



前 言

几年来，我省中医响应党的中医政策，發揚祖國醫學遺產的号召所献出的秘方驗方，業經我会整編了一部分，于一九五六年八月已出版，接着又整編了这本“河南省中医秘方驗方匯編(續一)”。需要說明这次整編的秘方驗方中，有不少剧毒藥品（如：巴豆、紅娘、斑蝥、甘遂、砒石……之类），在临床采用时，对虛弱患者請特別慎重將事。一般对于中医学術沒有相当造詣的讀者，对于这些剧毒藥品，需經過中医診斷許可后再用，切勿濫用，以免造成事故。

本續編內容分类，由于傳染病类單方不多，所以把它归在內科、兒科等病門中，不另列傳染病門，讀者可依照中医的分类法，以求索引。

編內献方人的籍貫，凡写“商專”、“洛專”二字的，就是“商丘專區中医进修班”、“洛陽專區中医进修班”的縮写；其他写在姓名前的二字，都是河南县名。讀者有需要向献方人詢問問題时，請逕向各該專區中医进修班或各該县衛生工作者协会轉达較為捷便。

最后，希望讀者在参考和临床采用秘驗方之余，仍將疗效記錄下来，以及宝貴意見，随时函告我会，作为再次重版时修改的参考。

河南省中医委员会

一九五八年七月

目 录

一 內科

1. 瘧疾类.....	(1)
2. 痢疾类.....	(3)
3. 破伤風类.....	(7)
4. 肺癆类.....	(10)
5. 咳嗽类.....	(12)
6. 哮喘类.....	(16)
7. 黃疸类.....	(17)
8. 吐瀉类.....	(19)
9. 头痛类.....	(20)
10. 中風类.....	(22)
11. 痹病类(包括痛風).....	(24)
12. 癰瘤类.....	(26)
13. 胃病类(包括噎膈).....	(30)
14. 梅核气类.....	(39)
15. 腫脹类.....	(43)
16. 腰痛类.....	(52)
17. 便血类.....	(53)
18. 陰囊病类.....	(55)
19. 脫肛类.....	(56)
20. 疝气类.....	(57)
21. 淋濁类.....	(59)
22. 尿閉类.....	(62)
23. 杂治类.....	(64)

二 婦科

1. 調經類..... (70)
2. 經閉類..... (74)
3. 崩漏類..... (76)
4. 帶下類..... (81)
5. 胎前類..... (85)
6. 臨產類..... (90)
7. 產後類..... (92)
8. 催乳類..... (100)
9. 乳病類..... (103)
10. 症瘕類..... (107)
11. 雜治類..... (109)

三 兒科

1. 麻疹類..... (111)
2. 驚咳類 (百日咳)..... (112)
3. 瘵病類 (驚風)..... (116)
4. 臍風類..... (120)
5. 鵝口瘡類..... (122)
6. 積塊類..... (126)
7. 吐瀉類..... (128)
8. 雜治類..... (131)

四 外科

1. 肺癰類 (肺膿瘍)..... (135)
2. 胃癰類 (包括胃潰瘍)..... (136)
3. 瘰癧類 (頸淋巴結核)..... (137)
4. 痔漏類..... (139)
5. 發背類..... (141)
6. 腫毒類..... (144)
7. 膿瘡類..... (146)

8. 疥癬类..... (148)
9. 杂治类..... (152)

五 五官科

1. 目病类..... (158)
2. 耳病类..... (162)
3. 口咽类..... (164)
4. 牙病类..... (169)

六 虫病、外伤及杂治

一 內 科

一 瘧 疾 類

處方 一

洛寧 李振華

主治：瘧疾。

藥物：柴 胡三錢 黃 芩三錢 桂 枝錢半 葛 根三錢 黃 芪四錢
川 芎三錢 常 山三錢 烏 梅三錢 別 甲三錢 牡 蠣三錢
吳基萸錢半 焦山查四錢 青 皮二錢 甘 草錢半 生 姜四片
紅 糖一兩

配制：水煎。

用法：內服，在發前一天夜間服頭煎，發日服二煎。重者二劑自愈
不易復發。

處方 二

汧縣 郭有才

主治：瘧疾。

藥物：蒼耳子葉五個

用法：在未發前二小時，將叶子貼于肚臍上，停一天去之即愈。

處方 三

汧縣 郭有才

主治：瘧疾。

藥物：常 山三錢 黑 豆二兩

配制：常山先熬水濾去渣，再入黑豆繼續煮之，將水煮干。

用法：將黑豆吃了。

处方 四

安陽 傅濟人

主治：久瘧不愈。

藥物：土白朮一兩 生 姜一兩

配制：水煎。

用法：內服，不論早晚，二三付可愈。

处方 五

安陽 曹景周

主治：瘧疾。

藥物：雄 黃五分 艾 叶二片

用法：將藥安手腕上（即寸口），男左女右。

处方 六

安陽 范金相

主治：瘧疾。

藥物：柴 胡四錢 黃 芩三錢 鱉 甲三錢 檳 榔三錢 常 山二錢
草 果二錢 烏 梅二錢 陳 皮二錢 甘 草一錢 生 姜三片

配制：水煎。

用法：內服。

处方 七

安陽 孫廷舉

主治：瘧疾。

方法：將大椎用針刺破，以半个胡椒敷上，外用膏藥貼之。

处方 八

唐河衛協會

主治：惡性瘧疾。

藥物：常 山三錢 烏 梅三錢 大 白三錢 草 果二錢 丁 香一錢
山 查五錢 血竭花一錢 真檀香三錢 秋絲苔引

配制：水煎。

用法：內服。

处方 九

新乡 馬英远

主治：瘧疾。

藥物：甘 遂三分 甘 草三分

配制：共为細末。

用法：將藥撒膏藥上，貼于臍上。

禁忌：孕婦忌用。

二 痢 疾 类

处方 一

中牟 喬效曾

主治：阿米巴痢疾。

藥物：松蘿茶一兩 白椿皮二兩 旱蓮草一兩 干 姜二兩 紅 糖二兩

配制：水煎。

用法：內服。十岁兒童作六次服完，每日二次。

处方 二

开封 邢本厚

主治：細菌性痢疾。

藥物：黃 連二錢 烏 梅二錢

配制：共为細末。

用法：每服一錢，開水送下。

处方 三

穀陽 王景春

主治：細菌性痢疾。

藥物：鷄 蛋一个 百草霜三錢

配制：將鷄蛋炒熟（不加油干炒）。

用法：先以開水送下百草霜，再將炒鷄蛋吃了，每日照服二次。

处方 四

安陽 張濟人

主治：細菌性痢疾。

藥物：大 葱一頭 紅 糖四兩

配制：將葱搗爛，加入紅糖，冷開水沖入攪勻濾干渣不用。

用法：將濾汁內服，一日一次。

处方 五

洛寧 郭石秀

主治：紅白痢疾。

藥物：香椿樹皮 白椿樹皮（均去老皮）曬干

配制：共為細末。

用法：每日一次服三錢，加紅白糖（初病不用）開水送服。

处方 六

洛寧 王萬君

主治：紅白痢疾。

藥物：馬齒莧鮮的四兩 干的用五至八錢

配制：水煎，紅痢加蜂蜜，白痢加紅糖。

用法：內服。

处方 七

洛寧 左華堂

主治：紅白痢疾。

藥物：銀花 冰糖各一兩

配制：水煎。

用法：內服。

处方 八

濮陽 張世昌

主治：紅白痢疾。

藥物：鴉胆子仁一兩去油 五倍子二錢炒黃 枯 凡二錢

廣木香錢半 黃 連錢半

配制：上藥共为細末，面糊为丸，桐子大。

用法：每服二十丸。

处方 九

安陽 師致明

主治：紅白痢疾。

藥物：紅糖四兩 鷄蛋一个

配制：將紅糖在勺內化开，將鷄蛋打在里面，以热为度。

用法：一次吃完，一天一次。

处方 十

安陽 何鴻志

主治：紅白痢疾。

藥物：焦山查一兩 滑石五錢 广木香五分 甘草二錢

配制：水煎（紅痢加白糖白痢加紅糖）。

用法：內服。

处方 十一

內黃 王隆學

主治：紅白痢疾，日久轉为虛寒者。

藥物：百煨河子三錢 肉蔻炒去油三錢 木香一錢 吳茱萸五分
生姜五錢

配制：水煎，加紅糖五錢。

用法：內服。

处方 十二

濮陽 王希國

主治：食積紅白痢疾。

藥物：山查一兩 焦山查一兩 干姜四錢 滑石四錢

配制：水煎，加紅白糖为引。

用法：內服。

处方 十三

內黃 郭廣源

主治：虛寒痢疾或痢久不愈。

藥物：赤石脂^{三錢} 白 凡少許

配制：共研細末。

用法：米湯或白面湯沖服。

處方 十四

南樂 吳亮周

主治：白痢。

藥物：南山楂^{一兩} 白 芍^{一兩}

配制：水煎加紅糖適量。

用法：內服。

處方 十五

南樂 吳亮周

主治：血痢。

藥物：竹葉^{二錢} 鈎 丁^{三錢} 蟬 腿^{二錢}

配制：水煎，加白糖適量。

用法：內服。

處方 十六

漢陽 朱世榮

主治：赤痢。

藥物：銀 花^{五錢} 滑 石^{二錢} 側柏葉^{炒二錢} 神 曲^{二錢}
甘 草^{錢半} 藕 節^{五錢}

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十七

安陽 潘際昌

主治：痢疾。

藥物：馬齒莧

配制：將馬齒莧切碎和面包住蒸熟。

用法：盡量食之。

处方 十八

洛陽 張潤軒

主治：痢疾。

藥物：木槿花一大把

配制：水煎加紅糖五錢。

用法：內服。

处方 十九

安陽 王序泰

主治：痢疾。

藥物：二花二兩

配制：焙干為末。

用法：每服五錢，一日服二次，白痢多，加紅糖一兩，紅痢多加白糖一兩。

处方 二十

安陽 謝文德

主治：久痢。

藥物：椿根白皮一兩 柴胡二錢 烏梅七個 車前子五錢
黑豆一兩

配制：水煎。

用法：內服。

三 破 傷 風 類

处方 一

平樂 郭耀堂

主治：破傷風第一期心煩口舌干燥，飲水不止。

藥物：川芎三錢 升麻二錢 白芷三錢 京子三錢 荆芥二錢
防風三錢 明天麻三錢 南星三錢 川羌三錢 桂枝三錢
姜虫二錢 全虫一錢 靈仙三錢 芒硝三錢

配制：水煎。

用法：內服，只服一剂。

处方 二

平乐 邵耀堂

主治：破伤风第二期心中發急不安，面色青紅。

藥物：(一)天竺黄一錢 田三七一錢 琥 珀五分 朱 砂五分 元寸一分

牛 黄五厘 乳 香五分 沒 藥五分

(二)天 麻全虫 姜 虫各二錢

配制：(一)共为細末 (二)水煎濾汁加黃酒四兩 白 芷一兩。

用法：(一)三次分服，每三小时服一次(成人量)。(二)將藥汁
送服藥末。

处方 三

平乐 邵耀堂

主治：破伤风第三期身体僵硬抽搐冷汗。

藥物：潞党参二兩 熟 地一兩 归 身三錢 制附子二錢 上元桂一錢
炙 草二錢(用时宜慎)

配制：水煎。

用法：內服。

处方 四

洛寧 王允華

主治：破伤风。

藥物：蟬 退去头足十五个 白魚鱉头錢炒三兩 荆 芥五錢 黃 酒半升

配制：用黃酒煎藥。

用法：內服(热服出汗避風一剂即愈)。

处方 五

商寧 傅傳久

主治：破伤风。

藥物：楮树皮二兩 紅 糖二兩

配制：水煎。

用法：內服，出汗。

处方 六

滑县 郭成德

主治：破伤風。

藥物：当 归_{三錢} 川 芎_{三錢} 川 断_{三錢} 川 羌_{三錢} 大 活_{三錢}
川木瓜_{三錢} 明 雄_{二錢} 灵 仙_{三錢} 黄 芩_{三錢} 荆 芥_{三錢}
甘 草_{一錢}

配制：水和童便煎藥。

用法：內服。外傷，用防風南星細面，香油和敷。

处方 七

安陽 李丙寅

主治：破伤風（包括产后風）

藥物：蟬腿五錢去头足为末

配制：用黄酒十兩煎沸，再入蟬退末煎數沸。

用法：一次服完，發汗，避風三天。

处方 八

洛寧 程瑞祥

主治：干痲風（即破伤風）。

藥物：元寸 辰砂 姜虫 三七各五分

配制：上藥共为細末。

用法：每服五厘，黄酒冲下。

处方 九

安陽 楊玉修

主治：破伤風口緊。

藥物：鷄窩中蟬螻。

用法：將头切去，用汁搽牙，即开。

四 肺 癆 類

处方 一

商丘 周宏裕

主治：肺結核咯血。

藥物：煅牡蠣二兩 山甲炒二兩 鱉甲炒二兩 象貝母二兩 元寸二分

配制：上藥共研細末，用阿膠煎湯為丸。

用法：每次服一滿小匙，每日服三次，飯後服。

处方 二

陳少云

主治：肺結核吐血。

藥物：白芨二兩 核桃仁三兩 猪肺一具煮熟

配制：前二味共為末。

用法：將猪肺粘二藥末服（一方云可加些蜜服）。

处方 三

蘭亭中醫進修班

主治：肺結核。

藥物：海浮石一兩（去粗渣） 大珍珠五分 姜 蛋二錢 羚羊角一錢

西洋參一錢五分 元 寸二錢 枝子皮二錢 蜘蛛十個

滑 石二錢 煨白朮二錢 云 苓二錢 白果衣二錢煨

清半夏三錢

配制：共研極細末。

用法：每飯後服二分，一日三次。

处方 四

蘭亭中醫進修班

主治：肺結核。

藥物：大蒜或小蒜。

配制：搗爛為丸。

用法：每服二分，常服有效。

处方 五

尉氏 王有志

主治：肺結核。

藥物：防党参一兩 川 連一兩

配制：共为細末，煉蜜为丸。

用法：每服一錢，日服三次，飯前服，兼服雞蛋三个。数料可愈。

处方 六

新乡 王玉明

主治：肺結核（骨蒸潮热咳嗽）

藥物：生百部四兩 杏 仁去皮油炒四兩 白 芨二兩

配制：共为細面。

用法：每日服三錢，常服为妙。

处方 七

新乡 賀言思

主治：肺結核

藥物：大蒜二兩

配制：煮熟。

用法：連湯帶蒜服完，早晚各煮服二兩，服至病愈为止。

处方 八

洛專 狄中华

主治：肺病，咳嗽，痰帶血絲。

藥物：党参四兩 白椿根皮四兩 酸棗樹根白皮四兩

配制：上藥水煎兩柱香去渣，入蜂蜜四兩，血余炭少許。

用法：不拘时当茶飲。

处方 九

洛專 張學魁

主治：肺癆（肺結核）。

藥物：生地半斤 元 参十兩 連 翹一兩 二 花一兩 錦地羅一兩

貝 母、百 合、双 皮各三錢

配制：水煎。

用法：早晚各服一次，弱者减量用（慎用）。

五 咳嗽类

处方 一

洛寧 張景周

主治：年老气短咳嗽，气候寒凉更感呼吸困难。气急。

藥物：党参三钱 白朮三钱 云苓三钱 炙甘草二钱
广陈皮三钱 制半夏三钱 炙冬花三钱 炙天冬二钱
炙寸冬二钱 炙薏仁一钱半 白芥子二钱

配制：水煎。

用法：内服。

处方 二

洛寧 駱林

主治：气虚咳嗽。

藥物：生姜八兩 核桃仁二兩 好柿餅一个

配制：將姜和核桃仁榨碎，入柿餅內，放油鍋內炸一炸。

用法：任意食之。

处方 三

安陽 張俊民

主治：咳嗽吐血。

藥物：新椿根白皮四兩 梨四兩去皮核 蜂蜜四兩 白糖四兩

配制：將椿根皮及梨用蜜炙了，放銅鍋內加水煎熬三沸去渣，再加白糖煮五分鐘即成。

用法：每天早晚各服一次，每次兩酒盅，開水沖服。

处方 四

安陽 唐景周

主治：久病咳嗽。

藥物：梨兩個 川貝母五錢 力參一錢 白糖一兩 五味子一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 五

安陽 王恩德

主治：熱咳嗽。

藥物：川貝母末六錢 蜂 蜜二兩

配制：二味調勻。

用法：分二次，開水沖服。

处方 六

安陽 邢文秀

主治：咳嗽痰壅。

藥物：玉 金一錢 白 凡一錢 牛 黃一分 朱 砂少許 薄荷冰少許

配制：共為細面密貯。

用法：每服二分。

处方 七

安陽 邢文秀

主治：咳嗽吐痰。

藥物：川貝母三錢 橘 紅三錢 瓜 蒌四錢 清半夏二錢

白 芨二錢 桑葉二錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 八

安陽 陳 秀

主治：咳嗽。

藥物：梨 汁四兩 川貝母末一兩 蜂 蜜半斤

配制：共熬成膏。

用法：每服三錢。

处方 九

安陽 劉長率

主治：咳嗽。

藥物：蜂 蜜一兩 紅 糖四兩 生 姜四兩搗碎

配制：共熬成膏。

用法：隨意食之。

处方 十

安陽 王垣光

主治：咳嗽。

藥物：蘇 叶三錢 双 皮三錢 桔 梗三錢 甘 草三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十一

安陽 范金相

主治：咳嗽。

藥物：鮮生山藥二兩去皮 蜂 蜜四兩

配制：將山藥切碎加蜜煎熟。

用法：內服。

处方 十二

新乡 王尊三

主治：受寒咳嗽。

藥物：胡 椒錢半 浙 貝五錢 大 梨六個 蜂 蜜二兩

配制：將梨挖下一蓋，再挖出梨肉適量，再將椒貝為末與蜜和勻，分裝梨內蒸熟。

用法：每飯後服二個，日服三次。

处方 十三

新乡 任金生

主治：年老畏寒咳嗽。

藥物：生 姜二兩 紅 糖二兩 紅 棗二兩去核

配制：三味共搗如泥。

用法：每飯后服三錢，開水送下。

處方 十四

新鄉 任保福

主治：新久咳嗽。

藥物：炙麻黃一錢 生奴皮五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十五

新鄉 李 炎

主治：畏寒咳嗽。

藥物：生 姜二兩

配制：燒炭，研為末，分作四包。

用法：每天服一包，元酒一兩送下。

處方 十六

新鄉 崔其峰

主治：咳嗽日久。

藥物：川貝母三錢為面 蜂 蜜五錢

配制：蜜放杓內煎沸，加入川貝面，開水沖化。

用法：上藥一次內服，每日一次，服三五次。

處方 十七

新鄉 任保福

主治：因感冒引起之咳嗽、喘息，呼吸困難。

藥物：炒麥芽一兩 冰 糖半兩

配制：冰糖為末。

用法：麥芽煎湯，送服冰糖。

處方 十八

安陽 潘際昌

主治：咳嗽痰喘。

藥物：橘紅 半夏 姜虫 川貝各等分

配制：共為細面。

用法：每服一分，日服三次。

處方 十九

洛專 狄中華

主治：肺病咳嗽痰帶血絲。

藥物：覺 參四兩 白椿根樹皮四兩 酸棗樹根白皮四兩

配制：上藥水煎兩柱香去渣，入蜂蜜四兩 血余炭少許

用法：不拘時當茶飲。

六 哮 喘 類

處方 一

關考 劉子正

主治：喘咳浮腫脈沉有力。

藥物：葶苈子四錢 桑 皮三錢 炒杏仁三錢 蘇 子二錢

茯苓八錢 澤 瀉三錢 猪 苓三錢 大腹皮四錢

川牛夕二錢 車前子三錢 布包（方內有葶苈須經中醫診斷許可後方可應用）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二

洛專 吳慶林

主治：哮喘。

藥物：大秋梨半斤 生 姜半斤 紅 糖半斤 白胡椒二錢

配制：上藥共搗為糊蒸熟。

用法：每日早晚各服五錢。

處方 三

濮陽 李忠林

主治：痰喘咳嗽。

藥物：牙皂莢二錢 杏 仁二錢 射 干三錢 干 姜二錢
川 貝三錢 元 桂錢半

配制：上藥共為細末煉蜜為丸。

用法：先由小量服起，漸次增加，以知為度。

處方 四

安陽 牛廷燦

主治：哮喘

藥物：麻 黃四兩 冰 糖四兩

配制：將麻黃加水熬濾去渣，再將冰糖加入熬成膏。

用法：每次服一大酒杯，一天兩次，開水沖服。

處方 五

安陽 楊玉書

主治：咳嗽哮喘。

藥物：白果仁四兩 冰糖、紅糖、蜂蜜各四兩 生姜汁兩盅

配制：將白果仁研面，和后四味共熬成塊。

用法：噙口中化嚥。

處方 六

唐河 衛協會

主治：紅薯瘰（哮喘）得于潮濕肥沃地上勞動后

藥物：紅薯杆四兩 紫背浮萍半碗 紅白糖各二兩

配制：水煎加入紅白糖。

用法：內服二碗發汗。

七 黃 疸 類

處方 一

洛專 賈稚汗

主治：全身發黃小便少不能食。

藥物：茵陳蒿 炒黑凡 核桃仁 豬肪油 紅 糖 大棗去皮
各四兩

配制：上藥一處共搗為丸，三錢重。

用法：每服一丸，每日二次。重者兩料可愈。

處方 二

洛寧 張文

主治：黃疸（陽黃）。

藥物：赤小豆 白黍子 公丁香 苦丁香焙干或晒干各七個

配制：上藥共為細末，分為三包。

用法：每天用一次，把一包吸在鼻腔內，用紙塞住鼻孔，二小時把紙去掉，鼻內即流黃水，藥完可愈。不愈再用一料。

處方 三

濮陽 邊建修

主治：黃疸。

藥物：黑 凡半斤 小棗泥一斤 胡桃仁去薄皮四兩 紅花微炒四兩為末

配制：上藥合搗極勻，和入煉蜜為丸，桐子大。

用法：每早晚空心各服十五粒。

禁忌：南瓜雜肉。

附說：服藥後，如有欲嘔現象，應減量服。

處方 四

唐河 衛協會

主治：黃疸。

藥物：陳皮 油朴 蒼朮 青皮 各四錢共為面 黑 凡二兩
大 棗八十枚 香 油一兩

配制：先將棗煮熟後，去皮核，取肉搗為泥，再用水一小碗和香油共入鍋內煮沸，將黑凡加入溶化後，加入藥面，放涼後，把棗泥和入拌勻，為丸如綠豆大。

服法：每晚飯後，用卮子，茵陳少量煎水沖服二十粒。次早再沖服十粒，連服十日後，早晨不再服用。

處方 五

安陽 豆義方

主治：陰黃疸。

藥物：黑 凡 胡桃仁 猪板油 梁上塵 小麦面各二兩

配裝：共碾極細，以熟棗肉和為丸。

用法：每服二錢，每日二服，開水送下。

八 吐 瀉 類

處方 一

洛專 郭同寅

主治：久瀉不止。

藥物：黑山羊肝子一個 黑 凡一兩

配制：將羊肝用竹刀割開，黑凡撒在肝子內，瓦器內蒸兩柱香時間。

用法：不分次數吃完即愈。

附說：經者意見：上方黑凡量相當大，吃時應由小量吃起，漸次增加，吃後如感不適，即應減量。

處方 二

洛專 駱 林

主治：夏日水瀉。

藥物：新屠猪血

配制：將猪血放瓦上焙干研細。

用法：每服二錢，開水送下，小兒減量。

處方 三

洛專 楊國君

主治：中寒上吐下瀉脈沉面蒼白。

藥物：麦 麩五斤 食 鹽半斤

配制：用酒或醋拌麩鹽，炒半小時，分裝兩個布袋內。

用法：將袋輪流熨腹上，數次即好轉，隨內服附子理中湯加減。

處方 四

安陽 馬順卿
郭清源

主治：上吐下瀉腹部微痛或轉筋。

藥物：鏡面砂一錢五分 粉甘草面一錢 薄荷冰三分 冰片二分五厘

配制：共為細面密貯。

用法：每次服五分，每小時服一次，重者半小時服一次，最好在服藥前，先刺尺澤穴放出黑紫色血液。

處方 五

項城 崔國榮

主治：嘔吐腹瀉（腸胃炎）。

藥物：六一散每兩加仁丹三十粒朱砂一錢

用法：每服一錢至三錢。

附說：原方未載服用量，編者擬定如上量。

九 頭 痛 類

處方 一

巩縣 李汗三

主治：頭痛兼牙痛（三叉神經痛）。

藥物：夏枯草五錢 大黃四錢 川芎三錢 白芷三錢
生香附三錢 菊花三錢 澤蘭三錢 懷牛夕二錢 甘草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二

洛寧 劉鳳閣

主治：眉稜骨痛。

藥物：酒黃芩錢半 白芷一錢 防風一錢 柴胡一錢
川羌一錢 酒川芎七分 穗芥荊甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服（晚睡時服）。

處方 三

洛寧 賈維漢

主治：眉稜骨痛（早飯後開始，中午大痛，傍晚輕，入夜止）。

藥物：黑羚羊角一錢 辽細辛一錢 知 母一錢 辽 味一錢

川 軍三錢 芒 硝二錢 防 風二錢

配制：水煎。

用法：內服，日久疼痛，服之即效。

处方 四

洛寧 衛克儒

主治：偏正头痛。

藥物：霜桑叶一个 鷄 子一个

配制：將桑叶水煎一时，入鷄子燉熟。

用法：喝湯吃鷄子，飯后用，一日二次，重者可連服數日。

处方 五

開封 劉國威

主治：偏头痛兼眼痛牙痛（三叉神經痛）。

藥物：牙 皂一錢 鵝不食草一錢 細 辛一錢 青 黛五分

配制：共為細末。

用法：每用少許吸入鼻孔（左痛吸右孔內，右吸左，以流淚為效）。

用三五次。

处方 六

尉氏 羅廣先

主治：偏头痛（實熱症）。

藥物：酒 連二錢半 川 芎四錢 黃 芩三錢 柴 胡三錢

羌 活三錢 細 辛一錢 防 風二錢 石決明四錢 木 通二錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 七

濮陽 李忠林

主治：偏头痛。

藥物：蒼耳子四錢 川 芎三錢

配制：共為細末。

用法：姜水冲服。

处方 八

洛寧 楊國君

主治：頭痛（早飯前后發作微惡寒者）。

藥物：生川芎五錢 柴 胡一錢 細 辛三分 生 姜三片

配制：水煎。

用法：在發作前兩小时空心服（孕婦酌減川芎）。

处方 九

漢陽 曾庆修

主治：偏正頭痛。

藥物：細 辛三莖 瓜 蒂七枚 丁 香七粒 梗 米七粒
梅 片五厘 元 寸一分

配制：共研細末。

用法：先令患者口含清水，再隨左右將藥末吹入鼻中豆許，三十分鐘將清水吐出即安，不愈再作。

一〇 中 風 類

处方 一

杞縣 郭明陽

主治：右半身不遂脈微細。

藥物：大綿芪二兩 桂 枝三錢 白 芍四錢 川 芎三錢
歸 身四錢 棗 仁四錢 柏子仁四錢 雞血藤四錢
川 羌三錢 秦 艽三錢 荆 芥二錢 防 風三錢
杜 仲四錢 甘 草二錢

配制：水煎。

用法：內服數劑。

处方 二

新鄉 常溫亭

主治：口眼歪斜。

藥物：黃 連七錢 覺 參五錢 歸 身五錢 白 芍四錢

羌 活三錢 防 風二錢 白附子三錢 全 蝎三个
甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服三四剂。

处方 三

洛專 万聖忠

主治：半身不遂，中風不語。

藥物：西黃蘗八兩 党 参三兩 大熟地二兩 黑杜仲一兩
西杞果三錢 炒棗仁四錢 焦白朮五錢 补骨脂五錢
山萸肉三錢 怀山藥炒四錢 炙甘草二錢 大 棗三个
核 桃二个打碎

有寒加附子三錢 炮 姜三錢，血滯加好元桂二錢，不省人事
加石菖蒲。

配制：水煎。

用法：內服數十剂可愈。

处方 四

洛專 胡魯素

主治：中風不語（卒然昏倒，不省人事，喉內痰声如鋸，四肢強
硬）。

藥物：当 归一兩 台烏片三錢 灵 仙三錢 云 皮一錢
半 夏三錢 石菖蒲三錢 玉 金三錢 防 風三錢
牙 皂三錢（煨为面） 川厚朴一錢 枳 实三錢 生 姜三片

配制：水煎。

用法：內服，二剂有效。

处方 五

長垣 李浩訓

主治：口歪舌強言語不清。

針穴：針刺：頰車 地倉 合谷 三个穴位見效后用外敷藥。

外敷：蓖麻子仁六十粒 牙皂研面八分 共搗为泥 左歪敷右 右歪

數左。

处方 六

商丘 于超然

主治：癱瘓（兩足筋軟，發陰燒，昏睡）。

藥物：鹿茸二錢 鱉甲二錢 乳香二錢 沒藥二錢
蓉花樹皮二錢

配制：水煎，加紅糖、燒酒適量。

用法：內服。

附說：服后如不見輕，第二劑加黑豆去紅糖。

处方 七

商丘 張文光

主治：半身不遂，麻木不仁。

藥物：當歸五錢 赤芍二錢 桃仁一錢半 云苓三錢 口芪一兩
甘草一錢 秦艽三錢 川芎一錢 地龍三錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：初起無遺尿症狀者，口芪漸加至四兩。

一一 痹病類（包括痛風）

处方 一

通許 沈文杰

主治：周痺（周身疼痛）。

藥物：秦艽四錢 木瓜三錢 五加皮三錢 川斷三錢 乳香三錢
川烏錢 桑寄生四錢 小茴三錢 杜仲四錢 獨活一錢
桂枝三錢 川芎三錢 甘草一錢 川牛夕三錢 黑豆五錢

配制：水煎。

用法：內服，三劑。

处方 二

東明 邢懷之

主治：痺病（周身關節痛或麻木不仁，身灼熱，屈肢難伸）。

藥物：蒼 朮三錢 黃 柏三錢 川 羌三錢 獨 活三錢 當 歸三錢
 川 牛 夕三錢 防 已二錢 廣 木 香三錢 元 胡三錢 赤 芍二錢
 紅 花錢半 桑 寄 生二錢 乳 香二錢 沒 藥三錢 地 骨 皮三錢
 柴 胡三錢

配制：水煎。

用法：藥汁加酒一盅，內服（連服有效）。

處方 三

杞 縣 張 洪 錫

主治：風濕腿痛，勞動尤甚。

藥物：當 歸 川 芎 川 牛 夕 川 木 瓜 地 風
 年 見 川 烏 草 烏 川 羌 杜 仲
 二 花 甘 草各四錢（此方有劇毒藥經中醫診斷許可后方可
 應用以免中毒）

配制：上藥共為粗末，泡入二斤燒酒內，五天后再加入白糖半斤。

用法：頻服。

處方 四

洛 寧 程 濟 群

主治：風濕腿痛。

藥物：麻 黃 桂 枝 川 烏 草 烏 千 年 見
 杜 仲 川 羌 大 活 附 子 云 皮
 川 芎 防 已 粉 丹 皮 白 花 蛇 乳 香
 沒 藥 馬 前 子各等分

配制：上藥為細末，煉蜜為丸，如梧子大。

用法：每服七丸燒酒送下（藥劇慎用不可過量）。

處方 五

洛 寧 劉 志 敏

主治：風濕性關節炎（不論新久）。

藥物：豆腐漿六十斤 當歸二兩 漢防已三兩

配制：上三味按熬藥膏法，熬為膏。

用法：將膏敷患處。

處方 六

洛寧 程濟群

主治：鶴膝風。

藥物：生川烏 生草烏 生附子各五錢 汶防己三錢

配制：上藥共為細末米醋調。

用法：塗患處（并內服小續命湯加減治之）。

處方 七

滑縣 班裕若

主治：風寒濕筋骨痛。

藥物：當歸三錢 萸川三錢 赤芍三錢 桂枝四錢 姜黃二錢
川芎三錢 玉米四錢 木瓜三錢 川牛夕三錢 威靈仙三錢
擦砂仁二錢 廣木香二錢 熟地四錢 陳皮二錢 獨活三錢
香櫞三錢（無香櫞以元肉三錢代之） 紅糖四兩 明流酒三斤半

配制：將藥糖同酒同人瓶內，蓋緊瓶口，置鍋中燉三柱香時間取出。

用法：每日早晚各飲藥酒一盅。

一二 癲癇類

處方 一

登封 姜文治

主治：胡言亂語，不知羞恥。

藥物：知母二錢 貝母三錢 天冬四錢 寸冬三錢
羚羊角二錢 廬子三錢 黃連二錢 芒硝四錢
西吉一兩 地龍三條 白凡一錢 皂凡一分
青礞石四錢 朱砂一錢研細外包

配制：水煎。

用法：內服，服后上吐下瀉，昏迷不醒，一日、三日后再服一劑

(此方宜慎用)。

禁忌：孕婦忌用。

处方 二

陈留 樊玉如

主治：羊癇瘋。

藥物：猪 胃一个 陈棉花十兩 燒灰 豆腐漿一罐

配制：將棉灰裝入猪胃內扎口，放豆腐漿內用大砂鍋煮熟。

用法：去棉灰食胃。吃一、二个可愈。

处方 三

密县 呂履九

主治：羊癇瘋。

治法：發作時，查看會陰部有紫色小泡，以針刺破出血自愈。

处方 四

洛寧 万聖忠

主治：羊癇瘋。

藥物：明 雄三錢 神 砂三錢 生南星三錢 生半夏三錢

生草烏三錢 生川烏三錢 綠豆面一兩八錢

配制：上藥共為細末水和為丸綠豆大。

用法：內服，頭三天每次服四丸，每早空心開水送下，以後每日增加一丸，加至八丸為止。（為經常量不可多服）

附說：服藥期間，若吐清痰疙瘩，即為有效徵兆。

处方 五

商寧 黃思義

主治：羊羔瘋。

藥物：人中白五錢 雞 蛋七个

配制：將人中白裝七个雞蛋內，用面包住燒熟。

用法：隨意吃雞蛋，能吃几个吃几个。

处方 六

商寧 杜恆鑫

主治：羊癇瘋。

藥物：雄黃一錢 川貝一錢 花粉一兩 熊胆一分
牛黃五厘 赤金三十張 朱砂五分 琥珀一錢
薄荷一錢 元寸一分 降香一錢 海浮石一錢

配制：共為細末。

用法：內服，分六次服完。

處方 七

商專 王宗仁

主治：羊癇瘋。

藥物：魚鰾一兩 鐵炒 皂凡一兩 鐵炒 朱砂一兩 輕粉三錢

配制：上藥共為細末。

用法：用混酒送服（三次分服）。

附說：編者按：皂凡、朱砂、輕粉三藥分量都嫌過大，似可減半試用。

處方 八

商專 陳鳳朝

主治：羊癇瘋。

藥物：白凡五錢 魚膠一兩 白面炒黃 朱砂三錢

配制：共為細末分作三付。

用法：每日空心開水送服一付。

處方 九

安陽 董純

主治：羊癇瘋。

藥物：小牙皂半斤 清半夏三兩 生薑三兩 朱砂一錢
羊肝一個

配制：將牙皂、生羊肝加水兩碗煮之，煮至水將盡為度；取出牙皂陰干研為細末，半夏也研為細末，生薑搗爛取汁，和牙皂、半夏末為丸如黃豆大，朱砂研末為衣。

用法：每次服三錢，每早晚空心各服一次，開水送下。

禁忌：禁吃辛辣。

处方 十

洛專 趙子勳

主治：氣心瘋（時哭時笑不識尊卑）。

藥物：西 吉一兩半 川 朴五錢 炒白芥子五錢 黃 芩五錢
木 通二錢 枳 實五錢 芒 硝二錢 姜半夏錢半
梔 子五錢 菖 蒲五錢 礞 石三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十一

滑縣 班裕若

主治：癇症（發病時喘促昏悶，無喘者不治）。

藥物：生杭芍六錢 寸 冬六錢 知 母六錢 冬 花八錢
青木香五錢 枳 實六錢 大 白六錢 厚 朴六錢
花 粉八錢 粉 草五錢 桔 梗六錢 大生地六錢

配制：上藥共為細末，煉蜜為丸如棗大。

用法：每日早晚各服一丸，服完可愈。

处方 十二

商專 史文浩

主治：癲癇。

藥物：魚 鱉二兩 好麻炭 三錢

配制：魚鱉剪為小塊，放杓中，上蓋一小碗炒黃，和麻炭共研為末。

用法：每次服三至五錢，日二服。

处方 十三

商專 閻克彰

主治：癲癇。

藥物：冰 糖四兩 夾竹桃叶尖（每岁一个叶尖）

配制：水煎。

用法：內服。

附說：服此藥后，即大量嘔吐痰沫，痰尽病愈，一般最少要吐三天。（用时宜慎重，应經中医診斷許可后再用）。

处方 十四

商專 郭錫源

主治：癲癇。

藥物：猪尿。

用法：每服一酒杯，一日三次。

处方 十五

商專 史文逸

主治：癲癇。

藥物：代赭石六錢 淤白朮 酒曲 半夏 龙胆草 沒藥各三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十六

尉氏 朱万鑑

主治：癲癇狂。

藥物：（1）磁石末一錢 朱砂末五分 （2）党 参一两

白 朮一两 烏 藥三錢 海 沉三分 白 芷二錢

天 麻二錢 苏 叶錢半 木 瓜四錢 青 皮三錢

葛 蒲三錢 茯 神五錢 棗 仁三錢 甘草一錢

有痰加半夏三錢

用法：先服磁石朱砂，后服煎劑。

一三 胃 病 类（包括噎膈）

处方 一

东明 尹汝汗

主治：胃脘痛（憎寒壯熱時痛時止甚至嘔吐）。

藥物：丁 香 广木香 巴豆霜 白胡椒各三錢 枳 壳

紅 花 灵 脂各一两

配制：上藥共为細末。

用法：內服，弱者每服八厘，强者每服一分，开水送下，日二次
（三五日可愈，服三星期可除根）。

处方 二

开封 朱广居

主治：胃痛（胃脘痛）。

藥物：元 胡三錢 灵 脂三錢 乳 香三錢 沒 藥二錢 草 果三錢

配制：上藥共为細末，分作二包。

用法：每服一包，酒送下。

处方 三

洛寧 張思敬

主治：反胃（随食随吐或暮食朝吐）。

藥物：水 銀一錢 石硫磺二錢

配制：上藥合研極細如煤色。

用法：上藥黃酒送服（頓服），此后每天早晨服牛乳或羊乳不拘多少，服一百天可愈。

处方 四

洛寧 張學魁

主治：一般胃痛。

藥物：广木香三錢 朱 砂一錢

配制：共为細末分作三包。

用法：每服一包开水送下。

处方 五

洛寧 李振華

主治：胃癰（包括胃潰瘍）。

藥物：海螵蛸去皮。

配制：为細末。

用法：每服三錢用陈皮一錢 丁 香五分 木 香五分 煎水送服，每日服三次。

禁忌：甜糖及难消化食物、刺激性东西。

附說：服三日后，大便不見血，病症見輕，可減量至二錢。如大便秘，可加貝母三錢，麻仁三錢。

处方 六

洛專 王志純

主治：胃部沉痛，嘔吐酸水。

藥物：黃連錢半 附子三錢（此方有劇毒藥經中醫診斷許可后方可应用以免中毒）

配制：水煎。

用法：內服。

处方 七

洛專 李宗道

主治：反胃。

藥物：阿魏三錢 杏仁七個去皮尖 枳壳二個 燒酒四兩

配制：將阿魏、杏仁搗為細末，裝在枳壳內合住，用綫捆緊，放砂鍋內煮四小時，將枳壳取出，瓦上焙干，再裝在兩個筒瓦內捆住，將筒瓦兩頭用面塊封好，火上焙黃為度，共為細末。

用法：每晨服一次，每次服一錢，黃酒沖下。

处方 八

洛專 左華堂

主治：肝郁胃痛。

藥物：紫丁香錢半 良姜一錢 砂仁一錢 川椒三錢 烏梅一個
元寸二分 沉香三分

配制：水煎。

用法：內服。

处方 九

洛專 段清吉

主治：心胃痛。

藥物：丹參五錢 檀香三錢 砂仁錢半 白片三錢

金鈴子二錢 元 胡三錢 制乳香二錢 广木香七分
沉 香五分 (男子服去丹參)

配制：水煎。

用法：內服。

禁忌：孕婦忌服。

处方 十

南乐县 李春

主治：胃气痛。

藥物：干 姜五錢 甘 草五錢 白 芍五錢

配制：水煎，加紅糖一兩。

用法：內服。

处方 十一

襄陽 李玉海

主治：胃气冷痛。

藥物：香 附一兩醋洗七次 良 姜一兩醋洗七次

配制：共研極細末。

用法：每服三錢，每日二次，開水送下。

处方 十二

南乐县 李春

主治：胃气冷痛，時發時愈。

藥物：胡 椒七粒 全虫一个去头足及尾尖

配制：共研細末。

用法：一次開水送服。

处方 十三

內黃 殷学林

主治：慢性胃气痛。

藥物：活蝎子一个 片 砂五分 生白面一錢

配制：共搗極細，水和为十五丸。

用法：每服三丸，每日三服，开水送下。

禁忌：生冷食物。

处方 十四

商寧 郭彩光

主治：倒食（飯后一小時后嘔吐）。

藥物：廣白叩三錢 棗砂仁三錢

配制：共為細面，分作七包。

用法：每服一包，水酒各半沖服。

处方 十五

漢陽 穆宗興

主治：噎食。

藥物：胡桃仁研碎四兩 生薑碎切四兩 藕節切碎四兩 紅糖四兩

白糖四兩 廣木香為末一錢 砂仁二錢為末 香油一斤

配制：將香油在銅鍋內熬開，即將諸藥放入攪拌，再放入飛羅面適量拌成塊。

用法：上藥隨意食之。

处方 十六

漢陽 段智印

主治：噎膈反胃。

藥物：熟地一兩 吳茱萸四錢 寸冬三錢 五味子四錢

元參一錢 大當歸三錢 白芥子一錢 川牛夕二錢

配制：水煎。

用法：內服，服七八付后，改服下方。

熟地一兩 附子一錢 上油桂一錢 吳茱萸四錢

大寸冬三錢 五味子二錢 天字片四錢 山藥二錢

粉丹皮一錢 澤夕一錢 川牛夕一錢

第二方須多服至三五十付，服藥期中如覺中滿難受，加服海南沈八分。

处方 十七

滑县 高相汉

主治：噎膈。

藥物：生 姜四兩 去皮切細極 葱 白四兩 搗如泥 細 芡面四兩
紅 糖四兩 白 糖四兩 核桃仁四兩 搗成膏 蜂 蜜四兩
明 酒四兩

配制：先將糖蜜入鍋熔化，再加入各味熬之，熬至滴水成珠為度，
過熬則失效。

用法：每服半兩，開水沖服，一日二三次。

处方 十八

商 專 劉擢英

主治：噎膈（滿喉淡白，內外無形，吐之不出，咽之不下，如花芯
狀）。

藥物：沉香 大丁香 老木香各三錢 鷄嗉子三個

配制：前三味共為面，鷄嗉子（不去內容物）用黃膠泥包住，放炭
火上燒焦，去外泥為面，和前藥面煉蜜和為丸如豆大。

用法：每服二至三錢，一日服兩次。

处方 十九

商 專 范云驤

主治：噎膈。

藥物：沉 香二錢 冰 片一錢 上川貝五錢 百 合五錢
卜 荷一兩

配制：共為細末。

用法：每服一錢，開水送下，日服二次。

处方 二十

商 專 毛慕文

主治：噎膈。

藥物：初生老鼠兒子一個。

配制：瓦上焙干為末。

用法：內服黃酒送下，一次服完，須服五六次。

附說：對吐痰如蟹沫者不治。

處方 二十一

商專 于希杰

主治：噎膈。

藥物：沉香五分 廣木香五分 紫 薏五分 紅豆蔻五分 丁香五分

烏雞胃一個（去內容物，勿沾水）

配制：用雞胃裝各藥，外用膠泥包住，燒焦去泥研末。

用法：三次分服，開水送下。

處方 二十二

商專 張超彬

主治：噎膈及倒食。

藥物：白公雞一只取血 蓖麻子稞七稞

配制：將蓖麻子稞，貼近地皮上二寸許均砍斷，隨將雞血滴入蓖麻稞筒內數滴（每稞內均滴），上復一酒杯，用土封嚴，約二十一天，將此蓖麻稞節取出，用水煎。

用法：內服，每次煎服一稞，日服一次至二次，服三四稞可愈。

處方 二十三

商專 秦德修

主治：食道狹窄（噎膈）。

藥物：雄 黃二錢 朱 砂二錢 礪 砂二錢 乳 香一錢

黑 豆四十九粒 烏 梅十二個

配制：將烏梅水浸搗如泥，各藥研末，共搗為丸，以雄黃為衣，丸如彈子大三錢重。

用法：每空腹含化一丸，然後用茶漱口咽下，隔五日再如法服之。

處方 二十四

商專 王德元

主治：噎膈。

藥物：丁香一錢五分 广木香一錢五分 西 茴一錢五分
陳 皮一錢五分 建烏梅一錢五分 胡 椒三十二粒
巴 豆十二粒去油 血竭花一錢五分 青 皮一錢五分
萊 菔子一錢五分

配制：上藥共為細末。

用法：每服一錢，水酒送下。

編者意見：上方內有巴豆雙，為峻瀉劑，體弱者雖服一錢，也有瀉下的可能，用時宜經中醫診斷許可後，方可應用，以免發生事故。

處方 二十五

商 專 王麗生

主治：噎膈（能吃焦的食物，不能喝稀的）

藥物：天 冬 麥 冬 肉 桂 急性子 生 地
广木香各三錢 槐 莢二兩 茶 葉二兩

配制：上藥瓦上焙黃為細面，蜜和為丸。

用法：每日三次，每次服一錢。

禁忌：生冷大葷驢馬肉。

處方 二十六

商 專 郭雲岫

主治：噎膈。

藥物：紅 棗七個 全斑蝥七個 沉 香五分 白 糖四兩

配制：將棗去核，裝入斑蝥，用綫扎住，陳豆稽炭內燒焦研末，加沉香末，並加入豆稽炭少許研末，將糖加入，放碗內蒸溶化後取出，作為七丸。（方內斑蝥有毒，分量勿隨意增加）

用法：每晚含化一丸（一方云，此治梅核氣方）。

處方 二十七

沈 丘 劉文軒

主治：噎食倒食（飲食不進，或食入即吐，食道如塞，精神如常）。

藥物：蓖麻棵、水蛭（數寸長者）二個 黃酒一斤

配制：夏季將蓖麻棵（噎食用白蓖麻棵，倒食用紅蓖麻棵）的根近

土寸許处，用刀挖开，裝入一个水蛭，用綫扎好，用泥封固，再用土埋好，長至四十九日扒开視之，該处較粗，將此节取下，風干备用（另一水蛭貯藏备用），用时將麻櫟节与另一水蛭共焙干为細末，浸黃酒內一日。

用法：每服一小酒杯，一天三次。

处方 二十八

商專 刘茂松

主治：噎膈倒食（食不能下，或下后不久嘔出）。

藥物：巴豆仁二十粒（三粒不去油）去油 大紅梨三个（巴豆劇毒，用时宜經中
医診斷許可后方可服用。）

配制：將巴豆仁放梨中，外用膠泥包住燒三四小时以梨熟为度。

用法：每二日吃一个，六日服完，最重者三次可疗。

处方 二十九

商專 陶建綱

主治：噎膈。

藥物：猪胃（即猪肚子）一具，洗淨，独头蒜八兩 新百合八兩

配制：蒜、百合俱入猪胃內，綫縫口砂鍋內煮熟。

用法：任意食之，另用壁虎（蝎虎）一个，酌流酒十兩 泡之，溫服。

处方 三十

商專 陶建綱

主治：噎膈。

藥物：礪 砂三錢 建烏梅十二个（去核） 乳香一錢五分 黑 豆四十九粒
百草双一錢五分 綠 豆四十九个 明 雄二錢 朱 砂二錢

配制：以上六味，共搗为丸如彈子大，雄黃朱砂为衣。

用法：每日服一丸，姜湯化服。

一四 梅核气类

处方 一

东明 赵国庆

主治：梅核气（咽干微热如异物在咽喉）。

藥物：西 吉八兩 姜 蚕六錢 青 黛六錢 老木香四兩
蜂 蜜十二兩

配 制：西吉切片，酒漬透蒸晒九次，合各藥共为末，煉密为丸桐子大。

用法：每服三錢，飯后服开水送下（一料可愈）。

处方 二

洛專 李振华

主治：梅核气。

藥物：党 参三錢 白 朮三錢 陈 皮二錢 半 夏三錢
云 苓三錢 香 附三錢 砂 头二錢 西 茵三錢
烏 藥三錢 青 皮二錢 桔 梗三錢 豆 根三錢
射 干三錢 牛 子三錢 知 母三錢 甘 草錢半
广木香八分

配制：水煎。

用法：內服。

禁忌：憤怒生气。

处方 三

洛專 董天庆

主治：梅核气。

藥物：元 桂五錢 川牛夕三錢 大茴香八個 百草霜三錢
人乳汁二兩 蜂 蜜四錢 白 糖四錢 紅 糖四錢

配制：將前四味藥研細，再把后四味放銅器內化开，和入藥末为丸

二錢重。

用法：酌量服之。

处方 四

洛專 程少宗

主治：梅核氣。

藥物：月石三錢 射干三錢 川貝母三錢 烏梅肉五錢

山豆根四錢 云皮三錢 甘草三錢

配制：共為細末，煉蜜為丸如梧子大。

用法：每嚥化一丸連續用之。

禁忌：生冷腥葷。

处方 五

滑縣 王金聲

主治：梅核氣

藥物：川貝母三錢 黃連三錢 卜子三錢 槐肉三錢

白糖半斤 蜂蜜四兩

配制：將白糖和蜂蜜熬至滴水成珠離火，即將前四味藥（預先碾為末）末和入攪勻切成塊。

用法：每含口中一塊，化汁徐徐咽下，一日含一、二兩。一、二料可愈。

处方 六

滑縣 高相漢

主治：梅核氣。

藥物：紫蘇葉三兩 上沉香二錢 卜荷葉四兩 烏梅肉一兩

訶子肉八錢 香附五錢 廣木香五錢

配制：上藥共為細末，用煉蜜六兩，白糖半斤，冰片面二錢，調勻為丸，病重者再加牛黃一分，元寸一分。

用法：將藥丸放口內嚥化，三料可愈。

处方 七

內黃 劉長峯

主治：梅核氣。

藥物：蜜半斤 大珍珠一個煨 牛黃一分 元寸一分
珊瑚一錢半 琥珀三分 赤金二張 鏡砂五分
梅片二分

配制：上藥研細，蜜熬至滴水成珠，相和切塊，如糖球大。

用法：每服一塊，含化咽汁。

附說：用蜘蛛三個，白凡五錢搗爛，同煨枯研細，再加麻杆灰少許，同上末（和入蜜中的藥末）混合，吹入喉中。

處方 八

商專 李秀文

主治：梅核氣。

藥物：木香二錢 沉香一錢 小茴二錢 丁香二錢 射香三錢

配制：共研細末。

用法：每次服一錢，每日二次，開水送下。

處方 九

商專 武敬益

主治：梅核氣（會厭有小粒）。

藥物：老木香三錢五分 血竭花二錢 紅卜子炒三錢 建烏梅肉十二個
廣陳皮三錢 均青皮三錢 巴豆三十個去淨油 胡椒三十二個
丁香一錢五分 小茴三錢鹽炒（此方有烈性藥巴豆經中醫診斷許可後方可應用，以免造成事故）

配制：共研細末。

用法：每服一分，早晚服二次，黃酒沖服。

處方 十

沈丘 劉文軒

主治：梅核氣。

藥物：斑蝥三十二個 大棗三十二個 白糖紅糖各一斤（方中斑蝥有劇毒，分量不可增加）

配制：將棗去核，每個裝入一個斑蝥，用豆槽火燒存性，為細末，將糖放銅勺內溶化，和入藥末，作為三十二丸。

用法：临睡时含口内一粒，化汁咽下。一二料可愈。

处方 十一

鹿邑 董習礼

主治：梅核气。

藥物：槐 蓼五錢 急性子五錢 广木香三錢 硼 砂五錢 沉 香一錢
白 糖一兩 飞罗面一兩

配制：將藥共为末，和糖面攪拌勻，放鍋內蒸透后，用白蜜和为丸如豌豆大。

用法：每日服二次，临睡时，再噙化十丸久服可愈。

处方 十二

商專 刘茂松

主治：梅核气（喉部發現有紅絲狀者）。

藥物：枇杷叶八兩去毛 白蜂糖四兩

配制：將枇杷叶水煎汁，冲白蜜內。

用法：一次服完，連服三次后，再隔兩日服一次，或三四日服一次，重者服十次可愈。

处方 十三

商專 赫長山

主治：梅核气。

藥物：广木香 大 白 大 黃 牙 皂各三錢

配制：共为細末，黑豆浸濕搗和为丸。

用法：开水冲服。

編者意見：原方并未說出服用量，用时可量情由少量服起，漸次增加。

处方 十四

商專 朱文彬

主治：梅核气。

藥物：橘 紅三錢 枳 壳三錢 香附子三錢 川 貝三錢 云 苓三錢
大 白三錢 西 茵三錢 条 苓三錢 广木香二錢 沉 香一分

苏 梗三錢 前 胡三錢 甘 草一錢 川 朴三錢 蘆 根三錢
灯芯五莖

配制：水煎。

用法：內服，五剂可愈。

一五 腫 脹 类

处方 一

禹县 冀家仁

主治：水腫初起。

藥物：梧桐叶、豆腐不拘多少

配制：水煎。

用法：單吃豆腐。

处方 二

杞县 張天祿

主治：水腫（腹中水盛，足浮腫而冰冷，小便赤澀）。

藥物：按金匱腎气丸方，去肉桂加兩參。

配制：为丸重三錢。

用法：每日早晚各服一丸，并水送下（三四料可愈）。

禁忌：食鹽百天。

处方 三

內黃 傅擇古

主治：水腫（小便不利周身浮腫）。

藥物：玉子穗上的干紅蕊（即玉蜀黍穗上）一兩

配制：水煎。

用法：內服，三次見效，十次可愈。

处方 四

禹县 冀家仁

主治：水腫（遍身浮腫，皮毛出水，按其膚如泥）

藥物：車前子一兩 茯苓二兩 王不留行五錢 肉 桂三分 赤小豆三錢

配制：水煎。

用法：內服。一二剂即消。

附說：本方对臍突手掌無紋的水腫患者，有时还有效。又鷄屎醴逐水虽有神效，但服后水由大便排出，不如本方服后，水由小便排出为好。

处方 五

洛尊 郭同寅

主治：通身水腫。

藥物：川萆薢一兩 大麦芽鬚二兩

配制：水煎。

用法：內服三付有效。

处方 六

禹县 冀家仁

主治：全身水腫，皮膚流水，按之陷下成孔，手起脹滿如旧，飲食知味，大便溏泄，小便澀气喘不能臥由于腎水亏虛所致者。

藥物：熟地二兩 山茱萸一兩 山藥一兩 茯苓二兩
丹皮六錢 澤泄一兩 麦冬一兩 五味子三錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：愈后必須戒房事一年，鹽百日

处方 七

禹县 冀家仁

主治：水腫由于肺腎俱虛者（症狀：腰腫背平、脚腫，小便不利或肚腹腫脹，四肢浮腫，喘急痰盛，不可以臥）。

藥物：茯苓五錢 附子五錢 牛夕一錢半 官桂一兩
熟地二兩 山藥三兩 丹皮一兩 澤瀉五兩
車前子一兩半 山茱萸一兩

配制：上藥共为細末，蜜丸。

用法：每次服一兩，开水送下，每日二次（早晚各一次）服完一料

可愈。

附說：本方即全匱腎氣丸方，所開分量，不可更改。

处方 八

禹县 冀家仁

主治：上身先腫，再及于下，日久一身尽腫，喘嗽难臥，小腹光亮。

藥物：山藥一兩 芡實一兩 茯苓五錢 白朮二兩
肉桂三分 訶子一錢 百合五錢

配制：水煎

用法：內服一二十劑。

处方 九

汛县 洪耀光

主治：水腫氣腫。

藥物：广木香一兩 青木香一兩 川木香一兩 茄沉香一兩
公丁香一兩 甘遂三錢（須泄者加二丑五錢虛弱者須經中医
診斷許可后方可应用以免發生事故）。

配制：共为末，面糊为丸如桐子大。

用法：日服一次，三十至四十丸，开水送下。

处方 十

禹县 冀家仁

主治：水臌（初腫处手按之如泥即是）

藥物：苦苧藤子炒一兩五錢 郁李仁一兩五錢 防己七錢五分
沉香一兩五錢 琥珀五錢 杏仁去皮尖炒五錢 苏子五錢
赤茯苓五錢 澤瀉五錢 元寸少許

配制：上藥共为細末，蜜丸梧子大，每付二錢五分。

用法：空心人參湯送下。

处方 十一

安陽 郭有才

主治：水臌。

藥物： 瞿 莖三錢 川 羌三錢 澤 夕三錢 猪 苓三錢
 广木香三錢 檳 榔三錢 商 陸三錢 大腹皮三錢
 川木通三錢 椒 目三錢 姜 皮三錢 砂 仁一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十二

安陽 周濟人

主治：水臌。

藥物：半斤重魚一條 松羅茶一兩 黑 凡三錢

配制：將魚剖開去雜洗淨，將藥裝入魚肚內蒸熟。

用法：一次吃完。

处方 十三

安陽 薛宝山

主治：水臌。

藥物：甘 遂四分为末

用法：將甘遂末放肚臍內，以膠布貼住，即時內服甘草煎水，水即从小便排出。

处方 十四

長垣 韓良卿

主治：水臌。

藥物：大腹皮二兩 馬蜂窩一個 豆 腐一斤半

配制：上三味共入鍋內煮之（如水三碗）

用法：先吃豆腐，后喝藥湯。二三劑可消。

处方 十五

禹县 冀家仁

主治：气臌（初腫處按之如囊，遂手即起）。

藥物：白 朮一兩 茯 苓一兩 薏 仁一兩 甘 草一分
 枳 壳三分 党 参一錢 山 藥五錢 桂 楠一分
 車 前一錢 蘿蔔子一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十六

滑县 馬興九

主治：气臌。

藥物：大 棗一百个 皂 刺一百个

配制：每个棗柄处，刺入皂刺一个，加水煮熟，去皂刺。

用法：將棗一頓吃完，再將藥湯飲尽。

禁忌：体虛之人忌服。

处方 十七

臨汝 王書怀

主治：气臌、水臌。

藥物：大 白六錢 青 皮六錢 甘 遂六錢 广木香三錢

配制：共为細末分作七包。（本方須經中医診斷許可后方可应用）

用法：每服一包，开水冲服，壯人每日一次，弱人隔日一次。

禁忌：生冷油鹽腥葷百日。

附說：藥愈后，吃鹽須过百日，先用魚一条去腸杂，用黑凡一兩，裝魚腹內，用黃土泥將魚包住，放炭火內燒焦取出，共为細末，每服三錢，开水送下，用完，再开始吃油鹽。

处方 十八

長垣 韓良卿

主治：气臌水臌。

藥物：甘 遂二兩醋炒 大 戟五錢 芫 花五錢 二 丑五錢

配制：共为細面，白面为丸，朱砂三分为衣。丸如桐子大。

用法：每服三十丸，空心服，重者二料可愈。

禁忌：忌鹽百日（虛人須經中医診斷許可后方可服用本方）

处方 十九

清丰 晁 全

主治：气臌水臌。

藥物：商 陸一兩 甘 遂八錢 陳萊腹種三個

配制：上三味，用開水浸過，晒干，共為細面，水丸如棗核大（本方須經中醫診斷許可後方可服用）。

用法：每服三錢，每晚服一次，隔日服一次，亦可隨病。情輕重加減用之。

禁忌：忌鹽百日。

處方 二十

禹縣 冀家仁

主治：食臑（腹內有積聚，如石堅硬，令人坐臥不安，二便澀滯，上氣喘促，或通身虛腫）。

藥物：川厚朴去皮姜炒五分 黃 芩炒 黃 連姜炒 益智仁 草豆蔻
當 歸各五分 廣木香 升 麻 紅 花 吳茱萸各三分
半 夏姜炒七分 甘 草 紫 胡 澤 瀉 神 曲
青 皮 陳 皮各三分 生薑一片口干加葛根四分

配制：水煎。

用法：食遠溫服。

處方 二十一

禹縣 冀家仁

主治：大病後飲食不節 致傷脾胃，以至中滿腹脹。

藥物：黨 參三分 白 朮五錢 茯 苓三錢 蘿卜子五分 陳 皮三分
山 藥五錢 芡 實三錢 甘 草一分 神 曲三分 山 查五粒
蘇 子五分

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十二

禹縣 冀家仁

主治：血臑（腹大、紫筋、腹上有紅點紅紋）。

藥物：桃 仁八錢 大 黃五分 蟻 蟲三個 甘 遂五分 八分（本方須經中醫診斷許可後方可服用）

配制：共为末水煎。

用法：內服（并宜与二十三方輪流服用）

处方 二十三

禹县 冀家仁

主治：同上。

藥物：灵 脂炒二錢 当 归三錢 川 芎二錢 桃 仁二錢 丹 皮二錢
赤 芍二錢 烏 藥二錢 元 胡一錢 甘 草三錢 香 附錢半
紅 花三錢 枳 壳錢半

配制：水煎。

用法：內服。

附說：血厥病，宜按以上兩方制藥輪流內服，但服前方后，須隔一日再服后方，同时必須把藥鍋刷洗很淨。

处方 二十四

禹县 冀家仁

主治：虫血厥（症狀，單腹脹，四肢不浮腫，面色淡黃，有紫点与紅紋）。

藥物：白 朮一兩 雷 丸三錢 白 微三錢 甘 草一錢
大 黃二錢 当 归一兩 丹 皮五錢 蘿卜子一兩
紅 花三錢

配制：水煎。

用法：內服。

附說：服一剂，腹內必作雷鳴，少頃泄下大量惡物（如血、如膿、如虫）。再服一剂，即大瀉下，惡物可排尽，然后服用下方以調理：

人 参一錢 茯 苓五錢 苡 仁一兩 山 藥二兩

白芥子一錢 陈 皮五分 白 朮二錢 水煎內服，体虛病人，前方可減半分量用之，瀉下后，必須戒鹽百日。

編者說明：上方所治者，似为血吸虫病肝硬变。

处方 二十五

禹县 冀家仁

主治：气喘作脹腹腫，小便不利，漸漸一身俱腫。

藥物：白朮三錢 茯苓一兩 麥冬五錢 蘇子一錢
熟地五錢 山藥一兩 芡實五錢

配制：水煎。

用法：內服一二十劑。

处方 二十六

禹县 冀家仁

主治：腹部脹滿（由于脾虛誤治轉成者）。

藥物：黨參一錢 白朮三錢 茯苓三錢 蘿卜子一錢
薏仁三錢 芡實五錢 山藥五錢 肉桂三分
谷芽三錢

配制：水煎。

用法：內服，連服數劑。

处方 二十七

禹县 冀家仁

主治：气郁腹脹（因心中郁結不舒，久則兩肋飽悶，飲食下咽，即便腹脹）。

藥物：黨參一錢 茯神五錢 白芍三錢 白芥子二錢
蘿卜子五分 檳榔三分 神曲五分 枳殼三個
柴胡五分 薏仁三錢 厚朴三分

配制：水煎。

用法：內服，連服三四劑。

处方 二十八

禹县 冀家仁

主治：腹滿（由于火虛不能生土者，不見食物時想吃，見了食物，却覺厭惡，強食就覺胃滿）。

藥物：黨參一錢 白朮三錢 炒棗仁五錢 遠志八分

山 藥三錢 茯 苓三錢 神 曲五分 良 姜五分
蘿卜子一錢 枳 殼五分 干 姜炒黑一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 二十九

禹县 冀家仁

主治：妊婦面目虛腫（是水氣或久濕所致）

藥物：党 參一錢 白 朮二錢 川 芎八分 當 歸二錢
甘 草三錢 紫蘇 陳皮 腹皮各四分 茯苓皮一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 三十

禹县 冀家仁

主治：妊婦遍身浮腫，心腹脹痛，喘促小便不利。

藥物：白 朮五錢 茯 苓四錢 當 歸三錢 白 芍二錢
陳 皮一錢 生 姜七片 鯉 魚一條（八兩至十六兩重）

配制：水煎。

用法：內服。

处方 三十一

濟丰 遠 昭

主治：陰囊腫氣喘，睡不倒。

藥物：炙麻黃二錢 西洋參三錢 白 朮二錢 云 苓一兩
猪 苓二錢 防 己三錢 車前子五錢 五加皮三錢
澤 夕三錢 双 皮三錢 陳 皮三錢 浮藤子二錢
生玉米五錢 桂 枝三錢

配制：水煎。

用法：內服，同時兼服毛地黃片，一日二次，每次2至3片。

处方 三十二

唐河 楊慈云

主治：腎藏炎合併腹水症，全身腫脹，尿少便秘，食欲不振。

藥物：鯽魚（或鯉魚）一條重十二兩以上；蒜瓣二兩切片 松蘿茶（或毛尖茶）八錢 白商陸八錢切碎

配制：魚剖腹去鱗雜，將三味藥用稀布包住裝入魚腹，放砂鍋里，用長流水煮極熟去藥。

用法：在下午天將黑時，空心食魚喝湯，隔日一次。

編者意見：只喝湯不吃魚比較妥善。否則有中毒的可能。

處方 三十三

唐河 楊德三

主治：單腹腫脹（腹部积水，膨大如盤）。

藥物：豬肝一具 車前子三兩 小茴香二兩 半边蓮一兩切碎

配制：將藥與豬肝同入砂鍋內煮一小時。

用法：吃豬肝喝湯。

一六 腰痛類

處方 一

洛專 王太明

主治：閃挫腰痛。

藥物：梅豆角（杆亦可）一把

配制：水煎。

用法：內服，一二次即愈。

處方 二

洛專·張恩敬

主治：腎虛腰痛。

藥物：焦白朮四兩 玉 米三兩 芡 實二兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三

洛專 朱簡桐

主治：腰痛（因勞力過度，或色欲過度，腰痛如折，不能屈伸）。

藥物：猪 腎一寸 杜仲炒五錢 西 苣五錢

配制：將猪腎用竹刀切为薄層若干，將杜仲西苣研为末層層洒入猪腎內，再用麻線綑好，放砂鍋內煮熟。

用法：將猪肝任意食之，并飲酒以助藥力。

一七 便血类

处方 一

魏許 罗宗德

主治：大便下血，面黃虛腫，日下鮮血數十次者。

藥物：当 归七錢 地榆炭六錢 綠豆芽半斤 椿根皮半斤 生 姜四兩
紅 糖半斤

配制：先將綠豆芽椿根皮生姜搗爛絞汁，和当归地榆共放盆內燉三柱香为度。

用法：上藥汁每日服兩次，分作三天服完，服時加糖。

处方 二

杞县 刘乙善

主治：大便下血。

藥物：生 姜四兩 椿根白皮四兩 綠豆芽四兩 紅 糖四兩

配制：水煎取汁，加入紅糖。

用法：每次服兩酒杯，每日二次。

处方 三

密县 郭錫三

主治：便血（糞前糞后有鮮血）。

藥物：江 米八兩 白 糖四兩 生黃精四錢焙为末

配制：先將江米做成飯，加入黃精末和白糖。

用法：当飯吃。

处方 四

洛寧 程少宗

主治：便后下血。

藥物：大生地三錢 黑地榆四錢 通大海三個 當 歸三錢 黑荊芥三錢
貝 母三錢 黃 芩三錢 甘 草一錢 槐 花五錢

配製：水煎。

用法：內服二劑可愈，如不愈加番泄叶五錢再服。

處方 五

潁陽 冠 卿

主治：便血日久。

藥物：椿根白皮一兩 槐 花五錢 白 糖一兩

配製：水煎。

用法：內服。

處方 六

滑縣 宋丙舍

主治：大便下血。

藥物：椿根白皮四兩 小 棗四兩 核桃仁四兩 蜂 蜜四兩

配製：水煎。

用法：內服兩天服完。

處方 七

長垣 楊華林

主治：便血。

藥物：猪大腸子頭一個洗淨 建蓮子適量

配製：將蓮子裝入腸內，綫扎兩頭，煮熟。

用法：一次或數次吃完。

處方 八

內黃 邵增先

主治：便血日久不愈。

藥物：赤小豆二兩 養成芽陰干 當 歸一兩

配製：共為細末。

用法：每服一錢，一日服二次，開水沖服。

处方 九

滑县 楊永久

主治：便血日久。

藥物：槐 花二兩 柿 餅五个

配制：將二味用慢火焙焦，研为細末。

用法：每日兩次服用，每服二錢，开水送下。

处方 十

滑县 陶协律

主治：便血。

藥物：椿根皮 鮮公英 白萊菔 鮮 藕 綠豆芽各四兩

配制：共搗爛絞取汁加白糖四兩。

用法：內服。

一八 陰囊病类

处方 一

漢陽 王治國

主治：綉球風：

藥物：蛇床子炒三錢 川文蛤炒三錢 花椒炒一兩 胡 椒七个炒
枯 凡四錢 梅 片五錢

配制：上藥共为細末。

用法：香油調搽患处，一日三次。

处方 二

漢陽 朱世榮

主治：陰囊濕痒。

藥物：紫苏叶

配制：研为細末，加輕粉末少許。

用法：香油調搽。

处方 三

漢陽 張志剛

主治：陰囊濕痒。

藥物：爐甘石五分 牡蛎粉五分 冰片一厘 朱砂五厘

配制：共為細末。

用法：先用開水洗患處，擦干，將藥末干撒。

處方 四

漢陽 于茂勛

主治：陰寒陰汗。

藥物：白凡一錢 黃丹七分 胡椒二分 火硝一分

配制：共為細末米醋調成稀糊。

用法：攤手心內（男左女右），用手蓋住生殖器，同時多喝開水，發汗即愈。

禁忌：房事百日。

一九 脫肛類

處方 一

新鄉 王瑞群

主治：脫肛不收。

藥物：蝸牛一兩燒灰

配制：研末用豬油調勻。

用法：敷患處。

附說：如脫肛流血，用杏仁五錢搗如泥，敷患處即效。

處方 二

新鄉 賀言思

主治：脫肛。

藥物：鰲頭一個焙黃 五倍子一錢焙

配制：共為極細面。

用法：敷脫肛處。

處方 三

漢陽 何寶謙

主治：脫肛。

藥物：鴨 蛋一個 牡 蛎三錢

配制：先將牡蛎煎水去渣，將鴨蛋放入煮熟。

用法：吃蛋喝湯（吃五个可愈）。

处方 四

洛專 赵朝貴

主治：脫肛。

藥物：黃 蘆一兩 防 風五錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 五

澠池 袁書魁

主治：脫肛。

藥物：生姜汁 淨蜂蜜

配制：二味調勻。

用法：用鷄羽蘸藥汁，抹上即愈。

二〇 疝 气 类

处方 一

洛專 李作云

主治：偏子墜。

藥物：烏 藥三錢 升 麻二錢 猪 苓二錢 橘 核二錢

荔枝核二錢 蘆 巴 子二錢 金 鈴 子二錢 小茴香二錢

甘 草一錢 黃 酒二兩

配制：水煎濾汁加入黃酒。

用法：內服，飯前服，二劑可愈。

处方 二

洛專 朱尊賢

主治：偏子墜。

藥物：元 胡三錢 烏 藥五錢 升 麻五錢 陳 皮三錢

青 皮三錢 三 陵三錢 枳 朮三錢(右偏加烏藥一兩)

配製：水煎。

用法：內服。

處方 三

潞陽 劉雪法

主治：偏墜(痛者有效)。

藥物：杜仲炭三錢 小茴香三錢 穿山甲三錢 血 竭三錢
元 肉三錢

配製：上藥共為細末

用法：每服三錢，黃酒送下。

處方 四

滑縣 高冷魯

主治：偏墜。

藥物：元 參四錢 葛 根三錢 烏 梅二錢 紫 蘇二錢
大 白二錢 蒼耳子三錢 大 黃三錢 枳 實三錢
黨 參三錢

配製：水煎。

用法：內服。

處方 五

清平 姚至濤

主治：偏墜少腹作痛。

藥物：青木香一兩 橘 核三錢 荔枝核三錢 柴 胡二錢
廣陳皮三錢 沉 香錢半 乳 香二錢 甘 草錢半

配製：水煎。

用法：內服。

處方 六

內黃 王 鑑

主治：疝氣。

藥物：小茴香炒 大茴香 廣木香各等分

配制：共为細末。

用法：每服二錢，黃酒送下，三四服可愈。

处方 七

内黄 孙鸣鳳

主治：疝气。

藥物：小茴香一兩 鹽炒 猪 苓三錢 澤 夕三錢

配制：水煎加白酒二兩。

用法：內服。

处方 八

松县 甲吉华

主治：疝气。

藥物：川牛夕二錢 橘核仁二錢 山查子一兩 川楝子三錢
小 茴四錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 九

浚县 洪耀光

主治：疝痛。

藥物：广木香三錢 川楝子三錢 小茴香三錢 蒼 朮三錢
橘核仁三錢

配制：水煎。

用法：內服。

二一 淋 濁 类

处方 一

洛專 戚尊三

主治：淋病。

藥物：黑槐子三錢 大 黃三錢 雞 蛋四个

配制：將雞蛋开一小孔，蛋清蛋黄傾入碗中，另將上二藥为細末和

入拌勻，再裝入蛋殼內，用面糊口，籠上蒸熟。

用法：將藥蛋吃完，尽量多喝開水。

處方 二

許昌 李鴻文

主治：火淋。

藥物：生干香附子七個

用法：生着吃下，隨時即通。

處方 三

新鄉 任保福

主治：血淋。

藥物：川牛夕三錢 西滑石五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

商丘 倪秀忠

主治：石淋。

藥物：川木瓜一兩 二花二錢 公英二錢 粉甘草二錢

配制：水煎。

用法：內服（小兒量大人加倍）。

處方 五

濮陽 穆宗興

主治：白濁。

藥物：炮山甲、白凡、黃臘各一兩

配制：山甲白凡共為末，黃臘放銅勺內化開和為丸。

用法：每日早晚各服三錢，開水送下（一料可愈）。

處方 六

濮陽 曾慶修

主治：白濁。

藥物：刺猬皮炒兩 生川軍三錢 熟川軍三錢 生車前子三錢

熟車前子三錢

配制：上藥共為細末，用牙豬脊髓油和為丸。

用法：每服三錢。

處方 七

濮陽 宋立中

主治：白濁。

藥物：川 軍半生半熟 車前子半生半熟各五錢

配制：共為細末，牙豬脊髓油和為丸。

用法：每服二至三錢，石決明煎水送下。

處方 八

濮陽 陳自仲

主治：白濁。

藥物：黃連 車前子 西吉 琥珀各等分（各半生半熟）

配制：共為細末，豬脊油和為丸。

用法：開水送下二至三錢。

處方 九

長垣 李月波

主治：白濁（初得半月以內糊口者）。

藥物：大花丁香二至三錢

配制：為細末。

用法：一次服完，白酒四兩，溫熱送下，蓋被出汗即愈。

處方 十

主治：白濁下血。

藥物：西吉五分 上邊桂三分

配制：共為細末，用鷄蛋一個破小口，將藥裝入，紙包燒熟。

用法：將燒熟蛋藥一同吃下。

二二 尿 閉 類

处方 一

巩县 張增潤

主治：尿閉（夏日小便不利疼痛尿血）。

藥物：柳樹青皮。

用法：取一片含口中咽津或取一握煎水徐徐服下。

处方 二

洛寧 吳庆林

主治：小便秘澀。

藥物：西滑石粉六錢 牙 皂三錢 西 吉三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 三

洛寧 昌欽杰

主治：小便秘結。

藥物：秋豆角二根

配制：水煎。

用法：內服。

处方 四

洛寧 李景賢

主治：小便不利。

藥物：玉谷纓一兩 木 炭五錢（玉谷纓即包谷穗上長的紅纓）

配制：水煎。

用法：內服。

处方 五

洛寧 衛素雲

主治：小便不通。

藥物：甘 遂一錢為末 甘草三錢

配制：甘草用水煎汁。

用法：將甘遂末放肚臍內包扎住，內服甘草汁一時即通。

處方 六

內黃 焦明文

主治：小便不通（熱症）。

藥物：滑石粉一兩 生白芍一兩 黃 柏八錢 知母八錢

配制：水煎。

用法：內服（應按病情輕重靈活運用）。

處方 七

滑縣 郭心謙

主治：小便不通。

藥物：元寸一分

用法：將元寸放肚臍中另以葱白十餘根用綫捆緊用刀切去兩頭留下一指長按在臍上再用大鹽一斤炒熱布包放在葱白上熨之涼則更換一包（一斤鹽分兩包輪熨輪炒）

附說：此方治未全下利熱結膀胱尤效。

處方 八

滑縣 劉毓秀

主治：小便不通。

藥物：川萆薢一兩 烏藥五錢 石菖蒲五錢 甘草稍五錢 干姜三錢
肉桂三錢 小茴三錢 沖骨脂三錢 胡蘆巴三錢 附 子四錢

配制：水煎。

用法：徐徐服之，一劑即通。（應注意徐徐服之）

附說：上方對虛寒症更效。

編者：有內熱尿黃者慎用。

意見：

處方 九

濮陽 李王海

主治：小便不下小腹疼。

藥物：元 寸二厘 葱半斤（用白） 藕半斤

配制：共搗為泥。

用法：糊在臍和小腹部分。

二三 雜治類

處方 一

洛專 許延堂

主治：陽萎（性神經衰弱）。

藥物：淫羊藿 燒酒

配制：以淫羊藿適量，泡燒酒內十天。

用法：隨意飲之，另煎服下方：

熟地一兩 山萸肉三錢 黨參三錢 神方三錢

西杞果三錢 巴戟肉酒浸五錢 大云酒浸三錢 上元桂錢半

白朮四錢 遠志二錢 杜仲三錢

處方 二

主治：交腸（尿道出糞，肛門出尿）。

藥物：旧幘頭（即旧毡帽）一个

配制：燒存性為末。

用法：每服三錢，熱燒酒送下，二三次即愈。

處方 三

洛專 張思敬

主治：瘋狗咬（預防發作）。

藥物：麝香 朱砂 明雄各三分

配制：上藥共為細末。

用法：用細辛三分，熬水沖服上藥，厚蓋出汗自愈。

處方 四

洛專 李振聲

主治：腦神經衰弱（腦暈、腦痛、失眠、心跳、健忘、神倦、頭

弱、食欲不振)。

藥物：党參三錢 元參四錢 寸冬三錢 辽味三錢
九地八錢 山萸肉四錢 山藥三錢 茯神三錢
遠志三錢 炒棗仁三錢 白朮三錢 杭菊三錢
細辛錢半 桑椹二錢 甘草錢半 淡竹叶三錢

配制：水煎。

用法：內服，服三四劑后，覺痛覺等見輕，可去藥本白芷再服。

处方 五

洛專 戚尊三

主治：少年白髮。

藥物：生首烏四片 薄荷叶四兩 白糖三兩

配制：將前二味為極細末，再入白糖煉蜜為丸三錢重。

用法：每天不拘時服一丸，一日三四次，服半料可愈。

禁忌：用藥期間，忌食辛辣酸等刺激物。

处方 六

洛專 李宗道

主治：腳跟痛。

藥物：生川芎五錢

配制：為細末。

用法：稀布包藥，放腳跟下踏之。

处方 七

濮陽 段智印

主治：痞癰疔瘡（按即尋麻疹）

藥物：蒼朮三錢 川厚朴二錢 山查五錢 枳實三錢
酒軍三錢 京芍二錢 當歸三錢 苦參三錢
蛇床子三錢 防風二錢 羌活一錢 荊芥二錢
紅花錢半 青皮錢半 陳皮錢半 大白三錢
地膚子三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 八

清丰 馮明遺

主治：失音言語不出（婦女最效）。

藥物：柯 子四錢童便炒 大熟地八錢酒炒 大寸冬六錢
北五味三錢 桔 梗四錢 当 归三錢 花 粉四錢
杭白芍三錢 菖 蒲三錢 香 附四錢（咳嗽加川貝二錢）
前 胡四錢 薏 仁炒三錢 去熟地当归）

配制：水煎。

用法：內服。

处方 九

漢陽 梁道彰

主治：尿血。

藥物：紫 苑一兩

配制：水煎。

用法：內服，立效。

处方 十

杞县 張天祿

主治：衄血。

藥物：三 七三錢 白芨三錢

配制：共為細末，分作三包。

用法：每服一包，每二小時一次，開水送下。

处方 十一

洛專 吳庆林

主治：大小便閉。

藥物：西 吉六錢 牙 皂三錢 西滑石粉三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十二

清丰 馬順卿

主治：大小便閉。

藥物：螻 蛄三至五个

配制：水煎。

用法：內服。

附說：若單小便結，只用前半截身體煎服，若單大便結，只用後半截身體煎水服。

处方 十三

洛陽 刘守本

主治：夾陰伤寒（小腹痛，小便縮，甚至縮入腹內，女子有乳房內縮的症狀）。

藥物：上元桂五錢

配制：上藥為細末。

用法：開水送下，服後五至十分鐘即效。

处方 十四

安陽 李庆芳

主治：陽強不倒。

藥物：朴 硝四至五錢

用法：兩手和硝握住陽物，數分鐘即消。

处方 十五

安陽 邢文秀

主治：遺尿。

藥物：紫河車一具

配制：瓦上慢火焙干研末，面糊為丸。

用法：每服一錢，開水送下，早晚兩次。

处方 十六

唐河衛協會

主治：岔氣。

藥物：白 糖二兩 黃 酒一斤

配制：將黃酒燒滾入糖溶化。

用法：內服，一次喝完，使微汗，若腰痛者加服白芥子面三錢。

处方 十七

唐河衛協會

主治：足跟疼。

藥物：熟 地五錢 山萸肉三錢 山 藥三錢 云 苓三錢

丹 皮二錢 澤 瀉二錢 川萆薢三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十八

唐河衛協會

主治：氣結胸（胸滿刺疼、氣急促迫、不省人事）。

藥物：上 片二分 白 酒適量

配制：將片放盅內，用白酒燒滾倒入。

用法：內服即蘇。

处方 十九

唐河 楊慈云

主治：呃逆（橫膈膜痙攣）。

藥物：生姜自然汁五錢 蜂蜜一兩

配制：姜汁蜜混合，加開水沖化。

用法：內服，一日二三次。

处方 二十

唐河 楊慈云

主治：肝陽上沖（器質性高血壓症）。

藥物：生石決明六錢 明玳瑁四錢 杭白芍六錢 細條芩六錢 川牛夕四錢

夏枯草一兩 草決明五錢 生胆草二錢 生龍骨五錢 生牡蠣五錢

配制：水煎濃液。

用法：每天晚上及上午各服一次。

处方 二十

商專 叶昌恆

主治：夏季煩燥身熱不出汗，上午尤甚，欲飲冷水，如飲冷水，病即轉重，并畏太陽。

藥物：熟地八錢 山藥四錢 丹皮三錢 澤夕三錢 云苓三錢
黃肉四錢 肉桂二錢 附子二錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 二十二

商專 劉德芳

主治：失眠。

藥物：朱砂一兩 細辛三錢

配制：共研細面。

用法：每日臨睡前口服七分至一錢。

附說：服后約十分鐘可入眠，無副作用。

处方 二十三

商專 張克勇

主治：風濕侵襲、渾身強硬、牙關緊閉不發熱。

藥物：南星二錢 半夏二錢 紅花一錢五分 二花三錢 荆芥三錢
水風三錢 當歸四錢 全虫二錢 蜂蜜一兩 水酒一兩

配制：水煎，加入蜜酒。

用法：內服。

处方 二十四

商專 劉柏芬

主治：痰厥，氣絕，心頭溫，喉中响。

藥物：老屋上石灰去土三錢

配制：將石灰為末，水煎澄清。

用法：口服上面澄清液，痰出即愈。

处方 二十五

商專 刘柏芬

主治：五絕急症痰厥。

藥物：半夏。

配制：为末冷水为丸，如小豆大。

用法：塞鼻中，并掺末吹耳內，心口溫者，死一日犹可活，再予人中穴及兩足大拇指离指甲一韭菜叶处，各灸三五壯即活。

附說：人遇暴症，急如風雨，延医無不束手待斃，若心口少溫，口尚有气，宜急按此方法速治，庶免橫夭，特效驗方。

处方 二十六

商專 杜安全

主治：陰症（囊縮、眼皮青，臍腹痛，四逆）。

藥物：附子、肉桂各五錢 干姜、当归、酒芍、吳萸子、良姜、陳皮、西茴各三錢 广木香二錢 甘草一錢 生薑三片

配制：水煎。

用法：內服。

二 妇 科

一 調 經 类

处方 一

巩县 張增潤

主治：經前腹痛，甚或嘔吐。

藥物：丹 参一兩 香 附三錢 砂 仁錢半 元 胡錢半 紅糖適量

制法：水煎。

用法：內服。

处方 二

杞县 張洪錫

主治：經期腹痛，赶前錯后，忽多忽少。

藥物：当 归酒浸八錢 川 芎四錢 赤 芍三錢 生蒲黃三錢 元胡三錢
灵 脂三錢 沒 藥二錢 香 附五錢 紅 花二錢 官 桂二錢
西 茵二錢 西 吉一錢 干 姜二錢

配制：水煎。

用法：經来时連服三剂。

处方 三

南乐 姚和軒

主治：經前經后腹痛，及一切寒氣腹痛。

藥物：紅 花四錢 桃 仁五錢 油 桂五錢 老木香七錢

配制：共为末水丸如綠豆大。

用法：每次服一錢至錢半，姜水送下。

处方 四

清丰 馮明道

主治：月經逆行。

藥物：当归尾四錢 大生地四錢 元 参五錢 粉甘草三錢 西中吉三錢
黃 芩四錢 黃 柏三錢 川牛夕四錢 茜 草三錢 茅 根三錢
(久者加桃仁炒四錢)

用法：水煎內服。

处方 五

杞县 韓鳳翥

主治：月信后期，四肢游走性疼痛有热者。

藥物：大黃四錢 爬牆蜘蛛七个 大棗七个

配制：大黃为末，蜘蛛研爛，大棗煮熟去皮核取肉，三藥共合一处，搗匀为丸桐子大。

用法：上藥一次頓服，開水送下。

處方 六

杞縣 馬福勛

主治：月信后期（經來因寒風襲入，血行不利，少腹痛）。

藥物：（一）麩 皮 米 醋 葱 鹽 （二）酸棗樹根皮 葡萄
樹根皮紅糖各五錢

配制：（一）放鍋中同炒熱，（二）水煎加入紅糖。

用法：（一）布包溫罨少腹，（二）內服。

處方 七

東明 尹汝漢

主治：經期不准，面部浮腫。

藥物：皂 凡四兩 紅 花一兩 砂鍋底四兩研末 紅糖四兩 麥面四兩
南瓜子去壳五錢

配制：共為末，碗盛蒸兩小時，乘熱為丸桐子大。

用法：每服二錢或三錢，飯前服，日服三次，服后要休息，以防嘔吐。

編者意見：方中皂凡量嫌重，所以服后有嘔吐可能，應酌量減少皂凡量，使服后無嘔惡情況方妥。

處方 八

密縣 郭錫三

主治：經期不准，行經困難。

藥物：山 甲五錢 廣木香三錢 紅 花一兩 陳 皮二錢 紅糖四兩

配制：上藥為細末，紅糖化水和藥分作十四份。

用法：每服一份，每日服二次，開水送下。

附說：服上藥后，有受孕可能。

處方 九

登封 張耀先

主治：月經不調（忽多忽少，忽前忽后，經色異常，或有症塊）。

藥物：當 歸一兩 川 芎一兩 白 芍一兩 熟 地一兩
香 附十兩 三 稜八錢 文 朮八錢 紅 花一兩
蘇 木一兩 干 漆八錢 西 吉四兩 桃 仁一兩
生 地一兩 祈 艾八錢

配制：上藥共為細末，水丸綠豆大。

用法：每服二錢，開水送下，每早晚各服一次，七日見效。

禁忌：孕婦忌服。

處方 十

洛寧 王喜廉

主治：月經不調，骨蒸潮熱，口苦發渴，午後氣脹，經血色淡，或隔月一見，或年余不見。

藥物：歸 身五錢 炒川芎五錢 紅 花錢半 生 地二錢
知 母二錢 川貝母二錢 生干姜二錢 炒蒲黃三錢
冬 花三錢 三七參三錢 丹 參兩半 炙甘草二錢
蜂 蜜六兩 （口渴加生地三錢 寸 冬三錢；午後氣脹加
陳 皮三錢 砂 仁二錢；腹痛加肉桂一錢 靈 脂三錢。）

配制：上藥為末，煉蜜為丸，二三錢重。

用法：每次服一丸，一日三次，飯前開水送下。

附說：服藥幾日後，口內渴時，中午減服一次，十日後飲食增進者為好的現象。

處方 十一

洛寧 吳春銘

主治：月經不調，來時腹痛，錯前錯後。

藥物：當 歸一兩 益母草一兩 茜 草五分 紅 糖四兩

配制：用黃酒三斤將以上藥品浸入漬泡冬日二十天夏日十五天。

用法：每天早晚各服藥酒三杯（一二料可愈）。

處方 十二

漢陽 高書卿

主治：少腹淤血有塊（挾寒者）。

藥物：紅 花一兩 小茴香炒一兩 燒 酒一斤

配制：將紅花小茴香共浸酒內十天。

用法：每日量飲二次，每次一二酒杯。

處方 十三

漢陽 段智印

主治：痛經。

藥物：全當歸三支（大的）

配制：加水漫火熬濃汁。

用法：內服，多次分服，二日服完（服時徐徐咽下）。

處方 十四

漢陽 高世显

主治：月經旨期由于血滯。

藥物：當 歸三錢 白 芍酒炒三錢 熟 地五錢 香 附炒三錢

川 芎三錢 桃 仁二錢 文 朮錢半 木 通錢半

肉 桂錢半 紅 花一錢 炙 草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十五

漢陽 王治國

主治：月經錯前錯后，忽多忽少。

藥物：當 歸四錢 紅 花四錢 桃 仁三錢 荊芥穗五錢 防 風五錢

元 胡四錢 靈 脂四錢 香 附六錢 坤 草六錢

配制：上藥共為細末，黃酒為丸，桐子大。

用法：每服二錢，空心服，黃酒加開水送下。

二 經 閉 類

處方 一

尉氏 鄭其琛

主治：經閉（身熱、口渴、心煩、脈沉數）。

藥物：當 歸五錢 京 芍四錢 生 地三錢 枝 子三錢 蓮 召三錢
薄 荷三錢 黃 芩三錢 芒 硝三錢 大 黃四錢 甘 草二錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 二

萊陽 李紹泉

主治：經閉（全身發黃腹痛）。

藥物：黑 凡一斤 紅公鷄血三兩 大 棗四兩煮熟取淨肉

配制：將黑凡和公鷄血拌和，使其風干研細，和棗肉為丸桐子大。

用法：每次服七粒（每日加服二粒，服至十日加到二十七粒為止）
紅花黃酒煎汁送下，服至二兩大效。

处方 三

洛專 左華云

主治：經閉（三四月不見少腹脹滿）。

藥物：香 附八錢 台 烏五錢 小 茴一錢 干 漆一錢 桃 仁二錢
澤 蘭三錢 寸 香二分

配制：水煎。

用法：內服。

处方 四

洛專 胡遵素

主治：經閉。

藥物：巴 豆二個 胡 椒七個 生 地五分 扁 蓄五分 大 棗一個
去皮核

配制：上藥共搗如泥，用蠶壳二個，一個剪一小口，將藥裝入，另一個剪一大口，將小口者套住，外用絲絛紮緊，絛頭剩六寸長。

用法：將上制藥，納入陰戶內三寸許，三四天經血可來。

禁忌：貧血性月經不來及一切虛症禁用。

处方 五

南乐 高晋本

主治：处女經閉。

藥物：白 鴿一只（去毛及內臟） 血 竭一兩研細

配制：將血竭裝入鴿腹內用綫縫口黃酒清水各半煮熟。

用法：吃鴿喝湯。

处方 六

唐河 衛協會

主治：經閉或錯前錯后，身倦腹痛面黃肌瘦。

藥物：三 稜三兩 文 朮三兩 枳 殼三兩 香 附三兩 西 吉四兩
二 丑四兩 當 歸一兩 川 芎一兩 紅 花一兩 桃 仁一兩
元 胡一兩 玉 金一兩 大 白一兩 血 參一兩 陳 皮一兩
青 皮一兩 川 朴一兩 甘 草一兩

配制：共為末蜜丸。

用法：每服三錢，每日二服。

处方 七

唐河 衛協會

主治：同上。

藥物：三 稜 文 朮 桃 仁 丁 香 廣木香 枳 實 川 芎
青 皮 牙 皂 紅 花 巴 雙 各等分

配制：上藥共為細末，棗肉和為丸如綠豆大。

用法：每早空心服三十粒連服三日以泄為度。

附說：藥中有巴雙性峻用時，應經中醫診斷許可后方可服用，以免發生事故。

三 崩 漏 類

处方 一

陳留 張胃一

主治：血崩（血流不止不省人事脈微細無力）。

藥物：党 参三錢 黃 芪五錢 熟 地四錢 炒白芍三錢 地榆炭三錢
白 芷三錢 阿 膠三錢 川 斷三錢 龍 骨二錢 茯 苓三錢
砂 仁錢半 青 皮三錢 枳 殼錢半 棕櫚炭二錢 側柏叶二錢
艾 叶五个

配制：水煎。

用法：先用鉄器燒紅放醋中，以熏患者鼻孔，至惊悸为度，过一时，病人苏醒，血下迟慢，再將湯藥服下。

处方 二

鄱陵 傅溫容

主治：血崩日久，有时潮热口干，脈沉弱。

藥物：党 参一兩 黃 芪二兩 茯 苓四錢 广 皮三錢 荆芥炭三錢
阿 膠四錢 三七参一錢半 甘 草二錢 寸 冬五錢 枝 子二錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 三

登封 梁魁一

主治：血崩。

藥物：党 参一兩 炙口芪一兩 白 朮六錢 田三七研末二錢

用法：一面先將田三七分兩次開水送下，一面即用水煎前三味，边煎边服。一二剂可愈。

处方 四

洛寧 万聖中

主治：血崩面黃危急。

藥物：楮树叶一把

配制：水煎。

用法：內服。

處方 五

洛寧 魯汗三

主治：血崩屬实者。

藥物：黃連炭三錢 黃芩炭三錢 川柏炭三錢 棕 炭一錢 地 榆五錢
田三七末一錢（沖服）

配制：水煎，加黃酒四兩。

用法：先服三七末，再服藥汁。

處方 六

洛專 魯汗三

主治：血虛崩漏。

藥物：口 芪一兩 當 歸五錢 杭芍炭三錢 九地炭三錢 山萸炭三錢
地榆炭五錢 茜 草二錢 棕 炭一錢 姜 炭二錢 黑芥穗三錢
川柏炭一錢

配制：水煎，加黃酒適量。

用法：內服。

處方 七

洛專 云子珍

主治：血崩初得，脈洪大有力。

藥物：生 地二錢 玄 參五錢 寸 冬三錢 黑芥穗二錢 汗三七五分
（為末沖服）

配制：水煎。

用法：內服二三劑。

處方 八

洛專 胡蘆索

主治：血崩。

藥物：黨 參一兩 熟 地一兩 黑荊芥三錢 黑棕炭一兩 升 麻一錢
炙甘草一錢半 黑 豆半合

配制：水煎。

用法：內服一二劑。

處方 九

洛專 張文卓

主治：血崩不止。

藥物：楮樹葉干的二兩（鮮的五兩）

配制：水煎加紅糖適量。

用法：內服。

處方 十

洛陽 郭石秀

主治：血崩。

藥物：小麥胚穗（即小麥黑死穗）一升

配制：瓦上焙黃為細末。

用法：開水一次送服。

處方 十一

內黃 宋墨亭

主治：血崩。

藥物：綿 薑二兩 黃 芩三錢（病重加三七三錢）

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十二

漢陽 王子和

主治：血崩（營養不良，身體虛弱，忽然血崩，脈象細弱欲絕）。

藥物：大力參一兩 上桂楠炭三錢 田三七二錢

配制：桂楠三七共為末，分作三包。

用法：每服一包，煎人參湯沖服，四小時服一次，血止後，改服十全大補湯五劑，並注意營養。

禁忌：脈搏實大有力者禁服。

處方 十三

長垣 符敬禮

主治：漏症日久。

藥物：地 榆一兩 苦 酒半斤

配制：同放砂鍋內煎之。

用法：一日分四次服完。

处方 十四

滑县 班綽然

主治：子宫出血，淋漓不止，或大下血。

藥物：当 归_{四錢} 川 芎_{三錢} 白 芍_{三錢} 生地炭_{三錢}
黑枝子_{三錢} 刘寄奴_{三錢} 阿膠珠_{三錢} 芥穗炭_{三錢}
貫众炭_{三錢} 田三七_{二錢} 艾 叶_{三片}

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十五

內黃 符澤古

主治：老年血崩。

藥物：大力参_{五錢} 何首烏_{五錢} 田三七_{一錢}

配制：共为細末，分作六包。

用法：每服一包，每日服三次，开水送下，服完可愈。

处方 十六

安陽 宋迪廷

主治：血崩不止。

藥物：魚 鱉_{二兩}

配制：焙黄为末。

用法：黄酒冲服，以汗出为度。

处方 十七

安陽 李庆芳

主治：血崩。

藥物：麻杆灰_{一兩} 黑棕炭_{一兩}

， 配制：共为末。

用法：开水冲服。

处方 十八

安陽 案 命

主治：血崩。

藥物：絲羅底一張
配制：燒成炭研末。
用法：開水沖服。

處方 十九

安陽 周濟人

主治：血崩。
藥物：墓頭回三錢
用法：水煎內服。

四 帶 下 類

處方 一

登封 姜文治

主治：赤白帶。
藥物：古石灰一兩 茯苓一兩 紅糖二兩
配制：石灰茯苓共為細末，紅糖水化和藥為丸，每丸三錢重。
用法：每晚服一丸，開水送下。
禁忌：孕婦忌服。

處方 二

清丰 劉國恩

主治：赤帶。
藥物：雞蛋清一個 蕎麥面一把
配制：共和為丸。
用法：內服開水送下。

處方 三

濶池 王冠軍

主治：五種帶症。
藥物：海南沉 檀香 枳實 枳殼 紫叩仁 制半夏 生川烏
川軍 甘草各等分

配制：共为細末，蜜丸梧子大。

用法：每服三錢，空心服，蓼莪湯送下。

附說：上藥并治男子五淋。

处方 四

洛陽 李新維

主治：白帶。

藥物：生山藥四兩 炒山藥四兩 黃 芩一兩

配制：共为細末。

用法：每次服一兩，一日三次，空心服，一周見效。

处方 五

洛專 張文卓

主治：白帶。

藥物：熟 地一兩 黃 肉五錢 山 藥八錢 丹 皮四錢
云 苓四錢 澤 夕四錢 玉 米一兩 白果仁十个

配制：水煎。

用法：內服。

处方 六

清丰 刘国恩

藥物：管仲炭 木耳炭 蓮蓬炭 棕炭 生地炭 黃柏炒各三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 七

清丰 蔣楓春

主治：白帶。

藥物：当归尾三錢 艾叶炭一錢半 紅花一錢半 椿根白皮炭三錢

配制：水煎濾汁，加黃酒二兩。

用法：內服。

处方 八

內黃 黃云興

主治：白帶。

藥物：鴨蛋七個去黃取清，高粱花（無花用高粱面）焙干為末。

配制：用蛋清和高粱花末成塊，裝入七個鴨蛋壳內，用濕紙包好，再用火焙焦。

用法：每日服一個，兩回分服。

處方 九

漢陽 豆荊山

主治：白帶。

藥物：蓮鬚三錢 蓮肉五錢 連召三錢 燈芯一錢
竹葉一錢

配制：水煎。

用法：內服，服後令出微汗，避風三天，不愈再服數劑。

禁忌：忌房事百天。

處方 十

漢陽 豆荊山

主治：白帶。

藥物：全蝎一兩（重病用一兩五錢）

配制：焙微黃，如果不焦再輕焙一次，研為細末，分作六包。

用法：每天服一包，晚上服，黃酒四兩沖服（燒酒也可），服後用熱豆稭灰盛碗中，暖肚臍，每服一次暖一次，服完可愈。

附說：如有反應，身上起疙瘩無妨。按本方似為治某種原因所致的白帶，用時應慎重。

處方 十一

南樂 馬普駿

主治：初起白帶。

藥物：椿根白皮一兩 鮮茅根一把 血見愁一把

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十二

長垣 陳信然

主治：白帶。

藥物：當歸二錢 升麻錢半炒 云苓一兩 五倍子八錢

配制：水煎。

用法：內服（無副作用）。

處方 十三

滑縣 班綽然

主治：白帶。

藥物：馬齒莧一握 白果仁七個 雞蛋清三個

配制：先將前二味合搗，再加入雞蛋清中，用開水沖熟。

用法：內服，三四次可愈。

處方 十四

安陽 郭培基

主治：白帶。

藥物：豆腐一斤 硫黃一兩

配制：將豆腐分成三塊：挖成槽，填入硫黃蓋住，鍋內鋪上一指厚的稻草，將豆腐放在稻草上，加水以淹住豆腐為度，煮三四小時將硫黃取出為面。

用法：每服三錢，開水送下。

處方 十五

安陽 陳珍漢

主治：白帶陰痒。

藥物：蛇床子三錢 地骨皮一兩 白凡一錢 川椒二錢

配制：共為末熬水一盆。

用法：每天晚上用熬水洗患處一次，數次可愈。

處方 十六

許昌 胡俊嶺

主治：白帶。

藥物：古石灰半斤 白朮二兩

配制：共為細末。

用法：每服三錢，早晚各一次，開水送下。

处方 十七

許昌 李鴻文

主治：白帶。

藥物：硫黃四兩 豆腐一塊

配制：將硫黃入豆腐內，煨一柱香時，取出為末，分作兩付。

用法：每次服一付，用白果十個，白豇豆四兩，煎湯送服。三劑可愈。

鑑者意見：硫黃量太大，同時可視病情，酌量減少用量，可和第十四方參看。

处方 十八

商水 周廷岑

主治：白帶。

藥物：茅朮五錢 白芍三錢 川芎三錢 牡蛎五錢

配制：共為細末。

用法：每服一錢，開水送下，每日早晚各服一次。

五 胎 前 類

处方 一

濮陽 梁道彰

主治：孕婦勞動傷胎腰酸，不過三天者。

藥物：當歸三錢 黃膠三錢 西洋參三錢 大棉芪九錢

枸杞三錢 茯苓七錢 女貞子三錢 焦朮二錢

艾葉三個

配制：水煎。

用法：內服。

处方 二

濮陽 高書印

主治：懷孕五、六月胎懸。

藥物：生白芍一兩 甘草五錢 生姜一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 三

濮陽 高書印

主治：子嗽（五六月潮熱咳喘）。

藥物：熟地一兩 山藥五錢 萸肉三錢 茯苓一兩

丹皮三錢 澤夕三錢 卜子五錢 蘇子五錢

白芥子二錢 川牛夕二錢 生姜三片

配制：水煎。

用法：內服。

处方 四

濮陽 梁道章

主治：受孕三五月即行小產。

藥物：黨參一錢 川斷一兩半 黃芪五錢 杜仲炭二錢半

黃膠珠一兩半

配制：上藥共為細末，煉蜜為丸桐子大。

用法：每日早晚各服三錢，開水送下。

处方 五

濮陽 王治國

主治：屢次產兒不滿一歲便死。

藥物：小兒生後，將臍帶留六寸，用燒熱剪子剪斷，下余胞衣上之臍帶亦剪下六寸。

配制：將臍帶瓦上焙干，配辰砂等分，共為細末。

用法：香油和藥末塗乳頭上，使小兒常吃神效。

处方 六

南樂 趙秉信

主治：氣血虛弱胎不固。

藥物：當歸三錢 白朮三錢 云苓三錢 枳殼半錢

根 朴三錢 苏 梗三錢 兔絲子三錢 杜 仲半錢
 砂 王一錢 川貝母錢半 陳 皮一錢 箭 蕨三錢
 甘 草一錢 艾 叶四片（編者按：此方內“根朴”分量太
 重，用時宜減）

配制：水煎。

用法：內服。

处方 七

滑县 馬与九

主治：胎漏（因劳动小腹下墜疼痛下血）。

藥物：杜 仲三錢 白 朮三錢 貢 膠三錢 川 断二錢
 焦枝子一錢 柴 胡七分 白 芍二錢 黃 蘗壳七个炒炭

配制：水煎。

用法：內服。

处方 八

南乐 吳宪周

主治：胎气冲心，心胃疼如死。

藥物：螞蟻樓土二錢（牆上泥、溼亦可）

用法：白水冲服即愈。

附說：螞蟻樓土，即螞蟻銜出的土。

处方 九

滑县 馬与九

主治：孕婦便閉（因受胎压，大小便不通）。

方法：令孕婦仰臥床上，將足這一头抬起，使孕婦头向下垂，少傾
 慢慢落下，千萬勿使起床，尿即排出。尿罢喝甜面湯一碗。

处方 十

安陽 邢文秀

主治：胎漏。

藥物：力 參一錢 黃 芪三錢 炒白朮三錢 云苓二錢半 炒黃芩一錢

炒归身三錢 炒白芍三錢 黑地榆三錢 黑棗仁三錢 黑杜仲二錢
柴胡五分 升麻五分 艾叶三片

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十一

新郑 常嵩亭

• 主治：胎漏（孕后数月，陰道漏血，脈右滑細，左滑数。）

藥物：党参一兩、白芍五錢 黃芩炭三錢 益母草三錢 生地四錢
續斷二錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十二

洛寧 左华堂

主治：胎漏十余月，少腹微痛喜按。

藥物：綿芪一兩半 升麻一錢 党参二錢 菖蒲三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十三

唐河衛协会

主治：胎动不安。

藥物：当归三錢 川芎一錢 白芍二錢 大貝二錢 川羌二錢
芥穗二錢 口芪二錢 鬼絲餅二錢 枳壳二錢 川朴二錢
甘草錢半 蘼艾一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十四

許昌 龐子仁

主治：妊娠四五月漏血。

藥物：蓮叶一个 紅糖三錢

配制：水煎。

用法：內服二三次

处方 十五

商水 富 凱

主治：勞力傷胎見紅。

藥物：當歸身 地榆炭 生地炭 黃芩炭 焦朮 靈脂炭 荊芥炭
砂仁 口芪 陳皮 西茴 紅糖

配制：水煎

用法：內服。

处方 十六

商水 富 凱

主治：子煩（由內熱所致者）

藥物：四物湯加梔子 黃柏 黃芩 竹茹 砂王

配制：水煎。

用法：加童便內服。

处方 十七

商水 富 凱

主治：子腫。

藥物：四物湯加云苓 澤夕 寸冬 大腹皮 牛夕 木瓜 黃芩
胆草 地膚子 姜皮 甘草

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十八

商水 富 凱

主治：胎動不安，由于血熱者。

藥物：當歸身四錢 川芎三錢 生地五錢 砂仁三錢 云苓四錢
焦朮三錢 丹皮三錢 陳皮三錢 西茴六錢 川朴三錢
藿香二錢 甘草一錢（編者按：此方內“川朴”分量太重，
用時宜減）

用藥：水煎。

配制：內服。

六 临 产 类

处方 一

滑县 赵万章

主治：临产交骨不开。

藥物：当 归八錢 川 芎四錢 生桃仁一个去尖 朱 砂三分研細

配制：水煎。

用法：內服。

处方 二

內黃 王临學

主治：难产。

藥物：榆树根白皮七寸長向陽者

配制：水煎。

用法：內服，服后以产妇自己头髮嚥口內，待發嘔时其胎自下。

处方 三

滑县 郝鳳雷

主治：难产。

法物：当归身八錢 故 紙四錢 赤石脂二錢 大熟地 八錢

党 参八錢 甘 草二錢 黄 芪八錢

配制：水煎濾汁，以燒紅鉄釘淬入藥汁。

用法：少待，將鉄釘取出服藥汁。

处方 四

商水 富 凱

主治：难产（一二日因产妇困乏無力者）。

藥物：当 归二兩 川 芎四錢 口 芪八錢 龟 板八錢

髮 炭一錢 力 参一錢 白 芷五錢 甘 草二錢

配制：水煎。

用法：加冰糖，內服。

处方 五

商水 富 魁

主治：难产（临产胎衣早破，羊水干涸，胎兒难下。）

藥物：荷叶一塊。

配制：水煎。

用法：內服。

处方 六

唐河 衛协会

主治：难产（胎不順）。

藥物：猪 苓二錢 白 朮二錢 澤 瀉二錢 茯 苓二錢
石 葦二錢 木 通二錢 陈 皮二錢 車 前二錢
桔 梗二錢 甘 草一錢 灯 芯三茎 蛇 皮少許

配制：水煎。

用法：內服。

处方 七

長垣 麻得榮

主治：催生。

藥物：当归身五錢 大熟地一兩 大綿芪一兩 人 参六錢
故 子一兩 滑石粉五錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 八

唐河县衛协会

主治：交骨不开。

藥物：当 归一兩 川 芎三錢 川牛夕三錢 龟 板三錢
口 芪一兩 香 附三錢 紅 花三錢 寸 冬一兩
女 髮一團

配制：水煎。

用法：內服。

附說：若至三四天仍产不下者，龜板可用至一兩，并可加入人參二至八錢。

七 产 后 类

处方 一

巩县 王定文

主治：产后一月，小腹痛兩脇脹滿，脈沉迟。

藥物：大 白三錢 二 丑三錢 西 吉三錢半 紅 花三錢

配制：上藥共为細末，醋打面糊为丸綠豆大。

用法：上藥分作二次，黃酒送服。

处方 二

洛專 刘鳳閣

主治：产后瀉。

藥物：白芷 白 芍 云 苓 土白朮各三錢 牙豬肝一挂

葱 姜各四兩切碎

配制：上藥前四味，共为細末，豬肝用刀切开，把藥末和葱姜同裝入肝內，麻繩捆住，放砂鍋內蒸熟。

用法：儘量吃肝和藥。

处方 三

洛專 胡遜素

主治：产后下血不止，口紧昏迷。

藥物：当归五錢 川 芎一錢半 桃 仁一錢 姜 炭七分

黑荆芥一兩 炙甘草三錢 黑 豆一合

配制：水煎。

用法：內服。

处方 四

洛專 朱雪賢

主治：胎衣不下。

藥物：汾酒一兩 紅糖一兩和勻

用法：溫服即下。

处方 五

洛專 趙敬昭

主治：產後傷食，腹脹瀉泄，及經閉不通，或錯前錯后。

藥物：西吉七斤 醋香附二斤 紅曲一斤

配制：上藥共為細末，以十六分之一的石碱水，和藥為丸如綠豆大。

用法：每天下午空心服三至五錢，開水送下。

处方 六

洛專 李宗道

主治：產後傷食，發熱虐疾、痢疾。

藥物：巴豆七個去油 胡椒七個 大棗一個 綠豆七個

配制：將棗去核，將胡椒等三味研末，裝入棗內，用麻將棗捆好，新瓦上燒存性，研細，分作兩包。

用法：每服一包，開水送下（藥竣，用時須經中醫診斷許可，方可用）。

处方 七

洛專 趙子勤

主治：胎衣不下。

藥物：陳石灰二三斤

配制：將石灰搗細末，裝在便罐內，加開水半罐。

用法：將便罐放在產婦前，令產婦先將臍帶放在罐內，產婦隨坐罐上，少刻胎衣即掉。

处方 八

洛專 萬聖中

主治：產婦吊氣且。

藥物：澤 藥四錢 白 凡五錢

配制：水煎倒入盆中。

用法：令产妇坐盆上熏之，即可升上。

处方 九

澠池 李景賢

主治：产后食积水积面肉水果等积及少腹淤血結聚，早晚重，發冷發熱，面黃肌瘦，不思飲食。并治男妇小兒一切积滯肚疼屬实症者。

藥物：巴豆二十个（去皮不去油） 紅小豆四十个 綠 豆六十个
明 雄七分（本方須經中医診斷許可后方可服用以免發生事故）

配制：以上四味，放石臼內搗為細末，陈米醋和丸，如綠豆大。

用法：每早空心服，虛弱者（病久入虛，病仍是实。）可隔一日一服，产后病均用半生不熟的清米飲加紅糖少許送下，（其他不用紅糖）服藥后一小时，腹內当雷鳴，如不見此現象，可喝酸面湯几口以催藥力，使其瀉泄，泄多欲止，可喝稠面湯半碗即止。（服藥后，也有吐者勿妨。）

用量：成年人每服五丸，至多不能超过七丸，小兒酌減。

处方 十

濮陽 董長太

主治：产后癲狂。

藥物：自己胎盤，瓦上焙黃焦 血 珀一錢 元 寸五厘

配制：上藥共為細末。

用法：黃酒冲服使發汗，然后再用当归五錢，菖蒲五錢水煎服。

处方 十一

濮陽 李忠林

主治：产后風。

藥物：当 归三錢 紅 花二錢半 蜈 蚣三条 全 蝎一錢 血竭花四錢
兒 茶三錢 荆 芥二錢 防 風三錢 白 芷三錢 升麻三錢

配制：上藥共為細末。

用法：每服三錢，黃酒童便沖服微汗。

處方 十二

漢陽 高世顯

主治：產後惡露不下，瘀血攻心，狂言譫語。

藥物：干荷葉二兩 劉寄奴三錢 生蒲黃三錢 桃仁炒三錢 羊鮮血為引

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十三

南樂 李文卿

主治：產後風，久治不愈。

藥物：烏牛角一個

配制：焙干研細末。

用法：每次服一錢，姜水送下，日服三次，半月可愈。

處方 十四

南樂 朱聚奎

主治：產後風，牙關緊閉。

藥物：黃 丹七錢 火 硝五錢 胡 椒三錢

配制：共研細末。

用法：每次用二錢，醋調搽病人手心，汗出即愈。

處方 十五

清丰 楊榮林

主治：產後風。

藥物：豬鞭一條陰干 豆淋酒

配制：豬鞭用陰陽瓦焙干研末，豆淋酒法，用黑豆二兩，酒六兩，一面炒豆，一面燒酒，至豆亂响時，把熱酒沖豆內，去豆用酒。

用法：輕者每服一分，重者二至三分，不可過量，豆淋酒送服，服後蓋被出汗。

处方 十六

清丰 馮明道

主治：产后失血过多，神昏大汗，牙关紧闭。

藥物：大力参六錢 綿 芪四錢 熟地砂仁搗五錢 当归身一兩
貢膠珠四錢 茯神方四錢 远 志三錢 炒棗仁三錢 石菖蒲三錢
荆芥炭一錢

配制：水煎加童便。

用法：內服（应随症加减，不要过用一方）。

处方 十七

長垣 楊如周

主治：产后咳嗽。

藥物：姜 虫七个 坤草面 三錢 赤 金七張 蜂 蜜四兩

配制：將蜜放鍋內滾七滾，入前藥攪勻，赤金放藥上。

用法：上藥分作四份，每早晚各服一份，服藥后随喝黃酒二兩，重者須服三料。

处方 十八

清丰 馮明道

主治：产后四肢串痛。

藥物：当 归五錢 川 芎三錢 新紅花二錢 秦 艽四錢
大 活三錢 双 鉤三錢 川續斷四錢 鷄血藤四錢
防 已三錢 灵 仙三錢

配制：水煎，加童便黃酒为引，因伤者加天麻三錢，因寒者加附子一錢，桂楠三錢。

用法：內服。

处方 十九

滑县 郭心謙

主治：产后淤血肚痛不止（大小产均可）。

藥物：白鷄冠花一兩

配制：用黃酒六兩煎數沸。

用法：頓服，立時見效，重症加量，輕症減量。

處方 二十

滑縣 高相漢

主治：產後大瀉。

藥物：鷄蛋白一個

配製：用開水沖為一茶碗。

用法：喝之立止。

處方 二十一

滑縣 高相漢

主治：產後泄瀉。

藥物：鷄蛋黃一個

配製：用糖醋煮二十八分鐘。

用法：用黃酒沖服，或紅糖水沖服。

處方 二十二

南樂 國化伸

主治：產後血暈。

藥物：干漆不拘量。

用法：將漆點着，使醋噴滅，放床邊熏之即醒。

處方 二十三

南樂 朱聚奎

主治：產後茄翻腫脹。

藥物：紫茄花一兩焙干

配製：研為細末香油調。

用法：搽患處。

處方 二十四

清丰 馮道明

主治：產後五日內，瘀血停滯，小腹堅硬疼痛，胸膈脹滿，六脈沉遲，或牙關緊閉。

藥物：當 歸五錢 川 芎四錢 紅 花三錢 桃 仁四錢

桂 楠三錢 吳 萸三錢 小 茴三錢 香 附五錢

怀牛夕四錢 眞降香五錢 砲 姜二錢 元 胡三錢

配制：水煎，濾汁加重便兩盅黃酒一兩。

用法：內服一二劑。

处方 二十五

滑县 高洽魯

主治：陰挺（子宮下垂）。

藥物：团魚头一个 山 葱一兩

配制：共焙为細末。

用法：先用消毒藥水洗淨，將藥末撒患处，一二次可愈。

处方 二十六

安陽 龐子明

主治：产后腸脫（子宮下垂）。

藥物：人 参一兩 綿 芪一兩 升 麻五錢

配制：水煎。

用法：內服。

另以蓖麻子二十四粒，元寸一分，研碎貼在百会穴上，
腸收即取去，如腸干可用香油乳汁潤之。

处方 二十七

蘭考 范鎔皋

主治：产后冲紅（惡露驟停，面黃肌瘦）。

藥物：大 黃一兩 山 甲三錢土炒 螻 蛄一个煅上焙干（大黃量大用时宜
慎）

配制：上藥共为細末。

用法：紅糖一兩冲水送服上藥（一次頓服）。

附說：服藥后一二小时瘀血即下。

处方 二十八

通許 沈文杰

主治：产后行房，腹痛，面黃肌瘦。

藥物：金毛狗一兩 當 歸七錢 川 芎三錢 紅 花二錢 血竭花一錢
乳 香五錢 山 甲五錢 大 黃二錢 灵 脂三錢 蒲 黃三錢
桃 仁五錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服，三四劑。

处方 二十九

通許 于从善

主治：产后行房，冷燒、咳嗽、兩顴潮紅、少腹微痛、面黃肌瘦。

藥物：當 歸三錢 川 芎三錢 白 芍三錢 紅 花錢半 枳 實二錢
三 稜二錢 文 朮二錢 血力花錢半 桃 仁三錢 干漆炒炭
二錢 巴 豆三个去油 全小鷄一个(印出胎小鷄

焙干为末，如無全小鷄，药壳壳也可)

配制：上藥共为末蜜丸。

用法：每服三錢，开水送下，日服兩次。

处方 三十

洛專 李振華

主治：产后風。

藥物：柯 子三錢 米 壳三錢 淡竹叶三錢 砂 仁三錢 大棗十八个

配制：水煎。

用法：內服。

附說：虛弱者加綿茵党参当归身，有瘀血加活血藥。

处方 三十一

安陽 严全智

主治：产后七日內瘀腹疼。

藥物：乳 香三錢去油 沒 藥三錢去油 血竭花一錢半 酒元胡五錢

配制：共为細末。

用法：每服一錢，黄酒送下。

处方 三十二

安陽 宛玉清

主治：产后血出过多，汗如泉涌。

藥物：力 參一錢 生綿芪二兩 當 歸一兩 阿膠珠四錢 黑荊芥三錢
去茯苓三錢 麻黃根二錢 炙甘草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 三十三

安陽 陳珍漢

主治：產後風。

藥物：艾 葉一兩 荊 芥四兩 防 風四兩

用法：用草紙包藥放盒內燃燒，薰陰戶即愈。

另用： 當 歸八錢 川 芎四錢 黑干姜四分 桃 仁七個
烏 梅三個 炙甘草五分 艾 葉五個。水煎，加黃酒二三兩
內服。

處方 三十四

唐河 衛協會

主治：胎衣不下。

藥物：芡實葉一個

配制：水煎。

用法：內服。

又方：大麻子仁四十九粒，明雄二錢，元寸二分，共搗如泥，
糊腳心，即下。

八 催 乳 類

處方 一

密縣 郭錫三

主治：乳汁缺乏。

藥物：鷄蛋七個去壳 核桃仁七個 全 葱四兩 王不留行五錢

配制：先將王不留行煎汁去渣，再將鷄蛋核桃仁全葱加入同煮，酌
加食鹽。

用法：吃蛋飲湯取微汗。

处方 二

中牟 段岐州

主治：乳汁缺乏或無乳。

藥物：党 参一兩 黃 芪一兩 熟 地四錢 山 甲二錢
王不留行三錢 漏 蘆五錢 通 草三錢 公 英三錢
白 芍三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 三

开封 邢資厚

主治：乳汁缺乏由于气郁者。

藥物：山 甲四錢 王不留行三錢 香 附四錢 青 皮三錢
漏 蘆一兩 花 粉四錢 黃 芪四錢 通 草三錢
当 归三錢 鮮蝦米四兩

配制：水煎。

用法：內服一二剂。

处方 四

洛寧 駱 林

主治：乳汁缺少。

藥物：生口芪一兩 当 归五錢 升 麻七錢 王不留行二錢
漏 蘆二錢 黑芝麻五錢 通 草一錢半
爪萐仁三錢 桔梗一錢半 甘 草三分 山 甲一錢
核 桃三十个

配制：上藥共为細末。

用法：每服二錢。

处方 五

南乐 赵秉信

主治：通乳。

藥物：南瓜根一兩 紅 糖二兩

配制：水煎加入紅糖。

用法：內服。

处方 六

唐河衛协会

主治：催乳。

藥物：黃 芪五錢 當 歸三錢 山甲三錢 通 草二錢 藿 香三錢

王不留行三錢 紅 花一錢 白 芍二錢 云 苓三錢

甘 草一錢

配制：水煎（河水最好）。

用法：加黃酒三四兩，內服使發汗。

处方 七

商水 張明玉

主治：下乳。

藥物：當 歸四錢 川 芎三錢 王不留行四錢 川山甲四錢

通 草四錢 紅 花一錢 白 芷二錢 甘 草二錢

香 附一錢

配制：水煎。

用法：加酒四兩內服使出汗，健康者產後三日服之，虛弱者滿月後服之。

处方 八

商水 張東周

主治：下乳。

藥物：四物湯加川貝 花粉 山甲 王不留行 通草 漏蘆 生薑

甘草（按人體格斟酌用量）

配制：猪蹄湯煎藥。

用法：內服使出汗。

九 乳 病 類

處方 一

巩縣 李本軒

主治：乳癰（紅腫熱痛，已破未破均效）。

藥物：全瓜蒌一個 楸樹根皮二斤 生 地一錢 元 參一錢

配制：上藥共搗如泥，水煎熬去渣，再熬成膏。

用法：將膏攤布上，貼患處。

處方 二

密縣 郭錫三

主治：乳癰潰爛。

藥物：透骨草切碎五錢 糠谷老切碎五錢 鷄 蛋四個 香 油四兩

配制：將三味入油內熬熟。

用法：以油紙夾藥，量瘡大小復嚴為度，復上后不可去掉，至七日可愈。

處方 三

杞縣 郭明陽

主治：乳癰（乳房紅腫，冷熱頭痛）。

藥物：二花 連翹 公英 花粉 桔梗各三錢 全瓜蒌一個
甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服，一二劑。

處方 四

洛寧 汪俊三

主治：乳癰、乳疽、乳勞、乳發。

藥物：輕粉 銅錄 松香 雄黃 石黃 枯凡各一錢

配制：共為細末，另以香油二兩，黃臘五錢，放銅勺內，火上化熔，即離開火，加入六味藥末拌勻，攤在油紙上，如瘡大小

制成夾紙膏，周圍用綫縫好，一面用針刺孔若干，以便藥力透入瘡內。

用法：以刺孔一面按瘡上，再用紗布包紮，共貼七日。初起一貼即愈，潰后貼兩次可愈。

处方 五

洛寧 張建恆

主治：乳癰。

藥物：棉花壳一二斤

配制：加水按一般熬藥膏法熬成藥膏。

用法：將藥膏攤布上貼患處。

处方 六

洛寧 王履道

主治：乳房被擠結核。

藥物：川棟子 連肉 公英 鹿角各等分

配制：上藥共焙干，研為細末。

用法：每服三四分，米湯送下，服后臥床厚蓋出汗，一次汗后，再服勿用發汗，已潰者連服，并上患處，藥完可愈。

处方 七

洛寧 李宗道

主治：乳裂。

藥物：冰糖

配制：研細。

用法：撒裂口上。

处方 八

洛寧 昌欽杰

主治：乳癰乳疽。

藥物：乳香二錢 沒藥二錢 血竭一錢 兒茶二錢

松香二錢 大風子二十個 大黃五分 銀朱一錢

水銀二分五厘 輕粉二分五厘 硫黃二分五厘

猪板油四兩

配制：上藥共为細末，合猪油共搗如泥，夾油紙內，一面用針刺數百孔。

用法：以有孔面照患处貼上扎住，一二次即愈。

处方 九

濮陽 張新賢

主治：聚乳。

藥物：当 归 清半夏_{等分} 葱 白_{少許}

配制：上藥共搗如泥为丸。

用法：將藥丸塞鼻孔中，在左塞左，在右塞右，一天換二三次，另用坤草煎水內服，發汗即愈。

处方 十

濮陽 顧明乾

主治：聚乳。

方法：用火罐撥后胛骨下对乳房处，右边照左边撥，左照右边撥，一次即愈。

处方 十一

長垣 李昶白

主治：乳癰乳癌（初期患者最效）。

藥物：絲瓜子一兩炒焦

配制：为末分作兩包。

用法：每晚服一包，黃酒三四兩溫熱沖服，蓋被出汗，不愈次晚再服。

处方 十二

長垣 張守敬

主治：乳頭焦裂。

藥物：芙蓉叶 丁 香

配制：共为細末。

用法：撒患处。

处方 十三

唐河衛协会

主治：乳癰（乳腺炎）乳上紅腫硬痛，發冷發熱。

藥物：當 歸一兩 川 芎五錢 白 芨三錢 赤 芍三錢 二 花一兩
公 英八錢 地 丁三錢

配制：水煎。

用法：加黃酒三兩，內服使發汗。

处方 十四

唐河衛协会

主治：乳瘡（乳部紅腫，出頭流膿）。

藥物：血竭花五錢 廣黃丹五錢，老人指甲少許 老人頭髮少許
臭蒲草根去黑皮五錢 香 油二兩

配制：先將指甲頭髮，臭蒲草根共入香油內炸焦，濾去渣，再下黃丹（按一般熬膏藥方法）熬成膏藥，再將血竭花研為極細面，和入攪勻備用。

用法：將膏藥攤布上，貼患處。

处方 十五

許昌 羅位南

主治：乳腺炎發熱疼痛。

藥物：巴豆仁三個去油 鷄 蛋一個

配制：將去油巴豆雙，裝鷄蛋內，用面包住，燒熟去面壳。

用法：早晨空心將藥蛋吃了。

附說：經過几个小时要泄下。泄下过甚时，用稀湯補之，一次不愈，可再服一次（注意藥性過峻，用時宜慎：身體虛弱者應請醫生同意後使用）。

处方 十六

許昌 單國經

主治：婦人乳上生疔瘡。

藥物：生南星 防 風 白 芷 天 麻 川 芎 白附子各三分
（如未潰加皂刺）

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十七

密县 郭錫三

主治：乳腺炎寒热往来，局部腫痛。

藥物：当 归五錢 青 皮三錢 石 羔三錢 二 花五錢 芭 叶二錢
瓜 萼一个 沒 藥三錢 山 甲二錢 皂 刺三錢 公 英一兩
橘 叶七片 大 貝三錢

配制：水煎。

用法：加黃酒四兩，內服一二剂可愈。

一〇 症 瘕 类

处方 一

杞县 郭明陽

主治：妇女痞塊（不包括黑热病）羸弱乏力，腹大面黄、时寒热。

藥物：朴 硝九兩 紅 花四兩 西 茴三錢 大 茴三个 皂 刺三錢
沉 香三錢 純酒精一斤 猪尿胞一个

配制：上藥共为粗末，同酒精裝入猪尿胞內，过十二小时。

用法：敷塊上紮住，每三天加酒和藥各半量，共加五次即愈。

处方 二

陈留 凡玉如

主治：腹中血塊、寒塊、腹痛屬实者。

藥物：鷄中金五錢 玉 金三錢 乳 香三錢 沒藥 三錢 灵 脂四錢
巴 豆三錢去油

配制：上藥共为細末，醋糊为丸，如小黄豆大。

用法：每星期服一次，或十日服一次。每次服十二粒，即泄瀉，如不泄再服六粒，以泄下为度。（藥剧宜經中医診斷許可后方可服用，以免發生事故）

禁忌：孕妇及弱体禁用。

处方 三

洛專 李作云

主治：石瘕（經停）少腹坚硬如石，有时慢痛，形如妊娠，飲食工作如常）。

藥物：阿 魏一兩 元 寸三分 明 雄錢半 白 信一錢 皮 硝一兩
五倍子二錢 全 蝎一錢 蜈 蚣五条 巴 霜七分 梅 片五分
猪尿胞一个（帶尿管） 燒 酒四兩 醋四兩 六岁童便一胞

配制：上藥共为末，和酒醋童便等同裝入猪尿胞內。

用法：將已裝藥的猪尿胞，按在少腹上扎住，至七天可再加入酒醋童便如上数，再过七天，另換新藥。（上方并治男女小兒一切坚硬积塊）

內服藥：

1.破症湯（先服二剂，改服吳茱萸湯）

青 皮二錢 三 稜二錢 文 朮二錢 香 附三錢 归 尾五錢
台 片三錢 官 桂二錢 紅 花三錢 苏 木二錢 赤 芍二錢
白 芍二錢 甘 草二錢水煎加重便一杯服

2.吳茱萸湯（服五剂，改服琥珀散）

当 归三錢 肉 桂二錢 吳茱萸四錢 粉丹皮二錢 姜半夏錢半
寸 冬二錢 防 風五錢 藁 本二錢 細 辛一錢 干 姜二錢
茯 苓三錢 白 朮二錢 甘 草一錢 生 姜三片水煎服

3琥珀散。（服三剂）

三 稜二錢 文 朮二錢 丹 皮二錢 元 胡三錢 肉 桂二錢
台 片二錢 刘寄奴一錢 归 尾五錢 赤 芍三錢 生 地二錢
水煎冲服 琥珀朱砂每煎各五分

处方 四

洛專 李作云

主治：妇女腸覃（腹大如妊，月經照行）

藥物：1.川厚朴三錢 檳 榔五錢 广木香一錢 枳 壳三錢
青 皮二錢 陈 皮三錢 制甘遂二錢 大 戟二錢

大棗五个（藥液用時須經中醫診斷許可後方可服用）

2. 丁香三錢 廣木香三錢 小茴六錢 川楝子四錢
青皮三錢 三稜三錢 文朮三錢

配制：1. 水煎。

2. 共為細末，蜜丸二錢重。

用法：1. 內服六劑，接服二方丸劑。

2. 每早晚各服一丸，姜湯送下。

—— 雜治類

處方 一

漿陽 萊克儉

主治：驗胎（經閉後檢查是否受孕）。

藥物：牙皂去皮子焙 黃連 甘草各五分

配制：上藥研細末。

用法：熱黃酒沖服服後五分鐘內發生嘔吐即是妊娠，否則為病。

處方 二

洛專 李作云

主治：陰痒。

藥物：青皮三錢 蛇床子五錢 枳實三錢 蒼朮一兩

川軍三錢 陳石灰二兩 椿根皮二兩 地膚子五錢

配制：水煎。

用法：先熏後洗陰道，六七次可止。

處方 三

洛專 許乃容

主治：陰戶發痒。

藥物：雄雞肝子一个

用法：用絹將雞肝包好，綫纏留綫頭五寸長，放陰道內，一夜取出，內有小虫即愈。另服龍胆泄肚腸三劑，永不再發。

处方 四

洛專 衛完儒

主治：女生殖器腫痒痛，或陰外生濕疹。

藥物：胆 草二錢 当 归三錢 白 芍三錢 川 芎 錢半
生 地三錢 木 通二錢 西滑石三錢 防 風二錢
澤 瀉二錢 連 壳二錢 柴 胡三錢 扈 子一錢
蘆 蒼五分 甘草节一錢 灯 芯三根

配制：水煎。

用法：內服。另用：归 尾五錢 狼 毒五錢 苦 参五錢
灵 仙五錢 鶴 虱一兩 蛇床子二錢水煎濾汁，加入猪胆汁二三个煮
洗。

处方 五

南乐 高登本

主治：妇女血分有热內淤，發狂，哭笑失常。

藥物：粉丹皮二兩 二 花四兩 川 軍三錢 紅 花二錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 六

清丰 馮明道

主治：妇女郁悶不食，脇下作疼，逆气上升。

藥物：旋复花三錢 代赭石四錢 香 附五錢 玉 金三錢
炙上甲四錢 枳 壳三錢 大 白三錢 沉 香四錢
卜 子炒三錢 白芥子炒四錢 六根朴三錢 六神曲炒三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 七

洛專 丁子寬

主治：陰挺（由陰道出来黑紅色，如蛇样的嫩肉，疼痛难忍，引起
全身發热）。

藥物：归 身三錢 蓮 子三錢 伏 苓三錢 木 香五分

升 麻八分 綿 蘘四錢 蓮 鬚三錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：先將患处洗淨，然后服藥一二剂即愈。

附說：根据症狀及用藥来看，似为子宮脫类病。

处方 八

南乐 朱聚宝

主治：陰挺。

藥物：蛇床子五兩 烏 梅二个

配制：水煎，去渣。

用法：熏洗患处，数次可愈。

三 兒 科

一 麻 疹 类

处方 一

尉氏 郑其琛

主治：麻疹收后，余热多日不退。

藥物：柴 胡二錢 黄芩一錢 赤 芍錢半 生 地一錢

麦 冬一錢 地骨皮一錢 知 母一錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 二

漢陽 辛祥云

主治：麻疹迎風欲死。

藥物：蜜 蜂三个(室内死蜂最好)去翅足

配制：瓦上焙黃为末。

用法：开水送服，汗出即愈（二岁小兒量）。

处方 三

安陽 李榮貴

主治：麻疹不出。

藥物：芫荽

配制：將芫荽入酒內燃着。

用法：用棉花蘸酒擦前后心。

处方 四

鄆城 王从甫

主治：麻疹上部出齐，下部不見，咳嗽發热、口渴。

藥物：当 归二錢 白 芷五分 京 芍錢半 山 甲一錢
山 查三錢 青 皮錢半 木 通錢半 桔 梗錢半
前 胡錢半 鷄冠血燒酒一杯为引

配制：水煎。

用法：內服。

处方 五

鄆城 刘子明

主治：麻疹后咳嗽年久不愈。

藥物：瓜蒌皮一个焙焦为面 梨一个

配制：將梨挖一孔，入瓜蒌面在內，面包燒熟。

用法：將梨三次吃完，二岁小兒兩天吃一个。

二 瘰 咳 类（百日咳）

处方 一

主治：百日咳。

藥物：苦杏仁三錢 大貝母 杏仁 化橘紅 半夏 元参各二錢

条 芩二錢 竹 茹二錢 鮮葦莖七寸 杷 叶幾半

甘 草一錢 紅 梨一个(無紅梨用冰糖一兩。口鼻出血加梔子茅根)

配制：水煎取汁(如用冰糖第一煎加半兩二煎加半兩)。

用法：多次分服(三四劑可愈)。

处方 二

蘭考 范鉞泉

主治：百日咳。

藥物：川貝母一兩 杏 仁五錢 青 黛三錢

配制：共為細末。

用法：三歲小兒每服一錢，每日二次。

处方 三

登封 姜文治

主治：百日咳。

藥物：川貝母一錢 朱 砂外包五分 生石膏三錢 姜 蛋五分

配制：水煎。

用法：內服(五歲以下小兒減半量)。

处方 四

濮陽 孫懷堂

主治：百日咳。

藥物：川貝母一錢半 月 石一錢 蛤粉煨五分 鏡 砂五分

琥 珀一錢 青 黛三分 赤 金三張

配制：共為細末。

用法：一歲小兒每服二分，蜜水送下，每日服二次。(隨小兒大小增減)

处方 五

清丰 周殿卿

主治：百日咳。

藥物：薤 仁一錢半 寸冬一錢半 川貝母一錢 姜 虫一錢 川軍一錢

甘 草一錢

配制：用香油三兩炸藥成黑色，去渣用油。

用法：藥油一歲小兒，三日分服。

處方 六

安陽 蔡福陽

主治：百日咳。

藥物：寒水石二錢 石 羔二錢 滑 石二錢 川貝母一錢半 天竺黃五分
牛 黃一分 赤 金五錢

配制：共為極細末。

用法：三歲以下者，每服三至六分，每日三次，咳嗽帶血者，茅根三錢煎湯送下，發熱者加白糖。

處方 七

滑縣 楊永久

主治：百日咳。

藥物：川貝母三錢 清半夏三錢 炒杏仁三錢 白芥子錢半 玉 金錢半
桔 梗二錢 甘 草二錢

配制：共為細末。

用法：七歲小兒服三分，加白糖少許，開水送下。每日服三次。

處方 八

安陽 牛庚書

主治：百日咳。

藥物：棉子油 鷄 蛋一個

配制：將鷄蛋用棉油炸熟。

用法：將油炸鷄蛋一次吃完。

處方 九

太康 軒洪立

主治：百日咳。

藥物：川 貝二錢 冬 花二錢 炙復花一錢五分 炙雙皮二錢 葶藶子一錢
天 冬二錢 姜黃連一錢 廣 皮二錢 甘 草五分 白 梨三片

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十

項城 尹明初

主治：百日咳。

藥物：百 合一兩 江 米一兩 白 糖一兩

配制：百合同江米熬成湯，白糖加入。

用法：內服。

处方 十一

鄆寧 董宛章

主治：百日咳。

藥物：姜 虫三錢 双 丁三錢 川 貝三錢 橘 紅三錢

配制：水煎。

用法：內服（嘔吐加半夏，胃脹加蘇子）。

处方 十二

睢縣 劉振理

主治：百日咳。

藥物：生荸薺二斤 蜂 蜜二兩

配制：將荸薺搗碎擠汁，加蜜停對，每次用二茶匙，加水少許同煎煮沸。

用法：一天服二次。

处方 十三

商寧 齊兆祥

主治：百日咳。

藥物：百 部三錢 天 冬三錢 寸 冬五錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

三 痙病類（驚風）

处方 一

杞县 郭明陽

主治：急驚風（体温 40°C 左右脈頻數，角弓反張陣發痙攣，牙关紧閉）。

藥物：菊 花一兩 胆 草二錢 石决明二錢 归 身二錢
怀牛夕三錢 生石膏一兩 天竺黃二錢 杭 芍二錢
犀 角八分 薄 荷一錢 甘 草一錢（犀角为末另服）

配制：水煎。

用法：內服。

处方 二

东明 邢懷之

主治：急驚風（高热、神昏、譫語、痙攣、抽搐、头項强直、角弓反張，口吐涎沫、面部赤紫、牙关紧閉）。

藥物：元 寸一分 牛 黃一分 朱 砂五分 冰 片一分
全 虫一个去尾 姜 虫七个

配制：上藥共研極細，另用香油炸艾叶，去艾叶用油和藥末，以粘稠为度备用。

用法：內服，用量按年齡酌情用之，病重不能服藥者，可塗病兒口內，每一小时塗一次。

附說：上方組成藥物共六味，都是用量很少的藥物，三岁兒每服一分即可。

处方 三

登封 姜文治

主治：急驚風。

藥物：姜 蚕六分 全 蝎錢半 大 黃一錢 鈎 藤錢半
胆 草錢半 指甲焙黃二十个 甘 草一錢 灯 芯三茎

配制：水煎。

用法：內服。

处方 四

陈留 徐汉广

主治：急惊風。

藥物：朱砂一錢 天竺黃二錢 犀角一錢 銀花三錢

配制：先將朱砂天竺黃共為細末，犀角銀花煎湯。

用法：以煎藥送服末藥，一歲小兒每次服一分至分半，日服二次。

处方 五

洛寧 程少宗

主治：急惊風。

藥物：川山甲三錢 全虫二錢 玉金三錢 雄黃二錢
巴豆四錢 蜈蚣一條 朱砂一錢

配制：上藥共為細末。

用法：一歲以下每服二分，二歲服四分，以泄下為度，姜湯送下。
（巴豆沒說去油，量似嫌重，用時減量試用）。

处方 六

洛寧 裴植生

主治：急惊風發熱痰喘。

藥物：全虫 姜虫 朱砂各四分 牛黃六厘 冰片 天麻
黃連各四分

配制：共為細末。

用法：姜湯或開水送下。

处方 七

濮陽 劉德方

主治：小兒惊風。

藥物：猪尾血四滴

配制：開水涼溫，將血化開。

用法：內服，使發汗即愈。

处方 八

濮陽 徐希孟

主治：惊風。

藥物：葱 葫四个 生 姜五片 蜂 蜜適量 蛇 皮五寸 土蜂窠一塊
麻 油適量

配制：共搗和極細成丸。

用法：將丸放小兒手中握之，以出汗為度，將藥取下手洗淨。

处方 九

濮陽 徐希孟

主治：惊風（高热神昏，二目天吊，咀唇發紺，气喘，喉中有痰等熱型者）。

藥物：牛 黃一分 珍 珠一分 琥 珀五分

配制：共為細末。

用法：每服二分，每日三次，犀角五分薄荷一錢半煎水冲服。

处方 十

長垣 李清峯

主治：惊風（鼻煽气粗抽搐）。

藥物：全 虫一个 蜈 蚣一条 薄荷叶幾半 牛 黃二分 半 夏幾半
梅 片五分 甘 草一分 烏 梅一个

配制：共為細末，一岁服一分，微汗愈。

处方 十一

清丰 周奕卿

主治：急惊風。

藥物：朱 砂四分 琥 珀一分 赤 金四飛 滑 石二分 姜 虫二分
胆 星一分 蝎 尾二个 川 連一分 牛 黃六厘 甘 草六厘

配制：共為細末。

用法：一至五岁小兒，分三日服完，早晚各一次，一岁以下減半。

处方 十二

潯县 宋从善

主治：惊風。

藥物：胆 星二分 琥 珀一分 赤 金二張 中 吉三分 蝎 尾一个
青 粉少許 朱砂一分 姜 虫三个

配制：共为細末。

用法：每次服二厘，一日三至五次服。

处方 十三

安陽 龙子明

主治：急慢惊風。

藥物：鏡砂輕粉各等分 青蒿虫適量（青蒿虫在七月十五日捕）

配制：共搗为丸，如高粱子大。

用法：每岁一粒，乳汁和服。

附說：慢惊有二种說法，可參看医宗金鑑小兒科惊風門，及驗方新編惊風門。

处方 十四

安陽 李書雨

主治：急惊風。

藥物：牛 黃六厘 冰 片一分 全 虫八分 朱 砂四分 黃 連三分
胆 星四分 天竺黃一分 赤 金兩張 甘 草八分

配制：共为細末。

用法：一岁每服一分。

处方 十五

安陽 孙殿卿

主治：急惊風。

藥物：牛 黃一分 姜 虫五分 全 虫五分 竺 黃二分 冰 片三分
川 連一錢 薄 荷三分 天 麻五分 朱 砂五分

配制：共为細末。

用法：一岁兒每服二分。

处方 十六

滑县 郭瀛林

主治：急惊風，四季瘟疫、急性傳染病、昏迷痙攣、自汗舌赤。

藥物：蟬腿去足二錢 西中吉四錢 姜 虫二錢 廣姜黃五分 天竺黃二錢
梅 片五分 元 寸一分 胆 星二錢 牛 黃一分

配製：共研細末，煉蜜為丸，鏡砂為衣，丸如銅扣大，一歲以內，
每日服二三次，每次一丸，大者酌加，初起淡姜湯研化沖
服，現神經症狀時，薄荷鉤丁湯沖服。

四 臍 風 類

處方 一

洛 專 郭石秀

主治：預防臍風。

藥物：姜虫 麻黃 甘草各三錢

配製：共為細末，煉蜜和作窩窩狀。

用法：蓋在才剪畢的臍上，外用布包紮，七八天后臍帶脫落掉取
去。

同時內服：黃 連二分 西 吉三分 紅 花二分
桃 仁二分 當 歸四分 生 地四分 甘 草二分
二 花五分 （水煎汁服）

處方 二

清 丰 歐陽恆

主治：臍風。

藥物：全 虫一個 姜 虫一個 朱 砂一厘 輕 粉一厘

配製：共為細末。

用法：蜂蜜和塗乳頭上，令嬰兒食之。

處方 三

濮 陽 孫先森

主治：臍風。

藥物：牆上蜘蛛三個 朱 砂少許

配製：將蜘蛛用香油炸黃，合朱砂共研細末。

用法：用陳蓆箕綫，破窗戶紙煎湯送服。

处方 四

內黃 王樹槐
薛付德

主治：臍風。

藥物：朱砂二分 赤金二錢 巴豆二个去油 白面少許
或加中吉一分（藥竣，用時須經中醫診斷許可后方可服用。）

配制：共為細末。

用法：每服五厘，服後吐沫輕泄為效。

处方 五

滑縣 尚相吾

主治：臍風。

藥物：炒全虫一个 炕姜蚕一个 琥珀二分 朱砂三分
梔片二分 牛黃一錢半

配制：共研細末，乳汁調和為丸如豆大。

用法：每服一丸。

处方 六

清丰 楊心領

主治：預防臍風。

藥物：蝎尾七个 姜虫三个 輕粉一分 赤金一張
琥珀三分

配制：共為細末。

用法：小兒初生後，乳汁送下三厘。

处方 七

濮陽 侯則仙

主治：預防臍風。

藥物：西吉三錢 朱砂一錢 甘草二錢

配制：共研細末。

用法：初生兒未食乳前，先用紅糖調藥抹入口內。

处方 八

濮陽 孫先森

主治：臍風。

藥物：川 烏_{五錢} 草 烏_{五錢} 明天 麻_{五錢} 清半夏_{五錢}
辽細辛_{三錢} 南 星_{四錢} 白附子_{一兩}

配制：共为細末（方內有劇毒藥須經中医診斷許可后方可服用，以免中毒）。

用法：每服一至三分，以蜘蛛兩個香油焦炸，煎湯送下，汗出而愈。

附說：上方并能治妇人产后風（破伤風）以及刀剪紅伤。

产后風每服用一錢 一錢半，以全当归_{四錢} 防 風_{錢半}
紅 花_{一錢} 煎湯送服。

五 鵝 口 瘡 類

处方 一

洛專 魯注三

主治：白口瘡、口腔內或舌上糜爛，有薄白点或白塊。

藥物：吳萸子_{五錢} 制附子_{五分} 上蒙桂_{四分}

配制：上藥共为細末，好米醋調糊。

用法：先以手將兩足心磨擦發熱，即將藥糊足心上，以布包纏，次日即可輕。

处方 二

洛專 靳鑑瑄

主治：紅白口瘡。

藥物：黃 柏_{八分} 黃 連_{五分} 兒 茶_{一分}

配制：上三味共为細末。

用法：撒患处。

处方 三

洛專 程少宗

主治：紅口瘡。

藥物：青黛 明雄 梅片 月石 朱砂 黃柏各等分

配制：上藥共为細末。

用法：吹入患处。

处方 四

漢陽 穆宗興

主治：糊口白。

藥物：枯 凡一錢 壁錢蜘蛛七個 冰 片二分

配制：上藥共为細末。

用法：敷患处。

处方 五

漢陽 賈玉璽

主治：鵝口瘡。

藥物：文蛤土炒三錢 生石膏二錢 鏡 砂一錢

配制：上藥共为細末。

用法：香油調抹患处。

处方 六

漢陽 高世顯

主治：鵝口瘡。

藥物：文 蛤炒黑五錢 枯 凡五錢 鷄內金五錢 冰 片一錢

配制：上藥共为細末，香油調和。

用法：塗患处。

处方 七

滑縣 宋丙合

主治：糊口白。

藥物：蜚 蝨炒 牆上蜘蛛等分

配制：焙干共为細末。

用法：撒患处。

处方 八

滑縣 郭心謙

主治：口瘡及糊口白。

藥物：枯 凡五錢 綠豆面一兩 冰 片一錢半 蛇 皮一錢炒黑

指 甲 不拘數起多

配制：共為細末。

用法：撒患處或香油調塗。

處方 九

張學 范書信

主治：糊口白及咽喉腫痛。

藥物：西瓜霜一錢 黃柏末二錢 青 黛二錢 明 粉一錢
枯 凡一錢 月 石二錢 海 片一錢

配制：共為細末。

用法：吹患處，二、三次可愈。

處方 十

內黃 王明紹
傅擇古

主治：糊口白。

藥物：枯 凡一錢 五倍子一錢 冰 片三分 蛇 退少許
(一方無枯凡有青黛)

配制：共為細末。

用法：香油調搽患處。

處方 十一

內黃 張希曾

主治：糊口白。

藥物：中 黃一分 胆 星一分 冰 片二分 蜘蛛二個
白 凡五分

配制：先將白凡化成水，再將蜘蛛和白凡化在一處，一直焙干取出，和前三味藥共研為末。

用法：將藥撒在舌上，停五分鐘用頭髮入口內，將藥擦掉，撒藥不必太多，撒數次可愈。

處方 十二

內黃 呂好文

主治：小兒咀爛。

藥物：力參 黃柏等分

配制：共為細末。

用法：每日撒三次，三日可愈。

處方 十三

安陽 師教明

主治：糊口白。

藥物：五倍子一個 手指甲一錢炒黃 元明粉一錢

配制：共為極細末。

用法：一日撒患處四次（撒藥前用皂布裹手指上，將口內的白物擦下再撒藥）。

處方 十四

清丰 陳世英

主治：鵝口瘡。

藥物：牆上黑蜘蛛七個焙 五倍子五個焙 蜚 包七個焙 枯 凡少許

配制：共研細末。

用法：用時先用青布纏手指頭上，將口腔內擦淨，將藥吹患處。

處方 十五

安陽 程丕治

主治：鵝口瘡及紅白口瘡。

藥物：五倍子 枯凡各等分

配制：共為細末。

用法：吹患處。

處方 十六

唐河 衛協會

主治：鵝口瘡。

藥物：南 星二錢 半 夏二錢 白 芷二錢 香椿樹白皮三錢

配制：共為末，醋和成糊作片。

用法：上藥敷于腳心一夜。

处方 十七

遂平 董璽五

主治：糊口白。

藥物：白鵝糞五錢 冰 片一分

配制：鵝糞放瓦上焙微黃和冰片共為細面。

用法：吹患處。

处方 十八

新乡 中医进修班

主治：鵝口瘡。

藥物：臘月公鷄胆七个 炙黃 独角五倍子一个 蚕皮（即蚕子出蚕后之壳）
少量 明 凡一錢 空 蚕三个

配制：前四味共為細末，裝入空蚕內焙焦黃為末。

用法：用菜子油少許和藥，用鷄羽毛調抹患處，隨抹隨掉。

处方 十九

新乡 李嘉寅

主治：鵝口瘡。

藥物：滑石一錢 辰 砂三分 冰 片二分

配制：共研細末。

用法：搽患處。

六 积 塊 类

处方 一

密县 郭錫三

主治：脾藏腫大發熱（黑熱藥可試用）。

藥物：胡桃仁二个 桃 仁七个 杏 仁七个 葱 头七个
大 黃三錢 卮 子三錢 芒 硝三錢 猪板油一兩

配制：大黃卮子先為細末，再合余藥共搗為泥。

用法：將藥泥攤于黑布上貼患處，七日內表皮發青為效，重病用藥
二次可愈。

处方 二

盧氏 王增亮

主治：小兒腹有積塊，青筋暴露，面黃肌瘦，體弱發燒。

藥物：血竭花一錢半 葱 姜各一兩 枝 子三錢 芒 硝三錢
蜈 蚣一條 白木耳三錢 鉄 皮三錢

配制：上藥加黃酒適量搗如泥，用紗布袋裝入。

用法：將藥袋貼在腹上，對時取下，腹皮發青是適應症，每月一次，三次即愈。

处方 三

洛專 賈聚永

主治：小兒痞塊，腹大青筋，面黃肌瘦，時常微燒。

藥物：青 蛙二個 砂 王三錢 紫叩仁三錢

配制：將砂王、叩仁研為細末，裝在青蛙口內，用泥將青蛙包住，放炭火內燒干透去泥，將青蛙和藥共研細末。

用法：每服一錢，每天服一次，開水送下，服完為度，慢慢熱就退，症狀減輕，以至全愈。

反應：服藥後肚發响。

針刺：服藥後，針刺內關穴與痞塊處一次，以免病愈復發。

处方 四

洛專 張子善

主治：小兒面黃肚大，塊積發黃，大人也可用。

藥物：皂凡一兩 醃面酵頭四兩 核桃仁七個 大棗七個去核焙焦

配制：先用醃面將皂凡包住，籠內蒸熟後，切片焙干，合棗及胡桃仁共為細末，煉蜜為丸彈子大。

用法：每日服一丸，茵陳蒿湯送下。

处方 五

南樂 張占三

主治：痞塊食積。

藥物：巴 霜五錢 玉 金四錢 全 虫三錢沙黃去毒尾 炒山甲五片

蜈蚣 三条去头足炒黄

配制：共为細末。

用法：二三岁小兒每服五厘，用鷄蛋一个去清，入藥末面包煨熟，早晨空心吃（不可多用）。

处方 六

唐河 衛协会

主治：疳积（面黃肌瘦，微燒，倦怠，腹脹作疼，食欲不振）。

藥物：雄黃四錢 大 白一兩 使君子仁一兩 牡蠣粉四錢

配制：共为細末。

用法：三岁以上小兒，每服二錢，早飯前神曲湯送下。

处方 七

唐河 衛协会

主治：疳积。

藥物：三 棱三錢 文 朮三錢 腹 毛三錢 大 白三錢

芒 硝三錢 核桃仁半斤

配制：將藥和核桃仁，共放鍋內加水煮，以水干为度，取出核桃仁备用。

用法：每早吃二三錢。

七 吐 瀉 类

处方 一

蘭考 孔昭彩

主治：水瀉。

藥物：車前草一兩 鷄 子一个

配制：將車前草搗爛絞取汁，加入少量水，再將鷄子打开傾入煮熟。

用法：吃鷄子喝湯。

处方 二

洛專 左華堂

主治：吐瀉（三四月內小兒吐瀉是脾虛症）。

藥物：党參三錢 土白朮三錢 云苓二錢 炙甘草一錢

配制：水煎加紅糖適量。

用法：內服。

处方 三

洛專 宋蘭湘

主治：嘔吐，由于先天性消化不良者，症見腹脹黃瘦。

藥物：臍帶一個 朱砂五分

配制：新瓦上焙黃，和朱砂共為細末。

用法：每服三——四分，每日早晨服一次，重者早晚各服一次，開水送下。

处方 四

洛專 關伯興

主治：小兒發熱，腹泄、口干舌燥。

藥物：生石膏 西滑石 車前子各三錢 灶心土如核桃大一塊為末

配制：先以灶心土泡水中一小時去渣，以水煎藥。

用法：內服。

处方 五

內黃 黃玉猷

主治：脾虛腹瀉，脫水乳汁不化。

藥物：力參一錢 雞內金一錢

配制：共為細末。

用法：一歲小兒每服一分，每日二服，開水送下。

处方 六

長垣 陳信然

主治：小兒久瀉。

藥物：升麻五分 砂仁一錢半 車前子三錢 烏梅一個

配制：水煎。

用法：內服（一岁兒量）。

处方 七

新乡 王庆修

主治：小兒泄瀉腹疼。

藥物：車前子一兩半生半炒 山 查一兩半生半炒

配制：共为細面。

用法：五岁以上用二錢，开水送下。

处方 八

新乡 胡树淨

主治：夏日上吐下瀉。

藥物：灶心土一兩 川 連三錢

配制：用川連煎水，泡灶心土，干后研为面。

用法：一岁小兒每服一錢，开水送下。

处方 九

新乡 李天昌

主治：小兒嘔吐。

藥物：蜂蜜 火麻仁炒研（不拘量）伏龙肝一塊

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十

新乡 刘文瀾

主治：小兒嘔吐。

藥物：生 姜三片 灶心土少許

配制：小米泔水煎。

用法：內服。

八 杂 治 类

处方 一

新郑 常嵩亭

主治：舌下生白塊，如瓜子大，日久不退。

藥物：生 地二錢 犀 角三分 木 通二錢 粉 草一錢 灯 芯三分

配制：水煎。

用法：內服，兩天服一劑，時時飲之（另外敷冰硼散）。

处方 二

滎陽 苏克儉

主治：小兒夜啼。

藥物：姜 蚕五分 蟬 退五分 茯 神五分

配制：水煎。

用法：內服，一二劑。

处方 三

杞县 張天祿

主治：肥胖小兒，腋窩、腹股溝等部易于淹爛。

藥物：紫苏叶

配制：为極細末。

用法：將藥末撒患处，每日三四次。

处方 四

通許 周运岐

主治：陰部腫爛。

藥物：朱 砂四分 輕 粉三分 梅 片四分

配制：上藥共为細末。

用法：將藥撒患处，每天一二次。

处方 五

杞县 歸鳳賓

主治：脫肛。

藥物：爬牆蜘蛛一個 小膏藥一張

配制：先將蜘蛛搗泥，攤小膏藥上。

用法：貼小兒臍上，一日更換一次，三五日可愈。

處方 六

洛專 張子善

主治：肛門周圍紅爛。

藥物：文蛤炒黃色二錢 干蚯蚓糞一兩 梅片少許

配制：上藥共為細末。

用法：香油調藥搽患處。

處方 七

洛專 昌欽杰

主治：小兒尿道腫。

藥物：虫 退三錢 芥 穗三錢

配制：水煎。

用法：熏洗患處，三次可愈。

處方 八

洛專 王書懷

主治：小兒虫積、食積、面黃肌瘦。

藥物：麥 芽五錢 建 曲一兩 蕪 荳五錢 黃 連二錢

配制：上藥共為細末。

用法：每空心服一錢，開水送下。

處方 九

漢陽 張廷力

主治：小兒骨軟（二三歲兒最適）。

藥物：當歸身二錢 紅 花二分 川續斷酒蒸錢半 五加皮一錢 骨碎
補去淨毛二錢 故紙炒錢半 天字片錢半 炙甘草五分 黃蘗一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十

漢陽 楊方堂

主治：小兒骨軟不能站立。

藥物：當歸身二錢 熟地二錢 高麗參一錢 鹿茸一錢 川牛夕二錢
山藥二錢 川木瓜錢半 山萸肉二錢 炙甘草一錢 土元五分
故紙錢半

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十一

濮陽 左允菊

主治：小兒口角流涎，浸濕下唇赤赤。

藥物：焦朮三錢 青皮二錢 炮姜一錢 法夏二錢 廣木香錢半
丁香一個

配制：上藥共為細末，米湯為丸綠豆大。

用法：小兒每服十丸。

處方 十二

滑縣 班裕若

主治：夏日頭面濕爛。

藥物：馬齒莧一握 青代一錢 川連五錢

配制：共搗為膏。

用法：敷患處。

處方 十三

長垣 楊守義

主治：急性及慢性腎囊腫痛，或不痛，或堅硬，皮色不變。

藥物：青皮鴨蛋一個 土狗一只去翅足

配制：將土狗裝鴨蛋內，將口糊住燒熟。

用法：一天吃一個或兩個，急性者數日愈，慢性者多吃。

處方 十四

長垣 杜明礼

主治：初生兒周身淹爛。

藥物：爐甘石三錢 蛤粉錢半 蘆薈二錢 梅片一錢

配制：共為細末。

用法：干撒患处。

处方 十五

南乐 国化申

主治：胎毒成瘡。

藥物：炒川椒一兩 炒文蛤一兩 輕粉一錢 冰片五分

配制：共为細末。

用法：上藥香油調塗，一天一次。

处方 十六

滑县 宋丙合

主治：胎臍流水。

藥物：車前子。

配制：炕黑为末。

用法：干撒患处。

处方 十七

安陽 牛耕書

主治：小兒尿多。

藥物：白朮月十八个 上边桂一錢 公丁香一錢 白叩仁一錢 灶心土二錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十八

安陽 朱迪庭

主治：小兒陰囊腫。

藥物：絲瓜切一截。

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十九

安陽 秦 崑

主治：大肚痞。

藥物：臭椿树皮五斤

配制：水煎三小时，去渣再熬成膏。

用法：先用姜搽患处，再用布攤膏，加元寸五釐貼患处。

处方 二十

長蘆 呂長舒

主治：小兒大便瀉綠色糞。

藥物：天竺黃一兩 胆 星一兩 朱 砂二錢 双 鉤三錢 楊 梨五錢

配制：共為細末。

用法：一歲小兒，每次服四至五分。

四 外 科

一 肺 癰 類（肺膿瘍）

处方 一

洛惠 万聖中

主治：肺癰（咳嗽吐膿血，腥臭難聞，顴紅，食欲不振。午後發熱，夜間盜汗，胸痛尿赤）。

藥物：金銀花二至四兩 黑元參二至四兩 蒲公英四至八錢

條黃芩三至六錢 桔梗六錢至一兩 白 芍三至六錢

氣虛加潞黨參一兩（初得勿用）

配制：水煎。

用法：內服，一二十劑。

处方 二

洛惠 万聖中

主治：肺癰。

藥物：桔 梗二兩 甘 草二兩 菠菜帶根洗淨拾斤

配制：桔梗甘草煎湯，菠菜熬為膏。

用法：先服甘草桔梗湯，服後有大吐膿的現象，過一日後，繼續沖服菠菜膏，一日三次。一次三匙，空心服。

處方 三

濮陽 黃庚余

主治：肺癰，吐膿血。

藥物：豬肺一個 白芨四兩

配制：將豬肺陰干為末，白芨研末炒黃，面糊為丸。

用法：每服三錢，每日早晚服一次，久服即愈。

處方 四

滑縣 容克彬

主治：肺癰，吐膿血。

藥物：二花一兩 當歸四錢 寸冬五錢 元參五錢
甘草錢半 生地炭四錢 川貝三錢 橘仁二錢
白芍三錢 黑梔二錢

配制：水煎。

用法：內服。

二 胃 癰 類（包括胃潰瘍）

處方 一

洛專 張學魁

主治：胃潰瘍，胃痛劇烈，嘔吐，有時吐血黑暗色，或灰褐色，質重，常在食後疼痛，舌紅能食，重症大便發黑，大吐血時，常致暈倒。

藥物：四君子湯加玉金 赤芍 牡蠣 乳沒各三錢 痛以後加炒仁
山藥玉米 處方如下：

黨參八錢 白朮四錢 云苓六錢 甘草三錢
赤芍三錢 牡蠣三錢 乳香三錢 沒藥三錢
（砂仁三錢 山藥五錢 玉米六錢）

配制：水煎。

用法：早晚服。

处方 二

長垣 范金相

主治：胃癰。

藥物：當歸三錢 白芍三錢 五靈脂三錢 川玉金三錢

醋軍二錢 姜連二錢半 建曲一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 三

洛專 李振華

主治：胃潰瘍。

藥物：海螵蛸

配制：去皮為面。

用法：每服三錢，日服三次，每次用陳皮一錢，丁香五分，木香五分，煎水送服，服三日後，大便不見血，病症見輕，可服成二錢，再幾日後，可再減量，服藥後大便有小白點，如大便秘，可加貝母三錢，麻仁三錢。

三 瘰癧類（頸淋巴結核）

处方 一

洛專 魏晉國

主治：瘰癧（淋巴腺結核）

藥物：五倍子一個 蝟子一個 蜈蚣一條各去頭足

配制：上藥共為末，用錫紙包七層，再用面包一層，放炭火上炙干研細。

用法：上藥用黃酒沖服，速效。

处方 二

洛寧 張國桐

主治：淋巴腺結核已潰者。

藥物：壁虎一个

配制：上藥焙黃為細末。

用法：撒患處，一日一次速效。

处方 三

洛寧 王玉太

主治：瘰癧未破。

藥物：核桃四个 蜘蛛七个 明雄二錢研細

配制：將核桃去仁，把蜘蛛裝入，雄黃末撒在蜘蛛身上，用白面將核桃包住，放在炭上燒成黑色為度，取出研細。

用法：每日服一个核桃藥，三次分服，輕者服完可愈。

处方 四

洛寧 許乃容

主治：瘰癧（已潰未潰均效）

藥物：雞蛋一个 金毛狗少許

配制：將雞蛋開一小口，裝入金毛狗，用黃土泥包固，用麥糟火燒一小時。

用法：每早吃藥蛋一个，以好為止（初起者二十个可愈）。

处方 五

濮陽 崔慶范

主治：瘰癧未潰。

藥物：全蝎二个 蜈蚣二个 多年老公雞頭帶毛一个
香油四兩

配制：上藥用桑木柴火熬成膏。

用法：每天抹患處兩次。

处方 六

滑縣 徐希孟

主治：瘰癧。

藥物：川 軍三錢 斑 蝥二錢 二味拔毒散一錢 寸 香少許

配制：將藥放入酒盅中，加适量的水，火上煮數十沸，將藥汁倒入
鷄蛋壳內，隨即仍倒壺內。

用法：將鷄蛋壳趁熱蓋患處（事先用面貼周圍），如拔火罐法拔
之，五至十次。隔一日一次。

處方 七

南樂 朱聚奎

主治：瘰癧。

藥物：蜈 蚣二條 全 蝎一錢 土炒山甲五錢 火 硝五錢

配制：共研末，分作八份。

用法：每日服一份，用酒送下。

附說：或將上藥一份和鷄蛋一個，白糖适量，加水攪勻，蒸熟吃。

處方 八

滑縣 武金中

主治：瘰癧。

藥物：土炒穿山甲二錢 白姜虫二錢 大蜈蚣五條

配制：上藥共為細末，再用鷄蛋十五個，破小口，將藥面分勻裝入
鷄蛋內，用筷子攪勻，紙糊蛋口燒熟。

用法：每次吃兩個，每日吃兩次，未潰者服三料，已潰者服六料。

四 痔 漏 類

處方 一

洛專 李宗道

主治：痔瘡。

藥物：霜降后，早晨有霜土塊

用法：用土塊擦肛門，每天擦四五次。

處方 二

洛專 潘堯舉

主治：痔瘡出血，疼痛難忍。

藥物：芒 硝二兩

配制：將芒硝用開水溶化。

用法：趁熱熏洗患處，每日二次，四五次可愈。

處方 三

濮陽 樊金祥

主治：痔漏。

藥物：銀 朱五錢 硫 黃炒五錢

配制：共為細末。

用法：先用白凡水洗淨患處，濕者干敷，干者香油和塗。

處方 四

清丰县 董亮

主治：痔漏。

藥物：雄豬胆一個 蕎麥面適量

配制：共和為丸。

用法：每次服三錢，每日兩次，開水送下。

處方 五

濮陽 陳茂軒

主治：痔漏。

藥物：大蜈蚣九條 黃母雞腸子一全件

配制：將腸內尿去淨，裝入蜈蚣，置瓦上焙干為末，分成九包。

用法：每日早晨吃一包，米醋送下，兩料可愈。

處方 六

唐河县 衛協

主治：外痔。

藥物：旱煙袋內油

用法：每晚臨睡時塗患處，使流水數次可愈。

處方 七

許昌 王景仙

主治：痔瘡。

藥物：明雄一兩 朱砂三錢 白臘四兩

配制：前二味共為末，白臘溶化相為丸。

用法：每服三錢。

處方 八

唐河縣衛協

主治：血痔（內痔下血，疼痛難忍）。

藥物：當歸三錢 紅花五錢 荊芥五錢 夏枯草二兩

芒硝二兩 豬尿一個瓦上焙干

配制：水煎湯入罐內。

用法：坐上熏之。

處方 九

唐河縣衛協

主治：血痔。

藥物：蚯蚓糞五六斤

配制：將蚯蚓糞炒熱。

用法：將炒熱蚯蚓糞，分裝兩個袋內，（輪流換用）令患者坐袋上薰蒸之，涼時即換。

處方 十

羅山 陳煥章

主治：外痔。

藥物：硫黃半兩

配制：將便桶洗淨，內放缸瓦一塊，將硫黃放瓦上燃着。

用法：患者坐便桶上，用衣被罩住便桶，如熏疼時臀部略向上提，痛止復坐，約三十分鐘，次日痔核可消。

五 發 背 類

處方 一

密縣 谷鹿鳴

主治：搭手（紅腫熱痛）。

藥物：生石膏一兩 白 糖一兩 公 英一兩

配制：上藥共搗如泥。

用法：敷患处，一日可消。

處方 二

杞縣 徐有良

主治：發背（紅腫熱痛，或潰後經久不愈）。

藥物：百草霜三錢 生熟芝麻各一兩 雞中金三錢 胡椒七個

配制：上藥共為細末，香油和勻，用油紙兩面夾藥末將邊緣合，并用針將油紙一面刺孔几十个。

用法：將刺孔面對患处貼之，用帶紮緊，過三日換貼那一面，二三次即愈。

處方 三

開封 王炳乾

主治：發背（潰爛如蜂窩）。

藥物：輕粉三錢研細帶皮生杏仁七個 葱 白七寸 蜂 蜜二兩

配制：上藥共搗如泥。

用法：用薄棉紙七張包藥在內，敷患处紮緊，一日一換，重者不過七次腐肉即脫，再上生肌散收功。

處方 四

洛寧 王喜廉

主治：搭手、中發背、黃瓜癰及一切陽瘡已破者。

藥物：珍珠煨一個 牛 黃一分 元 寸一分 梅 片三分 黃 連一錢
大 黃二錢 炒巴米三個 狼 毒三分 明 雄一錢 礞 砂三分
制乳香一錢 制沒藥錢半

配制：上藥共為細末。

用法：大瘡一日上一次，小瘡三日上一次。

處方 五

洛寧 胡遵業

主治：發背已潰未潰均可用。

藥物：桐 油二兩 石羔二兩為末

配制：上二味和在一處，用槐条攪成膏狀，攤油紙上。

用法：貼在瘡上，疼痛立止，緩緩而愈。

處方 六

濮陽 曹鴻禱

主治：搭背对口。

藥物：磁缸片，火燒醋煨三次研細四錢 血余炭一錢 螞蜂窩炒黑黃
色研細一錢 枯凡一錢 梅片七分

配制：上藥共研極細。

用法：先以花椒水洗瘡淨，再上上藥。

處方 七

滑縣 王金聲

主治：搭背。

藥物：小 棗七個 紅色大麻子七個 壁 錢七個 手指甲七個
頭 髮一團 香 油四兩 官 粉二兩

配制：將藥用油炸焦，濾去渣，再下官粉熬，熬至滴水成珠為度。

用法：將上述熬成的膏藥，攤黑布上貼患處，一日一換，待瘡輕
時，兩日一換。

處方 八

滑縣 郭瀛林

主治：搭背。

藥物：銅 綠三錢 血力花一錢 黃丹五分 乳香一錢 沒 藥一錢
梅 片五分 大馬蜂窩一個焙存性

配制：共研細面，以生蜜調和。

用法：將藥攤在新黑布上，貼于瘡上，一日一換。

附說：此藥能止痛化腐生肌，使瘡勢自然潰大，腐肉自脫。

六 腫 毒 類

處方 一

密縣 郭錫三

主治：無名腫毒，惡寒發熱，腫痛難忍。

藥物：當 歸四兩 元 參二兩 公 英四兩 二 花三兩
乳 香三錢 沒 藥三錢 甘 草一兩

配制：水煎汁量加燒酒。

用法：內服，一二劑。

處方 二

伊川 楊松賦

主治：一切無名腫毒，紅腫高大。

藥物：當 歸四錢 九 地五錢 上元桂三錢 生川烏三錢
生草烏三錢 白 歛三錢 白 芷三錢 生山甲片三個
西 吉五錢 木鱉子三錢 阿 魏一錢另包 香 油二十兩
廣 丹九兩

配制：前十味藥與香油同入鍋內熬之，用槐条不住手攪，使煙漸漸
飛出，熬到山甲片發白光將化時，取出甲片，再熬，如見油
內起黑煙即去火，起白煙即加火，煙盤旋上升為正常，熬至
藥焦黑時，濾去渣再熬（用慢火）油熱把廣丹均勻地下在鍋
內，見黑沫起時，將油滴冷水內几滴，看中黑邊黃可再下
些廣丹，熬至滴水成珠，將鍋端下，把阿魏下在鍋內攪開，
再用涼水一大盆，用槐条攪水轉圈，將油慢慢倒在盆內后，
用手將膏藥拿出盤之，至膏藥發明為度。

用法：將膏藥攤布上貼患處，四五天內不可揭看。

處方 三

濮陽 趙元吉

主治：無名腫毒赤痛。

藥物：松 香一兩 蓖麻子仁一兩 乳香去油三錢 沒藥去油三錢

血 竭三錢 兒 茶三錢 銅 錄二錢 大蜈蚣二條(天熱可少用
蓖麻子仁)

配制：上藥合一处共搗極細勻成膏藥狀。

用法：攤布上貼患處，一二次即消。

处方 四

長垣 李德芳

主治：無名腫毒。

藥物：黃 連二錢 黃 芩三錢 大 黃一兩 白 芷三錢
乳 香二錢 沒 藥二錢 冰 片二分 土蜂窩八錢
熊 胆三分

配制：共為細末，香油或雞蛋清調和。

用法：敷患處。

处方 五

南樂 張保惠

主治：無名腫毒。

藥物：生 地兩半 乳 香五錢 沒 藥五錢 當 歸兩半
山 甲三錢 枝 子五錢 黃 連五錢 黃 柏一兩
香 油一斤 黃 丹半斤 松 香四兩

配制：以香油將各藥(去黃丹)炸枯濾去渣，再徐徐將黃丹下入，煎至滴水成珠即成。

用法：攤布上貼患處。

处方 六

伊川 楊松岳

主治：無名腫毒(紅腫高凸)。

藥物：當 歸四錢 九 地五錢 上元桂三錢 生川烏三錢
生草烏三錢 白 欬三錢 白 芷三錢 山甲片三個
西 吉五錢 木 鱉三錢 阿 魏一錢另包 香 油二十兩
廣 丹九兩

配制：前十味藥入香油內熬之，至山甲片發白光時取出，濾去渣慢

火把黃丹下入，熬至滴水成珠離火，再下阿魏攪勻，傾冷水中拉拔去火毒備用。

用法：攤布上貼患處四五天內不可揭看。

七 臙瘡類

處方 一

洛專 關伯興

主治：臙瘡（并治各種瘡瘍）。

藥物：百草霜二兩 鷄蛋清一個 香 油一兩

配制：將三味合一处和勻，用油紙夾住制成夾紙膏。

用法：將有針孔一面貼瘡上，紗布扎住，發痒時不要揭開，二十天可愈。

處方 二

洛專 張書文

主治：臙瘡。

藥物：當 歸五分 川 芎五分 巴 米一兩 廣 丹八分 大麻子油四兩

配制：把大麻子油放在鍋內熬熱，下前三味藥炸焦濾去渣，再下廣丹，熬至滴水成珠，攤油紙上，作成夾紙膏。

用法：將刺孔一面，對准患處貼之，并扎緊七日一換。

處方 三

滑縣 宋丙合

主治：臙瘡及黃水瘡。

藥物：冬天的白菜疙瘩一個

配制：焙黃為末。

用法：流水者干撒，干者香油調塗。

處方 四

內黃 張順興

主治：臙瘡。

藥物：黃丹五錢 朱砂二錢 銅青二錢 松香一錢 銀朱五分
潮腦五分 官粉一錢 香油四兩

配制：先將香油用鉄鍋熬至不見沫后，將黃丹官粉下入，熬至滴水成片熄火，再下余藥攪勻，用表心紙七張，用針扎成眼，將藥攤上。

用法：攤一張貼一張，一次貼完，再用淨布裹住，三年內者十日可愈。

处方 五

清丰 刘国恩

主治：臙瘡

藥物：榆樹白皮 黑糖 元寸少許

配制：共搗如泥。

用法：敷患处。

处方 六

南乐 王文瑞

主治：臙瘡。

藥物：白薇三錢 白鮮皮三錢 白芷三錢 蛇床子四錢 地膚子四錢
滑石二錢半 寒水石二錢半 鱉甲三錢 大黃二錢 潮腦三錢
冰片少許

配制：共為細末。

用法：香油調抹。

处方 七

許昌 王國志

主治：臙瘡。

藥物：韭菜地里的蚯蚓糞焙黃為末 梅片少許研細。

配制：二味混合，再研極細。

用法：濕者干撒，干者香油調和抹之。

处方 八

許昌 母合西

主治：臙瘡。

藥物：爐甘石入化銀鍋內煨枯為度梅片少許。

配制：共研極細（最好先研爐甘石，再加片），和豬油搗泥。

用法：攤桑皮紙上，貼患處七日一換。

八 疥 癬 類

處方 一

榮陽 靳鳴岐

主治：干濕癬瘡及頭脫白屑或流黃水。

藥物：松香 黃連 硫黃等分研末

配制：先將松香入鍋中熔化，再將黃連硫黃末和入攪勻，隨將藥倒在盤中，待冷研細。

用法：香油和藥敷患處。

處方 二

密縣 谷鹿鳴

主治：干濕疥瘡。

藥物：白蘚皮一兩 花椒三錢 白芷三錢 連根皮三錢
硫黃五錢

配制：上藥共為細末。

用法：濕疥干洒患處，干疥用豬板油一兩，藥末三錢搗勻，布包擦患處。

處方 三

密縣 郭錫三

主治：禿瘡。

藥物：小米粥

用法：將小米粥敷患處二指厚，淨布復蓋頭上，周圍用帶扎緊，待米粥將干為度。（一次可愈）

處方 四

洛專 郭石秀

主治：濕癬遍身。

藥物：硫 黃一兩 白 凡 三錢 花 椒六錢半 土大黃搗絞汁

配制：上藥前三味共為細末，和入土大黃汁。

用法：搽患處一天四次。

處方 五

伊川 楊志欽

主治：禿瘡。

藥物：鷄 蛋七個

配制：先用香油少許將鍋擦勻，再把雞蛋打成糊，倒在鍋內煎成餅樣。

用法：先將頭髮洗刷干淨，即將蛋餅貼在頭上，連用三四次即愈，愈后用生薑擦無髮處，即生髮。

處方 六

濮陽 穆宗興

主治：癬瘡。

藥物：棉子油四兩 黃 香一兩 狼 毒五錢為末 潮 腦五錢

配制：將棉子油放銅勺內熬滾，把黃香放入化開，再將狼毒末入內燉火，最后下入潮腦。

用法：塗抹患處，一日一二次。

處方 七

濮陽 趙元吉

主治：牛皮癬。

藥物：新鮮皂角刺五斤

配制：將皂角刺搗碎，按熬藥膏法熬成稠膏，再加入糖醋少許，使成稀稠適度。

用法：先用細磁片，將癬部白皮刮去，然後將藥膏抹上一層，少時毒水泌出，應注意拭去，一日一次，數次即效，停二三日再抹二次。

處方 八

濮陽 趙元吉

主治：疥瘡。

藥物：花 椒二錢 水 銀三錢 胡桃仁另搗二兩 白 芷三錢
狼 毒七錢

配制：上藥共為細末，分作七包。

用法：每隔一日撒床上（被褥上）一包。

處方 九

主治：小兒白癬。

藥物：苦 棗子（焙焦黃）

配制：上藥為末，豬油調和。

用法：搽患處，每日一次，敷藥前先以花椒水洗淨。

處方 十

滑縣 趙毓松

主治：禿瘡。

藥物：白頭翁 百草霜各等分

配制：共為細末，以凡士林調和成藥膏。

用法：先將头上的白皮用開水洗去，然後將藥膏抹上，每日一次，待至紅頭皮變成青頭皮，可以停止不抹，如有瘡疤痕皮色未變完者，仍須個別抹之，務使完全為青頭皮方為痊癒。

處方 十一

滑縣 同書芳

主治：腿部癬瘡。

藥物：建蓮子 榆根白皮。

配制：建蓮子炒研為末。

用法：先用榆根白皮貼患處，待至將毒拔淨，生出鮮紅肉芽時，再用蓮子末撒之。

處方 十二

滑縣 祝才俊

主治：禿瘡。

藥物：黃 丹五錢 白 芷五錢 枯 凡二錢 棉 油適量

配制：共為細面，將棉油煮沸後，和入攪勻。

用法：搽患處數次可愈。

处方 十三

滑县 周玉昆
牛俊卿

主治：癬瘡疥癩。

藥物：硫黃粉酒炙 黃 連等分

配制：共研細。

用法：香油調搽患處。

处方 十四

濮陽 王廷彬

主治：頭上錢癬。

藥物：生毛朮三錢 生大黃三錢 白 芨三錢 斑 蝥二錢

配制：共為細末，米醋調之成糊。

用法：先將患處用苦楝根皮煎水洗淨，再抹藥，抹藥後，患處可能起泡，甚至破爛流毒水，應听其自然結痂而愈。

附說：藥中有斑蝥，毒性相當強，擦藥面積不宜太大，否則有中毒的危險，如癬塊較多，宜搽好一處再搽另一處，切勿滿頭都搽，招致病人中毒的危險。

处方 十五

滑县 班裕若

主治：疥瘡。

藥物：藜 蘆五錢 巴豆仁去淨油一錢半 甘草五錢（藥劇宜慎用）

配制：共為細面，雞蛋油和調。

用法：搽患處。

处方 十六

唐河 衛協會

主治：禿瘡。

藥物：當歸三錢 川芎三錢 煙筋二兩 蛇床子三錢 川椒五錢

密陀僧四錢 毛朮三錢 枯凡三錢 狼毒三錢 甘草二錢 香油一斤

廣丹一兩七錢 硫黃面三錢 輕粉三錢研細 上片五分 白臘七錢

配制：先將前十味藥入香油內熬枯成黑色，去渣後，再下廣丹，熬至滴水成珠，再下後四味藥即成。

用法：每天洗擦一次。

九 杂 治 类

处方 一

登封 姜文治

主治：骨槽風已潰爛。

藥物：明雄一錢 朱砂一錢 蚕壳五分 芒大炭二十个 炒梅片五分

配制：共為極細面。

用法：撒患处，一二星期可愈。

处方 二

滎陽 李紹泉

主治：黃水瘡。

藥物：黃香 銀朱各分。

配制：將黃香裝葱叶內入鍋煮，以黃香熔化為度，取出去葱叶和銀朱研細，香油和攤油紙上。

用法：貼患处。

处方 三

洛專 汪俊三

主治：陰疽貼骨流（皮色不變，局部向外流清水，或黃水稀膿如白面湯）。

藥物：河柴炭三錢 密陀僧三錢 銅 汞三錢 松 香三錢 潮 腦三錢
乳 香五錢 沒 藥五錢 元 寸少許

配制：上藥共為細末，用等量香油米醋調和藥末适度，攤油紙上制成夾紙膏。

用法：將夾紙膏有孔一面照貼患处，七日為度，在七日內如藥干燥可取下，加入香油适量，再行貼上。

附說：貼后如瘡面下陷，証明藥已發生效力，又此藥膏有半起半長作用，欲起者多用醋不加油，欲長者多加油不加醋。

处方 四

洛專 裴植生

主治：下部瘡（頑固日久，用它藥不效者）。

藥物：乳香去油 沒藥去油 輕粉 銅 汞各五分 木鱉子一個
紅大麻子五個 生桃仁去皮五分 葱 葫二個 生薑五分
陳脂油二兩 官粉二錢

配制：將上藥共搗成膏攤油紙上，按夾紙膏作法作成夾紙膏。

用法：將有孔一面對貼瘡上扎住，七天一換藥。

處方 五

洛專 郭石秀

主治：疔瘡攻里，煩悶昏迷嘔吐。

藥物：黃連 黃芩 黃柏 梔子微炒各三錢 二花二兩 甘草錢半

配制：水煎。

用法：內服，服后汗出即愈。

處方 六

洛專 王玉太

主治：兩膝腫痛，不能行路。

藥物：花椒二兩 生薑四兩 廣丹四兩 香油半斤

配制：將花椒生薑香油放鍋內熬至藥焦，將渣濾出，再下廣丹熬至滴水成珠為度，攤白布上。

用法：貼患處（夜間貼）局部發痒即見效。

處方 七

洛專 張建恆

主治：鵝掌風（手掌發痒起皮）。

藥物：小米糠

配制：用碗一個，口上封一張紙，用針刺小孔三四十個，將小米糠放在上面，用火燃燒片時，油即滴入碗內。

用法：將糠油搽掌內數次可愈。

處方 八

洛專 郭石秀

主治：赤游風（游走不定）。

藥物：新石灰為末 清水 香油各等分

配制：將三物和在一處，用棒打成糊。

用法：將藥糊用鷄毛蘸搽患處，數次可愈。

處方 九

洛專 靳鑑瑄

主治：風濕疹。

藥物：蒼朮 白芷 黃連 大黃 乳香 沒藥 花椒 白凡 明雄
黃柏各等分

配制：上藥共為細末。

用法：香油和搽患處，加白頭翁并治禿瘡。

處方 十

洛專 胡遵素

主治：魚口。

藥物：鷄蛋一個去清少許 蜈蚣一條，全 虫一個共為細末

配制：將蜈蚣全虫細末，裝在鷄蛋內，白面包之火燒熟。

用法：將藥蛋去皮食之，兩次可愈。

處方 十一

洛專 楊丰君

主治：髮際瘡（起初頭沉無力，項強直困痛，發痒起疙瘩數粒，久不潰破，潰后久不收口，乍痛乍痒）。

藥物：黃豆腐渣攤布上一指厚

用法：貼患處，一日換二次，三四日可愈。

處方 十二

洛專 楊丰君

主治：瘡生贅肉有膿汁。

藥物：胆 凡一錢 乳香去油五分

配制：共研細末。

用法：上贅肉上，用膏藥貼之，一日二次上藥。

處方 十三

洛專 程濟群

主治：白癬風。

藥物：硫 黃二錢 石 黃二錢 雄 黃二錢 蛇床子二錢
密陀僧一錢 輕 粉五分

配制：上藥共為細末醋調。

用法：搽患處（久用方效）。

處方 十四

漢陽 顧明乾

主治：黃水瘡。

藥物：蛤 粉一錢 煅白堊一錢 黃柏細末一錢 輕 粉五分

配制：上藥共為細末香油調和。

用法：抹患處。

處方 十五

漢陽 蕭景云

主治：黃水瘡。

藥物：月石 硫黃 五倍子 苦參各等分

配制：共為細末香油調。

用法：擦患處。

處方 十六

漢陽 楚金祥

主治：纏腰火丹（蛇串）。

藥物：鮮葛苳叶

配制：搗如泥（無鮮者用干叶，研末水和敷）。

用法：敷患處。

處方 十七

漢陽 張志剛

主治：天泡瘡潰爛。

藥物：青 黛五分 煅蛤粉二錢 黃 柏錢半 煅石堊一錢
輕 粉五分

配制：共為細末。

用法：香油調搽。

处方 十八

濮陽 王治國

主治：天泡瘡。

藥物：老蓮房 白凡末 不拘多少

配制：將白凡末裝蓮房空窰內，仰放于鍋內，下面用沙土圍住，大火燒枯取出為末，加梅片少許，香油和調。

用法：抹患處，一日三次。

处方 十九

濮陽 王治國

主治：薄皮瘡。

藥物：銅綠為末四錢 白 凡一兩 梅 片五分

配制：用瓦一個，兩頭用泥擋住，白凡放中間，下用火燒白凡起泡時，將銅綠撒于泡上，至白凡不再起泡為度，取出合片共為細末。

用法：以末上瘡上。

处方 二十

濮陽 耿得三

主治：疳腮。

藥物：巴豆霜 棗三個

配制：將棗燒熟去皮肉取核，蘸上巴豆霜，用棉紙包住。

用法：用一個塞鼻孔內，一個手握住，一個挾于腋窩，躺床上出汗即愈。

处方 二十一

濮陽 王治國

主治：疔毒。

藥物：蓖麻子仁一兩 乳 香錢半 冰 片一分

配制：共搗如泥。

用法：貼患處，二三日可愈。

处方 二十二

濮陽 劉化育

主治：中毒（吞服白砒、鴉片、官粉）。

藥物：玉金 青代 海螵蛸 滑石各四錢

配制：共為細末。

用法：用雞蛋清四個，香油四兩，調藥末內服，使毒物吐出即愈。

處方 二十三

內黃 王鳴紹

主治：痄腮。

藥物：土蜂窩一個

配制：為末，蜜醋調和。

用法：敷患處，三四次可愈。

處方 二十四

長垣 余子便

主治：瘡中生蛆。

藥物：黃色皂凡為末。

配制：用蜂蜜調和。

用法：敷瘡上。

處方 二十五

長垣 余子便

主治：瘡生贅肉。

藥物：烏梅去核晒干

配制：研為細面，用蜂蜜調和。

用法：敷患處。

處方 二十六

長垣 余子便

主治：一切疔毒（對紅絲疔特效，並治發背對口初起及纏腰火毒丹）。

藥物：硫黃五錢 蕎麥面三錢 麥面錢半 梅片二分
青黛四錢 薄荷冰一分

配制：共研細面，柳葉煎水調藥成泥。

用法：將藥敷疔上二分厚，瘡口上一分厚，藥干取下再調再敷。

附說：如患者心煩、譫語、神昏，此為走黃危候，急用白糖綠豆粉各一兩，新汲水調和送下即醒。

處方 二十七

內黃 宋善亭

主治：附骨疽（在臀部腫而不紅，瘡口流水如米湯）。

藥物：露蜂房 蛇退 血余等分

配制：共燒成黃色研細。

用法：每服一錢，白酒沖服（酒一盅）每日服二三次。

五 五 官 科

一 目 病 類

處方 一

洛專 汪俊三

主治：泄瀉目翳大渴不止。

藥物：白 芷 酒白芍 茯 苓 桔梗 各三錢共為細末 豬肝子一個

配制：先將豬肝子用竹刀切為多層，將藥末撒在里面，麻繩捆好，入砂鍋內煮熟為度。

用法：將豬肝連藥吃了，并喝湯，一週可愈。

處方 二

濮陽 王治佳

主治：小兒痘疹后，目生云翳。

藥物：蓖麻子仁一百個 白芥子一兩 釜底灰三錢

配制：上藥共搗如泥。

用法：塗足心，左塗左，右塗右，左右雙塗。

處方 三

濮陽 王治國

主治：小兒因食物不佳，消化不良，目中云翳忽起。

藥物：黃連四錢 胡連四錢 吳茱萸三錢 蓖麻子仁二十粒

配制：上藥共為細末，雞子清調和。

用法：塗于足心。

處方 四

滑縣 宋丙合

主治：麻疹余毒攻目。

藥物：大白二錢 白芨二錢 虫退一錢 木賊一錢半

配制：共為細末，加葱胡七個，紅蓖麻子七個，元寸少許，官粉一盒，共搗如泥，若干加涼水為塊。

用法：患左目，將藥泥貼于右足心，患右目，貼左足心，外用紗布包紮，二十四小時，再換新藥，即可愈。

處方 五

長垣 李祭城
李青峯

主治：泄久目生云翳。

藥物：力參一錢 石決明二錢 煅 大白五分 川連一錢 虫退一錢

配制：水煎。

用法：內服，二三劑即退。

處方 六

滑縣 路際平

主治：產後二目莫覩。

藥物：雞肝子一個。

配制：瓦上焙干為末。

用法：用鹿銜草二兩煎湯，送服雞肝末，三付可愈。

處方 七

滑縣 武金鐘

主治：黑眼珠突出（光發白者不治）。

藥物：川山甲二錢 炒白芥子三錢 木別子四錢 君子仁三錢 川軍二錢
川 連五分 甘 草二錢（方中有劇毒藥須經中醫診斷后方可服用，以免
中毒）

配制：水煎。

用法：內服，二三劑。

處方 八

滑縣 武金鐘

主治：嬰兒眼目紅腫高大。

藥物：生半夏 白芥子各一錢

配制：共研細，熱水調和糊。

用法：塗在足心上，用布包住。

處方 九

滑縣 武金鐘

主治：夜間眼痛難忍。

藥物：夏枯草一兩

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十

安陽 傅擇古

主治：眼球流血，夜間疼重。

藥物：夏枯草一兩 白姜虫三錢 白 芷三錢

配制：水煎。

用法：內服數劑。

處方 十一

滑縣 劉毓秀

主治：目珠夜痛。

藥物：香 附一兩 夏枯草一兩 甘 草二錢

配制：水煎。

用法：內服，三四劑。

处方 十二

滑县 刘毓秀

主治：内障眼，忽然失明，气虚脱症。

藥物：西洋参三钱 当归四钱 芡实三钱 川芎二钱 白芍三钱
熟地五钱 兔丝子三钱 枸杞三钱 复盆子三钱 破故纸三钱
车前子三钱

配制：水煎。

用法：内服。

处方 十三

滑县 閻泰宾

主治：害眼肿痛。

藥物：黄連二钱 冰片一钱 硼砂一钱 燒酒二兩

配制：上藥共为末，置酒中燉热。

用法：用藥酒塗抹眼外周圍，一夜即愈。

处方 十四

清丰 路际平

主治：小兒一夜目赤或紫（大小皆不定）不痛不昏。

藥物：二花三钱 杏仁一钱寸 冬二钱 甘草五分

配制：水煎。

用法：内服。

处方 十五

清丰 路际平

主治：妇女陰火上翻攻眼，經年不愈。

藥物：白凡一兩 杏仁七个 輕粉一分

配制：共为末，置鉄勺內火煨，俟藥溶化，急速作为丸四个。

用法：每用稀布包一丸，納入陰道內，一天一換。

处方 十六

濮陽 張成三

主治：爛眼。

藥物：食醋半碗

配制：用銅鏡子（紫銅片也可）蓋在醋碗上，放在炕的山台里边，
過一夜，銅鏡子下面就出現和露水珠樣的水珠。

用法：即用上述的水珠，抹眼皮上，數次即愈。

處方 十七

清李 路際平

主治：四時暴發沙眼，紅腫怕光流淚。

藥物：西中吉四錢 芒 硝三錢 沒 藥二錢 血竭花一錢 三七參五分

配制：共為細末。

用法：每服三錢，早晚各一服，服完可愈（老弱減量）。

處方 十八

南樂 王濟川 內黃 王樹槐

主治：目為物所傷，引起發炎酸痛，紅腫流淚。

藥物：防 風一錢 薄 荷一錢 白 凡三錢 冰 片一分

配制：共為細末，加生地一兩搗如泥。入前藥末和成塊，若干時加涼水，再用紗布包住成餅，敷于目上，每小時用涼水濕一次，日夜敷之，對時一換，兩次可愈。

二 耳 病 類

處方 一

中牟 馬紹勛

主治：聾耳流膿或黃水。

藥物：山羊屎瓦上焙黃為末 梅片 芝麻油等分

配制：將山羊屎瓦上焙黃為末，梅片也為末，和入油中，俟油澄清後备用。

用法：用上面澄清油滴耳內。

處方 二

濮陽 豆荊山

主治：耳中疼痛流膿。

藥物：石菖蒲 銀朱 冰片 枯凡各二錢 龍衣一條焙干

配制：上藥共為細末。

用法：先將耳內膿絞淨，再以香油調藥末滴耳內，二三次可愈。

處方 三

清丰 姚怀仁

主治：耳炎流膿血。

藥物：蚕 茧一个 銀 朱二分 冰 片二分

配制：將藥裝入蚕茧內，面包，火內燒透，共為細末。

用法：吹耳中（先將膿洗淨）。

處方 四

滑县 張紹曾

主治：耳內出膿。

藥物：磺胺結晶粉 五倍子

配制：將磺胺粉裝入五倍子內，放鉄板上，用火燒鉄板，將倍子焙干為末。

用法：先將耳內膿液，用藥棉拭絞淨，再用藥末吹入耳內，數次可愈。

處方 五

漢陽 陈自仲

主治：耳聾（年逾五旬的老人）。

藥物：石菖蒲五錢 牙皂角五錢 元 寸一錢

配制：共為細面，用小棉紙將藥面包成五十份，搓成長棍型（五分管長），浸入小磨香油中二十四小時。

用法：將藥取出塞在耳內，每次一根，每日換塞十根。

處方 六

唐河衛協會

主治：耳內流血

藥物：龍骨（火煨）

配制：研極細。

用法：吹耳內三次可愈。

处方 七

許昌 孙彬如

主治：耳內流膿流水或聾。

藥物：生 地三錢 菖 蒲三錢 复 花錢半 紫 草八分

配制：用香油浸泡上藥數日，浸泡至油色發紅為度。

用法：用油滴耳中，覺耳中熱時，再滴之，一星期可愈。

处方 八

許昌 張聘三

主治：中耳炎。

藥物：白 凡五錢 蚕 茧數个

配制：將白凡裝入蚕茧內，用無明火燒枯為度。加梅片少許，共研細。

用法：先將耳內擦淨，入藥滿耳，外用棉塞自愈。

处方 九

許昌 陈聘三

主治：中耳炎。

藥物：全 虫三錢 枯 凡三錢 冰 片少許

配制：先將全虫焙黃和凡片共研細末。

用法：每日吹耳內兩次。

三 口 咽 類

处方 一

登封 梁魁一

主治：纏喉風（喉部如繩纏，牙關緊閉，口流涎液）。

藥物：酒大黃二錢 二 花四錢 管 仲三錢 甘 菊三錢

川 羌三錢 元 參四錢 白 芷三錢 桔 梗五錢

細 辛一錢 石 膏七錢 牛 子三錢 甘 草三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 二

中牟 段岐州

主治：喉潰瘍（腫爛出膿）。

藥物：知母四錢 花粉三錢 黃芩三錢 寸冬三錢
銀花四錢 公英四錢 大青三錢 丹皮三錢
木通二錢 薄荷錢半 甘草三錢 竹葉一握

配制：水煎。

用法：內服，二劑可愈。

处方 三

中牟 段岐州

主治：喉癰（咽喉腫痛，發熱惡寒，咽下困難）。

藥物：元參五錢 生地四錢 山豆根五錢 桔梗三錢
馬勃二錢 銀花八錢 大黃四錢 赤芍三錢
枝子三錢 石膏四錢 甘草三錢 燈芯三錢

配制：水煎。

用法：內服，一二劑可愈。

处方 四

中牟 段岐州

主治：咽喉紅腫爛痛，飲食不進。

藥物：月石一兩 大梅片一 元寸一分 珍珠三個煨
牛黃五厘 朱砂一錢 薄荷末五分 元明粉一錢

配制：共研為細末。

用法：將藥末吹患處，日吹四五次。

处方 五

杞縣 張洪錫

主治：喉閉，痰塞咽喉，聲如拉鋸，飲食不下。

藥物：豬牙皂去皮弦搗碎

配制：水煎二三沸。

用法：內服，每服半酒杯，少停再飲，以痰吐出為度，不可多服。

處方 六

東明 宋彥昌

主治：白喉（喉部腫痛上有白膜）。

藥物：白 凡一錢 雄 黃一錢 元明粉二錢 月 石二錢
梅 片五分

配制：共為細末。

用法：將藥末吹患處，每日三四次。

處方 七

洛寧 戚遵三

主治：喉嚨腫閉。

藥物：大 黃三錢 月 石六錢 良 姜三錢 靈 脂三錢
細 辛四錢 羊 檳 榔三錢 元 胡三錢 甘 草三錢
熟 地九錢 沒 藥三錢 巴 豆去油三錢（方中有巴豆須經
中醫診斷許可後方可服用）

配制：上藥為細末，煉蜜為丸，朱砂為衣，如梧子大。

用法：每用十四丸，加入冰糖少許，噙在口中化開，徐徐咽下，事先備稀面湯一碗，如見腹泄，就用稀面湯補之，如不泄，把稀面湯內加醋服下即瀉。

處方 八

濮陽 王治國

主治：卡脖喉。

藥物：小 棗七個去核 斑 蝥一個 人 言一錢

配制：上藥共搗如泥，棉紙裹住。

用法：塞鼻孔內，須臾起一小包，用針刺破即愈。

處方 九

濮陽 楊方堂

主治：卡脖喉。

藥物：小 棗一個去核 人 言少許

配制：將人言裝棗內，用豆稽火燒焦。

用法：塞鼻孔內，見血取出即愈。

处方 十

清丰 郭文士

主治：咽喉腫痛，水米不下。

藥物：甘遂 枯凡等分

配制：共為細末。

用法：吹入咽喉。

处方 十一

清丰 苗云瑞

主治：扁桃腺炎。

藥物：当 归三錢 生 地五錢 元 参二錢 黃 芩二錢
二 花四錢 大 貝二錢 枝 子二錢 連 召二錢
寸 冬四錢 大 黃三錢 川 連二錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十二

清丰 苗云瑞

主治：咽喉兩邊發紅疼痛。

藥物：生 地四錢 桔 梗二錢 寸 冬四錢 葛 根三錢
薄 荷二錢 二 花四錢 大 貝二錢 枝 子二錢
連 召二錢 丹 皮三錢 甘 草一錢 板蘭根二錢
双桑叶三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十三

濮陽 高相汶

主治：咽喉腫痛，咽下困難。

藥物：月 石一兩 煨龍骨六分 象皮六分土炒 明 雄少許 鏡 砂一錢
牛 黃一分 元 寸一分 梅 片二錢

配制：共研極細。

用法：吹患处。

处方 十四

滑县 閻泰寔

主治：咽喉炎。

藥物：朱砂一錢 月石三錢 牛黃一分 珍珠一个

配制：共研極細。

用法：吹患处。

处方 十五

濮陽 高相汉

主治：白喉及糊口白。

藥物：土炒鷄內金五錢 土炒文蛤五錢 枯白凡三錢 梅片一錢

配制：共研極細。

用法：吹患处，或用香油調搽三四日。

处方 十六

洛專 李維文

主治：舌疔。

藥物：黃連一錢 沒藥去油一錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十七

洛專 靳鑑

主治：舌破爛。

藥物：青黛八分 黃柏五分

配制：共為細末。

用法：香油調塗患处。

处方 十八

洛專 丁子寬

主治：白口瘡。

藥物：大五倍子一个 梅片五分

配制：五倍子用蜂蜜炙黃和片共研細末。

用法：撒患處，一日二三次。

四 牙 病 類

處方 一

蘭考 吳永光

主治：牙痛（兩腮發腫灼熱）。

藥物：大黃三錢半 枳 殼二錢半 防 風三錢半 生 地三錢半 升麻二錢半
丹皮三錢 當 歸三錢 細 辛錢半 青 皮二錢 石膏三錢半
甘草二錢 柴 胡一錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二

乳縣 李汗三

主治：風火牙痛（陣發性）。

藥物：黃 連四分 潮 腦一錢

配制：共為細末。

用法：每用約一分，塗患處。

處方 三

洛寧 張思敬

主治：虛火牙痛。

藥物：九 地一兩 夏枯草一兩 元 肉一兩 麥 冬三錢 羌 蔚子三錢
石 膏一錢 地骨皮三錢 粉丹皮三錢 炒川芎二錢 車前子二錢
生 地錢半

配制：水煎。

用法：內服。

處方 四

洛寧 朱尊賢

主治：虛火牙痛。

藥物：九 龍四兩 地骨皮二兩

配制：水煎。

用法：內服。

处方 五

洛尊 丁子寬

主治：急火牙痛，時痛時止。

藥物：蒸首烏一兩 當 歸四錢 生白芍七錢 炒川芎三錢 土茯苓四錢
明天麻三錢 防 風三錢 元 參四錢 知 母四錢 甘 草錢半
夏枯草八錢 薄 荷錢半

配制：水煎。

用法：內服，飯後服，服後痛處麻木，可再服一劑。

处方 六

洛尊 左華云

主治：小兒牙疳，二三年不愈者。

藥物：黑 凡三厘 紅 糖適量

用法：開水送服，一二次即愈。

附說：編者按：黑凡有催吐作用，用量宜慎。

处方 七

漢陽 朱 勤

主治：風火牙痛面腫。

藥物：元 參四錢 生 地五錢 丹 皮二錢 薄 荷四錢 甘 草三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 八

清丰 董純一

主治：牙疳（牙齦破爛出血疼痛）不論新久。

藥物：雄 黃五錢 好茶葉二兩 白 砒一錢

配制：先將茶葉熬水約五六碗，撈出茶葉傾磁盆內，再將雄黃研為細末，加于茶水內攪勻，另用洋鉄片制成小勺狀，底扎數小孔，將白砒放勺內，以桑柴火煨之，待紅時，浸入雄黃茶水

內，取出再煅再浸，以白砒煅尽为止。

用法：患者用此藥水漱口（有毒不要咽下），每日漱二三次，每次漱三四口。

处方 九

滑县 郑万杰

主治：火牙痛。

藥物：洋冰五分

配制：用新酒杯盛之，上面盖上一个酒杯，用面糊严，架火上升之，成霜形备用。

用法：抹患牙上。

处方 十

滑县 仝書芳

主治：牙痛。

藥物：川烏 草烏 升麻 細辛 萆薢 良姜各三錢 燒酒一斤

配制：將藥浸酒內，數日后用。

用法：以藥酒漱口，漱过吐去，即用溫水漱口。

处方 十一

安陽 郭清源

主治：風火牙疼。

藥物：西中吉五錢 全 虫五个

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十二

南乐 王惠民

主治：牙痛。

藥物：食鹽 白酒不拘量

配制：將食鹽放白酒內，加溫溶化。

用法：將酒灌鼻中，立效。

处方 十三

林县 崔翰嵩

主治：虛火牙痛。

藥物：生地 熟地 元參 骨碎補各五錢

配制：水煎：

用法：內服。

处方 十四

湯陰 張永安

主治：風火牙痛。

藥物：火硝 火碱 白芷 細辛 雄黃各等分

配制：共為面。

用法：吹鼻內左疼吹右。

附說：方中火碱，為強腐蝕性藥不能用，應改用市上所賣的碱面。

处方 十五

湯陰 張永安

主治：風火牙痛。

藥物：樟 腦五錢 雄 黃三錢

配制：共為細面。

用法：用紙少許，包藥若干，咬疼處立止。

处方 十六

內黃 崔鴻順

主治：風火牙痛。

藥物：生地去皮 洋冰少許

配制：共搗為膏。

用法：用一小塊咬疼處。

处方 十七

南樂 潘際昌

主治：腎虛牙痛。

藥物：熟 地一兩 大 活三錢

配制：水煎。

用法：內服。

处方 十八

滑县 王序森

主治：牙痛。

藥物：華 卜二錢 牙 皂二錢

配制：上藥共为粗末，用白酒二兩浸泡，濾去渣滓。

用法：將酒噙口中即止疼。

六 虫病、外伤及雜治

处方 一

杞县 郭明陽

主治：鉤虫病。

藥物：榧子 雷丸 黑凡暇各二兩 大白 蒼朮各五錢

配制：上藥共为細末，煉蜜为丸（分作七十丸）。

用法：每日早晚各服一丸，烏梅湯送下。

处方 二

洛專 李作云

主治：虫积。

藥物：檳 榔一兩 二 丑一兩 大 云一兩 紅 糖二兩

配制：上藥共为細末，分作三包。

用法：內服，每服一包，開水送下。

附說：編者按：上方可驅除蟯虫、蛔虫、蛭虫、姜片虫等。

处方 三

洛專 楊志欽

主治：妇女小兒，好吃泥土。

藥物：生 地八錢 白 薇五錢 黃 連三錢

配制：水煎。

用法：內服，小兒減量。

處方 四

內黃 趙勤修

主治：寸白虫（蟯虫）。

藥物：雄 黃一錢 川 連一錢

配制：共為細面，面糊為丸，如棗核大。

用法：在大便後，將藥丸納入肛門。

處方 五

安陽 白雲瑞

藥物：苦楝根白皮五錢 蛇床子三錢 檳 榔三錢 甘 草二錢

配制：共為面，煉蜜為丸，用一寸長的布包好縫縫。

用法：塞入肛門內，六小時取出。

處方 六

安陽 劉岫生

主治：蟯虫。

藥物：蒼 朮五錢 麥 芽五錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 七

東明 趙國慶

主治：蝎子螫痛。

藥物：生半夏細末

配制：碱水和為糊。

用法：塗患處。

處方 八

洛寧 王喜康

主治：蛇入口內。

藥物：胡椒(末)

用法：將蛇尾用刀破開，納入胡椒末少許，蛇即退出。

處方 九

安陽 郭有才

主治：蝎子螫痛。

藥物：蝎 虎一只 鷄 蛋一个

配制：將鷄蛋開小口取出蛋黃一半，將蝎虎裝進去，用紙糊口，焙干為末。

用法：以酒調藥面，抹患處，即止疼。

處方 十

安陽 尹全智

主治：蝎子螫痛。

藥物：生半夏二錢 白 信五分 當門子四分 雄 黃錢半
蟾 酥八分

配制：上藥共為細末，以黃臘化開，和藥作成錠子。

用法：將錠子近火熔化，滴患處，即止疼。

處方 十一

榮陽 蘇克儉

主治：創傷出血疼痛。

藥物：白 糖五錢 朱 砂五分 葱白七寸

配制：上藥共搗如泥。

用法：敷患處，包紮，立時見效，并有預防破傷風功能。

處方 十二

洛專 高約貴

主治：跌打損傷，一切腫痛。

藥物：米醋二斤

配制：將醋放跌鍋內熬成膏。

用法：攤貼患處，止痛消腫。

处方 十三

洛專 郭石秀

主治：刀伤化膿。

藥物：血力花 白臘 陈石灰 輕粉等分

配制：上藥共为細末。

用法：將藥末撒瘡上，用膏藥貼之即愈。

处方 十四

洛專 楊逢君

主治：湯火燒伤，起泡潰爛。

藥物：大 麦二兩 冰 片四分研細

配制：將大麦炒成炭黑色研細，和入冰片研勻。

用法：未潰爛者香油調搽患處，已潰爛者用此藥末干撒，每天二三次。

处方 十五

洛專 戚道三

主治：湯火燒伤。

藥物：生大黃 蜂蜜

配制：將大黃为細末，和入蜂蜜內，成不稀不稠膏狀。

用法：將藥膏糊患處，用紙蓋之，每日一換。

处方 十六

洛專 張育年

主治：湯火燒瘡。

藥物：當 归三錢 川 芎三錢 大生地三錢 紫 草三錢 乳 香二錢
沒 藥二錢 血力花一錢 栗 壳六錢 黃 臘三錢 白 臘六錢
香 油四兩

配制：先將香油熬至滴水成珠，再將當归、川芎、生地、紫草、栗壳、乳香、沒藥、血力花用稀布包住放在油內熬至無聲時將藥取出再入黃白臘化盡即成。

用法：將藥膏攤白紙上貼患處每二日一換。

处方 十七

洛專 張學魁

主治：湯火傷。

藥物：鉄茶壺上鉄鏽一兩 梅片少許

配制：上藥共研為細末香油調。

用法：搽患處。

处方 十八

洛專 段清吉

主治：湯火燒爛。

藥物：綠豆面

配制：香油調和。

用法：已潰爛結痂者搽患處，如未結痂者干撒患處。

处方 十九

洛專 劉志敏

主治：竹刺刺入指甲縫內。

藥物：紅糖一錢

用法：敷患處用布包一小時即自出。

处方 二十

漢陽 王智國

主治：接骨。

藥物：不隔年的雄鷄一只去毛連骨 五加皮四兩 寸香三分

配制：上藥入石臼內搗如泥。

用法：將骨對正藥敷折處，按正骨包扎法包扎一小時內中作聲，對時去掉即愈。

处方 二十一

漢陽 朱 勤

主治：火燒瘡。

藥物：當 歸二錢 生 地二錢 紅 花一錢 血 竭錢半 兒 茶二錢
乳 香錢半 沒 藥錢半 輕 粉五分 冰 片三錢 黃 臘三錢

香 油四兩 血 余一兩

配制：先將上藥放油內（血竭輕粉冰片黃臘除外）炸焦濾淨渣，離火再加入血竭等味；攪勻放冷成藥膏。

用法：將藥膏攤薄紙上，貼患處。

處方 二十二

濮陽 朱保臣

主治：掉髻便干。

藥物：當 歸四錢 紅 花三錢 桃 仁三錢 木 瓜四錢 黃 芩三錢
丹 皮三錢 枳 實三錢 川 朴三錢 西 吉五錢 甘 草一錢

配制：水煎。

用法：加酒內服。

處方 二十三

濮陽 朱保臣

主治：下頰脫臼。

藥物：當 歸五錢 黃 蘗一兩 黨 參五錢 白 朮三錢 熟 地四錢
白 芍三錢 川 芎二錢半 甘 草二錢

配制：水煎。

用法：內服。

處方 二十四

濮陽 左允菊

主治：凍瘡。

藥物：酒 精四兩 樟 腦一兩 花 椒四兩

配制：先將花椒浸酒精內，三日取出，再加入樟腦溶化。

用法：棉蘸搽洗患處。

處方 二十五

濮陽 左允菊

主治：凍瘡破潰。

藥物：蜂 臘一兩 硫磺末一錢

配制：將臘溶化入硫磺末，攪勻成膏。

用法：以膏抹患处。

处方 二十六

滑县 陶协律

主治：湯火伤。

藥物：綠豆面粉微炒黃黑色

配制：为末。

用法：用黃酒和塗患处。

处方 二十七

長垣 余子俊

主治：止血（手术后出血不止，及諸般出血）。

藥物：小磨香油四兩

用法：飲服立止。

处方 二十八

滑县 牛俊卿

主治：創伤出血。

藥物：紫 苏三兩 麻 黄三兩 乳 香二兩 沒 藥二兩 自然銅三錢
龙 骨二兩 血竭花二兩 象 皮二兩 珍 珠一錢 元 寸一分
兒 茶二兩

配制：元寸珍珠各研为細末，其他諸藥共为細面，再加入元寸珍珠面和勻，密貯。

用法：撒患处。

处方 二十九

滑县 赵毓松

主治：开水热湯伤。

藥物：寒水石二錢 黃 連二錢 冰 片一錢

配制：共为細末，香油調和。

用法：塗伤处，每天塗三四次。

处方 三十

長垣 高登本

主治：創伤。

藥物：古石灰一兩 鷄蛋青兩個

配制：先將石灰研細，再和蛋清和勻，作成餅焙干研為面。

用法：香油調和搽傷處。

處方 三十一

安陽 王臨學

主治：槍傷、創傷、止疼生肌、去風消腫。

藥物：朱砂 紅粉 輕粉等分

配制：共為細面。

用法：先將患處用茶葉水洗淨，撒上藥面，用膏藥蓋住。

處方 三十二

長垣 李德芳

主治：刀傷打傷。

藥物：紫 草三錢 乳 香二錢 沒 藥二錢 血力花一錢 兒茶二錢
當 歸二錢 防 風二錢 紅 花一錢 川 椒一錢
薄荷葉二錢 象 皮二錢 香 油半斤

配制：各藥用香油炸枯瀝去渣，再下黃臘一錢半溶化成膏，再以梅片一錢，田三七二錢、枯凡三錢為末，加入膏中。

用法：用藥膏少許敷傷處，止血止疼，不結疤而自收口。

處方 三十三

商專 于超然

主治：折骨后，脖項疼。

藥物：杜仲一兩 大活五錢

配制：水煎加醪醑酒四兩

用法：內服。

附說：并配合針刺大椎穴一針更妙。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 河南省中医秘方验方汇编 (续一)

作者 = 河南省中医委员会编

页数 = 1 8 0

S S 号 = 1 0 4 4 4 1 9 4

出版日期 = 1 9 5 8 年 1 0 月第 1 版