

C103/1816
V.6

新刻良朋彙集卷之四

婦人科

保命勝金丹

此丹內能

婦人科

婦人科

婦人科

婦人科

婦人科

婦人科

新刻良朋彙集卷之四

婦人科

保命勝金丹

此丹專能和經益精補虛種子百發百中兼治男婦諸虛百損女子胎前產後血枯經閉崩漏赤白帶下男子遺精白濁腰痛腿酸精寒陽痿咳嗽痰喘耳鳴眼花等症

南香附

一觔第一次用童便浸二次酒浸三次鹽水四次醋浸每次按春五夏三秋七

冬十日取起曬乾

官揀參

川當歸

赤芍藥

白芍藥



香白芷

川芎

延胡索

遠志

去心

白朮

各一兩五錢

桂心

白茯苓

牡丹皮

川牛膝

各二兩五錢

大熟地

四兩五錢酒洗蒸

白薇

四兩去蘆

大甘草

七錢五分

藁本

三兩

右除香附另製外十七味俱用煮東酒亦按春五

夏三秋七冬十日浸過曬乾爲末聽用後加

赤石脂

白石脂

各一兩

此二味用好醋浸

三日入火煨紅再淬入醋內如此七次焙乾爲

末和入藥內

滴乳香

明沒藥

各一兩

真琥珀

五錢

硃砂

五錢飛過

右四味用煮酒細研成膏和入前藥內煉蜜杵丸

如彈子大以金箔爲衣曬乾入磁罐收貯封固

聽用

凡修合此丸須擇壬寅或壬申日虔誠製造無使

婦人雞犬一切不潔淨人見之爲妙

硃石脂

真琥珀

乳香

沒藥

硃砂

此六味女人可用男人不可用

服藥法

凡男婦遇諸症取藥一丸放在磁碗內入煮酒半

碗蒸服若女人胎前產後月子諸病用滾水小
半碗將藥手捺碎入碗內用碟蓋泡開如冰冷
將碗放在鍋內慢火煮熱取出碗以銀匙研細
服之如月子病用些須醋滴在藥碗內服之若
碗內藥未淨再用酒滌之飲盡令其半醉服後
少坐片時待身覺困倦可卧用衣被蓋暖使汗
出則通身暢快百病遂消如女人經至而腹痛
者服此一丸下月即不作痛如行經三日前依
法連服三日任其久不生育老必能成孕百發
百中並無一空然淨第三日服藥交好一定生
也

四物湯

治婦人有孕卒然見血胎欲墜落腰疼之甚

赤芍藥

當歸 各一兩 熟地 一兩五錢

川芎 二兩

共爲細末每服三錢阿膠葱艾煎湯調服
催生奪命丹

端治臨產胎不順者或橫或倒或幾日不下

母丁香末 二錢

乳香

沒藥 各一錢

麝香 二分半

共爲細末用臘月初八日兔腦合丸雞頭子大硃砂爲衣每服一九冬天熱酒服夏月滾水服

黑神散

孫偉方

治婦人產後敗血致諸痰者臨產亦用

當歸

熟地

白芍

酒炒

肉桂

去皮各一兩

沉香

蒲黃

炒黑

沒藥

櫻灰

赤芍

各錢

乳香

三錢

血竭

五分

甘草

炙一兩

右共研細末每服二錢凡產後十八症俱用童便和煮酒調服神効

黑神丸

治產後一切病症俱用四物湯送下一丸

仙方濟世黑神丸

京墨一兩用水研

一錢二分飛羅麵

天麻細末秤二錢

佛面真金用五貼

二錢百草霜再研

共合爲丸四十粒

產婦一顆保安痊

烏金丸

治產後血迷瘀血上攻兩脇脹滿胃脘疼痛大小便不通發熱作喘大渴飲冷眼見鬼神惡露去早不行但凡有餘之症服之立効

乳香

沒藥

歸尾

各一錢

百草霜

二錢

巴豆

去油三錢

右為細末煉蜜為丸如大黃豆大硃砂為衣每服一丸用煮東酒四兩生薑一片煎二三沸將藥研化服之後吃紅棗三五枚如不吃棗則吐吃過棗吐亦無妨

烏金散

治產後血迷氣敗餘血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭眩無力眼花多汗血山崩漏等症

血竭

百草霜

血餘

男子的燒存性

當歸

肉桂

去粗皮

真京墨

延胡索

鯉魚鱗

炒黃淨末

右各等分研極細末每服二錢溫黃酒調服

益母丸

七月七日採益母草連根葉花梗採來將花葉另放一所梗用刀切斷入鍋內水煮無青色將渣梗撈出不用即將花葉放入湯內煮熟撈起曬乾研末將此汁澄去泥腳就將末放入汁內量有十觔對無灰酒童便各五觔用武火煮三炷香為度用荆條篩子一個上攤豆腐濾子布一

塊篩子放在大磁盆上將藥攤平上用荆條橫
豎架住再將布四圍蓋之勿令粘藥俟澄下水
又對童便煮東酒各三觔將篩中之藥倒在蒸
籠內蒸一炷香如此七次完連汁盡入鍋內文
火炒用竹板鏟勻炒乾不粘布單起出曬乾爲
末細羅羅過煉蜜爲丸藥蜜各對無令輕重每
九二錢隨送下
如胎前產後臍腹刺痛或作聲胎動不安下血
不止糯米湯或當歸湯化下
胎衣不下及橫生不順死胎不下經日脹悶心

滿心痛炒鹽湯下

中風牙關緊急半身不遂失音不語惡露不盡
結滯刺痛上衝心胸滿悶童便合黃酒化下

兩太陽穴脹痛呵欠心忪氣短瘦弱不思飲食
血氣身熱手足頑麻遍身骨節疼痛水瀉赤白
痢疾血山崩漏糯米湯化下

血暈眼黑頭疼內熱口乾作渴如見鬼神狂言
不省人事薄荷湯或黃酒化下

瘀血不散結成血塊臍腹奔痛煩悶時發寒熱
或有冷汗或未滿月氣血閉塞不順咳嗽氣喘

胸膈不利惡心吐酸面目浮腫兩脇疼痛鼻衄
舌黑口乾四肢無力經脉不調自汗發熱骨蒸
作腫及婦人久不孕育俱用黃酒化下
大小便不通煩燥口苦面垢顏赤五心煩熱薄
荷湯化下 赤白帶下艾湯化下
或瀉血水棗湯化下 生產前後以酒化下
活血紫金丹

治婦人經脉不通腹內成塊遍體發熱並治心疼

歸尾

巴豆

去皮油各五升

五靈脂

代赭石

火煨醋淬七次各一兩

右共爲細末醋糊爲丸如棗豆大每服五七丸

紅花湯送下

如心疼艾醋湯送下

一婦人懷孕須用安胎之法少生氣惱戒慎勞碌則

胎元無傷再少進保胎之劑自然無事稍有不

安卽服四物湯加

白芍

黃芩

酒炒

二味水煎服

一孕婦懷胎三個月因氣所觸致傷胎元腹內少痛

覺胎微動當服四物湯加

茶葉

水煎服服後復作痛煎四物湯送紫金丹

一孕婦三四個月或因氣怒或登高騎馬失腳墜落

傷折胎動用四物湯加

艾葉

大麥

水煎服

一孕婦四五個月勿食傷胎之物若誤食并氣怒傷胎腰疼腹痛見血者煎四物湯送

烏金散打下惡物効

一孕婦六七個月偶有所傷腹痛不安或從高墜下觸動胎元痛不可忍或見血露或惡心嘔吐卽服安胎飲四物湯內加

白朮

條芩

陳皮

紫蘇

砂仁

水煎服如胎安不住就服

烏金散

黑神丸

再不應胎不下服奪命丹

一孕婦七八個月身體面目四肢浮腫用 烏金丸

丁香

煎湯化下

取下惡物後如臍腹

痛用四物湯補之加

薤蓄

艾葉

煎湯服

一產前小便澀少惡血阻隔不通服 烏金散

一產前小便淋瀝不通上下不和嘔吐惡心小腹脹

一產滿者服

烏金丸

一產前卒然不得小便此是胎逼尿胞用 葱白

搗膏貼臍上

田螺肉搗膏亦妙

同用亦可

一胎漏下血不止或心腹脹滿用

當歸 川芎 各五錢 黃酒煎入童便服

一若因母病而胎動但治其母惟用

當歸 川芎 益母草

右三味煎湯送烏金散 若因胎動而母病

者急當安胎用

芍藥 黃芩 益母草

右三味煎湯送黑神丸 須認輕者轉動不

安重者必致傷墜若面赤舌青是兒死面青舌

赤是母死唇舌俱青兩邊沫出子母俱死速進

奪命丹

一產前身體黃腫子癰痰涎潮搐目弔口噤中風頭

項強直經脈拘急語言蹇澀不省人事者服

黑神丸 烏金散

一胎氣不和心胃脹滿疼痛或臨產驚恐氣結者服

烏金丸 紫金丹

一胎死腹中或橫或倒或產生不下急用

草麻仁 十九粒 巴豆仁 十九粒 麝香 半分

右共搗如泥攤貼臍下丹田穴隨時就下即去其

藥少有不應即服 紫金丹

烏金丸或者先服藥後貼臍妙

一產前頭疼咳嗽用

蛇脫

燒灰

入黃酒內送

烏金丸

一難產者血塞子宮門也卽用

烏金散

黑神丸

猪脂榆皮煎湯下

一臨產之婦不可坐臥只宜行動不可用力太早臨產之時先服

烏金散

黑神丸

黃酒送下

一婦人月子後受風四肢攣拳名鷄爪風痛牽遍身下時發者於兩腿膝蓋傍有鬼眼穴各灸三壯

卽愈

一產前崩漏用

粗子煎湯送烏金散

一治胎衣不下用

皮硝一兩

童便黃酒調服卽下

一治產後大熱不能芟衣蓋被用

猪苦膽

一個

生飲汁卽愈

霹靂散

治血山崩漏經行不止

黃芩

炒

荆芥

炒

右研細末各二錢黃酒四兩同盛碗內先將銅稱錘一個用棗木柴燒通紅淬入藥碗內酒滾乘

熱服効

一方

治產後腹脹閉結膨悶氣急坐卧不安

大麥芽

炒

爲末用一合陳酒調服立通

一方

治產後血暈迷悶

五靈脂

半生半炒

爲末每服三錢滾水調下如

口閉搗開灌之

一方

治產後面白乃惡血下多氣脫故目閉不

開

人參

一兩

煎湯灌之將手指人中眉心卽回

神効

一方

治產後面紫乃惡血上冲氣壅故口開不

合

山查

一兩炒

童便煎服

再用韭菜搗爛裝入

有嘴瓶內煎滾醋中入急包其口將嘴薰二鼻

孔將手指人中穴妙

一方

治產後面黑

乃惡血人肺發喘欲死

人參

五牙

蘇木

一兩槌碎

水三鍾先煎蘇木至一鍾瀘去渣調人人參末服

神効

一方

治產後肉線下垂

乃產婦用方太過垂出肉線痛徹心脾急用

老姜三筋連皮炮人麻油二筋炒乾先以熟

絹盛起納近產口乃以絹袋盛姜就近薰之冷則更換漸次縮入也重者須一二日則愈斷則不可治也

一方

治新產後不問有病無病即用

童便一鍾陳醋半鍾合而溫服則百病不生

一方

治產後昏暈急將

亂髮浸陳醋燒於床前立甦即溫服童便一碗可保無虞

一方

治產後惡血攻心語言顛倒健忘失志及

打撲損傷一切敗血爲病殊効

血竭

沒藥各等分

右爲末每服二錢童便陳酒各半鍾調和溫服其

惡血即下行而愈

一方

治產後血崩大下不止

蒲黃炒黑爲末每服二錢用川芎當歸各二

錢煎湯調服即止甚効

此藥治身體無汗手足不冷者乃血欲脫而氣未脫也當服之若汗大出手足冷而無神色眼欲

閉者身倦無力口鼻氣淺者氣欲脫也不用前方只用
人參五錢煎湯熱服即止

一方

治產後血暈心眼倒築角弓反張四肢搐搦又治中風口噤不能服藥灌入鼻中其効如神
已上十方王永光集

荊芥穗微炒爲末每服三錢童便一鍾煮酒少許調下或煎湯亦可

芎歸獨活湯

治產後敗血流注經絡腿疼膝痛寒熱往來以成產後雜症

川芎

丹皮

續斷

木瓜

丹參

秦艽

獨活

各八分

當歸

香附

童便製

牛膝

各一

陳皮

六分

甘草

三分

赤芍

八分

茯苓

六分

水二鍾煎七分溫服

一方

童便

半鍾

酒一鍾

合而溫服即愈

一方

暈用

治產後穢汚不尽腹滿心悶手脚煩熱血生藕搗爛取汁飲之最妙
產後當息生冷惟

藕不必忌能清血故也

一方 治妇人血山崩

槐花 百草霜 各等分

爲末每服二小空

心溫酒調服

一方 治產後兒枕痛用

山查 水煎濃湯加沙糖一匙飲之

一方 治產後諸勞病

當归 赤芍 蒲黃 川芎

紅花 乾姜 甘草 生 菟絲子 各一

黃酒一鍾童便二鍾加黑豆一撮煎一鍾空心服

渣再煎

一方 治產後諸病用

紅褐子 一尺燒灰 以黃酒調服出汗百病愈

一方 治產後血氣上衝心痛

鬱金 燒灰 爲末每服二小匙醋調灌卽愈

一方 治產後惡露不淨見神見鬼

蛇脫 一條 用火燒灰黃酒調服惡露自下方安

一方 治產後陰翻 王永光集

澤蘭 水煎濃汁薰洗卽收

一方 治妇人產後房事太早成風症

黑牛蹄夾肉老皮燒存性為末黃酒調服三

出汗愈

妊娠門

保產無憂散

治素有產難之患如懷孕至八個月將此藥服一劑半月後又服一劑臨產時再服一二劑能保子母平安不受驚怖真正仙方幸勿輕視

當歸 酒洗

川芎

菟絲子

酒泡各一各五分

蘼艾

酒洗

厚朴

姜炒各七分

白芍

一名酒炒臨月加三分

羌活

五分

嫩黃耆

蜜炙

荆芥穗

各八分

川貝母

去心一各

枳殼

六分炒

甘草

五分

水三鍾薑三片煎一鍾溫服渣再煎

青皮安胎飲

治胎前瘧疾

柴胡

青皮

草果

白朮

黃芩

茯苓

厚朴

甘草

各八分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分服

白朮調中湯

治婦人胎前泄瀉

白朮

人參

黃連

厚朴

各八分

白芍

山藥

陳皮

澤瀉

山查

茯苓

各一各

甘草

三分

砂仁

六分

水二鍾煎八分溫服

一方 治孕婦心痛又止婦人產後發熱

乾公雞屎炒焦 銀硃各二名五分

右共爲末每服一名熱黃酒調服卽出冷汗愈

一方 治妊娠腰痛不可忍者

補骨脂炒香爲末嚼核桃肉半個空心溫黃酒

調服二名

一方 以上二方王永光集

治懷孕二三个月胎動不安防其欲墮預當服之
或素慣墮者服之皆効

川杜仲八兩姜汁炒川續斷二兩酒拌炒

右爲細末棗肉爲丸如桐子大每服三十丸陳倉
米湯送下

治孕婦痢疾方 皮醫生方

雞蛋一個挖一孔入黃丹一名在內煮熟用刀

對半剖開與婦人吃半個其疾卽止必定是男
如不止再與那半個食之就止必定是女

治孕婦胎動方

硃砂一名雞蛋清三枚攪均生服胎死卽出未

死立安

一方

治婦人有孕小兒腹內有聲

着孕婦自己淨掃三間房地卽無聲也

又方

用糸一百文撒在地上着孕婦十完卽好

難產門

催生丸

端治婦人生產不順或橫或逆以致六七日不下者或嬰兒死於腹中命在垂危以藥服之立刻卽下保全母子服者無不効驗

母丁香

乳香 各一糸 麝香 二分半

右共爲細末在臘月初八日兔腦爲丸黃豆大

產時水服一丸小兒卽時分解

此藥在小兒男左女右手掌中取出藥爲証將此藥放七日還與小兒服男女俱用乳服之永不生痘疹之患此方真仙方也

一方

治婦人難產

車前子

白芍 各一糸

白芷

冬葵子

各三

大腹皮

枳殼

川芎

各二糸

當歸

一兩

水酒各鍾半煎服

一方

治胎前產後所積一十八症通服之効

川大黃

生八分

大茴香

檳榔

麥芽

炒黃

篇蓄

瞿麥

紅花

蘇木

甘草

各五分

右共爲細末每服三錢黃酒調服服藥後如惡心以紅棗食之坐一炷香忌生冷油膩

治難產方

頭髮

燒灰

爲末每服一錢煮酒調服

先脫

產婦常着衣一什蓋灶頭免胎衣不下之厄

一方

治胎衣不下

今產婦口啣自己髮尾則嘔噦卽下胎衣

一方

以上三方主永光集

治橫生逆產手足先出以其父名書手足上卽順生也

一方

治產難血液下多乾澁不產

車前子

炒三錢

爲末以雞蛋一個取清調之溫

服卽下神効

催產方

非常緊勿用必瀉益難產服此立下

益母草

六錢

當歸

五錢

川芎

四錢

朴硝

三錢

水二碗煎一碗候大溫令一氣飲少頃卽產或子

壞腹中亦可下有起死回生之妙宜廣傳之

一方 治妇人难產用 脩德堂

蠶紙半張燒灰 爲末白水調服卽產

難產方

窩兒白酒 蜂蜜 蘇油 童便

右四味各一小鍾合而溫服

難產催生方

秋葵子七十粒 研末熱黃酒調服

催乳門

下乳天漿散 治妇人元氣虛弱乳汁微少

川芎 當歸 白芍 熟地

茯苓 天花粉 甘草 王不留行炒

麥冬去心 穿山甲炒 通草 漏蘆各一錢

右用健猪前蹄有七孔者一隻煮爛取汁二碗煎

藥至半碗二次頓熱食遠服之外用舊木梳火

烤熱梳乳上七房次第梳之其乳若湧泉

湧泉湯

王不留行錢三 川山甲錢二 天花粉

歸身各一錢五分 木通 甘草各一錢

右藥同前方一樣煎服

又方

漏蘆

二兩五錢

蛇脫

三錢火燒存性

瓜蒌

十個火燒存性

右爲細末每服二錢溫黃酒調服

下乳妙方

鮮蝦米

一觔去皮須足

用肉不拘多少淨磁器

中搗爛東酒熱服盡量服少時乳至再用猪蹄

湯飲之一日幾次其乳若湧泉驗過多人如神

但蝦米只服一次猪蹄湯不拘數可服

又方

生韭子

黑者炒

爲末黃酒冲服五錢効

又方

川山甲

炒研末三錢

核桃肉

五個

右二味同搗如泥黃酒冲服乳如湧泉甚効

催乳方

治隔奶乳少服之

川山甲

土炒

全蝎

姜蠶

各九錢淨末

大黃末

生三兩

右共合一處每服一錢黃酒調服

乳病門

治乳癰方

王永光集

蒲公英

浙貝母

甘草節

柴胡

天花粉

陳皮

白芷

荆芥

金銀花

錢各一

瓜蔓 一個

水三鍾煎一鍾食遠服

治吹乳膈乳方

靈佑宮胡方

羌活

花粉

青皮

赤芍

各一錢

歸尾

二錢

金銀花 三錢

川山甲

三片

白芷

八分

蒲公英

五錢

水二大鍾酒一大鍾煎一鍾溫服出汗屢驗

一方

治吹乳

生半夏

一個

爲末用葱白半寸搗泥爲丸綿裹

塞鼻孔內一夜卽愈左乳塞右鼻右乳塞左鼻

初起者甚効

治乳癰初發方

紅棗

七枚去核

取鼠屎七粒入棗內

火煨存性

右爲細末入麝香少許溫酒調服

一方

治乳癰成濃痛不可忍

蜂房

燒灰

爲末每服二錢水一盞煎六分去渣

食後溫服大効

方

治吹乳成塊

蒲公英

連藤金銀花

各四兩

右藥二味用鮮的搗爛取汁黃酒冲服將渣敷乳
腫處如無鮮的用酒煎不拘時溫服將渣搗
爛敷腫處甚効

一方 治結乳痛不可忍者

蛇蓋兒根花 搗爛熟黃酒冲服飲酒將渣敷於乳土
即愈 此藥花名叫火燎眉

一方 治婦人結乳不通或生癰作腫初起未成

膿者用

蒲公英 根葉二兩 搗爛入好黃酒半觔煎數沸

去渣熱服蓋被出汗如無汗隨嚼生葱飲滾白

湯催之得微汗即消其渣敷腫處 方加

三川柳

一方 治乳腫硬疼痛用

水膠 乳香 二味以水化均貼上腫處愈

治乳癰初起方

小青皮 醋炒五錢 蓮蓬殼 七個火燒存性 蒲公英 炒乾一兩

右為細末每服三錢食後黃酒送下三服盡消

又方

白芷 土貝母 各等分 為細末每服三錢陳

酒熱服護暖取汗即消重者再一服 如壯實

者每服五錢

一方 治乳岩硬如鼓

槐花炒爲末每日陳酒調服三錢卽消

一方 治乳懸怪症產后兩乳忽長細小如腸垂

過小肚痛不可忍

川芎 當歸 各二錢 濃煎頓服仍用二味燒

燻令病人吸之再將草麻子一粒搗爛貼頭頂

上漸收進

一方 治乳癰用 以上四方王永光集

龜板去兩邊燒存性爲末每服三錢陳酒送下此

方不論有孕無孕皆可服之服後側患處睡半

日三服而愈

治吹乳方 郎興祖方

棉花子 一兩打碎 水煎服愈

治吹乳經驗良方

猪脊髓油 五兩 麝香 三分 冰片 三分 研末

右先将髓油搗爛後入麝冰二味和均量痛處大

小一二貼卽止

虛勞門

逍遙散 治婦人肝脾血虛發熱或潮熱或自汗

盜汗或頭疼目眩或怔忡不寧煩熱口乾或月經不調或肚腹作痛小腹腫墜水道澀痛或腫出膿內熱作渴

當歸 白芍 炒 白朮 酒炒 白茯苓

柴胡 酒炒 各一錢 炙甘草 五分

水二鍾煨姜三片薄荷少許煎八分服

凡婦人胎前產後有餘不足一切等症當服益母

丸方在婦人科

清肺飲 治婦人虛勞發熱咳嗽吐血等症

當歸 川芎 黃芩 貝母 去心

知母 蜜炒 阿膠 炒 蒲黃 炒 陳皮 各八分

白芍 炒 生地 天冬 麥冬 去心

前胡 各一錢 薄荷 六分 枳殼 麩炒 五錢 藕節 十個

甘草 三分

水二大鍾煎八分食遠頻頻服

一方 治婦人潮熱服此能安

當歸 白芍 酒炒 骨皮 川芎

麥冬 去心 阿膠 炒 黃芩 炒 柴胡 醋炒

山梔 炒黑 各一錢 紅花 七分 桃仁 去皮尖六分

生地 一錢 香附 醋炒 知母 鹽炒 椿根皮

黃柏鹽炒 斷艾各八分 甘草五分

水三鍾燈心二十寸煎一鍾晚間熱服渣再煎次

早服

一方 治產婦發熱欲投水者

雞蛋打一孔入白礬三分燒熟食之

鳳凰散

孫偉方

婦人產後大熱發燒要下井者用

公雞糞焙乾二兩 水二鍾煎六分涼冷一飲而

止

經閉門

治經脉不通方

凡室女經閉先用針刺下唇無血不治

當歸 香附醋炒各一錢二分 川芎二錢 山查肉

生地姜汁炒 延胡索炒 枳殼麩炒 神麴炒

麥冬去心各一錢 白芍一錢六分酒炒 連翹去心八分

水三鍾燈心三十寸紅棗二枚煎八分食遠溫服

渣再煎服

一方 王永光集

治乾血癆或一年二年可治

歸尾 桃仁 香附 熟大黃各一錢

赤芍

紅花

三棱

莪朮

川芎 各八分

右藥先用東酒煎乾再入水鍾半煎七分食遠溫

服如肚腹疼加玄胡 八分 枳實 一錢 肉桂 三分

生藥方 端治婦人乾血勞 孫偉方

蝙蝠 二分 牛膝 三分 麝香 少許 小茴香 二分

右為末用蚕繭一個裝在內外再用絲綿包裹線

纏留線尺許在外送人門內候日足自下如一

月在內一日下兩月在內兩日血下而出

一方 治婦女經閉不通發熱勞症

鳳眼草 為末一兩 紅花 炒二錢

水三鍾煎一鍾入黑糖五錢空心服服三五劑見

血方止

一方 治乾血勞其効如神 王永光方

紅花 生薑 桃仁 各三錢 老葱 三根

紅棗 七個 麝香 半分

右用黃酒半觔入砂壺內懸煮一炷香溫服 頭

服上焦有汗二服中焦有汗三服下焦有汗即

愈 如服三服無汗其病不能治也

又方

木耳

洗淨去蒂焙乾爲末

核桃仁

去皮搗泥一錢

右用黃酒二鍾煎一鍾空心服出汗卽愈

一方

治婦女經閉其効如神

鼈甲

一個

用陳米醋

一觔

炭火炙淬醋炙得醋

完爲度

右研細末每服三錢煮酒調服

又方

王永光集

生蒲黃末

一錢

乾漆

炒烟將盡爲止三錢

石爲末作一服紅花煎酒調下立通

無極膏

治婦人乾血氣不可不用也此乃經水之仙藥

大黃

一兩爲細末

用嚴醋一觔熬成膏爲丸如雞

頭子大每服一丸熱酒化開卧時溫服大便利

一二次後脉自下

一方

治女子經水不通

茜草

一兩

酒煎服之一日卽通此草甚忌鉄器

治乾血勞氣方

蝙蝠

一個燒存性

爲末每服一錢酒服卽愈

又方用

未開眼的小老鼠

五七個

草紙包濕過灰火內

埋燒存性爲末每服五分熱黃酒調服

又方用

高醋七觔圓頭雞蛋七個入醋內泡二十一日

又各自泡一日七日完將原醋煮雞蛋早晚各一枚食之即愈

又方用

劉士琦方

華皮燒灰

每服三錢黃酒調服

月經作怪方

治女人月經退出皆作禽獸形欲來傷人先將綿塞陰戶頓用白湯調下沒藥末一兩即愈

血崩門

血崩第一方

當歸

川芎

白芍

丹皮

白朮

茯苓

條芩

荊芥穗

熟地

生地

各一錢酒洗

香附

醋炒黑一錢五分

柴胡

酒炒七分

炙草

四分

加蜀葵花

紅的五朵

血熱加地榆

水三鍾煎一鍾食遠服

忌氣腦勞碌炙博等物

一方

孫偉方

端治婦人血山崩漏產後虛勞等症

藕節

蓮肉

蓮心

蓮蒂

蓮莖

蓮房

藕尖

荷葉蒂

各一錢

水二鍾煎八分溫服

如常服煎此湯煮粥食善

一方

治婦人血崩

當歸

龍骨

煨各一兩

香附米

二錢炒

棕櫚

五錢燒灰

右爲末每服四錢空心米飲調下

忌油膩生冷

等物

一方

治婦人行經不止服此截藥

頭紅花

爛羅底

爛八搭草鞋鼻子

蓮房

此四味俱燒灰存性

右爲末每服一錢黃酒送下

不過三貼其紅立

止

治血崩方

當歸

一及炒

熟地

炒

川芎

荷葉蒂

炒

白芍

阿膠

炒

地榆

炒焦

蒲黃

炒焦

黃蓍

蜜炙

百草霜

棕櫚灰

水三鍾煎一鍾空心服

一方

治婦人崩漏之甚者

蓮蓬

燒灰存性

研細末每服三錢空心米湯下

不止燒酒亦可神効

血山崩方

黃蓍 一觔 好醋 一觔 煎至半觔去渣每服一小

鍾空心溫服

又方

刺鬼菜

鮮者半觔干者四兩

水煎服効

一方

治產後血漏不止

靈佑宮胡集

天靈蓋

燒灰存性

爲末每服二錢黃酒送下

一方

治血山崩久不止諸藥不効

雞爪黃皮二三錢熬水露一宿空心服不過二貼立止冬天溫服

一方

治治女人血崩

貫衆

五斤

酒煎服之立止

又方

王世公集

貫衆

燒存性

爲末黃酒調服三五錢立止

槐子散

治血淋並婦人血山崩漏不止

槐子

炒黃

管仲

炒黃各五分

共爲末每服五錢用炭醋一鍾煎滾三五沸去渣

溫服

治血崩方

年下脂麻楷

七個

燒灰黃酒送下

治血崩方

白馬糞煨灰用無灰酒調下三四錢愈

白帶門

暖宮丹

治赤白帶下又兼種子

蛇床子

四升

肉桂

杏仁

母丁香

菟絲子

白芨

細辛

吳茱萸

薏苡仁

砂仁

牡蛎

川椒

各一升

共為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸入陰戶內多時即化每日一丸藥病止後交合必有孕也

一方

治婦人淋症

石韋

條芩

木通

榆白皮

葵子

瞿麥穗

甘草稍

各一升五分

水二鍾煎八分空心服

白帶丸

蘼艾

當歸

酒洗

熟地

各二兩

香附

三兩醋浸一夜焙乾

川芎

人參

各一兩三升

白朮

茅朮

黃柏

酒炒

阿膠

白芍

酒炒

椿根皮

洗淨各一兩

地榆

七升

白茯苓

八升

白石脂

六升

煨

右為細末米醋糊為丸如桐子大每服五六十丸

早晚各一服白水送下

一方 治婦人白帶久不愈者 孫偉方

隔年陳蕎麥麵不拘多少雞蛋清爲丸棗豆大
每服二錢黃酒送下

又方

史公方

墓頭回 六分

紅花 一分半

用東酒童便各一鍾煎八分溫服

又方

黑豆 二兩

白果 十個去皮

紅棗 二十枚

水二碗煮熟食之三服除根

一方

治婦人白帶

白果肉

四兩

硫黃末 二分

砂鍋內炒熟去黃皮

將白果肉空心嚼爛服數個鹽湯下

一方

治赤白帶下

白果

去皮

煮熟蜜餞每日清晨吃七枚再食炒

料豆一兩白滾水送數日愈

一方

治赤白帶下

赤茯苓

五分

爲末空心豆腐漿調服

白帶單方

芫荽

用好煮酒煎服

陰瘡門

一方

治婦人陰門内生瘡作癢

用活蛤蚌一個剖開將有肉半個手拿對陰戶一夜次日又用一個全安

蛤蚌亦不用甚大

一方

治婦人女子陰戶作癢

生猪肝放滾水內一二滾取出刀切一寸濶五寸長入陰戶內一個時辰取出愈如不愈仍照

前一服全安

一方

治婦人陰戶生茄卽內疝氣

紫茄燒灰存性香油調抹在棉花上入陰戶內愈

一方

治婦人產後陰戶燥熱作痛遂成翻花等症

澤蘭葉

四兩

白礬

二兩

水煎薰洗二三次卽收

瘰癧門

破癥瘕散

治血虛五心煩熱晝則平安夜則發熱

當歸

生地

白芍

炒各一錢

川芎

七分

黃連

炒五分

胡黃連

三分

水二鍾煎七分服

治驚癇方取

白馬尿二鍾和雞子清三枚煎八分空心服當吐出小驚愈

一方 治肉癢思肉不已用

馬齒莧合鹽醋煎過飲之亦消

一方 治卒暴癇腹有硬物晝夜刺痛

蒴蒴科根十觔洗瀝去水切碗 黃酒十觔浸三宿

取汁熱服五合至一升日三服速効

熨塊法

吳茱萸一升搗碎酒和煮熱布裏熨之冷即換屢効

小兒科

千金至寶丹

耑治小兒脾虛急慢驚風等症兼治大人三十六種風多服療一切不明久疾沉疴並效

明天麻泡 全蝎去毒炒 直僵蠶炒 防風

膽南星 羌活 白附子泡 茯神

石菖蒲去毛 半夏姜製 荊芥穗 川芎

酸棗仁炒 細辛 桔梗炒 人參

白朮

茯苓

遠志

去心各五錢

炙甘草

犀牛角

羚羊角

大珍珠

真琥珀

辰砂

細研水飛各三錢

京牛黃

一錢五分麝香

明雄黃

各一錢

大赤頭蜈蚣

一條用薄荷湯浸焙乾

天竹黃

一兩

重裏金

三十片

銀箔

四十片

川烏

水泡去皮臍

鈎藤勾

川黃連

去皮毛

沉香

各三錢

烏蛇尾

酒泡炙五錢

右共三十七味爲細末五月五日修合用姜自然汁爲丸大者一分小者半分外再用辰砂爲衣量兒大小用金銀煎湯研化服如用末藥每服

一分半分照前引送下

牛黃抱龍丸

端治小兒急慢驚風痰嗽朝搐及傷風瘟疫身熱

昏睡氣粗風熱痰壅咳嗽喘急兼治痘疹首尾

可服此藥能鎮驚安神定志退諸熱除痰涎止

嗽喘壯實小兒時常服之則免痰熱驚風等症

天南星

一兩

天竺黃

五錢

麝香

珍珠

琥珀

各一錢

雄黃

辰砂

各二錢五分

牛黃

五分

金箔

十片爲衣

右爲細末水煮甘草膏和丸如櫻桃大每服一丸

薄荷湯化下

牛黃紫金丹

端治小兒急慢驚風發熱迷睡咳嗽痰涎啼哭不
已或面青黃黑白手足拘攣目直上視翻白久
積不愈內生邪熱均皆治之

天麻

微炒

僵蠶

紙包灰炮

丹皮

各一錢五分

天竺黃

白附子

切片微炒各二錢

全蝎

生手去足熱水洗去鹽毒微炒

胆南星

五錢

胡黃連

生一錢

地骨皮

去粗皮一錢五分炒

硃砂

五分

牛黃

四分

麝香

二分

大赤金

二十五張入藥

右十三味另研極細和勻煉蜜爲丸如大烏豆大

萬金不換抱龍丸

王永光集

用時須量人之大小強弱如嬰兒一丸小兒二

丸童子三丸若十一二歲以上俱服四丸用筋

研爛薄荷湯調下不拘時服忌葷腥油膩生冷

山藥

三兩

胆南星

大竺黃

無真者胆草代之

琥珀

白茯苓

白檀香

各三錢

枳殼

枳實

各二錢五分

甘草

二錢

大赤金

十張

硃砂

二錢五分水飛過一半入藥一半爲

共爲細末滴水爲丸如櫻桃大硃砂爲衣每服一

丸

如身發熱燈心竹葉湯下

嘔吐金銀首

飴煎湯服食寒姜湯下

一方

治小兒急慢驚風

王永光集

硃砂

二分

水片

一分

殭蚕

七個

全蝎

去毒三個

右爲研細末人乳調服

又方

真牛黃

三分

無名異

二分

大黃

酒蒸曬乾九次

共研細末滴水爲丸如菜豆大用辰砂爲衣每服

三九人乳汁或滾水送下其効如神

又方

五月五日土中取蚯蚓跳者放一邊不跳者放

一邊各焙乾爲末煉蜜爲丸如龍眼大急者用

跳的慢者用不跳的每一丸俱用薄荷湯化下

一方

治小兒四日六日八日驚風等症

硃砂

二分

官粉

二分

淡全蝎

二個燒存性

殭蚕

二個燒

共研細末用無根水調灌下或分作二服亦可

牛黃散

治體肥小兒月子至五七歲者無論何風症但是

胸膈內常聞有痰聲响并咽喉痰涎不斷胸口

高滿腹大通身燒熱大小便不通或未出痘疹

之前有此病者皆可服

錦紋大黃生

正檳榔

白牽牛頭末

黑牽牛頭末

辰砂

人參各等分

右爲細末收用小兒月子內體壯者一分弱者半
分量大小虛實加減用蜂蜜水調服隔上痰盛
者先吐痰后瀉痰盡即安

六釐散

治小兒急慢驚風痰涎壅盛

南星

一兩用羌活生薑同煮無白心爲度

半夏

一兩如南星製

黃耆

一兩蜜炙

姜黃八錢

硃砂

一錢

胡黃連

二錢五分

麝香

一分冰片半份

右爲細末磁瓶收固勿見日色勿近煖處每用六
釐急驚風用羌活荆芥湯下慢驚用姜棗湯下
飲食不消用山查麥芽湯下

一方

王永光集

此藥能去先天胎毒永不出痘百試百驗

大黃

三錢

以無灰酒半盞入銅鍋內煎成濃汁

將絹袋濾過小兒初生未開口時每服挑一二
分不拘遍數任其惡心不妨出盡胎糞永無胎
毒屢試屢驗勿以大黃傷小兒元氣爲疑

一方

治臍風濕腫久不瘥者

露蜂房 燒灰

研末敷臍上効

一方 治小兒驚風

孫偉方

老鼠外腎鮮者研水乾者水煎服之即愈

一方 治小兒喉中痰壅喘急

巴豆 一枚去殼

搗如泥作一丸綿裹男左女右塞

鼻內以痰下為効

一方 治撮口臍風

生葱

完全二根搗汁

用直蠶

三個

為末調塗母乳頭

上令兒吮之或用乳調蠶末灌之兒口即開神

驗

一方用

熱湯蘸布裹手指輕輕搽破即安不用服藥妙

一方

馬齒莧 燒存性

為末蜂蜜調敷臍上効

一方

用鹽豉納臍上炙之

一方 治小兒臍風久不愈者

蟹蟄

五五月的更好

為末敷之臍上按月三四度小

兒無口瘡之患

又方

用蜂房

燒灰

研細蜜調敷臍効

小兒夜啼

蟬花散 治小兒夜啼狀若鬼祟

蟬脫 七個 取下半截為細末用薄荷湯調入好

酒少許食後服或者不信將上半截為末依前

法服後啼如初古人立法莫知其妙小兒觸犯

禁忌而夜啼者宜醋炭薰之

一方

燈花 三四顆 研末燈心湯調抹口中以乳汁送

下或燒燈心灰塗乳上令兒吮之

一方 治小兒夜啼腹痛

牛黃如小豆大以乳汁化服神効

小兒胎毒

狼毒散 孫偉方

治小兒胎毒月子內頭上赤紅痒極頭搖出血痒

后大哭不睡遍身無皮一片血肉其痒非常

白附子 黃丹 蛇床子 各五錢 羌活

獨活 狼毒 白鮮皮 硫黃

枯白礬 輕粉 各三錢五分

右十味共研細末乾用香油調濕用乾摻但凡諸

痒瘡俱効

一方

治小兒胎毒肥瘡

五倍子

香白芷

各一兩

黃丹

花椒

各五錢

枯礬 二錢

右爲細末香油調搽濕則乾上

一方

治小兒外腎腫大用

石礬

用醋磨搽之卽効

又方

牡蠣

用雞蛋清調塗卽消

立消散

治小兒渾身起羅網蜘蛛瘡燥痒難忍用

豆腐皮

燒存性

爲末香油調搽立痊

一方

治小兒渾身頭面及陰囊虛腫

使君子肉

一兩

蜂蜜

五錢

炙盡搗泥每服一錢

食後米湯調下

又方用

地龍糞

以甘草煎湯調搽立効

口舌生瘡

神靈膏

孫偉方

治口內諸瘡點暴發火眼上瘰癧効

菜豆粉

四兩炒黃

川黃連末

一兩

麝香

冰片

各五分

右用煉過淨蜜四兩共合一處放淨石板上以鐵槌打千槌收貯磁器內聽用 如點眼凉水點上瘡瘡水調搽上 口瘡用菜豆大一粒含漱嚥下

三白散

劉宗順方

治小兒牙疳紅白口瘡

紅絨毳子

燒灰

珍珠

煨各一錢

冰片

一分

共研極細先用淨米泔水洗後上藥神効

一方

治舌卒腫如猪胞狀滿口不治必死

百草霜

用酒調塗舌上立愈

紅口瘡方

乾姜

黃連

各等分

右爲末上患處吐水卽食物不痛

治舌腫方

蒲黃

爲末頻搽

又以

黃連

水

煎服瀉心火卽愈

又方

治舌忽脹滿口

乾姜

蒲黃等分爲末乾搽患處神効

一方

治口唇生瘡

檳榔燒灰

入輕粉末敷之良

一方

治小兒大人口瘡

冰糖

一錢

冰片

半分

硼砂

三分

右爲細末葦筒吹患處卽愈

一方

治小兒重舌又名雀舌

巴豆

半粒

飯粘

四五粒

共搗爛爲餅如黃豆大

貼在印堂中待四圍起泡去之卽愈

小兒驚風

保金丸

治小兒未歲咳嗽

南星

半夏

生白礬

巴豆

去殼另研

杏仁

去皮尖另研

牙皂

各等分

右研均棗肉丸如桐子大每服三丸針挑於燈上

燒存性研爛茶清調灌

參花散

治小兒咳嗽吐血

人參

天花粉等分爲細末蜜水調下三五

分卽愈

咳嗽方

小兒大人並治

半夏

姜製

杏仁

去皮尖微炒各等分

右研末姜汁爲丸棗豆大每服一錢姜湯下

痘疹門

三豆湯

痘疹將發之際服之今多者少少者可無或有終身不出者

黑豆 萊豆 赤小豆 各一升生用

甘草 三兩

右將豆淘淨全甘草用雪水或長流水煮豆熟爲度去甘草將豆曬乾又入汁再浸再曬汁盡爲度逐日取豆任意食之

預防湯

疹未出時服之毒少者可使不出毒多者亦能減

輕葢防患於未病之先也

黃連 一錢五分 生犀角 鼠粘子 炒

山豆根 各一錢 蜜蒙花 八分 苦參 七分

紅花子 十粒

水一鍾半煎至八分飢時服

保嬰稀痘方

羌活 麻黃 各六分 生地 黃柏 升麻

甘草 黃連 歸身 各四分 防風 川芎

藁本 黃芩 酒洗 柴胡 乾葛

蒼朮 各三分 紅花 細辛 蘇木 陳皮

白朮各二分 吳茱萸 連翹各一分

每逢立春夏秋冬前一日用水二鍾煎八分露一宿次早仍溫熱服若四季俱服永不出痘服一二次者出稀應驗如神

兔血丸

用活兔一隻在臘月初八日取血以蕎麥麵和之加雄黃四五分爲丸如菜豆大初生小兒三日後服二三丸乳汁化灌下如通身發出紅點卽是其徵驗可保終身不出痘疹卽出亦不甚稠密也若嬰兒已長成能飲食者就以兔肉啖

之尤妙

一方 治小兒將出痘時取

經霜絲瓜連蒂三寸者燒灰存性爲末又用炒糯米煎湯不拘時調服二錢出痘必稀

一方 治痘瘡不起用

葶薺搗汁和白酒漿頓溫服之卽起但不可頓大熱大熱則反不妙慎之

四聖丹

治痘瘡疔黑紫頭黑爛臭不可聞

白豌豆性西十九粒燒灰存 血餘性燒灰存 珍珠性三分炒半

良朋彙編 卷之四
右研極細用油胭脂調凡有痘毒痘瘡無論青黃黑紫之色先搗去瘡痂出紫血後上此藥回生變紅色則愈

一方 治痘癰潰而不斂用

白麴

即乾狗糞

不拘多少燒存性爲末調火酒服又用生白麴末敷患處即愈

又方用

白豌豆炒

爲末摻上即愈

一方 治小兒痘疹不起

李樹上津膠些須熬水飲之即愈

一方 治痘疹出不快

乾山查 爲末湯點服之立出紅點

稀痘方

金銀花 熬膏服之甚妙

犀角化毒丹

治小兒胎毒丹毒一切諸瘡癰腫痘疹等症

犀角

鎊

朴硝

粉甘草

各三錢

桔梗

一兩

青黛

三錢

生地

牛旁子

微炒

赤茯苓

各五錢

連翹

玄參

各六錢

共爲細末煉蜜爲丸如龍眼大每服一九薄荷湯

研下有驚加硃砂為衣

一方 治小兒大人出痘疹回在心胸作喘發燒

用象糞八錢 升麻二錢

水二鍾煎一鍾服即表出

預解痘毒神方

雞子頭蛋一個入糞坑內浸七日煮熟食之大

妙痧痘俱不出矣

痘疹要訣 治咽喉痘疹

惡實一錢酒拌炒乾 甘草節一分 桔梗一錢五分

水一鍾半煎七分服

一方 孫偉方

治小兒疹痘回在心胸滿悶發熱命在須臾者用

白公雞冠上血五七點窩兒白酒冲服大便打

下痘疹毒則愈

一方 治風瘙癢疹心下迷悶

巴豆五十粒去皮

水七鍾煎二鍾以帛拭於身上隨手即愈

小兒傷食

腹脹者脾胃氣虛也

蘿蔔子炒 蘇子 乾葛 陳皮

枳殼

白朮

各一錢或八分

甘草

五分或三分

水二鍾煎八分服

又方

治小兒停食脹滿

白蘿蔔汁服効

又方

治小兒肚大脹滿

雞蛋

一個

開孔裝入大蜘蛛一個外用紙包裹

水濕灰火煨熟食之愈

一方

治小兒健脾吐瀉燥濕痢疾水瀉

橘紅

一兩

蒼朮

米泔浸三日換三次去皮炒

炙甘草

白朮

炒各一兩

厚朴

姜炒一兩五

藿香

七兩

為末蒸熟為丸重六分或四分每一丸米湯送下

一方

治小兒傷積不思飲食吐瀉方

猪苓

二兩

澤瀉

四兩

茯苓

白朮

各三兩

藿香

一兩

砂仁

五兩

右為細末米飯為丸六分重米湯送下或車前湯

下如小便腫硬用

小茴香

川練子

木通

煎湯服

小便不利用桂皮五分煎湯送下

消食丸

白朮

炒

砂仁

陳皮

三稜

炒

神麴

炒

麥芽

炒各五兩

香附

炒一兩

右研細末麵糊為丸如菉豆大每服三五七十九

加減用白湯送下

一方

治小兒傷生冷麵食等物

山裏紅果

多食好

又方

燒核桃

食之良

小兒吐瀉

燒針丸

治小兒吐瀉神効

孫偉方

黃丹

水飛

枯礬

硃砂

各等分

右用小棗肉生搗爲丸如櫻桃大每服一丸戳於針尖放燈上燒燃研爛冷米泔水送下嘔吐食後服泄瀉食前服一歲至三歲一丸三歲至五

歲服兩丸

一方

治大人小兒惡心嘔吐不止

大蘿蔔英子

搗爛取汁飲則止

治小兒吐瀉不止方

孫偉方

乾團粉

三升

用雞蛋清調攤紙上貼額門瀉止

去藥如嘔吐不止亦用此藥貼脚心其吐卽止

一方

治大人小兒水瀉俱効

砂仁

搗碎姜汁拌炒二三升

水二鍾煎一鍾加黑沙糖一兩再滾二三沸服

封臍丸

治小兒瀉吐

肉豆蔻 麵裏煨熟一升五 雄黃末 一升

右為末醋糊為丸黃豆大曬乾用一丸醋泡少時

放臍內以膏藥貼之

參苓白朮散 治大人小兒瀉痢不止

人參 雲苓 炙甘草 桔梗 各八升

蓮肉 百粒 白朮 土炒 白扁豆 去皮炒 山藥

陳皮 各一兩 沙仁 五升 薏苡仁 八升

右為細末大人小兒量用一二三錢黑棗湯調服

米湯亦可

狗皮膏 貼小兒瀉痢兼可作封肚暖臍膏

木鱉子 十個 杏仁 四十粒 桃枝 柳枝 各四十

用脂麻油七兩將藥入油燈黑枯色去渣淨入飛

過黃丹三兩用槐條攪令烟盡滴水成珠待溫

再入 乳香 沒藥 各五升 麝香 一升 研末攪均

入水中退火毒攤狗皮上貼腹臍神効

一方 治小兒吐乳不止

蚯蚓糞 為末每服五分空心米飲調下大

効

一方 治小兒吐瀉慢脾驚風一二歲可服

硃砂 五釐二歲已上 全蝎 一個去足毒一歲一

右為細末白湯調服

一方 治小兒嘔吐不止

硃砂一分 團粉三分 黃土五分 以涼水調下即

止

諸熱門

黃芩荊芥湯

治小兒感冒發熱痰壅風熱丹毒腫痛頸項有核
顙赤癰癤眼目赤腫口舌生瘡咽喉疼痛小便
淋瀝胎毒痘疹一切餘毒等症

柴胡

黃芩

荊芥

各一分

牛旁子

連翹

瞿麥

車前子

赤芍藥

滑石

梔子

木通

當歸

防風

各四分

蟬蜋

五分

甘草

一錢六分

右加竹葉十片燈心十寸水二鍾煎八分不拘時

頻頻服

盜汗門

胡連丸

治小兒盜汗神効

柴胡

胡黃連

各等分

為細末蜜丸雞頭子大一二三九一服放銀器中
黃酒化開再入水五分重湯煮二三十沸溫連

藥渣飲盡重者再一服効

一方 治小兒虛汗不止

桃樹上乾疤桃子

七枚

浮麥

一撮

水二鍾煎七分溫服

赤遊丹毒

治蛇纏丹妙方

舊破草蓆人睡過有汗的更好燒灰香油調敷

又方

看先起處有泡紫黑用

小小艾炷香炙三五艾則痊

一方

孫偉方

治小兒赤遊丹毒因火烤衣褥熱炕受其火毒赤

腫遊走日久成瘡退皮之症

伏龍肝

爲末用雞蛋清調搽搽一處好一

處如四圍又腫再搽若從四肢往內腫者重從中往四肢腫者輕腫處用衣針泛去惡血愈

一方

端治火丹

黃芩

爲末水調搽之

一方

治小兒赤遊丹毒

無名異

爲末葱汁調塗立消

一方

治小兒赤遊行于身體上下延至心胸卽

死用

芒硝 煎取濃汁以拭丹上大効

一方 治遍身赤丹

羚羊角 燒灰 爲末以雞子清調塗神効

膿泡瘡門

銀松丹 治膿泡瘡

老松香 一兩 水銀 五錢

共研極細末用生猪板油調搽神効

一方 治小兒頭上肥瘡

活鯽魚 一尾開肚去腸 入人言三分在內

油煎熱火上培乾爲細末搽瘡上卽愈

一方 治小兒面上一切諸瘡用

團圓五倍子 一個鐵杓內炒胡黃 爲細末以香

油調上

一方 治膿泡瘡揭去膿蓋用

紫皮大蒜外白皮貼上不動自然平安

一方 治小兒遍身生瘡濃水不乾用

黃柏 爲細末加枯礬少許摻之愈 單用

黃柏末亦可

一方 治膿泡瘡

硫黃錢一兩二 硃砂一錢 人言三錢

右三味為末每用三分水一碗煎用鵝毛掃水於瘡上

一方 治小兒頭上肥瘡

肥皂子燒灰存性 為末麻油調搽三日即愈

一方

治渾身燎泡如棠梨每個出水有石一片如指甲大其泡復生抽盡肌肉不治

蓬朮三稜 各等分

右為末每服二錢黃酒調連進幾服愈

六聖散

孫偉方

治頭面生瘡作痒黃水等症

小紅棗燒灰 枯礬 黃丹 官粉

松香各一兩 銀硃三錢

右為細末瘡乾用油調搽瘡濕乾摻上

四聖散

治黃水瘡兼小兒肥瘡胎毒並皆治之

官粉 黃丹 松香 白礬飛

右等分為細末瘡濕乾用乾則油調

又方

李國忠集

薰牛皮

煨成灰

官粉

松香

各等分

右為細末用燈窩油搽患處即愈

鳳爪散

治面上黃水痒瘡久不愈者用

公雞爪

炒烟盡存性

為末用真麻油調上愈

又方

松香

一兩

定粉

一錢

花椒

三分

右三味研細末燈窩油調搽効

又方

荔枝核

研細末水調上効

小兒牙疳

治小兒走馬牙疳神方

小紅棗

七個去核

每個內入黃豆大人言一塊

以線縛嚴放炭火內煨之先有黑烟起後有白

烟起將盡取出

右為細末加冰片半分先用米泔水將黑腐肉洗

去此藥上在疳瘡轉遭即不向外走裏面生新

肉其効如神

走馬牙疳散

五倍子

大者一個

裝入茶葉末在內外用紙封

好放灰火內煨黃色為度

右爲細末先用米泔水洗漱後上藥効

又方

人中白

火煨紅醋淬七次八錢

對人筋炒黃二錢

爲細末上患處卽愈

又方

明雄七分

明礬三分

共研細末先用米泔水洗

淨上藥効

牙疳速効散

並治舌上生瘡

寒水石

燒紅二兩

蒲黃

蚊蛤各五錢

青黛二錢

冰片一分

右爲細末敷上卽効

七寶散

治一切牙疳

硼砂

枯礬

各一錢

盧會

五分

青黛三分

輕粉二分

雄黃二分

冰片一分

共爲細末摻牙疳上或以雞翅掃敷之

三仙散

治走馬牙疳一時腐爛

人中白

火煨一錢

銅綠三分

麝香

半分

右爲細末搽患處不可太多

一方

治牙疳不論大人小兒俱効

尋房上貓兒糞色白者好放瓦上焙存性又用

曰鹽梅

火煨存性各等分

右研極細吹於患處即愈

治走馬牙疳口瘡方

李榮玉方

黃五倍子

一錢燒灰

珍珠

煨五分

右二味研極細末搽患處即愈

疳疾門

蘆會消疳飲

治小兒腹內積聚生疳作痞發燒作渴口內生疳內服此劑外貼化痞膏藥可保全

蘆會

銀柴胡

胡黃連

川黃連

玄參

牛蒡子

山梔子

桔梗

薄荷

羚羊角

三分

淡竹葉

十片

升麻

甘草

各一分

石膏

五分

水二鍾煎七分頻服

一方

治小兒面黃腹大飲食少進肌膚不潤疳積等症

蘆會

燕薹仁

炒去衣

白朮

人參

胡黃連

雞肫皮

各二錢五分

史君子肉

夜明沙

淘淨各一兩

為細末蒸餅為丸如彈子大眼內有膜猪精肉煮

湯化一九服之餘用米湯化下空心服午後再服其疾自愈

益兒餅

治小兒疳疾生於皮裏膜外也

水紅花子

一錢

史君子肉

山查肉

各五錢

白朮

四錢

檳榔

一錢五分

木香

一錢

神麴

二錢五分

右爲末和小米麵一筋做餅蒸熟任意食之

一方

孫偉方

治小兒癰瘡痞塊面黃肌瘦好吃泥土發燒口渴

等症

核桃

一百個打開

檳榔

四兩

硝砂

二錢

大黃

二兩

右用水三升煮一炷香下皮硝四兩又煮一炷香再入皮硝四兩如水乾再添水煮以三炷香爲度取出與小兒陸續食之自然體胖

一方

治小兒疳疾但見肚大青筋髮豎脖子細好食煤炭泥土等症

木鱉子

蒼朮

遠志肉

三稜

檳榔 各一錢七分

右為未用牙猪肝不見水一具以竹刀盡去筋膜

切薄片相連勿斷用皮硝五錢洗去血搽入前藥末在內用竹簽簽

好餘末下舖上蓋放鍋內蒸一炷香取出不拘

時與病者食之如不肯食研碎拌在飯內亦可

一方 治小兒面目皮肉並黃

瓜蒌根 搗爛取汁二合入蜂蜜一人匙煖服

一方 治小兒疳積腹脹如鼓用

蟹蟄 三四個去頭爪皮腸 水煮入鹽酒葱椒煮

熟與兒食之以愈為度

瘡疾門

牛黃丸 治小兒瘡疾

雄黃 一錢五分 蜈蚣 二條去頭足砂 蘆薈

阿魏 天竺黃 各三分 牛黃 二分

共為末化黃蠟一兩為丸如棗豆大每服七丸退

熱再服九九則塊消服十一丸全好雞子清合

藥吃亦可黃酒送下

又方 靈佑官胡集

阿魏 三錢 蜈蚣 三條 麝香 三分另研 全蝎 七個

雞子 一個 蜂蜜 二兩 葱白 三根 皂角 七錢

右爲細末用酒糟拳大一塊將前藥搗和成膏量
痞大小以紅布攤藥貼在患處三日如肉色發
青卽愈

又方用

番木鱉一個泡去毛研末 膠棗二個去核

右二味搗如泥作二丸用雞子一個將頭打破一
孔放入藥丸在內外用紙封嚴水濕飯上蒸熟
去殼取出藥丸埋入地內此蛋與小兒空心食
之輕者服三四個重者服五六個全愈

一方

治小兒面黃肚大脾疾等症

黃蠟

和雞肝煮良久取起只吃肝三五服

卽効

透膈清涼羊肝散

王永光集

耑治小兒痞疾服之神効

白朮

蒼朮

莢朮

水紅花子

頭髮

燒灰各等分

右爲細末用羊肝一具以竹刀割去筋膜切片勿
斷將藥末摻勻在內合定飯鍋上蒸熟與兒食
之甚効

又痞疾方

水蘿蔔 二兩 黃酒糟 二兩 皮硝 二兩 梔子 五個

連皮生姜 五斤

共搗如泥用布包貼患處乾則又換貼三五次即愈

又方用 水紅花連根葉全用 熬成膏攤貼効

痢疾門

姜茶煎 治小兒痢疾

生姜 三斤 細茶 三斤

水二鍾煎一鍾服効

又方 烏梅 去核 細茶 各等分

右二味爲末蜜爲丸如彈子大每用一丸白滾水

化下

一方 治小兒紅痢

團粉 七錢 黑糖 三錢 水調服

又方 治小兒白痢

黑糖 七錢 團粉 三錢 水調服



一方 治小兒脫肛

苦參 五倍子 東壁土 各等分

布三味煎湯洗 再用木賊爲末上之即收

一方

五倍子

爲末敷上卽愈煎湯洗亦好

一方

主瘰癧

雞毛掃上自收

