

橫節密和為丸飲服七丸如梧子大⑤再服漸加至二七丸當
心中淡之數欲嘔吐淡涕為佳若不覺觸可至二七丸此是
孝感所用元出僧宗分

膏療百病大風惡瘡諸腫毒瘰癧瘰皆主之方

石硫黃三兩 朱沙三兩

雄黃二兩

已上並細研如粉

附子十枚

硫雄州枚

烏頭十五枚

生漆三兩

常歸三兩

芫蕒三兩

細辛三兩

防風三兩

白芷三兩

乾薑三兩

桂心三兩

松脂八兩

生薑黃三斤

猪脂二升

565

右切以清酒淹浸一宿用猪脂於炭火上煎之九上九下絞去滓以摩

病上如前茵草等膏法

平龍面暗久用香悅甚良方

丁香三分

麝香三分

列師綿裹蔥膏絞取更內香煎十數沸除之

香附子三分

青木香三分

白附子三分

芫蕒四分

辛夷仁三分

芫蕒三分

白芷三分

甘松香二分

荖蘆三分

霍香二分

白僵蚕二分

羊脂三升

桃生脂三合

猪脂七合

熊白三合

蘇合

石切諸藥綿裹以清酒七合水七合和漬一宿并內脂中暖火煎水

盡絞去滓別研麝香綿裹於膏中煎十數沸綿濾度以楊木長攪

使先用之如法

石龍芮五分

蘭桂四分

已載皮十二分

伏苓八分

五味子十二分

澤瀉八分

縱容十二分

花者 蛇床子八分

牛膝十二分

遠志皮八分

薤葉子十分

菟絲子四分

面漬七宿 覆盆子十分

苟杞子十分

石斛十二分

石十五味轉節密和為丸如梧子大一服廿丸日二服不覺稍加至卅丸

用黃耆酒服不忌食

石龍芮丸主上熱下冷脾胃氣不足不多銷食縱食無味不長肌膚此方宜

通榮衛調中養理石氣平胃能食充實陪力方中

石龍芮六分

芫蕒四分

枳殼十六分

炙甘草四分

去心

甘草十六分

蘭桂一分

署預四分

乾薑黃六分

石斛四分

女麴八分

蒸香

石十味轉節密和為丸如梧子大一服廿丸日二服稍加至廿五丸酒

飲任量體中冷熱服藥

禁滋陰大肥

微文仲

石味梅節密和為丸如梧子大一服廿九日二服稍加至廿五丸酒

飲任量體中冷熱服藥 禁鹽菜大肥 依文仲

療脚氣兩煩疼處時微腫勝脫間有水及心隔積淡等患去之服桃花散方
桃花陰乾量取二升 注此虛平量之不須按標

石一味梅節為散溫清酒和之令得通咽空腹頓服之如至行十里
久當覺腹中鳴轉以少熱粥投之即止三數行所有宿水淡冷
不銷之物皆悉下盡下熱水如湯下冷水如泉若寫多力多通
與言冷飯即安穩 全不使生虛損不比服餘寫藥也經宿已後即
覺膈脚輕健進食極美 膈腫立銷小便遂利甚驗大鍾柱生
服三升為劑佳 忌食猪肉肥滑物等 三四忌之 勿食

療淡飲內銷方

前胡七分 菴藹子十二分 枳殼十分 伏苓十二分 意改至十二分

澤瀉八分 細辛七分 柴胡六分 旋伏花六分 石為丸食後飲

消之間以粥飲一服卅九日再服 忌食 忌食 四時常服方 菟絲子三升 酒

伏神五兩 至參三兩 遠志三兩 桂心二兩

石梅節為散以酒服之二方寸匕日再服別漸加至三匕日忌大

酢熱麴餘並無妨 毒慈藥

前仲方去辛已服茲覺得力為近來腸胃不調又鍾乳丸託今更

請依此方服一劑加 蛇床子三兩 肉桂客三兩 已貳兩三兩

石加一味已外並依舊方服法亦准舊

孩子兩三歲至五六歲患赤白膿血熱痢黃連散方

黃連十二分 烏梅肉八分 乾熱 阿膠七分 犀角末七分 黃蘗八分

舊根六分 黃芩六分 龍骨八分

石梅節為散兩三歲已來飲服半錢許日再服稍加至一

錢四五歲已上量大小以意加服之日並再服忌食猪魚生冷油

晒菴麵等

又主孩兒冷利下水穀白色食不銷等方

晒菴麵等

又主孩兒冷利下水穀白色食不銷等方

厚朴十分炙 黃連十二分 龍骨八分 赤石脂八分 物食子六枚
至粟六分 阿膠七分炙 甘草六分

石切搗篩為散服法多少禁忌同前散法 胡荽

丈夫虛腎熱客數苦自洩不心方

白龍骨十分 杜鵑六分 車前子六分 葶子八分 熟令香 鹿茸八分炙
酸石榴皮五分 麋骨八分 燒馬灰 花縱客八分

石切搗篩為散溫酒服之方寸匕日再服漸加至兩匕忌猪膽
油脂肥滑物等

療鬼魅等病方

石好蜀升麻十兩着兩青木香和搗為末每服一方寸匕日三服腹水下之無忌
療瘧病生糞酒方

右取衆生尿三升衆生薑升六通六日麴末三升並心一升慈
白切一升乾粟米飯熟一時和內瓮子中夏通埋土下冬通埋馬
糞中三七日熟去上蓋取清每服兩服別徑者一升已下弱者
半升已米病重者不過盡一劑輕者差即休

今主省睡方

馬頭三兩炙 酸棗中三兩 別搗研 苦菜子三兩 通草三兩 玄參六兩
伏神三兩 麥門冬三兩 去心 枳殼二兩炙

石搗篩密和為丸食訖水服廿丸日二服加至卅丸為恒常
宜喫苦菜爛煮下飯為佳 無所忌 蘇楚

常服補益方

重乾參黃六兩 縱客三兩 牛膝三兩 菟絲子二升 酒浸七日 已乾取五兩

遠志二兩 桂心三兩 五味子五兩

石搗篩密和為丸如梧子以酒服卅丸日再服服外稍加至
六七十九 無所忌 奉藏

乙秘傳津液方近奉養性神不傳

秘傳津液方選萃養性神不傳

鯨鱗蚶未連者四枚

去頭足相以背腹洗之

大青蚶十四枚

去之山用者良

丁臨飛赤黃者六十枚

煮之三升米下今足明自房

右合搗篩以鷄子白和為丸如梧子圓服三九日三服九

九心盡日交而液不出也欲下者食猪脂二斤

備急丸主霍亂心腹急痛滿悶不得吐利方

乾薑三兩

大黃三兩

巴豆三兩

去心熱令黃列搗如膏

右搗篩為散蜜和作丸如梧子大飲汁服廿九日

二服稍加至四五十九日心停停藥目赤和檢像丸藥如藥法

理中丸主宿食不消及霍亂吐瀉不止方

人參三兩

乾薑三兩

白朮三兩

甘草三兩

右搗篩為散蜜和作丸如梧子大飲汁服廿九日二服不愈至卅九

黃丸主一切惡氣蠱毒疰忤心腹痛脹結實小兒驚熱咳嗽上氣身面

腫氣婦生血氣帶下赤白帶主方

半黃一銖

麝香一銖

犀角二銖

天竺一節

朱沙一分

石錫一兩

禹餘糧一分

元青一分

雄黃一分

黃連一分

元花一分

大威一分

生參一分

伏苓一分

桂心一分

乾薑一分

前胡一分

寧應子一分

當歸一分

夕藥一分

芎藭一分

圓枳一分

細辛一分

薄黃一分

已豆一分

去皮心煮黃列搗

右廿七味搗篩為散內已豆中搗令相入少下密搗三千杵武九

內密器中一服三九如梧子大飲汁服常以微痢病破為度

猛藥生增服之老小減服二九服一九如麻子大三九服五

如小豆五九六九服如梧子二九並已微痢為度差心服

烏梅丸主諸雜痢無不差方

烏梅炭二兩

黃檗二兩

黃連三兩

熟艾三兩

甘草二兩

附子二兩

炮去皮

乾薑三兩

右七味搗篩為散蜜和為丸如梧子大一服廿九日二服漸加至

四五十分飲汁服

用油滑猪

