T7903/7621(53)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

SEP 30 1959

丹溪先生金匱鉤玄目錄

卷第一

中風　六鬱
癎　寒
傷寒　暑
注夏　暑風
濕　內傷
火　傷風
發斑　疹
温病　瘧
咳嗽　痰
喘　哮
痢　泄瀉
脾泄
痢　禁口痢
霍亂　乾霍亂
嘔吐　惡心
翻胃　傷食
瘧　噯氣

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

吞酸　嘈雜
水腫　皮脹
吃逆　頭風
眩暈　眉痛
卷第二
心痛　腰疼
痛風　勞瘵
各血　衄血
腸風　夢遺
淋　小便不通
關格　小便不禁
五疸　消渴泄瀉
自汗　盜汗
頭痛　頭眩
耳聾
脇痛　腹痛
咳血　嘔血
溺血　下血
精滑　濁
痛　健忘
痙　血塊
疝　腳氣
陽虛惡寒　手心熱
厥　面寒面熱
咽喉生瘡　口瘡
肺痿　天疱瘡
腸癰　結核
卷第三
婦人科　經水
血崩　帶下赤白
恍惚　驚悸
吐蟲　癥瘕
發熱
手痲　手木
喉痺　纏喉風
酒查鼻　肺癰
漏瘡　痔瘡
脫肛

白帶并痛風　子嗣　胎前
胎動　惡阻　束胎　安胎
胎漏　子腫　難產　催生方
產後　血暈　補虛　消血塊
泄　惡露不盡　中風
發熱惡寒　急慢驚風
小兒科　吐瀉黃疸　腹脹　夜啼
疳病　瘡瘡　脫肛　木舌
口瘡　脫囊　喫泥　痢疾食積
癮疹　咯紅
解顱　蚘蟲　口噤　風痙
癩頭　赤瘤　鼻赤

丹溪先生金匱鉤玄目錄

丹溪先生金匱鉤玄卷第一

門人戴元禮録　新安吳勉學校正

中風

大率主血虛有痰以治痰爲先或虛挾火與濕亦有死血留滯者外中於風者亦有中氣者當從口開手撒眼合遺尿吐沫直痰治順氣化痰若口眼㖞斜筋痛者皆不治

視喉如鼾睡肉脫筋痛者皆不治

半身不遂大率多痰有死血無血在左屬死血在右屬痰有熱氣虛

病若在左者四物湯等加桃仁紅花竹瀝薑汁在

右者二陳湯四君子等加竹瀝薑汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當吐

吐法輕用瓜蒂鰕汁皂角重用藜蘆半錢或三分

加麝香灌入鼻內或口內吐痰出一吐不已再

吐之亦有虛而不可吐者

氣虛卒倒參芪補之 竹瀝薑汁

氣虛有痰濃參湯合竹瀝薑汁炒恐泥痰再加竹瀝薑

血虛宜四物湯俱用薑汁加荊瀝

汁入內服能食者去竹瀝加荊瀝

又法以猪牙皂角白礬等分爲末薑湯調下名稀

涎散

血虛者四物湯補之 挾痰者亦用薑汁竹瀝

脉訣內言諸不治證見則不可治筋枯者不治舉

動則筋痛者是筋枯以其無血滋潤故也

治痰氣實能食用荊瀝 氣虛少食用竹瀝

此二味用開經絡行血氣入四物湯中必用薑

汁助之

肥白人多濕少用附子烏頭行經

初昏倒急撮入中至醒然後用去痰藥二陳湯四

物四君子等湯加減用

六鬱

戴云鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化也此爲傳化失常六鬱之病見矣氣鬱者胷脇痛脉沉澁濕鬱者周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細痰鬱者動則卽喘寸口脉沉滑執鬱者瞀小便赤脉沉數血鬱者四肢無力能食便紅脉沉食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊盛者是也

氣血中和萬病不生一有怫鬱諸病生焉

氣鬱　香附子　蒼朮　川芎　白芷

濕　蒼朮　川芎　南星　瓜蔞

痰　海石　香附　蒼朮　川芎　梔子

熱　青黛　香附　蒼朮　川芎　香附

血　桃仁　紅花　青黛　川芎　香附

食　蒼朮　香附　鍼沙（醋炒）　山查　神麴（炒）

春加芎　夏加苦參　秋冬加吳萸黃

越鞠丸　解諸鬱　又名芎朮丸

蒼朮　香附　撫芎　神麴　梔子等分爲末水丸如菉豆大

凡鬱皆在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降餘皆倣此

癲

大風病是受得天地間殺物之氣古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天散取惡物陳蟲於穀道中出取出雖有道路之異然皆不外乎陽明一經治此證者須知此意看其先病與病上先見者上體多者在上自下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明胃經與大腸無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多血氣俱受之者上下俱多也自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫從上從下以漸而來者皆可治入見其病勢之緩多忽之雖按法施治病已痊可若不能忌口絕色皆不免再發發則終於不能救也余曾治五人中間惟一婦人不再發以其貧甚而且寡無物可喫也餘四人三四年後皆再發孫真人云吾嘗治四五十人終無一人免於死非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病藥外又服百

餘貼加減四物湯半年之上方得經行十分安愈
治法　在上者醉仙散在下者通天再造散後用通
神散及三稜鍼於委中出血但不能忌口絕房者
不治之也

醉仙散

胡麻仁　牛蒡子　蔓荊子　枸杞子　名半兩為粗末
同炒紫色　白蒺藜　茗參　瓜蔞根
防風　各半兩

右八味為細末每一兩半入輕粉三錢拌勻大人
一錢空心日午臨睡各一服淡茶調下五七日間
必於齒縫中出臭涎水渾身覺痛昏悶如醉利下
惡臭屎為度量大小虛實加減與之證候重而急
者須以再造散下之候補養得還復與此藥喫須
斷鹽醬醋諸般魚肉椒料果子燒炙等物止可淡
粥及淡煮熟時菜食之茄尚不可食惟有烏稍蛇
菜花蛇可以淡酒煮熟食之以助藥力

再造散

鬱金　半兩　生用　大黃　一兩　炮　皂角刺　一兩黑者　大者
白牽牛　頭末六錢半炒半生用之

右為末五錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄出蟲

如蟲口黑色乃是多年蟲口如赤色是近者三數日又進一服直候無蟲即絕根也

寒　主平温散

有卒中天地之寒氣有口傷生冷之物

戴云此傷寒謂身受肅殺之氣口食冰水瓜果冷物之類病者必脉沉細手足冷息微身倦雖身熱亦不渴倦言語或遇熱病誤用此法輕者至重重者至死凡脉數者或飲水者或煩燥動擾者皆是熱病寒熱二證若水火也不可得而同治誤即殺人學者慎之

傷寒

傷寒必須身犯寒氣口食寒物者從補中益氣湯中加發散藥屬內傷者十居八九其法邪之所湊其氣必虛只用補中益氣湯中從所見之證出入加減氣虛熱甚者少用附子以行參芪之劑如果氣虛者方可用此法　已上傷寒冷法可用於南方不宜北

暑

戴云暑乃夏月炎暑也盛熱之氣著人也有冒有傷有中三者有輕重之分虛實之辯或腹痛水瀉

者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲也此二者
冒暑也可用黃連香薷飲盖黃連退暑熱香薷消
畜水或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此
爲熱傷在分肉也當以解毒白虎湯加柴胡氣如
虛者加人參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脉數者
熱在肺經用清肺湯柴胡天水散之類急治則可
遲則不可治矣或火乘金也此爲中暑凡治病須
要明白辯別慎勿滾同施治春秋間亦或有之切
莫執一隨病處方爲妙

黃連香薷飲　挾痰加半夏　乘虛加人參黃

注夏　屬陰虛元氣不足

戴云秋初夏未頭痛腳軟食少體熱者是也補中
益氣湯去柴胡升麻加炒黃柏挾痰止用南星半
夏陳皮之類或生脉散出千金方

暑風

戴云暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火
者有因痰者火君相二火也暑天地二火也內外
合而炎爍所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑
氣入而鼓激痰飲塞礙心之竅道則手足不知動

躡而卒倒也此二者皆可吐內經曰火鬱則發之
挾火挾痰實者可用吐法吐卽發散也量其虛實
而吐之吐醒後可用清劑調治之

濕

一戴云濕有自外入者有自內出者必審其方土之
致病源東南地下多陰雨地濕凡受必從外入多
自下起以重腳腳氣者多治當汗散久者宜疎通
滲泄西北地高人多食生冷濕麪或飲酒後寒氣
怫鬱濕不能越作腹皮脹痛甚則水欬脹滿或通
身浮腫如泥按之不起此皆自內而出也歸其元
氣多少而通利其二便責其根在內也此方土內
外亦互相有之但多少不同須對證施治不可執一

本草蒼朮治濕上下俱可用

二陳湯加酒芩羌活蒼朮散風之藥行濕最妙

內傷

內傷病退後燥渴不解者有餘熱在脯冢可用參
苓甘草少許蔗汁冷服或茶匙挑薑汁與之虛者
可用人參湯世之病此者爲多但有挾痰者有挾
外邪者有熱鬱於內而發者皆以補元氣爲主看
其所挾之病而兼用藥

火

有可發者二　風寒外來者可發　鬱者可發
陰虛火動難治　火鬱當發看何經　鬱者可降
重則從其性升之　實火可瀉　小便降火極速
凡氣有餘便是火　亦可
火急甚重者必緩之生甘草
人壯氣實火盛顛狂者可用正治或硝水水飲之
人虛火盛狂者可用生薑湯與之若投以水水正
治立死有補陰即火自降者炒黃柏地黃之類

山梔子仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下
行降火人所不知
凡火盛者不可驟用涼藥必用溫散
又方左金丸治肝火
黃連六兩茱萸一兩或半兩或水爲丸白湯下五十丸

傷風

戴云新咳嗽鼻塞聲重者是也
屬肺者多　散宜辛溫或辛涼之劑
發斑　屬風熱
戴云斑有色點而無頭粒者是如有頭粒即疹也

風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散消息當以微汗而散之下之非理也

內傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降之發斑似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之下之非理也

疹

疹云疹浮小有頭粒者是隨出即收收則又出者是也非若斑之無頭粒也當明辨之

屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者

衆人病一般者是也又謂之天行時疫有三法宜補宜降宜散

又方

大黃　黃芩　黃連　人參　桔梗　防風

蒼朮　滑石　香附　人中黃

右爲末神麴爲丸每服五七十丸分氣血痰作湯使氣虛四君子湯血虛四物湯痰多二陳湯送下如熱甚者可用童子小便送下

大頭天行病東垣有方

羌活　酒芩　大黃　酒蒸

冬溫爲病非其時而有其氣者冬時君子當閉藏而反發泄於外專用補藥帶表

又方以竹筒兩頭兩節中作一竅納甘草於中仍以竹木釘閉竅於大糞缸中浸一月取出晒乾專治瘧毒

瘧有風有暑有食有老瘧瘧母痰病

老瘧病此係風暑入陰分在臟用血藥用芍藥青紅花當歸加蒼朮白朮黃柏甘草前露一宿次早服之無汗要有汗散邪爲主帶補有汗要無汗正氣爲主帶散有瘧毋者用先藥消導酷煮鱉甲爲君三稜蓬朮香附隨證加減

三日一發者受病一年間發者受病半年一日一發者受病一月連二日發者住一日者氣血俱受病一日間一日者補藥帶表藥後用瘧丹截之在陰分者用藥徹起在陽分方可截之

又方

草果　知母　檳榔　烏梅　常山　甘草炙　川山甲炮　用水酒一大碗煎至半碗露一宿臨發日前二時溫服如叶則順之

截瘧青蒿丸

青蒿一兩　冬青葉二兩　馬鞭草二兩
官桂二兩

右三葉皆陰乾秤爲末法丸如胡椒子大每兩作四服於當發前一時服盡

大法暑風必當發汗夏月多在風凉處歇遂閉其汗而不泄因食者從食上治

瘧而虛者須先用參朮一二貼托住其氣不使下陷後用他藥治內傷挾外邪者同法內必主痰必以汗解二陳湯加常山柴胡黃芩草果

瘧而甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水自汗可與參芪朮芩連梔子川芎蒼朮半夏等治

久病瘧二陳湯加川芎蒼朮柴胡葛根白朮一錢

一發

欬嗽

風寒　火主降火　燃　肺脹　火鬱

痰主降痰

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也勞者盜汗出無痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰

出嗽止五者大棗耳赤當明其是否也

風寒行痰開嗽理二陳湯加麻黃杏仁桔梗

火降火清金化痰

勞四物湯中加竹瀝薑汁必以補陰爲主

肺脹而嗽者用訶子青黛杏仁訶子能治肺氣因

火傷極遂成鬱遏脹滿取其味酸苦有收斂降火

之功佐以海蛤粉香附瓜蔞青黛半夏麴

食積痰作嗽發熱者半夏南星爲君瓜蔞萵苣

爲臣青黛石膏爲使

火鬱嗽者訶子海石瓜蔞青黛半夏香附

咳嗽聲嘶者此血虛受熱也用青黛蛤粉蜜調服

久嗽風入肺用鵝管石椎黃鬱金款冬花碾末和

艾中以生薑一片留舌上灸之以煙入喉中爲度

乾咳嗽者難治此係火鬱之證乃痰鬱火邪在中

用苦梗以開之下用補陰降火不已則成勞倒倉

好此證不得志者有之

嗽而脇痛宜疎肝氣用青皮等方在後二陳湯內

加南星香附青黛薑汁

治嗽藥大棗多用生薑者以其辛散也

上半日嗽多者屬胃中有火貝母石膏能降胃火

午後嗽多者此屬陰虛必用四物湯加知母黃柏
先降其火
五更嗽多者此胃中有食積至此時候流入肺金
知母地骨皮降肺火
火氣浮於肺者不宜用涼藥用五味五倍斂而降
之有痰因火逆上者先治火後治其痰也
肺虛甚者用參膏此好色腎虛有之以生薑陳皮
佐之大槩有痰者可加痰藥治之
治嗽多用粟殼不必疑但要先云病根此乃收後
之藥也　綿云陰分嗽者多屬陰虛治之也

不嗽而肺脹塞遏不得眠者難治
治嗽煙筒
佛耳草　款冬花　鵝管石
右爲末用紙捲燒其煙薰之或白湯調亦得
治嗽有痰天突肺腧二穴灸治嗽泄火熱大瀉肺
氣三椎骨下橫過各一寸半是穴
嗽春是春升之氣用清藥二陳加薄荷之類夏是
火炎上最重苓連秋是濕熱傷肺冬是風寒外來
用藥發散之後以半夏必逐去痰庶不再來
又方治嗽劫藥

五味子 半兩　五倍子 一錢　甘草 二錢半
風化硝 一錢　末以蜜爲丸嚼化之

痰　脉浮當吐

凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰反易生多
濕痰　用蒼朮　瓜蔞子　香附　五倍子
老痰　海石　半夏　黃連
熱痰　用青黛　黃連
食積痰　神麯　麥蘗　山查子

痰在腸胃間者可下而愈痰在經絡中者非吐不
可出吐法中就有發散之義也

府上之痰必用吐之瀉亦不能去也
氣實痰熱結在上者則吐吐難得出或成塊或吐
咯不出氣滯鬱鬱者此則難治矣
膠固者必用吐之

吐法　用附子尖　梔梗蘆　人參蘆　瓜蒂
砒　不甚用　藜蘆　文蛤　末茶
右藥此皆自吐不用手探但藥但湯皆可吐
吐法先以布捨膊勒腰於不通風處行此法

蘿蔔子半升擂和以漿水一桮濾去粗入少油
蜜旋至半溫服後以鵝翎探吐凡用鵝翎須
以桐油浸邦以皂角水洗去肥晒乾用之
又法用蝦帶殼半斤入醬葱薑等料物煮汁先喫
蝦後飲汁以翎勾引吐必須緊勒肚腹
二陳湯一身之痰都能管如在下加下引藥如在
上加上引藥
凡人身上中下有塊者多是痰也問其平日好食
何物吐下後用藥
許學士用蒼朮治痰飲成窠囊一邊行極効痰挾

痰血遂成窠囊
痰之清者屬寒用二陳湯之類
內傷挾痰必用人參黃芪白朮之屬多用薑汁煎
送或用半夏之屬虛甚者宜加竹瀝
痰證者多挾風外證爲多
濕者多眠加身倦而重之類熱者清之食積者必
用攻之兼氣虛者用補氣藥補之
因火盛逆上者治火爲先白朮黃芩石膏之類中
氣不足則加人參白朮痰之爲物隨氣升降無
處不到

脾虛者清中氣二陳加白朮之類燕周提藥
中焦有痰與食積則氣賴其所養卒不便虛若攻
之盡則虛矣
眩暈嘈雜乃火動其痰用二陳湯加梔子芩連類
噫氣吞酸此係食鬱有熱火氣上動以黃芩爲君
南星半夏爲臣橘紅佐之熱多者加青黛
痰在脇下非白芥子不能達
痰在皮裏膜外者非薑汁竹瀝不可達
痰在膈間使人頭狂健忘宜用竹瀝風痰亦服竹
瀝又能養血痰在四肢非竹瀝不開

痰結核在咽喉燥不能出入化痰藥加軟堅鹹藥
杏仁　海石　桔梗　連翹　瓜蔞仁
少佐朴硝以薑汁蜜調免嗆化之
海粉即海石熟痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰
能消可入丸子末子不可入煎藥
黃芩治熱痰假以降其熱也
竹瀝滑痰非薑汁不能行經絡也
枳實瀉痰能衝墻壁　五倍子能治老痰
小胃丹　治膈上痰熱風痰濕痰有膊諸痛煩能
損胃氣食積痰實者用之不宜多

青礞石丸去濕痰重在風化硝

潤下丸降痰最妙

陳皮半斤去白以水化鹽半兩拌陳皮令得所煮候乾炒燥一方不去白甘草一兩炙

右爲末蒸餅丸菉豆大每服三十五丸温水下三十丸

痰方

油炒半夏大治濕痰又治喘止心痛粥丸薑湯下

黃芩 空心 香附 半夏薑製 貝母巳上治濕痰加瓜蔞仁 青黛 作丸子治熱痰

中和丸治濕痰氣熱

蒼术 黃芩 香附 半夏各等分爲末粥丸

燥濕痰方亦治白濁因痰者

南星一兩 半夏一兩 蛤粉二兩 青黛爲衣

右爲末神麴糊丸

痰嗽方

黃芩一兩半酒浸洗 滑石半兩 貝母一兩

南星一兩 風化硝二錢半 白芥子半兩去殼

右爲末湯浸蒸餅爲丸

導痰湯

半夏四兩 南星 橘皮 枳殼 赤茯苓一兩

甘草半兩

用生薑煎服之

千緡湯

半夏七枚洗製 皂角去皮炙
四片破之 一寸二分 甘草炙一寸
生薑如指大

煎服之治喘

治痰方

南星 半夏 滑石 輕粉各三錢 巴豆三十粒

右用皂角仁浸濃汁丸如梧桐子大每服五十丸

黃連化痰丸

黃連一兩 陳皮五錢 吳茱萸酒浸一錢
半夏一兩伍錢

右爲末入桃仁二十四箇研如泥和勻神麴糊丸如菉豆大每服百丸薑湯送下

消痰方

益元散七錢 吳茱萸三錢

治鬱痰方

白殭蠶 杏仁 瓜蔞 訶子 貝母

喘

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃虛喘者擡肩撷肚喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大槩胃中有實火膈上有稠痰得食咽壅下稠痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也昔葉都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水去利五六次而安矣

凡久喘未發以扶正氣爲要已發以攻邪爲主

有氣虛短氣而喘有痰亦短氣而喘

有陰虛自小腹下火起而上者

喘急有風痰者婦人大全方千緡湯

陰虛有痰喘急者補陰降火四物湯加枳殼半夏氣虛者人參蜜炙黃柏麥門冬地骨皮之類

大槩喘急之病甚不可用苦藥涼藥火氣盛故也可用導痰湯加干緡湯治之

諸喘不止者用劫藥一二貼則止之劫藥之後因痰治痰因火治火椒目碾極細末用一二錢以生薑湯調下止之

又法用蘿蔔子蒸熟爲君皂角燒灰等分爲末以生薑汁煉蜜爲丸小梧子大每服五七十丸漸化下之効

哮

專主於痰宜吐法

治哮必用薄滋味不可純用凉藥必帶表散

治哮方　用雞子畧敲殼損膜不損浸於尿缸內三四日夜取出煮熟食之効蓋雞子能去風痰

痫

身熱　後重　腹痛　下血

戴云痫雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治但分新舊更量元氣用藥與赤白帶同

身熱挾外感

不惡寒小柴胡湯去人參

惡寒發熱爲表證宜微汗和解

蒼朮　川芎　陳皮　芍藥　甘草生薑煎服

後重積與氣鬱墜下兼升兼消

或氣行血和積少但虛坐努力此爲亡血倍用歸身尾却以生芍藥生地黃桃仁佐之復以陳皮和之

或下痫而大孔痛者此因熱流於下也用木香檳榔黃芩黃連炒乾薑

或纏退減十之七八積已盡糟粕未實當炒芍
炒白朮炙甘草陳皮茯苓湯下固腸先三十
然固腸先性燥有去濕實腸之功恐滯氣未盡
者不可遽用此藥只宜單服此湯可也
或痢後糟粕未實或食稍多或饑甚方食腹中作
痛者切勿驚恐以白朮陳皮各半盞煎服和之
則安
或久痢後體虛氣弱滑瀉不止又當以訶子肉豆
蔻白礬半夏之類撰用以澁之甚則加牡蠣然
須以陳皮爲佐若大澁亦能作痛又甚者炎大

愜氣海
古方用厚朴爲瀉凝滯之氣然朴太温而散氣久
服大能虛人滯氣稍行即去之餘滯未盡以炒
枳殼陳皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴少緩此
陳皮亦重滯退一半當去之只用陳皮以和諸
藥陳皮去白有補瀉之義才若爲參朮之佐亦
能補也
凡痢疾腹痛必以白芍藥甘草爲君當歸白朮爲
佐惡寒痛者加桂惡熱痛者加黄柏蓮者更能
參以歲氣時令用藥則萬舉萬全豈在乎執方哉

諸不治證

下痢純血者必死　下痢如塵腐色者死

下痢如屋漏者死　下痢如竹筒注者不可治

下痢如魚腦者半生半死

噤口痢　胃口熱甚故也

黃連多加入參煮湯終日呷之如吐了再喫開以

降之人不知此多用溫藥甘味此以火濟火以

滯益滯哀哉

一方臍中用田螺

亦有誤服熟藥濕藥之毒犯胃者當明審以祛其

毒　痢方亦作丸

大黃　黃連　黃芩　黃栢　枳殼　當歸

白芍藥　滑石　甘草　桃仁　白朮　各等分

右爲末神麴糊丸

孫郎中因飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮　白朮　厚朴　茯苓　滑石

右煎下保和丸

小兒八歲下痢純血以食積治

黃芩　白芍　滑石　茯苓

蒼朮　白朮　炒麴

右煎下保和丸

甘草　陳皮

又下痢法熟不止者屬陰虛用寒凉藥熏升藥熱
泄瀉　濕　氣虛　火　痰　食積
載云凡瀉水腹不痛者是濕也飲食入胃不住或
完穀不化者是氣虛也腹痛瀉水腹鳴痛一陣瀉
一陣是火也或瀉時或不瀉或多或少是痰也腹
痛甚而瀉瀉後痛減者是食積也
濕燥濕兼滲泄之四苓散加蒼术白术甚者二术炒
氣虛人參白术芍藥黃芩木通入四苓散
火宜伐火利小水黃芩黃芩木通入四苓散
痰積宜豁之海石青黛黃芩神麯蛤粉或用吐法

食積宜消導疎滌之神麯大黃
已上諸藥皆作丸子服之
凡泄瀉水多者仍用五苓散治之
世俗類用澁藥治痢與瀉若積久而虛者或可行
之而初得之者恐必變他疾爲禍不小矣殊不
知多因於濕淡滲分利小水最爲上策

止瀉方

肉豆蔻　五錢　滑石　春冬一兩二錢半　夏二兩半秋二兩
又方薑麯丸
陳麯　六兩炒　陳麥　亦可　茴香　五錢　生薑　一兩

右炒白朮炒麴炒芍藥或丸或散或湯作丸妙

脾泄

治一老人奉養大過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄之疾

白朮二兩炒　白芍藥一兩拌炒　神麴一兩半炒
山查一兩半炒　半夏一兩洗　黃芩五錢炒

右爲末荷葉包飯煨爲丸

治一老人年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作瀉下血淡水膿後腹痛小便不利裏急後重參朮爲君甘草滑石檳榔木香蒼朮最少下保和丸二十五丸第二日前證俱減獨小不利以益元散服之

霍亂

戴云霍亂者吐也有聲有物凡有聲無物而躁亂者謂之乾霍亂也

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩傍邊此乃千金妙法也

內有所積外有所感陽不升陰不降垂腸而成矣切勿以米湯與之立死　脉多伏爲絕見成吐瀉還用吐提其氣起

大法生薑理中湯最好　有可吐者　有可下者
吐用二陳湯加減亦可　或梓樹木煎湯吐亦可

乾霍亂

此病最難治死在須臾升降不通故也
此係內有物所傷外有邪氣所逼有用吐法者則
無發散之義也
吐提其氣極是良法　世多用鹽湯
有用溫藥解散者　其法解散不用涼藥
一陳湯加和解散　川芎防風蒼朮白芷

嘔吐

凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦
有痰膈中焦食不得下者　有氣逆者
有寒氣鬱於胃口者　胃中有痰有熱者
然胃中有火與痰相合而致嘔吐者多矣
朱奉議以半夏生薑橘皮爲主
孫真人誤以噦爲咳逆
劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳
胃中有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子黃連生薑
久病嘔者胃虛不納穀也以生薑人參黃芪白朮
香附

惡心　有熱　有痰　有虛

戴云惡心者無聲無物但心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心非心經之病其病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也　皆用生薑隨證用藥

翻胃　卽膈噎　膈噎乃翻胃之漸　發揮備言

戴云翻胃有四血虛氣虛有熱有痰血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有熱者脉數而有力有痰者脉滑數二者可治血虛者四物爲主氣虛者四君子爲主熱以解毒爲主痰以二陳爲主大約有四　血虛　氣虛　有熱　有痰無病必用童便竹瀝薑汁牛羊乳

糞如羊屎者斷不可治大腸無血故也

痰用二陳湯爲主寸關脉沉或伏而大有氣滯結者通氣之藥皆可用也寸關脉沉而濇氣虛四君子湯爲主血虛四物湯爲主左手脉無力大不可用香燥之藥服之必死宜薄滋味

馬剝疕燒灰存性一錢重好棗肉五胃散二錢温酒調服食卽可下然後隨病源調理神效

陳皮三斤　厚朴三斤　甘草三十兩　蒼术五斤

傷食

戴云惡食者胸中有物導痰補脾

二陳湯加　白朮　山查　川芎　蒼朮

痞　食積無濕　東垣有法有方

又痞滿方

吳茱萸三兩　黃連八兩　粥爲丸

軟石膏礦末醋丸如菉豆大瀉胃火食積痰噯氣　胃中有火有痰

南星　半夏　軟石膏　莊草根　或湯或丸

吞酸

戴云濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏其食不得傳化故作酸也如穀肉在器濕熱則易酸也必用菜萸順其性而折之反佐菜萸黃連

嘈雜　只是痰因火動

戴云此即俗謂之心嘈也

梔子薑炒黃連不可無　梔子黃芩爲君

南星　半夏　橘皮　熟多加青黛

肥人嘈雜二陳湯加撫芎用蒼朮白朮炒梔子

五痘

不用分五同是濕熱如盒麴相似

戴云五疸者週身皮膚并眼如梔子水染因食積黃者量其虛實下其食積其餘但利小便爲先小便利白卽黃自退

輕者小溫中丸　重者大溫中丸

熱多者加黃連　濕多者茵蔯五苓散加食積藥

消濕泄瀉

先用白朮白芍藥炒爲末調服後却服消渴藥

消渴　養肺　降火　生血爲主　分上中下治

黃連末　天花粉末　人乳　生藕汁

生地黃汁

右二物汁爲膏入上藥搜和佐以薑汁和蜜湯爲膏徐徐留於舌上以白湯少許送下

能食加軟石膏　瓜蔞根治消渴神藥

水腫

戴云水腫者通身皮膚光腫如泡者是也以健脾滲水利小便進飲食元氣實者可下

此因脾虛不能制水水清妄行當以參朮補脾氣得實則自能健運自能升降運動其樞機則水自行非五苓之行水也宜補中行濕利小便切不可下

二陳湯加白朮人參爲主佐以蒼朮炒梔子黃芩

麥門冬制所木若腹脹少佐厚朴氣不運加木香木通

氣若陷下升麻柴胡提之隨證加減必須補中

産後必用大補氣血爲主少佐以蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾壅滯用半夏陳皮香附監之

有熱當清肺麥門冬黄芩之屬

一方用山梔子去皮取仁炒搥碎米飲送下若胃脘熱病在上者帶皮用

皷脹　又名單皷　其詳在格致論中

大補中氣行濕此乃脾虛之甚須必達音樂斷厚味以大劑人參白朮佐以陳皮茯苓蒼朮之類

有血虛　當以四物湯行血

脉實熱人壯盛者或可用攻藥便用收拾白朮爲主厚朴治腹脹因味辛以散其氣在中焦故也

自汗　屬氣虛　濕熱　陽虛

東垣有法有方

六參　黄芪　少佐桂枝

陽虛附子亦可用

撲法

牡蠣　楚皮　蒺藜本　糯米　防風　白蓳
麻黃根　爲末週身撲之
火氣上蒸胃中之濕亦能作汗凉膚散主之
痰證亦有汗者
盜汗　血虛　陰虛
戴云盜汗者睡則汗自出覺則無矣非若自汗而
自出也　小兒不須治
東垣有法有方當歸大黃湯
盜汗方
白朮四兩二兩用黃芪同炒一兩用石斛同炒
二兩用牡蠣末同炒一兩用麩炒麻黃根爲末

微黃色餘藥不
用只用白朮
右爲細末每服三錢用粟米湯調下盡四兩效
吃逆　有痰　氣虛　陰火　視其有餘不足治之
戴云吃逆者因痰與熱胃火者極多
不足者人參白朮湯下大補丸
有餘并痰者吐之人參蘆之屬
頭風　有痰者多
左屬風　荊芥　薄荷
屬血虛　川芎　當歸　芍藥
右屬痰　蒼朮　半夏　屬熱　黃芩

搐藥有用葶藶搓猪膽

頭痛　多主於痰

痛甚者火多　亦有可吐者　亦有可下者

滿空膏治諸般頭痛除血虛頭痛不治

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛必用川芎當歸湯

古方有追涎藥　出東垣試效

羌活　防風　黃連　各炒　柴胡　七錢　川芎　二錢

甘草　炙一兩半　黃芩　三兩　刮去黃色到　半夏　一半酒炒一半

右爲末每服二錢七勺熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用湯送下臨卧服之

痰挾氣虛火治痰爲主　挾補氣藥并降火藥

屬痰　無痰則不能作眩

屬火　痰因火動　又有濕痰者　有火多者

左手脉數熟多　脉濇有死血

右手脉實痰積　脉大必是久病

頭暈　火動其痰

二陳湯加黃芩蒼术羌活散風行濕或用防風行濕之劑可也

昔有一老婦患赤白帶一年半是頭眩坐立不久

睡之則安　專用治赤白帶除之其眩自安矣

眉稜痛

風熱痰　作風痰治類痛風

白朮酒黃芩末茶調服

又方川烏頭草烏二味爲君童便浸洗炒去毒細辛黃芩羌活甘草佐之

耳聾

少陽厥陰熱多　皆屬於熱耳鳴者是

或云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

蕳麻子　四十九粒　棗肉十箇

右入人乳搗成膏子石頭上畧晒乾便丸如桐子大以綿裹塞於耳中左右耳亦

又方用鼠膽入耳中左好　仍開痰散風熱

大病後須用四物湯降火

有陰虛火動耳聾者亦如上法

大凡心腑之痛須分新久若明知身受寒氣口食

寒物而病於初得之時當以温散或温利之藥

若曰病得之稍久則成鬱矣鬱則蒸熱熱則又

必生大原病式中備言之矣若欲再温散盛無

助火添病耶由是古方中多以山栀爲熱藥之

丹溪先生金匱鈎玄卷第二

門人戴元禮録　明新安吳勉學校正

心痛　即胃脘痛

心痛雖日數多不喫飲食不死若痛方止便喫還痛必須三五服藥後方可喫物

大凡心腹之痛須分新久若明知身受寒氣口食寒物而病於初得之時當以温散或温利之藥若曰病得之稍久則成鬱矣鬱則蒸熱熱則又必生火原病式中備言之矣若欲丹温散盛無助火添病耶由是古方中多以山梔爲熱藥之

向導則邪伏而病易退正易復而病易安雖然病安之後若縱恣口味不改前非病復作時必難治之也

山梔炒去皮每十五箇濃煎湯一呷入生薑汁令辣再煎小沸服或入苦一錢尤妙山梔大者用七箇或九箇大槩胃口有熱而作痛非山梔子不可佐以薑汁或半夏橘紅各五黃芩三甘草用二陳湯加蒼朮倍加炒梔痛甚者加炒乾薑從之反治之法心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石菖川芎茗末梔子必炒去皮用作丸服之

凡治病必須先問平日起居如何假如心痛有因平日喜食熱物以致血流於胃口作痛用桃仁承氣湯下之切記輕者用韭汁桔梗能開提氣血藥中兼用之

練根錫灰之類脉堅實不大便者下之

以物拄按痛則止者挾虛也以二陳湯加炒乾薑和之有蟲痛者面上白斑唇紅能食屬蟲治苦痛甚者脉必伏多用温藥不用參朱可用附子

諸痛不可用補氣藥

客寒犯胃草菅蔻九用之兼可用止用一二服

草豆蔻一錢四分裹燒熟去皮　吳茱萸湯泡洗去梗焙乾　益智仁　白礬研末　橘皮　人參　黃芪　各八分　生甘草　桂皮　炙甘草　歸身　各六分　麴末　薑黃　各四分　洗一錢　麥蘗一錢炒黃　桃仁七箇去皮　半夏　一錢半　澤瀉一錢小便多減半用之　柴胡四分　詳腫下痛多為用之

右一十八味除桃仁另研如泥外餘極細末同桃仁研勻用湯泡蒸餅為丸如桐子大每服三十丸食遠用熱白湯送下旋斟酌多少用之

又方用黃荊子炒焦為末米飲調服亦治白帶

又方脾痛用海蛤粉佐以香附末用川芎山梔生薑煎辣湯調服為佳

又方單用牡粉酒調下一二錢氣實不可用

腰疼　濕熱　腎虛　瘀血

濕熱腰疼者遇天陰或坐久而發者是腎虛者疼之不已者是也瘀血者日輕夜重者是也

脈大者腎虛用杜仲龜板黃栢知母枸杞五味之類用猪脊髓丸

脈澁者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花

濕熱者用蒼朮杜仲黃栢川芎

痰者用南星

凡諸痛皆屬火寒凉藥不可峻用必用温散之藥
諸痛不可用人參補氣氣旺不通而痛愈
甚矣

臍下忽大痛者人中如黑色者多死難治也
人面上忽有紅點者多死

脇痛

肝火盛　木氣實　有死血　肝急　有痰流注
木氣實　川芎　蒼朮　青皮　當歸
龍會龙瀉火要藥

死血　桃仁　紅花　川芎
痰流注　二陳湯加　南星　蒼朮　川芎
肝苦急食辛以散之用撫芎蒼朮血病入血藥中
行血脇痛甚者用薑汁下龍會龙肝火盛故也
咳嗽脇痛二陳湯加南星多香附青皮芎薑汁
腹痛　有寒　積熱　死血　食積　濕痰
戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是時痛時止者
是執也死血痛者每痛有處不行移者是也食積
者甚欲大便利彼痛減者是濕痰者凡痛必小便
不利

脉弦強者食　脉滑者痰
滑痰多作腹痛用苦茶蒼朮香附白芷生薑汁入
湯服腹中水鳴乃火擊動其水也二陳湯加黃
芩黃連梔子
凡心腹痛必用温散此是鬱結不散阻氣不運故
病在下者多屬食宜温散之
一老人腹痛年高不禁下者用
川芎　蒼朮　香附　白芷　乾薑　茯苓
滑石

痛風

四肢百節走痛　風熱　風濕　血虛　有痰
大法主方
蒼朮　南星　川芎　白芷　當歸　酒黃芩
在上者加羌活　桂枝　桔梗　威靈仙
在下者加牛膝　防己　木通　黃檗
血虛者多用川芎　當歸　佐以桃仁　紅花
薄桂治痛風無味而薄者獨此能橫行手臂領南
星蒼朮等治之
上中下痛風方
威靈三錢　南星二兩　蒼芎一兩

桃仁五錢　白芷五錢　桂枝三錢　防己半錢
蒼术二兩　黃栢酒浸炒二兩　紅花一錢半　羌活三錢
神麴一兩炒　草龍膽五分

張子元氣血虛有痰濁陰火痛風

人參一兩　白术二兩　黃栢二兩炒黑色
山藥一兩　海石一兩　瓊陽五錢　乾薑五錢燒灰
南星一兩　敗龜板二兩酒炙熟地黃二兩　琥爲丸

治臂痛

半夏一錢　陳皮五分　茯苓五分　蒼术一錢半
酒芩一錢　蔵靈仙三分　白术一錢　甘草少許炒

南星一錢　香附一錢

勞瘵　其主在乎陰虛痰與血病

青高一斗五升文武火熬約童便減二斗去高熬至一斗入猪膽汁七箇再熬數沸苦草末收之

虛勞身瘦屬火因火燒爍

勞病四物湯加人尿薑汁

咳血　痰盛　身熱多是血虛

戴云咳血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血者是咯血者每咯出血皆是血疾瘡劒血者鼻中

出血也溺血小便出血也下血者大便出血也雖有名色分六俱是熱證但有虛實新舊之不同或妄言爲寒者誤也

青黛　訶子　山梔　海石　瓜蔞皮

右爲末薑汁蜜調呑化嗽甚者加杏仁後以八物湯加減調理

身熱多是血虛四物湯加減

嘔血　火載血上錯經妄行

脉大發熱咳中痛者是氣虛用人參黃芪蜜炙黃柏荆芥并當歸生地黃用之

嘔血用韭汁童便薑汁磨鬱金同飲之其血自清

火載血上錯經妄行四物湯加炒梔子童便薑汁山茶花童便薑汁酒調

鬱金末治吐血入薑汁童便

痰帶血絲出者童便薑汁竹瀝

又方用韭汁童便二物相呑用鬱金細研入在二物之內同飲其血自消

又方治衄血以鬱金如無鬱金以茶薑汁童便和好酒調服即止之

咯血

薑汁童便青黛入血藥中用之加四物湯地黃膏
牛膝膏之類

衄血

涼血行血爲主　犀角地黃湯入麝金同用
經血通行或血腥或哽血吐血用韭葉汁立効

溺血　屬熱　或用小薊琥珀
山梔子炒水煎服
有血虛者四物湯加牛膝膏

下血

不可純用寒涼藥必於寒涼藥中用辛味矛温如
酒浸炒涼藥酒煮黃連之類
有熱四物湯加炒梔子升麻秦艽阿膠珠
下血屬虛當歸散四物湯加炮乾薑升麻
又方用白芷五倍子
凡用血藥不可單行單止
有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝生血故也有
濕傷血宜行濕消熱可也
內經謂身熱卽死寒則生此亦是大槩言之必兼
證詳之則可今豈無身熱生寒而死者
脈沉小流連或微者易治

脈浮大洪數者難愈宜滑不宜弦

仲景治痢可温者五法可清者十法或解表或利小便或待其自已區分易治難治極密但與瀉同立法不分學者當辨之

大孔痛一日温之一日清之

久病身冷自汗脈沉小者宜温暴病身熱脈浮洪者宜清

有可吐者　有可下者　有可汗者

初得時原氣未虛必推蕩之此通用之法稍久氣虛則不可

先水泄後膿血此脾傳腎腎敗邪難愈

先膿血後水泄此腎傳脾脾微邪易愈

如荳汁者瀑也蓋脾胃爲水穀之海無物不受常兼四藏故如五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之

因熱而作不可用巴豆等藥如傷冷物者或可用亦宜謹之

又有時疫作痢一方一家之内上下傳染相似却宜明運氣之勝復以治之

腸風　獨在胃與大腸出

黃芩　秦艽　槐角　升麻　青黛

夢遺　專主熱　脫精

戴云因夢交而出精者謂之夢遺不因夢而自泄精者謂之精滑皆相火所動久則有虛而無寒者也

帶下與夢遺同法治

青黛　海石　黃柏　即春樹根丸

內傷氣血不能固守當補以八物湯加減吞椿樹根丸思慮成病其病在心安神帶補熱則流通

知母　黃柏　蛤粉

精滑　專主濕熱

戴云滑者小便精滑下也俱是膀胱濕熱雖有赤白之異終無寒熱之別河間云天氣熱則水渾濁寒則澄徹清冷由此觀之濁之爲病濕熱明矣

黃柏　知母　牡蠣　蛤粉

又方

良薑三錢　芍藥二錢　黃柏二錢燒灰存性

椿樹皮白皮一兩半

右爲末糊爲丸每服三十丸

濕熱　有痰　有虛　赤濁屬血　白濁屬氣

寒則堅凝　熱則流通

大率皆是濕熱流注宜燥中宮之濕用二陳湯加

蒼朮白朮燥去濕赤者乃是濕傷血加白芍藥

仍用珍珠粉丸加椿樹根皮滑石青黛等作丸

虛勞者用補陰藥大槩不利執藥

肥白人必多痰以二陳湯去其熱胃弱者兼用人

參以柴胡升麻升胃中之氣丸藥用

青黛　黃柏炒褐色　乾薑炒微黑色

海石　蛤粉

胃中濁氣下流爲赤白濁者用柴胡升麻蒼朮白

朮二陳湯丸藥用樗末蛤粉炒薑炒黃柏

專主胃中之濁氣下流滲入膀胱用青黛蛤粉

肝脉弦者用青黛以瀉肝

又方

黃柏一兩炒黑　生柏二錢半一作海石二兩

神麴五錢　三兩

爲末水丸

有熱者　黃柏　滑石　青黛之類

燥濕痰　南星　半夏　蛤粉

右神麴爲丸青黛爲衣或用海石代麴

張子元氣血兩虛有痰痛風時作陰火間起小便白濁或帶下赤白方在前痛風中

一人便濁常有半年或時夢遺形瘦作心虛主治珍珠粉丸和勻定志丸服

一婦人年近六十形肥奉養膏粱飲食肥美中焦不清濁氣流入膀胱下注白濁白濁即是濕痰也

戴云斷用二陳湯去痰加升麻柴胡升胃中之清氣加蒼术去濕白术補胃全在活法服四貼後濁減大半覺胃滿因柴胡升麻升動其氣痰阻滿閉用二陳湯加炒麴白术素無痰者升動胃氣不滿

丸藥方

青黛　椿皮　蛤粉　滑石

乾薑炒　黃栢炒

右爲末炒神麴糊丸仍用前燥濕痰丸亦能治帶

又方

滑石利竅

青黛解鬱結

黃栢治濕熱

炒乾薑味苦斂肺氣下降使陰血生乾薑鹽制蛤粉醎寒入腎

之

淋

皆屬於痰熱

淋者小便淋瀝欲去不去又來皆屬於熱
解熱利小便山梔子之類用苦　甘草煎服諸藥
中皆加牛膝

老人亦有氣虛者人參白朮中帶木通山梔
亦有死血作淋者以牛膝作膏此證亦能損胃不
食

小便不通

氣虛　血虛　痰　風閉　實熱

吐之以提其氣氣升則水自下之蓋氣承載其水
也

氣虛用人參黃芪升麻等先服後吐或參芪藥中
探吐

血虛四物湯先服後吐若歸湯吐亦可痰多二陳
湯先服後吐皆用探吐

痰氣閉塞二陳湯加木香香附探吐實熱利之

一婦人脾痰後患大小便不通此是痰隔中焦氣
滿於下焦二陳湯加木通初喫後柤再煎服吐

之

關格

戴云關格者謂膈中覺有所礙欲升不升欲降不降欲食不食此爲氣之橫格也必用吐提其氣之橫格不必在胸痰也有痰以二陳湯吐之吐中便有降有中氣虛不運者補氣藥中升降

小便不禁

屬熟　屬虛

戴云小便不禁出而不覺赤者有熟白者爲氣虛也屬熟者五苓散加解毒散虛者五苓散加四物湯

癇　驚　痰　宜吐

戴云痰者俗曰猪癇風者是也

大率行痰爲主

黃連　南星　瓜蔞　半夏

尋痰尋火分多少治無不愈

分痰分熟有熟者以涼藥清其心有痰者必用吐藥吐用東垣安神丸

此證必用吐吐後用平肝之藥青黛蒲黃芍之類

健忘

戴云健忘者爲事有始無終言談不知首尾此以爲病之名非比生成之愚頑不知世事者

精神短少者多　亦有痰者

恍忡　大段屬血虛

有慮便動屬虛　時作時止痰因火動

戴云恍忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

瘦人多是血少　肥人屬痰尋常者多是痰

直覺心跳者是血少用四物安神之類

驚悸　血虛　用硃砂安神丸

痙　大率與痺病相似

多是血虛有火煎痰人參竹瀝之類不用羌風藥

血塊　一名積痕

塊在中爲痰飲　在右爲食積　在左爲血積

氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血

此理曉然醋煮海石三稜蓬木桃仁紅花五靈脂香附之類

白术湯吞下龍子能消血塊次消痰

治塊當降火消食積食積即痰也

行死血塊去須大補石斛一物有痰積有血塊可用洗滌垢膩又消食積

吐蟲

以黑錫炒成灰檳榔末米飲調下

癥瘕

戴云積聚癥瘕有積聚成塊不能移動者是癥或有或無或上或下或左或右者是瘕

用蜀葵根煎湯煎人參白朮陳皮青皮甘草硝牛膝成湯入細研桃仁玄明粉各少許熱飲一服可見塊下

病重補接之後加減再行

消塊丸即千金大硝石丸止可磨塊不令人困須量虛實而用可也

硝石六兩大黃八兩人參甘草各三兩

右爲末以三年苦酒三斗置銅器中以竹片作準每入一升作一刻柱器中熬先納大黃不住手攪使微沸盡一刻後乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸則取丸如雞子中黃大每服一丸米飲下如不能大丸則作小丸如梧子大每服三十丸後下如雞肝如米泔赤黑等色下後忌風冷淡軟粥將理

又三聖膏

末化石灰半斤爲末置器中炒令淡紅色揀出火外候熱少減次下大黃末一兩爲末就爐炒伺大黃熱減入下桂心末桂心半兩爲末畧成膏藥厚攤貼患處

貼積聚塊

大黃　朴硝各一兩

右爲末用大蒜搗膏和勻貼之

癌瘕在皮裏膜外須用補氣香附開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚味

茶癖　石膏　黃芩　升麻

右爲末砂糖水調服

癭氣　先須斷厚味

海藻一兩　黃藥二兩

右爲末以少許置於掌中時時舐之津嚥下如消三分之二須止後藥服

食積一方乃在婦人門食積條下

疝

濕熱痰積流下作疝大槩因寒鬱而作也卽是疫飲食積并死血

戴云疝本屬厥陰肝之一經余嘗見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也

子和云疝本肝經宜通勿塞只此見治之法專主肝經與腎絕無干不宜下癥瀝多疝氣炎夫敦穴食積與瘀血成痛者

梔子　桃仁　山查　枳實　吳茱萸
右爲末生薑汁順流水作湯調服

按之不定必用桂枝屬虛

桂枝　山梔炒烏頭細切炒
右爲末薑汁爲丸每服三十丸劫痛

治疝方定痛速効　濕勝者加荔枝

粳殼十五箇　山梔炒　糖炒　吳萸炒
右爲末生薑汁爲丸每服三十丸劫痛

又方守先治癪要藥不疼者

蒼朮　南星　白芷　山查　川芎　半夏
枳實　爲末神麴作丸

治陽明受濕熱傳入大腸惡寒發熱小腹連毛際結核悶痛不可忍

山梔炒　枳殼炒　桃仁炒　山查等分
右研細砂鉢內入生薑汁用水一盞煎令沸熟服之

治諸疝發時用海石香附二味爲末以生薑汁湯調服亦能治心痛

治疝方

梔子　桃仁　橘核　茱萸　川烏

右碾煎服劫藥用烏頭細切炒梔子橘核散單止痛

腳氣

蒼术鹽炒　白术　防已　檳榔　川芎

犀角　甘草　木通　黃連

生地黃酒炒黃栢　有熱加　黃芩　黃連

有熱加竹瀝薑汁

大熱及時令熱加石膏大便實加桃仁小便澁加牛膝

有食積流注

蒼术　黃栢　防已　南星　川芎　白芷

犀角　檳榔　血虛加牛膝龜板

如常腫者專主乎濕熱朱先生有方肥人加痰藥

戴云有腳氣衝心宜四物加炒栢再宜湧泉穴用附子津拌貼以艾灸泄引其熱

健步丸

歸尾　芍藥　陳皮　蒼术各一兩　生地黃一兩

大腹子三箇　牛膝　茱萸各半兩　黃芩半兩

桂枝三錢

右爲末蒸餅爲丸每服百丸白术通草煎湯食
前下

一婦人足腫

黃柏　蒼术　南星　紅花　酒洗　草龍膽
川芎　牛膝　酒洗　生地黃

筋動於足大指動上來至大腿近腰結　奉養厚
因風寒作四物湯加酒芩紅花蒼术南星

筋轉皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花
大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽
生則陰生故也不可用附子可用參多服

痿

斷不可作風治而用風藥

濕熱　痰　無血而虛　氣弱　瘀血

濕熱兼垣健步方中加燥濕降陰火藥芩柏蒼术
之類

濕痰二陳湯中加蒼术黃芩黃柏白术之類入竹
瀝

氣虛四君子湯加蒼术黃芩黃柏之類

血虛四物湯中蒼术黃柏下補陰丸

亦有食積妨碍不得降者　亦有死血者
健步丸方
羌活　柴胡　滑石　甘草炙　天花粉酒製各半兩
防巳　防風　澤瀉各三錢　肉桂半錢
川烏　苦參酒製各一錢
右爲末酒糊丸如桐子大每服七十丸煎愈風湯以空心下
發熱　陰虛難治
戴云凡脉數而無力者便是陰虛也
陰虛發熱用四物湯加黃柏兼氣虛加參芪白朮蓋四物湯加黃柏是降火補陰之妙藥
又云陰虛發熱用四物湯甚者加龜板炒黃柏
喫酒人發熱難治
不飲酒之人若因酒而發熱者亦難治
一男子年三十歲因酒發熱用青黛瓜蔞仁薑汁
每日以數匙入口中三日而愈
陽虛惡寒
戴云凡背惡寒甚者脉浮大而無力者是陽虛也
用人參黃芪之類甚者加附子少許以行參芪之氣

一女子惡寒用苦參一錢赤小豆一錢爲末南星黃芩酒麴丸吐用川芎蒼朮白芷川芎

手心熱

梔子　香附　蒼朮　白芷　川芎

半夏生用　爲末麴糊丸

手痲

此是氣虛也

手木

東垣云痲木氣不行也補　肺中之氣是濕痰死血

十指痲是胃中有濕痰死血

厥　因痰　用白术　竹瀝

厥者手足冷也熱厥道也非寒證因氣虛血虛

熱承氣湯外感解散加蔓汁酒

面寒面熱

火起　寒鬱熱　面寒　退胃熱

喉痺

大槩多是痰熱也只以桐油吐之　或用麝干遊

流水吐

又方用李實根皮一片噙口內要用李實根磨水

傅頂上一遭立効新採園中者

纏喉風

戴云屬痰熱纏喉風者謂其咽喉裏外皆腫者是也用桐油以鵝翎探吐　又法用燈油脚探吐之又方用遠志去心水調傳項上一遭立効

喉咽生瘡幷痛

多屬虛血熱游行無制客於咽喉人參蜜炙黃柏荊芥

虛　人參　竹瀝　無質火

熱　黃連　荊芥　薄荷　硝石

右爲細末用童汁調噙

口瘡

血虛　四物湯中加竹瀝

服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上無制用理中湯甚者加附子　或噙官桂亦可

又方用西瓜漿水口痛甚者以此徐徐飲之冬月紫榴皮燒灰噙之

酒皶鼻　血熱入肺

四物湯加陳皮紅花酒炒黃芩煎入好酒數滴就炒五靈脂末服效　又用桐油入黃連以天甲藤燒油熱傳之

肺癰

已破入風者不治 搜風湯吐之 出醫壘元戎

收斂瘡口止有合懽樹皮白斂煎湯飲之

肺瘻

專主養肺養血養氣清金

天疱瘡

通聖散及蚯蚓泥晷灰蜜調傅之妙

從肚皮上起者裏發外還服通聖散可也

漏瘡

須先服補藥以生氣血即參芪木歸芍爲主大劑

服之外以附子末唾和作餅如錢厚以艾炷灸之漏大艾炷亦大漏小艾炷亦小但灸令微熱不可令痛乾則易之乾研爲末再和再灸如囚平爲効亦有用則止來日如前法再灸直至囚平爲効亦有用附片灸仍前氣血藥作膏藥貼之

痔漏

用五倍子朴硝桑寄生蓮房煎湯先薰後洗腫者

用木鱉子五倍子研細末調傅

漏專以凉藥爲主

痔漏方

人參　黃芪　當歸　川芎　升麻　枳殼
條芩　槐角

腸癰

作濕熱食積治　入風難治
治漏外塞藥　蘆甘石小便煖　牡礪粉

結核

或在頸在項在身在臂如腫毒者多疼注作核不
散治耳後項門各一顆
僵蠶炒　青黛　膽星　酒大黃
右爲末蜜丸嚼化之

頸頰下生瘰核

二陳湯加炒大黃　連翹　桔梗　柴胡

治臂核作痛

連翹　防風　川芎　酒芩　蒼术　皂角刺

治還跳穴痛防生附骨癰方

以蒼术佐黃柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏
月加條芩體虛者加土牛膝以生甘草爲
使大料煎入生薑汁帶辣食前飲之病甚者加
黃柏桂枝十數貼發不動少加大黃一兩貼承
不動者恐癰將成矣急搬地成坑以火煆紅沃

以小便赤體坐其上以被蓋圍抱下體伏熱氣薰蒸腠理開血氣暢而愈

脫肛

氣熱　氣虛

氣虛補氣用人參　當歸　黃芪　川芎

升麻

血虛者四物湯加黃柏炒

血熱者涼血四物湯加黃柏炒

經水不調不孕

丹溪先生金匱鈎玄卷之三

入戴元禮錄　明新安吳勉學校正

婦人科

經水經候過期而作疼者乃虛中有熱所以作疼

經水不及期血熱也四物湯加黃連

經候將來而作疼者血實也

桃仁　香附

黃連

過期乃血火也

川芎　當歸　帶人參白朮與疼藥

過期紫黑色有塊血熱也必作痛

四物湯加　黃連　香附

淡色過期者乃痰多也

二陳湯加　川芎　當歸

紫色成塊者乃是熱也四物湯加黃連之類

痰多占住血海地位因而下多者目必漸昏肥人

如此

南星　蒼朮　香附　川芎　作丸服

肥人不及日數而多者痰多血虛有熱前方加黃

連白朮若血枯經閉者四物湯加桃仁紅花

軀肥脂滿經閉者導痰湯加芎連不可服地黃泥

膈故也如用以生薑汁炒

血崩

崩之爲病乃血之大下豈可爲寒但血去後其人

必虛當大補氣血

東垣有治法但不言熱其主於寒學者宜再思之

急則治其標白芷湯調百草霜

甚者棕櫚皮灰後用四物湯加乾薑調理

因勞者用參芪帶升補藥

因寒者加乾薑　因熱者加黃芩參芪

崩過多者先服五靈脂末一服當分寒熱五靈脂

能行能止婦人血崩用白芷香附爲丸
白帶用椒目末又用白芷末
一方用生狗頭骨燒灰存性或酒調服或入藥服之
又方用五靈脂半生半熟爲末以酒調服
氣虛血虛者皆於四物湯加人參黃芪
漏下乃熟而虛者四物湯加黃連
帶下赤白 赤屬血 白屬氣 主治燥濕爲先
帶漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱宜升無人知
此肥人多是濕痰

海石 半夏 南星 蒼术 川芎 椿皮
黃柏
瘦人帶病少如有帶者是熱也
黃柏 滑石 川芎 椿皮 海石
甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加蒼术白
术仍用丸子 一本作龍子
又云赤白帶皆屬於熱出於大腸小腸之分
一方黃荆子炒焦爲末米飲湯下治白帶亦治心
痛
羅先生治法或十棗湯或神祐丸或玉燭散皆可

用不可峻攻實者可用此法虛則不宜
血虛者加減四物湯
氣虛者以參朮陳皮間與之
濕甚者用固腸丸
相火動者於諸藥中加火炒栢
滑者加龍骨赤石脂
滯者加萎花性燥者加黃連
寒月火人喜附臨機應變必須斷厚味
良薑　芍藥　黃柏二錢各　燒灰　入椿樹皮末一兩半
右爲末粥爲丸每服三四十丸

痰氣帶下者
蒼朮　香附　滑石　蛤粉　半夏　茯苓
婦人上有頭風鼻淵下有白帶
南星　蒼朮　黃柏炒焦　滑石　半夏
川芎　辛夷　牡蠣粉炒　茯苓
白帶兼痛風
半夏　茯苓　川芎　陳皮　甘草　蒼朮炒浸
南星　牛膝　黃柏　酒浸晒乾炒
子嗣
肥盛婦人不能孕育者以其身中脂膜閉塞子宮

而致經事不能行可用導痰湯之類

瘦怯婦人不能孕育者以子宮無血精氣不聚故也可用四物湯養血養陰等藥

產前胎動

孕婦人因火動胎逆上作喘者急用條黃芩香附之類將條芩更於水中沉取重者用之

固胎

地黃半錢　人參　白芍各一錢　白朮一錢半

川芎　歸身尾一錢　陳皮一錢　甘草二錢

糯米一十四粒　黃連些小　黃栢些小

桑上羊兒藤七葉完者

右㕮咀煎湯服之

血虛不安者用阿膠　痛者縮砂行氣故也

一切病不可表

惡阻　從痰治

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者有痰瘦者有熱多用二陳湯

或白朮爲末水先隨所好或湯或水下

婦人懷姙愛物乃一藏之虛假如肝藏虛其肝氣止能生胎無餘物也

血塊死血食積痰飲成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜
眩暈身熱時作時止

黃連一兩一半用茱炒去茱　山梔半兩炒
黃一半益智炒去益智
白芍半兩　香附一兩用童便浸　蘿蔔子一兩半炒
山查一兩二錢　青皮　神麴各半兩
莪朮半兩用米醋煮　桃仁半兩留尖去皮
白芥子一兩半炒　香附四兩醋煮　无龍子消血塊
爲末作丸子服之

婦人血塊如盤有孕難服峻削

桃仁一兩去尖皮　海石一兩醋煮　白朮一兩
香附四兩醋煮

爲末神麴爲丸

束胎

束胎丸第八箇月服

黃芩酒炒夏用一兩秋用七錢半　茯苓七錢半
陳皮二兩忌火　白朮二兩粥爲丸

束胎散即達生散

人參半錢　陳皮半錢　白朮　白芍
歸身屋各一錢　甘草二錢炙　大腹皮三錢
紫蘇半錢

或加枳殼砂仁作一貼入青葱五葉黃楊木葉稍

十箇煎待於八九箇月服十數貼甚得力或夏加黃芩冬不必加春加川芎或有別證以意消息

第九箇月服

黃芩一兩　酒炒宜熱藥不宜
涼藥怯弱人減半
枳殼七錢半　臨月十日前小便多時減此一味
炒滑石

右爲末粥爲丸如梧桐子大每服三十丸空心熱湯下不可多恐損元氣

安胎

白朮　黃芩　炒麵　粥爲丸

黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行縮砂安胎治痛行氣故也

益母草即茺蔚子治產前產後諸病能行血養血

難產作膏　地黃膏　牛膝膏

胎漏　氣虛　血虛　血熱

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下也

子腫　濕多

戴云子腫者謂孕婦手足或頭面通身浮腫者是也用山梔炒一合米飲湯吞下　三因方中有鯉魚湯

難產

難產之由亦是八九箇月內不謹者氣血虛故亦有氣血凝滯而不能轉運者

催生方

白芷灰　滑石　百草霜

右爲末苧歸湯或葳蕤汁調服之

治胎衣不下

婦人大全方別有治法

產後　血暈一虛火載血漸漸暈來

用鹿角燒灰童火等研爲極細末以好酒調灌下即醒行血極快也

又方用韭葉細切盛於有嘴瓶中以熱醋沃之急封其口以嘴塞產鼻中可愈眩暈

產後補虛

人參　白朮各二錢　黃芩　陳皮

川芎各半錢　歸身尾半錢　甘草一錢炙　有熱加

生薑三錢　茯苓一錢

必用大補氣血雖有雜證以末治之

當清熱補血氣

消血塊

滑石二錢　沒藥一錢　麒麟竭一錢　無則用

牡丹皮　爲末醋糊作丸

无龍子能消血塊

泄

川芎　黃芩　白术　茯苓　乾薑　滑石

白芍炒　陳皮　吳茱萸煎湯服

惡露不盡

謂產後敗血所去不盡在小腹作痛

五靈脂　香附末　蛤粉　醋丸　甚者入

桃仁不去尖

如惡血不下以五靈脂爲末神麴糊丸白术陳皮

湯下

中風

不可作風治切不可以小續命湯服之必大補氣

血然後治療當以左右手脉分其氣血多少而

治

口眼喎斜不可服小續命湯

發熱惡寒

大發熱必用乾薑輕用茯苓滲滲其熱一應苦寒

熱發表藥皆不可用也

纔見身熱便不可表發熱惡寒皆是氣血
左手脉不足補血藥多於補氣藥
右手脉不足補氣藥多於補血藥
惡寒發熱腹滿者當去惡血脉滿者不是腹痛者
是
產後不可下白芍以其酸寒伐生發之氣故也
產後一切病皆不可發散
小兒科
小兒食積痰熱傷乳爲病大槩肝與脾病多
小兒汗病多及大人亦然肝只是有餘腎只是不
足
吐瀉黃疸
三稜　莪朮　陳皮　青皮　神麴　麥芽
甘草　白朮　茯苓　黃連　右爲末水調服
傷乳吐瀉者加山查　時氣吐瀉者加滑石　發
熱者加薄荷
吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用
急慢驚風
發熱　口瘡　手心伏熱　痰熱　痰喘
痰嗽

並用通法重則用瓜蒂散輕則用苦參赤小豆末
須酸苞汁調服吐之後用通聖散蜜丸服之
驚有二證一者熱痰主急驚當直瀉之一者脾虛
乃爲慢驚所主多死當養脾
東垣云慢驚者先實脾土後散風邪
急者只用降火下痰養血
慢者只用硃砂安神丸更於血藥中求之
黑龍丸
牛膽南星　礬石各一兩焙硝
青黛各半兩　麝香二兩硃砂三錢
等分　天竺黃
糊丸　麝香五分

蜈蚣二錢半
燒存性
右爲細末煎甘草湯膏丸如鷄頭大每服一丸
或二丸急驚薄荷湯下慢驚桔梗白朮湯下

神聖牛黃奪命散
檳榔半兩　木香三錢　大黃二兩麪裹煨熟
爲末
白牽牛一兩一半生用　半炒　黑牽牛粗末一半生用
半炒用
蜜漿水調下不拘時候微利爲度

痘病

胡黃連丸

胡黃連半錢去苗　阿膠一錢半醋煮　麝香四粒
果積　　去肉積
神麴二錢半去食積　黃連二錢半炒去熱積

右爲末猪膽汁丸如黍米大每服二十丸白术湯下

小兒疳病腹大胡黃連丸二十丸白术湯下

瘡瘡　分氣虛血虛補之

氣虛用人參白术加解毒藥

但見紅點便忌升麻葛根湯發得表虛也

吐瀉少食爲裏虛不吐瀉能食爲實

裏實而補則結靡疼

陷伏倒靨灰白爲表虛或用燒人尿黑陷甚者燒人尿紅活綻凸爲表實而復用表藥則要潰爛

不結痂二者俱見爲表裏俱虛

瘡瘡或初出或未出時人有患者宜頓服此藥多者合少重者合輕方用絲瓜近蒂三寸連瓜子皮燒灰存性爲末砂糖拌喫入硃砂末亦可

解瘡毒藥

絲瓜　升麻　酒芍藥　甘草生用　糖毬

黑豆　犀角　赤小豆

解瘡瘡法已出未出皆可用硃砂爲末以蜜水調

服多者可減少者可無

腹脹

蘿蔔子蒸紫蘇梗　陳皮　乾薑各等分

甘草減半　食減者加白朮煎服

夜啼

人參一錢半　黃連一錢半　甘草半錢　竹葉二十片

作二服加薑一片煎服之

口瘡

戴云謂滿口生瘡者便是　江茶粉草傅之

又方苦參黃丹五倍子青黛各等分傅之

脫囊腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說

木通　甘草　黃連　當歸　黃芩　煎服

脫囊紫蘇葉爲末水調傅上荷葉裹之

脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

東北方陳壁上土湯泡先薰後洗亦可用脫囊藥服之

木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又言重舌者亦是

此類二者蓋是熱病用
百草霜　滑石　芒硝　爲末酒調敷

癮疹　黑斑　紅斑　瘡癢
用通聖散調服

咯紅
戴云咯紅者卽唾肉有血非吐血與咳血
黑豆　甘草　陳皮　煎服

噦泥　胃熱故也
軟石膏　甘草　黃芩　陳皮　茯苓
白朮　煎服

痢疾　食積
黃芩　黃連　甘草　煎服
赤痢加紅花桃仁　白痢加滑石末

食積痢
炒麴　蒼朮　滑石　芍藥　黃芩　白朮
甘草　陳皮　茯苓　右㕮咀煎下保和丸

解顱
乃是毋氣虛與熱多耳
戴云卽初生小兒頭上骨未合而開者右以四君子湯四物湯有熱加酒芩炒黃連生甘草煎服外

以帛束緊用白蘞末敷之

蚣虫

練樹根爲君佐以二味陳湯煎服

噤

鬱金　蒸蘆　瓜蒂　爲末搐鼻

風痰

南星半兩入器中水高一指浸晒乾研細末
切

白附子一兩用飛白麪爲丸如雞頭大每服一

九或二九薑蜜薄荷湯化下服之

頭頭

用紅炭炷長流水令熱洗之又服酒製通聖散除

大黃酒炒外以胡葽子伏龍肝懸龍尾黃連白

礬爲末調敷

又方

松樹厚皮燒灰一兩白膠香熬沸傾石上二兩

黃丹一兩飛白礬半兩火飛　軟石膏一兩

黃連半兩大黃五錢輕粉四盞

右極細末熬熟油調敷瘡上須先洗了瘡口敷

乃佳

赤瘤

生地黃　木通　荊芥
苦藥帶表之類用巴蕉油塗患處
鼻赤
雄黃　黃丹　同敷
一小兒好喫粽成腹痛
黃連　白酒藥
爲末調服乃愈

火豈君相五志俱有論
火之爲病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚暴
何者蓋能燔灼焚焰飛走狂越消爍於物莫能禦之
遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相
火也猶龍火也火性不妄動能不違道於常以稟位
聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動
少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火龍火一
妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移他經事非細
故動之極也病則死矣經所以謂一水不勝二火之
火出於天造君相之外又有厥陰藏府之火根於五

志之內六欲七情激之其火隨起大怒則火起於肝
醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火
起於肺心爲君主自焚則死矣丹溪又啓火出五藏
主病曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸痛瘡瘍屬於
心火之用也諸氣膹鬱屬於肺火之升也諸濕腫滿
屬於脾火之勝也經所謂一水不勝五火之火出目
人爲又考內經病機一十九條內舉屬火者五諸熱
瞀瘈皆屬於火諸躁狂越皆屬於火諸病跗腫疼
逆上皆屬於火諸躁擾狂越皆屬於火諸病跗腫疼
瘡驚駭皆屬於火而河間又廣其說火之致病者甚

多深契內經之意曰喘嘔吐酸暴痒下迫轉筋小便
渾濁腹脹大竅之有聲癰疽瘡疹瘤氣結核吐下霍
亂脊強腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰
慄驚惑悲笑譫妄衄衊失血污之病皆少陰君火之火
乃眞心小腸之氣所爲也若瘡瘍冒昧躁擾狂
越罵詈驚駭跗腫疫疹氣逆上衝禁慄如喪神守噎
嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔湧溢食不下目眛不明暴
注瞤瘈暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心包絡三
焦之氣所爲也是皆火之變見於諸病也謂爲脉虛
則浮大實則洪數藥之所主各因其屬君火者心火

也可以濕伏可以水減可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以濕折之從其性而伏之與柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實端不可不察以臟氣司之如黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立爲陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽彊相火熾盛以乘陰位日漸煎熬爲火虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實爲陽彊之病以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷其陰失守無根少火爲虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰爲陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土爲火鬱之病以升散之劑發之如升麻乾葛葉胡防風之屬不明諸此之類而求火之爲病施治何所依據故於諸經集略其說畧備處方之用庶免實實虛虛之禍也

氣屬陽動作火論

捍衛冲和不息之謂氣擾亂妄動變常之謂火當其

和平之時外護其表復行於裏周流一身循環無端出入升降繼而有常源出中焦總統於肺氣昌當病於人也及其七情之交攻五志之間發乖戾失常清者遽變之爲濁行者抑遏而反化失衛護而不和內失健悍而少降營運漸遲肺失主持妄動不已五志厥陽之火起焉上燔于肺氣乃病焉何者氣本屬陽反勝則爲火矣河間曰五志過極則爲火也何後世不本此議而一槩類聚香辛燥熱之劑氣作寒治所據何理且言七氣湯製作其用青皮陳皮三稜蓬术益智官桂甘草遂以爲平和可常用通治七情所傷混同一意未喻其藥以治眞氣以下諸氣尤有甚焉者茲不復叙況所居之情各不同且夫經言九氣之變未嘗略而不詳如怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結其言治法高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之驚者平之勞者温之結者散之喜者以恐升之悲者以喜勝之九氣之治各有分別何嘗混作寒治論而類聚香熱之藥通言而治諸氣豈理之謂歟若香辛燥熱之劑但可劫滯氣衝快於一時以其氣久抑滯借此暫行開發之意藥中無佐使制

伏所起之氣服之甚則增熾欝火蒸薰氣液而成積
自積滋長而成痰一飲下膈氣乃氳氳清虛之象若
霧露之着物雖滯易散內挾痰積開而復結服之日
久安有虛實而不動氣動而不散者乎此皆人所受
誤之由習俗已久相沿而化卒莫能救升發太過香
辛散氣燥熱傷氣眞氣耗散濁氣上騰猶曰腎虛不
能攝氣歸原遂與蘇子降氣湯四磨湯下黑鉛丹養
氣丹鎮墜上升之氣且硫黃黑錫佐以香熱又無補
養之性籍此果能生氣而補腎乎請熟詳之夫濕痰
盛甚者亦或當之初服未顯增變由其喜墜而愈進

形質弱者何以收救不悟肺受火炎子氣亦弱降令
不行火無以制相扇而動本勢空虛命絕如縷積而
至深丹毒濟火一旦火氣狂散喘息奔急而死所以
有形丹石无藥重墜無形之氣其氣將何抵受隨而
降之乎譬以石投水水固未嘗沉也豈不死歟丹溪
有曰上升之氣自肝而出中挾相火其熱愈甚自覺
無冷非眞冷也火熱似水積熱之甚陽亢陰微故有
此證認假作眞似是之禍可勝言哉內經雖云百病
皆生於氣以正氣受邪之不一也今七情傷氣欝結
不舒痞悶壅塞發爲諸病當詳所起之因滯於何經

有上下部分藏氣之不同隨經用藥有寒熱温凉之同異若枳殼利肺氣多服損胃中至高之氣青皮瀉肝氣多服損眞氣與夫木香之行中下焦氣香附之快滯氣陳皮之泄氣霍香之馨香上行胃氣紫蘇之散表氣厚朴之瀉衛氣檳榔之瀉至高之氣沉香之升降其氣腦麝之散眞氣若此之類氣實可宜其中有行散者有損泄者其過劑乎用之能却氣之標而不能治氣之本豈可又佐以燥熱之藥以火濟火混同謂治諸氣使之常服多服可乎氣之與火一理而已動靜之變反化爲二氣作火論治與病情相得丹溪發揮論云冷生氣者出於高陽生之謬言也自非身受寒氣口食寒物而足論寒者吾恐十之無一二也

血屬陰難成易虧論

内經曰榮者水穀之精也和調五藏洒陳於六腑乃能入於脉也源源而來生化於脾總統於心藏於脾肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步藏得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脉少則濇充則

實常以飲食日滋故能陽生陰長液汗變化而赤爲
血也生化旺則諸經恃此而長養衰耗竭則百脉由
此而空虛可不謹養哉故曰血者神氣也持之則存
失之則亡是知血盛則形盛血弱則形衰神靜則陰
生形役則陽亢陽盛則陰必衰又何言陽旺而生陰
血也蓋謂血氣之常陰從乎陽隨氣運行於內而無
陰以羈束則氣何以樹立故其致病也易而調治也
難以其比陽常虧而又損之則陽易亢陰易乏之論
可以見矣諸經有云陽道實陰道虛陽道常饒陰道
常乏陽常有餘陰常不足以人之生也年至十四而

經行至四十九而經斷可見陰血之難成易虧知此
陰氣一虧傷所變之證亦妄行於上則吐衄衰涸於外
則虛勞妄返於下則便紅稍血熱則膀胱瘈閉溺血
滲透腸間則爲腸風陰虛陽搏則爲崩中濕蒸熱瘀
則爲滯下熱極腐化則爲膿血火極似水血色紫黑
熱盛於陰發於瘡瘍濕滯於血則爲痛癢癮疹皮膚
則爲冷痺畜之在上則人喜忘畜之在下則爲喜狂
墮恐跌仆則瘀惡內凝若分部位身半已上同天之
陽身半已下同地之陰此特舉其所顯之證者治血
必血屬之藥欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證

輔佐謂之六合湯者詳言之矣余故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中之氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生眞陰之虛也當歸分三治血中主藥通腎經性味辛温全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能和血氣腹痛也若求陰藥而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當從長沙血虛之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨經以人參補之陽旺則生陰血也若四物者獨能主血損益損其一二味之所宜爲主治可也此特論血病

分受傷爲氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇子血竭牡丹皮者血崩所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棡灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜蒐蘿瓊陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾薑桂者血寒所宜生地黃苦參血熱所宜此特取其正治之大略耳以其觸類而長可謂無窮之應變矣

滯下辯論

滯下之病嘗見世方以赤白而分寒熱妄用兇澁燥劑止之或言積滯而用巴硇尤藥攻之或指濕熱而

與淡滲之劑利之一偏之誤可不明辯乎謹按原病式所論赤白同於一理反復陳喻但不熟察耳果腸胃積滯不行法當辛苦寒涼藥推陳致新蕩滌而去不宜巴硇毒熱下之否則鬱結轉甚而病變危者有之矣若瀉痢不分兩證混言濕熱不利小便非其治也夫泄者水穀濕之象滯下者垢瘀之物同於濕熱而成治分兩岐而藥亦異若淡滲之劑功能散利水道濁流得快使泄自止此有無之形豈可與滯下混同論治而用導滯行積可乎其下痢出於大腸傳送之道了不干於腎氣所下有形之物或如魚腦或下

如豆汁或便白膿或下純血或赤或白或赤白相雜若此者豈可與瀉混同論治而用淡滲利之可乎嘗原其本皆由腸胃日受飲食之積餘不盡行留滯於內濕蒸熱瘀鬱結日深伏而不作時逢炎暑不行相火司令又調攝失宜復感酷熱之毒至秋陽氣始收火氣下降蒸發畜積而滯滯行故名之曰滯下其濕熱瘀積干於血分則赤干於氣分則白赤白兼下氣血俱受邪矣又而不愈氣血不運脾積不磨陳積脫滑下疑猶若魚腦矣甚則腸胃空虛關司失守濁液并流色非一類錯雜混下

注出狀如苣汁矣若脾氣下陷虛坐努責便出色如白膿矣其熱傷血深濕毒相瘀粘結紫色則紫黑矣其污濁積而欲出氣滯而不與之出所以下迫窘痛後重裏急至圊而不能便總行頻併亦少乍止乍起而不安此皆大腸經有所壅遏窒碍氣液不得宣通故也衆言難處何法則可求之長沙論云利之可下宜下腹痛則宜和身重則宜温脉弦則去風膿血粘稠以重藥竭之身冷自汗以重藥温之風邪内束宜汗之豬瀦爲痢當温之在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者内疎之小便澁者分利之用藥輕重之别又加詳載行血則便膿自愈調氣則後重自除治實治虛之要論而丹溪又謂大虛大寒者其治驗備載局方發揮觀此治法豈可膠柱而調瑟又有胃弱而閉不食此名禁口痢病七方未有詳論者以内經大法推之内格嘔逆火起炎上之象究乎此則胃虛木火乘之是土敗木賊也見此多成危候

三消之疾燥熱勝陰

嘗讀劉河間先生三消之論始言天地六氣五味以配養人身六味五藏而究乎萬物之源終引內經論渴諸證以辯乎世方熱藥之悞此比物立象反復詳明非深達陰陽造化之機者孰能如是邪請陳其略夫經中有言心肺氣厥而渴者有言脾痺而渴者有因小腸胃與大腸結熱而渴者有因小腸痺熱而渴者有因肥甘而食渴者有因醉飽入房而渴者有因遠行勞倦遇天熱而渴者有因傷害胃乾而渴者有因腎熱而渴者有因痛風而渴者雖五藏之部分不同而病之所遇各異其爲燥熱之疾一也三消之熱本濕寒之陰氣衰燥熱之陽氣大甚皆因乎飲食之餌失節腸胃乾涸而氣液不得宣平或耗亂精神過違其度或因大病陰氣損而血液衰虛陽氣悍而燥熱鬱甚或因久嗜醎物恣食炙煿飲食過度亦有年少服金石石散積久實熱結於下焦虛熱血氣不能制實熱燥甚於腎故渴而不飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消此三消者其燥熱同也故治疾者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除

腸胃燥熱不甚濟一身津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澁則病日已矣豈不以滋潤之劑養陰以制燥滋水而充液哉何故泄漏消渴多者不知其書謂因下部腎水虛不能制其上焦心火使上實熱而多煩渴下虛冷而多小便若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火尤難治也但以暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦心火則自然渴止小便如常而病愈也吁若此未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則爲熱心火屬陽而本熱虛則爲寒若腎水陰虛則心火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱矣以彼人言但見消渴數溲妄言爲下部寒爾豈知腸胃燥熱佛鬱使之然也且夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水今腎水既不能勝心火則上下俱熱奈何以熱養腎水欲令勝心火豈不闇哉彼不謂水氣實者必能制火虛則不能制火故陽實陰虛而熱燥其液小便淋而常火陰實陽虛不能制水小便利而常多此又不知消渴小便多者蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外以養乎百骸故腸胃之外燥熱太甚雖

多飲水入於腸胃之內終不能浸潤於外故渴不止而小便多水液既不能滲泄浸潤於外則陰燥竭而無以自養故久而多變爲聾盲瘡瘍痤痱之類而危始其爲燥熱傷陰也明矣

泄瀉從濕治有多法

泄瀉者水瀉所爲也由濕本土土乃脾胃之氣也得此證者或因於內傷或感於外邪皆能動乎脾濕脾病則升舉之氣下陷濕變注并出大腸之道以胃與大腸同乎陽明一經也云濕可成泄聖教治濕大意而言後世方論泥云治濕不利小便非其治也故凡泄瀉之藥多用淡滲之劑利之下久不止不分所得之因遽以爲寒而用緊澁熱藥兇之夫泄有五殘泄者水穀不化而完出濕兼風也溏泄者所下澄徹清冷小便清白濕兼寒也濡泄者體重軟弱泄下多水濕自甚也滑泄者久下不能禁固濕勝氣脫也若此有寒熱虛實之不同舉治不可執一而言謹書數法于後夫泄有宜汗解者經言春傷於風夏必飧泄又云久風爲飧泄若保命集云用蒼术麻黃防風之屬是也有宜下而保安者若長沙言下痢脈滑而數者有宿食也當下之

下利已差至其時復發者此爲下未盡更下之安悉用大承氣湯加減之劑有宜化而得安者格致餘論夏月患泄百方不効視之久病而神亦瘁小便少而赤脉滑而頗弦格悶食減因悟此久積所爲積濕成痰留於肺中宜大腸之不固也清其源則流自清以菜萸等作湯温服一碗許探喉中一吐痰半升如利減半次早晨飲吐半升而利止有以補養而愈者若脾胃論言脉弦氣弱自汗四肢發熱大便泄瀉從黄芪建中湯有宜調和脾濕而得止者若潔古言曰四肢懶倦小便不利大便走泄沉困飲食減少以白术

芍藥茯苓加減治之有宜升舉而安者若試効方言胃中濕脾弱不能運行食下則爲泄助甲膽風勝以尅之以升陽之藥羌活獨活升麻防風炙甘草之屬有宜燥濕而後除者若脾胃論言上濕有餘脉緩怠惰嗜卧四肢不收大便泄瀉從平胃散有宜寒凉而愈者若長沙言協熱自利者黄芩湯主之舉其濕熱之相宜者若長沙言下利脉遲緊痛未欲止當温之下利心痛急當救裏下利清白水液澄徹可與理中四逆湯輩究其利小便不利者可與五苓散益元散分導之以其收泄小便不利之相宜者可間言濕勝則濡

斂之相宜者東垣言寒滑氣泄不固製訶子散澁之
以上諸法各有所主宜獨利小便而濕動也豈獨病
因寒必待龍骨石脂縣重燥毒之屬澁之治者又當
審擇其說一途取利約而不博可乎