

宋刻錢氏小兒藥證

上卷

秘本不借

錢村寶藏書

慈幼無量

醫家類

嬰童至寶

宋刻錢氏小兒藥證直訣上



前後共抄補五十餘頁而闕序獨完良足珍愛因將近
時翻刻本補闕訂訛以資省覽仍以此帙歸之
芙川并識數語於卷端 研芬揚希銓

錢氏小兒藥證目錄卷上

直設序

脉證治法

小兒脉法

五藏所主

肝外生感風

肺熱

肺虛熱

變蒸

五藏病

肝熱

肺盛復有風冷

肺藏怯

心熱

心實

腎虛

面上證

目內證

肝病勝肺

肝病勝肝

肝有風

肝有熱

肝有風甚

驚癇發搐

早晨發搐

日午發搐

日晚發搐

夜間發搐

傷風後發搐

傷食後發搐

百日内發搐

急驚

慢驚

五癇

瘡疹候

傷風

傷風手足冷

傷風自利

傷風腹脹

傷風兼藏

傷風下後餘熱

傷寒瘡疹同異

初生三日內吐瀉壯熱

初生三日已上至十日吐瀉身溫涼

初生下吐

傷風吐瀉身溫

傷風吐瀉身熱

傷風吐瀉身涼

風溫等熱相似

腎怯失音相似

黃相似

夏秋吐瀉

吐乳

虛羸

咳嗽

諸疳

胃氣不和

胃冷虛

積痛

心痛

腹痛附

虫與癰相似

氣不和

食不消

腹中有癖

虛實腹脹

腫附

喜汗

盜汗

夜啼

驚啼

弄舌

丹瘤

鮮顱

六陽虛汗

胃怯汗

胃啼

胎肥

胎怯

胎熱

急欲乳不能食

龜背龜骨

腫病

五藏相勝輕重

雜病證

不治證

卷中

記嘗所治病二十三證

錢氏小兒藥證直訣目錄下

大青膏

涼驚圓

粉紅圓

又名溫發馬元

瀉青圓

又名

地黃圓

瀉白散

又名

阿膠散

又名補肺散

導赤散

益黃散

瀉黃散

白朮散

塗頤法

浴體法

安神圓

當歸圓

瀉心湯

生犀散

白餅子

又名玉餅子

刺鴛圓

括蕒湯

五色圓

調中圓

塌氣圓

木香圓

胡黃連圓

蘭香散

白粉散

消積圓

安聖散

紫霜圓

止汗散

香薷圓

花火膏

白玉散

牛黃膏

牛黃圓

玉露散

一名甘露散

百祥圓

一名南陽圓

牛李膏

一名心勝膏

宣風散

麝香圓

大惺惺圓

小惺惺圓

銀砂圓

蛇黃圓

三聖圓

小青圓

小紅圓

小黃圓

鐵粉圓

銀液圓

鎮心圓

金箔圓

辰砂圓

剪刀股圓

麝蟾圓

軟金丹

桃枝圓

蟬花散

釣藤飲子

抱龍圓

豆卷散

龍腦散

治虛風方

又方

施銀圓

牛黃膏

五福化毒丹

羌活膏

郁李仁圓

犀角圓

異功散

麝香散

如聖圓

白附子香連圓

豆蔻香連圓

小香連圓

二聖圓

沒石子圓

當歸散

溫白圓

豆蔻散

溫中圓

胡黃連麝香圓

大胡黃連圓

掄仁圓

大蘆薈圓

龍骨散

橘連圓

龍粉圓

香銀圓

金華散

安虫圓

燕蕒散

膽礬圓

真珠圓

消堅圓

百部圓

紫草散

秦艽散

地骨皮散

人參生犀散

三黃圓

治顛開不合

黃耆散

虎杖散

捻頭散

羊肝散

蟬蛻散

烏藥散

二氣散

葶藶圓

麻黃湯

生犀磨汁

大黃圓

史君子圓

青金丹

燒青圓

敗毒散

錢氏小兒藥證目錄卷下終

附方目錄

閻孝忠

治小兒急慢驚

治小兒吐瀉

金液丹治小兒吐瀉虛極

驚風或洩瀉等

治小兒急驚方搐

治急慢驚

治小兒實熱踈轉

治小兒驚風痰熱

治小兒瘡疹傷食相似

治小兒瘡疹

治小兒脾胃虛弱

小兒治法

藥方

升麻葛根湯

惺惺散

消毒散

黃蘗膏

胡荽酒

四聖散

又方藍根散

治瘡疹倒靨黑陷

又方

治伏熱在心或悞服熱藥

甘露飲子

白虎湯

調肝散

治瘡疹入眼

治瘡疹入眼成翳

又方

治口瘡

治癰耳

治畜熱

治虫咬心痛

治脾胃虛寒吐瀉冷痰

治外腎腫硬成疔 鈎藤膏

魏香散

地黃散

治熱痢下血

菖蒲圓

鷄頭圓

羚羊角圓

全蝎散

和中散

紫蘇子散

赤石脂散

藥墨散

至寶丹

紫雪

理中圓

五苓散

附子理中圓

金液丹

又方

青州白圓子

小柴胡湯

錢仲陽傳

無爲軍新刊錢氏方後序

附方目錄卷終

錢氏小兒藥證直訣序



醫之爲藝誠難矣而治小兒爲尤難自六
歲以下黃帝不載其說中古以還始有顧
頤經以占壽夭死生之候則小兒之病雖
黃帝猶難之其難一也脉法雖曰八至爲
和平十至爲有病然小兒脉微難見醫爲
持脉又多驚啼而不得其審其難二也脉
旣難憑必資外證而其骨氣未成形

正悲啼喜笑變態不常其難三也問：

之醫之工也而小兒多未能言言亦未足
取信其難四也藏府柔弱易虛易實易寒
易熱又所用多犀珠龍麝醫苟難辦何以
已疾其難五也種種隱奧其難固多余嘗
致思于此又目見庸醫妄施方藥而殺之
者十常四五良可哀也蓋小兒治法散在
諸書又多出于近世臆說汗漫難據求其

要妙豈易得哉太醫丞錢乙字仲陽汶上
人其治小兒該括古今又多自得傑出一
時其法簡易精審如指諸掌先子治平中
登第調須城尉識之余五六歲時病驚疳
癖癰屢至危殆皆仲陽拯之良愈是時仲
陽年尚少不肯輕傳其書余家所傳者纔
十餘方耳大觀初余筮仕汝海而仲陽老
矣於親舊間始得說證數十條後六

得雜方蓋晚年所得益妙比於京師
別本然旋著旋傳皆雜亂初無紀律互有
得失因得參校焉其先後則次之重複則
削之訛謬則正之俚語則易之上卷脉證
治法中卷記嘗所治病下卷諸方而書以
全於是古今治小兒之法不可以有加矣
余念博愛者仁者之用心幼幼者聖人之
遺訓此惠可不廣耶因復取所自著小兒

說及平日經驗方附其後將傳之好事者
使幼者免橫夭之苦老者無哭子之悲此
余之志也因以明仲陽之術於無窮宣和
元年四月初吉宣教郎幹當在京諸司專
勾司大梁閻孝忠序

此序
時傳抄
本使



卷八



錢氏小兒藥證直訣上

閻孝忠集

脉證治法

小兒脉法

脉亂不治 氣不和弦急 傷食沉緩

虛驚促急 風浮

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五藏六府成而

錢氏小兒藥證直訣上

閻孝忠集

脉證治法

小兒脉法

脉亂不治 氣不和弦急 傷食沉緩

虛驚促急 風浮

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五藏六府成而

未全自生之後即長骨脉五藏六府之神
智也變者易也

榮源太上
多變氣

又生變蒸者自內

而長自下而上又身熱故以生之日後三
十二日一變變每畢即情性有異於前何
者長生府藏智意故也何謂三十二日長
骨添精神人有三百六十骨除手足中四
十五碎骨外有三百二十數自生下骨一
日十段而上之十日百段三十二日計三

百二十段爲一遍亦曰一蒸骨之餘氣自
腦分入髓中作三十二齒而齒牙有不及
三十二數者由變不足其常也或二十八
日即至長二十八齒已下做此但不過三
十二之數也凡一周遍乃發虛熱諸病如
是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨
氣乃全而未壯也故初三十二日一變生
腎生志六十四日再變生膀胱其發耳與

散冷腎與膀胱俱主於水水數一故先變
生之九十六日三變生心喜一百二十八
日四變生小腸其發汗出而微驚心爲火
火數二一百六十日五變生肝哭一百九
十二日六變生膽其發目不開而赤肝主
木木數三二百二十四日七變生肺聲二
百五十八日八變生大腸其發膚熱而汗
或不汗肺屬金金數四二百八十八日九

變生脾智三百二十日十變生胃其發不
食腸痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒
故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於
十變後六十四日長其經脉手足受血故
能持物足立能行也經云變且蒸謂蒸畢
而足一歲之日也師曰不汗而熱者發其
汗大吐者微下不可餘治是以小兒須變
蒸蛻齒者如花之易苗所謂不及三十二

齒由變之不及齒當與變日相合也年壯而視齒方明

五藏所主

心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則卧而悸動不安

肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛則前牙多欠氣熱則外生氣溫則內生

脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風

肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虛則哽氣長出氣

腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷

更當別虛實證假如肺病又見肝證前牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目直大叫哭項急頓悶者難治蓋肺久病則虛冷肝強實而反勝肺也視病之新久虛實虛則補母實則瀉子

五藏病

肝病哭叫目直呵欠頓悶項急

心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水

脾病困睡洩瀉不思飲食

肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急

腎病無精光畏明體骨重

肝外生感風

呵欠頓悶口中氣熱當發散大青膏主之若

能食飲水不止當大黃圓微下之餘不可下

肝熱

手尋衣領及亂捻物瀉青圓主之壯熱飲

水喘悶瀉白散主之

肺熱

手掐眉目鼻面柑桔湯主之

肺盛復有風冷

骨滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發

散風冷散肺瀉白散大青膏主之肺只傷寒則不骨滿

肺虛熱

脣深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散

肺藏怯

脣白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣麤喘促哽氣者難治肺虛損故也

脾肺病久則虛而脣白脾者肺之母也母

子皆虛不能相營故名曰怯肺主脣白白而澤者吉白如枯骨者死

心熱

視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也導赤散主之

心氣熱則心胷亦熱欲言不能而有就冷之意故合面卧

心實

心氣實則氣上下行澁合臥則氣不得通故喜仰臥則氣得上下通也瀉心湯主之

腎虛

兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顙即解也面色_{白睛}純白此皆難養縱長不過八八之數若恣色慾多不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜於下而縮

身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃圓主之

面上證

左顙爲肝

右顙爲肺

額上爲心

鼻爲脾

頰爲腎

赤者熱也隨證治之

目內證

赤者心熱導赤散主之

淡紅者心虛熱生犀散主之

青者肝熱瀉青圓主之淺淡者補之

黃者脾熱瀉黃散主之

無精光者腎虛地黃圓主之

肝病勝肺

肝病秋見

一作日暗

肝強勝肺肺怯不能勝肝

當補脾肺治肝益脾者母令子實故也補

脾益黃散治肝瀉青圓主之

肺病勝肝

肺病春見

一作早晨

肺勝肝當補腎肝治肺藏

肝怯者受病也補肝腎地黃圓治肺瀉白

散主之

肝有風

目連劄不搖得心熱則搖治肝瀉青圓治

心導赤散主之

肝有熱

目直視不搖得心熱則搖治肝瀉青圓治
心導赤散主之

肝有風甚

身反折強直不搖心不受熱也當補腎治
肝補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

凡病或新或久皆引肝風風動而止於頭
目目屬肝風入於目上下左右如風吹不
輕不重兒不能任故目連劄也若熱入於

目牽其筋脉兩眦俱緊不能轉視故目直
也若得心熱則搖以其子母俱有實熱風
火相搏故也治肝瀉青圓治心導赤散主之
驚癇發搖

男發搖目左視無聲右視有聲女發搖目
右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證

早晨發搖

因潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動

搖口内生熱涎項頸急此肝旺當補腎治肝也補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

日午發搐

因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搖此心旺也當補肝治心治心導赤散涼驚圓補肝地黃圓主之

日晚發搐

因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝補脾益黃散治肝瀉青圓治心導赤散主之

夜間發搐

因潮熱亥子丑時不甚搐而卧不穩身體溫壯目睛斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不納津液當補脾治心補

脾益黃散治心導赤散涼驚圓主之

傷風後發搐

傷風後得之口中氣出熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏主之小兒生本怯者多此病也

傷食後發搐

傷食後得之身體溫多唾多睡或吐不思食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後

服安神圓

百日內發搐

真者不過三兩次必死假者發頻不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治之可發散大青膏主之及用塗頤浴體法

急驚

因聞大聲或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚風主之

小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚風主之以除其痰熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒客痰熱於心胃因聞聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不因聞聲及驚亦自發搐

慢驚

因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時痙瘓昏睡睡露睛此無陽也括萆湯主之

凡急驚陰陽異證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別誤小兒甚多又小兒傷於風冷病吐瀉醫謂

因聞大聲或大驚而發搐發過則如故此
無陰也當下利驚風主之

小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引
飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱
甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚
圓主之以除其痰熱不可與巴豆及溫藥
大下之恐搐虛熱不消也小兒客痰熱於
心胃因聞聲非常則動而驚搐矣若熱極

雖不因聞聲及驚亦自發搐

慢驚

因病

出亦

也括

凡生

涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別悞

小兒甚多又小兒傷於風冷病吐瀉醫謂

因病出也括凡生涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別悞小兒甚多又小兒傷於風冷病吐瀉醫謂

因聞大聲或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚風主之

小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚圓主之以除其痰熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒客痰熱於心胃因聞聲非常則動而驚搐矣若熱極

雖不因聞聲及驚亦自發搐

慢驚

因病

「風寒」

出亦

「無陽」

也括

凡急

「心驚」

涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別候小兒甚多又小兒傷於風冷病吐瀉醫謂

向橫小兒驚風
止後發當問望

脾虛以溫補之不已復以涼藥治之又不可
已謂之本傷風醫亂攻之因脾氣即虛內
不能散外不能解至十餘日其證多睡露
睛身溫風在脾胃故大便不聚而為瀉當
去脾間風風退則利止宜風散主之後用
史君子圓補其胃亦有諸吐利久不差者
脾虛生風而成慢驚

五癇

凡治五癇皆隨藏治之每藏各有一獸並
五色圓治小病也

犬癇反折上竄大叫肝也

羊癇目瞪吐舌羊叫心也

牛癇目直視腹滿牛叫脾也

雞癇驚跳反折子縱雞叫肺也

猪癇如尸吐沫猪叫腎也

五癇重者死病後甚者亦死

瘡疹候

面燥頤赤目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱
咳嗽嚏噴手足梢冷夜卧驚悸多睡並瘡
疹證此天行之病也惟用溫涼藥治之不
可妄下及妄攻發受風冷五藏各有一證
肝藏水疱

肺藏膿疱

心藏斑

脾藏疹

歸腎變黑

惟斑疹病後或發癰餘瘡難發癰矣木勝

脾木歸心故也若涼驚用涼驚圓溫驚用
粉紅圓

小兒在胎十月食五藏血穢生下則其毒
當出故瘡疹之狀皆五藏之液肝主淚肺
主涕心主血脾爲裏血其瘡出有五名肝
爲水疱以淚出如水其色青小肺爲膿疱
以涕稠濁色白而大心爲斑主心血色赤
而小次於水疱脾爲疹小次斑瘡其主裏

血故色赤黃淺也涕淚出多故膿疱水疱皆大血營於內所出不多故斑疹皆小也病瘕者涕淚俱少譬胞中容水水去則瘦故也

始發潮熱三日以上熱運入皮膚即發瘡疹而不甚多者熱留膚腠之間故也潮熱隨藏出如早食潮熱不已爲水瘕之類也瘡疹始出之時五藏證見惟腎無候但見

平證耳翕涼耳涼是也翕耳俱屬於腎其居北方主冷也若瘡黑陷而耳翕反熱者爲逆也若用百樣圓牛李膏各參服不愈者死病也

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢

劇也青乾紫陷昏睡汁出不止煩燥熱渴
腹脹啼喘大小便不通者困也凡瘡疹當
乳母慎口不可令飢及受風冷必歸腎而
變黑難治也

有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若
黑紫乾陷者百祥圓下之不黑者慎勿下
更看時月輕重大抵瘡疹屬陽出則爲順
故春夏病爲順秋冬病爲逆冬月腎旺又

盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑
陷秋斑子冬疹子亦不順也難重病猶十
活四五黑者無問何時十難救一其候或
寒戰噤牙或身黃腫紫宜急以百祥圓下
之復惡寒不已身冷出汗耳聾反熱者死
病也何以然腎氣大旺脾虛不能治故也
下後身熱氣溫欲飲水者可治以脾生勝
腎寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下

妄下則內虛多歸於腎若能食而痲頭焦起或未焦而喘實者可下之身熱煩渴腹滿而喘大小便澁面赤悶亂大吐此當利小便不差者宣風散下之若五七日痲不焦是內發熱熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痲也宜宣風散導之用生犀磨汁解之使熱不生必著痲矣

瘡疹由內相勝也惟斑疹能作搐疹爲脾所生脾虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜爲熱神氣不安因搐成癰斑子爲心所生心生熱熱則生風風屬於肝二藏相搏風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母括萸湯主之

瘡黑而忽瀉便膿血并痲皮者順水穀不消者逆何以然且瘡黑屬腎脾氣本強或舊服補脾藥脾氣得實腎雖用事脾可制

之今瘡入腹爲膿血及連痂皮得出是脾強腎退即病出而安也米穀及瀉乳不化者是脾虛不能制腎故自洩也此必難治

傷風

昏睡口中氣熱呵欠頓悶當發散與大青膏解不散有下證當下大黃圓主之大飲水不止而善食者可微下餘不可下也

傷風手足冷

脾藏怯也當和脾後發散和脾益黃散發散大青膏主之

傷風自利

脾藏虛怯也當補脾益黃散發散大青膏主之未差調中圓主之有下證大黃圓主之下後服溫驚圓

傷風腹脹

脾藏虛也當補脾必不喘後發散仍補脾

也去脹塌氣圓主之發散大青膏主之

傷風兼藏

兼心則驚悸

兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣嗽

兼腎則畏明

各隨補母藏虛見故也

傷風下後餘熱

以藥下之太過胃中虛熱飲水無力也當

生胃中津液多服白朮散

傷寒瘡疹同異

傷寒男體重面黃女面赤喘急憎寒各口中氣熱呵欠頓悶項急也瘡疹則顯赤燥多噴嚏悸動昏倦四支冷傷寒當發散之治瘡行溫平有大熱者解毒餘見前說

初生三日內吐瀉壯熱

不思乳食大便乳食不消或白色是傷食

當下之後和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

初生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有兼見證

肺睡露睛喘氣

心驚悸飲水

脾困倦饒睡

肝呵欠頓悶

腎不語畏明

當瀉見兒兼藏補脾益黃散主之此二證多病於秋夏也

生下吐

初生下拭掠兒口中穢惡不盡嚥入喉中故吐木菰圓主之凡初生急須拭掠口中令淨若啼聲一發則嚥下多生諸病

傷風吐瀉身溫

乍涼乍熱睡多氣麤大便秘黃白色嘔吐乳

食不消時咳嗽更有五藏兼見證當煎入藏君臣化大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下也此乃脾肺受寒不能入脾也

傷風吐瀉身熱

多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此爲胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發散藥止渴多服白朮散發

散大青膏主之

傷風吐瀉身涼

吐沫瀉青白色悶亂不渴噎氣長出氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益黃散發散大青膏主之此二證多病於春冬也

風溫潮熱壯熱相似

潮熱者時間發熱過時即退來日依時發

熱此欲發驚也壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也風熱者身熱而口中氣熱有風證溫壯者但溫而不熱也

腎怯失音相似

病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能嚥藥此非失音爲腎怯不能上接於陽故也當補腎地黃圓主之失音乃猝病耳

黃相似

身皮目皆黃者黃病也身痛髀背強大小便澁一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色看物皆黃渴者難治此黃疸也二證多病於大病後別有一證不因病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食土渴者脾瘕也又有自生而身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯胃不和也

夏秋吐瀉

五月二十五日已後吐瀉身壯熱此熱也
小兒藏府十分中九分熱也或因傷熱乳
食吐乳不消瀉深黃色玉露散主之

六月十五日已後吐瀉身溫似熱藏府六
分熱四分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色
似渴或食乳或不食乳食前少服益黃散
食後多服玉露散

七月七日已後吐瀉身溫涼三分熱七分
冷也不能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣
睡露睛脣白多噦欲大便不渴食前多服
益黃散食後少服玉露散

八月十五日已後吐瀉身冷無陽也不能
食乳乾噦瀉青褐水當補脾益黃散主之
不可下也

吐乳

吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也
皆當下

虛羸

脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或
吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣也有冷
者時時下利脣口青白有熱者溫壯身熱
肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香圓主
之夏月不可服如有證則少服之熱者胡

黃連圓主之冬月不可服如有證則少服之

欬嗽

夫嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病
嗽者其病必實非久病也其證面赤痰盛
身熱法當以葶藶圓下之若久者不可下
也十一月十二月嗽者乃傷風嗽也風從
背脊第三椎肺俞穴入也當以麻黃湯汗
之有熱證面赤飲水涎熱咽喉不利者宜

兼甘桔湯治之若五七日間其證身熱痰
盛唾粘者以編銀圓下之有肺盛者欬而
後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱
以偽白散瀉之若傷風欬嗽五七日無熱
證而但嗽者亦葶藶圓下之後用化痰藥
有肺虛者欬而哽氣時時長出氣喉中有
聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先實
脾後以編銀圓微下之涎退即補肺補肺

如上法有嗽而吐水或青綠水者以百祥
圓下之有嗽而吐痰涎乳食者以白餅子
下之有嗽而咯膿血者乃肺熱食後服甘
桔湯久嗽者肺亡津液阿膠散補之欬而
痰實不甚喘而面赤時飲水者可編銀圓
下之治嗽大法盛即下之久即補之更量
虛實以意增損

疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也

疳在外鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡不着痂漸遠耳生瘡治鼻瘡爛蘭香散諸瘡白粉散主之

肝疳白膜遮睛當補肝地黃圓主之

心疳面黃頰赤身壯熱當補心安神圓主之脾疳體黃腹大食泥土當補脾益黃散主之

腎疳極瘦身有瘡疥當補腎地黃圓主之筋疳瀉血而瘦當補肝地黃圓主之

肺疳氣喘口鼻生瘡當補脾肺益黃散主之骨疳喜卧冷地當補腎地黃圓主之

諸疳皆依本藏補其母及與治疳藥冷則木香圓熱則胡黃連圓主之

疳皆脾胃病亡津液之所作也因大病或吐瀉後以藥吐下致脾胃虛弱亡津液且

小兒病疳皆愚醫之所壞病假如潮熱是一藏虛一藏實而內發虛熱也法當補母而瀉本藏則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之利既多矣不能禁約而津液內亡即成疳也又有病癖其疾發作寒熱飲水脇下

有形硬痛治癖之法當漸消磨醫反以巴豆硃砂輩下之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸令疳瘦

又有病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過致脾胃津液少即使引飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變諸端因亦成疳

又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津

液燥損亦能成疳

又有肥疳即脾疳也身瘦黃皮乾而有瘡疥其候不一種種異端今略舉綱紀目澁或生白膜脣赤身黃乾或黑喜卧冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水利色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬚作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也

大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者爲肥熱疳久病者爲瘦冷疳冷者木香圓熟者黃連圓主之冷熱之疳尤宜如聖圓故小兒之藏府柔弱不可痛擊大下必亡津液而成疳凡有可下量大小虛實而下之則不至爲疳也初病津液少者當生胃中津液白朮散主之惟多則妙餘見下

胃氣不和

面眇白無精光口中氣冷不思食吐水當

補脾益黃散主之

胃冷虛

面眄白色弱腹痛不思食當補脾益黃散主之若下利者調中圓主之

積痛

口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積宜消積圓甚者當白餅子下之後和胃

虫痛

虛實腹痛附

面眄白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安虫散主之小兒本怯者多此病積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛者當口淡而沫自出治之隨其證

虫與癇相似

小兒本怯故胃虛冷則虫動而心痛與癇略相似但目不斜手不搐也安虫散主之

氣不和

口頻撮當調氣益黃散主之

食不消

脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

腹中有癖

不食但飲乳是也當漸用白餅子下之

小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍

熱飲水或喘嗽與潮熱相類不早治必成

疳以其有癖則令兒不食致脾胃虛而熱發故引飲水過多即蕩滌腸胃亡失津液脾胃不能傳化水穀其脉沉細益不食脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成疳矣餘見疳門

虛實腹脹

腫附

腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂滿喘可下之用紫霜圓白餅子不喘者虛也不

可下若候下則脾虛氣上附肺而行肺與
脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢
母氣虛甚即目胞腮腫也色黃者屬脾也
治之用塌氣圓漸消之未愈漸加圓數不
可以丁香木香橘皮豆蔻大溫散藥治之
何以然脾虛氣未出腹脹而不喘可以散
藥治之使上下分消其氣則愈也若虛氣
已出附肺而行即脾胃內弱每生虛氣入

於四肢面目矣小兒易爲虛實脾虛不受
寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿
悞也胃久虛熱多生疸病或引飲不止脾
虛不能勝腎隨肺之氣上行於四肢若水
狀腎氣浸浮於肺即大喘也此當服塌氣
圓病愈後面未紅者虛衰未復故也

治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未出林
以兵攻之必可獲寇若出林不可急攻攻

必有失當以意漸收之即順也

治虛腹脹先服塌氣圓不愈腹中有食積結糞小便利黃時微喘脉伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而後結有積所治宜先補脾後下之下後又補脾即愈也補肺恐生虛喘

喜汗

厚衣卧而額汗出也止汗散主之

盜汗

睡而自汗出肌肉虛也止汗散主之遍身汗香苾圓主之

夜啼

脾藏冷而痛也當與溫中藥及以法穰之花火膏主之

驚啼

邪熱乘心也當安心安神圓主之

弄舌

脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌治之勿用冷藥及下之當少與瀉黃散漸服之亦或飲水醫疑爲熱必冷藥下之者非也飲水者脾胃虛津液少也又加面黃肌瘦五心煩熱卽爲疳瘦宜胡黃連圓葷大病未已用藥弄舌者凶

丹瘤

熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤如丹當以白玉散塗之

解顛

年大而顛不合腎氣不成也長必少笑更有目白睛多眇白色瘦者多愁少喜也餘見腎虛

太陽虛汗

上至頭下至項不過胃也不須治之

胃怯汗

上至項下至臍此胃虛當補胃益黃散主之

胃啼

小兒觔骨血脉未成多哭者至小所有也

胎肥

生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸肌瘦目白睛粉紅色五心熱大便難時時生涎浴體法主之

胎怯

生下面色無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多噓目無精彩當浴體法主之

胎熱

生下有血氣時叫哭身壯熱如淡茶色目赤大便赤黃糞稠急食乳浴法主之更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

急欲乳不能食

臣客風熱入兒臍流入心脾經即舌厚唇燥口不能乘乳當涼心脾

龜背龜腎

肺熱脹滿攻於腎鬲即成龜背又乳母多食五辛亦成

兒生下客風入脊逐於骨髓即成龜背治之以龜尿點節骨取尿之法當蓮葉安龜在上後用鏡照之自尿出以物盛之

腫病

腎熱傳於膀胱膀胱熱盛逆於脾胃脾胃虛而不能制腎水反尅土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也若大喘者重也何以然腎大勝而尅退脾土上勝心火心又勝肺肺爲心尅故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五藏逆二者腎水氣上行傍浸於肺

故令大喘此皆難治

五藏相勝輕重

肝藏病見秋木旺肝強勝肺也宜補肺瀉
肝輕者肝病退重者脣白而死

肺病見春金旺肺勝肝當瀉肺輕者肺病
退重者目淡青必發驚更有赤者當搐爲
肝怯當目淡青色也

心病見冬火旺心強勝腎當補腎治心輕
者病退重者下竄不語腎怯虛也

腎病見夏水勝火腎勝心也當治腎輕者
病退重者悸動當搐也

脾病見四旁皆倣此治之順者易治逆者難
治脾怯當面目赤黃五藏相反隨證治之

雜病證

目赤兼青者欲發搐

目直而青身反折強直者生驚

咬牙甚者發驚

口中吐沫水者後必虫痛

昏睡善嚏悸者將發瘡疹

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱

吐瀉昏睡不露睛者胃實熱

吐瀉乳不化傷食也下之

吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷

吐稠涎及血皆肺熱久則虛

瀉黃紅赤黑皆熱赤亦毒

瀉青白穀不化胃冷

身熱不飲水者

熱在外身熱飲水者熱在內

口噤不止則失音遲聲亦同

長大不行行則脚細齒久不生生則不固

髮久不生生則不黑血虛怯爲冷所乘

則脣青

尿深黃色久則尿血

小便不通久則脹滿當利小便

洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者
是脾虛

吐涎痰熱者下之 吐涎痰冷者溫之

先發膿疱後發斑子者逆

先發膿疱後發疹子者順

先發水疱後發疹子者逆

先發膿疱後發水疱多者順少者逆

先水疱後斑子多者逆少者順

先疹子後斑子者順

凡瘡疹只出一般者善

胎實面紅目黑睛多者多喜笑

胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭

凡病先虛或下之合下者先實其母然後
下之假令肺虛而痰實此可下先當益脾
後方瀉肺也

太喜後食乳食多成驚癇

大哭後食乳食多成吐瀉

心痛吐水者重痛 心痛不吐水者冷心痛

吐水不心痛者胃冷

病重面有五色不常不澤者死

呵欠面赤者風熱 呵欠面青者驚風

呵欠面黃者脾虛驚 呵欠多睡者內熱

呵欠氣熱者傷風

熱證踈利或解化後無虛證勿溫補熱必隨生

不治證

目赤脉貫瞳人

骨腫及陷

鼻乾黑

魚口氣急

吐虫不定

瀉不定精神好

大渴不定止之又渴

吹鼻不噴

病重口乾不睡

時氣脣上青黑點

頰深赤如塗胭脂

鼻開張

喘急不定

錢氏小兒藥證直訣上



宋刻錢氏小兒病證

中卷

宋刻善本

錢氏寶藏書

醫家類

董氏小兒斑疹備急方論



錢氏小兒病證直訣卷中

李寺丞子三歲病搐自卯至巳數醫不治
後召錢氏視之搐目右視大叫哭李曰
何以搐右錢曰逆也李曰何以逆曰男
爲陽而本發左女爲陰而本發右若男
目左視發搐時無聲右視有聲女發時
右視無聲左視有聲所以然者左肝右
肺肝木肺金男目右視肺勝肝也金來



刑木二藏相戰故有聲也治之瀉其強而補其弱心實者亦當瀉之肺虛不可瀉肺虛之候悶亂哽氣長出氣此病男反女故男易治於女也假令女發搐目左視肺之勝肝又病在秋卽肺兼旺位肝不能任故哭叫當大瀉其肺然後治心續肝所以俱言目反直視乃肝主目也凡搐者風熱相搏于內風屬肝故引

見之於目也錢用瀉肺湯瀉之二日不悶亂當知肺病退後下地黃圓補腎三服後用瀉青圓涼驚圓各二服凡用瀉心肝藥五日方愈不妄治也又言肺虛不大瀉者何也曰設令男目右視木反剋金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當補其肺慎勿瀉也

廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢

謂其父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使病錢曰八使過來日午間卽無苦也次日午前午前果作急搐召錢治之三日而愈蓋預見目直視而顙赤必肝心俱熱更坐石杌子乃欲冷此熱甚也肌膚素肥盛脉又急促故必驚搐所言語時者自寅至午皆心肝所用事時治之

瀉心肝補腎自安矣

李司戶孫病生百日發搐三五次請衆醫治作天釣或作胎驚癇皆無應者後錢用大青膏如小豆許作一服發之復與塗頤法封之及浴法三日而愈何以然嬰兒初生肌骨嫩怯被風傷之子不能任故發搐頻發者輕也何者客風在內每遇不任卽搐搐稀者是內藏發病不

可救也。搐頻者宜散風冷，故用大青膏不可多服。蓋兒至小，易虛易實，多即生熱，止一服而已。更當封浴，無不效者。

東都王氏子吐瀉，諸醫藥下之，至虛變慢。驚其候，睡露睛，手足瘳痲，而身冷。錢曰：此慢驚也。與蘇蘇湯，其子胃氣實，即開目而身溫。王疑其子不大，小便令諸醫以藥利之。醫留八正散等數服，不利而

身復冷。令錢氏利小便。錢曰：不當利小便利之。必身冷。王曰：已身冷矣。因抱出錢曰：不能食而胃中虛。若利大小便，即死。久即脾胃俱虛，當身冷而閉目。幸胎氣實而難衰也。錢用益黃散。史君子圓四服，令微飲食。至日午，果能飲食。所以然者，謂利大小便，脾胃虛寒，當補脾，不可別攻也。後又不語諸醫，作失音治之。

錢曰既失音開目而能飲食又牙不緊而口不緊也諸醫不能曉錢以地黃圓補腎所以然者用清藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊也

東都藥舖杜氏有子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃外風寒搐入肺經今肺病嗽而吐痰風在肺中

故也宜以麻黃葷發散後用涼藥壓之卽愈時醫以鐵粉圓半夏圓漏銀圓諸法下之其肺卽虛而嗽甚至春三月間尚未愈召錢氏視之其候面青而光嗽而喘促哽氣又時長出氣錢曰痰困拾以捌玖所以然者面青而光肝氣旺也春三月者肝之位也肺衰之時也嗽者肺之病肺之病肺自十一月至三月久

卽虛痿又曾下之脾肺子母也復爲肝
所勝此爲逆也故嗽而喘促哽氣長出
氣也錢急與瀉青圓瀉後與阿膠散實
肺次日面青而不光錢又補肺而嗽如
前錢又瀉肝瀉肝未已又加肺虛唇白
如練錢曰此病必死不可治也何者肝
大旺而肺虛熱肺病不得其時而肝勝
之今三瀉肝而肺病不退三補肺而肺

證猶虛此不久生故言死也此證病於
秋者十救三四春夏者十難救一果大
喘而死

京東轉運使李公有孫八歲病嗽而胸滿
短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃
膏各貳服治之三日加喘錢曰此肺氣
不足復有寒邪卽使喘滿當補肺脾勿
服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢

曰何治也醫曰退熱退涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也醫有慙色錢治愈

東都張氏孫九歲病肺熱他醫以犀珠龍麝生牛黃治之一月不愈其證嗽喘悶亂飲水不止全不能食錢氏用史君子

圓益黃散張曰本有熱何以又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效錢曰涼藥久則寒不能食小兒虛不能食當補脾候飲食如故卽瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉其肺遂愈十分張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

睦親宮十太尉病瘡疹衆醫治之王曰疹

未出屬何藏腑一醫言胃大熱一醫言
傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏
曰若言胃熱何以乍涼乍熱若言母腹
中有毒發屬何藏也醫曰在脾胃錢曰
既在脾胃何以驚悸醫無對錢曰夫胎
在腹中月至六七則已成形食母穢液
入兒五藏食至十月滿胃脘中至生之
時口有不潔產母以手拭淨則無疾病

俗以黃連汁壓之云下臍糞及涎穢也
此亦母之不潔餘氣入兒藏中本先因
微寒入而成瘡疹未出五藏皆見病症
內壹藏受穢多者乃出瘡疹初欲病時
先呼欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷痺
面顯燥赤嗽嗽時嚏此五藏證具也呵
欠頓悶肝也時發驚悸心也乍涼乍熱
手足冷脾也面目顯頰赤嗽嚏肺也惟

腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡
疹乃五藏毒若出歸一證則肝水庖肺
膿庖心斑脾疹惟腎不食毒穢而無諸
證瘡黑者屬腎由不慎風冷而不飽內
虛也又用抱龍圓數服愈其別無他候
故未發出則見五藏證已出則歸一藏
也

四大王宮五太尉因墜鞦韆發驚搐醫以

發熱藥治之不愈錢氏曰本急驚後生
大熱當先退其熱以大黃圓玉露散惺
惺圓加以牛黃龍麝解之不愈至三日
肌膚尚熱錢曰更二日不愈必發斑瘡
蓋熱不能出也他醫初用藥發散發散
入表表熱卽斑生本初驚時當用利驚
藥下之今發散乃逆也後二日果斑出
以必勝膏治之七日愈

睦親宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留抱龍圓三服李以藥下之其疹稠密錢見大驚曰若非轉下則爲逆病王言李以用藥下之錢曰瘡疹始出未有他證不可下也但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也如瘡疹三日不出或出不快卽微發之微發不出卽加藥不出卽大發之如大發後不多及脉

平無證者卽瘡本稀不可更發也有大熱者當利小便小熱者當解毒若出快勿發勿下故止用抱龍圓治之瘡痂若起能食者大黃圓下一二行卽止今先下一日瘡疹未能出盡而稠密甚則難治此悞也縱得安其病有三一者疥二者癰三者目赤李不能治經三日黑陷復召錢氏曰幸不發寒而病未困也遂

用百祥圓治之以牛李膏爲助若黑者
歸腎也腎王勝脾土不尅水故脾虛寒
戰則難治所用百祥圓者以瀉膀胱之
腑腑若不實藏自不盛也何以不瀉腎
曰腎主虛不受瀉若二服不效卽加寒
而死

皇都徐氏子三歲病潮熱每日西則發搐
身微熱而目微邪反露睛四肢冷而喘

大便微黃錢與李醫同治錢問李曰病
何搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢
所作何目斜露睛曰搐則目斜何肢冷
曰冷厥必內熱曰何喘曰搐之甚也曰
何以治之曰嚏驚圓鼻中灌之必搐止
錢又問曰旣謂風病溫壯搐引目斜露
睛內熱肢冷及搐甚而喘併以何藥治
之李曰皆此藥也錢曰不然搐者肝實

也故令搖日西身微熱者肺潮用事肺主身溫且熱者爲肺虛所以目微斜露睛者肝肺相勝也肢冷者脾虛也肺若虛甚用益黃散阿膠散得脾虛證退後以瀉青圓導赤散涼驚圓治之後九日平愈

朱監簿子五歲夜發熱曉卽如故衆醫有作傷寒者有作熱治者以涼藥解之不

愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉圓下涎其病益甚至五日大引飲錢氏曰不可下之乃取白朮散末煎一兩汁三升使任其意取足服朱生曰飲多不作瀉否錢曰無生水下能作瀉縱瀉不足恠也但不可下耳朱生曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱清袖裏皆此藥也至晚服盡錢看之曰更可服三升又煎白朮

散三升服盡得稍愈第三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿膠散二服而愈

朱監簿子

三歲

忽發熱醫曰此心熱顙赤而

唇紅煩燥引飲遂用牛黃圓三服以一物瀉心湯下之來日不愈反加無力而能食又便利黃沫錢曰心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病

也錢先用白朮散生胃中津後以生犀散治之朱曰大便黃沫如何曰胃氣正卽瀉自止此虛熱也朱曰醫用瀉心湯何如錢曰瀉心湯者黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久衆醫至曰實熱錢曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安而又加面黃頰赤五心煩燥不食而引飲醫曰旣虛熱何大便黃沫錢笑曰便

黃沫者服瀉心湯多故也錢後與胡黃連圓治愈

張氏三子病歲大者汗偏身次者上至頂下至胸小者但額有汗衆醫以麥煎散治之不效錢曰大者與香瓜圓次者與益黃散小者與石膏湯各五日而愈廣親宅四大王宮五太尉病吐瀉不止水穀不化衆醫用補藥言用薑汁調服之

六月中服溫藥一日血加喘吐不定錢曰當用涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服併服之衆醫皆言吐瀉多而米穀不化當補脾何以用涼藥王信衆醫又用丁香散三服錢後至曰不可服此三日外必腹滿身熱飲水吐逆三日外一如所言所以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃

卽大吐瀉他醫又行溫藥卽上焦亦熱故喘而引飲三日當死衆醫不能治復召錢至宮中見有熱證以白虎湯三服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服四日用石膏湯一服旋合麥門冬黃苓腦子牛黃天竺黃茯苓以朱砂爲衣與五圓竹葉湯化下熱退而安

馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢曰目中黑睛少而白睛多面色晄白神怯也黑睛少腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱酒慾若不保養不過壯年面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也不可下下之虛入肺則嗽入

心則驚入脾則瀉入腎則益虛此但以
消積圓磨之爲微有食也如傷食甚則
可下不下則成癖也實食在內乃可下
之畢補脾必愈隨其虛實者無不效者
廣親宮七太尉七歲吐瀉是時七月其證
全不食而昏睡睡覺而悶亂哽氣乾噦
大便或有或無不渴衆醫作驚治之疑
睡故也錢曰先補脾後退熱與史君子

圓補脾退熱石膏湯次日又以水銀硫
黃二物下之生薑水調下一字錢曰凡
吐瀉五月內九分下而一分補八月內
十分補而無一分下此者是脾虛瀉醫
妄治之至於虛損下之卽死當卽補脾
若以史君子圓卽緩錢又留溫胃益脾
藥止之醫者李生曰何食而哕錢曰脾
虛而不能食津少卽哕逆曰何瀉青褐

水曰腸胃至虛冷極故也錢治而愈

黃承務子二歲病瀉衆醫止之十餘日其證便青白乳物不消身涼加哽氣昏睡醫謂病困篤錢氏先以益脾散三服補肺散三服三日身溫而不哽氣後以白餅子微下之與益脾散二服利止何以然利本脾虛傷食初不與大下措置十日上實下虛脾氣弱引肺亦虛補脾肺

病退卽溫不哽氣是也有所傷食仍下之也何不先下後補曰便青爲下藏冷先下必大虛先實脾肺下之則不虛而後更補之也

睦親宮中十大王瘡疹云瘡疹始終出未有他證不可下但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也如瘡疹三日不出或出不快卽微發之如瘡發後不多出卽

加藥加藥不出卽大發之如發後不多
及脉平無證卽瘡本稀不可更發也有
大熱者當利小便小熱者當解毒若不
快勿發勿下攻止用抱龍圓治之瘡疹
若起能食者大黃圓下一二行卽止有
大熱者當利小便有小熱者宜解毒若
黑紫乾陷者百祥圓下之不黑者甚勿
下身熱煩燥腹滿而喘大小便濇面赤

悶亂大吐此當利小便不瘥者宣風散
下之也若五七日痂不焦是內發熱氣
蒸於皮中故瘡不得焦痂也宜宣風散
導之用生犀角磨汁解之使熱不生必
着痂矣

辛氏女子五歲病蟲痛諸醫以巴豆乾漆
硃砂之屬治之不效至五日外多哭而
俛仰睡卧不安自按心腹時大叫面無

正色或青或黃或白或黑目無光而慢
脣白吐沫至六日胸高而卧轉不安召
錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不
除青色大驚曰此病大困若更加瀉則
爲逆矣至次日辛見錢曰夜來三更果
瀉錢于瀉盆中看如藥汁以杖攪之見
有丸藥錢曰此子肌厚當氣實今證反
虛不可治也辛曰何以然錢曰脾虛胃

冷則蟲動而今反目青此肝乘脾又更
加瀉知其氣極虛也而丸藥隨糞下卽
脾胃已脫兼形病不相應故知死病後
五日昏篤七日而死

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯
血前醫以桔梗湯及防己圓治之不愈
涎上攻吐喘不止請錢氏下禰銀圓一
大服復以補肺湯補肺散治之或問段

氏子咯血肺虛何以下之錢曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎上而吐愈爲順治也若先補其肺爲逆耳此所謂識病之輕重先後爲治也

鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽藏

熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多驚又與青金膏一服又瀉三行加口乾身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至曰已成虛羸先用前白朮散時時服之後服香朮圓十三日愈

曹宣德子三歲面黃時發寒熱不欲食而

氏子咯血肺虛何以下之錢曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎上而吐愈爲順治也若先補其肺爲逆耳此所謂識病之輕重先後爲治也

鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽藏

熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡

甲子年四月即刻本誤作爲之惡臣、

不若

乾言尚有微熱未盡又與膏也

膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至曰已成虛羸先用前白朮散時時服之後服香薷圓十三日愈

曹宣德子三歲面黃時發寒熱不欲食而

飲水及乳衆醫以爲潮熱用牛黃圓麝香圓不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢曰當下白餅子後補脾乃以消積圓磨之此乃癖也後果愈何以故不食但飲水者食伏於管內不能消致令發寒服止渴藥吐者以藥衝故也下之卽愈

錢氏小兒病證直訣卷中

終

錢氏小兒藥證目錄卷下



大青膏

治小兒熱盛生風欲爲驚搐血

氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之

天麻

末壹錢

白附子

末生壹錢伍分

青黛

研壹錢

蝎尾

去毒生末

烏蛇稍肉

酒浸焙乾取末各壹錢

硃砂

研

天竺黃

研

飲水及乳衆醫以爲潮熱用牛黃圓麝香圓不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢曰當下白餅子後補脾乃以消積圓磨之此乃癖也後果愈何以故不食但飲水者食伏於管內不能消致令發寒服止渴藥吐者以藥衝故也下之卽愈

錢氏小兒病證直訣卷中

終

錢氏小兒藥證目錄卷下



大青膏

治小兒熱盛生風欲爲驚搐血

氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之

天麻

末壹錢

白附子

末生壹錢伍分

青黛

研壹錢

蝎尾

去毒生末

烏蛇稍肉

酒浸焙乾取末各壹錢

硃砂

研

天竺黃

研

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子
大至一皂子大月中兒粳米大同牛黃
膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同
甘露散服之

涼驚圓 治驚疳

草龍膽

防風

青黛

各叁錢

鈎藤

貳錢

黃連

伍錢

牛黃

麝香

龍腦

各壹匙

麵糊圓粟米大每服叁伍圓金銀花湯

下

粉紅圓

又名溫驚圓

天南星

臘月臘牛胆中百日陰乾取末肆兩別研如礬者只剉炒熟用

硃砂

壹錢伍分
研

天竺黃

壹兩
研

龍腦

半匙別研

坯子胭脂

壹錢研乃染胭脂

右用牛胆汁和圓雞頭大每服一圓小

者半圓沙糖溫水化下

瀉青圓方 治肝熱搐搦脉洪實

當歸

去蘆頭切焙稱

龍腦

焙稱

川芎

山梔子仁

川大黃

濕帶炭

羌活

防風

去蘆頭切焙稱

右件等分爲末鍊蜜和圓雞頭大每服半圓至壹圓煎竹葉湯同沙糖溫水下

地黃圓 治腎怯失音顙開不合神不足

目中白睛多面色眇白等方

熟地黃

山萸肉

乾山藥

各肆錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各叁錢

右爲末煉蜜圓如梧子大空心溫水化

下三圓

瀉白散

又名瀉肺散

治小兒肺盛氣急喘

嗽

地骨皮

桑白皮

炒各壹兩

甘草

炙壹錢

右剉散入粳米壹撮水貳小盞煎七分
食前服

阿膠散

又名補肺散

治小兒肺虛氣粗喘

促

阿膠

壹兩伍錢
麝炒

黍粘子

炒香

甘草

炙各貳錢伍分

馬兜鈴

伍錢焙

杏仁

七箇去皮尖
炒

糯米

壹兩炒

右爲末每服壹貳錢水壹盞煎至六分
食後溫服

導赤散

治小兒心熱視其睡口中氣溫

或合面睡及上竅咬牙皆心熱也心氣
熱則心胃亦熱欲言不能而有就冷之
意故合面睡

生地黃

甘草

生

木通

各等分

右同爲末每服叁錢水壹盞入竹葉同
煎至五分食後溫服一本不用甘草用
黃芩

益黃散

又名補脾散

治脾胃虛弱及治脾

疳腹大身瘦

陳皮

去白壹兩

丁香

貳錢一方用木香

訶子

炮去核

青皮

去白

甘草

炙各伍錢

右爲末三歲兒壹錢半水半盞煎三分

食前服

瀉黃散

又名瀉脾散

治脾熱弄舌

藿香葉

七錢

山梔子仁

壹錢

石膏

伍錢

甘草

叁兩

防風

肆兩去蘆切焙

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服壹錢至貳錢水壹盞煎至五分溫服清汁無時

白朮散

治脾胃久虛嘔吐泄瀉頻作不

止精液苦竭煩渴躁但欲飲水乳食不

進羸瘦困劣因而失治變成驚癇不論

陰陽虛實並宜服

人參

貳錢伍分

白茯苓

伍錢

白朮

伍錢炒

藿香葉

伍錢

木香

貳錢

甘草

壹錢

葛根

伍錢渴者加至壹兩

右咬咀每服叁錢水煎熱甚發渴去木

香

塗頤法

麝香

壹匙

蝎尾

去毒爲末半錢一作半匙

薄荷葉

半匙

蜈蚣末

牛黃末

青黛末

各壹匙

右同研用熟棗肉劑爲膏新綿上塗勻貼頤上四方可出壹指許火上炙手頻熨百日內外小兒可用此

浴體法

治胎肥胎熱胎怯

天麻末

貳錢

全蝎

去毒爲末

硃砂

各伍錢

烏蛇肉

酒浸焙乾

白礬

各貳錢

麝香

壹錢

青黛

叁錢

右同研勻每用三錢水三碗桃枝壹握

葉伍柒枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

甘桔湯 治小兒肺熱手搯眉目鼻面

桔梗

貳兩

甘草

壹兩

右爲麤末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓食後溫服加荊芥防風名如聖湯熱甚加羌活黃芩升麻

安神圓 治面黃頰赤身壯熱補心 一

治心虛肝熱神思恍惚

馬牙硝

伍錢

白茯苓

伍錢

麥門冬

伍錢

乾山藥

伍錢

龍齒

壹匙 研

寒水石

伍錢 研

硃砂

壹兩 研

甘草

伍錢

右末之煉蜜爲圓雞頭大每服半圓沙糖水化下無時

當歸湯 治小兒夜啼者藏寒而腹痛也

面青手冷不吮乳者是也

當歸

白芍藥

人參 各壹分

甘草

炙半分

桔梗

陳皮

不去白各壹分

右爲細末水煎半錢時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃圓人參湯下

瀉心湯

治小兒心氣實則氣上下行澁

合卧則氣不得通故喜仰卧則氣上下通

右爲末每服五分臨卧取溫水化下

生犀散

治目淡紅心虛熱

生犀

氣錢剉末

地骨皮

自祿佳

赤芍藥

柴胡根

乾葛

劉客壹兩

甘草

炙五錢

右爲麁末每服壹貳錢水壹盞煎至柒分溫服食後

白餅子

又名王餅子

治壯熱

滑石末

壹錢

輕粉

伍錢

半夏末

壹錢

南星末

壹錢

巴豆

合肆箇去皮膜同水壹升煮乾研細

右三味搗羅爲末入巴豆粉次入輕粉又研勻却入餘者藥末如法令勻糯米粉圓如菉豆大量小兒虛實用藥三歲已下每服三圓至五圓空心紫蘓湯下忌熱物若三五歲兒壯實者不以此拘加至貳三圓以利爲度

利驚圓

治小兒急驚風

青黛

輕粉

各壹錢

牽牛末

伍錢

天竺黃

貳錢

右爲末白麪糊圓如小豆大貳拾圓薄荷湯下一法煉蜜圓如芡實大壹粒化

下

括蔞湯

治慢驚

括蔞根

貳錢

白甘遂

壹錢

右用慢火炒焦黃色研勻每服壹匙煎麝香薄荷湯調下無時凡藥性雖冷炒焦用之乃溫也

五色圓 治五癰

硃砂

伍錢研

水銀

壹兩

雄黃

壹兩

鉛

參兩同水銀熬

眞珠末

壹兩研

右煉蜜圓如麻子大每服叁肆圓金銀薄荷湯下

調中圓

人參

去蘆

白朮

乾薑

炮各三兩

甘草

炙減半

右爲細末圓如菴豆大每服半圓至貳叁拾圓食前溫水送下

塌氣圓 治虛脹如腹大者加蘿蔔子名

褐圓子

胡椒

壹兩

蝎尾

去毒伍錢

右爲細末麪圓粟米大每服伍柒圓至壹貳拾圓陳米飲下無時一方有木香

壹錢

木香圓 治小兒疳瘦腹大

木香

青黛

另研

檳榔

荳蔻

去皮各壹分

麝香

另研壹錢伍分

續隨子

去皮壹兩

蝦蟇

叁個燒存性

右爲細末蜜圓菴豆大每服叁伍圓至

壹貳拾圓薄荷湯下食前

胡黃連圓

治肥熱疳

川黃連

伍錢

胡黃連

伍錢

硃砂

壹錢另研

右以上貳物爲細末入硃砂末都填入猪膽內用淡漿水煮以杖于鉢子上用線釣之勿着底候壹炊久取出研入蘆薈麝香各壹分飯和圓如麻子大每服伍柒圓至貳叁拾圓米飲下食後

蘭香散 治疔氣臍下赤爛

蘭香葉

葉名燒灰 貳錢

銅青

伍分

輕粉

貳字

右爲細末令勻看瘡大小乾貼之

白粉散 治諸疔瘡

海螵蛸

叁分

白芨

叁分

輕粉

壹分

右爲末先用漿水洗拭乾貼

積圓 治大便秘臭

丁香

玖個

縮砂仁

貳拾個

烏梅肉

叁個焙

巴豆

貳個去皮油心膜

右爲細末麪糊圓黍米大叁歲已上叁伍圓已下叁貳圓溫水下無時

安蟲散 治小兒蟲痛

胡粉

炒黃

檳榔

川練子

去皮核

鶴虱

炒各貳兩

白礬

銼器熬壹分

乾漆

炒烟盡貳分

雄黃

壹分

巴豆霜

壹分

右爲細末每服壹匙大者半錢溫米飲

調下痛時服

紫霜圓 治消積聚

代赭石

煨醋淬七次

赤石脂

各壹錢

杏仁

伍拾粒去皮

巴豆

叁拾粒去皮膜心出油

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲圓如粟米大壹歲服伍圓米飲湯下壹貳百日內兒叁圓乳汁下更宜量其虛

實加減微利爲度此藥兼治驚痰諸雖下不致虛久

汗散 治六陽虛汗上至頂不過胃也不須治之喜汗厚衣卧而額汗出也止汗散止之

右用故蒲扇灰如無扇只將故蒲燒灰研細每服壹貳錢溫酒調下無時

香瓜圓 治遍身汗出

大黃瓜

黃色者壹個去綠

川大黃

濕唇裏燒至寧焦

胡黃連

柴胡

去蘆

鰲甲

醋炙黃

蘆薈

青皮

黃栢

右除黃瓜外同爲細末將黃瓜割去頭填入諸藥置滿却蓋口用杖子揷定漫火內煨熟麪糊圓如菉豆大每服叁貳圓食後冷漿水或新水下大者伍柒圓至十圓

花火膏

治夜啼

燈花

壹棵

右塗乳上令兒吮之

白玉散

治熱毒氣客於腠理搏於血氣

發於外皮上赤如丹是方用之

白土

氣錢伍分又云滑石

寒水石

伍錢

右爲末用米醋或新水調塗

牛黃膏

治驚熱

雄黃

小瘰大用獨莖莖節根水并醋共大盞煮盡

甘草末

甜硝

各叁錢

硃砂

半錢匕

龍腦

壹匙匕

寒水石

研細伍錢匕

右同研勻蜜和爲劑食後薄苛湯溫化

下半皂子大

牛黃圓

治小兒疳積

雄黃

研水飛

天竺黃

各貳錢

牽牛

末壹錢

右同再研麩糊爲圓粟米大每服叁圓

至五圓食後薄苛湯下兼治疳消積常服尤佳大者加圓數

玉露散

又名甘露散

治傷熱吐瀉黃瘦

寒水石

軟而微青黑中有細紋者是

石膏

堅白兩牆壁手不可折者是好各半兩

甘草

生壹錢

右同爲細末每服壹匙或半錢壹錢食

後溫湯調下

百祥圓

一名南陽圓

治瘡疹倒壓黑陷

用紅芽大戟不以多少蔭乾漿水軟法
骨日中曝乾復內汁中煮汁盡焙乾爲
末水圓如粟米大每服壹貳拾圓研赤
脂麻湯下吐利同無時

牛李膏

一名必勝膏

治同前方

牛李子

右杵汁石器內熬膏每服皂子大煎杏
膠湯化下

風散

治小兒慢驚

檳榔

兩個

陳皮

甘

各半兩

牽牛

肆兩半生熟

右爲細末叁歲兒蜜湯調下五分已
上壹錢食前服

麝香圓

治小兒慢驚疳等病

草龍膽

胡黃連

各半兩

木香

蟬殼

去刺爲末

蘆薈

去砂科

熊膽

青黛

各壹錢

輕粉

腦麝

牛黃

各壹錢並別研

瓜蒂

黃拾壹個爲末

右猪膽圓如桐子及菰豆大驚疳藏府或秘或瀉清米飲或溫水下小圓伍柒粒至壹貳拾粒疳眼猪肝湯下疳渴燂猪湯下亦得猪肉湯下亦得驚風發搐眼上薄荷湯化下壹圓更水研壹圓滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼蟲痛苦練子或

白蕪荑湯送下百日内小兒大小便不通水研封臍中蟲候如乾漆好麝香各少許并入生油壹兩點溫水化下大凡病急則研碎緩則浸化小兒虛極慢驚者勿服尤治急驚痰熱

大惺惺圓

治驚疳百病及諸壞病不可

具述

辰砂

研

青礞石

金牙石

各壹錢半

雄黃

壹錢

蟾灰

貳錢

牛黃

龍腦

各壹匙別研

麝香

半錢別研

蛇黃

叁錢醋滓伍次

右研勻細水煮蒸餅爲圓朱砂爲衣如
萊豆大百日兒每服壹圓壹歲兒貳圓
薄苛溫湯化下食後

小惺惺圓

解毒治急驚風癇潮熱及疾

虛煩藥毒上攻躁渴

臘月取東行母猪糞

燒灰存性

辰砂

水研聽

腦射

各貳錢

牛黃

壹錢各別研

蛇黃

西山者燒赤醋滓叁次水研乾用半兩

右以東流水作麪糊圓桐子大硃砂爲
衣每服貳叁歲兩圓鑰匙研破溫水化
下小兒纔生便宜服壹圓除胎中百疾
食後

銀砂圓

治涎盛膈熱實痰嗽驚風積潮

熱

水銀

結砂子參皂子大

辰砂

研成錢

蝎尾

去毒爲末

鵬砂

粉霜

各研

輕粉

郁李仁

去皮焙研爲末

白牽牛

鉄粉

好臘茶

各卷錢

右同爲細末熬梨汁爲膏圓如菉豆大
龍腦水化下壹圓至叁圓亦名梨汁餅
子及治大人風涎並食後

蛇黃圓

治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚

是也

蛇黃

真者叁個火銀醋淬

鬱金

染分壹處爲末

麝香

壹匙

右爲末飯圓桐子大每服壹貳圓煎金
銀磨刀水化下

三聖圓

化痰涎寬膈消乳癖化驚風食

癇諸疳小兒壹歲以內常服極妙

○小青圓

青黛

壹錢

牽牛

末卷錢

膩粉

壹錢

並研勻麪糊圓黍米大

小紅圓

天南星

大宜兩生

硃砂

半兩研

巴豆

宜錢取霜

並研勻薑汁麪糊圓黍米大

○小黃圓

半夏

生米壹分

巴豆

霜壹匙

黃蘗

末壹匙

並研勻薑汁麪糊圓黍米大 已上百

日者各壹圓壹歲者各貳圓隨乳下

鐵粉圓 治涎盛潮搐吐逆

水銀砂子

貳分

硃砂

鐵粉

各壹分

輕粉

貳分

天南星

炮製去皮臍取末壹分

右同研水銀星盡爲度薑汁麪糊圓粟

米大煎生薑湯下十圓至十五圓二三

十圓無時

銀液圓 治驚熱膈實嘔吐上盛涎熱

水銀

半兩

天南星

貳錢炮

白附子

壹錢炮

右爲末用石腦油爲膏每服壹皂子大
薄荷湯下

鎮心圓 治小兒驚癇心熱

硃砂 龍齒 牛黃各壹錢 鐵粉 琥珀

人參 茯苓 防風各壹錢 全蝎柒個焙

右末煉蜜圓如桐子大每服壹圓薄荷
湯下

金箔圓 治急驚涎盛

金箔貳拾片 天南星剉炒 白附子炮

防風去蘆頭焙 半夏湯浸柒次切焙
乾秤各半兩 雄黃

辰砂各壹分 生犀末半分 牛黃

腦麝各半分已上六物研

右爲細末薑汁麪糊圓麻子大每服叁
伍圓至壹貳拾圓人參湯下如治慢驚
去龍腦服無時

辰砂圓 治驚風涎盛潮作及胃熱吐逆

不止

辰砂

別研

水銀砂子

各壹分

天麻

牛黃

伍分

腦麝

別研伍分

生犀末

白殭蠶

酒炒

蟬殼

去足

乾蝎

去毒炒

麻黃

去節

天南星

湯浸洗次焙切乾秤各壹分

右同爲末再研勻熟蜜圓如菉豆大硃砂爲衣每服壹貳圓或伍柒圓食後服之薄荷湯送下

剪刀股圓 治一切驚風久經宣利虛而

生驚者

硃砂

天竺黃

各研

白殭蠶

去頭足炒

蝎

去毒炒

乾蟾

去四足并腸洗炙焦黃爲末

蟬殼

去劍

五靈脂

去黃者爲末各壹分

牛黃

龍腦

并研各壹匙

麝香

研伍分

蛇黃

伍錢燒赤醋淬三次放水中研盡

右藥末共貳兩肆錢東流水煮白麵糊圓桐子大每服壹圓剪刀環頭研食後

薄荷湯化下如治慢驚卽去龍腦

麝蟾圓 治驚涎潮搐

大乾蟾

秤貳錢灰各另研

鐵粉

壹錢

硃砂

青礞石末

雄黃末

蛇黃

燒取末各貳錢匕

龍腦

壹匙匕

麝香

壹錢匕

右件研勻水浸蒸餅爲圓如桐子大硃砂爲衣薄荷水下半圓至壹圓無時

軟金丹 治驚熱痰盛壅嗽膈實

天竺黃

輕粉

各貳兩

青黛

壹錢

黑牽牛

取頭末

半夏

用生薑二錢持成麴焙乾再爲細末各三分

右同研勻熟蜜劑爲膏薄荷水化下半皂子大至壹皂子大量兒度多少用之

食後

桃枝圓 踈取積熱及結胸又名桃符

巴豆霜

川大黃

黃蘗

末各壹錢壹匙

輕粉

硃砂

各伍分

右爲細末麪糊圓粟米煎桃枝湯下壹
晷兒伍柒圓伍柒歲貳叁拾圓桃符湯
下亦得未晷兒叁貳圓臨卧

蟬花散 治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽

喉壅痛

蟬花

和壳

白殭蠶

直者酒
炒熟

甘草

炙各壹錢

延胡索

半分

右爲末壹歲壹匙肆伍歲半錢蟬殼湯

下食後

釣藤引子

治吐利脾胃虛風慢驚

釣藤

叁分

蟬壳

去蘆頭切

防風

去蘆頭切

人參

去蘆頭切

麻黃

去節稱

白殭蠶

炒黃

天麻

蝎尾

去毒炒各半兩

甘草

炙

川薊

各壹分

麝香

壹分別研入

右同爲細末每服貳錢水壹盞煎至陸
分溫服量多少與之寒多加附子末半

錢無時

抱龍圓 治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽驚風潮搐及蟲毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時雨服之

天竺黃

壹兩

雄黃

水飛壹錢

辰砂

麝香

各別剉半兩

天南星

肆兩 臘月臘半 胆中陰乾百日如無只將生者去皮臍剉沙乾用

右爲細末煮甘草水和圓皂子大溫水化下服之百日小兒每圓分作叁肆服

伍歲壹貳圓大人叁伍圓亦治室女白帶伏暑用鹽少許嚼壹貳圓新水送下臘月中雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸天南星叁日候透軟煮叁伍沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末捌兩以甘草貳兩半拍破用水貳碗浸壹宿慢火煮至半碗去滓旋旋洒入天南星末慢研之

令甘草水盡入餘藥

豆卷散 治小兒慢驚多用性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱症有病愈而致熱症者有反爲急驚者甚多當問病者幾日因何得之曾以何藥療之可解毒之藥無不效宜此方

大豆黃卷

水浸黑豆生芽是也曬乾

板藍根

貫衆

甘草

炙各壹兩

右四物同爲細末每服半錢至壹錢水煎去滓服甚者參錢漿水內入油數點煎又治吐蟲服無時

龍腦散

治急慢驚風

大黃

蒸

半夏

湯洗薄切用姜汁浸宿焙乾炒

甘草

金星石

禹餘糧

不灰木

青蛤粉

銀星石

寒水石

右各等分同爲細末研入龍腦壹匙再

研勻新水調壹匙至伍分量兒大小與之通解諸毒本舊方也仲陽添入甘松參兩枝藿香葉末壹錢金芽石壹分減大黃一半治藥毒吐血神妙

虛風方 治小兒吐瀉或悞服冷藥脾虛生風因成慢驚

大天南星

壹個重八九錢已上者良

右用地坑子一個深三寸許用炭火伍

觔燒通赤入好酒半盞在內然後入天南星却用炭火三兩條蓋却坑子候南星微裂取出刺碎再炒勻熟不可稍生候冷爲細末每服伍分或壹匙量兒大小濃煎生姜防風湯食前調下無時虛風又方

半夏

壹錢湯洗七次姜汁浸半日曬乾

梓州厚朴

壹兩細剉

右件米泔參升同浸壹百刻水盡爲度

如百刻水未盡加火熬乾去厚朴只將半夏研爲細末每服半匙壹匙薄荷湯調下無時

褊銀圓 治風涎膈實上熱及乳食不消

腹脹喘粗

巴豆

去皮油心膜
研細

水銀

各半兩

黑鉛

貳錢半水銀
結砂子

麝香

伍分另研

好墨

捌錢研

右將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝

香陳米粥和圓如菉豆大捏褊壹歲壹圓貳叁歲貳叁圓伍歲以上伍陸圓煎薄荷湯放冷送下不得化破更量虛實增減並食後

又牛黃膏

治熱及傷風疳熱

雄黃

研

甘草末

川甜硝

各壹分

寒水石

生飛研
壹兩

腦子

壹錢

菉豆粉

半兩

右研勻鍊蜜和成膏薄荷水化下半皂

大食後

五福化毒丹

治瘡疹餘毒上攻口齒躁

煩亦咽乾口舌生瘡及治蘊熱積毒熱

驚惕狂躁

生熟地黃

焙料各伍兩

元參

天門冬

去心

麥門冬

去心焙料各參兩

甘草

炙

甜硝

各貳兩

青黛

壹兩半

右上八味爲細末後研入硝黛鍊蜜圓

如雞豆大每服半圓或壹圓食後水化

下

羌活膏

治脾胃虛肝氣熱盛生風或取

轉過或吐瀉後爲慢驚亦治傷寒

羌活

去蘆頭

川芎

人參

去蘆頭

赤茯苓

去皮

白附子

炮各半兩

天麻

壹兩

白殭蠶

酒浸炒黃

乾蝎

去毒炒

白花蛇

酒浸取肉焙乾各分

川附子

炮去皮

防風

去蘆頭切焙

麻黃

去節秤各叁錢

荳蔻肉

雞舌香

即母丁香

藿香葉

木香

各壹錢

輕粉

壹錢

珍珠

麝香

牛黃

各壹錢

龍腦

半匙

雄黃

辰砂

各壹分已上十味各別研入

右同爲細末熟蜜和劑旋圓大豆大每服一二圓食前薄荷湯或麥冬湯溫化下實熱驚急勿服性溫故也服無時

郁李仁圓 治襁褓小兒大小便不通驚

熱痰實欲得溏動者

郁李仁

去皮

川大黃

去粗皮取實者剉酒浸半日控乾炒爲末各壹兩

滑石

半兩研細

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石圓如黍米大量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

犀角圓

治風熱痰實面赤大小便秘澀

三焦邪熱府藏縕毒踈導極穩方

生犀角末

壹分

人參

去蘆頭切

枳實

去瓢炙

檳榔

半兩

黃連

壹兩

大黃

戴雨酒浸切片以巴豆去皮壹柏錢貼在大黃上置裏飯上蒸三次切妙令黃焦去巴豆不用

右爲細末鍊蜜和圓如麻子大每服壹貳拾圓臨卧熟水下未動加圓亦治大人孕婦不損

異功散

溫中和氣治吐瀉不思乳食凡

小兒虛冷病先與數服以助其氣

人參

切去頂

茯苓

去皮

白朮

陳皮

剉

甘草

各等分

右爲細末每服貳錢水壹盞生薑伍片棗兩個同煎至柒分食前溫服量多少與之

藿香散

治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽

及轉過度者

麥門冬

去心焙

半夏麴

甘草

炙去水

藿香葉

壹兩

右爲末每服伍分至壹錢水壹盞半煎柒分食前溫服

如聖圓 治冷熱疳瀉

胡黃連

白蕪荑

去扇炒

川黃連

各貳兩

史君子

壹兩去壳秤

麝香

別研伍分

乾蝦蟇

伍枚剉酒熬膏

右爲末用膏圓如麻子大每服人參湯下貳叁歲者伍柒圓以上者拾圓至拾

伍圓無時

白附子香連圓

治腸胃氣虛暴傷乳哺

冷熱相雜瀉痢赤白裏急後重腹痛撮撮晝夜頻併乳食減少

黃連

木香

各壹分

白附子

大貳個

右爲末粟米飯圓菜豆大或黍米大每服拾圓至貳叁拾圓食前清米飲下日夜各肆伍服

豆蔻香連圓

治泄瀉不拘寒熱赤白陰

陽不調腹痛腸鳴切痛可用如聖

黃連

炒叁分

肉豆蔻

南木香

各壹分

右爲細末粟米飯圓米粒大每服米飲湯下拾圓至貳叁拾圓日夜各肆伍服食前

小香連圓

治冷熱腹痛水穀利滑腸方

木香

訶子肉

各壹分

黃連

半兩炒

右爲細末飯和圓菜豆大米飲下拾圓

至叁伍拾圓頻服之食前

二聖圓

治小兒藏府或好或瀉久不愈

羸瘦成疳

川黃連

去須

黃蘗

去麋皮各壹兩

右爲細末將藥末入猪膽內湯煮熟圓如菜豆大每服貳叁拾圓米飲下量兒大小加減頻服無時

没石子圓

治泄瀉白濁及疳痢滑腸腹

痛者方

木香

黃連

各壹分

没石子

壹個

荳蔻仁

訶子肉

叁個

右爲細末飯和圓麻子大米飲下量兒

大小加減食前

當歸散

治變蒸有寒無熱

當歸

貳錢

木香

官桂

甘草

炙

人參

各壹錢

右咬咀每服貳錢水柒分蓋薑叁片棗

壹枚去核同煎服

溫白圓

治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷

疳洞利及因吐瀉或久病後成慢驚身

冷瘕癰

天麻

生薑兩

白殭蠶

炮

白附子

生

乾蝎

去毒

天南星

劉湯浸柒次焙各壹分

右同爲末湯浸寒食麵和圓如菉豆大
圓了仍與寒食麵內養柒日取出每服
伍柒圓至叁貳拾圓空心煎生薑米飲
漸加圓數多與服

荳蔻散 治吐瀉煩渴腹脹小便少

荳蔻

丁香

各半分

舶上硫黃

壹分

桂府白滑石

叁分

右爲細末每服壹匙至半錢米飲下無

時

溫中圓 治小兒胃寒瀉白腹痛腸鳴吐

酸水不思食及霍亂吐瀉

人參

切去頂焙

甘草

剉焙

白朮

各壹兩爲末

右薑汁麵和圓菉豆大米飲下壹貳拾
圓無時

胡黃連麝香圓 治疳氣羸瘦白蟲作方

胡黃連

白蕪荑

去屑各壹兩

木香

黃連

各半分

辰砂

另研壹分

麝香

別研壹錢

右爲細末麵糊圓菜豆大米飲下伍柒圓至拾圓叁伍歲已上者可拾伍圓貳拾圓無時

大胡黃圓

治一切驚疳腹脹蟲動好喫

泥土生米不思飲食多睡嘔噎藏府或秘或瀉肌膚黃瘦毛焦髮黃飲水五心煩熱能殺蟲消進飲食治瘡癰常服不

瀉痢方

胡黃連

黃連

苦楝子

各壹兩

白蕪荑

去節半兩
秋切叁分

蘆薈

另研

乾蟾頭

燒存性另
研各壹分

麝香

壹錢另研

青黛

壹兩半另研

右先將前肆味爲細末猪膽汁和爲劑每壹胡桃大入巴豆仁用油單一重裹之蒸熟去巴豆用米壹升許蒸米熟爲度入後肆味爲圓如難圓少入麵糊圓

麻子大每服拾圓拾伍圓清米飲下食後臨卧日進叁兩服

榆仁圓 治疳熱瘦悴有蟲久服充肥

榆仁

壹度

黃連

去頭各壹兩

右爲細末用猪膽柒個破開取汁與貳藥同和入碗內甑上蒸九日每日壹次候日數足研麝香伍分湯浸一宿蒸餅同和成劑圓如菉豆大每服伍柒圓至

壹貳拾圓米飲下無時

大蘆薈圓 治疳殺蟲和胃止瀉

蘆薈

研

木香

青橘皮

胡黃連

黃連

白蕪荑

去屑秤

雷丸

鶴虱

微炒各半兩

麝香

貳錢另研

右爲細末粟米飲圓菉豆大米飲下貳拾圓無時

龍骨散

治疳口瘡走馬疳

砒霜

蟾酥

各壹匙

粉霜

伍分

龍骨

壹錢

定粉

壹錢伍分

龍腦

半匙

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同研每用少許傳之

橘連圓

治疳瘦久服消食和氣長肌肉

陳橘皮

壹兩

黃連

壹兩伍錢去鹽漬米泔浸壹日

右爲細末研入麝香伍分用猪膽柒個分藥入在膽內漿水煮候臨熟以針微

剉破以熟爲度取出以粟米粥和圓菜豆大每服拾圓至貳叁拾圓米飲下量兒大小與之無時

龍粉圓

治疳渴

草龍膽

定粉

烏梅肉

焙秤

黃連

各貳分

右爲細末煉蜜圓如麻子大米飲下壹貳拾圓無時

香銀圓 治吐

丁香

乾葛

各壹兩

半夏

湯浸七次切焙

水銀

各半兩

右上叁味同爲細末將水銀與藥同研
勻生薑汁圓如麻子大每服壹貳圓至
五七圓煎金銀湯下無時

金華散

治乾濕瘡癬

黃丹

煨壹兩

輕粉

壹錢

黃蘗

黃連

各半兩

麝香

少許

右爲末先洗次乾摻之如乾癬瘡用臘
用豬脂和傅如無用麻油亦可加黃芩
大黃

安蟲圓

治上中二焦虛或胃寒蟲動及

痛又名苦楝圓方

乾漆

叁分杵碎炒
烟盡

雄黃

巴豆霜

壹錢

右爲細末麵糊圓黍米大量兒大小與

服取東行石榴根煎湯下痛者煎苦楝根湯下或蕪荑湯下伍柒圓至叁貳拾圓發時服

蕪荑散

治胃寒蟲痛

白蕪荑

索扇秤

乾漆

炒各等分

右爲細末每服壹匙伍分或壹錢米飲調下發時服右方杜壬養生必用方同杜亦治胃寒蟲上

膽礬圓

治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

膽礬

真者壹錢爲憑末

綠礬

真者貳兩

大棗

拾肆個去核

好醋

壹升

已上肆物同煎熬令棗爛和後藥

史君子

貳兩去壳

枳實

去穢炒叁兩

黃連

訶黎勒

去穢各兩並爲麤末

巴豆

三枚去皮破之

已上伍物同炒令黑約叁分乾入後藥

夜明砂

壹兩

蝦蟇灰

存性壹兩

苦楝根皮

末半兩

已上參物再同炒候乾同前肆物杵羅
爲末却同前膏和入臼中杵千下如未
成更旋入熟棗肉亦不可多恐服之難
化太稠卽入溫水可圓卽圓如菉豆大
每服貳叁拾圓米飲溫水下不拘時

真珠圓

取小兒虛中一切積聚驚涎宿

食乳癖治大小便澁滯療腹脹行滯氣

木香

白丁香

真考

丁香

末

巴豆仁

油桐水浸
宿餅穢膩

輕粉

各等分
少許爲末

白滑石

末等分

右爲末研勻濕紙裹燒粟米飯圓麻子

大壹歲壹圓捌玖歲已上至拾伍歲服

捌圓炮皂子煎湯放冷下挾風熱難動

者先服涼藥壹服乳癖者減圓數隔日

臨卧壹服

消堅圓

消乳癖及下交妳又治痰熱膈

實取積

礱砂末

巴豆霜

輕粉

各壹錢

水銀砂子

兩是

細墨

少許

黃明膠

末伍錢

右同研勻入麪糊圓如麻子大倒泔水下壹歲壹圓食後

百部圓

治肺寒壅嗽微有痰

百部

參兩炒

麻黃

去節

杏仁

淨個去皮尖微炒煮三伍沸

右爲末煉蜜圓如芡實大熱水化下加松子仁肉五十粒糖圓之含化大妙

紫草散

發斑疹

鈎藤鈎子

紫草茸

各等分

右爲細末每服壹匙或伍分壹錢溫酒調下無時

秦茺散

治潮熱減食蒸瘦方

秦茺

去蘆頭切焙

甘草

炙各壹兩

乾薄荷

半兩勿焙

右爲麁末每服壹貳錢水壹中盞煎至捌分食後溫服

地骨皮散 治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

及餘熱方

地骨皮

白椽佳

知母

銀州柴胡

去蘆

甘草

炙

半夏

湯洗七次切焙

人參

切去頂婦

赤茯苓

各等分

右爲細末每服貳錢薑伍片水壹盞煎至捌分食後溫服量大小加減

人參生犀散

解小兒時氣寒壅欬嗽痰

逆喘滿心忪驚悸藏府或秘或泄調胃進食又主一切風熱服尋常涼藥卽瀉而減食者

人參

切去蘆桑錢

前胡

去蘆桑錢

甘草

炙黃貳錢

桔梗

杏仁

去皮尖略曝乾爲末秤各伍錢

右將前肆味爲末後入杏仁再粗羅羅過每服貳錢水壹盞煎至捌分去滓溫服食後

三黃圓

治諸熱

黃芩

辛酉志

大黃

庚辰年夏

黃連

去積各壹錢

右同爲細末麪糊圓菉豆大或麻子大
每服伍柒圓至拾伍圓貳拾圓食後米
飲送下

治顙開不合鼻塞不通方

天南星大者微炮去皮爲細末淡醋調
塗緋帛上貼顙上火炙手頻熨之

黃芪散

治虛熱盜汗

牡蠣

煨

黃芪

生地黃

各等分

右爲末煎服無時

虎杖散

治實熱盜汗

右用虎杖剉水煎服量多少與之無時
捻頭散 治小便不通方

延胡索

川苦楝

各等分

右同爲細末每服伍分或壹錢捻頭湯

調下量多少與之如無捻頭湯卽湯中
滴油數點食前

羊肝散 治瘡疹入眼成翳

右用蟬蛻末水煎羊子肝湯調服貳叁
錢凡痘瘡纔欲著痂卽用酥或面油不
住潤之可揭卽揭去若不潤及遲揭瘡
硬卽隱成癍痕

蟬蛻散 治斑瘡入眼半年已內者壹月

取効

蟬蛻

去土取末壹兩

猪懸蹄甲

貳兩罐子內監泥固濟燒存性

右二味研入羚羊角細末壹分拌勻每
服壹匙百日外兒伍分叁歲以上壹貳
錢溫水或新水調下日三四夜一二食
後服一年以外難治

烏藥散 治乳母冷熱不和及心腹時痛
或水瀉或乳不好

天台烏藥 香附子

破用白者

高良薑

赤芍藥

右各等分爲末每服壹錢水壹盞同煎
陸分溫服如心腹疼痛入酒煎水瀉米
飲調下無時

二氣散 治冷熱驚吐反胃一切吐利諸
治不效者

硫黃

半兩研

水銀

鐵錢半研不見星

右每服壹匙至伍分生薑水調下或同
炒結砂爲圓

葶藶圓

治乳食衝肺咳嗽面赤痰喘

甜葶藶

腸帶炒

黑牽牛

炒

漢防已

杏仁

炒去皮尖各壹錢

右爲末入杏仁泥取蒸陳棗肉和搗爲
圓如麻子大每服伍圓至柒圓生薑湯
送下

麻黃湯

治傷風發熱無汗咳嗽喘急

麻黃

去節參錢水煮去沫曬乾

肉桂

貳錢

甘草

炙壹錢

杏仁

柒個去皮尖製炒黃研膏

每服壹錢水煎服以汗出爲度自汗者

不宜服

生犀磨汁

治瘡疹不快吐血衄血

生犀磨汁

大黃圓

治諸熱

大黃

黃芩

各壹兩

右爲末煉蜜圓如菉豆大每服伍圓至拾圓溫蜜水下量兒加減

史君子圓

治藏府虛滑及疳瘦下利腹

脇脹滿不思乳食常服安蟲補胃消疳

肥肌

厚朴

去麋皮薑汁塗汁

甘草

炙

訶子肉

半生半煨

青黛

各半兩如是惡驚及帶熱瀉入此味如只變疳不調不用此味

陳皮

去白壹分

史君子

去殼生兩麵裏煨熟去麵不用

右爲末煉蜜圓如小雞豆大每服壹圓
米飲化下百日已上一歲已下服半圓
乳汁化下

青金丹 疎風利痰

蘆薈

牙硝

青黛

各壹錢

史君子

叁枚

硼砂

輕粉

各伍分

蝎梢

拾肆個

右末磨香墨拌圓麻子大每叁圓薄荷

湯下

燒青圓

治乳癖

輕粉

粉霜

硼砂

各壹錢

白麵

貳錢

玄精石

壹分

白丁香

壹匙

定粉

壹錢

龍腦

拾匙

右同一處研令極細滴水和爲壹餅以
文武火燒熟勿焦再爲末研如粉麵滴

水和圓如黃米每服柒圓漿水化下叁歲以下服伍圓量兒大小加減服之此古方也



敗毒散 治傷風瘟疫風濕頭目昏暗四肢作痛增寒壯熱項強睛疼或惡寒咳嗽鼻塞聲重

柴胡

洗去蘆

前胡

川芎

枳殼

炒

羌活

獨活

茯苓

桔梗

炒

人參

各壹兩

甘草

半兩

右爲末每服貳錢生薑薄荷煎加地骨皮天麻或㕮咀加蟬蛻防風治驚熱可加芍藥乾葛黃芩無汗加麻黃

錢氏小兒藥證目錄卷下

終

					文天祥 忠貞堂	文天祥 忠貞堂	文天祥 忠貞堂	文天祥 忠貞堂
--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

附董氏小兒斑疹備急方論

宋刻錢氏小兒藥證

下卷

宋本不借造化孩童

秘帙

懸罄室舊藏

宋刻錢氏小兒藥證直訣下



附方

閻孝忠

余家幼稚多疾率用錢氏方設取效如神
因復研究諸法有得于心如驚疳等錢仲
陽之未悉者今見於下并以仲陽傳附卷末
小兒急慢驚古書無之惟曰陰陽癇所謂
急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之
類是也陽動而速故陽病曰急驚陰靜
而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱

之別治之不可悞也急驚由有熱熱即生風又或因驚而發則目上目劄涎潮搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱藥壹貳服直說中藥香圓鎮心圓抱龍圓辰砂圓及至寶丹紫雪之類候驚勢已定須更以藥下其痰勢直說中利驚圓軟金丹挑枝圓之類或用大黃朴硝等藥利下痰熱心神安寧即愈慢驚得於大病之餘吐

瀉之後或悞取轉致脾胃虛損風邪乘之凡小兒吐瀉不止必成慢驚宜速治此名與癡似睡而

精神慢四肢與口中氣皆冷睡露睛或胃痛而啼哭如鵝聲此證已危蓋脾胃虛損故也

凡小兒吐瀉當溫補之余每用理中圓以

溫其中以五苓散導其逆五苓散最治小兒吐瀉連與

數服兼用異功散等溫藥調理之往往

便愈若已虛損當速生其胃氣宜與附

子理中圓研金液丹末煎生薑米飲調

灌之惟多服乃效

服至貳叁兩無害

候胃氣已生

手足漸暖陰退陽回然猶瘕癥即減金

液丹壹貳分增青州白圓子壹貳分同

研如上服以意詳之漸減金液丹加

白圓子兼用異功散菴活膏溫白圓

釣藤飲子之類調理至安依此治之仍

頻與粥雖至危者往往死中得生拾救捌玖

金液丹治小兒吐瀉虛極最妙沈存中良

方論金液丹云親見小兒吐利劇氣已絕

服之復活者數人真不妄也須多服方驗

驚風或洩瀉等諸病煩渴者皆津液內耗

也不問陰陽宜煎錢氏白朮散使滿意

取足飲之彌多彌好

凡小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢

驚雖靜乃危病也急驚方搐但扶持不可擒捉蓋風氣方盛恐流入筋脉或致手足拘攣

治急慢驚世人多用壹藥有性溫性涼不可泛用宜審別之又治慢驚藥宜去龍腦縱須合用必以溫藥爲佐或少用之凡小兒實熱踈轉後如無虛證不可妄溫補熱必隨生

治小兒驚風痰熱堅癖能不用水銀輕粉甚便如不得已用之僅去疾即止蓋腸胃易傷亦損口齒

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致悞也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐食宜以藥下之

小兒耳冷翕冷手足乍冷乍熱面赤時嗽
嚏驚悸此瘡疹欲發也未能辨認間服
升麻葛根湯消毒散已發未發皆宜服
仍用胡荽酒黃蘗膏暑月煩躁食後與
白虎湯玉露散熱盛與紫雪咽痛或生
瘡與甘桔湯甘露飲子餘依錢氏說大人同
小兒多因愛惜過當往往參兩歲未與飲
食致脾胃虛弱平生多病自半年以後

宜煎陳米稀粥取粥面時時與之拾月
以後漸與稠粥爛飯以助中氣自然易
養少病惟忌生冷油膩甜物等

小兒治法大槩與大人同惟劑料小耳如
升麻葛根湯惺惺散等雖人皆知之倉卒亦
難檢今並載于下錢氏已有方者今不復錄
升麻葛根湯治傷寒溫疫風熱壯熱頭痛
肢體痛瘡疹已發未發並宜服之

乾葛

剉細

升麻

芍藥

甘草

坐炙各等分

右同爲麤末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞量大小與之溫服無時

惺惺散治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和

桔梗

細辛

去葉

人參

切去頂焙

甘草

剉炒

白朮

白茯苓

去皮

芡薤根

各壹兩

右同爲細末每服貳錢水壹盞入薤荷伍葉煎至柒分溫服不拘時如要和氣入生薑伍片同煎壹法用防風壹分用川芎壹分

消毒散治瘡疹未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈去痰治咽痛

牛旁子

貳兩炒

甘草

半兩剉炒

荆芥穗

壹分

右同爲鹿末每服參錢水壹盞半煎至壹盞溫服不拘時

黃蘗膏治瘡疹已出用此塗面次用胡荽酒

黃蘗

去麤皮壹兩

甘草

肆兩

新葦豆

壹兩半

右同爲細末生油調從耳前至眼輪並厚塗之日叁兩次如早用瘡不上面縱有亦少

胡荽酒

胡荽

細切肆兩以好酒貳盞煎壹兩沸入胡荽再煎少時用物合定放冷

右每吸壹兩口微噴從頂至足勻遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽即能辟去汗氣瘡疹出使

瘡疹忌外人及穢觸之物雖不可受風冷然亦不可擁過常令衣服得中并虛涼處坐卧

治瘡疹出不使及倒極四聖散

紫草茸

木通

甘草

枳殼

麩炒去穢

黃耆

切焙

右同爲麩末每服壹錢水壹中盞煎捌分溫服無時

又方藍根散

板藍根

壹兩

甘草

叁分

右同爲細末每服半錢或壹錢取雄鷄冠血塗兩點同溫酒少許食後同調下

貳方無證勿服

治瘡疹倒撮黑陷

人牙

燒存性研入麝香少許

右每服叁錢溫酒少許調下無時

又方

小豬兒尾尖

取血叁伍點研入生龍腦少許

右新水調下食後

治伏熱在心昏瞶不省或悞服熱藥搐熱

冒昧不知人及瘡疹倒撮黑陷

生梅花腦子

研半字
或壹字

右取新殺猪心壹箇取心中血同研作大圓用新汲水少許化下未省再服如瘡疹陷伏者溫酒化下

甘露飲子治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發並可服又治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搖

生乾地黄

焙

熟乾地黄

焙

天門冬

麥門冬

各去心
焙

枇杷葉

去毛

黃芩

去心

石斛

去苗

枳殼

麩炒
去穢

甘草

劉炒

山茵陳葉

右各等分爲鹿末每服貳錢水壹盞煎捌分食後溫服牙齒動搖牙齦腫熱含嗽泔并服

白虎湯解暑毒煩躁身熱痰盛頭痛口燥

大渴

知母

壹兩半
焙乾秤

甘草

半兩
剉炒

石膏

肆兩

白粳米

捌錢

右同爲麋末每服參錢水壹盞煎至捌分食後溫冷隨意服氣虛人加人參少許同煎

瘡疹太盛宜服此調肝散令不入眼

生犀

錯取末
壹分

草龍膽

半錢

黃耆

半兩
切

大黃

去皮
貳錢

石膏

半兩

桑白皮

白搗
焙乾

釣藤鈎子

麻黃

去節各
壹分

括萎

去
皮

甘草

炙各
等分

右爲麋末每服貳錢水壹盞煎半盞食後時時溫服少許

治瘡疹入眼

馬屁勃

半兩

皂角子

拾肆箇

蛇皮

半兩

右入小罐子內鹽泥固濟燒存性研細

溫酒調下壹貳錢食後服

又方治瘡疹入眼成翳

括藁根

半兩

蛇皮

貳錢

右同爲細末用羊子肝壹箇批開入藥末貳錢麻纏定米泔煮熟頻與食之未能食肝令乳母多食

又方

蟬殼

末

右用水煎羊子肝湯調服貳叁錢

凡豆瘡才欲着痂即用酥或面油不住潤之可揭即揭去若不潤及遲揭瘡痂硬即隱成癍痕

治口瘡

大天南星

去皮只取中心如龍腦大爲細末

右用醋調塗脚心

治癰耳

白礬

大飛壹錢

麝香

壹字

坯子烟脂

染烟脂也壹錢

右同研勻每用少許先用綿裹杖子搨淨搽之

治畜熱在中身熱狂躁昏迷不食

豆豉

兩半

大梔子人

茶箇掇破

右共用水參盞煎至貳盞看多少服之無時或吐或不吐立效

治虫咬心痛欲絕

五靈脂

末貳錢匕

白礬

大飛半錢匕

右同研每服壹貳錢水壹盞煎伍分溫服無時當吐出虫

治脾胃虛寒吐瀉等病及治冷痰

齊州半夏

湯浸紫灰切焙壹兩

陳粟米

參分陳穀米亦得

右咬咀每服參錢水壹大盞半生薑拾片同煎至捌分食前溫熱服

治外腎腫硬成疔

乾蚯蚓

爲細末

右用唾調塗常避風冷濕地

小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內吊釣
藤膏

沒藥

研

好乳香

水中坐乳鉢研細秤

木香

薑黃

各肆錢

木鱉子人

拾貳箇

右先將下參味同爲細末次研入上貳

味煉蜜和成劑收之每壹歲兒可服半
皂子大餘以意加減前釣藤湯化下無
時次用魏香散

魏香散

蓬莪朮

半兩

真阿魏

壹錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮壹晝夜
焙乾爲細末每服壹字或半錢煎紫蘇
米飲空心調下

地黃散治心肝壅熱目赤腫痛生赤脉或白膜遍睛四邊散漫者猶易治若暴遮黑睛多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

生乾地黃

切焙

熟乾地黃

切焙

當歸

去蘆頭切焙

黃連

去驢

木通

壹錢

玄參

半錢

甘草

壹錢半

防風

去蘆頭焙

羌活

生犀

末

蟬殼

去土

木賊

穀精草

白蒺藜

去尖

沙苑蒺藜

各壹錢

大黃

去皮取實者

右爲細末每服壹字或半錢量大小加減煎羊肝湯食後調下日叁夜壹忌口

將息亦治大人

治熱痢下血

黃蘗

去皮

赤芍藥

肆錢

右同爲細末飯和圓麻子大每服壹貳拾圓食前米飲下大者加圓數

治心氣不足伍陸歲不能言菖蒲圓

石菖蒲

錢貳

丹參

錢貳

人參

切去頂

焙半兩

赤石脂

錢叁

天門冬

去心

麥門冬

去心

焙半兩

右同爲細末煉蜜圓菴豆大或麻子大
溫水下伍柒圓至壹貳拾圓不計時日
叁肆服久服取效又有病後腎虛不語
者宜兼服錢氏地黃圓
雞頭圓治諸病後不語

雄雞頭

壹箇

鳴蟬

叁箇

大黃

壹兩

取實處

甘草

壹兩

木通

半兩

當歸

去蘆頭切

焙叁分

黃耆

焙切

川芎

遠志

去心

麥門冬

去心

人參

切去頂

焙半兩

右同爲細末煉蜜圓小豆大平旦米飲
下伍圓空心日叁肆兒大者加之久服
取效雞蟬貳物宜求死者用之不可旋
殺孫真人所謂殺生求生去生更遠不

可不知也

治腎虛或病後筋骨弱伍陸歲不能行宜
補益肝腎羚羊角圓

羚羊角

尖細而節密者是錯取末

生乾地黄

焙

虎脰骨

敲破塗酥炙黃

酸棗人

去皮炒

白茯苓

各半兩

桂

去皮取有味處不見火

防風

去蘆頭切焙

當歸

同上

黃耆

切焙各壹分

右同爲細末煉蜜和成劑每服壹皂子

大兒大者加之食前溫水化下日參肆服取效

治驚風中風口眼喎斜語不正手足偏廢
不舉全蝎散

全蝎

去毒炒

僵蚕

直者炒

甘草

赤芍藥

桂枝

不見火

麻黃

去節

川芎

黃芩

去心各壹錢

天麻

陸

大天南星

湯浸漚次去反

右爲麋末每服參錢水壹盞半薑柒片煎柒分溫服無時量大小與之日叁肆服忌羊肉

和中散和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

人參

切去頂焙

白茯苓

白朮

甘草

剉炒

乾葛

剉

黃耆

切焙

白扁豆

炒

藿香葉

各等分

右爲細末每服參錢水壹盞乾薑貳箇

去核薑伍片煎捌分食前溫服

紫蘇子散治欬逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣或呵氣未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

紫蘇子

訶子

去核秤

蘿蔔子

杏仁

去皮尖麩炒

木香

人參

切去頭各叁兩

青橘皮

甘草

剉炒各壹兩半

右爲細末每服壹錢水壹小盞入生薑

參片煎至伍分去滓不計時候溫服量
大小加減

赤石脂散治痢後軀氣下推出肛門不入

真赤石脂

揀去土

伏龍肝

各等分

右爲細末每用半錢傅腸頭上頻用

藥墨散治斷臍後爲水濕所傷或棚袍濕
氣傷於臍中或解脫風冷所乘故令小兒
四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜速療之

黃蘗

炒

金下墨

亂髮

燒各等分

右爲細末每用少許傳之

至寶丹治諸癰急驚心熱卒中客忤不得
眠睡煩躁風涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔
吐並宜服之

生烏犀屑

生玳瑁屑

琥珀

研

朱砂

細研水飛

雄黃

已上各壹兩研細水飛

金箔

伍拾片壹半爲末

銀箔

伍拾片研

龍腦

壹分研

麝香

壹分

牛黃

半兩

安悉香

壹兩半為末以無灰酒飛過濾淨去砂石約取壹兩慢火熬成膏

右生犀玳瑁搗羅為細末研入餘藥令勻將安悉香膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入少熟蜜盛不津器中旋圓如桐子大貳歲兒服兩圓人參湯化下大小以意加減又治大人卒中不語中惡氣絕中諸物毒中熱暗風產後血運死

胎不下並用童子小便壹合生薑自然汁參伍滴同溫過化下伍圓立效

紫雪治驚癇百病煩熱涎厥及傷寒胃熱發斑一切熱毒喉痺腫痛又治瘡疹毒氣上攻咽喉水漿不下

黃金

拾兩

寒水石

磁石

滑石

石膏

各肆兩捌錢並搗碎

已上用水伍升煮至肆升去滓入

下項藥

玄參

壹兩陸錢搗碎

木香

陸錢

羚羊角屑

犀角屑

沉香

各半兩搗碎

升麻

壹兩陸錢搗碎

丁香

壹錢搗碎

甘草

捌錢炙剉

已上捌味入前藥汁中再煮取壹升伍合去滓入下項藥

消石

參兩壹錢芒消亦得

朴消

壹斤精者

已上貳味入前汁中微火上煎

木篦攪不住手候有柴合投在水盆中半日欲凝入下項藥

朱砂

參錢飛研

麝香當歸子

壹錢壹字研

已上貳味入前藥中攪勻寒之兩日

右件成紫色霜雪每服壹字至半錢冷水調下大小以意加減咽喉危急病捻少許乾嚙立效又治大人脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫

毒厲卒死溫瘧五尸五疰大能解諸藥
毒每服壹錢至貳錢冷水調下並食後服
理中圓治吐利不渴米穀不化手足厥冷
人參去蘆 白朮生
乾薑炮 甘草炙剉各
右爲末煉蜜和圓鷄黃大每服壹圓水
壹大盞化開煎及染分連滓放溫服小
兒分爲叁服大小以意加減食前

五苓散治霍亂吐瀉躁渴飲水小便不利

澤瀉貳兩
半剉

木猪苓去皮剉
壹兩半

官桂去皮
壹兩

白茯苓壹兩
半剉

白朮壹兩
半剉

右爲細末每服壹錢溫湯調下渴躁新
水調服大小以意加減不以時候

附子理中圓治脾胃寒弱風冷相乘心痛
霍亂吐利轉筋

人參去蘆

白朮生

乾薑炮

甘草

炙對

黑附子

炮去皮臍各壹兩

右爲細末煉蜜和壹兩作拾圓每服壹圓水壹中盞化開煎及柒分稍熱服食前小兒分作叁兩服大小以意加減金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥逆精神昏塞多睡露睛口鼻氣涼欲成慢驚風者又治大人陽虛陰盛身冷脉微自汗吐利小便不禁

船上硫黃

拾兩先飛煉去砂石秤研爲細末用砂合子盛令捌分滿水和赤石脂封

縫鹽泥固濟歇乾露地先埋壹水罐子盛水滿坐合子在土又以泥固濟訖常以叁斤火養叁日叁夜足加頂

火壹燉成候冷取藥

右以柳木搥乳鉢內研爲細末每服貳錢生薑米飲調下大小以意加減多服取效大人藥末壹兩蒸餅壹兩水浸去水脉和圓桐子大燉乾每服伍拾圓至百圓米飲下並空心連併服

又方

范正宅

硫黃

不以多少淡黃通明者為上飛煉去砂石研為細末用有蓋砂罐子壹箇取水中田字草或益

母草搗發土成泥更入紙筋同搗固濟罐子貴不破熬乾盛硫黃末在內可不滿兩指於露地深盡十字放罐子在中心使底下通透四面用炭約肆伍斤勾火簇不蓋罐子頂時時揭觀候化為汁速去四面火用濕土埋壹宿次日取出於北蔭下不見日氣處攤壹坑子約壹貳尺將罐子去蓋倒埋壹宿次日取出和罐入湯內煮伍拾沸濾出取藥

右以柳木槌乳鉢內研如粉麵相似小兒因吐瀉之後變成慢驚風者每服壹

貳錢生薑米飲調下併服取效大人陰證傷寒脉微欲絕以水浸無鹽蒸餅和圓桐子大熬乾每服伍拾圓或百圓米飲下並空心服

青州白圓子治小兒驚風大人諸風

半夏

生柴兩

天南星

生參兩

白附子

生貳兩

川烏頭

半兩生去皮臍

右搗羅為細末以生絹袋盛用井花水

擺未出者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋擺盡爲度放磁盆中日熬夜露至曉棄水別用井花水攪又熬至來日早再換新水攪如此春伍日夏叁日秋柒日冬拾日壹法肆時只浸壹宿去水熬乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清圓菉豆大每服叁伍圓薄荷湯下大人每服貳拾圓生薑湯下癰瘰風溫酒下並不以時候服

小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頭痛項強四肢煩疼往來寒熱嘔噦痰實中暑瘧病並宜服

柴胡

去蘆
捌錢

半夏

湯洗切焙
貳錢半

黃芩

去
心

人參

去
蘆

甘草

炙對各
叁錢

右爲麤末每叁錢水壹盞半生薑伍片棗壹枚擘破同煎及捌分濾去滓放溫分作叁兩服大小以意加減並不以時

候日參夜貳

錢仲陽傳

河間劉跂撰

錢乙字仲陽上世錢塘人與吳越王有屬
做納土曾祖贊隨以北因家於鄆父顯善
針醫然嗜酒喜游一旦匿姓名東游海上
不復返乙時參歲母前亡父同產嫁醫呂
氏哀其孤收養為子稍長讀書從呂君問
醫呂將歿乃告以家世乙號泣請往跡父

凡五六返乃得所在又積數歲乃迎以歸
是時乙年叁拾餘鄉人驚嘆感慄爲泣下
多賦詩詠其事後柒年父以壽終喪葬如
禮其事呂君猶事父呂君歿無嗣爲之收
葬行服嫁其孤女歲時祭享皆與親等乙
始以顛顛方著山東元豐中長公主女有
疾召使視之有功奏授翰林醫學賜緋明
年皇子儀國公病瘵瘵國醫未能治長公

主朝因言錢乙起草野有異能立召入進
黃土湯而愈神宗皇帝召見褒諭且問
黃土所以愈疾狀乙對曰以土勝水水得
其平則風自止且諸醫所治垂愈小臣適
當其愈天子悅其對擢太醫丞賜紫衣
金魚自是戚里貴室逮士庶之家願致之
無虛日其論醫諸老宿莫能持難俄以病
免哲宗皇帝復召宿直禁中久之復辭

疾賜告遂不復起乙本有羸疾性簡易嗜酒疾屢攻自以意治之輒愈最後得疾憊甚乃嘆曰此所謂周痺也周痺入藏者死吾其已夫已而曰吾能移之使病在末因自製藥日夜飲之人莫見其方居亡何左手足攣不能用乃喜曰可矣又使所親登東山視菟絲所生秉火燭其下火滅處斮之果得茯苓其大如斗因以法噉之閱月

而盡繇此雖偏廢而氣骨堅悍如無疾者退居里舍杜門不冠屨坐卧一榻上時時閱史書雜說客至酌酒劇談意欲之適則使二僕夫輿之出沒閭巷人或邀致之不肯往也病者曰造門或扶携強負累累滿前近自隣井遠或百數十里皆授之藥致謝而去初長公主女病泄利將殆乙方醉曰當發疹而愈尉馬都尉以爲不然怒責

之不對而退明日疹果出尉喜以詩謝之
廣親宗室子病診之曰此可無藥而愈顧
其幼曰此兒旦夕暴病驚人後參日過午
無恙其家恚曰幼何疾醫貪利動人乃如
此明日果發癰甚急復召乙治之參日愈
問何以無疾而知曰火急直視心與肝俱
受邪過午者心與肝所用時當更也宗室
王子病嘔泄醫以藥溫之加喘乙曰病本

中熱脾且傷奈何以剛劑燦之將不得前
後搜與石膏湯王與醫皆不信謝罷乙曰
毋庸復召我後貳日果來召適有故不時
往王疑且怒使人十數輩趣之至曰固石
膏湯證也竟如言而效有士人病欬面青
而光其氣哽哽乙曰肝乘肺此逆候若秋
得之可治今春不可治其家祈哀彊之與
藥明日曰吾藥再瀉肝而不少卻參補肺

而益虛又加脣白法當參日死然安穀者
過期不安穀者不及期今尚能粥居五日
而絕有妊婦得疾醫言胎且墮乙曰娠者
五藏傳養率六旬乃更誠能候其月偏補
之何必墮已而子母皆得全又乳婦因大
恐而病病雖愈目張不得瞑人不能曉以
問乙乙曰黃郁李酒飲之使醉則愈所以
然者目系內連肝膽恐則氣結膽衡不下

惟郁李去結隨酒入膽結去膽下目則能
瞑矣如言而效一日過所善翁聞兒唬愕
曰何等兒聲翁曰吾家孿生二男子乙曰
謹視之過百日乃可保翁不憚居月餘皆
斃乙爲方博達不名一師所治種種皆通
非但小兒醫也於書無不闕它人靳靳守
古獨度越縱舍卒與法合尤邃本草多識
物理辨正闕誤人或得異藥或持疑事問

之必爲言出生本末物色名貌退而考之
皆中末年寧痺浸劇其嗜酒喜寒食皆不
肯禁自診知不可爲召親戚訣別易衣待
盡享年捌拾貳終於家所著書有傷寒論
指微伍卷嬰孺論百篇一子早世二孫今
見爲醫

劉跂曰乙非獨其醫可稱也其篤行似儒
其奇節似俠術盛行而身隱約又類夫有

道者數謂余言曩學六元五運夜宿東平
王冢巔觀氣象至逾月不寐今老且死事
誠有不在書者肯以三十日暇從我當相
授余笑謝弗能是後遂不復言嗚呼斯人
也如欲復得之難哉沒後余聞其所治驗
尤衆東州人人能言之劉其章章者著之
篇異時史家序方術之士其將有考焉

董氏小兒斑疹備急方論序

世之人有得一奇方可以十全愈疾者恐
恐然惟慮藏之不密人或知之而使其藥
之不神也其亦陋矣夫藥之能愈病如得
人人而告之使無天橫各盡其天年以終
此亦仁術也吾友董及之少舉進士不第
急於養親一日盡棄其學而從事於醫然
醫亦非鄙術矣古之人未嘗不能之如張



董氏小兒斑疹備急方論序

世之人有得一奇方可以十全愈疾者恐
恐然惟慮藏之不密人或知之而使其藥
之不神也其亦陋矣夫藥之能愈病如得
人人而告之使無天橫各盡其天年以終
此亦仁術也吾友董及之少舉進士不第
急於養親一日盡棄其學而從事於醫然
醫亦非鄙術矣古之人未嘗不能之如張



仲景陶隱居葛洪孫思邈皆名於後世且
昧者爲之至於異貴賤別貧富自鄙其學
君子不貴也及之則不然凡人之疾苦如
已有之其往來病者之家雖祁寒大暑未
嘗少憚至於貧者或昏夜自惠薪粢以周
其乏者多矣他日斃小兒斑疹方一秩見
過求序於余因爲引其略亦便見及之之
所存知世之有奇方可以療疾者不足貴

也如此東平十柳居士孫準平甫序

又

夫上古之世事質民淳稟氣純粹邪不能
干縱有疾病祝由而已雖大人方論尚或
未備下逮中古始有巫妨氏者著小兒顱
顱經以下壽夭別死生歷世相援於是小
兒方論興焉然在襁褓之時藏府嫩弱脉
促未辨痒不知處痛亦難言祇能啼叫至

於變茲驚風客忤解顱近世巢氏一一明
之然於斑疹欲出證候與傷風相類而略無
辨說致多謬誤而復醫者不致詳慎或乃虛
者下之實者益之疹者汗之風者溫之轉生
諸疾遂致夭斃噓可歎也今採摭經效秘方
詳明證候通爲壹卷目之曰斑疹備急方非
敢謂有補於後世意欲傳諸好事者庶幾鞠
育之義存焉東平董汲及之序

董氏小兒斑疹備急方論

東平董汲及之論次

總論

論曰夫生民之道自微而著由小而大此
物理灼然不待經史證據可知然小兒氣
稟微弱故小品方云人生陸歲已上爲小
陸歲已下經不全載所以乳下嬰兒有疾
難治者皆爲無所依據至如小兒斑疹壹

候不惟脉理難辨而治療最比他病尤重
始覺證與傷寒陰癰相近通都輔郡名醫
輩出則猶能辨其一二遠地左邑執病不
精失於詳審投藥暴妄加之小兒藏府嬌
嫩易爲傷動斑疹未出往往疑爲傷風即
以麻黃等藥重發其汗遂使表虛裏實若
爲陰癰治之便用溫驚藥品則熱勢愈盛
直至參肆日證候已定方得以斑瘡藥治

之則所失多矣大率世俗醫者斑疹欲出
多以熱藥發之遂使胃中熱極其初作時
即斑疹見於皮下其已出者變黑色而內
陷旣見不快尤用熱藥薰蒸其疾斑疹得
熱則出愈難轉生熱證大小便不通更以
巴豆取積藥下之則使兒藏府內虛熱又
不除邪氣益深變爲喘滿便血或爲痘癰
身體裂破遂使百年之壽一旦爲俗醫所

誤者可不痛哉大抵斑疹之候始覺多咳嗽
身體溫壯面色與四肢俱赤頭痛腰疼眼
睛黃色多腫中瘦癢手足厥耳尖及尻冷
小便赤大便秘三部脉洪數絕大不定是
其候也其乳下兒可兼令乳母服藥其證
候未全或未明者但可與升麻散解之其
已明者即可用大黃青黛等涼藥下之次
即與白虎湯如秋冬及春寒未用白虎湯

之時但加棗煎服不必拘於常法仲景云
五月後天氣大熱即可服白虎湯特言其
梗槩耳大率疹癍未出即可下已出即不
可下出足即宜利大小便其已出未快者
可與紫草散救生散玳瑁散之類其重者
以牛李膏散之或毒攻咽喉者可與少紫
雪及如聖湯無不效也其餘熱不解身熱
煩渴及病疹兒母俱可與甘露飲或便血

者以牛黃散治之兼宜常平肝藏解其敗
熱慮熱毒攻肝即衝於目内生障翳不遇
醫治腫人遂損尤宜慎之然已出未平切
忌見雜人恐勞力之人及狐臭薰觸故也
未愈不可當風即成瘡痂如膿疱出可燒
黑丑糞灰隨瘡貼之則速愈而無瘢也及
左右不可闕胡荽蓋能禦汗氣辟惡氣故
也如兒能食物可時與少葡萄蓋能利小

便及取如穗出使之義也小兒斑疹本以
胎中積熱及將養溫厚偶胃中熱故乘時
而作外臺方云胃爛即發斑微者赤斑出
極者黑斑出赤斑出伍死壹生黑斑出拾死
壹生其府熱即爲疹蓋熱淺也藏熱即爲
疱蓋熱深也故證色論云大者屬陰小者
屬陽汲總角而來以多病之故因而業醫
近年累出諸處治病當壬申歲冬無大雪

天氣盛溫逮春初見小兒多病斑疹醫者頗如前說如投以白虎湯之類即竊笑云白虎湯本治大人蓋不知孫真人所論大人小兒爲治不殊但用藥劑有多少爲異耳則是未知用藥之法故多失誤今博選諸家及親經用有效者方備錄爲書

藥方

升麻散治疹疱未出疑貳之間身熱與傷

寒溫疫相以及瘡子已出發熱並可服之方

升麻

芍藥

葛根

炒劉

甘草

各壹兩

右爲細末每貳歲兒服貳錢水壹盞煎

至伍分去滓溫服不以時日參夜壹服

白虎湯治痘疱癰疹斑瘡赤黑出不快及

疹毒餘熱并溫熱病中暑氣煩躁熱渴方

石膏

肆兩

知母

壹兩

甘草

各壹分

人參半兩

右爲細末每服貳錢水壹盞入粳米貳拾粒同煎至米分去滓溫服不以時小兒減半服春冬秋寒有證亦服但加棗煎并乳母亦令服之

紫草散治伏熱在胃經暴發痘疱瘡疹一切惡候出不快小便赤澁心腹脹滿方

紫草去苗壹兩

甘草生用半兩

木通去根節細剉

枳殼麩炒去穢

黃耆各半兩炙剉

右爲細末每服貳錢水壹盞煎至陸分去滓溫時時呷之

抱龍圓治一切風熱中暑驚悸瘡疹欲出多睡咳嗽涎盛面赤手足冷發溫壯睡中驚搐搦不寧脉洪數頭痛嘔吐小便赤黃方

天南星

劉開裏白者生爲末臈月內取黃牛膽汁和爲劑却入臈內陰乾再爲末半斤

天竺黃貳兩別研

硃砂貳錢研水飛

雄黃半兩研水飛

麝香

好者壹錢別研

牛黃

壹字別研

右同研極細甘草水和圓鷄頭大窰乾貳歲兒竹葉或薄荷湯化下壹圓不拘時候壹方不用牛黃

救生散治瘡疹膿疱惡候危困陷下黑色方

獐猪血

臍月內以新瓦罐子盛掛於屋東山陰乾取末壹兩

馬牙硝

壹兩研

鵬砂

研

硃砂

水飛

牛黃

研

龍腦

研

麝香

各壹錢別研

右同研極細每貳歲兒取壹錢新汲水調下大便下惡物瘡疱紅色爲度不過再服神驗無比

牛李膏治瘡疹痘疱惡候見於皮膚下不出或出而不長及黑紫內陷服之即順救危急候愚小年病此危惡殆極父母已不忍視過今太醫丞錢公乙下此藥得安因懇求真法然此方得於世甚久惟於收時

不知早晚故無全效今并收時載之學者
宜依此方

牛李子

玫瑰月后取研銷滷汁不以多少於銀石器中
焚或膏可圓每膏或兩細研好藥香入半錢

右每貳歲兒服壹圓如桐子大漿水煎
杏膠湯化下如瘡疱紫黑內陷者不過
再服當取下惡血及魚子相似其已黑
陷於皮下者即紅大而出神驗

玳瑁散治瘡疹熱毒內攻紫黑色出不快

生玳瑁

水磨濃汁壹合其猪心壹箇
從中取血青皂子大同研

右以紫草嫩茸濃煎湯調都作壹服

利毒圓治瘡疹欲出前胃熱發溫壯氣虛
腹滿大小便赤澁睡中煩渴口舌乾手足微
冷多睡時嗽涎實脉沉大滑數便宜服之方

大黃

兩半

黃芩

去心

青黛

各壹錢

膩粉

抄壹錢

檳榔

生牽牛

取末各壹錢半

大青

壹錢

龍腦

研

硃砂

各半錢研

右杵研爲細末麵糊爲圓如黃米大每
貳歲兒服捌圓生薑蜜水下不動再服
量兒大小虛實加減

如聖湯治咽喉一切疼痛及瘡疹毒攻咽
喉腫痛有瘡不能下乳食方

桔梗

剉

甘草

生用

惡實

微炒各壹兩

麥門冬

去心半兩

右爲細末每貳歲兒服壹錢沸湯點時

時呷服不以時

甘露飲解胃熱及瘡疹已發餘熱溫壯齟
齒宣腫牙痛不能嚼物飢而不欲食煩熱
身面黃及病瘡疱乳母俱可服之

生乾地黄

焙切

熟乾地黄

焙切

天門冬

去心

麥門冬

去心

枇杷葉

去毛

黃芩

去心

石斛

去根剉

甘草

炙剉

枳實

麩炒去穢

山茵陳葉

各壹兩去土

右爲散每服貳錢水壹盞煎至半分去滓溫服不以時候量力與服

神仙紫雪治大人小兒一切熱毒胃熱發斑消痘疱癰疹及傷寒熱入胃發斑并小兒驚癇涎厥走馬急疳熱疳疳黃疳瘦喉痺腫痛及瘡疹毒攻咽喉水漿不下方

黃金

壹伯兩

寒水石

石膏

各叁斤

犀角

屑

羚羊角

各拾兩屑

玄參

壹斤

沉香

錢

木香

丁香

各伍兩

甘草

捌兩

升麻

陸兩皆咬咀

右以水伍斗煮金至叁斗去金不用入諸藥再煎至壹斗濾去滓投上好芒硝貳斤半微火煎以柳木篦攪勿停手候欲凝入盆中更下研硃砂真麝香各叁兩急攪勻候冷貯於密器中勿令見風每服壹錢溫水化下小兒半錢壹字咽

喉危急病捨少許乾嚥之立效

調肝散敗肝藏邪熱解散斑疹餘毒服之
瘡疹不入眼目

犀角

屑壹分

草龍膽

半

黃耆

半兩

大黃

壹分

桑白皮

壹分

釣藤鈎子

壹分

麻黃

壹分去根節

石膏

別研

括婁實

各半兩去穢皮

甘草

壹分

右為散每服貳錢水壹盞煎至伍分去

滓溫服量兒大小加減不以時候

護目膏治疹痘出後即須愛護面目勿令
沾滌欲用胡荽酒噴時先以此藥塗面
上然後方可以胡荽酒噴四肢大人小
兒有此悉宜用之方

黃蘗

壹兩去皮剉

萊菔

壹兩半揀淨

甘草

四兩剉

右為細末以生油調為膏從耳前眼眶
並鼻塗目三五遍上塗面後可用胡荽

酒微噴勿噴面也早用此方塗面即面
上不生疹痘如用此方塗遍縱出亦少
胡荽酒方治斑痘欲出令速出宜用此

胡荽

卷兩

石細切以酒貳大盞煎令沸沃胡荽便
以物合定不令氣出候冷去滓微火從
項已下噴背及兩脚背腹令偏勿噴頭
面

仍將痒貼乾紅箱袋子盛篋合令氣出
及見帶之餘酒乳母飲之妙

治瘡疹陽毒入胃便血日夜無節度腹痛
啼哭牛黃散方

鬱金

壹兩

牛黃

壹錢

右研爲末每貳歲兒服半錢以漿水半
盞煎至叁分和滓溫服大小以此增減
之日貳服

蛇蛻散治斑疹入眼翳膜侵睛成珠子方

馬勃

壹兩

皂莢子

貳升

蛇退皮

全者壹條

右入小罐子內封泥燒不得出煙存性
研爲末溫水調下壹錢食後

真珠散治斑疱瘡疹入眼疼痛翳膜眼赤
著明方

括蕒根壹

兩

蛇退皮

全炙壹錢

右爲末用羊子肝壹枚批開去筋膜搽
入藥貳錢用麻縷纏定以米泔內煮熟
任意與喫如少小未能喫羊肝以熟羊

肝研和爲圓如黃米大以生米泔下拾
圓乳頭上與亦可日叁服

兒小未能食肝與乳母食之佳

董氏小兒斑疹備急方論

道光乙未仲秋過味經書局獲觀以誌欣幸

年十月四日



後序

余平生刻意方藥察脉按證雖有定法而探源應變自謂妙出意表蓋脉難以消息求證不可言語取者襁褓之嬰孩提之童尤甚焉故專一為業垂肆拾年因緣遭遇供奉禁掖累有薄效誤被

恩寵然小兒之疾陰陽癰為最大而醫所覃思經有備論至於斑疹之候幾然危惡

反驚搐傷寒貳癰大同而用藥甚異投劑
小差悖謬難整而醫者恬不爲慮此得告
歸里中廣川及之出方一秩示予予開卷
而驚歎曰是予平昔之所究心者而子乃
不言傳而得之予深嘉及之少年藝術之
精而又愜素所願以授人者於是輒書卷
尾焉時元祐癸酉拾月丙申日翰林醫官
太醫丞賜紫金魚袋錢乙題

