

湖南中草药单方验方选编

· 修 订 本 ·

5
省中医药研究所编

湖南科学技术出版社



湖南中草药 单方验方选编

修 订 本

湖南省中医药研究所编 湖南科学技术出版社

湖南中草药单方验方选编

(修 订 本)

湖南省中医药研究所编

责任编辑：石 洪

*

湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

原湖南人民出版社出版

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1982年10月第1版第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/64 印张：4.3125 字数：95,000

印数：1——23,000

统一书号：14204·70 定价：0.45元

前 言

1969年冬，我所与湖南中医学院附属第一、二医院的部分医务人员深入我省农村，对群众运用中草药防病治病的宝贵、丰富经验进行了初步调查，采集单、验方7500多个，草药标本和成药实物1500多种。根据简、验、便、廉的原则，先后选方608个，编成《湖南中草药单方验方选编》两辑，于1970年、1973年由湖南人民出版社出版。

本书发行后，对中医临床和科研都起了一定的作用，颇受欢迎。为满足广大医务工作者的需要，决定修订重版，基本上保留原书中简便有效的方药，适当增加部分新的内容。但由于编者的水平有限，缺点错误在所难免，热诚地希望读者提出批评意见。

湖南省中医药研究所

1982年元月

编写说明

一、本书以防治我省常见病、多发病为重点，一般采用现代医学病名或症状名，也包括少数中医病名。适当参考中西医对疾病的分类方法，共列6个科的85种病症，收载疗效较好而又容易采到的中草药单、验方384个。

二、中草药治病的特点是辨证施治，使用单、验方亦必须根据病人的具体情况，如体质强弱、病性寒热和病情缓急等不同情况来选择。

三、剂量采用公制。除极少数有说明者和儿科疾病外，一律为成人用量。因此使用时要按年龄大小、病情轻重和药品干鲜斟酌。

四、使用草药，既要依花、茎、叶、根的不同功能，也要根据季节条件，如春用叶，夏用花、茎，冬用根。

五、药有正名、俗名，为了便于读者查找方便和使用时不致混淆，在书末附有索引，刊载大部分草药的正名、学名、别名。

六、为节约篇幅，本书仅按“处方”、“制法”、“用法”、“疗效”、“说明”为序予以介绍，对其治疗验案，则不一一列举。

七、书中绝大部分单、验方为全省各基层医疗单位提供，但已不可能一一查考，为保持体例的统一，献方者的单位、姓名一律不录。

目 录

(一) 传染科疾病

流行性感冒	(1)
流行性脑脊髓膜炎	(6)
流行性乙型脑炎	(10)
白喉	(13)
细菌性痢疾	(15)
阿米巴痢疾	(20)
急性黄疸型肝炎	(22)
钩端螺旋体病	(27)
疟疾	(28)
血吸虫病	(32)
麻风	(34)

(二) 内科疾病

慢性气管炎	(36)
肺结核	(37)

风湿性心脏病·····	(38)
冠状动脉硬化性心脏病·····	(40)
高血压病·····	(40)
胃和十二指肠溃疡病·····	(44)
上消化道出血·····	(47)
便血·····	(50)
肠炎·····	(51)
慢性肝炎·····	(54)
再生障碍性贫血·····	(57)
血小板减少性紫癜·····	(58)
心、肾性水肿·····	(60)
肝硬化腹水·····	(62)
急性肾炎·····	(67)
糖尿病·····	(70)
姜片虫病·····	(71)
胆道蛔虫病·····	(71)
中暑·····	(73)
风湿性关节炎·····	(74)
腰痛·····	(80)

坐骨神经痛·····	(81)
三叉神经痛·····	(83)
癫痫·····	(84)
农药中毒·····	(85)
药物中毒·····	(87)
食物中毒·····	(89)

(三) 外科疾病

出血·····	(91)
烧、烫伤·····	(98)
跌打损伤·····	(113)
慢性骨髓炎·····	(120)
颈淋巴结核·····	(123)
疔疮·····	(131)
痈疖·····	(133)
乳痈·····	(135)
急性阑尾炎·····	(137)
肠梗阻·····	(140)
泌尿道感染·····	(141)
胆石症·····	(141)

血栓闭塞性脉管炎·····	(144)
皮肤慢性溃疡·····	(146)
荨麻疹·····	(148)
湿疹·····	(149)
冻疮·····	(150)
漆疮·····	(152)
神经性皮炎·····	(152)
稻农皮炎·····	(154)
牛皮癣·····	(157)
皮肤癌·····	(159)
狐臭·····	(161)
汗斑·····	(162)
毒蛇咬伤·····	(163)
狂犬咬伤·····	(174)
蜈蚣咬伤·····	(176)

(四) 妇科疾病

血崩·····	(177)
白带·····	(178)
葡萄胎·····	(179)

胎动不安·····	(180)
脱脐·····	(181)
子宫颈糜烂·····	(183)
滴虫性阴道炎·····	(183)

(五) 儿科疾病

惊厥·····	(189)
小儿肺炎·····	(190)
百日咳·····	(191)
腮腺炎·····	(193)
小儿腹泻·····	(194)
蚕豆黄·····	(195)
疳积·····	(196)
脱肛·····	(200)

(六) 五官科疾病

急性扁桃体炎·····	(202)
急性结膜炎·····	(204)
中耳炎·····	(207)
鼻渊·····	(208)
牙痛·····	(209)

附:

草药索引.....(212)

(一) 传 染 科 疾 病

流行性感 冒

【预防用药】

—

处方 华荠苧

制法 将鲜华荠苧全草除根切细晒干，置于球形瓶中，加水略低于药面，安装冷凝装置。加热，冷凝收取馏液，分出挥发油，置瓶中密封保存。我们采用民间蒸酒的土办法馏取挥发油，500克药物可馏取挥发油10毫升。

用法 用1毫升华荠苧挥发油加入1000毫升冷开水中，充分震摇使成乳液状，名为华荠苧混悬剂。喷喉，每日2次，连喷2天。

疗效 1971年某大队发生流感，用华荠苧混

悬液喷喉，疫情迅速得到控制。

二

（八味四防饮）

处方 常山 桂枝 水灯草 白茅根 桑白皮 桃树皮 陈皮 竹茹各60~90克

制法 上药切碎，每剂加水30公斤煎成23公斤。

用法 每人每日服1次（100毫升），连服3天。

疗效 1969年7~8月，泸溪县兴隆场公社武也大队第六、七生产队流感流行，发病率高达75%，全公社立即普遍服用此方，未再发生新的病例。

三

处方

（1）田边菊9克 黄荆叶15克 矮地茶12克

（2）山薄荷9克 野南瓜15克 凤尾草15克

路边荆15克

用法 任选一方，水煎服。

说明 对防治流感和感冒风热型均有效。

四

处方

(1) 紫苏15克 黄豆30克 葱白5个

(2) 岗梅10克 枇杷叶6克 紫苏6克

用法 任选一方，煎水代茶饮。

五

处方 万年青 金银花 升麻 益母草 胡
颓子各1000克 紫苏 荆芥 臭牡丹 虎杖
酸浆草 苦荞各500克 十大功劳 黄荆
五加皮 藿麻草 生姜各250克

制法 洗净切细，加水煮沸后，再煎15分钟
左右，滤渣存液即成。

用法 每次服250~300毫升，

【治疗用药】

一

处方 马鞭草9克 淡竹叶6克 生石膏24克

大青叶9克 沙参9克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

说明 本方适应于流感风热型。

二

处方 积雪草15克 大青叶12克 夏枯草9克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

说明 本方适应于流感风热型。对咽炎、急性扁桃体炎亦有效。

三

处方 川芎 黄芩 葛根 甘草各9克 葱白5个

用法 水煎。每日1剂，分2次服。如寒热往来加柴胡9克；咳甚加川贝、知母各6克；痰多

加前胡6克 ●

四

处方 紫苏2克 荆芥3克 川芎3克 葱(连须用)

3个 生姜3片 大枣3枚 红糖30~60克

用法 水煎。每日1剂，分3次服。

说明 本方适应于流感风寒型。

五

处方 路边荆12克 野菊花9克 茜草9克 仙

鹤草9克 车前草6克 一枝黄花9克 岗梅9克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

疗效 观察195例，有效186例，有效率为95.3%。其中一天好转或痊愈率为28.2%，两天好转或痊愈率为62.3%，三天痊愈率为4.8%。

说明 本方适应于流感风热型。

流行性脑脊髓膜炎

【预防用药】

一

处方 黄豆 250克 马尾松枝一束

用法 水煎。每天服一碗，连服 3 天。

二

处方 马鞭草 水灯草 水菖蒲 骨碎补
忍冬藤 木贼各15克

用法 煎水当茶喝。

三

处方 金银花12克 大青叶6克 甘草3克
明矾3克

用法 共研细末，开水送服。每日2次，每次3克，连服3天。

四

处方 贯众 甘草 金银花 连翘 板蓝根
黄柏 生石膏各9克

用法 水煎服。每日2~3次。

五

处方 金银花500克 大青根1000克 夏枯
草1000克 芦根1500克 岗梅1500克 (均用
干品)

制法 上五味以水6000毫升煎两次，用4层
纱布过滤，再将两次滤液合并浓缩到3000
毫升，加适量糖精及高级食用香精矫味，
并加0.5%苯甲酸钠防腐。

用法 每日服1次，每次20~30毫升，连服3
天。

疗效 1972年3月流脑发生后，有1600人接
受预防服药，5月份调查，凡服预防药者无
一例发病。

【治疗用药】

一

处方 生石膏 滑石 薄荷 青黛 朱砂

淡竹叶 梔子 连翘 甘草 各9克

用法 水煎当茶饮。

说明 本方适应于流行性脑脊髓膜炎初起。

二

处方 生地 白芍 丹皮 黄芩 薄荷 菊

花 知母 生石膏 蔓荆 僵蚕 贯众

蝉蜕 板蓝根 钩藤 连翘 各6克

用法 水煎。每日1剂，煎服2次。

说明 本方适应于流行性脑脊髓膜炎的菌血症期。

三

处方 银花 生石膏 芦根 知母 甘草

钩藤 葛根 僵蚕 玉竹 连翘 苦参

栝楼根 玄参 丹皮 黄连各9克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

说明 本方适用于脑脊髓膜炎的脑膜炎期。

四

处方 癞蛤蟆 蚯蚓泥 雄黄各等份

用法 上三味和成团，敷脐上。

说明 本方适用于流行性脑脊髓膜炎的脑膜炎期。

五

处方 麦冬6克 忍冬藤9克 青木香3克 菊花6克 七叶一枝花9克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

流行性乙型脑炎

【预防用药】

处方 鲜牛筋草30克

用法 煎水当茶饮，连服3天。隔10天后再连服3天。

【治疗用药】

—

处方 路边荆15~30克 七叶一枝花6~8克

鸭跖草90~120克

用法 先将路边荆、鸭跖草二味煎水，后把七叶一枝花磨水兑服（或研细末吞服）。

说明 津市卫生防疫站1969年治本病80例，治愈72例。

二

处方 七叶一枝花 八角莲（均用根）

用法 各磨服3克。

说明 主要用于退热镇惊。单服一味亦可。

三

处方 海金沙根（或藤） 紫花地丁 钩藤

银花根（或藤） 白菊花 生石膏 各15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

四

（“七〇一”药饼）

处方 山乌龟120克 燕子窝泥500克

制法 山乌龟（以根块粗糙的新鲜品为佳）

挖回埋土中备用。用时捣烂，与冷大米饭少许混合捣匀，再加燕子窝泥用冷水调成糊状，制成药饼两个。

用法 将病人置阴凉地面，侧卧，剪去头发，

取“七〇一”药饼敷后头部（面积约半个头部大）。地上铺荷叶，让病人不敷药的那侧贴在荷叶上。所敷药饼若有热感，即更换一个。药饼干后，可用少量凉水淋湿调匀再用，直至体温恢复正常（一般约需半小时至一小时，重病人约两小时）。然后改为每日换3次。一般病人从敷药到清醒需3~4天。在这保护性抑制期，要注意以下四点：

1. 极严重的病人，昏迷2~3天后，可适当补充营养；
2. 病人需服用其他药物时，可酌情鼻饲，一般不要插胃管；
3. 使用“七〇一”药饼，不能同时使用鲁米那；
4. 高烧病人体温超过40℃，易引起抽搐、惊厥，可酌情加用退热药。

疗效 用上法治疗流行性乙型脑炎41例，39例痊愈，2例好转。治愈时间最长者10天，最短者1天，平均4.8天。用药剂量最多5

剂，最少1剂，平均2.8剂。

白 喉

一

处方 鲜白牛膝60克 壁钱(形象蜘蛛，有四对长脚，卵囊白而圆扁，固着于墙壁屋角)数个

用法 鲜白牛膝捣烂取汁，冲入开水一碗即服，然后将壁钱置瓦上焙干研细末吹入咽喉。

二

处方 马鞭草

制法

(1) 取新鲜马鞭草叶、茎60克，捣烂至出汁，然后再加第二次淘米水1000毫升，充分搅拌，去渣取汁。

(2) 取干马鞭草30克，加水1000毫升煎熬

至300毫升左右。

用法 每次150毫升，每日2次，连服3~5天。

疗效 临床治疗咽白喉50例，全部于2~5天内治愈。临床及细菌学观察均证明马鞭草对白喉有效。如×××，女，18岁。发病7天后入院。检查扁桃体上有点状分泌物，咽拭子抹片白喉杆菌(+)，诊断为咽白喉。经服马鞭草3天后咽拭子抹片转阴，第4天假膜脱落，住院6天，痊愈出院。

三

处方 西瓜霜 瓜子金各9克 地虱婆2.4克(焙)
偷油婆20只(去足焙) 人指甲3克(焙) 硼砂6克
人中白3克 雄黄4.5克 朱砂3克 麝香2.4克
梅片9克

制法 西瓜霜(大西瓜一个，取孔去瓢，将玄明粉研细，装满瓜内，仍将取孔之皮补上盖严，置阴暗无风之处，过数日瓜上起霜刮下)与诸药共研细末，瓶贮备用。

用法 取药末吹喉，每日2次。

说明 此方系谢天锡之父生前从几个治喉专师得授真传，毕生屡验之方。

细菌性痢疾

【急性菌痢】

一

处方 雀舌草六株

用法 水煎服。每日2~3次。

说明 此草治急性菌痢及肠炎效果甚佳。捣烂外敷，可治烫伤。

二

处方 黄荆子1000克 酒曲(酒药子)60克 白糖500克

用法 上药炒黄为末。每日服3次，每次6~9克。5~7天为1疗程。

说明 郴州传染病院用本方治疗184例,治愈率达98%。对慢性痢疾、肠炎亦很有效。

三

处方 马齿苋30克 凤尾草30克

用法 水煎。每日1剂,分3次服。红痢加地榆15克;白痢加牛皮冻(牛皮消)9克。

说明 马齿苋惯用于治痢,凤尾草亦有治痢效果。但须与俗名叫凤尾草而无治痢功效的地刷子及沙氏鹿茸草相区别。

四

处方 地榆15克 夜关门30克 野南瓜30克 瓜子金15克

用法 煎水,每天1剂,分2~3次服。

说明 道县防治院用本方治愈百余例。

五

处方 辣蓼草15~30克 蛇莓15克 马鞭

草15~30克

用法 加水500毫升，煎沸后浓缩至200毫升，每日1剂，分2次服。

疗效 某医院用此方治疗急、慢性菌痢19例，治愈15例，好转4例。

六

处方 美丽獐牙菜

制法 取美丽獐牙菜全草洗净晒干或烤干，研极细末，装成胶囊。

用法 每天服3~4次，每次服0.5克，连服1~3天。亦可取全草6克煎服，日服3次，连服2~3天。

疗效 广泛应用于细菌性痢疾收效良好。如蔡××，女，72岁。发热腹泻三天，体温39℃，每天腹泻20余次，下腹疼痛，初为水样便，后为红白粘液，里急后重，有明显失水状，诊断为菌痢。用美丽獐牙菜6克水煎服，每日1剂，分3次服，腹痛泻痢全

部消失。

七

处方 水杨梅(茜草科)

用法

(1) 水剂：取水杨梅花果序干品15克，煎服或开水冲泡一刻钟后去渣服用。

(2) 片剂(浸膏片)：每次服1.5~2克，每日3~4次。

(3) 灌肠：用口服量的加倍量溶于200毫升温水中保留灌肠，每日1~2次。

疗效 经五年多的实验和临床观察，对666例急性菌痢患者及172例慢性患者的治疗，有效率达98.8%。证明对菌痢和肠炎有显著疗效。外用对阴道滴虫也有较好效果。

八

处方 葛根30克 贯众30克 陈茶叶30克 红、白糖各15克 萝卜菔3个(炒枯) 艾叶30片

乌梅3个

用法 水煎。每日1剂，分3次服。

【慢性菌痢】

一

处方 地榆30克 桃金娘20粒 海蚌含珠15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

二

处方 薜荔9克 野南瓜根30克 鸡屎藤(牛皮消)9克 枫树球6克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

三

处方 水杨梅(茜草科)30克 乌梅3个 干姜3克
黑豆60克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

说明 本方适用于慢性菌痢虚寒型。

四

处方 黄瓜藤 麻油

用法 黄瓜藤烧灰存性，调麻油敷脐上。

五

处方 乌药 车前草 七姊妹(白薇) 葛根

青木香 乌不落 石菖蒲 各10克

用法 车前草用全草，余药用根。水煎。每日1剂，分2次服。

阿米巴痢疾

一

处方 鸦胆子肉18克 山药60克 薏苡仁60克

滑石60克

用法 共研细末，每次服6克，米汤送服，日服2次。

说明 长沙某草药医生曾用此方治阿米巴痢

疾20多例，效果良好。

二

处方 蛇骨头 适量

用法 洗净，焙至黄色，研末后再炒至黑色，

红糖开水冲服。每日3次，每次3~9克。

三

处方 桃树皮 白头翁 香椿树根皮 各9克

用法 水煎服。每日3次。

四

处方 蛇蜕 60克

用法 烧灰存性，日服2次，每次3克。

急性黄疸型肝炎

一

处方 满天星 凤尾草 海金沙 木贼草

车前草各9克

用法 每日1剂，加水800毫升煎至400毫升，分2次服。

疗效 治疗38例，痊愈20例，近愈15例，好转3例，有效率为100%。如唐××，男，16岁。因患急性黄疸型肝炎，于1971年1月9日入院。入院时肝功能检查：黄疸指数90单位，凡登白试验直接阳性反应，麝浊20单位，麝絮(+++)，脑絮(+++)，高田荒氏试验(+++)，谷丙转氨酶93单位(改良法，正常为8~40单位)。入院后单纯用本方治疗，每天1剂，服药3个疗程(共30剂)。于2月10日复查肝功能：黄疸指数6单位，凡登白试验(-)，麝浊8单位，麝

絮(±), 脑絮(±), 高田荒氏试验(-),
谷丙转氨酶正常。住院33天, 痊愈出院。

二

处方

(1) 茵陈30克 金钱草30克 海金沙15克

(2) 茵陈 鸡骨草 枸骨 十大功劳各30克

(3) 茵陈 鸡骨草 枸骨 十大功劳
各30克 海金沙15克

用法 任选一方, 水煎, 每日1剂, 分2次服。

疗效 用上述三种方剂治疗77例全部有效。

其中痊愈者64例, 占83.1%。患者的各种自觉症状均在1~2周内消失。

三

(舒肝合剂)

处方 桃金娘60克 白背叶30克 矮地茶60克
白糖适量

用法 水煎。每日1剂, 分2次服。肝痛较甚

加川楝、青皮、白芍、延胡索、佛手；食纳减少加山楂、鸡内金、陈皮、炒麦芽；头痛失眠加远志、枣仁、夜交藤、龙齿。

四

处方 凤尾草60克 白芍30克

用法 水煎。每日1剂，分4次服。1个月为1疗程，一般服用1~2个疗程。症状严重，进食极少者，适当配合输液等对症疗法。

疗效 观察61例，一般服药2~4天食欲增加，恶心腹胀减轻；服药后7天左右黄疸指数开始下降，平均15天恢复正常；一般服药30~40天后肝功能即可完全恢复，或基本恢复正常。

五

处方 田基黄60克 茵陈30克 夏枯草15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。20~30天为1疗程。

疗效 治疗22例，治愈14例，好转5例，有效率80%以上。方中若加绿豆或马鞭草，对降转氨酶有效。

六

处方 马鞭草9克 十大功劳6克 甘草6克

用法 上药加水500毫升，煎至300毫升。每日1剂，分2次服。

七

处方 溪黄草 马鞭草 丁癸草各15克

用法 水煎服。每日1剂。7~12天为1疗程。

疗效 某医院用此方治疗28例，治愈25例，好转3例。

八

处方 茅莓30克 溪黄草15克 白背叶30克

十大功劳15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

疗效 某医院用此方治疗10例，治愈7例，好转3例。本方亦可治慢性肝炎。

九

处方 满天星(天胡荽)15克 溪黄草15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

疗效 某医院用此方治疗10例，治愈8例，好转2例。

十

处方 黄花菜根60克 梔子60克 乌泡根15克
山蚂蝗(小槐花)根5克 牙郎树(构树)皮
12克

用法 共研细末，加米粉500克，丸如梧子大。
日服3次，每次5粒，逐日加1粒，至每次服
10粒时即不再加量。

十一

处方 十大功劳30克 白茅根30克 白糖适量

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

钩端螺旋体病

【预防用药】

一

处方 香泽兰

用法 把香泽兰切碎撒于稻田内（田内存水不宜太多），一天后即可下田劳动。

二

处方 桐油500克 雄黄30克

用法 调匀后擦双脚。

说明 据芷江县介绍，此方预防本病有一定效果。

【治疗用药】

处方 丝瓜络半个（烧灰存性） 红糖30克

用法 丝瓜络灰用红糖水兑服。

说明 本方用以治本病所致的肿痛疮毒。

疟 疾

【预防用药】

一

处方 黄荆叶90克 半夏90克 生姜90克

用法 煎水供10人服，每人日服1次，每次100毫升。

说明 黄荆俗名土常山，民间常用其叶防治疟疾。煎服或研末水泛为丸均可。

二

处方 野南瓜根

用法 浸在水缸内作饮水消毒。

【治疗用药】

一

处方 白术 茯苓 法夏各9克 广皮6克
常山15克 青蒿15克 黄荆叶30克(或黄荆子
9克炒) 生姜3片 大枣3枚
用法 上九味煎水。必须在疟疾发作之前两
小时服之，日服1剂，连服数剂。
说明 对一日疟、间日疟、三日疟皆有效。

二

处方 西氏毛茛3根
用法 捣敷内关穴，以起泡为度（穴上垫铜
钱，药放入铜钱孔中，外用布包扎）。

三

处方 石菖蒲一根
用法 捣烂，敷于腕上内关部位。男左女右。

疗效 某医院曾用此法治疗数十例，效果很好。

四

处方 鹅不食草15~30克

用法 水煎，于发作前顿服。并在发作前两小时用此药塞入鼻孔内。

五

处方 乌梅2个 枳实 常山 大枣 鳖甲
甘草各6克 生姜3片

用法 水煎，于疟疾发作前一小时服。

六

处方 常山 草果各6克 枳实 当归各9克
大枣4枚 黑豆7粒

用法 煎水。每日1次，分2次服。

七

处方 青蒿叶

用法 晒干研末瓶贮备用。每次用30克，于病发前用开水或浓茶泡服。

八

处方 草果^{2克}

用法 将草果籽研末，用纱布卷好在发病前一小时塞入鼻孔中。

九

处方 雄黄 黄丹各1.5克

用法 于发作前两小时1次顿服。

疗效 治疗14例，均于给药1~2次后痊愈。

如易××，男，24岁，工人。从1971年1月起，8个月内先后发作间日疟5次（每次均经血片检查发现疟原虫），头4次西药治愈。1971年8月第5次发作，血涂片又找到

疟原虫，于发作第7天入院。次日在发作前2小时服药1次，临床观察19天未见复发出院，迄今未复发。

血 吸 虫 病

—

处方 艾叶60克 樟脑 丁香 陈皮 木香
肉桂 独活 羌活 细辛 苍术 山奈
各9克 麝香0.3克

用法 将艾叶捣成绒，余药研成细末。将艾绒与药末以皮纸卷成结实的灸条三根。每日早晚灸气海、肾俞穴各1次，每次各灸半小时至一小时。

说明 本方制成的艾条主要作用为消腹水，亦可治疗风湿。一般在灸10~12天后，症状明显改善，疼痛减轻，食欲增进，精神好转，20天后尿量增加。

二

处方 老鸦蒜 4 粒 蓖麻子 40 粒

用法 将上二味共捣烂，外敷双侧涌泉穴。

说明 主治顽固性腹水，以及腹内有症结者。
一般在敷药 10 小时后尿量即增加。

三

处方 山奈

用法 将山奈研细末，撒于痞块部，以纱布沾醋敷于痞块腹面，再以酒精洒在纱布上，周围以湿布绕成圈，保护皮肤，然后点燃纱布，直至病人感到灼热即灭掉。以布盖住，反复数次。病人有舒适感，痞块可逐渐变软。

疗效 治疗晚期血吸虫病肝硬化效果较好。
如某社员患血吸虫病十多年，全身浮肿发亮，曾在某地区医院治疗无效，后改用此方治疗，三个月后即能参加体力劳动，并

在下雪天，一次走了20里路。

麻 风

一

处方 活毒蛇1条 稻谷90克 白母鸭1只

用法 将毒蛇以绳子穿鼻孔挂起，剥皮后在蛇肛门约6公分处用刀划开，取出蛇胆囊。将蛇胆汁及蛇肉(剁碎)拌于谷内，喂鸭子吃，关在笼内。第二天杀鸭，除去整个内脏后炖烂。给病人服用，只吃一次。

说明 本方是农村一蛇医所献，治麻风效果很好。

二

(复方苍耳丸)

处方 苍耳子1500克 黄柏 首乌 胡麻仁
牛蒡子 苍术 独活 活血藤 石南藤
贯众 竹根七 万年青 十大功劳 蛇不

过各1000克 南蛇根 仙鹤草 五爪龙 黄
连 山豆根 蓖麻子 苡仁 炮甲珠 松
香 没药各500克 雄黄150克 癩蛤蟆60克

制法 将上药水打成丸。

用法 每日服2次，每次服9克。

三

(复方红藤丸)

处方 红藤根1500克 活血藤1000克 小血藤
八角枫 土牛膝 常春藤 络石藤 朱砂
莲各500克

制法 将上药水打成丸。

用法 每日服2次，每次9克。

疗效 用复方苍耳丸治疗40例，复方红藤丸
治疗10例，共计50例。麻风性病理细胞明
显减少或呈退行性变者37例，占74%；病灶
完全消退者6例，占12%（结合临床症状、
细菌检查符合治愈标准者3例）；无变化者
7例，占14%。

(二) 内 科 疾 病

慢性气管炎

一

处方 夜关门(全草60克，鲜品可用至90克) 天门冬
百部各18克

用法 加水600毫升，煎成200毫升。每日服
2次，每次100毫升，连服10天为1疗程(煎
熬时用陶器为佳)。

二

处方 矮地茶60克 盐肤木皮30克 胡颓子根
30克 沙参30克

制法 以上均用干药，加水煎两次，将两次
药液混合，文火浓缩至100毫升，加适量白

糖和防腐剂，瓶装备用。

用法 每次服50毫升，每日2次，10天为1疗程。

疗效 据五个月内三次治疗的系统观察，有效率为90.4%，显效率为65.6%。

三

处方 矮地茶30克 黄芩15克 麻黄9克 炒地龙9克 甘草9克

用法 以上为1日量，煎煮加糖浓缩成膏，分3次服。10天为1疗程，连服2个疗程。

肺 结 核

处方 胎盘（以无传染病产妇的第一胎男孩最好）4个 百部500克 白及250克 母鸡1只

制法 将胎盘焙焦黄，连同百部、白及共研细末，将未生过蛋约2斤重的母鸡去皮及内

脏，切成块，放适量水浓煎，去骨及渣，以浓汤和药末为丸，如黄豆大。

用法 每日早晚各服9克，以蛋汤或猪精肉汤送服。

疗效 治疗7例，痊愈（经X线透视病灶纤维化）4例，近愈（症状消失，X线透视有显著改善）2例。如刘××，女，40岁。患浸润性肺结核，每到春季大咯血一次。面色苍白、消瘦、声嘶、午后潮热，咳嗽胸痛，痰带血丝，并伴有月经不调。服上方一料好转，再服一料症状消失，月经恢复正常。经X线胸透复查，病灶已纤维化。

风湿性心脏病

一

处方 鲜万年青叶18克

用法 水煎。每日1剂，分3次服。

疗效 某，女，21岁。临床诊断为风湿性心

脏病，二尖瓣闭锁不全，合并心力衰竭。
全身性水肿，呼吸困难，强迫体位，心前
区剧痛，心率140次/分。服上方，每日1剂，
连服10天，诸症均消失，病情稳定，继续
观察半月后好转出院。

二

处方 老茶叶树根（粗壮新鲜的）90克 甜酒
500克

用法 水煎。每晚临睡前温服。

三

处方 朱砂根1莖 活血莲（橐吾）1莖 皂角
刺5个 川芎9克 白胡椒7粒

用法 上药炖猪心吃并内服药汁，每日1剂。
如有水肿，上方蒸鲜鲤鱼内服。

疗效 某人患风湿性心脏病，服本方后症状
缓解，后以本方治数人皆有效。

冠状动脉硬化性心脏病

处方 毛冬青

用法

(1) 口服：毛冬青浸膏糖衣片，每日3次，每次6片(每日剂量相当于生药90克)。

(2) 肌注：毛冬青针剂。每次2毫升，每日1~2次。

疗效 用毛冬青治疗冠状动脉硬化性心脏病256例，其中据143例临床观察，近期有效率为96.5%。出院后6~12个月随访110例，疗效巩固的达89%。

高 血 压 病

—

处方 (1) 内服：鲜土杜仲(野扇花)60克

夏枯草15克 桑寄生15克 玉米轴30克 鲜

臭牡丹15克

(2) 外敷：苦瓜藤30克 苦蕒60克

用法

(1) 方煎水，每日1剂，连服12天；

(2) 方捣烂外敷头额或头顶部。

二

处方 臭梧桐叶15克 牛膝9克 杜仲9克 菊花5克 丹皮9克 白芍9克 天麻5克 丹参9克 钩藤9克 青木香5克 石决明12克 夜交藤15克

用法 水煎。每日1剂，分3次服。

说明 原方无剂量，方中剂量乃编者酌定的。

三

处方 玉米须30克 水牛角尖15克

用法 水煎玉米须，水牛角尖磨水兑入。临服加红糖60克。

四

处方 地米荠(葶荠)30克 绿壳鸭蛋1个 枫
树球7个 大枣10枚 天丁6克 红、白糖适量
用法 水煎。每天1剂，分3次服。

五

处方 桑寄生 15克 夏枯草 15克 生杜仲9克
生白芍30克 黄芩15克 首乌15克 生地30克
生牡蛎15克 生龟板 15克 黑芝麻 30克 龙
胆草15克 生赭石15克
用法 共研细末，炼蜜为丸。每日3次，每
次9克，开水送服。
说明 本方适用于高血压病肝阳上亢型。

六

处方 槐角 25公斤 冬青 15公斤 熟地 7.5公斤
桑枝 12.5公斤 臭牡丹10公斤 夏枯草 15公斤
白糖25公斤

制法 将前六味洗净拌匀，用纱布袋装好投入陶器缸内，加3倍量水（以淹没生药水面高出30厘米为度），浸泡30分钟，煮沸两小时，如此反复三次，分别过滤，合并药液加入糖浆，浓缩至57000毫升即得。每公斤降压膏相当于生药1.5公斤。

用法 每次一调羹（约20毫升），日服3次，两个月为1疗程。

疗效 治疗127例，临床观察证明降压膏对各期高血压都有一定疗效，尤其对改善高血压患者的各种症状更能收到较为满意的效果。如王××，男，50岁。发现高血压4年，1970年加剧，血压最高210/150毫米汞柱，服利血平、依斯迈林、益寿宁波动很大，持续不降，且症状不见减轻，1971年夏季改服降压膏后血压稳定在150/90毫米汞柱，症状大见改善。

胃和十二指肠溃疡病

一

处方 地雷

制法 取块根洗净，晒干，研细末，水泛为丸如胡椒子大。

用法 每日2次，每次2克，温开水送服。

疗效 治疗胃痉挛性疼痛256例，均收到迅速止痛的效果。对某些应用阿托品、普鲁卡因封闭无效的病例也能奏效。

二

处方 土茯苓150克 乌药 白背叶各90克

制法 上药各研极细末，过筛混匀。

用法 每服3克，空腹时用温开水送服。

疗效 临床观察胃及十二指肠溃疡，胃痉挛，急、慢性胃肠炎40例，均于服药后10分钟止痛。

三

处方 白胡椒 30克 白芥子 36克 生甘草 9克
桔子树根皮9克

用法 上药共研细末，兑甜酒冲服，每天1剂，分早、中、晚3次服完。

疗效 门诊治疗观察胃痛属寒性者478例，一般3~5剂疼痛即可缓解。如林××，女，48岁。胃痛二十余年，反复发作，入冬加剧，痛时吐酸，手足厥冷。服本方一剂痛减，二剂痛止，连服五剂，至今未复发。

四

处方 乌贼骨60克 浙贝9克

用法 共研细末。每次6~9克，开水冲服，每日3次。

说明 本方对胃及十二指肠溃疡病有效。

五

处方 石菖蒲 青木香 金钱草 香附子

橙树根皮各30克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

说明 本方治胃痛偏于寒性者。处方用量均为鲜药，如用干药，则用量减半。

六

处方 青木香9克 木香9克 陈皮3克 隔山消（牛皮消） 四方消（六棱菊）各12克 散

血莲（凤丫蕨）15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

七

（肝胃百合汤）

处方 柴胡10克 黄芩10克 百合15克（体虚者用30克） 丹参15克 乌药10克 川楝10克 郁金10克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。若胃脘热痛拒按加蒲公英15克；胃脘冷痛喜按加高良姜3克；泛酸明显加乌贼骨10克；神疲、气短、乏力加明党参12克；痛处固定，舌质见淤斑加桃仁6克；胃脘痛而大便色暗或如柏油样加生蒲黄10克；便秘加火麻仁15克；胸背胀或胸痛彻背加九香虫3克；胃脘挛急而痛加白芍15克、甘草10克；上腹隆胀、呕甚、得呕则舒加枳实10克、白术10克。

说明 本方是夏度衡教授治疗胃与十二指肠溃疡，急、慢性胃炎等病属于中医肝胃不和兼淤滞型的经验方。三十余年来用于临床取得较好疗效。

禁忌 酒、笋子。

上消化道出血

一

处方 白及 白芍 紫珠草各15克 甘草3克

用法 每日1剂，煎水200～300毫升，分3次服。痛甚加乌贼骨、浙贝；血虚加熟地、阿胶。

疗效 治疗30例，痊愈26例，占86.6%；好转2例，占6.6%。如余××，女，33岁。胃病八年。七天前上腹疼痛，突然呕出暗红色血样液约300毫升，继之解出黑大便，大便隐血试验强阳性（++++），面色苍白，巩膜无黄染，腹平软，剑突下压痛，肝脾均未扪到。诊断为溃疡病出血，给予补液，注射仙鹤草素，仍解黑大便，停用西药给以本方连服五剂，大便转黄色，腹痛缓解。

二

处方 大蒜 芒硝（用量三比一）

制法 将上药捣烂混合。

用法 先于患者一侧足心涂上一层凡士林油膏，然后将药用纱布包好，敷上整个足心，

厚度约一公分。每次敷三小时，每日1次。平均用4~5天，至大便隐血试验为阴性，症状消失为度。

疗效 治疗15例，呕血1例，便血5例，呕血便血同时并见者9例。敷药后，呕血便血停止。

三

处方 桤木（全株）

制法

- (1) 丸剂：将桤木研成细末，取500克加蜜2倍拌匀，烤干后，做成丸子，每粒重0.3克，干燥包装备用。
- (2) 片剂：取桤木粉500克加入淀粉液100~200毫升，做成颗粒，烤干后压片，每片重0.25克。
- (3) 水煎剂：将桤木洗净切片，取500克，加水2500毫升煮沸，连续3次。然后将3次药液混合后过滤，浓缩成400毫升，

再过滤即成。

用法 丸剂每次服1丸；片剂每次服4片；
水剂每次服10毫升，均为每日3次。

疗效 收治16例，其中溃疡病出血11例，门
脉高压所致食道静脉曲张破裂出血4例，
下肢血管瘤1例。治愈15例。

便 血

一

处方 椿根白皮60克 白芷6克 栗壳3克 车
前草二莖

用法 先将椿根白皮蜂蜜拌炒，栗壳洗净蜂
蜜炒，然后将四味用清水同煎。分3次服，
连服2剂。

疗效 曾治愈大便下血8年久治不愈的患者，
疗效确实。

二

处方 干柿子 白萝卜

用法 用干柿 3 枚烧炭，和蜜拌萝卜食之。

说明 本方适用于肠风便血，大便干燥者。

三

处方 乌梅肉_{45克} 僵蚕_{30克}

制法 上二味放新瓦上用火焙枯存性，共研细末贮瓶内备用。用时将药末放碗内，加热米饭调和，搓为小丸如梧桐子大。

用法 每日3次，每次10克，食前开水吞服。

说明 本方适用于先便后血，大便正常，肛门无痔，久治不愈者。

肠 炎

一

处方 路边荆_{18.3公斤} 夜关门_{3.7公斤} 野南

瓜11.3公斤 安息香酸75克

制法 将前三味药根切片，放锅内加水超过药面约10厘米，分别煎3次，每次熬存三分之一。再将3次药液混合浓缩成12000毫升，过滤、冷却，将安息香酸75克溶于3000毫升纯酒精，倒入药液中搅匀。

用法 每日服2~3次，每次10毫升。

疗效 本方经宜章县迎春公社卫生防治站临床观察，疗效确实很好。

二

处方 地丸子（三叶翻白草）10份 樟树根1份

制法 将上二味药根切片、烘干、研粉、过筛、按比例混合。

用法 每日3次，每次3~6克。

疗效 本方治肠炎有显效，治菌痢亦有效。

三

处方 马齿苋15克 陈茶叶9克 种萝卜莢9克

水灯草90克 **灶心土**一块（煨红）

用法 水煎。每日1剂，日服3次。

四

处方 黄荆

用法 取根、茎、叶均可。鲜的30~60克捣烂取汁服；干药15~30克煎水服。每日2~3次。

五

处方 仙鹤草 海蚌含珠 乌泡 石榴皮

金银花 地榆各9克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

六

处方 没食子（煨）2个 陈皮9克 泽泻9克

党参9克 灶心土30克

用法 水煎。每日1剂，分3次服。若呕吐

加黄连须6克 木通9克；寒泻加炮姜1.5克

附片6克 桂枝6克；呕吐蛔虫加乌梅1个、川楝3个。

七

处方 土黄连（细叶十大功劳）辣蓼草各15克
用法 水煎。每日1剂，分2次服。
说明 本方治慢性肠炎效果较好。

八

处方 陈茶叶9克 生姜5克 煨姜5克 酒药
子（炒黄）24克
用法 水煎。每日1剂，分2次服。
说明 本方治慢性肠炎颇有效验。

慢性肝炎

一

（疏肝理脾丸）

处方 柴胡 茜草 当归 赤芍 枳实 蒲

黄 灵 脂 地 龙各2330克 鳖 甲7390克 鸡
内 金1560克 猪 肝 7800克 青 皮1165克 白
糖 适量

制法 取鲜猪肝用沸水稍烫，使稍稍变硬，切片，烘干，然后将猪肝与其他药物共研细粉，蜜丸如梧子大，用白糖粉上衣或按上糖衣法上衣，以90~120℃温度干燥4~6小时，取出冷却即得。

用法 每日3次，每次9克，饭前1小时吞服。

疗效 自1965年开始，临床用于治疗慢性肝炎（瘀阻型）以及早期肝硬化，均获得较好疗效。

二

处方 满天星 适量 白公鸡1只

用法 杀刚开叫的白公鸡，留鲜血（不放盐），去毛、头、足、翅及肝脏以外的内脏，洗净。再将满天星全草洗净，捆成小把，填

满鸡腹，封好，蒸熟。先食新鲜鸡血，后吃鸡肉。

疗效 编者走访经治疗的病例，皆称有效。

说明 服新鲜鸡血和鸡肉不能放盐，否则无效。

三

处方 白背叶12克 茵陈30克 夏枯草12克
麦冬12克

用法 上药加水500毫升，煎至200毫升。每日上、下午各服1次。

疗效 某医院用此方治疗5例，痊愈3例，好转2例。

四

处方 溪黄草150克 田基黄150克 白背叶30克
茅莓根30克 牛大力150克 十大功劳90~150克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。10~15

天为 1 疗程，一般2~4个疗程奏效。

疗效 某医院治疗14例，痊愈10例，好转 4 例。

五

处方 西氏毛茛^{2株}

用法 把西氏毛茛全草洗净捣碎，拌红糖30克，敷腕关节掌侧24小时。

疗效 某医院以之治慢性迁延型肝炎 9 例，痊愈 8 例，无变化者 1 例。

再生障碍性贫血

一

处方 阿胶 生地 藕节 鸡血藤^{各12克}

黄芪 白芍 地骨皮 参须 麦冬 当

归^{各9克} 黄花倒水莲^{6克} 花蕊石^{15克}

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

说明 适用于再生障碍性贫血的早期阶段。

二

处方 黄瓜香（匍伏堇）30克 母鸡1只

用法 先将母鸡去头、足、翅和内脏，然后将黄瓜香洗净、捣烂，放在母鸡腹中，炖熟后连鸡及汤同服，3次服完。在服药前，须先服桐油炒的黄豆，如有呕吐、腹泻者方可服上药。

疗效 某社员，经医院检查，确诊为再生障碍性贫血，治疗效果不佳。后服本方五次病愈。现已参加生产劳动。

血小板减少性紫癜

一

处方 田边菊 半边莲 各12克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

二

处方 牛腿骨

用法 取鲜牛腿骨一根（勿用病牛骨），不加油盐，炖汤喝，一般两天服完。

疗效 廖×，患血小板减少性紫癜久治乏效，血小板最低时只有3万，出血点遍及全身，食欲减退，不能工作。经服上方后，出血点逐渐消失，食欲增强，血小板上升至14万。

三

处方 鲜马尾松针60克 鲜茅根 藕节各30克
仙鹤草15克。

用法 水煎2次，分3次服完，每日1剂。
服至症状消失一周以上。

疗效 治疗10例，均于5~7天后出血倾向停止，紫癜逐步消失，取得较好的效果。如刘××，女，15岁。因鼻衄及全身出现瘀

斑四月余，于1972年9月28日入院。入院检查：血色素3.5克，血小板3.6万/立方毫米。骨髓检查符合血小板减少性紫癜。经用各种止血药物和大量激素，并反复多次输血，症状未能控制，出血倾向严重。患者处于半昏迷状态，乃停用原有治疗，改服本方，两天后活动出血停止，一周后出血倾向明显改善。先后服药一个月，紫癜完全消失，血色素上升至12克，血小板上升至7.8万，痊愈出院。

心、肾性水肿

一

处方 生巴豆(去壳)60克 苦荞子250克

制法 将上二味共研细末，用热米汤调和为丸如饭豆大。

用法 视体质强弱，每次用开水送服3~5粒，每日服2~3次。

疗效 某女社员，一年前走路稍快即感心悸、气促。五个月前，先见面部浮肿，后延及上肢、下肢、腹部，渐不能食、动则气促、心悸。服此丸后泻水，第三天水肿消退，食欲大增，迄今未复发。已参加生产劳动。

说明 本方还可治肝硬化腹水，但用药后常水泻厉害，因此要注意观察，防止失水、酸中毒及昏迷发生，应适可而止。

禁忌 服药后48天内忌食生、冷、油、盐。

二

处方 金钱草3克 万年青6克 天仙藤9克
白茅根5克 虎刺9克 海金沙18克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

三

处方

(1) 内服：海金沙30克 水菖蒲 木通 天花粉 水杨柳(柳叶白前)各15克

(2) 外洗：陈稻草 栗树皮 芭蕉树
用法 内服方每日 1 剂，分 2 次服。然后以
外洗方煎水洗浴。

四

处方 海金沙 9 克 白术 120 克 黑牵牛 45 克
甘草 15 克

用法 共研细末，每日 3 次，每次 6 克，开
水送服。

禁忌 忌盐 120 天。

肝硬化腹水

一

处方 马鞭草 60 克 半边莲 半枝莲 田基
黄 白花蛇舌草 各 30 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方以马鞭草为主，其他各药根据不
同情况斟酌加减。

二

处方 癩蛤蟆5个 大蒜49瓣 猪肚1个

用法 把癩蛤蟆去头及肠杂，同大蒜一起放入一个猪肚内炖。分多次服。

三

处方 四月花（紫薇）根500克 七叶黄荆

（牡荆）根18克 车前草3株 山楂树根60克

野南瓜树根120克 梔子根30克 路边荆30克

水灯草9克

用法 第一剂煎后放甜酒少量；第二剂煮豆腐两小块；第三剂煮猪小肠1~2尺；第四剂起加煮瘦猪肉。一般以水十碗煎成一碗，头煎当天晚餐后服，二煎次晨空腹服。重者连服15剂以上，轻者10剂左右，腹水消后再以本方加艾三根煎水蒸黄鸡。

疗效 编者曾访问一早期肝硬化腹水患者，1961年发现腹水，迭经中西医治疗无效，

1964年服此方而愈、至今尚健在。

禁忌 禁鱼、虾、笋。

四

处方 鲜土鳖虫7个 白糖24克 甜酒水1杯

用法 先用甜酒送服土鳖，再服白糖。20天为1疗程。

五

处方 梔子根15~30克 白茅根30克 鸡爪糖

树(枳椇)根30克 山蚂蝗(小槐花)根15克

土茯苓15~30克 黄檀树根9克 酸枣树根15~

30克 细叶水杨柳 (柳叶白前)9克 虎杖

12克 老鸦风(白珠树)根15克 乌泡树根

15克 岗梅根15克

用法 先以水煎服2~3剂、每日1剂。以后则放猪脚炖服。

疗效 靖县有关方面及群众反映此方确实有效。

六

处方 腹水草60克 葱白9克 生姜皮3克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

禁忌 用药时忌盐。

七

处方 红大戟(京大戟)90克 紫草根120克

冬葵子90克 大枣750克

用法 上药用砂锅煮4~6小时，煮干后放水再煮。然后取大枣阴干，每日吃3次，在7天内吃完。煮后剩下的药水约一茶杯，一次服完。

八

(消水丸)

处方 甘遂 大黄 陈皮 槟榔 黑牵牛

白牵牛 牙皂各等份

制法 共研极细末，炼蜜为丸。

用法 每次服 6 克，每日 1 次，于早晨空腹时用淡姜汤送下，10 天为 1 疗程。在治疗前及治疗期间，均辅以酵母、多种维生素口服，高渗葡萄糖加维生素 C 静脉推注，并配合高营养无盐饮食。

疗效 治疗 7 例，服药 1~2 疗程后，腹水全消，症状改善或消失。如廖 × ×，男，57 岁。腹胀两月余，下肢浮肿 20 天，于 1970 年 10 月 22 日入院。检查：慢性重病容，腹膨胀，腹围 105 厘米，腹壁静脉怒张，肝脾因腹水触不到，下肢重度凹陷性水肿。肝功能：高田荒(+++)，谷丙转氨酶 60 单位。诊断：肝硬化腹水。入院后，于 10 月 27 日用消水丸 1 疗程，腹水渐消，腹围缩至 92 厘米，下肢浮肿全消。再用 1 疗程，腹水全消，腹围 76 厘米。12 月 29 日出院，经随访 13 个月，未见复发。

急性肾炎

一

处方 益母草30克 白茅根 车前草 木通
三颗针 叶下珠 旱莲草各15克

用法 水煎。每日1剂，每剂煎煮2次。加红糖少许为引，分2次服。治疗期间，需口服多种维生素，无盐饮食。血尿明显者加荠菜30克、倍用茅根。

疗效 治疗23例，临床症状平均10天左右消失，尿常规化验平均8.7天恢复正常，15例住院病人平均12天出院。

二

（四根汤）

处方 棕树根 黄栀子根 白茅根各30克 尿
珠子根60克 路边荆15克

用法 上药煎成合剂250毫升，加入适量的防

腐剂，瓶装备用。或临时煎服。

疗效 治疗观察20例。大多数病人均有不同程度的发热，全部病人均有不同程度的水肿，小便常规检查：蛋白（++++）2例，（+++）5例，（++）5例，（+）8例，所有患者均有不同程度的血尿，其中严重者红细胞（+++）2例，（+）3例，白细胞（+）1例，出现颗粒管型7例，出现白细胞管型4例。经用四根汤治疗后，10～15天临床症状消失，小便常规化验正常或接近正常。如熊××，男，8岁。开始畏寒发热，咳嗽，尿黄短少，面部浮肿，继而渐及全身，有腹水，阴囊浮肿，下肢浮肿（++），尿蛋白（++++），白细胞（+），红细胞（+），颗粒管型4～9，白细胞管型0～2，诊断为急性肾炎。服本方15天后，临床症状消失，尿蛋白极微量，红细胞1～3，白细胞0～1。

三

(肾炎合剂)

处方 车前草 白茅根各30克 积雪草15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

疗效 治疗22例，其中痊愈10例，占45.4%；显效6例，占27.3%；好转6例，占27.3%。如李××，女，三岁半。因全身明显浮肿，尿少住院。尿常规：蛋白(++)，脓球1~6/HP，红血球0~3/HP，颗粒管型(+)/HP。诊断：急性肾炎。经用本方15天后，全身浮肿消失，下床活动如常。尿常规：蛋白(-)，脓球(-)，红血球0~2/HP，白血球0~1/HP，颗粒管型(-)/HP。痊愈出院。

四

处方 白花蛇舌草 白茅根 旱莲草 车前草 夏枯草各9~15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

疗效 治疗50例，治愈40例，占80%，浮肿一般在2~7天内完全消退；10例好转，占20%。

糖 尿 病

一

处方 鸡屎白7份 谷芽3份

制法 将新鲜鸡屎白放瓦上焙枯存性，加入烤焦的谷芽，共研细过筛，加适量白糖为丸，每丸重0.5克。

用法 每日3次，每次1丸，热酒兑服。

二

处方 高丽参5克 生石膏30克 麦冬9克 沙
参15克 竹叶10克 知母15克 法夏9克 淮
山15克 甘草3克

用法 水煎。每日1剂，分5次服。

姜片虫病

处方 槟榔30克 雷丸 榧子 乌梅 乌药
各9克 川楝15克 花椒6克 枳实9克 沉
香3克

用法 水煎。每天1剂，上、下午各服1次，
饭前服。

禁忌 孕妇忌服。有严重贫血者慎服。

胆道蛔虫病

—

处方 乌梅11克 十大功劳15克 ~~地锦15克~~
川椒5克 木香3克 两面针12克 ~~枳壳~~
大黄各5克 延胡索 川楝各5克

用法 水煎。每日1剂半。

二

处方 苦楝根白皮 适量

用法 晚上把上药切碎捣烂，以饭作饼敷胸口。

三

(安蛔汤)

处方 藿香9克 乌梅15克 黄连5克 川楝
3克 白矾1克

用法 水煎。每日1剂。并发感染合四逆散
(柴胡、白芍、枳壳、甘草)；呕吐加旋覆
花、代赭石；腹痛甚加玄胡索、七叶莲；
大便秘加大黄、玄明粉。

疗效 本方与乌梅汤治疗观察430例，除3例
转外科手术外，其余全部治愈。治愈率为
99%。平均疼痛消失为三天。

中 暑

一

处方 青木香_{30克} 老君须_{30克}
用法 研细末，每次 9 克，开水泡服。
说明 本方名“镇痛散”，治中暑腹痛。

二

处方 木姜子_{15克} 青木香_{15克} 辣蓼草_{15克}
土细辛（杜衡）_{15克}
用法 上药洗净晒干，共研细末，每次服
3克，开水冲服。
说明 本方适用于中暑上吐下泻且腹痛者。

三

处方 泽兰叶_{9克} 大米_{30克}
用法 上药共捣烂，同淘米水内服。
说明 本方适用于中暑胸闷、昏迷者。原方

缺剂量，现剂量乃编者所加。

风湿性关节炎

一

处方 边河枫(白半枫荷)根60克 蓖荑树(卫矛)根30克

用法 煎汤兑酒服，或炖猪脚吃。每日1剂，分3次服。

说明 本方主治全身风湿痛。

二

处方 鲜桑枝 木防己 金钱草各30克 豨莶草、土细辛(徐长卿)各60克

用法 水煎。每日1剂，分3次服。连服8剂。

三

处方 当归12克 豨莶草12克 糯米500克 甜

酒药子 适量

用法 前二味共研细末。将米煮熟，与药末和匀，再加甜酒药子调匀，做成酒。每天3次，每次1杯，冲鸡蛋服。

四

处方 露蜂房1个 白酒250毫升

用法 将蜂房浸入酒内，10天后，用以擦患处。

五

处方 紫荆皮15克 独活12克 白芷 白芍 制草乌各9克 制川乌6克 红花 石菖蒲各9克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。服药前先喝酒适量。

说明 本方适用于风湿性关节炎寒湿型。

六

处方 皂荚 细辛 高良姜 生草乌 生川乌各1.6克 丁香1克 肉桂1.2克 樟脑30克

用法 共研细末，撒在“伤湿止痛膏”上，贴患处。

说明 本方近期疗效好，远期疗效尚待观察。

七

处方 牛膝 天冬 薏苡仁 鸡血藤 活血藤 骨碎补 制川乌 制草乌 钩藤各9克
木瓜 隔山香(金鸡爪)各15克 千年健 羌花 威灵仙各6克 黄芪30克 当归45克 石南藤15克

用法 上药浸酒3公斤，浸10天后，每日服药酒30毫升。

八

(活血安痛酊)

处方 桑寄生 当归 桂枝各3公斤 丹参 熟地各4公斤 老鹳草 苍术 活血藤 安痛藤 续断 赤芍 木瓜 川牛膝各2公斤 桃仁500克 乌梢蛇 皮子药各1000克 红花

制草乌各250克 蜈蚣120克 白糖40公斤 95%
酒精150公斤

制法 先将酒精稀释成75%的浓度，取各药（除白糖外）混合均匀，捣成粗料，白布袋装，用蒸馏水或开水将药洒润，扎紧袋口，投入酒精中，将缸密封，每隔10天翻动揉搓一次，一个月后加入蒸馏水将酒精稀释成50度，再浸泡20天，除去药渣，然后取白糖加水入锅溶化，煮沸，倾入药缸中，不断搅拌10~15分钟，使其静置2~3天，倾取上层清液，调整为40度（药渣用蒸馏法收回酒精、以备再次浸药之用）。以200毫升瓶装，封固即得。

用法 每日1~3次，每次30毫升。

禁忌 孕妇忌服。

九

处方 地下明珠

用法 将上药烘干研末备用。用时以冷开水

或白酒调湿，捏成绿豆大一团，敷于痛点或穴位上，外用胶布固定，12~24小时后取去。敷药后局部有烧灼刺痛感，局部大多数皮肤变紫或起水泡。如有水泡，可用消毒针刺破，一般2~3天结痂，局部色素亦逐渐消退。

疗效 共治疗风湿性关节炎、坐骨神经痛，腰腿痛、三叉神经痛等100余例，一般痛点明显而固定的，用药后90%以上都有明显的止痛效果以至好转或近愈。

十

（青藤汤）

处方 青风藤30~45克 秦艽 寻骨风各15克
首乌30克

用法 水煎。每日1剂，分3次服。风胜型加威灵仙、羌活；寒胜型加附片、桂枝、制川乌；湿胜型加苡仁、苍术；热胜型加丹皮，生地；虚弱型加桑寄生、黄芪、刺

五加皮。此外，还可按病变部位，选加不同药物，如头部加藁本、粉葛根，上肢加桑枝、姜黄；下肢加牛膝、木瓜；背部加威灵仙；腰部加徐长卿、狗脊。

疗效 治疗180例，基本控制(对早期患者，肿胀消退，功能恢复；对晚期患者的关节畸形及功能障碍，不作完全恢复要求)24例；显效(临床症状大部消失)72例；有效(临床症状部分缓解)66例；无效(症状无变化)18例。总有效率为90%。

说明 本方服后有的自觉发热(体温正常)，皮肤发红，周身发痒起荨麻疹，此反应约持续2小时，一般不需用药即可恢复正常。初服药者偶有头目眩晕，呕吐，不思食，水肿，多尿。未发现远期副作用。为了防止此副作用，用量可由少逐渐加多。

十一

处方 生半夏30克 生山栀60克 黄柏15克

大黄15克 桃仁10克 红花10克

用法 上药共研极细末，醋调敷患处。

说明 本方适用于膝部关节红肿 灼热而痛（即中医所谓“鹤膝风”），一般敷药10分钟止痛，1~3天消肿，疗效确实。

腰 痛

处方 大伸筋9克 枸骨 菝葜 八棱麻（八楞木） 活血藤各18克 五加皮 当归 木瓜各12克 威灵仙9克 川牛膝15克 红花6克

用法 水煎。每日1剂。2次温服。

疗效 治40余例，均有一定疗效，显效率为80~90%，一般服3~7剂即能见效。如宋××，男，50岁。10多年前因翻车事故腰部受伤后，腰痛经常复发，活动不便，生活不能自理。用本方2剂即见好转，连服7剂近愈。

坐骨神经痛

一

处方 狗胫骨500克 当归 千年健 威灵仙
百步拿 大枣各120克 川乌 草乌各9克
细辛15克

制法 狗胫骨焙焦存性，大枣去核，与诸药共研细末，炼蜜为丸，如黄豆大。

用法 每日早晚各服1次，每次15~20丸，开水送服。如感恶心舌麻，是川、草乌的毒性反应，用生姜15克捣汁开水兑服以解之。

疗效 邓××，男，41岁。因扭伤腰部后延及坐骨呈持续性疼痛，难以转侧。用上方加三棱、莪术、茜草、紫草、牛膝、杏仁、红花、三七为一料 白酒4公斤浸泡5天，每日服3次，每次服30毫升。一剂即止痛，二剂即能参加重体力劳动，疗效显著。

禁忌 孕妇、阴虚发热、消化道溃疡均忌服。

二

（雪花丸）

处方 雪冻花 碘化钾

制法 雪冻花根皮烘干，研细末，装入胶囊，每颗重0.4克；碘化钾亦另装胶囊，每颗重0.6克。

用法 每天服雪冻花、碘化钾胶囊各1颗。连服3天为1剂，2剂为1疗程，病程长者可服2个疗程。现在已将剂型作了改进，即先将雪冻花研粉后再加入碘化钾，加工成糖衣片，每片含雪冻花、碘化钾各0.15克。每日饭后服3次，每次2片。

疗效 治疗93例，临床治愈21例，好转44例，总有效率为69.9%。如苗××，男，42岁，芷江铁二局干部，1972年春劳动时扭伤腰部，3天后影响整个右下肢，卧床不起70余天。住某职工医院治疗效果不佳。仍行

走不便，须策杖缓行。72年7月，由人护送来湖南省中医学院附属二医院就诊。查：直腿抬试强阳性，腰4~5椎及环跳穴明显压痛，服本方2剂后疼痛减轻一半，已扔掉拐杖、由湖南旅社步行二里许来院就诊。先后服雪花丸5剂，即痊愈。经随访，未复发。

三叉神经痛

处方 白芍30克 生牡蛎30克 丹参15克 甘草15克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

说明 本方是夏度衡教授治疗原发性三叉神经痛属于中医肝阳化风型的经验方。近三十年来用于临床取得较好疗效。

癲 癇

一

处方 川贝_{18克} 枯矾_{9克} 法夏_{12克} 制南星_{12克} 紫河车_{1个}

用法 紫河车洗净焙干，与诸药共研细末。
每日3次，每次3克，开水吞服。

二

处方 吴萸_{9克} 朱砂_{5克} 广香_{5克} 紫河车(焙研)一个 生姜_{9克}

用法 前三味煎，生姜捣汁和紫河车粉冲药服。

三

处方 石菖蒲 茯神 制南星 法夏 白芥子 天竺黄 钩藤 独活各_{9克} 远志(炙) 细辛各_{3克} 天麻 广皮 桂枝尖 牙皂

前胡各6克 生姜汁9克

用法 前15味水煎两次，去渣，将两次药汁和匀，分成两份，兑生姜汁服。

说明 本方曾治愈多人，唯发作时遗尿者无效。

四

处方 鱼鳔60克 青矾(煅)10克 朱砂10克 天竺黄10克

用法 上药共研细末，炼蜜为丸。每次10克，每日早晚各1次，白酒送服。

农药中毒

一

处方 贯众30克

用法 上药捣烂放干净纱布上用冷水冲滤，流出水与泡沫。内服泡沫及水。

说明 本方可解砒、磷中毒。

二

处方 野百合叶

用法 研末，每次3~6克，冷开水调服。

说明 野百合即民间所称之“化草”，解砒、磷中毒效果良好，也是治食物中毒及骨梗喉的有效药物。

三

处方 蛇莓60克 生绿豆60克

用法 捣烂，冷开水泡后绞汁内服。

说明 本方可解雷公藤及砒、磷中毒。

四

处方 小叶凤尾草（日本乌蕨）250克

活血藤15克 小活血（南五味子）15克 青木香15克 广香15克 冰片3克

用法 凤尾草捣烂取汁，余药研末。分3~4次兑服。

说明 本方能解各种农药中毒。

五

处方 大黄30克 防风30克 甘草30克

用法 水煎顿服。

说明 解六六六中毒。

六

处方 乌柏根30克

用法 捣烂，兑第二次淘米水服。

说明 解六六六中毒。

药 物 中 毒

一

处方 青蒿适量

用法 水煎顿服。

说明 解斑蝥中毒。

二

处方 生姜_{适量}
用法 捣烂取汁内服。
说明 解半夏中毒。

三

处方 芭蕉莧_{适量}
用法 将芭蕉莧捣烂，加入第二次淘米水，
取汁内服。2~3小时服1次。
说明 解巴豆中毒。安仁县人民医院曾用此
方治愈一例重症患者。

四

处方 羊血_{1碗}
用法 生饮。转危为安后，复饮一杯。
说明 解雷公藤和砒中毒。

五

处方 臭娘子叶90克 水杨梅(茜草科)叶90克

芭蕉莖适量 麝香0.3克

用法 前三味捣烂取汁加麝香。黄土水兑服。

说明 解雷公藤中毒。

食 物 中 毒

一

处方 地浆水

用法 在黄土地上挖一个三、四尺深的坑，
灌水。搅混澄清后喝一、二碗。

说明 解野果、野菜、鱼类中毒。

二

处方 茵陈30克 大黄15克

用法 水煎。寒证加附子9克；热证加黄
柏9克。

说明 治蚕豆中毒（即蚕豆黄）。

三

处方 金银花叶500克 地浆水适量

用法 把鲜金银花叶捣烂，用地浆水兑服。

说明 解野蕈中毒。

四

处方 绿豆120克

用法 煎浓汁服。

说明 解野蕈中毒。

五

处方 鲜金鸡尾（乌韭）120克

用法 捣碎，用米泔水一碗浸，去药渣后服。

说明 解野蕈中毒，亦可解砒中毒。

(三) 外科疾病

出 血

一

处方 田边菊 乌泡叶 蒿菜巴 (茼蒿)

救兵粮 (火把果) 毛蜡烛 (香蒲) 各等份

制法 将上药分别焙至黑黄色，共研细末备用。

用法 压敷伤处。

说明 有人将兔子的股动脉切开，用本药末压敷20秒钟，出血即止。

二

处方 姜炭 无名异 白及各30克 鸡肫皮15克 冰片3克

用法 上药共研极细末，瓶装密封备用。用时取适量撒伤口包扎。

说明 有关单位择方中主药作动物实验（兔股动脉切开），证实可在7分钟内止血。

三

处方 棕榈树适量

用法 棕树干品洗净、去粗皮，烧灰存性，研细贮瓶。用时撒伤口。

说明 本方治开放性骨折出血。有人用此药治疗多例，止血效果良好，并能促进骨折愈合。

四

处方 石飞丝（松萝） 水蛭

用法 上药焙枯各等份，研细瓶装密封。用时以适量撒伤口。

说明 某草医用此方治疗动脉损伤出血多例，效果很好。

五

处方 桤木嫩叶 适量

制法 把桤木嫩叶用水拌湿，磨成细粉，布包洗出稠汁，沉淀取净粉（布包内的粗渣不要）。

用法 敷扎伤口。

六

处方 乌泡叶 鸭嘴皮 地榆根 各等份

用法 共捣烂，或干燥研细末。用时取适量敷伤口上。

说明 主治一般外伤出血，对动脉损伤出血效果亦好。

七

处方 蒲黄 适量

用法 焙灰存性瓶贮。用时敷伤口上。

说明 对一般外伤出血有较好的疗效。

八

处方 苧麻叶500克 冰片少许

用法 苧麻叶去叶脉烘干，研成细末，加冰片瓶贮。用时撒伤口上。

说明 本方止血生肌效果良好，某地仅用苧麻叶一味，亦收止血之效。

九

处方 马尾松（花粉或根皮）蔓 苧麻各等份

用法 马尾松（上半年用松花粉，下半年用松树根白皮）同蔓苧麻一起用石器捣烂，敷伤口上。

说明 本方能止血、续筋、生肌，敷一次即可。嚼敷效力更好。

十

处方 水蛭 陈石灰各等份

用法 将水蛭焙存性，与陈石灰一起研细末

瓶贮。用时取适量敷伤口。

十一

处方 鸡血若干滴 鸡皮适量

用法 割鸡颈取血，临用取鸡皮。先用热鸡血淋伤处，后敷上鸡皮，包扎固定。

说明 本方主治腹壁创伤出血。

十二

处方 苏木

用法 焙干研细末撒伤口。

十三

处方 乌贼骨 金鸡尾（凤尾草） 陈石灰
白及 韭菜 桤木叶 雷公藤 马兰 泽
兰 苧麻叶 毛蜡烛（香蒲） 侧柏炭
血余炭各等份

用法 共研细末，撒敷伤处。

十四

处方 陈石灰500克 大黄120克

制法 有四种：(1) 二味同炒，至石灰变红色为度，去大黄，筛极细末备用。(2) 石灰水浸大黄3天，去大黄，取石灰晒干研末。(3) 石灰水浸大黄3、5天，取大黄晒干研末备用。(4) 石灰、大黄炒成桃红色，共研细末备用。

用法 取细末敷患处。

说明 本方源于中医古方桃花散，止血效果甚好，唯各地制法不同，一并选录，提供研究。

十五

处方 韭菜根30克 童便1杯

用法 将韭菜根捣烂取汁兑童便服，渣敷患处。

说明 此方确有效。

十六

处方 陈石灰150克 丝瓜叶30克 韭菜叶30克

用法 共捣烂敷患处。

说明 某卫生院用于临床，证实对静脉、微血管及小动脉出血有较快的止血作用。

十七

处方 马尾松1把 见血散(飞龙掌血)根适量

用法 如出血不止，用马尾松嚼烂外敷；如出血不多，用见血散嚼烂外敷。

十八

处方 蔓苧麻 金鸡尾(乌韭)各适量

用法 捣烂外敷。

说明 某卫生院用本方治三例较严重之外伤出血，止血效果满意。

十九

处方 冬青叶 金樱子树嫩尖 金鸡尾（凤尾草） 雷公稿（山胡椒）叶 桤木叶 各等份
用法 嚼烂外敷。

烧、烫 伤

一

处方

内服方：大叶金花草（乌韭） 山桂枝（阴香） 虎杖 土大黄 十大功劳叶 光叶海桐 各9~15克

外洗方：光叶海桐 十大功劳叶 银锁匙（百解藤）

外敷方：生地榆 土黄芩（南天竹） 苦参

用法 先煎服内服方，再以水煎外洗方洗伤口。然后把外敷方诸药共研细末，加冰片少许，麻油调膏外涂，日数次。

疗效 本方治大面积烫伤有一定效果。如一社员在1969年12月烧窑时不幸窑顶崩塌，烧伤面积达百分之六十以上，胸部及下肢均为三度烧伤。经用上药治疗20天，除两下肢胫骨处尚未完全愈合外，90%以上伤面愈合良好。

二

处方 漆大伯(毛果算盘子)15克 蛇不过15克
金银花5克 山黄连(南天竹)5克

用法 本方可制成洗剂或粉剂外用。

(1) 洗剂：上药用水1500毫升，煎成1000毫升。外洗和湿敷伤面。

(2) 粉剂：混合研细，蒸汽消毒。取干粉撒布伤面。

说明 本方系某军医院在学习民间用漆大伯治疗漆疮经验，并用以治一例剥脱性皮炎取得疗效后，在原方中加入山黄连，用于治疗烧、烫伤，取得明显效果。据临床资

料介绍：

- (1) 本方有较明显的抗菌作用。经临床和实验观察，对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、大肠杆菌等都有抑制作用，对绿脓杆菌作用更明显。已化脓的创面，用湿敷法可使脓液很快消失，伤面变新鲜。**
- (2) 有较强的收敛作用。湿敷或撒粉后，伤面两天内就变清洁、干燥，同时肿胀也消退。**
- (3) 有明显的生肌作用。II度烧伤伤面上药后，上皮生长较快；严重感染或较深的伤面，湿敷后肉芽生长也很好，给植皮创造了有利条件。**
- (4) 有一定的止痛作用。**
- (5) 早期使用有控制或延缓败血症发生的作用。**

三

处方 陈石灰5公斤 生石膏30克 艾绒30克

纯茶油 适量

制法 将生石膏研细混入石灰加井水7公斤搅拌，除去悬浮物，澄8分钟。将澄清液与茶油按1:1的比例相混合，不断搅拌至淡黄糊状（若澄清液不够，可再在前所制的沉淀物中加井水搅拌澄清后继续使用）。上药和匀后，加入艾绒再充分搅匀（若伤面无感染者，可不加艾绒）。

用法 把药液涂于大小适当的纱布上，覆盖伤面。第一天前6小时的换药次数，以保持伤面湿润为度。以后14小时内换药7次，第二天换药8次；第三天至痊愈每天换药2~4次。用药时应注意：如敷料粘于伤面，不要强行撕揭，可再贴上一层敷药纱布，稍候，即可取下。如伤面出现绿色分泌物时，加强换药即可自行消除。上药后有人会出

现短时寒战，但不久即会自愈。

疗效 本方治疗烧伤病人七例：四例大面积烧伤（伤面分别为82%、85%、64%、40%），三例小面积烧伤，均迅速治愈。

四

处方 桐子树（油桐）花120克 桐油500克

制法 将从桐子树上落下的桐树花（未沾水、干净的）浸在桐油里，存阴凉处，离地一尺高，放数月。

用法 鸭毛开水烫过，蘸桐花油搽伤面，每日数十次，以保持湿润为度。

五

处方 雄鸡血

用法 雄鸡断颈取血，用血淋伤面，然后包扎。过两天，鸡血变黑，可不再换药，至痊愈。

六

处方 黄连 黄芩 黄柏各等份 冰片少许

用法 前三味晒干研细末，加总量五分之一的冰片，用凡士林调匀。涂患处。

七

处方 生石膏 大黄 连翘 儿茶各等份

用法 共研细末过筛，用麻油调药末，每日搽伤面4~6次。如伤面有水泡，可用消毒针刺破，排出水液，再涂药。

说明 本方止痛效果好，化脓率低，疗效较快。对于中、小面积I、II度烧伤的，不管伤面有脓无脓，均可使用。

八

处方 脚踏莲（筋骨草）叶 火伤泡（蔷薇莓）叶各适量

用法 捣烂外敷，每日换药1次。

说明 本方治烫伤效果较好。以火伤泡根用米泔水磨浓汁频擦，亦可治烫伤。

九

处方 黄连 地榆各等份

用法 二味共研末。用时将药末撒伤面，一日数次。

十

处方 煅牡蛎 井内青苔(焙干) 野水鸭

毛(烧成灰) 海金沙(焙干)各等份

用法 共研细末，鸭蛋清调涂。愈合慢的可加适量鸡内金、老丝瓜皮、血余炭、柿蒂、乌贼骨、冰片等。

说明 本方可治大面积烧伤。

十一

处方 河蚌壳 人乳各适量

用法 将河蚌壳煅成灰，研细，人乳调搽患

处2~3次即愈。

十二

单
方

处方 红蚯蚓数条 白糖适量 冰片少许

用法 将蚯蚓洗净，放白糖中，待蚯蚓变黑，白糖溶化后，去蚯蚓残体，加入少许冰片外搽。

说明 本方治中、小面积烧、烫伤很有效。有的地方则不用冰片。

十三

处方 冬青树皮90克 乌泡根皮60克 金樱子根皮30克

用法 上三味均去粗皮，用内皮加水煎成浓汁涂患处。

十四

处方 大黄30克 黄连3克 地榆120克 进口苦（苦树）叶18克 轻粉6克 冰片1克

用法 共研细末，麻油调搽。亦可用于药末撒在分泌物较多的伤面上。

说明 本方治烫伤效佳

十五

处方

内服方：

①烧伤1号：金银花 甘草 鱼腥草 马齿苋 各30克

②烧伤2号：上方加十大功劳、柴胡 各15克

③烧伤3号：蛇莓60克 蒲公英30克 柴胡 甘草 银花 各15克

④地马合剂：地锦 马鞭草 各500克

外用方：

①外用1号：煅炉甘石500克 硼砂10克
氯霉素粉5克 冰片9克

②外用2号：煅炉甘石500克 硼砂20克
白及400克 氯霉素粉10克 冰片20克
血竭50克

- ③外用4号：炉甘石200克 松香100克
冰片20克 马齿苋100克 甘草100克
珍珠母100克 草河车80克 十大功劳
100克 丹参100克 银花100克
- ④外用5号：丹参 地榆 银花 白芷
各175克 十大功劳200克 松香40克 黄
蜡 冰片各16克 麻油1500毫升

制法

- (1) 外用1号：上药分研细末，过筛后混合，用瓶储存。
- (2) 外用2号：先将白及置烤箱中120℃2小时，冷后研细末过筛，同诸药混合瓶储；亦可制成30%的麻油混悬液使用。
- (3) 外用4号：炉甘石用140目筛过筛后，置烤箱中，170度加热3小时；将珍珠母、丹参、银花、草河车烘干研末，过120目筛，再置烤箱100度加热3小时。将冰片、松香分别研细过120目筛。然后将上药拌匀即可。

(4) 外用5号:将丹参、地榆、银花、白芷、十大功劳与油混合放置一夜,用火熬1个半小时(文武火交替,以白芷变焦黄为止),冷至80度以下,纱布过滤,约得液体800毫升,再加黄蜡小火溶化搅拌,冷至70度时加松香(先过120目筛)搅匀,冷却成膏备用。

用法 内服外用配合使用

内服:

①、②方加水煎成400毫升,每次50~150毫升,日服2次;

③方加水煎成400毫升,每次100毫升,每日2次;

④方加水煎成500毫升,每次100毫升,日2次(亦可外用以药水棉球洗创面)。

外用:

首先将创面洗净,然后把外用药粉置于纱布袋内,将药粉均匀撒在创面上,行暴露疗法。外用5号主要用涂深Ⅱ度或经

久不愈的陈旧肉芽创面。

疗效 从1969年以来，用各种剂型的烧伤药治疗500余例烧伤病人，治愈率由70%提高到95%。

十六 (紫草膏)

处方 当归 防风 生地 白芷各45克 紫草
150克 黄丹1克 冰片9克 麻油1公斤 凡士
林2公斤

制法 先将麻油入锅煮沸，加入当归等前四味药，约熬10分钟后，加入紫草（先用温水泡湿后拧干），再熬约15~20分钟，以白芷呈淡黄色为度，去药渣过滤，取药液入凡士林溶化。离火待稍冷后加入黄丹、冰片粉末拌匀，冷却即成。

用法 进院后，在纠正休克的同时进行清创。一般用生理盐水或1/1000呋喃西林液冲洗伤口3~4次，去除已游离之表皮。继用

1/1000新洁尔灭溶液洗创面。清洗后用紫草膏涂布于棉垫上覆盖创面或直接涂擦创面。感染创面每天换一次，清洁创面隔天换一次。

全身治疗可酌情进行补液输血及抗生素治疗。较大面积烧伤及创面感染并发全身中毒症状者均内服“三黄汤”加养阴、生津、健胃的中药。

疗效 治疗47例，新鲜I、II度创面24例，除2例发生轻度感染于3周后愈合外，22例创面于4~19天内1期愈合。感染率为8.3%，较本院既往病例大为降低。深II、III度烧伤均未植皮自行愈合。如伍××，男，37岁。因瓦斯爆炸受伤，两小时后入院。烧伤颜面、耳、颈、胸、上腹部、四肢、会阴、背部，除部分水泡外，均已脱皮。诊断为II度烧伤，总面积76%。进院立即给予输液等抢救。创面清洁后，覆盖紫草膏棉垫，于伤后20天创面全部愈合。

十七

处方 芭蕉树汁(最好是冬季取)30毫升 新石灰汁200毫升 麻油30克

制法 将芭蕉树捣烂，用布包绞汁，将新石灰500克放入1公斤清水里搅动后，泡10分钟以上，除掉水面上泡沫与水底沉淀，取出清亮水。另将芭蕉树汁和麻油拌匀，使其混合后，再将石灰清亮水慢慢渗进去，边渗边搅，使其成白色浆糊状膏。

用法 先用银针将水泡刺破，使水流出，再用鸭毛将药膏涂患处，每日3~4次。

疗效 本方有清热、止痛、消炎作用，治疗烧烫伤30余例，效果良好。涂药后止痛、皮肤愈合快，愈后无疤痕。治疗丹毒亦有效。

十八

处方 虎杖

用法 晒干研末撒创面。

疗效 本方疗效肯定。如男性患儿××，Ⅰ、Ⅱ度烫伤占全身面积50%，腹部水泡已破烂流水，用本方20余天即愈。

十九

处方 蛇蜕3张 血余炭60克 生地榆500克 煨石膏240克 冰片9克 桐油2公斤

制法 取乱发1.5公斤，洗净烘干烧灰60克。蛇蜕先用桐油少量炸熔化，然后倒入2公斤桐油，待油热，掺入血余炭及地榆、石膏、冰片细末，搅匀、煎沸，离火后冷却成膏，装瓶备用。

用法 局部外涂。伤重者酌情内服消炎败毒药。

疗效 不论伤情轻重均有效。经31例的治疗观察，效果较好，愈后无疤痕。如杨××，60岁。煮饭时被米汤烫伤右侧手、腰、臀、下肢，伤面达40%，深Ⅱ度，体温39.8℃，

口渴心烦，经用上药局部外搽，每天1次，纱布包好，内服消炎解毒中药3剂，半月痊愈。

二十

处方 生地榆1个 蜈蚣4条 冰片15克

制法 生地榆捶成泥状，后二味共研细末，混合后加麻油调匀。

用法 先清洗疮面，然后敷上药适量包扎。

初起每天换药1次，以后每3～4天换药1次。

治疗期间禁吃生辣食品。

跌打损伤

一

处方 骨碎补 生石膏 大黄各30克 红花

茜草 磁石 土鳖虫 自然铜各15克 樟

脑9克

制法 共研细末，过筛备用。

用法 白酒调药敷伤处；如皮肤破裂，关节脱出者均只宜用桐油调敷，日换1次。骨折初期，每隔3天换药1次。敷药后，用纱布绷带包扎固定。

二

处方 黄栀子60克 川乌 草乌 生姜黄
香附子各15克 柑子树叶30克

用法 柑子树叶和香附子均用鲜品捣烂，其他药晒干研细末，一起加酒、面粉调和敷伤处。

疗效 治疗20例，一般外敷1~2次即愈。

三

处方 鹅不食草30克 土鳖虫15克

制法 焙干研成细末，贮瓶备用。

用法 每日2~3次，每次3克，温热甜酒送服。

疗效 治疗跌打损伤腰痛患者100多例均有

效，对陈旧性腰扭伤、打伤疼痛亦有一定的疗效。

四

处方 接骨木 飞天蜈蚣 合叶三七 见血散 各30克

制法 共研细末，以45%酒精浸泡7天后即可用。

用法 以棉球蘸药液揉患处，每天4~5次。

疗效 治疗30例，疗效较好。如颜××，男，因跌倒致右肘关节脱位，脱位处红肿疼痛，复位后用本方治疗2天，肿痛明显消退，第3天肿痛消失。

五

处方 鸭公青9~25克

用法 鸭公青根用猪油炒后，水煎服。每天1剂。可酌情加续断、骨碎补、凤尾草、金腰带等。外用捣烂敷患处。

疗效 本方治挫伤、扭伤、骨折等125例，复查84例，治愈72例，好转12例。如×××，女，51岁。右小腿跌伤，当即右踝部肿胀剧痛，经透视诊断为右胫骨骨折，用杉树皮夹板固定。内服鸭公青3克，每天1次，7天后肿退痛止，拆除夹板，连服单味鸭公青27天，并外敷鸭公青叶，治疗32天，功能恢复而愈。

六

处方 沙梨树叶 杨柳叶 芭岩散(地构叶)
大散血(银铃花) 小散血(过路黄) 田边菊 鹅不食草

制法 诸药各适量放少许凉水，捣烂取汁，瓶贮备用。

用法 先复位，后敷上药，药上放灯草，再以杉树皮固定，每天由灯草处滴入上药汁，每周换药1次。

说明 本方用于开放性骨折效果较好。

七

处方 紫花地丁 车前草 积雪草 马鞭草
夏枯草 腹水草 延胡草(水苏) 黄瓜香
(匍伏堇)各适量

用法 先用金银花、水菖蒲、艾煎水洗患处。
复位后将上药捣烂外敷，以杉树皮固定，
每天滴入上药汁，每周换药1次。

说明 开放性和闭合性骨折均可用。

八

处方 芫花根皮 威灵仙根各一条

用法 二物结成辫状腰带，系腰部沾人汗气
(越久越好)，然后取辫带用白酒(童便亦可)
磨服3克，每天1次。

说明 本方主治跌打损伤。

九

处方 散血莲(凤丫蕨)根 茜草根 朱砂

根各等份

用法 上药用酒磨，搽断骨处。可同时内服“蟹壳存性酒”（将蟹壳焙干研末浸酒中），每日3～5次，每次一小杯。饭前服。

禁忌 孕妇忌用。

十

处方 南瓜蒂 骨碎补 紫花地丁 夏枯草
金钱草 金鸡尾（凤尾草） 金银花 腹
水草尖 鸡屎藤 田边菊 山蚂蝗（小槐
花）叶 各适量

用法 先将南瓜蒂、骨碎补捣烂敷伤口，退
硝磺毒一夜，然后再将其他九味药捣烂外
敷伤口。

说明 本方治枪伤，亦可治疗各种炸药伤。

十一

处方 了哥王叶250克 黄芩120克 血竭 冰
片 各30克

制法 先将前二味烘干，研成细末，过筛，再与后二味混合，瓶装备用。

用法 对断指创面，尽量少用生理盐水冲洗，如污染严重可先用双氧水冲洗后，再用生理盐水冲洗，拭干，对创面断裂的皮肤肌腱一般不清除，按解剖部位对合断指，间断缝合断指3~4针，再用新火柴盒皮（药皮）包围伤口，在火柴盒皮外敷本方药。再用4块小夹板固定患指。一般3~5天观察一次伤口，如无感染，不需换药；如有感染，可用50%桉叶水冲洗伤口后，将鸡蛋白调本方药外敷，每两天换药一次。还可结合具体情况，做如下辅助治疗：

(1) 用破伤风抗毒素1500~3000单位做预防治疗；

(2) 适当应用5天左右抗生素，控制感染；

(3) 内服：半枝莲 乌泡刺 路边荆各15克
十大功劳18克 苏叶12克 木通12克 水煎，日1剂，连服5~6剂。

疗效 治疗 8 例不完全离断指，均已接活。
其中 7 例无功能障碍，1 例因伤及关节，活动受到影响。

慢性骨髓炎

一

处方 炉甘石 500 克 冰片 60 克 雄黄 广丹
白及各 30 克 铜绿 血竭各 15 克

制法 将炉甘石放入炭火烧红的砂罐内，煨红，以童便淬之，冷后研末过筛，加入诸药，共研末备用。

用法 取蜡纸一张，按患处大小用针密刺小孔。然后把适量药末与生猪油和成膏涂在蜡纸小孔上，以有孔的一面贴患处，每两天换 1 次。如已成瘻管者，可用白降丹 15 克，麝香 0.3 克，磺胺粉 60 克和匀，分多次掺入瘻管内，使管壁破坏，创面扩大，脓液容易流出；或用麻油 60 毫升煎沸，加松香 6 克，黄

蜡60克，冷后成膏，加磺胺粉适量，取膏涂纱布上敷患处。

说明 有人曾用此方治疗慢性骨髓炎数十例，一般在1~2个月内痊愈。

二

处方

内服方：猫骨 猪骨 鸡骨 蛇骨 猴骨
各9克

外用方：破纸伞(去把烧灰)60克 百草霜60克
密陀僧30克 (共研细末)

用法 以水煎内服方，每日2次，连服7天，继之用上药煎水兑甜酒服。另外，以蜜调外用药末敷患处，每日1次。

说明 曾用此方治愈二例。

三

处方 冬青叶 白及各适量

用法 除去患处脓汁和死骨，把上药嚼烂敷

患处。

疗效 治疗下肢慢性骨髓炎三例，均痊愈。

其中一例系溆浦县江口风水湾人，左脚腓骨疼痛，穿孔流黄水两年多，敷药5次即愈。

四

处方 千年老鼠屎（紫背天葵） 紫花地丁

蒲公英 木芙蓉花叶 各适量

用法 上药均用鲜者嚼烂外敷患处。

疗效 一人因外伤腓骨处发炎已七年，外表组织棕褐色，渗出液有恶臭，有三个漏管，压孔流水，行走困难。经敷上药40天，伤口基本愈合，效果很好。

五

处方

内服方：石苋菜（商陆）莨_{12克} 青木香_{6克}

八角莲_{3克} 水煎服，每日1剂。

外洗方：艾叶适量 食盐少许 水煎洗。

外敷方：乌贼骨（去硬壳） 血余炭 鸡脆皮
（焙） 三药共研细末敷伤口。

外纳方：千层楼（千层塔）根（去粗皮） 生
半夏 水射干各适量 共研末纳入疮口
一、二次，然后再用收口药。

用法 上四方配合使用。

六

处方 黄花倒水莲（吊吊黄） 金银花 野
百合 夏枯草 淡竹叶各适量

用法 上药水煎。每日1剂。同时以泽兰、
煅蚌壳研粉外敷。

颈淋巴结核

一

处方 水银 青矾 明矾 牙硝 食盐各30克

冰片9克 麝香0.9克

制法 共研极细末，放入小罐内（不加水），用文火加热熔化至倒立小罐内药物不出为度，按制降丹法制备（时间约3.5小时）。

用法 取上药适量，放在光滑的木板上与数十个地古牛（鼠妇虫），少数白饭共捣，做成甘草片大小的丹药与第二方同用。

二

处方 麻油250克 黄丹120克 冰片6克 麝香0.9克

制法 按一般制膏药法制备。

用法 将第一方丹药适量放在淋巴结核的尖端硬处，外敷此膏药即可。

三

处方 麻油250克 黄丹120克 海马1个 冰片
红花 白芷 三七 乳没 各1.5克 麝香
0.3克

制法 按一般制膏药法制备。

疗效 道县寿雁公社用此方治疗淋巴结核甚多，治愈率达80%以上。

说明 以上三方适用于淋巴结核初期。

四

处方 过山虎（大花卫矛）60~90克 木槿根
白毛藤（白英）各9克

用法 水煎。每两日1剂。

疗效 郴县某工厂一工人，患颈部及腋窝淋巴结核五年多，流腥臭黄水三年多，久治无效。经服上方7剂而愈。

禁忌 此方峻烈，孕妇禁用。

五

处方

内服方：杨桃藤根500克 水煎加雄鸡血
滴入兑服；

外用方：杨桃藤根500克 枇杷树根500克捣

烂敷患处。

用法 内服外敷结合使用。

六

处方 铁板消（小槐花）30克

用法 煎汤煮鸡蛋，每日1次，连服3~4次。

疗效 汨罗县某医生用此方治疗9例均有效。

七

处方 米浆树（笑靥花）根15克 梔子9克

忍冬藤30克 虎刺9克 夏枯球6克 凤尾草
6克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。连服两天
后，即单用米浆树根15克煮瘦猪肉吃。

八

处方 玄参12克 贝母12克 牡蛎12克

制法 将前二味蒸熟，牡蛎煅后醋淬共为末，
炼蜜为丸如绿豆大。

用法 每日3次，每次服5克，饭前开水送服。

九

处方 海藻 昆布 乳香 没药 炮甲珠
各45克 蜗牛75克 皂刺1.5克 土狗(蝼蛄)
50个

用法 共研细末。每次3克，临睡时以开水加
白酒少量送服。

禁忌 服药期间禁食鸡蛋、甘草，禁同房。
孕妇忌服。

十

处方 癞蛤蟆1只 鸡蛋1个

制法 秋冬之交，取活癞蛤蟆剖开去内脏，
置鸡蛋一个缝合于内，清水煮熟。

用法 去壳食蛋，七天1次，连服3次。

疗效 李某，男，40岁，中学教师。自幼颈
部生瘰癧，屡经治疗未愈。1963年春，右
耳下肿大如鸡蛋，疼痛颇剧，妨碍饮食，

赴某医院检查，诊断为“全身多发性淋巴结核”，建议抗结核治疗，历经半载，病情依然。某日在医院候诊，一病友主动介绍此方，云系祖传，用治多人，均三次即愈。李某试之，三服后症果大减，疼痛消失，饮食亦增。次年，如期再服，即告痊愈。

说明 癞蛤蟆，本名蟾蜍，系毒品，切切不可过量。

十一

处方 大戟 芫花 甘遂 白芥子 山慈姑

龟版(炙酥) 七叶一枝花 穿石 阳各等份

制法 共研细末过筛，调凡士林或依比膏和匀备用。

用法 加醋或葱汤调外敷。每日或间日换药1次。上方加樟脑少许，疗效更佳；上方去白芥子加甘草可治阴疽和无名肿毒坚硬如石者。

禁忌 痈疽疮毒、结核瘰癧已溃；疔疮红肿

灼热；皮肤有过敏反应者。

十二

处方

内服方：

(1) 山豆根30克 夏枯草15克 凤凰衣3个
薄荷6克

(2) 扁豆120克 湘曲60克 芡实 苡米
莲肉各30克 黄豆270克

外用方：生地 当归尾 赤芍各60克 香白
芷120克 冰片1.8克 麝香4克 黄丹180克
朱砂适量 黄蜡 白蜡各120克 活鲫鱼
一条(约120克) 猪油 麻油各250克

制法

内服(2)方：先将黄豆、扁豆炒半熟，和其他药共研细末。

外用方：将猪油、麻油放锅内熬开，放入鲫鱼，炸至枯焦捞出；将黄蜡和白蜡放油内熔化后，将生地、归尾、白芷、赤芍研

极细末倾入搅动，然后放黄丹搅匀，把锅端离火，至温热时放入冰片、麝香、朱砂拌匀成膏。

用法 先内服（1）方，每日1剂，水煎，连服3剂。接服内服（2）方，服时将药末入饭米粉子（即饭焙黄后研成粉子）适量，米汤调和煮熟服之，每次30克、每日早晚各1次。在此同时，以香墨、冰片加入白酒适量捣浓制成针剂，以梅花针蘸针剂刺患处0.3厘米深，针后将膏药敷贴患处，每隔3天换药1次。敷膏药时须注意：淋巴结未穿孔者，在膏药内先撒樟脑1克、白胡椒（五粒）之粉末，再敷上膏药；淋巴结红肿者，只蘸上樟脑后敷上膏药；淋巴结穿孔者，用芫花根白皮放尿内浸5~7天，取出去粗皮做成引线，蘸冰片粉末，深插孔内，外留0.3厘米长（以便更换时取出），再贴上膏药。引线3天换1次。

疗效 经用本方治疗21例，近期、远期疗效

均好。如聂××，男，2岁。颈部、腋窝、腹股沟等处均可触及淋巴结，颈部有20多个已经红肿，大者如鸡蛋。伴头痛、发热、神志不清。用上述方法治疗两个月后，症状全部消失，至今七年无异常变化。

疔 疮

处方

内服方：乳香 没药（均用陈土炒存性） 四方麻 生地 熟地 花粉 炙黄芪 生黄芪 连翘 鱼腥草 虎耳草 白蜡 黄蜡各30克 人中黄12克 朱砂15克 母丁香3克 蜂蜜250克

外用方：麝香0.3克 冰片 母丁香各3克 扫粉 海浮石 水龙骨 象皮 文蛤各6克

制法

内服方：上药除黄、白蜡熔化，朱砂、丁

香另研外，其他药物共研细末过筛，加入黄白蜡，炼蜜为丸，如黄豆大，再以朱砂、丁香粉末为衣，晒干备用。

外用方：上药共研极细粉末，瓷瓶收贮。

用法 内服药每日2次，每次3~5丸，或7~9丸，搗碎，生甘草30~60克煎水泡服。同时将少许外用药用涂患处（初期可先用五虎白降丹点在疔头上）。

说明 本方系家传，内服药可使毒自内消，外涂可使毒不扩散，内外配合，其效颇佳。

二

处方 积雪草 紫花地丁 木芙蓉花 桃叶
各10克

用法 上药均用鲜品捣烂外敷1~2天。

说明 本方适用于疔疮初起未溃者。

痈 疔

处方

- (1) 苍耳虫
- (2) 山苦瓜虫

制法

- (1) 秋季采捉苍耳虫后，即用麻油浸泡贮存，浸泡愈久，疗效愈好。
- (2) 秋末挖取山苦瓜根块，剥出虫后，泡于食醋中备用。

用法 患处清洁消毒后，取苍耳虫或山苦瓜虫一条敷于疮口和疮口周围，再涂抹浸泡液，用凡士林纱布敷盖，固定包扎。每日换药1次，好转后隔日1次。

疗效 共治36例，均未用抗生素。苍耳虫治疗15例，疼痛消失快，一般换药2~3次即愈。山苦瓜虫治疗21例，疗效较明显，若

加天南星、山苦瓜粉拌入外敷，效果更好。

二

处方 马鞭草 田皂角各1莧 片糖适量

用法 前二味各煎数沸，去渣，混合，加片糖。以此代茶，日服2~3次。

禁忌 脾胃虚弱者勿服。

三

处方 活癞蛤蟆1只 雄黄适量

制法 将雄黄灌入蛤蟆腹内，以腹满为度，再以绳捆扎如圆墨形，悬屋檐下阴干。

用法 用麻油磨蛤蟆取浓汁搽敷，日数次。

说明 本方适用于疔子或无名肿毒未穿溃者。一般2~3天即愈。

乳 痛

一

处方 矮地茶 金银花 蒲公英各30克 红花9克

用法 水煎服。每日1剂，每剂煎2次。

疗效 杨××，产后7天左侧乳房红肿疼痛，硬块约6×7cm，触痛，体温39.5℃，服上方一剂，体温降至37.5℃，肿块变软，疼痛减轻，二剂后红肿消散，体温正常，共用四剂痊愈。

说明 本方用于急性乳腺炎。

二

处方 木芙蓉 紫花地丁 酢酱草 田边菊 野菊花各适量

用法 木芙蓉(夏秋采花叶，冬春采根皮)，余诸药均采鲜品，洗净，捣烂。先用浓茶

或淡盐开水洗患部，将药敷上，保持湿润。日一换。

说明 本方对乳腺炎有显效，亦可治腮腺炎、指疔、痈肿、疮疖和一切化脓性皮肤病。

三

处方 公丁 细辛各60克 蜂房120克 百草霜60克

制法 先把蜂房切碎焙黄研细末，再把其余三味研细末，混合后瓶贮备用。

用法 撒药末1.5克~3克于万应膏上，贴患处，可自消散。

说明 本方用于乳痛初起，坚硬肿痛而不红者。

四

处方 生半夏 天南星各10克 葱白3克(以上三药以新鲜者为佳)

制法 上药洗净，混合后捣烂如泥，用纱布

包好。

用法 放鼻孔下嗅15分钟，每日5~8次。一般2~4天可愈。

急性阑尾炎

(包括阑尾周围脓肿)

—

处方 鲜白骨树根15克 鲜蛇莓60~120克

用法 每天1~2剂，水煎，分2次服。阑尾脓肿者加皂角刺9克；合并局限性或弥漫性腹膜炎者加隔山香30克、摇竹消15克、广香、桃仁、赤芍各9克；病情严重者配合鲜铁扁担根15克磨水成浆顿服，或用甘遂末1克水冲服。

疗效 治疗50例，治愈38例，好转8例，无效4例。

二

处方

外敷方：生大蒜(去皮)120克 芒硝30克 熟
大黄粉适量

内服方：白花蛇舌草 田基黄各30克 黄芩
大黄各15克 岗梅9克

用法 外敷配合内服。

外敷：前二味共捣烂，外敷腹部患处，两
小时后去掉，以熟大黄粉加酱油调成糊
状，外敷6~12小时。

内服：水煎，每日1剂，分2次服。阑尾
穿孔或阑尾脓肿者加冬瓜子或苡仁；恶
心呕吐者加竹茹、柿蒂。

疗效 治疗阑尾炎40例，痊愈29例，占
72.5%；好转8例，占20%；无效3例，
占7.5%。

说明 外敷法适用于单纯性阑尾炎、化脓性
阑尾炎全身情况较好者。外敷的部位以病

变部位为中心，稍超过压痛的范围，厚度不低于1厘米。外敷药不能直接接触皮肤，必须垫2~4层凡士林纱布保护。

三

处方 红藤 地丁各30克 金银花 连翘各12克
乳香 没药各9克 玄胡6克 大黄5克 甘草6克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

疗效 潘××，男。右下腹疼痛，痛侧腹肌强直，阑尾点压痛明显。有反跳痛，恶寒发热，白细胞增高，诊断为急性阑尾炎。服上方后，当天病情好转，服第二剂即症状全部消失，白细胞转为正常。

四

处方 败酱草 蒲公英各30克 苡仁15克 秦皮 连翘 大黄 皂角刺各9克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

疗效 对阑尾周围脓肿有显著疗效，一般在服药3~4剂后症状好转，体温、白细胞下降，肿块缩小。

肠 梗 阻

处方

(1) 铁扁担30克

(2) 甘遂末1克 芒硝 大黄各9克

用法

(1) 磨成糊状，开水冲服。

(2) 大黄煎水，冲服甘遂、芒硝。

服药后2~3小时，用第二次煎药 水 或温盐水灌肠，以诱导排便。蛔虫性肠梗阻，先用哌嗪驱虫，过12~24小时再服上药。

疗效 治疗72例，攻下成功者54例，占75%，中途改行手术者18例，占25%。

泌尿道感染

处方 鱼腥草 矮地茶 海金沙 车前草

(子)各30克

用法 水煎。每日1剂。

疗效 治疗12例，痊愈6例，好转6例。

说明 本方对急性泌尿道感染效果较好。

胆 石 症

—

(利胆排石汤2号)

处方

蛇莓60克 柴胡 隔山香 十大功劳 茵

陈蒿各30克 大黄15克(后下)

用法 入院后，口服利胆排石汤2号，每天1~2剂，服药2小时后，用电针刺鸠尾、胆俞（或阳陵泉）30分钟。然后口服50%

硫酸镁，15分钟后肌肉注射“654-2”（脉搏过快者可不使用）。以上用法简称“总攻”。第一个24小时内可“总攻”2~3次，以后根据情况每1~2天“总攻”1次。“总攻”前必须纠正水电解质及酸碱平衡紊乱。

疗效 治疗50例，临床症状缓解、体温及白细胞恢复正常者30例，有效率为60%；胆道排出结石者15例，排石率为30%；因各种原因改行手术者20例，占40%。

二

处方 白花蛇舌草 茵陈 金钱草各30克

用法 水煎。分2次服。本方可按中医辨证加减，部分症状严重者可结合输液、抗菌药物及对症治疗。

疗效 治疗10例，有效9例，主要症状缓解时间为2.2天。如黄××，女，35岁，发病两天入院，诊断为胆石症、胆囊炎。体温39℃，腹痛(+++)，黄疸指数15单位，

白细胞 12,300 /立方毫米，用方 2 天后腹痛消失，体温正常，黄疸指数 4 单位，白细胞 9,300/立方毫米，住院 5 天，症状消失出院。

三

处方 翠云草 虎杖 蒲公英 黄芩 黄柏
广香 枳壳 茵陈 凤尾草 柴胡各 500 克
大黄 郁金各 250 克 赭石 150 克

制法 上药共煮 3 次，约为 15,000 毫升，再浓缩成 8,000 毫升，以瓶分装高压消毒后备用。

用法 每次服 20～30 毫升，每日 3 次。

四

处方 郁金 6 克 白矾 5 克 火硝 1.8 克 滑石 9 克
甘草 3 克

制法 上药共研极细末，瓷瓶贮。

用法 上药共分 3 次服，日服 1 次，温开水

送服。

疗效 1958年在门诊治疗一女性患者陈×，胁肋胀痛，右上腹绞痛，呕吐黄苦水，全身及巩膜均黄染，在××医院住院治疗效果不明显。在湖南省中医学院第二附属医院服上方配合内服甘露消毒丹加减，每日1剂，约1个月而愈（经市第一医院胆囊造影证实结石消失）。

禁忌 有肺结核者勿用。

血栓闭塞性脉管炎

处方

内服方：

(1) 金银花 玄参 苡仁各30克 当归25克
牛膝 红花各9克 甘草12克

(2) 千斤拔1公斤 白酒10公斤

外用方：

木芙蓉叶 野菊花 白蔹 马鞭草 牛

莠子(全草)各30克 紫花地丁18克 当归
白芷 知母各15克 地榆25克 黄柏15克
儿茶 龙骨 青黛各12克 乳香 没药各
18克 血竭15克 扫粉9克 红粉3克 铅粉
黄蜡各30克 白蜡45克

制法

外用方：用麻油 1 公斤浸泡前11味，5 天后，用火熬至药枯，去渣，滴水成珠，下黄、白蜡，待油成凝固状，再将儿茶、龙骨、乳香、没药、血竭、青黛、扫粉、红粉、铅粉等药研成粉末，下入搅匀，即成药膏。

用法 内服配合外用。

内服：(1)、(2)两方同时服用。(1)方水煎，每天 1 剂，分 2 次服；(2)方浸泡1 周后每日 3 次，每次15~20毫升。

外用：纱布棉垫涂药膏敷之。一般每天换药 1 次，脓液过多者，每天换药 2 次。

皮肤慢性溃疡

一

处方 枯矾 乌贼骨 冰片 地锦 夜关门

木芙蓉叶 各适量

制法 将枯矾 乌贼骨 冰片研极细末，地锦、夜关门、木芙蓉叶三味中任选一味晒干研末和上三味研匀，瓶装密封。

用法 用淡盐水或明矾水清洁创面后，再用药末适量撒敷。夏天每日换药1次，冬天间隔2~3天换药1次。外用消毒纱布包扎。如果创面红肿疼痛，则先用木芙蓉花叶或鲜犁头草捣烂涂敷，拔除脓毒，再敷药末。

疗效 一患者右小腿溃烂20多年，经上方治疗3个月痊愈。

二

处方 龙骨 寒水石(煨)各3克 炉甘石 玉

竹各4.5克 象皮6克 冰片0.3克 蛇蜕 白
蜡各1.5克

用法 共研细末，干撒新肉上，外包以纱布，
日换1次。

疗效 本方用于手术后伤面溃疡，久不愈合，
一般撒3次即生效，屡试不爽。

三

处方 蛇皮 麻油

制法 蛇皮用火焙干，研成细粉末后用小麻
油调成糊状备用。

用法 创面消毒后，敷药，纱布覆盖，1~2
天换药1次。

疗效 用上方治疗褥疮、放射性烧伤和汽油
烧伤引起的皮肤慢性溃疡3例，均取得满意
的效果。如周××，女，23岁，初期鼻咽
癌患者。在行深部X线照射时，致面颊及颈
部放射性烧伤，芦荟液治疗1周无效，疮面
流黄水，疼痛剧烈，经用上方14天，创面

愈合。

荨 麻 疹

一

处方 赭石15克 青壳鸭蛋2个 冰糖30克
用法 水煎。日服1次，以3~5次为1疗程。
禁忌 虾、蟹

二

处方 玉兰花1朵 鸡蛋2个
用法 将鲜玉兰花切碎，与鸡蛋混合，用茶油煎食。

三

处方 桂枝8克 白芍6克 麻黄6克 苦杏仁6克 甘草5克 生姜3片 大枣3枚
用法 水煎。每日1剂，分3次服。
说明 此方乃《伤寒论》桂枝麻黄各半汤，用

治荨麻疹，疗效可靠。

湿 疹

一

处方 滑石 虎杖各12克 石膏(煅)9克 炉甘石(煅)6克 冰片3克 氯霉素1克 强的松25毫克 凡士林30~40克

制法 研极细末，和凡士林配成软膏。

用法 每日涂1次。

二

处方 百草霜50克

用法 以沸水泡药，澄清，用鹅毛蘸百草霜水涂洗，每日3次。

三

处方 松香6克 铅粉3克 冰片1克

用法 研细末，用桐油调擦。

说明 本方屡试屡验，取效甚捷。

冻 疮

一

处方 生地 地榆 紫草 归尾 黄柏各150克
甘草90克 冰片 黄蜡 白蜡各60克 麻油
2.5公斤

制法 将麻油熬开，前六味倒入油内熬焦，
用纱布滤去药渣，放入黄蜡、白蜡搅溶，
稍凉后再放冰片搅匀，放瓷罐内备用。

用法 外涂患处，每日2次。

说明 一般只需用3~4次即可愈。本药膏对
烫伤亦有较好效果。

二

处方 大戟 芫花各12克 甘草8克

用法 水煎，乘热洗患处。洗过后用生姜频
擦，每日2次。

说明 本方适应于冻疮未溃期。

三

处方 蜂蜜50克 生猪油 100克

制法 二味调和拌匀。

用法 外涂患处，每日数次。

说明 本方适应于冻疮溃烂期。亦可用黄柏20克、白及7克 共研细末，麻油调涂患处。

四

处方 猪脚指甲 120克 桐油 1公斤 广丹 120克

白及120克(研细) 松香 1公斤 樟脑少许

制法 先将桐油煮沸，放猪脚指甲煎枯，取出研细，入松香熬至滴水成珠，再入猪脚指甲细末、白及末调匀，入广丹、樟脑即成。

用法 用时烤熔滴入皲裂内。每日2次。

漆 疮

—

处方 贯众 白前各60克 桑枝 黄柏各15克

用法 水煎服，每日1剂。药渣加水再煎洗浴。

说明 本方为宁乡县城关镇医院刘晓明祖传秘方。湖南省中医药研究所詹永康医师用此方治疗120多例，一般2剂痊愈，个别患者服至5剂痊愈。

神经性皮炎

—

处方 斑蝥150克 通草150克 硼砂300克

制法 将斑蝥用95%酒精1000毫升浸泡3天左右；将通草和硼砂加水约3000毫升煎至2000毫升。两种液体按1:1和2:1配制即成。

用法 根据患部皮肤角化的程度，选择不同比例的药水外洗，每日3次。

疗效 治疗23例，21例痊愈，2例有效。此外，本方对各类癣病(除头癣)、阴囊湿疹均有显效。如龚××，男，55岁。两下肢及胸窝部患神经性皮炎达8年之久，奇痒难忍，多方医治无效。经用浓度为2:1的本方及单纯性斑蝥浸液外搽，5天后复诊时患处已愈60%，奇痒显著减轻，再用本方2次即愈，至今未复发。

二

处方 密陀僧 乌贼骨 雄黄各1份 枯矾半份

制法 共研极细末，用凡士林调成60%的软膏，装瓶备用。

用法 先用温开水洗净患处，将少许药膏搓揉患处，再在患处涂一层药膏。

说明 此药膏治神经性皮炎有显效。亦可治铜钱癣。

稻农皮炎

【预防用药】

一

处方 凡士林 500克 松香 雄黄粉各90克
樟脑60克

制法 将凡士林加温熔化，入松香粉末不断搅匀，待松香完全熔化后，离火降温至40～50℃，再投入雄黄、樟脑充分搅拌，在冷凝中，温度越降，搅拌越勤，以雄黄、樟脑不沉淀为止。

用法 下水田前，涂手脚，上、下午各1次。

疗效 把20人平均分成擦药和不擦药（即对照组）两组，结果擦药者只有1人感染，对照组10人全部感染。

二

处方 蛇不过根45克 石菖蒲根30克

用法 煎水洗手足。

三

处方 韭菜汁 桐油

用法 任选一药，下水前搽手脚。

【治疗用药】

一

处方 石膏2份 硫磺1份 明矾4份 聋桐树叶1份

制法 分别研细末，混合瓶装备用。

用法 每晚睡前洗净患处，撒上药末，轻轻揉擦，使之粘合。

疗效 治疗160例，大多数只用药1~2次，局部渗液减少，肿胀消退，结痂而愈。少数

用药3~4次而愈，效果满意。如杨××，男，40岁。双手指、足趾间糜烂、渗液、肿胀已7天，当晚用本药涂1次，次晨肿消，结痂，又治1次而痊愈。

二

处方 苦楝根皮 九里光各2500克 旱烟杆

250克 号筒杆(全草)5000克 大柳树叶枝2500克

制法 上药加水50公斤，煎至10公斤，过滤备用。

用法 擦患处。

三

处方 盐肤木 蛇床子各30克

用法 煎水洗。每日2次。

四

处方 明矾 茶叶各60~90克

用法 煎水洗。每日2次。

五

处方 浮萍 地肤子 苍耳子各60克

用法 煎水洗。每日2次。

牛 皮 癬

一

处方

内服方：生首乌30克 土茯苓15克 蓖麻

蝉蜕 僵虫 苦参 甘草 桃仁各9克

乌梢蛇15克

外用方（皮新6号药水）：紫草 石榴皮

喜树子 菝葜 补骨脂 羊蹄 苦参 各250克

用法 内服外搽配合。

内服方：水煎服，每日1剂。

外用方：上药混合，用95%酒精2500毫升
浸泡10天后外擦患处。

说明 控制牛皮癣有一定疗效。

二

处方

内服方：花椒（根、叶）120克 包金七层
楼（多头苦苣菜）120克

外用方：蜈蚣（烧灰） 明矾各9克 黑砂
白芷 寒水石各6克 花椒 黄柏 冰片
各3克 樟脑15克

用法 内服、外洗、外擦同用。

内服方：水煎，第一次内服，第二次外洗。
两天一剂。

外用方：白芷、花椒、黄柏焙枯与其他药
共研细末，麻油调匀，擦患处。

禁忌 酸腥、发物。

三

处方 生巴豆（去壳）30克 雄黄15克

用法 共研成半糊状擦患处，擦后可起小疱，
待小疱萎退后，第二次擦痒处，一般2次可

愈。

禁忌 忌涂于正常皮肤上。

皮 肤 癌

处方 (五虎丹)

水银 白矾 牙硝各180克 青矾 食盐
各90克

制法 上药在乳钵内共研至不见水银珠为度，放入炼铜砂罐内加温，蒸发水分，使成“丹胎”。然后将砂罐倒置于一瓷碗内，盐水石膏封口，盛放入荷叶水缸口上，缸内盛水约10公斤，罐上放炭火约2小时，瓷碗冷却后取丹，以白色结晶为佳。

用法

- (1) 糊剂：将五虎丹结晶研成粉末，用浆糊调，视癌大小粘涂，一次粘涂面积不宜过大，应分次进行。
- (2) 钉剂：将五虎丹结晶粉末，加入少量

蟾酥、红娘、斑蝥，用米饭搓成钉状，阴干备用（无红娘时，只用斑蝥亦可。每根钉直径约2~3毫米，长约2~3厘米，视肿瘤大小一次嵌入1~6根。隆突较高的肿瘤可插其基根部，致使大块坏死脱落。癌组织经用五虎丹腐蚀脱落，遗留之创面、改用红升丹撒之，每2天1次，直到收口为止。五虎丹、红升丹换药均应敷贴普通外科膏药，密闭创口。

疗效 治愈13例不同部位的皮肤癌（痊愈标准是：局部癌变组织全部坏死脱离，创面愈合，转移之肿大淋巴结消失，复检病理切片为阴性者）。经临床观察和追访，疗效较满意。如汪××，男，74岁。1971年3月发现阴茎龟头溃疡，并呈菜花样外翻，腹股沟淋巴肿如鸡蛋大。同年5月收入湖南中医学院第二附属医院治疗，病理切片送检，报告为“阴茎鳞癌III级”。先后外用五虎丹2次，肿块完全坏死脱落，又改用红升丹生

肌收口，配合内服菊藻丸（银花、三棱、漏芦、马蔺子、山慈姑各1500克，菊花、海藻、马钱子、七叶一枝花各1000克 首乌2000克蜈蚣500克 黄连250克，共研细末，水泛为丸如绿豆大。每次服3克，每日3次）。经治71天，痊愈出院。

狐 臭

一

处方 大蜘蛛2个 冰片2克

用法 黄泥裹蜘蛛烧熟去泥，和冰片研细末，调擦腋下。

二

处方 黄连15克 石炭酸25毫升 普鲁卡因25克

制法 取生理盐水975毫升，加上药，搅拌过滤分装，10磅高压灭菌备用。

用法 双腋窝用碘酒、酒精消毒,用7号针在腋毛区皮下组织缓慢注入上药15~20毫升(注射时要先做普鲁卡因皮试,还要注意回血,勿将药液注入血管内)。

疗效 治疗13例,均注射1次。观察一年,腋下臭味均消除。

汗 斑

处方 密陀僧 硫黄各9克 花椒5克 海螵蛸
3克 水银5克

制法 前四味共研细末,再加水银研。

用法 生姜切片,蘸药擦患处,每日3次。

疗效 何××,女,24岁,农民。近来颜面满布汗斑,黑白相间。用上方外擦,两周而愈。

毒蛇咬伤

一

处方 毛萝藦

用法

(1) 局部处理

先扩创排毒：清洗伤口，然后用三棱针或手术刀以牙痕为中心行“米”字形扩创，以利毒排出（但对五步蛇咬伤患者不用此法）；

再敷药解毒：将鲜“毛萝藦”捣烂调敷伤口周围，解除局部组织中的余毒以防感染（此法仅用于煎服法治疗的部分病例）。

(2) 具体方法

煎服法：轻、中型患者，每日煎服干毛萝藦30～50克，分2次服；重型、危重型患者，每日煎服干毛萝藦50～60克，分

2次服，待病情好转后，酌减用量。

肌注法：轻、中型患者，肌注毛萝藤注射剂2毫升×1支（含生药20克/次），每日2次；重型和危重型患者，每日肌注增至4～6次。首次剂量酌加，小儿剂量酌减。

疗效 水煎口服法治疗38例，治愈36例，占94.74%，重型、危重型最短治愈天数3天，最长27天。肌注法治疗27例，治愈27例，占100%，重型、危重型最短治愈天数7天，最长10天。如鄱县沔渡公社吴××，女，39岁，1979年9月19日下午3点在后园摘菜，被五步蛇咬伤左足内踝，当即不能行走，伤口出血，刺痛难忍，局部发黑、肿胀。次日清晨，口腔及牙龈出血不止，全身满布紫血斑，自觉头昏、心悸、胸闷、恶心，于9月21日9点入鄱县中医院。查伤口流血不止，周围皮肤明显坏死。当即煎服干毛萝藤50克，分2次口服，外用以

1:1000呋喃西林液冲洗伤口，继以鲜毛茛
摩、犁头草捣烂外敷，住院17天，痊愈出
院。

二

处方 （百步丹）

- (1) △半边莲 △地耳草 △叶下珠 △
犁头草 瓜子金 犁头角 合百草 七
叶一枝花 毛瓜 矮地茶根 一枝黄花
鹅不食草各100~200克鲜药 （本方主要用
于解蛇毒）
- (2) △积雪草 △满天星 海蚌含珠 狗
牙半枝莲 野菊花 白花蛇舌草 苦胆
草 大青叶 四方马兰 小金钱草各50~
100克（本方主要用于清热、消炎、止痛）
- (3) △矮桃草 △丁癸草 奶浆草 叫子
草 一把针 鸭跖草 水杨柳 车前草
扁蓄 水灯草 海金沙各50~100克（本方
主要用于利水、消肿）

(4) △伏地草 △乌柏叶 △盐肤木叶
△天花粉 蛇不过 土牛膝 田皂角
旱莲草各50~100克 (本方主要用于通经、
活络、消肿)

用法 以上各方因地制宜采取1~2种 (每方应有1~2味主药, 共4~8种) 鲜品即可。采取后, 用清水洗净、捣烂, 加冷开水适量, 反复捣汁, 共约500~1000毫升, 加雄黄9克, 白酒适量, 混合均匀, 将药汁分成两等份, 一份加糖适量内服, 每天1剂, 分2次服; 一份不加糖外敷伤口。敷伤口时, 按一般清洗、扩创、排毒处理后, 用纱布浸渍药汁围敷肿痛以上7~10厘米处(近心端), 松紧适宜。应保持纱布湿润, 时时将药汁浇涂纱布上。伤口任其暴露, 如伤口闭合, 应用三棱针或小刀片作“-”或“×”形开口, 以利排毒, 但开口又不宜过深, 以免伤及血管, 出血不止。

此外, 还应根据不同情况, 加用药物:

如出现头昏、视力模糊、瞳孔缩小等神经中毒症状者，加蜈蚣3条、白芷15克，共研细末或煎汁兑入；

如伤口出血不止，全身出现瘀斑，甚至口鼻出血者，加白茅根、侧柏叶、仙鹤草，或旱莲草鲜品捣烂取汁兑入；

如出现顽固性肿胀者，用石菖蒲、盐肤木各60克。青木香、乌柏根皮各30克，共捣烂取汁兑入，并可乘热熏洗肿处；

如长期溃烂不收口者，用九里光、蛇不过各等量煎水，每天洗1次伤口，并用纱布浸药汁湿敷。待长新肉芽时，用红升丹、轻粉各1克、青黛4.5克、鸡内金6克、飞甘石15克、熟石膏15克，共研细末撒伤口上；

如高烧不退，加龙胆草、土柴胡水煎服；

如恶寒战抖者，加马鞭草、黄荆叶各30克共捣烂取汁或水煎服；

如二便不通者，加车前草、海金沙、水灯

草、生石膏、大黄各适量，水煎服；
如呕吐不止者，加姜半夏12克、灶心土60克
水煎服；

如起水泡者，用天泡草、薜荔捣汁点水泡
上，或用蛇莓30克捣汁，一半内服，一半
涂泡上；

如上肿至胸腹部，或头、胸背部被咬伤者，
应以内服为主，加重方(3)剂量，使毒
从小便出。还可将纱布浸药汁敷伤处末
端，以加速肿的消退。

疗效 鄞县中村地区医院共治93例，痊愈93
例。无一例死亡。

说明 处方中凡标△者，是在治疗过程中使
用机会最多、最常用的药。

三

处方 白醋300毫升 五灵脂15克 雄黄7.5克
白酒60毫升

用法 白醋内服，五灵脂、雄黄和白酒冲服，

然后用雄黄外敷伤口周围。

说明 本方具有防止蛇毒扩散和蛇毒攻心的作用。

四

处方 九斤花 九斤角 水菖蒲 土细辛
八角莲 岩丸子 血蜈蚣 雄黄连 七叶
一枝花 青木香各9克 四两麻3克

用法 晒干研末。每次一汤匙加烟油（即烟斗水）调服；亦可用醋调药末外敷。

说明 本方治各种毒蛇咬伤。

五

处方 山苦瓜 九龙胆 七叶一枝花 黄疸
草 半边莲 青木香 蛇不过 隔山消
各等份

用法 各药均取鲜品捣烂外敷。

说明 本方治各种毒蛇咬伤。

六

处方 山苦瓜(王瓜) 童便

制法 把山苦瓜先放童便内浸泡七昼夜，再放瓦屋上露七昼夜，备用。

用法 嚼烂敷伤处。

说明 此方治好毒蛇咬伤300多例，各地均反映效果良好，似为治毒蛇咬伤的首选方。

七

处方 金银花叶 蛇莓 母野烟叶 各适量

用法 上药取鲜品，加少许凉水捣烂取汁。

从近心端向伤口处抹，每日5次。如出现肿大难消者，先用瓦针刺伤出血；如出现全身症状者，则内服药汁半碗，同时外抹。

疗效 某草医治疗1000多例，无一例失败。

八

处方

内服方：九牛子 三叶拿 竹叶姜(山姜)

各9克 山豆根30克

外用方：南蛇吐剑(虎掌) 雄黄

用法 内服与外用配合。

内服方：诸药研末水煎兑酒服。每日3次，
每次6克。

外用方：捣烂敷伤口。

九

处方 七叶一枝花 七叶黄荆(牡荆)

用法 二药各取鲜品适量捣烂外敷，亦可单
用七叶一枝花9克点米泔水磨浓汁内服。

十

处方 半边莲30克

用法 口嚼外敷，亦可用水煎内服。

说明 民谣：“家有半边莲，可以伴蛇眠”，说明本药治蛇咬伤是有一定的实践基础。

十一

处方 一枝箭(杏香兔耳风)_{15克} 七叶一枝
花_{15克}

用法 水煎内服，亦可嚼敷伤口。

十二

处方 帽子苞(蔷薇莓) 路边荆各适量

用法 上药捣烂用二道淘米水浸，浸汁少许内服，然后用浸汁由上向下擦伤肢，最后以药渣敷之。

说明 本方对各种毒蛇咬伤均有效，反复用3、4次即愈。

十三

处方 雄黄_{适量} 大蒜三株

用法 捣烂内服。

说明 本方适用于蛇毒攻心者。

十四

处方 鸭跖草60克

用法 鲜草揉水兑白糖适量内服。

说明 本方适用于蛇咬伤吐血者。

十五

处方 鹅不食草60克

用法 捣汁，撬开牙齿灌服。

说明 本方适用于蛇毒封喉，不能进食者。

十六

处方 细叶金鸡尾(乌韭) 小血藤(南五味子)叶 岗梅 金樱子叶各30克

用法 上药均用鲜品捣烂敷患处。

说明 本方适用于蛇咬伤后伤口感染者。

狂犬咬伤

处方

内服方

(1) 鲜紫竹根120克 生地榆 飞滑石

党参各15克 射干 生地 银花各12克

鲜白茅根60克 甘草 柴胡 赤芍

酒大黄 杏仁各9克 琥珀1.5克 斑蝥

3个（虫蛀者不用，去头足翅，糯米两调羹同炒至米黄为度，去米）

(2) 鲜万年青叶30克

(3) 大黄9克 活土鳖8个 桃仁6克

杏仁4.5克

外用方 犁头草 半边莲 金疮小草 车

前草 土牛膝叶 木芙蓉叶 天葵草

（全草）各适量

用法

内服方

方(1)：水煎，分6次服，两天1剂，连服3～8剂。

方(2)：水煎，分2次服，每日1剂，连服4剂；也可以同方(1)交替使用。

方(3)：诸药一同捣烂，加入清水100毫升，用瓦罐煎至60毫升后，用洁净纱布过滤，取汁。将上药煎好过滤的药汁调入适量蜂蜜顿服。服后，大便中如未泻出污秽物，再服1～2剂，至泻出污秽物为止。

外用方 诸药均用鲜者捣烂。先用浓茶水或甘草煎水冲洗伤口再敷药，每日换1次。外敷药中，加入鲜八角枫叶、吴茱萸叶同捣烂，以防止破伤风。

疗效 治疗14例，其中经外用方治疗者9例；内服方者5例，均控制了发病。

蜈蚣咬伤

一

处方 鲜红辣蓼草1把

用法 洗净，捣烂涂敷伤口，并用该药从咬伤部位上方向伤口处搓揉。

疗效 经用此方治疗20余例均获显效。

二

处方 癞蛤蟆1个

用法 腹部剖开，不要破胆，敷患处。

(四) 妇 科 疾 病

血 崩

一

处方 蚕沙

用法 炒炭存性，每次用9克，以适量黄酒兑服。

疗效 一妇人40岁，经闭四月，腹隐痛，服桃红四物汤后下大块黑血甚多，十余日不止，以胶艾四物汤加蒲黄炭服3剂仍无效。翻阅《验方新编》，有蚕沙炭止血崩的介绍，乃处上方嘱服，3次即止。

禁忌 生冷

二

处方 陈棕皮 头发

用法 二味适量，烧灰兑酒服。

三

处方 百草霜30克 乌贼骨60克 鸡蛋2个

用法 鸡蛋搅碎，加入百草霜同煮，去药渣，再入乌贼骨研细末兑服。

四

处方 百草霜9克 陈精制墨(磨浓汁)1酒杯 海
螵蛸(炒黄)9克 当归9克 生地30克 贯众
炭15克

用法 水煎调红砂糖服一茶盅，每日3次。

白 带

一

处方 当归 川芎 柴胡 杜仲 广皮 鸡

血藤各9克 木通 菊花 五加皮各12克

通草3克 肉桂1.5克 甘草6克 生姜3片

用法 水煎服，每日1剂。赤白带下加 鸡冠花 蒙花 木槿花。

说明 本方在慈利县江垭区一带民间流传已近百年，对赤白带下、腰痛者疗效显著。

二

处方 蛇床子90克 五味子 雄黄各60克 海螵蛸 枯矾各30克

用法 共研细末，每次用3克，用消毒纱布分裹成小它，塞入阴道，3天更换1次，连用2、3次即愈。外用艾叶煎水，每晚洗1次，连洗7晚。

葡萄胎

处方 五灵脂12克 生蒲黄9克 水蛭2条 蜈蚣1条 党参24克 白术9克 茯苓9克 甘草6克 当归15克 川芎6克 白芍12克 熟

地_{12克}

用法 水煎，分2次服。气血虚甚者，先以归脾汤健心脾，待气血充足时再攻；瘀积过甚者，先以桃红四物汤合失笑散化瘀。一般服上方3~5剂后，即可排出囊状葡萄物，而后继服归脾汤加熟地_{15克}、枸杞_{9克}调理善后。

疗效 治疗5例，均获痊愈。随访四例，均身体健康。

胎 动 不 安

—

处方 陈南瓜蒂_{3个} 鲜苧麻根_{90克} 陈紫苏
莩_{15克} 陈艾叶_{10克} 鸡蛋_{3个}

用法 将南瓜蒂（亦可用陈莲蓬蒂）切片炒香，和其他药物连同鸡蛋一起水煮，去药渣取汁约450毫升，每日1剂，分3次服，蛋同食，连服2~3剂。不发热、不烦渴、

常呕吐清水者，加伏龙肝60克；胃热呕吐者加竹茹9克。

二

处方 炙黄芪12克 党参 炒白术 熟地 续断各9克 白芍6克 川芎 砂仁 黄芩各3克 甘草5克 糯米1勺

用法 水煎。每日1剂，分3次服，连服3～5天。

说明 本方既治胎动不安，亦治习惯性流产，屡用皆效。

脱 脐

一

处方 矮地茶 白及 枯矾各等份

制法 研细末，混匀，高压消毒备用。

用法 婴儿出生6小时后，将脐带平脐轮剪断，敷上药粉。

疗效 使用1045例，无一例发生出血、感染或其他并发症。

二

处方 枯矾 槐花各等份

制法 共研细末，瓶装加盖，高压消毒（15磅保持15分钟）后备用。

用法 新生儿出生后，用止血钳紧靠脐轮处压挫脐带3～5分钟，然后于压挫处剪断，并剪除全部白色胶质，用5%碘酒消毒，撒上断脐粉末，覆盖无菌纱布加压包扎。观察1小时，如有渗血者，再加适量药粉；如脐带残留过长，再将脐轮重剪，撒药包扎。

疗效 共用125例，无1例出血，脐轮回缩良好，残端干燥，没有感染，操作简便，不需换药，能提前出院。

说明 对有出血素质产妇之新生儿和脐带太粗者忌用；对高血压产妇之新生儿及严重

窒息的新生儿慎用。

子宫颈糜烂

处方 黄柏 地榆 儿茶 白芷 甘草 冰片 各等份

制法 上药烘干共研成粉末，经高压消毒后瓶装备用。

用法 每日用新洁尔灭冲洗阴道后上药1次，将药粉喷布于宫口，或用棉球沾药粉后塞入宫颈口，每日换药1次。

疗效 治疗3例重度宫颈糜烂者，整个宫颈无正常粘膜组织，触及出血，白带多，经25~35天，治疗均获痊愈。

滴虫性阴道炎

—

（苦虎灭滴膏）

处方 苦楝子粉100克 虎杖粉100克 虎杖浓

缩液500毫升 桐油300毫升

制法 苦楝子去核、烘干、研粉过筛；虎杖根洗净、切碎、烘干、研粉过筛；再取鲜虎杖根5公斤，切碎，加水煎熬3次，直至虎杖煎烂为止，3次煎液混合，再煎熬浓缩至500毫升。将苦楝子粉和虎杖粉加入虎杖浓缩液中调匀，再加桐油300毫升，调成糊状即成。

用法 用消毒干棉球抹净阴道内白带，再用棉球蘸虎杖根浓缩液反复涂抹阴道壁、穹窿及外阴后，以长棉签蘸浓缩液涂宫颈管。然后取苦虎灭滴膏约20毫升，放入阴道内，最后在阴道内放置一带线尾的阴道塞以防灭滴膏流出。2天后患者可自行拔掉，7~10天后复查。病程长、久治不愈者，每4~5天上药1次，连续2~3次。每次月经干净后需复查1次，连续复查3个月。复查后上药1次，以求根治。

疗效 朱××，36岁。患滴虫性阴道炎18年，

曾使用灭滴刚等常规疗法未获好转。白带多，腥臭，镜检发现滴虫。即在阴道内上苦虎灭滴膏1次，复查滴虫阴性，又先后上药2次，以巩固疗效。

二

（双百灭滴净）

处方 百部500克 95%农用敌百虫10克（或
畜用敌百虫20片）

制法 将百部加水2500毫升煎熬，去渣过滤后得药液1000毫升，冷却后加入敌百虫，再加酒精50毫升防腐，摇匀后密封保存备用。

用法 首次上药时，将50厘米长、7厘米宽的消毒纱布条浸透药液，填满阴道，保留一夜。另将重1.5克的带线消毒纱球4个装入自备瓶内，倒入药液浸透纱球，嘱患者每晚睡前坐浴后，自塞一个纱球于阴道后穹窿部，线头留在外面，以便次日取出，

连续 5 天为 1 疗程。

疗效 观察100例，均只1~3个疗程痊愈。

三

处方 鸦胆子20粒

制法 将药放入100毫升水中，用砂罐煎成约20毫升备用。

用法 每次取20毫升，用注射器套上导尿管注入阴道内，每日1次。

疗效 治疗6例，经2~3次用药即愈，随访一年多未见复发。

四

处方 九里光

制法 将九里光全草洗净切碎，煮沸2次，再将这2次液体用文火浓缩成1:1(即500克药最后煮成500毫升药液)。

用法 以清水洗净阴道后，用带线尾的棉花纱布塞蘸药放入阴道内，24小时后自行取

出。滴虫多者还可先用棉签或棉花涂药，抹洗阴道壁，再放纱布塞。5次为1疗程，隔日1次，月经期暂停治疗。

疗效 治疗120例，痊愈99例，占82.5%；好转15例，占12.5%；复发6例，占5%。有效率为95%。

五

处方 蛇床子60克 雄黄9克 枯矾3克

用法 水煎，洗外阴部，每日1~2次。

六

处方 猪肝

用法 将猪肝蒸熟，削成条状，在一端钻数孔，另一端用线扎好。晚上将钻孔的一端先塞入阴道，白天取出。

说明 阴道内滴虫为猪肝香味所诱而钻附猪肝孔中，白天掉出，即可将滴虫逐步消灭，数次可愈。

七

处方 雄黄1.5克 桃仁30克

用法 捣烂和匀做条，塞入阴道。

(五) 儿 科 疾 病

惊 厥

—

(熄风止惊汤)

处方 当归15克 白芍6克 全蝎1.5克 蝉
衣1.5克 钩藤4克 熟地6克 川芎3克 蜈
蚣1条 菊花6克 甘草3克

用法 水煎服，每日1剂。临床症状消失后，
再服2~3剂以巩固疗效。

说明 经临床30例初步观察，本方对婴儿手
足搐搦症、高烧惊厥及癇病惊厥均有较好的
疗效。

二

处方 地龙7条 生姜4.5克 鲜葛根30克

用法 活地龙洗净，与其他二味一起捶烂，用开水泡汁，纱布过滤，服药汁。

疗效 李××，5岁，发热40℃，抽搐，角弓反张，气促，下肢厥冷，眼不开，咬齿有声，医治无效。用本方2剂后痊愈。

小 儿 肺 炎

处方 癞蛤蟆2只

用法 上药洗净置桶内，用冷水浸8分钟。

先取一只抹干，将癞蛤蟆肚皮覆盖于患儿剑突下(心窝部)，使其头朝上，用手扶住或纱布固定约15分钟后，癞蛤蟆周身灼热时取下放置桶内，另换一只如前法敷于小儿剑突下。如此每隔15分钟轮换1次，连续1~2小时，重症可连敷3小时以上。

疗效 治疗40例，一般在敷后15~20分钟开始退热，肺部湿性罗音减少，敷1小时往往即可降温1~3℃，直至体温正常，肺部罗音全部消失。

百 日 咳

一

处方 白蜡树茎根4公斤 鱼腥草1公斤 白茅根1.5公斤 土冬花1公斤 甘草1.5公斤

制法 上药共洗净切碎，加水5000毫升，煎2小时，取出药液再煎一次，将两次药液合并浓缩至2000毫升，加入防腐剂备用（如无土冬花，以枇杷叶代）。

用法 1岁以内每次5毫升，5岁以上每次10毫升，15岁以上每次15~20毫升。每日3次，连服3~5天。

疗效 共治58例，治愈38例，好转15例，无效5例（其中3例并发肺炎）。

二

处方 黄豆90克 车前草30克 陈茶叶30克
冰糖30克

用法 以水1000毫升先熬前三味，熬至500毫升时，滤去渣纳入冰糖溶化。分6次服，每隔3小时1次，连服7天。

三

处方 蛭干15克

用法 加水适量蒸，连汤服之。

疗效 长沙市半湘街刘某的孙女患百日咳，曾入某传染病院，疗效不显著。出院回家后，把蛭干蒸汤服之，不久即愈。

说明 蛭干本为滋补食品，味道鲜美，小儿喜食。唯百日咳初起不宜用。

腮腺炎

一

处方 鱼腥草 犁嘴草 车前草各30~60克

用法 水煎服，每日1剂。红肿严重者，另用鱼腥草、蒲公英鲜品适量捣烂外敷，每日换药1次。

疗效 治疗135例，资料完整者45例，痊愈39例，占86.6%；好转6例，占13.4%。对有密切接触者，采用本方预防，服药后，均未发病。如李××，男，7岁。因发热，双侧腮腺肿大伴咽喉疼痛，于1971年5月16日下午就诊。查体温40℃，双侧腮腺红肿。当日下午3时、7时各服药1剂，当晚体温恢复正常，咽喉疼痛消失，续服药2天痊愈。

二

处方 马兰(全草) 山苦瓜根各等份

制法 研极细末，用凡士林配制成30～50%软膏。

用法 外敷患处，每日换药1次。

疗效 治疗116例，全部有效。平均2～3天治愈。

三

处方 黄柏 黄芩各12克 毛茛9克

用法 共研细末，调鸡蛋清涂患处。

小 儿 腹 泻

一

处方 地锦45克 青木香9克 甘草9克

用法 水煎成100毫升。小于3岁者，每次10毫升；大于3岁者，每次15毫升，每日服3次。

疗效 治疗小儿腹泻300例，有效率89.7%，尤其对急性肠炎有显著疗效。

二

处方 生姜1.5克 葛根3克 海蚌含珠2克

制法 研成粉剂。

用法 开水冲服。每日3次，连服7~10天。

疗效 舒××，男，1岁。低热腹泻已2个多月，每天10余次，经用西药无效，改服此方后体温下降，腹泻全止，恢复健康。

三

处方 陈米适量 艾绒一丸 胡椒7粒(研末) 酒药饼1个

用法 先将米放瓦罐内煮熟捣烂，再入后三味合捣成饼敷肚脐。

蚕 豆 黄

处方 当归 生地各15克 白芍9克 白茅根
仙鹤草各30克 藕节9克 大枣5枚 马尾松
针适量

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

疗效 共治30例，一般服药2~3天即治愈。

全部病例均未用输血治疗。如邓××，男，6岁。因吃生蚕豆，出现恶心、呕吐、烦躁、发热，起病3天入院。查：体温38.6℃，面色苍黄，嗜睡，皮肤、巩膜显著黄染，尿呈茶褐色，心音弱，心律齐。化验：红细胞160万/立方毫米，血色素3克。入院后服上方1剂，当天恶心、呕吐停止，继服1剂，食欲明显增加，玩耍如常。复查：红细胞251万/立方毫米，血色素6.5克，痊愈。

疳 积

一

处方 雷丸(去黑皮) 石燕(刮去生土炭火煨醋淬7次) 川椒 蒺藜(炒去节刺) 使君肉 木贼 石蟹(制法同石燕) 文蛤(炒)各30克

用法 共研细末。每次用药末3~6克加于鸡

肝（猪肝亦可）内蒸服。或用上药末与猪肝粉和匀，开水冲服。

疗效 刘××，3岁。患疳积，心烦易怒，口渴不食，面黄肌瘦，腹胀足肿，大便泄泻，臭秽异常，满眼云翳失明。指纹青紫，脉数，舌红无苔。服疳积散（即上药）一料，诸证悉已。目睛云翳消失，重见光明。

禁忌 香咸食物。

二

处方 榧子 木鳖各30克 夜明砂60克

制法 分别炒枯至黑褐色为度，然后研末过细筛，瓶装密封。

用法 以药末3克蒸不沾水的鸡肝（雄鸡较好。未阉割干净的“公鸡”及病鸡之肝不可用）一具，蒸熟服，服后不要喝茶或吃糖果。如眼起云翳或眼睑红肿不能睁开，或兼有腹胀、便秘、发热等临床症状，须配合下方煎水内服：使君子、芦荟、煅石

决、杭菊、湘曲、麦芽各9克，黄连、南木香各2.4克、厚朴、生地、夏枯草各3克、枳实、槟榔、山楂肉、炒香附、桑白皮各6克，黑山栀1.5克（此为7岁以上小孩剂量，7岁以下酌减）。

三

处方 鸽屎_{15克} 谷精草 石决明 炉甘石（火煨童便淬） 鸡内金 夜明砂 槟榔 使君肉 五谷虫（炒）各9克 胡黄连 椒目（炒）各3克

用法 共研细末，分数次放入猪肝内，蒸熟，入盐少许，连猪肝和汤食。

疗效 治愈眼疳10余例。

四

处方 疳积草（爵床）30克

用法 水煎服。每日1剂。痰热加淡竹叶；腹泻加海蚌含珠，严重者加辣蓼草；食欲不

振口渴加四方草(陌上菜)；眼生白翳者，用满天星捣烂塞鼻，日换1次，左右鼻孔交替塞药。

禁忌 用本方时忌食酸、腥、猪血。

五

处方 癩蛤蟆1个 砂仁9克(研细末)

用法 将癩蛤蟆剖开去肠杂，用酒洗净，放砂仁末于腹内扎紧，外以黄泥包好，用火煨熟，去泥焙干研末。每日服3次，每次服1.5克，开水调下。

说明 《本草纲目》卷42“蟾蜍”：“主小儿劳瘦、疳积最良。”(蟾蜍即癩蛤蟆)

六

处方 金线吊白米(粉条儿菜)15克 老君树(白薇)根30克 山蚂蝗(小槐花)根24克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

七

处方 疳积草(爵床) 苦蕒 青蒿 酒药草

夜关门 田边菊 茵陈 海蚌含珠各9克

用法 水煎。每日1剂，分3次服。脾疳加山药；心疳加土黄芩(南天竹)、土黄连(乌韭)；肝疳加谷精草、夜明砂(以蒸猪肝或鸡肝吃为主)；肺疳加金线吊白米(粉条儿菜)、白茅根、桑白皮；肾肝加女贞子、牛膝、车前草。

脱 肛

一

处方 鸡蛋1个 升麻1克

用法 将鸡蛋空端敲一小孔，插入升麻，上复以皮纸，直立于待蒸之饭上蒸熟。去蛋壳及升麻食之。每日1个。

疗效 小儿彭×，脱肛年余未愈。初起尚能

托还，日久托后亦出。家人为之四出求方，百试不效。其母一日于市上遇一老人，偶然谈及小孩脱肛之事，老人乃以此方告之，并说自己的孙子亦患脱肛以此法治愈。彭母闻之大喜，回家后如法炮制，10天脱肛减轻，未及1个月，其病告愈。迄今20余年从未复发。

二

处方 陈芋茎 猪大肠 陈壁土

用法 将陈壁土捣细，开水冲后搅和，澄清后去土煮后二味，连汤吃。

三

处方 黄连3克 五倍子9克 鳖头1个(焙)

用法 共研细末，用麻油调搽。

(六) 五官科疾病

急性扁桃体炎

一

处方 生石膏12克 十大功劳 朱砂根 岗梅 黄栀子 淡竹叶 木通 射干 甘草各9克

用法 用砂罐加水至药面，煎2次，约100毫升，分2次服。

疗效 几年来治疗小儿急性扁桃体炎1000余例，收到较好效果。其中系统观察50例，1~2天内体温恢复正常，扁桃体肿大消失者占90%以上。如李××，男，2岁。发烧、咳嗽、气促一天。检查：体温39.8℃，咽部充血，双侧扁桃体中度肿大。用青、链

霉素治疗无效，改服本方，2天痊愈。

二

处方 儿茶 白芷各2克 明雄黄 郁金 硼砂 朱砂各15克 珍珠 青黛 薄荷各9克 甘草5克

用法 共研细末，吹喉。

三

处方 马鞭草7.5公斤 瓜子金10公斤 七叶一枝花2.5公斤

制法 洗净、切碎，用水浸泡1小时后再加水浸过药面，煎煮2次，用纱布过滤，滤液浓缩至10000毫升，加防腐剂，放置3~5天，滤去沉淀，加糖煮沸，用3层纱布过滤，冷却后加入适量薄荷油（先用酒精溶解），不断搅拌，再放置2~3天，布袋吊滤，分装备用。

用法 每次5~10毫升，每2小时1次，晚上睡

觉时不服，即每日8次。

疗效 几年来治疗急性扁桃体炎数百例，收到较好的效果。其中系统观察100例，以用药3天评定效果，痊愈48例，占48%；好转44例，占44%；无效8例，占8%；总有效率为92%。

四

（菊蓝汤）

处方 野菊花 板蓝根各15克 蒲公英30克

麦冬9克 桔梗9克 甘草5克

用法 水煎。每天1剂，分2次服。

疗效 观察治疗35例，有效率为80%。

急性结膜炎

一

处方 生地12克 黄柏 黄芩 龙胆草 草

决明 白菊花 车前草各9克

用法 每日1剂，水煎服。连服3天为1疗程。

疗效 治疗急性结膜炎35只眼，痊愈22只眼，显效13只眼。治疗角膜炎8例，痊愈5例，显效3例。

二

处方 三颗针200克 忍冬藤250克 猪苦胆5个 冰片少许

制法 前二味洗净，加水 1500 毫升，煎至 1000毫升，用7层纱布过滤，入后二味，瓶装备用。

用法 每日滴眼3～5次。

疗效 十年来治疗急性结膜炎100余例，除少数加服磺胺药外，一般点10次好转，15次痊愈。

三

（梅青液）

处方 乌梅500克 青黛10克

制法 将青黛粉溶于100毫升蒸馏水中，加热至80℃，过滤，即得10%的青黛液，其酸碱度(pH)7.5。再将乌梅加水2000毫升，煮沸2小时，过滤，又加水2000毫升，煮沸1小时，过滤，将两次滤液合并浓缩成浸膏状，然后加95%酒精800毫升提取一次，过滤，回收酒精即得乌梅浸膏。将10%青黛液加入适量乌梅浸膏中，使最终溶液的酸碱度(pH)为4~4.5，即得梅青液。过滤、消毒后，分装备用。

用法 一般每2小时滴药1次，重者每小时滴药1次。

疗效 治疗观察93只眼，50只眼在3天内痊愈，占53.76%；7天以上痊愈者占8.6%，疗效显著。

中 耳 炎

一

处方 麝香 血竭 梅片各0.15克 铜绿 红粉 青黛各0.3克

用法 共研极细，以细料纸3层，密刺小孔，将药末撒纸上卷捻，插入耳内。

二

处方 千层石榴花适量 冰片少许

用法 将花晒干，和冰片研极细末，吹入耳内，3~5次即效。

三

处方 白背叶

制法 取鲜白背叶，用稀酒精提取有效成分，即酒精为100毫升，白背叶为100克；再加白背叶根的水提浓缩液（其浓度相当于100

克白背叶根水提浓缩成100毫升)，另加氢化可的松0.2%。含酒精为40%。

用法 每天滴耳3次。

疗效 一般用药1~2天后即显效果，经治疗化脓性中耳炎50例，治愈17例，占35%；显效17例，占35%；好转16例，占30%。

注意 本方只对化脓性中耳炎(单纯型)效果好。

鼻 渊

一

处方 辛夷花3克 麝香0.3克

用法 辛夷花去外衣晒燥，研极细末，和入麝香研匀，瓶装勿泄香气，每日用洗净香葱茎蘸药末点入鼻内，促使鼻内流出腥臭浊液。另外，每天用岗梅根30克水煎内服。

说明 治鼻渊屡用皆效。

二

处方 辛夷_{3克} 黄瓜莢_{6克} 丝瓜莢_{21克}

用法 水煎服。每日1剂。

牙 痛

一

处方 毛茛_{1000克}

制法 取鲜毛茛全草洗净捣烂，用纱布包好绞汁约500毫升，加95%酒精15毫升，置阴凉处静放3天后过滤，滤液瓶装备用。

用法 用棉签沾药水擦痛牙，亦可用毛茛鲜叶捣烂，胶布固定于印堂穴（切忌水流入眼中），痛止取去，以免起泡。

疗效 共治253例，均于2~3分钟内止痛。如周××，男，51岁。牙痛用各种止痛片无效，擦此药少许，2分钟即止痛。

二

处方 熟地30克 牛膝10克 细辛3克 生石膏30克 麦冬10克 大青叶12克 蒲公英15克
用法 水煎。每日1剂，分3次服。
说明 本方适用于实火牙痛。

三

处方 熟地24克 荔枝30克
用法 水煎。每日1剂，分3次服。
疗效 聂×，老药工，年近花甲，肾精不藏，数日前患牙痛，自服清胃火之剂未愈。某医见其齿根松动，牙龈不红肿，知为老年肾亏，虚火上炎，告以此方，1剂痛减，2剂痛止。
说明 本方适用于肾虚牙痛，若胃火牙痛，慎勿服用。

四

处方 蜂房1个 生石膏80克 食盐适量

用法 将石膏、食盐填满蜂房内焙枯，研细擦牙。

说明 本方适用于风火牙痛。

• 附 •

草 药 索 引

(一 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
一枝黄花	菊 科	<i>Solidago virgo-aurea</i> L.	满山黄、金锁匙 黄花草
一朵云根	海 桐 科	<i>Pittosporum sahnia-</i> <i>num</i> Gowda.	崖花海桐
一包 针	水龙骨科	<i>Microsorium fortunei</i> (Moore.) Ching.	连贴草、七星剑
一把 针	菊 科	<i>Bidens pilosa</i> L.	鬼针草

(二 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
十大功劳	小 蘗 科	Maho nia japonica. DC.	猫儿头、部瓜山树 土黄柏、刺黄连
丁 癸 草	蝶形花科	Zornia diphylla (L.) pers.	丁贵草、人字草 地丁
七 叶 莲	五 加 科	Schefflera arboricola Hayata.	鹅掌藤、汉桃叶
七叶一枝花	百 合 科	Paris polyphylla Smith.	蚤休、重楼
八 角 莲	小 蘗 科	Dysosma pleianthum (Hance) Woods.	八角盘、独角莲
八 角 枫	八角枫科	Alangium chinense (Lour.) Rehd.	华瓜木、八角梧桐
八 棱 麻	忍 冬 科	Sambucus javanica Reinw.	接骨草

续表

药名	科名	学名	别名
人 苋	大戟科	<i>Acalypha australis</i> L.	海蚌含珠、珍珠草 血见愁
人 字 草	蝶形花科	即丁癸草	
九 斤 花	蓼 科	<i>Polygonum chinense</i> Linn.	火炭母、老蛇头
九 斤 角	萝 藦 科	<i>Cynanchum atratum</i> Bunge.	白薇、土白前
九 龙 胆	防 己 科	<i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep.	青牛胆、金果榄、 山慈菇
九 里 光	菊 科	<i>Senecio scandens</i> Buch. —Ham.	千里光、九里明
了 哥 王	瑞 香 科	<i>Wickstroemia indica</i> C. A. Mey	九信草、铁伞骨

(三 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
三 爪 龙	蔷薇科	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke.	蛇莓、蛇泡草
三 颗 针	小 蘗 科	<i>Berberis chengii</i> Chen.	土黄连
三 叶 木 通	木 通 科	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koiz.	三叶拿、羊开口
三 叶 翻 白 草	蔷 薇 科	<i>Potentilla freyniana</i> Borum	地丸子
土 贝	葫 芦 科	<i>Bulbostemma</i> <i>Paniculatum</i> (Max.) Franquet.	藤贝
土 大 黄	蓼 科	<i>Rumex daiwoo</i> Makino	金不换
土 牛 膝	苋 科	<i>Eupatorium chinense</i> L.	兰草、六月霜

续表1

药名	科名	学名	别名
土冬花	蔷薇科	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	枇杷花
土丹参	唇形科	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.	紫丹参、鼠尾草
土柴胡	菊科	<i>Avtemisia japonica</i> Thunb.	
土茵陈	玄参科	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.	阴行草
土黄连	水龙骨科	<i>Phymatopsis hastata</i> (Thunb.) Kitagawa.	金鸡脚、鸭脚草
大 钻	五味子科	<i>Kadsura coccinea</i> (Lem.) A.C.Sm.	小血藤、小活血 冷饭团
大 叶 桉	桃金娘科	<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	

续表2

药 名	科 名	学 名	别 名
大 血 藤	大血藤科	即红藤	
大 罗 伞	紫金牛科	<i>Aradisia crenata</i> Sims.	山豆根、朱砂根
大 果 榆	榆 科	<i>Ulmus macrocarpa</i> Hance.	黄榆、山榆
大 青 根	马鞭草科	<i>Clerodendron cyrtoph</i> <i>yllum Turcz.</i>	板蓝根、臭叶树
大金钱草	报春花科	<i>Lysimachia christinae</i> Hance.	过路黄
山 奈	藜 荷 科	<i>Kaempferia galanga</i> L.	山辣
山 姜	藜 荷 科	<i>Alpinia japonica</i> Miq	箭骨风、竹叶姜

续表3

药名	科名	学名	别名
山麻	荨麻科	Boehmeria Platanifolia (Maxim.) Fr. et Sav.	背伏毛
山乌龟	防己科	Stephania cephalantha Hayata.	白药子
山苦瓜	葫芦科	Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.	王瓜、苦瓜莲、土瓜
山柃苦	芸香科	Evodia lepta (Spreng.) Merr.	三丫虎、白芸香
山高梁	禾本科	Alopecurus aequalis Sobol.	看麦娘、牛头猛
山胡椒	樟科	Lindera glauca Bl.	见风消子

续表4

药名	科名	学名	别名
山薄荷	马鞭草科	<i>Caryopteris incana</i> Miq.	山荆芥、兰香草
山梗菜	桔梗科	<i>Sophora subprostrata</i> Chu et T.	水菟菜、苦菜
小通草	旌节花科	<i>Stachyurus praecox</i> S. et Z.	旌节花
小槐花	豆科	<i>Desmodium caudatum</i> (Thunb.) DC.	山蚂蝗、水蛭草
小金钱草	旋花科	<i>Dichondra repens</i> Forst.	黄疸草、马蹄金
万年青	百合科	<i>Rohdea japonica</i> Roth.	开喉箭、冬不凋草
千斤拔	豆科	<i>Moghania prostrata</i> (Roxb.) Wang. et Tang.	蔓性千斤拔

续表5

药名	科名	学名	别名
千年健	天南星科	Homalomena aff. sagittaeifolia Jungh.	一包针
千年矮	黄杨科	Buxus microphylla sieb.et Zucc. var. sinica Rehd.et Wils.	黄杨木
千层塔	石松科	Lycopodium serratum Thunb.	矮罗汉、狗牙菜
千金藤	防己科	Stephania hernand- ifolia (Willa.) Walp.	山乌龟
卫矛	卫矛科	Evonymusalata (Thunb.) Regel.	六月凌、鬼箭羽
马兰	菊科	Aster trinervius Roxb.	田边菊、鱼鳅串

续表6

药名	科名	学名	别名
马桑	马桑科	<i>Coriaria sinica</i> Maxim	蛤蟆树、上天梯
马蓝	爵床科	<i>Strobilanthes</i> <i>flaccidifolius</i> Nees.	板蓝根、百花草
马齿苋	马齿苋科	<i>Portulaca oleracea</i> L.	瓜子菜
马尾松	松科	<i>Pinus massoniana</i> Lamb	枞树
马鞭草	马鞭草科	<i>Verbena officinalis</i> L.	龙牙草、铁马鞭 紫顶龙芽
飞天蜈蚣	菊科	<i>Achillea sibirica</i> Ledeb.	著草、一枝蒿
飞龙掌血	芸香科	<i>Toddalia aculeata</i> pers.	见血散、三百棒

(四 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
天 葵	毛 茛 科	<i>Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino</i>	千年老鼠尿、散血珠
天 胡 荽	伞 形 科	<i>Hydrocotyle rotundi- folia Roxb.</i>	破铜钱、满天星
天 泡 草	茄 科	<i>Physalis pubescens Linn.</i>	苦蕒、灯笼草
王 瓜	葫 芦 科	即山苦瓜	
木 槿	锦 葵 科	<i>Hibiscus syriacus L.</i>	木荆花、灯笼花
木 姜 子	樟 科	<i>Litsea pungens Hemsl.</i>	山胡椒
木 芙 蓉	锦 葵 科	<i>Hibiscus mutabilis L.</i>	山苧麻 三变花

续表1

药名	科名	学名	别名
五爪龙	葡萄科	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	乌莛莓、猪娘藤
牛大力	蝶形花科	<i>Millettia speciosa</i> champ.	山莲藕
牛皮消	萝藦科	<i>Cynanchum caudatum</i> Maxim	牛皮冻、隔山消 见肿消
牛尾菜	百合科	<i>Smilax riparia</i> A. DC.	伸根草
牛筋草	禾本科	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	鸭脚草
云实	豆科	<i>Caesalpinia sepiaria</i> Roxb.	鸟不落、黄牛刺

续表2

药名	科名	学名	别名
毛瓜	葫芦科	Melothvia heterophylla (Louv.) Cogn.	大种老鼠拉冬瓜
毛茛	毛茛科	Ranunculus japonicus Thunb.	毛芥菜
毛冬青	冬青科	Ilex pubescens Hook. et Arn.	毛披树、茶叶冬青
毛萝藦	萝藦科	Marsdenia sinensis hemsl.	
毛果算盘子	大戟科	Glochialon eriocarpum champ	漆大伯、毛漆
乌芋	莎草科	Eleocharis planpaginea R. Br.	荸荠、地栗
乌泡	蔷薇科	Rubus tephordes Hance.	倒水莲、八月泡

续表3

药名	科名	学名	别名
乌韭	林蕨科	<i>Stenoloma chusana</i> (L.) Ching	金花草、孔雀草
乌柏	大戟科	<i>Sapium sebiferum</i> Roxb.	蜡子树、赶山鞭
乌荑莓	葡萄科	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	五爪龙
长叶冻绿	鼠李科	<i>Rhamnus crenatus</i> Sieb. et Zucc.	茜木根、土黄柏
凤丫蕨	裸子蕨科	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb) Diels	散血莲、活血莲
凤尾草	凤尾蕨科	<i>Pteris multifida</i> Poir.	小凤尾、金鸡尾

续表4

药 名	科 名	学 名	别 名
日本乌蕨	中国蕨科	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb) Kunze.	土黄连、金鸡尾 凤尾草
六棱菊	菊 科	<i>Laggera alata</i> (DC.) Schultz.-Eip.	四方消、六耳棱
六角英	爵 床 科	<i>Justicia procumbens</i> L.	爵床、疳积草
火把果	蔷 薇 科	<i>Pyracantha Fortuneana</i>	救兵粮
火炭母	萝 科	<i>Polygonum chinense</i> L.	莽麦三七
水王孙	水 螫 科	<i>Hydrilla verticil</i> <i>lata</i> Casp. var.	虾公草、黑藻

续表5

药名	科名	学名	别名
水灯草	灯芯草科	<i>Juncus effusus</i> L.	灯芯草、龙须草 土麻黄
水龙骨	水龙骨科	<i>Polypodium niponicum</i> Mett.	光棍树、石伸筋
水菖蒲	天南星科	<i>Acorus calamus</i> L.	菖蒲、泥菖蒲
水杨梅	蔷薇科	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	小益母
水杨梅	茜草科	<i>Adina rubella</i> Hance	沙荆子、穿鱼串
水黄连	龙胆科	<i>Swertia chinensis</i> Hemsl. et Forbes.	当药
水杨柳	萝藦科	<i>Cynanchum stauntoni</i> (Decne.) Hand. —Mazz.	柳叶白前、白前

(五 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
玉 兰 花	木 兰 科	Magnolia grandiflora L.	百花果、洋玉兰
打 不 死	菊 科	Gnaphalium japonicum Thunb.	细叶鼠、鞠草
石 蒜	石 蒜 科	Lycoris radiata Herb.	龙爪草、一枝箭
石 吊 兰	苦 苣 苔 科	Lysionotus pauciflora Maxim.	还阳丹、肺红草
石 胡 荽	菊 科	Centipeda minima (L.) A. Braun, et Aschers.	鹅不食草、大救驾
石 南 藤	胡 椒 科	Piper wallchii (Miq.)	石南

续表1

药名	科名	学名	别名
石猴子	葡萄科	<i>Tetratigma hemsleyanum</i> Diels. et. Gilg.	小扁藤、拦山虎
石蟾蜍	防己科	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore.	猪大肠、山乌龟
叶下珠	大戟科	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	珍珠草
叫子草	藤黄科	<i>Hypericum sampsonii</i> Hance.	元宝草
号桐杆	罂粟科	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.	博落回
田边菊	菊科	<i>Aster trinervius</i> Roxb.	马兰丹、泥鳅草

续表2


药 名	科 名	学 名	别 名
田 基 黄	金丝桃科	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	地耳草、防蚊草
打破碗花花	毛 茛 科	<i>Anemone vitifolia</i> Buch.-Ham.	野棉花、青水胆
四 方 麻	玄 参 科	<i>Calovhabados</i> Cauloptera Hance.	青鱼胆、四方消
四 叶 葎	茜 草 科	<i>Galium gracile</i> Bunge.	
四 两 麻	马兜铃科	<i>Asarum forbesii</i> Maxim.	杜衡、马蹄细辛
四 块 瓦	金粟兰科	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	及己

续表3

药 名	科 名	学 名	别 名
四方马兰	唇 形 科	即半枝莲	
兰 香 草	马鞭草科	即山薄荷	
半 边 莲	桔 梗 科	Lobelia radicans Thunb.	急解索、细米草
半 枝 莲	唇 形 科	Scutellaria barbata Don.	四方马兰、并头草
皮 子 药	芸 香 科	即红总管	
瓜 子 金	远 志 科	Polygala japonica Houtt.	紫背金牛、金锁匙 散血丹
鸟 不 企	五 加 科	Aralia decaisneana Hance	老鸦怕、鸟不落

续表4

药名	科名	学名	别名
冬青	冬青科	<i>Ilex chinensis</i> Sim.	一口血
冬葵	冬葵科	<i>Malva verticillata</i> L.	冬苋菜
白英	茄科	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	蜀羊泉、毛秀才 白毛藤
白勒	五加科	<i>Acanthopanax trifoliatum</i> (L.) Merr.	五虎进、刺三加
白背叶	大戟科	<i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Muell —Arg.	白叶野桐、毛桐
白面风	菊科	<i>Inula cappa</i> DC.	白牛胆



续表5

药名	科名	学名	别名
白蜡树	木犀科	Ligustrum lucidum Ait.	女贞
白狼毒	大戟科	Euphorbia fischeriana steud	狼毒大戟、狼毒
白叶野桐	大戟科	即白背叶	
白半枫荷	五加科	Dendropanax proteus Benth.	河边枫、三把叉
白骨树根	大戟科	即乌桕	
白花蛇舌草	茜草科	Oldenlandia diffusa (Willd.) Roxb	

(六 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
地 锦	大戟科	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	奶浆草、仙桃草
地 雷	毛茛科	<i>Clematis henryi</i> Oliv.	单叶铁线莲
地 沟 叶	大戟科	<i>Speranskia cantonensis</i> (Hance.) Pax. et Hoffm.	巴岩散、黄鸦胆
地 虱 婆	鼠妇科	<i>Armadiillidium</i> vulgare (Latreille.)	鼠妇虫 (动物)
地 耳 草	藤黄科	即田基黄	

续表1

药 名	科 名	学 名	别 名
地下明珠	茅 膏 菜 科	<i>Drosera peltata</i> Sm. var <i>lunata</i> Clarke.	内宝珠、金老鼠
地瓜儿苗	唇 形 科	<i>Lycopus lucidus</i> , Turcz.	泽兰
老 鹳 草	牻牛儿苗科	<i>Geranium wilfordi</i> Maxim.	一颗针、藤五爪
百 解	冬 青 科	<i>Ilex asprella</i> Champ.	岗梅、梅叶冬青
百 步 拿	唇 形 科	<i>Glechoma hederacea</i> L.	连钱草
西氏毛茛	毛 茛 科	<i>Ranunculus sieboldi</i> Miq.	黄花草、毛芹菜

续表2

药名	科名	学名	别名
吊黄	远志科	<i>Polygala aureocaudata</i> Dunn.	黄花倒水莲、吊吊黄
光叶海桐	海桐科	<i>Pittosporum glabratum</i> Lindl.	麻口皮子药、过山虎
尖尾枫	马鞭草科	<i>Callicarpalongissima</i> (Hemsl.) Merr.	紫珠树
安石榴	安石榴科	<i>Punica granatum</i> L.	石榴
羊蹄	蓼科	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	
羊躑躅	杜鹃科	<i>Rhododendron molle</i> G. Don.	闹羊花、八里麻 黄杜鹃

续表3

药名	科名	学名	别名
关公须	唇形科	<i>Salvia plebeia</i> R. Br.	雪见草
阴香	樟科	<i>Cinnamomum burmanni</i> Bl.	山桂枝、土桂枝
阴地蕨	瓶尔小草科	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	破天云、散血叶
血蜈蚣	秋海棠科	<i>Begonia pedatifida</i> Leveille.	裂叶秋海棠、水蜈蚣
伏石蕨	水龙骨科	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> presl.	瓜子草、瓜子金
伏地草	茜草科	<i>Oldenlandia chrysotricha</i> (Palibin.) Chun.	地蜈蚣、对叶寸节草

续表4

药 名	科 名	学 名	别 名
竹 叶 椒	芸 香 科	<i>Zanthoxylum planispinum sieb. et Zucc</i>	臭花椒、四两麻
竹叶细辛	萝 藦 科	<i>Pycnostelma paniculatum (Bunge.) K. Schum.</i>	寮刁竹、徐长卿
过 路 黄	报春花科	<i>Lysimachia christinae Hance.</i>	铜钱草、蜈蚣草 小散血
红 藤	大血藤科	<i>Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.</i>	大血藤、活血藤
红 总 管	芸 香 科	<i>Zanthoxylum simulans var. podocarpum Huang.</i>	麻口皮子药、野花椒

续表5

药名	科名	学名	别名
红辣蓼草	蓼科	<i>Polygonum hydropiper</i> Linn.	水蓼
合百草	葫芦科	<i>Actinostemma lobatum</i> (Maxim) Maxim	合子草、无白草
朱砂根	紫金牛科	<i>Ardisia crenata</i> Sims.	山豆根、金锁匙 铁凉伞
朱砂莲	薯芋科	<i>Dioscorea cirrhosa</i> Lour.	薯蓣、红孩儿 红药子
华荠苎	唇形科	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	细叶香薷
多头苦蕒菜	菊科	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	包金七层楼

(七 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
苧 麻	荨 麻 科	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud.	野麻
芙 蓉 叶	锦 葵 科	即木芙蓉	
芸 苔 子	十字花科	<i>Semen. Brassicae</i> <i>campestris</i>	油菜子
花 榈 木	豆 科	<i>Ormosia henryi</i> prain	相思树、鸭屎菜 鸭公青
杜 衡	马兜铃科	<i>Asarum blumei</i> Duch.	土细辛、马蹄香
杜 鹃 花	杜鹃花科	<i>Rhododendron simsii</i> planch.	映山红、山踯躅

续表1

药名	科名	学名	别名
杠板归	蓼科	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	蛇不过、蛇倒退
杜仲藤	夹竹桃科	<i>Parabarium micranthum</i> (Wall.) Pierre.	土杜仲、飞天驳
麦斛	兰科	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim	石仙桃、瓜子莲
两面针	芸香科	<i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.	上山虎、野花椒
连钱草	唇形科	<i>Glechoma hederacea</i> L.	铜钱草、满天星 半边莲
杏香兔耳风	菊科	<i>Ainsliaea fragrans</i> champ.	山豆根、肺形草 七厘丹

续表2

药名	科名	学名	别名
岗梅	冬青科	即百解	
岗稔	桃金娘科	Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk	桃金娘、水刀莲
尿珠子根	禾本科	Coix lachrymajobi L.	薏苡
鸡血藤	豆科	Mucuna birdwoodiana Tutchner	大血藤、血枫藤
鸡冠花	苋科	Celosa cristata L.	鸡头
牡荆	马鞭草科	Vitex cannabifolia Sieb. et Zucc.	黄荆、土常山 野牛藤

(八 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
青 风 藤	防 己 科	Sinomnium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils	青藤、寻风藤
苦 树	苦 木 科	Picrasma quassioides (D. Don.) Bennett.	进口苦、黄楝树
苦 蕒	茄 科	Physalis pubescens Linn.	天泡子、灯笼草
苦 胆 草	唇 形 科	即金疮小草	
苦 楝 树	楝 科	Melia azedarach L.	
刺 黄 柏	小 蘗 科	即阔叶十大功劳	
茅 莓	蔷 薇 科	Rubus parvifolius Linn.	三月泡、种田满

续表1

药名	科名	学名	别名
松萝	松萝科	<i>Usnea longissima</i> Ach.	石飞丝
抱石莲	水龙骨科	<i>Lepidogrammitis drymoglossoides</i> (Bak) Ching.	瓜子莲、瓜子金
岩丸子	秋海棠科	<i>Begonia sinensis</i> A. DC.	中华秋海棠、阴阳子
枫香	金缕梅科	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	枫树 (果实名路路通)
虎杖	蓼科	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.	大叶蛇总管、酸筒杆 土大黄
虎刺	茜草科	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaerth. fil.	十大功劳、绣花针
虎掌	天南星科	<i>Arisaema thunbergii</i> Bl.	土南星、南蛇吐剑

续表2

药名	科名	学名	别名
虎舌红	紫金牛科	<i>Ardisia mamillata</i> Hance.	红毛毡、老虎台
京大戟	大戟科	<i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr.	将军草、龙虎草
油桐	大戟科	<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.	桐子树、罌子桐
泡桐	玄参科	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	白桐、水桐
夜关门	豆科	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don.	铁扫帚
闹羊花	杜鹃花科	<i>Rhododendron molle</i> G. Don.	羊躑躅、黄杜鹃
金果榄	防己科	<i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep.	山慈姑、青牛胆

续表3

药名	科名	学名	别名
金挖耳	菊科	<i>Carpesium divaricatum</i> sieb. et Zucc.	铁骨消、翻天印
金鸡爪	伞形科	<i>Angelica citriodora</i> Hance	隔山香、香白芷 鸡爪参
金疮小草	唇形科	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	青鱼胆、伏地筋骨草 苦胆草
枸树	桑科	<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	楮实子树、纱子树
鱼腥草	三白草科	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	蕺菜、臭菜
细叶 十大功劳	小檗科	<i>Mahonia Fortunei</i> Fedde.	猫公头、土黄连
狗半枝 牙莲	景天科	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge.	垂盆草

(九 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
芥 菜	十字花科	Capsella bursa—pastoris (Linn.) Medic.	地菜、野芥菜
草 河 车	唇 形 科	Salvia chinensis Benth.	紫参、石见穿
珍 珠 草	大 戟 科	phyllanthus urinaria L.	叶下珠、日开夜闭
桤 柳	桤 柳 科	Tamarix chinensis Lour.	观音柳、西河柳
枸 骨	冬 青 科	Ilex cornuta Lindl. et paxt.	狗公刺
南 天 竹	小 檗 科	Nandina domestica Thunb.	珍珠盖凉伞、土黄芩 山黄连

续表1

药 名	科 名	学 名	别 名
南 蛇 藤	卫 矛 科	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	过山龙、钻骨风
南五味子	五味子科	<i>Kadsura longipedunculata</i> Finet. et Gagnep.	小活血、内风消 小血藤
胡 颓 子	胡颓子科	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	蔷薇树、甜棒锤
穿 心 莲	爵 床 科	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees.	一见喜、苦胆草
穿 石 阳	桑 科	<i>Cudrania cochinchinensis</i> (Louv.) Kudo et Mats.	穿破石、畏芝
兖州卷柏	卷 柏 科	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring.	凤凰草、金不换

续表2

药名	科名	学名	别名
香椿	楝科	<i>Cedrela sinensis</i> Juss.	青叶花
香蒲	香蒲科	<i>Typha latifolia</i> L.	毛蜡烛、蒲黄
急解索	兰科	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames.	盘龙参、绶草
匍伏堇	堇菜科	<i>Viola diffusa</i> Ging	野薄荷、散血丹 黄花草
络石藤	夹竹桃科	<i>Trachelospermum jasminoides</i> L.	爬壁藤
娃娃藤	萝藦科	<i>Tylophora floribunda</i> Miquel.	老君须
除虫菊	菊科	<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> Vis.	

(十 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
桤 木	金縷梅科	Loropetalum chinense Oliv.	榧花
盐 肤 木	漆 树 科	Rhus semialata Murr.	五倍子、天蜈蚣
破 铜 钱	伞 形 科	Centella asiatica (L.) Urb.	积雪草、马蹄草
鸭 公 青	豆 科	即花榈木	
鸭 跖 草	鸭跖草科	Commelina Communis L.	竹叶菜

续表1

药名	科名	学名	别名
海金沙	海金沙科	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw	斑鸠窝、满天云
粉条儿菜	瓦合科	<i>Aletis spicata</i> (Thunb.) Franch.	肺风草、金线吊白米 蛆蛆草
海蚌含珠	大戟科	即人苋	
铁扫帚	豆科	即夜关门	
铁扁担	鸢尾科	<i>Iris japonica</i> Thunb.	开喉见、扁竹根
积雪草	伞形科	即破铜钱	

续表2

药名	科名	学名	别名
臭牡丹	马鞭草科	Clerodendron bungei Steud.	大红袍、臭梧桐
臭娘子	马鞭草科	prema microphylla Turcz.	臭常山、铁箍散
鬼针草	菊科	Bidens bipinnata L.	盲肠草、婆儿针
笑靥花	蔷薇科	Spiraea prunifolia Sieb. et Zucc.	米浆树
缺腰叶蓼	蓼科	polygonum runcinatum Hamilt. var. sinense Hemsl	九斤花、田枯七 脚肿草

(十一画)

药名	科名	学名	别名
菝葜	百合科	Smilax China Linn.	金刚刺
黄荆子	马鞭草科	Vitex negundo L.	土常山、荆巴柴 姜子叶
黄疸草	旋花科	即小金钱草	
黄花倒水莲	远志科	Polygala aureocauda Dunn.	吊吊黄
雪冻花	瑞香科	Daphne odora Thunb.	瑞香、雪花皮 山棉皮
接骨木	忍冬科	Sambucus racemosa L.	舒筋树、木蒴藿
聋桐树	夹竹桃科	Wrightia pubescens R. Br.	倒吊笔、墨柱根 刀柄

续表1

药名	科名	学名	别名
蛇莓	蔷薇科	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke.	地锦、蛇泡草 三仙草
蛇含	蔷薇科	<i>Fotentilla kleiniana</i> Wight et Arn.	五爪莲、五虎草 五叶藤
蛇不过	蓼科	即杠板归	蛇倒退
蛇葡萄	葡萄科	<i>Ampelosis brevipedunculata</i> koehne.	假葡萄、爬山虎
野百合	豆科	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	化草、化骨草
野花椒	芸香科	即竹叶椒	
野南瓜	大戟科	<i>Glochidion puberum</i> Hutch.	算盘子、馒头果

续表2

药名	科名	学名	别名
野扇花	黄杨科	<i>Sarcococca ruscifolia</i> stapf.	土杜仲、大风消 土丹皮
野茄子	菊科	<i>Xanthium strumarium</i> L.	苍耳
眼子菜	眼子菜科	<i>Potamogeton Franchetii</i> A. Benn. et Baag.	鸭嘴皮
常春藤	五加科	<i>Hedera sinensis</i> Tobl.	
麻首风	买麻藤科	<i>Gnetum parvifolium</i> (warb.) C.Y. Cheng.	狗果藤
麻口皮子药	芸香科	即红总管	

续表3

药名	科名	学名	别名
盘龙草	菊科	<i>Aster scaber</i> Thunb.	土苍术、东风菜
犁头角	旋花科	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	小旋花
犁头草	堇菜科	<i>Viola japonica</i> Langsd.	犁头草、紫花地丁
雀舌草	石竹科	<i>Stellaria Alsine</i> Grimm.	青鱼草
银铃花	报春花科	<i>Lysimachia decurrens</i> G.	大散血
猕猴桃	猕猴桃科	<i>Actinidia chinensis</i> pranch.	藤梨树、钻地风
猪娘藤	葡萄科	即五爪龙	

(十二画)

药名	科名	学名	别名
蓖麻	大戟科	<i>Ricinus Communis</i> L.	润肠、大麻子
茺蒿	菊科	<i>Artemisia Vulgaris</i> L. var.	千粒米
萱花	百合科	<i>Hemerocallis fulva</i> L.	黄花菜、金针菜
落地生根	景天科	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) pers.	打不死、土三七
博落回	罂粟科	即号桐杆	
喜树	珙桐科	<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.	
棣棠花	蔷薇科	<i>Kerria japonica</i> DC.	兑棠花、橡皮树

续表1

药名	科名	别名	学名
紫葳	紫葳科	<i>Campsis chinensis</i> Voss.	凌霄花、过江龙 过山龙、搜骨风
紫薇	千屈菜科	<i>Lagerst roemia indica</i> L.	宝幡花、四月花 羊屎树
紫竹根	禾本科	<i>Phyllostachys nigra</i> Munro.	黑竹根
紫珠草	马鞭草科	<i>Callicarpa pedunculata</i> R. Br	
酢酱草	酢酱草科	<i>Oxalis corniculata</i> L.	老鸦酸、三叶酸
阔叶 十大功劳	小蘗科	<i>Mabonia bealei</i> Carr.	土黄柏、刺黄柏

续表2

药名	科名	学名	别名
筋骨草	唇形科	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	脚踏莲、青鱼胆
隔山香	伞形科	<i>Angelica citriodora</i> Hance.	过山香、香白芷 枸橼当归
铺地蜈蚣	茜草科	即伏地草	
铺地蜈蚣	石松科	<i>Lycopodium cernuum</i> L.	合金草、路伸筋
雄黄连	防己科	<i>Stephania</i> Sp.	一点血
鹅不食草	菊科	即石胡荽	

(十三画)

药名	科名	学名	别名
蒲公英	菊科	Taraxacum mongolicum H.-M.	黄花地丁
摇竹消	萝藦科	即竹叶细辛	
雷公藤	卫矛科	Tripterygium Wilfordii Hook. F.	水莽草、断肠草 三棱
满天星	伞形科	Hydrocotyle sibthorpioides Lam	天胡荽
溪黄草	唇形科	plectranthus striatus Benth.	熊胆草、风血草
路边荆	茜草科	Serissa foetida Comm.	六月雪、千年矮

续表

药名	科名	学名	别名
辣蓼草	蓼科	<i>Polygonum flaccidum</i> Meisn.	旱蓼
鼠曲草	菊科	<i>Gnaphalium multiceps</i> Wall.	水蚊子、佛耳草 水蒿、黄花草
腹水草	玄参科	<i>Botryopleuron axillare</i> Hemsl.	吊线风、金鸡尾 倒挂风、老君丹
矮地茶	紫金牛科	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Bl.	紫金牛、平地木
矮桃草	报春花科	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	星宿菜
蓍草	菊科	即飞天蜈蚣	

(十四画)

药名	科名	学名	别名
蔓苧麻	荨麻科	<i>Momialis hirta</i> Wedd.	糯饭藤
蔓陀罗	茄科	<i>Datura metel</i> L. f. alba	闹羊花、羊金花
酸浆	茄科	<i>Physalis alkekengi</i> L.	红天泡子
蔷薇莓	蔷薇科	<i>Rubus rosaefolius</i> Sm.	火伤泡、四月泡
蜘蛛抱蛋	百合科	<i>Aspidistra elatior</i> Blume.	竹根七、一寸十八节 赶山鞭
翠云草	卷柏科	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv.) Spring.	

(十五画以上)

药名	科名	学名	别名
缬草	败酱科	Valeriana officinalis L.	山麝
薜荔	桑科	Ficus pumila L.	凉粉子、爬壁藤 络石藤
薯蓣	薯蓣科	即朱砂莲	
橐吾	菊科	Ligularia tussilaginea Makino.	铁冬苋、活血莲 马蹄草
爵床	爵床科	即六角英	
藿麻草	荨麻科	Urtica Sp.	

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 湖南中草药单方验方选编 (修订本)

作者 = 湖南省中医药研究所编

页数 = 2 6 3

S S 号 = 1 0 4 4 4 1 7 5

出版日期 = 1 9 8 2 年 1 0 月新 1 版