內府秘傳眼科銀海精微 上

内府秘傳眼科銀海精微

刻銀海精微二卷末知何人氏所撰著蓋余生而目善病昔直按垣余同寅友李冲涵公出以示余曰疾幾有當於目病方技乎余檢閲見其圖象立論及咨問宗旨俱一一分

内府秘傳
科銀海精微

刻銀海精微引
銀海精微二卷未知何人氏
所撰著蓋余生而目善病昔
直掖垣余同寅友李冲涵公
出以示余曰庶幾有當於目
病方技乎余檢閲見其圖象
立論及荅問宗旨俱一一分

析明盡若嘗飲上池所視見者取名銀海本之道藏其爲方書信乎精矣微矣數年宦遊所至每攜之笥中茲承乏河朔因擷所屬付剞劂蓋不欲秘之自私也雖然方亦未可盡拘泥也脉證有陰陽表裏虛實之異斟酌損益存乎其人不然拘泥古法而不通變則是編也真古人糟粕耳至易簡玅方則古宋陽里子所授魯東門伯所修六物不殊外假而自稱絶技又是書所不載也

賜進士第中憲大夫河南等處提
刑按察司副使奉
勅巡河北道前吏科左給事中
北海齊一德經書



景岳全書引此文曰首有楊仁齋曰四字而每大字以下有也而無彼者左傍加一點又有彼而無此者補入於右傍或層上

銀海精微序

夫眼者乃五臟之精華如日月麗天昭明而不可掩者也其首尾赤皆屬心其瞳眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間一點黑瞳如漆者腎實主之是隨五臟各有症應然論其所主則瞳子之關繫重爲何以言之目者肝之外候也肝取木腎取水水能生木子肝母腎爲有子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏朦晾暈爲輪赤暈刺痛浮腫此肝熱也眼生清淚枯黃遠睛此

肝虛也瞳人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦
小或帶微黃此腎熱也一虛一實以此驗之然
人肝腎之氣相依而行孰知心者神之舍又所
以爲肝腎之副焉所謂一而二二而一者也何
則心主血肝藏血血能生熱凡熱冲發於眼皆
當清心凉肝又不可固執其水生木之說特眼
者輕膜裹水照徹四方遡源反本非天一之水
又果孰爲主宰乎折而論之則拘急牽颼瞳青
胞白痒而清淚不赤不痛是謂之風眼烏輪突
起胞硬紅腫眵淚濕漿裹熱刺痛是謂熱眼眼

昏而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澁微赤是謂之
氣眼其或風與熱并則痒而浮赤風與氣搏則
痒澁昏沉血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針
之類氣血不至故有渺視胞垂省目盲障之形
淡紫而隱紅者爲虛熱鮮紅而蠹赤者爲實熱
兩眥逞露生努肉者此心熱血旺白膜紅膜如
傘紙者此氣滯血凝熱症瞳人肉壅白睛帶濕
色浮而赤者也冷症瞳人青綠白睛枯槁氣沉
而濁也眼熱經久復有風冷所乘則赤爛眼中
不赤但爲痰飲所注則作痛肝氣不順而挾熱

所以羞明熱氣畜聚傷胞所以胞合此外症之
太槩然而五臟不可闕一脾與肺獨無預何也
曰白睛帶赤或紅筋者其熱在肺上胞下臉或
目瞑間如赤點者其熱在脾脾主味也五味之
秀養諸中則精神發於外肺主氣也水火升降
榮衛流轉非氣孰能使之前所謂五臟各有症
應於此又可推矣雖然眼之為患多生於熱其
間用藥太抵以清心凉肝調血順氣為先有如
腎家患燥設遇虛症亦不過以當歸地黃輩潤
養之輕用溫藥不可也況乎肺能發燥肝亦好

潤古方率用杏仁乾柿飴糖砂蜜為佐果非潤
溢之意乎至於退翳一節尤關利害凡翳起於
肺肺家受熱輕則朦朧重則生翳如珍珠衣狀
来者易散翳狀如梅花者難消雖翳自熱生然
治法先退翳而後退熱者猶熱極生翳若先去
赤熱則血為之氷而翳不能去矣其有赤眼凉
藥與之過多又且滌之以水不及掌而氷凝矣
眼特一團水且水性清澄右不可拘拘於點洗
喜怒失節哭慾無度窮役眼力泣涕過多凌寒
中風當暑日日不避烟火飲啖熱多此皆患生

序畢

於臟腑者也專事點洗可乎哉有能靜坐澄神愛護目力放懷息慮心逸日休調和飲食以養之斟酌藥餌以平之明察秋毫斷可必矣

銀海精微卷之上

五輪八郭總論

人有兩眼猶如天地之有兩睛視萬物察纖毫何所不至日月有一時之晦者風雲雷雨之所致也眼之失明者四氣七情之所害也太抵目爲五臟之精華一身之要係故五臟分五輪八卦名八廓五輪肝屬木曰風輪在眼爲爲睛心屬火曰血輪在眼爲二眥脾屬土曰肉輪在眼爲上下胞臉肺屬金曰氣輪在眼爲白仁腎屬水曰水輪在眼爲瞳人至君八廓無位有名太陽之腑爲天廓脾胃之腑爲地廓命門之腑爲火廓腎之腑爲

水廓肝之腑爲風廓小腸之腑爲雷廓膽之腑爲
膀胱之腑爲澤廓斯爲眼目之根本而又藉血爲之胞
絡或蘊積風熱或七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨
五臟所偏而見或腫而痛羞澁多淚或生障昏暗失明
其症七十有二治之須究其源因風則散之熱則清涼
之氣結則調順之切不可輕用針刀鈎割偶得其愈出
乎僥倖或有悞而爲者則必爲終身之患也又不宜遍
用涼藥恐氷其血凝而不流亦成瘸疾用藥當量人之
老少氣體之虛實又有腎虛者亦令人眼目無光或生
冷翳宜補煖下元滋補腎水北方患者多是目骨風沙

夜卧熱炕二氣交蒸故使之用涼藥北方之人故與南
方之人用藥有不同也瘡瘍之後毒氣鬱結於肝而氣
不能瀉攻發於眼目傷於瞳人者素無治法也

五輪圖式



大眥赤者心之實也
大小眥爲血輪屬心火
黑精爲風輪屬肝木
瞳人爲水輪屬腎水
白仁爲氣輪屬肺金
上下胞臉爲肉輪屬脾土
小眥赤者心之虛也

八廓圖式



天廓屬大腸傳送肺金乾卦
火廓屬心抱陽命門經離卦
地廓屬脾胃水谷之海坤卦
水廓屬腎經會陰坎卦
山廓屬膽經清淨艮卦
風廓屬肝經養化巽卦
雷廓屬心小腸經關泉震卦
澤廓屬膀胱經津液兌卦

五輪之圖

眼中赤脉血輪心　黒睛属腎水輪深
白睛属肺氣輪應　肝主風輪位亦輪
更有肉輪脾臓應　兩臉属脾胞胃侵

八廓之圖

肝為養化之廓

腎與眼疾豈無由　酒色過時更惜憂
莫道睛光無大故　看看膜障裹雙眸

膽為清淨之廓

視物依稀似霧中　時時手拭兩睛瞳

要知冷涙頻頻出　此是肝虚膽氣攻

膀胱津液之廓

膀胱属水腎為夫　冷涙相形本臓虚
赤脉縱横輪廓内　不逢妙手豈能甦

胃名水谷之廓

飲食相干在胃中　更加積熱兩相攻
臉胞漸腫生睛赤　不解中宮熱不通

命門抱陽之廓

内抱真陽是命門　眼前花發色紛紛
不能補腎調肝氣　睛腫縱横似有根

大腸傳送之廓

傳送原因是本經　肺家壅滯熱相侵
只宜大腸依次第　閉澁之時醫患睛

小腸關泉之廓

小腸腑屬關泉廓　受病先從心裏傳
兩眥皆赤生痒痛　但調經脉自然痊

腎屬會陰之廓

視物如看霜霧多　擡頭畏日事如何
急宜補腎禁房室　免使昏矇不得過

六腑　三焦　膽　胃　大腸　小腸　膀胱

五臟　心　肝　脾　肺　腎

心屬火　肝屬木　脾屬土　肺屬金　腎屬水

五行生尅

金生水　水生木　木生火　火生土　土生金
金尅木　木尅土　土尅水　水尅火　火尅金

五臟表裏

心與小腸爲表裏　肝與膽爲表裏
脾與肺爲表裏　肺與大腸爲表裏
腎與膀胱爲表裏　三焦與命門爲表裏
一說命門與心胞絡爲表裏

三陰三陽經

心是手少陰經　小腸是手太陽經
腎是足少陰經　膀胱是足太陽經
肺是手太陰經　大腸是手陽明經
脾是足太陰經　胃是足陽明經
肝是足厥陰經　膽是足少陽經
三焦是手少陽經　命門是手厥陰經
此是三陰三陽也

七情

喜　怒　憂　思　悲　恐　驚

喜傷心其氣散　怒傷肝其氣緊
憂傷肺其氣聚　思傷脾其氣結
悲傷心胞其氣急　恐傷腎其氣怯
驚傷膽其氣亂　此乃七情是也

汗乃心之液　淚乃肝之液　涎乃脾之液
唾乃肺之液　精乃腎之液　此五臟之液是也
苦入心經　酸入肝經　甘入脾經
辛入肺經　鹹入腎經

四氣

酒色財氣　風寒暑濕　過度成病

大皆赤脉付睛



赤脉穿睛之症起於大眥者心之實也此心邪之侵肝也心屬火主血肝屬木主筋筋得血灌引漸至黑睛蔓延瞳人甚則看物如同隔絹是三焦相火炎上或勞心事太過或夜觀書史或能飲酒及好食五辛

煎炒熱物法宜瀉火退熱老少不同治日積月累滿脉大者宜用小鋒針挑斬毒血流出赤脉斬矣若是作發赤脉不用桃發點以陰二陽四藥服以四順八王當歸散凉肝之劑其病無不甦矣又有暴横之人赤脉灌睛者此生相也非比前症治之

問曰人之患目大眥赤脉付睛大眥常壅澁看物不準者何也荅曰乃心經之實熱況心或因思慮勞神或飲食太過致使三焦發熱心火愈熾故目常赤也治之雖攻少陰經心胞陽火廓先服三黄丸瀉其心火次以洗心散去其病肝連丸常鎮三黄丸點用清

療散服用清心利小腸經降火爲主用八正散

八正散

大黄　瞿麥　木通　梔子

滑石　甘草　車前子　匾蓄

右各等分爲末每服五錢水一鍾煎或入竹葉燈心葱頭食後服

導赤散

木通　甘草　梔子　黄栢

生地黄　知母

右每服細末四五錢水一鍾入竹葉燈心草同煎食後服

七寶洗心散

當歸　赤芍藥　大黄各一兩　麻黄二兩

荊芥五錢　黄連一兩　梔子

右爲末每服三四錢水煎食後服

三黄丸

黄連　黄芩各一兩　大黄三兩酒浸過炒

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸熱水下

肝連丸

白羊子肝一副勿令下水以線結定總筋吊起高

處濾乾血水輕輕剝去外膜可將肝置於平木板上以竹刀割下肝粉筋膜不用肝粉和爲丸每服五十丸茶送下

小背赤脉傳睛



小背赤脉傳睛者心之虛也與大背不同治法分或

症治之五臟之主六腑之宗且屬南方候陽象德之君火生土火乃土之母脾上實則心火虛矣治先瀉其脾土之實後補其心之虛多因夜近燈火勞傷心經致使心虛氣弱血運不行積在小背之間故引此二者以爲後之學者識然此症宜喫藥不必挑剪

瀉肝散

桔梗　黃芩　大黃　芒硝

梔子　車前子

九仙散

黃芩　荊芥　甘草　赤芍藥

菊花　川芎　當歸　木通

白芷

右等分爲末每服三錢用水煎食後服

駐景丸　治心腎俱虛血氣不足下元衰憊服

楮實微炒　枸杞子　五味子　人參各一兩

熟地酒浸焙乾二兩　乳香一兩制過　肉蓯蓉酒浸焙乾四兩　川椒去目炒乾一兩

兎絲子淘淨去沙土酒浸一宿蒸過焙乾四兩　一方加當歸

右爲末煉蜜爲丸梧桐子大每服三十丸空心塩湯下

補勞人參丸　治心神恍惚

人參　白茯苓　白附子　續斷

遠志　菊花　甘草

右爲末煉蜜爲丸彈子大每服一丸細嚼食後桔梗湯下月三次

補虛人參丸

茯苓　人參　續斷　遠志各一兩

白附子三錢　甘草　白殭蠶各五錢

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸細嚼桔梗湯送下

努肉攀睛



努肉攀睛者與大眥赤脉之症同然此症者脾胃熱毒脾受肝邪多是七情鬱結之人或夜思尋家筵無歇或飲酒樂慾致使三焦壅熱或肥壯之人血滯於大眥努肉發端之時多痒因手擦摩努肉漸漸生侵黑睛月積月累者爲實乍發乍痛者爲虛治法實者小針爲鈎鈎起剪斷些寬二五日剪痕收滿方可點陰二陽四藥吹點餘翳漸清避風忌口齋戒可也若乍發不宜鈎剪宜服藥點以淡丹藥可也三焦心火俱炎亦能生此疾治之須鈎割後宜服瀉脾除熱飲

瀉脾除熱飲

黄芪　防風　充蔚子　桔梗
大黄　黄芩　車前子　黄連
芒硝各一兩　每服六錢水煎服

此症脾胃積熱相火胃火旺也若經久翳厚施實爲

晴者宜鉤去剪記次日用退翳捲雲散調津液點之
日一次三黃湯加寒劑常點用對交冊加清涼散若
筋腫厚大者宜剪剪畢頭處用火烙之使其再不復
生愈後仍用三黃丸收功鎮其上炎之火

三黃連　治脾胃積熱致生此疾宜服加芩藥宣連
黃連　黃芩　大黃各一兩
若熱甚者脉紅盛者加黃栢石膏山梔子之類水煎
食後温服

金花丸

黃連　黃栢酪各四　黃芩　人參各三兩


雞冠蜆肉

桔梗三兩　半夏二兩　梔子仁　兩
右爲末煉蜜爲丸梧桐子大每服五十丸茶下

雞冠蜆肉者心之熱酒之毒也脾胃壅滯肝臟積熱
肉翳漸漸而長侵至黑睛發來高大形似雞冠蜆肉

壅蔽太陽皆因相火鬱結致生紅肉礙淚出
治法初發之時用小鋒針破使惡血流出以輸其肉
二三日又可針一次又法可鼻孔內剪竹葉捲作小
筒彈進放血或小鋒針亦可右眼右孔左眼左孔服
三黃加朴硝丸如彈子大夜臥嚼化以沃上焦火正
爲揚湯止沸莫若去薪息火肉翳者可烙三十五度其
效甚速烙可用軟皮剪孔濕按眼胞烙則不傷四弦
皆肉有虛有實虛切不可用剪剪則流血汪洋變爲
利害或壅如桃李之狀難治
問曰眼內生虛肉形似雞冠蜆肉者何也脾胃受風

熱火旺脾土燥熱也治法年少者只宜瀉脾胃本臟
若脾胃衰不受寒涼者宜瀉子瀉母之法瀉本臟用
三黃湯加寒涼劑泄子用瀉肺湯瀉母用八正散瀉
心湯主之點用清涼散加涼藥仍服三黃丸收功若
積久大者亦宜前剪後宜烙新發小者宜挑不用烙
宜用退翳捲雲散點之一二次

三黃丸　八正散　二方前症條下

瀉肺湯　治肺經得脾熱白仁變生雞冠蜆肉宜服

桑白皮一兩去皮　地骨皮一兩去土　甘草七錢　黃芩一兩
桔梗一兩

右爲末每服三四錢水煎食後服

瀉心湯　治心熱傷脾土燥熱宜服

大黄　黄芩　桔梗　知母

黒參　馬兜鈴　防風

右等分水煎食後服

兩臉粘睛



兩臉粘睛者脾胃風虚冷弱邪氣聚於臉致胞臉風赤濕爛肝膈虚熱眵粘四眥夜睡上下胞臉膠凝粘緊血滯不散久則漸生翳膜治法宜陰一陽三吹點若發年久眼皮漸長雖不是拳毛倒睫亦可夾起眼皮使露黒睛消散血氣臉積有瘀血可剃可洗爛痒者洗以碧天丹每日侵晨用桑白皮入塩燻洗或大寒後不落桑葉名爲鐵扇子煎洗極妙或菊花葉煎湯洗亦可此乃發年久有此症初發者無此症病耳問曰眼患年久兩臉粘而不開明者何也荅曰脾胃受風冷所傷邪氣久積不散致血氣凝滯久注不開

時自眵淚含糊治法年久宜當歸活血煎神清散主之近患蟬花散密蒙花散主之若經久不愈久注不開眼皮長者雖不是拳毛倒睫亦可灸起眼皮點用重藥片腦不用

久患虛冷

當歸活血煎　治風冷久積兩臉粘睛服之

當歸　黃芪　沒藥　川芎（血氣旺者勿用）

蒼朮　荊芥　薄荷　熟地黃

羌活　菊花　麻黃

右等分爲末煉蜜爲丸如彈子大每食後細嚼一丸清茶送下日進三次

久受風邪

神清散　治風毒傷胞臉眼生翳膜日漸細小服之

川芎　薄荷　羌活　附米

藁本　防風　荊芥　川烏

枳殼　石膏　白芷　甘草

細辛　麻黃各等分

右爲末每服三四錢食後清茶葱白湯送下

無疼痛時

蟬花散　治肝經蘊積熱毒傷肝上攻於目赤腫多淚

羞明一切風毒傷肝並皆治之

谷精草 去土 菊花 蟬蛻 羌活

甘草 蒺藜 草决明 防風

川芎 梔子仁 密蒙花 荊芥穗

蔓荊子 黄芩 木賊

右各等分爲末每服二錢食後用清茶調服或荊芥湯調服

無痛有羞明時服

密蒙花散 治眼羞明怕日肝膽虛損瞳人不清服之

密蒙花 羌活 菊花 蔓荊子

青箱子 石决明 蒺藜 木賊

枸杞子

右各等分爲末每服三錢食後清茶送下脾胃虛者加白朮五分

眵 淚 粘 濃



問曰眵淚粘濃出而不絶者何也荅曰此肺之虚也肺受心火之邪熱所尅金得心火而衰故眵淚而不絶也宜先服艾煎丸以去肺與大腸經天廓之邪熱後用阿膠散而補之

艾煎丸

好艾葉醋蒸焙乾　薄荷　當歸　地骨皮
晩蚕沙即蚕屎　糯米　秦艽　綿黄芪
黄栢　桔梗

右爲末煉蜜爲丸每服三十五丸食後服桑白皮湯下或薄荷湯下

阿膠散

阿膠蛤粉炒一兩　鼠粘子炒一兩　甘草五錢　糯米一兩
馬兜鈴　款冬花　紫菀各一兩

右爲末每脉六錢水煎服

眵淚　淨明

問曰人患眼白仁常淚紅壅熱睛淚出而不絕者何也荅曰此肺之實熱也肺屬金金生水金旺則水溢淚本通肝亦是肺之精華肺經實熱故目睛淚出而不絕也治之須用瀉肺湯泄肺經之實熱後用省味金花丸降其肺火則與大腸傳道流利而天廓目經於度無上炎之火睛淚淨明矣

瀉肺湯

地骨皮　大黃
茸草各一兩　芒硝
右每服五錢水煎　桔梗

省味金花丸

川黃栢二兩　黃芩
連翹各一兩　薄荷五錢
右煉蜜爲丸每服五十丸桑白皮湯下或薄荷湯下



問曰人之患眼目有黑花芒芒如蠅翅者何也答曰此腎水衰腎乃肝之母腎水不能濟於肝木則虛熱膽乃生於肝之傍肝木焦枯膽氣不足故行動舉止則眼中神水之中蕩漾有黑影如蠅翅者治之須用猪苓散順其肝腎之邪熱次用黑參湯以凉其肝則膽經清淨之廓無邪熱之所侵後用補腎丸黑花自消

猪苓散

木猪苓一兩　車前子五錢　木通　大黃

梔子　滑石　黑狗脊　扁蓄各一兩

蒼朮

右爲末每服三錢塩湯下

黑參湯

黑參　黃芩　生地黃　赤芍藥

菊花　青箱子　白蒺藜

右爲末每服四錢水煎服

補腎丸

石菖蒲　枸杞子　白茯苓　人參

山藥　澤瀉　兎絲子

肉蓯蓉各兩

右煉蜜爲丸每服五十丸塩湯下

目暗生花



與起坐生花同

目暗生花不能久視者何也此乃腎之虛也眼雖屬於竅門乃歸腎而爲主腎虛則眼昏或貪淫樂慾酒色過度使腎臟衰憊稟受天真不全精神短少致瞳人神水不清眼目無力故目生花不能久視治之須用還精補腎丸使陰水足無不還矣

還精補腎丸

人參　白朮　茯苓　蒺藜
羌活　木賊　菊花　防風
肉蓯蓉　密蒙花　川芎　甘草
青箱子　山藥　牛膝各一兩　兎絲子

右爲細末煉蜜爲丸或煎服亦妙

熱極眵睛



眼目熱極珠磣淚出者也此陰陽不和五臟壅熱肝膈毒風上充忽然腫痛難忍五輪振起乃五臟熱極致使也宜服救睛散次用涼膈連翹散先點清涼散

後有九一冊

救睛散

川芎　防風　羌活　甘草

木賊　石膏　薄荷　菊花

石決明

右爲末每服三錢清茶下

涼膈連翹散

連翹　大黃　黃連酪一　薄荷

梔子　甘草　黃芩　朴硝酪一

右水煎服

胞肉膠凝



胞肉膠凝與兩臉粘睛頰同兩臉粘睛臉之病此症胞之病臉熱則膠粘病之淺胞熱則膠粘病之深故分作兩症治之脾胃壅熱肝膈風充胞臉內蠹肉壅起爛濕膠粘膠凝氣血壅滯不能疏散積之年久黑睛生翳朦昧不明羞明怕日治法以陰二陽四吹點有瘀血可剌洗以桑白皮鐵掃子菊花當歸防風荊芥木賊薄荷鹽花之類胞肉積久堅硬厚實者番轉絡二三度而實其肉可也

問曰眼久注不開內生虛肉胗淚膠凝者何也答曰胃中有伏熱鬱於內也治宜通脾瀉胃湯加寒劑降大腸去風宜點重藥肉肉結原實者宜剌洗至肉平澤方止堅厚者亦絡無妨絡後清涼消毒膏敷之

通脾瀉胃湯

麥門冬　芫蔚子　防風　大黃

胞肉生瘡



知母　天門冬　黄芩
熟甚者加　黄柏　石膏　朴硝　梔仁
一方又加黒參
右等分爲末每服五錢水煎食前服

胞肉生瘡與胞肉膨脹生風粟兩臉粘睛四症大同小異此皆上胞下臉之病然中間分折治法各有輕重深淺兼洗針烙不同胞肉生瘡者此脾胃熱毒胞肉虎蒼或風粟變而爲瘡血熟化膿腐爛腥臊流汁流膿浸漬墨睛生翳眼如珠砂之色此症雖火不可不知治用陰二陽十藥日月桑白皮煎湯入枯礬鹽化帛轉眼皮以鵝翎刷洗有瘡處以血竭乳香没藥輕粉彌陀僧或有瘡處烙二三十無妨

問曰胞肉生瘡碍睛睛珠者何也答曰胃得心熱也治宜瀉心火解胃熱用八正散三黄湯之類痛者用

沒藥散有瘡處仍用剃洗點以清涼及重藥肉虛者
宜烙外用清涼消毒膏敷之
八正散 在前大背赤脉條下
三黃湯 在前努肉條下
血滯疼甚服
沒藥散 治心脾胃得熱致胞肉生瘡宜服
大黃多用 真血竭破積血止痛去赤 沒藥少
朴硝多
右照多少加減爲末每服二三錢食後用茶清調下

臉生風粟



臉生風粟者臉間積血年久致生風粟與眵粘症同
眵粘者無風粟故又作一症胞者上胞也臉者下臉
也此脾胃壅熱致令胞臉之間漸生風粟如米甚如
楊梅之狀摩擦瞳人黑睛有翳治法番轉臉風粟逐

箇用鋒針密針三五度亦烙更妙晴有翳者用陰三陽五藥吹點二三夜吹一次忌口動風動血之物莫喫可也

問曰下臉生風粟如楊梅之狀者何也答曰脾得邪熱血滯不行致生風粟紅蠹不平宜剃洗脾熱用瀉脾湯久患宜烙點用清涼可也

瀉脾湯

人參　黃芩　大黃　桔梗
白茯苓　芊硝　茺蔚子二兩　白芍藥一兩
黑參兩半　細辛　白花各一兩

右各等分加減每服四五錢水煎服

天行赤眼



天行赤眼者謂天地流行毒氣能傳染於人一人害眼傳於一家不約大小皆傳一遍是謂天行赤眼腫痛沙澁難開或五日而愈此一候之氣其病安矣治

法此症再不可剃洗只用童子小便煎黄連露宿温洗日進五遍以解悪毒之氣更用胡宣二連礬雄黄共研細調姜汁點一眥通其悪涙其痛立止或酒調散服之二三貼無妨此症只氣候瘴毒之染雖腫痛之重終不傷黒睛瞳人也

問曰一人患眼傳於一家者何也答曰天時流行瘴毒之氣相染治宜解毒凉血清熱痛甚者服用洗肝散七寶洗心散點用清凉散加解毒但此症與内無損極甚者二七不療自愈切不可剃洗去血

七寶洗心散　方在大眥赤脉條下

洗肝散　治暴發赤腫天行赤眼時常眼痛宜服

大黄　梔子　防風　薄荷
當歸　川芎　羌活　甘草

右一兩爲末食後熱水調二三錢服

大患後生翳



下治字法字誤而正可在宣字上

大患後生翳者與天行赤眼同一症也何分兩症治之天行赤眼只一候或七日愈矣雖同無生翳之患大患者初起陡然而起腫痛發來甚重沙澁難忍增寒作熱坐卧不安或通夜行至達旦羞明怕日淚出如湯鼻涕溏流兩眼腫起如桃日夜呻唫飲食無味二七不愈遂生翳如黃膿疥瘡占在風輪其腦牽痛治宜治胡宣二連藥照前研細調姜汁點用苦桃葉側栢葉菊葉柳葉薰洗服宜四順八正導赤散雖療痊可赤昏昧三個月方得復舊失於調治喪明必矣

問曰天行赤眼後生白翳者何也答曰邪氣甚傷經絡也外邪甚則傷肝肝受傷則生翳治宜四順散細辛湯點用熊膽膏翳厚者用九一丹點

四順湯　治經絡得熱大患後生翳宜服

大黃　當歸　甘草　赤芍藥

右各等分每服四五錢水煎食後服

細辛湯　治風邪傷肝致眼生翳

羌蔚子　黑參　黃芩　桔梗

大黃　車前子　木通　生地黃

甘草

右各等分水煎食後服

暴露赤眼生翳



暴露赤眼生翳者與天行赤眼同理天行赤眼者能傳染於人暴露赤眼但患於一人而無傳染之症天行者雖痛腫而无翳暴露者痛而生翳故此有別治法叩其所因量其老少虛實熱則清涼之氣結則調

順之此眼縱有瘀血切不可剃洗亦不可峻補藥宜酒煎散發散內有麻黃蒼朮或大黃當歸散疏通血氣點以淡藥九一丹如翳厚珍珠散點之洗以黃連當歸防風菊花側栢葉赤芍藥薄荷荊芥之類

酒煎散

漢防已　防風　甘草　荊芥

當歸　赤芍藥　牛旁子　乾菊花

右各等分酒煎食後溫服

大黃當歸散　治眼壅腫瘀血凝滯不散攻發生翳服

當歸酒浸二錢　菊花三錢　大黃酒蒸　黃芩各一兩

紅花炙用　蘇木　梔子酒炒　木賊

右水煎食後服

暴風客熱



暴風客熱與暴露赤眼同也暴露者肝心二經病也故赤而痛致黑暗生翳暴風客熱者肝肺二經病故白仁生虛翳四圍壅遶朝伏黑暗四入白仁紅翳壅起痛澁難開故分暴露與暴風有別之症暴者乍也驟也陡然而起治法疏通退熱涼膈瀉肝增減酒調之劑發散風熱恪云熱眼忌酒孰知酒能能血藥無酒不能及於頭目也此眼不同剩洗不可點涼藥暴客之和來之速去之亦速耳非比五臟六腑蘊積發歇不時之症同俗為傷寒眼也

問曰白仁壅起包小烏暗疼痛難開者何也此是肺經受毒風不散久則發熱攻人眼中致令白睛浮腫名曰暴風客熱宜服酒調散補肝湯用搜風煎洗服

瀉肝散　治眼發歇不時

羌活　黄芩　黒參各半兩　桔梗

大黄　芒硝　地骨皮各一兩

右每服六錢水煎服

補肝湯

藁本一兩　白芷　車前子　石決明

天麻　赤芍藥　防風　細辛各一兩

右每服三錢米湯調下

搜風煎　洗眼治眼中有黒花

陳皮　秦艽　防風　細辛各一兩

黄連　木香各五錢

右爲末水一鍾浸一宿去査入龍腦一錢蜜四兩漫火熬成膏點之不用蜜煎湯薫亦可

又以當歸活血煎主之腫痛甚亦用雙解散酒調散發表之點用重藥加姜粉以辛散之

雙解散

防風　川芎　歸尾　赤芍藥

大黄　麻黄　薄荷　連翹

芒硝　黄芩　桔梗　石膏

滑石　荊芥　甘草　山梔

白木 實者去之

右等分水煎食後温服如暴發加葱三根

風甚眼痛

桑螵蛸酒調散 治眼紅痛痛有血翳壅腫服之

當歸 甘草 大黄 赤芍藥

菊花 蒼朮 桑螵蛸 羌活

麻黄 茺蔚子

右各等分用水煎食後加酒温服如熱甚加大黄朴硝或爲末温服酒調服三錢

痛如神祟



疼如神祟舊無根基只依痛得怪異或日痛而夜愈或夜痛而日愈如艾之灸針之刺忽來忽往無蹤無跡號曰痛如神祟豈有神祟爲禍而害眼孰知陰陽偏勝動靜氣血攻擊使然亦有信巫之地因所禱厭

痕作福而愈者有之孰知病勢將除偶因而愈曰神
祟眼非也治法痛時只將艾葱熨之服酒煎散一二
貼住痛點以時藥洗以歸尾白芷防風芍藥川芎生
地黄止痛散血可也
問曰眼内不紅不赤不腫乍痛如神祟者何也荅曰
陰陽升降不和氣血偏勝相攻便然或有血虚者下
午痛或有氣旺太甚者上晝痛下晝痛者宜服助陽
和血湯上晝痛者宜服酒調洗肝散明目流氣飲點
清涼之藥又有一樣眼時時痛如針刺此是新血與
舊血相攻擊治法亦同

血氣虚服

助陽和血湯　治血氣不調如神祟痛如針刺服之
蔓荊子三分　香白芷三分　柴胡　黄芪
升麻各四分　甘草炙　當歸身酒浸　防風各五分
右作一貼水一鍾半煎八分温服臨避風處睡可也
又并渣服

熱氣攻痛

酒調洗肝散　治眼熱氣上攻無時黑睛痛者服之
黑參　大黄　桔梗　知母
朴硝　梔子　黄芩　熱甚者加

生地歸尾之類

右爲末每服二三錢温酒調下目服二次

熱氣鬱結

明目流氣飲　治氣鬱眼目亦腫服之

菊花　細辛　大黄　牛旁子

川芎　蒺藜　荊芥　玄參

甘草　蔓荊子　防風　梔子

黄芩　木賊　蒼朮　草决明

右各等分水煎食後服

痛如針刺



眼痛如針刺者即是神祟症中如艾之灸如針之刺痛同然此症皆因心臟潛伏熱毒風壅在於膈間目眩頭疼眼絲常急夜卧澁痛淚出難開時時如針刺相似急服瀉心湯八正散之劑口含水嗃以雄黄散

正其頭點以時藥消散血氣洗以側栢葉防風荊芥薄荷黃連生地黃之類黑睛有星如釘之釘凹進痛如針刺點以淡藥可也

鴻心湯　方在前雞冠蜆肉症內

入正散　方在前胞肉生瘡症內

傷寒熱病後外障



傷寒熱病外障者蓋由大病新瘥出早形骸羸瘦臟腑未實氣血尚虛陰陽偏勝未復縱口多毒五辛油膩煎炒一切熱物之類蓄積諸毒衆聚停留于內熱邪必表于外攻冲於眼眼者五臟六腑之精華其症各現於五輪此症發時赤腫淚出痛澁難開瞳人闊大黑花繚亂不能遠視此血虛也治法點以時藥洗以散風前證活血之藥不宜剩洗只平補臟腑損其有餘益其不足是為活法也宜忌三兩月可也

問曰兩目或發腫痛者何也答曰氣血不足虛陽攻上故也此症縱有疼痛切不可服瀉藥涼藥只宜和

解之痛腫甚者明月細辛湯熊膽丸地黄湯之類點三七丹腦射不用又不可剃洗

風熱作痛

明月細辛湯　治熱病後患腫痛大便結羞明服

川芎　生地黄　蔓荊子　歸尾

白茯苓　藁本　荊芥　防風

麻黄根　羌活　川椒　細辛

密蒙花

右各等分食後温服日一次

熊膽丸　治肝膽得熱火和爲病用清熱解毒

能膽一箇　石決明　車前子　澤瀉

細辛各一兩　乾地黄　茺蔚子　牛膽一箇

龍膽草

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九丸食後温酒送下

地黄湯　治眼久病昏澁因發而久不愈宜服

防風　羌活　人參　白茯苓

當歸　熟地黄　黄連　黄芩

右各等分水煎温服

風牽出臉



風牽出臉者脾胃受風毒出胞臉之間臉受風而皮緊脾受風則肉壅風牽出臉淚出汪汪無分四季此土陷不能提水也水漬於臉隱爛之狀治法先用摩風膏刮散皮外風邪塗以白斂膏消

散風毒當轉臉皮格三五度無妨此症一年半載易治若年久肉堅難治若眼有紅筋貫上黑睛有翳有膜吹以丹藥瘴塌洗以碧天丹此症大抵眼弦之病也此症大風癩癆之人面部所牽多受是病症難以調治故名風牽出臉

問曰下臉當出从不能提水也治法肉堅厚者用受風邪所傷致土壞不收淚出汪汪者何也答曰脾經灸烙二十五度至皮轉爲度服用夜光柳紅丸外用摩風膏摩擦之點用重藥水加凉夜光柳紅丸　治風邪傷胞臉致風牽出臉不收宜服

人參　川芎　荊芥　白芷
川烏火煨　南星　石膏各二兩　石決明
草烏去火濕炮少用　藁本　雄黃　細辛
當歸　蒲黃　蒼朮浸少　防風
薄荷　藿香　全蝎各二兩　何有烏兩
羌活三兩　甘松一兩

右爲末煉蜜爲丸每服三十丸茶清下

摩風膏　治胞臉受風或疼痛諸痛處可摩可貼

木香　當歸　白芷　防風
細辛　藁本　黑附子一　沒藥

骨碎補各一兩　川烏　赤芍藥　肉桂各兩
猪脂　牛酥　鵝脂各四兩

右爲末香油八兩浸一次一日砂鍋內熬入牛酥鵞脂同熬成以手摩擦有瘡處或半身不遂用砂弓刮之使風氣散

風　牽　喎　斜



風牽喎斜者雖與風牽出臉同喎斜者脾胃虛房事不節脾胃有毒夜卧多痰或醉飽坐卧當風貪涼左右忽受風牽喎斜眼内赤痒時時頓動其眼血絲四起瞳人不開大視物濛濛甚至半身不遂治法急用摩風膏擦摩面部更以刮沙弓所患風一邊手臂通刮或通身一可刮一日一遍用大磁青碗搗碎入磁石多寡搜麵糊爲餅烘熟貼面對鼻一邊左喎貼右右喎貼左貼至撦口眼正其藥取起又可灸夾車耳門穴開口取之太陽人中承漿喎左灸右喎右灸左近患者易治若年久難治

問曰目睛斜視倒日者何荅曰肝經受風邪所牽使其筋緩縮不利治法宜灸火發散風邪以加全蝎白附子南星半夏夜光柳紅丸外用摩風膏導引發散目睛必轉

灸火穴

太陽　夾車　耳門　聽會

耳尖　風池各一穴

方在前出臉症内

夜光柳紅丸

方亦在前症内

摩風膏

被物撞破



被物撞破者並無所患有所因者三ツ此外因也全然無事誤被物撞破或打着或跌着或撞破傷胞瞼也積血紫青撞破白仁傷其硬殼此不能爲害惟撞破黃仁風輪血灌瞳人煞氷輪混雜最爲利害之症控

痛惡瞳忽澁難開治法服以酒調散熨以葱艾或專以生地黃搗爛作餅烘熱貼一日一換以散其血如無生地黃用芙蓉葉無葉用根去泥粗皮用白皮搗爛烘熱貼亦可若眼眶青黑搗生蘿蔔護貼切宜將息避風忌口動風動血之物諸般血肉莫吃新撞者易治若撞久血凝不散無痛者難治也

問曰並無所患誤被物撞破或生翳者何也答曰外傷也與內無猶治法扔起者宜散血爲主痛甚者沒藥散止之若至血散變生白翳爲不治之症也

方在前胞肉生瘡症內

沒藥散

撞刺生翳



被物撞刺生翳者與撞破一理然刺被竹木簽刺痕傷損血灌漑遂生血翳磣澁淚出紅筋滿目此症外傷與患眼生翳不同患眼者五臟六腑之毒發出爲有根病也刺傷者外傷與內無預治法與同症同寬

一七之後痕變成翳可用輕丹少少吹點忌淫慾嗔怒避風將息失於調治潰痛發腫傷於風輪釀成大患或至瞎進無治法也

血灌瞳人



血灌瞳人者因毒血灌入金井瞳人水內也猶如水

流入井中之状清濁相混時痛澁紅光滿目視物濛濛如隔絹看物若烟霧中然先患一隻後乃相牽俱損此症有三肝症血熱日積月累灌入瞳人血凝入水此關乎肝腎二經病也此血難退撞破之血鮮而熱灌雖甚退之速又有開金針失手撥着黄仁亦有瘀血灌入瞳人舉此三症治法頗同亦用大黄當歸散没藥散墜血明目丸前被物刺破及撞刺生翳并血灌瞳人皆可服前三料藥其效甚大或生地黄芙蓉根搗爛烘貼三症通可用之或葱艾熨亦可或可方而或可圓活法而行不可拘執其方焉而獲功哉

問曰人患眼目無内患忽因物刺着胞瞼睛珠血積不散或瘀血灌入瞳人或用針悞損惡腫痛難忍或因惡拳打着睛珠脱出一二分者將何治法答曰打傷之時搗爛生地黄敷之以散其血先服止痛没藥散後服墜翳明目丸若因傷風服除風湯若打着睛珠流出者以手掌心搽進珠亦以生地黄敷之若無生地黄用乾地黄酒浸濕搗爛亦可服止痛没藥散

没藥散

没藥　血竭　大黄　朴硝

右爲末每服三錢酒調下茶下亦可

墜翳明目丸

石決明　川芎　五味子　知母

山藥各一兩　人參　細辛

右爲末煉蜜爲丸清茶送下

除風湯

防風　車前子　藁本　五味五

細辛　川芎　桔梗

右每服三錢白湯送下或水煎服

血翳包睛



問曰人之患血翳遮兩睛者何也答曰皆因心經發熱肝臟虛勞受邪熱致令眼中赤澁腫痛淚出漸有赤脉通睛常時舉發久則發筋結厚遮滿烏睛如赤肉之相故名曰血翳包睛宜服瀉心湯次以修肝活

血湯

瀉心湯

黄連　黄芩　大黄　連翹

荊芥　赤芍藥　車前子　薄荷

菊花各一兩

右㕮咀每服四五錢水煎服

修肝治血湯

當歸　生地黄　赤芍各半兩　川芎

羌活各七錢　黄芪　防風　黄連

大黄　薄荷　連翹　菊花

白蒺藜各一兩

右每服四五錢水煎入酒二盞温服

問曰血翳包睛者何也荅曰心熱血旺也此病初患易治若至血散盡難消痛時用破血紅花散當歸龍膽湯點用清凉散

當歸龍膽湯

防風　石膏　柴胡　羌活

五味子　升麻　甘草　黄連酒洗

黄芪　黄芩酒洗　黄栢酒洗　當歸

龍膽草　赤芍藥各五錢

右㕮咀每服五錢水煎至二碗去查入酒少許臨卧熱服忌言語

破血紅花散

當歸稍　川芎　赤芍藥　枳殼
蘇葉　連翹　黄連　黄芪
梔子　大黄　蘇木　紅花
白芷　薄荷　升麻

右各等分水煎加酒三盞温服

臉生偷針



問曰人之患目臉生小節偷名偷針者何也荅曰陽明胃經之熱毒也或因食壅熱之物或飲酒太過使胃經上充於眼目故臉眥之間時發瘡毒俗名偷針此疽番轉臉皮剃洗瘀血點用清涼散先宜服退赤散後用通精散瀉脾飲

退赤散

黄芩　黄連　白芷　當歸
赤芍藥　梔子　桑白皮　木通
桔梗　連翹　毎服水煎食後服

通精散

防風　川芎　當歸　赤芍藥
大黄　芒硝　蒺藜　石膏
黄芩　甘草　桔梗　牙硝
黄連　羌活　滑石　荊芥

右用姜三片食後服

瀉脾飲

茺蔚子　防風　黄芩　玄參
梔子　石膏　大黄炙　知母
黄栢

黒翳如珠



黒睛如珠者腎肝俱労七情鬱結之人毒風攻充熱
極淚出難開疼痛甚至水輪突起黒翳如豆如珠大
小不定撑起眼胞磣澁礙人眼睛難以運動寢食不
安先患一隻后乃相牽俱損治法用小鋒針逐箇横
穿破其黒翳中有悪水流出即平勢若拾芥瞬息痊
安眼即能開設若不諳此療服凉剤點凉薬靡有其
功小兒如此患者多是痳眼其翳起來或如小香菰
之狀不宜針其治法載小児痳眼條下其針破翳根
處宜淡丹薬吹點消磨翳根
問曰風輪生翳如珠如蠅頭如蠏眼者何也荅曰肝

腎二經風熱氣鬱也治法久積黒翳高者宜挑破珠
頭疼者宜撥雲湯明目細辛湯主之熱甚者當歸龍
膽湯主之點用二八丹調乳汁用未成此症以暴発
推之

撥雲湯　治眼黒翳如珠蠏睛疼痛風氣傷肝腎二經
宜服之

黄芪蜜炙　細辛　生薑　乾葛
川芎熱者除之　柴胡　荊芥　藁本
甘草　升麻　當歸　知母
羌活　防風　黄栢

蠏睛疼痛



右爲末每服六七錢水煎服
明目細辛湯　方在傷寒熱病後症內
當歸龍膽湯　方在前血翳包睛症內

蟹睛疼痛者如黑翳同症起於瞳人肝腎之病馬其翳如豆如珠蟹睛者其翳起占瞳人翳根小而苗大此乃貼膈之病膈中雍毒貼氣伏熱赤澁淚出疼痛難開羞明怕日其翳發起尖高如蟹睛一般形狀治法與前症同用小鋒針出惡水流盡即平吹點以淡淡丹藥清其翳根其服藥不同前症宜用瀉肝補腎之劑服之空心服補腎之藥飯後服瀉肝散

瀉肝散　補腎散

蟬蛻　防風　蒺藜炒　當歸

密蒙花　木賊　川芎　菊花
荊芥　茯苓　石决明　煅過　枸杞子
知母　黄栢　青塩

右各等分水煎空心服

旋螺尖起



旋螺尖起者熱積於肝貼毒壅於膈門充攻睛珠疼痛中央瞳人漸變青白色忽然凸起血絲纏遶此乃是膜入水輪二家併熱旋起尖來狀若螺尾遂號旋螺尖證治法宜陰二陽四丹吹點或調鱔魚血點尖處若年久須有鋒針對瞳人中央針入半分放出惡水此乃取平之法紙封將息避風忌口十數日可也服用雙解散鬱金酒調散

鬱金酒調散

黄芩　鬱金　大黄　防風
梔子　當歸　川芎　赤芍藥

龍膽草

右爲末每服三錢温酒調下食後服二次

突起睛高



突起睛高險峻利害之症也同前旋螺尖大不伴矣皆因五臟毒風所蘊熱極充眼者内屬五臟外現五輪五臟之氣毒攻五輪之瞳初起麻木疼痛汪汪淚出病勢洶湧卒暴之變莫測非精於龍木之奥旨不能措手矣諺云眼不翳不瞎正此也苟非其人殆有甚焉非徒無益而反害之治法揚湯止沸莫若去薪息火急投酒調散酒煎散宣退五臟之毒熱搗葱艾熨五輪之突起消除疼痛洗以白芷細辛當歸蒼木麻黄防風羌活未可與點藥宜忌口葷腥將息避風治若稍遲或控膿或突出一寸高者至此之際須鋒針針出惡水疼痛方止睛高取平耳無尤之效也

酒調散

○當歸　○甘草　○赤芍藥　○菊花
○羌活　○桑螵蛸　○茺蔚子　防風
荊芥　木賊
右各等分水煎食後加酒三盞温服

硬臉硬睛



硬臉硬睛者胞臉睛珠俱木痛濕難運膈間積熱肝風上壅氣血凝滯睛臉堅硬血旺氣虛弱之人或飲酒大腸堅結多受是症先患一眼後乃相牽俱損漸生翳膜治法初發時宜摩風膏摩去風邪散運血氣或煎生地黄當歸川芎赤芍白芷羌活薰洗日三度宜瀉肝膈之熱點以時藥若積年久臉有瘀血宜剃洗黑睛有翳有膜可吹可點

問曰眼患經久臉胞睛珠俱木不運者何也荅曰血氣受邪凝閉不行故也治法宜剃洗服用當歸活血煎助陽和血湯點用重藥加辛熱姜粉之類

當歸活血煎　方在前兩臉粘睛症內
助陽和血湯　方在前傷寒熱病症內

白陷魚鱗



白陷魚鱗者肝肺二經積熱充壅攻上致黑睛遂生白翳如魚鱗鋪砌之狀或如棗花中有白陷發歇不時或發或聚疼痛淚出然婦人多生此病何也苦樂不由已出七情鬱結不舒毒蘊於肝肝者血之室也婦人以血爲主血傷則肝風黑仁風輪多生是翳甚至白陷釘入黃仁引血相授漸成大患額頭兼痛用摩頂膏摩擦封貼於額頂處用陰二陽四丹吹點或用青鹽黃泥固濟包煨熟研末以鴨毛蘸點於魚鱗中日一次又能除此翳耳

問曰黑睛生白翳凹入不平成陷者何也荅曰肝虛血衰也故肝虛則受風風甚則作痛血衰則成陷治法點用珍珠二八丹之類

酒調散　痛甚宜服方在前突起睛高病內　沒藥散　方在血灌瞳人病內

蟬花散　羞明而不痛者宜服　密蒙花散二方在兩臉粘睛症內　桑螵蛸酒調散　方在暴風客熱症內

花翳白陷



與棗花白陷同

人之患眼生翳如蘿蔔花或魚鱗子入陷如碎米者此肝經熱毒入腦致眼中忽然腫痛赤澁淚出不明頭痛鼻塞乃是肝風熱極腦中風熱極致使然也宜服瀉肝散加味脩肝散主之

瀉肝散

黑參　大黃　黃芩　知母

桔梗　車前子各兩　羌活　龍膽草

當歸　芒硝

右為末等分水煎服

加味脩肝散

羌活　防風　桑螵蛸　梔子
薄荷　當歸　赤芍藥　甘草
麻黃　加連翹　菊花　木賊
川芎　白蒺藜　大黃　黃芩
荊芥各一兩

右為末各等分水煎入酒溫服

蟬花散

蟬蛻　菊花　蒺藜　蔓荊子
草決明　車前子　防風　黃芩
甘草　右等溫水煎服

補腎明目丸　方在前蠅翅黑花症內

密蒙花散　方在前兩臉粘睛症內

水蝦翳深



水蝦翳深者黑睛上生翳如水蝦形狀因而名曰水鰕也大抵與魚鱗白陷同也亦因肝經有熱微微小

小占在眼之風輪黒睛含糊清眵填粘於翳之低處
作時赤澁淚出眵滿矇蔽童人一重如鼻涕或黄或
白看則如膜遮障一般蘸却又生日久能致損眼發
歇來往治法宜陰二陽四三夜吹一次稍退宜點侵
晨用菊花側栢葉黄連歸鬚桑白皮之類煎湯日洗
二三次服撥雲退翳散

撥雲退翳散

楮實子　薄荷各五錢　川芎一兩五錢　黄連
菊花　蟬蛻各五錢　瓜蔞根生用三錢　蔓荊子
密蒙花　蛇退各五錢　荊芥穗　香白芷

木賊　防風　甘草各五錢
右為末煉蜜為丸如櫻桃大每一兩作十丸每服一
丸一日二服

治眼引湯于後

氣障木香煎湯下
眼常昏暗菊花好茶下
眼睛無神懶視當歸湯送下
婦人血暈當歸湯下
虚弱之人十全大補湯下

玉翳浮瞞



玉翳者風充入腦積熱肝膈發歇疼痛失於調治日久積累血凝不散結成白翳遮瞞瞳人如玉色相似立名玉翳浮瞞如此之狀有進有退有紅有淚發歇未定治法用陰三陽二藥吹點一次眼淚帶藥汪汪流出如此之狀甚翳膜必能漸漸收捲渾如磨鏡鹿埃去淨明必復矣若發年久無進無退不紅不痛縱有丹藥之驗刀針之利終無措手之處撥雲墜翳眼藥之聖功效不能施為縱然公侯王孫若受此疾為廢人矣雖有千金之貴天下之翳熟近莫能其出手也

問曰人之患眼翳如玉色遮瞞烏睛者何也答曰此同肝風攻充入腦積熱在於肝膈之間久乃腎虛致眼中常發熱或赤痛初則紅腫赤脉穿睛漸漸生白翳膜初起如碎米久則成片遮瞞烏睛凝結如玉色名曰玉翳遮睛治之宜服瀉肝散明目菊花散通明

補腎丸
瀉肝散　治胃中熱
歸尾　大黃　桔梗
知母　芫蔚子　車前子
防風　赤芍藥　連翹
薄荷
右各等分每服六錢水煎服
明目菊花散　黃芩
菊花　熟地黃　木賊
蔓荊　連翹　白蒺藜
薄荷

防風　川芎　荊芥穗　甘草
右各等分水煎服
通明補腎丸
楮實子　五味子　枸杞子酌一人參
兎絲子　肉從蓉　菊花
當歸　牛膝　知母
青鹽各一兩　熟地黃
右煉蜜爲丸每服五十丸空心鹽湯下　黃柏

膜入水輪



膜入水輪者肝臟積熱邪在肺経此金尅木之候也故黄仁乍時生瘡白色可後又發日往月来致膜漸入水輪此翳之根也如水之得土變化異常遂生瘡不退日積月累久成大患謂之膜入水輪流汁流膿

痛澁難開右患傳左右患傳右治法宜明藥之時熨以葱艾吹以丹藥服以湯散無有不效若傷日久不痛不疼不淚不紅如釘入木如玉之有瑕玷如玳瑁之有黒點此黄仁與水輪変白定矣縱使岐黄龍木再世亦不能爲也

問曰風輪生瘡或突起愈後変成白翳久不散者何也荅曰肝木衰金氣甚也此病初患時有疼有淚治宜退血瀉肺金修肝活血無疼無淚淡白色者宜服補煖活血之劑治之

瀉肺散

當歸　黃芩各一兩　桔梗　麻黃
枳殼各半兩　秦皮　葶藶　菊花
旋覆花　生地黃　防風　白芷
耳草　玄參　梔子各一兩　地骨皮八錢
右爲末每服二錢桑白皮煎湯下

脩肝活血湯

歸尾　赤芍各一兩五錢　川芎　羌活各七錢
黃芪　防風　黃連　大黃各三錢
薄荷　連翹　白蒺藜　菊花各一兩
右每服四錢水煎入酒服

風輪釘翳



釘翳根深者與膜入水輪同也此乃勞傷肝經或性燥急促之人啼哭含情之婦欲強制鬱傷於肝赤澁難開痛牽頭腦淚出羞明怕日釘翳日深接引黃仁

根深血援終不移治法宜用退熱飲去風散血之劑
或痛甚服酒調散 一二貼頭痛熨以葱艾洗以防風
川芎菊花歸尾白芷麻黃羌活荊芥之類量翳大小
輕重吹以丹藥將息避風大忌淫慾嗔怒不疼不痛
亦爲不治之症也
問曰風輪生翳如針如麻米者何也荅曰肝虛火動
也此症多是性燥之人或思慮太過所致治法疼痛
甚者宜服洗肝散糖煎散點用珍珠散加凉膈散方
俱在前

修肝散

梔子　薄荷　防風　當歸
甘草　連翹　大黃　黃芩
蒼朮　羌活　菊花　木賊
赤芍藥　麻黃

右各等分爲末每服二錢食後蜜水調下或煎日進
二三服

糖煎散

龍膽草　防風　防已　大黃
荊芥　赤芍藥　當歸　甘草
川芎

右各等分爲末水煎臨時服入砂糖少許同服

黃膜下垂



黃膜下垂者脾胃熱風結血凝氣滯肓脂窒塞血運不能周故生是疾發歌無時痛澁淚出漸生黃膜下垂發則膜舒退則膜捲胞皮下垂羞明怕日雖舉不

張黃膜漸長遮瞳瞳人也甚至滿目皆黃難辨人物治法雖不是拳毛倒睫之症亦可夾此眼皮使露黑睛黃膜氣舒發歌手足可夾乍發不宜夾治宜通脾寫胃撥雲八正之劑以對充之加片腦少許如有淚退之速無淚退之遲忌吾齋戒使衰其血易於調理也又有一症黃膜從下生上爲之黃膜上充大抵治同厚者宜挑剪

問曰如睛黃赤生翳如赤膜者何也答曰脾胃得肝木克土之候也治宜省味金花丸去其黃膜後用砂平青丸收功點用重藥腦不可用火許

針砂平胃丸　久服平胃氣去肝邪

蒼朮　厚朴　陳皮　甘草

針砂

右各等分㕮咀爲末煉蜜爲丸如菉豆大每服五十丸空心米湯下

省味金花丸　治脾胃積熱致生黃膜

梔子　黃芩　黃栢　桑白皮

地骨皮　桔梗　知母　甘草

右爲細末煉蜜爲丸茶清送下

赤膜下垂



眼胞下生赤膜垂下遮於黑睛疼痛者乃胃熱也治法紅痛甚者服鬱金酒調散大黃當歸散微退後用撥雲湯生地黃散點用重藥加清凉散藥以上方俱在前

大黄當歸散　治胃中有熱生膜疼痛

當歸　赤芍藥　川芎　菊花

大黄　黄芩　杏仁　薄荷

右各等分㕮咀食後水煎温服

生地黄散　治眼下赤膜發歇無時久服則不發

生地黄　黄栢　知母　防風

荊芥　升麻　乾葛　天花粉

黄芩　甘草　桑白皮　白茯苓

赤芍藥

右㕮咀每服七八錢重水煎食後服

逆順生翳



逆順生翳與赤膜下垂與黄膜下垂上充之症頗同然此順逆者五臟虚勞風熱冲於肝膈上胞陽明經毒壅血氣凝滯故生赤膜垂下謂之垂簾翳此爲順下臉大陰肝經毒壅故翳膜下生向上謂之逆翳治

法宜服瀉脾胃之劑大抵去翳之藥隨其輕重增減用之宜忌口諸毒

問曰眼上下逆順上翳者何也荅曰肝經虛損積毒熱甚至生翳四起侵黑睛治宜明目流氣飲蟬花無比散點用珍珠散次用三七丹腫者亦可剃洗

明目流氣飲（方在前傷寒熱病症內）治脾得邪熱或逆順生翳

蟬花無此散　治風毒傷目昏暗漸生白翳遮睛

白茯苓　甘草（炙助胃）　防風（各四兩）　川芎

石決明（搗水煮研極細）　赤芍藥（各三兩）　白蒺藜（炒去尖四兩）　蛇退（炙兩）

蟬蛻（去頭足翅四兩）　蒼朮（一兩）　當歸（酒浸二兩）

右爲末每服三錢食後米汁調服茶亦可忌食毒物

漏眼膿血



漏睛膿血者有甚於釘翳并膜入水輪二症之利害也此症未發之時其頭先覺昏悶四肢如勞五臟多積風熱壅毒攻充於黑睛黃仁生出毒瘡灌漑水輪

控血潰爛流膿治法宜葱艾入白芷鍋内炒熱以綿
裹熨於眼胞上屢換熱的散其惡血消其敗膿止其
惡痛生地黄搗爛煨熨於有瘡處更妙用陰二陽四
丹對於有瘡處吹或單用枯礬輕粉血竭乳香研細
對着瘡處吹點亦可洗以桑白皮入塩花明礬煉洗
服以墜血明目丸沒藥散忌動風動血之物
方在前血灌瞳人症内

墜翳明目丸

沒藥散

沒藥　大黄蒸少用　朴硝

右爲末每服三錢酒調下茶亦可

飛塵入眼



飛塵入眼者此症全然無事誤被物或飛塵飛絲入
眼者此外傷也只爲塵物粘在胞臉之間粘定不出
痛澁難開磣澁淚出致生障膜初患之時治法用絲
綿纏耳環脚番轉上下胞臉撥出塵物即可若初時

不諳此法少療日久必生翳膜遮瞞瞳人須有丹藥吹點胞臉內仔細番看有物粘處必定有血積成塊或肉疙瘩此是病之發縱處宜小鋒針挑撥或有刺塵處針毒血出可此爲病之根也曰外病也初起時將絲綿捲銅匙脚撚撥出塵物久者宜番轉看上下有積處剃洗至平點用清凉散服以散血退熱之劑

酒調散

當歸　甘草　大黃　赤芍藥
菊花　桔梗　蒼朮　桑螵蛸
麻黃　羌治　荒蔚子　連翹各一兩

右爲末每服三錢酒調下

修肝散

防風　羌活　當歸　生地黃
黃芩　梔子　赤芍藥　大黃
甘草　蒺藜各一兩

右水煎服

拳毛倒睫



拳毛倒睫者此脾與肺二經之得風熱也肺爲五臟之華蓋主一身之皮毛肺虛損則皮鬆而毛落也脾家多壅濕熱致令上胞常腫太柢肝家受熱不時淚出痛痒羞明怕日赤澁難開常以手摩引致令上下胞臉皮漸長眼漸緊故睫毛番倒裡面刺眼碍澁瞳人漸生翳膜欹頭側視不能正觀治法先宜剃洗瘀血後用竹夾夾起眼皮灸四五壯爲妙使毛生向外其疾瘳耳睛中有翳用陰二陽五丹吹點翳即消磨其夾須依口訣務令緊夾不可滋水恐潰有疤痕若脫下痕處用光粉調香油遂早搽抹久則肉色一般

眼目光明如舊

細辛湯 治脾經腫得風熱宜服

細辛 防風 知母 ○茺蔚子

○大黃 ○桔梗 羚羊角 ○黑參

右㕮咀每服四五錢用水煎食後溫服

防風飲子

黃連一兩 細辛 蔓荊子各二錢 葛根

防風各五錢 當歸身七錢 甘草炙 人參

右水煎食遠服避風忌口

除濕壓熱飲

細辛　蒼朮各一兩　防風　知母
茺蔚各半兩　桔梗二兩　大黄
梔子仁　朴硝　右水煎服

阿膠丸

阿膠蛤粉炒　鼠粘子炒　甘草　糯米炒各一兩
馬兜鈴　疑冬花　紫菀　桔梗
右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸食後細嚼薄
荷湯下

密蒙花散

密蒙花　羌活　菊花　石決明
木賊　黄栢　白蒺藜　黄芩
蔓荊子　青箱子　枸杞子
右每服三錢茶送下水煎亦可

充風淚出



充風淚出者症非一也有腎虚不生肝木肝經受風

而虛損故木動也迎風而淚出肝經虛者宜服止淚補肝散止之大止淚之法點用重藥熟淚者服川芎茶調散點用清涼散肝風者宜蒼朮止之不赤不疼淚出是謂之風淚腫痛赤澁淚出者此熱淚也若迎風而出汪汪冬月多憂月少秋却還生又不分四季皆有此冷淚也冷淚者乳香川烏九川烏一箇草烏二箇去皮明礬一錢白麵塊一箇爲末豬膽汁爲丸如黍米大每用一丸夜臥時放在眼之大凡頭淚止即止或灸止之又有肺臟久冷大凡有殼各爲淚堂淚堂通肺腑此淚難治久流則能令目昏暗血

氣虛弱之人不腫不赤但淡紫紅者澁痛淚出是虛淚

灸法

久流冷淚灸上迎香二穴天府二穴肝俞二穴第九骨開各對寸半

止淚補肝散　治肝虛迎風淚出不止宜灸睛明二穴係太陽頭風池二穴臨泣二穴

蔊菜　當歸　熟地黃
白芍藥　木賊　防風　川芎　蔓荊子　甘草

右各等分爲末每服二十三錢茶酒任下

蒼朮散　治風濕傷肝濕淚昏花

蒼朮　木賊　香附米　夏枯草
蟬蛻　甘草　蒺藜　白芷
防風　蔓荊子　川芎　姜蚕

右依各等分爲末每服二三錢茶清下酒亦可

川芎茶調散　治一切熱淚眼弦濕爛

川芎　防風　羌活　甘草
木賊　石膏炒　石决明炒　荊芥
薄荷葉　菊花各一兩

右爲末每服二三錢食後茶下

肝風積熱



肝風積熱者肝家勞苦七情鬱結二三年間來來往往一發一歇遂生翳膜或聚或散赤澁淚出此症多是夜勤燈光觀書史或雕畫打銀細巧之人久累肝家積熱成風肝若受風必有腦痛不覺漸漸昏蒙治

法有翳者吹以丹藥內服瀉肝省風之劑除肝家之風熱忌口將息一年半載病根除矣其洗眼照依疼痛腫澁眼之方載在前症條下

問曰眼目遞年舉發無時者何也答曰肝經積熱也經云肝勞則氣逆肝寧則氣順氣急則發氣順則欲治宜發時痛甚者服洗肝散省風湯之類常服此數方則能除此病也點用清涼散　洗肝散方在天行赤眼症內

瀉肝散　治肝經積熱

黑參　大黃　黃芩　知母

桔梗　芒硝

右等分為末每服二三錢食後熱水調下日二次

省風湯　治肝熱大旺瞳人不清或細小宜服

防風　犀角　大黃　知母

玄參　黃芩　羚羊角肝虛不用　桔梗

右為末每服二錢水煎入燈心竹葉食後服



生起生花者此是內障此症肝血衰瞻腎二經虛也六陽不舉故久坐傷血起則頭暈眼花或前常見花發數般或赤或黑或白繚亂昏暗不明良久乃定瞳人開大不清此症宜補肝腎或明目固本丸不治恐久變爲青盲內障變爲五風難治之症也固本丸只生熟二地黃天麥二冬加人參也

問曰人之生起眼前見花數般莊莊如蠅翅者何也肝腎二經氣乏也經云肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙眩暈治法宜補腎丸補肝重光丸還睛丸明目固本丸補腎明目丸隨人氣體虛實增減用之

補腎丸　治血氣虛弱變成內障宜服

磁石（火煅醋淬七次水飛过三兩）　肉蓯蓉（酒浸焙）　五味子

熟地黃（酒蒸焙）　枸杞子　兎絲子（淘淨酒浸蒸另研各二兩）

楮實子　覆盆子（酒浸）　車前子（酒浸）　石斛（去根各一兩）

沉香（另研五分）　或加知母　黃栢（各一兩）　青塩（另研五分）

右煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心塩湯下

補肝明目丸　治肝腎血虛視物不明諸眼服涼藥表裏愈後少神光

羚羊角　生地黃　肉蓯蓉　枸杞子

防風　草決明酪一楮實子五匁　乾菊花
羌活　當歸各二兩　羊子肝四兩煮焙
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯
送下日午清茶下臨卧酒下不飲酒人參當歸湯下
明目固本丸　治心熱腎水不足用少精光久服堅
精清心
生地黃　熟地黃　天門冬　麥門冬
枸杞子　乾菊花
右各研末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心
鹽湯下

黃昏不見



人之兩目至日落西之時漸漸不見亦係肉障俗謂之雀盲也此乃腎之虛也眼雖屬於竅門乃歸於腎而爲主腎虛則眼目昏或貪淫樂慾酒色過度使腎臟衰憊禀受天真不全精神短少致瞳人腎神水不

清故目之無光也治之須有還精補腎看人老少虛實斟酌藥餌以平之飲食以補之戒色斷怒使會陰水自然明矣

還精補腎丸　治內障方在目暗生花症內

補腎明目丸　治諸內障欲變五風變化視物不明

川芎　當歸　熟地黃　菊花
山藥　知母　石菖蒲　黃栢
青塩　遠志　白蒺藜　川巴戟
五味子　白芍藥　桑螵蛸　茺蔚子
兎絲子　青箱子　蜜蒙花　枸杞子
肉蓯蓉　石決明

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服四十丸空心塩湯下

十味還睛丸　治下元虛憊一切內障

防風　羌活　密蒙花　青箱子
川芎　蒺藜　甘草　白朮
木賊　兎絲子酒浸三宿生肌焙乾

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸空心塩湯下

瞳人乾缺



瞳人乾缺者亦係内障與外障無預但因頭疼痛而起故列外障條中按此症因夜卧不得肝藏魂肺藏魄魂魄不安精神不定而少卧勞傷於肝故金併不圓上下東西如鋸齒匾缺參差久則漸漸細小視物濛濛難辨人物相牽俱損治法宜瀉膽補腎之劑一

本無眥鴻飛内有肝腎俱虚火旺也用猪肝煮熟露宿侵晨切薄蘸夜明沙細嚼此藥能通明益膽之功瞳人小者肝之實瞳人大者肝之虚此症失於醫治久久瞳多鎖緊如小鈎眼大内結有雲翳或黄或青或白陰看不大陽看不小遂成瞽疾耳初起時眼珠墜痛大眥微紅猶見三光者宜服五瀉湯省風湯同補腎丸及補腎明目丸久服效 方俱在前

五瀉湯 治瞳人乾缺肝火旺及五臓虚火旺動此藥能瀉火

黄栢 知母 木通 梔子

生地黄　甘草　黒參　桔梗
黄芩　防風　熱甚加羚羊角
犀角　黄連
右㕮咀每服六七錢用水煎食後服

痒極難忍



痒極難忍者肝經受熱膽因虚熱風邪攻充肝含熱極肝受風之燥動木揺風動其痒發焉故諸痒屬虚則痒諸痛爲實实則痛黒珠痒者有眼弦痒者點以丹藥或煨姜摩擦淚通痒止或濕痒用碧天丹洗侵晨洗以塩湯或入桑白皮防風荊芥薄荷之類問曰眼迎風受痒者何也答曰脾肝一經受風邪也治法痒時用三霜丸撥雲散綿裹散洗用去風藥

二霜丸　治痒極難忍用此丸即愈

姜粉　枯礬　白明砂

右爲末口津液調和如粟大要用時將一丸於於大

皆止之

綿裹散　治眼濕淚爛弦眼目

當歸　黃連各一錢　銅青七分　枯礬四分　朴硝

右各爲細末用細絹色綿縛緊每一箇約龍眼核大要用時將一箇用白湯半盞泡洗之一日二次

眼內風痒



問曰人之患眼遇風痒極者何也答曰此因肝虛合畜風熱膽經風毒上充入眼遂遇風受痒宜剩洗服

藁本烏蛇湯補膽湯

藁本　烏蛇　防風　白芍藥

羌活　川芎　細辛

右浸酒煎服亦可

補膽湯

刖胡　馬兜苓　茯苓各二兩　柴胡

人參　桔梗　細辛　黑參

右煉蜜爲丸每服三錢水煎服亦可



問曰人之患眼生翳如珠垂簾遮睛者何也答曰此因心火盛炎肝經風熱上攻入腦中熱毒流下住於風輪故眼赤澁淚出腫痛無時羞火烏睛白紅色故名曰垂簾翳宜服洗心散加味脩肝散方

洗心散

荊芥　薄荷　連翹　麻黃
赤芍藥　梔子　黃連　大黃各一

右每服五錢水煎服

加味脩肝散

梔子　薄荷各三兩　羌活一兩
大黃　連翹各五錢　黃芩
菊花　赤芍藥
麻黃　木賊　川芎各一兩
甘草　白蒺藜

右爲末每服三錢用酒調下痛用酒不痛水煎服

鶻眼凝睛



鶻眼凝睛此驟然所感非久患之症因五臟皆受熱毒致五輪振起堅硬不能轉運氣血凝滯睜然如鶻烏之眼凝視不運之貌難辨人物因形而名曰鶻眼

凝睛治法先用香油調姜粉汁於額臉部摩擦及頂上或摩風膏摩擦更好服以酒煎散以被蓋出汗其眼即活動面面用燈火燒之斷其風路此症多是小兒急慢驚風之症大人少有此患

桑螵蛸酒調散 方在前暴風客熱內眼瞳初服

導痰消風散

陳皮　半夏　全蝎　白芷
甘草　羌活　防風　荊芥
升麻　細辛　蘆香

右㕮咀各等分水煎姜二片溫服

轆轤展開



轆轤展開者與鶻眼凝睛症同鶻眼凝睛者睛凝不運之貌轆轤展開而大者此膽腎之水散爲瞳人之太小隨黃仁之展縮黃仁展則瞳人小黃仁縮則瞳人大人不知瞳人能大小者非也此乃肝受風而不展轆轤則瞳人圜圓也隨肝輪而縮竟見瞳人大不收號曰轆轤展開症風充入腦眼帶吊起此症小兒急慢驚風受之治法若前姜汁調香油摩風膏摩擦藥用蚌殼頻頻灌下乳母忌口

問曰瞳人開大不收而展縮者何也答曰肝受風痰盛也治法僻巽錠子牛黃丸石楠散初起者宜發表小兒如此患治法亦同

僻巽錠子　治肝膽受風變成前症小兒通睛瞳人闊大並皆治之

牛膽南星鐵　防風　乾姜各三錢　白附子五錢

牛黃三分　川烏　白芷　薄荷

木香　白木　白茯苓　人參各五錢
硃砂一錢　射香五分　白姜蚕二十箇生用　片腦五分

右將前藥俱研爲細末冬用蜜二斤甘草半斤煎作膏稀稠得宜將次藥末和作錠子金泊爲衣小兒急慢驚風手足搐搦金銀箔磨湯化下一錠太人破傷風酒化下三四錠子約一錢一箇或七分一箇擧此麻黃一斤甘草半斤用水三四碗砂鍋內煎至一鍾之時入蜜一斤緩緩熬煉至滴水內成珠方將前藥搜和爲丸即作錠子也

牛黃丸　能去風痰

牛黃二分　白附子　全蝎　肉桂
芎藭　石膏各一兩　白芷三分　藿香五錢
射香少許　硃砂二錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一二三丸臨卧薄荷湯下

通頂石楠散　能利膈開風痰
石楠藤　藜蘆各一兩　瓜蒂七分

右爲末米湯下一匙日一二度灌入口內去風痰

小兒通睛



小兒通睛與鶻眼凝睛轆轤展開此三症頗同然此症或因外物打着頭額或被諸般人物驚心遂成驚風之症風熱傷肝魂不應目風邪上壅黃仁不成關鎖瞳人開惟直視不辨人物致眼通睛通者黃仁水輪皆黑似無黃仁瞳人水散似無瞳人此黃仁與瞳人通混不分號曰通瞳亦風藥摩擦二法發散風邪宜服牛黃丸不須點藥只服藥然前症牛黃丸通頂石楠散亦可用也

牛黃丸　通頂石楠散　三方俱在前症條下

五七犀角飲

犀角　人參　茯苓　甘草

遠志各一兩　射香少許　龍膽草　黃芩各五錢

右㕮咀水煎服

小兒疹痘



小兒痘疹者名爲百歲瘡也不論大小俱患一度疹痘入眼症有兩分痘瘡初上皮膚之際眼閉不開眼上即有痘瘡點在黑睛上易治急取益母草煎湯燻洗日三度更以陰一陽五丹調鱔魚血點忌口及夜啼乳母亦忌口須疹痘痊可其眼漸開眼中之痘亦隨而痊矣又有一症疹痘之後瘡痂落盡肌體肥壯眼中忽然紅澁此乃餘毒鬱結於肝而發出此症十分利害失治多能害目只用車前草擂水頻與吃下洗却肝經之熱毒洗以益母草點以鱔魚血調藥經曰疹痘之後毒氣鬱結發肝而氣不能泄攻發於眼傷於瞳人者素無治法也

問曰小兒此症入眼者何也答曰小兒痘瘡之發五臟皆熱毒之氣壅塞停留熱氣在肝膈充入眼使疼痛淚出怕目羞明難開遂生瘡於眼內久發變爲白

膜衫覺瘡入眼中赤澁之時急將藥泄其毒外以退翳之藥若不能爲終身之患也先將秦皮湯洗目眼紅花退翳散服之効

秦皮湯　洗眼

秦皮　秦艽　防風　細辛各兩

甘草三錢　右將水二盞煎至一半熱洗

紅花散

紅花　連翹　當歸　生地黃

紫草　大黃　甘草　赤芍藥

右燈心竹葉水煎服

退翳散　即猪肝散

真蛤粉　谷精草　夜明砂

右爲細末用猪肝二兩切開摻藥於內以麻扎定煮水冷將肝同藥細嚼煮肝本汁嚥諸般毒物莫吃

小兒眼生翳



小兒眼生翳者脾胃實熱所致或是胎中受毒或因乳母好食熱物皆能令小兒患眼量兒之大小疾之遠近輕重一週半載者其藥須令母吃或蛤殼灌入小兒吃可也二三歲者此是胎毒也離母之後患眼者此是小兒自受之症與母無預此藥須令小兒吃忌以油膩煎炒糖甜菓子之類不獨患眼所忌不忌多生驚症變爲痒傷亦能害目甚至不治之症其痒眼別有餘條欵此乃小兒生翳症也黑睛如麻豆大如蘿蔔花與痒眼大不侔矣一倍三黃丹一倍珍珠散點用

加味脩肝散

梔子　薄荷　連翹　麻黃
赤芍藥　羌活　當歸　大黃
黃芩　菊花　木賊　白蒺藜
川芎　甘草　右水煎食後服

痘疹入眼



問曰小兒疹痘入眼者何也答曰小兒於母胎中受其毒必發疹痘出之時五臟俱有熱相攻或肝臟熱甚必有痘生於目內宜服

涼肝散

草决明　天花粉　甘草　赤芍藥
綠豆皮　谷精草

右爲末每服六錢蜜水調下

問曰小兒痘疹傷眼者何也答曰內臟虛熱上攻也治法經云切不可瀉餘毒宜用微凉劑和解此症初起睛上紅紫澁痛可用通神散或車前草擂蜜水頻頻與吃洗去肝中次邪若至喪明睛中有翳或四入者經云疹痘之後毒氣鬱結於肝傷於瞳治素無治也

通神散　治小兒疹痘用此能解毒

白菊花　菉豆皮　谷精草　石决明

右各等分爲末每服二錢乾柿一箇米汁水一盞同煎候水乾不拘時服能服湯藥只將本方煎服亦可

救苦觀音散

桔梗　當歸　連翹　藁本
細辛　蒼朮　龍膽草　羌活
黃連　知母　黃芩　黃栢

川芎　柴胡
生地黃　紅花　防風
右各等分煉蜜爲丸能吞者每四五十丸服小者磨
服之
逍神散　升麻
菊花　谷精草　密蒙花
蒼朮　石决明　茸草　葛豆皮
蝉退　木賊　黃芩
右各等分水煎食後温服



問曰大人小兒雀目至申酉時不見物者何也答曰肝虛受邪熱所傷經絡凝滯不和陰陽不和榮衛不通夜至昏也治法宜服五膲丸蝙蝠肝散又宜服蒼蟲散豬肝散主之不用點藥虛極者諸補藥亦可增減用之

蒼蠅散

用蒼蠅翅草及花爲細末用白水煑猪肝露一宿空心煎丸又可服猪肝散

猪肝散　即退翳散　方在前小兒疹痘症内

五膽丸

熊膽　一箇　黄牛膽　二箇　青魚膽　一箇　鯉魚膽　一箇

青羊膽　一箇　石决明　二兩　夜明砂　一兩　射香　少許

右爲末將前膽和爲丸如菉豆大每服三十丸空忘茶下

蝙蝠散

蝙蝠肝　一箇　石膏　一兩　黄丹　煅　石决明　煅

白蒺藜　炒各一兩　若無蝙肝用羊肝加夜明砂

右將前藥研細末每服二錢米湯調下無蝙蝠肝用羊肝一塊切作四塊以藥一二錢糝肝内以麻縛定用米汁水罐内煑熟次早取出羊肝藥細爵以煑肝汁同食効如體虚弱之人亦可服補藥爲丸尤妙

胎風赤爛



胎風赤爛者其症有三初時血露入眼洗不乾淨而生是疾遂至赤爛又有在母胎中其母不知忌口多食壅毒之物酒麵五辛之類至産生三四箇月兩眼雙赤眵粘四眥紅赤濕爛此是胎毒所致此小兒在腹中飲母血血毒於兒生出方發此症也又有乳母壯盛之人抱兒供乳之際兒口未哺乳頭汁脹滿其汁洒然射出充入兒眼亦能生此爛濕若充射面部則能生疵濕瘡痒大抵此三症通號曰胎風赤爛孰知内有三因之由血露不淨與乳充射宜碧天丹洗胎毒者須母服三黄丸忌口其兒亦用三黄湯煙洗

點以時藥可也服宜小防風湯小承氣湯小菊花膏導赤散此数方随冷熱用之或童子患眼者治法亦用此数方加減點用時藥

小防風湯　此数方治小兒胎風赤爛小兒眼生翳

大黄　梔子　甘草　赤芍

歸尾　防風　羌活

右等分水煎食後服

小承氣湯

大黄　薄荷　杏仁　蟬退

甘草　羌活　天麻　當歸

赤芍藥　防風　右水煎服

小菊花膏丸　治小兒風毒眼

黃連　枯黃芩　大黃　乾菊花

羌活　蒼朮　荊芥　防風

右爲細末煉蜜爲丸每服四五十丸或爲膏

小兒痱傷



小兒痱傷之症富貴之家多生是疾蓋由父母速愛之由也小草如草木之萌蘖怎受風日寒露之欺且小兒五臟六腑未實氣血柔弱怎禁油膩煎炒及諸般暈腥或一週半載縱口菓子糖甜之物及鵝鴨雞猪牛羊等肉或飯方了又哺以乳或乳方飽又與其飯此出於父母至情富貴之家有是症焉貧賤之家豈有是患何也一食諸物不消不化先傷於脾致腹脹午後發熱至夜半方退日久頭髮稀踈轉作泄瀉頻頻瀝甚則渴至傷肝膽眼之白仁鮮紅羞明怕日漸生翳膜遮瞞黑珠或突起如黑豆如香菰之狀治

法先治內後治外用雞卵入輕粉一二分史君子仁一箇半葱珠幾顆濕紙包煨與吃宜空心連吃五七彈止又宜煮羊肝露宿蘸夜明砂吃或猪肝亦可切宜忌口暈腥其白膜用陰一陽七藥調乳點煎胡宣二連服側栢葉燻洗若痔傷肝膽眼珠突出或瞎盡爲不治之症不獨瞎眼甚至喪命若聲啞口乾脚手俱腫十死八九

問曰小兒痔傷眼目疼痛羞明不開烏睛上青翳如黑珠子或白膜遮睛者何也荅曰此因飲乳之際好食菓子雜物油膩及熱毒物多使脾胃生痔或瀉泄不止夜間潮熱久則痔蟲傷肝上攻眼目初覺紅澁羞明急療若烏睛上變成有黑翳如珠泄瀉不止者多是不治宜服除熱飲等方

五痔丸　治小兒痔眼面瘦皮黃羞明怕日食乳不消

綠礬（成塊浣淨）　彌陀僧（煅過）　夜明砂（各一兩）

右爲末用蒸棗肉搗前藥末爲丸如黍米大每服三四十丸量兒之大小空心米湯下

除熱飲

大黃　知母　防風　黃芩（各兩）

黑參　茺蔚　菊花　木賊（各二兩半）

右水煎食後服三貼用雞蛋一箇史君子仁三箇輕粉二分同研末入蛋内煨熟空心服至二三箇即去疳蟲後服五疳丸

五疳丸

胡黄連五錢　牛黄一錢　彌佗僧一兩　夜明砂

緑礬二兩

右用棗肉爲丸緑豆大空心服三十丸米湯送下

蕪荑丸　治小兒五疳

蕪荑　黄連　神曲　麥芽炒

右各等分爲末麵糊爲丸緑豆大每服十丸至十五丸米湯下　五疳陳皮湯下　寒熱往來薄荷湯下

風弦赤眼



問曰人之患眼兩臉時常赤爛者何也答曰大人患者因脾土蘊積濕熱脾土衰不能化濕故濕熱之氣相攻傳發于胞臉之間致使羞明淚出含在胞臉之

内此淚熱毒以致眼弦赤爛治法春夏爛者爲熱爛
服用三黄湯洗用綿裹散金錢湯有瘀血宜剩洗與
服瀉脾湯秋冬爛者爲冷爛又曰迎風洒淚洗用碧
天丹點用重藥臉厚剩洗之後宜火烙之小兒患者
因母胎中受熱或落地之時惡露入目沐浴不淨拭
之未乾却感外傷風邪使邪入目亦生此疾治之小
兒服黄芪湯大人服茶調散熱甚洗金錢湯風甚洗
碧天丹先剩洗後用藥

黄芪湯

黄芪　車前子　細辛　黄芩

五味子　蒼朮　黄連各一兩

右各等分水煎服

茶調散 即川芎茶調散方在前充風淚出症内

三黄湯 在努肉攀睛症内　綿裹散 在痒拯難忍症内　碧天丹

金錢湯　治久年爛弦

古錢 即老銅錢生銹者佳七箇　黄連 研末二錢　白梅乾 五箇梅自落者爲白梅

右將此三味用老酒二小盞於磁罐内煎至半盞至
夜時冷可洗用不過三四日即愈日二次

爛弦火穴法

魚尾二穴　睛明二穴　上迎春一穴　攢竹二穴

大陽二穴

爛弦風之症因脾胃壅熱久受風濕更加吃諸毒物日積月累致成風爛胞臉之内變成風痘動則發痒不時因手拂拭甚則連眼眶皆爛無分春夏秋冬皆如是眵淚滿腮有不近人手之怕治法番轉眼臉剃洗瘀血二三度或小鋒針針出瘀血亦可若因摩引有紅筋者宜老醋燒爐甘石淬七次加以陰丹量輕重搽點眼弦或次點眼内無妨忌動風動血之物不食可也

肝風目暗疼痛



此症肝風目暗者乃是肝腎虛勞肝氣不足血虛故也不時疼痛舉發無時痛則惟眼珠墜疼頗有赤澁淚出看物依稀眼前多見花發數般或黄或白或黑見一物如見兩般形狀不諳療治恐損眼也此症實

有內外相兼病也非徒治外而不治內曷濟哉內則
白蒺藜散補外則陰二陽八毋調乳汁點二三夜點
一次片腦少加洗以生黃菊花赤芍側栢葉秦皮白
芷川芎更加忌口五辛諸熱物莫吃

補肝活血散　虛者宜服

藁本　白芷
防風　細辛
菊花　當歸
石決明　天麻
羌活　黃芪
生地黃　黃連

右各等分水煎服

補腎丸　治目暗疼痛恐變成黑風內障先宜服之

澤瀉去毛　細辛去苗　兎絲子酒浸焙乾五味子炙各一兩
羌蔚子炒二兩　山藥一兩　熟地黃焙二兩

右爲末研均煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸空
心鹽湯下

白蒺藜散

蒺藜　菊花
茸草　連翹

右各等分水煎食後溫服

蔓荊子　草決明
青箱子

迎風洒淚症



問曰迎風洒淚者何也曰肝之虛也是亦腦冷迎風淚遂出拭却還生夏月即少冬月即多後若經二三年間不以冬夏皆有此疾乃淚通於肝肝屬本目乃肝之外候爲肝虛風動則淚流故迎風淚出即服補肝散治冷淚

補肝散　治冷淚

當歸　熟地黃　川芎　赤芍藥

防風　木賊　右等分水煎服

菊花散　治熱淚

菊花　川芎　木賊　香附子

夏枯草　羌活各一兩　草烏一錢　防風

甘草　荊芥　白芷各五錢

右爲末每服三錢茶下水煎亦可

又方　治實淚

菊花　蒺藜　防風　羌活

NANYODO BOOK-STORE
MOTOMACHI BUNKYO
TOKYO
楠林南陽堂
¥800.15
二冊
33/11.23

17
919

川芎　夏枯草　木賊　甘草各三両

右毎服二銭湯調下水煎亦可

川芎茶調散　治熱涙方在前充風涙出症内

蒼朮止涙散

木賊　香附子　白芷　石膏

菊花　荊芥　白蒺藜　薄荷

當歸　白芍藥　川芎　蟬退

夏枯草

右爲末毎服三銭食後茶清下冷涙酒下

銀海精微巻之一終

NANYODO BOOK-STORE
MOTOMACHI BUNKYO
TOKYO
楠林南陽堂
¥800.00
33/11.23

川芎　夏枯草　木賊　甘草各三両

右毎服二銭湯調下水煎亦可

川芎茶調散　治熱涙方在前充風涙出症内

蒼朮止涙散

木賊　香附子　白芷　石膏

菊花　荊芥　白蒺藜　薄荷

當歸　白芍藥　川芎　蟬退

夏枯草

右爲末毎服三銭食後茶清下冷涙酒下

銀海精微巻之一終

内府秘傳眼科銀海精微 下

紅霞映目



問曰人之患眼赤澁腫痛羞深有紅翳於烏睛上濃淚如紅霞映目者何也荅曰此乃三焦積熱肝膈風熱上攻致然也治之須用去風散血清涼之藥脩肝散　治肝氣不順

防風　羌活　當歸　生地黄
黄芩　梔子　赤芍藥　甘草
藁本　大黄　白蒺藜

右各等分水煎服

撥雲散

黄芩　甘草　藁本　梔子
防風　菊花　密蒙花　連翹
桔梗　薄荷　赤芍藥　白蒺藜

右水煎食後服

加味脩肝散　方在小兒眼生翳内

早晨疼痛



問曰早晨痛至午者何也荅曰早晨至午皆陽旺是虛陽攻上頭風攻注爲諸陽之首早晨人動則血運赤陽轉於首與風氣相攻早晨疼痛兩眥宜服川芎散白蒺藜散

川芎散

晨注轉

午後疼痛（ビイウ）



石膏二兩　川芎　五錢　白附子一兩　茸草
毛活　菊花　地骨皮
右等分水煎服
白蒺藜散　方在肝風目瞤症內

問曰人之患眼午後至夜漸加疼痛者何也腦虛陽毒勝也人身之血午後行於陰道至夜歸於肝之司兒腦虛陰毒勝故午後漸疼痛昏花也治之須用回陽湯次以夜光柳紅羞澁難開宜服

回陽湯　治眼珠淡紅羞澁難開宜服

附子　當歸
赤芍藥　五味子
人參　川芎
茯苓　細辛
車前子　甘草

右每服棗子一枚姜三片水煎半飢服

夜光柳紅丸　方在風牽出瞼症內　治風濕傷肝

痛極增寒



問曰人之患眼痛而增寒者何也荅曰此乃氣衰血盛經曰血榮氣衛号為陰主血榮陰也衛為陽今氣衰血旺乃陽不盛陰故痛極而惡寒也宜服附子猪苓湯白术湯主之

附子猪苓湯

白芍藥　甘草　羌活各一兩　附子

猪苓　加黃芩　柴胡

右每服五錢水煎服之

白术湯

白术　川芎　蔓荊子　沒藥

白蒺藜去刺　黃芩　防風　五味子

菊花　甘草

右各等分水煎服

問曰人之患眼痛而體熱者何也荅曰衛屬陽而發熱榮屬陰而發寒榮衛為陰陽之道也在上屬心肺

在下屬肝腎今乃氣旺而血衰是陽多陰少故痛而體熱是熱邪歸于心也宜服洗心散解明散

洗心散

大黃　赤芍藥　荊芥　黃連
當歸　連翹　薄荷　甘草

解明散

當歸　赤芍藥　黃芩　菊花
柴胡　地骨皮　車前子　桔梗
生地黃　梔子　連翹各一兩

右各等分水煎服



臉停瘀血

問曰人之患目臉停瘀血者何也荅曰此乃肝氣凝滯脾胃停風濕也或因天行赤眼之後起之太早不能調養則使血凝於胞臉之間名曰瘀血治之須審上下胞臉剩洗瘀血至盡宜服退赤散當歸散

退赤散

大黄　黄芩　黄連　白芷

當歸　赤芍藥　梔子　桑白皮

右各等分水煎服

當歸散

當歸　生地黄　赤芍藥　川芎

茸草　菊花　木賊　黄芩

大黄　蒺藜　木通　梔子

右各等分水煎服

不赤而痛



問曰人之患眼不痒不赤而痛者何也荅曰氣腦虚也榮衛不和血氣凝滯亦有也七情鬱結肝風冲上腦中風氣相攻故不痒不赤而痛初患急服藥恐變爲五風内障難治宜服透紅匀氣散川芎散助陽和血湯

透紅匀氣散

當歸　細辛　白芷　沒藥
澤蘭　甘草　茴香　天仙藤
厚朴　乳香　肉桂　黑牽牛
生地黃　羌活各一兩
右爲末每服二錢熱酒調下
川芎散
川芎　菊花　細辛　鼠粘子
石膏　姜蚕　蒺藜各一兩
右爲末每服二錢米湯下
助陽和血湯　方在傷寒熱病後症內

赤而不痛



問曰人之患眼赤而不痛者何也荅曰肝熱也膀胱澁而不利心火炎也人身之血若河澤之流比若川澤疏通以歸於海若膀光壅塞則洪水妄流人之血順則經絡流利上下相接週而復始逆則散漫妄行

上注於目故赤而不痛也今膀胱不利心火上炎肝經實熱豈不若川澤之壅塞也治之須用八正散導赤散順肝丸服之

八正散　二方俱在大背赤脉條下

導赤散

順肝丸

黄連　黄芩　當歸　生地黄各一兩

蕤仁三十粒

右共爲末煉蜜爲丸

左赤傳右



問曰左赤傳右何也荅曰此陰經火熱也陽中行陰也肝也陰中行陽心也邪熱攻積於肝也肝邪交於心傳於目也左目屬太陽右目屬太陰故左赤傳右太陽經旺也宜服三黄丸洗心散

三黄丸　方在大背赤脉症内熱甚加黄栢

洗心散

大黄　當歸　赤芍藥　甘草

荊芥　麻黄　梔子各一兩

右等分水煎服

右赤傳左



問曰右赤傳左何也答曰此陰經火旺脉有陰經及陽絡皆屬於肺氣者肺之精也故右赤傳左乃肺經邪熱陰絡火旺宜服瀉肺散一曰陰虛命門火旺也

瀉肺散　方在膜火水輪症内

桑白散　治肺氣壅塞邪熱上攻眼目白睛腫脹日夜痛心煩悶

桑白皮　玄參　升麻　杏仁

旋覆花　赤芍藥　菊花　葶藶

防風　黄芩　枳殼　甘草炙各一兩

右每服水一鍾半姜三片煎至八分食後温服

胞腫如桃



問曰人之患眼胞臉壅腫如桃者何也答曰此乃脾肺之壅熱邪客於腠理致上下胞腫如桃痛澁淚出不絶之注桃目治之用桃葉烘熱熨其腫處宜服發散清凉藥羌活除風湯蟬花散主之

發散清凉散

升麻　赤芍藥　川芎　柴胡酪
玄參　黄芩　荊芥　甘草
白朮　梔子　赤茯苓　乾葛
草决明　右爲末每服六錢水煎服

羌活除風湯

羌活　獨活　川芎　桔梗
大黄　地骨皮　黄芩酪　麻黄
蒼朮　甘草　菊花　木賊

右水煎服

蟬花散　方在花翳白陷症内

視物不真



問曰人之患眼視物不明如紗遮睛何也荅曰此血衰氣旺血爲榮氣爲衛衛爲陽而氣清榮爲陰而氣濁素問曰清氣爲天濁氣爲地清陽發腠理濁陰走五臟者心肝脾肺腎也眼有五輪內五臟腎屬於水輪爲瞳人腎水衰不能濟於肝木使肝木血衰不榮於眼目故睛少短不能久視腎衰不爲心火交濟故心火上炎眼目必熱則看物不準今腎水衰乃虛陽攻上肝血衰故目不得血豈非血衰而氣旺也服駐景丸補腎四順涼肝散

駐景丸

川椒一兩去目　楮實子　五味子　枸杞子

乳香　人參各兩　兎絲子　內蓯蓉各五錢

右煉蜜爲丸塩湯下

四順涼肝散

荊芥　川芎
赤芍藥　甘草
右各等分水煎溫服

室女逆經



當歸　防風
漢防己

問曰人之患眼女子逆經血灌瞳人滿眼赤澁者何

也此乃室女或肥壯婦人血熱經閉過期不行則血逆行於上注於目灌于睛外皆紅色或烏睛上起如努肉治之切不可鈎割只用下氣破血通經之藥其血翳自退宜服調經散破血紅花散順經湯導赤散

調經散

香附米　當歸尾　黃芩　二兩
黃連　生地黃　大黃　五錢　蒸
羌活　梔子　赤芍藥
蘇木　薄荷　川芎
破血紅花散　方在血翳症內　治室女逆經眼疼痛生血翳包睛　木賊　甘草　以上各一兩

順經湯　能通經行血止痛

當歸尾　川芎　小茴香
柴胡　陳皮　枳殼
青皮　香附子　玄胡索
肉桂　熟甚加黃連　桃仁
右各等分水煎食後温服
導赤散　方在大腎赤脉症內　紅花
沒藥散　方在脬肉生瘡症內　黃芩

血室溢痛



問曰婦人遇行經之際眼自溢痛者何也答曰肝虛也凡婦人稟受虛者眼中原有病根若遇行經之際去血過多肝經愈加虛損故使眼自轉加疼痛腫溢難開頭痛眩暈生翳於黑睛上或如粟米或如花瓣白醋皆因肝衰虛也宜服當歸補血散點以九一冊

當歸補血散

當歸　川芎　白芍藥　防風
細辛　菊花　甘草　車前子
茺蔚子　蒺藜　白朮　羌活
薄荷各兩　大黃五錢

右每服八錢水煎入酒三盞溫服

八物湯　治虛損血枯上攻眼目

黃芪　茯苓　川芎　熟地黃
當歸　白芍藥　人參　菊花

右每服半飢溫服

白睛黃赤



問曰白睛漸漸黃赤者何也答曰酒毒也酒能發陽過飲無度脾經受濕傷肝膽助火火傷於肺經白仁屬肺故白仁黃赤者酒之過也引血傷於肝肝受其血熱自上朝於目目受其酒之熱毒灌注睛輪黃赤

宜服黄連解毒散服數貼之後點以清涼散

黄連解毒散

黄連　黄芩　黒參　龍膽草
荊芥　天花粉　梔子　茵蔯
生地黄　車前子　桔梗　連翹

右每服水煎加童便三盞温服

清金涼肝散

黄連　黄芩　梔子　連翹
夢薤　桑白皮　麥門冬　天花粉
赤芍藥　乾葛　荊芥　杏仁

青皮　甘草

右水煎加蜜一盞又内煎一沸食後温服

患眼頭疼



問曰人之患眼偏正頭痛者何也答曰風毒甚也頭風在右者屬痰屬熱用蒼朮半夏熱用酒製黄芩在

左属風及血虚風用荊芥薄荷血虚者用芎歸芍藥酒製黄栢此三症看而用之有驗治法痛甚者酒調散表之熱痛者石膏散清空散川芎茶調散冷痛者酒調散川芎散神清散主之風毒作痛菊花散如神散主之不必點丹

酒調散下　桑螵蛸的　方在暴風客熱症内

灸穴

百會一穴　神窓四穴　臨泣二穴　聽會二穴
耳尖二穴　風池二穴　光明二穴　太陽二穴
率骨二穴

定髮際并點各穴法則　南鈎參入　偏則　灸一邊痛處

前眉心平以墨點記以草比同身寸三寸自眉心比至草盡處是前髮際亦以墨點記又大杼骨上一點以前草三寸盡處亦點記是後髮際又將草自前髮際比至後髮際平摺摘去一節又將草均分作六摺摘一摺止存五摺以此草自前髮際比至草盡處是百會穴

又以百會穴爲中四邊各開二寸半乃神窓穴也

灸耳尖穴即率骨穴

將耳摺轉尖上比寸半盡處是率骨穴　考過同

臨泣穴
以童人對眉尖上點爲記當眉點比上三寸半是臨泣穴

光明穴
對瞳人上眉中是光明穴

攢竹穴
眉頭兩陷中是攢竹

睛明穴
在目內大眥外畔肉上陷宛中

頰車穴
在耳下曲頰端陷中

風池穴
在後髮際陷中

肝腧穴
在第九骨下各開寸半

天府穴
在胸兩腋下三寸宛宛中

聽會穴
在耳下前陷中開口取之

耳門穴
在上耳前起肉當耳缺

魚尾穴
在小眥横紋盡處
太陽穴
在外眥五分是
石膏散
石膏五錢　麻黄一両　何首烏五錢　乾葛八錢
右用水煎食後服
清空散
川芎五錢　柴胡七錢　黄連炒　防風去芦
甘草炙　羌活各一両　黄芩三両半炒一半酒製一半　梔子両半

右爲細末每服一錢熱酒内入茶少許調如膏臨卧抹口内少用白湯下如頭疼每服加細辛二錢如太陰脉緩有疾名痰厥頭疼加羌活防風川芎甘草半夏一両五錢如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱悪寒熱而渇此陽明頭痛只服白虎湯加香白芷
白虎湯
知母　石膏　甘草　加呉白芷
右各等分入粳米三十粒水煎服
川芎茶調散　治諸風上攻頭目偏正頭痛熱頭風

薄荷 八錢　防風 五錢　細辛 一兩　羌活
白芷　芎藭 各一兩　川芎　荊芥 各四錢

右爲末每服三錢葱白茶調湯溫服常服清頭目

芎藭散　治冷頭風

石膏 二錢五分　草烏 一分半　芎藭 二分　薄荷 二分
白附子 二分　芎草 一分　白芷 三分　細辛 一分

仙靈脾 二分

神清散 方在兩臉內治冷頭風

枳殼　白芷　石膏　芎草
細辛　麻黃

菊花散　方在迎風淚症內

如聖散

白芷　川烏　防風 各二分　細辛 半二分
雄黃 二分　草烏 炮過去皮尖　兩頭尖

右爲末溫酒調下二錢日服一次

通頂散　治一切頭風

川芎　白芷　谷精草
防風　薄荷　牙皂
細辛　蒲黃　藜蘆
　　蔓荊子

右爲末口含水嚼之吹入鼻內亦可

雄黄丸　治偏正頭風

全蝎　雄黄各二錢　盆硝錢半　乳香

沒藥各二錢　薄荷　川芎各一錢　片腦一分

右爲末口噙水搐吹鼻内日二次

貼諸般疼痛眼方

赤芍蒲黄與鬱金　芙蓉研末拌均勻

硃缺土螺緊姜汁　若然常痛只擦睛

痛甚加白芷　南星　無名異　血見熱久不開

加生川烏等分爲末熱水調搽眼眶四圍乾了再換

羌活除風湯　方在前

能遠視不能近視



問曰能遠視不能近視者何也荅曰氣旺血衰也經云近視不明是無水也治宜六味地黄丸加補腎丸諸補陰藥皆可主之

六味地黄丸　治腎虚眼不柰視神光不足

熟地黄　白茯苓　牡丹皮　澤瀉
山藥　山茱萸
一方加川芎當歸蔓荊子
右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心服
不必點丹
問曰能近視不能遠視者何也荅曰血虛氣不足也
經云遠視不明是無火也治宜初起者服地芝丸千
里光散菊花散隨人氣血虛實加減諸補藥皆可用
地芝丸
甘菊花　枳殼各兩　生地黄四兩　天門冬四兩

又加麥門冬亦可
右爲末煉蜜爲丸每服三十丸空心鹽湯下
千里光散
菊花　千里光　甘草各等分
右爲末每服三錢夜後臨卧用茶清調下
菊花散
菊花四兩　白蒺藜二兩炒去刺　生地黄四兩　甘草五錢
右爲末每服二錢食後米泔水下
小兒疳傷
問曰小兒三五歲身如癆瘵面色痿黄眼内紅腫或

突者何也答曰脾胃受傷五臟火旺名曰疳傷也治宜退熱用寒涼劑潮熱用胡宣二連湯有虫史君子湯收功用五疳丸點用清涼散若至胃氣下陷泄瀉頻頻無治法眼珠或突起憂白者廢人耳

二連湯

胡黃連五分　宣黃連一錢　成童子者焙之

右爲末用蜜水調服或成貼服亦妙熱甚加銀柴胡

史君子湯　能殺疳虫

史君子三箇　輕粉一分　葱珠幾顆

右史君子輕粉二味爲細末入雞蛋一箇攪均用濕紙包七重煨熟蛋息火氣空心與吃連吃四五箇蛋止不可多用

五疳丸　方在小兒疳傷症內

猪肝散　方在小兒疹症內

駐景補腎明目丸　治肝腎俱虛瞳人內有淡白色昏暗漸成內障服能安魂定魄補血氣虛散

五味子　熟地黃酒蒸炒　枸杞子　楮實子酒浸

肉蓯蓉酒蒸焙　車前子酒洗　石斛去根各一兩　青塩另研一兩

沉香另研五錢　磁石火煅醋水飛過　兎絲子酒浸另研各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服七十丸空心塩

湯下

救苦湯　治熱症用裏不得能退熱亦赤

桔梗　連翹　紅花　細辛
當歸身　甘草炙　蒼朮　龍膽草
羌活　升麻　柴胡　防風
藁本　黃連　生地黃　黃芩
知母　川芎　赤芍藥

右姜三片葱三根食後温服

決明子散

黃芩　甘菊　木賊　草決明
石膏　赤芍藥　川芎　羌活
甘草　蔓荊子　石決明

右各等分爲末每服三錢水一盞姜三片煎至七分食後服

貼諸般赤眼　治眼赤腫不開者

黃栢　姜黃　南星　草烏
黃連

右等分爲末姜自然汁調貼兩太陽穴一二次痛止如有赤障起亦可貼打傷赤腫不開加芙蓉葉菉豆粉調貼同葱搗貼亦妙

清凉消毒膏　敷諸熱眼

薄荷葉　芒硝　大黄　細辛

椎黄　黄栢

右等分爲末水調塗之効

經驗洗眼散　洗時眼熱眼

大黄　山梔子　防風　薄荷

川芎　羌活　甘草

右等分用水煎薰洗

洗眼湯泡散

當歸稍　赤芍藥　黄連　杏仁

右爲細末每日一次用水湯泡洗

酒煎散　治眼有風熱赤澁痛宜服

防風　防已　甘草　荊芥

當歸　赤芍藥　牛旁子

右等分用好酒煎食後服

酒調散　治白仁腫痛可服

槐花　梔子　牛旁子　防風

蛤粉

右等分爲末水煎食後入酒少調服

大黄當歸散　治眼壅腫瘀血凝滯不散攻充生翳宜服

歸尾酒浸　川芎各一兩　菊花三兩　大黃酒炒五錢
黃芩　蘇木　梔子酒炒各一兩　紅花五錢

右等分照加減用水煎食後服

加味湯泡散　洗眼方

歸尾　赤芍藥　黃連　杏仁
加防風各半兩　銅青二錢　薄荷葉三錢

三淚

一曰冷淚　二曰熱淚　三曰眵淚

一冷淚不赤不痛無翳無膜凡早出迎風有淚或至秋迎風有淚其淚自出病在肝也

二熱淚如糊粘下與上瞼皮有紅有腫眼罔不見日夜見燈火淚湧出病在心也

三眵淚如糊粘兩眼弦赤腫生努肉病在肺也

冷淚用肝經止淚方

當歸　青鹽　地黃　木賊

熱淚用此方

荊芥　梔子　黃芩　黃連
木賊　地黃　夏枯草

眵淚方

桑白皮　夏枯草　川芎　木賊

藁蘼　麥門冬　梔子

治上實下虛血貫瞳睛

防風二錢　羌活　白芍藥各兩半　荊芥二錢

生熟地黃各兩半　粉草五錢　當歸二錢　川芎四錢

菊花三錢　加茯苓

右爲末水一鍾入當土地黃同煎溫服忌一切毒物

川芎丸　治頭風冷淚

川芎　細辛　白朮　甘菊

白芷

右爲細末蠟丸如黍米大夜卧一丸日中一時辰換

一丸荀收仲嘗謂予曰有人視一物作兩物醫者作肝氣有餘故見一爲二教服補肝氣藥皆不驗此何疾也予曰孫真人云目之絲上屬腦後出於頂中邪中於頭逢身之虛其人沉則隨目絲入於腦轉轉則目絲急急則目眩以轉邪中其睛所中不相比則睛散睛散則岐故見一物爲兩物也後令服驅風入腦藥則愈

加減駐景丸　治肝腎氣虛視物䀮䀮血少氣多

車前子略炒二兩　當歸去尾　熟地黃洗各五錢　枸杞子

川椒炒　楮實子無臀不用　五味子各一兩　兎絲子酒煮焙半斤

右爲細末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服三十丸空心或酒或塩湯下

撥雲散　能散風毒退翳障及赤爛弦者

羌活　防風　川芎　白蒺藜

荊芥　蟬退　甘菊花各一兩

右爲細末每服二錢食後桑白皮煎湯調服

鴻膽散　治瞳人乾缺内障

玄參　黄芩　地骨皮　麥門冬

知母各一兩　黄芪　茺蔚子

右每服水煎食後温服

天門冬飲子　治轆轤轉關外障

天門冬　茺蔚子　知母各二兩　五味子

防風各一兩　人參　茯苓　羌活各一兩半

右每服水煎食後温服

補言方　所著法最奇云眼淚痒或生翳或赤痛並皆治之

右用宣州黄連搗碎末蕤核仁去皮研爲膏等分和合取無听病乾棗頭三枚割頭少許留之却去核以二物滿塡於中却將割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄爲則以茶甌量水半碗於銀礶器内文武火

煎取一雞子大以綿濾待冷點眼前後試數人皆應
今醫家用亦多得効故附之萬不失其驗

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白翳見於大眥及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通故目青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下以監府中陽氣衝天上行此乃先補其陽後於太陽標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃陰治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此法是也每日侵晨以腹中無宿食服

補陽湯臨卧服益陰丸若天色變大寒大暑并勞役預日飲食不調精神不足乃先補其陽氣上升通於肝經之末利矣

人參　熟地黃　黃芪　白朮
甘草　白芍藥　羌活　獨活各兩
澤瀉　陳皮　陳風各五錢　知母炒
當歸身去芦酒剉衣　白茯苓去皮　生地黃炒各一錢　柴胡去苗三兩
肉桂

右同爲粗末每服半兩水三盞煎至一盞去渣空心宿食盡消服

知母飲子　治花翳多年不退

知母　茺蔚子各三　防風　細辛

桔梗　茯苓　大黄　芒硝各一

右每服水一碗煎至五分食後温服

開明丸　治遠年近日翳障昏盲寂無所見一切目疾

熟地黄一兩半酒浸　兎絲子　車前子　麥門冬去心

蕤仁去皮　决明子　地膚子　茺蔚子

枸杞子　黄芩　五味子　防風去芦

滓瀉　杏仁炒去皮尖　細辛　青箱子

葶藶　官桂　羊肝須用白羊者肝薄

切片焙乾作末或只以肝煮研爛爲末作丸或少則以蜜漬之

右爲細末糊丸如梧桐子大每服三十丸熱水下日三服仍忌生姜糟酒炙煿等物

磨光散　治諸風攻眼磨翳障除昏暗

防風　羌活　菊花　草决明

蟬退去足　蛇退剪碎和麻油炒　甘草炙

沙苑蒺藜形如羊腎者慢火畧炒　石决明揚碎研細以水飛過各五錢

右爲細末每服一錢半食後麥門冬煎湯調服

蜜蒙花散　治冷淚昏暗

蚕蒙花　菊花　蒺藜　石决明
木賊去節　白芍藥　甘草各五錢
右爲細末每服一錢清茶調下服半月加至二錢
决明散　治眼見黑花不散
决明子　甘菊花各一兩　防風去芦　車前子
芎藭　細辛　栀子仁　蔓荆子
玄參　白茯苓　山茱萸各一兩半　生地黄二兩
右爲末每服二錢食後鹽湯調下
羌活散　治風氣攻眼昏澁多淚
羌活　川芎　天麻　旋覆花

蒙本　防風
細辛　杏仁去皮尖各一兩　蛇退洗
右爲末水煎食後服　甘菊花
草龍膽散　治上焦風熱毒氣攻冲眼目暴赤瞹痛羞
明多睛迎風有淚翳膜攀睛努肉隱痛並皆治之
龍膽草　木賊去節　草决明微炒　甘草炙各二兩
附米炒去毛　川芎各四兩
右爲末每服二錢麥門冬熱水入沙糖少許同煎食
後調服或米泔汁調亦好
地黄散　治黑睛或白睛先赤而後痒迎風有淚隱澁不開

生地黄一兩　芍藥五錢　當歸　甘草各五錢

右每服五錢食後服

嗃鼻散　治目風熱腫赤難開

雄黄　辰砂各三兩　細辛五錢　麝香

片腦各一分　右爲細末口含少許嗃鼻中

瀉肝散　治天行赤眼外障

知母　桔梗　羌蔚子　大黄

玄參　羌活　細辛

車前飲　治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人

羞明怕日多淚宜服之

車前子炒　豪花去枝　草決明　羌活

白蒺藜炒去角　龍膽草　菊花　粉草

右爲末每服三錢食後米湯調下

還睛補肝丸　治肝虛兩目昏睛衝風下淚

白朮　細辛　川芎　人參

決明子微炒　羌活去芦　當歸切焙　白茯苓去皮

苦參　防風去芦　官桂去粗皮　地骨皮

玄參　黄芩去黑心　五味子　車前子炒

菊花　青箱子　甘草炙

右爲細末煉蜜粘丸每服三十丸加四十丸不拘時

米飲下

鎮肝丸　治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒澁難開多眵洒淚怕日羞明時發腫赤或生翳障澁並皆治之

遠志去心三兩　地膚子二兩　青箱子少炒　白茯苓

防風　决明子　蔓荊子　人參各二兩

山藥　甘菊花　栢子仁　甘草

細辛　玄參　車前子　地骨皮

右蜜糊丸每服三十丸食後米湯下日三服

羌活散　鎮肝明目暴赤眼一切內外障翳

羌活　川芎　防風　旋覆花各五錢

楮葉　楮實　蒼朮米泔浸去皮　蟬退

木賊　菊花　桑葉　甘草各一兩

右為細末每服二錢茶清下早晚食後臨卧時各一服合藥時不得犯鐵器及不見火忌麵及酒諸毒物

青箱子丸　治肝虛積熱外障

箱子二兩　車前子　兎絲子　熟地黃

茺蔚子　五味子　細辛　防風

人參　澤瀉　茯苓各一兩

右每服三十丸空心茶清下

地黄丸　治用力勞心肝虚風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜兼肝腎風毒熱氣上衝久視目疲傷肝血肝主血勤書則傷肝而目昏肝傷則目傷風而熱氣凑目昏一盛不宜專服補藥當益血鎮肝而目自明矣

熟地黄　兩半　菊花　防風　光明砂

羌活　桂心　沒藥　各五錢一　决明子

黄連　各一兩

右爲末煉蜜爲丸每服二十丸食後熱水服日三次

晉范寧嘗苦目痛就張湛求方湛戲之曰古宋陽子少得其術以授魯東門伯次授左丘明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左大冲凡此諸賢並有目疾得此方云省讀書一減思慮二專内視三簡外觀四日起晚五夜早眠六勿物熬以神火下以氣飾薀於胸山七白然後納諸方寸修之一時近其數其目睫遠視尺筆之餘長服不已非徒明目及亦延年審如是而行非可謂之嘲戲亦有方也

菊花散　治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜

菊花　四兩　蝉退　去足　羌活　各三兩　荆芥

右爲細末每服二錢食後清茶調下

湯泡散　治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁　防風　黄連　赤芍藥

歸尾各五錢　銅青一錢　薄荷三錢

右剉碎每服二錢極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再換熱用日兩三次一方入白塩少許開目沃沸洗塩亦散血

雷巖丸　治男子婦人肝經不足風邪内乘上攻眼睛淚出羞明怕日多見黑花翳膜遮睛臉生風栗或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭風牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能既濟肝木此藥久服大

補腎臟能添目力世人服藥多不知根源往往不効

枸杞子　菊花各二兩　巴戟酒浸一宿去皮心　肉蓯蓉

牛膝各一兩　川椒三兩去目　黑附子青塩二錢以沸水同煮水浸去皮根

右爲細末浸藥水煮麵糊爲丸每服十丸空心温酒下

又方　治肝虛或當風眼淚鎮肝明目

右用臘月犍牛膽盛黑豆不論多少浸候百日開取食後夜間呑三七粒神効

萬壽地芝丸　治目能近視不能遠視食之能治風熱

天門冬去心　生姜焙各四兩　甘菊花二兩　枳殼炒三兩

右爲末每服一百丸食後茶清或酒下

洗肝散　治肝實眼

人參　黄芩去黑心　赤茯苓　梔子仁
川芎　柴胡　地骨皮　菊花
桔梗　黄連　甘草

右每服入苦竹葉七片食後服

羚羊角散　治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚

黄芩　梔子　瓜蔞　胡黄連
菊花　細辛

右每服加竹葉煎之

竹葉湯　治肝臟實熱眼赤疼痛

淡竹葉　黄芩　升麻　木通

車前子　黄連　玄參　芒硝
梔子　大黄炒

右食後服

龍膽飲　治肝臟實熱眼赤腫痛

龍膽草　梔子　防風　山茵蔯
川芎　玄參　荊芥穗　菊花
楮實　甘草

右食後服

決明子湯　治肝臟實熱目眥生赤肉澁痛

決明子炒　柴胡　黄連　竹葉
防風　升麻　細辛　菊花
甘草

右水煎服

瀉肝散　治肝熱赤眼腫痛

梔子仁　荊芥　大黄　甘草

羊肝丸　治肝經有熱目赤睛痛視物昏澁及治障翳青盲之眼

羯羊肝五兩切片生用　黄連研爲末

右先將羊肝去筋膜於砂盆内擂入黄連末杵和爲丸每服五十丸不拘時熱水送下忌猪肉及冷水一連作五劑瘥昔唐崔承元内障喪明夜坐聞有聲問誰荅曰昔蒙出活今特來謝授此方依方修合服之眼復明朗

助陽活血湯　治眼發之後熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而隱澁難開此因服苦寒藥過多真氣不能通九竅也故眼花不明宜助陽和血補氣眼中自然明朗不必點丹

柴胡　白芷　升麻　當歸

黄芪　防風　蔓荊子　甘草

右水煎臨卧熱服避風寒忌食冷物

甘菊花散　治肝氣壅塞翳障遮睛隱澁難開

菊花　木賊　防風　羮藜

甘草　木香

右爲末每服一錢七分不拘時沸湯點服

甘菊花湯　治內外障翳一切眼疾

菊花　升麻　旋覆花　石決明

川芎　大黃炒各五錢　石膏　羌活

地骨皮　木賊炒　青箱子　黃芩

防風　梔子仁　草決明　荊芥

黃連　甘草

右爲細末每服五錢水一碗蜜一盞煎至七分食後溫服

八子丸　治風毒氣眼翳膜睛不開久新及內外障疾

青箱子　決明子　葶藶子　車前子

五味子　枸杞子　地膚子　茺蔚子

麥門冬去心　細辛　官桂　生地黃

赤茯苓　澤瀉　防風去芦　黃芩各兩

右爲細末煉蜜和丸每服二十丸加至三十丸茶清送下溫米飲亦好日進三服

靈圓丹　治男女攀睛翳膜痒澁羞明赤筋碧暈內外障瘀肉風赤眼並宜服之

蒼朮米泔浸四兩　川芎　柴胡　白附子

遠志去心　羌活　獨活　菊花

青皮　陳皮　荊芥　石膏
防風　青箱子　全蝎　仙靈皮酥炙
木賊去節　楮實　黄芩　甘草各兩

右爲細末煉蜜糊餅蒸熟爲丸一錢重一箇食後荊芥湯或酒或茶磨服日進二丸其功立驗

柴胡退翳丸　一名地黄丸

治内障右眼小眥青白翳太眥微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡寒大便澁或時難小便如常過天煖熱處頭痛睛脹能食日沒後天陰則昏暗此症亦可服名滋陰地黄丸

熟地黄八錢　生地黄　黄栢　當歸酒製
茺蔚子　丹參　知母　黒附子
寒水石　芍藥一兩三錢　防已酒製一錢　牡丹皮
羌活　川芎　柴胡五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心白湯送下如消食未盡候飢時服之忌語言隨後以食壓之東垣蘭室秘藏方去翳在大眥加葛根升麻翳在小眥加柴胡羌活是也

補腎丸　治黒翳如珠外障

人參　茯苓　細辛　五味子

桔梗　肉桂各一兩　乾山藥　栢子仁各三兩
乾地黄一兩五錢加知母　黄栢二兩　青塩一兩
右爲末煉蜜和丸每服三十丸空心白湯下
退熱飲子
防風　黄芩　桔梗　茺蔚各三兩
大黄　玄參　細辛　五味子各一兩
右爲末每服五錢水一盞煎至五分食後服
搜風湯　治旋螺尖起外障
防風　大黄　天門冬　五味子
桔梗各一兩　細辛　茺蔚各三兩　菊花

芍藥各一兩五錢
右每服五錢水一鍾煎至五分食後服
抽風湯　治奚魁蜆肉外障
防風　桔梗　大黄　細辛
黄芩　玄參　車前子　芒硝各一
右每服五錢水煎食後服
摩風膏　治鶻眼凝睛外障
黄芪　細辛　當歸　杏仁
防風　松脂　黄蠟各一兩　白芷
小麻油各四兩
右爲末煎成膏塗之

補腎丸　治眼暗浮花恐變成黑風內障

澤瀉　細辛　兎絲子酒浸焙乾　五味子炒各一兩

茺蔚子焙二兩　山芋一兩五錢即山藥　熟地黃焙三兩

右爲丸每服二十丸空心塩湯下

磁石丸　治雷頭風變內障

磁石燒紅醋浸三次　五味子炒　乾姜　牡丹皮

玄參各一兩　附子炮五錢

右爲末蜜和爲丸每服十丸食後清茶或塩湯下

瀉肝散　治肝虛雀目恐變成內障

防風去蘆　黃芩　桔梗　芍藥

大黃炒　右每服入芒硝半字臨卧溫服

連栢益陰丸　一名瀉陰火丸

黃連酒洗炒一兩　防風　五味子　甘草

羌活　獨活　歸尾酒洗各一兩半　黃栢

細辛　知母各一兩　石決明燒存性

右煉蜜爲丸如菉豆大每服三十丸漸加至百丸止用清茶下常服補陽湯以服此藥爲不可勝補陽恐妨飲食

升陽柴胡湯　升陽泄陰羌活柴胡補陽湯

柴胡　羌活　獨活　甘草根去稍

歸身　熟地黄酒炒　楮實　人參
白朮　白茯苓　黄芪各五錢　澤瀉
陳皮　防風各錢　知母三錢酒浸要日加五錢　肉桂五分
右剉碎每服五錢水二盞煎至一盞去渣稍熱服仍
合一料煉蜜爲丸食遠清茶下五十丸每日与前藥
各一服如天氣熱加五味子三錢天門冬去心五錢
更加楮實五錢

桑白皮湯　治肖生花翳白點状如棗花
桑白皮　木通　澤瀉　犀角
黄芩　茯神　玄參　旋覆花
川大黄炒各一兩　菊花一兩五錢　甘草炙五錢
右爲細末每服二錢水一盞煎六分連渣湯温服

枸苓丸　治男子婦人腎臟虚耗水不上升眼目昏暗
遠視不明漸成内障
枸杞子四兩　白茯苓八兩去皮　當歸二兩　青塩一兩另研
兎絲子四兩浸蒸酒
右爲細末煉蜜和丸每服七十丸食前白湯下

熟地黄丸　治血弱陰虚不能養心致心火旺陽火盛
徧頭腫悶瞳子散大視物則花理當養血涼血益血
除風散灸則愈矣

熟地黄一兩　五味子　枳殼炒　甘草炙各三錢

右爲細末煉蜜和丸每服一百丸食遠清茶送下日進三服忌食辛辣物而助火邪及食寒冷物損胃氣藥不能上行也

煮肝散　治目生黑花斬成内障及開睛偏視風毒攻眼腫痛澁痒短視倒睫省目

羌活去芦　獨活去芦　青箱子　菊花各一兩

右爲細末每服三錢七羊肝子一葉剉細淡竹葉數片同裹如粽子大別用黑豆四十九粒米泔一碗銀石器内同煮豆爛泔乾爲度取肝細嚼温酒下又將豆食空心日午夜卧服

芎藭散　治目暈昏澁視物不明

白芷一錢　芎藭　地骨皮　荊芥穗

何首烏去黑皮　菊花　旋覆花　草决明

石决明制不碎　甘草各一兩　青箱子　蟬退去土

木賊各五錢

右爲細末每服一錢七米泔水調下

滌風散洗眼方　治風毒攻眼赤腫痒痛

黄連　蔓荊子各五錢　五味子二錢

右剉碎細末分三次新水煎濾清汁以手潑洗效

通頂散　治風毒攻眼并夾腦風

細辛（去葉）　香白芷　藿香葉（去土）　川芎（各七錢）

躑躅花（三錢）

右爲細末每用先含新汲水一口然後挑少許搐在鼻內以手擦兩太陽穴

銅青方　洗眼治風弦毒眼

銅青（黑豆大一塊）　防風（一寸）　杏仁（三箇去皮尖）

右各細切於盞中新汲水浸湯瓶中頓令乘熱乘熱洗之如痛者加當歸數片

蟬殼散　治眼目風瞳及生翳膜等疾

蟬殼　地骨皮　黃連　牡丹皮

蒼朮（米汁浸焙）　白朮　菊花（各一兩）　龍膽草（五錢）

甜瓜子（三兩）

右爲細末每服一錢半荊芥煎湯送下食後臨卧各一服

凉膈丸　治眼狀青色大小

黃連（洗不見火）　黃芩　荊芥　龍膽草（各五錢）

蘆薈　防風（各一兩）　黃栢（去皮）　地膚子

右爲細末煉蜜和丸每服二十丸食後薄荷湯送下

麥門冬散　治血灌瞳人昏澁疼痛及轆轤關外障

麥門冬　大黃
玄參　細辛
右㕮服水一鍾煎至七分去滓下芒硝少許食後溫服
連翹飲子　治目中悪翳與太皆隱澁小皆緊久視昏
花近風有淚

連翹　當歸　蔓荊子
其草　柴胡　黃芩
黃芪　防風　桔梗
右等分食後服
調經散　治室女月水倍久倒行逆上沖眼先以光明

散點血膜不退用珍珠散點先以調氣則血通矣

烏藥　附子　蔡花
當歸　茯苓　升麻
升麻　乾葛　黃芩
紅花　不通加蘇木氣不順加木香沉香
右二十香不過大煎出藥後將此二味香磨與藥同服
若經脉月流不斷或因氣脹沖眼眼珠腫痛翳膜不
退服天麻散

陳皮　川芎　羌活
防風　荊芥　生地黃
血竭　紫蘇孔
天麻退翳散　治垂簾翳障昏暗失明

當歸一兩好酒浸焙乾　川芎一兩酒浸焙乾　赤芍二兩五熟水泡
熟地黃一兩酒浸焙乾

白姜蚕一両熱水泡洗去絲姜汁炒　蟬退五十隻水泡洗去頭足
羌活　防風　荊芥　木賊各二両去根節
石决明一両燒過存性　白蒺藜一両五錢　白芷一両五錢　甘草七錢
麥門冬二両　黄芩尾　羊角天麻炒存性　厚枳殼炒
蔓荊子一両炒打碎　菊花一両　蜜蒙花七錢
共二十一味每服連子三箇燈心七根水一鍾半煎
至八分食後温服若眼紅加黄連
酒煎散　治眼赤色有氣熱宜服
此方通治婦人赤腫下垂初服此起
漢防已　防風　甘草　荊芥

當歸　赤芍藥　牛旁子
右酒煎食後服
大黄當歸散　治眼壅腫瘀血凝滯攻冲生翳宜服
當歸　菊花　大黄炒　黄芩
紅花炒　蘇木　梔子炒
右煎服
當歸薄梗湯　治眼生翳淚出羞明發久不愈
薄荷　桔梗　知母　黑參
赤芍藥　黄芩酒炒　生地黄　菊花
茺蔚子　當歸　桑白皮　防風

川芎　白芷　甘草

右淨水一鍾煎服

黃芩白芷散　治眼血翳淚出羞明發久不愈

當歸　黃芩　防己　防風

川芎　白芷　羌藜　石決明

桔梗　草決明　青箱　蒙花

茺蔚子　菊花　木賊　知母

赤芍藥

右爲細末食後清茶下

黃風菊花湯　治初起努肉攀睛急宜服之

防風　黃連　桑白皮　赤茯苓

瞿麥　車前子　梔子　大黃

黃芩　細辛　桔梗　連翹

右水湯半飢溫服

加減當歸菊連湯　治膜下垂初脹初發此方致效

如久病此方收功

當歸　白芷　赤茯苓　黃芩

赤芍　知母　桑螵蛸　生地黃

木通　連翹　麥門冬　菊花

防風　川芎　石膏　茺蔚

覆盆子　茸草

右水煎食後服

蒼朮散　治小兒痘瘡入眼生翳膜羞明怕日

蒼朮　槐花　防風　乾葛

藁本　川芎　蛇退　枸杞子

蒺藜　黄芩酒炒　乳香不見火藥煎成方下　白菊花家産

蟬退　木賊　石膏　谷精草

茸草　没藥不見火前同乳香一

右爲末水煎食後服大人水煎小兒爲末服之

此治小兒痱眼其症泄後眼不開宜服　此進賢方

當歸　菊花　黄連各五錢

右爲末水一鍾入蜜一匙煎三沸食後服之

小兒班瘡入眼

柴胡湯　又用茶調洗肝散　如赤眼用四物湯

四物湯

赤芍藥　羌活　蟬退　木賊

黄芩　大黄　蒙花　粉草

桔梗　蒺藜　鬱金　當歸

防風　龍膽草　川芎　獨活

石膏　川椒　菊花　草決明

黄連　荊芥　蒼朮　車前子
谷精草　右毎服燈心十根温服

六一丸　治熱淚

蛤粉　黄連　木賊　香附米

右爲末糊丸茶送下

通草散　洗風淚障翳

川芎　羌活　赤芍　甘草
當歸　射香

右爲末搜匀爲丸如皂角子大百沸湯泡淚眼神效
治眼赤腫

大黄　荊芥　鬱金　薄荷
朴硝　痛加沒藥

右爲末用姜汁調或赤加葱根搥爛和藥貼太陽二穴
治小兒眼不開

用葶藶子爲末取猪膽調貼額上

小撥雲散　治男婦目澁痛爛淚出羞明怕日血灌瞳人

黄芩　甘草　梔子　大黄
龍膽草　芍藥　鬱金　羌活
蟬退　木賊　當歸　蒙花
蒺藜

洗心散　治眼目腫痛難開澁淚

大黄炒　黄芩　梔子　甘草

黄栢　木通　菊花　赤芍藥

防風　荊芥

蜜蒙花散　治久患内外障翳羞明怕日迎風洒淚腫痛難開努肉攀睛風熱氣障等病皆治之

蒙花　威靈仙　草决明　羌活

黒附子　大黄　石膏　川椒炒

木賊　甘草　蟬退　獨活

楮實子　川芎　荊芥　車前子

防風　菊花　黄連　蒼朮

右燈心煎服

消風散　治一切風毒上攻頭目拘急鼻澁男婦宜服

藿香　白芷　全蝎　甘草

防風　青風藤

又方　治前症外感風邪頭痛鼻塞流涕眼目赤腫

荊芥　甘草　羌活　防風

陳皮　川芎　蘇葉　蟬退

附米　升麻　麻黄

右姜三片葱三根熱服取汗爲度

治爛弦風　不問遠年近日洗藥

黃連　五倍子　當歸

明礬焙　銅青　雞仁

右爲細末將小鍾張水入藥於內飯上蒸過藥水點洗爛處爲妙

治時行熱眼

防風　川芎

旋子　龍膽草

荊芥　黃栢

爛弦風　生地黃

赤芍藥

蒼朮浸炒

茸草

右煎服之

用白礬先醋飛過取無病婦人乳汁調雞毛點拭之

爛弦風　赤眼

水銀一錢　銀硃五分　銅青三分

右姜包煨過共爲末飾過點眼弦如神

眼疾頭痛消風散

霍香　川芎

白茯苓　荊芥

陳皮　蟬退

防風　加細辛　白芷薄荷各川芎茶調散

點藥　冷眼用

人參

茸草

逢州豆

羌活

獨活

火硝 二錢水飛過晒乾芦甘石煉過二分不開流淚風痒一切治之

熱眼

朋砂 一錢研細

片腦 二釐入前藥

暴赤眼

雞子 一箇去黃用白 黃連 研細末一錢入雞子白內紙封放糊泥中理一日一夜次早取出濾過點之

五臟要論

心熱眼紅者血熱則可用黃連當歸尾蘇木紅花赤芍藥痒痛之類虛者本方若虛此數味除之加人參細辛沒藥歸尾熟地黃茯苓之類

肺熱火旺者則可用山梔子桑白皮地骨皮黃芩防風天麥二門冬之類虛則可加人參沉香黃芪磁石五味子之類實者用葶藶子連翹

肝氣盛火旺者則可用柴胡羌活青箱子白芍藥羚羊角虛則除之加熟地黃當歸川芎楮實枸杞之類

脾胃實者則可用石膏朴硝黃芩黃栢虛則除之可加白木蒼朮枳殼陳皮半夏人參之類

腎熱相火旺者則可用黃栢知母車前子木通滑石瞿麥匾蓄大黃朴硝之類虛則大忌之可加肉蓯蓉五味子磁石兎絲子乳香川椒青塩枸杞子之類

夫審瞳人之法瞳人開大者忌辛辣之藥瞳人焦小者宜寒凉辛辣則可也開大者以酸藥收之焦小者以辛藥散之久注不開者宜發之久積宜行氣血爲主　養肝血還睛丸亦可用之

未成症主方秘要　眼表裡不退疼痛愈甚用細辛湯

明目細辛湯　治眼赤痛眉攢腫悶鼻塞涕涶稠粘大便秘結羞明怕日隱澁難開睫成紉多眵粘

助陽和血湯　治陰陽不升降作痛不時隱澁有淚眵蠹紅淚糊或時發赤眼凉藥不退者用

救苦湯　眼暴發熱火旺苦疼不住服利藥不效有熱不退可用

當歸龍膽湯　治眼中黃仁生黃白翳從下而上此候多是火旺也人若患此此藥能瀉火退熱又能退翳消紅腫

桑螵蛸酒調散　治風熱裡病雙解散實熱裡病此藥治傷風頭疼及眼珠腫痛或偏正此是傷風寒眼腫雖甚其眼皮帶浮而軟人多鼻塞聲重眼羞明怕日白仁雖虛壅而不蠹紅如此狀者用前二散表裡之腫消痛止用生地黃散撥雲湯變用又變前方不可

久服

麟竭金酒　裡熱無表症治一切實熱其眼腫起如桃有不近人手之拍羞明怕日或內壅突起蠃紅淚出如湯鼻涕溏流內生深赤血翳如此狀者其翳不能為害熱去退翳即消此藥通能之痛止後用救苦湯當歸龍膽收功

酒調洗肝散　治一切熱眼及赤眼雜開眼珠痛白仁赤而痛不虛可用止痛生地黃散後用功亦同

當歸活血煎　治羞明怕日者頭痛雖甚內不蠃紅此樣眼多虛或眼上珠生白陷翳者此方可與蟬花散蜜豪花散相間服之効

蜜豪花散　治一切體虛之人無疼有羞明者服涼藥不得甚眼羞明而內痛白仁內隱紅常流清涕淚視物蒙蒙此藥可用日進二三服夾明子散蟬花散此三方功亦同効

省風湯　治一切肝氣有餘瞳人鎖緊或成乾缺視物不能明繚亂白仁淡紅瞳人焦小黃色夜見五色烽光者此方能除肝膽極熱

九仙飲　治羊老之人眼赤不退帶紫紅白色若然有

蠹紅者以暴發客熱一類推之

洗肝散　治眼肝氣有餘風輪變色焦枯或疼痛外生赤翳此方能除火退肝熱

紫金丸　治外障生雲膜血翳服涼藥不退而不多痛者可用

夜光柳紅丸　治風毒上攻眼虛腫頗有紅紫或痒或痛生翳年久服諸藥不効可用

餡肝散　治暴發眼及發不時疼痛甚者熱服肝氣上升淚出汪汪內有鮮紅可用至如痛止血散不用

補肝重明丸　治諸眼服涼藥表裏愈後失神光者其眼無羞明用之能補養肝血還睛丸亦可用之

當歸龍膽湯　治眼中黃仁生白翳從下而上此候多是火旺也人有此患此藥瀉火退熱用能退翳消紅腫

審症應驗口訣

如男子婦人患偏正頭痛者先審熱甚用雙解散二三貼大通之後服川芎茶調散加涼劑點用九一丹冷痛者用桑螵蛸酒調散大通之後用川芎散神清散主之點用清涼散少加腦入些姜粉無不効矣

烏輪赤暈刺痛浮漿此肝熱也治法宜用酒調洗肝散

加麻黃赤芍或瀉肝散修肝散收功生地黃散點用
清涼閒九一丹
膽生清淚枯黃遠睛此肝虛也治法用止淚補肝散點
用九一丹後服補腎丸此乃滋母益子也
瞳人開大淚白偏斜者此腎虛也治方服補腎丸補腎
明目九駐景九點用九一丹多服少點
瞳人焦小或帶微黃此腎熱也治法先服五瀉湯著風
之類後收功用補腎明目丸火服甚効
瞳青胞白痒而清淚不赤不疼是謂之風眼治法服羌
活除風湯點九一丹閒二八此羌粉効

烏輪突起胸硬瞳紅睅淚濕漿裹熱則痛是謂之熱眼
治方用雙解散加涼大通之劑瞳痛止用生地黃散
點用清涼散閒九一丹點之隨人治法用之
眼渾如淚胞腫而軟上壅濛濛酸渣微赤是謂之氣眼
服桑螵蛸酒調散後服明目流氣飲當歸湯主之
其或風與熱并則痒而浮赤風與氣搏則痒澁昏沉點
用九一丹閒二八丹服羌活除風湯
血熱交聚故生瘡膚粟肉紅縷偷針之類服用瀉脾湯
瀉心湯主之點用清涼散有瘡膚粟肉即煎洗至平

眼熱經久復有風冷所乘則赤爛點用清凉散服用瀉
心湯洗肝散主之洗用綿裹散其効甚速
眼中不痛而赤但爲痰飲所注則作痛服用半夏二陳
湯三四貼後服明目流氣飲不用點藥
肝氣不順而挾熱所以羞明服用洗肝散二三貼加麻
黄後服蜜蒙花散五七貼補腎主之點用九一丹加
清凉散初不可重藥
白睛帶赤或紅筋者其熱在肺服洗肺湯除熱飲洗肝
散點用清凉藥丸一丹
上胞下臉或目唇間如疥點者其熱在脾治法服瀉脾

湯瀉脾除熱飲三黄丸主之可剃可洗用清凉散點
有淚翳者九一丹點之
因風則散之用九一丹入些姜粉熱則清凉散點之氣
結則調順之將前藥間點因風者可用防風通聖散
即名雙解散後服羌活除風湯熱者洗肝散修肝散
氣結者服流氣飲黄芪湯主之
白陷魚鱗之症多因肝腎俱實血衰成陷治法服酒調
散二貼後服蟬花散蜜蒙花散相間服之効點用二
八丹調乳汁點間九一丹點之
突起睛高旋螺尖起嶮岐利害之症也又有一法與他

取平之効將鋒針針入三分以鳳屎點針口所以毒攻毒或陰丹醮點亦可先服鬱金酒調散四五貼後可動針此乃平之法無光之効也

又有一症逓年月眼内痒極秘曰諸痛爲實諸痒爲虚人之患眼虚腫及眼眶骨此痰飲爲患治法用明目流氣飲加半夏陳皮厚朴三味用姜二片同煎連服四五貼其痛即除另將二陳湯丹藥亦可點用治之隨輕重所施治法在人意耳

頭風

冷痛　熱痛　風痛　痰厥痛　係偏風

陽明頭痛

眼淚

熱淚　冷淚　虚淚　風淚　濕淚

審症秘諭

暴發眼者審他是熱甚用雙解救苦湯當歸龍膽湯脩肝散洗肝散瀉肝散鬱金酒調散

有是風熱火病服凉藥不退者用明目細辛湯助陽活血湯紫金川芎茶調散明目流氣飲桑螵蛸酒調散

有是久病血滯風甚用當歸和血煎神清散沒藥散捲雲湯發歇無時用生地黄散破血紅花散

辯

有是風毒爲病用蟬花散如聖散川芎茶調散神清散
夜光柳紅丸痰病用清熱半夏二陳湯之類老痰用
四生湯
有是久病無表病裏病眼内凈了用蟬花散蜜蒙花散
决明子散十味還睛丸
若内病俱無但是外病可次第依法不須服藥有翳只
是去翳藥加減療之

辯眼經脉交傳病症論

有人問於予曰人之眼目乃五臟六腑之精苟有患
傷於内腑其理何哉然則又有左病而不傳右右病

鋭 眼

而不傳左左右俱病未審其詳請而言之予應之曰
噫非精於岐黄龍木之奥者莫明乎此也
夫眼者乃五腑之專精也目者是心之竅也瞳人者
腎之精也宗精之水所以不出行血裹之氣輔之共
湊於目頭者諸陽之所聚也足太陽膀胱之脉起於
目之鋭背通項入腦正屬目本名曰眼系督脉陽柔
之会首循風府而出則入係腦則爲目風厥肝脉上
出額督會於巔頂其別交者從目係風相搏故目䀮
膉無所見項中風府兩筋之間乃別陰陽交于目内
鋭背陰氣盛則目瞑陽氣盛則目瞑病而不得卧者

衛氣不得入於陰故陽氣滿而陰氣虛故目不瞑而不得拋者衛氣流於陰不得於陽陽氣虛故目閉故病猶有偏勝之理且飲食之中有五味天地之氣有六淫人身之中有七情皆能生病更有賊微正邪之別氣與味也皆無形之物能傷於有形之質何患不生於病況眼科之中又有與太方之不同治之各有異亦宜審其受病之因視其內外淺深之症假若一槩治療不無抱薪之患良可惜哉予因幼躭疾苦求醫療迨今數年於是熟玩諸家之書治之玄妙之旨訪尋師友廣博方書採集百端推原其本凡有疑難之間不恥下問務究奥旨子能潛心注意雖不登岐黃龍木之岸亦可謂醫中魁首也

凡看眼法先審瞳人神光次看風輪再察白仁四辨胞臉二眥此四者眼科之大要看眼之時令其平身正立緩緩舉手輕撐開眼皮先審瞳人若有神光則開合猛烈次看風輪若展縮雄健則魂魄無病三察氣輪無病則澤潤光滑四辨其肉輪若好則間各有力二眥不蠹赤矣

凡審翳法若久年翳膜能去者其翳浮虛爛紅其眼不張若近年發歇眼其翳紅白色浮厚者有些紅未

痊

退有淚者易散看其中多有死釘不能去若散翳如紅霞色者易退若因頭痛起因有死白翳者難退又有一樣厚翳去盡其眼全痊黑睛有些微雲薄薄帶淡白色不能去名曰冷翳

凡烙法將烙時可安心定志將眼撐開用濕紙將四背好肉處以濕紙敷定只留要烙處許大將匙燒紅於細綿上開過即烙之不可傷四弦烙乾用和解藥外敷之使具拔出火氣

用夾法

夾時先畨轉看上下胞臉有瘀血處可剃剃至平血盡方上方可夾上夾子其夾不可高大只在重弦上仔細看其睫毛轉又要平正方可著力扯緊其夾肉處用小艾員灸三箇不可多灸灸多恐潰夾決目夾肉若未乾可再催用淡淡丹藥去其餘翳此眼縱有厚翳不可用重藥

用金針撥光了之時將蓉花葉末調水護之一日一換宜服謹翳丸等方

凡撥金針看人老瘦就手撥之肥壯者先宜服退氣散血和其五臟後可撥之

退氣散血

大黄末貳錢五分　當歸末二錢五分　川山甲一分二釐　連翹二分二釐
白芷一分二釐　乳香一分二釐　沒藥一分二釐

開金針法

凡開金針須擇吉日風靜日煖須待日午之時焚香請呼龍樹醫王觀音菩薩然後方靜坐片時定自己之氣息令人取木凳一條以綿被帖軟令患者坐於凳被上騎馬對坐面與我對平母俟高低緩緩以銅簪脚於開縫處點計之次看鋒針口與瞳人三分之下要憑口訣使高低遠近方將鋒針令其人眼轉看數遍足了方按鋒針三四下看透了即取起有些血出用綿紙拭乾其血後方用地方令針緩緩撚試若透此針取出然後依法用天字針再進取翳其翳若好撒開裹針緩緩收下停針畢方落在後去紙舉物與他看之即見不可與他人久視即用濕紙重重封固太陽用水膏塗之至次早方開看再換濕紙再封如此七日斜卧不可憑他番身轉側七日後方開封與起無妨矣　念觀音呪七遍方取出金針看其翳不浮起即用濕紙封片時方去紙舉手動之

觀音呪

願眼紫金登洒洒水离易黄沙滿藏經千眼千首千

龍王文殊大士騎獅子普賢菩薩乘象王日裏夜裏
雲膜盡翳膜消磨強中強吉中吉眼中常顧得光明
清淨般若波羅密

眼科用藥次第法

夫眼疾之醫雖分症類而其中病源不可不深思而
熟視哉夫疾有久新証有輕重須分表裏風熱氣熱
濕熱實熱而新病者皆因內積熱毒之輕循經絡而
上頭目遇外風寒所觸而發者必須先發表風邪後
乃遠其火熱黃連黃芩以瀉火防風薄荷以疎風兼
以麻黃蒼朮之類如無風寒所逼推血壅上宜用當

歸大黃防已墜下之劑久眼昏蒙所曉宜用當歸地
黃防風羌活之類有翳膜加木賊蒺藜蟬退決明等
劑如胞合眼皮不開此乃寒刑之氣傷胞宜行氣之
藥青皮黃芪香附兼以風藥佐之血滯者宜調血赤
芍歸尾鼠粘如頭痛者羌活白芷蔓荊藁本川烏之
類佐以風藥防風荊芥玄參柴胡細辛用之必當也
如眼眩暈昏潰十分作痛但虛腫痛及眼瞧此乃痰
飲所患宜二陳湯兼佐以風藥如腫脹暗痛熱淚難
禁者苦寒之藥宜然但視人之形氣虛實體之盛衰
務究其內外淺深不可專書全在人之活法方書者

乃前人立法之規使後無失其序如歸於症者則緩可以尋方倘暴發者變動於頃刻苟不明於藥性寒温病勢之緩急而使之療非徒無益而反害之矣予掇拾諸家之方贅成歌括六十餘首此平昔應驗之神方若用意熟記則不思忖而了然矣若能知抽添之工夫加減之意趣真可謂眼科中之至寶哉後之學者當以予之用心珍之重之俾術不輕而身不賤矣内障一書乃心授之法故不形於紙筆如若泛泛豈仁人君子哉

金針眼科經驗方藥詩括

酒調散歸及麻蒼赤芍菊甘菟大黄茺蔚桑螵共十味
　暴風腫痛用之良
酒煎散内歸芎苓赤芍本通山梔仁龍胎大黄欝金入
　防風加上效如神
酒調洗肝有黒参知母大黄芩桔梗梔子朴硝共七味
　睛痛淚出用之痊
四順當歸與大黄更兼甘草赤芍良不拘疾眼經年久
　一服交君便可康
八正車前與瞿麥匾芎滑石山梔仁大黄木通同甘草
　燈心竹葉效如神

雙解防風將軍芍薄荷芎歸草朴硝梔翹梗芩膏麻黄
荊芥白朮滑石良
當歸活血煎黄芩薄荷蒼朮麻黄宜川芎羌活菊花等
熟黄荊芥沒藥醫
大黄當歸散菊花薄荷黄芩川芎佳壅腫血凝生赤翳
頻頻服藥再連浣
七宝洗心當歸芍黄連荊芥及麻黄梔子大黄共七味
眼疼赤痛正相當
九仙飲治眼通紅赤芍當歸與木通白芷黄芩同甘草
菊花荊芥與川芎

治時散有蜜蒙花歸菊剝蟬梔子加木賊防風甘草連
更兼赤白芍無差
蒼朮散能止昏涙夏枯木賊甘香附蒺藜白芷芎防風
蟬退天蚕蔓助力（力字補入衆本闕）
脩肝散有當歸芩薄荷連翹山梔仁甘草防風加蜜烹
肝虚目暗用之靈
瀉肝散内有桔梗大黄知母與黑參朴硝黄芩連七味
眼痛暴発霎時平
加味脩肝散芥歸菊花羌活甘蒺藜大黄連翹薄荷梗
赤芍防風莫改移

涼膈連翹梔子仁大黄甘薄朴硝芩更加黄連赤芍藥
服之熱毒化為塵
茶調散内菊薄荷羌活川芎荊芥和石決石膏甘草少
防風木賊去流痾
眼中流出如何得四物補肝加木賊蒼朮防風白蒺藜
川芎羌活甘草炙
明目細辛藁本芎紅花歸蔓荊防風生黄椒茯麻根入
羌活蒙花共湊功
救苦湯内桔翹辛羌活川藁柴歸身龍胎知母荊防草
黄芩連栢生地升

愁 ウレヘ カナシム
雙 サウ フタツ ナラブ

撥雲菊花及蟬退白蒺川芎荊芥配羌活防風桑白皮
掃除執翳真無偽
肝風衝眼淚昏蒙羌活黄芪及撫芎甘草蒺藜荊芥穗
何愁翳膜障雙睛
蜜蒙花散有菊花木賊石決明莫差白芍甘草白蒺藜
細研為末用清茶
連翹散内有黄芩羌活菊花草決明白蒺蜜蒙龍膽草
更兼甘草去羞明
川芎羌活治頭疼藁本細辛白芷增更有蔓荊防風佐
教君一服便安寧

煖肝湯内有防風茺蔚藁甘及川芎五味細辛知母等
黄芩若治最多功
省味脩肝用當歸赤芍防風白蒺藜蟬退大黄川芎使
更加木賊是其宜
復明散内石决明茺蔚青箱甘蔓荊木賊人參夏枯草
白芷芎蒺草决明
人參羌活散獨活甘草茯苓桔梗芍枳殼天麻地骨皮
柴胡前胡川芎藥
洗心散内七般藥甘草當歸同芍藥荊芥蒼朮麻大黄
眼腫服之如捻却

退赤散内有大黄黄連白芷赤芍詳當歸白蒺葱去白
何愁淚出白如湯
小菊花散只五味蒺藜木賊五味是羌活爲末用茶調
專治羞明并澁淚
防風湯内用蟬蟲薄荷當歸及川芎羌活大黄梔子草
熱衝眼自并頭風
蟬花散内菊芩風羌活山梔白蒺芎木賊蔓荊决明子
谷精荊芥草蜜蒙
省風湯内有羚羊羌活黑參麻大黄知母當歸升桔梗
蜜蒙甘草是奇方

補血當歸熟地黄白朮白芍芎芷防車菊辛羌甘白茯
桔梗茺蔚蒺大黄
活血當歸散木通黄芩生地與撫芎白蒺當歸生梔子
赤芍甘草菊花同
硫血當歸劉寄菊玄明赤芍紅蘇木夫芩歸尾羌連翹
木賊甘草生地熟
菩薩散藥只五味甘草防風白蒺藜蒼朮荊芥治羞明
効若靈丹故名是
明目流氣飲牛蒡荊玄梔藜細防風甘草大黄再添入
眼中赤澁不來攻

蔓荊散内有黄芪甘草人參白芍宜黄栢倍加將酒炒
昏蒙虚氣用之宜
川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛兼羌活
荊茶同煎用者多
助陽和血補氣湯甘草當歸白芷防蔓荊升麻柴胡使
黄芪加上水煎嘗
省風百觧荊芥參甘草陳皮白茯苓姜蚕芎藭防風藿
蟬退厚朴羌活葶
散熱飲子用黄連防風羌活黄芩兼大黄當歸生地入
腫痛暴發即時痊

龍膽散有乾菊花川芎香附木賊加草決明中加甘草
迎風冷淚却無此
芎藭散內荊芥多甘草菊花及薄荷蒼朮一味米泔浸
研為細末任調和
神仙退翳羌活歸甘草蒙花荊賊藜地骨瓜蔞蔓枳實
椒連蟬菊薄蛇皮
當歸龍膽升麻草赤芍柴胡五味藁羌活石膏同黃芩
黃柏連翹酒炒好
洗心眼散治退紅羌活升麻草木通梔子大黃赤芍藥
黃芩九味奏防風

偏正頭痛用清空膏連酒炒及川芎柴胡羌活黃芩甘
細辛少使配防風
蟬花茶調散川芎荊芥
羌蚕蟬退治頭風
打撲疹疱紅花散升麻生地羌活甘草大黃連翹赤芍藥
更加當歸尾國老
小防風湯梔子仁羌活甘草當歸身赤芍大黃水煎服
小兒熱毒用之神
小承氣湯薄荷蟬甘草杏仁及防風羌活天麻當歸是
大黃赤芍水煎同

菊花膏内用大黄荊芥黄芩木草蒼羌活防風黄連左
細辛爲末蜜調嘗
糖煎散有龍膽草防已防風同甘草赤芍川芎荊芥歸
服之奇效如神好
蟬花無比有茯苓羌活防風當歸身赤芍蒺藜同甘草
川芎蒼朮草决明
退翳撥雲黄連芩菊花龍膽羌活荊大黄石膏甘白芷
石决防風草决明
已上六十一方　隨手作効

丹藥和論

對交丹四六丹可吹久年翳膜虚厚未堅實者不見
人物者可三日一次九一丹解之其翳即消散如水
厚薄至効如是對交四六不可用也後可用珍珠散
間九一丹點之
三七丹施於手久眼凡紅白翳不拘下生上上生下
厚極者可二日一次以淡淡丹和解之
二八丹理三五年發歇眼有紅系略有疼痛痒澁其
翳帶紅白色可一夜一次輕藥和之
九一丹治眼時常發歇眼目生翳或疼痛可點若無
疼痛只用清凉散間九一丹點之若有淡翳似飛雲

霧者只用碧雲丹清凉散吹點
又有一切冷眼不受寒藥者只用清凉散少加片腦
入些姜粉時時點之効
又有一切眼不受納藥者看其翳若去得將各様丹
膏少少調乳汁時時少少點之更不受者用淨三黄
陽丹不用腦點亦能消翳吹雲膏亦可主之
又有一様受不得前藥只將陽丹不用腦射朋砂點
之
又有一様眼諸丹藥點不服將雞子梹榔磨冷水將
雞翎點亦能退翳

又有一様眼不用丹藥將青塩及食塩火燒過冷水
調雞毛點亦能退翳
又有一様眼人丟刺在眼不得出者將葱搥碎敷之
又將五倍子搥碎敷刺亦出又將蜣螂即噴屎蟲研
碎敷之刺亦出

煉蘆甘石浸藥水方

防風	黄芩	大黄	當歸
龍膽草	黄栢各二兩	羌活	生地黄
川芎	白芷	細辛	菊花各八錢
麻黄	赤芍藥	蒼朮	木賊各六錢

黄連一兩五錢　荊芥五錢　山梔子　薄荷各七錢
草烏此以下三味新增　栢子仁　柴胡
蜜蒙花
右將二十四味俱選新鮮的細切如麻豆一咀用冷
水四五碗銅盆內浸三四夜若春夏浸一宿秋五冬
七日常以手擦過使其味出用細布濾過之

煉蘆甘石法

其甘石須選帶隔又要輕或帶淡天青色可也打
碎用燒過銀鍋內貯滿一仰一盖頓丹爐內煉至
極紅透鈐出淬藥水內其藥過藥傾撇仍將甘石

置火內依前淬如此者三凡一次須煉極紅不透
恐甘石變色黑淬三次已定將甘石通打碎又用
新藥水浸一宿去火毒次日傾盡藥水晒乾研末
有石者作一處無石者作一處異研又可將藥水
再濕過晒過研極細細絹篩過即為陽丹

修合陰丹法

煉過甘石四兩　銅青七錢五分　硇砂白的二錢半　青塩二錢半
彌陀僧一錢
右將此五味用龍膽草及黃連二件浸過的水通將
五味和均濕過碼碗內研得如泥至膩方可晒乾再

研方入別藥

又入六味

黃連二錢五分淨末 細辛末二錢去葉 草烏末二錢 薄荷葉八分

乳香製過一錢半 沒藥製過二錢合乳香製法在後

右將此六味研至極細膩方入別諸藥

後藥味

朋砂明者一錢五分 胆礬三分 雄黃七分要黃明者 輕粉七分

黃丹五分以水淘去硝砂沉丹用晒乾 硃砂五分 牙硝五分

海螵蛸七分火煅味淡白色者不煅 白丁香五分即小雀屎立散者

血竭五分 明礬一錢火枯 姜粉七分晒乾 姜浄沉濾細

腦射 少許

除片腦及射香隨時加減外其餘藥二十三味通共一處併研至細膩細絹篩過貯作一罐謂之捲雲丹即陰丹也惟此一料捲雲丹以陰陽動靜用之或可加可減斟酌膜之厚薄翳之遠近假如年久翳膜厚者加以陰丹減陽丹若使翳膜薄者或乍發不久者又加以陽丹減以陰丹外障諸症不出此藥百試百驗無不效真乃濟世之靈寶也

珍珠散 治一切膜障眼

乳香製過 沒藥製過 珍珠製過以上各一錢五分

朋砂 枯过一錢　輕粉 一分半　射香 七厘　銅青 五分
牙硝 二分半　硃砂 一錢五分　片腦 二分　血竭 五分
蕤仁 二錢新竹筒盛了文武火煨去壳油筒兩頭亦要紙封固取出去白皮方去油研用
琥珀 八分員時以一點研將簪脚點放火上燒化爲清烟者氣做松香其色蠹紅乃爲真也
胆礬 二分半　明礬 枯二分半　白丁香 二分
右精製爲極細末配童子小便浸三黃水煮甘石爲陽丹听用
怕日羞明多淚並皆治之却將黃連末熊膽牛黃蕤仁四件用長流水一大碗於磁器內熬至半碗用重綿布濾去渣量意入蜜二兩文武火熬至紫色蘸起

牽絲爲度不可太過不及方將朋砂龍腦收貯在磁器封固土埋七日出火毒用時將銅簪蘸點於眼內少許日點三次忌動風之物

靈妙應痛膏　此膏治眼疼痛暴發不可忍者
蕤仁 一百粒去皮油　硃砂 飛一錢　片腦 一字　乳香 如棗核大
朋砂 一錢
右將前藥俱爲細末用蜂蜜爲膏子以銅簪點之一二次其痛即止

神仙碧霞丹
銅綠 一兩　當歸 二錢　沒藥 二分製過　麝香 二分

馬牙硝五分　乳香五分制過　黃連末二錢　牛腦二分
白丁香二分　一方加此三味

右將前藥俱研爲末熬黃連膏子爲丸如龍眼核大用時將一丸涼水化開日點二次六次効

吹雲丹　治目中淚及迎風並羞明怕日常欲閉目在暗室塞其戶牖翳成歲久遮睛此藥多點神効

細辛　升麻　蕤仁各二分　青皮
連翹　防風各四分　柴胡五分　甘草
當歸各六錢　荊芥穗一錢絞取濃汁　揀黃連二錢
生地黃一錢五分

右將㕮咀除連翹外用淨水二碗先熬餘藥至半碗入連翹同熬至大盞許去渣入銀石器內文武熬至滴水內成珠不散爲度煉熟蜜少許熬用之

擂鼻散

三黃　黃栢　黃芩　黃連

煉煮罐內三黃童便以乾爲度取出又以龍膽草水洗浸一宿晒乾甘石即三黃丹聽用以前珍珠散藥末爲極細末再不必用製配合三黃聽用

珍珠散　此能退翳翳厚者點之合此藥朋砂要枯過用

一倍三黄丹　一倍珍珠散　腦射朋砂臨
時放量度下
如要輕此
一倍三黄丹　一倍珍珠散　腦射朋砂如
前
再要輕此
陽丹一倍　三黄丹一倍　珍珠散一倍
上三様共合腦射朋砂亦要
合丹口功要法
其合丹之日要天晴日朗更擂諸藥要細篩而又篩

方妙
九一丹　九匙陽丹　一匙陰丹
二八丹　八匙陽丹　二匙陰丹
三七丹　七匙陽丹　三匙陰丹
四六丹　六匙陽丹　四匙陰丹
已上丹藥俱腦射硼砂枯煆過臨時量度加減放

假如二八丹陽丹八匙陰丹二匙用片腦三釐枯過
硼砂四釐射香二釐
九一丹陽丹九匙陰丹一匙枯過硼砂五釐片腦三
釐射香一釐能止淚去翳

清凉散

即陽丹十匙硼砂六釐生用片腦三四釐射香三
釐其腦射硼砂點時合丹量度下

碧雲丹

即青凉散加銅緑亦要腦射或加枯礬少許能去
翳膜用

捲雲丹

即陰丹如遇眼勾剪大小眥頭暈可將藥調液點
退血

又有一丹點能退翳

捲雲丹一匙　陽丹半匙　姜粉三分
飛礬半分　燒過塩一分半　共合點之

七寶散

琥珀　珍珠各三錢　硼砂五分　珊瑚一錢
硃砂　硼砂各五分　玉屑一錢　蕤仁三十粒
片腦　射香各一分

右將前藥俱細研碾如塵埃方入射香片腦雜仁三件再研熟官絹節過於罐內夜間臨卧以銅簪挑一米大許點於有翳膜處

攪雲散

蘆甘石 煉過 二兩 黃丹 制過 二兩
乳香 沒藥 川烏 五錢 犀角 二兩
硼砂 硇砂 青鹽 各二錢五分
血竭 輕粉 鷹屎 各二錢
片腦 五分 雜仁 去殼 半錢
射香 五分

右將前藥如法精製共研和均極膩以羊角錐收貯但有翳膜者以銅簪每夜臨卧點二次極厚者亦能去也

治諸眼一切點貼膏藥

千金勝極膏

蘆甘石 煉過 一兩 黃連 末 大錢
川烏 炮去皮 大錢 銅青 好的 二錢
川姜 煨去皮 大錢 沒藥 製過 黃丹 各一錢
乳香 製過 一錢 硼砂 五分 龍腦 五分
射香 二分 雜仁 去皮油 炒 錢

右將前藥俱為末冬蜜一斤砂鍋內溶開生絹濾過去蠟煎熬用棍棒丕住手攪熬至紫色滴水不散將前藥末入內攪勻取出於青石上鐵錘可打千餘下

或爲錠子或爲丸子不拘作法遠年遠日疼痛風濕難開諸症將一丸溫水化開或點眼或作錠子磨水點之極効文或爲膏於紙上貼兩太陽穴散血尤妙

熊膽膏

熊膽一錢真者其色如沙糖樣帶閏濕色喫在口內味苦又涼即真者　牛黃一錢

龍腦五分即蘇州茄荷其葉三四指大如羊葉相　蕤仁去油一錢

硼砂一錢　黃連爲末二兩

此膏治男婦遠年近日內外障膜赤爛天行時氣暴發赤腫

治眼腫紅痛澁難開若用薊洗之後可吹鼻中先含水一口然後吹之以通其氣散其風邪

鵝不吃草二兩　川芎　白芷　石菖蒲

蔓荊子各三錢　細辛　牙皂　全蝎各一錢

鬱金三錢

右爲細末確內收貯勿令泄氣以備後用

五黃膏　治目腫澁痛欲以冷洗應驗

好黃連　黃芩　黃栢　大黃

黃丹

右爲末以芙蓉葉用冷水或煎茶調貼兩太陽穴

白歛膏

好白芨　小白芷　白歛

右爲末牛脂熬成膏如前敷貼

四生散　治眼目被物刺傷或模損

生地黄　生薄荷　生艾葉　生當歸

朴硝

右共搗爛貼眼眶并患處

神仙散　治頭目昏眩偏風痛極

甜瓜蒂　焰硝　雄黄　蒼耳子

川芎　薄荷　藜蘆　鬱金

右將前爲末口含水吹一字入鼻中令患者含水一口方吹藥入患者鼻中

碧天丹　專治遠年近日爛弦風眼

銅青五錢　明礬四錢　五倍子一錢　白礬土一錢

海螵蛸一錢　薄荷葉五分

右將此六味俱爲末用老姜汁搜和爲丸如圓眼核大要用時將一丸淡姜湯一盞泡散洗眼弦次日再洗依此洗三四次即愈

八仙丹　治爛眼弦風有蟲痒甚効

當歸七分　銅緑一錢　薄荷七分　白礬一錢

黄連　五倍　焰硝各五分　軽粉一分

右爲末極細以絹篩用絹包約龍眼核大泡洗日三
五次

藥性論

當歸味甘性温入心肝二經尾能破血頭養血全用活
血熟者不可用製用酒洗

川芎味辛性温入肝經上行頭角助陽氣止痛下行血
海能養血如氣旺者不可用

赤芍藥味苦辛性寒入肝經能破血行血去赤膚止痛
白芍藥味苦酸性寒入肝經能補脾損肝氣能養肝血
瀉肝火如肝虛火衰者不可用

熟地黃味甘性温入心經肝經補血如熱者不可用用
酒蒸杵爛爲餅晒乾研爲末作丸如不作丸勿蒸

黃柏味苦寒入腎經補腎降相火如火衰不可用

龍膽草味苦性涼入肝經益肝膽氣治目赤腫除胃家
伏熱

半夏除濕化痰和胃氣利胸膈治太陰頭痛製用姜汁
炒

羌活入膀胱經治頭痛去風和降肝氣肝虛不用
防風味甘辛性熱入膀胱經以體周遍療諸風以氣味
能瀉肺經

黄連味苦寒入心經能瀉心火凉血去中焦熱厚腸胃
大黄味苦寒入胃經有推墻倒壁之功能消腫去其皮
膚之熱實者生用虚者酒蒸久患虚腫者勿用
生地黄入心經治血熱生新血散瘀血凉心血寒者勿
用
麻黄入肺經去風寒退邪熱開九竅發表
白芷味辛性熱入腸經去風止痛消足陽明頭痛去肺
肝二經發熱
細辛味辛性熱入心經能去風止淚頭痛益肝膽通竅
去葉用

山梔子味苦入肺經瀉肺火除五臟熱目熱赤腫宜用
要炒
木賊味甘入肺經去目翳益肝膽明目去風通竅止淚
蒼朮味辛性温入胃經平胃氣去風邪去濕止淚發散
用米泔水浸一日一換水浸炒乾用
瞿麥味苦入小腸經去膀胱熱養腎氣明目利小便
黄耆味甘性温入脾經行氣固表虚血滞不行宜用蜜
浸火炙研爲末作丸如不做丸勿如此
滑石入小腸經能降上炎之火通九竅利小便
車前子味甘鹹性寒入小腸經清利小便去肝經風熱

石決明入肝經去目障明目有沉墜之功肝虛者不用
火煆極紅為度
青霜子性微寒入肝經瀉熱上衝去赤障肝虛不用製
用酒洗
草烏明入肝經溫肝熱熱痛淚出明目肝虛不用
白蒺藜不入湯藥宜丸入肝經明目去風止痒炒杵去
刺用
牡丹皮味苦寒入腎經瀉陰火陽火能涼心血能行滯
血止痛
地骨皮味苦寒入腎經退熱除蒸瀉肺熱宜用

桑白皮味甘入肺經除肺熱瀉肺氣肺寒不用
麥門冬味甘寒入肺經治肺熱去肺腑火又清心竅
蜜蒙花味甘入肝經去目中赤脉眵淚能明目
烏藥入肝經能順氣行氣去風
胡黃連味苦寒入肝經退骨熱潮熱補肝膽明目能治
小兒疳傷不下食霍亂熱痢疾小兒藥多用之
蔓荊子味苦寒入三焦治頭疼眼睛痛能明目開鬱降
火
枸杞子味甘入腎經補腎明目去目中赤膜遮睛酒洗
用

何首烏味苦温入心經祛風寒治陽明頭疼
蟬退入肝經去風解毒脫目翳止淚散寒邪
白朮味苦温入脾胃經能健脾胃生津液去胞臉濕熱
氣喘者勿用又能助氣
香附米味苦辛能行氣助胃氣止淚去濕用之炒去毛
杵淨
夏枯草稟純陽之氣得陰氣則枯能止淚去風以陽補
陰之理
千里光入心經去風解毒熱明目亦能行氣即夜明砂
水淘去屎畱砂

一種草藥名千里光採其嫩葉淨洗搗汁熬成膏單用
點眼退翳明目恐即此也前註恐非
遠志味苦氣温入心經定心益志利竅安魂魄
犀角入心經涼血解心熱清頭目鐵剉剉碎用或水磨
服
羚羊角入肝經清肺肝火清心明目肝虛不用
石膏入胃經瀉胃火伏熱有鎮之功胃虛不用
乾葛味甘平入胃經解肌發表退熱升提胃氣
藁本味辛入膀胱經去顛頭痛引藥上行
史君子味甘入胃經殺疳虫利小便

薄荷味辛寒入肝經去賊風發表利関節止痛
菊花味苦甘微寒入肝經明目清頭風去目翳發表
茺蔚子味辛甘入眼經除血熱明目去風
甘草味甘生寒熱温入脾經生用能瀉火解毒灸者能
助胃和平
桑螵蛸補腎去風通五淋利小便明目散翳
槐花味苦寒入心經去心赤瀉血瀉大腸熱
鬱金味苦寒入心經治血鬱於且能凉能破心下氣開
鬱
黒參味苦鹹入腎經補腎氣明目得黄芩瀉肝火除肝
熱
知母味苦寒入腎經補腎水瀉腎火三焦火
桔梗味苦温入肺經治肺熱爲諸藥之舟楫乃肺部之
引經
芒硝治積聚熱疾利大便不通
漢防己味辛苦寒通行諸經去風寒有走達之功
蒲黄味甘性平入心經能消瘀血破血消腫炒用
連翹瀉心火解脾胃温熱除心經客熱
五味子味酸性温入腎經肺經補腎滋肺益肝
獨活味苦温走諸經去外受賊風無分新舊

楮實子味苦寒入肺經升陽上行能去風治頭痛
肉蓯蓉味酸鹹性温入腎經補腎生精用酒洗相火旺
不用
川椒味辛熱用之於上退六腑之沉寒用之於下去目
中障盲去目炒去汗用
人參味甘氣温無毒入肺經補氣不足安魂魄生精開
心竅通血肺寒可用肺熱傷肺
白茯苓味甘温入肺經安魂定魄補心虛養神利小便
旋覆花味甘入肺經去痰明目治頭風
兎絲子味辛甘入腎經補腎明目能去目黑花酒洗蒸
餅晒乾爲丸不做丸勿製
澤瀉味甘寒入膀胱利水通淋補陰不足明目
黑附子味辛大熱入三焦主陽散風去寒邪火旺者不
用即大附子去粗皮
木香味苦性温入心經主治心痛泄胞腹中滯寒冷氣
不必過火磨入藥中服
牛膝能引諸藥下行丸用土牛膝春夏用葉冬用根惟
葉之効尤速能益精又治竹木刺入肉敷之即出
石斛味甘性温入腎經去胃熱補陰血益精壯筋骨
紅花味甘苦入心經能破血行滯血少用又養血

天門冬味苦氣寒入肺經瀉肺火定肺氣利小便涼血
去心杵爲餅晒乾爲丸如不做分研
石菖蒲味辛性熱入腎經補腎能開心竅明目
柴胡味苦寒入肝經能除往來結熱積於胸中除肝熱
又得黃芩能瀉肝火
黃芩味苦寒入肺經枯者瀉肝火實者退膀胱熱
巴戟能補腎益精療陰痿引氣上行
陳皮去白者消痰利氣留白者補胃和中
葶藶味苦寒入肺經瀉肺喘利水下肺氣炒用
芎藭入腦治頭痛血虛者去頭風養血

白附子一名兩頭尖去風痰止頭痛去粗皮用
天麻主頭風去風疾利四肢濕痺
枳殼寬腸下氣祛風化痰治風邪作痛
瓜蔞根即天花粉入肺經去痰火解熱毒又能除酒毒
肺寒者不用冷痰者不可過用有熱藥此宜可亦
用之
匾蓄利小腸經熱閉
小茴香味辛氣平開胃行氣止嘔吐膀胱冷氣腫痛入
藥妙
南星去風痰消腫毒用姜汁煑過

草爲走筋骨敗血去風止痛薑汁煮用
川烏去風寒作痛助陽
荆芥去皮風邪發
雄黃解熱毒散血止痛
乳香調血氣利諸經之痛製用等第三片夾藥在中炙
斗火炙去油研末用
沒藥破血止痛去目翳膜同前製法
血竭破積血止痛去赤膚
木通利小腸經結熱降心火
牛旁子去風明目行血

蛤粉能消痰火涼血解肌表極熱
蛇退即蛇皮去風毒止淚疼痛
全蝎消風毒破風痰尾更住去四足之
薤香開胃氣結痰利之
蚕退去風消痰明目去翳膜即曉蚕砂
龍腦即薄荷性熱能通利寒熱去風消目赤
芣松味芣性温去風下氣治心腹痛辟惡氣
硃砂鎮心安魂魄涼血
肉桂引大陽經止頭痛去寒邪利肝膈氣
白歛散結氣除目赤熱

藜蘆吐氣風痰快膈去蓋用根有大毒用宜斟酌
白芨去賊風解中風熱閉
猪牙皂角去風痰解表利氣多去皮弦
香白芷去皮膚風熱瘡瘥
杏仁潤肺氣去痰行血
紫蘇消痰解表利氣
夜明砂明目去風
山茱萸入腎經除頭暈補虛生精去核
天麻子去風補腎明目研碎入煎藥
熊膽退熱降火去目赤熟試真假用水一碗撒灰在內
將熊膽放水中分灰水各開兩邊為真者其色淸黑
山藥補腎不足生精
牛黃去熱痰能安魂魄凉血淸心
石燕通血利小便治淋
薏仁去目中赤痛風痒去翳
在內於紅火煨藥紙乾取出打去油聽用
珍珠淸心明目去目腫翳製法用豆腐一塊入珠於腐內
蒸過取出用洗淨無漿白綿布二三重包珠石上
杵爛用細末

玄精石安魂魄有氣之功
沙魚皮解風毒止淚
威靈仙去風邪
青皮能下氣快膈消痰濁氣升於至高者而能下氣虛
者不用
青鹽補腎引至下部水磨化銅鍋熬成鹽聽用
川練子明目退熱補腎去核用
沉香補右尺命門脉壯元陽散滯血

方點藥撥翳膏
薏仁去皮殼 射香四分另研
石蠣煅一錢 片腦五分另研
白丁香五分水登 紅珊瑚
熊膽畧炙乾 辰砂
銀精石滾水泡各一錢 蕙耳石用五錢或七錢
硼砂一錢明者將紙七重包煅另研包起
石燕遇有翳厚者加入無翳者不用
右為細末和勻用磁器罐秉起一半乾點一半入後藥

珍珠一錢放三日腐上蒸遍 琥珀一錢另研
硼砂一錢另研煅 青鹽另研分
滴乳香炙 金精石滾水泡

當歸尾 生地黃
赤芍藥 防風

蔓荊子　羌活　連翹　黃芩　薄荷

各用五錢剉細用雪水或臘月水兩大盞石器內煮藥至一盞去渣用真正好白蜜三兩再用文武熬三四沸以新綿濾出收入磁罐內却將前藥末共作一處攪勻用清油紙縛住常常旋取點用此藥收八九年亦好不壞此仙傳方也

銀海精微卷之下終

寬文八年仲冬日
村上勘兵衛刊行