

- 【用法】 每次食杏仁二至三粒，每小時服一次。
註： 如無狂犬病毒者，服藥後會有口、舌腫痛，腹痛等，倒作用，如係狂犬病則不會，同時兼服瀉下利尿劑使大小便通暢。

治狂犬病方

封開 莫福林

- 【處方】 吉祥花搥糖敷（正萬年青大種的）
【適應】 毒狗咬

治狂犬病方

封開 李考年

- 【處方】 甘草錢半，杏仁錢半，口嚼爛敷患處。
【適應】 瘋狗咬。
普通犬咬用甘草杏仁可以治療，至瘋狗咬能治否未敢決定。

治狂犬咬傷方

雲浮 潘寶林

- 【處方】 正川連二錢，北杏四錢，大甘草二錢，茯神三錢，斑茅虫廿四只。
【製法】 取米一撮，將斑茅虫和米炒至黃色，去淨斑茅虫不用，只將米研爲細末。
【用法】 將藥四味，用水二盅煎至一盅，沖入米粉和勻連粉服盡。
註： 本方屢試屢驗，曾救多人，不可忽視。

治癩狗咬傷方

雲浮 朱旺貴

- 【處方】 甘草，果皮，豬兜沫，蕃薯葉，搥爛敷傷處。

治癩狗咬傷方

雲浮 鍾伯平

- 【處方】 萬年青約三至四兩，煲水飲約飲三至四斤愈。

治狂犬咬傷病方

雲浮 黃瑞林

【處方】 萬年青蕋，草鞋頭，六月雪蕋，水煎服至多次愈。

治狂犬病方

雲浮 蘇善卿

【處方】 斑茅虫（去頭足煨存性）每服三分，加六一散冲服，如小便紅而刺痛，用萬年青，六月雪，煎水服之。

治癩狗咬傷方

陳福泉

【處方】 大柚皮（燒黃）二三只。

【製法】 將藥用砒酸水加麻油攪勻敷傷處。

又方

【處方】 人參錢半，甘草錢半，茯苓錢半，川芎錢半，薑活錢半，地榆三錢，獨活錢半，柴胡錢半，枳壳錢半，桔梗錢半。

【用法】 每日服一劑，連服二三劑。

又方

【處方】 瀉葉二錢，大黃錢，銀花三錢，川烏錢半，熟草烏錢半，甘草二錢，北齊錢半。

二、蛇蝎咬傷（包括蜈蚣咬傷）

毒蛇咬人效方

黃舉昌

【處方】 黎壁葉，雷公豆。

【用法】 用酒炒，以汁來服。

毒蛇咬傷驗方

順德 蕭沃林

【處方】 大葉七星劍（用葉和嫩梗）大葉蛇總管，（用頭，種有

三年以上者）入地金牛公，（用蘘之皮）眼龍（用葉）雄黃精，玉綉球，（用葉搾汁）。

【製 法】 上列各藥，同等分量，研極細末，再用玉綉球搾汁爲丸。每粒重一分。

【用 法】 每次二粒，有嘔者繼服二粒，非因毒蛇咬傷誤服此藥者，可用黃精解之，若被青竹蛇咬傷，用生蕪乾菜煎水服。

【適應範圍】 毒蛇咬傷。

青竹蛇咬傷驗方

順德 黎良

【處 方】 七星劍一兩五錢，（生草藥）

【製 法】 搗爛用酒浸。

【用 法】 多飲酒的多開，少飲的少開，酒和藥量須按一定比例，飲後用刀將傷口割開流血，放清毒素，然後將藥渣搽傷口。

毒蛇咬傷驗方

陳德君

【處 方】 半邊旗（草名）

【用 法】 浸酒飲服

又 方

【處 方】 金不換（草名）

【用 法】 將藥浸酒飲服。

毒蛇咬傷驗方

陳信如

【處 方】 蛇王草

【用 法】 藥生用六錢，搗爛，熱酒冲服。乾用研末，熱酒冲服。

蛇、蜈蚣咬傷方

張健光

【處 方】 山甲，浙貝，皂角，銀花，乳香，花粉，沒藥，歸尾。

【用法】 將藥煎服並用外敷藥，第一次用綠豆二兩，馬蹄去皮二兩，共搥敷，第二次用野藤頭四兩，柏葉三兩，黃糖二兩，共搥敷，第三次用野苧藤四兩，生指甲葉三兩，片糖二兩，共搥敷上。

毒蛇咬傷驗方 普寧 張伯色 張伯神

【處方】 單辟毒一兩，金獅藤一兩半，倒坎菊一兩半，薄荷仔八錢，胡椒根一兩，牛刀菊八錢，割蛇劍一兩，紅心杏二兩，刀竹八錢，細辛五錢，白芷兩半，紅精三錢。

【製法】 共為細末，用酒和麵粉煉糊為丸。

【用法】 成年人每服四錢，小兒減半。

毒蛇咬傷方

陳福泉

【處方】 白凡二錢，白姑錢半，玉茸錢半，茯神二錢，細辛錢半，靈先二錢，白芷二錢，川芎錢半，丁香一錢。

【用法】 將煎以清水煎服。

中國抗蛇毒藥物：

我參觀廣東省中醫藥展覽會，知道您院進行抗蛇毒中藥研究工作：這是值得重視的問題。雖然近代科學發明幾種抗蛇毒藥物，尚未能達到滿意的結果；祖國藥物有希望將這個問題推進一步，茲將鄉村經驗草藥及抗毒藥物，提出來作為參考研究的材料：

茲將各類蛇形，抗毒藥草列下：

五虎蛇：目烏口紅，身有五色形，似毒花。用龍舌草為主治藥。

百步蛇：四節有尾，形如水圭。用尾射草為主治藥。

箕甲蛇：身烏一節白一節，舌白口紅，瘡口牙痕雙層。

用菜瓜蜜為主治藥。

飯匙銑蛇：瘡口咬二點烏。

用柳枝簾為主治藥。

膏竹絲蛇：瘡口咬二點紅。

用蒲羅二榔為主治藥。

- 白肚官蛇：**公蛇頭下七點，母蛇項下一條白，瘡口咬二點烏。用茅裡金釵爲主治藥。
- 血結蛇：**全身紅。用哆尼簧爲主治藥見血不治。
- 罩蛇：**形烏，牙根雙層。用杏草爲主治藥。
- 割岸蛇：**形似劍刀，尾傷人。用潑濁筋爲主治藥。
- 龜頭蛇：**牙根雙層，傷口有雙層。用大本馬尾絲爲主治藥。
- 金腰帶蛇：**舌烏口赤，尾有刺，身帶金絲條。用龍牙草爲主治藥。
- 烏稱蛇：**身短，所咬瘡口一吼。用小本乳草爲主治藥。
- 哆尼根蛇：**身有烏紅。牙痕雙層。用黃花仔草爲主治藥。
- 雨傘節蛇：**身帶青黃，一節青黃。用水沉香草爲主治藥。

按上藥是福建閩南藥草名稱，可能與其他地方差異。

特種藥：被毒蛇咬傷，劇痛，傷口見黑筋一條浮起，向上伸展，急將長髮紮緊，勿使黑筋伸張。用吸飽血的臭虫（木虱）七隻，重症十隻，放入口內嚼爛吞服，或搗爛調米酒服。味覺甜。并川臭虫血塗傷口，浮起黑筋漸退，其傷口不久發現蛇齒隨黃水流出，沒有活虱，虱乾亦有效，惟服量加倍，各種毒蛇咬傷都可用。

百足咬方

【處方】用白心蕃薯搗爛敷上患處，如無蕃薯的薯藤亦可。

治蜈蚣咬傷效方

【處方】用黃皮核錄輝敷上傷口，或用蜆蟪（即鼻涕虫）搥傷口，立止痛消腫。

又方

【處方】蜈蚣煨灰約二、三分，煖滾水沖服可治「破傷風」并治一切瘡瘍腫毒，損傷爛肉等。

毒蛇咬傷方

陳福泉

【處方】 鳳尾草，二面針，掃把枝（松花蕊）吹波草，禾花氣，老虎鬚，各少許。

【製法】 將藥用雙料酒半斤煲食。

【用法】 腫甚加吹波草，痛甚加二面針，如孕婦食後數小時再服十二太保一劑。

毒蛇咬傷

揭陽 魏坤娥

甲 方

毒蛇咬人爲害甚烈，其毒在舌，被咬者，二分鐘後週身麻痺，頭痛口渴，一點鐘則目濛不能見物，二點鐘則能死亡，被咬之處則慎勿貼藥（使之抗毒內入）服藥後候其瘡口變黑色，以細磁割破，砭去毒血而愈。

初咬時縛緊其上部，使血流慢緩，切勿以手摸其瘡口，以免染毒他處，更爲厲害，倘驟然不能得藥，暫向鄰近沽白米酒數升服至大醉，以暫抵抗，慎勿洗水，着水即死。

蛇咬一事，常在田間，甚或黑夜，迨至發覺，則蛇遠去，不明其是否毒蛇，則依兩種証據，一是視其症狀，二點鐘內不發病，可無問題，一是視其齒位以作鑑別如下：

有毒的：（一）白花蛇（即希扶鱧）（）全班齒，圓形無血，無痛，而麻木。

（二）烏、白暗鑽（烏、白梢蛇）兩個齒位甚深，浮腫色黑大痛。

（三）青竹標：有血，大痛，此蛇常住山坑。

（四）黃金鉚：此蛇之舌不甚毒，其尾巴有毒簕，口咬而轉尾螫之，故口位之外尚有一個毒瘡，此蛇亦常住山坑。

無毒的：（一）水蛇（）捨齒四個有血有痛。

(二)草花蛇不捨齒有痛，流血甚多，水蛇與草花蛇，如遇睚子之時，瘡口有腫有黑，多血不痛，亦有死亡。

治療處方有二：(一)是君臣藥，(二)是菁草藥如是外科生蛇者，則(一)方研末外敷，(二)方煎水調酒內服，如是蛇咬，則二劑同服，如被咬者，須先服藥，愈先愈好。

【君臣藥方】生南星，川白芷，葦撥，牙皂角，細辛，川大黃，正雄精，剝刁根，以上各三錢，川蜈蚣三條煨用以上九味共研細末外科敷用，咬傷同下方內服。

【菁草藥方】金劍草，金花草，金香爐，金鎖匙，山厚合，白花七托蓮，黃花仔，千年蓀，關刀筆，山勤菜，節節花，一枝香，倒地梅，白花鬼仔目週根，以上各五錢，川蜈蚣五條煨用。

以上十五味晒干研末，生蛇作用服，蛇咬與上合劑同服(白米酒二同煎)。

又 方

揭陽 林 猛

紅枝乳(鈴)仔草四兩，金西籐四兩，牛刁根四兩，金樹香六兩，龍眉筆四兩，山節花四兩，一枝香四兩，山厚合四兩，倒金菊四兩，土(鋪)地錦四兩，馬丫繳四兩，黃花仔四兩，消山虎六兩，六角英六兩，半畔蓮六兩，鹽酸藤六兩，藥丸草五兩，金香草六兩，割蛇劍五錢，荷箔四兩，明雄精八兩，細辛三兩，刁竹三兩，金胡蘆五兩，白芷六兩，半夏三兩，蜈蚣卅條，川蓮二兩，南星五兩，皂角三兩，五靈脂四兩，川貝三兩，川大黃四兩，山甲三兩，七托蓮三兩，黃芩三兩，

本方共研細末和蓀粉糊爲丸，外用雄精爲丸衣，每服十丸散劑則每服三至四錢。

因症加減法：(蛇咬無定處輕重深淺不一定)

白花蛇咬着陰毒用之下各藥須加重用酒送下：

薄荷，雄精，白芷，細辛，苡髮，刁根，半夏，蜈蚣，川蓮，南星，皂

角，五靈脂，（共研細末每服加錢半）

烏梢蛇咬着陽毒用之下各藥須加重用酒送下：

川連，川貝，大黃，山甲，七托蓮，黃芩，火盛加犀角，浮痰加射香，牛黃，珍珠，珠砂，（共研細末每服錢半），如危急死症者用蜈蚣浸酒灌入口或可望生。

又 方

揭陽 楊 魁

雄精五錢，細辛一兩，白前一兩，必發三錢，靈脂五錢，靈仙五錢，刁竹一兩，白芷五錢，龍頭荷三錢，白花茶時紅一兩，牛舌紅一兩，兒舌紅一兩，白枝七葉蘭一兩，重樓一兩（金線重樓即七托蓮）
共研細末，每次五錢溫酒服。

（此方可治鎖喉蛇：症狀一頸有條腫起，繞項一週）

（此方由錢坑林仁生仿來）孕婦忌服。

又 方

揭陽 吳 濟

【處 方】 山胡椒根（又名金獅藤），一枝香，龍眉筆，節節花。
四味每味各五錢重（各青草藥物都要取桑浦山出產者佳）

用法服法及處理說明：

先將患者的傷口用磁器火酒消毒後割開瘡口揉去其惡血
後將上開的藥物槌爛下酒浸後取酒與患者服之藥渣槌酒貼瘡口可使患者免致危險。

方頭來源：方頭來自叔父所仿授。

【附】新濬區中醫公開治療毒蛇咬傷驗方

（一）普通蛇咬傷不甚重者用之

雄黃三錢，紅花三錢，吳黃錢，川貝二錢，五靈脂三錢，川連錢半，連喬三錢，白芷二錢，法半夏三錢，甘草錢，靈仙三錢。
淨水煎加酒一杯沖服。

(二) 毒重而身體強壯者用之

羚羊五分，犀角五分，生地五錢，銀花三錢，川連二錢半，田七錢，浙貝二錢，吳萸二錢，靈仙二錢，枝子二錢，歸尾錢，花粉二錢，防杞二錢，黃柏二錢，靈脂二錢，黃芩二錢。

手部加連喬桂枝，脚部加牛七川木瓜同煎。

(三) 蛇 丸

此丸專治蛇咬并治運身蛇，蛇頭纏指無名腫毒等。

遼刁竹，鹿耳苓，金鎖匙，大葉蛇總管，假苦瓜，半邊旗葉，金雞爪，香薷，鵝不食，烏臼頭，狗腳跡，田基黃，半邊蓮，以上各四兩，七星劍八兩，共藥十四味，晒干爲末，煉蜜爲丸，每個三錢，蜡壳封固，倘被蛇咬傷，即用銀器清水刮去惡血用一丸開酒服，一丸敷傷口，一邊露口流毒，毒盡即癒。

(四) 消毒飲

蛇毒未清，時流惡水，再服此方外敷下方草藥即癒。

人中黃三錢，金銀花五錢，紅條紫草錢，歸尾三錢，赤芍三錢，防風錢，白芷錢半，連喬三錢，麥冬二錢，靈脂二錢，清水煎服，加酒冲服。

(五) 外敷方

咬傷後時流黃水不能收口用此方敷患處。

鬧楊花并葉，五子金葉，七星劍葉，鱉蜞抱葉，落地生根葉，白麻頭。

以上搗爛敷患處，倘好作癢，毒水流清即去鬧楊花加埋口散敷之即癒。

(六) 埋口散

梅片，川連，雄黃，甘草，血餘灰，白芷，青黛各二分。

以上各藥爲末搽患處或用臘梅油開搽。

(以上六方是土華鄉中醫梁國柱公開)。

(七) 治毒蛇咬傷用此方浸酒

(經驗良方)

細葉雙眼龍三兩，老虎脰一兩，黑面神一兩，小蘭青一兩，鹿耳苓一兩，獨腳烏臼頭一兩，大蘭青一兩，節節花一兩，鬼羽箭一兩，鯽魚草一兩，寮刁竹一兩，金鎖匙一兩，威靈仙一兩，田基黃一兩，入地金牛一兩，鐵包金一兩，毛射香一兩，一枝香又名七葉一枝花一兩。

以上各藥，先晒乾然後用三蒸酒三斤浸至一個月，可能出味應用，其用法如下：如被毒蛇咬傷時先將蛇牙痕跡尋見用銀針挑出，若係看不明傷口，可用牆邊青苔和片糖舂爛，擦傷口左右，定有傷口發現，再將蛇牙挑出，隨用了哥黃葉（又叫九綫藥）一握和片糖舂爛，敷傷口二三次，兼飲此酒，每日早午晚三次每次約二兩，不能多飲酒者，可以減少，定必見效，又要檢查被咬者之傷口處，若有黃濁水流出，此係毒氣未清，要用黑面神樹頭或葉一握，煲水飲之，以止黃毒水才好。

(此方係崙頭鄉黎姓捉蛇師留存，林博海中醫公開)。

(八) 毒蛇咬方

吳茱萸二錢半，細辛二錢半，紅黃四錢，防風三錢，靈仙二錢，白芷四錢，川連二錢，八角二錢，甘草三錢，田基五錢。

清水一碗煎服，服後用藥渣擦敷傷口。

(九) 草藥方

獨腳蓮，半邊棋，毛射香，菊花心，蛤蚧王，聊刁竹，山桂花，石上蓮，土牛七，金雞爪，金鎖匙，紫貝金牛。

以上生藥各三錢浸酒一斤備用，每次服二兩，或用酒兩碗煎至八分。

(以上兩方係土華鄉正骨衛逢生公開)。

(十) 佛山普君墟捉蛤祖傳方

靈仙二錢，銀花，靈仙，連喬，雄黃，雲蓮，生半夏，胆草，川芎，紅花，白芷，吳黃，以上各二錢用酒沖服。

另用蒲公英，苦地胆，半邊蓮，蛇總管，紅茶各二錢，爲末搽傷口開散敷。

(十一) 毒蛇傷咬方

金雞爪二錢，山茨菇三錢，金耳環二錢，土白芷三錢，土香干三錢，山辣了三錢，撩刁竹三錢，榕樹鬚三錢。

以上八味共爲細末每服三錢好酒沖服後用酒開此散搽患處用瓶裝勿洩氣日久可用(上兩方瑤頭中醫何君耀公開)

(十二) 蛇咬傷方

吳茱萸錢半，大茴香一錢，甘草七分，雄黃七分，檳榔五分，烏肉蛇咬加白礬五分，過基合蛇咬加六耳苓五分，金腳帶蛇咬加苦參三分五厘，硫黃三分半，其餘蛇不用加減。

以上藥共研細末用酒同煲量盡飲即癒。

(此方乃敦和市利羣中醫聯合診所陳達聞中醫公開)

(十三) 順德喜涌關世慈治毒

蛇咬傷方

紅黃精七錢，川貝七錢，白芷七錢，細辛五錢，尖欖七錢，五靈脂一兩，鹿耳苓兩半，吳萸七錢，苦參一兩，靈仙一兩，梅片錢半。

共十二味爲細末煉蜜爲丸每重二錢加蠟封固，開酒和服並將藥渣擦外。

(十四) 彬社書院門口石碑方

(河南隔山蛇王馮初傳來)

威靈仙，雄黃，白芷，五靈脂，甘草，川貝母，吳萸，細辛，金銀花。

共九味每重二錢，靜冰煎服加酒冲更效。

(十五) 簡煥竹蛇方

(小洲中醫葉瑞禎公開)

靈仙，甘草，銀花，細辛，吳萸，白芷，山貝，防風，連喬，雄黃精，靈脂，扁蓄，各三錢。

酒水各半同煎最好加燒酒冲服，以飲醉爲度連服三劑永無復發。

(此方已傳下數十年醫治蛇咬傷者有百多次均獲痊癒)。

(十六) 草藥方

(瑤頭鎮中醫潘平寧公開)

田基黃，鐵包金，獨脚烏，鹿耳苓，龍胆草，假苦瓜(生藥)七星劍，金耳環，半邊蓮，蛇總管，擦刁竹，天簡菜，細金，辣位草，以上各一兩，紅黃精五錢。

研末每服三錢，開酒服另開小許外敷咬傷部位。

(十七) 治毒蛇咬傷方

(區澤林中醫公開)

天井燈四兩，浸酒一斤，治各種蛇咬傷，口服用。

(此種生草藥產於南海縣沙貝鄉，本市藥店沒有出售)

(十八) 毒蛇咬傷方

(瀝潞鎮捕蛇者傳自大瀝墟驗方)

威靈仙，五靈脂，川貝母，紅黃精，川白芷，川連，吳茱萸，甘草，以上各三錢。

用水酒煎服藥渣搗爛敷患處。

(十九) 外敷方

靈仙三錢，細辛三錢，六耳苓五錢，靈脂三錢，川足四條，蛇總管兩，紅黃三錢，川連三錢，半邊蓮三錢，白芷三錢，狗脚脊兩，雙眼龍兩。

共爲末用水煮成膏敷患處，消腫止痛散毒除腐肉。

(二十) 又方

先用吳萸三錢煎服後用下方

吳萸三錢，熟草烏三錢，甘草三錢，靈脂三錢，白芷三錢，擦刁竹三錢，小牙皂三錢，尖檳三錢，牛王五分，紅黃精三錢，熟南星三錢，小回三錢，熟川烏三錢。

共爲細末爲丸每個二錢如被蛇咬毒用一丸開酒服外敷患處消腫止痛。

(二十一) 蛇方

(利羣中醫聯合診所梁星階中醫公開)

山辣了一兩，吳萸一兩，七星劍一兩，金雞爪五錢，香子兩，山

茨菇兩，仙人對坐草（要葉）兩，野石榴遠兩，龍胆草兩，半邊蓮兩，山刁竹兩，六耳苓兩，金耳環五錢，（浸酒三斤，飲三酒杯隨量將酒搽傷口）

（二二）烏肉蛇咬傷方（用酒冲服）

川連，龍胆草，甘草，細辛，白芷，吳萸，靈脂，威靈仙，川貝，六耳苓，木服藤，田基王，以上各三錢。

飲完茶之後打爛藥渣爲末敷傷口處，連服三服，每日一服。

（二三）過基合蛇咬傷方

白芷，法夏，甘草，川貝，紅花，知母，紅黃，苓仙（靈仙），吳萸，以上各三錢。

服法如上方。

（此二方是土華鄉捕蛇者梁景全公開）

（二四）陳伯益治蛇咬傷方

（陳永祥中醫公開）

吳萸，白芷，靈仙，紅黃，紅花，甘草，連喬，法夏，靈脂，上各三錢酒冲服

（如不到肚先用青蒿煎服及用九里香棘刺傷口使流出毒水易愈）

（二五）（崙頭石碑抄錄治蛇咬傷方）

靈仙，靈脂，甘草，白芷，貝母，吳萸，雄黃，以上各藥每味五錢酒水各半煎服及用藥渣擦傷處即癒。

（二六）經驗蛇方

靈仙三錢，靈脂三錢，紅黃三錢，白芷三錢，吳萸三錢，貝母三錢，以上藥味用酒煎服 用藥渣搽咬傷口

(二七) 化毒方

生大黃一兩，穿山甲炙二錢，歸尾五錢，白僵蠶炒三錢，蜈蚣一條炙
以上共研末每服二錢

(二八) 毒蛇咬方

痴頭婆一錢，雄黃精二錢，以上藥共搗爛用酒調服擦敷傷口。

(二九) 又 方

吳萸，白芷，雄黃，靈仙，靈脂，防風，以上各等分以上藥味用酒煎
服後用渣搗爛再加獨行千里草共搗敷傷口。

(三〇) 又 方

蛤屈草，田基王，假紫蘇，假茨菇，以上生草藥同千里獨行草方用法
用酒煎服後用渣敷傷口。

(三一) 又 方

吳萸六分，草節三分，六耳苓八分，八角三分，雄黃三分尖檳二分（
服法同前）戒食，黃酒，生薑，子鴨，魚腥火毒之物。

（以上各方是白鶴洞正骨莫桂昌公開）

(三二) 治蛇咬傷方

吳萸六分，紅黃精三分，甘草三分，尖檳二分，八角八分。

將上五味藥搗碎用燒酒生雞胆浸片刻飲其汁再用藥渣敷傷口。

(三三) 又 方

雄黃精，白芷，川貝，靈脂，靈仙，甘草，吳萸各五錢。

用酒水各半煎服將渣敷傷口處。

(三四) 各種蛇咬傷分別治法

過基合：傷處如品字形依上方加六耳苓一分

金脚帶：傷處即咬即黑依上方加六耳苓二分硫黃二分

烏肉蛇：（即飯鏟頭）傷口拱起圓泡加白凡二分六耳苓二分。

青竹蛇：傷口甚小火照即熱加六耳苓二分苦參三分。

長尾彫：傷口與青竹蛇同單用吳萸八角開酒服便可。

步鬥蛇：傷口即咬即展開可用上藥無加。

騷鼠：（又名毛蛇）傷口即咬即出血，立生痰，食物即吐，
用硫黃，細茶，八角，三味嚼爛敷之，單服吳萸即癒。

（以上藥方和治法是東望鄉中醫陳炳南公開）

三、燙火傷

燙火散

順德 李庭芬

【處方】 寒水石十兩，大黃十兩，黃柏末十兩。

【製法】 共爲細末，用甘油調勻。

【用法】 敷搽患處。

燙火傷清凍膏

順德 黎良

【處方】 白灰一斤，油一兩。

【製法】 將白灰用滾水開好，然後將灰水一兩，油一兩，和勻即成。

【用法】 凡遇燙火傷處，將油搽上，便可止痛。

【適用範圍】 治燙火傷，並治皮膚爆裂。

燙火膏

順德 羅全獎

【處方】 地榆八兩，茶油一斤，正梅片二錢。

【製法】 將藥研末加入茶油。

【用法】 敷搽傷處，油裏渣滓敷患處。

【適用範圍】 燙火傷。

燙傷（滾水傷效方）

潘少華

【處方】 用梳打（撒布紮患處，可止痛）。

又方

【處方】 用草麻油與鷄蛋白塗上患處，便可止痛。

四、跌打刀傷（附破傷風）

跌打方

陳德君

【處方】 拔子樹皮三錢，烏白樹二層皮三錢。

【製法】 將藥用酒燉服。

【用法】 渣塗患處。

【禁忌】 孕婦忌服。

駁骨方

【處方】 生羌六兩（炒），榕吊（約三、四兩），酒餅十只，田蟹二十只，馬王（水蛭）七百三十條，屎缺底一斤，落地生根一斤。

【製法】 將藥搗爛。

【用法】 將藥加酒炒熱，敷患處，一二日後換藥，仍加酒炒熱敷上，過三、四天後再換藥一次。

駁骨方

海南 賴欽仁

【處方】 石攀，樹攀，壁攀，三種石坎鎚碎，用燒酒燉熟外敷。

【適應】 骨折，骨浮能在七天內駁好。

駁骨方

梅縣 黃倬南

【處方】 生鹽霜柏樹根皮數兩搗爛和生黃毛生鷄仔一只舂爛如泥敷患處外加夾板固定。

急救保險散驗方

海口市 李嶧生

【處方】 雪上一枝蒿（雲南省出產）

【製法】 將藥洗淨晒干，入甌蒸一小時，候稍冷取出晒干，刮上皮，研爲粉末。

【用法】 諸傷昏迷不省人事，以童便調服，諸傷腫痛用酒調服，並調塗患處。

【用量】 輕症用五厘，重症用一分，小孩週歲用半厘，餘類推。

【適應範圍】 鎗刀跌打，咽喉腫痛，白喉喉炎腫，雙單蛾喉症，風痰痛症，牙齒腫痛，危急痧症，吐血便血，無名腫毒，血流不止，倒經吐血，小兒驚風，瘡瘍痢疾。

【禁忌】 孕婦忌食。

急救止血散驗方

海口 李嶧生

【處方】 玉桂渣（即玉桂去油取其渣）

【製法】 將玉桂渣研粉，用磁瓶或玻璃瓶貯之。

【用法】 以玉桂粉搽上患處，便立即止血，但傷處切勿近水。

【適應範圍】 跌打損傷，血流不止。

【禁忌】 孕婦忌服。

跌打損傷氣絕效方

【處方】 金土龍一錢微炒，正牛黃三分，熊胆三分，血竭一錢，西紅花一錢，兒茶五分，沉香五分，川射二分，沒藥五分，硃砂三分，梅片二分。

【製法】 右藥共爲細末，磁瓶貯藏，勿令洩氣。

【用法】 以藥五分用燒酒白糖少許沖服，重者再用五分。

急救喉痛散

- 【處方】 正牛黃五分，正冰片一錢，硼砂一錢，雄黃一錢，川連一錢，硃砂一錢，青黛一錢，射香三分，兒茶一錢。
- 【製法】 共爲細末，磁瓶貯用。
- 【用法】 每次用三分吹入喉內，日三次。
- 【禁忌】 孕婦忌用。

傷科驗方

黃舉昌

- 【處方】 上硃砂一錢二分，射香一錢二分，正梅片一分二厘，乳香一錢五分，紅花一錢五分，沒藥一錢五分血竭一兩，兒茶二錢四分，
- 【用法】 共爲細末，磁瓶貯藏，每次服七厘燒酒沖服，並用酒調敷傷處。
- 【禁忌】 孕婦忍服
- 【適應範圍】 專治金瘡跌打損傷，骨斷筋斷血流不止，並治一切無名腫毒。

跌打止痛通脈散驗方

黃耀怡

- 【處方】 牛銀二兩，麻黃（去節）一兩，大田七五錢，牛黃三錢，的乳香五錢，上沒藥五錢洋烟灰一錢五分，金絲熊胆四錢，
- 【製法】 將牛銀盛入瓶內，加入童便過藥約二三寸高，約浸一個月，十日換一次童便，取出去毛，再入清水浸一個月，每十日換水一次，浸至無泡爲度，切薄片晒干，慢火炒黃，研爲細末。
- 【用法】 大人每日服一錢，每次五分，分早晚服食。

跌打下部內服藥方

順德容奇 李庭芬

- 【處方】 木通四錢，枳壳四錢，陳皮四錢，防風四錢，生地七分

歸尾七分，紅花七分，羌活八分，甘草一錢，

【製 法】 將藥用清水三碗煎至一碗。

【用 法】 用白酒一小杯沖服。

跌打吊瘀方

李庭芬

【處 方】 花椒五錢，川椒五錢，桂枝四錢，白芥子五錢，紅花四錢，枝子四錢，桃仁四錢。

【製 法】 將藥研成粉末。

【用 法】 用雙蒸酒加麵粉煮敷患處

止血散

順德 李庭芬

【處 方】 大黃一兩，兒茶一兩，牙皂錢半，雄黃精二兩，梅片五分，尖栝一兩，血竭三兩，寸香五分，田七三錢，血珀末三分，

【製 法】 將藥研為細末，

【用 法】 撒佈患處，能消炎防腐。

【適圍範應】 治療一切外傷出血。

跌打丸方

順德 李庭芬

【處 方】 沉香五錢，木香五錢，硃砂四錢，珍珠五錢，象皮五錢，琥珀一兩，降香一兩，田七二兩，乳香四兩，末藥八錢，熊胆一兩，人參一兩，枝子五錢，蘇木一兩，歸尾二兩，紅花二兩，生花五兩，牛七二兩，澤蘭四兩，烏藥二兩，砂仁二兩，木通一兩，大黃二兩，血竭二兩，桂枝四兩，桃仁四兩，細辛一兩，白芷一兩，加皮五兩，小茴二兩，續斷一兩，杜仲五兩，水瓜六兩，黃柏一兩，赤芍五兩，桔梗四兩，防風二兩，京芥二兩，碎補四兩，車前五兩，

【製 法】 選正藥品研極細末，煉老蜜糖為小丸，如柱圓大，外用蠟封固，

【用法】 用時去蜡雙蒸酒搗爛，塗擦傷處。

跌打內服藥方

順德 李庭芬

【處方】 丹皮二錢，赤芍二錢，生地三錢，田七三分，紅花二錢，血竭二錢，枳殼三錢，丁香四錢，血珀二錢，川芎二錢，烏藥二錢，歸尾三錢，碎補二錢。

【製法】 將藥用雙蒸酒煎服。

【適應範圍】 調氣活血，去瘀鎮痛，治一切跌打。

跌打丸方

李庭芬

【處方】 牛膝七錢，京芥五錢，赤芍一兩，紅花一兩，寄雙二兩，川芎八錢，田七五錢，當歸二兩，桂枝八錢，乳香四錢，桃仁八錢，血竭一兩，香付六錢，大黃兩半，山甲一兩，熟製川烏一兩。

【製法】 將藥用雙蒸酒煎。

【用法】 外敷藥。

【適應範圍】 調氣活血，去瘀鎮痛，療一切跌打。

跌打中部內服藥方

李庭芬

【處方】 歸尾八分，紅紅一錢，乳香一錢，末藥一錢，桔梗一錢，甘草八分，防風一錢，羌活八分，赤芍八分，桃仁一錢。

【製法】 水二盅煎至一盅。

【用法】 一次飲服。

【適應範圍】 治療跌打損傷，中部少腹以上。

跌打上部內服藥

李庭芬

【處方】 人參五分，七地七分，熟地七錢，川芎四錢，防風四錢，京芥四錢，甘草四錢，首烏二錢，薄荷三錢。

【製法】 用水三盅煎至一盅。

【用法】 一次飲服。

【適應範圍】 治療跌打損傷胸部以上。

跌打浸酒藥方

李庭芬

【處方】 乳香五分，歸尾四錢，紅花三錢，末藥五分，澤蘭三錢，田七三錢，生軍三錢，生五五分，生地四錢，玉桂五分，枝子二錢，木瓜二錢，生草五分，牛七三錢，羌活五分。

【製法】 將藥用酒濕透蒸過曬乾，後用酒三斤浸之。

【用法】 跌打損傷，身體內外可用此酒內服，外塗擦傷處。

生肌散

李庭芬

【處方】 川連末三錢，梅片五錢，乳香三兩，末藥三錢，血珀一兩，甘草四兩，石脂末三兩，象皮末四兩。

【製法】 將藥研成細末。

【用法】 將藥散佈瘡口。

【適應範圍】 治療一切癰疽等瘡，破爛日久不斂。

跌打傷內吊痧方

李庭芬

【處方】 生羌活四錢，川烏四錢，桂枝四錢，川椒四錢，古月粉四錢，石辣四錢，澤瀉四錢，田七四錢，末藥四錢。生軍四錢，半夏四錢，京芥四錢，薄荷四錢，黃芩四錢，莪朮四錢，歸尾四錢，草烏四錢，乳香四錢，南星四錢，澤蘭四錢。

【製法】 將藥研為末，

【用法】 用白酒煮敷患處。

跌打內服藥方

李庭芬

【處方】 生地三錢，紅花三錢，歸尾三錢，澤蘭三錢，澤瀉三錢，枝子三錢，車前二錢，木通三錢，羌活二錢半，乳

香一錢，沒藥一錢，赤芍二錢八分，白芷二錢半，靈仙二錢，生軍三錢，田七二錢，血竭三分，牛黃五分。

【製 法】 將藥用水煎服。

【適應範圍】 跌打。

附註：傷頭部加川芎，當歸，身上加杜仲，當歸身，四肢加桂枝。

熊胆藥膏

李庭芬

【處 方】 川連末三兩，大梅片一兩八錢，元明粉六兩，青黛粉八兩。

【製 法】 用多量黃藤熬膠，後將藥調成膏。

【用 法】 將藥膏外敷患處，日換二次。

【適應範圍】 治療癰疽初起紅腫熱痛。

跌打丸方

李庭芬

【處 方】 牛七七錢，京芥五錢，赤芍一兩，寄奴二兩，川芎八錢，田七五錢，當歸二兩，桂枝八錢，乳香四錢，桃仁八錢，血竭一兩，香付六錢，大黃兩半，山甲一兩，熟製川烏一兩。

【製 法】 將藥晒乾，研極細末，煉老蜜糖和藥調勻成小丸，每個重三錢，外用醋蠟封固。

【用 法】 將丸去蠟切碎，用熱酒半杯溶解，塗擦患處。

麻醉藥內服藥方

李庭芬

【處 方】 製蟾酥一錢，法夏六分，川椒一錢八分，胡椒一錢八分，鬧楊花六分，畢撥一錢，製川烏一錢八分。

【製 法】 將藥研為細末。

【用 法】 每服五分，用酒沖服。

麻醉藥外敷藥方

李庭芬

- 【處方】 生川烏五錢，蟾酥四錢 生草烏五錢，生半夏五錢，畢撥五錢，生南星五錢，胡椒一兩，細辛一兩。
- 【製法】 將藥研為細末，用酒調成。
- 【用法】 將藥敷患處，約一時除去，即施行手術，則不痛。

外傷出血方

順德 陳義生

- 【處方】 白凡五錢，五倍子五錢，田七三錢，礪砂一錢。
- 【製法】 將藥研成細末。
- 【用法】 乾敷外傷出血處。
- 【適應範圍】 外傷出血。

梁財信跌打丸秘方

梁載孫

- 【處方】 製川烏四兩，製三稜四兩，製莪朮四兩，青皮二兩，製香附四兩，歸尾四兩，大田七四兩，川斷四兩，南丹皮四兩，蒲黃四兩，防風四兩，玄胡一兩，五靈脂四兩，生花四兩，鬱金四兩，白芍四兩，廣木香二兩，台烏三兩，柴胡三兩，只壳二兩，熟軍八兩，生地六兩。
- 【製法】 共為細末，煉蜜為丸，每個二錢。
- 【用法】 用清茶或開水送服，大人一枚，小兒折半，婦女經痛用山渣肉一兩煎水加白糖一兩送服。
- 【適應範圍】 消腫散瘀，定痛活血，婦女經痛，胸脇肋痛。

金麝跌打酒外用方

許子珍

- 【處方】 金耳環二兩，山枝子二兩，延胡索二兩，麝香亮四兩，大生地二兩，當歸身四兩，熊胆皮二兩，寶鼎香二兩，舊陳皮二兩，生半夏二兩。
- 【製法】 將藥用米酒廿斤浸三個月後開始可用。

【適應範圍】 止痛，消腫，活血。

破傷風

廣州 盧宗強

【處方】 全蠍三錢，防風三錢。

【用法】 清水煎去渣溫服。

【症狀】 脈浮促，風由破傷處傳入，初則畧有抽搐，外觀似不甚重要者，若不急治，必致死亡。

治女人傷積在胸脹大如盆方

雲浮 黃華甫

【處方】 用散血老根蒸燒酒服之。

跌打藥酒方

廣州 吳伯鴻

【處方】 劉寄奴五錢，乳香三錢，五靈脂五錢，白芨五錢，黑老虎一兩，降香五錢，金耳環二錢，蘇木五錢，莪朮三錢，田七二錢，浸酒一斤。

跌打消腫止痛散瘀外敷方 廣州 何秉江

【處方】 田七末一兩，乳香六錢，末藥六錢，生枝子六錢，虎脛骨一兩，炙酥澤蘭五錢，生川烏五錢，正血竭八錢，防風五錢，六錢，川加皮六錢，紅花六錢，歸尾五錢，大生地六錢，生半夏五錢，金邊土鱉一兩，川斷五錢，生大黃六錢，生獨活五錢，

另加入生草藥：鵝不食草二兩，九層塔一兩，打不死二兩，大還魂一兩半，川破石一兩半，田基王一兩，（上述生草藥晒干研末）

【製法】 上藥研末和勻全為一料，份量看傷者腫痛大小酌量加減。

【用法】 用時加老羌三錢，生葱一條，搗爛煮酒致滾為度，後將藥散放入攪勻，溫煖敷傷處，外用布紮緊，免露風。

止痛駁骨散

廣州 林鴻芳

【處方】 大田七一兩，正血竭八錢，骨碎補一兩，活土鼈三十只（去頭足）川續斷八錢，正的乳一兩，虎腰骨六錢（炙酥）川獨活一兩，川加皮八錢，生大黃一兩，古銅錢十二個，（醋淬九次）莪朮一兩，

另加生草藥：寮勻竹一兩（連根）透骨消一兩，金耳環二兩，黑老虎一兩半，打不死一兩半，五層塔一兩半，川破石一兩，小羅傘一兩，

【製法】 晒干研末，同熟藥和勻，雙蒸酒塗糊狀，敷傷處，杉皮夾好扶正，外紮布帶勿露風。

註：症重者，用生鷄一隻（約十四、五兩）同上藥搗勻煮熟敷之。

跌打傷科秘方

廣州 鄒錦賢

【處方】 生半夏五分，生枝子五分，生南星五分，生川椒五分，生大黃五分大田七一錢，獨活五分，川烏五分，紅花五分，赤芍五分，防風五分，乳香五分，木香五分，杜仲五分，川芎五分，白芷五分血珀五分，血竭五分，三稜五分，寄奴五分，硃砂五分，加皮五分，羌活五分，桔梗五分，澤蘭五分，莪朮五分，當歸五分，土鼈四只，用地龍二條，金絲熊胆二分

【製法】 研為細末，用燒酒半斤同藥粉和勻，另加豆粉三錢同煮，慢火煎到起膏，用油紙塗上藥敷患處。

五、砲彈射傷

被槍傷子彈不出效方

【處方】 生地一兩，生川烏一兩，生草烏一兩，火麻一兩。

【用法】 將藥搗爛，如在春夏則用糖調，秋冬則用青油調敷傷處。

取砲彈藥方

順德容奇 李庭芬

- 【處方】 扁魚脯，黃牛屎，廣尾魚，扁柏葉，葦蕪子，白薯莖，推車子一對，土狗，麻油，豬牛肉，馬前，蜜糖。
- 【製法】 將藥搗爛。
- 【用法】 把藥敷上傷口，砲彈即出。

又方

李庭芬

- 【處方】 用扁魚肚胎連皮搗爛敷治，約三次便效，此乃四肢潰爛，爛肉內則用土狗胎搗爛敷上，但不能出必落下部，不能為患。

出砲碼方

陳德君

- 【處方】 山竹桔核四只，推車子二只，巴豆肉五分，土狗子一只，白蠟一錢，葦蕪子五分。
- 【製法】 將藥搗成泥狀，搓成條。
- 【用法】 先用銀針探入傷處深淺，然後將藥條塞進傷口。

六、急救（包括骨梗、服毒）

哽魚骨、鷄骨良方

黃舉昌

- 【處方】 威靈仙兩，沙糖二兩，醋一碗。
- 【製法】 將藥完全用醋煎服。

魚骨哽方

順德 陳坦君

- 【處方】 威靈仙四錢，煨草果三錢。
- 【製法】 將藥用水煎，加入粗砂糖。
- 【用法】 一次飲服，成年人加倍量。
- 【適應範圍】 魚，鷄骨哽，（鷄骨哽要多飲）

誤服魚藤根驗方

陳坦君

- 【處方】 用童便一至二碗服之立效。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]
书名 = 广东省各县市验方交流汇编 第一集 第六编 灾害外科症类
作者 = 广东省中医药研究委员会编
页数 = 2 8
S S 号 = 1 0 4 4 4 0 2 0
出版日期 = 1 9 5 6 年 0 7 月