

廣東省
中醫驗方交流彙編

5
廣東省中醫藥研究委員會編

廣東人民出版社

廣東省 中醫驗方交流彙編

广东省中医药研究委员会編

广东人民出版社

广东省
中医驗方交流彙編
广东省中医葯研究委员会編

*

广东人民出版社出版 (广州大南路43号)

广东省書刊出版業營業許可證粵字第1号

新华書店广东分店發行

广州印刷厂印刷

*

統一書号：14111·5

書号：1027·787×1092 1/32·10 3/4印張·213,000字

1957年8月第1版

1957年8月第1次印刷

印數：1—15,550 定价：(9)一元一角

編者的話

搜集本省各地中医秘方、驗方，吸收其中合理的和有效的部分，加以整理提高，使能更好地为保健事業服务，是我会工作任务之一。几年来，广东省衛生廳、广州市衛生局和本省衛生工作者协会，收集了各地中医及人民群众献出的秘方、驗方不少，經我会把它審核、选择，編为中医驗方交流彙編第一集，送發各衛生医療机构作進一步实验研究，以擴大經驗交流。这些驗方普遍得到中医界的重視和欢迎，同时广大群众也紛紛來函訂購。

現我会为了适应群众需要，擴大經驗交流范围，除將第一集重加校核外，并將最近收集到的資料，增編入本集內出版，以期能普遍深入到各地区。希望各地区医务工作者加以实验研究，并隨時將研究成果告知我会，以便進一步發掘祖國医药遺產的宝贵經驗，更好地为广大人民服务。

書中所載各种青草藥名，都是本省的俗称，而其学名一时无法查对明白，致使外省讀者不够明了，深感抱歉！

本書諸方是專供医务工作者研究实验之用，一般缺乏医药知識者，請勿自行試用。

广东省中医藥研究委员会

1957年1月13日

7250/02

目 錄

第一篇 內科症類

一、吐瀉（急慢性胃腸炎、霍亂）·····	1
二、心腹痛（胃神經痛、消化性潰瘍、闌尾炎、 腸寄生蟲腹痛）·····	11
（并參考第二十項疝痛範圍）	
三、膈食反胃·····	23
四、痢疾·····	24
五、大便秘結·····	37
六、小便墜閉·····	38
✓七、淋濁（包括砂淋、血淋、白淋、白濁、虛淋）·····	40
八、黃疸·····	47
九、吐血（包括鼻衄、大便下血、血友病）·····	53
十、肺癆（包括咳血）·····	59
十一、咳嗽·····	62
十二、哮喘·····	67
十三、肺癰·····	73
十四、瘧疾·····	74

十五、脚气	84
十六、癰疽	86
十七、水腫（包括脚腫，并附血吸虫晚期效方）	88
十八、關節痛	109
十九、頭痛（包括腦炎頭痛）	112
二十、疝痛（包括辜丸炎及癰瘕積聚痛）	113
廿一、癲狂	118
廿二、撞紅、夾色伤寒、苏癆（广东民間病名）	119
廿三、虛弱（包括貧血、萎黃、眩暈、失眠、怔忡、遺精、縮陽）	124
廿四、腸伤寒（腸熱）	130

第二篇 婦科症类

一、經痛	132
二、帶下	134
三、難孕	137
四、經閉	139
五、血崩	142
六、胎前	148
七、產褥	150
八、異胎	155
九、陰挺（子宮脫出）	155
十、乳瘡（包括离奶）	157

第三篇 小兒科症類

一、口腔病·····	161
二、吐乳·····	166
三、泄瀉·····	166
四、疳積（包括蛔蟲）·····	169
五、夜啼·····	175
六、驚風·····	175
七、咳嗽（包括百日咳、奶哮）·····	182
八、麻疹·····	187
九、皮膚胎毒·····	190

第四篇 五官科症類

一、眼科·····	192
二、耳科·····	200
三、鼻科·····	204
四、喉科（包括舌病）·····	207
〔附〕牙科·····	223

第五篇 外科症類

一、瘡瘍（包括皮膚爛肉）·····	232
二、疔腫·····	247
三、瘰癧·····	251
四、痔漏·····	256
五、疥癬·····	263

六、湿疹（包括花柳）.....	265
-----------------	-----

第六篇 灾害外科症类

一、狂犬咬伤（附一般犬咬伤）.....	267
二、蛇蝎咬伤（包括蜈蚣、老鼠咬伤）.....	274
三、烫火伤.....	301
四、跌打刀伤（附破伤风）.....	304
五、炮弹射伤.....	325
六、急救（包括骨鲠、服毒）.....	326

第一篇 內科症類

一、吐瀉（急慢性胃腸炎、霍亂）

治腹瀉方

平远 袁濟生

【處方】 老柚壳三錢，細茶葉二錢，生薑二小片。

【服法】 將上藥二味研成細末，用生薑煮水送服。

【適應症】 腹痛瀉，瀉下如水。

【戒食】 生冷食物、魚類豬油三幾天。

急性腸炎方

封開 符汝英

【處方】 玉兒草蕓一兩（又名滿天星、繡牛、特角、膿膏，該藥分大葉細葉兩種，現取其細葉者），金剛葉二十張，捶爛，棉花核一兩捶破（捶時用布包好，不可讓核飛去）同煮水服。另用鉄薯芋去皮，切成細條，用鑊炒成炭存性（有黃色的不要）用上藥水沖焗出味，頻頻服，遇瀉即飲，便可馬上止疴嘔。如手足仍抽搐，用金剛葉一斤半，大寬筋藤一斤半，生鹽四兩，煎水洗四肢和全身，便可止痙攣。此方本人曾治效數次。

【適應症】 腹部劇烈疼痛（腸痙攣），腹瀉，臭味難聞，~~瀉出黃色水四五次~~，并發嘔吐不止及手足痙攣，食百物~~概不~~受，~~淋~~如雨，口噤不言，病發時如治不得法，十至十五小時便會死亡。

又 方

开建 吳孔梗

【处 方】 鷄桐木一兩，番薯藤干二兩，煮水飲即止吐瀉，藥渣擦手足，就不会抽筋。

【适应症】 忽然泄瀉肚痛抽筋等。

治泄瀉方

广州 鄧先貴

【处 方】 番石榴叶（适量）。

【用 法】 从樹上摘下來的鮮叶，用开水洗淨，即入口嚼爛吞下。

【适应症】 泄瀉痢水。

泄瀉四仙飲方

广州 楊雪生

【处 方】 炒谷芽三錢，炒麥芽三錢，山楂炭五錢。

【用 法】 水煎，和真蜜糖一湯匙，溫服。

【适应症】 泄瀉。

【禁 忌】 油膩葷腥。

治泄瀉痢疾六和湯方

广州 楊雪生

【处 方】 炒谷芽三錢，炒麥芽三錢，山楂炭五錢，金銀花五錢，綿茵陳四錢。

【用 法】 水煎，早晚各服一次。

【适应症】 泄瀉及紅白痢疾等。

治嘔吐方

龙川 鍾焯元

【处 方】 陈皮二錢，姜竹茹二錢，党参二錢，枇杷叶二錢，赤茯苓二錢，半夏一錢半，甘草一錢，生姜一錢，大棗二只，柿蒂三錢。

【用 法】 用水煎服。

治黃痧方

澄海 陈文波

【处 方】 烏棗三兩，皂矾四錢，蓮子二兩，白茯苓一兩，淮山藥一兩，綿茵陈四錢，針砂三錢。

【制 法】 烏棗煮爛去核，其余的藥研成細末，煉蜜和制为丸，如綠豆大。

【用 法】 每次服三錢，早晚各服一次。

【附 注】 黃痧为澄海地方病名，即劇烈的嘔瀉症。

治水瀉方

欽縣 黃德公

【处 方】 鉄樹木叶一兩（切碎），鷄蛋一只（打开）。

【用 法】 攪勻煎水服。

吐瀉方（脾虛）

封开 伍學傳

【处 方】 附子一錢，白朮錢半（土炒），防党一錢，炙草一錢，干姜五分，春砂仁一錢，白芍一錢（炒），故紙一錢（鹽水炒），肉桂一分（研末另包冲服）。

【用 法】 另用灶心土八錢，以水二碗煎取一碗，澄清去渣，煎上各藥成半碗溫服（三至五歲用全方，一至三歲

減半服)。

六神嘔疴散 廣州 蔡文榮

【處方】 樟木子、广木香、赤石脂、白芍、甘草、栗壳等分。

【用法】 共研細末，每服二分，重症二服至三服，兒童量減。

【适应症】 疴嘔腹痛抽筋，小兒胃腸病吐瀉。

疴嘔腹痛方 封开 八耀榮

【處方】 赤苓、甘草、蒼朮、酒芩、蘇叶、陳皮、法夏、神麴、牙皂、木香、細辛、藿香、麥芽、枳壳各三錢，香附、山楂、薄荷、腹皮、砂仁、川朴（川姜汁炒）、扁豆、葛根、蓮叶各六錢。

【用法】 將藥研成細末，每服六分，陳皮湯送下，抽筋加川木瓜湯送下。

【适应症】 疴嘔腹痛抽筋、傷暑受寒各症，不論有汗无汗。此方小兒每服六分尚可，成人每服須一錢，瀉久而有缺水現象勿服。

治大腸熱瀉方 丰順衛協

【處方】 木耳五錢，用水浸漲，露一晚，和白糖煎服。

治絞腸痧方 丰順衛協

【處方】 辣蓼叶一兩，和黃糖煮水服。

絞腸痧方

廣州 趙思競

【處方】 生姜磨汁于杯內澄清片時，傾去姜汁，將杯底姜粉少許點入兩眼大角內，流出熱淚，很快見效。

治絞腸痧肚痛驗方

欽縣 黃德公

【處方】 干馬糞(煨灰存性)一兩，紅泥(搗溶)五錢。

【用法】 用樟木(去皮切片)五錢煎水沖服。

絞腸痧劇烈吐瀉腹痛方

廣州 梁翰芬

【處方】 雄黃精三份，白矾七份，研成細末，梔水棕搗爛為小丸，成人每次服一錢，小兒減半，一日可服二次，用開水送服。

疴嘔肚痛抽筋霍亂方

廣州 黃節香

【處方】 厚朴一兩、藿香一兩、煨木香五錢、泡蒼朮一兩、老檀香一兩、丁香五錢、烏梅肉一兩、川木瓜五錢、法半夏一兩、淡附子五錢研末，成人每服一錢，小兒五分(均司碼秤)，用陰陽水送服，止後每隔三至三小時服一次，一日三次。

霍乱驗方

丰順 陈乃生

【处 方】 焦白朮一兩，干姜五錢，熟附五錢，炙甘草三錢。

【用 法】 水兩碗煎六分溫服，隔兩小時再服一劑，若吐瀉仍有，加煨肉寇三錢、肉桂一錢，用灶心土或赤石脂二味煎水去渣，將水煮藥，如抽筋加木瓜五錢、桂心二錢，如大汗大瀉用高麗參二錢（半炒）或党參五錢、麥芽三錢、五味子錢半，另煎水當茶飲。若服藥即吐，仍須頻服，竟有日夜連服四、五劑，四肢才轉溫，吐瀉漸止者。症有輕重，故效有遲速，萬勿因一、二劑少效便易他方。

【适应症】 寒霍乱。

【附 注】 一九四三年梅縣霍乱流行，死者不計其數，后以此方治療，活者甚多。惟必要確診是寒霍乱方合。

在霍乱初期，四肢未至厥冷，心力未呈衰竭者，宜先服上方，患者已呈厥逆，脉伏，即投此方以為救危，二方相輔而行，效果很好。

治霍乱效方

云浮 陈荣光

【处 方】 薏仁五錢，川木瓜三錢，白芷三錢，蚕砂三錢，吳萸六分，樟木子二錢，蒼朮一錢，扁豆五錢，水煎去渣加鹽少許溫服。

治霍乱驗方

云浮 黄勉臣

【处 方】 甘松一兩，桂枝一兩，羌活一兩，藿香一兩，知母一兩五錢，樟木子錢半，連翹錢半，甘草五錢。

【用法】 研成細末，大人每次服三錢，小兒減半。

又方

云浮 黃勉臣

【处方】 樟木子五錢，或用樟木皮五錢，煎水內服，小兒酌量減用。

治霍亂方

云浮 劉永康

【处方】 檐前滴水石約一至二斤，放鍋中炒至極紅，淬入清水二、三碗，煮沸，加生油或茶油七至八滴再煎，傾置盆中，用粗紙拖去水面上油膩，候溫，令病人盡量飲之，自愈。

【附注】 本方經治愈多人，屢試效果很好。

治霍亂吐瀉腹痛屢驗方

云浮 衛榮彬

【处方】 蒜頭四兩，食鹽二兩，將蒜頭搗爛和鹽放入鍋中炒至老黃色，加水煎沸，服至不瀉為止。如系寒加吳茱萸八分同煎服。

治干霍亂(又名絞腸痧)方

陳炳榮

【处方】 竹筒蜂，搗爛，加鹽少許，沖滾水服之。

吐瀉散

丰順 徐朝

【处方】 眞麝香二分，蟾酥二分，明枯矾四錢，明雄精

三錢，藿香四錢，吳茱三錢，川連一錢，桂枝三錢，大黃錢半，青蒿二錢，春砂仁二錢，甘草二錢，金石斛二錢。

【制 法】 共研成細末，用瓷瓶貯藏，勿令泄氣，另用檀香少許煮水數滾后，約二茶杯，再和冷開水二茶杯，共沖服藥散。

【用 法】 成人每服五分，若吐瀉未止，可再服五分，兒童可按年齡大小酌減。

【附 注】 一九四三年夏，我縣霍亂流行，周治清醫師用此方治愈十多人，服藥后須服大量鹽水。

霍亂抽筋驗方 廣州 吳森波

【處 方】 火秧勒樹一兩去皮，煮水一次服。

霍亂症散方 廣州 屈炳衡

【處 方】 藿香八兩，蒼朮八兩，甘草六兩，芥穗四兩，香薷四兩，丁香三兩，神麴四兩，厚朴四兩，赤芍六兩，蘇叶六兩，黃連三兩，桂枝四兩，白芷六兩，樟木子八兩，石脂八兩，枳殼四兩，腹皮八兩，木香三兩，防風四兩，云苓一斤，香附三兩，桔梗六兩，陳皮四兩。

【用 法】 共研成細末，每次服五分，小兒減半，重症加倍，開水沖服。

【適應症】 霍亂吐瀉抽筋，或不吐瀉而肚痛抽筋的絞腸痧症。忌食米粥及寒冷膩滯等物。

时疫霍乱散

广州 馮希陶

【处 方】 大梅片八分，薄荷冰一錢，枯矾三錢，正辰砂一兩，广木香一兩，細辛五錢，白芷三錢，甘草三兩。

【用 法】 共研成細末，每次服一錢，急症每四十分鐘服一次，緩症一小时服一次，一日服三次。

【适应症】 霍乱吐瀉，四肢厥冷，脉伏不起，昏迷，轉筋。

万应散方

广州 刘咏如

【处 方】 細辛三錢半先研尽，牙皂三錢半先研尽，朱砂二錢半，蟾酥一錢，陈皮二錢，雄黃晶二錢半，防風二錢，白芷二錢，桔梗二錢，甘草二錢，法夏二錢，貫众二錢，藿香二錢，木香二錢，丁香二錢，薄荷二錢，白矾二錢，制南星二錢。

【用 法】 共研成細末，忌用火炒，封固候用。

【适应症】 疴嘔腹痛抽筋，風火牙痛，中風中痰，心胃氣痛，伤寒傷暑身熱，山嵐瘴氣，水土不服，大人小兒急症，胃氣腹痛，小兒每次用一至二分，大人每次用一錢。兼用此散點眼內。

霍乱驗方

广州 鍾玉池

【处 方】 樟木子三錢，丁香二錢，炮天雄四錢，萆撥二錢，川干姜二錢，白芷二錢，肉桂一錢，鴉片烟屎（三沙屎）二錢，風沙藤根四錢，山芝麻根四錢。

【适应症】 寒症霍乱，瀉如清水，六脉沉微，四肢冰冷。

【处 方】 广木香二兩，石菖蒲二兩，泡蒼朮二兩，吳萸八錢，辰砂四錢，波蘿八錢，厚朴二兩，沉香八錢，丁香四十粒，鴉片烟灰四錢。

【用法】 共研細末，以三分庄小樽裝，蜡封口候用。成人每服一樽，重症加倍，五歲以上兒童半樽，五歲以下忌服。

【适应症】 虚寒或寒湿之霍乱痢嘔腹痛抽筋均效。

【处 方】 生明矾一斤，正辰砂三錢，明雄黃一兩，薄荷冰二分。

【用法】 共研成細末，輕症服一錢，重症服二至三錢，用陰陽水沖服。

【处 方】 藿香二錢半，蒼朮二錢半，柴胡錢半，羌活二錢半，澤瀉錢半，木通錢半，神麴三錢半，紅茶三錢半，葱頭二个。

【用法】 用水煎服。

二、心腹痛（胃神經痛、消化性潰瘍、闌尾炎、腸寄生蟲腹痛）

（并參考第二十項疝痛範圍）

心氣痛方

封开 苏燦財

【处 方】 川朴錢半，灵脂錢半，香附一錢，佛手錢半，郁金一錢，飯朮錢半，枳壳一錢，故紙錢半，陈皮一錢，甘草五分，川芎錢半，当归一錢，生姜二片。

【用 法】 水煎服。

【适应症】 男妇心氣痛。

心氣痛方

广州 趙思競

【处 方】 老黃皮樹根或梅花樹正根三錢，黑枝七至八个，水煎，用好酒冲服。

又方白毛鷄胆一只，不見水，正蜜糖一杯，燉滾，臨發作前空心服。

又方网油膏二錢，綠豆一錢，煲（煮）數滾，食后嘔虫而愈。

治心氣痛方

恩平 馮 耀

【处 方】 七叶一枝花一兩半，枝子根一兩，吹筒管根一兩，当風桔根兩半，酸醋根五錢。

【用 法】 上藥用鷄一只同煲（煮）食。

各种气痛效方

陸大成
鄧福英

【处 方】 沉香二錢，丁香二錢，青皮五錢，良姜四兩（酒炒），香附六兩（醋炒）。

【用 法】 將藥研成細末，用磁瓶貯，每次取服二錢，用蜜糖水冲服。中童減半。

治心气痛方

清遠 李謙益

【处 方】 用白矾二錢，色醋適量。

【用 法】 將白矾研細末，冲入色醋內，飲之。

治心气痛方

清遠 徐福田

【处 方】 金櫻子蕢四兩，白銀杏蕢四兩，苦楝子蕢四兩。

【用 法】 研成細末，每次服一錢，滾水冲服。

治胃气痛方

廣州 郭社明

【处 方】 香附四錢，小茴四錢，牛膝五錢，銀花三錢，綿茵陳四錢，杜仲五錢，山甲三錢，雄豬小肚八兩，青壳鴨蛋一只，山馬甲二兩，牛奶樹寄生二兩，延胡三錢，木香二錢（后下）。

【用 法】 水八碗，煎至三碗，分三次食，飯前飯后各一次，臨睡時再服一次。在未服藥之前，先服蘇合丸一个，烏金丸二个。

治心气痛剧方

新豐 李 爵

【处 方】 血見愁、五指毛桃、青漆等三味之根各適量。

【用法】 清水煎服。

又方

新丰 李 爵

【处方】 桃仁三錢（打碎）。

【用法】 清水煎服。

胃气剧痛方

新丰 李 爵

【处方】 牛奶樹根适量。

【用法】 用石膏豆腐同煮食。

治心气痛方

陽江 姚 剛

【处方】 丹參四錢，檀香一錢，砂仁二錢，金鈴子一錢，枳實二錢，尖枳二錢，蘆薈一錢，元胡索二錢，柿蒂一錢，三棱五分，白芍二錢，莪朮一錢，烏梅三只。

【用法】 清水碗半，煎至一碗，痛在十年以內者服一剂，十年以上者，連服四剂，小童減半。

【禁忌】 蘿卜，欖豉，糯米等食物。

心气痛方

云浮 趙裕才

【处方】 茵陳三錢，南豆花三錢，佩蘭三錢，花粉二錢，桃仁二錢，干葛花三錢，桑枝三錢，薤白二錢，生枝仁錢半，甘草一錢。

加減法：孕婦去桃仁，體質寒者去枝仁，加延胡二錢或加佛手二錢。

【适应症】 由消化不良而誘發的胃腸痛症，時發時止者。

治男妇心胃气痛方

云浮 叶 良

【处 方】 川朴（姜汗炒）二錢，甘草五分，五灵脂一錢，佛手一錢，飯朮一錢，当归身一錢，破故紙一錢，川芎一錢，枳壳一錢，川郁金一錢，香附一錢，广陈皮一錢，生姜二片。

【用 法】 水煎內服（此方經多人服食有效）。

治心气痛單方 云浮 黄瑞林

【处 方】 寒痛用山姜头一兩，热痛用白銀樹二層皮二兩，均用清水煎服。

治胃痛屡效方 云浮 趙裕才

【处 方】 荔枝核（煨）五錢，乳香三錢，玄胡索三錢，研成細末。

【用 法】 每服三錢，日兩服，白开水送下。

治心絞痛方 云浮 趙裕才

【处 方】 血余炭八分，晚蚕砂一兩，研成細末，另玄胡三錢，煎水冲入药末，搖勻澄清服之，立止。

治气脹頂心不能食方 黄瑞熙

【处 方】 用生雄雞雛一只，在雞背上用瓦器剖开，急去內臟，加川麝一分，敷臍上，或痛处，良久，自安。

立止腹痛方

封开江口 苏卓活

【处 方】 老姜适量。

【用 法】 把姜捶爛敷在肚臍上。

肚痛不止

封开 張少眉

【处 方】 生葱头八兩。

【用 法】 將葱捶爛炒热敷肚臍处。

肚痛万应散

广州 鄧智卿

【处 方】 黃連一兩，黃芩一兩，黃柏一兩，紫蘇叶一兩，香附一兩，藿香四錢，乳香四錢，降香四錢，檀香四錢，沉香四錢，蒼朮四錢，沙姜四錢，甘松四錢，檳榔四錢，木香四錢，延胡四錢。

【用 法】 研成細末，另用大黃二兩，浸煎濃汁煮面为丸，每重五分，辰砂为衣，每服二丸（小儿減半），將丸磨水用开水送服。

【适应症】 四时感冒，痢嘔，肚痛。

逢痛必止散

广州 王 强

【处 方】 赤石脂一兩，郁金二錢，赤芍二錢，灵脂二錢，甘草十兩，乳香二錢，木香一錢，金花草二錢，般馬錢二錢，鴉片烟二錢，田七二錢。

【用 法】 將藥研末和勻，成人每次服三分，儿 童一分

(五歲內小兒禁用)，開水送服。

【適應症】 各種痛症輕重新久均效，止痛後覺口乾喉燥的飲淡鹽水。

本方含有劇毒成分如鴉片、金花草，須十分謹慎注意使用，以免容易引起中毒。

止痛丹

廣州 馮天慈

【處方】 甘草三十份，波薐五份，大茴五份，薄荷油四份，丁香油三份，樟油五份。

【用法】 研成細末煉成小丸，看症輕重增減。

治慢性腸神經痛方

潮安 周益枝

【處方】 乳香一錢五分，沒藥一錢五分，茯苓五錢，白芍五錢，小茴七分，川棟二錢。

【用法】 水煎服。

【適應症】 衰弱期慢性腸神經痛。

治腹痛效方

丰順 劉兆芹

【處方】 芍藥甘草湯——杭白芍一兩，炙甘草五錢。

【用法】 用清水一碗半，煎六分溫服，兒童減半。

此方除療胃腸一切痛甚效之外，對二腳攣急酸痛（其症狀晚上腫痛，而晨止者）不能行亦甚效。凡因跌打損傷或睡眠姿勢不正，因而腰背有筋牽強者亦宜。

治肚痛良方

欽縣 郭蘭生

【處方】 榔衣二錢，良姜二錢，蘇梗二錢，陳皮二錢。

【服法】 清水煎服。

胃痛方

廣州 劉咏如

【處方】 薤白头三錢（去衣），炒焦瓜蒌仁三錢，延胡索二錢，法夏二錢，茯苓三錢，香附二錢，煨瓦楞子三錢，生姜二片，桂枝一錢。

【用法】 清水煎服。

【适应症】 久患胃痛，胸痞之涎，脉弦。

治胃痛方

澄海 黃紹昌

【處方】 用生鷄卵壳数个（去內膜），放在新瓦上焙赤研成細末，每次服一錢，飯前各服一次，用佛手干煮水冲服。

治胃痛散方

澄海 陳成光

【處方】 黑枝子二錢，云連一錢二分，白芍二錢半，靈脂錢半，煨牡蠣四錢，檳榔錢半，沉香（或丁香）三分。

【用法】 原方七味，十五歲以上照量，十五歲以下半量，七歲以下再酌減，用水煎服。

治胃神經痛方（俗称肝胃气痛）

陽春 何夢蓮

【处 方】 檀香八分，降香八分，橘紅一个。

【用 法】 煎濃湯服。

治胃痛方

龙川 楊文初

【处 方】 海螵蛸五錢，良姜三錢，香附四錢，广木香二錢。

【用 法】 上药共研成末，冲沸水服或煎水服亦可，共服二剂。

治胃寒痛方

龙川 黃菊馨

【处 方】 “大建中湯”干姜四錢，蜀椒四錢，石柱参二錢，大棗二兩。

【用 法】 上药煮水服。

【适应症】 此方治胃痛（俗称心气痛）如割，痛約半小时，时痛时止，精神困乏，不能飲食，脉乍大乍細，舌絳不鮮。

治胃積疼痛方

云浮 欧宴桃

【处 方】 青皮二錢，灵脂二錢，川棟子二錢，穿山甲珠二錢，小茴二錢，玄胡索錢半，沒药錢半，良姜錢半，檳榔二錢，木香一錢，沉香一錢，春砂一分，煎服。

沉香化滯定痛丸

云浮 李茂釗

【处 方】 沉香錢半，大黃三錢，莪朮二錢，沒药二錢，

乳香二錢，煨瓦楞子五錢，玄胡索（酒炒）三錢，為末糊丸服，每次三錢。

【適應症】 胃氣滯痛。

治胃病方

廣州 黃廣大

【處方】 雞鰓二三十個。

【服用法】 將雞鰓洗後，用水煮至極爛，每天或隔日煮食一次，服至三、四次便可痊愈。

慢性胃病胃痛

廣州 謝 創

【處方】 五靈脂八兩，香附子八兩（去淨毛水浸一日），黑丑一兩，白丑一兩。

【制法】 將藥研成細末微火炒至半熟，醋和為丸，如蘿卜子大。

【服法】 每日早晚各服一次，每次一錢，姜湯送下。

慢性胃潰瘍方

封開 鄧琮林

【處方】 南豆花三錢，云苓三錢，金釵斛二錢，干葛花三錢，苡仁五錢，薤白二錢，春砂花錢半，檳榔花錢半，白芍二錢，甘草一錢。

南豆、干葛、春砂、佛手等花，療胃腸病發作疼痛比較青皮木香等有效，而且較少副作用，至于此种花類之性味，大概与各藥本身之作用相近似，但氣味芳香，鎮痛調整之功能較為优越，如能臨床診斷確屬腸胃病疼痛者，可以對合症狀選方用之（或適當加減），常收良效。

【症 狀】 胃部疼痛，牽引脅痛，每發時即覺潮熱，噯腐，大便常夾黑色血液，脈緩濡，舌苔白滑不渴。

治胃痛民間驗方 云浮 趙裕才

【處 方】 桐油樹蘗，約四、五兩，煎水內服。立效如神。

胃痛丸方 汕頭 蔡仰高

【處 方】 防黨參二兩，細辛五錢，桂心五錢，厚附片（焙）二兩半，干姜一兩半，川椒六錢，川連三錢，高麗參五錢，黃柏五錢，當歸尾三兩，炙草一兩，良姜一兩半，烏梅卅粒，大棗一兩半，正沉香三錢，吳茱（鹽水炒）五錢，祈艾（醋制）一兩，砂仁一兩，青皮一兩，檀香六錢，靈脂一兩，川厚朴（姜制）六錢，炙芪一兩，白朮（土炒）一兩，香附（制）五錢。

【制 法】 各藥揀上品，用米酒濕透，隔宿蒸熟，晒干研成細末，煉冬蜜為丸，如綠豆大。

【用 法】 每日服丸二次，每次以二錢為度，半飢時用開水送下。普通胃痛服六兩，久積多年作痛，可服至十兩。

【適應症】 胃經虛寒消化不良，嘔吐酸水，或吐食物以及虵虫作痛如針刺。胃潰瘍服用亦有效。

治胃病驗方 龍川 黃泮增

【處 方】 青皮二錢，元胡錢半，木香一錢，大茴二錢，五靈脂二錢，良姜錢半，砂仁五分，上沉香一錢，沒藥錢半，公丁香一錢，川楝子二錢，木鱉子一錢（去壳），檳榔

錢半，前胡一錢，山甲二錢，麝香一分（另裝）。

【制 法】 將去壳木鱉子切成七八片，同其他藥放入銅鍋內炒成焦黃色，取去鱉子不用，再把余藥研成末，攤在地上約三小時，以一錢一包，分成若干包，用玻璃樽裝好，勿泄氣。

【用 法】 每日服二次，中午稍后一次，就寢前一次，每次服一錢，和麝香一份（如全藥共十四包，每次用麝香十四分之一），并用鹽一粒如黃豆大放入藥粉內，以開水沖服之。

胃病驗方

海丰 呂振坤

【處 方】 丁香三錢，白朮四錢，雄黃三錢，蒼朮二錢，鶴虱四錢，陳皮三錢，歸尾三錢，豆蔻三錢，麝香二分。

【制 法】 共研成極幼的細末，裝到玻璃瓶里儲藏。

【用 法】 病輕服二錢，重病服三錢，先用咸欖五枚和老茶葉末三錢煮水（一碗水煎至二三分），然後將藥末和好酒攪勻，用煮好的水沖下，溫服，每天服一次或二次，連服三天。

【禁 忌】 一切冷食（長期性）。

【適應症】 心腹脹痛，或吐黃水，飯粒不能吃，日夜呻吟，痛連背心。

久年傷積外用吸管方 汕頭 蔡仰高

【處 方】 生川烏三錢，生草烏三錢，姜黃三錢，續斷三錢，川大黃三錢，自然銅三錢，當歸尾三錢，北細辛二

錢，白芷三錢半，防風三錢，一條根五錢，川黃柏三錢。

【用法】 上藥共研成粗末和桂竹管十段（桂竹管每節長二寸五，兩端一空一塞），加水五碗同熬，約二炷香久取起，用銀針消毒后刺破傷痛之處，見血，然後將竹管帶烟向刺破處吸之，熱氣退，管即自脫，另以他管代之，其積血被吸出后將永不再發。

【適應症】 一切年久傷積，時時作痛，用此有效。

闌尾炎方

【處方】 大黃五錢，元明粉五錢，丹皮五錢，桃仁三錢，冬瓜仁五錢，木通三錢，海藻三錢。

【用法】 水煎溫服，日服二次，如瀉過多，宜減大黃明粉。

【適應症】 闌尾炎疼痛。

治闌尾炎方

封开 張伯炷

【處方】 丹皮三錢，苡米五錢，桃仁三錢，萹蒲三錢，香附二錢，甘草一錢。

【用法】 水煎服。

【適應症】 盲腸部疼痛劇烈、右足抽縮，不能伸直。

萹蒲一葯，廣州對腸癰常使用小萹蒲。

治盲腸炎方

江村區高塘小組西醫 劉介臣

【處方】 蛇利草煮水當茶飲。

【服 法】 生用或晒干同样可用，分量多少无妨。

胃痛和虫患方 封开 何仲平

【处 方】 防党三錢，归身二錢，干姜錢半，川連二錢，細辛錢半，川椒錢半，桂枝錢半，黃柏二錢，附子二錢，烏梅四錢。

此方原治厥陰吐蛔的，現借治胃腸作痛虫患，往往收到良好效果，若服其他治标的止痛药无效者，可試服此方。

三、膈食反胃

治膈食反胃方 郁南 陈万生

【处 方】 雪梨一个去核，入丁香五十粒在雪梨內，外用紙包，煨熟食之。

【适应症】 膈食反胃，食入即吐。

又 方 郁南 聶尊賢

【处 方】 牛反草（即牛夜間反出的草）煎水服。

【适应症】 朝食晚吐，晚食朝吐。

治膈食驗方 云浮 黃瑞熙

【处 方】 青皮三錢，干姜三錢，吳萸五分，鵝喉二条，川生花二錢，牡丹皮三錢，細辛五分，月石五錢。

【用 法】 將药研成末，分四天服，每天三次。

膈气散

广州 趙思競

【处 方】 大黃二兩酒制九次，上沉香末六錢，礪砂二錢，桃仁去皮尖去油六錢，烏朮一兩。

【用 法】 研末每服三分，五更舌上舐津下。

治膈症方

陽春 何夢蓮

【处 方】 用老桑樹櫟櫟，燒紅存性，研為末。

【用 法】 黃酒燉熱，沖上藥末，每次一至二錢。

四、痢 疾

痢疾屢驗方

陳濟周

【处 方】 生谷芽、炒谷芽、生車前子、熟車前子、生甘草、炙甘草各等分，肚痛枳瀉加炒白芍、生白芍、生山查肉、炒熟山查肉（本方由玉子巷禮耕齋關澄弼秘傳而來）。

久痢驗方

廣州 梁端儕

【处 方】 鴉胆子去壳取完整粒肉。

【用 法】 成人每次服二十至五十粒，可用藥囊分載，空腹開水送服，疴痢經過一星期以上多效。

治閉口痢方

【处 方】 去壳鴉胆子肉霜一兩。

【制用法】 將鴉胆子肉取去油（名肉霜），用白飯二兩和

藥搓成小丸綠豆大，大人服八粒，小兒服一二粒，同時用當歸炭三錢、荊芥炭一錢煮水作茶飲，又將京柿一個，瘦肉二兩，木棉花四朵，作饌食。

痢症丹

廣州 姚錦石

【處方】 生大黃二兩，羌活一兩，制川烏一兩，北杏仁二十五粒，蒼朮一兩半（米泔水浸一夜麻油炒）。

【用法】 共研極細末，每服三分至一錢，一日三次，小兒酌減，開水送服。

赤痢驗方

【處方】 用貓鼠耳草，分量成人每次服一兩，蘿卜皮一兩煮水沖蜜糖，重症服三次即愈。又方用蘇銀花一兩研末沖蜜糖作二次服。

紅白痢症方

廣州 趙思競

【處方】 紅花三錢，鴉片一分，黃蠟五錢，朱砂一錢，鴉胆肉五錢去油。

【用法】 將藥研成細末，做成小丸如綠豆大，每服八粒，一日三次。

痢症方

廣州 趙思競

【處方】 鉄香爐五錢，錦地羅五錢，白石（木）耳五錢，京柿三個，木棉花五錢，白茅根五錢。

【服法】 清水煎服。

治痢疾方 順德大良 董少宸

【處方】 大黃一兩。

【用法】 用好酒二大盞，煎至一盞半，去渣分二次服。

【適應症】 瀉痢日久不愈，膿血稠粘，里急后重，日夜无度。

又方 順德大良 董少宸

【處方】 赤芍四錢，白芍四錢，歸尾三錢，黃芩三錢，

大黃二錢，木香二錢，尖檳三錢，甘草一錢。

【服法】 清水煎服。

【適應症】 紅白痢疾，腹痛，里急后重。

又方 順德大良 董少宸

【處方】 白芍六錢，黃芩四錢，甘草一錢五分。

【服法】 水煎服。

【適應症】 痢止后，服此以撤尽其毒。

又方 順德容奇 李庭芬

【處方】 水飛木薯粉。

【用法】 成人每次量兩匙，用冷水調勻如糊狀，加入白糖少許，用開水沖入，口服。

【適應症】 痢疾里急后重，黃白粘液帶血，日下數十次，連服此藥四次，可以見效。

又方

【处 方】 生狗貼耳三兩，生細叶鳳毛草二兩。

【用 法】 將上藥煎取一碗半濃汁，加老番薯餅末半个，冲蜂糖服，小兒減半。

【适应症】 紅白痢疾。

又 方

失名

【处 方】 大黃四錢，只壳三錢，檳榔二錢，當歸二錢，川朴二錢，赤芍三錢，萊菔子三錢，木香四分。

【用 法】 水煎服。

【适应症】 久痢不愈，新痢而无發熱惡寒症狀亦可用。

痢疾方

手抄本

【处 方】 西党三錢，西栗壳二錢，木香五分，故紙二錢，五味二十粒，縮砂一錢，山楂二錢，煨姜为引。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 久痢不愈。

痢疾方

封开 梁云山

【处 方】 留种蘿卜头一个煮水，后將蘿卜水煮鷄蛋二只，連湯服用。如果長期痢紅白痢者，將蘿卜水煮鷄肉，連湯服食。

又 方

封开 梁伯強

【处 方】 春砂花二兩，煮水冲蜜糖服，若有紅白，加檳榔炭八錢同煎。

又 方

封开 龙昆山

【处 方】 槐花、麥芽、榴皮、蒼朮、銀花、茯苓、郁金、灵脂、沉香，以上各味錢半炒过，若虛痢加炙芪、炙党、炒白朮。

【用 法】 水煎服。

【适应症】 此方屬寒湿痢有效。

又 方

封开 莫翰洲

【处 方】 銀花三錢，黃芩二錢，白芍二錢，山查二錢，枳壳二錢，檳榔二錢，归身三錢，甘草一錢，地榆二錢，紅花二錢，如只是白痢无血者，去地榆加大黃錢半，木香八分，同煎服。

【适应症】 紅白痢均可适合，初起湿热積滯者多效。

又 方

封开 黎民生

【处 方】 肉桂五分，川連二錢，煎服連服五天。

【适应症】 久痢可用。

寒痢症方

封开 苏富軒

【处 方】 熟附四錢，炮姜錢半，茯苓四錢，白朮四錢（土炒），赤石脂三錢，吳萸七分，炙草一錢，煎服。

【适应症】 痢疾不止，脉沉小，舌淡白微黃，但潤而不燥，渴飲热湯，腹中隱痛。

又 方

封开 苏富軒

【处 方】 熟附子四錢，干姜錢半，飯党参三錢，白朮四錢（土炒），茯苓四錢，赤石脂三錢，水煎服。

【适应症】 紅白痢日久，脉微欲絕，舌淡白不渴。

痢疾方

丰順 潭江衛協

【处 方】 鮮鳳尾草一束，萊菔子一兩（略炒），柿餅一塊。

【用 法】 將萊菔子柿餅煎水后，將鳳尾草捶搗冲和，再加蜂糖服之。

又 方

丰順 許振剛

【处 方】 川大黃四錢，枳壳三錢，白芍五錢，川朴錢半，麥芽四錢，南木香一錢（后下），檳榔錢半。若下血多者加槐花四錢（炒黑）。

【适应症】 此方适用于初起的痢疾。

治赤白痢疾經驗方

云浮 区功蓋

【处 方】 毛射五錢，山查子三錢，金銀花一兩，煎水服。

治紅白痢疾方

云浮 何漢華

【处 方】 用黑叶荔枝核晒干研成細末，另用灯心球一丸，陈皮一塊，煮粥，將荔枝核末和入粥內，另加土白糖拌勻食之，虽噤口痢亦效。

（略）

治小兒痢疾方 云浮 趙裕才

【處方】 云母石(眞者)三錢，研成極細末，和粥哺兒。

治痢疾方 云浮 歐國英

【處方】 槐花三錢，銀花三錢，木棉花三錢，川連一錢，鵝蛋花二錢，天香爐二錢，白头翁三錢，大黃二錢。

【用法】 水煎服。

治紅白痢疾方 云浮 樊榮華

【處方】 生苡米一兩，黑芝麻一兩，搗爛煎服。

治紅白痢症驗方 云浮 六合診所

【處方】 粟壳三錢，麥冬三錢，竹葉三錢，紅棗七只，黑棗七只，灯芯一扎，水煎去渣加黃糖、白糖各七錢。

治紅白痢症方 云浮 保民診所

【處方】 枯礪二錢，甘草二錢，沉香二錢，洋烟屎二錢，赤石脂二錢。

【用法】 共研成細末，大人每服七分，小兒每服三分，白開水送下。

治痢症良方 云浮 彭明軒

【處方】 薑蒲四錢，萊菔子三錢，北紫草五錢，銀花三錢，槐花三錢，水煎服。

又 方

【处 方】 用元根火秧心漂淨煮水服之。

紅白痢疾方

佚名

【处 方】 川不太、木棉花、赤茯苓、錦地蘿、金香爐，
每四錢煎水服。

治痛痢效方

云浮 趙裕才

【处 方】 川連五錢，槐米一兩（二味同炒至老黃色，去槐米不用），另乳香錢半，沒藥錢半，研成細末，先將川連煎水作濃汁調入藥末，作一次服之，立能止痛止痢。

又 方

叶少海

【处 方】 鳳尾草一把煎水冲蜜糖服之。

治下痢方

叶滿枝

【处 方】 刀头玉、木棉花、鷄谷草各適量，水煎內服。

治痢疾經驗良方

云浮 區焯年

【处 方】 金香爐一兩，土銀花六錢，綿茵陳六錢，加京柿二只去蒂切片，水煎服。

治白痢方

云浮 曾吉燮

【处 方】 祈艾、木香、川薤白、錦地蘿各適量，水煎內服。

治獨脚痢方 云浮 梁毅修

【處方】 黑鐵樹葉一兩，煮瘦豬肉少許服之，痔症下血亦效。

【附注】 獨脚痢系地方俗稱，究系何種症狀，待考。

治噤口痢疾方 云浮 朱星葵

【處方】 山查五錢，銀花五錢，研成末，用姜皮煮水，沖蜜溫服。

治痢疾初起方 云浮 六合診所

【處方】 赤痢用紅梗勒莧菜四兩，白痢用白梗勒莧菜四兩，如紅白痢每樣各三兩，搗爛絞汁沖開水和蜜糖內服。

治痢效方 云浮 陳榮光

【處方】 薏仁五錢，扁豆五錢，葛根五錢，鴉胆子（另吞）七粒，陳皮一錢，赤芍四錢，山查七錢，麥芽五錢，水煎去渣溫服。

治痢疾方 清遠 盤灼明

【處方】 五月槐水粽，切開曬干候用。用以煮粥食之。

治痢疾驗方 台山 王明

【處方】 錢缺口、節節花（因每節都是開花結實，故名）各適量。

【用法】 上药煎水，用蜜糖冲服。每天一次，空心服。

如由白痢转红痢时，连服四天。

【禁忌】 酸、辣、鱼腥、青菜及油腻等物。

治红白痢方

新丰 李 爵

【处方】 柴胡钱半，黄芩四钱（酒洗），白芍四钱（酒洗），
大黄三钱（酒洗），归身一钱，生地四钱，揀香钱半，枳壳
钱半，川连三钱，陈皮一钱，桃仁钱半，地榆三钱，白头
翁三钱，尖檳钱半，红花一钱，川朴钱半，山楂钱半。

【用法】 清水煎服。如发热头痛，则减去川连；无红，
可减桃仁、地榆。

治痢疾方

龙川 張林泉

【处方】 野苧菜八两。

【用法】 上药煮水，放盐水三两，和服。

【附注】 若是白痢，用野苧菜冲蜜糖热服。

治痢疾方

龙川 黄育三

【处方】 金银花五钱。

【用法】 将上药研成末，用开水冲服，每日三次。红痢
加红糖，白痢加白糖，服后泻下次数增多，待痢毒净
后，下痢自止。

治痢疾驗方

广州 鍾滿枝

【处方】 铁线草、京柿（适量）。

【用法】 將藥煮冰糖食。

治痢疾驗方 廣州 林佐才

【處方】 正川連錢半，黃芩錢半，白芍錢半，山楂肉錢半，面炒枳壳一錢，姜汁炒川朴一錢，尖檳一錢，青皮八分，當歸五分，甘草五分，地榆五分，紅花三分，桃仁一錢（去皮搗泥），木香三分（研末另包沖服）。

【用法】 水煎服，服后再用水一碗煮成半碗，再服。如滯澀甚者，加酒炒大黃二錢，服二劑去此味。單白痢去地榆、桃仁，加橘紅四分。連服數日。

【說明】 服藥后，可能反見辛苦，或肚痛尤甚，勿驚，因藥力所致也。

治痢疾方 清遠 謝朗軒

【處方】 用騎籬拐（類似青蛙，但腳較長）一個，煮粥或煮水服。

治紅痢驗方 欽縣 黃甲乾

【處方】 槐花三錢，銀花二錢，菊花錢半，紅花一錢，地榆二錢，蘇木三錢，百草霜三錢，甘草二錢。

【服法】 清水煎服。

治痢疾方 清遠 張一平

【處方】 延胡一兩，枯礬錢半，石脂一兩，甘草三錢，陳皮錢半，辰砂二錢，川連二錢，木香錢半。

【用法】 共研成細末，紅痢以白糖開水沖服，白痢以紅糖開水沖服，大人每次服一錢，小兒減半。

治赤白痢疾方 澄海 陳惠嵩

【處方】 鳳尾毛、豬肝菜、白骨豬母菜、眞珠花菜各一束。

【用法】 上草藥用米泔水煎，和蜜沖服。

治紅白痢方 雲浮 嚴錦卿

【處方】 雀仔利草三至四兩，搗爛沖蜜糖服之。

治痢疾方 雲浮 黃盛林

【處方】 勒茨菇（每次一兩）煮瘦豬肉食之。

又方

【處方】 酸石榴搗絞汁取二升，每服五合，治五色痢疾有效。

治久痢不止方

【處方】 薺花不拘多少，陰干研成末，每服二錢，用白開水送服。

治阿米巴性痢疾方

雲浮 趙裕才

【處方】 白頭翁湯加歸身五錢，白芍四錢，香椿樹根皮

五錢，水煎，內服。吞服鴉胆子十至十五粒，如服鴉胆子后腹痛轉劇，可煎服白芍四錢，甘草二錢，即止。

治阿米巴痢疾方 澄海 沈卿云

【處方】 阿膠五錢，當歸八錢，伏龍肝一兩，三七三錢，鴉胆子百粒（去壳），芍藥八錢。

【制法】 醋煮烏梅肉為丸如綠豆大。

【用法】 每次服八十丸，用艾葉和白頭翁湯送下，每日服三次。

治細菌性赤痢方 云浮 趙裕才

【處方】 黃芩四錢，川連二錢，檳榔三錢，枳殼三錢，川朴三錢，當歸身五錢，白芍四錢，廣木香（后下）二錢，甘草二錢，生錦軍三錢，水煎。

【加減法】 努賁減少，去錦軍加茜根三錢；熱減少，減黃芩、川連各一錢；腹痛減少，減木香一錢；里急后重減少，減檳榔、枳殼、川朴各一錢；膿血減少，減歸身、白芍各二錢，此名退減芍藥湯法。如以上症狀任何一種加重，則依藥量照增，此名進加芍藥湯法。但總結一般治療經過，都屬逐漸減輕急性病狀。余以本方為主，痊愈率在90%以上。而運用加減之法，服三劑而痊愈者指不勝屈。

治腸炎及細菌性痢疾方

澄海 林祖述

【處方】 用生葉下珠一兩或二兩，煎水服（可加紅糖也）。

治熱毒痢、紅痢方 澄海 沈卿云

【處方】 犀角三錢，川連三錢，干葛三錢，石榴皮五錢，地榆五錢，蘇花四錢，黃芩五錢，三七三錢，黑荊芥三錢，黑槐花三錢。

【用法】 共研成細末，每次服三錢，和蜜沖服，每日服三次。

治各種毒痢方 澄海 沈卿云

【處方】 干葛五錢，地榆五錢，干姜五分，當歸五錢，黑豆百粒，罌粟壳四錢，枳壳五錢，黑山查五錢。

【服法】 共研成細末，每次服三錢，用冬瓜子煎湯沖服，每日服三次。

治濕熱血痢方 欽縣 吳星齋

【處方】 烏梅二枚（去核），乳香一錢，沒藥一錢，大黃三錢，黃連一錢，貝母一錢，肉蔻一錢（去油），槐花錢半（炒黑），茵陳一錢（炒黑），朱砂一錢。

【用法】 上藥研成細末，煉蜜為丸，朱砂為衣，如龍眼大。大人每次服二丸，小兒每次服一丸，米湯送下，一服未愈可再服。

五、大便秘結

治大便不通方 封開 溫燦星

【處方】 生油四兩飲下即通。

治習慣性便秘方

- 【處方】 草決明十兩。
【用法】 每次用二兩水煎服，五次可愈。
【適應症】 習慣性便秘，不是寒熱結症狀者。

治習慣性便秘方 清遠 盤灼明

- 【處方】 火秧蘗流出的汁液，加適量番薯粉為丸，如綠豆大，用新瓦焙干候用，每次服一丸（開水調勻）。
【附注】 此丸服後四小時便瀉，無副作用，亦無肚痛。

治大便閉結寒結方

- 【處方】 巴戟一兩，白朮一兩，熟地一兩，山萸肉一兩，附子三錢。
【用法】 水煎服。
【適應症】 便秘腸鳴作痛、胃噎冷氣、畏寒喜熱者。

六、小便壅閉

治尿閉方

郁南 譚鑒初

- 【處方】 田螺肉（新鮮的），生鹽。
【用法】 共捶爛敷小腹部，移時即通。如有風寒，加吳萸末同敷。

治小便不通方 高要 刘振旺

【处 方】 田螺廿只（去壳），蒜头二个。

【用 法】 共捶爛貼肚臍中三小时。

【适应症】 尿閉不通。

小便不通方 封开 廖文庭

【处 方】 生葱連根一握，生鹽一撮，田螺七只，三味共捶爛敷肚臍即通（如夏季无葱时，用四季葱亦可）。

治小便不通方 云浮 刘晋文

【处 方】 假黄栗藟煎水，加鹽服之，即通。

治小便閉驗方 云浮 高恒均

【处 方】 莎鷄四十九只（搗爛），冲白滾水服。

治小便不通方 云浮 区仲銘

【处 方】 大田螺一只和大梅片少許搗爛敷肚臍。

又 方 云浮 趙裕才

【处 方】 金櫻子藟四兩，川滑石一兩，煎水內服，立通。

治小便刺痛及出血方

云浮 黃士才

【处 方】 木通三錢，生枝三錢，車前子三錢，大黃二

錢，扁蓄二錢，瞿麥三錢，桃仁二錢，赤芍二錢，滑石三錢，甘草錢半，水煎，內服。

治男婦小便不通方

丰順 潭江衛協

【处 方】 抗青草四兩，煎水和烏糖服即通。

又 方

丰順 潭江衛協

【处 方】 白頸蚯蚓（最好在芭蕉樹下的）約六条，將泥去淨，捶溶去渣，其汁和蜂蜜及開水服（无蜜糖用鹽數粒，或米泔水亦可，同樣制法），且可治小兒百日咳。

氣虛小便不出方 廣州 趙思競

【处 方】 熟地四錢，萸肉二錢，淮山二錢，茯苓三錢，而參三錢（另燉兌），麥芽三錢，牛膝二錢，車前二錢，肉桂四分（另研末沖）。

七、淋濁（包括砂淋、血淋、白淋、白濁、虛淋）

治砂淋方 揭陽六區 曾紀識

【处 方】 用韭菜一把煮醋沖六一散服之，沙出。

又 方

【处 方】 用貓毛草，車前草，半呷（邊）蓮草各適量，

煎水冲鹽少許服。

治砂淋方

【处 方】 先煮冬瓜連湯帶渣食之，后用牛膝、乳香、血余和酒水各半煎湯，加入血余炭冲服，不效再服。

治砂淋方

【处 方】 白苧麻头二兩，海金砂五錢，水煎服有效。

治砂石淋效方 丰順 潭江衛協

【处 方】 金錢草（即錢鑿口）煎水服之立效。重者數服。

【附 注】 本人曾親目見過真正之金錢草，不是錢鑿口，据文献記載，对治砂石淋症确屬神效云，但錢鑿口是否同样有效，有待今后之實驗，方能确定之。

治砂淋方

徐世雄

【处 方】 蟋蟀二只（男人用雄，女人用雌，用新瓦焙存性），六一散二錢，另用露水草三錢煎水，冲和服之。

又 方

云浮 苏善卿

【处 方】 扁蓄、瞿麥、葵子、海金砂各三錢，煎水內服。

砂淋方

广州 劳靖夷

【处 方】 卑蛭（又名肥猪，形如小土別，灰白色，干用

研末)，老豆角蕓四兩。

【服 法】 先將豆角蕓用水五碗煎至大半碗，沖入卑蠊末服之。

【适应症】 砂淋病（即今膀胱結石）。

治砂淋方

清遠 侯世良

【處 方】 用萬年青（不是普通的，而是類似吊蘭，其邊不是金色的），煮瘦豬肉食。

治砂淋方

郁南 黃汝霖

【處 方】 佛桑花。

【用 法】 煎水服。

【适应症】 砂淋疼痛。

治膀胱結石方

潮安 陳計生

【處 方】 淡豆豉五錢，牛膝三錢，麝香五厘。

【用 法】 清水煎服。

【适应症】 膀胱疼痛，放散至直腸和生殖器，排尿障礙，尿綫中斷，或見血尿。

治淋病

廣州 李鴻或

【處 方】 劉寄奴一兩，川棟子四錢，木通五錢，澤瀉四錢，海金砂六錢，瞿麥四錢。

【用 法】 水煎服。

【适应症】 砂淋、白濁、小便刺痛。

又 方

廣州 曾少安

【處 方】 牛膝三錢，乳香三錢。

【用 法】 水煎服。

【適應症】 淋病小便刺痛。

又 方

廣州 謝錫霖

【處 方】 馬蹄四兩，金錢草二兩。

【服 法】 水煎服。

【適應症】 一般淋病。

治血淋特效方

雲浮 趙裕才

【處 方】 牛膝一兩，乳香三錢，水煎內服，最嚴重者，血水点滴而出，慘痛呼號，服至三劑，无不痊愈。

【附 注】 本方出驗方新編，經屢試屢驗，曾治愈多人，故特为介紹注意。

治血淋方

郁南 聶春榮

【處 方】 蓮須、川連、地榆、阿膠、枳壳、赤茯苓各三錢，黃芩、生地、木通各四錢，黑枝六錢，灯芯二束。

【用 法】 同煎服。

治溺血驗方

陳鉅昌

【處 方】 粟米（即玉蜀黍）心、須、莢三样生用或晒干均可，每次用數兩，以清水數碗煎取一碗燉服，約服數

十次。

治血尿驗方 清遠 楊玉棠

【處方】 京柿一只（燉存性）煮粥食。

治男子血尿方 云浮 溫 星

【處方】 水瓜壳煎服，加萊菔子同煎更效。

男子血淋不止方 廣州 趙思競

【處方】 陳枳壳一錢，海金沙一錢，滑石一錢，黃連錢半，瞿麥一錢，冬青子一錢，生甘草八分，王不留行一錢，灯芯花一只。

【用法】 淨水煎服。

小便出血痛不可忍方

廣州 趙思競

【處方】 淨豆豉一撮，煎湯服之奇效。

小便下血方 廣州 趙思競

【處方】 旱蓮草，車前草，取汁，每日空心溫服一杯。

治尿血、便血及婦人血崩血淋

陽春 何夢蓮

【處方】 梅樹強，木賊草，灯芯草。梅樹強每次分量約二三兩，后二味隨宜加減。

【用法】 先煎后二味先服，再服梅樹強湯，一剂血減，二剂痊愈。

治尿道炎方 清遠 植修己

【处方】 用通菜头半斤(搗爛)，白糖二兩，用开水冲服。

治尿道炎方 清遠 呂植純

【处方】 用桃仁一兩，搗爛如泥，加适量白糖，用开水冲服。血尿加血余炭三錢更有效。

治血淋症方 廣州 黃濟時

【处方】 潞党参三錢，白朮二錢，炙甘草一錢五分，云茯苓四錢，滑石三錢，蒲黃三錢，琥珀二錢，車前子三錢，海金沙三錢，干荷蒂二錢。

【用法】 清水二碗半煎至一碗，空腹溫服，每日一剂，服至三、四剂，自愈。

【适应症】 形瘦体倦，小便不利，便时見血塊及白汁，大便日五六次。

治赤濁小便瀉痛方 龍川 黃子青

【处方】 蛇舌草四兩。

【用法】 上药煎水服即愈。

治白濁方 雲浮 練華國

【处方】 独行千里、六月雪、九里明各适量，水煎內服。

治白濁方 龍川 張日光

【處方】 野苧菜根四兩，牛膝頭一兩，紅背一兩，白花鬼點火二兩。

【用法】 上藥煮豬腳服。

治花柳白濁方 雲浮 黃林

【處方】 生白果一兩，川太片一兩，川百足（去頭足）四條，土瓜根強一兩，水煎內服，連服四至五次即愈。

治神經衰弱小便混濁方

潮安 陳宗虞

【處方】 茯苓一兩，淮山一兩，金櫻五錢，芡實一兩，蓮子一兩，棗肉五錢，薏仁六錢，人字草一兩。

【制服法】 上藥用水燉熟晒干，研為細末，米糊為丸如梧桐子大，每早晚飯前各服三錢，開水送下。

【適應症】 輕度神經衰弱并發現小便混濁者。

治慢性淋濁方 龍川 楊德布

【處方】 老杉樹仁（即山中老杉樹經刀傷流出之樹脂日久結成脂塊的），採取干燥者。

【用法】 將杉樹脂研成末，用末摻入半煎熟之雞蛋，包裹吞服，早晚一次，每次約一至二錢，連服三四日。

治小便浮塊或沉淀及赤白濁女人白帶方

澄海 陈悟生

【处 方】 綉球花叶六叶，瘦猪肉一兩。

【用 法】 以上二药切碎煎水服。

八、黃 疸

治黃疸方

广州 区英杰

【处 方】 鷄骨草二兩至四兩，瘦猪肉一塊。

【用 法】 將肉和药共煎湯服。

【适应症】 全身及角膜均發黃。

又 方

广州 叶 英

【处 方】 黄皮核一兩，鷄骨草五兩，瘦猪肉三兩。

【用 法】 將药和肉共煎湯服，連服二十次，每次要煎三小时。

【适应症】 小便眼白均黃，身体疲倦，飲食不思。

治黃疸方

失名

【处 方】 生薏米四錢，綿茵陈五錢，川草薢四錢，瞿麥三錢，扁蓄三錢，車前三錢，木通三錢，滑石六錢，枝子三錢，胆草四錢，甘草錢半。

【服法】 用水煎服，連服四次。

【适应症】 皮膚面目均黃，屬於熱性的。

治陽黃疸效方 云浮 趙裕才

【处方】 用滿天星草四兩，搗爛，放沙盆中，另煮茵陳蒿二兩去渣，沖沙盆里，澄清，再去滿天星渣，使病人盡量內服，三服可愈。

治黃疸經驗方 云浮 朱星葵

【处方】 川草薢錢半，川木瓜錢半，秦艽二錢，茵陳錢半，黃柏錢半，山枝二錢，石斛二錢，豬苓錢半，閩澤瀉錢半，木通錢半，龍胆草二錢，酒苓錢半。

【附注】 患本病者，身體、四肢、面、目、二便皆黃，宜服本方，并用銅器煮水浴身即愈。

【編者按】 本方只治陽黃，如屬陰黃勿服。

治黃疸方 高要 廖平世

【处方】 對面針強六兩，毛鷄一只。

【制服法】 男子患此症用母鷄一只，女子患此症用公鷄一只，加些油鹽用水八碗連葯煮至一碗連鷄同食。

【适应症】 全身皮膚皆黃、面部和眼睛亦黃，不論男女患此症，服三劑痊癒。

治黃疸病方 廣州 許秀榮

【处方】 歸身三錢，淮山三錢，豬苓三錢，黃苓三錢，

茵陳五錢，茯苓三錢，黃精三錢，赤芍三錢，大棗一兩，甘草一錢，青礪一兩（瓦焙）。

【用法】 用雙蒸酒二斤，白糖六兩浸服，每次一茶杯，晚飯後服之。

黃疸外治方 婦幼隊 雷慶余

【處方】 朱砂二錢，苦丁香八錢，母麻雀糞八錢，共研成粉。

【用法】 取竹筒一枝，將藥粉放入竹筒內，吹入病人鼻孔中，須用力吹進內部，吹後叫病人伏着面坐或臥，使鼻孔內黃水流出，任由他流至干淨為度，不可用手阻止。

【注意】 吹藥前，須將鼻涕排淨，免阻礙藥粉入內，吹藥後如口中感覺有苦味，不可咽下，須即吐出。三天即可痊愈。

黃病方 廣州 趙思競

【處方】 馬鞭草適量，煎湯，常飲自愈。

黃腫丸 廣州 趙思競

【處方】 渣肉七錢，香付三錢，生黨七錢，青皮二錢，麥冬二錢，兩參一錢，茯神三錢，白朮五錢，杜仲四錢，炮姜一錢。

【用法】 研成細末蜜丸，朱砂為衣，每服七分。

黃疸妙方

廣州 趙思競

【處方】 龍鱗草煮精猪肉食。

慢性黃病（阻塞性黃疸）方

南城 蕭 熙

【處方】 黨參二兩，白朮二兩，云苓三兩，生甘草八錢，針砂二錢，皂莢（焙存性）錢半，鷄內金二兩。

【用法】 將藥研成細末，蜜丸，如梧子大，每服五分至一錢，每日三服。

治散胆黃症方

龍川 張妙連

第一方

【處方】 苡米五錢，扁豆四錢，鳳仙花一兩，山渣四錢，麥芽八錢，香薷一錢五分，水仙子四錢。

【用法】 上藥煎水服，至小便白色為止。

第二方

【處方】 茵陳二錢，扁豆二錢。

【用法】 將上藥研成末，取鯽魚一條剖開，入上藥末，蒸熟，蘸辰砂食之。

第三方

【處方】 山湯樹根。

【用法】 上藥煎水服。

【附注】 散胆黃症狀：尿黃色、熱至四十度以上，瞳孔縮小，眼目歪視，汗出粒形，舌色灰白，周身發黃。

原书缺页



九、吐血（包括鼻衄、大便下血、血友病）

治新吐血經驗方 云浮 趙裕才

【處方】 生側柏叶，生萊菔头，生蓮藕連節，共納臼中搗爛，絞取清汁，調服三七末錢半，立止。

止新吐血驗方 云浮 曾仲煉

【處方】 旱蓮草鮮者四兩搗爛，冲童便飲之，加生柏子共搗爛同服尤效。

新吐血方 云浮 曾仲煉

【處方】 藕節煮旱蓮草服之。

治血熱妄行方 云浮 陳維龍

【處方】 生萊菔，鵝汁盡量服之。

胃出血方 封开 徐行庄

【處方】 蒲黃三錢，生地三錢，川連三錢，生枝三錢，甘草錢半，黃芩三錢，花粉二錢，側柏三錢，犀角錢半（先煎），水煎冷服。

【適應症】 大熱吐血。

又方 封开 鍾毓芬

【處方】 生蓮藕半斤，扁柏叶二兩，搗爛冲開水冷飲，

三次便愈。

【适应症】 心中發熱吐血。

治吐血方

云浮 黎彥樞

【处 方】 生鐵炒紅，熟鹽一錢（微炒），煎服，即止。

治吐血良方

云浮 鄧慶耀

【处 方】 威藕節一兩半，柏子仁三錢，兢麥草一兩，煎服。

治嘔血方

云浮 保民診所

【处 方】 生地五錢，藕節四錢，山枝三錢，天葵三錢，百部四錢，茜根四錢，大麥冬三錢，煎服。

治吐血經驗方

云浮 伍 佳

【处 方】 胎血余炭五分（煨存性）合柏子仁三錢研末，沖入開水一兩，再加童子便約一至二兩，服之。

治吐血不止方

云浮 樊榮華

【处 方】 灶心泥一兩，百草霜五錢，同研末，煎服。

又 方

云浮 樊榮華

【处 方】 仙鶴草一兩，白茅根花三錢，煎服。

治吐血方

郁南 陳德軒

【处 方】 茜根五錢，藕節一兩。

【服 法】 水煎加蜜調服。

【适应症】 一般吐血。

治吐血良方

【处 方】 生茅根五錢，紅棗十枚，生地五錢，仙鶴草三錢，蓮子五錢，丹皮五錢，鹿含草三錢，杏仁三錢，扁柏五錢，茜根草四錢，牛膝三錢，韭菜一兩煎服。

【适应症】 上中下三焦，心肺、脾胃、腎肝、血散而吐。

又 方

佚名

【处 方】 黑枝子四錢，歸身三錢，桃仁三錢，黑磁石一兩，炮姜一錢，生花三錢，生地黄五錢，志通三錢，白及三錢，仙法夏三錢，花粉三錢，田七二錢。

【服 法】 用水煎成加生蓮藕汁和藥服。

【适应症】 治忽然从口吐出之血，乃咯血、衄血散行。

治吐血方

【处 方】 仙鶴草一兩，白茅花煨炭三錢。

【服 法】 水煎服。

治嘔吐血方

新丰 李 爵

【处 方】 血見愁根，五指毛桃根（适量）。

【用 法】 上藥煮瘦猪肉服。

治吐血不止方 新丰 李 爵

【处 方】 归身二錢（炒黑），花蕊石四分（煨研飛），杏仁錢（去皮尖），淮牛膝三錢（炒），茜草一錢，丹皮一錢，葶薺五錢。

【服 法】 清水煎和童便服即止。

治吐血、鼻血方 郁南 黎达权

【处 方】 黑墨草，百草霜，側柏叶。

【用 法】 用水煎好，加童便冲服。

治鼻血、吐血、大便血同时發現方

郁南 莫兆平

【处 方】 生地炭三錢，生茅根一兩，丹皮二錢，白芍四錢，阿膠二錢，側柏叶三錢，大黃炭三錢，茜根二錢半。

【服 法】 同煎湯加田七末六分，再加入童便冲服。

治鼻流血方

【处 方】 山枝子、大甘草煨炭研細末，加梅片吹入，鼻血即止。

【适应症】 兼治皮膚外伤出血或刀破伤出血。

鼻出血方

封开 李考年

【处 方】 生地五錢，天冬三錢，麥冬四錢，茜根四錢，白及四錢，黑枝子四錢，黑側柏四錢。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 血热妄行、鼻血不止。

又 方

封开 馮飛鵠

【处 方】 茅根五錢，生地一兩，加桑白四錢，黑枝二錢，更效。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 一般血热鼻出血。

又 方

失 名

【处 方】 生地一兩，麥冬一兩。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 鼻流血不止。

又 方

封开 張少眉

【处 方】 茜根四錢，黑枝子一錢，茅根四錢，藕節二錢。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 鼻血不止。

又 方

河源 楊鳳鳴

【处 方】 鷄屎藤二兩，猪肉适量。

【用 法】 猪肉共煎湯服。

【适应症】 鼻出血、牙血、嘔血。

治鼻血驗方 廣州 麥潔泉

【處方】 旱造禾頭六錢，大紅棗(去核)三枚。

【用方】 清水四碗煎至一碗，如患者無外感發熱兼病，可加瘦豬肉少許同煮。服二、三劑自可痊愈。

【適應症】 流鼻血不論新久及多少，俱皆適用。

治遍身毛管出血 云浮 潘良杰

【處方】 松毛煮水候冷，用布或巾在水中浸透鋪皮膚出血處。

治逢孔出血經驗良方

云浮 譚培彬

【處方】 五靈脂五錢，炒克靈脂五錢，側柏葉三錢，用開水煮沸，加蜜糖五錢煎服效。

【編者注】 炒克靈脂五錢一句恐系衍文。

治腸風下血方 澄海 王維玉

【處方】 側柏葉三錢，黑荊芥五分，黑槐花三錢，黑地榆一錢，炒蘇花三錢，黑查肉三錢，山枝子錢半，酒白芍錢半，當歸身二錢，生地黃三錢，炒枳殼錢半，萊菔殼二錢。

【服法】 水一碗八分煎至八分服。

十、肺癆（包括咳血）

治肺癆方

番禺 关南溪

【处 方】 鮮胎盤一个（制干药名紫河車）。

【制服法】 取妇人產后之新鮮胎盤，用水洗淨，再用生鹽擦过，然后再洗去鹽味，切成粗条，加米煮粥食。

【适应症】 治療五臟损伤，补而不燥，并无不良副作用，多食亦有益无害，功能調补血气，系治療肺癆有效药之一。

又 方

番禺 关南溪

【处 方】 人參七分，阿膠三錢（熬炒），牛蒡子三錢，南杏三錢，糯米二錢半，馬兜鈴二錢，甘草七分。（补肺阿膠散）

【服 法】 水煎服。

【适应症】 治肺癆功能补肺，服此方同时煮鮮胎盤食三次可痊愈。

又 方

番禺 关南溪

【处 方】 白及先用清水洗淨，隔水在飯面蒸过，再晒干，研成細末，每次用白及粉二錢，和蜂蜜五錢，开水冲服，每晚睡前服食一次，至半月后可隔晚服一次。此药对破金型肺癆（即喉头結核發音嘶哑），尤为有效。

又 方

番禺 关南溪

【处 方】 虎乳灵芝三錢，加入上开补肺阿膠散，煎服。

【适应症】 对肺癆咯血症甚有療效，或用虎乳灵芝和冬虫草，燉黑肉竹絲鷄食亦佳。

肺癆咯血驗方 廣州 趙思競

【处 方】 鷄屎藤五錢，蜜棗一大粒，石仙桃一兩，鳳凰鷄（有毛）五錢，扁柏五錢，藕節五錢。

【用 法】 一日一剂煎服。

治先痰后血方

【处 方】 天冬三錢，枝子二錢，鱉甲二錢，陈皮錢半，生地四錢，紫苑三錢，黃芩三錢，桑白三錢，茯苓三錢，白芍三錢，阿膠炒二錢，甘草錢半，烏梅二錢。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 屬於肺熱而吐血者。

治先血后痰方

【处 方】 生地二錢，熟地三錢，天冬、麥冬各二錢，陈皮錢半，知母錢半，黃柏（蜜炒）二錢，白芍（酒炒）二錢，歸身（酒洗）三錢，生姜三錢，大棗二枚。

【服 法】 同煎服。

【适应症】 屬於陰虛而吐血者。

治咳血 順德 陳義生

【处 方】 阿膠三錢，白及三錢，京柿五个（切片）。

【服 法】 清水二盅，煎至大半碗，再加食鹽少許溶化，

倒出放溫服。

【适应症】 男婦兒咳血。

治肺出血

潮安 陳宗虞

【處方】 正朱砂三錢，正川貝三錢，煅中白三錢。

【服法】 上藥共研細末，入柿餅內加水一杯燉服，三小時服一次。

【适应症】 肺結核出血，及外傷性肺血管破裂出血。

又方

【處方】 竹茹絲一兩，鉄包金五錢，穿破石五錢，石豬肝三錢，云田七三錢。

【服法】 上藥用水煎候涼服，連服二三劑，每日一劑，有卓效。

【附記】 內鉄包金、穿破石、石豬肝，系生草藥，廣州生草藥鋪有賣，如別地無此藥，則可不用，即用竹茹三兩，田七三錢，鹽二分，水煎涼服亦效。

治咳血良方

【處方】 海底椰三錢，磁石八錢，萆薢三錢，鹿含草三錢，咸秋石一錢，百部二錢，茜根四錢，生地四錢，山枝四錢，熟地四錢，桃仁二錢，川貝三錢，牛黃一分（另包沖服），加生珠珀，生蓮藕汁和藥服。

【适应症】 治咳痰和血日久，肺經出血。

治肺病吐血或肺癰肺癆等

【處方】 紅葱頭煮瘦猪肉食，未愈再進，屢效。

治癆病骨蒸方 陽春 何夢遠

【處方】 扁柏叶四十九尖，茅根一百支，紅棗一斤，同煮極爛，去柏叶茅根，只食紅棗，每日空心服一百枚。

十一、咳 嗽

枝氣管炎方 封开 梁云山

【處方】 白前二錢，杏仁三錢（去皮），麻黃二錢（去節），桔梗二錢，百部二錢，紫苑三錢，地骨皮三錢，桑皮四錢，兜鈴三錢，陳皮錢半，知母三錢，薏仁三錢（去油），甘草錢半。

【用法】 水二碗煎至一碗，分二次溫服，一劑咳嗽減少，氣平得臥，再服下方。

【禁忌】 腥膩燥熱等物。

又 方 封开 梁云山

【處方】 冬花三錢，桑白四錢，石燕三錢，百部二錢，桔梗二錢，陳皮錢半，杏仁三錢（去皮），地骨皮三錢，兜鈴三錢，麻黃二錢（去節），薏仁三錢，甘草錢半，犀角一錢（先煎）。

【用法】 先將黑犀角用水三碗先煎，后將各藥煎至一

碗，分二次溫服，此症咳嗽再減少，气喘平和，潮熱稍退，口不渴，食欲稍進，再將此方連服二劑，繼服后方。

又 方

封开 梁云山

【处 方】 麻黃二錢（去節），桑白四錢，地骨皮三錢，黑犀角一錢（先煎），牛子三錢，花粉三錢，石燕四錢，知母三錢，杏仁三錢（去皮），冬花三錢，百部二錢，桔梗二錢，陳皮錢半，甘草錢半。

【用 法】 先將黑犀角用水三碗先煎，后將各藥煎至一碗，分二次溫服，此症咳嗽已大部分減少，不潮熱，食欲增進，再將此藥連服四劑便愈。

治支氣管炎

清遠 林少生

【处 方】 金邊黃蜆四兩，老蜜糖一斤，川貝一錢，陳皮一錢。

【用 法】 先把黃蜆蜜糖浸一百天，把上藥拌勻，放飯面蒸熟食之。

治支氣管炎

【处 方】 陳皮一錢，法夏四錢，白朮三分，川貝二錢，薄荷二分。

【用 法】 將上各藥研末，每服一至二錢，開水送下。

【适应症】 咳嗽痰多。

肺炎及肺支氣管炎 廣州 歐學英

【处 方】 土桑白皮一兩，土地骨一兩，粉甘草一錢。

【用法】 早午各服一剂。水煎服。

【說明】 如屬支氣管炎，照上藥加地龍干三錢，浙貝三錢，薄荷一錢煎服。

治傷風咳嗽良方 欽縣 潘澤寰

【處方】 糖一兩，紅棗一兩，生姜兩半，水三碗煎服，服后汗出為度。

治慢性支氣管炎 潮安 陳去弱

【處方】 新鮮蘿卜汁八兩，飴糖一兩。

【服法】 上藥共燉化，候溫，每日二次溫服。

【適應症】 持續久咳，早晚及夜間增劇，咯痰粘稠。

治咳良方 恩平 馮耀銓

【處方】 啄木鳥一只，礞石五錢，枇杷叶一兩（去淨毛），貝母一錢，冬花三錢，紫苑三錢，杏仁四錢。

【用法】 鮮籐竹筒一個（以二三寸為度），載入此藥，用黃泥和鹽撈勻封上竹筒，放入七十至百斤谷壳內燒之，燒妥取出研末，開水沖服。

治風痰塞胸（寸金丹）方

澄海 吳仰松

【處方】 苦參子肉打爛，每一小粒用烏棗肉包之，朱砂為衣。

【用法】 成人服廿丸，小兒（四歲起）服十丸。

治痰火咳嗽經驗良方 趙裕才

【處方】 青黛四錢（水飛極細復研），川貝末三錢，蛤粉三錢，煉蜜丸如指頭大，臨臥含化三至四丸，其效如神。

治諸般咳嗽久不止方

【處方】 款冬花四錢，川貝母二錢，知母四錢，枇杷叶（去毛蜜炙）八錢。

【用法】 上藥先用水浸一小時，微煮數沸，加冰糖二兩，和勻，頻頻啜服之，數日即止，屢用屢效。

訶子散 封开 張普生

【處方】 訶子三錢，青黛四錢，川連三錢，海石四錢，黑枝四錢，薤仁四錢，黃芩四錢，川貝三錢，甘草二錢。

【用法】 若吐血，可單用生蓮叶煮水飲，連飲數次便愈。

【適應症】 實熱久嗽。

【編者按】 非有實熱，勿用芩連。

咳嗽痰實症方 封开 盧其欽

【處方】 貝母三錢，橘紅三錢，赤苓二錢，知母三錢，天冬三錢，玉竹三錢，薤壳二錢半，麥冬三錢。

【用法】 水煎服，若咳痰見血加黑枝炭三錢半，絲瓜絡炭二個，血余炭五分。

【編者按】 傷風咳嗽表邪未解忌用。

治久嗽出血方 澄海 林岳松

【处 方】 川貝五錢，青黛一錢。

【服 法】 共研成細末，每次用藥末錢半，和柿餅一塊，用童便燉服，每日服一次。

止咳散 高要 趙芳伯

【处 方】 頂旧陳皮一錢，半夏四錢，白矾三分五厘，川貝二錢，薄荷二分。

【制 法】 將上列藥共研成細末，每服一錢至二錢，開水沖服。

【适应症】 咳嗽痰多，此散不寒不燥能立奏奇效。

治年久咳嗽不止方 叶 良

【处 方】 北杏二錢，人參二錢，阿膠一錢，桑白皮三錢，知母錢半，烏梅八只，罌粟壳二錢，甘草錢半，大棗四只。

治氣喘咳嗽丸方 汕頭 蔡仰高

【处 方】 高麗參一兩，防黨二兩，淮山二兩，蘇歸二兩，炙芪兩半，干姜兩半，麻黃(去節)兩半，化橘紅兩半，蘇子一兩，僵蚕八錢，驢夏七錢，川貝一兩，冬花一兩，川朴(姜制)一兩，石硫黃一兩，炙草一兩，白芍一兩，瓜蒌仁一兩，皂角七錢，細辛五錢，五味三錢，正虎乳三錢，琥珀三錢，牛黃一錢，肉桂六錢，沉香三錢

(上五味另和研)，紫河車一具，大棗廿枚。

【制 法】 上藥除正虎乳等五味另研外，其餘藥物均用米酒濕透，隔宿蒸熟，搗爛，晒干，研極細細末蜜丸如綠豆大。

【服 法】 每日早晚飯後各服丸一次，每次用丸卅粒，開水送下。未成年者減半，五歲以下者每次服十丸，一歲者每次服四丸。

【適應症】 哮喘咳嗽，氣喘，痰多，倚息，支氣管炎等症服之均甚效。

【用 量】 廿歲以上者可服至十兩，即能不發。

十二、哮喘

治哮喘方

石牌華僑醫務所 張進金

【處 方】 白果廿粒，麻黃二分，款冬三錢，蘇子三錢，杏仁二錢，法夏一錢五分，桔梗一錢五分，甘草八分。

【用 法】 用水三碗煎成一碗溫服，服二至三劑即停止，隨服下方即可痊愈。

又 方

【處 方】 熟地三錢，杞子二錢，黃芪四錢，黨參六錢，大棗十枚，羊肉一斤。

【服 法】 將藥和羊肉共同用水熬，熬至肉爛為度，飲湯并吃羊肉，每星期服二次，連吃一個月。

治哮喘方

封开 何仲平

【处 方】 紫苑三錢，北杏三錢，明党三錢，川貝二錢，
荆芥錢半，麻黃三錢，冬花三錢，百部三錢，甘草一
錢，法夏四錢，銀杏十枚(煨熟)，皂莢五分，生姜三片。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 气喘不得臥。

【附 記】 麻黃宜去節，先煎去沫。

治哮喘方

【处 方】 白果廿一枚(炒香去壳)，麻黃三錢，法夏三
錢，款冬花三錢，桑白三錢，苏子三錢，北杏三錢，黃
芩三錢，甘草一錢，生姜三片。

【服 法】 清水煎服。

治哮喘方

王鑒堂

【处 方】 淡豆豉五兩，制海石五錢，熟白朮五錢，枯礬
一兩半，加工粉一兩八錢七分，正朱砂六錢。

【制 法】 共研成細末，水和為丸，朱砂為衣，如綠豆
大，裝樽勿泄氣，勿使受潮濕。

【适应症】 男婦老少，新老諸般哮喘。

【服 法】 每次大人四五粒，小兒二三粒，用清茶或開水
送下。能在發作前半小時服最佳。

【禁 忌】 孕婦勿服，戒公鷄、鯉魚、龍眼、荔枝，及生
痰滯氣等物。

治哮喘方 順德大良 董少宸

【处 方】 龍涎香一錢，而參三錢，牛黃一錢，麝香二分，僵蚕三錢，鬧洋花一錢，鍾乳石一錢，防党四錢，細辛一錢五分，鹿茸二錢，归身三錢，茯神一兩，牛膝五錢，熟地一兩，款冬四錢。

【制 法】 共研成細末，米糊为丸，每粒五分。

【适应症】 体虛无热的哮喘。

【服 法】 每服一丸，开水送下，連服数天。

治哮喘方（吸入法）

順德大良 董立三

【处 方】 法夏五錢，川貝五錢，鬧洋花四兩（以二兩切絲），薄荷叶二錢切成絲，毛射香（生草薈）五錢，老生姜一斤。

【制 法】 將法夏、川貝二味研成細末，用老姜取汁和勻，燉兩点鐘，再用鬧洋花二兩，毛射香五錢煎水，与各药和勻，晒極干，每次五厘至一分和生切熟烟混合，卷作紙烟或用旱烟筒吸入，哮喘立止。

【适应症】 新旧哮喘。由小量用起，注意过量中毒。

治哮喘实验丸方 广州 朱國英

【处 方】 龍涎香四分，正砂仁三分，竹黄精六分，橘紅皮四分，制南星七分，旧陈皮二分，上川朴五分，炒苏子三分，正牛黃六分，七制信石三分，正珍珠一錢，煨

蒙石五分，胆矾七分，正秋石五分。

【制 法】 信石用水豆腐制七次，將上藥研末，用淡豆豉二錢半煎水搗爛，加面粉二錢一分和藥粉為小丸。

【用 法】 成年人每次服七厘，晨早清茶送下，小兒減半，輕症漸減至痊愈。

皂莢散

廣州 胡倍功

【處 方】 皂莢二兩。

【用 法】 研成細末，每次一錢，每日一次，開水送服。

【適應症】 哮喘。（服后必劇吐）

治哮喘方

高要莫章 黎鑣源

【處 方】 金雞納霜一分，陳皮一分，春砂仁（去壳）二錢，蘇子二錢，龍涎香三分，毛桔紅四分，川朴四分，正秋石五分，煅礞石五分，竹黃六分，正牛黃六分，胆星七分，珍珠末一錢，胆矾七分，制信石三分。

【用 法】 共研成細末，另用淡豆豉三錢搗爛，煎水一盅，和面粉二錢，打和為丸，每丸重二厘。服够一足劑量，即可痊愈。

【服 法】 頭一個月，每天服七丸；第二三月，每天早晚各服七丸；第四個月，每天仍服七丸，用六安茶或清遠茶送下，白開水亦可。

【附 注】 處方內信石一味，毒性極大，一定要依法炮制后可用。制信石方法：把信石用布包好，取豆腐及甘草搗爛，同放在大瓦罐內，加滿清水，連煮兩晝夜，取出

信石，陰干研末，合藥使用。

治哮喘特效方 封开 何仲平

【处 方】 紫菀三錢，北杏三錢，明党三錢，川貝二錢，
荊芥錢半，麻黃三錢，冬花三錢，百部三錢，甘草一錢，
法夏四錢，銀杏十枚，皂仁五分，生姜三片，水煎服。

治哮喘方 苏善卿

【处 方】 猫腸全副，用男童便浸四十九天，撈起晒干，
燉过，又青骨鳥（撥）一双，加法半夏三錢，北杏仁三
錢，玄胡三錢。

【用 法】 共研成細末，每服二錢，开白粥食之。

哮喘又方 潮安 陈德發

【处 方】 川貝母一兩，海蠔蛸一兩，田蛙一大只。

【制 服 法】 將田蛙去腹腔內腸雜清水洗淨待用，將川貝，
海蠔蛸裝入田蛙腹中，用綫縫合，用蜡紙包裹，外涂田
泥，厚六分，以手鑒为長方形，瓦上燉至田泥白色为度，
去泥，將田蛙連藥研成細末，每天服三次，飯后各服二錢。

【适应症】 如上述哮喘症狀，須于發作后長期服用。

治哮喘方 清遠 馮伯高

【处 方】 鷄蛋廿只。

【用 法】 用童便，生鹽三兩，和禾秆灰（糯秆更好）和
勻醃鷄蛋，四天后可吃，每天吃一只。

治輕重支氣管炎哮喘（吸入）方

澄海 高哲睿

【處方】 開陽花二錢，麻黃一錢，沉香四分，牙硝少許。

【用法】 共研成細末，每于發病時，用藥粉每次五厘燃烟，吸入肺部，即能定喘。

【禁忌】 熱症忌用。

治痰喘效方

陽春 何夢蓮

【處方】 用豆腐一斤，當中挖一窩，內裝紅白糖各二兩，放碗內，連碗放鍋內添水煮一炷香之久，一次吃完，連吃三四次。

治哮喘病藥膏方 潮安 謝平山

【處方】 防黨八錢，茯苓八錢，白朮六錢，炙甘草三錢，陳皮四錢，半夏五錢，蘇子三錢，薏苡一兩，胡桃肉六錢，甜杏仁五錢，桂枝一錢五分，白果二十粒，款冬花五錢，麻黃二錢，沉香二錢五分，棗仁五錢，五味一錢五分。

【制法】 上藥研成細末，用雪蜜十二兩，飴糖六兩，豬油一兩混和藥末熬成膏，再加入姜汁一兩五錢和勻即成，每天服三次，每次服一枚（如棗大），開水送下。

【禁忌】 戒食生冷及刺激性食物。

【護理】 睡眠時頸背部要保持溫暖。

【適應症】 哮喘病（支氣管喘息），（并治慢性氣管炎），一般多在夜間發作，呼吸困難，喘鳴或咳嗽，顏面蒼

白，胸部有壓迫感，不能平臥，（至慢性氣管炎）緩和的只有經常咳嗽，臨床沒有顯著症狀，重型的咳嗽劇烈，常在上呼吸道感染，在冬季多會發作，無發熱及血象變化，听診呼吸音強銳，呈水泡音或笛音。

針灸治哮喘方 清遠 鄧汝湘

【處方】 針天突，氣海，丰隆等穴。

十三、肺 癰

治肺膿瘍方 順德大良 董立三

【處方】 銀花二錢，浙貝四錢，生苡仁五錢，白及一錢半，亭力子三錢，桔梗三錢，陳皮八分，甘草節二錢。

【服法】 用水煎一次頓服。

【適應症】 肺膿瘍，咳嗽吐濃痰，發熱，胸痛。

又方 封開 梁斗南

【處方】 葶莖三錢，苡米五錢，桃仁二錢，瓜瓣八分，甘草一錢，桔梗錢半。

【用法】 水煎服，二劑可愈，后用苡米煮粥食，服至痊癒。

【適應症】 肺膿瘍，口臭，痰似膿，脈滑大。

又方 開建 梁尙俊

【處方】 牛子二錢，連翹二錢，元參三錢，川貝二錢，

銀花二錢，桑葚二錢，花粉二錢，知母二錢，桑皮三錢，薏仁三錢，前胡二錢，苡米三錢，桔梗二錢。

【用法】 水煎一次服。

【适应症】 肺癰肺痿初期，咳血痰黑色，气喘，肌肉消瘦。

【禁忌】 孕婦勿用。

又方

廣州 趙思競

【处方】 久年蒜頭醋，隨量啜服。

十四、瘧疾

良性瘧（間日瘧或三日瘧）方

封开 梁澤民

【处方】 柴胡二錢，黃芩二錢，法夏二錢，知母三錢，川朴一錢，檳榔二錢，青皮一錢，桃仁三錢，川紅花錢半。

【加減法】 頭痛甚加藁本、蘇叶各三錢；骨節疼痛加威靈仙三錢，蒼朮二錢；口渴去法夏加花粉三錢；口干唇舌均紅去檳榔、川朴、法夏，加赤芍二錢，茅根一兩，柴胡減至一錢，青皮八分；舌有厚苔加川連一錢，查炭二錢；大渴汗出，熱時胸滿難堪，去檳榔、川朴、青皮、法夏，加石膏、茅根、竹叶、連翹。夜熱不甚，時間無定，一日二三度發，加桂枝赤芍。上述症狀而夜熱甚的加當歸；痰多加川貝；無汗而骨節疼痛气喘或咳嗽的，加麻黃北杏；三數日大便不通，苔黃厚的，加大黃枳實。

【适应症】 寒熱兩型并具，有汗或無汗，發作有時，每日

間日或三日發作一次者。

【說明】 梁乃津中醫師云：理血，調整熱型，健胃，殺滅瘧原蟲，為中法治瘧的四大用藥原則。……一般良性瘧，可以本方為主，根據加減法去取，甚有效。但殺滅瘧原蟲的力量，本方實嫌不足，能于用藥的同日，給予西藥，對於良性瘧的任何一種治程，則效果十分穩當。如无西藥，可用常山四五錢。但常山有催吐作用，須用酒洗，再加入紅棗三四枚去核，收效也很好。如只用常山一味，很難有效。

【禁忌】 孕婦忌用桃仁，紅花。

又 方

封開 梁澤民

【處方】 石膏一兩，知母五錢，柴胡（寒多者多用，寒微者少用，無寒者不用），竹葉四錢，茅根一錢，黃芩三錢，花粉四錢，連翹四錢，桃仁三錢，川紅花二錢，威靈仙錢半，牛膝四錢。

【加減法】 夜發而唇紅齒燥者，去柴胡加生地元參赤芍；苔厚膩者，加川貝竹茹；胸滿吐甚，加玉樞丹；小便不利加滑石木通。

【適應症】 寒微熱甚，或但熱不寒，口渴汗出或不汗出，胸滿煩燥，骨節疼痛時嘔者。

【說明】 梁乃津中醫師云：本方所治較第一方為重，更應并用西藥。如无西藥，應入常山、紅棗。有西瓜時，口渴多吃西瓜，无西瓜以茅根馬蹄（連皮）西瓜皮煎水代茶。本型病症，單用西藥三四天方效，單用中藥要五

天，中西合用一两天可效。本型再發机会較上方为少。

又 方

封开 梁澤民

【处 方】 升麻一錢，柴胡二錢，首烏四錢，当归三錢，黃芩四錢，炒党参三錢，別甲五錢，白朮二錢，陈皮二錢，黑棗四枚，生姜二錢。

【加減法】 嘔加半夏、云苓；骨節疼痛加桂枝、灵仙；头痛甚加白芷、藁本；大便不通加菴蓉、麻仁、川朴。

【适应症】 虛人貧血患瘧者。

【說 明】 梁乃津中医师云：营养不良和体虛胃弱者，一旦患瘧，貧血立見，此时只用抗瘧药多不見效，有时只見抗瘧药的副作用，很易变成慢性瘧，作者于此类症狀，用本方已收效数十次。有些病者服药后三四小时，一切症狀立即好轉，作者近來常用百乐君，繼續与本方再服一星期左右，再發率大減。本型病症不能用奎宁。

又 方

封开 梁澤民

【处 方】 柴胡三錢，桂枝二錢，干姜一錢，花粉三錢，黃芩二錢，牡蠣六錢，炒党参三錢，酒炒常山五錢，別甲五錢，生姜二錢，大棗四枚。

【加減法】 不渴而嘔，去花粉加半夏、吳萸、云苓；身体瘦弱，时出盜汗，去花粉加黃芪、当归、浮小麥；夜甚的加当归。本型可用阿的平为主药的一个治程。

【适应症】 寒多热少，头眩汗出，胸脅苦悶，心悸不安而口渴者。

又 方

封开 梁澤民

【处 方】 桂枝二錢，赤芍二錢，柴胡錢半，当归三錢，

青蒿二錢，別甲四錢，青皮錢半，川紅花錢半（酒洗）。

【加減法】 渴加花粉茅根，枝桂減半，紅花不用酒炒；嘔

加生姜半夏。本型可用百乐君为主药的一个治程。

【适应症】 夜瘧微寒微熱，或但熱不寒但寒不熱者。

又 方

封开 梁澤民

【处 方】 干姜錢半，附片三錢，厚朴二錢，蒼朮二錢，

常山三錢（酒炒），当归三錢，草果二枚，白薏仁錢

半，紅棗四枚（去核）。

【加減法】 嘔甚加川椒吳萸半夏；汗多加龍骨牡蠣。本方

并用西药时最好先服本方一日，第二日起然后服阿的平

或百乐君，不可用奎宁。

【适应症】 寒熱甚微，或寒甚熱微，唇舌淡白，脉微細而

弱，古說所謂“虛寒特甚者”。

惡性瘧

封开 梁澤民

【处 方】 連翹五錢，茅根一兩，石膏一兩，知母四錢，

桃仁四錢（打），川紅花二錢，赤芍四錢，山甲五錢，

地龍四錢，元參六錢，麝香一分，玉樞丹三錢，全虫二

錢。

【加減法】 微寒者加柴胡少許，舌无苔者加生地石斛，骨

節疼痛者加少量归尾，大便不通加大黃。

【适应症】 热型不清，高热昏迷，头痛如劈，口渴干嘔，胸滿痞脹，脉弦數大，舌質略紅，舌面如堆粉末者。

【說明】 梁乃津中醫師云：作者于抗战期間，西藥絕時，粵北惡瘧流行極烈，曾以本方治療過很多患者，多數有效。但如有奎寧，則應用奎寧為佳，注射奎寧兼用本方，收效很快。營養不良者，淮山、莢肉、枝子、生地、元參、知母、石斛煎水代茶，口渴者，有西瓜時最好多吃西瓜。治療用理血劑，作者多年來經驗很有效，寒性用當歸，熱性用桃紅。……這類瘧疾，如用白虎柴胡之類，不但無效，而且病更加重。本型又可兼用玉樞丹。……又中藥對於瘧疾的常用方，如金匱的鱉甲煎丸，張景岳的何人飲，局方常山飲，和倪涵初治瘧第一二諸方，都有一定的作用。請讀者們自己參考。

瘧疾方

封開 莫兆丰

【處方】 鱉甲三錢，山甲珠一錢，木賊二錢，桂枝尖錢半，鹿角霜三錢，防黨二錢半，首烏三錢，生姜三片，歸身二錢（土炒），紅棗二只。

【用法】 水煎服，連服二三劑。

【說明】 該方久瘧適用，初起熱瘧不宜。

瘧疾昏厥救急法

該方是封開縣二區梁澤民從蕭俊逸治傷寒（腸熱病）另吞六神丸，紫雪丹的方法，活用借治瘧昏厥，經

試驗有效。

【處方】 雷允上六神丸十粒，橘花仙館紫雪丹一瓶（小兒酌減）。

【用法】 先將六神丸搗爛，然後和勻紫雪丹，用白開水放溫沖灌（不可用剛開的水沖下），灌完紫雪丹之後，須繼續進白開水二三次。

【說明】 若服完紫雪丹六神丸二小時仍未蘇醒者，可繼續進雷少逸的實竅導痰湯——竺黃二錢，遠志一錢，石菖五分，杏仁三錢，薏仁三錢，僵蚕三錢，皂角炭五分，水煎服。若腦症狀顯著者，可加犀角，川連，胆草，紅花，丹皮，赤芍等。神經性症狀顯著者，加羚羊角，勾藤，全蝎，菊花，天麻等。

【禁忌】 孕婦忌用。

瘧疾加減柴胡青蒿飲方

丰順 許振剛

【處方】 北柴胡三錢，浙青蒿二錢，條黃芩二錢，肥知母三錢，常山根二錢半（酒炒），川秦艽二錢，大烏梅二枚。

【服法】 水二碗煎至六分，空腹服，小兒減半，老人酌減，孕婦忌。

【加減法】 若嘔不止者，加姜半夏三錢；寒長而熱微者，去知母，加桂枝七分至一錢；若熱多微寒或無寒兼多汗而頭痛者，加生石膏八錢（碎）；至若高热不退，頭劇痛，漸進昏迷者，生石膏加至兩半至二兩，打碎先煎，原方加桃仁三錢，川紅花二錢，胆草一錢，用水三大碗

煎存一碗，頻頻灌服，至人事清醒，熱較退時，將原方減輕分量，繼續再服九劑。若慢性瘧（久瘧）或三日瘧，脾臟腫大，寒熱均不顯著者，去知母黃芩川芎，加鱉甲（酒醋炙）八錢，黨參五錢，首烏四錢，水三碗煎七分，連服七至十劑，脾腫一定消細，瘧也痊愈。

【適應症】 良性瘧、間日瘧、三日瘧、惡性瘧、慢性瘧。

【附 注】 患者原不嘔者，服此方不嘔，藥性和平，無副作用，如孕婦患惡瘧，可不用桃仁、紅花，加羚羊三分（另燉）。

治瘧疾經驗良方 云浮 區功蓋

【處 方】 柴胡錢半，枳殼五分，白芷五分，防風八分，粉甘草五分，山查肉五分，廣陳皮八分，青皮八分，法半夏一錢，前胡八分，生姜三片。

【用 法】 水煎，在發作前一點半鐘服之。

【附 注】 本方分量雖少，而收效甚大，經驗多人。

治發冷病方 云浮 樊榮華

【處 方】 常山一兩，生姜五錢，水煎服之。小童酌減用。

治瘧疾方 云浮 歐國英

【處 方】 柴胡二錢，黃芩二錢，厚朴七分，甘草七分，草果五分，常山錢半，青皮五分，青蒿一錢，生姜一片，水煎服。

治瘧疾方

云浮 林業初

【处 方】 川杜仲一兩，煎服即愈。如單寒无熱者，用鱉甲飲加杜仲地榆煎水服之。

治瘧疾方

云浮 趙裕才

【处 方】 常山二錢，尖檳三錢，烏梅二只，柴胡三錢。

【加減法】 如熱少寒多，加草果仁錢半；寒少熱多，加知母三錢；口渴加花粉四錢；嘔吐加法夏三錢，生姜一錢。

【用 法】 水煎服，服時宜在瘧發前兩小時飲葯，法當一劑瘧止。如仍未解時，加針刺大椎合谷二穴必效。

瘧疾驗方

廣州 李陳濟

【处 方】 常山三錢，川芎二錢，白朮二錢，草果七分，紅棗七只，甘草七分。

【用 法】 水三碗煎至一碗，沖酒服。另外用白芥子末五分，白胡椒粉五分，和酒攪，在發冷前一時將葯貼腕上脈門緊縛之，男左女右，約三十分鐘，覺痛，即解去。重症每日再貼一次。

瘧疾方

廣州 陳培淦

【处 方】 蜘蛛壳（即蜘蛛蛻出之壳）。

【用 法】 將壳搓碎，以黑棗或桂圓肉裹之，于瘧發前三小時服食，并頻啜熱粥。

【适应症】 間日瘧，或每日瘧。

治瘧疾方

清遠 陳瑞初

【處方】 常山一兩，天麻一錢二分，升麻八分。

【服法】 將藥研成粉末，每次服一錢半，開水沖服。或將藥煎服，于發作前二小時服之。

治瘧疾方

清遠 郭鳴榮

【處方】 無名異（又名吹干子）。

【服法】 研成細末，預于發作前兩小時滾水送服一錢。

治瘧疾方

清遠 黃 峰

【處方】 常山一兩，良姜一兩，尖檳五錢。

【服法】 研細末，米糊為小丸，每次服三錢于發作前兩小時服之。

治瘧疾方

清遠 賴植生

【處方】 用秤荷果樹一兩，切碎，米二兩拌炒至黃色，預于發作前兩小時煎水飲之。

治疫瘧效方

【處方】 川厚朮一錢，制半夏一錢五分，檳榔錢半，草果（煨）八分，酒炒黃芩錢半，甘草五分，藿香一錢，加生姜三片為引。

【用法】 清水煎服。

【適應症】 此方系雷少逸時病論之宣透膜原法，又師吳又

可达原飲之法，方中去知母之苦寒及白芍之酸澀，仍用朴、檳、草果，達其膜原，驅其盤踞之邪，黃芩清燥熱之余，甘草為和中之用，擬加藿香暢氣調脾，生姜破陰化濕、濕穢乘入膜原而作瘡者，此法必奏效。

又 方

清遠 賴植生

【處方】 川厚朴錢半，檳榔錢半，草果一錢，黃芩四錢，甘草錢半，藿香二錢，制半夏錢半，去心麥冬三錢，天花粉三錢。

【用法】 用清水煎服。

【適應症】 脈右勝于左，瘧間日發，寒少熱多，自汗、欲吐、腹痛、身體疼、舌苔黃膩、口渴、小便黃、系感濕熱患疫瘡所致，擬宣透膜原法加味。

又 方

清遠 賴植生

【處方】 當歸頭五錢，黃芪三錢，生地三錢，熟地三錢，黃連一錢，黃芩錢半，黃柏錢半，甘草錢半，浮小麥五錢，泡光參五分。

【服法】 清水煎服。

【適應症】 脈右浮數而虛、左細小、系邪熱未清而陰血陽氣空虛。

治長寒瘧疾方

廣州 黃春田

【處方】 大葉雙龍葉五分(研末)，尖檳六分(研末)。

【用法】 藥末和酒沖服。

【适应症】 長寒瘧疾。

【說明】 据献方者謂：“此方系傳自蜀北老中医謝植溪先生，患者服食，确有效果，并說服食后，全身滾热，起一种反抗作用。能制止寒战。”

治單寒牝瘧（外治）方

云浮 黃進旒

【处方】 川足（去头足）一条，研末，用膏药一只，以川足末作药心放膏药内，貼項后处。

治瘧疾驗（外治）方

广州 李珍華

【处方】 生姜（适量）。

【制法】 將姜用火煨至热，置石臼和以白樹油碎爛之。

【用法】 用白布五条，每条包碎爛的姜，分包于左右手脉門及左右足指上，其另一包包在头額上，待睡至汗出，醒來即除。

針灸治瘧疾方 清远 潘恩普

【处方】 針大椎，合谷后溪，風池，風府。

十五、脚 气

治療脚气驗方 順德 李庭芬

【处方】 眉豆四兩，生姜五錢，通草二錢，紅棗八个，

蒜头二个，青皮两个。

【制 法】 用清水同煎，煎至眉豆开花，連水帶渣服食。

【适应症】 治一般性脚气，广泛地取得治療效果。

治湿脚气方 潮安 王邦安

【处 方】 麝香一分，沉香二錢，木香一錢五分，蒼朮一錢，薏苡三錢，僵蚕二錢，姜半夏一錢五分，桂枝一錢五分，紅花一錢，甘草一錢，川木瓜一錢五分。

【服 法】 上药共研成細末，每天服三次，每飯时用散二錢与飯調勻，另用糯米、綠豆、蒜头共煮熟作飯，或粳米、花生仁煮食。

【适应症】 治下肢水腫，属于維他命乙二缺乏引起者。

脚气症驗方 广州 趙思競

【处 方】 水魚一只約斤余，勿放血，原身放入水鍋內燒至將开，俟其死，剝去青黑衣膜，复用开水煮透，然后剖开去腸臟，勿接触冷水，斬开五件，放瓦罐內，加綠豆八錢，土苡仁一兩半，和后续药汁隔水燉四小时，用咸檸檬汁点食，并趁热飲汁。

山菩提(鮮用)二兩(勿錯用老鼠担冬瓜)，鮮崩大碗七錢，金釵斛錢半，川木瓜錢半，陈皮錢半，淮牛七一錢，水三碗煎取碗半，作燉水魚用。

治脚气病方 东莞 郭潤枚

【处 方】 白芷末二錢，苡米末二錢，地胆头一兩，白醋

四兩。

【服 法】 先將地胆头用三碗水煎至小半碗，然後將醋及藥末和食，每隔兩天服一次，重者可多服一至二劑。幼童在十至十四歲每次服二分之一，五歲至九歲每次服三分之一。

【禁 忌】 燒鵝及燒鴨等。

十六、癱 痺

治中風類偏枯症方

高要 莫家濟

【處 方】 靈龜兩只，土茯苓十兩，虎骨十兩，桑枝十兩。先將龜放在瓦盅內用火炙，刮去衣不用，破開肚，全只連上開三味藥放于大罌內加水熬兩日夜，去渣取汁，將汁貯起。後另用姜活四錢，獨活四錢，川牛膝六錢，桂枝四錢，防風六錢，天麻四錢，水煎至一碗去渣，共上四味藥汁燉熱，分二次服。

【適應症】 偏枯或左或右不遂等症。

治顏面神經麻痺方

潮安 陳樹剛

【處 方】 (內服) 天麻六錢，雙勾藤六錢，金蟬肚廿只，全蝎去頭足八個，僵蚕六錢，朱砂三錢。

(外用) 蓖麻子去壳七十粒、麝香五厘共捶爛成膏，作一次攤于玻璃紙上，粘貼健側(即麻痺喎斜在左貼在右

方，患在右者貼在左方）。

【用法】 上（內服）藥共研成極細末，每天飯后各服一錢五分，開水沖服。

【適應症】 本病主征通常是一側性面部癱瘓、患側面肌弛緩、無表情、額部不出皺紋、眼瞼開大（兔眼）、鼻唇溝消失、口角下降、麻痺顯著時口裂被牽至健側、咀嚼、談話、唾吐、漱口都障礙，味覺缺損、反射運動不存在。

又 方

潮安 李仰衡

【處方】 巴豆去壳三十六粒，蓖麻子三十六粒，麝香三厘。

【外用法】 將巴豆和蓖麻子加高粱酒捶爛后摻入麝香。

如口眼歪在左，將藥膏貼于右手寸口脈上，歪在右則貼在左手寸口脈上。貼藥時間以二十四小時為度，至面部有灼熱感則去藥，如熱太高，應提前一小時去藥。

治風濕骨痛、癱瘓效方

韶關 卓錫璇

【處方】 劈拍子根（又名老鼠屎，鉄包金），適量。

【用法】 將藥同豬脚或鷄鴨脚煮食。

【適應症】 遠年風濕骨痛，手足癱瘓等症。

桂枝茯苓丸

廣州 梁朝宗

【處方】 桂枝尖一兩二錢，桃仁泥八錢，赤芍八錢，丹皮八錢，云苓二兩四錢。

【用法】 共研極細末，米糊為小丸，每服三錢，飯前用開水沖服。

【適應症】 麻痺。一身之中，有一處覺得麻痺狀或骨節疼痛者。

驅風逐濕湯 廣州 崔顯時

【處方】 獨活一錢半，牛膝五錢，桑寄生五錢，當歸三錢，生地五錢，火麻仁（打）六錢，續斷三錢，木瓜四錢。

【用法】 水三碗煎至八分，每日一劑，溫服。

【適應症】 一切風濕痺，手足攣痛，麻痺不仁，腰痛背強，筋僕骨弱，而無實邪者。

十七、水腫（包括臃脹，并附血吸虫晚期效方）

水腫氣腫方 封開 八耀榮

【處方】 生軍四錢，青皮四錢，牽牛三錢，亭力四錢，甘遂三錢，大戟三錢，芫花三錢，商陸三錢，枳殼三錢，連翹三錢，木香五錢，蛤粉三錢，陳皮五錢，桑白三錢，椒目三錢，肉桂五分，用七醋三兩同炒，晒干研成細末，面粉為丸綠豆大，每服廿丸，每日空心服一至二次，用陳皮湯送下。先服陳皮湯消上部，繼服桑白湯消中部，再服姜皮湯消下部。兼要攻補行氣，宜煎服——白朮、茯苓、澤瀉、北芪、木香、蘇葉、牽牛（醋炒）、亭力等藥。

水腫或腹水症方 封开 符汝英

【处 方】 鯉魚一條（大人八兩一條，小兒用四兩一條左右），將魚在腹部剖開一寸許闊，取出腸臟，抹干腹內血液，用生鹽二斤，炒至黑色，將鹽敷密鯉魚，蓋回鑊蓋，候一小時即熟，一次食盡，連服三四天，可消。

【附 注】 本方适宜于營養不良性水腫，若是腎炎水腫則忌鹽，注意勿用為要。

又 方 封开 苏次平

【处 方】 萊菔子三錢，淮山三錢，神麴五錢，枳壳二錢，車前子二錢，肉桂一分，土炒白朮、白茯苓、生苡仁各一兩，甘草三分，水煎，分三次溫服。

【适应症】 水濕腫脹日久，胃口不開者。

治实症腹水方 潮安 陈映山

【处 方】 商陸三錢，甘遂四錢，大戟三錢，黑丑四錢，白丑四錢，法夏四錢。

【用 法】 上藥研成細末，每日服二次，每次一錢五分，開水沖服。

【适应症】 各種原因引起腹水、腹部膨脹有壓重感、臍窩消失、腹壁靜脈怒張、打診濁音。因橫膈膜被推向上、常有心悸亢進、呼吸困難、一般小便不利。本方治實症而脈有力者，若體弱而脈微細者不適用。

水腫方

廣州 陳振煦

【處方】 黃皮果叶數斤，燒灰。

【用法】 將灰浸水內攪勻，用布濾過，將水煮飯食二三次，利水消腫甚速。

【附注】 忌食糯米、面、鹽五星期。

治水腫方

清遠 黃 峰

【處方】 大戟一錢，芫花一錢，甘遂一錢（三味俱醋炒）。

【服法】 共研成細末，一錢藥末入土狗仔一只（炙為末），第一次用陳皮煎湯送下；第二次用桑白煎湯送下；第三次用葱白煎湯送下。

治水腫方

陽春 何夢蓮

【處方】 生金櫻子樹根（去粗皮）切碎秤一兩五錢，鹿含草三錢，小香菌（極小團結者）七枚，以上三味，用水二碗半煎至半碗，復被靜臥，趁溫時服下，少頃小便即通，而腫亦隨消。

【附注】 此症全身浮腫，小便不通，甚者兩足青紫，透明，疼痛異常，不能步履，諸藥不效，急宜用本方。

治水腫方

廣州 許瑞琪

【處方】 黑丑、白丑、芫花、甘遂、芒硝、牙皂、檳榔、甘草各二錢。

【服法】 把藥放入蕎麥面內，包成角二三個，用炭火焙

熟，去皮，研成細末（不用鉄器）蜜为十二丸，分早晚服，每次服兩丸，开水送下。

【禁忌】 由服藥之日起，戒食鹽一百零一天。

治腎病水腫

【处方】 防党三兩，白朮三兩，茯苓五兩，炙草五錢，陈皮一兩，法夏一兩，蒼朮二兩，北芪三兩，熟附一兩，土肉桂一兩，姜皮一兩，川椒一兩，吳萸五錢，白薏仁五錢，川厚朴五錢，腹皮五錢，丁香五錢，炒薏米三兩，防己二兩，香加皮一兩，防風五錢。

【制法】 以上共二十一味，合研成細末。

【服法】 成年人每服三錢，每日服二次，早晚用米湯送服，十歲左右減半，更小的酌減用，又輕症可減服。

【适应症】 治一般水腫病、虛弱、倦怠、胃消化不良或飽脹、小便短少次數多，脉搏沉迟、細、弱、无力者，均可服用，有兴奋強心、健胃消食、利水消腫之功。

小儿虛寒水腫方 丰順 周治清

【处方】 甘遂五分，芫花一錢，赤茯苓半，白朮七分，油桂三分，油朴八分，澤瀉七分，枳壳七分，小茴三分，茵陈一錢。

【用法】 水一碗煎至三分服。

【附注】 以上是六歲小儿藥量，成人增加分量，或用面煮糊丸服之則瀉，煎剂不瀉。

治肺水腫方（心臟性水腫也有效）

【處方】 肉桂心四分，茯苓五錢，熟地五錢，柏子仁三錢，北芪四錢，熟棗仁五錢，山萸肉四錢，遠志一錢五分，白朮三錢，川加皮六錢，熟附子三錢。

【服法】 清水煎服。

【適應症】 心臟衰弱、全身水腫、心跳、氣喘。

治急性腎炎方 廣州 譚石生

【處方】 麻黃、北杏、苡仁、生甘草、赤小豆、陳葫蘆、瓜壳、桑皮各適量。

【用法】 水煎服，數劑可愈。

【適應症】 急性腎炎、眼面浮腫、發高熱、尿少、血尿。

治慢性腎炎方 廣州 譚石生

【處方】 白朮八錢，附子八錢，茯苓一兩半，白芍六錢，干姜三錢，麻黃一錢半，紅棗三枚。

【服法】 水煎服。

【適應症】 下肢浮腫、面目亦腫、心悸、小便短少、舌白潤、脈遲弱心有雜音。

【附注】 上方是一主方，仍當隨症狀的變化而加減靈活運用。

治慢性腎炎方 臨高 陳其中

【處方】 老熟地五錢，丹皮二錢，車前一錢，萸肉三

錢，澤瀉二錢，萊菔子二錢，淮山三錢，磁石二錢，黑牽牛錢半，牛膝二錢，灯草為引。

【服法】 水煎服，連服十劑。

【適應症】 慢性腎炎。

治五種臌脹症方 廣州 趙思競

【處方】 甘遂(醋炒)二錢，大戟二錢，元胡二錢，木香二錢，羌花二錢，醋炒亭力二錢，醋炒川貝錢半，田七錢半，共研末，輕症每次五分，中症七分，重症多至一錢。一日早午晚各服一次，開水送服。

治臌脹收功方 廣州 趙思競

【處方】 小皂角五錢，干姜五錢，白朮五錢。

【用法】 將藥煲茶飲之。凡遇此症，將上方藥末服之，以大便尿好為証，然后用本方三味煎服，自然收功。服藥之時忌用鹽醬，魚腥。凡人體虛弱，倘以前食藥過多，須用清化肉桂煮水沖藥粉食，以佐元氣。

臌脹十九方 廣州 趙思競

(一) 第一日，回渣。小便必長，忌葷一日。

【處方】 白朮一錢半(土炒)，茯苓二錢半(去皮)，赤茯苓錢半(去皮)，陳皮錢半，半夏(姜汁炒)、木通(酒炒晒干)、蘇叶各一錢，生姜一大片，大棗肉三枚。

【編者注】 回渣，即留藥渣再煎一次，亦即每服藥煎兩次合為一服之意。

(二) 第二日早，回渣，以后不忌葷。

【处 方】 白朮錢半(土炒)，茯苓錢半，赤茯苓錢半，陈皮錢半，青皮一錢(醋炒)，春砂一錢(去皮，打)，生姜三片。

(三) 第二日午，回渣。

【处 方】 白朮(土炒)、半夏(姜汁炒)、春砂(去衣醋炒)、草果(去皮)、木通各一錢，黃芩八分(酒炒)，猪苓一錢半(去皮忌鉄)，苏叶八分(炒碎)，磨沉香三分(冲)。

(四) 第二日晚，回渣。

【处 方】 猪苓一錢半(去皮，忌鉄)，磨沉香四分(冲)，川朴(姜汁炒)、烏药、春砂(去衣)、白朮各八分，澤瀉、尖檳、白茯苓、白朮(土炒)、半夏(姜汁炒)、香附(醋炒)、黃芪、麥冬(去心)、瞿麥各一錢。

(五) 第三日早，回渣。

【处 方】 白朮一錢(土炒)，木香錢半(切片)，草果(去皮)、半夏、蒼朮(米泔炒)各一錢，白芷、春砂(去皮打)、厚朴(姜汁炒)、陈皮各八分，黃芪一錢(蜜炙)，丁香三分(切片)，苏叶一分(炒碎)，磨沉香五分(冲)。

(六) 第四日早与三日早服方同，午用下方，回渣。

【处 方】 白朮(土炒)錢半，白茯苓、香附(醋炒)各一錢

二分，澤瀉、厚朴（姜汁炒）、木通、歸身（酒炒）、木瓜各一錢，蒼朮（炒碎）、黃芩（酒炒）、青皮（醋炒）、陳皮各八分。

（七）第四日晚五更，回渣。

【處方】 白朮（土炒）、香附（醋炒）、陳皮各一錢，木通、半夏（姜汁炒）、腹皮（酒洗晒干）、白茯苓、枳殼、木瓜、麥冬（去心）、蒼朮（泔水泡）、檳榔各一錢，磨沉香五分（沖），白芷尾八分（碎），藿香梗八分。

（八）第五晚四更，回渣。

【處方】 白茯苓二錢（去皮），白朮錢半（土炒），陳皮一錢，川朴一分（姜汁炒），木通、香附（醋炒）、砂仁（去衣研）、半夏（姜汁炒）、木瓜、蘇葉（炒碎）、枳殼（姜汁炒）各八分。

（九）第六日早，回渣。

【處方】 半夏錢半（姜汁炒），瞿麥一錢，木瓜一錢，炙芪八分，木香八分（片蜜炙），蒼朮一錢（米泔浸炒），砂仁錢半（去衣），蘇子二分（炒碎）。

（十）第六日午，回渣。

【處方】 白朮（土炒）、豬苓、白茯苓（去皮、忌鐵）各錢半，陳皮、木香、澤瀉各一錢。

（十一）第七日午與六日午方同，晚用下方，回渣。

【處方】 白朮二錢半（土炒），半夏錢半（姜汁炒），

白茯苓錢半（去皮），扁蓄八分，木香八分（片），木瓜、陳皮、木香、瞿麥、枳殼、蘇子（炒碎）、檳榔各一錢。

（十二）第八日晚，回渣。

【處方】 豬苓（忌鉄）、白朮（土炒）各錢半，瞿麥、葶藶（炒打）、木通、陳皮、澤瀉各一錢。

（十三）第九日早，回渣。

【處方】 白朮（土炒）錢半，白茯苓錢半，陳皮一錢，蘇子（炒打）一錢，木香（片）八分。

（十四）第九日午，回渣。

【處方】 白茯苓、香附（醋炒）、木通各錢半，石榴皮、檳榔、蘇子（炒研）、壳春砂、萊菔子（炒研）、陳皮各一錢，磨沉香八分（沖）。

（十五）第九日晚，回渣。

【處方】 白朮（土炒）、豬苓（去皮忌鉄）、茯苓、澤瀉各錢半，陳皮一錢，瞿麥一錢，灯草十條（每長六寸）。

（十六）第十日早，回渣。

【處方】 香附（醋炒）、木香（切片）、川朴（姜汁）、陳皮、蘇子（炒研）、春砂（去皮碎）各一錢，白朮（土炒）、木通、白茯苓各錢半，半夏二錢（姜汁炒），白芷八分。

（十七）第十日午，回渣。

【處方】 白芷、桑白、枳殼、香附（醋炒）、半夏（姜汁炒）、蘇子（炒研）、青皮、檳榔、陳皮各一錢，

木瓜、木通、白朮（土炒）、麥芽各錢半，砂仁八分（去壳研），木香八分（切片），磨沉香八分（冲）。

（十八）緊皮丸

【處方】 人參、生地、赤茯苓、神麴（醋炒）、木通、車前、麥芽（炒）、澤瀉、白茯苓（去皮忌鉄）、青皮（醋炒）、半夏（姜汁炒）各一兩，蒼朮二兩（姜汁炒），陳皮二兩，故紙二兩（鹽水炒），白歸身二兩（酒洗），莪朮八錢（醋炒），正川朴一兩（姜汁炒）。

【用法】 面糊為小丸，早晚每吞三十粒，白開水送下。倘貧不得人參者，可去人參，仍為丸，每用五錢，研調下開的代參膏。

代參膏

【處方】 玉竹二斤，防風二兩，炙芪一斤，杞子十二兩（酒蒸），杞葉六兩（蜜炙），天冬八兩，龍眼肉十二兩，地黃十二兩（濕紙包煨熟，切片酒浸一夜），熬膏，煉蜜十二兩，收貯開緊皮丸。并治九種胃痛，但恐藥力猛，略停數日方可食，孕婦忌。

（十九）開鹽方

【處方】 白朮八分，麝香五厘，研末，入鯽魚二條（去腸臟），生鹽一兩，用紙包固，煨熟，新瓦焙干，研末歇一宿，每早晚服一錢（用開水送）。

治血吸蟲藥方（即治臌脹黃疸）

海康 尹盛初

【處方】 水仙子五錢，百部五錢，蕪荑五錢，使君肉一

兩，春砂四錢，百草霜五錢，皂矾兩半，蒼朮五錢，文蛤五錢，商陸五錢，茵陳兩半，水蛭十條，山竹仔皮四只皮壳，山道年五錢，川朴根七錢，只實一兩，白芍七錢，茯苓一兩，安桂心三錢，蘆會四錢，東洋參一兩，姜黃五錢，腹皮三錢。

【制 法】 共研成細末，用片糖十兩，煎成膠，和藥粉為丸，如梧桐子大，每早晚服三次，每次服二錢，服完此劑可愈七八成，再服用香砂六君子湯八九劑可愈。

【适应症】 治單腹脹症。

又 方

【處 方】 甘遂三錢，澤瀉三錢，大戟五錢，珍珠末二錢，麝香三錢。

【制 法】 共研成細末，入米粉為丸，每天早晨服一錢三分，用以下各藥按次每日取一味煎湯送丸服。

(1) 商陸適量，(2) 木通四錢，(3) 麥冬三錢，(4) 田螺十只，(5) 側魚一條，(6) 灯芯一錢，(7) 枝子五只，服藥後飯量要略為減少一些，服藥後約十至十五分鐘，腹部開始微痛，隨有嘔瀉，如見肩血也不要害怕，如見臍血并來，即應停藥，這是危症，本藥療效達(95%)。晚期症亦可愈，通常二至三周可以治愈。

【注 意】 (1) 治療期間及愈後一百天內，絕對戒鹽。
(2) 生鷄、鯉魚、黃牛肉，永遠戒食。

治气臟方

潘惠芳

【处 方】 細辛四錢，麻黃三錢，白朮四錢，当归三錢，
白芍三錢，北芪四錢，大棗十二枚。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 治气臟。

又方治各种臟脹方

李錫賜

【处 方】 大黃二錢，青皮二錢，黑丑二錢，亭力二錢，
桑白二錢，椒目二錢，陈皮二錢，連翹二錢，大戟二
錢，甘遂二錢，芫花二錢，萊菔子二錢，商陸二錢，肉
桂二錢，枳壳二錢，木香二錢，蛤粉二錢。

【制服法】 以上各葯同頭醋二盅同炒研極細末，每次服量
（未詳），第一服用姜葱湯，五更时空心服，定然得
瀉，午时自止，即消面腫；第二服用开水湯五更时空心
服，能消中部腫处；第三服用陈皮湯服，能消脚下腫处，
輕者三服，重者五服。

又治气臟葯方

李錫賜

【处 方】 烏葯錢半，桔梗一錢，枳壳二錢，檳榔八分，郁
李仁二錢，乙金六分，香附二錢，三棱八分（醋炒），瓜蒌
霜二錢 川朴八分，青皮二錢，土狗七只焙干去头足，
木香五分（后下），沉香末五分（冲）。

【服 法】 淨水煎。

【适应症】 治气臟戒鹽一百日，倘誤食了鹽，用塘蝦搗爛

煮湯食之即解，遲則復發難治，凡食物宜用米醋點白糖調味，切戒無鱗魚、田螺、狗肉等物，切記。

／ 又治酒臌方

李錫賜

【處方】 解葛七錢（如無以干葛代之），服二劑，不好不治。

【服法】 水煎服。

【適應症】 治酒臌。酒臌又名蜘蛛臌，此病酒積所致，腹中常悶。

又治血臌方

李錫賜

【處方】 生地三錢，紅花三錢，生軍三錢，桃仁錢半（去油），烏藥錢半，破布藥二錢，桔梗一錢，枳殼一錢，青皮一錢，甘草錢半，川朴二錢，郁李仁二錢，土狗七只焙干去頭足，沉香末五分，木香末五分。

【用法】 水煎和沖二香末空肚服。

【適應症】 治血臌。此症婦人更多，皆因天癸不調，或產後停滯所致。

又治水臌方

李錫賜

【處方】 海螵蛸二錢浸淡研末，茯苓末一錢，大腹皮二錢，陳皮二錢，郁李仁二錢，甘草二錢，薄荷葉八分，土狗七只焙干去頭足。

【用法】 淨水煎服。

【適應症】 治水臌，手足俱浮腫。如是板臌，按其腹狀如

板，俱无軟处，此为不治之症。

2 又治積臌方

李錫賜

【处 方】 烏梅三个，熟軍二錢，生地二錢，三棱二錢(醋炒)，枳壳一錢，莪朮二錢(醋炒)，青皮一錢，乙金六分，香附一錢，烏朮錢半，川朴八分，薄荷八分，郁李仁二錢，瓜蒌霜二錢，土狗七只焙干去头足，沉香末五分，木香末五分。

【用 法】 淨水煎和二香末服。

【适应症】 治積臌，腹中常疼痛。

又試看各症狀法

【試 法】 方法先用生鹽四兩炒熟，用布包，放落患者臍下，看其鹽色，若何色素。

如系水臌，鹽化水；如系血臌，鹽变紫紅色；如系食臌，鹽变紅色；如系气臌，鹽变紫黑色；如气虛中滿并非臌症，鹽仍本色。

又 方

李錫賜

【处 方】 大蒜头五个，大田螺四个，車前子二錢。

【制 法】 共研末，做餅貼臍下，扎緊一小時，小便自利，如喘促难臥，取土狗七只去头足焙干，用萊菔子一錢煎湯送下。

又 方

李錫賜

【处 方】 大戟二錢，芫花錢半，甘遂錢半，黑丑二錢，

連翹二錢，川椒一錢，巴豆一錢，白朮二錢，萊菔子二錢，
青皮二錢，腹皮二錢，葶藶錢半，川黃錢半，砂仁錢半，
益智子錢半，木香錢半，朱苓二錢，澤瀉一錢，木通錢半。

【用法】 以上共研成細末，用米醋煮面糊為丸，如綠豆
大，每服五錢，用陳皮、葱、酒煎湯送下。如服後肚內
作痛，定痛散解之，方開列于下。

【適應症】 治五般臟總方。

定痛散方

【處方】 元胡三錢，香附三錢，木香一錢，甘草一錢，
乳香錢半，沒藥錢半，巴豆三錢，共研成細末（每次服量
未詳），用陳皮湯送下。

又方

李錫賜

【處方】 海金砂錢半，灶心泥三錢半，黃芩錢半，莢朮
錢半，茅朮三錢，百草霜錢半，苦地膽二錢半，澤瀉錢
半，川烏二錢半，春砂仁三錢，江子肉一錢，正川連二
錢半，大黃錢半，朴硝錢半，三棱錢半。

【制法】 共研成細末，用黑棗肉捶爛為丸如綠豆大，每
次服一錢，開水送下。

【適應症】 治雙腹臟三腫三消法，如系水臟加茵陳一錢，如
系食臟加白朮三錢，如系血臟加山姜子一錢，麝香一錢，
血竭錢半，銅綠錢半，硫磺錢半，半夏錢半，氣臟加沉香
二錢，四肢俱腫加石膏五錢，根據各臟症加藥引煎水送
丸服。

看症發藥，一身不腫，獨一处腫是單肢也，脚腫肚脹眼黃周身浮腫，是双虫也，肚內有消有脹，是气脹也，皮黃眼黃周身浮腫，是黃腫水脹也，四边帶痞，肚有痛，是血脹也。

倘臍肚有紅筋十字过臍，不可医也，又肚臍突高腫流水，为不治之症，又面青白，肚大青筋，臍下开了，又手掌无紋，均不治，又陽事不举，不治，又陰消后腫，不治。

治虛腫症方

肇慶 陸大成
鄧福英

【处 方】 倒吊筆頭二兩，五加皮一兩，五爪金龍皮五錢，大腹皮五錢，青皮二錢。

【服 法】 將藥煮猪脚或猪骨，作湯飲之。

治虛腫良方

欽縣 潘澤寰

【处 方】 灯笼辣椒五錢，生姜一兩，蒜头一兩，黑豆豉一兩，生牛肉九兩。

【用 法】 共搗碎炒熟，空肚服三次。

治腹水方

龙川 謝作材

【处 方】 桂枝三錢，茯苓三錢，猪苓三錢，白朮三錢，澤瀉二錢，北芪六錢，党参五錢，故紙三錢，巴戟三錢，陈皮三錢，肉蔻一錢五分，厚朴二錢，苡米六錢，扁豆四錢。

【用 法】 水煎服。

治血吸虫病方 清远 周中敬

【处 方】 土茵陈五錢，大棗一兩，青矾五錢，蒼朮三錢，共研成細末，醋糊为丸，每服三錢。另以 芫花 四錢，大戟四錢，商陸五錢，大棗五錢，薄荷五分，甘遂五錢，煎服。

【用 法】 上药丸每日服三次，每次服三錢，以猪油炒飯送下，并服煎剂，每星期服烏龜血一次。

治血吸虫病方 清远 張一平

【处 方】 大黃六錢，朴硝六錢，枳实三錢，川朴三錢。另以土狗（又名螻蛄）七只焙干研末。

【用 法】 上药煎水，送土狗末服食。

治血吸虫病方 清远 黃 峰

【处 方】 陈皮、大黃、猪苓、千金子、桑白、葶藶子、萊菔子、尖檳、木通、牙皂（去油）、莪朮、干漆、澤瀉、三棱、姜黃、青木香、枳实各一錢，木香三錢，兩头尖三錢。

上药醋煮后研細末，米糊为小丸，每服十丸至一百丸，空心服七天。如消腫后再用陈皮八錢，蒼朮二兩，青矾二兩，川朴一兩，用醋煮过研末，用大棗肉为丸，每服二錢，飯湯送下。

烏桕根皮丸

治療一百二十三例血吸虫病病人初步总结

安徽省宁国縣血吸虫病防治站

今年一月中旬，宁國縣在宁墩区組織中医配合防治組，用烏桕根皮進行了二十二例晚期血吸虫病的實驗治療。經過十五天治療過程的觀察，九例腹水消失，十二例腹水減輕，八例脾臟縮小，六例肝臟縮小。其中有十三例出院時直腸鏡檢和二月底隨訪糞便孵化檢查，都沒有找到血吸虫卵。這批實驗治療所取得的經驗較少；而且，在治療過程中，病人服藥有嘔吐、腹痛等反應；有些重度腹水病人，服藥后腹水雖消除，却因為藥物的作用，有一部分胃腸充氣。

在地委和縣委的領導下，今年二月下旬，我們組織了以原療法提供人叶成宏老先生為主的中西醫治療隊伍，收治了不同程度的血吸虫病病人一百五十名進行臨床觀察。二月二十九日開始治療，經過一個月的療程，除二十二例因入院后反復糞檢陰性和五例因其他病症中途放棄治療未總結在內以外，現將完成療程的一百二十三個病例初步总结報告如下：

一、治療過程情况

病人入院時，都經中、西醫診斷確認為血吸虫病。一百二十三例血吸虫病病人中，全部糞便檢查陽性。我們根據體

檢情况和中西醫的意見，將病人分成晚期腹水、肝脾腫大輕度腹水、早期血吸虫病等三個組，進行治療。

治療過程中，最初將烏桕根皮焙干、研成末，和水制成丸給病人連日或間日服用。對晚期腹水組的病人，用較大劑量，先攻下腹水，然後逐漸遞減。一般起初每次二至三錢，服三至五次後，逐漸減少藥量；對肝脾腫大輕度腹水組和早期血吸虫病組的病人，則從改善體征、減少腹水著手，先用較小的劑量，頭三天每人一般服一錢，以後根據病情增減。經過一個階段的觀察，服用純烏桕根皮丸的，一般服藥後三十至六十分鐘，便發生腹瀉；服藥五次後，一般每天腹瀉五至十次。第一次服藥後，一般有輕度腹痛、噁心、嘔吐等症狀；有少數病人并發生胃腸充氣。服藥數天後，腹痛和嘔吐等症狀才逐漸減少。大部分在病人服藥後數小時有全身乏力和食欲不振現象；但第二天停藥（間日服）時，一般食量即增加，反應也就消失。我們認為，上述服藥後的症狀，主要是由於藥物對機体的作用和因藥物刺激胃腸粘膜而引起的。

根據這些情況，我們組織中醫進行了研究。中醫同志根據古書記載棗有甘緩作用，聯想到用棗泥和烏桕根皮粉制丸，可以減少嘔吐症狀。我們便試用30%棗泥和70%烏桕根皮粉末制成烏（桕）棗（泥）丸。經過試用：服烏棗丸後腹瀉發生時間延長了，嘔吐和腹痛現象也顯著減輕。以後，經過實際觀察和工作中的摸索，逐步採用了中醫的辨證論治和綜合性的輔助療法：根據病人各種不同情況，以烏桕根皮為主，以其他藥物進行配合治療，減少了病人治療過程中的反應。棗泥減少了嘔吐，同時也延長了瀉水發生時間；用檳

榔、芒硝冲水送服，增加了瀉水量；用木香散（用广木香、青皮、萸澄茄等配制成丸）和香砂平胃散（用蒼朮、川朴、木香、砂仁等配制成丸）可消除病人服藥后胃腸充气的不舒服感；此外，也可用針灸減輕或消除病人服藥后的腹痛。

二、療效的初步觀察

从二月二十九日开始，到四月初治療結束。一百二十三例中，有不同程度腹水病人七十八例，治療后，四十九例腹水症狀完全消失，腹圍恢復正常；二十四例腹水症狀消除，但其腹圍仍比正常人稍大；五例腹水減輕。脾腫大者九十九人中，經治療后，脾腫消失的十人，脾臟縮小一至三公分的四十五人，脾臟腫塊軟化的四十人，四例无变化。肝臟腫大的九十二例中，治療后肝腫消失的十四人，縮小一至三公分的三十五人，肝臟腫塊軟化的四十一人，二例无变化。服藥期中檢查黃疸指数高于十一的十七人，經過治療后都恢復正常和接近正常；其中二例的指数曾一度略为增高，到治療結束時也已轉为正常。黃疸指数一般在服藥一周后开始降低，以后逐漸恢復正常或接近正常。一百二十三例中，在四月九日末次糞便孵化檢查時，五十例陰性。

三、二个典型病例介紹

病人揭兴才，男性，農民，六十二歲。三月五日入院。入院前有腹水已三年，近四个月轉重，心跳气急，小便極少。病況危急，家人抬送入院。入院時檢查：血压百分之一百六十，腹部成球形，腹圍九十七公分，肝脾不能触及。下肢浮腫，尿中有微

量蛋白，糞便檢查陽性，確診為晚期血吸虫病。自三月七日至四月五日止，共服烏桕丸一兩六錢，症狀和体征顯著改善，腹水消除，腹圍縮小十八公分，血壓恢復正常，健康狀況顯著好轉。化驗檢查：尿中無蛋白，糞檢孵化連續三次陰性。

病人晏東梅，女性，農民，五十歲。二月廿四日入院。入院時自訴過去一年來有瀉痢史，多至每天八至九次，行動時感氣急，心跳。入院時檢查：體重四十五公斤。面容憔悴，營養不良，舌苔白，心率八十二分；高度腹水，腹圍八十四公分，肝腫劍突下二公分，質堅韌，表面不平；脾腫肋下十二公分，質硬，無壓痛。血清黃疸指數十一單位，碘液試驗二十，尿中有微量蛋白。糞便檢查陽性，確診為晚期血吸虫病。自二月廿九日至四月六日止，共服烏桕丸一兩五錢，一般症狀和体征顯著好轉，於四月八日出院。出院時檢查：腹圍縮小八公分，脾腫縮小三公分，肝脾皆現變軟。大小便已正常，食欲增加，心跳氣急頭暈腹脹等症完全消失。出院時化驗檢查，血清黃疸指數五單位，碘液試驗陰性，尿中無蛋白。糞便血吸虫卵孵化檢查仍為陽性。

四、小 結

根據李時珍“本草綱目”記載，烏桕根皮味苦，微溫有毒，性沉而降，主治暴水^①，癥瘕積聚^②，療頭風^③，利水通腸，功勝大戟。從我們臨床觀察結果看來，烏桕根皮有迅速導瀉、消除腹水、縮小肝脾腫大，消除黃疸症狀和改進肝臟功能的作用。我們採用的治療方法是高度和中度腹水病人，以每次二至三錢頓服，間日遞減，輕度腹水病人每次用一至二錢。

在治療过程中应限制食鹽和水分，并增加营养。一般療程在二十至三十天左右。在治療过程中，应当根据病人不同情况，采取中医随症施治的原則治療，可收到更大的效果。以百分之三十棗泥和百分之七十的烏柏根皮粉末制成的烏棗丸，服后能減輕和减少嘔吐和腹痛的發生，对于輕症和体弱的病人更为适宜。烏柏根皮產地分布極广，安徽、浙江、江西、四川、福建、广东等省都有出產，來源充沛，制用簡易，药价低廉，对治療晚期血吸虫病腹水病人有良好效果。虽然服药后暂时產生一些短时的吐瀉、腹痛等症狀，但在臨床应用时只要審慎掌握，可以安全使用。此药对人體內血吸虫的殺虫作用，因为觀察時間不够，現在还难于作出結論，有待今后作進一步的觀察研究和証实。

⊖ 暴水——急性水腫症。

⊖ 癥瘕痞聚——指腹腔臟器腫大，組織粘連和它腫大后的形狀，如肝脾腫大、痞塊等。

⊖ 头風——是各种头疼症狀的通称。

(轉載“健康报”1956年4月27日)

十八、關節痛

關節炎焮痛方 順德 董少宸

【处 方】 木通二兩(干切)。

【服 法】 水二碗煎取一碗服，取熱服，服后有微汗为度。痛略止，但痛位游走者，加姜活、防風；痛甚有汗，加熟附子；无汗，加麻黃；痛甚不能移动者，加防己。

各藥以不超過三錢為度。

治腰痛方

龍川 李濟才

【處方】 金邊土別五錢，川木耳四錢，正川杜仲一兩，川續斷三錢。

【用法】 水煎服。

【附注】 1.因損傷，加蘇木三錢；2.因睡臥受寒而痛，加公英五錢；3.痛經時間太久而痛者為腎虛，加甘杞三錢，胡桃肉三錢，故紙三錢；4.兼有腹痛，加白朮三錢。

風濕骨痛效方

肇慶 陸大成
鄧福英

【處方】 木瓜五錢，續斷五錢，薏米五錢，川芎二錢，觀音柳七枝，車軸木四錢，車前草五錢，歸身五錢，藕節二個，陳皮三錢，半夏三錢，枳殼五錢，柴胡四錢，木通四錢，菊花五錢，芡實五錢。

【服法】 清水煎服。

治鶴膝風痛方

龍川 曾志標

【處方】 “四神煎”：遠志一錢五分，生芪三錢，牛膝一兩，石斛一兩。

【用法】 上藥煎水服，一連數劑。

【外敷方】 “五聖散”：白芥子三錢，白芷三錢，乳香七分，土生牛膝（數量不限）。

上藥搗蜜糖二兩，敷膝腫處，敷后用棉被蓋上，即有汗出，連敷數天。

【附 注】 此病症狀：双膝头勾腫，膝盖下离二指处会陰腫，就是眞鶴膝風。

治歷節風方 龙川 駱評余

【处 方】 金匱“烏头湯”：白芍二錢，黃芪三錢，麻黃二錢，炙甘二錢，烏头（采用焙附片）二錢，蜜糖一兩。

【用 法】 水煎服。

治風軟腫痛方 龙川 駱文祺

【处 方】 方用独活寄生湯原方。

【用 法】 有腫加川烏、草烏（慎用），去人參。无腫加虎骨、花蛇（去头尾）。

筋縮不舒疼痛效方

肇慶 陆大成
鄧福英

【处 方】 当归兩半，白芷五錢半，薏仁五錢，生地五錢半，元參五錢半，山甲二錢，巴戟二錢半，柴胡二錢。

【用 法】 水煎服，并加酒少許。

治慢性歷節風（關節炎）方

澄海 王慕云

【处 方】 川烏五錢，全蝎三錢，麝香五分，地龍五錢，僵蚕三錢，大豆三錢，蜈蚣三錢。

【用 法】 共研成細末，和米糊为丸，每服三錢，空腹服。

治远年風湿效方 陽江 姚 剛

【处 方】 川木瓜五錢，白茯苓五錢，牛膝四錢，半楓荷五錢，虎骨五錢。

【用 法】 將藥浸酒一斤，廿日可飲，搽食兼用。

【适应症】 手骨麻痺，脚骨痿軟，腰骨刺痛，半身不遂，四肢腫痛。

周身骨痛效方 肇慶 陆大成 鄧福英

【处 方】 过山風叶四兩，田七叶二兩，巴戟五錢，紫苏叶二兩，葱头一兩，陈皮二錢，老姜一兩。

【用 法】 將藥搗爛，好酒煮熱，分兩服包敷患處，每隔四小時換藥一次，再用酒炒熱再敷。

十九、頭痛（包括腦炎頭痛）

治頭風痛效方 肇慶 陆大成 鄧福英

【处 方】 白芷三兩，川芎一兩，甘草一兩，川烏一兩，天麻一兩，山甲五錢，干葛五錢。

【用 法】 將上藥研成細末，瓶貯，每次服二錢，薄荷煮水沖服。十歲以下減半。

治腦脊髓膜炎頭痛方

【处 方】 龍胆草三錢，犀角三分，黃連錢半，菊花三錢，生地五錢，當歸三錢，羚羊角三分，加服安宮牛黃

丸半个，冲服。

二十、疝痛（包括睾丸炎及癰瘕積聚痛）

小腸疝氣痛方 云浮 叶 良

【处 方】 荔枝核煨灰一兩，黃皮核五錢，柑核三錢，小茴香一錢，青皮一錢，吳萸八分，广木香錢半，桂心三分，煎水服。

治疝氣方 濟遠 張一平

【处 方】 木樨子鹽三兩，猪小肚一只，水四碗，煎至一碗飲之。

小腸氣痛方 封开 董劍初

【处 方】 猪苓三錢，荔枝核三錢，柑核三錢，黃皮核二錢（炒），枳壳二錢（炒），青皮二錢，烏藥三錢，川茴二錢，木通二錢半，香附二錢。

【用 法】 酒水各半煎服，后加酒一盞冲服。

寒疝神方 封开 羅焰南

【处 方】 荔枝核一兩（燒微焦），洋硫磺錢半，陳皮一錢。

【用 法】 研末，每服三錢，酒送下，二三服除根。

【适应症】 睾丸痛甚，致于气上冲心，手足厥冷。

疝气方

馬隱庵錄自臨床各科綜合治療學

【處方】 川萆薢三錢，歸尾三錢，橘核錢半，橘叶錢半，川楝子三錢，南蒼炭三錢，赤芍錢半，絲瓜絡錢半，澤瀉三錢，苡仁三錢，山枝錢半（炒焦），木通一錢，花粉三錢，赤猪苓各三錢，水煎服。

【適應症】 睪丸漸次腫大，疼痛，潮紅，灼熱，小便赤痛。

疝气方 錄時逸人中國內科病學

【處方】 桂枝錢半，白朮錢半，赤苓三錢，猪苓二錢，澤瀉二錢，小茴香五分，木香一錢，台烏二錢，吳萸五分，川練錢半。

【用法】 水煎服。寒甚者加附子、干姜；內熱重去桂枝、吳萸、小茴，加山枝、黃芩；血滯加紅花、桃仁；氣虛加北沙參；便瀉加苡仁、車前。

【適應症】 睪丸偏墜，腫痛脹大。

治睪丸痛方

黃繼榮

【處方】 北杏五錢，南杏五錢，和鴨蛋打爛同煎服。如只屬一個睪丸腫痛，用鴨蛋一枚，兩個睪丸皆腫痛則用鴨蛋二枚，連煎服二三次。

治小腸氣驗方

【處方】 郁金五錢，麥冬十粒。

【服 法】 水二碗半煎成八分，一次服。

【适应症】 能止疝痛，止痛后再服一二剂能断尾。

又 方

【处 方】 生麻雀一只連毛。

【制用法】 生放入瓦罐內，外用泥封，用火焙成炭，研成細末，分二次，晨早开白粥服食。

【适应症】 治小腸疝气。

治小腸疝气方

麥炳榮

【处 方】 螳螂三只(煨存性)六一散一兩，白糖五錢，冲开水服。

治小腸疝气舉丸疼痛方

云浮 黃進旆

【处 方】 絲瓜核三錢，搗爛，冲开水服之。

疝气断根方

苏賢生

【处 方】 生松叶(俗名松毛)半斤，生扁柏半斤，鷄蛋兩只。

【制 法】 先將松叶、柏叶洗淨，以清水五碗煎至一碗，鷄蛋熟后去壳同药煎。

【用 法】 一次連同鷄蛋服食。

【适应症】 壯年疝气，湿热下墜。

治舉丸炎方

龍川 徐亞古

【處方】 絲瓜絡一兩，蓮蓬一兩，海螵蛸三錢，六一散五錢。

【用法】 先將絲瓜絡、蓮蓬二件用陰火燒灰，再用海螵蛸研末和六一散沖開水服。

治舉丸偏墜外驗方

陽春 何夢蓮

【處方】 青壳鴨蛋一個，頂頭打一小孔，將洋參末五分裝入蛋內，用筷攪勻，孔口用濕紙封固，再用濕紙把蛋全個包固，放熱灰內煨至蛋熱，取起，去壳吃下。兩天服一次，服三至四次即愈。

治偏墜方

龍川 羅伯謀

【處方】 馬甲頭十兩，豬粉腸四兩。

【用法】 煮水空心服。

又方

龍川 鍾焯元

【處方】 桃仁二錢，杏仁二錢，桔核二錢，荔枝核二錢，小茴一錢，川練子二錢。

【用法】 上藥加食鹽少許，煎水空腹服。

治舉丸炎方

龍川 徐亞古

【處方】 大茶蔞，酌用。

【用法】 上藥煮水熏之有效。

【禁忌】 切不可內服。

治疝氣方

清遠 侯世良

【處方】 川斷四兩（研末），蜜糖二兩，開水沖服。

治肝脾腫大經驗方

封開 趙裕才

【處方】 水邊紅辣蓼。

【用法】 半老穗者，全株，連頭帶子及葉拔起，洗淨晒干，不拘多少；大蒜頭去衣膜，約與蓼等量，同納石臼中，打爛如泥，捏如餅狀，晒干研末。每斤入蚶子壳煨灰研粉四兩，再用老蒜頭搗膏為丸，如梧桐子大，每服百丸，空心白開水送下，日三服。外另用新鮮辣蓼同蒜頭打爛，加皮硝一兩許，河魏三錢，再搗捏成餅樣，量腫塊大小貼之，外用帶扎好，干則換藥，約二三次即消。

治積聚癥方

封開 羅焰南

【處方】 人參二錢，白朮錢半，陳皮錢半，法夏錢半，歸身錢半，茯苓錢半，義朮二錢半，三棱八錢，木香錢半，鱉甲四錢（醋炙），炙草一錢。

【用法】 水煎服，以蜜煉丸更妥。

【適應症】 虛弱人飲食留滯，聚積癥瘕血龜等。

【附注】 孕婦慎用。

廿一、癲 狂

治癲癩方

孔憲武

【处 方】 無論遠年初起，用猪肚一个，內放起碼金叶十張（普通漆匠貼金用的金叶，每張价值一二角而已），猪肚的口用綫縫好，煮熟，水不要多，約兩大碗余，連肚連湯，設法使患癲癩的人尽行吃下，便可霍然而愈了。

治癲癩病丸剂方 潮安 陈去弱

【处 方】 蟬衣五錢，朱砂二錢，明矾四錢，勾藤一兩，乙金五錢，制全蝎五錢，制蜈蚣三条，姜蚕一兩，天麻五錢，川芎五錢，防風五錢 白芍 一兩，甘草五錢。

【制服法】 上藥共研成細末，面糊为丸，如綠豆大，每次服一至二錢，每早晚服一次。如有發熱者，用生地、元参、麥冬各三錢，煎水送服。

【适应症】 猝然昏倒痿攣，不省人事，口流白沫，顏面蒼白或發赤，瞳孔散大，遺尿，具有癲癩征狀者。

治神經失性乱言方

广州 李耀芝

【处 方】 紫丹参三錢，云茯神三錢，川郁金三錢，石菖蒲二錢，生龍齒一兩，煅牡蠣五錢，熟棗仁五錢，柏子仁三錢，牛黃四分，猴棗二分，麝香一分（另放）。

【制 法】 用燉盅一个，先將牛黃、猴子棗搗細末，放在盅

底，次將余藥放盅內，加入開水兩碗，蓋住盅，隔水燉兩點鐘取出，用紗布過濾。

【用法】 另用茶杯放入麝香，將藥汁沖服，空肚服之。

【適應症】 失性，失眠，痰多，驚悸畏怖，妄想，幻覺夢多，精神恍惚等症。

治發狂方

龍川 張宏烜

【處方】 生地八兩，石膏八兩，寸冬五兩，花粉五兩，寒水石四兩，礞石一兩。

【用法】 用水七碗煎，分多次空心服。

【附注】 發狂甚重者，生地要用一斤，石膏要用一斤。服藥后会安睡或安睡一夜始醒。

廿二、撞紅、夾色傷寒、蘇癆

治撞紅經驗良方 云浮 毛澤賢

【處方】 生地五錢，粉甘草錢半，黃芩四錢，生花三錢，蘇木四錢，連翹三錢，川滑石五錢，澤蘭三錢，木通四錢，水煎，連服二三劑。

治撞紅經驗方 云浮 潘鑒銘

【處方】 連翹三錢，滑石四錢，扁柏二錢，穿破石二錢，赤芍三錢，丹皮二錢，粉甘草錢半，生地五錢，紅花二錢，歸尾二錢，木通二錢，水煎服。

又方

云浮 潘鑒銘

【处 方】 生地五錢，滑石三錢，紅花二錢，朱芩四錢，澤蘭二錢，木通二錢，桃仁三錢，玄參四錢，連翹三錢，水煎服。

治撞紅及夾色方 云浮 梁毅修

【处 方】 老鼠屎樹強五錢，羅鼓勒強五錢，扁柏叶三錢，桑叶三錢，瓷瓦器粉四錢，榕樹須五錢，蔗一兩，水煎服。

治夾色伤寒方 云浮 李明周

【处 方】 生箭芪三錢，大歸身二錢，川芎錢半，玄胡索二錢，炮山甲二錢，橘紅三錢，陳佛手二錢，桃仁二錢，云茯苓三錢，酒炒川木瓜二錢，酒炒牛七二錢，黑附片一錢，正羚羊錢半（如无羚羊可用白犀片代之），水煎服。

祖傳治伤寒夾色經驗良方

云浮 董愛朝

【处 方】 東風桔強一兩五錢，生歸尾二錢，生地黄三錢，西秦艽三錢，雪梨干四錢，川牛七三錢，六神翹三錢，淡竹叶二錢，蘇叶一錢，紅花八分，柴胡三錢，粉葛四錢，瞿麥三錢，苦瓜干三錢，赤芍三錢，淮通三錢，蔗尾白一條，古勞茶三錢，水煎內服。

【症 狀】 頭重、舉則暈眩，腰痛，四肢麻痺，心翳等。

治伤寒夾色方 云浮 丘万方

【处 方】 黑墨草半斤，开水冲服。

治夾色伤寒驗方 云浮 鄧慶耀

【处 方】 麻黄二錢，細辛二錢五分，姜活一錢，柴胡一錢，榕樹須四錢，羽箭錢半，双寒头五錢，崗松花五錢，馬鞭草五錢，鴨脚木皮五錢，水煎服。

【附 注】 如在夏季酷热时，麻黄最多用至二錢半，不可过多，恐發汗不止。

治伤寒夾色方 云浮 黎鏡泉

【处 方】 白茅根一兩，生扁柏五錢，老勒強一兩，尖嘴痕芋头（即木芋头）一兩（切細絲用），榕樹吊須一兩，用米一兩同药落鍋，炒至米变黃色，加入清水三碗煎数沸，以水一碗，給病者飲之，余水并渣再冲水煮数沸，乘热与病人洗身，立效。

治夾色伤寒方 彭明軒

【处 方】 炮山甲錢半，归身一錢，北芪七分，佛手一錢，玄胡一錢，橘紅七分，川木瓜錢半，桃仁一錢，牛膝錢半，川附五分，川芎一錢，茯苓半錢，羚羊角一錢，水煎服。

二日后，若脉沉而緊，或似虛浮者，用下方。

【处 方】 羚羊角錢半，归身一錢，川地骨二錢，北柴胡二錢，佛手錢半，烏梅一只，酒洗西紅花五分，黃柏錢

半，化橘紅錢半，牛膝鹽水炒二錢，川芎一錢，知母鹽水炒二錢，水煎服。

【附 注】 先用白矾五分令病人含之，如覺甜而不澀者，為真夾色也，用生鷄仔和麝香、梅片敷肚臍，后用上列前方。

又 方

云浮 彭明軒

【處 方】 歸身三錢，桂枝二錢，白芍二錢，炙草錢半，木通錢半，細辛一錢，紅棗五只，水煎服，如寒盛者加吳萸二錢，生姜三錢，同煎服。

【適應症】 夾色傷寒，四肢厥逆者。

治夾色傷寒方

云浮 伍云佳

【處 方】 老鼠屎（生草藥名）一兩，粉葛一兩半，蘇叶八錢，蘿卜干二兩，燈籠草（又名搏仔草）二兩，生柏叶一兩，冬桑叶二兩，加冬竹蔗一斤，夏秋加黃糖二兩同煎。

【用 法】 以上各藥，用水五斤，煎至一斤，溫服。

【附 注】 倘失治，死后周身黑，便是此症的失敗。但患此症，手足麻木，手脚趾甲有黑色，兼身熱頭暈，便是對症，宜及早治療。

夾色傷寒止痛散

汕頭 蔡仰高

【處 方】 青皮二錢，人中白二錢，陳皮二錢，乳香（制）二錢，沒藥（制）二錢，五靈脂二錢，沉香二錢，檳榔子二錢，木香二錢，砂仁二錢。

【制 法】 上藥各用上品，共研成細末。

【用 法】 每次用散二錢和米酒一杯開水沖服，服藥散四次可以痊愈。

口渴時用香附錢半，干葛錢半，陳皮錢半，甘草一錢，煎水服之。

【适应症】 色后傷寒，小腹結痛甚劇，二便秘結不通，口渴喜熱飲。

治夾色死心头尚暖者急救效方

欽縣 黃德公

【处 方】 酸檸檬果二只（切碎），白矾三錢，水煎，搗口灌之。

治夾色傷寒效方 欽縣 黃樹基

【处 方】 枳子錢半，杜仲錢半，牛膝錢半，干姜一錢，附子二錢，巴戟錢半，甘草一錢。

【服 法】 清水煎服。

治夾色症灸法 云浮 劉晉文

【处 方】 用陳艾絨，加些少麝香，在尾脊骨處灸五壯，手足指尖男左女右，灸五壯。

治勞癆經驗方 云浮 張勝初

【处 方】 木棉花強，兩便針，龍眼樹皮，鉄牛入石，酸味仔強，榕樹須，蘆花勒強，蘆根，楊桃樹寄生，以上

九味各一兩，煎四小時，煎成湯，約二碗，夫婦同食，連服八次，屢試屢驗。

【适应症】 咳而无血，面目日漸枯黃，本病不出百日而死。

治苏癆症良方 云浮 衛永祺

【处 方】 酸五稔叶一斤，五月艾叶一斤，洗淨，共搗極爛，加燒酒四兩，再搗，絞出其汁，用生鷄仔一只，約重半斤為度，殺取生鷄血沖汁內，和勻服之，立愈。

治妇人苏癆月后風方

清遠 李謙益

【处 方】 桐油樹皮，煮瘦猪肉食。

陰症伤寒效方 肇慶 陸大成 鄧福英

【处 方】 白朮三兩半，肉桂三錢二分，丁香錢半，吳萸錢半。

【用 法】 水煎服。十六歲以下減半。

廿三、虛弱（包括貧血、萎黃、眩暈、失眠、怔忡、遺精、縮陽）

治貧血有效方 云浮 趙裕才

【处 方】 鴨血（鷄血無效）蒸熟，和入好酒（最好是首烏酒），約二三茶匙食之，不四五日，面色必轉紅潤。

【附 注】 此方傳自梅縣林海医生，屢試皆驗。

萎黃病方

封开 朱清湖

【处 方】 陈皮一兩，青矾五錢，川朴一兩，砂仁五錢。

【用 法】 共研細末，后用黑棗八兩，蒸熟去皮核，杵爛加入前藥末為小丸，每日服二錢。

【适应症】 皮膚萎黃，全身倦怠，食欲減退，失神心悸，婦女月經不調。

怔忡病方

云浮 趙裕才

【处 方】 不落水猪心一只，剖开，連猪心血，加入朱砂三錢，重湯燉約三四小时，食之，食至兩三枚，可止。

失眠症（即亢陽症）效方

【处 方】 百合六錢，紫蘇一錢，香附二錢，北味一錢，淮山四錢，萸肉三錢，文且二錢，丹皮二錢，生地四錢，白茯四錢。

【用 法】 水煎服五剂，下午七点鐘服，宜靜養為妥。

【說 明】 此方不合老人。

防眩湯

【处 方】 散党五錢，半夏三錢，白朮五錢，当归五錢，熟地一兩，白芍五錢，川芎四錢，萸肉四錢，天麻一錢，陈皮五分。

【用 法】 清水煎服。

【說 明】 头目暈眩虽屬小症，然而大病每由此而起，甚

至暈眩眼目一時昏花，卒至猝倒而不可救者，宜及早治之，方名防眩湯者，此專治氣血之虛，不治頭風之暈眩。

遺精方

封開衛協

【處方】 云茯苓、石蓮肉各三兩，山藥六兩，肇芡實三兩，共研成末。

【用法】 另用生金櫻子三斤熬膏，和上藥末為丸，每服三錢，淡鹽湯送下。

【適應症】 房事過多，性機能衰弱遺精。

虛性遺精方

封開 蘇世初

【處方】 龍骨、麻黃根、肉蓉、牡蠣、益智、破故紙各二錢，蓮須三錢，沙苑三錢，棉花仁三錢，金櫻三錢，巴戟三錢，升麻一錢。

【用法】 水煎服。

治遺精效方

云浮 趙裕才

【處方】 金櫻子(半熟者)約十斤，剖去核及毛，重湯燉水，煎膏，肇芡實五兩，白雲蓮一兩，湘蓮肉二兩，共為細末，加入生櫻子膏，和勻，日作口糖食之，不特止遺精神效，并能增進食欲，強壯筋骨。

治遺精方

清遠 侯世良

【處方】 春砂三錢，黃柏三錢(鹽水炒)，甘草錢半，玉茸一兩，牡蠣一兩。

【服 法】 清水煎服。

治陽萎方

清遠 植修己

【處 方】 蜚蠊公二兩，鹿茸五錢，黃精一兩，巴戟五錢，丁香三錢，杜仲二兩，高麗參五錢（防黨代之亦可），故紙一兩，鎖陽一兩，合桃肉一兩。

【用 法】 上藥共研細末，另以狗鞭十余條，先用蛇床子一兩，水兩碗半煎成濃汁，狗鞭炙透，研末，煉蜜為大丸，每丸重三錢，每天服一至二丸。

治小便不禁方

云淨 趙裕才

【處 方】 野生白花薔薇根，煎濃汁，連服數次，有效。

治神經衰弱方

陽春 何夢蓮

【處 方】 火麻花四兩，人參二兩，共研成細末蒸熟，隨臥冰糖水送下一錢。

治神經衰弱加味羊腎丸

潮安 李 衡

【處 方】 高麗參一兩，淫羊藿一兩，仙茅一兩，沙苑一兩，陽起石五錢，薏苡一兩，山茱萸六錢，巴戟六錢，鎖陽六錢，兔絲六錢，枸杞一兩。

【制用法】 各藥共研細末，另用羊外腎一對，水內燙硬，不要太熟，剝去外皮，晒干研末，與上藥末混和，煉蜜為丸，如豌豆大，每早晚飯前各服三錢，開水或鹽湯送

下，輕症一料即效，重症多服。

【适应症】 陽萎、舉而不堅、早泄、屬於性神經衰弱疾患。

補腎方

廣州 鄧榮滋

【处 方】 骨碎补一兩，巴戟四錢，杞子三錢，淮山一兩，鎖陽五錢。

【用 法】 煮猪腰食(注意不要將腰肉洗)，約二天食一次。

【适应症】 性神經衰弱，遺尿症。

此方出于清宮秘方，是先將骨碎补，鎖陽兩葯，兩味相等在新瓦內煨干取末，后將猪腰切开兩边，將葯末放入，用絲綫扎之，在新瓦上煨干存性，为末，和蜜糖及棗肉为丸，如梧桐子大，每次服二錢，早晚各一次，若覺气热口苦，則用鹽水送服。我在臨床上覺得制丸手續麻煩，且不能久藏，易于變質，故改用飲食方法服用，既可以佐膳，且又可口。

補腎葯酒方

陽江 姚 剛

【处 方】 牛膝、元肉、杞子、巴戟天、炙芪、狗脊、卷苓、絲餅、西归各一錢，熟地黄、黃精、台党各二錢，白芍、龜膠、鹿膠、炙草各五分，杜仲一錢，黑豆五錢(炒)，大棗四枚，蛤蚧一条。

【用 法】 上葯用好酒一斤四兩浸足十五天可飲，早、晚飲一杯。

【适应症】 腰骨疼痛，夜多小便，心跳耳鳴，头暈眼花，

脚骨痠軟，夜夢遺精，陽事不舉等症。

治縮陽症方

龙川 謝鸞高

【处 方】 附片三錢，肉桂三錢，干姜三錢，艾叶一錢五分。

【用 法】 水煎服。

治縮陽症方

苏善卿

【处 方】 白胡椒冲燒酒內服，若无白胡椒，用蛤蜊骨代之，如不效，或情势危急者，以艾絨急急救之，在病人尾龍骨处，灸时加一銅錢，在錢眼处灸之，以免灸点太闊。

治縮陽良方

李明周

【处 方】 白胡椒四兩打爛，冲酒服之，立效。

【附 注】 据編者按上兩方相同，因縮陽症，乃因虛寒过度，乃經謂寒主收引之义，余曾親治縮陽症二人，当發作时，急用戥秤盒夾之，随用燒酒开火药（指土產火药，是用焰硝、硫磺、木炭合制的。若是化学火药，成分不明，不可內服）內服，皆效。

治縮陽方

黃德泉

【处 方】 肉桂四分，杞子六錢，白胡椒三錢，破故紙（鹽酒炒）六錢，肉苁蓉六錢，用水煎服，經驗多人。

治縮陽症方

郁南 徐永田 林 燿 李君衡 潘振麟

【處方】 硫磺錢半（用天生石磺）。

【用法】 冲滾水或酒服。

又方

郁南 莫兆平

【處方】 北芪五錢，石柱參一錢，黑附子三錢，炮姜一兩，
胆星三錢。

【用法】 共煎湯冲服桂心二分。

治舉丸縮上方

郁南 黎彥樞

【處方】 木樨子四只，塘虱魚一條，或加糯米煮粥食之，神效。

廿四、腸伤寒（腸熱）

治腸熱

廣州 周志偉

【處方】 痕芋頭（即木芋頭）四兩（司馬秤）。

【用法】 將木芋頭切片，用鑊炒至微黃，用清水約四斤，
煮約八小時余，煎成約二碗，分數次服，約服三天可痊愈。

【適應症】 男女一般性腸熱。

又 方

番禺 鄧伯強

【处 方】 川滑石五錢，波蘿一錢，川朴錢五分，北杏三錢，淡竹叶四錢，甘草二錢，法夏三錢，通草三錢，粳米一兩。

【用 法】 清水煎服。

【适应症】 舌胎潤灰色（中医名为湿溫症）。

治腸熱症驗方 广州 陈治平

【处 方】 犀角五分（另煎冲服），正西藏紅花五分（另以葯水焗服），正七个牛黃三分（末粉冲服），生地五錢，土苡仁六錢，生蘆根一兩，生蓮叶三張（取边去心），小环釵四錢，梨干四錢，云苓四錢，正金汁二安冲服，連翹四錢，白薇四錢。

【用 法】 水四碗煎至大半碗，同葯末冲服，如口渴加生石膏一兩，小便赤短加車前四錢，兼見枝气管及肺炎加桔梗四錢。

【症 狀】 唇焦、舌黑、口渴、譫語、腹部見紅暗斑点。

治腸傷寒方 龙川 刘子銘

【处 方】 蛇舌草三兩，馬齒莧（俗名老鼠耳）二兩，車前草二兩。

【用 法】 上葯煮水当茶飲。

【附 注】 如腸出血，用六角英、乳仔草各等分，捶爛，用紗布包好，搾取汁一兩左右，加燒酒三滴，和冷开水冲服。同时服白头翁湯加槐花五錢，水煎服。

第二篇 妇科症类

一、經 痛

治經痛方

番禺江村區雙郭衛協小組

【处 方】 兩頭尖三錢，桃仁三錢，天冬四錢，郁金三錢，香附四錢，錦黃三錢，制元胡二錢，白芍三錢，丁香一錢，歸尾三錢，小茴二錢，防黨三錢，川生花三錢，莖蓉四錢，肉桂三分（煨）。虛弱者，加鮑魚海參同煎服。

【用 法】 用水煎服。

治虛弱貧血經痛方 封开 陳德安

【处 方】 云苓三錢，新艾二錢，川芎錢半，白朮三錢，制香附二錢，續斷（酒炒）二錢，歸身三錢，益母草三錢，杜仲三錢，靈脂二錢，白芍三錢，春砂仁七分。

【用 法】 水煎服。或倍過分量，煉蜜為丸，每服三錢。

【适应症】 月經不調，貧血面黃，四肢疲倦，食欲不振，經前經後腹痛，或多或少，腰痛頭眩。

經痛方

廣州 胡香余

【处 方】 防黨二錢，酒大當歸四錢，大棗（擘）三枚，

广木香二錢，酒川芎二錢，大生地二錢，酒白芍四錢，
土炒白朮四錢，炙草二錢，制香附四錢，生姜三片。

【用法】 清水三碗煎至大半碗，溫服。

【适应症】 經期腹痛。

調經止痛方

【处方】 归身、延胡、沒药、紅花各等分，适量。

【服法】 水煎服。

妇科血積塊痛方 广州 趙思競

【处方】 紫荆花叶四十九塊，捶爛，用醋头炒熟，敷患
处。再用山查末五錢，白糖三錢，煎水一盅，服数次。

治月經前后不調方

澄海 蔡冠英

【处方】 川朴錢半，黄芩錢半，茯苓三錢，益母草錢
半，酒白芍錢半，木香六分，陈皮錢半，檳榔錢半，制
香附錢半，神麴一錢，炒枳壳錢半，甘草七分。

【用法】 每当經來，即服此湯，如服后下月或二个月，
經不來，再服此湯，要刪去檳榔一味（因恐已受孕，此
味不宜服），盖此方不只調經，而能种子。

調經丸剂方

澄海 蔡純臣

【处方】 当归二兩，川芎兩半，白芍二兩，赤芍兩半，
生地兩半，熟地兩半，香附二兩，台烏兩半，沉香一

兩，木香一兩，琥珀八錢，山查二兩，元胡二兩，乙金七錢，牛膝一兩，紫蘇一兩，陳皮二兩，茯苓兩半，柴胡一兩，白朮二兩，炙草一兩，益母草二兩，藿香一兩，砂仁七錢，条芩兩半，黑枝兩半，杜仲兩半，木瓜一兩，續斷兩半，淮山一兩，黑艾兩半，蛤粉炒阿膠二兩。

【制 法】 以上諸藥共用酒濕蒸熟，晒干研末，煉蜜為丸，每丸重一錢二分。

【服 法】 應在排經前二三天服起，至排經一天止（經多勿用）。每天早晚空腹用開水或飯湯送一丸半至二丸。但須注意的，在該丸服后，下次如月經不來，有受胎懷疑時，則不可再服。

【適應症】 適應範圍：月經不調，子宮作痛，腰痠不暢，久不受孕等。

二、帶 下

治赤白帶下丸方 汕頭 蔡仰高

【處 方】 西洋參一兩，茯苓二兩四錢，白朮一兩八錢（土炒），炙草一兩半，遠志一兩，熟地四兩四錢，白芍一兩八錢，當歸三兩，黑荊芥兩半，淮山二兩八錢，香附一兩八錢，炙芪二兩四錢，祈艾二兩四錢（醋炒），柴胡一兩八錢，炒膠珠二兩，杜仲二兩四錢（炒黑），寸冬一兩二錢，續斷一兩八錢，防風一兩八錢，兔絲一兩八錢，椿根，冠花，木瓜一兩二錢，陳皮一兩八錢，

木香一兩，升麻一兩二錢，龙骨一兩二錢（煨），甘杞一兩，煨牡蠣一兩，煨余糧二兩，煨陽起石二兩，黨參二兩，白斂二兩，金櫻（去核）二兩，北茸五錢。

【制 法】 上藥各揀上品，用米酒濕透，隔宿蒸晒，研成細末，煉蜜為丸，如綠豆大。

【服 法】 每日早晚各服一次，每次二錢，空腹時服，飯湯或開水送下。服六至十兩，即見效。

【適應症】 婦女血氣虛弱，赤白帶下，新久微甚，濃濁粘稠，小便混濁不清，月經愆期，久不產育，服之均有奇效。

又 方

潮安 陳明昭

【處 方】 防黨（米泔炒）四錢，炙芪二錢，白朮（炒）二錢，炙甘一錢半，蜜柴胡五分，蜜升麻五分，陳皮一錢，赤石脂四錢，煨龍骨五錢。

【服 法】 清水二碗煎至八分，飯前服。

【適應症】 婦女白帶日久，纏綿不愈。

久年白帶方

廣州 趙思競

【處 方】 胡椒三分，硫黃三分。

【用 法】 共研成細末，雞蛋一個，開孔將藥末入蛋內攪勻，用紙封固，蒸熟食之，三至四次可愈。

帶下虛脫方

廣州 趙思競

【處 方】 芡實粉二兩，白茯苓二兩，赤石脂（煨）一兩，杜仲（炒醋淬）一兩，禹余糧（煨）一兩，牛角腮（炙黃）一兩。

【用法】 研成細末，好醋一盞，拌和前藥，晒干再研細，糊丸，每服二錢，淡鹽湯下。

白帶新症方 廣州 趙思競

【处方】 郁李仁四兩，白蓮蓬三個研末蒸透，白果（蒸熟）一斤，棉子仁末（蒸）一斤，共搗成小丸，每服三錢，白糖水送下。

治赤白帶效方 肇慶 陸大成
鄧福英

【处方】 老貫眾一斤（去皮毛）。

【用法】 將藥用陳醋泡透，慢火煨熟，研末。每次服二錢半，開水和白糖沖服。

治婦人白帶方 澄海 林賢書

【处方】 白芷三錢，當歸二錢半，澤瀉二錢，金英二錢，白蓮須二錢，芡實二錢，甘草錢二，茯苓二錢半，白淮山二錢，白芍二錢，牛膝二錢半，杜仲二錢半，煅牡蠣三錢，元參二錢半，南沙參二錢半。

【服法】 水煎服。

治流白帶方 清遠 張一平

【处方】 升麻五錢，北柴胡五錢，北芪八錢，白芷三錢，炙草四錢，陳皮四錢，歸頭五錢，墨魚骨一兩。

【用法】 將藥研成細末，用金櫻子一斤熬膠，煉蜜為丸，每次服三錢，早晚各一次。

治流白帶方

清遠 李濟雄

【處方】 胡椒十粒（研末），鷄蛋一只。

【用法】 先把鷄蛋開一小孔，入胡椒粉于蛋內，以紙封固煨熟食。

治黃帶方

清遠 楊紹初

【處方】 蒼朮一兩，黃柏四錢，車前四錢，淮山一兩（以上俱炒），白果十粒，煎水服。

三、難 孕

補血調經種子丸 汕頭 蔡仰高

【處方】 高麗參五錢，茯苓四兩八錢，白朮（土炒）三兩六錢，黨參五兩，炙草三兩，熟地八兩，當歸八兩，北麋茸五錢，白芍三兩六錢，淮山三兩六錢，蜜芪四兩八錢，祈艾（醋制）四兩八錢，柴胡（蜜制）三兩八錢，遠志三兩六錢，椿根皮三兩六錢，杜仲（炒黑）四兩八錢，續斷三兩六錢，防風三兩六錢，兔絲三兩六錢，香附（制）三兩六錢，陳皮三兩六錢，南木香一兩，木瓜二兩四錢，麥冬二兩四錢，升麻（蜜制）二兩四錢，龍骨（煨）一兩，枸杞一兩六錢，牡蠣（煨）一兩二錢，膠珠三兩，荊芥（黑）二兩八錢，益母草一斤。

【制法】 上藥揀上品，用米酒濕透蒸熟，搗爛，晒干，研成細末，煉冬蜜為丸，如綠豆大。

【服 法】 每日早晚空腹各服一次，每次二錢，開水送下，每日最少須服至六錢，多服更好。

【適應症】 氣血不足，頭目昏眩，精神短少，夜間失眠，月經后期，或崩漏面色萎黃，血海干枯，子宮寒冷，久未受孕，四肢痠軟。

通用婦科丸 廣州 趙思競

【處 方】 熟地一兩半，白茯苓一兩，白芍五錢，紅花三錢，丹參四錢，陳皮三錢，丹皮四錢，川芎七錢半，白朮三錢，香附三錢，元胡七錢半，當歸一兩，生地五錢。

【用 法】 研末蜜丸，每重三錢，每次三個，米酒開服。

【適應症】 月經不調，難孕。

調經婦科丸 廣州 趙思競

【處 方】 蒲黃五錢，祈艾二兩，續斷五錢，台烏五錢，春砂五錢，烏豆二兩，干姜五錢，熟地五錢，川芎五錢，寄奴五錢，醋制大黃五錢，炮蒼朮五錢，丹皮五錢，莪朮五錢，肉桂五錢，元胡五錢，當歸五錢，三棱五錢，陳皮五錢。

【用 法】 研末蜜制小丸，每服五錢，一日二次。

婦科種子良方 廣州 孫少竹

【處 方】 西全當歸三錢，延胡索一錢（醋制），上桂心四分（煨服），五靈脂二錢（炒），川干姜二分（炒），生蒲黃三錢，小茴香七粒（酒炒），赤芍藥二錢，川芎

一錢，沒藥一錢。

【制 法】 揀選正地道藥，清水一碗八分，煎至七分，將肉桂心焗服。

【用 法】 月經來時即連服三天，服至四個月為度。

【適應症】 凡婦人子宮虛冷，月經不調，久不孕育，或妊娠腹痛，多患小產等症。

調經種子方 陽江 姚 剛

【處 方】 歸身三錢，川芎二錢，酒芍二錢，萸肉二錢，茯苓二錢，丹皮二錢，廣皮八分，元胡索一錢，香附二錢，紫丹參二錢，五靈脂三錢，生姜三片。

【用 法】 水二碗煎至一碗，空腹服之。經水先期，加條芩一錢，白朮一錢；經水后期，加肉桂三分，祈艾五分，炒芍藥錢半；經閉不通，加桃仁三錢；白帶，加川斷肉錢半，熟地二錢；久不受孕者，加丹參四錢。經水來時服之。

避孕驗方 廣州 胡香余

【處 方】 白鷄冠花二兩，紅鷄冠花二兩，瘦豬肉六兩。

【用 法】 清水四碗，煎至大半碗，不放油鹽，溫服。每日連服三次。

四、經 閉

治婦女經閉方 順德 黎 良

【處 方】 蜚沙二兩，燒酒一斤。

【服法】 將蚕沙放酒內煎取汁，用紗布濾過，每日服一次，每次半酒杯，經通后即停藥。

【适应症】 一般經閉。

又方 封川開建 羅董童劍初

【處方】 柏子仁（去油）三錢，熟地（砂仁拌）五錢，牛膝（鹽水制）二錢，澤蘭三錢，續斷三錢，卷柏三錢。

【服法】 水煎服。

【适应症】 血少經閉。

又方 封川開建 蘇世初

【處方】 丹參五錢，鹿角霜二錢，通草錢半，山甲錢半，蒲黃二錢，良姜二錢，延胡二錢，香附二錢，歸身三錢。

【服法】 水煎服。

【适应症】 經閉而兼有脹痛者。

經閉驗方 廣州 趙思競

【處方】 石栗適量煲（煮）猪肉食二至三次，或煮豬甜碟（即腩子），无石栗用石栗叶亦可。

又方 河源 巫鏡奎

【處方】 漆樹根二兩。

【用法】 用水煎沖酒服。

【适应症】 經閉不通。

又方 番禺大石区 叶冠天

【处 方】 鮮紅鷄冠花八錢，瘦猪肉二兩。

治經閉黃腫方 高要 戴芝林

【处 方】 蒼朮四兩，牛膝四兩，青矾八兩（醋煮至黑为度），紅棗、黑棗（去皮核）各二兩。

【用 法】 上藥用醋为丸，如桐子大，每日服五錢，服完即愈。

治經閉發黃方 高要 謝敬嚴

【处 方】 青矾一兩，紅矾一兩，当归一兩，元胡五錢，土茵陈一兩，百草霜一兩。

【用 法】 上藥共研末，用白醋二小碗煮溶勻之，候冷，用生鉄一小塊燒紅浸醋中，加生姜三片，米酒二斤浸藥。俟出味后，每天早晚飲一小杯。

治行經忽停閉甚者不省人事方

丰順 丰良衛協

【处 方】 白薇五錢。

【服 法】 水煎冲酒服。

治經閉不通方 郁南 宾紹華

【处 方】 归身二錢，归尾、西紅花、吳萸各錢半。

【服 法】 同煎服。

治妇女干血癆方 陽春 何夢蓮

【处 方】 茜草三錢，川芎三錢，黑丑白丑六錢。

【用 法】 共研末和蜜为七丸，第一天吃三丸，第三天吃二丸，第五天吃二丸，即愈。

治逆經口鼻流血方

郁南 朱坤南

【处 方】 川芎三錢，归身四錢，生地四錢，白芍四錢，
祈艾三錢，阿膠四錢，炙甘草一錢。

【服 法】 水煎服。

五、血 崩

治子宮出血方

【处 方】 黑地榆一兩，黑管仲一兩，黑木耳一兩，共研成細末。

【服 法】 用藕節三錢，煎水分三次冲药末服。

【适应症】 血崩大下。

又 方

【处 方】 散党四兩，干姜五分，阿膠五錢。

【服 法】 用水煎服，一次量。

【适应症】 血崩而體質較虛的。

又 方

【处 方】 生薏仁五錢，續斷三錢，龍骨二錢，牡蠣二錢，白果三錢，郁金一錢。

【服 法】 用水煎服，一次量。

【适应症】 一般崩漏不止的。

又 方

【处 方】 乳汁草三兩，韭菜三兩，在鍋內炒至黑色。

【服 法】 用白醋四兩入藥煮沸，溫服，一次服完。（一方加元明粉二錢。）

【适应症】 一般血崩症。

又 方

【处 方】 薯叶尾一握，放鍋上炒至黃黑色，用白醋煮沸放溫服之，一劑即愈。愈后用補藥收功。

又 方 順德大良 董立三

【处 方】 地榆一錢，白醋適量。

【服 法】 白醋把地榆煎成濃湯，一次溫服。

【适应症】 子宮出血過多。

【編者按】 此方簡單可用，但分量過輕，須增至五錢以上，并須炒黑，功效較著。

又 方

封川 莫远釗

【处 方】 棕衣炭五錢，血余灰二錢，赤石脂五錢。

【服 法】 共炒紅色，冲开水飲。

【适应症】 子宫出血不止。

又 方

南丰 李滋生

【处 方】 貫仲炭三錢，崗松叶炭三錢，棕繩炭五錢，虛
者加丽参一錢，血余炭二錢。

【服 法】 共煎水服。

【适应症】 子宫出血。

又 方

番禺 庾蔭棠

【处 方】 归身八錢，白芍五錢，龜膠六錢，祈艾（炭）
一兩，瓦弄子（煨）一兩，附子五錢，炮姜三錢，党参
一兩半，川芎三錢。

【服 法】 清水煎服。

【适应症】 治虛型血崩。

又 方

【处 方】 首烏、当归、川芎、酒芍、香附、黑蒲黃、續
斷、元胡、醋炒祈艾、茯神、附子、阿膠珠、黑地榆各
適量。

【服 法】 煎水服。

【适应症】 血崩之屬於寒性者。

又 方

【处 方】 生地、黑柏、当归、生芍、川芎、茯神、續斷、棗仁、血余灰、棕灰各适量。

【服 法】 水煎服。

【适应症】 血崩之屬於热性者。

又 方

河源 刘耀輝

【处 方】 馬蹄香，一至五根，醋或黄酒一大碗。

【服 法】 將馬蹄香連根拔起，和醋（酒）炒熟內服，不可加水。

【附 記】 祖傳几代秘方，治愈人極多。

【适应症】 血崩症。

又 方

楊鳳鳴

【处 方】 鷄冠花一株。

【用 法】 將鷄冠花炒黑，加水、酒、醋煮沸，再加入棕灰冲服。

【适应症】 血崩。

又 方

河源 巫鏡奎

【处 方】 馬鞭草二株，益母草一株。

【服 法】 用水煎冲酒服。

【适应症】 血崩。

又 方

河源 罗 权

【处 方】 旱蓮草四兩，母雞一只。

【用 法】 將旱蓮草和雞共煮食，一次見效。

【适应症】 血崩，或經血时來时止。

又 方

丰順 丰良衛协

【处 方】 絲瓜絡五錢。

【用 法】 燒灰冲酒服，或用生艾叶一握，与白乳汁搗，
和酒一倍服。

【适应症】 血崩，子宮出血不止。

又 方

丰順 潭江衛协

【处 方】 干当尼子三四兩。

【用 法】 煎水服即止。

【适应症】 血崩，兼治小儿腹瀉。

又 方

丰順 潭江衛协

【处 方】 苧根四兩。

【用 法】 水煎服。

【适应症】 胎前子宮出血，能安胎，小便不利亦效。

又 方

郁南 張伯桂

【处 方】 醋炒祈艾、酒芍、益母草各三錢，老松節四
錢，川芎錢半，归身五錢，蒲黃二錢，黄芩一錢，續斷

三錢，有熱加生地三錢。

【服法】 水煎服。

又方

郁南 凌秀初

【處方】 棕皮炭、扁柏炭各五錢，荊芥炭二錢，吳萸炭一錢，血余炭三錢，歸身三錢，龜板三錢。

【服法】 水煎服。

血山崩方

廣州 趙思鏡

【處方】 白蓮蓬二至三只，晒干煨灰，熱酒沖服，如未收功，繼服下方。

海蜇皮切碎，用鍋炒香，白醋沖下，連醋盡服。

治血山崩方

清遠 黃芳

【處方】 薯蕷頭（研末），童子雞一只。

【用法】 先將雞肉煎湯，加醋，開薯蕷末服，每次服三錢。

治血山崩方

清遠 楊玉棠

【處方】 百草霜同雞仔肉炒透，加鹽煮水服。

治婦女血崩不止方

龍川 吳聲揚

【處方】 黃烟筒——取中間一段約二寸。

【用法】 將取下黃烟筒燒成炭（燒至無烟），研末，沖黃酒服之可止。

治妇人血山崩方 澄海 李華坤

【处 方】 金狗仔一兩二錢。

【用 法】 將上药下水二碗半煎存碗余，渣濾清，服之即愈。

治妇科血崩效方 肇慶 陸大成
鄧福英

【处 方】 茅根五錢，側柏叶五錢，香附子五錢，烏賊骨三錢，鹿角膠一錢，禹余糧三錢，艾叶五錢，紫石英一錢，木賊三錢，龍骨一錢，大蓳三錢，小蓳三錢。

【用 法】 水煎服。

又 方 肇慶 陸大成
鄧福英

【处 方】 地榆二錢半，續斷二錢半，白芷三錢，蒲黃錢半，五靈脂二錢，赤石脂二錢半。

【用 法】 水煎服。

六、胎 前

保胎方 汕頭 蔡仰高

【处 方】 防党參五兩，白朮(土炒)三兩，川芎五錢，祈艾(醋制)二兩半，熟地五兩，甘杞一兩，續斷三兩，当归五兩，杜仲(炒黑)三兩，炙草兩半，鬼絲一兩，川朴(姜制)五錢，炙芪二兩，升麻六錢，炒膠珠二兩，酒芩一兩，砂仁一兩，荆芥(黑)一兩。

【制 法】 各藥用米酒濕透，隔夜蒸熟，搗爛，晒干，研末，煉蜜為丸，如綠豆大。

【服 法】 早晚空腹各服一次，每次二錢，開水送下。

【適應症】 孕婦氣血虛弱，有時漏紅，或習慣小產，或胎動腹痛。

治婦人妊娠漏胎下血損傷勞傷

見血方

廣州 陳子材

【處 方】 大當歸四錢，川續斷三錢，炙黃芪四錢，川杜仲三錢，川芎二錢，白芍藥四錢，正桑寄生五錢，黑蒲黃二錢，黑荊芥一錢，阿膠三錢。

【用 法】 清水煎服，每天早晚各一劑，兩天服完即愈。

防止小產方

陽春 何夢蓮

【處 方】 用苧麻根（約一二兩）洗淨煎湯服之。

【適應症】 孕婦胎動不安，勢將小產。

治胎動流血不止方

清遠 黃守仁

【處 方】 熟地五錢，川斷三錢，苧麻五錢（糯米四撮拌炒至黃色），白朮四錢，當歸一兩，人參錢半，北芪五錢，黃芩三錢。

【用 法】 清水煎服，在未服藥前，先用油紙扇或油紙傘燒灰至黑色，白色無效，煮滾米醋，把油紙灰沖服后，再服上方。

治小產流血不止灸方

欽縣 郭蘭生

【處方】 用灯芯一莖点生油燒着，灸大敦穴（左右脚拇指头指甲外处）。

七、產 褥

治妇人难產方 郁南 王箴吾

【處方】 川芎二錢，龜板二錢半，滑石三錢，急性子三錢，車前錢半，归身二錢。

【用法】 共煎服。

治妇人难產方 恩平 馮耀鈴

【處方】 蟋蟀一只（干的）。

【用法】 用水煎服。

解救誤服毒藥墜胎方

陽春 何夢蓮

【處方】 白扁豆（去皮）一兩。生甘草三錢。

【用法】 水三碗煎至一碗，分二次服。

催生藥

陽春 何夢蓮

【處方】 素蘭花（或鮮或干均可，紅心者忌用）適量。

【用法】 用开水冲下。

【适应症】 不論逆生橫生，各種難產，屢經試用，多能安然產下。

治產后惡露不下脹痛方

溱浦 黃民叔

【处 方】 山查一兩，干漆一兩（燒去烟取末）。

【用 法】 將山查煎湯，送服干漆炭末。

【适应症】 凡產后惡露不下，小腹脹痛，服桃仁、紅花等藥毫不見效的，用此方必通露止痛。

治胎衣不下方

郁南 盧其欽

【处 方】 无名异三錢。

【用 法】 用米醋四兩煎出味，冲鴨蛋白二只，飲之即下。

又 方

郁南 童劍初

【处 方】 川芎三錢，归身一兩，益母草三錢。

【用 法】 用陳酒煎服。

又 方

郁南 黃滿方 陳國藏 趙焯廷

【处 方】 生鷄仔一只，割开去腸臟，敷臍上，并用生鷄毛燒水放盆內令產婦坐上熏之，即下。或用旧松扫燒灰和鷄毛煎熏亦得。

又 方

廣州 趙思競

【處 方】 淮牛膝三兩，冬葵子五錢水煎服。

又 方

龍川 駱經常

【處 方】 歸身、靈脂、元胡、生蒲黃各三錢。

【用 法】 用黃酒煮，空心服，卽下。

治死胎不下方

廣州 趙思競

【處 方】 平胃散（局方）加芒硝二至三錢，煎服。

治婦人產后肚痛驗方

欽縣 郭蘭生

【處 方】 川芎一錢，歸身八錢，桃仁一錢，炙草一錢，炮姜錢半，紅花一錢，延胡二錢，靈脂三錢（醋炒），生蒲黃二錢。

【用 法】 清水煎服。若血流不止，減去紅花，加荊芥炭錢半，山楂炭一錢。

產后血痛方

廣州 趙思競

【處 方】 白鷄冠花煎酒服，或用山楂煎汁加糖服。

產后流尿方

廣州 趙思競

【處 方】 大鯉魚一條，只取鱗，用油煮令酥脆，加以鹽醋姜料拌鱗食之。

產后肚痛瘀血未清方

廣州 長壽區 譚 鏘

【處方】 威靈仙一兩。

【用法】 將藥用好米酒煎服，血虛加當歸，氣虛加黃芪。

治婦人產后瘀血不消積聚作塊心

腹切痛方

廣州 陳子材

【處方】 益母草三錢，紅花錢半，郁金二錢，莪朮二錢，
荆三棱二錢，當歸三錢，青皮錢半，桃仁二錢，牛膝二
錢，川芎二錢，五靈脂三錢，玄胡錢半，骨碎補三錢。

【用法】 清水二碗半煎至八分，空心服。

治產后流血不止方 郁南 檀炯南

【處方】 炙北芪四錢，醋炒地榆四錢，黨參四錢，白
朮、茯苓、炙草各三錢，遠志、棗仁各二錢。

【服法】 水煎服。

產后乳少效方

肇慶

陸大成
鄧福英

【處方】 黃芪一兩，川山甲五錢，當歸一兩，通草五
錢，王不留行五錢。

【服法】 用豬腳一只，和藥煮食。

產后乳少方

【處方】 水魚一只，豬蹄一只。

【用法】 共煮湯食，連服三次即效。

產后乳汁不通方 廣州 趙思競

【处方】 白風鱸每次半斤或一斤，油鍋爆過，水滾下，煮熟加少許鹽食之。

產后寧坤至寶丹 汕頭 蔡仰高

【处方】 熟地二兩，生地二兩，益母草一兩，當歸二兩，川芎兩半，赤芍兩半，白芍二兩，茯苓兩半，黃芩兩半，淮山兩半，白朮二兩（土炒），石棗二兩，陳皮兩六，斷艾（用醋炒），香附（制）二兩，藿香一兩，紫蘇五錢，元胡一兩，甘草七錢，椿根皮兩半，查肉一兩，木瓜一兩，麥冬兩半，台烏二兩，續斷兩二，柴胡五錢，砂仁五錢。

另和沉香六錢，血竭八錢，木香一兩，琥珀二兩，童膠珠三兩。

【制法】 將前列部分藥物用米酒濕透，隔宿蒸熟搗爛，日光晒干，研成細末，和沉香以下四味，后煉冬蜜為丸，每粒合市秤錢半。

【服法】 每日早晚空腹各服丸一粒，滾飯湯送下，開水送服亦可。每逢產后可連續服二十粒至三十粒為度，倘經瘀過多，則服十粒，不必多服。

【适应症】 產后惡露不下，血沖頭暈，小腹結痛，周身疼痛，子宮發炎，寒熱往來，遍身浮腫，心氣疼痛。以及經來腹痛，癥瘕固結，口舌焦干，經來血少，并皆治之。

八、异 胎

治妇人异胎經驗方

云浮 伍云佳

【处 方】 人参，归身，大黄，牛膝，雷丸，紅花，丹皮，枳壳，厚朴，桃仁。如嘔加藿香。煎水，服之，当瀉下，俟腹部消后，須進补养之剂，以善其后。

【症狀特征】 舌色藍黑，有斑点，子宫出血，或时聞食臭則吐，腹脹如娠。

九、陰挺（子宮脫出）

治子宮脫出（又名陰挺）方

高要 戴芝林

【处 方】 防党参四兩，北芪四兩，升麻錢半。

【用 法】 上药用酒燉嫩母鷄食即愈。

又 方

丰順 潭江衛协

【处 方】 白薑麻根，入四君子湯，加北芪。各適量。

【用 法】 共煎酒空腹服。

【注 意】 愈后用香蕉花蕊蒸熟，晒干燉酒食，可防止再患。

又 方

丰順 潭江衛协

【处 方】 补中益氣湯。

【用法】 水煎空心服。

【注意】 方內升麻須先用醋制，再用蜜制，北芪須重用。

又 方

丰順 馮子良

【处方】 巴戟二兩（重者四兩）。

【用法】 熬成膠狀，將汁燉猪腸頭食，數次即愈。

又 方

郁南 陈鎮源

【处方】 黑芝麻二兩，升麻一兩，猪大腸一具。

【用法】 三味共煮熟食之即收。

又 方

郁南 草靜風

【处方】 炙北芪八錢，炙党参五錢，白朮四錢，酒川芎三錢，炙草二錢，酒炒寸冬三錢，酒炒杜仲四錢，升麻三錢，酒洗歸身二錢。

【用法】 同煎服，加兩參三錢更好。

治子宮下墜方

清遠 周中敬

【处方】 炙升麻八錢，杜仲四錢，川斷八錢，連須四錢，党参一兩，北芪一兩，炙草三錢，白朮三錢，龜甲四錢八。

【服法】 清水煎服。

治子宮炎症方

廣州 嚴楞法

【处方】 蒲公英粉四分。

【用法】 日服二次，正午一服，下午二時一服，每次服

四分，開水沖服。

治婦人產後子宮下脫外治方

澄海 謝水獅

【處方】 益母草，草樛草，豬母菜，和尚頭草。

【用法】 將上藥煎水洗，后用煨存性柿餅二錢，梅片一分，共研細末摻之。

治子宮下垂外治方

清遠 郭鳴燦

【處方】 茶子（又名茶欬）三兩，黑醋半斤。

【制用法】 先煮醋，后落茶子末，出味時，盛盆中用以熏陰部，每日三次，并服補中益氣湯。

陰門生瘡痛癢外治方

欽縣 鄧清舫

【處方】 蛇床子一兩，花椒三錢，白矾三錢。

【用法】 水十碗煮三四个鐘頭。用盆載之，先熏后洗，每日三數次。

十、乳瘡（包括離奶）

治乳瘡方

郁南 李 冕

【處方】 榕樹叶八兩，搗爛。

【用法】 用酒四兩蒸熟，取汁飲之，其渣加面粉煮糊敷患處。

治乳瘡外治方 郁南 孔燦南

【處方】 黑芝麻二兩，炒焦研末。

【用法】 用茶油調敷患處即消。

又方 郁南 莫遠創

1. 外敷方：

【處方】 蒲公英兩半，山茨菇兩半，防己一兩，樟腦五分，梅片五分。

【用法】 共搗爛敷患處。

2. 內服方：

【處方】 連翹三錢，銀花二錢，花粉三錢，車前三錢，牛子二錢，公英三錢，生地三錢，木通三錢，茯苓三錢，甘草二錢。

【用法】 水煎服。

婦女乳瘡方

【處方】 樗白皮四錢。

【用法】 將上藥炒至九成黑，用酒二碗煎服數次。

又方

【處方】 生香附（又名雷公頭）一兩。

【用法】 將藥搗爛，用酒煎服，剩下藥渣趁熱敷乳痛

处，数次即愈。

治乳癰方

清遠 徐 湛

【处 方】 用白花菜，片糖搗爛敷之，如穿孔的則煮水洗之。

治妇人乳腫（發炎）方

【处 方】 蒲公英、姜黃、白芷、赤芍、花粉、大黃、連召各二錢。

【用 法】 上藥共研末，用燒酒一半、糖一半，調敷患处，即消。

治女人乳痛方

龍川 黃子青

【处 方】 地胆头一兩五錢，檳榔根一兩五錢。

【用 法】 上藥用二分之一泡水食，二分之一捶爛塗之即愈。

治乳瘡驗方

北海 曹炎明

【处 方】 木瓜一斤（或多一些），蝦米二兩，牛肉四兩。

【用 法】 上藥加些水煮熟，但不要落油和鹽，初起時，每天吃一至二次。

【适应症】 乳瘡初起，在未化膿時適用，如已化膿則不見效。

小儿截乳后乳部腫脹方

广州 彭大受

【处 方】 枳壳三錢，麥芽一兩半。

【服 法】 水煎服。

小儿隔乳方

汕头 蔡仰高

【处 方】 黑枝子一錢半，雄黃精一錢半，辰砂五分，輕粉六分。

【用 法】 將上藥共研極細末，用玻璃瓶貯藏勿泄气，用时將藥散五分，調乳汁和勻，用白毛筆蘸藥抹于小孩之眉上。男孩欲隔奶，抹左眉上，女孩則抹右眉上，一小时抹一次，以藥散抹完为止。大約經過四次后，該小儿即不吃奶，其他食物則正常，并无副作用。

【功 效】 帮助小儿断奶，百發百中。

第三篇 小兒科症類

一、口腔病

治小兒口出白痧方

廣州 黎達英

【處方】 人中白一錢，五倍一錢，熟礬砂一錢，正川連一錢，正青黛一錢，生白朮一錢，正梅片三分，烏梅炭三只，正神砂一錢，正珍珠末五分，另地蟬子十只（用新瓦焙干煨存性）。

【制法】 共研成細末。

【用法】 將散吹入口內，流出潺涎而愈。

【適應症】 小兒生出兩三個月後，胎中熱毒，口出白膜痧，不能吃乳。

治小兒口內生含腮（俗名猴袋）方

澄海 林志翔

【處方】 雄精二分，中白二分，凡茶一分，文蛤一分，礬砂二分，朱辰砂三分，川連二分，牛黃一分，真珠一分，油丹二分，麝香一分，琥珀二分，梅片二分。

【用法】 共研成細末，抹口內。

治小儿紅喉症方 龙川 張妙連

【处 方】 元明粉五分，雄精五厘（研粉）。

【用 法】 用鵝羽卷藥粉塗之，再用川連五分煮水漱口。

治小儿胎痰膏方 澄海 黃道生

【处 方】 明竺黃一錢，鵝管石一錢，浮海石一錢，朱砂一錢，正珍珠（豆腐制）一分。

【制 法】 上藥五味研成細末，加上陳李濟抱龍丸一粒，蘇合丸一粒，用罐收貯，加入老冬蜜八錢，封固，燉一枝香久，調勻取用。

【用 法】 在治程愈后，即進服此藥膏，輕者一劑，重者二劑，則病寧息。惟服用時，一周歲以上每劑分作十餘次，沖開水服，早晨服一次，四五個月者酌量減半沖服之。

【适应症】 治小兒四五個月至周歲以上，常發喉頭炎（俗謂胎痰）。

治小兒口內生蛆方

澄海 朱介民

【处 方】 蟾珠六厘，硼砂六分，元明粉分半，朱砂二分，中白一分，梅片一分。

【用 法】 共研成細末，抹口內。又外用可貼腳底，但須加吳茱、胡椒，重者再加琥珀，皆研末，用飯粒和勻，男的貼左腳底，女的貼右腳底，每次貼一點半鐘。

治小儿口内生蛆或牙龈糜烂方

澄海 陈文波

【处 方】 煨黄柏三分，煨硼砂三分，黄连三分，中白三分，雄精二分，儿茶二分，青黛二分，煨弓蕉皮三分，煨蜂房二分，甘草二分，朱砂二分，珍珠一分，梅片一分，麝香一分。

【用 法】 共研成细末，另用枸杞菜叶二钱，硼砂六分，煎水洗口内患处，后抹药散。

治小儿弄舌方 清远 楊紹初

【处 方】 石膏五钱，甘草一钱，知母三钱，粳米少许。

【用 法】 将上药煎服，继以大叶芙蓉（如无叶用花），搗爛，以鸡蛋拌匀，敷心口及脐中，并以雄黄点舌尖。

治儿童鼻中出血不止方

澄海 李華坤

【处 方】 葵扇目煨灰存性，和梅片少许，研末吹入鼻中。

治儿童头上生血箭出血不止方

澄海 李華坤

【处 方】 新艾捶蜜和梅片贴之，即愈。

治小儿虎头蛆（小儿口瘡）方

澄海 陈祿生

【处 方】 蜂房钱半，川连一钱，朱砂五分，黄柏八分，

油丹錢半，中白五分，煨硼砂一錢，梅片二分，煨牙蕉皮（不拘多少）。

【用法】 共研成細末抹之。

走馬牙疳方

潮安 辜寬文

【处方】 砒石一分，珍珠末一分，人中白二分，朱砂五分，黑側柏二錢，梅片五分。

【制用法】 砒石用瘦猪肉四兩切片共捶爛，沙鼎煨成炭，烟尽为度，同余药共研成細末，用适量敷患处。

【适应症】 本病又称口颊坏疽，多发生于儿童，口腔粘膜牙龈发生坏疽性病变，急速蔓延附近组织如颜面等处，（中医称走馬牙疳，形容迅速变化），急性型蔓延極快，且全身症状劇烈，几天内即呈極度衰弱，并發腹瀉，譫妄，昏迷，很快归于死亡，年龄愈小预后愈不良。

走馬牙疳效方

黃舉昌

【处方】 人中白一錢，儿茶一錢，青黛一錢，硼砂一錢，薄荷五錢，元明粉五錢，馬勃五錢，上梅片五分。

【用法】 共研成細末，涂上患处。

【适应症】 走馬牙疳，咽喉疼痛，舌腫齦臭，并牙出血爛及于口等。

又方

潮安 王子貞

【处方】 人中白二錢，煨硼砂二錢，川黃連二錢，煨蜂房一錢，制油虫二錢，正青黛五分，梅片五分。

【用法】 共研成細末，敷患处。

【适应症】 潰瘍性口內炎，亦称牙疳。瘍科心得把牙疳分为二种，一是風熱牙疳（指本方应用），一是走馬牙疳（口頰坏疽），風熱牙疳多發生于身体衰弱小儿，而口腔衛生欠佳的小孩更为多見，系一种特發型牙齦炎，發病部位有的局限一处，有时蔓及全口和舌面。

又 方

潮安 陈英东

【处方】 硼砂三分，川連三分，冰片三分，人中白一錢。

【用法】 共研成細末敷患处。

小儿鎖喉散

广州 趙思競

【处方】 全蝎梢六分（浸淡炒），僵蚕一錢（炒），甘草六分，瞿麥一錢，川烏尖（制）六分，蜈蚣三条（去头足）。

【用法】 研成末，先用少許吹入鼻內，但得嚏者極重就可治，后用薄荷七片煎湯，送服藥末，每次二分。

【适应症】 嬰孩三朝七日不飲乳，撮口口噤症狀。

初生儿摻臍法

封开 鄧琮林

【处方】 枯矾二錢半，硼砂三錢半，朱砂五分，冰片、麝香各五厘。

【用法】 共研細末，在嬰兒臍帶断后，即以藥摻之，可免臍風。

【适应症】 預防臍風。

治小儿初生臍風（封臍法）方

澄海 湯杰欽

【处 方】 魚臍草叶（青草）二錢，抱龍丸一粒，苏合丸一粒，麝香末一分。

【用 法】 上药四样搗爛成泥狀，封臍。

二、吐 乳

治小儿吐乳方 云浮 叶滿枝

【处 方】 馬尾茜取核四至五錢，煎水內服，即止。

小儿嘔乳方 封开 陈鏡周

【处 方】 地鷄虫（又名猪仔，生長在屋內爛桶底，盆底等处，灰藍色，象半边豆形）二三十只，加些生鹽同搗爛，冲开水或人乳給小几飲。如寒痰用銅壳炙焦研末，煎陈皮灯芯薄荷湯冲服，或乳汁开亦可。

三、泄 瀉

治小儿水瀉方 云浮 曾仲煉

【处 方】 楊桃一兩，水煎服。

治小儿夏日泄瀉方

云浮 李茂釗

【处 方】 黄土（土穴中的）一兩，薄荷（后下）八分，竹叶三錢，陈倉米三錢，麥芽四錢，南豆衣五錢，蓮梗二錢，水煎，內服。

治小儿泄瀉屢效方

云浮 趙裕才

【处 方】 白茯苓、車前子各三錢，肇實三錢，老蓮肉五錢，破故紙二錢，貫白朮三錢，慢火濃煎，內服。

治小儿泄瀉方 云浮 保民診所

【处 方】 藿香錢半，丁香一錢，白蓮二錢，水煎服。

治小儿水瀉單方 广州 陈敬紹

【处 方】 管仲心六錢，防風一錢，金蟬蛻廿只。

【用 法】 清水二碗煎至一碗，每日分三次服食。

【适应症】 急性腸炎，及流行起之急性胃炎，举凡水瀉下痢腹痛，渴水厭食，体温达三十九度至四十度。

治小儿腸炎泄瀉下痢外治方

丰順 王就成

【处 方】 干羊屎二十五枚，薄荷末一錢。

【用 法】 二味滴入适量米酒，共捶成餅封臍，宜冷用，

有驅風止痛止瀉作用，屢試屢效。

治小兒單燒久熱兼腹瀉方

龍川 謝作材

【處方】 柴胡一錢五分，白芍一錢五分，炙甘草五分，黃芩一錢，青蒿一錢五分，姜活七分，蘇梗一錢五分，扁豆三錢，連召一錢五分，厚朴一錢，神麴三錢，檳榔一錢五分，生姜一片，大棗二枚，荊芥七分。

【用法】 水煎服。

治小兒泄瀉引飲方

海口 吳安瀾

【處方】 糞坑（廁所）底之磚瓦片或久年便溺缸之瓦片，（手掌大）三四塊。

【用法】 將磚瓦片洗淨，陰干，投入烈火爐中燒令透紅，淬入清水碗內，取出，俟水溫暖時，即與病者盡量飲之，其病即解。

小兒慢驚水瀉方 封開 丘水和

【處方】 黃牛屎，車前草，旧早米，老產粟（四味同炒過炭為度），同陰陽水煎服，即止泄瀉。

【編者按】 陳鏡周也是用這幾味藥治此症，但陳君于方后注得較詳，茲節錄之如下：“四味藥炒過炭，以青烟起完為止，用一大湯碗清水傾落鍋內，隨手溜起，澄清，給兒童連飲四五次，生津止渴止疴，再飲三四次即愈。”

四、疳積（包括蛔虫）

治胃吐酸消化不良驗方

丰順 陈名中

【处 方】 春砂仁錢半，川厚朴錢半，炒白朮二錢，明党參錢半，南木香一錢，云山楂一錢，炒麥芽一錢，赤茯苓二錢，藿香叶二錢，制蒼朮錢半，上神麴錢半，京三棱錢半。

【用 法】 共研極細末，每天服三次，每次服七分，調以等量白糖，冲水飯后服。

治小兒腹脹方 潮安 吳志弘

【处 方】 生柚皮晒干瓦上煨黑。

【用 法】 研成細末，每天服二至三次，每次二至三分。

【适应症】 对乳兒消化不良，胃腸充气有效。

小兒疳積散方 云浮 曾兆慎

【处 方】 蛤壳三錢，淡古三錢，珍珠一分，枯礬錢半，胆礬錢半，米砂三錢，鷄內金錢半，共研成細末，为十八包。

【用 法】 一至二歲服五厘，三至五歲每次服二分，七至八歲服三分。（經試屢驗）

治小兒疳積方 云浮 苏善卿

【处 方】 人中白三錢，鷄內金三錢，淡古三錢，研末分多次內服。

治小儿五疳散方 广州 鄧智卿

【处 方】 朱砂一錢，海螵蛸三錢，水仙子二錢，淮山二錢，土炒白朮二錢，夜明砂六分，蟬肚六分，珍珠末五分，熟礪砂六分，黃皮蟾蜍二只（去腸肚、眼睛）煨存性，胆破者勿用。

【用 法】 共研細末，用羊肝二兩（去淨筋膜）煎水，于晨早时开散五分服之，有奇效。并常用蟬蛻，麥冬，甘草，菊花等煎茶常服。

【适应症】 小儿五疳（即心、肝、肺、脾、腎疳，痘痲后眼膜睛翳）。

疳積眼經驗方 封开 鄧琮林

【处 方】 海螵蛸、蛤粉、金蟬蛻、正辰砂、谷精草、夜明砂、石决明、粉甘草各三錢，白蒺藜五錢。

【用 法】 共研細末，蒸猪肝食，每次用三錢。

【适应症】 肌肉羸瘦，眼胞重垂，艰澀难开，翳膜遮睛等症。

疳積退翳散 封开 罗初馨

【处 方】 水仙子、使君子各三錢，淮山、海螵蛸各二錢，正辰砂、蟬蛻各一錢。

【用 法】 共研細末，每用七分，蒸猪、鷄、鴨肝，加些酒和生鹽，不放油，或开粥食亦可。

【适应症】 疳積眼上云翳，艰澀难开，黃昏鷄盲等症。

小儿疳積或癰痘愈后眼上翳膜方

封开 失名

【处 方】 海螺蛸、使君肉、水仙子、煅石决、薏苡仁各錢半，夜明砂、朱砂各二錢，熟礪砂八分，正珍珠二分。

【用 法】 共研成細末，朱砂、珍珠二味后入。

治小儿疳積伤目方

丰順 潭江衛协

【处 方】 草决明、石决明、生寒水石各三錢，谷精錢半，海螺蛸錢半，夜明砂二錢，淘淨。

【用 法】 共研末，和猪或鷄肝燉服。

治小儿夜盲症方 丰順 潭江衛协

【处 方】 蒼朮二錢，煮猪或鷄肝食之愈。

灵效疳積散

广州救济分会 趙良杰

【处 方】 金錢草二兩，黄花鱸叶一兩，均晒干量。

【用 法】 火炕存性，研成細末，約分一百包，每天服二次，飯后服。先將散入猪肝內蒸熟服之，或用稀粥調服，輕症連服六天即愈，重者半月，服后檢查糞便，每混有大量幼虫。

【适应症】 殺虫，消積，退热，健脾。

奇效疳積散 云浮 方全診所

【處方】 炒厚朴一兩，廣陳皮八錢，粉甘草七錢，真蘆薈七錢，白燕蕒五錢，真青黛三錢，百草霜二錢，旋復花錢半。

【用法】 共研細末，每一歲用藥一分，用燈芯水，于早上空腹時送服，愈後，仍當用藥理脾。

【適應症】 小兒疳積，面黃肌瘦，小便如米泔，大便瀉黃酸臭，頭皮干枯，毛髮稀疏，甚至目眶羞明，睛生云翳，形体骨立，夜熱早涼，等症。

小兒疳積方 云浮 蘇善卿

【處方】 人中白三錢，鷄內金三錢，淡古三錢，研末內服。

小兒疳積方 云浮 趙友昌

【處方】 爐甘石(煅飛過)五錢，冬君肉三錢，礪砂五分。

【用法】 共研細末，一至二歲每服五厘，三至五歲每服一分，余可量小兒大小酌給之。

治疳積方 云浮 六合診所

【處方】 煅牡蠣一兩，煅墨魚骨二兩，熟礪砂五錢，炒土別五錢，煅甘石一兩，炒冬君一兩，炒樅子三錢，熟白朮一兩，山楂五錢，朱砂一兩，炒水仙子一兩，枯礬五錢。

【用法】 共研細末，每次服一錢米湯送下。

治小儿疳積犯眼（不敢視物）方

澄海 陈文波

【处 方】 煅蛤壳三錢，夜明砂三錢，谷精子三錢。

【服 法】 上药共研成細末，用淘米水燉鷄肝或猪肝服之（食肝并湯）。

小儿疳病方

陽春 何夢蓮

【处 方】 大棗一百枚（去核），象核之大小，实以大黃，外裹以面，煨極熟，搗为丸，如小棗核大，每次服七丸，日再服。

治疳積上眼白翳遮眼驗方

云浮 彭冠卿

【处 方】 肉果（面裹煨）二只，史君子（去壳）五只，胡黃連一錢，白蒺藜（炒去刺）一錢，蘆薈一錢，共研細末，鷄肝一具，酒漿少許，同搗爛去渣，入前药末，調勻，蒸熟食之，吃一二服，立愈。本方經治愈多人，确有奇驗。

【附 注】 本方傳自名醫周鶴仙，屢試屢驗，并治小儿肚大泄瀉，面黃肌瘦等症。神效。

小儿疳積肥儿餅糕方

新丰 李 爵

【处 方】 使君肉二兩，海螵蛸二兩（用米泔水浸过，晒干去骨皮取粉），夜明砂六錢，上朱砂三錢，正淮山二

錢，山楂四錢（去核），神麴四錢，白朮四錢，茯神四錢，水仙子干四兩，薄荷叶二兩，綠豆八兩，蘇鼠（又名錢鼠）乙只（去腸臟，煨存性）。

【制 法】 上藥研成末，加白糖為餅，量服。

治十歲以內孩童肚脹方

欽縣 鄧清舫

【處 方】 新桑蛸三只（煨灰存性），蜘蛛壳三只（煨灰），韭菜五條。

【用 法】 先將韭菜煮水沖服上列二味藥，每次服二分或三分。

【禁 忌】 糯米，酸味，及魚腥等物。

肥兒丸

云浮 趙裕才

【處 方】 炒神麴五錢，胡黃連五錢，炒麥芽五錢，肉豆蔻二錢（面裹煨去油），尖檳榔（去臍）一只，广木香一錢，史君肉（去淨壳）二錢半，荊三棱二錢，莪朮二錢，鷄內金三錢。

【用 法】 共研細末，蒸餅為丸，如黍米大，米湯送下五分，漸增至一錢為限。

防治小兒食積方 东莞 單耀明

【處 方】 大茶子殼一兩（打碎），鷄蛋一至三枚。

【用 法】 藥與蛋一同放入清水煎煮至一小時左右，去水取蛋食之。

小儿蛔虫病方 潮安 許瑞雍

【处 方】 苦楝根二層皮六錢至八錢。

【用 法】 水煎一次服。用于三歲至四歲小儿。

【适应症】 小儿与成人蛔虫病均适用，对蛔虫病合并勾虫感染，服此根皮并能同时驅除勾虫，少有不快副作用，且同时无需服瀉剂。

五、夜 啼

治小儿夜啼方 潮安 陈德友

【处 方】 金蟬（去上截）十个，朱砂三分。

【服 法】 上药研成細末，分为二次，每次用勾藤一錢，灯芯十条，煎水冲服，每天早晚各服一次。

【适应症】 哺乳小儿易發夜啼，每突然在睡眠中驚醒，啼哭尖銳，面容恐怖，号泣不止，心悸不安。

六、驚 風

治小儿急驚痰癇方

潮安 刘隆圖

【处 方】 正真珠末七分，壁虎一錢，姜蚕一錢五分，全蝎一錢，胆星一錢五分，防風七分，天麻一錢五分，制白附一錢五分，朱砂一錢，辰砂一錢，麝香五厘，九節一錢，古板金箔五張，大黃一錢，雄精一錢五分，苏荷七分，鍾乳粉七分，川連一錢，苏半夏一錢，川貝一

錢，薑霜一錢五分，竹黃一錢，乙金一錢。

【用法】 上藥研成極細末，二歲小兒用藥二分五厘，五歲三分，以足銀器一件，燈芯十五條，車前草三叶，煎水沖服。

【適應症】 各種腦神經症狀發作期。

又方

潮安 陳明昭

【處方】 正真珠末五分，粒牛黃五分，川麝香二分，煅礞石二錢，雙勾藤三錢，上壁虎一錢五分，童胆星一錢五分，明竹黃二錢，正朱砂一錢五分，川天麻一錢五分，白附子一錢五分，沉香一錢，淨全蝎十個，古板金十片。

【制用法】 研成極細末，每日服一次，一歲以下服三分，三歲服五分，五歲服七分，五歲以上服八分至一錢，用開水沖服。

七厘散

順德容奇 李庭芬

【處方】 大板金六張，牛黃八分，香附三分，勾藤八分，珍珠末五分，朱砂四分，血珀三分，金蟬蛻八分，寸香分半，菖蒲八分。

【服法】 用開水沖上開藥末，一歲以下小兒每次服量二分。

【適應症】 治小兒昏迷厥脫，手足抽搐。

保赤丹

順德容奇 李庭芬

【處方】 制胆星五錢，寸香分半，牛黃一分，薄荷叶一

錢，朱砂二錢半，上梅片一分半，炒牙皂七分，炒姜蚕一錢二分。

【服法】 以上各藥共研成極細末，一歲以下嬰兒每次服量二分，用開水一湯匙沖服。

【適應症】 同上方。

治小兒慢驚風

順德 齊 杏 呂秉衡

【處方】 熟地五錢，焦朮三錢，炙芪二錢，炙黨參三錢，當歸一錢，固紙一錢，炒棗仁二錢，杞子二錢，山萸肉一錢，炙甘草一錢，胡桃肉連壳二個打爛，南桂七分，炮姜七分，生薑三片，南棗三枚。

【服法】 用灶心土二兩先煎水去渣，取水加附子二錢同煎，頻頻灌服，重症照方日夜服二次。

【適應症】 治患急慢驚風抽搐昏迷。

治小兒驚風方

丰順 羅泮三

【處方】 僵蚕錢二，牛蒡錢半，防風錢三，条芩錢半，金錫一錢，知母一錢，天麻一錢，胆星七分，金蟬三只，荊芥五分，川足一條（焙酥研末沖），竹黃八分，朱砂沖四分（原八分），水一碗二，煎四分服。

小兒驚痰散

廣州 劉月山

【處方】 熟枯礞四分，珍珠五分，朱砂五分，地鼈（又名肥猪）四錢焙干研末。

【制 法】 將藥搗爛研成細末。

【用 法】 開水沖服，日服一次，乳兒每服五厘，小兒每服一分。

【適應症】 小兒身熱痰鳴，連聲咳，急驚。

急驚風方

封開 鍾毓芬

【處 方】 胆星、竹黃、薄荷、甘草各一錢，浙貝錢半，朱砂八分，川連五分，蟬蛻七只。

【用 法】 水煎。未服此方前，先用蕉根蚯蚓二條，搗爛沖開水飲以救急。

【適應症】 面紅，眼斜，口動，手足發熱。

急驚風方

封開 陳秀峰

【處 方】 竹魚胆（小兒一歲用整個四分之一，二歲用半個，三歲用四分之三，研末），勾藤、生枝、僵蚕、木通、竹黃各四錢。

【用 法】 各藥煎湯，乘熱放入魚胆末，攪勻給小兒飲。

驚風痰迷方

封開 張岐山

【處 方】 羚羊角錢半（先煎），天竺黃二錢，川連錢半，麝香五厘或一分，梅片末、牛黃末各一錢，珍珠末一分，珠、麝、牛、冰四味同研末。

【用 法】 先以水碗許，煎羚羊至半碗，才放竹黃川連二味，煎至一大茶盅，斟出碗后，以小半盅開珠、射、牛、冰末給小兒飲，如牙關已閉，用竹筷撬開灌藥。

【适应症】 小儿驚風，痰迷不語，高热。

小儿通关散（又名一六千金散）

封开 伍学傳

【处 方】 雄黃、朱砂、川連、牙皂、細辛、白蕤各八分，川貝一錢，全蝎、天麻各六分，珍珠、牛黃、冰片各三分，胆星四分，甘草二分，僵蚕六分。

【用 法】 上药共研細末，密貯，遇此症用一分至二分，量儿童大小，开开水或茶灌下即苏。

小儿急驚風方 封开 黃会周

【处 方】 用七星草捶細冲开水服，可开竅及省人事。

又外治方 封开 徐海汪

【处 方】 鷄儿勒洞苗，和鷄蛋白捶勻，擦四肢，即止抽搐。

治小儿急驚方 澄海 吳仰松

【处 方】 痰鳴时，以大拇指控其人中，然后将搗爛的石榴叶心放其口內，用开水送服。

治小儿胎痰急驚風痰万应丹方

澄海 蔡春炎

【处 方】 珍珠一錢，麝香一錢，琥珀二錢，古板金箔七十張，煅礞石二錢，青黛五分，甘草末一錢，牛黃一錢，

竺黃二錢，牙硝一錢，金蟬七十只，姜蚕三錢，犀角一錢，梅片一錢，酒軍二錢，海石二錢，胆星二錢，奇南香一錢，煅礞砂一錢，云連二錢，雄黃二錢，管石二錢。

【服法】 上藥共研細末，用灯芯煮水送服。每次成人一錢，小兒減半。

治小兒中熱發抽方

丰順 王就成

【處方】 胆草錢半，生枝一錢，柴胡七分，防風八分，羌蚕七分，川連八分，条芩八分，双鉤七分，車前六分。

小兒至寶丹

新丰 李爵

【處方】 雄黃二錢半，山藥一兩(炒)，南薄荷二錢(去根)，九轉南星一兩，天竺黃五錢，飛朱砂二錢半，麝香三分。

【用法】 將藥研成細末，煉蜜為丸，棗仁大，金箔為衣，每次服十余粒，薄荷湯送下。

【適應症】 諸驚抽搐，四時感冒，傳染瘟疫，煩躁不寧，痰咳氣急，及瘡疹欲出，發搐等症。

小兒發高熱不退外治方

封开 梁云山

【處方】 鵝不食草(一大握)約重半斤，捶爛放盆中，加入炒至老黃色的生鹽二兩，隨用開水沖，隨沖隨將藥和鹽攪勻，約水大熱不灼手時，給小兒洗身，并將藥渣

擦小儿額上及手足，高热就漸退。

热清鎮驚散

【处 方】 連翹五分，柴胡五分，地骨五分，絲草五分，
勾藤五分，黃連五分，黑枝子五分，云苓五分，寸冬五
分，木通五分，黃芩五分，車前五分，甘草三分，薄荷
三分，竹叶三分，灯芯十条。

【服 法】 共研成極細末，用开水送下，分数次服。

【适应症】 治小儿急驚初起，身热面赤，搐搦上視，牙关
緊硬，口鼻中气热，痰涎潮涌，忽然而發生。

小儿慢驚方

封开 莫瀚洲

【处 方】 熟地三錢，潯参三分，白朮、炙草、云苓、淮山各
一錢，萸肉八分，肉桂二分，姜炭六分，黑棗二只，水煎服。

【适应症】 面唇淡白，或泄瀉，手足冰冷等症。

又 方

封开 鍾毓芬

【处 方】 石柱参、炙甘草各一錢，肉桂三分，白朮、茯
苓各二錢，全蝎錢半，水煎服。

【适应症】 面唇淡白，或泄瀉，手足冰冷等症。

小儿慢脾方

封开 彭秋元

【处 方】 丁香、炙草各錢半，胡椒八分，烏梅二只，肉
桂二分，干姜五分，水煎服。

【适应症】 泄瀉不止，神色疲倦等。

治慢驚風水瀉方 广州 趙思競

【处 方】 木通（炒）、火麻仁各二分，远志、蓮蕊、柿霜（冲）各三錢，薺苈、天冬、牛膝、蠟梅花（后下）各二錢。

【服 法】 清水煎服。

治小儿中風冷抽，口角流涎，角弓反張方 丰順 王就成

【处 方】 生党錢半，白朮一錢，川茯二錢，炙草五分，陈皮六分，半夏六分，附子五分，干姜三分，肉桂五分，姜蚕七分，勾藤八分，防風八分，水煎服。

七、咳嗽（包括百日咳、奶哮）

治慢性气管炎及百日咳方

潮安 謝平山

【处 方】 枇杷叶三十片，百部五錢，白前三錢，薺苈八錢，苏子二錢，雪蜜八兩，飴糖四兩，猪腦二匙。

【制 法】 將百部、白前、薺苈、苏子研成末，將杷叶煎成濃汁半碗，与以上各药混和成羔，最后加入生姜汁二匙和匀。

【服 法】 每天服三次，每次服半匙，以愈为限。

【适应症】 久咳多痰，百日咳。

【戒 忌】 忌食蝦、蟹、蛋及刺激性食物。

治小兒百日咳方 潮安 林濟川

【處方】 款冬花一錢，川貝一錢，茯苓一錢五分，紫苑一錢五分，北杏二錢，桑白二錢，五味三分，烏梅二只（煎爛搗碎取仁用）。

【服法】 清水煎服，咳血加茅根、藕節各二錢。

又方

【處方】 天冬五錢，麥冬五錢，百部根三錢，鮮竹茹二錢，瓜蒌仁二錢，橘紅皮二錢，如鼻衄加白茅根五錢，藕節五錢。

【服法】 用水二百西西，煎成九十西西，二至三歲小兒，分三次服，四小時服一次。

治百日咳方 封川江口 梁云生

【處方】 杏仁三錢，桔梗二錢，陳皮錢半，竹茹二錢，麻黃八分，冬花二錢，法夏二錢，甘草錢半。

【服法】 用水二碗煎成一碗，分二次溫服，每四小時服一次，服后咳嗽嘔吐均減少，即服第二方。

第二方

【處方】 腹皮二錢，陳皮錢半，蕤仁三錢（去油），麻黃八分，杏仁三錢，石膏二錢，竹黃二錢，蘇子二錢，苡米三錢，冬花二錢，川貝二錢，甘草錢半。

【服法】 照前方分服，服后痰咳已少，面腳浮腫亦消，

接服下第三方。

第三方

【处 方】 杏仁三錢，苡米四錢，冬瓜仁三錢，枝子仁二錢，葦莖二錢，桔梗二錢，冬花三錢，陈皮錢半，桑白二錢，法夏二錢，紫苑三錢，甘草錢半。

【服 法】 同上方，咳痰等减少后，仍須連服三剂。才能痊愈。

又 方

河源 彭其昌

【处 方】 白前三錢，百部五錢，蕤仁二錢，桔梗錢半，天冬三錢，麥冬三錢，紫苑三錢，冬花二錢，百合二錢，竹茹六分。

【服 法】 共煎水分三次服。

小儿百日咳方

何焯山

【处 方】 葦莖三錢，冬瓜仁三錢，川貝三錢，公英二錢，金銀花藤四錢，生杭菊二錢，馬鞭草二錢，桃仁錢半，百部根二錢，丁力子一錢，錦黃錢半。

【服 法】 用水二盅煎至半盅服，食后排便極臭。

【适应症】 中医名頓膈，面目浮腫，眼白睛發紅点，口鼻出血，甚至痙攣而有驚厥，窒塞之象。

治百日咳方

丰順 曾群光

【处 方】 川黃連三錢，共研末，用膠壳入末，每个重八

厘，用开水送下。每天服二至三次，每次一至二个，重症服五至七天可愈。

又 方

陈慎仁

【处 方】 南杏仁二錢（去皮油），甜丁力八分（隔紙略炒），白前草錢半，川百部一錢，枇杷叶錢半（去毛），正川貝八分，川薏仁錢半（去油），木通八分，半蒡子錢半（打碎），服子八分（略炒），天竺黃錢半，薄荷叶八分。

【用 法】 用开水一碗，煎至一茶盅，頻頻服下，服藥后忌食葷腥酸辣等味。周歲內之小兒原方煎好后分作二次服下，每次須隔二小時，三歲兒童照原方一次服，若五六歲兒童依原方酌量增加分量。

【附 注】 獻方者近二年在太埔銀溪區曾治愈三十余人。

治小兒百日咳方 云浮 李劍茂

【处 方】 復花二錢，蒸百部一錢，海浮石二錢，桑叶二錢，竹叶二錢，桔梗錢半，馬兜鈴二錢，川貝一錢，木通錢半，天花粉二錢，蘇子錢半，煎服。

又 方

云浮 梁毅修

【处 方】 百部三錢，浮海石三錢，金礞石三錢，蘇梗錢半，麻黃一錢，前胡二錢，丁力子三錢，北杏仁二錢，復花錢半，貝母二錢，水煎服，如五歲以下小兒，減半服之。

又 方（輕揚宣肺法）

【處方】 象貝三錢，括蕁皮三錢，北杏仁三錢，前胡錢半，蜜炙枇杷叶三錢，蘇子（微炒）二錢，水煎去渣加入大蒜水糖漿和勻服。

治小兒百日咳方

【處方】 玉竹二錢（干切），法夏二錢，白前、百部、火麻仁各三錢，炙草、訶子、菖蒲、郁李仁各四錢。

【服法】 清水煎服。

治小兒百日咳驗方

欽縣 張明邦

【處方】 貝母五錢，生甘草二錢，

【服法】 共研末，砂糖為丸，如梧桐子大，每次服五丸。

治小兒陰虛發熱咳嗽方

龍川 駱欽平

【處方】 鹽銀柴二錢，鹽鱉甲三錢，淮山三錢，鹽澤瀉一錢五分，茯苓二錢，朱苓一錢五分，百合二錢，丹皮一錢五分，水熟地三錢，白菊一錢五分，陳皮一錢，鹽知母二錢，加小洋參一錢。

【用法】 煎水服。

【適應症】 小兒陰虛發熱，咳嗽，口渴，面黃。

八、癩 疹

治癩疹出不齊外治方

云浮 黎伯鹽

【處方】 生芫荽一握，搗爛，酒水和煎至沸，搓擦全身，頭、目、手、足，復被取汗，則必出齊。

癩疹初期方

【處方】 葛根三錢，連翹三錢，杏仁三錢，牛子二錢，竹葉二錢，茯苓三錢，澤瀉二錢，桔梗二錢，銀花三錢，陳皮八分，苡米三錢，扁豆衣三錢，麥芽三錢，花粉二錢，甘草一錢，燈芯二子。

【用法】 水兩碗煎至一碗，分二次溫服，連服二劑。

【適應症】 癩疹已出，發燒咳嗽口渴，泄瀉，食欲不振等症。

【禁忌】 腥膩燥熱。

又 方

【處方】 紅天葵二錢，銀花二錢，葛根二錢，北紫草二錢，北杏二錢，連翹二錢，薄荷八分，甘草八分，杷葉三錢（去毛），浙貝錢半，桔梗二錢，荊芥一錢。

【用法】 水一碗煎成半碗溫服。（此方是三至七歲分量，嬰兒五個月至一歲減半。）

【適應症】 癩疹初期，發熱咳嗽，眼疲倦，耳背起紅筋。

【禁忌】 肉類，油滯生冷。

治小儿麻疹出不起方

云浮 保民診所

【处 方】 蟬蛻二錢，干葛二錢，蘇叶二錢，服之則出。

治麻疹后泄瀉或血痢无度方

云浮 余少英

【处 方】 豬甲蘭叶，搗爛，加鹽，冲开水服之。

又 方

封开 陈德安

【处 方】 紅蘿卜干四錢，北紫草二錢，葛根二錢，白头翁二錢，檳片一錢，赤芍二錢，地榆二錢，枳壳八分，槐花二錢，銀花二錢，川連七分，木棉花錢半。

【用 法】 水一碗半煎成半碗溫服。（此方是三至七歲分量，嬰兒五个月至一歲減半。）

【适应症】 麻疹紅白痢，痧粒出齐未收，忽然下痢，紅白相間，里急后重，每天下痢十一、二次，肚痛口渴。

治麻疹后眼起膜方 清远 曹昌福

【处 方】 龍衣（煨）、蒺藜各二錢。

【服 法】 上藥研末，蒸豬肝食。

又外治方

清远 曹昌福

【处 方】 麝香一分，雄黃精五分，梅片二分，朱砂五分，輕粉二分。

【用法】 共研細末，右眼起膜吹左耳，左眼起膜吹右耳，每次吹五厘，日吹兩三次。

治癰后肺炎外治方

清遠 植修己

【處方】 麝香一分，木香五分，丁香五分，雄黃一錢。

【用法】 上藥研成末，放在病人心口，即把去腸臟的生鷄仔噴些燒酒后，立敷上病人胸部，每見腹响，大約敷一点鐘久即去。

預防癰疹方

湛江 吳漢龍

【處方】 紫草茸五錢，白朮二錢，广木香一錢，甘草一錢，黃連一錢，正辰砂一錢。

【制用法】 將各藥切碎，隔水蒸透晒干，研成細末。一歲至三歲，服半劑，四歲至十歲服一劑，十歲以上連服二劑，每次服量視兒童大小酌定，分數次服。

【適應症】 在未患過癰疹的小兒，于流行季節前，預服此方，可免患癰疹，屢試屢效。

又方

湛江 吳漢龍

【處方】 取初生兒臍帶（放瓦上焙干為末，入辰砂研成極細末，用甘草水飛過。）拌入黃連、甘草末各五分，和蜜糖拌勻。

【服法】 在流行季節前，預給一歲的小兒服食，分量未詳。

【适应症】 小儿經服此药，于流行区域内，兩年，并无被傳染麻疹。

九、皮膚胎毒

胎毒洗方

封开 馮飛鵠

【处 方】 勾藤二錢，甘草一錢。

【用 法】 煮水洗，每日洗兩三次可愈。

【适应症】 小儿胎毒口內生白粒。

治小儿胎毒洗瘡方

丰順 潭江衛协

【处 方】 用高脚凉傘梗燒成灰研末混茶油抹之。

胎毒搽方

封开 陈电初

【处 方】 雄黄一錢，皂刺七分，京粉、床子各五分，白芷、黄丹各一錢。

【用 法】 共研末，調开水搽二三次可愈。

【适应症】 小儿口內生白粒。

【編者按】 該方京粉可能是水粉。

胎毒爛瘡方

封开 唐乃万

【处 方】 蝌蚪不拘多少。

【用 法】 同石灰放在一只盅子內，經過六個月，化成清水后，將水搽之。

【适应症】 头面和全身爛瘡。

小儿爛头瘡方 封开 何仲平

【处 方】 吳萸一兩，熟松香五錢，生猪油四兩，肥猪肉亦可。

【用 法】 將藥放瓦器內，文火熬至焦黑色，去藥，后入松香融化待用，遇有爛头，先以枯矾煮水洗净瘡膿，隨搽此膏。

【适应症】 小儿爛头瘡。

胎毒方 揭陽 李仕珍

【处 方】 馬下烏青草六錢和猪肉煎水，服三四剂見效。

【适应症】 此症一發十余粒，發无定处。

第四篇 五官科症類

一、眼 科

清明去翳湯

廣州 高健伯 林秀蘭

【處方】 谷精三錢，木賊三錢，金蟬蛻一錢，土桑白五錢（先煎），赤芍三錢，丹皮三錢。

【制法】 淨水一市斤煎取三兩。

【用法】 臨睡前一次服食，一歲以下服三分之一，一至十歲服三分之二，大人照原方服，重者連服二三帖。

【適應症】 肝肺經有風熱，症狀目起紅根（眼球發炎），畏日，羞明，赤痛。

砂眼外治方

廣州 馮天慈

【處方】 川黃連五十份，黃藤一百份，梅片三份。

【用法】 蜜作小丸，開冷茶或淨開水泡化，外搽數次痊愈。

【適應症】 凡患砂眼或作痛者。

治熱眼和砂眼外治方

欽縣 石耀碧

【處方】 用雞蛋一至二只，在蛋的兩頭各刺一孔，用干

淨手巾一條，濕水后鋪開，用口吹蛋的一頭，使蛋白流于巾上，加食鹽少許攪勻，使病者躺下，把手巾敷在眼上，熱時換涼的一邊，每日敷二至三次。

【適應症】 眼目紅腫，流淚，怕光，刺痛，發痒，和眼球起白膜等。

治眼科經驗点眼藥方

云浮 刘枝庭

【處方】 煨爐甘石三兩，川連一兩半，胆草一兩半，先將川連胆草二味用水三碗煎成汁去渣，后放甘石落汁浸透晒干研末加梅片五分，珍珠二分，和研細末，用玻璃瓶收貯，以蠟封口，勿泄藥氣。

【適應症】 眼痛紅腫，赤痛起膜，諸般眼痛。

【用法】 用人乳汁或水開藥，用灯心点入眼內，其痛即止，其膜自退，此方有百發百中之效。

治眼起点上膜外治方

云浮 欧仲銘

【處方】 田基黃，犁眼草，罗白菜芯，搗蝦公肉敷之。

治眼科經驗方 云浮 鄧煥延

【處方】 蒺藜四錢，柴胡二錢，荆芥二錢，玄參四錢，天麻三錢，姜活錢半，赤芍三錢，生軍三錢，紅花錢半，茜根三錢，川芎一錢，生地八錢，水煎服之。

【適應症】 兩目紅腫，羞明下泪，兩額作痛等症。

治紅腫赤眼作痒流泪外治方

云浮 林均令

【处 方】 水石榴，假醋味，和鷄蛋白搗爛敷患处。

热眼外治法

云浮 江潤林

【处 方】 白朴硝一兩，水十二兩，浸潤，用消毒的鴨毛蘸滴眼內，立即止痛，并能治无名腫毒痛痒，已潰爛者忌用。

風热眼痛方

广州 鍾滿枝

【处 方】 白背樹头（适量）。

【用 法】 將葯煮瘦猪肉食三四次。

治風热眼痛驗方

广州 郭社明

【处 方】 片糖三兩，綠豆四兩，香草二兩，陈皮四錢，榕樹叶（要采不見陽光的）三兩。

【服 法】 清水三碗，煎至碗半，飯后服之。

眼痛煎方

封开 吳乃迪

【处 方】 大黃、黃芩、赤芍、連翹各二錢半，荆芥、羌活各錢半，刺蒺藜、防風、白菊、甘草、木賊各二錢。

【用 法】 水煎服。

【适应症】 白睛紅赤疼痛漸浸黑睛。

眼刺痛方

封开 陈杰臣

【处 方】 柴胡、生地、桑白各三錢，黃芩、蒙花各二錢，防風、甘菊、木賊、金蟬（去头足）各錢半，荆芥、甘草各一錢。

【用 法】 水煎，每日服一剂，連服三剂愈。

【适应症】 肝肺二經發燥热，双眼全紅腫，如有砂在內刺痛。

治眼痛方

陽江 姚 剛

【处 方】 杭菊二錢，蟬蛻一錢，草决明錢半，白芍錢半，杞子二錢，谷精二錢，熟地二錢，蒺藜一錢，龍衣錢半。

【用 法】 清水煎服。

【适应症】 風火，湿熱，迎風流淚及腫痛等眼病。

大小男妇血注瞳人方

封开 吳 乃

【处 方】 荆芥、沒藥、荆子各錢半，田七、雄黃、朱砂各五分，槐花、紅花各一錢，麥冬、黃柏各二錢。

【用 法】 水煎服，兼有肺火，加桑白二錢。

【适应症】 上下眼胞色鮮紅或微黑，如打伤血注不散。

眼科外治方

云浮 健康診所

【处 方】 若眼起翳膜者，用生推翳草四塊捶爛敷于手脉关部处，右眼起膜敷左关，左眼起膜敷右关，至一小时

后敷处必起水泡，待泡散而膜亦退，神效之至。

【編者按】 此草又名治扣草，又叫去膜草。

鷄盲方（夜不見物者）

云浮 六合診所

【处 方】 百草霜蒸鮫魚腸，連食數次，立效如神。

又 方

云浮 防國升

【处 方】 方布傘樹皮，晒干研末，蒸鮫魚腸食，二次即愈。

發鷄盲方

封开 苏卓活

【处 方】 白鱈魚肝同米酒蒸熟食之，愈后再食三五次，可不再發。

治眼起膜方

云浮 六合診所

【处 方】 老鼠拉冬瓜二兩，煮瘦猪肉食之，連湯飲尽有效。

治暴發火眼方

陽春 何夢蓮

【处 方】 連翹二錢，防風一錢，木賊五分，黃柏二錢，黃芩一錢，桑叶一錢，決明一錢，薄荷五分，甘菊一錢，川軍三錢，荊芥錢半，黑枝一錢，蒺藜八分，甘草一錢。

【用 法】 水三碗煎至一碗，溫服，輕者一劑，重者三劑，如火盛者用川軍五錢，或再加銀花一錢。

治飛絲入眼方 云浮 六合診所

【处 方】 生鹽，果皮，葱头，煮水洗患眼立出。

治飛絲入目外治方 丰順 張濟梅

【处 方】 用金櫻子叶捶爛和乳貼之。

治天行赤眼外治方

云浮 六合診所

【处 方】 用川連末，或生軍末浸入人乳，点眼內，每日十余次，消腫止痛均有奇效。

治眼球紅腫不退外治方

云浮 趙裕才

【处 方】 生柏叶和鷄蛋白，于睡眠时閉目敷之。

治眼結合膜炎（热目）外治方

丰順 丰良衛協

【处 方】 归尾一錢，黃柏一錢，生地一錢，枯矾五分，梅片二分。

【用 法】 共浸涼井水出味，用藥棉蘸藥水貼之。

治眼臉糜爛外治方

丰順 張濟梅

【处 方】 蒼朮一錢，黃柏一錢，醋制甘石一錢。

【用法】 共研末和酸醋外搽。

治眼睛刺伤外治方

丰顺 張济梅

【处方】 冷飯团叶（嫩心）捶溶和人乳貼，如有障碍物
隔夜即出。

風弦爛眼外治方 封开 罗乃馨

【处方】 銅綠五厘，胆矾三厘，麝香二厘。

【用法】 共研末，入大口螺內，隔一宿，次早取螺水涂之。

点眼膜方 封开 罗乃馨

【处方】 蛤胆汁，調入人乳汁点之。

眼上云方 封开 陈秀峰

【处方】 生鷄冠血三四滴，正梅片三厘，开七夕水搽，
如左上云，先搽右眼，右上云，先搽左眼。

治眼起膜外治方 清远 黃 峰

【处方】 菊花一錢，胆矾三錢，硼砂一錢，白矾三錢，枯矾
一錢，薄荷五分，扁豆一錢，北杏一錢，烏梅肉二只，
銅綠二錢。

【用法】 上药用冻开水一碗浸，男人加大花針一枚，小
花針一枚，釘仔（小釘）二枚，女人用花針一枚，二寸
釘一枚同浸，候药溶解，成溶液滴眼，日三四次。

治眼起白点外治方

龙川 巫卓賢

【处 方】 野芹菜三錢捶爛。

【用 法】 取健康妇人乳汁和上药拌匀，左眼痛敷右手脉处，右眼痛敷左手脉处，敷时宜用銅錢隔住，然后敷药，至患者感觉微痛，即刻除药。

治眼生膜外治方 龙川 楊家治

第一方

【处 方】 天津春永堂眼药粉一樽，沙猫子（又名爬沙虱）十只。

【用 法】 將沙猫子用新瓦焙干研末，和眼药粉密封，以免泄气，用时以灯芯草蘸粉涂眼。

第二方

龙川 曾师亮

【处 方】 野薯菇根。

【用 法】 上药根捶爛加入乳汁敷眼内，連敷三次即可。

眼科外治方

肇慶 陆大成
鄧福英

【处 方】 黄藤四兩，木賊六兩，救必应二兩，桑叶半斤，紅筋草四兩，草决明二兩，龍胆草四兩。

【用 法】 用水煎，去渣，濾过澄清，加熊胆一个，瓶貯。用时先將药水洗眼上，后用棉花湿透敷眼外。

治視覺異常方 澄海 林怀素

【处 方】 紫苏叶一錢，生姜三片。

【服 法】 上药煎好后入醋一匙，服三剂痊愈。

【适应症】 見一人如見兩人，見一物如見兩物。

針灸治双目失明方

清遠 鄧汝湘

【处 方】 針攢竹，睛明，絲竹空，童子髀，光明，腎俞，肝俞等穴。

治双目紅腫刺痛針法

云浮 陈錫華

【处 方】 針刺睛明穴，合谷穴，太陽穴即愈。

二、耳 科

治流耳膿外治方

云浮 区功諡

【处 方】 鯪魚胆數只，和枯矾一錢，拌勻晒干研末，吹入耳中。

治流耳膿外治方 云浮 李耀錦

【处 方】 大梅片二分，煨山甲一錢，煨龍衣五分，枯矾五分，煨蛤骨一錢。

【用法】 共为細末，先用消毒药棉抹淨膿汁，然后将药末吹入耳內。

流耳膿外治方 云浮 黃瑞林

【处方】 猫头骨五分，煨桑蛸五分，莎鷄五分，大梅片一分，雄黃精五分，大光鷄沙灰一只，川連末五分，上樹拐急骨煨五分，枯矾五分，龍骨五分，青黛五分。

【用法】 用药棉抹干耳膿，順吹入耳中，立效。

治耳膿外治方 云浮 刘澤楷

【处方】 用白矾一錢，梅片二分。

【用法】 共研末，先用白醋洗淨耳中，將药吹入耳中。

【禁忌】 忌食鷄、鴨蛋。

治流耳膿方 云浮 苏善卿

【处方】 用石蛤骨煨灰，加梅片和勻，先用醋洗耳，拭干后，將蛤灰吹入耳內，即愈。

治耳膿外治方 云浮 廖觀慶

【处方】 石榴皮，梅片共研末，掺入耳內。

治生耳聾外治方 云浮 練國華

【处方】 羊牯稍，耳挖草，木茛瓜核，狗尤木，南蛇核。

【用法】 共研細末，吹入耳中。

治耳聾耳膿外治方

云浮 黎伯鹽

【處方】 用馬錢磨水搽患處即愈。

治膿耳（中耳炎）外治方

丰順 丰良衛協

【處方】 土木鱉(燒灰)一至二个，雄精三錢，梅片一分。

【用法】 共研細末，吹入耳內。

又方

丰順 丰良衛協

【處方】 釣核泡（即三月泡），搗爛煨酒搽之。

治耳流膿外治方 澄海 王維玉

【處方】 胭脂米一錢，枯矾三分，大片二分，海螵蛸五分，龍骨一錢(煨灰)，竹虱一錢，雄黃末一錢，黃柏一錢。

【用法】 共研細末，用竹管吹入耳內，先用茶渣水洗淨后吹入。

【适应症】 治流膿年久者。

耳內生努肉，名耳內胆脂瘤方

丰順 黃蔚文

【處方】 鴉胆子（苦參子），每次用廿粒去壳，將肉搗溶和飯粒再捶勻，敷患處，約三四次，其努肉即可去淨，全無痛苦感覺。

【附 注】 此方系汕头市立第二人民医院卓善章 医师 所授，黃蔚文医师自己治療自己的耳內努肉痊愈后，又經手治療其他七例亦均痊愈。

耳孔腫痛外治方 封开 苏燦財

【处 方】 颠茄子一个去蒂并挖去瓢。

【用 法】 用茶子油放入茄內，煮滾，候冷，將油滴入耳內自愈。

【适应症】 耳孔生瘡腫痛。

治入耳蛇腫痛外治方

云浮 欧应池

【处 方】 江南臭草一撮，搗爛，用酒开灌耳中，即愈。

入耳蛇方

封开 李昌蘭

【处 方】 生地，黄芩，枝子，石膏（各适量）。

【用 法】 煎水飲。外用節節花研末，調酒滴入耳內。

【适应症】 耳內刺痛。

又外治方

封开 麥作芬

【处 方】 落地楊梅一兩，亞酸草五錢，灯臺菜五錢。

【用 法】 三味同捶細浸酒，左耳痛滴右耳，右耳痛滴左耳。

【适应症】 耳內刺痛。

三、鼻 科

治鼻內出氣惡臭異常

云浮 黎鏡泉

【處方】 金釵斛二錢，生松柏叶一兩，柴胡三錢，猪鼻肉二兩。

【用法】 水煎約半小時後沖蜜糖二兩，料酒一兩飲之，服二次即愈。

治腦漏方

陽春 何夢蓮

【處方】 用經霜絲瓜根（須在泥中經霜），每次約五錢至一兩。

【用法】 水煎服。

【適應症】 鼻流腥涕，鼻淵不已，久則腦痛，流涕如黃膿。

治慢性鼻竇炎外治方

澄海 陳悟生

【處方】 黃花魚石般存性（俗稱金龍魚腦石）四錢，般存性絲瓜藤（夏用西瓜蒂，秋用絲瓜藤）四錢，礞砂一錢，大梅片少許。

【用法】 共研末吹入鼻內。

治出血鼻外治方

云浮 歐仲銘

【處方】 亂髮一團，淘淨煨灰，吹入鼻中，男用女髮，

女用男髮。

治鼻衄方

云浮 黃士才

【處方】 茜根炭二錢，山枝炭三錢，生熟地各五錢，澤瀉三錢，丹皮二錢，藕節三錢，扁柏炭二錢，玄參二錢，茅根二錢，白茯苓二錢，山萸肉二錢，白木耳二錢，水煎服。

又方

云浮 劉澤楷

【處方】 用青蛇仔煎水，和雞蛋沖服，一二次必愈。

治鼻血方

云浮 趙裕才

【處方】 生地五錢，麥冬五錢，綠豆衣三錢，赤芍二錢，丹皮二錢，煎服立止。

治鼻血不止

封开 李考年

【處方】 生地五錢，天冬三錢，麥冬四錢，茜根四錢，白及四錢，黑枝子四錢，黑側柏四錢，水煎服。

【適應症】 血熱妄行之鼻衄。

又方

封开 馮飛鵬

【處方】 茅根五錢，生地一兩，水煎服。

鼻血不止方

封开 盧耀軒

【處方】 生地、麥冬各一兩，煎水飲。

又 方

封开 張少眉

【处 方】 茜根四錢，黑枝子一錢，茅根四錢，藕節二錢。

【用 法】 水煎服。

治出鼻血方

丰順 丰良衛協

【处 方】 鮮竹青二錢，老細茶一錢，煎水服。

治鼻出血方

龙川 胡本根

【处 方】 正楊梅樹根。

【用 法】 上藥煮猪肉食。

治流鼻血及血山崩方

清远 林次机

【处 方】 崗稔樹叶或崗稔仔（適量）。

【用 法】 流鼻血用猪鼻煮食，若血山崩 用猪小肚煮食。

治鼻流血不止驗方

欽縣 黃德公

【处 方】 黃枝子五錢，綠豆一兩，水煎服。

治鼻衄方

东莞 單耀明

【处 方】 玄參五錢，生地黄五錢，白芍三錢，扁柏叶四錢。

【服 法】 用猪鼻肉（數量不拘）同藥煮食，三四次

可愈。如无猪鼻肉可用瘦猪肉代之。

治衄血經驗方 陽春 何夢蓮

【处 方】 生甘草四錢，北蒼炭二錢，五味子二錢。如兼大量吐血，加浮小麥一兩，桑白三錢。

【用 法】 水煎服。

四、喉科（包括舌病）

喉毒外治方 封开 彭秋元

【处 方】 冰片五分，硼砂、人中白各錢半，海螵蛸、青黛各八分，牛黃五厘。

【用 法】 共研末吹喉中。

【适应症】 喉內腫痛。

双單鵝喉方 封开 植炯南

【处 方】 粉葛、桑叶、生地、銀花、貝母各四錢，木通、甘草各錢半，杷叶三錢，竹叶、薄荷各二錢。

【用 法】 水煎服。先用白矾五分，冰片二厘研末，吹入喉內后，再服此方。

【适应症】 双單鵝喉及一切喉毒。

双單鵝喉吹喉散 封开 苏燦財

【处 方】 山豆根一錢，牛黃、人中白各五分，青黛四分，冰片、硼砂、朱砂各三厘，川連七分，川射二厘。

【用法】 共研細末，用吹粉器吹入喉中，待唾出毒涎后
复吹，經宿可愈，倘药粘喉，可飲些溫的开水或茶吞下。

【适应症】 咽喉腫痛双單鵝喉。

双單鵝喉方 封开 陈鏡周

【处方】 人指甲数片（煨存性），人中白三四錢。

【用法】 共研細末，吹入喉中三四次即穿，穿后用生鹽
含漱。

【适应症】 咽喉腫痛，双單鵝喉，但此症單鵝三天，双鵝
二十四小时便会死亡，宜急治之。

治喉症方 龙川 陈水石

【处方】 野麻黃根（即細叶黃花孟），适量。

【用法】 將根煮水冲黃糖服。

【附注】 如能飲水，即可就愈。

又外治方 龙川 陈水石

【处方】 老虎哥藪（未出子的）适量。

【用法】 用陰火煨焙干，研末，吹入喉內。

治單双蛾喉方 龙川 甘雨卿

【处方】 三月泡根四兩，紅白膜叶四兩。

【用法】 煎水服。

【附注】 單蛾只用三月泡根，小几減半量。

治喉痛方

龙川 胡本楓

【处 方】 麻甲棘叶根适量。

【用 法】 煮水含服。

【适应症】 初期白喉之喉痛可治。

又 方

龙川 鄭天生

【处 方】 生馬鞭草叶十五片。

【用 法】 煎水含服。

治双單鵝喉外治方

云浮 梁國球

【处 方】 山豆根五分，人中白一錢，青黛一錢，正辰砂二錢，大梅片三錢，玄明粉二錢，礞砂二錢。

【用 法】 共研細末，每次二分至三分，用鵝翎管或小竹管吹入喉中。

治双單鵝喉外治方

云浮 健康診所

【处 方】 青黛五分，冰片五分，枯矾一錢，人中白一錢，牙硝五分，竹蜂三只（煨存性），木槿子三粒（用刀刺破，放鹽入內，煨至烟尽存性用）。

【用 法】 研成極細末，吹喉中。

治双單鵝喉方 云浮 曾吉雯

【处 方】 鵝不食草、罗斗筋藤各适量。

【用 法】 煎水冲蜜糖服。

治鵝喉症方 云浮 黎彦樞

【处 方】 白矾二錢，木樨子四粒，煮水飲。

双單鵝喉方 陈德君

【处 方】 箭猪身上箭毛。

【用 法】 把箭毛用火炙成团，研成末，吹進喉內。

治鵝喉症吹药方 广州 郭社明

【处 方】 薄荷二分，黄芩二分，生枝子二分，正川連二分，正麝香一分（另包），朴硝五厘，灯心灰五厘，大梅片一分五厘，全虫五厘，豆根一分，甘草一分，人中白五厘，姜虫五厘。

【用 法】 研成極細末，吹入喉內，連吹二次，每隔五分鐘吹一次。过半小时不出声者，再吹三次。

治双單鵝喉水不通方

新丰 李 爵

【处 方】 金鵝爪根（又名罗伞杵）适量。

【用 法】 將药煮水含之，在含时要注意勿令药入腹。

【禁 忌】 不要吞药入腹。

治喉蛾方

澄海 陈漢霖

【处 方】 川連一錢，儿茶三分，煨蝸牛三个，人中白三分，煨礞砂三分，珍珠一分，麝香五厘，冰片二分，桔梗一錢，陈皮一錢，甘草一錢。

【用 法】 將藥研末吹喉。

治單双鵝喉方

欽縣 黃澍基

【处 方】 生蟾蜍三只，細油甘木叶一兩，龍眼木叶一兩（落在塘中者佳）。

【服 法】 以塘水煎服。

治鵝喉方

清遠 黃創業

【处 方】 人指甲（煨）、地碑虫（煨）、桑螵蛸（煨）、水瓜皮（煨）、珍珠、梅片、人中白、麝香、青黛、胆矾、礞砂、苦參、川連各等分。（珍珠、梅片、胆矾可用少些）

【用 法】 研成細末，吹入喉中。另用麻黃、樹果核煮水含漱。

治鵝喉方

清遠 陈瑞初

【处 方】 訶子二分，胆矾二分，梅片二分，枯矾二分，川連二分，熊胆一分，川麝五厘。

【用 法】 共研極細末，吹入喉中，另用海草、昆布、山豆根、津梗、連翹、蘆根各三錢，煎水服。

治扁桃體腫大方 廣州 高維博

【處方】 馬蹄十枚，麥冬三錢。

【服法】 清水煎服。每星期服一次，患處自然萎縮。

治一切喉症屬火者

云浮 趙裕才

【處方】 用鮮扁柏葉搗，絞取汁，加生冬蜜糖調和，忌見火，以湯匙時時挑咽之，消腫退火如神，百試百效。

【附注】 本方出種福堂公逸良方，經屢用屢效者。

治喉症吹喉方 云浮 樊榮華

【處方】 入地虎一只，用黃泥團密封，炭火煨，去泥存性，研末吹喉中，即愈。

又方

云浮 樊榮華

【處方】 木槌子兩粒，加生鹽二分藏入其內，炭火煨透，研末吹入喉中，有效。

又方

云浮 彭明軒

【處方】 六神丸二十粒，牛黃二分，珍珠三錢，炮人指甲一錢，青黛粉五分，大梅片二分，入地虎五分，研為細末，吹喉中。

治咽喉諸症方 欽縣 郭蘭生

【處方】 金銀花三錢，甘草三錢。

【服法】 清水煎或酒煮服。

【適應症】 喉中腫痛，濃痰梗塞，咳嗽失音，嘔吐痰涎膠固不斷者。

治急性扁桃腺炎方

龍川 叶宜枚

【處方】 金銀花三錢，白連花四錢，正川連二錢五分，川貝實三錢，柿花蒂十只，山豆根三錢，川射干三錢，制僵蚕二錢。

【用法】 水煎服。

又外治方

龍川 唐育清

【處方】 馬鈴薯藤仔根一兩五錢。

【用法】 用兩碗水煮成一碗，用作漱口，有時吞下少量，一點鐘可吞下一次，主要用作含漱咽喉腫痛處。

扁桃體發炎驗方 普寧中醫學會

【處方】 瓊菜頭、燈籠草、小號叶下紅、鵝不食草各等分。

【制法】 將藥捶爛取汁。

【用法】 將藥汁和酒一杯服之，其渣用紗布裹之含在喉部，使涎液流出口外。

白喉、扁桃腺炎、咽喉炎、一切喉症方

丰順 黎瑞劍

【处 方】 青黛七分，川連二錢，露蜂房二錢，胆矾（火煨）一分，珍珠二分，黃瓜霜三錢，牛黃三分，麝香二分，熊胆六分（水浸），正梅片三分，薄荷叶七分，枯礬砂二錢。

【制 法】 共研細末，用小竹管插藥末吹入喉內，隔一两个小时再吹。

【附 注】 此方系丰良区有名喉科藥，須平时預制密封以备急用，其中珠黃射胆須选真貨。

治口腔、咽喉各症吹藥方

李風珠

【处 方】 虎头蜂巢一兩（煨存性），梅片一錢，珠末一分，麝香一分。

【用 法】 將藥研末，吹入喉。

治喉痛方

澄海 金悟和

【处 方】 鋪地錦、鹽酸仔、三脚虎各适量。

【用 法】 將三味青草藥和鹽數粒搗爛含之，再以生鋪地錦五錢煎水服。

治喉痛方

澄海 余斯深

【处 方】 占舌草（即假芹菜）、半畔蓮各适量。

【用法】 將藥二味取汁，水煎服之。其渣煎水，加入食鹽少許作口含用。

咽喉痛驗方 廣州 陳鉅昌

【處方】 生蒼耳子根，頭，粗壯者四五枚，不要干叶，三蒸酒四五兩，酸梅四五枚，共同以文火煎取約二兩，候微溫，分次含于口腔內，約三分鐘即吐，含完藥水為止，即有極多痰涎隨之吐出，病即愈。

喉科吹藥方 云浮 歐炳揚

【處方】 入地虎（燉存性）一只，生牛黃五分，麝香五厘，梅片五分，川連一錢，生錦一錢，人中白一錢，人中黃一錢，玄明粉一錢。

【用法】 共研細末，密瓶收貯，用時，以鵝翎管吹喉中。

治鎖喉方 清遠 黎錫洪

【處方】 珍珠三厘，琥珀三厘，牛黃三厘，麝香一分，梅片五分，辰砂五分，田七三分，川連三分。

【用法】 將藥研細末，以鵝毛蘸藥末，放入小兒喉中，或用竹筆筒吹入喉內。

治鎖喉方 清遠 陳杏波

【處方】 紫石英五錢，川足五條，竹黃三錢，雄黃三錢。

【制法】 研成細末后，再入朱砂一錢，牛黃五分，麝香五分，梅片五分，用玻璃樽固封。

【用法】 將藥吹入喉中。

治鎖喉驗方

番禺 鄔壁泉

【處方】 正辰砂一分，正牛黃一分，熟礪砂二分，木槵子三分（去皮殼），青黛二分（飛淨），雄黃精二分，珍珠末一分（飛淨），大梅片一分，人中白三分。

【用法】 將藥共研成細末，用玻璃樽裝貯待用，切勿泄氣。用此散時，先用山豆根四錢，薄荷二錢，木槵子鹽六錢，煎水含之。唾去口膠后，以散一分吹之。

初起宜服加味甘桔湯：桔梗二錢，甘草稍錢半，防風二錢，荊芥錢半，僵蚕錢半，牛子三錢，薄荷八分，射干二錢。痰多加浙貝，熱盛加芩連，項腫加馬勃，口喝加花粉。

【适应症】 一切喉症。

治鎖喉方

云浮 黎伯鹽

【處方】 全蝎七分，僵蚕一錢，甘草七分，瞿麥一錢，川烏七分，蜈蚣二條（蜈蚣要酒浸洗，并用金頭赤足者，去頭足炒）。

【用法】 共研細末名鎖頭散，每服二至三分，薄荷煎水送服。

【适应症】 治小兒三朝七日內不能食乳并治風痰。

【附注】 此乃保嬰之效方。

又 方

云浮 黎彥樞

【处 方】 朱砂二分，礞砂二分，雄黃一厘，川貝一錢，
陳皮七分。

【用 法】 水煎和乳汁內服。

喉腫飲食不得下咽外吹方

云浮 毛澤賢

【处 方】 桑螵蛸二只煨灰研末，加冰片二分，用竹管吹
入喉中。

【适应症】 不論寒熱病狀，立即止痛消腫。

治結喉痰毒熏方 云浮 李章金

【处 方】 算盤子（又名七代伯）四兩，龍眼樹二層皮。

【用 法】 將藥煎水放入米筒內，乘熱張口合米筒口上熏
喉間，則痰自喉中流出，未盡再熏，甚者至三四次。

喉核發大症

廣州 詹益康

【处 方】 生半夏三錢，生南星三錢，北防風四錢，天花
粉三錢，皂角刺五錢，赤小豆五錢，浙貝母三錢，金銀
花二錢，胆星七分，竹蜂四只，細辛七分，北杏一錢
半，牙皂五分，竹黃精七分。

【制 法】 共研成細末。

【用 法】 將藥吹入喉部并敷外邊腫處。

【适应症】 喉核症（主內消痰涎）。

喉科散

廣州 劉福來

【處方】 川貝母三錢，瓜蒌仁二錢，黃瓜霜三錢，旱蓮草五錢，人中白三錢，人中黃三錢，生豆根三錢，生礬砂錢半，生甘草二錢，青黛二錢，皂角錢半，琥珀一錢，連翹三錢，山甲二錢，牛黃五分，梅片三錢，麝香八分，龍涎香錢半，另生草藥：金鎖匙三錢，金不換三錢，白欖廿枚（新瓦煨灰）。

【制法】 研成細末。

【用法】 將散吹入喉中，兼服下列藥味三、四劑：大生地五錢，生甘草一錢，元參四錢，薄荷一錢二分，麥冬三錢（去心），川貝母二錢，白芍二錢，丹皮二錢，煨石膏二錢，淨水煎服。

喉科神效方

廣州 李健聰

第一方

【處方】 胆矾二錢，青矾二錢，朴硝二錢，生鹽四錢，研勻瓶貯，用時用酸梅肉開勻和下方調勻，塗搽喉中，當嘔出痰涎，作為洗喉之用。

第二方

【處方】 海螵蛸二錢，礬砂二錢，蜒蝣虫二十條（焙干），竹蜂五只，冰片三分，麝香一分。

第三方（洗喉後即用本方吹喉）

【處方】 珍珠三分，琥珀三分，礬砂二錢，炙黃柏二錢，麝香三分，牛黃二分，鹿角霜三錢，鷄內金一錢，

焙朱砂八分，熊胆二分，青黛一錢，元明粉一錢，甘草二錢，冰片五分，木槿子四粒(煨)，鵝喉二条。

喉科散

广州 刘咏如

【处 方】 白矾一錢，正大梅片二錢，夜行虫五十只(即蟪蛄，研末藏地十五天)，麝香壳一个，防風三錢，鈎藤尖三錢，人中白二錢，竹蜂四只。

【用 法】 共研細末，吹入喉內。

【禁 忌】 孕婦忌用。

喉科散

云浮 黃瑞林

【处 方】 大梅片一分，川麝香五厘，熟礪砂五分，牛黃一分，川地龍一分，正辰砂三分，人中白五分，川蜡二分，青黛二分，珍珠末一分。

【用 法】 共研細末，吹入患处。

【适应症】 專治喉中痰涎，及初起白泡，白膜。

喉科散

云浮 健康診所

【处 方】 冰片二分，百草霜五分，地鳖虫(用新瓦焙干)五十只。

【用 法】 上药研成細末，开蜜糖，用消毒过的鴨毛蘸点患处，若喉腫者，入竹蜂殼研末吹入喉中。

白喉外治方（扁桃腺炎亦适用）

丰順 潭江衛協

【处 方】 大肚蜘蛛一只，烏梅七粒（去核），將兩味焙酥退火毒后，共研細末，分为七次用竹管吹入喉头，或用水混和冲入喉头。

治白喉方

龙川 張林泉

【处 方】 南頸葫蘆草根。

【用 法】 煮水含漱或咽下少許。

又 方

【处 方】 大黃果樹根一至二兩。

【用 法】 煮水含漱或咽下少許。

治白喉外治方

【处 方】 訶子肉（研末），酸梅（搗如醬），生蜜糖。

【用 法】 將藥和勻，用新毛筆蘸藥，点患处。

治白喉驗方

【处 方】 茨桐菠根（一名瑚樹灰根）一兩。

【用 法】 將藥煮水冲蜜糖服之，或含喉用，过一、兩天
后，白膜脫去。

白喉散

丰順 罗克全

【处 方】 山豆根一分，黃柏八厘，柿霜四厘，胆星二分，朱砂分半，煨蜂房一分，全蝎尾八厘（焙成灰），硼砂六厘，水仙根六厘，珍珠一分，川連二分，玄蛤二分，冰片二分，共研細末吹喉內。

白喉外治貼頸膏 丰順 罗克全

【处 方】 赤小豆五錢，綠豆八錢，川貝四錢，雄黃精二錢。

【制 法】 共研末，加柿餅二塊，食鹽少許，和蜂蜜共捶成膏貼頸部。并服甲、乙湯如下：

甲 方

【处 方】 桔梗一錢，生地一錢，牛蒡五分，白芍一錢，連翹八分，杏仁六分，川茯錢半，桑皮六分，猪苓四分，白朮四分，甘草三分，灯芯十二寸，水煎服。

乙 方

【处 方】 当归八分，白芍一錢，生地八分，桔梗八分，枳壳五分，連翹八分，粉丹皮五分，川連三分，川貝八分，苏子四分，甘草三分，水煎服。

【附 注】 凡小儿白喉症，可先用甘草煎湯洗口，然后吹藥散，如頸腫用貼頸膏，并內服甲湯，气急用乙湯。

白喉單方

丰良衛協

【處方】 灯籠草（即打額草，或称額孢子草）搗碎，絞出汁和蜜服。

喉疳散

汕頭 蔡仰高

【處方】 人中白（飛）一錢二分，煨礞砂九分，黃柏三分，梅片三分，洋儿茶六分，橄欖核（煨）三粒，飛青黛一錢，正川連三分，柿霜九分，甘石（飛）一錢，龍薄荷一分，正牛黃二分，正真珠一分。

【用法】 將藥研極細末，用玻璃樽收藏待用。每次用少許吹入咽頭，一日五次，六次亦可。

【適應症】 扁桃腺炎，咽門炎，喉蛾均有效。

舌忽腫大效方

黃舉昌

【處方】 蒲公英五錢。

【用法】 將藥煎濃汁去渣入口含之，小兒用末擦舌上。

治舌下癰腫（蛤蟆腫）方

龍川 鄧國青

【處方】 土蒲黃一錢，二枚片一分，朴硝一錢，百草霜三分。

【用法】 上藥共研細末，用針刺出舌下腺之血，將藥末放在舌腺腫大處。

又 方

龙川 鍾嘉谷

【处 方】 鉄馬鞭草、大黃果叶、洗衫圓根各适量。

【用 法】 各药煮水含漱。

治骨鯁方

龙川 方才良

【处 方】 葵扇柄一把燒灰，海螵蛸一錢炙熟研末。

【用 法】 將药研末，冲开水含服，半小时即下。

治魚骨鯁喉方

龙川 曾志标

【处 方】 苧根五錢。

【用 法】 上药煮酸醋空心服。

治猪骨鯁喉方

龙川 鍾焯元

【处 方】 茄子根（俗名吊菜）八兩。

【用 法】 將药煮水緩緩吞下。

〔附〕牙 科

牙痛丹

封开 唐迺万

【处 方】 細辛、樟腦珠、玄明粉各一錢，薄荷、萆撥各二錢，川椒錢半，雄黃五分，正梅片三錢。

【用 法】 升煉：先將药研末，放入磁碟內，然后將碗或杯盖好，用紙湿水封口，碟底点盞油灯，慢火煎熬，慢慢將水滴湿封口的紙，不使之干，約三四点鐘，揭起盖住

的碗或杯，刮落附着的霜，就是应用点牙痛的升丹。

【适应症】 不拘新久牙痛。

祖傳特效牙痛水秘方

云浮 潘鑒銘

【处 方】 搯弓絲螻，兩便針螻，山麻油螻，假烏攪螻，細叶痴头婆螻，龙眼樹皮，以上各藥，生用各一兩，干用各五錢。

【用 法】 用白醋一斤，納藥，用瓦罐同煎，約十分鐘，用布濾去渣，加白矾五分，石膏一錢，牽牛子七分，細辛五分，雄黃五分，硼砂五分，共同放入上藥水內，再煎十分鐘，再濾去渣，然後澄清，以淨瓶載好，如遇牙痛時，用藥棉蘸藥塞患牙處，其痛立止。

治牙痛經驗方 云浮 六合診所

【处 方】 小露蜂房錢半，明乳香二錢，貫眾錢半，酒洗黃芩一錢，細辛二分，赤芍一錢，白芷一錢，荊芥一錢。

【用 法】 用清水煎，去渣，含口中，其痛即止，如系虫蛀牙痛，初含時，或痛加劇，然不必心慌，若再含數次，必當自愈，屢經試而效驗。

治虛火牙痛方 云浮 陳大覺

【处 方】 用六味湯，加骨碎補，龜板，龍骨，水煎，溫服。

治風火牙痛方 云浮 黃勉臣

【处 方】 火秧籬（去籬刺），納鹽入其內，放炭中，燬灰為末，搽患處，待口涎流出，立效。

治風火牙痛不止方

云浮 彭冠卿

【处 方】 玄參五錢，生地二錢，白菊三錢，桔梗三錢，甘草一錢，細辛七分，煎水，先含二次，漱口，然後內服立效。

治虫牙痛方 云浮 趙裕才

【处 方】 糯米頭強（晚造更好）三四兩，煮水含之。

治諸腫牙痛不止方

云浮 趙裕才

【处 方】 籬洞仔叶兩許，絞汁，令病人閉目仰臥，以汁滴眼中，令滲入，良久，医者以食中兩指將其眼撥開，在內眥處用銀簪刮之，即有如蛛絲者被刮出，將絲牽盡，其痛立止，神效之生，屢試屢驗，莫明其理。

【附 注】 本方傳自陳的田。

治虫牙痛方 云浮 黃瑞林

【处 方】 細辛，蘆薈，白芷，研末，用棉花濕茶，蘸藥末塞患處。

治紅腫牙痛及牙根炎方

云浮 刘永康

【处 方】 生地四錢，黃柏錢半，玄參錢半，閩瀉二錢，丹皮錢半，知母錢半，枝仁二錢，升麻七分，甘草一錢，生石膏五錢，水煎服。

牙痛經驗方

封开 苏燦財

【处 方】 玄明粉、雄黃各五分（飛淨），白牙硝一錢，大梅片二分。

【用 法】 共研細末，涂患处。

治虫牙痛方

云浮 李樹林

【处 方】 細辛一錢，姜黃二錢，胡椒五分。

【用 法】 共研末，用藥棉卷藥末，痛時，塞入患牙孔中，立止。

治牙痛經驗方

云浮 李明周

【处 方】 鯪魚，辣椒，共煮水食之立效。

風火牙方

广州 黃少雄

【处 方】 梧桐樹強干片一兩，瘦猪肉二兩，煮食。

風火牙方

廣州 蘇子安

【處方】用火秧竅空其中，加生鹽于內，用火煨灰為末，搽患處，待涎出，立效。

治虫牙痛方

清遠 黃耀南

【處方】用水楊梅煮水含，不可吞下。

治風火牙痛方

清遠 何季甫

【處方】碎朴六錢，炮姜錢半，升麻錢半，化羔六錢，丹皮三錢，靈仙三錢，黃芩三錢，牛膝三錢，枝子四錢。

【服法】清水煎服。

止牙痛方

陽江 姚剛

【處方】防風三錢，生地二錢，石膏三錢，狗脊二錢，川姜一錢，枯草二錢，升麻五分，牛膝一錢，甘草一錢。

【服法】水一碗煎至七分。

治虫牙痛方

陽江 姚剛

【處方】五倍子五錢，煮水含數次可愈。如飲冷飲熱覺痛，用北辛五分、樟腦一錢、松香一錢，研末，擦患處即愈。

治牙痛方

龙川 鍾焯元

【处 方】 梔子一錢，朴硝二錢。

【用 法】 將藥共研細末，泡開水待涼，含漱。

又 方

龙川 謝建承

【处 方】 茶堯子一兩。

【用 法】 煮水含漱，可愈。

治牙痕露驗方

广州 姚錦石

【处 方】 螻蛄十只，白醋一斤，入地金牛一兩。

【制 法】 將藥煎至三十分鐘后，取出藥汁。

【用 法】 溫含，含時將牙咬緊頻頻漱之。

【适应症】 牙癰、牙疳、牙痛等。

屢驗牙疳莧棗散 封开 楊植三

【处 方】 白莧菜梗（煨炭）三錢，凡茶二錢，紅棗錢半（去核）夾入如黃豆大的雄黃一粒（煨炭），硼砂二錢，人中白一錢，大梅片二分。

【用 法】 共研細末，點腐爛處，含待漚涎滿口，始唾，唾完，清水漱淨，再點，經過數次點漱即愈。

牙疳方

封开 陳 良

【处 方】 牛黃，龍骨，青黛，硼砂，川連，花粉，黃柏，冰片，人中白。

【用法】 共研細末点患处，若牙肉潰爛，去硼砂加和海螵蛸，分量按症輕重而定。

【适应症】 牙肉腫痛，痒甚則牙肉腐爛，流鮮毒血。

治脫牙流血不止方

云浮 伍万生

【处方】 用牛燭一枝，点着吹黑，淬入牙孔中，可止。

治腎火冲激牙縫出血不止方

云浮 趙裕才

【处方】 大熟地一兩，山萸肉四錢，大淮山四錢，丹皮二錢，閩澤瀉二錢，白茯苓六錢，玉蕊蓉（鹽制）二兩，水煎服。

治牙縫出血不止方

云浮 黃勉臣

【处方】 竹茹五錢（醋浸一夜），將竹茹絞在流血处，立止。

后服下方：生地四錢，龜板六錢，石膏三錢，龍齒二錢，石斛二錢，花粉三錢，丹皮錢半，沙參四錢，白芍錢半，茅根五錢，生藕三兩，煎服。

治牙漏血不止方 云浮 馮德新

【处方】 用白矾末和棉花卷塞患处，立止。

治牙出血方 封开 徐海汪

【处 方】 干芭蕉叶燒灰，搽患处，血即止。

牙肉崩爛出膿血方（又名崩沙症、
口臭異常） 封开 謝澤群

【处 方】 沙崩藥（此味系生草）約用二兩，煮水放筒內
熏患处，后將藥水含，連治三四天愈。

治齒癆外抹方 澄海 吳仰松

【处 方】 煨草魚齒二对，朱砂三分，黑枝五分，人中白
三分，煨礪砂三分，珍珠一分，琥珀四分。

【用 法】 研細末抹之。

【适应症】 齒齦时常流血及破爛化膿而生臭味者。

牙宣方

广州 勞清夷

【处 方】 生姜一兩，淮鹽五錢，土地骨三錢，粉甘草錢
半。

【用 法】 淨水一碗煎至半碗，一次服完。

【适应症】 牙齦出血，睡时血从牙齦出。

治牙蛇方 云浮 陈炳燦

【处 方】 水石榴，煎水含漱，立效。

脫取患牙方 云浮 六合診所

【處方】 活雄鯽魚一尾（約四五兩），白砒六錢，將砒研末，納魚腹中，懸檐當風處，待肉腐盡脫時，去砒不用，淨取魚骨晒干為末，每用米粒大小，放患牙根上，則牙自脫。

【編者按】 此方出自叶天士所著秘授單方書中，據各地試用，多效。但納白砒后，其魚外應以薄紙糊裹。又腐盡后，應在溫水中仔細將砒洗淨，以免誤入口中中毒。

第五篇 外科症类

一、瘡瘍（包括皮膚爛肉）

治爛頭方

云浮 区功諱

【处 方】 用鯪魚一条，連腸臟用泥封固煨存性，研成細末，开茶油搽患处。

治对口瘡方

云浮 李灼華

【处 方】 先用猫尿搽之，后用老筋蛆高瓜，捶爛敷患处。

治对口瘡方

丰順 陈煥庭

【处 方】 蟾酥五分，雄精二錢，混冷茶外搽。

又 方

丰順 陈煥庭

【处 方】 桑螵蛸（螳螂巢）八个煨到六分黑，即刻研成細末，放陰涼处退火毒，一二小时久，混茶油搽患处，二三次可愈。已开口用效，最好兼服消毒剂。

后枕瘡方

封开 李昌蘭

【处 方】 川連，花粉，連翹，知母，黃芩，枝子，山豆

根，桔梗。

【用法】 水煎服，另用大黃、花粉二味研末，和塔池龍水開敷，四五天可愈。

【适应症】 一名对口瘡，生后項，如鴨蛋大，紅腫刺痛。塔池龍水（即酢塔水）。

爛頭方

封开 盧鑒明

【处方】 入地蜈蚣，青蒿二味。

【用法】 研末，和酒開搽患處，再用雄黃末摻膿水，一星期可收效。

【适应症】 头上全部浮腫、爛膿。

治对口瘡方

龙川 李文英

【处方】 七叶一枝花（生一兩、干五錢），老虎尿（生一兩、燥五錢）。

【用法】 未化膿用黃糖和上藥捶爛外敷，已化膿用茶油和上藥捶爛外敷。

又方

龙川 黃子青

【处方】 竹虱。

【用法】 將藥和黃糖塗之，二三日痊愈。

治頸蛇浮腫方

龙川 黃子青

【处方】 生半夏全株捶爛。

【用法】 將藥和燒酒敷之即愈。在头部加白芷、雄黃，在

脚部加三黃散。

治腦后疽驗方（即下山虎）

和平 袁俊三

【處方】 海風藤（又名石須）。

【用法】 將海風藤和黃糖搗爛，敷上患處。

头上黃水方

封开 陈泮林

【處方】 雄黃、兒茶、五倍子、歸尾、連翹、白芷各二錢，乳香、沒藥各錢半，川連、銀花各二錢半。

【用法】 共研末，開七夕水擦。

【適應症】 头上瘡流黃水。

黃蟬窠方

封开 陈泮林

【處方】 老茶葉、仆芋頭、血散藥各適量。

【用法】 煮水洗。

【適應症】 瘡生似黃蟬窠形。

回膿方

封开 彭回春

【處方】 榕樹強（取二層皮）、梅片各少許。

【用法】 二味搗爛敷，并用南蛇筋蠶煮水蒸 鯉魚食可愈。

【適應症】 外邊結痂，里边有膿的瘡。

飛瘍方

封开 符汝英

【处 方】 白芷五分，冰片一分，好文茶一兩（即上好茶叶）。

【用 法】 白芷冰片二味研末，用茶叶煎濃汁去渣，再入銅壳煎成膠，开药末搽患处，馬上停止蔓延，第二天即干水結痂，待痂落自愈。

【适应症】 面上突然起一黑泡，泡潰后愈起愈多。

又 方

封开 苏次平

【处 方】 雄黃、冰片、熟石膏、黃連、黃芩、黃柏各等分。

【用 法】 共研末开茶油搽，亦即停止蔓延，干水而愈。

【适应症】 面上初起白泡，泡潰后，滿面輪遍，象爛痘一般。

又 方

封开 植式材

【处 方】 黑狗撈（生草药）。

【用 法】 煮水洗。

【适应症】 面上初起白泡，泡潰后，滿面輪遍，象爛痘一般。

馬眼瘡方

封开 八耀榮

【处 方】 馬鞭草，馬蹄菇。

【用 法】 二味舂爛敷之。

【适应症】 瘡生眉上，紅腫暗瘀色。

陰陽瘡效方

黃舉昌

【处 方】 生地四錢，紅花三錢，歸尾四錢，赤芍三錢，銀花五錢，連翹四錢，牛子三錢，山甲四錢，乳香三錢，沒藥三錢，貝母錢半，防風一錢，陳皮錢半，甘草二錢。

【用 法】 熱腫痛加大黃五錢，在手加桂枝三錢，在腳加牛膝三錢，木瓜三錢，體虛者去大黃加泡黨參一錢，黃芪五錢，西歸四錢，燈芯為引。

臙瘡驗方（臙瘡即上五寸，下五寸）

順德 胡紹鼎

【处 方】 陀僧四錢，石硫黃二錢，枯礬二錢，銅綠二錢，蜆壳灰六錢。

【制 法】 將藥研末后，同豬中脊肥肉約一兩，舂爛和藥末攪成膏。

【用 法】 視瘡口大小，將藥膏攤成一貼，在蜡紙上，敷上瘡口，外用綳帶扎住，睡眠不解除，如有黃水流出，可用薄紙拭抹，隔一二日用苦參、枯礬、艾葉、兒茶，煮水洗瘡，復貼上藥。

【适应症】 只适于臙瘡。

治脚臙破爛方

澄海 王維玉

【处 方】 水粉五錢，雄黃五錢，松香五錢，樟腦二錢，

紅丹一錢，銅青一錢五分。

【用法】 共研末，用豆頭做餅，摻入葯散，封貼患处。

治鷄屎瘡（即頭瘡）方

澄海 許儀文

【处方】 用蔗粕放于新瓦上煨存性，研成細末，和猪油或麻油、茶油皆可，抹患处。但須先用葱水或肥皂水洗去瘡痂，然后取葯抹之。

瘡科生肌驗方 順德 歐陽朝

【处方】 珍珠末五錢，鳳凰胎壳十个（即鷄雛胎），琥珀末一錢，煨石蛻（生于咸地石罅及杉木边長形的小蚌仔）一兩，梅片末五分。

【制法】 將鳳凰胎壳石蛻二味入瓦爐內，用海边潔淨泥糊封之，略晒干，繼用爐灰火煨，煨二至三小時后取出，再以一些豆腐同研，至極細末为止，排去豆腐水，次日如法搗成。

【用法】 瘡瘍潰后，抹淨毒水，俟干，撒上葯粉。

搭背毒瘡秘方 廣州 時祖蔭

【处方】 五倍子一兩，白蜜二兩。

【制法】 將葯拌勻，用陰陽瓦以微火焙干，至金黃色为度，研成細末，用醋調之，攤在藍竹布上（布之中間開一孔洞，以便毒水由此流出），再加蜂房（同样用陰陽瓦焙干研成細末），摻在葯上，敷上患处。

【用法】 將藥貼上患处，任其自流毒水，該藥每日更換一次，若年老人或小孩子氣力不足者，免用蜂房，敷藥時，先用溫暖的硼砂水，并火酒等洗淨然後敷上藥。

瘡科拔毒散 順德 李庭芬

【處方】 生南星五兩，沒藥三兩，草河車五兩，生川烏五兩，白芷五兩，黃蜂窠五兩，生牛銀五兩，乳香三兩，黃柏五兩，生半夏五兩，甘草三兩，大黃五兩，山茨菇五兩。

【制法】 將藥研成細末，加入面粉少許調勻如糊狀，後用火煮成軟膏。

【適應症】 治療一切陰疽，皮色不變，堅硬如石，沒有紅腫，只有稀痛。

【附注】 此藥只可外敷，不能入口眼，煮過藥的用具，不可用以再煮食物。

生瓜（土名）方 揭陽 楊 芬

【症狀】 初生惡寒發熱，全身筋絡酸痛，初起未見紅腫，唯現發成塊狀的患处發熱烙手，後則全身繼起四五个不等。

【治法】 用青草，捶酒餅一畔半粒，米粉一撮，候發酵搓成條三寸長，搭手脉口男左女右。

【外敷方】 君藥：大藤苦奈，埔銀叶，蚶壳草，蔓陀蘿叶。

臣藥：珠仔草，桔叶，過江龍，車前草，白担当，

生艾叶，六角英，消山虎，叶下红，鹽酸雞藤，白牽牛，芙蓉花叶。

【內服方】 用蛇舌草一大撮捶爛拌酒取汁燉服，以渣敷患处。

【附 注】 繼服、敷數日可消。

蜈蚣瘡方（又名瓜棚瘡方）

廣州 趙良杰

【处 方】 雄黃三錢，康青錢半，梅片五分，蒜头一个，新瓦焙枯研末，开茶油搽。

凍瘡治療效方

黃益之

【处 方】 生蘿卜頂（即生叶处之頂）一斤。

【制 法】 蘿卜頂和水各一斤，煮至騰沸，水色青，傾入盆內。

【用 法】 把脚入水中浸，并用煮过的蘿卜頂搓患处几次，便愈。

治療疽方

龍川 叶宜枚

【处 方】 （1）未开口用生半夏搗爛敷，（2）已开口用野棉桃樹根搗爛敷。

又 方

龍川 田玉屏

【处 方】 辣椒樹叶和雞蛋白炒熟。

【用 法】 將上藥加入白餅糟中和勻，敷患处。

治手足指生天蛇毒方

龙川 叶宜枚

【处 方】 生地七錢，赤芍四錢，生花一錢，桃仁三錢，
生甘一錢，勞子三錢，乳沒二錢，柴胡四錢，白芷三
錢，条芩三錢，川連二錢，黃柏四錢，銀花三錢。

【用 法】 水煎服。

治蛇头指（癰疽）方

龙川 鍾焯元

【处 方】 香附子、白朮各一錢。

【用 法】 將藥研末入猪胆內，包裹手指患处。

治坏指疽驗方

鄒甫仁

【处 方】 塘角魚數頭。

【用 法】 把塘角魚碎之醋拌，微溫敷上。

【适应症】 坏指疽。

治蛇头指初起（癰疽）方

龙川 曾师亮

【处 方】 雄黃、黃丹、川連各三錢，大黃、白芷、樟腦
各二錢，細辛一錢。

【用 法】 將上藥研末入猪胆內，包裹手指患处。

【禁 忌】 忌食豆腐。

又 方

龙川 朱振華

【处 方】 祈艾三錢，川足兩条，硫磺三錢，白芷三錢，細辛三錢，必發三錢，雄黃三錢。

【用 法】 將上藥研末如棉花狀，用草紙卷成如蚊香狀，燃火烟熏患处二、三次，即止痛消炎而愈。

治手指生蛇方

澄海 余斯深

【处 方】 金头蜈蚣草，鵝屎，食鹽。

【用 法】 將三味藥和酒貼之即效。

治手指生蛇方

澄海 張乐和

【处 方】 天葛菜（刮蛇劍一次四叶勿多），帶藤苦棟，菊花叶，加上雄黃二錢半，白芷二錢，珍珠二厘（研細末）。

【用 法】 青草和藥末共捶爛貼之。

生猪屎瘡方

龙川 張林泉

【处 方】 用生白蕨擦之即愈。

生鯉魚嘴方

龙川 魏日光

【处 方】 老鼠耳，公鷄冠血。

【用 法】 上藥搗爛外敷。

治崩烏肉（潰瘍）方

龍川 張日光

【處方】 推車子。

【用法】 上藥焙酥研末，調茶油敷。

治蠟子瘡（又名纏腰蛇）方

龍川 叶宜枚

【處方】 野墨菜。

【用法】 調水敷之即愈。

治陽毒方

龍川 駱欽平

【處方】 生川烏、生草烏、生南星、生半夏、細辛、姜黃、重樓、雄黃。

【用法】 上藥各三錢，川足二條，共研末，開燒酒塗紅腫處可愈。

治无名腫毒方

龍川 叶宜枚

【處方】 流民草、四叶蓮、六月雪各適量。

【用法】 將藥搗爛敷之即愈。

又方

龍川 黃子青

【處方】 鳳仙花叶（俗名指甲花）捶爛。

【用法】 將藥塗患處即愈。

治伤口爛生虫方 龙川 罗伯謀

【处 方】 苦楝樹皮。

【用 法】 煮水洗之其虫立死。

治石硬方 东莞 單耀明

【处 方】 雄黄精、川生花各一兩，姜活、独活各五錢，大蒜头三錢。

【用 法】 碾成細末，用酒或醋煮为糊狀，用布包敷，敷时要乘热，又可將該药末用紙包搓成条，点火熏痛处，亦效。

石硬驗方（脚底結石）

順德 胡少泉

【处 方】 斑蝥十只，梔水一兩，熟烟二錢。

【用 法】 煎水。热洗約半点鐘，从不痛处漸漸洗入，后用熟烟敷痛处。

【适应症】 石硬初起未化膿者，收效达百分之百。

治石硬驗方 广州 王玉麟

【处 方】 旧草鞋一只。

【用 法】 將草鞋浸入尿缸，三小时后取起，再用青磚一个，用火燒热，將浸过尿的草鞋放在磚面上，把患脚踏在草鞋面上熏蒸患处，每日二三次，連踏兩天，便可愈了。

治陰瘡初起效方 欽縣 黃華強

【處方】 生地二錢，川連二錢，片糖三錢。

【用法】 研成末，加片糖和勻敷貼患处，后再用朱砂一錢塗之。

治水毒瘡如癰样良方

欽縣 郭蘭生

【處方】 蒼朮三錢，荊芥二錢，蛇床子一錢，白芷二錢，穿山甲二錢，五倍子三錢，青矾六分，苡米三錢，木瓜二錢，銀花三錢，乳香二錢，松蘿一兩。

【用法】 上藥加葱頭一握，煮水洗二三次。

治潰瘍方

清遠 雷福瑞

【處方】 樟腦、銀朱、松香、白蜡(黃蜡亦可)各適量。

【用法】 先煮松香、白蜡，溶解，入銀朱、樟腦。取起用清水煎幾次，外敷。

治膿疽驗方

順德 李庭芬

【處方】 用耙頭樹根一兩，燉米酒服之，數次即愈。

爛頭驗方

東莞 李 正

【處方】 牛黃，冰片，樟腦，枯矾，雄黃精。

【制法】 將藥研成藥粉末，用油攪拌成膏，或研粉存貯。

【用法】 將膏涂上或搽上患处。

【适应症】 爛头初起流惡水，耳內流膿作痛。

皮膚病驗方

东莞 李 正

【处方】 鳳尾草，怕丑草，玉爭花，蛇炮立，烏柏，牛奶枯，王瓜龍，雌棠信，地胆头，白扫地胆头。

【制法】 將藥晒干研粉末，用油攪拌為膏。

【用法】 把藥膏涂上患处。

【适应症】 皮膚發爛流惡水，刀傷流血，粉瘤，及耳內流惡水。

傳染性膿疱疹（土名叫水鹵）驗方

东莞 李 正

【处方】 石決明（煅）四錢，文蛤錢半，云連二錢，雄精一錢，人中白錢半，水粉四錢，寒水石二錢。

【用法】 將藥共研細末，水調勻搽患处。

【适应症】 疱疹脚根紅暈，上面水泡色澄清，傳染很快。

治肩头生瘡方

澄海 金秋華

【处方】 正甘蜜三錢，淡池一錢五分，与猪骨髓共捶貼之。

【附注】 此病俗名鷄癰。

治赤游丹方

澄海 林賢忠

【处方】 田結夜七条，荊茄心七个（每个二寸長）。

【服 法】 水五小杯煎至三杯，服時滴白酒七滴。

砧白神方

汕頭 蔡仰高

【處 方】 生首烏二錢，當歸（全）二錢，白芍（酒制）二錢，炙草錢半，山甲珠錢半，木瓜錢半，皂刺錢半，白芷錢半，續斷二錢，防己二錢，澤瀉錢半，牛膝錢半，丹皮錢半。

【服 法】 上藥用水一碗八分，煎至八分服之，服三劑可愈。

藥渣用酒頭糟和勻捶爛，貼痛處。

【適應症】 足掌下面發炎腫痛或化膿，憎寒壯熱，痛苦非常，在前名印豆，在后名砧白，服之均奏效。此症勞動群眾患之較多，尤以農民為最多。

治出腐骨方

清遠 呂直純

【處 方】 用大蕉樹頭搗爛敷患處。

熊胆藥膏

順德 李庭芬

【處 方】 川連末三兩，大梅片一兩八錢，元明粉六兩，青黛粉八兩。

【制 法】 用多量黃藤熬膠，后將藥調成膏。

【用 法】 將藥膏外敷患處，日換二次。

【適應症】 治療癰疽初起紅腫熱痛。

二、疔 腫

生蛇疔

云浮 黃瑞林

【处 方】 雄黃二錢，輕粉五分，蟾酥二分，梅片一分，
川足一條，木鱉子三粒，川連二錢。

【用 法】 共研成末，開茶敷之，立愈。

【适应症】 治蛇疔兼治反唇疔、馬嘴疔有效。

頭面火毒紅腫方 封開 李宏文

【处 方】 大血散藥，秤星樹蘗。

【用 法】 煮水洗，并用秤星樹叶和地黃搗爛敷患處留
口，勿敷密。

【适应症】 不論男女，頭面紅腫，或腫成麻龍大。

入腦蛇方

封開 唐日光

【处 方】 生白头翁一斤，連頭春爛取汁。

【用 法】 用藥棉蘸汁，左耳痛滴右耳，右耳痛滴左耳。

【适应症】 耳內腫毒引及腦部刺痛。

夾頸蛇方

封開 黃會周

【处 方】 鴨仔菜，生鹽少許。

【用 法】 二味捶幼敷之，一次可消。

【适应症】 生頸項兩旁的瘡。

反唇疔方

封开 鍾盛南

【处 方】 曾子虫(一名水蛋家，生于塘、坑、圳水中)。

【用 法】 用网子撈來，搗爛开酒多搽患处，夏秋天热，可开七夕水搽，搽完后再取馬蹄菇煎水，半洗半飲有效。

【适应症】 生在人中唇口的疔。

面上腫毒症效方

封开 廖文廷

【用 法】 用鷄肝敷上痛处。

生紅綫瘡(俗謂生牛瘡)方

陈德品

【处 方】 路边白菊花根一兩，沙姜二片。

【用 法】 將葯蒸燒酒搽患处。

治生面疔方

龙川 張学堯

【处 方】 膳芋头一只蒸熟，加入蟬酥一錢，梅片一錢，地婢十只焙干研粉。

【用 法】 上葯調蜜糖成膏，敷面上，留下眼目口鼻，再服普济消毒飲，加大黃三錢服之更效。

又 方

龙川 張湖青

【处 方】 蜆壳一只，焙酥燒灰篩过。

【用 法】 上葯調茶油涂之。

【附 注】 如生面疔可用水藤香扭汁涂之。

治肩背生疔（紅腫熱痛）方

龍川 黃云章

【處方】 水霜魄根去皮衣。

【用法】 上藥和酒餅糟舂爛敷之。

治疔瘡草藥方 澄海 金秋華

【處方】 叶下紅、半脾蓮、蠶腳菜、燈籠草各適量，共捶爛貼之。

治疔瘡方 澄海 謝振民

【處方】 烏梅三粒（燉存性），丁香錢半，梅片五分。

【用法】 將藥研末，調茶油抹在疔瘡周圍。

治疔瘡方 澄海 王濟授

【處方】 用帶藤牽牛花捶烏糖貼之。

治珠疔（又名魚鱗疽）效方

普寧 許炯充

【處方】 銅青錢半，樟腦七分，明礪錢半，雄黃七分，青南姜少許。

【用法】 用飯和鹽搗勻敷患處，日換藥二次。

馬嘴疔方 封開 伍伯強

【處方】 雄雞冠血。

【用法】 用刀仔割雄鷄冠上，取血搽之即消。

【适应症】 唇口坚硬疼痛的疔。

又 方

封开 苏次平

【处方】 燕子巢泥。

【用法】 研末，开芝麻油搽。

【适应症】 唇口坚硬疼痛的疔。

又 方

封开 植炯南

【处方】 水仙花子錢半（研末），蟾酥五分。

【用法】 用酒浸化蟾酥，入水仙末和匀敷疔处，留疔头勿敷，將药末开稀搽之亦可。

【适应症】 唇口坚硬疼痛的疔。

又 方

封开 廖文廷

【处方】 生蜘蛛三只（去头足）。

【用法】 捶烂敷。

【适应症】 唇口坚硬疼痛的疔。

馬嘴疔方 广州救济分会 趙良杰

【处方】 雄黄精一錢，大梅片三分，鷄公冠血混和涂患处。

【适应症】 上唇人中处，初起是極小紅点，繼而全身不舒服，寒慄發热、剧痛。

三、瘰 癧

瘰癧方

封开 八耀榮

【处 方】 石斛、蓖麻仁各四錢，木鱉子仁三錢。

【用 法】 共研末，放空蛋壳內母鷄孵廿一天久，取出入瓶貯用，用时找仙人掌（生草）捶爛取汁，开搽患处可消。

【适应症】 項下結核等慢性淋巴腺病。

又 方

封开 苏次平

【处 方】 夏枯草四兩，玄参二兩半，桔梗、甘草、海藻、海蛤粉、川貝、連翹、当归、生地、生軍、薄荷、花粉、麥冬、枳壳各五錢，朴硝三錢。

【用 法】 共研細末，用青鹽浸水，澄清和葯煮透，加神麴煉糊为丸，每服三錢，开水送下。

【适应症】 項下結核等慢性淋巴腺病。

瘰癧外搽方

封开 苏次平

【处 方】 老石灰（炭火煨透），桐油。

【用 法】 經火煨过的老石灰，晒干研極細末，和桐油开搽患处，在未搽前，先用花椒葱头二味煎水洗淨患处，后搽此葯。

頸癰驗方 兴宁 高偉强 高穆寰

【处 方】 石玉粉（俗名石灰）二兩，葯餅（俗名鹼水）半兩，草霜八錢（鍋撈），麝香五分。

【制 法】 先將出爐潔白之石灰，臨風自發十天，不能近水，次后篩去砂石，然后將餅葯、草霜、麝香秤足分量，互相攪勻，用小竹子，用力調煉，連續三天，使葯有粘性成膏質狀態，以后裝置瓶中，使勿泄气。

【用 法】 病者先靜臥椅上，用火酒消毒患处，然后以墨圈癰子周圍，認明大小，再用棉花將葯膏涂上。

【注 意】 普通癰子可貼用二時半，每四十分鐘換葯一次，共換葯三次，如屬頑核，可增加半小時換葯一次，換葯時，先用小竹纏住棉花蘸冷開水洗之，然后敷上葯膏，大約二天至十天內癰子慢慢陷入化為癰水，再取方內服排毒，使由大小便出，癰子自然痊愈。

【禁 忌】 一歲至八歲勿用此葯，戒煎炒，色欲。

又 方

龙有忠

【处 方】 刺來藤，裸貢子藤，中根藤，和猪脚煎食有效。

頸癰驗方

順德 盧曦庭

【处 方】 白甲五十只，蜜糖一兩。

【制 法】 將白甲去頭足，腸翼，加入蜜糖一兩，搗成糊狀，共燉一小時。

【用 法】 燉后便可服食，病重者約服四十次，至愈為止。

【适应症】 頸癰。

治瘰癧保消方 澄海 余斯深

【处 方】 馬牙硝二錢，木鱉一錢，朱砂一錢，皂角一錢，巴豆六分，姜黃六分，大黃一錢，紅花六分，三棱一錢，莪朮一錢，金頭蜈蚣二條，麝香二分。

【用 法】 將藥研成細末，取紋銀絲針消毒后，針其患處，及患處前后結筋，使微微出血之后，用藥棉蘸75%酒精洗淨后，將藥末少許加入米醋，用京墨磨勻抹之，每天一次，輕症約七天，重症約二十天。

治瘰癧方 澄海 林樹芳

【处 方】 胡桃壳一个，全蝎二个，生蜘蛛二个。

【用 法】 將上藥入胡桃壳內，用綫縛緊，用湿紙包裹火煨存性研末，黃酒送服，至多服五次。

治瘰癧方 澄海 王应杰

【处 方】 桔梗五錢，麝香一錢，珍珠一錢，朱砂三錢，海藻五錢，元參三錢，川貝三錢，姜蚕三錢，赭石五錢，牛黃一錢，龍骨五錢，全蝎二錢，牡蠣五錢，羚羊一錢，犀角五分，胆星三錢，茯苓五錢。

【服 法】 將藥研末，加蜜为丸，成人每服二錢，夏枯草煎水送下。

外貼藥膏方

【处 方】 生川烏 錢，生草烏一錢，生南星一錢，生半夏錢半，生茨菇一錢，生馬前二錢，制沒藥錢半，制乳香錢半，大戟一錢，江子仁一錢，麝香一錢，蟾酥一錢，白芷二錢，芫花二錢，甘遂二錢。

【用 法】 諸藥晒干研末，和猪胆汁煮成膏，貼于患处。

治瘰癧方

恩平 馮耀銓

【处 方】 牙硝一錢，青鹽一錢，白矾一兩，地牛三十个（不用研），水銀一錢。

【制 法】 用大青碗一个載住藥，上盖以小碗，以泥封固，炭火燒至无烟为度，把上盖碗上的藥刮下，用飯和制丸，如綠豆大。

【用 法】 先用艾茸在患处中央灸之，隨即將丸放在膏藥中間敷上。每隔四天換藥一次，換時用綠豆水含口，以避毒氣。

治乳癌、瘰癧驗方

廣州 崔景山

【处 方】 山茨菇三兩，五倍子二兩，千金子仁一兩，紅芽大戟一兩五錢，白芷八錢，川麝香一錢五分。

【用 法】 研極細末，一半煉蜜为丸如綠豆大，每晚服一錢，開水送服，一半用蜜糖和水調勻日夜搽患处数次。另服湯劑：生甘草二錢，小麥七錢，生白芍六錢，山茨菇三錢，五倍子三錢，玄參四錢，全當歸五錢，干地黃五錢，大麥芽六錢，菖蒲三錢，龜板七錢。如有潮熱去當

归、麥芽，加花旗参、麥冬；痰火盛酌加南杏、川貝、沙参。

【适应症】 瘰癧大小如連珠及乳癌初起不紅腫痛而实者。

【禁忌】 孕妇忌服。

治瘰癧方

龙川 李文英

【处方】 矮脚狐狸尾根（生一兩、干五錢）。

【用法】 第一剂煮瘦猪肉；第二剂煮猪粉腸；第三剂再煮瘦猪肉。

【附注】 輕者三服痊愈，重者照法反复多服。

治多發性淋巴腺炎方

龙川 叶宜枚

【处方】 野薄荷。

【用法】 上药搗爛調酒敷之，另用地胆头一兩煎水服之。

治腹股溝淋巴腺炎

龙川 李济才

【处方】 炒山甲一兩，新鮮鷄蛋二只。

【用法】 上药研末，和糯米酒一碗煮开，早晚空心服，連服二剂，即愈。

治淋巴腺結核方 澄海 吳仰松

【处方】 灯籠草头三个（生、干均可）。

【服法】 和冬瓜碧煎水服。

四、痔 瘻

痔瘡驗方

龍門 鄒仁甫

- 【處方】 荊芥四錢，蟬衣四錢，防風四錢，甘草節四錢，透骨草（即白鳳仙花梗）三錢，瓦松三錢（人家屋頂有），癩蝦蟆草（又名臭婆娘草）四錢，老醋一兩，食鹽四錢。
- 【用法】 將藥清水洗淨濃煎至沸，加入老醋次下食鹽，溶盡，离火，傾入痰盂內，令患者端坐其上蒸之，候藥稍溫，復于患處洗之。

痔瘡及新久紅白痢症方

- 【處方】 槐花米一兩，黃片糖一兩。
- 【用法】 將藥煎服，大約服一至十劑可愈。
- 【外熏法】 用白花蟛蜞草、旱蓮草各三兩，濃煎，再加米酒和勻熏洗。

煮水浸外痔藥

陳靄平

- 【處方】 冬青頭、榕樹須、六耳凌各適量。
- 【用法】 將藥用水煮至數沸，俟溫，坐盆內浸之。

治久年不愈之內外痔症丸方

澄海 陳農余

- 【處方】 干生地一兩，槐花八錢，蘇銀花八錢，苦參根四錢，胡蓮六錢，刺楸皮四錢。

【服 法】 共研細末，將藥末藏入猪腸頭（約兩余）內，
燉一炷香久，取起搗爛和飯粒為丸，晒干，每服四錢，
用開水送下，約服廿天后見效。

治痔瘡方

清遠 陳耀榮

【處 方】 信石（煨）五分，枯礬一錢，烏梅肉一錢，朱
砂一錢，梅片一錢。

【用 法】 共研細末，茶油開塗患處。

治痔瘡方

清遠 陳子才

【處 方】 川麝五厘，川連末一錢，蟾酥五厘，熊胆二分，
珍珠末二分，牛黃一分。

【用 法】 上藥用適量水浸一夜，塗患處，日三四次，并
每晚用九里明二兩，五倍子五錢，銀花二兩，煮水洗
之。

治外痔驗方

欽縣 曾永芳

【處 方】 銅綠二錢，青礬二錢，枯礬二錢，胆礬一錢。

【用 法】 先取南蛇筋葉煎二小時取濃汁，后用散調勻。

先焗外肛痔瘡，待稍溫后，再加濃藥汁，用軟毛巾輕壓
痔瘡，痛腫即消。外洗三服可痊愈。

【禁 忌】 酒及燥熱物。

治痔瘡方

廣州 鄭先貴

【處 方】 桃叶（適量）。

【用法】 把桃叶捣烂敷患处，或将叶煮水熏患处。

又 方

龙川 刘子铭

【处方】 矮脚地菰连根叶四至八两，生葱连根叶三两，生姜一两（捶烂）。

【用法】 用水煮出味，倒入小盆内，上面架板，患者坐板上，乘热熏蒸，待温度适宜，则坐入水中浸洗，用此法治疗四次后，再用下方治疗。

又 方

【处方】 大茶药根（即断肠草根）五两（捶烂）。

【用法】 上药用水煮至出味，如上述第一方之熏蒸浸洗。

【附注】 体弱者不宜浸太久，此药治疗后便可痊愈，如仍不愈，再用下方。

又 方

【处方】 生葱连根叶四两，没食子一两轻则五钱，生姜一两（捶烂）。

【用法】 以上三味用水煮至出味，如上方熏蒸浸洗自能痊愈。

又 方

龙川 曾丙生

【处方】 五倍子叶十两。

【用法】 煮水十斤倒入浴盆内浸洗。

治痔瘡效方

肇慶 陸大成
鄧福英

【處方】 木鱉子五錢，細辛三錢，苦參五錢，桃仁三錢，白矾二錢。

【用法】 上藥水煎，去渣，用瓶貯水，用時，先用火酒消毒患處，棉花濕透敷上，每日換五次。

治先便后血驗方 欽縣 韋澄秀

【處方】 白头翁三錢，伏龍肝一錢，秦皮錢半，黃連一一錢，黃芩二錢，地榆二錢，丹皮二錢，槐花二錢，附子一錢，血余五錢，炙甘草錢半。

【服法】 清水煎服。

治脫肛方

龍川 黃立昌

【處方】 團魚頭頸骨。

【用法】 將藥加醋炙酥研末，每日早晚飯前各服二錢。

【禁忌】 孕婦忌服。

治脫肛日久不縮方

龍川 羅伯謀

【處方】 白樹叶（又名亞娘叶），席草头（織席的草）。

【用法】 將藥搗爛和麝香五厘，酒娘糟三兩敷臍，若恰縮至原位，即須去藥，如果縮得太入，則將藥換敷足底，出至原位則去藥。

治小儿脱肛与女人子宫下垂方

龙川 馮錦升

【处 方】 沙姜五錢，蓖麻子一兩，灶鷄子五只，黃精五錢。

【用 法】 上藥捶爛塗貼頭頂上，即愈。

【附 注】 直腸或子宮縮回至原位后，即須除去。

治脱肛方

澄海 吳仰松

【处 方】 蜘蛛二个，放于瓦上焙干研末，和灯盡（下）

油，用鷄毛抹之，同时服“补中益气湯”二剂。

增補治療痔瘻痔核驗方資料

广州 林紹庭

茲將治病方藥列下：

（甲）至于枯痔散，砒是主藥，但砒是一种有强力的腐蝕藥，且容易入血中毒，虽經過改良，还需要精益求精，俾使藥力更純淨，腐蝕力和中毒力减少，而对其效用不变，故精制砒，是有必要，茲將制砒法如下：

白砒一兩——（1）大黃、黃芩各五錢，水煎去渣，入砒煎干取起晒干。

（2）綠豆四兩，水煎至开二十分鐘，去豆，入藥同煎干晒干。

（3）甘草一兩，酒二大碗，先將砒放酒中浸廿四小时取出，和入韭菜汁二碗煎少頃，將砒放于湯中，煮干晒干。

(4) 西瓜汁二碗，將砒同煮干晒干。

(5) 瘦猪肉三兩，捶爛如泥，入豆粉二兩和勻，將砒包于肉粉中。又用豆粉包作皮，放炭中燉至烟尽为度，候冷去肉粉，取砒用。

(6) 明矾末五錢，放在磁鍋內，又將制砒研末，与白矾調勻，火炭焙至矾枯为度，取起退火毒。

【枯痔散处方】 (一) 蟾酥、冰片、熊胆、麝香、牛黄、三仙丹、琥珀、朱砂、儿茶、乳香、沒药、制砒各等份，右研細末，調蒸流水涂痔核，一日二次(冰片先用酒精化开加入)。

注：三仙丹是用水銀、牙硝、白矾提升为丹。福建漳州出品最純力足，亦是具有腐蝕力，与砒配合，增强其药力，在治疗过程較短，減輕其中毒分量，而且配合止痛消炎药。

(二) 銅青二，枯矾二，制砒三，梅片二(酒精化开)右研極細末，調蜜涂。

注：銅青亦是一种銅类腐蝕药，会增强砒力，但可能痛加劇，宜加奴佛卡因。

(三) 爐甘石、儿茶、三仙丹、冰片、朱砂、滑石粉各等份，研細末，調猪脊髓涂。

(四) 活鯽魚一尾，刮去腸雜，入白矾令滿，火煨存性，研細末，調猪胆汁扫上。

按第一、二处方，枯痔代替药方。第三、四处方，

是治尚未脫出肛外第一、二期痔核。

分泌物增多，帶起肛門四周圍發生濕疹。利用下藥敷。

【處方】 一、白芨、生石膏、黃連三錢，枯矾一錢，冰片、麝香各二分，石細米、調蛋白、冬蜜各一兩，涂四周圍。

二、胡粉（Clumbi carbonas）一兩，裝入銀罐，煅開成老金色研末，又加冰片三分研末，摻。痔核、痔瘻，效驗治療法。

【內服藥處方】 一、甘草丸——每服輕者三錢，重者五錢，槐花三錢煎湯送下，一日一次，常閉結痔核有效。

二、土杉根七錢，綠豆四兩，梨樹寄生、梧桐樹寄生各三錢，同猪大腸頭（肛門）一節，烘熟連服三次至七次自消。

三、正川七一錢半，牛膝七錢七分，大黃三錢二分，銀花四錢四分，白蘚皮三錢三分，荊芥四錢四分，赤椿叶七錢七分，連翹、枝子各二錢二分，衰弱者加北沙參七錢七分，肉蓯蓉四錢四分。研末，神麴糊為丸，桐子大，分作七次，七日空心服，痔并下血，服后半個月自消。

四、水魚（鱉）一只約一斤，去血、去頭、腸雜、用酒燉熟取肉，另用干柿果一個燒灰，蘆甘石、朱砂、中白各一錢，同水魚、酒再燉片時，取肉藥一起食。治痔瘻穿腸有效。

五、槐花（炒黑）青黛一兩，當歸一兩，右研末糊丸，先嚼胡桃肉一個，用淡鹽送下三錢，治痔瘻。

六、槐角子一斤，當歸三兩，右為末糊丸，桐子大，每服百余丸，酒送下，治痔核腫劇痛。

【熏核方】 九里明(青草藥店買)、榕樹叶各四兩，水三斤，煮沸二十分鐘，將藥汁傾入窄口痰壺，乘熱坐在壺上熏，候藥汁溫洗痔核，并用下藥抹。

【處方】 阿魏、鹿角霜各二錢，研細末，再加冰片五分，調水敷。

【痔核軟膏處方】 (甲)綠豆粉二兩，甘草八錢，黃柏六錢，黃連、黃芩各二錢，硼砂一錢半，梅片一錢，天竹筴五錢，牛黃二錢，薄荷冰一錢(另研末)，共研成細末。(乙)木鱉子白一兩二錢，天花二錢，虎咬簕一兩二錢，白豬母乳一十二兩，白花菜六兩，叶下紅四兩。(青草藥店有賣)

【制法】 麻油二斤半，將(乙)藥同熬至滴水成珠，去渣加入黃蜡九兩(夏天十二兩)，候稍冷加入(甲)藥散。溫度極微時，最后加入薄荷晶攪搖勻，裝入錫管，注入肛門，每日二次。

以上處方都是臨床實驗有效的藥物，作為治療和參考材料。

五、疥 癬

疥癬效方

順德 陳義生

【處方】 硫磺五錢，三仙丹一錢，黃連末四錢，冰片五分，大楓子油適量。

【用法】 將藥研末，塗搽患處。

癬疥藥

珠海 徐煒高

【處方】 鷄爪蘭（四會土名）是盆栽品，采叶搗爛搽汁搽患處，這藥汁放存愈久愈好，性能不變，搽後無刺激，愈後無痕迹。

松皮癬方

廣州 歐治源

【處方】 地膚子五錢，蒼耳子三錢，澤蘭叶三錢，云苓皮八錢，防風二錢，荊芥錢半，薄荷一錢，黃芩二錢。

【用法】 清水煎服。

治魚鱗瘰（魚鱗癬）方

龍川 黃言可

【處方】 細辛五分，梅片七分，樟腦七分。

【用法】 取河魚一條剖腹，將藥末裝入魚腹內，待魚腐爛取汁搽之。

治疥瘡（百瘡散）方

澄海 吳仰松

【處方】 黃三仙一錢二分，枯礬一錢八分，水粉二錢四分，淡池三錢，兒茶三錢，大黃三錢，樟腦二錢四分，黑楓子肉卅六粒。

【用法】 共研細末，抹時先用涼茶水洗瘡口，然後將藥末和香油調抹。

【適應症】 凡新老疥瘡及肩頭擦破生瘡者。

治疥癩方

清遠 潘恩普

【處方】 文蛤半斤，白芷半斤，茶油二斤。

【用法】 將藥煎枯去渣后，入胡椒粉一錢半，雄黃精末一錢，樟腦三錢，硫磺末一斤，再入蜜蜡溶解，候溫擦患處。

治生油熾方

清遠 賴植生

【處方】 用生葱頭捶爛擦患處，止痒干水，三至五天可愈。

又方

清遠 黃耀南

【處方】 生白欖數枚，去核，搗爛，把汁擦腎囊。

六、濕疹（包括花柳）

飛瘍方

揭陽 曾鴻舒

【處方】 老虎婆（藥店無備此藥，要平時採取）晒干為粗末，用時加入山羊紅一錢至二錢，油虫屎二錢至三錢，紅酒共蒸，蒸后取紅酒食下一二杯，余渣包布擦患處皮上，無不見效者，服此藥不知有油虫屎味者，便是飛瘍無疑。

【適應症】 如發冷膜，頭面虛腫，痒不可言，或麻痺，最忌風寒，愈后若被風寒所感即要復發。

治尋癩疹（俗名鬼風、風癩）方

东莞 單耀明

【处 方】 樟木子兩半，桂枝尖一兩。

【用 法】 清水煎，乘熱熏洗之。

花柳方

鶴山 黃加偉

【处 方】 全虫五分（去頭足），江子肉三分（去油），大黃五分，正麝香一分，紅黃五分，正血珀五分，正川連五分，川足一條（去頭腳），紫草茸五分，正珠末一分。

【制 法】 共研極細末，不可見火。

【用 法】 分十一包，體健者，每日服一包，如體弱者，隔日服一包。用開水或蜜糖送服。

治花柳毒方

澄海 林鴻聲

【处 方】 金蟬四十八只，葶薺四兩，潮蓂四兩，牙蕉根四兩。

【用 法】 將上藥用十三碗水煎至六碗，分二日服之。輕者一劑，重者二劑，各症退後，應以六味地黃丸補之。如腎陽虛，宜附桂八味丸，用潮蓂煎湯送下，以清余毒。

【适应症】 花柳毒伏肺，咳血失音落肉，病原初因毒濁，服通利之藥過多，損及腎臟，致肺腎具虛，不能排毒外出。

第六篇 灾害外科症类

一、狂犬咬伤（附一般犬咬伤）

癩狗咬伤方 广州 趙良杰

【处 方】 藟青、万年青、鵝不食、假紫苏、假紅藍（假紅絲綫）各一兩，加水煮熟搗爛敷患处，未敷前先用銀器消毒，刮清血迹，然后敷之，几天可愈，最好先食燒鵝五兩，亦无复發之虞，忌食糯米及金瓜一百天。

治狂犬病方 丰順 周治清

【处 方】 刁竹一錢，雄黃精一錢，細辛一錢，生甘草一錢，山豆根三錢，馬前子二只（均用玻璃刮去毛，一只生用（选細小的），一只用谷壳灰煨，存性），共研末，冲开水服，成人一次量，儿童按年齡照減，此方服后痊愈的，忌聞鐘声。

【附 注】 該方系兴宁水口区著名有效方。

【編者按】 此方馬前子有毒性，用时須慎重。

又 方 丰順 許振剛

【处 方】 斑猫（即花螻虫）廿一只，另用鷄蛋煮熟去壳，將斑猫包在蛋內，再蒸，去斑猫食蛋，每天服蛋一

只，共三天。

【外 用】 馬甲子（春用叶，秋用藤）捶黃糖貼被咬傷處。

又 方

【处 方】 斑猫四十九只，用米泔水浸一宿，取起去头、足、翅，用清水熬斑猫，去渣取汁，北杏仁四十九粒，溫水浸去皮，候干，將斑猫汁浸杏仁，候干。

【用 法】 每次食杏仁二至三粒，每小时服一次。

【附 注】 如无狂犬病毒者，服药后会有口、舌腫痛，腹痛等不适现象，如系狂犬病則不会。同时須兼服瀉下利尿剂使大小便通暢。

治狂犬病方

封开 莫福林

【处 方】 吉祥花（正万年青大种的）捶糖敷。

【适应症】 毒狗咬。

治狂犬病方

封开 李考年

【处 方】 甘草錢半，杏仁錢半，口嚼爛敷患处。

【适应症】 瘋狗咬。

【編者按】 普通犬咬用甘草杏仁可以治療，至瘋狗咬能治否尙待証实。

治狂犬咬伤方

云浮 潘宝林

【处 方】 正川連二錢，北杏四錢，大甘草二錢，茯神三

錢，斑蝥虫廿四只。

【制 法】 取米一撮，將斑蝥虫和米炒至黃色，去淨斑蝥虫不用，只將米研成細末。

【用 法】 將葯四味，用水二盅煎至一盅，沖入米粉和勻連粉服盡。

【附 注】 本方曾救多人，不可忽視。

治癩狗咬傷方 云浮 朱旺貴

【處 方】 甘草，果皮，豬兜沫，番薯葉，捶爛敷傷處。

治癩狗咬傷方 云浮 鍾伯平

【處 方】 萬年青約三至四兩，煮水服，約服三至四斤。

治狂犬咬傷病方 云浮 黃瑞林

【處 方】 萬年青莖，草鞋頭，六月雪莖，各適量，水煎服。至多次即愈。

治狂犬病方 云浮 蘇善卿

【處 方】 斑蝥虫（去頭足燉存性）每服三分，加六一散沖服，如小便紅而刺痛，用萬年青，六月雪，煎水服之。

【編者按】 斑蝥虫毒性頗大，用時宜慎。

治癩狗咬傷方 陳福泉

【處 方】 大柚皮（燒黃）二三只。

【制 法】 將藥用碳酸水加麻油攪勻敷傷處。

又 方

【處 方】 人參錢半，甘草錢半，茯苓錢半，川芎錢半，羌活錢半，地榆三錢，獨活錢半，柴胡錢半，枳殼錢半，桔梗錢半。

【用 法】 每日服一劑，連服二三劑。

治狂犬病方 清遠 郭述初

【處 方】 控涎丹、甘遂、大戟、白芥子各等分。

【用 法】 上藥為湯為散均可，開水開服，每服五分。

治狂犬咬傷驗方 欽縣 李桂南

【處 方】 紅鯉魚一條，蘆荻竹一握，煎好酒飲，並將水洗身。

治狂犬病驗方 廣州 叶永青、鍾新泉

【處 方】 鷄谷虫（又名花羅虫，即斑蝥）一只，大（冬）糯谷米二粒。

【制 法】 將虫去腳爪，焙干，研成粉末。

【用 法】 分三包，日服三次，開水送下。

【適應症】 狂犬病。

【禁 忌】 服藥后要戒口一百天，如鷄鵝、竹筍、鯉魚、八月豆角等。

治狂犬病方

鍾岳降

【处 方】 茯苓、枳壳、桔梗、柴胡、甘草、羌活、独活、川芎、前胡、薄荷、生姜各三錢。

【用 法】 將藥煎好，另加生地榆一兩，紅竹葉搗汁沖服，連服三劑。以生黃豆入口咀嚼覺不腥為無毒。

【附 注】 在窮鄉僻壤的地方，不容易配藥時，可先找金公翹葉、蛤仔腳樹葉、萬年青三味共搗，以米酒沖服，然後繼續服藥。

治狂犬病方

龍川 劉求仁

【处 方】 土狗子。

【用 法】 上藥用瓦焙酥，研粉和酒服下，服後下瀉而愈。

治狂犬咬傷痛不忍方

龍川 黃子青

【处 方】 馬錢燒灰存性研末。

【用 法】 上藥和燒酒塗，傷口即愈。

狂犬病方治

清遠 何季甫

【处 方】 酸楊桃十餘斤，晒半天，用埕（罎）載好，不要放水，經過三月後，用其渣與黃糖混合敷傷口，用糖開楊桃水飲，日飲四兩，連服七天。

治狂犬病方 清远 侯世良

【处 方】 金边土别，桃仁，和黃糖捶爛，敷伤口，分量按伤口大小而定。

治狂犬病方 清远 黃 芳

【处 方】 用假薄荷四兩，搗爛，开水燙熟，加些黃糖开服，其渣涂敷伤口。

治狂犬病方 清远 陈瑞初

【处 方】 黃皮叶，通菜头、白苣薯藤，番瓜（去核），分量酌用。

【用 法】 用冻开水搗爛敷伤口，并可把搗爛的汁飲些少。

治狗咬方 澄海 張守臣

【处 方】 石榴心一兩（叶也可），馬蹄金一兩。

【用 法】 將上药捶取汁，和桂枝末三錢調服后，用該青草渣再和桂枝末、烏糖，共捶酒貼伤口。

瘋犬咬人影驗方 广州 胡香余

【处 方】 銅鎖一把連鑰匙一条（不論大小），大糯米四兩，紫竹蔗一尺（帶皮破碎）。

【用 法】 清水煮熟，去鎖連鑰匙及蔗等只食其飯，連食三、四次，每日一次。

【附 注】 人影被獺犬咬伤后，天本无風，病者感觉風大，这时病屬危險，急服上药三次自愈，愈后戒酒色一年。

【編者按】 所謂犬咬人影，系世俗說法。实际系沾染瘋狗毒素，虽未被咬伤，亦能發作狂犬病。

蛇、犬、虎伤效方

肇慶 陆大成
鄧福英

【处 方】 樟木子一斤，甘草半斤，生万年青二斤，苦参半斤，干姜四兩，当归半斤，細辛四兩，桃仁四兩，桑寄生一斤，魚腥草二斤。

【用 法】 上药用水煎，去渣，加白矾二兩，冰片二錢，用瓶封貯，用时，將棉花湿透敷患处。

【适应症】 治諸般咬伤。

又 方

肇慶 陆大成
鄧福英

【处 方】 生半夏四兩，甘草二兩，細辛二兩，苦参四兩。

【用 法】 將上药研成細末，用瓶密封，凡伤口处，先用火酒消毒后，再涂以麻油，然后將药敷上，另加冰片、麝香少許，容易封口。

二、蛇蝎咬伤（包括蜈蚣、老鼠咬伤）

毒蛇咬人效方

黄萃昌

【处 方】 黎壁叶，雷公豆。

【用 法】 用酒炒，取汁来服。

毒蛇咬伤验方

顺德 萧沃林

【处 方】 大叶七星剑（用叶和嫩梗），大叶蛇总管（用头，种有三年以上者），入地金牛公（用茎之皮），双眼龍（用叶），雄黄精，玉绣球（用叶榨汁）。

【制 法】 上列各药，同等分量，研极细末，再用玉绣球榨汁和为丸。每粒重一分。

【用 法】 每次二粒，有嘔者继续服二粒，非因毒蛇咬伤误服此药者，可用黄精解之，若被青竹蛇咬伤，用生韭干菜煎水服。

【适应症】 毒蛇咬伤。

青竹蛇咬伤验方

顺德 黎 良

【处 方】 七星剑（生草药）一兩五錢。

【制 法】 捣烂用酒浸。

【用 法】 善饮酒的多开，少饮的少开，酒和药量须按一定比例，饮后用刀将伤口割开流血，放清毒素，然后将药渣搽伤口。

毒蛇咬伤驗方

陈德君

【处 方】 半边旗（草名）。

【用 法】 浸酒飲服。

又 方

【处 方】 金不换（草名）。

【用 法】 將藥浸酒飲服。

毒蛇咬伤驗方

陈信如

【处 方】 蛇王草。

【用 法】 藥生用六錢，搗爛，熱酒冲服。干用研末，熱酒冲服。

蛇、蜈蚣咬伤方

張健光

【处 方】 山甲，浙貝，皂角，銀花，乳香，花粉，沒藥，歸尾。

【用 法】 將藥煎服，并用外敷藥，第一次用綠豆二兩，馬蹄去皮二兩，共捶敷；第二次用野麻頭四兩，柏叶三兩，黃糖二兩，共捶敷；第三次用野苧蘆四兩，生指甲叶三兩，片糖二兩，共捶敷上。

毒蛇咬伤驗方

普宁 張伯色 張伯神

【处 方】 單畔筆一兩，金獅藤一兩半，倒坎菊一兩

半，薄荷仔八錢，胡椒根一兩，半刀薊八錢，割蛇劍一兩，紅心杏二兩，刀竹八錢，細辛五錢，白芷兩半，紅精三錢。

【制 法】 共研細末，用酒和面粉煉糊為丸。

【用 法】 成年人每服四錢，小兒減半。

毒蛇咬傷方

陳福泉

【處 方】 白矾二錢，白蜆錢半，玉茸錢半，茯神二錢，細辛錢半，靈先二錢，白芷二錢，川芎錢半，丁香一錢。

【用 法】 將藥以清水煎服。

毒蛇咬傷方

陳福泉

【處 方】 鳳尾草、二面針、掃把枝（松花蕊）、吹波草、禾花氣、老虎須各少許。

【制 法】 將藥用雙料酒半斤煮食。

【用 法】 腫甚加吹波草，痛甚加二面針，如孕婦食後宜于數小時再服十三太保一劑。

毒蛇咬傷方

揭陽 魏坤娥

毒蛇咬人為害甚烈，其毒在牙，被咬者，二分鐘後周身麻痺，頭痛口渴，一點鐘則目蒙不能見物，二點鐘即能死亡，被咬之處慎勿貼藥（否則逼毒內入），服藥後候其瘡口變黑色，以細磁器碎片割破，砭去毒血而愈。

初咬時縛緊其上部，使血流慢緩，切勿以手摸其傷口，

以免染毒他處，更為厲害，倘驟然不能得藥，可服米酒至大醉，以暫抵抗，慎勿洗水，著水即死。

蛇咬一事，常在田間，甚或黑夜，迨至發覺，則蛇遠去，不明其是否毒蛇，則依兩種証據，一是視其症狀，兩點鐘內不發病，可無問題，一是視其齒位以作鑑別，如下：

有毒的：（一）白花蛇（即希扶鱗）（）全斑齒，圓形無血，無痛，而麻木。

（二）烏、白暗鑽，（烏、白梢蛇）兩個齒位甚深，浮腫色黑大痛。

（三）青竹標：有血，大痛，此蛇常住山坑。

（四）黃金鉀（）此蛇之舌不甚毒，其尾巴有毒齧，口咬而轉尾螫之，故口位之外尚有一個毒瘡，此蛇亦常住山坑。

無毒的：（一）水蛇（）含齒四個有血有痛。

（二）草花蛇（）不含齒有痛，流血甚多，水蛇與草花蛇，但如遇孵子之時，瘡口有腫有黑，多血不痛，亦有死亡。

治療處方有二：（一）是中藥，（二）是青草藥。如是外科生蛇者，則用（一）方研末外敷，（二）方煎水調酒內服，如是蛇咬，則二劑同服，如被咬者，須早服藥，愈早愈好。

【中藥方】 生南星、川白芷、蔓攢、牙皂角、細辛、川大黃、正雄精、薊刁根各三錢，川蜈蚣三條燉用，上藥共研細末外科敷用，咬傷同下方內服。

【草藥方】 金劍草、金花草、金香爐、金鎖匙、山厚合、白花七托蓮、黃花仔、千年蓀、關刀筆、山勸菜、節節

花、一枝香、倒地梅、白花鬼仔目周根各五錢，川蜈蚣五条煅用。

【用法】上藥晒干研末，生蛇單用草藥方服，蛇咬與草藥合劑同服（白米酒二同煎）。

又方

揭陽 林 猛

【處方】紅枝乳（鈴）仔草四兩，金西藤四兩，牛刁根四兩，金樹香六兩，龍眉筆四兩，山節花四兩，一枝香四兩，山厚合四兩，倒金菊四兩，土（鋪）地錦四兩，馬丫織四兩，黃花仔四兩，消山虎六兩，六角英六兩，半畔蓮六兩，鹽酸藤六兩，藥丸草五兩，金香草六兩，割蛇劍五錢，薄荷四兩，明雄精八兩，細辛三兩，刁竹三兩，金胡蘆五兩，白芷六兩，半夏三兩，蜈蚣三十條，川連二兩，南星五兩，皂角三兩，五靈脂四兩，川貝三兩，川大黃四兩，山甲三兩，七托蓮三兩，黃芩三兩。

共研細末和薯粉糊為丸，外用雄精為丸衣，每服十丸，散劑則每服三至四錢。

【加減法】白花蛇咬着陰毒用下各藥，須加重用酒送下，

薄荷，雄精，白芷，細辛，薯蕷，刁根，半夏，蜈蚣，川連，南星，皂角，五靈脂（共研細末，每服加錢半）。

烏梢蛇咬着陽毒用下各藥，須加重用酒送下，

川連、川貝、大黃、山甲、七托蓮、黃芩，火盛加犀角，浮痰加麝香、牛黃、珍珠、朱砂（共研細末，每服錢半），如危急垂死者，用蜈蚣浸酒灌入口或可望生。

又 方

揭陽 楊 甦

【處 方】 雄精五錢，細辛一兩，白前一兩，必發三錢，
靈脂五錢，靈仙五錢，刁竹一兩，白芷五錢，龍頭荷三
錢，白花茶時紅一兩，半舌紅一兩，兒舌紅一兩，白枝
七葉蘭一兩，重樓一兩（金錢重樓即七托蓮）。

【用 法】 共研細末，每次五錢，溫酒服。

（此方可治鎖喉蛇：症狀：頸有一條腫起，繞項一周）。

【附 注】 （此方由錢坑林仁生傳來）孕婦忌服。

又 方

揭陽 吳 濟

【處 方】 山胡椒根（又名金獅藤），一枝香，龍眉筆，
節節花。四味每味各五錢重（各青草藥物以桑浦山出產
者佳）。

【用 法】 先將患者的傷口用火酒消毒後的磁器割開傷
口，揉去其惡血，後將上開的藥物捶爛，下酒浸後，取
酒與患者服之，藥渣捶貼瘡口，可使患者免致危險。

〔附〕新濠區中醫公開治療毒蛇咬傷驗方

（一）普通蛇咬傷不甚重者

【處 方】 雄黃三錢，紅花三錢，吳萸錢，川貝二錢，五
靈脂三錢，川連錢半，連翹三錢，白芷二錢，法半夏三
錢，甘草一錢，靈仙三錢。

【用 法】 淨水煎加酒一杯沖服。

(二) 毒重而身体强壮者

【处 方】 羚羊五分，犀角五分，生地五錢，銀花三錢，川連二錢半，田七一錢，浙貝二錢，吳萸二錢，灵仙二錢，枝子二錢，归尾一錢，花粉二錢，防杞二錢，黃柏二錢，灵脂二錢，黃芩二錢。

手部加連乔桂枝，脚部加牛膝川木瓜同煎。

【用 法】 水煎服。

(三) 蛇 丸

此丸專治蛇咬并治运身蛇，蛇头纏指，无名腫毒等。

遼刁竹，鹿耳苓，金鎖匙，大叶蛇总管，假苦瓜，半边旗叶，金鷄爪，香莢，鵝不食，烏臼头，狗脚迹，田基黃，半边蓮，以上各四兩，七星劍八兩，共藥十四味，晒干研末，煉蜜为丸，每个三錢，蜡壳封固，倘被蛇咬伤，即用銀器清水刮去惡血，用一丸开酒服，一丸敷伤口，一边露口流毒，毒尽即愈。

(四) 消毒飲

蛇毒未清，时流惡水，再服此方，外敷下方草藥，即愈。

【处 方】 人中黃三錢，金銀花五錢，紅条紫草一錢，归尾三錢，赤芍三錢，防風一錢，白芷錢半，連乔三錢，麥冬二錢，灵脂二錢，清水煎，加酒冲服。

(五) 外敷方

【处 方】 鬧楊花并叶，五子金叶，七星劍叶，鰓 鯢 抱叶，落地生根叶，白麻头。

【用 法】 以上捶爛敷患处，倘好作痒，毒水流清即去鬧楊花，加封口散敷之即愈。

【适应症】 咬伤后，时流黄水，不能收口，用此方敷患处。

(六) 封口散

【处 方】 梅片、川連、雄黃、甘草、血余灰、白芷、青黛各二分。

【用 法】 以上各药研末，搽患处，或用腊梅油开搽。

(以上六方是土華鄉中医梁國柱公开)。

(七) 治毒蛇咬伤用此方浸酒

【处 方】 細叶双眼龍三兩，老虎鬚一兩，黑面神一兩，小蘭青一兩，鹿耳苓一兩，独脚烏白头一兩，大蘭青一兩，節節花一兩，鬼羽箭一兩，鯽魚草一兩，寮刁竹一兩，金鎖匙一兩，威灵仙一兩，田基黃一兩，入地金牛一兩，鉄包金一兩，毛麝香一兩，一枝香(又名七叶一枝花)一兩。

【用 法】 以上各药，先晒干，然后用三蒸酒三斤浸至一个月出味应用，其用法如下：如被毒蛇咬伤时，先將蛇牙痕迹尋見，用銀針挑出，若系看不明伤口，可用牆边青苔

和片糖舂爛，擦傷口左右，定有傷口發現，再將蛇牙挑出，隨用了哥黃叶（又叫九綫藥）一握和片糖舂爛，敷傷口二三次，兼飲此酒，每日早午晚三次每次約二兩，不能多飲酒者，可以減少，定必見效，又要檢查被咬者之傷口處，若有黃濇水流出，此系毒氣未清，要用黑面神樹頭或叶一握，煮水飲之，以止黃毒水才好。

（此方系畬頭鄉黎姓捉蛇師留存，林博海中醫公開）。

（八）毒蛇咬方

【處方】 吳茱萸二錢半，細辛二錢半，紅黃四錢，防風三錢，靈仙二錢，白芷四錢，川連二錢，八角二錢，甘草三錢，田基五錢。

【用法】 清水一碗煎服，服后用藥渣擦敷傷口。

（九）草藥方

【處方】 豬腳蓮，半边棋，毛麝香，菊花心，蛤蜊王，聊刁竹，山桂花，石上蓮，土牛膝，金雞爪，金鎖匙，紫貝金牛。

【用法】 以上生藥各三錢，浸酒一斤备用，每次服二兩，或用酒兩碗煎至八分。

（以上兩方系土華鄉正骨衛逢生公開）。

（十）佛山普君墟捉蛇祖傳方

【處方】 靈仙，銀花，連翹，雄黃，云連，生半夏，胆

草，川芎，紅花，白芷，吳萸，以上各二錢，用酒冲服。

另用蒲公英、苦地胆、半边莲、蛇总管、紅茶各二錢，研末敷伤口。

（十一）毒蛇咬伤方

【处 方】 金雞爪二錢，山茨菇三錢，金耳环二錢，土白芷三錢，土香干三錢，山辣了二錢，擦刁竹三錢，榕樹須三錢。

【用 法】 以上八味，共研細末每服三錢，好酒冲服，后用酒开此散搽患处，用瓶裝勿泄气，日久可用。

（上兩方瑤头中医何君耀公开）

（十二）蛇咬伤方

【处 方】 吳茱萸錢半，大茴香一錢，甘草七分，雄黃七分，檳榔五分。烏肉蛇咬加白矾五分，过基合蛇咬加六耳苓五分，金脚帶蛇咬加苦參三分五厘，硫黃三分半，其余蛇不用加減。

【用 法】 以上藥共研細末，用酒同煮尽量飲即愈。

（此方乃歙和市利群中医联合診所陈达聞中医公开）

（十三）順德喜涌关世慈治毒 蛇咬伤方

【处 方】 雄黃精七錢，川貝七錢，白芷七錢，細辛五錢，尖檳七錢，五灵脂一兩，鹿耳苓兩半，吳萸七錢，

苦參一兩，靈仙一兩，梅片錢半。

【用法】 上藥共研細末，煉蜜為丸，每重二錢，加蠟封固，用酒和服，并將藥渣外擦。

（十四）彬社書院門口石碑方

（河南隔山蛇王馮初傳來）

【處方】 威靈仙、雄黃、白芷、五靈脂、甘草、川貝母、吳萸、細辛、金銀花各二錢。

【用法】 水煎服，加酒沖更效。

【加減法】 過基合：傷處如品字形，依上方加六耳茶一分。

金腳帶：傷處即咬即黑，依上方加六耳茶二分，硫黃二分。

烏肉蛇：（即飯鏟頭）傷口拱起圓泡，加白矾二分，六耳茶二分。

青竹蛇：傷口甚小，火照即熱，加六耳茶二分，苦參三分。

長尾雕：傷口與青竹蛇同，單用吳萸八角開酒服便可。

步斗蛇：傷口即咬即展開，可用上藥無加。

騷鼠（又名毛蛇）：傷口即咬即出血，立生痰，食物立吐，用硫黃、細茶、八角三味嚼爛敷之，單服吳萸即愈。

（十五）簡煥竹蛇方

（小洲中醫叶瑞禎公開）

【處方】 靈仙、甘草、銀花、細辛、吳萸、白芷、山

貝、防風、連翹、雄黃精、靈脂、扁蓄各三錢。

【用法】 酒水各半同煎，最好加燒酒沖服，以飲醉為度，連服三劑，永無復發。

（此方已傳下數十年，醫治蛇咬傷者有百多次，均獲痊愈）。

（十六）草藥方

（瑤頭鎮中醫潘平宇公開）

【處方】 田基黃、鉄包金、獨腳烏、鹿耳苓、龍胆草、假苦瓜（生藥）、七星劍、金耳環、半邊蓮、蛇总管、擦刁竹、天簡菜、細金、辣位草各一兩，雄黃精五錢。

【用法】 研末每服三錢，開酒服，另開少許外敷咬傷部位。

（十七）治毒蛇咬傷方

（區澤林中醫公開）

【處方】 天井灯四兩，浸酒一斤，治各種蛇咬傷，口服用。

（此種生草藥產于南海縣沙貝鄉，廣州藥店沒有出售）。

（十八）毒蛇咬傷方

（瀝滘鎮捕蛇者傳自大瀝墟驗方）

【處方】 威靈仙、五靈脂、川貝母、雄黃精、川白芷、川連、吳茱萸、甘草各三錢。

【用法】 用水酒煎服，藥渣搗爛敷患處。

(十九) 外敷方

【处 方】 灵仙三錢，細辛三錢，六耳苓五錢，灵脂三錢，川足四条，蛇总管一兩，雄黃三錢，川連三錢，半边蓮三錢，白芷三錢，狗脚脊一兩，双眼龙一兩。

【用 法】 共研末，用水煮成膏敷患处，消腫止痛散毒除腐肉。

(二十) 又 方

【处 方】 先用吳萸三錢煎服，后用下方：

吳萸三錢，熟草烏三錢，甘草梢三錢，灵脂三錢，白芷三錢，擦刁竹三錢，小牙皂三錢，尖檳三錢，牛玉五分，雄黃精三錢，熟南星三錢，小茴三錢，熟川烏三錢。

【用 法】 共研細末，为丸，每个二錢，如被毒蛇咬用一丸开酒服，并敷患处，消腫止痛。

(二一) 蛇咬方

(利群中医联合診所梁星階中医公开)

【处 方】 山辣蓼一兩，吳萸一兩，七星劍一兩，金雞爪五錢，香于一兩，山茨菇一兩，仙人对坐草(要叶)一兩，野石榴远一兩，龙胆草一兩，半边蓮一兩，山刁竹一兩，六耳苓一兩，金耳环五錢(浸酒三斤，飲三酒杯随量將酒搽伤口)。

（二二）烏肉蛇咬伤方

【处 方】 川連、龙胆草、甘草、細辛、白芷、吳萸、灵脂、威灵仙、川貝、六耳苓、木服鹽、田基王各三錢。

【用 法】 水煎用酒冲服，后打爛药渣敷伤口处，連服三服，每日一服。

（二三）过基合蛇咬伤方

【处 方】 白芷、法夏、甘草、川貝、紅花、知母、雄黃、灵仙、吳萸各三錢。

【用 法】 服法如上方。

（此二方是土華鄉捕蛇者梁景全公开）

（二四）陈伯益治蛇咬伤方

（陈永祥中医公开）

【处 方】 吳萸、白芷、灵仙、雄黃、紅花、甘草、連乔、法夏、灵脂各三錢，酒冲服。

【附 注】 如不到肚，先用青蒿煎服，及用九里香棘刺伤口，使流出毒水，易愈。

（二五）經驗蛇咬方

【处 方】 灵仙三錢，灵脂三錢，雄黃三錢，白芷三錢，吳萸三錢，貝母三錢。

【用 法】 以上药味用酒煎服，用药渣擦伤口。

(二六)化毒方

【处 方】 生大黃一兩，穿山甲炙二錢，归尾五錢，白僵蚕炒三錢，蜈蚣一条炙，以上共研末，每服二錢。

(二七)毒蛇咬方

【处 方】 痴头婆一錢，雄黃精二錢，以上药共搗爛，用酒調服，并用渣敷伤口。

(二八)又 方

【处 方】 吳萸、白芷、雄黃、灵仙、灵脂、防風各等分，以上药味用酒煎服，后用渣搗爛，再加独行千里草共搗，敷伤口。

(二九)又 方

【处 方】 蛤屈草，田基王，假紫苏，假茨菇，以上生草药同千里独行草用酒煎服，后用渣敷伤口。

(三〇)又 方

【处 方】 吳萸六分，草節三分，六耳苓八分，八角三分，雄黃三分，尖檳二分（服法同前）。戒食黃酒、生姜、子鴨、魚腥火毒之物。

（以上各方是白鶴洞正骨莫桂昌公开）

(三一) 治蛇咬伤方

【处 方】 吳萸六分，雄黃精三分，甘草三分，尖檳二分，八角八分。

【用 法】 將上藥捶碎，用燒酒生鷄胆浸片刻，飲其汁，再用藥渣敷傷口。

(上方系东望鄉中医陈炳南公开)

治毒蛇癩狗咬伤方 澄海 余子英

【处 方】 山薄荷一兩，关刀模二兩(无此藥用烏脚模代之)，細辛一錢。

【用 法】 將上藥搗爛，和白酒，入銅鼎內炒熟，搾取其汁飲之，并將藥渣貼傷口。若傷口收合，須再挑破揉出其血，然后貼之，俾藥力得吸其毒質。症重日用二剂，輕者一剂，小儿減半。

治毒蛇咬伤方 广州 許秀榮

【处 方】 吳萸、細辛、白芷、丁香、雄黃各四錢。

【用 法】 共研末，以白酒四兩开服。渣滓涂伤口。不能飲酒者以酒一半和开水冲服亦可。

治毒蛇咬伤方 清遠 朱業榮

【处 方】 山烏柏樹皮、油草、辣蓼叶各适量。

【用 法】 先用烏柏皮扎住伤口上段，再用油草捶爛擦伤口，繼用辣蓼煮水洗伤口。

治毒蛇咬伤方 清远 盤灼明

【处 方】 牛耳風、兩面針樹头各一兩。

【用 法】 把上列樹头切碎，用酒燉服，成人服一茶杯，并把药酒擦伤口周圍，不可擦伤口。

治毒蛇咬伤方 清远 黃守仁

【处 方】 雄黃精四錢，威灵仙四錢，吳萸三錢，北細辛錢半，沒石子三錢，归尾三錢，生錦軍八錢，白芷四錢，川連二錢，紅花二錢，赤芍二錢，甘草一錢，六耳苓六錢。

【用 法】 清水煎服。并用生草藥外敷；大耳梳（又名牛耳風根）刮取其二層皮，燉熟，加酒敷伤处。

治青竹蛇咬伤方 清远 黃耀光

【处 方】 槍仔蕓（又名豆豉姜）八兩，兩面針蕓四兩。

【用 法】 上药和米酒燉出药味，隨量飲之，并把酒擦腫处，不可擦伤口。再用痴头茗皮搗爛敷伤处。

治蛇咬伤方 龙川 胡本根

【处 方】 半边其草，生半夏三分，細辛七分，雄黃五分。

【用 法】 上药共捶爛，可搽可食，蛇公咬伤加麝香。

又 方 龙川 陈求安

【处 方】 川足一条，雄黃七分，白芷一錢五分，川大黃一錢五分，生甘草一錢，归尾一錢。

【用法】 水煎冲酒服。

又方

龙川 陈求安

【处方】 雄黄精一钱，川足一条，生南星一钱，北细辛一钱五分，生半夏二钱，白芷一钱。

【用法】 上药共研细末，浸烧酒搽四周浮腫处，不可搽伤口，因要留供排出毒水也。

又方

龙川 李寿人

【处方】 灵脂三钱，灵仙三钱，雄黄精二钱，貝母三钱，吳于三钱，白芷三钱，细辛一钱，甘草三钱。

【用法】 将药水煎，冲酒服。药渣捣碎加米粉舂爛敷伤处，勿敷伤口。

治毒蛇咬伤方

龙川 張林泉

【处方】 夏枯草二兩，白芷一兩，大黃六钱，白矾二钱，雄黃一钱，麝香六厘。

【用法】 上药研末冲酒，分二、三次服。

又方

龙川 黄云章

【处方】 苦瓜根、冬瓜根、独脚烏桕根（又名防已）、山苦瓜根各等分。

【用法】 一服八钱，有伤口防已减少用，未开口防已要加多，嫩水去渣冲烧酒服。

又方

· 龙川 刘日权

【处 方】 蛇利（舌）草八兩。

【用 法】 上药煎水加酒服。

治播箕侠蛇咬伤方

清远 郭述初

【处 方】 細辛、赤芍、白芍、文蛤、胆草、枯矾、硼砂、使君子、夜明砂、法夏、全虫、桔梗、麥芽，谷芽各等分。

【服 法】 清水煎服。

治青竹蛇咬伤方

清远 朱業榮

【处 方】 六耳苓五錢，甘草錢半，白芷四錢，灵仙三錢，吳萸三錢，乳香錢半，銀花二錢，赤芍二錢，大黃五錢，沒石子二錢，紅花二錢，沒药錢半。

【用 法】 清水煎服。先用牛耳風二層皮煎熟开酒，冷却候用，即將銀器刮伤口，刮完，用牛耳風药酒，自下而上擦之，擦完服上药。

治蛇咬良方

· 广州 冼榮濟

【处 方】 寮刁竹四兩（全用），金耳环四兩（全用），独脚蓮四兩（全用），韓信草四兩（全用），多須公四兩（根），威灵仙四兩（全用），九層塔四兩（全用），七星劍四兩（全用），独脚球三兩（全用），金鎖匙四兩（全用），蛇王草四兩（全用），双眼龍三兩（皮

根)，黑老虎四兩（全用），了哥王四兩（根皮），黑面神四兩（根皮），白花鬼灯籠四兩（根皮），鹽箱柏四兩（根皮），入地金牛公四兩（根皮），独脚烏柏三兩（根皮），正川連三兩（全用），吳萸二兩（全用）。

【用法】 將上藥浸酒十五斤，每服二兩，日服二次。如為藥丸，每個重二錢，酒溶化，日服二次。若為散，每服一錢五分，日二次，開水沖服。如遇傷口閉，用刀割開，流清瘀血，傷口如感痛，即用犁頭草、半边蓮各二兩，捶爛，加冰片二分敷上，中間留一孔。

治毒蛇咬傷方 電白 李 廣

【處方】 雄黃精末六錢，五靈脂末一兩，乳汁草（即細葉飛洋草）二兩（捶爛）。

【服法】 先將乳汁草、五靈脂二味，用水二碗煎至一碗，加適量酒沖雄黃末飲之。藥渣可敷傷口周圍，中間留一孔，以便毒水排出，服藥后，如傷者覺得安靜，疼痛減少，并傷口處有黃水流出，是為服藥的功効。

【附注】 上藥飲后兩小時，可再服一劑，傷勢重的可服至三劑。乳汁草系生草藥，冬天很少，可先采藥晒干備用。生乳汁草莖摘斷有一點點白乳狀汁冒出（汁味不甜不苦），莖及花呈微清紅色，葉橢圓形，系對生。

治療毒蛇特效藥方

公 開 者：江蘇季德勝

整理記錄：南通中醫院

【处 方】 半边莲（或用半枝莲），过溝龍，貴開口草，七叶一枝花，野韭菜，雨箭草，扇子草。

【用 法】 以上七种药各等量，搾取其汁，和入霉麥及蟾蜍，蛇，蜈蚣，守宮，露蜂房等之炙灰，攪調稠粘适度，捏成扁圓餅如算盤珠大，陰干，罐貯备用。不可受潮或沾水。

【療 效】 本药是一种药餅，治療毒蛇咬伤中毒及其他毒虫咬伤，确屬有效，涂敷后，无不立奏捷功，且該药餅对蛇类具有攝伏控制作用，如持有此种药餅，毒蛇即很馴服，手持玩弄，亦不咬人，治療毒蛇咬伤中毒，經過我們的分別訪問，季君治愈的患者，証实療效是确切的，季君不但經常當場以毒蛇咬伤手臂或舌头，用药餅涂治取效，并可生吞毒蛇之头，隨服药餅，亦无所害。

按：方中草药七种，除扇子草外，其余六种，經生药鑒定，已知其科屬与性能，茲参考文献，簡述于后：

半边莲：系桔梗科山梗菜屬，为著名的治蛇民間药，明李时珍已將其列入本草綱目，謂“蛇虺伤，搗汁飲，以渣涂之”，俗諺有“人能識得半边蓮，終朝可以伴蛇眠”，是反映它的效能的卓著，季得勝也體驗到，不論那种毒蛇，如触及此草，就麻痺骨酥，不能伤人了。又半枝蓮亦有同等功效，屬馬齒莧科，为一年生草本，多產于溪边石砌等处，有青、紅二种，青者叶尖，紅者叶圓，莖与叶皆肉質，叶互生，莖長五、六寸，初夏由枝梢开小花五瓣，呈紫紅黃白等色，并能治療瘡、黃疸等症。

过溝龍：此名从來未見聞，經采原植物察看，方知就是葎

草，其莖有細刺，善勑入膚，故名醫別錄名之為“勒草”，蜀圖經本草又稱為“葛勒蔓”俗呼“割人龜”系桑科葎草屬，田野自生之蔓草，莖長達十余尺者，“過溝龍”之名恐据此而來，蘇頌本草謂能“療久痢疥癩”，李時珍說“除九虫，辟瘟疫，傳蝎蛇傷”。本品與“蛇麻”“忽布”為近緣植物，性狀與效用相同，其所含之“苦味酸”有強烈抗生殺菌作用。

黃開口草：此亦系口傳之別名。實即宋圖經本草之“佛甲草”，綱目稱之謂“佛指甲”，俗呼為“指甲草”屬景天科石蓮華類，為山野自生之多年生草本，亦可移植于庭園供賞玩用。葉有較厚之肉質，多汁，似馬齒莧，頗柔軟，傾臥地面，着地之部分節節生根，初夏莖梢着生多數小花。花瓣五片，色黃，雄蕊十枚，和漢藥考謂本品“新鮮葉中所含之漿汁，用以治毒虫螫傷及燙火傷”荷蘭藥師論述本品之功效甚詳，應用甚廣，認為能刷盡污物，抑制惡毒，善退肚熱，止煩渴，治療咽喉口舌之癰腫與潰瘍，并治泄瀉，赤痢，角膜炎，濕疹，皮炎，痔瘡，毒虫咬傷等症，歸納言之，則為解毒，退熱，消炎，鎮痛之藥。季德勝驗此草，對毒蛇很有制服作用，蛇觸及其氣味，就口僵喉閉，不能咬人了。

七葉一枝花：即百合花之蚤休，李時珍說：“虫蛇之毒得此治之即休，故有蚤休，螫休諸名。”名醫別錄謂本品主治，“癰疾痛瘡除蝕，下三虫，去毒蛇。”蘇頌本草認為，“摩醋敷痛唾蛇毒甚有效”。本品含有草休素，解熱鎮痙，消炎解毒之效甚著。內服外敷均佳。

野韭菜：經取原植物鑒定，方知卽是“麥門冬”。方書所用，乃其根部，但本方中却是採取它的莖葉，藏器本草論本品之功效，謂能去心熱，止煩熱寒熱。甄權本草亦曰可治熱毒，然則其莖葉在本方中是可以協同緩解中毒的。

雨箭草：是“翹搖”的土名，爲豆科紫雲英屬，遍生于四野道旁，有破血，止血，生肌的作用，本方採用，義理也很明顯。

屬子草：就是雞服草，功效尙待考。

霉麥：又名敗麥，其有效部分爲“麥角”乃一種霉菌之干燥菌子，寄生麥粒上釀殖所致，其形微彎似角。色紫黑，組合與藥理作用，頗類副腎精，有強大收斂性，能使血管、胃腸、膀胱等不隨意肌發生收縮，而于子宮爲尤甚，在本藥餅內主要是收縮血管，而奏止血之功。

蟾蜍：別錄論其功效曰：“陰蝕疽瘍，惡瘡，獫犬傷”。陶宏景說：“燒灰敷瘡立驗”。日華本草，“治鼠瘻惡瘡”李時珍說：治一切五疳八痢，腫毒。破傷風病。脫肛。本品是卓效的解毒鎮痛藥。內服并有強心作用。

蜈蚣：是用的各種有毒與無毒的蛇，綜合綱目論蛇之功效，主要是療風癩頑癬，惡瘡癰癰，并能治破傷風與狂犬病，這是值得我們注意，進一步研究的。

蜈蚣：爲多足類蜈蚣科，處處有之。綱目：“主小兒驚癇風搐，臍風口禁，丹毒禿瘡，瘰癧，便毒痔瘡，蛇傷。”本品具有鎮痙痛，攻毒之功，在本藥餅中亦屬主藥之一。

守宮：爲爬蟲類蜥蜴類守宮科，俗名壁虎，治中風癱瘓，手足不舉，或歷節痛風，風痙驚癇，癰風癰癰等症，能奏鎮痙，定痛，起瘳之功，本品燒存性塗搽淋巴腺結核有

著效，又李洛之医师以壁虎浸液治肺結核，效果良好。

露蜂房：为節足动物膜翅类大黃蜂或革巢蜂之窠，野外多有之。本經：主驚癇瘕瘕，寒熱邪氣，癰疾鬼精，蠱毒腸痔，火炙之良。別錄，治惡疽，附骨痛，根在臟腑，歷節腫出，丁腫惡脉，諸毒皆瘥。蘇頌：“炙研和猪脂瘰癧成瘻”本品为卓效的蠟瘰，殺虫，解毒藥，在本藥餅中是对療效產生协同加强的作用的。

【应用】 本藥品的应用范围及其用法如下：

1. 凡被毒蛇咬伤后，即用此藥餅沾唾液（不可用其他水液）涂敷伤口四圍，約距伤口半寸許涂一圓圈，將伤口扎住，使毒水外泄（此水甚毒，不可誤入眼或口內），迅即止痛消腫而愈。如伤損处已結痂，需挑破，使毒水流出始妥。
2. 倘咬伤足或手臂部，未能即時治療，而其毒向上蔓延腫痛者，需在腫的上部約一寸許，用藥餅沾唾液箍一圓圈，則其毒即不再上移，毒液仍由伤口流出，如已結痂，亦需挑破。
3. 被蛇咬伤后，倘有头昏眼花，周身癱瘓无力，視物有增大感觉的，是中樞神經中毒現象，必須迅取本藥餅一枚，以溫开水送下，局部处理同上。如已服藥餅尚未見效的，此毒重藥輕之象，需另向中藥鋪購“蜈蚣”二条，瓦上焙黃，研細，調燒酒少許，或冲开水服下，可以挽救。
4. 对于蜈蚣、蝎、蜂、毒蚊以及其他毒虫咬伤，均可用此藥以唾液涂敷于咬伤处，立能止痛消腫。

5. 对于各种痛腫瘡癰，用燒酒少許調此藥涂患处，一日二次，二三日可以消散。
6. 小儿夏季易患之天疱瘡，用絲瓜叶搗汁調此藥餅搽之，每日二次，奏效亦速。
7. 对于疥瘡、濕疹、癩頭、頑癬等症，以麻油調本藥餅搽之甚效。
8. 在瘧疾發作前二小时，用此藥餅塞兩鼻孔內約十分鐘，可以截止之。
9. 根据季德勝談，如被瘋狗咬伤，在三日以内者，用此藥一至二粒，和黃酒四兩服下，可保安全，倘已过六七日因毒已深，恐亦无效。

抗蛇毒藥物

广州 林紹庭

五虎蛇：目烏口紅，身有五色形，似毒花。用龍舌草为主治藥。

百步蛇：四節有尾，形如水蛙。用尾射草为主治藥。

鐵箕甲蛇：身烏一節白一節，舌白口紅，伤口牙痕双層。用菜瓜蜜为主治藥。

飯匙銑蛇：伤口咬二点烏。用柳枝漿为主治藥。

膏竹絲蛇：伤口咬二点紅。用蒲鹽二榔为主治藥。

白肚官蛇：公蛇头下七点，母蛇項下一条白，伤口咬二点烏。用茅里金釵为主治藥。

血結蛇：全身紅。用哆尼簪为主治藥，見血不治。

罩蛇：形烏，牙根双層。用杏草为主治藥。

割岸蛇：形似劍刀，尾伤人。用湧濁簾为主治藥。

龜頭蛇：牙根双層，伤口有双層。用大本馬尾絲为主治藥。

金腰帶蛇：舌烏口赤，尾有刺，身帶金絲條。用龍牙草為主治藥。

烏稱蛇：身短，所咬傷口一孔。用小本乳草為主治藥。

哆尼根蛇：身有烏紅。牙痕雙層。用黃花仔草為主治藥。

雨傘節蛇：身帶青黃，一節青黃。用水沉香草為主治藥。

按上藥是福建閩南藥草名稱，可能與其他地方差異。

特种藥：被毒蛇咬傷，劇痛，傷口見黑筋一條浮起，向上伸展，急將長髮扎緊，勿使黑筋伸張。用吸飽血的臭虫（木虱）七只，重症十只，放入口內嚼爛吞服，或搗爛調米酒服。味覺甜。并用臭虫血塗傷口，浮起黑筋漸退，其傷口不久發現蛇齒隨黃水流出。沒有活虱，虱干亦有效，惟服量加倍，各種毒蛇咬傷都可用。

蜈蚣咬方

【處方】 用白心番薯搗爛敷上患處，如无番薯，薯藤亦可。

治蜈蚣咬傷效方

【處方】 用黃皮核捶爛敷上傷口，或用蜆螈（即鼻涕虫）搓傷口，立止痛消腫。

治蜈蚣咬傷方 清遠 呂直純

【處方】 用紙條蘸生油點着吹熄，以烟熏傷口。

治蜈蚣咬伤方 清远 欧陽佐林

【处 方】 先用茛苢苑縛扎由下至上，并用茛苢燒焙伤口，有黄水出即愈。

治老鼠咬伤方 龙川 叶用膏

外用药

【处 方】 黄賊屎（螳螂）二錢，麝香五厘，枚片一分。

【用 法】 上药研末搽患处。

【附 注】 有紅綫通行用品字火炙之，有癰出現用下方。

內服药

【处 方】 慈姑二錢，三棱二錢，連翹二錢，木瓜二錢，茵陈二錢，澤蘭一錢五分，木通一錢五分，公英三錢，義朮一錢，兜苓二錢，紅花二錢，黑丑二錢，花粉二錢，生地二錢，血竭二錢，木賊一錢五分，麝香五厘（研末冲药服）或一分。

【用 法】 清水煎服。

【附 注】 痊愈后要戒鯉魚生鷄。

治老鼠咬伤生癰方

龙川 池振耀

【处 方】 黄賊屎，五灵脂。

【用 法】 上药炒黄研末，加米醋冲匀敷伤处。

【附 注】 如發热惡寒再用荆防敗毒湯。

治老鼠咬方

欽縣 李桂南

【處方】 甘草節半斤，黑豆二斤，水煎服，并洗患处。

【禁忌】 忌食糯米一百天。

三、燙火傷

燙火散

順德 李庭芬

【處方】 寒水石十兩，大黃十兩，黃柏末十兩。

【制法】 共研細末，用甘油調勻。

【用法】 敷搽患处。

燙火傷清凍膏

順德 黎良

【處方】 白灰一斤，油一兩（桐油最佳）。

【制法】 將白灰用開水開好，然後將灰水一兩，油一兩，攪成乳汁形即成。

【用法】 凡遇燙火傷處，將油搽上，便可止痛。

【適應症】 治燙火傷，并治皮膚爆裂。

燙火膏

順德 羅全獎

【處方】 地榆八兩，茶油一斤，正梅片二錢。

【制法】 將藥研末加入茶油。

【用法】 敷搽傷處，油里渣滓敷患处。

【適應症】 燙火傷。

开水燙伤方

潘少華

【处 方】 用草麻油与鷄蛋白涂上患处，便可止痛。

治燙火伤方

清遠 林 祥

【处 方】 地榆末，用茶油开搽患处。

治燙火伤方

清遠 楊紹初

【处 方】 用鷄腸蕒叶搗爛，开水开搽患处。

治燙火伤方

清遠 植修己

【处 方】 大黃末一兩，川連末五錢，梅片一錢，用花土
苓开搽患处。

治燙火伤方

清遠 黃創業

【处 方】 柄鷄草（又名火澡药）一握，搗爛，用茶油开
搽患处。

治燙火伤方

龙川 楊德布

【处 方】 釐姆樹二層皮。

【用 法】 采樹干、或根皮風干，切片研末，裝入玻璃瓶
內待用。用时和正茶油調成流糊狀，涂敷伤处，用量多
少濃淡不拘，惟涂面積不得超過全身五分之一或三分之
一。

又 方

龙川 叶宜枚

【处 方】 桃樹皮。

【用 法】 將藥燒灰存性，研末調茶油敷之。

治燙火傷驗方

順德 蔡恒光

【处 方】 南瓜。

【用 法】 搗爛敷傷處，頻頻換藥，直至水干結痂為度。

治燙火傷方

清遠 歐珍藏

【处 方】 大黃末，梅片末，桐油（適量）。

【用 法】 以桐油開上藥末敷患處。

治燙火傷方

清遠 黎蔭棠

【处 方】 酸棗樹皮熬膠。

【用 法】 用酸棗樹皮十餘斤，水兩桶，煮一夜，以布隔去渣，再煮至滴成珠候用，以鴨毛蘸此膠搽患處。

治燙火傷方

清遠 何志堅

【处 方】 生木棉花數斤，放入埕（罌）內封好，約三四個月後可用，將埕內的水塗搽患處。

治燙火傷方

清遠 何季甫

【处 方】 麻蛤頭（生草藥）燒灰搽患處。

四、跌打刀伤（附破伤風）

跌打方

陈德君

【处 方】 拔子樹皮三錢，烏臼樹二層皮三錢。

【制 法】 將藥用酒燉服。

【用 法】 渣涂患处。

【禁 忌】 孕婦忌服。

駁骨方

【处 方】 生姜六兩(炒)，榕吊(約三、四兩)，酒餅十只，田蟹二十只，馬王(水蛭)七百三十条，屎缺底一斤，落地生根一斤。

【制 法】 將藥搗爛。

【用 法】 將藥加酒炒熱，敷患处，一二日后換藥，仍加酒炒熱敷上，過三、四天后再換藥一次。

駁骨方

海南 賴欽仁

【处 方】 石攀，樹攀，壁攀。

【用 法】 將藥捶碎，用燒酒燉熟外敷。

【适应症】 骨折，能在七天內駁好。

駁骨方

梅縣 黃倬南

【处 方】 生鹽霜柏樹根皮數兩，搗爛和生黃毛生鷄仔一只，舂爛如泥，敷患处，外加夾板固定。

急救保險散驗方 海口市 李嶧生

【處方】 雪上一枝蒿（雲南省出產）。

【制法】 將藥洗淨曬干，入甌蒸一小時，候稍冷取出曬干，刮上皮，研為粉末。

【用法】 諸傷昏迷不省人事，以童便調服，諸傷腫痛用酒調服，并調塗患處。

【用量】 輕症用五厘，重症用一分，小孩周歲用半厘，余类推。

【適應症】 槍刀跌打，咽喉腫痛，白喉喉炎腫，雙單鵝喉症，風痰痛症，牙齒腫痛，危急痧症，吐血便血，无名腫毒，血流不止，倒經吐血，小兒驚風，瘡、痢疾。

【禁忌】 孕婦忌食。

急救止血散驗方 海口 李嶧生

【處方】 肉桂渣（即肉桂去油取其渣）。

【制法】 將肉桂渣研粉，用磁瓶或玻璃瓶貯之。

【用法】 以肉桂粉摻上患處，便立即止血，但傷處切勿近水。

【適應症】 跌打損傷，血流不止。

【禁忌】 孕婦忌服。

跌打損傷氣絕效方

【處方】 金土鱉一錢微炒，正牛黃三分，熊胆三分，血竭一錢，西紅花一錢，兒茶五分，沉香五分，川射二

分，沒藥五分，朱砂三分，梅片二分。

【制 法】 右藥共研細末，磁瓶貯藏，勿令泄氣。

【用 法】 以藥五分用燒酒白糖少許沖服，重者再用五分。

傷科驗方

黃舉昌

【處 方】 上朱砂一錢二分，麝香一錢二分，正梅片一分二厘，乳香一錢五分，紅花一錢五分，沒藥一錢五分，血竭一兩，兒茶二錢四分。

【用 法】 共研細末，磁瓶貯藏，每次服七厘，燒酒沖服，并用酒調敷傷處。

【禁 忌】 孕婦忌服。

【適應症】 專治金瘡跌打損傷，骨斷筋斷血流不止，并治一切无名腫毒。

跌打止痛通脈散驗方

黃耀怡

【處 方】 牛銀二兩，麻黃（去節）一兩，大田七五錢，牛黃三錢，乳香五錢，上沒藥五錢，洋烟灰一錢五分，金絲熊胆四錢。

【制 法】 將牛銀盛入瓶內，加入童便過藥約二三寸高，約浸一個月，十日換一次童便，取出去毛，再入清水浸一個月，每十日換水一次，浸至无泡為度，切薄片晒干，慢火炒黃，諸藥合研成細末。

【用 法】 大人每日服一錢，每次五分，分早晚服食。

跌打下部內服藥方

順德容奇 李庭芬

【處方】 木通四錢，枳殼四錢，陳皮四錢，防風四錢，生地七分，歸尾七分，紅花七分，姜活八分，甘草一錢。

【制法】 將藥用清水三碗煎至一碗。

【用法】 用白酒一小杯沖服。

跌打吊瘀方 順德容奇 李庭芬

【處方】 花椒五錢，川椒五錢，桂枝四錢，白芥子五錢，紅花四錢，枝子四錢，桃仁四錢。

【制法】 將藥研成粉末。

【用法】 用雙蒸酒加面粉煮敷患處。

止血散 順德容奇 李庭芬

【處方】 大黃一兩，兒茶一兩，牙皂錢半，雄黃精二兩，梅片五分，尖檳一兩，血竭三兩，寸香五分，田七三錢，血珀末三分。

【制法】 將藥研成細末。

【用法】 撒布患處，能消炎防腐。

【適應症】 治療一切外傷出血。

跌打丸方 順德容奇 李庭芬

【處方】 沉香五錢，木香五錢，朱砂四錢，珍珠五錢，

象皮五錢，琥珀一兩，降香一兩，田七二兩，乳香四兩，沒藥八錢，熊胆一兩，人參一兩，枝子五錢，蘇木一兩，歸尾二兩，紅花二兩，生花五兩，牛膝二兩，澤蘭四兩，烏藥二兩，砂仁二兩，木通一兩，大黃二兩，血竭二兩，桂枝四兩，桃仁四兩，細辛一兩，白芷一兩，加皮五兩，小茴二兩，續斷一兩，杜仲五兩，木瓜六兩，黃柏一兩，赤芍五兩，桔梗四兩，防風二兩，京芥二兩，碎補四兩，車前五兩。

【制 法】 選正藥品研極細末，煉老蜜糖為小丸，如桂圓大，外用蜡封固。

【用 法】 用時去蜡雙蒸酒搗爛，塗擦傷處。

跌打內服藥方 順德容奇 李庭芬

【處 方】 丹皮二錢，赤芍二錢，生地三錢，田七三分，紅花二錢，血竭二錢，枳殼三錢，丁香四錢，血珀二錢，川芎二錢，烏藥二錢，歸尾三錢，碎補二錢。

【制 法】 將藥用雙蒸酒煎服。

【適應症】 調氣活血，去瘀鎮痛，治一切跌打。

跌打丸方 順德容奇 李庭芬

【處 方】 牛膝七錢，荊芥五錢，赤芍一兩，紅花一兩，香附二兩，川芎八錢，田七五錢，當歸二兩，桂枝八錢，乳香四錢，桃仁八錢，血竭一兩，香附六錢，大黃兩半，山甲一兩，熟制川烏一兩。

【制 法】 將藥用雙蒸酒煎。

【用法】 外敷藥。

【适应症】 調氣活血，去瘀鎮痛，療一切跌打。

跌打中部內服藥方 順德容奇 李庭芬

【處方】 歸尾八分，紅紅一錢，乳香一錢，沒藥一錢，桔梗一錢，甘草八分，防風一錢，姜活八分，赤芍八分，桃仁一錢。

【制法】 水二盅煎至一盅。

【用法】 一次飲服。

【适应症】 治療跌打損傷，中部少腹以上。

跌打上部內服藥 順德容奇 李庭芬

【處方】 人參五分，七地七分，熟地七錢，川芎四錢，防風四錢，荊芥四錢，甘草四錢，首烏二錢，薄荷三錢。

【制法】 用水三盅煎至一盅。

【用法】 一次飲服。

【适应症】 治療跌打損傷胸部以上。

跌打浸酒藥方 順德容奇 李庭芬

【處方】 乳香五分，歸尾四錢，紅花三錢，沒藥五分，澤蘭三錢，田七三錢，生軍三錢，生地四錢，肉桂五分，枝子二錢，木瓜二錢，生草五分，牛膝三錢，羌活五分。

【制法】 將藥用酒濕透蒸過曬干，后用酒三斤浸之。

【用法】 跌打損傷，可用此酒內服，并外塗擦傷處。

生肌散

順德容奇 李庭芬

【處方】 川連末三錢，梅片五錢，乳香三兩，末藥三錢，血珀一兩，甘草四兩，石脂末三兩，象皮末四兩。

【制法】 將藥研成細末。

【用法】 將藥散布瘡口。

【適應症】 治療一切癰疽等瘡，破爛日久不斂。

跌打傷內吊瘀方

順德容奇 李庭芬

【處方】 生姜活四錢，川烏四錢，桂枝四錢，川椒四錢，古月粉四錢，石辣四錢，澤瀉四錢，田七四錢，沒藥四錢，生軍四錢，半夏四錢，荊芥四錢，薄荷四錢，黃芩四錢，莢朮四錢，歸尾四錢，草烏四錢，乳香四錢，南星四錢，澤蘭四錢。

【制法】 將藥研成末。

【用法】 用白酒煮敷患處。

跌打內服藥方

順德容奇 李庭芬

【處方】 生地三錢，紅花三錢，歸尾三錢，澤蘭三錢，澤瀉三錢，枝子三錢，車前二錢，木通三錢，羌活二錢半，乳香一錢，沒藥一錢，赤芍二錢八分，白芷二錢半，靈仙二錢，生軍三錢，田七二錢，血竭三分，牛黃五分。

【制法】 將藥用水煎服。

【適應症】 跌打。

【附注】 傷頭部加川芎，當歸；身上加杜仲，當歸身。

四肢加桂枝。

跌打丸方 順德容奇 李庭芬

【處方】 牛膝七錢，荊芥五錢，赤芍一兩，寄奴二兩，川芎八錢，田七五錢，當歸二兩，桂枝八錢，乳香四錢，桃仁八錢，血竭一兩，香附六錢，大黃兩半，山甲一兩，熟制川烏一兩。

【制法】 將藥晒干，研極細末，煉老蜜糖和藥調勻成小丸，每個重三錢，外用醋蜡封固。

【用法】 將丸去蜡切碎，用熱酒半杯溶解，塗擦患處。

麻醉藥內服藥方 順德容奇 李庭芬

【處方】 制蟾酥一錢，法夏六分，川椒一錢八分，胡椒一錢八分，鬧楊花六分，畢撥一錢，制川烏一錢八分。

【制法】 將藥研成細末。

【用法】 每服五分，用酒沖服。

麻醉藥外敷藥方 順德容奇 李庭芬

【處方】 生川烏五錢，蟾酥四錢，生草烏五錢，生半夏五錢，畢撥五錢，生南星五錢，胡椒一兩，細辛一兩。

【制法】 將藥研成細末，用酒調成。

【用法】 將藥敷患處，約一時除去，即施行手術，則不痛。

外傷出血方 順德 陳義生

【處方】 白矾五錢，五倍子五錢，田七三錢，硼砂一錢。

【制 法】 將藥研成細末。

【用 法】 干敷外傷出血處。

【適應症】 外傷出血。

梁財信跌打丸秘方 梁載孫

【處 方】 制川烏四兩，制三棱四兩，制莪朮四兩，青皮二兩，制香附四兩，歸尾四兩，大田七四兩，川斷四兩，南丹皮四兩，蒲黃四兩，防風四兩，玄胡一兩，五靈脂四兩，生花四兩，郁金四兩，白芍四兩，广木香二兩，台烏三兩，柴胡三兩，枳殼二兩，熟軍八兩，生地六兩。

【制 法】 共研細末，煉蜜為丸，每個二錢。

【用 法】 用清茶或開水送服。大人一枚，小兒減半，婦女經痛用山楂肉一兩煎水加白糖一兩送服。

【適應症】 消腫散瘀，定痛活血，并治婦女經痛，胸脅肋痛。

金爵跌打酒外用方 許子珍

【處 方】 金耳環二兩，山枝子二兩，延胡索二兩，麝香壳四兩，大生地二兩，當歸身四兩，熊胆皮二兩，寶鼎香二兩，旧陳皮二兩，生半夏二兩。

【制 法】 將藥用米酒廿斤浸三個月，后始可用。

【適應症】 止痛，消腫，活血。

治女人傷積在胸脹大如盆方

云浮 黃華甫

【處 方】 用散血老根蒸燒酒服之。

跌打藥酒方

廣州 吳伯鴻

【處方】 刘寄奴五錢，乳香三錢，五灵脂五錢，白芨五錢，黑老虎一兩，降香五錢，金耳環二錢，苏木五錢，莪朮三錢，田七二錢，浸酒一斤。

跌打消腫止痛散瘀外敷方

廣州 何秉江

【處方】 田七末一兩，乳香六錢，沒藥六錢，生枝子六錢，虎脛骨一兩炙酥，澤蘭五錢，生川烏五錢，正血竭八錢，防風五錢，川加皮六錢，紅花六錢，归尾五錢，大生地六錢，生半夏五錢，金邊土鱉一兩，川斷五錢，生大黃六錢，生獨活五錢。

另加入生草藥：鵝不食草二兩，九層塔一兩，打不死二兩，大還魂一兩半，川破石一兩半，田基王一兩（上述生草藥晒干研末）。

【制法】 上藥研末和勻全為一料，分量看傷者腫痛大小酌量加減。

【用法】 用時加老姜三錢，生葱一條，捶爛煮酒至開為度，后將藥散放入攪勻，溫暖敷傷處，外用布扎緊，免露風。

止痛駁骨散

廣州 林鴻芳

【處方】 大田七一兩，正血竭八錢，骨碎補一兩，活土鱉三十只（去頭足），川續斷八錢，正乳香一兩，虎脛骨六錢（炙酥），川獨活一兩，川加皮八錢，生大黃一

兩，古銅錢十二个（醋淬九次），莪朮一兩。

另加生草藥：寮刁竹一兩（連根），透骨消一兩，金耳環二兩，黑老虎一兩半，打不死一兩半，九層塔一兩半，川破石一兩，小羅傘一兩。

【制 法】 晒干研末，同熟藥和勻，双蒸酒至糊狀，敷傷處，杉皮夾好扶正，外扎布帶勿露風。

【附 注】 症重者，用生鷄一只（約十四、五兩）同上藥捶勻煮熟敷之。

跌打傷科秘方 廣州 鄒錦賢

【處 方】 生半夏五分，生枝子五分，生南星五分，生川椒五分，生大黃五分，大田七一錢，獨活五分，川烏五分，紅花五分，赤芍五分，防風五分，乳香五分，木香五分，杜仲五分，川芎五分，白芷五分，血珀五分，血竭五分，三棱五分，寄奴五分，朱砂五分，加皮五分，姜活五分，桔梗五分，澤蘭五分，莪朮五分，當歸五分，土鱉四只，用地龍二条，金絲熊胆二分。

【制 法】 研為細末，用燒酒半斤同藥粉和勻，另加豆粉三錢同煮，慢火煎到起膏，用油紙塗上藥敷患處。

治跌打內傷上下出血不止效方

欽縣 黃桂朝

【處 方】 白芨三錢，茅根三錢，大黃三錢，水煎冲童便服。

治外伤出血方 清远 張一平

【处 方】 澤蘭一兩，辣蓼叶二兩。

【用 法】 研成末，敷伤口。如伤口太大血涌出者，先以冷水向患者头面噴去，后敷药。

治止破伤流血驗方

海丰 王清泉

【处 方】 假乳李（又名假生稔）分量視伤处而定。

【用 法】 將药搗爛，敷患处，血自止。

跌打刀伤止血止痛方

陽春 何夢蓮

【处 方】 麻黄、乳香、沒药、車前子各四兩。

【用 法】 研細末，用樽封密，久久取出晒之，免致發潮，遇有患者即敷之。伤口用布扎住，自然止血止痛，很快痊愈。

止血方

龙川 巫卓賢

【处 方】 紅白膜樹叶。

【用 法】 上药晒干研末，敷患处即愈。

治刀伤止血生肌方

龙川 張日光

【处 方】 酒飯团根二層皮。

【用法】 上藥晒干，研末擦。

治跌打骨折流血不止方

龍川 張妙連

【處方】 生地三兩，當歸三兩，元參三兩，麥冬三兩，
黨參三錢，甘草三錢，寄奴三錢，乳香三錢，川三七五
錢，川斷五錢，白朮五錢，地榆一兩，花蕊石五錢。

【用法】 水煎服。

治跌打刀傷效方 陽江 姚剛

【處方】 田七一錢，土別一錢，紅花一錢，木香一錢，
義朮二錢，乳香一錢，血竭一錢，川芎一錢，杜仲二
錢，牛膝五分，川斷二錢，降香一錢，乙金一錢，然銅
二兩，寮刁竹一錢，元胡索八分，熟牛銀五分，沒藥一
錢，姜黃一錢，白朮二錢，骨碎補一錢，連翹六分，虎
骨一錢，獨活一錢，川瓜皮二錢，甘草一錢，三棱二
錢，全歸二錢，大黃一錢，防風一錢。

【用法】 將藥研成細末，重症用藥二錢，好酒二兩，燉
熱內服，并擦患處。輕症用藥一錢，酒一兩。如斷骨者
用生鷄仔一只吊死，去皮及內臟，用糯米飯半碗捶爛加藥
粉一兩，酒少許捏成餅敷患處，用綳帶扎住，對時取
去。如傷口仍有少量血流出，可用藥粉搽之。

治跌打損傷方 龍川 劉昌華

【處方】 大茶葉根，烏泥藤根，晃傘根。

【用法】 上藥同燒酒糟搗爛外敷。

【附注】 治跌打損傷甚效，如无酒糟，以酒餅二只代之。

治跌傷騎馬筋，膀胱受傷，小便行血方

澄海 林賢忠

【处方】 輕症者用粉豆根一兩。水一碗二分煎至七分服。重症者用粉豆根二兩。水加倍煎服。

有痛時加琥珀一錢研細末沖服。發現腫者加黃柏二錢同煎服。

治折斷骨方

新丰 李 爵

【处方】 大茶藥根，香附米，用不足一斤重未闔的生雞一只，連藥舂爛敷患處。對時要除藥，否則駁處起節。

【附注】 大茶藥根與生雞重量同等，另加香附米一兩。

治正骨方

清遠 鄧偉文

【处方】 還大魂，小還魂，大幌傘，小幌傘，上山虎，落山虎，金不換，千斤拔，滿天星，牛不食，大刀王，過骨刀，丁桂草，透骨硝（各等分）。

【用法】 將上藥的葉為末，可止血，其頭根可駁骨。凡斷手加桂枝，斷腳加牛膝，較骨加松節。凡斷骨要用生雞仔一只去頭足內臟，取肉捶爛，連藥加酒用鑊（鍋）炒過，敷傷處廿四小時應即把藥除去。

【附注】 第二次用藥時，不用生雞仔，以面粉和藥敷患處，消腫後，以追風膏貼之。

治正骨方

清遠 鄧偉文

【處方】 蘇木三錢，紅花二錢，歸尾三錢，乳香錢半，沒藥錢半，田七錢半，降香三錢，沉香一錢，桃仁二錢半，血竭二錢，澤蘭二錢半。

【用法】 清水煎服，將藥渣煎水，換藥時可以洗傷口。

治正骨方

清遠 胡杜桂

【處方】 陽起石一兩，花蕊石一兩，（二味醋煎九次）砂仁一兩，芒種草四兩，竹骨草四兩。

【用法】 將藥研成細末，每服一兩，開水送服。

注：芒種草出在上海，竹骨草出在西江，該藥可郵購，此方不止用在駁骨，凡跌打，刀傷，止血，婦人產後瘀痛均良。

跌打青腫消毒效方

肇慶 陸大成
鄧福英

【處方】 生軍五錢，半夏二錢，細辛一錢，生姜五錢，田七一錢，葱頭二兩。

【用法】 將藥搗爛，好酒煮，敷患處。

跌打刀傷效方

肇慶 陸大成
鄧福英

【處方】 當歸六錢半，澤蘭六錢半，川芎四錢半，紅花四錢半，桃仁四錢半，丹皮四錢半，蘇木三錢半。

【服 法】 水二碗，酒四兩同煎服。如伤头部加藁本一錢半，伤手加桂枝一錢半，伤腰加杜仲一錢半，伤脅加白芥子一錢半，伤脚加牛膝一錢半。

全身麻醉方

龙川 刘子銘

【处 方】 生川烏、生半夏、生南星、鬧羊花、蟾酥各等分。

【制 法】 將上藥捶碎，再用苧叶捶爛取汁拌勻晒干，再研極細末（用石舂），收藏好待用。

【用 法】 每服一分（老秤）。

【服 法】 燒酒或黃酒沖服。

【功 用】 能使全身知覺神經麻痺，昏迷，刀割不知痛苦（可以麻醉二小時）。

【禁 忌】 心臟衰弱等疾病，未滿周歲小兒，均忌用。

【解 法】 若此方過量中毒，用甘草湯煎濃汁服之，立刻蘇醒。

局部麻醉方

龙川 刘子銘

【处 方】 生川烏、生草烏、生南星、生半夏、蟾酥、胡椒（即古月）各等分。

【制 法】 將藥晒干研末，用燒酒調敷患部周圍。

【用 量】 視患者部位而定，敷上藥二十分鐘可以施行手術。

【功 用】 能使局部神經知覺麻痺。

【禁 忌】 如有傷口，須用消毒棉花遮蓋，以免藥物注入。

止痛接骨方 龙川 刘子銘

內服藥第一方

【处 方】 乳香二錢，沒藥二錢，田七三錢，苏木一錢五分，土鱉三錢，寄奴二錢，續斷二錢，加皮三錢，接骨丹（草藥）五錢。

【制 法】 水煎服。

內服藥第二方

【处 方】 当归五錢（后下），乳香一錢五分，白芍三錢，續斷三錢，加皮三錢，杜仲三錢，碎补三錢，虎骨五錢，故芷三錢，鹿筋三錢，龍骨一兩，田七三錢（研末冲服最好）。

【用 法】 水煎冲黃酒，分二次服。

外用接骨藥方 龙川 刘子銘

【处 方】 石薑蒲根四兩，公鷄一只（初开嘴約十二、三兩重），田七四兩（研末），麝香一分，五加皮四兩（生的亦可，如用干的要研末）。

【制 法】 將石薑蒲根用刀切碎，放石舂內舂爛，再加五加皮末再舂，隨將生鷄放入石舂內一齐舂爛，除去長的鷄毛，加燒酒拌勻，放入鉄鍋內，略炒热，鋪在油紙面上（長、短、闊、狹与伤处适合），再鋪田七末，麝香在藥的上面，趁热敷患处。

【用 法】 敷藥要敷足廿四小时才可除藥，二星期后才可

除夾板。如骨折先將杉樹皮作夾板將骨折處夾好，再用藥敷上，用綳帶綁好。如有傷口，先用礬礱結晶粉撒入傷口，再用當歸片三片貼上，然後用夾板壓在當歸片面上。

消腫止痛藥方 龍川 劉子銘

【處方】 辣蓼根（山邊純青葉的），過山龍根（九月間取之浸酒一小時），外搽腫處。

洗藥方 龍川 劉子銘

【處方】 番石榴葉（拔子葉）八兩，干番薯藤八兩，柚皮一只，石薺子藤八兩，生蔥根葉二兩，生薑一兩，生艾葉五兩。

【用法】 上藥煮水，洗傷腫處。

【附注】 注意年紀、身體、脈搏，如：身體虛弱先服一劑歸脾湯加田七，禁忌破血藥以及全身麻醉藥，待身體好轉再施行手術。

治骨折方 龍川 羅國斌

【處方】 石菖蒲根（石牙生，泥生不可用）生四兩或八兩（視部位需要增減）。

嫩雄雞一只（去毛、去腸不可洗水），米燒酒十二兩。

【用法】 將上藥和雞舂得極爛後，放入鍋內拌炒，稍干，則淬入一些燒酒再炒，如此反復拌炒酒淬，直至燒酒淬完，濕度適宜，便將藥取出平鋪油紙或蕉葉上面（寬闊須夠包裹整個骨折部位），待溫度適合，即將已經用

过完善手术的骨折部位包好，外用夾板夾正。包裹越緊越好，包裹后往往腫脹，有的上面腫、有的下面腫，但只包裹二小时便够，过久会使骨增大。二小时后，应即行解脫，再用“鵝不食草”燉燒酒，趁熱擦腫處，隨擦隨消。如骨仍未駁好，可再用一服，但時間不宜距離太近，至少須隔一天以后。如再有運動不靈，用辣蓼頭舂爛，浸燒酒塗擦（如要即刻使用，可用火燉出味，如欲保存長久，則不用火燉較好）。

又 方

龍川 羅伯謀

【處 方】 雄雞一只（約一斤重未開啼的）整個搗爛，臭艾（又名啄落艾）韭菜，石蒜。

【用 法】 共同搗爛炒熱，用布包好敷傷處，一炷香久。

【附 注】 解开以后會生水泡，如蛋般大，用針刺破水泡，讓水流出，然后用上好夾板夾好。對坐立有妨碍部位，即用蒜仁水洗淨，則不生水泡。內服藥因部位而異。

治跌打骨折方 龍川 丘丙興

外敷方

【處 方】 生細辛二兩，老松毛二兩，酒餅二只，生薑一兩。

【用 法】 先將傷處夾好，再敷上藥。

內服方

【處 方】 歸尾二錢，血竭一錢五分，田七一錢，薄荷一錢五分，三棱二錢，熟朮二錢，紅花一錢，香附一錢五分，土木鱉一錢五分，生甘草一錢，青皮一錢。

【用法】 水煎服。

治跌打秘方 龙川 駱文祺

【处方】 柴胡一錢四分，自然同六錢，枚片（另研）一錢，紅花六錢，乳香七錢，姜黃五錢，莪朮六錢，川三七一兩，沒藥八錢，續斷一兩，血竭六錢，乙金六錢，田七六錢，三棱六錢，川大黃七錢，當歸六錢，麝香（另研）二分，生甘草五錢，延胡六錢，川山甲六錢，桃仁（去皮）六錢。

【用法】 上藥研末煉蜜為丸，每丸七錢，燒酒送下。

又方 龙川 駱文祺

【处方】 苏木一錢五分，自然同一錢五分，田七一錢，雄黃一錢，沒藥一錢五分，血竭一錢五分，川大黃二錢，熊胆一錢，琥珀一錢五分，麝香另研四分，桃仁一錢，延胡一錢五分，赤芍一錢五分，紅花一錢五分，炙山甲一錢，乳香一錢五分，枚片另研五分。

【用法】 以上研末煉蜜為丸，每丸二錢，金箔為衣，蜡封固，用時用酒沖服一丸。

治伤口奇方 李鳳珠

【处方】 用未發毛鼠仔，和白灰搗爛，（約三兩）再用象皮（煨存性）一錢共研末，如遇伤口則用此末糝上患处，綑帶扎之，待痊愈后才解下來。

打伤積血及止痛方 广州 鄭先貞

- 【处 方】 生姜适量。
【用 法】 把生姜搗爛，敷在被打伤处。
【适应症】 打伤，压伤，不出血者。

治破伤風方 龙川 吳声相

- 【处 方】 大黃五錢，姜活五錢，黃芩五錢，川芎五錢。
【用 法】 上藥煎水溫服。
【附 注】 能治牙关緊閉，人事昏迷者，服后有發汗或有大便下瀉，此乃藥力發作所致。

破伤風 广州 盧宗强

- 【处 方】 全蝎三錢，防風三錢。
【用 法】 清水煎去渣溫服。
【症 狀】 脉浮促，風由破伤处傳入，初則略有抽搐，外觀似不甚重要者，若不急治，必致死亡。

治破伤風外灸方

- 【处 方】 槐樹白皮放患处艾火灸至如虫爬行或疼即愈。
殺菌化毒有效。

五、炮彈射伤

被槍伤子彈不出效方

【处 方】 生地一兩，生川烏一兩，生草烏一兩，火麻一兩。

【用 法】 將藥搗爛，如在春夏則用糖調，秋冬則用青油調敷伤处。

取炮彈藥方 順德容奇 李庭芬

【处 方】 扁魚臍，黃牛屎，广尾魚，扁柏叶，蓖麻子，白薯莖，推車子一对，土狗，麻油，猪牛肉，馬前，蜜糖。

【制 法】 將藥搗爛。

【用 法】 把藥敷伤口上，炮彈即出。

又 方 順德容奇 李庭芬

【处 方】 用扁魚肚胎連同糯米搗爛敷治，約三次便效，此乃四肢治療，倘肚內則用土狗胎搗爛敷上，虽不能出必落下部，不能为患。

出炮碼方

陈德君

【处 方】 山竹桔核四只，推車子二只，巴豆肉五分，土狗子一只，白蜡一錢，蓖麻子五分。

【制 法】 將藥捶成泥狀，搓成条。

【用 法】 先用銀針探入伤处深淺，然后將藥条塞進伤口。

治槍傷彈子入肉奪彈子方

龙川 李英南

【处 方】 竹桔子核（晒燥焙干、研末），砂姜，灶鷄子。

【用 法】 加生心飯搗爛敷傷處，可將彈子奪出。

治竹木屑及玻璃刺入肉不出方

龙川 李英南

【处 方】 老虎哥（螳螂）一只。

【用 法】 上藥焙干研末加烏藥膏和勻敷上即出。

治蛇骨入肉不出方

龙川 鄧咏泉

【处 方】 官婢（臭虫）一只。

【用 法】 取官婢血滴点傷處呈紅色可看見蛇骨，即以針挑之。

六、急救（包括骨鯁、服毒）

鯁魚骨、鷄骨良方

黃举昌

【处 方】 威灵仙一兩，沙糖二兩，醋一碗。

【制 法】 將藥完全用醋煎服。

魚骨鯁方

順德 薛坦君

【處方】 威靈仙四錢，煨草果三錢。

【制法】 將藥用水煎，加入粗砂糖。

【用法】 一次飲服，成年人加倍量。

【適應症】 魚，鰻骨鯁（鰻骨鯁要多飲）。

誤服魚藤根驗方

順德 陳坦君

【處方】 用童便一至二碗服之立效。

急救通關藥方

肇慶 陸大成
鄧福英

【處方】 皂角，細辛（等分）研末。加冰片少許，入瓶候用。

【適應症】 吊頸、水淹及諸急症氣垂絕者，以此散末吹入鼻中。另內服附子七錢，黃芪五錢，煎水服，生姜汁少許沖。

治諸中毒方

【處方】 防風一斤，紫蘇半斤，薄荷四兩，白矾五錢。

【用法】 用二三尺深的黃土六斤，放盆內，用水將黃土攪勻，俟水澄清后，取水煎藥。凡誤服毒的，即將藥水一至二兩，加入白糖少許，令服之。

治中砒毒（信石）方

清遠 呂直純

【處方】 用生鴨血濃患者飲。

治食大茶叶中毒方

龙川 謝建承

【处 方】 金銀花連叶捶爛取汁。

【用 法】 上藥和黃糖服。

又 方

【处 方】 生豬油食下，鴨舌草捶爛取汁。

【用 法】 上藥和黃糖服，可刺激嘔吐。

治中大茶毒方 清遠 黃創業

【处 方】 用雷公碗（又名崩大碗），搗爛，開茶油瀝患者服。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 广东省中医验方交流汇编

作者 =

页数 = 3 2 8

S S 号 = 0

出版日期 =

V s s 号 = 7 2 0 6 8 8 7 1