金匱玉函經

序目

一 二

清本刻

金剛般若波羅蜜經

平安成美堂藏版

清水翻刻

金剛般若波羅蜜經

平安成美堂藏版

何義門先生鑒定

漢仲景張先生著

金匱玉函經

眞本

本衙藏板

翻刻金匱玉函經引

仲景氏之遺書蓋傷寒論而已矣

晉王叔和特以其痙濕暍傷寒霍亂陰陽易等諸篇為傷寒論分雜病論為金匱要略又據其傷寒論條論於前會方於後勒成一家之書命以為金匱玉函經於是乎仲

景氏之書泒而為三今也雖難遽
淺一書之舊而合三觀之仲景全
旨斯在其中矣且此經與傷寒論
大同而小異其異者適足以相發
盖並行而不相悖者也如總例炮
製等篇則叔和所作固自言之矣
雖正文中亦叔和之言數見焉學

者能潭思三書而達於仲景之旨
則何憂乎莠之亂苗詩云涇以渭
濁湜湜其沚其斯之謂與方今傷
寒論要略二書已行于
本邦而此經則未也雖間有謄本
而亥豕轉甚予竊以為憾焉會得
清康熙印本文字端儼足為善本

遂刊而流世庶幾乎仲景微言罔
攸伏云爾

皆

延享三年丙寅冬十月

平安清水 敬長書于成美堂

金匱玉函經八卷漢張仲景論著晉王叔和所撰次也其標題蓋亦後人所加取珍秘之意仲景當漢季年篤好方術以拯天横其用心仁矣故自素難本草湯液諸書咸抉根得髓其為傷寒雜病論實為萬世羣方之祖自叔和尊尚以後年歲久遠錯亂放失者屢矣宋治平初命諸臣校定其

目有三曰傷寒論金匱方論一名金匱玉函要畧以
及此經是也雖未必盡復仲景本書之舊
然一家之學粗完余幼讀二論精微簡要
務令上口以通思索徧求是經獨不可得
後檢鄱陽馬氏經籍考雖列其目而所引
晁序則實金匱玉函要畧也則此經益自
元時而不行于世矣歲壬辰義門何内翰
以予粗習張書句讀手抄宋本見授拜受

卒業喜忘寢食惜其訛脫者多甚或不能
以句既無他本可校乃博考衆籍以相證
佐補亡滅誤十得八九稿凡數易而始可
讀則掩卷而歎曰是可報命于内翰矣内
翰嘗以古明醫多以醫案示人見愛過實
嘱刻其平生醫藥病狀之驗者予瞿然不
敢當語云三折肱為良醫予雖老是然處
方設劑吾斯未信因念是經世久未見而

內翰既得禁方不自秘匿雖古人尤難之開以傳後其弘濟豈但一師之說哉夫岐黃之書經也仲景之經律也臨證療疾引經案律十不失一二論所述畧具矣是書則兼綜兩者而整齊形證附類方藥各有門部次第不可淆亂則知經又論之自出尤醫門之金科玉條也八卷之中上順天和以藥人患非通三才之道而得徃聖之心者不能觀者苟能潛心玩索而知其所以則因病發藥應如桴鼓順之則能起死畔之則立殺人先儒以孫思邈尚為粗曉其旨得其書者未可謂不過與傷寒論及要畧相出入而鹵莽治之也不揆淺陋願與同志者熟讀而精思之

皆

康熙丙申陽月上海陳世傑書

重刻金匱玉函經序

吾宗懷三先生自幼學儒以多病廢遂篤嗜方書壯年由上海流寓吳門坐臥一閣近十年所手不釋卷帙精通諸禁方然未嘗以醫自夸所治輒效益務實不近名名久大震性高亮疎豁無軟熟態兩遊京師貴人爭迎之皆翩然謝歸出入里中乘壞肩輿有謁必往切脉診病其可藥與否常直言以對不爲挾要欺倖富貴人或

爲藥所誤垂死乃相招或投藥有起勢遽以庸
醫間之先生益厭苦常謾語來者曰吾不能醫
富貴人也儒門單戶有急相告卽毒熱嚴凍隨
早晚必赴愈不計其所酬薄厚其學長于仲景
嘗謂綱要精微實軒岐之繼別而自晉唐以還
名家掇論悉衍其緒故讀傷寒論及要略不但
誦數悉能心知其意惟恨未見金匱玉函經市
中見杜光庭所掇書標題恰同喜極購歸既啟

乃知非是于是求之益亟義門何先生知先生
最深得宋抄本授之窮日夜校閱卽有脫誤以
他書是正歷三四寒温而後可句尋考本序爲
宋館閣秘本元明以來相沿以要畧爲此經雖
丹溪之精通安道之淹貫蓋皆未見先生于是
刻而傳之間嘗語余黄岐之經義深以遠仲景
之書理切而要不深其書而求以通經如討源
而末有楫也然年久散失晦蝕于諸家之說多

矣故吾讀是書自成無已外注凡七十有二家皆废而不觀懼文多而益昧其經爾今吾刻是幸其久未見不爲注所厖學者潛心刻意庶幾得之雖然其間條緒同于傷寒論者幾什之七懼或者之又畧而弗觀不知發凡起例仲景別有精義存焉讀論與畧者不可闕也余曰經籍之顯晦存乎其人仲景憫宗人之彫喪拯後世之夭橫其利溥矣是經不絕如綫而今章之其用心既與古密契來者難誣其寶而傳之決也則仲景一家之書自此大昭矣丙申長至後長洲弟汝楫書

漢書藝文志載成帝之世詔李柱國校方技劉氏七略有醫經七家二百一十六卷經方十一家二百七十四卷其存於今獨黃帝内經而已素問難經本草之屬皆見於鄭玄經簿王阮志録要之最為古書比于六經繼出者東漢張仲景傷寒論西晉王叔和撰次玉函經二書寔相表裏詳病

理各詣其極乃方技中之論

語孟子書不得其門者末由語於生生也
隨書經籍志與唐宋藝文志卷目時有不
同然行於世者猶出宋治平間三館校定
可以据信吾友陳先生懷三研精覃思於
張王二書有年所矣遇疾危急羣疑共却
必予全濟於是同術驚詫目為神奇不知
惟能熟復古賢方劑視證所宜不肯妄行
胷臆以人之寄命為戲劇爾以書考之一

一可覆也先生深閔其道之晻昧務思援
古正今謂傷寒論世多有而金匱玉函經
發無傳乃從藏書家訪求善本与篋中本
再三勘校重開以通流之盖仁人之用心
也博與愛其禁而戒勿洩者殊絕矣昔東
垣李明之著傷寒會要書遺山元裕之為
之作序余無遺山之文辭而此書為醫學
之論語孟子其已試之效亦不假予言而

始張特重先生之用心可與進於孔益之道也輒書其後蓋先生本儒者云

康熙丁酉正月義門何焯

校正金匱玉函經疏

金匱玉函經與傷寒論同體而別名欲人互相檢閱而為表裏以防後世之亡逸其濟人之心不已深乎細考前後乃王叔和撰次之書緣仲景有金匱錄故以金匱玉函名取寶而藏之之義也王叔和西晉人為太醫令雖博好經方其學專于仲景是以獨出於諸家之右仲景之書及今八百餘年不墜于地者皆其力也但此經

自晉以來傳之既久方證訛謬辨論不倫歷代名醫雖學之皆不得彷彿惟孫思邈麤曉其旨亦不能修正之況其下者乎 國家詔儒臣校正醫書臣等先校定傷寒論次校成此經其文理或有與傷寒論不同者然其意義皆通聖賢之法不敢臆斷故並兩存之凡八卷依次舊目總二十九篇一百一十五方恭惟

主上大明撫運視民如傷廣頒其書爲天下生生之具直欲躋斯民於壽域者矣治平三年正月十八日太子右贊善大夫臣高保衡尚書員外郎臣孫奇尚書司封郎中秘閣校理臣林億等謹上

金匱玉函經目錄

卷一
疏序
證治總例
卷二
辨痙溼暍第一
辨脉第二
辨太陽病形證治上第三

卷三
辨太陽病形證治下第四
辨陽明病形證治第五
辨少陽病形證治第六
卷四
辨太陰病形證治第七
辨少陰病形證治第八
辨厥陰病形證治第九
辨厥利嘔噦病形證治第十
辨霍亂病形證治第十一
辨陰陽易差後勞復病形證治第十二
卷五
辨不可發汗病形證治第十三
辨可發汗病形證治第十四
辨不可吐病形證治第十五
辨可吐病形證治第十六

辨不可下病形證治第十七
辨可下病形證治第十八
卷六
辨發汗吐下後病形脉證第十九
辨可温病形證治第二十
辨不可火病形證治第二十一
辨可火病形證治第二十二
辨不可灸病形證治第二十三

敬長按脉證疑當作證治

辨可灸病形證治第二十四
辨不可刺病形證治第二十五
辨可刺病形證治第二十六
辨不可水病形證治第二十七
辨可水病形證治第二十八
論熱病陰陽交併生死證第二十九
卷七
方藥炮製

桂枝湯方第一
桂枝麻黃各半湯方第二
桂枝二麻黃一湯方第三
桂枝二越婢一湯方第四
桂枝加桂湯方第五
桂枝加附子湯方第六
桂枝去芍藥湯方第七
桂枝去芍藥加附子湯方第八
桂枝去桂加茯苓白朮湯方第九
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方第十
桂枝加芍藥生薑人參新加湯方第十一
桂枝倍加芍藥湯方第十二
桂枝加大黃湯方第十三
桂枝人參湯方第十四
桂枝甘草龍骨牡蠣湯方第十五

桂枝甘草湯方第十六
桂枝加葛根湯方第十七
葛根湯方第十八
葛根加半夏湯方第十九
葛根黃芩黃連湯方第二十
麻黃湯方第二十一
麻黃杏子甘草石膏湯方第二十二
麻黃附子甘草湯方第二十三
麻黃附子細辛湯方第二十四
麻黃連軺赤小豆湯方第二十五
麻黃升麻湯方第二十六
大青龍湯方第二十七
小青龍湯方第二十八
小建中湯方第二十九
小柴胡湯方第三十
柴胡桂枝乾薑湯方第三十一

柴胡桂枝湯方第三十二
柴胡加龍骨牡蠣湯方第三十三
大柴胡湯方第三十四
柴胡加芒硝湯方第三十五
柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯方第三十六
茯苓桂枝甘草大棗湯方第三十七
茯苓桂枝白朮甘草湯方第三十八
茯苓甘草湯方第三十九

五苓散方第四十
甘草乾薑湯方第四十一
芍藥甘草湯方第四十二
炙甘草湯方第四十三
甘草湯方第四十四
厚朴生薑半夏甘草人參湯方第四十五
梔子豉湯方第四十六
梔子甘草豉湯方第四十七

梔子生薑豉湯方第四十八
梔子厚朴湯方第四十九
梔子乾薑湯方第五十
梔子黃檗湯方第五十一

卷八

小陷胸湯方第五十二
大陷胸湯方第五十三
大陷胸圓方第五十四
又大陷胸湯方第五十五
文蛤散方第五十六
白散方第五十七
大黃瀉心湯方第五十八
附子瀉心湯方第五十九
半夏瀉心湯方第六十
甘草瀉心湯方第六十一
生薑瀉心湯方第六十二

禹餘糧圓方缺
赤石脂禹餘糧湯方第六十三
旋覆代赭石湯方第六十四
瓜蒂散方第六十五
白虎湯方第六十六
白虎加人參湯方第六十七
桂枝附子湯方第六十八
朮附湯方第六十九
甘草附子湯方第七十
芍藥甘草附子湯方第七十一
乾薑附子湯方第七十二
十棗湯方第七十三
附子湯方第七十四
大承氣湯方第七十五
小承氣湯方第七十六
調胃承氣湯方第七十七

桃仁承氣湯方第七十八
豬苓湯方第七十九
蜜煎導方第八十
麻子仁圓方第八十一
抵當圓方第八十二
抵當湯方第八十三
茵蔯蒿湯方第八十四
黃連阿膠湯方第八十五
黃連湯方第八十六
桃花湯方第八十七
吳茱萸湯方第八十八
豬膚湯方第八十九
桔梗湯方第九十
苦酒湯方第九十一
半夏散方第九十二
白通湯方第九十三

白通加豬膽汁湯方第九十四
眞武湯方第九十五
烏梅圓方第九十六
乾薑黃芩黃連人參湯方第九十七
白頭翁湯方第九十八
黃芩人參湯方第九十九
黃芩湯方第一百
黃芩加半夏生薑湯方第一百一
理中圓及湯方第一百二
四逆散方第一百三
四逆湯方第一百四
通脉四逆湯方第一百五
人參四逆湯方第一百六
茯苓四逆湯方第一百七
通脉四逆加豬膽汁湯方第一百八
當歸四逆湯方第一百九

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方第一百十
燒裩散方第一百十一
枳實梔子豉湯方第一百十二
牡蠣澤瀉散方第一百十三
竹葉石膏湯方第一百十四
麥門冬湯方第一百十五

附遺

金匱玉函經目錄　終

金匱玉函經卷第一

上海陳世傑懷三重校
漢仲景張機著
門人張邵煥有文叅
晉王叔和撰次
平江余謙牧心恭重校
宋林億等校正
門人張　嵩峻天閱

證治總例

夫二儀之內惟人最靈稟天地精英之氣故與天地相參天一生水剛柔漸形是以人之始生

先成其精腦髓既足筋骨斯成皮堅毛長神舍於心頭圓法天足方象地兩目應日月九竅應九州四肢應四時十二節應十二月五藏應五音六府應六律手十指應十干足十指莖垂應十二支三百六十節以應一歲天有風雨人有喜怒天有雷電人有音聲天有陰陽人有男女月有大小人有虛實萬物皆備乃名爲人服食五味以養其生味有所偏藏有所勝氣增而久

疾病乃成諸經藏中金木水火土自相尅賊地水火風復加相乘水行滅火土救其母迭爲勝負藏氣不精此爲害道不知經脉妄治諸經使氣血錯亂正氣受刑陰陽不和十死一生經云地水火風合和成人凡人火氣不調舉身蒸熱風氣不調全身强直諸毛孔閉塞水氣不調身體浮腫脹滿喘麤土氣不調四肢不舉言無音聲火去則身冷風止則氣絕水竭則無血土敗

則身裂愚醫不思脉道反治其病使藏中金木
水火土互相攻尅如火熾然重加以油不可不
愼又使經脉者如流水迅急能斷其源者此爲
上也
凡四氣合德四神安和人一氣不調百一病生
四神動作四百四病同時俱起其有一百一病
不治自愈一百一病須治而愈一百一病難治
難愈一百一病眞死不治

問曰人隨土地得合陰陽稟食五穀隨時相將
冬得溫室夏遂清凉消渗調寒暑四季不遭傷
恐懼畏無時忽然致不祥肺魄不能靜肝魂欲
飛揚心神失所養脾腎亦乖方六府彷徨亂何
以致安康非鍼藥不定盍自究精詳答曰肝虛
則目暗其魂自飛揚肺衰則氣上其魄自掩藏
心虛則不定諸藏受迮狹脾腎虛衰至內結作
癰瘡六府病蜎集諸脉失經常及時加鍼藥勿

使及淪亡

古者上醫相色中醫聽聲下醫診脉診候之法固是不易又云問而知之別病深淺命曰巧焉上醫相色知病者色脉與身形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生之類中醫聽聲知病者聲合五音火聞水聲煩悶驚悸木得金聲恐畏相刑脾者土也生育萬物回助四傍善者不見惡則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六識閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫診脉知病者源流移轉四時逆順相害相生審知藏府之微此爲妙也

夫診法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調勻氣血未亂精取其脉知其逆順必察四難而明告之然愚醫不能如斯逆四難而生亂階者此爲誤也

肝病治肺心病折腎其次取俞募不令流轉藏

府見肝之病當瀉肺金補肝木木子火爲父報仇故火尅金子病以母補之母病以子瀉之蓋云王者不受其邪而爲邪傳以得姦賊之侵病次於一藏之中五賊相害於彼前路當先斷之一藏不可再傷精神不中數勞次取俞募其令五邪氣當散去之

凡婦人之病比之男子十倍難治攷諸經言病本一體所以難治者婦人衆陰所集常與濕居

十五以上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿容月水去留前後交互瘀血停凝中路斷絕其中傷嬾不可具論生熟二藏虛實交錯惡血內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合陰陽或出行風來便利穴厠之上風從下入便成十二痼疾男子病者衆陽所歸常居于燥陽氣游動强力施泄便成勞損損傷之病亦衆多矣食草者力食穀者智食肉者勇以

金治金眞得其眞以人治人眞得入神

凡欲和湯合藥灸刺之法宜應精思必通十二經脉三百六十孔穴營衛氣行知病所在宜治之法不可不通湯散丸藥鍼灸膏摩一如其法然愚醫不通十二經脉不知四時之經或用湯藥倒錯鍼灸失度順方治病更增他疾惟致滅亡故張仲景曰哀哉烝民枉死者半可謂世無良醫爲其解釋

吾常見愚人疾病有三不治重財輕命一不治服食不節二不治信邪賊藥三不治若主候常存形色未病未入腠理鍼藥及時服將調節委以良醫病無不愈咸共思之又自非究明醫術素識明堂流注者則身中榮俞尚不能知其所在安能用鍼藥以治疾哉今列次第以示後賢使得傳之萬世

張仲景曰若欲治疾當先以湯洗滌五藏六府

開通經脉理導陰陽破散邪氣潤澤枯槁悅人
皮膚益人氣血水能淨萬物故用湯也若四肢
病久風冷發動次當用散散能逐邪風濕痺表
裏移走居無常處者散當平之次當用丸丸能
逐沉冷破積聚消諸堅癥進飲食調營衛能叅
合而行之者可謂上工醫者意也聖道非不妙
愚醫不能尋聖意之要妙怨嗟藥石不治者此
爲謬也非聖人之過也又能尋膏煎摩之者亦

古之例也虛則補之實則瀉之寒則散之熱則
去之不虛不實以經取之虛者十補勿一瀉之
實者瀉之虛實等者瀉勿太泄膏煎摩之勿使
復也若虛者重瀉眞氣絕實者補之重其疾大
熱之氣寒以取之盛熱之氣以寒發之又不須
汗下而與汗下之者此爲逆也仲景曰不須汗
而强與汗之者奪其津液令人枯竭而死又須
汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絕而

死又不須下而强與下之者令人開腸洞泄便溺不禁而死又須下而不與下之者令人心內懊憹脹滿煩亂浮腫而死又不須灸而强與灸之者令人火邪入腹干錯五藏重加其煩而死又須灸而不與灸之者使冷結重氷久而彌固氣上衝心無地消散病篤而死又須珍貴之藥非貧家野居所能立辦由是怨嗟以爲藥石無驗者此弗之思也

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升合消滅之法則云何答曰凡草木有根莖枝葉皮毛花實諸石有軟鞕消走諸蟲有毛羽甲角頭尾骨足之屬有須燒煉炮炙生熟有定一如後法順方是福逆之者殃又或須皮去肉或去皮須肉或須根去莖又須花須實依方揀採治削極令淨潔然後升合秤兩勿令叅差藥有相生相殺相惡相反相畏相得氣力有强有弱有君臣

相理佐使相持若不廣通諸經焉知草木好惡或醫自以意加減更不依方分配使諸草石强弱相欺勝負不順入人腹內不能治病自相鬬爭使人逆亂力勝刀劒若調和得宜雖未去病猶得利安五藏令病無至增劇若合治湯藥當取井花水極令潔淨升斗勿令多少煑之調和一如其法若合蜜丸當須看第七卷令童子杵之極令細熟杵數千百下可至千萬過多益佳

敬長按穰疑當作禳

依經文和合調勻當以四時王相日造合則所求皆得穰災滅惡病者得瘥死者更生表鍼內藥與之令服可謂千金之藥內消無價之病

夫用鍼刺者先明其孔穴補虛瀉實送堅付濡以急隨緩營衛常行勿失其理行其鍼者不亂乎心口如銜索目欲內視消息氣血不得妄行鍼入一分知天地之氣鍼入二分知呼吸之氣鍼入三分知逆順之氣鍼皮毛者勿傷血脉鍼

血脉者勿傷肌肉鍼肌肉者勿傷筋膜鍼筋膜者勿傷骨髓經曰東方甲乙木主人筋膜魂南方丙丁火主人血脉神西方庚辛金主人皮毛北方壬癸水主人骨髓志中央戊己土主人肌肉智鍼傷筋膜者令人愕視失魂鍼傷血脉者令人煩亂失神鍼傷皮毛者令人上氣失魄鍼傷骨髓者令人呻吟失志鍼傷肌肉者令人四肢不舉失智鍼能殺生人亦能起死人

凡用鍼之法補瀉爲先呼吸應江漢補瀉應星斗經緯有法則陰陽不相干震爲陽氣始兌爲陰氣終坎爲太玄華坤爲太陰精欲補從卯南欲瀉從酉北鍼入因日明鍼出隨月光夫治陰陽風邪身熱脉大者以烽鍼刺之治諸邪風鬼疰痛處少氣以毛鍼去之凡用烽鍼者除疾速也先補五呼刺入五分留入十呼刺入一寸留二十呼隨師而將息之刺急者深內而久留之

刺緩者淺內而疾發鍼刺大者微出其血刺滑者淺內而久留之刺澁者必得其脉隨其逆順久留之疾出之擫穴勿出其血刺諸小弱者勿用大鍼然氣不足宜調以甘藥餘三鍼者止中破癰堅痛結息肉也非治人疾也

夫用灸之法頭身腹背肩臂手足偃仰側其上中諸部皆是陰陽榮衛經絡俞募孔穴各有所主相病正形隨五藏之脉當取四時相害之脉如浮沉滑澁與灸之人身有大小長短骨節豐狹不可以情取之宜各以其部分尺寸量之乃必得其正諸度孔穴取病人手大拇指第一節橫度爲一寸四指爲一部亦言一夫又以文理縫縱會言者亦宜審詳

凡點灸法皆取平正身體不得傾側寬縱縮狹也若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立灸之反此者不得其穴

凡諸言壯數者皆以中平論也若其人丁壯病重者可復一倍其人老弱病微者可復減半然灸數可至二三百也可復倍加火治之不然則氣不下沉雖焦而病不愈又新生小兒滿一朞以還者不過一七止其壯數多少隨病大小也凡灸須合陰陽九部諸府各有孔穴而有多少故頭背爲陽部參陰而少臂脚爲陽部亦參陰而少胸爲陰部參陽而少腹爲陰部亦參陽而少此爲陰陽營衛經脉事也行壯多少在數人病隨陰陽而灼灸之若不知孔穴勿妄灸之使病增重又人體腰以上爲上部腰以下爲下部外爲陽部內爲陰部營衛藏府周流名曰經絡是故丈夫四十以上氣在腰婦人四十以上氣在乳以丈夫先衰于下婦人先衰于上灸之生熟亦宜撙節之法當隨病遷轉大法外氣務生內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之

所注氣血精明三百六十五絡皆歸于頭頭者
諸陽之會也故頭病必宜審之灸其穴不得亂
灸過多傷神或陽精玄精陰魄再卒是以灸頭
止得滿百背者是體之橫梁五藏之繫着太陽
之會合陰陽動發冷熱成病灸大過熟大害人
也臂脚手足者人之枝榦其神繫於五藏六府
隨血脉出能遠近採物臨深履薄養於諸經其
地狹淺故灸宜少過多則內神不得入精神閉
塞否滯不仁卽手臂不舉故四肢之灸不宜大
熟也然腹藏之內性貪五味無厭成疾風寒固
結水穀不消灸當宜熟若大杼脊中腎俞膀胱
八竅可至二百壯心主手足太陰可至六七十
壯三里太谿太衝陰陽二泉上下二廉可至百
壯腹上上管下管太倉關元可至一百壯若病
重者三復之乃愈耳若治諸沉結寒冷必灸之
宜熟量病輕重而攻治之表鍼內藥隨宜用之

消息將之與天同心百年永安終無橫殀此要
辨病救疾可行合宜之法并方藥共成八卷號
爲金匱玉函經其篇目次第列于卷首

金匱玉函經卷第一 終

金匱玉函經卷第二

辨痙溼暍第一

太陽病痙溼暍三種宜應別論以爲與傷寒相
似故此見之

太陽病發熱無汗而反惡寒是爲剛痙

太陽病發熱汗出而不惡寒是爲柔痙

太陽病發熱其脉沉細是爲痙

太陽病發熱其汗因致痙

病者身熱足寒頭項强惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭動搖卒口噤背反張者爲痙

脊强者五痙之總名其證卒口噤背反張而癒痙諸藥不已可灸身柱大椎陶道

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙葛根湯主之

剛痙爲病胸滿口噤臥不著席腳攣急其人必齘齒可與大承氣湯

痙病發其汗已其脉洽洽如蛇暴腹脹大者爲欲解脉如故反復弦者必痙

痙脉來按之築築而弦直上下行

痙家其脉伏堅直上下

夫風病下之則痙復發其汗必拘急

太陽病其症備身體强几几然脉沉遲此爲痙

括樓桂枝湯主之

痙病有灸瘡難療

痙家雖身疼痛不可發其汗汗出則痙

太陽病而關節疼煩其脉沉緩爲中溼

病者一身盡疼煩日晡卽劇此爲風溼汗出當

溼家之爲病一身盡疼發熱而身色似熏黃也

風所致也

溼家之爲病其人但頭汗出而背强欲得被覆

向火若下之蚤則噦或胃滿小便不利舌上如

胎此爲丹田有熱胸上有寒渴欲飲而不能飲

則口燥煩也

溼家下之額上汗出微喘小便利者死若下利

不止者亦死

問曰病風溼相搏身體疼痛法當汗出而解值

天陰雨溜不止師云此可發汗汗之而其病不

愈者何故答曰發其汗汗大出者但風氣去溼

氣仍在是故不愈若治風溼者發其汗微微似

欲出汗者則風溼俱去也

病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其
脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒溼故
鼻塞內藥鼻中卽愈
溼家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗爲
宜愼不可以火攻之
風溼脉浮身汗出惡風者防已湯主之
太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也
白虎湯主之
太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷
水水行膚中所致也瓜蒂湯主之
太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤
遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身卽
熱口開前板齒燥若發其汗惡寒則甚加溫鍼
發熱益甚數下之則淋甚

辨脉第二

問曰脉有陰陽何謂也答曰脉大爲陽浮爲陽

敬長按住疑當作往

數爲陽動爲陽滑爲陽沉爲陰澁爲陰弱爲陰
弦爲陰微爲陰陰病見陽脉者生陽病見陰脉
者死

問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉自
浮而數能食不大便名曰陽結期十七日當劇
其脉自沉而遲不能食身體重大便反堅名曰
陰結期十四日當劇

問曰病有澼淅惡寒而復發熱者何也答曰陰
脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之何謂陽
不足答曰假令寸口脉微爲陽不足陰氣上入
陽中則澼淅惡寒何謂陰不足答曰尺脉弱爲
陰不足陽氣下陷入陰中則發熱

陽脉浮陰脉弱者則血虛血虛則筋急

其脉沉者營氣微也其脉浮而汗出如流珠者
衛氣衰也營氣微加燒鍼血留不行更發熱而
燥煩也

脉蔕蔕如車蓋者名曰陽結也

脉纍纍如循長竿者名曰陰結也

脉聶聶如吹榆莢者名曰散也

脉瞥瞥如羹上肥者陽氣脫也

脉縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也

脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血也

脉來緩時一止復來名曰結脉來數時一止復來名曰促脉陽盛則促陰盛則結此皆病脉

陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脉見于關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也

陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰與陽同等者名曰緩也

脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無常也

脉弦而大弦即爲減大即爲芤減即爲寒芤即

爲虛寒虛相搏脈卽爲革婦人卽半產漏下男子卽亡血失精

問曰病有戰而汗出自得解者何也答曰其脈浮而緊按之反芤此爲本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脈浮故當汗出而解若脈浮而數按之不芤此本不虛若欲自解但汗出耳卽不發戰也

問曰病有不戰而汗出解者何也答曰其脈大而浮數故不戰汗出而解也

問曰病有不戰復不汗而解者何也答曰其脈自微此以曾發汗若吐若下若亡血內無津液陰陽自和必自愈故不戰不汗而解也

問曰傷寒三日其脈浮數而微病人身自涼和者何也答曰此爲欲解也解以夜半脈浮而解者濈然汗出也脈數而解者必能食也脈微而解者必大汗出也

問曰脉病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病者日中愈日中得病夜半愈者以陰得陽則解也夜半得病日中愈者以陽得陰則解也

問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病者日中愈日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者以陰得陽則解也

夫寸口脉浮在表沉在裏數在府遲在藏假令脉遲此為在藏

脉遲此為在藏

趺陽脉浮而濇少陰脉如經其病在脾法當下利何以知之脉浮而大者氣實血虛也今趺陽

問曰脉病欲知何時得何時愈答曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脉陰陽為和平雖劇當愈

師曰立夏得洪大脉是其本位其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗濈濈然自出者明日便解矣何以言之立夏脉洪大（一本作浮大）是其時脉故使然也四時倣此

脉浮而澁故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脉
弦而浮纔見此爲調脉故稱如經而反滑數者
故知當溺白溜膿也
寸口脉浮而緊浮卽爲風緊卽爲寒風卽傷衛
寒卽傷營營衛俱病骨節煩疼當發其汗也
趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮
則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也
營衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便堅

氣噫而除何以言之脾脉本緩今數脉動脾其
數先微故知脾氣不治大便堅氣噫而除今脉
反浮其數攸微邪氣獨留心中則饑邪熱不殺
穀潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如法
病者則饑數脉不時則生惡瘡也
師曰病人脉微而澁者此爲醫所病也大發其
汗又數大下之其人亡血病當惡寒而發熱無
休止時夏月盛熱而欲着複衣冬月盛寒而欲

裸其體所以然者陽微卽惡寒陰弱卽發熱醫
發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之
時陽氣在表胃中虛冷內以陽微不能勝冷故
欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱內
以陰弱不能勝熱故欲裸其體又陰脉遲澁故
知亡血也
脉浮而大心下反堅有熱屬藏者攻之不令發
汗屬府者不令溲數溲數則便堅汗多則熱愈

汗少卽便難脉遲尙未可攻
趺陽脉數微澁少陰反堅微卽下逆澁卽躁煩
少陰堅者便卽爲難汗出在頭穀氣爲下便難
者令微溏不令汗出甚者遂不得便煩逆鼻鳴
上竭下虛不得復還
脉浮而洪軀汗如油喘而不休水漿不下形體
不仁乍靜乍亂此爲命絕未知何藏先受其災
若汗出髮潤喘而不休此爲肺絕陽反獨留形

體如烟熏直視搖頭此爲心絕唇吻反青四肢
槩習此爲肝絕環口黧黑柔汗發黃此爲脾絕
溲便遺失狂語目反直視此爲腎絕又未知何
藏陰陽先絕若陽氣先絕陰氣後竭其人死身
色必青肉必冷陰氣先絕陽氣後竭其人死身
色必赤腋下温心下熱也
寸口脉浮大醫反下之此爲大逆浮卽無血大
卽爲寒寒氣相搏卽爲腸鳴醫乃不知而反飲

之水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人卽鬲
趺陽脉浮浮卽爲虛浮虛相搏故令氣鬲言胃
氣虛竭也脉滑則爲噦此爲醫咎責虛取實守
空迫血脉浮鼻口燥者必衄
諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處食飲
如常者畜積有膿也
脉浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而
解反發熱者差遲遲爲無陽不能作汗其身必

癢也

脉虛者不可吐下發汗其面反有熱色爲欲解不能汗出其身必癢

寸口脉陰陽俱緊法當清邪中上濁邪中下清邪中上名曰潔濁邪中下名曰渾陰中于邪必內慄表氣微虛裏氣失守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項强腰痛脛痠所謂陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄

足膝逆冷溲便妄出表氣微虛裏氣微急三焦相涸內外不通若上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷若中焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中爲濁營衛不通血凝不流衛氣前通小便赤黃與熱相搏因熱作使游于經絡出入藏府熱氣所過即爲癰膿陰氣前通陽氣厥微陰無所使客氣內入噎而出之聲嗢咽塞寒厥相追爲熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液

注下若下焦不闔清便下重令便數難臍築湫痛命將難全

脉陰陽俱緊口中氣出脣口乾燥踡臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足温此爲欲解或到八日以上反大發熱此爲難治設惡寒者必欲嘔腹痛者必欲利也

脉陰陽俱緊至於吐利其脉獨不解緊去人安

敬長按臉疑當作瞼

此爲欲解若脉遲至六七日不欲食此爲晚發水停故也爲未解食自可者爲欲解

病六七日手足三部脉皆至大煩口噤不能言其人躁擾此爲欲解若脉和其人大煩目重臉內際黃亦爲欲解

脉浮而數浮卽爲風數卽爲虛風卽發熱虛卽惡寒風虛相搏則灑淅惡寒而發熱也

趺陽脉浮而微浮卽爲虛微卽汗出

脉浮而滑浮卽爲陽滑卽爲實陽實相搏其脉
數疾衛氣失度浮滑之脉數疾發熱汗出者此
爲不治
脉散其人形損傷寒而欬上氣者死
脉微而弱微卽爲寒弱卽發熱當骨節疼痛煩
而極出汗
寸口脉濡而弱濡卽惡寒弱卽發熱濡弱相搏
藏氣衰微胃中苦煩此非結熱而反刼之居水

太陽之爲病頭項强痛而惡寒

太陽病其脉浮

太陽病發熱汗出而惡風其脉緩爲中風

太陽中風發熱而惡寒

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆

其脉陰陽俱緊爲傷寒

傷寒一日太陽脉弱至四日太陰脉大

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲吐

躁煩脉數急者乃爲傳

傷寒其二陽證不見此爲不傳

傷寒三日陽明脉大者爲欲傳

傷寒三日少陽脉小者爲欲已

太陽病發熱而渴不惡寒爲温病若發汗已身

體灼熱者爲風温風温之爲病脉陰陽俱浮汗

出體重多眠鼻息必鼾語聲難出若下之小便

不利直視失溲若被火微發黄劇則如驚癎時

掣縱發作復以火熏之一逆尚引日再逆促命期

太陽病三四日不吐下見乾乃汗之

太陽病頭痛至七日有當愈者其經竟故也若欲作再經者當鍼足陽明使經不傳則愈

太陽病欲解時從巳盡未

風家表解而不了了者十二日愈

夫病身大熱反欲得衣者寒在骨髓熱在皮膚身大寒反不欲近衣者熱在骨髓寒在皮膚也

太陽中風陽浮而陰濡弱陽浮者熱自發濡弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔桂枝湯主之

太陽病發熱汗出此爲營弱衛强故使汗出欲解邪風桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯主之

太陽病項背强几几而反汗出惡風桂枝湯主之

之論云桂枝加葛根湯主之
太陽病下之其氣上衝者可與桂枝湯不衝者
不可與之
太陽病三日已發汗若吐若下若温鍼而不解
此爲壞病桂枝不復中與也觀其脉證知犯何
逆隨證而治之
桂枝湯本爲解肌其人脉浮緊發熱無汗不可
與也常須識此勿令誤也

酒客不可與桂枝湯得之則嘔酒客不喜甘故
也
喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳
服桂枝湯吐者其後必吐膿血
太陽病發其汗遂漏而不止其人惡風小便難
四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯主之
太陽病下之其脉促胸滿桂枝去芍藥湯主之
若微惡寒者桂枝去芍藥加附子湯主之

太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多
而寒少其人不嘔清便自調日二三發脉微緩
者爲欲愈脉微而惡寒此陰陽俱虛不可復吐
下發汗也面反有熱色者爲未欲解以其不能
得小汗出身必當癢桂枝麻黃各半湯主之
太陽病初服桂枝湯反煩不解者當先刺風池
風府却與桂枝湯卽愈
服桂枝湯大汗出若脉但洪大與桂枝湯若其
形如瘧一日再發汗出便解宜桂枝二麻黃一
湯
服桂枝湯大汗出後大煩渴不解若脉洪大者
白虎加人參湯主之
太陽病發熱而惡寒熱多寒少脉微弱者此無
陽也不可復發其汗宜桂枝二越婢一湯
服桂枝湯或下之仍頭項强痛翕翕發熱無汗
心下滿而微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓

白朮湯主之

傷寒脉浮自汗小便數煩微惡寒論曰心煩微惡寒兩脚攣急反與桂枝湯欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以復其陽厥愈足温更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和讝語少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而讝語師言夜半手足當温兩脚當伸後如師言何以知之答曰寸口脉浮而大浮即爲風大即爲虚風則生微熱虚則兩脛攣其形象桂枝因加附子於其間增桂令汗出附子温經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明内結讝語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急與芍藥甘草湯爾乃脛伸與承氣湯微溏止其讝語故知其病可愈

太陽病項背强几几無汗惡風者葛根湯主之
太陽與陽明合病必自利葛根湯主之不下利但嘔者葛根加半夏湯主之
太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促表未解喘而汗出葛根黃連黃芩湯主之
太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘麻黃湯主之
太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

湯主之
病十日已去其脉浮細嗜臥此爲外解設胸滿脅痛與小柴胡湯脉浮者與麻黃湯
太陽中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁頭痛大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風不可服服則厥筋惕肉瞤此爲逆也
傷寒脉浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者可與大青龍湯發之

傷寒表不解心下有水氣欬而發熱或渴或利或噎或小便不利小腹滿或微喘小青龍湯主之

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者此爲寒去欲解小青龍湯主之

太陽病外證未解其脉浮弱當以汗解宜桂枝湯主之

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

太陽病外證未解不可下下之爲逆解外者宜桂枝湯主之

太陽病先發汗不解而下之其脉浮不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脉浮故知在外當解其外則愈宜桂枝湯

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表候仍在此當發其汗服藥已微除其

人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣
重故也麻黃湯主之

太陽病脈浮緊發熱其身無汗自衄者愈

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹
因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證
不罷不可下下之爲逆如此者可小發其汗設
面色緣緣正赤者陽氣怫鬱不得越當解之熏
之當汗而不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中

乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出
不徹故也更發其汗即愈何以知汗出不徹以
脈澁故知之

脈浮數法當汗出而愈若下之身體重心悸者
不可發汗當自汗出而解所以然者尺中脈微
此裏虛須表裏實津液自和即自汗出愈

脈浮而緊法當身疼頭痛宜以汗解之假令尺
中脈遲者不可發其汗何以故此爲營氣不足

血氣微少故也

脉浮者病在表可發汗宜麻黄湯一云桂枝湯

脉浮而數者可發汗宜麻黄湯

病常自汗出者此爲營氣和衛氣不和故也營行脉中爲陰主內衛行脉外爲陽主外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其時發汗卽愈宜桂枝湯

傷寒脉浮緊不發汗因致衄者宜麻黄湯

傷寒不大便六七日頭痛有熱未可與承氣湯其小便反清此爲不在裏而在表也當發其汗

頭痛者必衄宜桂枝湯

傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可與復發汗宜桂枝湯

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者必自愈

大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治之
其小便利必自愈
下之後發其汗必振寒脉微細所以然者內外
俱虛故也
下之後復發其汗晝日煩躁不得眠夜而安靜
不嘔不渴而無表證脉沉微身無大熱者乾薑
附子湯主之
發汗後身體疼痛其脉沉遲桂枝加芍藥生薑
人參湯主之
發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者
可與麻黃杏子甘草石膏湯
發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者
桂枝甘草湯主之
發汗後其人臍下悸者欲作賁豚茯苓桂枝甘
草大棗湯主之
發汗後腹脹滿厚朴生薑甘草半夏人參湯主

之

傷寒若吐若下若發汗後心下逆滿氣上衝胷起卽頭眩其脉沉緊發汗卽動經身爲振振搖茯苓桂枝白朮甘草湯主之

發其汗不解而反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之不惡寒但熱者實也當和胃氣宜小承氣湯

發汗若下病仍不解煩躁茯苓四逆湯主之

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠其人欲引水當稍飲之令胃中和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之

發汗後脉浮而數煩渴者五苓散主之

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入卽吐此爲水逆五苓散主之

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不即欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發其汗虛故也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口爲逆

發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若少氣梔子甘草豉湯主之若嘔梔子生薑豉湯主之

發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛此爲未解梔子豉湯主之

傷寒下後煩而腹滿臥起不安梔子厚朴湯主之

傷寒醫以圓藥大下之身熱不去微煩梔子乾薑湯主之

凡用梔子湯證其人微溏者不可與服之

太陽病發其汗而不解其人仍發熱心下悸頭
眩身瞤而動振振欲擗地者眞武湯主之
咽喉乾燥者不可發其汗
淋家不可發汗發汗必便血
瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則痙
衄家不可攻其表汗出必額上促急而緊直視
不能眴不得眠
亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振
汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹
餘糧圓
病人有寒復發其汗胃中冷必吐蚘
本發汗而復下之爲逆先發汗者治不爲逆本
先下之而反汗之爲逆先下之者治不爲逆
傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急
當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏宜
四逆湯救表宜桂枝湯

病發熱頭痛脉反沉若不瘥身體更疼痛當救
其裏宜四逆湯

太陽病先下之而不愈因復發其汗表裏俱虛
其人因致胃家當汗出自愈所以然者汗出
表和故也裏未和然後復下之

太陽病未解脉陰陽俱停必先振汗而解但陽
微者先汗之而解陰微者先下之而解汗之宜
桂枝湯下之宜承氣湯

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於
脇下正邪分爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲
食飲藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也
小柴胡湯主之

服柴胡湯已渴者此爲屬陽明以法治之

得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足温醫二三
下之不能食其人脇下滿痛面目及身黄頸項
强小便難與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔

柴胡湯不復中與也食穀者噦
中風五六日傷寒往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不
欲飲食心煩喜嘔或胃中煩而不嘔或渴或腹
中痛或脅下痞堅或心中悸小便不利或不渴
外有微熱或欬小柴胡湯主之
傷寒四五日身熱惡風頸項强脅下滿手足温
而渴小柴胡湯主之
傷寒陽脉澁陰脉弦法當腹中急痛先與小建
中湯不差卽與小柴胡湯主之
傷寒中風有小柴胡證但見一證便是不必悉
具
凡柴胡湯證而下之柴胡證不罷者復與柴胡
湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解
傷寒二三日心中悸而煩小建中湯主之
太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴
胡證仍在先與小柴胡湯嘔止小安其人鬱鬱

微煩者爲未解與大柴胡湯下之愈
傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡發潮熱而
微利此本柴胡證下之不得利今反利者知醫
以圓藥下之非其治也潮熱者實也先再服小
柴胡湯解其外後以柴胡加芒硝湯主之
傷寒十三日過經而讝語內有熱也當以湯下
之小便利者大便當堅而反下利其脉調和者
知醫以圓藥下之非其治也自利者其脉當微

厥今反和者此爲內實也調胃承氣湯主之
太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者
即愈其外不解尚未可攻當先解其外外解小
腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯
傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讝語一
身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯主之
傷寒腹滿而讝語寸口脉浮而緊者此爲肝乘
脾名曰縱當刺期門

傷寒發熱嗇嗇惡寒其人大渴欲飲酢漿者其腹必滿而自汗出小便利其病欲解此爲肝乘肺名曰橫當刺期門

太陽病二日而反燒厓熨其背而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必當讝語十餘日振而反汗出者此爲欲解也其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便堅者小便當數而反不數及不多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛卽欲劒陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讝語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽驚狂臥起不安

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

傷寒其脉不弦緊而弱者必渴被火必讝語弱者發熱脉浮解之當汗出愈

太陽病以火熏之不得汗者其人必燥到經不解必清血名火邪

脉浮熱盛而灸之此為實實以虛治因火而動咽燥必吐血

微數之脉慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脉浮當以汗解而反灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺此為火逆

欲自解者必當先煩乃有汗隨汗而解何以知之脉浮故知汗出而解

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發貴脉氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝

加桂湯
火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣
湯主之
太陽傷寒加温鍼必驚
太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒而
發熱關上脉細而數此醫吐之故也一日二日
吐之者腹中饑口不能食三日四日吐之者不
喜糜粥欲食冷食朝食夕吐以醫吐之所致也

此爲小逆
太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不
欲近衣此爲吐之內煩也
病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者以醫
發其汗陽氣微膈氣虛脉則爲數數爲客熱不
能消穀胃中虛冷故吐也
太陽病過經十餘日心下嗢嗢欲吐而又胸中
痛大便反溏其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐

下者與調胃承氣湯不爾者不可與反欲嘔胸中痛微溏此非湯證以嘔故知極吐下也

太陽病七八日表證仍在其脉微沉反不結胸其人發狂此熱在下焦少腹當堅而滿小便自利者下血乃愈所以然者太陽隨經瘀熱在裏故也

太陽病身黃其脉沉結少腹堅小便不利爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當圓

太陽病小便利者爲多飲水心下必悸小便少者必苦裏急也

金匱玉函經卷第二 終

金匱玉函經卷第二

中痛微與此非[illegible]故知在下也

太陽病七八日來[illegible]在其脈微沉反不[illegible]

其人發在此熱在下[illegible]少腹[illegible]

者必苦裏急也[illegible]

太陽病小便利者為多飲水心下必悸小便少

者血也當下之不可餘藥宜抵當圓

傷寒有熱而少腹滿痛小便不利今反利者為

金匱玉函經

三四

金匱玉函經卷第三

辨太陽病形證治下第四

問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛其脉寸口浮關上自沉爲結胸

問曰何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時小便不利陽脉浮關上細沉而緊爲藏結舌上白胎滑者爲難治

藏結者無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其

人反靜舌上胎滑者不可攻也

夫病發於陽而反下之熱入因作結胸發于陰而反下之因作痞結胸者下之早故令結胸

結胸者其項亦强如柔痙狀下之卽和宜大陷胸圓

結胸證其脉浮大不可下下之卽死

結胸證悉具而躁者死

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者其表未解也醫反下之動數變遲頭痛則眩胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊憹陽氣內陷心下因堅則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出其餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃

傷寒六七日結胸熱實其脉浮緊心下痛按之如石堅大陷胸湯主之

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱當與大柴
胡湯但結胸無大熱此爲水結在胸脇頭微汗
出大陷胸湯主之
太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌
上燥而渴日晡小有潮熱從心下至少腹堅滿
而痛不可近大陷胸湯主之
小結胸者正在心下按之卽痛其脉浮滑小陷
胸湯主之

太陽病一二三日不能臥但欲起者心下必結其
脉微弱者此本寒也而反下之利止者必結胸
未止者四五日復重下之此挾熱利也
太陽病下之其脉促不結胸者此爲欲解其脉
浮者必結胸其脉緊者必咽痛其脉弦者必兩
脅拘急其脉細而數者頭痛未止其脉沉而緊
者必欲嘔其脉沉而滑者挾熱利其脉浮而滑
者必下血

病在陽當以汗解而反以水潠之若灌之其熱
被劫不得去益煩皮上粟起意欲飲水反不渴
服文蛤散若不差與五苓散若寒實結胸無熱
證者與三物小白散

太陽與少陽併病頭項强痛或眩時如結胸心
下痞而堅當刺大椎第一間肺俞肝俞愼不可
發汗發汗卽譫語譫語則脉弦譫語五六日不
止當刺期門

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱
除而脉遲身凉胸脅下滿如結胸狀其人譫語
此爲熱入血室當刺期門隨其虛實而取之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適
斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發
作有時小柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語
如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二

焦必當自愈

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此爲未解也柴胡桂枝乾姜湯主之

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便堅其脉細此爲陽微結必有表復有裏沉亦爲病在裏汗出爲陽微假令純陰結不得有外證悉入在于裏此爲半在外半在裏脉雖沉緊不得爲少陰所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖以下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下

滿而堅痛者此爲結胸大陷胸湯主之若但滿而不痛者此爲痞柴胡不復中與也半夏瀉心湯主之

太陽少陽併病而反下之結胸心下堅利復不止水漿不肯下其人必心煩

脉浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人漐漐

汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引脅下痛嘔

卽短氣此爲表解裏未和十棗湯主之

太陽病醫發其汗遂發熱惡寒復下之則心下痞表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸煩面色青黃膚瞤如此者爲難治今色微黃手足溫者易愈

心下痞按之濡其脉關上自浮大黃黃連瀉心湯主之

君心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之
本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴
而口燥煩小便不利者五苓散主之一方云忍
之一日乃愈
傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噫食
臭脅下有水氣腹中雷鳴而利生姜瀉心湯主
之
傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不
化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩不得安
醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非
結熱但胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心
湯主之
傷寒服湯藥下利不止心下痞堅服瀉心湯已
復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚
理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯
主之若不止者當利其小便

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞
堅脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而
成痿
傷寒汗出若吐若下解後心下痞堅噫氣不除
者旋覆代赭石湯主之
太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止
心下痞堅表裏不解者桂枝人參湯主之
大下以後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大
熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯
傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解
也不可攻痞當先解表解乃可攻其痞解表宜
桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯
傷寒發熱汗出不解心下痞堅嘔吐下利者大
柴胡湯主之
病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞
堅氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也當吐
金匱玉函經　卷三　九

之宜瓜蒂散

病者若脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰
俠陰筋者此爲藏結死

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏
俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數
升者白虎加人參湯主之

傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎
湯渴欲飲水無表證者白虎湯主之

凡用白虎湯立夏後至立秋前得用之立秋後
不可服也

春三月病常苦裏冷白虎湯亦不可與與之則
嘔利而腹痛

諸亡血虛家亦不可與白虎湯得之腹痛而利
者急當温之

太陽與少陽併病心下痞堅頭項强而眩當刺
大椎第一間肺俞肝俞愼勿下之

傷寒無大熱口燥渴而煩其背微惡寒者白虎加人參湯主之

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐黃連湯主之

傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者桂枝附子湯主之若

其人大便堅小便自利者去桂加白朮茯苓湯主之

風溼相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫甘草附子湯主之

傷寒脉浮滑而表熱裏寒者白通湯主之舊云白通湯一云白虎者恐非舊云以下出叔和

傷寒脉結代心中驚悸炙甘草湯主之

辨陽明病形證治第五

陽明之為病胃家實是也

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有微陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約一作脾結是也正陽陽明者胃家實是也微陽陽明者發其汗若利其小便胃中燥大便難是也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發其汗若下之亡其津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者為陽明病也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗出而不惡寒但反惡熱也

問曰病有得之一日不惡熱而惡寒者云何答曰然雖一日惡寒自罷即汗出惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬

陽明也

病發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然是爲轉屬陽明

傷寒脉浮而緩手足自溫是爲繫在太陰太陰身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日便堅爲屬陽明

傷寒轉繫陽明者其人濈濈然微汗出也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮緊若下之則腹滿小便難也

陽明病能食爲中風不能食爲中寒

陽明病中寒不能食而小便不利手足濈然汗出此欲作堅瘕必大便初堅後溏所以然者胃中冷水穀不別故也

陽明病初欲食食之小便反不數大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解此爲水不勝穀氣與汗共併脉緊卽愈

陽明病欲解時從申盡戌
陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也其人本虛故攻其熱必噦
陽明病脉遲食難用飽飽即發煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也
陽明病久久而堅者陽明當多汗而反無汗其身如蟲行皮中之狀此以久虛故也

各陽明病反無汗而但小便二三日嘔而欬手足若厥者其人頭必痛若不嘔不欬手足不厥者其頭不痛
各陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛若不欬者其咽不痛
陽明病脉浮而緊其熱必潮發作有時但浮者必盜汗出
陽明病無汗小便不利心中懊憹者必發黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃
陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者必劒
陽明病本自汗出醫復重發汗病已瘥其人微
煩不了了者此大便堅也以亡精液胃中燥故
令其堅當問其小便日幾行若本日三四行今
日再行者知必大便不久出今爲小便數少津
液當還入胃中故知必當大便也
夫病陽多者熱下之則堅汗出多極發其汗亦
堅
傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之
陽明病心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者
死止者愈
陽明病面合赤色不可攻之攻之必發熱色黃
小便不利也
陽明病不吐下而煩者可與調胃承氣湯
陽明病其脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短

氣腹滿而喘有潮熱如此者其外為欲解可攻
其裏也手足濈然汗出此為已堅大承氣湯主
之若汗出多微發熱惡寒者外為未解其熱不
潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承
氣湯微和其胃氣勿令至大下
陽明病潮熱大便微堅者可與大承氣湯不堅
者勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之
法可與小承氣湯湯入腹中轉矢氣者為有燥
屎乃可攻之若不轉矢氣者此但頭堅後溏不
可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水
即噦其後發潮熱必復堅而少也以小承氣湯
和之若不轉矢氣者慎不可攻也
夫實則讝語虛則鄭聲鄭聲重語是也
直視讝語喘滿者死若下利者亦死
發汗多重發其汗若已下復發其汗亡其陽讝
語脈短者死脈自和者不死

傷寒吐下後不解不大便五六日上至十餘日日晡時發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摄空怀惕不安微喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱讝語者大承氣湯主之若一服利止後服

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必堅堅則讝語小承氣湯主之一服讝語止莫復服

陽明病讝語發潮熱其脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉矢氣者復與一升若不轉矢氣勿更與之明日不大便脉反微濇者裏虛也爲難治不可更與承氣湯也

陽明病讝語有潮熱而反不能食者必有燥屎五六枚也若能食者但堅耳大承氣湯主之

陽明病下血讝語者此爲熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之卽愈宜大承氣湯

陽明病其脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重發其汗卽躁心憒憒反讝語加溫鍼必怵惕煩躁不得眠下之卽胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎湯主之若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之

汗出讝語者以有燥屎在胃中此爲風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈宜大承氣湯

傷寒四五日脉沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則讝語

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺溺發汗則讝語甚下之則額上生汗手足厥冷若自汗出者白虎湯主之

陽明病汗出多而渴者不可與豬苓湯以汗多
胃中燥豬苓湯復利其小便故也
脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之
若胃中虛冷其人不能食飲水即噦
脉浮發熱口乾鼻燥能食者即衄
陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊
憹饑不能食但頭汗出梔子豉湯主之
陽明病發潮熱大便溏小便自可而胸脅滿不

去者小柴胡湯主之
陽明病發潮熱下堅滿不大便而嘔舌上白胎者可
與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身
濈然汗出而解
陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心
痛久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜臥一身
及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫
刺之小差其外不解病過十日脉續浮者與小

敬長按
密疑當
作蜜

柴胡湯但浮無餘證者與麻黃湯不溺腹滿加喘者不治

陽明病自汗出若發其汗小便自利此爲津液內竭雖堅不可攻之當須自欲大便宜密煎導而通之若土瓜根豬膽汁皆可爲導

陽明病其脉遲汗出多而微惡寒者表爲未解可發其汗宜桂枝湯

陽明病脉浮無汗其人必喘發其汗卽愈宜麻黃湯主之

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗齊頸而還小便不利渴引水漿此爲瘀熱在裏身必發黃茵蔯湯主之

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖堅大便反易其色必黑抵當湯主之

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可

攻其人腹微滿頭堅後溏者不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

病者五六日不大便繞臍痛躁煩發作有時此爲有燥屎故使不大便也

病人煩熱汗出卽解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者當下之脉浮虛者當發汗下之宜大承氣湯發汗宜桂枝湯

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎所以然者本有宿食故也大承氣湯主之

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎故也大承氣湯主之

食穀欲嘔者屬陽明吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦

太陽病寸緩關小浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也若不下其人復不惡寒而渴者爲轉屬陽明小便數者大

便卽堅不更衣十日無所苦也渴欲飲水者少
少與之但以法救之渴者宜五苓散
脉陽微而汗出少者爲自和汗出多者爲太過
陽脉實因發其汗出多者亦爲太過太過者陽
絕於內亡津液大便因堅
脉浮而芤浮則爲陽芤則爲陰浮芤相搏胃氣
生熟其陽則絕
趺陽脉浮而澁浮則胃氣强澁則小便數浮澁

相搏大便則堅其脾爲約麻子仁圓主之
太陽病三日發其汗不解蒸蒸然發熱者屬胃
也調胃承氣湯主之
傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯
太陽病吐下發汗後微煩小便數大便堅可與
小承氣湯和之愈
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下堅
至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之

令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但頭堅後溏未定成堅攻之必溏須小便利屎定堅乃可攻之宜大承氣湯

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲實急下之宜大承氣湯

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

傷寒腹滿按之不痛者爲虛痛者爲實當下之宜大承氣湯

舌黃未下者下之黃自去宜大承氣湯

陽明與少陽合病必下利其脉不負者爲順負者爲失互相尅賊名爲負若滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數者可下之假令下已脉數不解合熱則消穀善饑至六

七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脉數不解而下不止必挾熱便膿血

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利少腹微滿茵蔯蒿湯主之

傷寒身黃發熱梔子檗皮湯主之

傷寒瘧熱在裏身必發黃宜麻黃連軺赤小豆湯主之

傷寒發其汗已身目爲黃所以然者以寒溼相搏在裏不解故也以爲非瘧熱而不可下當于寒溼中求之

辨少陽病形證治第六

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而煩不可吐下吐下卽悸而驚

傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和卽愈胃不和則煩

而悸
太陽病不解轉入少陽者脅下堅滿乾嘔不能
食飲往來寒熱尚未吐下其脉沉緊與小柴胡
湯若已吐下發汗溫鍼讝語柴胡證罷此爲壞
病知犯何逆以法治之
三陽合病脉浮大上關上但欲寐目合則汗
傷寒六七日無大熱其人躁煩此爲陽去入陰
也

傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食
而不嘔此爲三陰不受邪也
少陽病欲解時從寅盡辰

金匱玉函經卷第三 終

金匱玉函經卷第四

辨太陰病形證治第七

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下痞堅

太陰病脉浮者可發其汗宜桂枝湯

太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者爲欲愈

太陰病欲解時從亥盡丑

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之

宜四逆輩

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止所以然者此脾家實腐穢當去也

太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

太陰爲病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之其人胃氣弱易動故也下利先煎芍藥三沸

辨少陰病形證治第八

少陰之爲病脉微細但欲寐

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若其人小便色白者爲少陰病形悉具所以然者以下焦虛有寒不能制溲故白也

病人脉陰陽俱緊而反汗出爲亡陽此屬少陰
法當咽痛而復吐利
少陰病汗而下利讝語者被火氣劫故也小便
必難爲强責少陰汗也
少陰病脉細沉數病爲在裏不可發其汗
少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺中
弱澁者復不可下之
少陰病脉緊至七八日自下利其脉暴微手足
反溫脉緊去此爲欲解雖煩下利必自愈
少陰病下利若利自止惡寒而蹈手足温者可
治
少陰病惡寒而蹈時自煩欲去衣被者可治
少陰中風脉陽微陰浮爲欲愈
少陰病欲解時從子盡寅
少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱
必便血也

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯

少陰病但厥無汗而强發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治

少陰病惡寒身蹎而利手足逆冷者不治

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

少陰病吐利煩躁四逆者死

少陰病四逆惡寒而身蹎脈不至不煩而躁者死

少陰病六七日息高者死

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐五六日自利復煩躁不得臥寐者死

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗

以二三日無裏證故微發汗
少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連
阿膠湯主之
少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸
之附子湯主之
少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉一作微者附
子湯主之
少陰病下利便膿血桃花湯主之

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利
不止而便膿血桃花湯主之
少陰病下利便膿血者可刺
少陰病吐利而手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸
湯主之
少陰病下利咽痛胸滿心煩豬膚湯主之
少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與
桔梗湯

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

少陰病下利白通湯主之

少陰病下利脈微服白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛而利此爲有水氣其人或欬或小便自利或下利或嘔者眞武湯主之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止而脈不出通脈四逆湯主之

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者

豬苓湯主之

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

少陰病下利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

少陰病脉沉者急温之宜四逆湯

少陰病飲食入口即吐心下嗢嗢欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐急温之宜四逆湯

少陰病下利脉微澁嘔而汗出必數更衣反少者當温其上灸之 脉經云灸厥陰五十壯

辨厥陰病形證治第九

厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱饑不欲

食甚者食則吐蚘下之不肯止

厥陰中風其脉微浮爲欲愈不浮爲未愈

厥陰病欲解時從丑盡卯

厥陰病渴欲飲水者少少與之卽愈

辨厥利嘔噦病形證治第十

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當

不能食今反能食恐爲除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脉之而數其熱不罷此爲熱氣有餘必發癰膿

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲爲寒而與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此爲除中必死

傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中

痛者其喉爲痺發熱無汗而利必自止不止者必便膿血便膿血者其喉不痺

傷寒一二日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發其汗必口傷爛赤

凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲藏厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘今病者靜而復時煩此爲藏寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥者烏梅圓主之

傷寒熱少厥微指頭寒嘿嘿不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病爲愈若

厥而嘔胃脘煩滿者其後必便血
病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者
此冷結在胞胱關元也
傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多
其病當愈四日至七日熱不除必清膿血
傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒
多熱少陽氣退故爲進
傷寒六七日其脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥
不還者死
傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死
傷寒六七日不便利忽發熱而利其人汗出不
止者死有陰無陽故也
傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下
此爲亡血下之死
傷寒發熱而厥七日下利者爲難治
傷寒脉促手足厥逆者可灸之

傷寒脉滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

手足厥寒脉爲之細絕當歸四逆湯主之若其人内有久寒當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

大汗出熱不去内拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

太汗出若大下利而厥冷者四逆湯主之

表熱裏寒者脉雖沉而遲手足微厥下利清穀此裏寒也所以陰證亦有發熱者此表熱也

表寒裏熱者脉必滑身厥舌乾也所以少陰惡寒而倦此表寒也時時自煩不欲厚衣此裏熱也

病者手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散

傷寒厥而心下悸者宜先治水當與茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

傷寒六七日大下後寸脉沉遲手足厥逆下部

故長按倘疑當作蹟

脉不至咽喉不利唾膿血洩利不止者爲難治
麻黃升麻湯主之
傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者爲欲
自利也
傷寒本自寒下醫復吐之寒格更逆吐下食入
即出者乾薑黃芩黃連湯主之
下利有微熱而渴脉弱者自愈
下利脉數有微熱汗出者自愈設復緊爲未解
下利手足厥冷無脉者灸之不温而脉不還反
微喘者死
少陰負趺陽者爲順也
下利寸脉反浮數尺中自澁者必清膿血
下利清穀不可攻其表汗出必脹滿
下利脉沉弦者下重脉大者爲未止脉微弱數
者爲欲自止雖發熱不死
下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清

穀必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利脉反數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也

下利後其脉絕手足厥晞時脉還手足温者生不還不温者死

傷寒下利日十餘行脉反實者死

下利清穀裏寒外熱汗出而厥通脉四逆湯主之

熱利下重白頭翁湯主之

下利腹脹滿身體疼痛先温其裏乃攻其表温裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

下利欲飲水爲有熱也白頭翁湯主之

下利讝語者有燥屎也宜小承氣湯

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也梔子豉湯主之

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

嘔而發熱者小柴胡湯主之

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

乾嘔吐涎沫而復頭痛吳茱萸湯主之

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

傷寒噦而腹滿問其前後知何部不利利之即愈

辨霍亂病形證治第十一

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

問曰病發熱頭痛身疼惡寒不復吐利當屬何病答曰當為霍亂吐下利止復更發熱也

傷寒其脉微澁本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰當利本素嘔下利者不治若

其人似欲大便但反失氣而仍不利是爲屬陽
明便必堅十三日愈所以然者經盡故也
下利後便當堅堅則能食者愈今反不能食到
後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈
若不愈不屬陽明也
惡寒脉微而復利利止亡血也四逆加人參湯
主之
霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水五苓散主
之寒多不用水者理中湯主之
吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂
枝湯小和之
吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四
逆湯主之
既吐且利小便復利而大汗出下利清穀裏寒
外熱脉微欲絕者四逆湯主之
吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕

者逼脉四逆加豬膽汁湯主之

辨陰陽易差後勞復病形證治第十二

傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花眼胞赤膝脛拘急燒裩散主之

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者以汗解之脉沉實者以下解之

大病差後從腰以下有水氣牡蠣澤瀉散主之

大病差後其人喜唾久不了了者胃上有寒當温之宜理中圓

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之

傷寒脉已解而日暮微煩者以病新差人强與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀即愈

吐下發汗後其人脉平而小煩者此新虛不勝
穀氣故也
病後勞復發熱者麥門冬湯主之

金匱玉函經卷第四 終

金匱玉函經

六五

金匱玉函經卷第五

漢仲景張機著　上海陳世傑懷三重校
晉王叔和撰次　門人張邵煥有文叅
宋林億等校正　平江余謙牧心恭重校
門人張嵩峻天閱

辨不可發汗病形證治第十三

夫以爲疾病至急倉猝尋按要者難得故重集諸可與不可方治比之三陰三陽篇中此易見

也又時有不止是三陰二陽出在諸可與不可
中也
少陰病脉細沉數病爲在裏不可發其汗
脉浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中
脉遲者不可發其汗何以故此爲榮氣不足血
氣微少故也
少陰病脉微不可發其汗亡陽故也
脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上澁反
在下微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風
汗出而反躁煩澁則無血厥而且寒陽微發汗
躁不得眠
動氣在右不可發汗發汗則劒而渴心苦煩飲
卽吐水
動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕
肉瞤
動氣在上不可發汗發汗發汗則氣上衝心

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨
節苦疼目運惡寒食則反吐穀不得前一云穀不消化
咽中閉塞不可發汗發汗則小便反難
逆冷雖欲跪臥不能自温
諸脉數動微弱並不可發汗發汗則小便反難
胞中反乾胃燥而煩其形相象根本異源
脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反
在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虚意欲得温

微弦爲虚不可發汗發汗則寒慄不能自還
欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中
飢煩晬時而發其形似瘧有寒無熱虚而寒慄
欬而發汗跪而苦滿腹中復堅
厥而脉緊不可發汗發汗則聲亂咽噤舌萎其
聲不能出
諸逆發汗微者難愈劇者言亂睛眩者死命將
難治

太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多
寒少其人不嘔清便續自可一日再三發其脉
微而惡寒者此爲陰陽俱虛不可復發其汗
太陽病發熱惡寒寒多熱少脉微弱則無陽也
不可復發其汗
咽喉乾燥者不可發其汗
亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振
衄家不可攻其表汗出則額陷脉上促急而緊
直視而不能眴不得眠
汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼可與
禹餘糧圓
淋家不可發汗發汗必便血
瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則痙
冬温發其汗必吐利口中爛生瘡
下利清穀不可攻其表汗出必脹滿
欬而小便利若失小便者不可攻其表汗出則

厥逆冷

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深熱亦深厥微熱亦微熱應下之而發其汗者必口傷爛赤

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出又自嘔者下之益煩懊憹如飢發汗即致痙身强難以屈伸熏之即發黃不得小便灸即發欬唾

傷寒其脉弦細頭痛發熱此爲屬少陽少陽不可發其汗

中風往來寒熱傷寒五六日已後胸脇苦滿嘿嘿不欲食飲煩心喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞堅或心中悸小便不利或不渴外有微熱或欬屬小柴胡湯證

傷寒四五日身體熱惡風頸項强脇下滿手足溫而渴屬小柴胡湯

傷寒六七日發熱微惡風支節煩疼微嘔心下

支結外證未去者屬柴胡桂枝湯證

太陽病發其汗因致痙

太陽與少陽併病頭項强痛或眩時如結胸心下痞而堅不可發其汗

少陰病欬而下利讝語是爲被火氣劫故也小便必難以强責少陰汗也

少陰病但厥無汗而强發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從耳目出是爲下厥上竭爲難治

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脉異經病雖俱傷于風其人自有固疾則不得同法其人素傷風因復傷于熱風熱相薄則發風温四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出譫語獨語內煩燥擾不得臥善驚目亂無精治之復發其汗如此者醫殺之也

傷寒溼温其人常傷于溼因而中暍溼熱相薄

故長按燥疑當作躁

則發溼温病若兩脛逆冷腹滿又胸頭目痛苦
妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳
聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此者
醫殺之也

辨可發汗病形證治第十四

凡發汗欲令手足俱周漐漐然一時間許益佳
不可令如水流漓若病不解當重發汗汗多必
亡陽陽虛不得重發汗也

凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也
凡云可發汗無湯者圓散亦可要以汗出爲解
然不如湯隨證良驗
大法春夏宜發汗
太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝
湯
太陽病脉浮而數者可發汗宜桂枝湯一云麻
黄湯
金匱玉函經

陽明病其脉遲汗出多而微惡寒表爲未解可發其汗宜桂枝湯

夫病脉浮大問病者言但堅耳設利者爲虛大逆堅爲實汗出而解何以故脉浮當以汗解傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脉浮解之當汗出愈

病者煩熱汗出則解復如瘧狀日晡發熱者屬陽明脉浮虛者當發其汗宜桂枝湯

病常自汗出此爲營氣與衛氣不和也營行脉中爲陰主內衛行脉外爲陽主外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出不愈此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷營營衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血必自下下

者卽愈其外未解尙未可攻當先解其外宜桂
枝湯
太陽病下之微喘者表未解故也宜麻黃湯又
云桂枝加厚朴杏子湯
傷寒脉浮緊不發其汗因衄宜麻黃湯
陽明病脉浮無汗其人必喘發其汗卽愈宜麻
黃湯
太陽病脉浮者可發其汗宜桂枝湯

太陽脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不
解其表候續在此當發其汗服湯藥微除發煩
目眩劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也
宜麻黃湯
傷寒不大便六七日頭痛有熱者不可與承氣
湯其小便清者此爲不在裏仍在表也當發其
汗頭痛者必衄宜桂枝湯
下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表宜

桂枝湯
下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯
太陽病頭痛發熱汗出惡風屬桂枝湯證
太陽中風脉陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔屬桂枝湯
太陽病發熱汗出此爲營弱衛强故使汗出欲救邪風屬桂枝湯證
太陽病下之其氣上撞屬桂枝湯證
太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府乃與桂枝湯則愈
燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發賁豚氣從小腹上撞心者灸其核上各一壯却與桂枝加桂湯
太陽病項背强几几反汗出惡風者屬桂枝加

葛根湯

太陽病項背强几几無汗惡風屬葛根湯

太陽與陽明合病而自利屬葛根湯證不利但

嘔者屬葛根加半夏湯證

太陽病桂枝證而反下之遂利不止其脉促表

未解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯證

太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風

無汗而喘屬麻黃湯證

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下也屬麻

黃湯證

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出

而煩躁頭痛屬大青龍湯證脉微弱汗出惡風

不可服之服之則厥筋惕肉瞤此爲逆也

陽明中風脉弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛

久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜臥一身及

目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之

小差其外不解病過十日脉續浮與柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不溺腹滿加噦者不治

太陽病十日已去其脉浮細嗜臥此爲外解設

胸滿脇痛與小柴胡湯脉浮麻黃湯

傷寒脉浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰

證者可與大青龍湯發之

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已

而渴者此爲寒去爲欲解屬小青龍湯證

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗

脉浮小便不利微熱消渴可與五苓散利小便

發汗

辨不可吐病形證治第十五

太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒發

熱關上脉細而數者此醫吐之故也若得病一

日二日吐之者腹中飢口不能食三日四日吐

之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐此醫吐之

所致也此爲小逆
太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不
欲近衣此爲吐之內煩也
少陰病其人飲食入口即吐心中嘔嘔欲吐復
不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不
可下也若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當温之
諸四逆厥者不可吐之虛家亦然
辨可吐病形證治第十六
凡服湯吐中病便止不必盡劑也
大法春宜吐
病如桂枝證其頭不痛項不强寸口脉微浮胸
中痞堅氣上撞咽喉不得息此爲胸有寒當吐
之
病胷上諸實胸中欝欝而痛不能食欲使人按
之而反有涎沫唾下利日十餘行其脉反遲寸
口微滑此可吐之吐之利則止

少陰病其人飲食入則吐心中喘喘欲吐復不
能吐當遂吐之
宿食在上脘當吐之
病者手足逆冷脉乍緊邪結在胸中心下滿而
煩飢不能食病在胸中當吐之
辨不可下病形證治第十七
脉濡而弱濡反在關弱反在巔微反在上澁反
在下微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風

汗出而反躁煩澁則無血厥而且寒陽微不可
下下之則心下痞堅
動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾
頭眩心悸
動氣在左不可下下之則腹裏拘急食不下動
氣反劇身雖有熱臥反欲蹉
動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷
熱汗自泄欲水自灌

動氣在下不可下下之則腹滿卒起頭眩食則
下清穀心下痞堅
咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下
臥則欲踡身體急痛復下利日數十行
諸外實者不可下下之則發微熱亡脉則厥當
臍握熱
諸虛者不可下下之則渴引水者易愈惡水者
劇

脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反
在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫
微弦爲虛虛者不可下微則爲欬欬則吐涎沫
下之欬則止而利不休胸中如蟲齧粥入則出
小便不利兩脇拘急喘息爲難脛背相牽臂則
不仁極寒反汗出軀冷若氷眼睛不慧語言不
休穀氣多入則爲除中口雖欲言舌不得前
脉濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反

在下浮則爲陽虛數則爲無血浮則爲虛數則
生熱浮則爲虛自汗而惡寒數則爲痛振而寒
慄微弱在關心下爲急喘汗不得呼吸呼吸之
中痛在於脇振寒相搏其形如瘧醫反下之令
脉急數發熱狂走見鬼心下爲痞小便淋滴小
腹甚堅小便血也

脉濡而緊濡則陽氣微緊則營中寒陽微衛中
風發熱而惡寒營緊胃氣冷微嘔心內煩醫以
爲大熱解肌發其汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅
表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵怏不
得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施汲
水灌其身客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆
之汗出而冒巔體惕而又振小便爲微難寒氣
因水發清穀不容間嘔吐反腸出顛倒不得安
手足爲微逆身冷而內煩遲欲從後救安可復
追還

脉浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤陽獨下陰部小便難胞中虛冷反小便利而大血盡乾煩不得眠血薄肉消而成暴液醫復以毒藥攻其胃此爲重虛客陽去有期必下如汚泥而死

趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也

營衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便堅氣噫而除何以言之脾脉本緩今數脉動脾其數先微故知脾氣不治大便堅氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如法病者則飢數脉不時則生惡瘡也

脉數者久數不止則邪結血氣不能復正氣却結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脉數者不

可下下之必煩利不止
少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱澁者復不可下之
脉浮大宜發汗醫反下之此爲大逆
脉浮而大心下反堅有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令溲數溲數則大便堅汗多卽熱愈汗少則便難脉遲尚未可攻
二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明欲自汗不惡寒若太陽證不罷不可下下之爲逆
結胷證其脉浮大不可下下之卽死
太陽與陽明合病喘而胸滿不可下下之卽死
太陽與少陽合病心下痞堅頭項强而眩勿下之
諸四逆厥者不可下之虛家亦然
病欲吐者不可下之
金匱玉函經　卷五　十四

太陽病有外證未解不可下下之爲逆
夫病發于陽而反下之熱入因作結胸發于陰
而反下之因作痞
脉浮緊而下之緊反入裏則作痞
夫病陽多者熱下之則堅
本虛攻其熱必噦
無陽陰强而堅下之必清穀而腹滿
太陰之爲病腹滿而吐食不下下之益甚腹時
自痛胸下痞堅
厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼痛熱飢而
不欲食甚者則欲吐下之不肯止
少陰病其人飲食入則吐心中嗢嗢欲吐復不
能吐始得之手足寒脉遲此胸中實不可下之
傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下
下之亡血死
傷寒發熱但頭痛微汗出發其汗則不識人熏

之則喘不得小便心腹滿下之短氣而腹脹小便難頭痛背强加溫針則必衄

傷寒其脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者脉初來大漸漸小更來漸大是其候也惡寒甚者翕翕出喉中痛熱多者目赤睛不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多清穀熱多便膿血熏之則發黃熨之則咽燥小便利者可救難者危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制貪水者必嘔惡水者厥下之咽中生瘡假令手足溫者下重便膿血頭痛目黃者下之目閉貪水者下之其脉必厥其聲嚶咽喉塞發其汗則戰慄陰陽俱虛惡水者下之裏冷不嗜食大便完穀出發其汗口中傷舌上胎滑煩躁脉數實不大便六七日後必便血發其汗小便即自利得病六七日後小便少者雖不大便但頭堅後溏

未必其成堅攻之必溏當須小便利定堅乃可攻之

藏結者無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉矢氣者爲有燥屎乃可攻之若不轉矢氣者此爲但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不能食欲飲水者必噦其後發熱者必復堅以小承氣湯和之若不轉矢氣者愼不可攻之

陽明病面合赤色者不可攻之必發熱色黃者小便不利也

陽明病當心下堅滿不可攻之攻之利遂不止者死止者生

陽明病自汗出若發其汗小便自利此爲津液內竭雖堅不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩不能得安醫見心下痞爲病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使之堅屬甘草瀉心湯證

下利其脉浮大此爲虛以强下之故也設脉浮革因爾腸鳴屬當歸四逆湯證

辨可下病形證治第十八

凡服下藥用湯勝圓中病卽止不必盡劑

大法秋宜下（一云大柴胡湯）

陽明病發熱汗多者急下之宜承氣湯

少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯

少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯

少陰病下利清水色青者心下必痛口乾燥者可下之宜大柴胡湯承氣湯

下利三部脉皆平（一云浮）按其心下堅者可下之宜承氣湯

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜承氣湯

陽明與少陽合病而利不負者爲順負者失也亦相賊爲負

脉滑而數者有宿食也當下之宜大柴胡湯承氣湯

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮大按之反澁尺中亦微而澁故知有宿食當下之宜承氣湯

下利不欲食者有宿食也當下之宜承氣湯

下利已瘥至其年月日時復發者此爲病不盡故也復當下之宜承氣湯

下利脉反滑當有所去下之乃愈宜承氣湯

病腹中滿痛者爲實當下之宜大柴胡湯

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡湯承氣湯

傷寒後脉沉實沉實者下之解宜大柴胡湯

傷寒六七日目不了了睛不和無表裏證大便

難徵熱者此爲實急下之宜大柴胡湯承氣湯

太陽病未解其脉陰陽俱停必先振汗出而解但陽脉微者先汗之而解陰脉微者先下之而解宜承氣湯一云大柴胡湯

脉雙弦而遲心下堅脉大而堅者陽中有陰也可下之宜承氣湯

結胷者項亦强如柔痙狀下之卽和宜陷胸圓

病者無表裏證發熱七八日脉雖浮數可下之

宜大柴胡湯

太陽病六七日表證續在其脉微沉反不結胸其人發狂此熱在下焦小腹當堅而滿小便自利者下血乃愈所以然者太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

太陽病身黃其脉沉結小腹堅小便不利爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也屬抵當湯

傷寒有熱而小腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之宜抵當圓

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出其身無有齊頸而還小便不利渴飲水漿此爲瘀熱在裏身必發黃屬茵蔯蒿湯證

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖堅大便必黑屬抵當證

汗出而讝語者有燥屎在胃中此爲風也過經

乃可下之下之若早讝語而亂以表虛裏實故也下之則愈宜大柴胡湯承氣湯

病者煩熱得汗出卽解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽明脉實者當下之宜大柴胡湯承氣湯

陽明病讝語有潮熱而反不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳屬承氣湯

下利而讝語者爲有燥屎也屬承氣湯

得病二三日脉弱無太陽柴胡證而煩心下堅至四日雖能食以承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯一升不大便六七日小便少者雖不能食但頭堅後溏未定其成堅攻之必溏當須小便利定堅乃可攻之宜大柴胡湯承氣湯

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引脇下痛嘔卽短氣不惡寒此爲表解裏未和屬十棗湯證

太陽病不解熱結胸胷其人如狂血自下下者
即愈其外不解尚未可攻當先解其外外解小
腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯
傷寒七八日身黃如橘子色小便不利小腹微
滿屬茵蔯湯證
傷寒發熱汗出不解後心中痞堅嘔而利者屬
大柴胡湯證
傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱屬大柴胡
湯證但結胸無大熱此爲水結在胸脇頭微汗
出屬大陷胸湯證
傷寒六七日結胸熱實其脉沉緊心下痛按之
如石堅屬大陷胸湯證
陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅
堅者則讝語屬承氣湯證
陽明病不吐下而心煩者屬承氣湯證
陽明病脉遲雖汗出而不惡寒其體必重短

敬長按言疑當作若

氣腹滿而喘有潮熱如此者其外爲解可攻其裏若手足濈然汗出此大便已堅承氣湯主之其熱不潮腹大滿而不大便者屬小承氣湯微和其胃氣勿令至大下

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之言不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉矢氣者爲有燥屎乃可攻之

陽明病讝語妄言發潮熱其脉滑疾如此者承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉矢氣者復與一升如不轉矢氣者勿與之明日又不大便脉反微濇此爲裏虛爲難治不可復與承氣湯大下後六七日不大便煩不解腹滿痛此有燥屎所以然者本有宿食故也屬承氣湯證

病者小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不能臥有燥屎故也屬承氣湯證

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出

大便難而讝語者下之卽愈宜承氣湯

金匱玉函經卷第五 終

金匱玉函經卷第六

辨發汗吐下後病形證治第十九

發汗後水藥不得入口爲逆

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不卽欬者此必兩耳無所聞也所以然者重發汗虛故也

發汗後身熱又重發其汗胸中虛冷必反吐也

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不
徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證
不罷者不可下之下之爲逆如此者可小發其
汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之
熏之若發汗不大徹不足言陽氣怫鬱不得越
當汗而不汗其人燥煩不知痛處乍在腹中乍
在四肢按之不可得其人短氣但坐汗出而不
徹故也更發其汗即愈何以知其汗出不徹以
脉濇故知之
陽明病本自汗出醫復重發其汗病已瘥其人
微煩不了了此大便堅也以亡津液胃中燥故
令其堅當問小便日幾行若本日三兩行今日
再行者故知大便不久出今爲小便數少津液
當還入胃中故知必當大便也
大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治之
其小便利必自愈

病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者以醫發其汗陽氣微膈氣虛脉則爲數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故吐也

病者有寒復發其汗胃中冷必吐蚘

傷寒發其汗身目爲黃所以然者寒濕相搏在裏不解故也

發汗後重發其汗亡陽讝語其脉反和者不死

傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可復發汗宜桂枝湯

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻其痞當先解表表解乃可攻其痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃瀉心湯

發其汗反躁無表證者宜大柴胡湯

服桂枝湯大汗出若脉但洪大者與桂枝湯若其形如瘧狀一日再發汗出便解與桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出大煩渴不解若脉洪大屬白虎湯證

太陽病發其汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸屬桂枝加附子湯證

發汗不解腹滿痛者急下之宜承氣湯一云大柴胡湯

發汗後身體疼痛其脉沉遲屬桂枝加芍藥生薑人參湯證

太陽病發其汗而不解其人發熱心下悸頭眩身瞤而動振振欲僻地者屬玄武湯證

發汗後其人臍下悸欲作賁豚屬茯苓桂枝甘草大棗湯證

發汗過多以後其人叉手自冒心心下悸而欲得按之屬桂枝甘草湯證

發汗後腹脹滿屬厚朴生姜半夏甘草人參湯

發其汗不解而反惡寒者虛故也屬甘草附子

敬長按僻疑當作擗

湯證
不惡寒但熱者實也當和其胃氣屬小承氣湯
太陽病發汗後大汗出胃中乾燥煩不得眠其
人欲飲水當稍飲之令胃中和卽愈
太陽病三日發其汗不解蒸蒸發熱者屬調胃
承氣湯
傷寒脉浮自汗出小便數煩復微惡寒而脚攣
急反與桂枝湯欲攻其表得之便厥咽燥乾煩

敬長按解字下

吐逆作甘草乾薑湯以復其陽厥愈足溫更作
芍藥甘草湯與之其脚卽伸而胃氣不和讝語
可與承氣湯重發汗復加燒針者屬四逆湯
傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噫食
臭脇下有水氣腹中雷鳴而利屬生薑瀉心湯
傷寒五六日其人已發汗而復下之胸脇滿微
結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱而
煩此爲未解柴胡桂枝乾薑湯證

疑脫屬字

陽明病汗出若復發其汗小便自利此爲津液內竭雖堅不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者必自愈

傷寒大吐下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞胸起則頭眩其脉沉緊發汗卽動經身爲振搖屬茯苓桂枝白朮甘草湯證

發汗吐下以後不解煩躁屬茯苓四逆湯證

發汗吐下以後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹屬梔子湯若少氣梔子甘草湯若嘔者梔子生姜湯證

傷寒下後煩而腹滿臥起不安屬梔子厚朴湯

傷寒吐下發汗虛煩脉甚微八九日心下痞堅
脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成
痿

傷寒發汗吐下解後心下痞堅噫氣不除者屬
旋覆代赭湯證

太陽病吐下發汗後而微煩小便數大便因堅
可與小承氣湯和之則愈

太陽病不解轉入少陽脇下堅滿乾嘔不能食
往來寒熱尚未吐下其脉沉緊可與小柴胡湯
若已吐下發汗溫針柴胡湯證罷此爲壞病知
犯何逆以法治之

吐利發汗其人脉平而小煩此新虛不勝穀氣
故也

下已後發其汗必振寒又其脉微細所以然者
內外俱虛故也

金匱玉函經　卷六　七

發汗若下之煩熱胸中塞者屬梔子湯證

下以後復發其汗者則晝日煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴而無表證其脈沉微身無大熱屬附子乾薑湯證

大汗出若大下利厥者屬四逆湯證

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因冒冒家當汗出愈所以然者汗出表和故也表和故下之

太陽病先發汗不解而下之其脈浮不愈浮爲在外而反下之故不愈今脈浮故在外當解其外則愈宜桂枝湯

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者屬柴胡桂枝湯證

發汗多亡陽狂語者不可下可與柴胡桂枝湯和其營衛以通津液後自愈

太陽病醫發其汗遂發熱惡寒復下之則心下痞堅表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加

火針因而煩面色青黃膚瞤如此者爲難治今色微黃手足溫者易愈

夫病陽多熱下之則堅汗出多極發其汗亦堅太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹堅滿而痛不可近屬大陷胸湯證

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺溺發汗則讝語下之則額上生汗手足厥冷自汗屬白虎湯證

傷寒服湯藥而下利不止心下痞服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦與赤石脂禹餘糧湯若不止者當利其小便

傷寒醫以圓藥下之身熱不去微煩屬梔子乾姜湯證

傷寒中風柴胡湯證具而以他藥下之若柴胡

湯證不罷復與柴胡湯必蒸蒸而振却發汗出而解此雖已下不爲逆也若心下滿而堅痛者此爲結胸屬大陷胸湯證若但滿而不痛者此爲痞柴胡不復中與也屬半夏瀉心湯證

得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫再三下之不能多其人脇下滿面目及身黃頭項强小便難與柴胡湯後必下重渴飲水而嘔柴胡不復中與也食穀則噦

病者無表裏證發熱七八日脉雖浮數者可下之假令已下脉數不解而合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血屬抵當湯證若脉數不解而下不止必挾熱便膿血

脉浮數法當汗出而愈而下之則體重心悸者不可發其汗當自汗出而解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液和自汗出愈

陽明病其脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗

故長按據第三卷中文發字下疑脫熱字

出而不惡寒反偏惡熱其身體重發其汗卽燥
心憒憒而反讝語加溫針必怵惕煩躁不得眠
下之卽胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎
者屬梔子湯證若渴欲飲水口乾舌燥者與白
虎湯若脉浮發熱渴欲飲水小便不利與猪苓
湯
發汗已後不可更與桂枝湯汗出而喘無大熱
屬麻黃杏子石膏甘草湯證

病人脉微而濇者此爲醫所病也大發其汗又
數大下之其人亡血病當惡寒而發熱無休止
時夏月盛熱而欲着複衣冬月盛寒而欲裸其
體所以然者陽微卽惡寒陰弱卽發熱此醫發
其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時
陽氣在表胃中虛冷陽氣內微不能勝冷故欲
着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱陰氣
內弱不能勝熱故欲裸其體又陰脉遲濇故知

亡血也

傷寒吐後腹滿者屬承氣湯證

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐食入口即出屬乾薑黃芩黃連人參湯證

傷寒吐下七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升屬白虎湯證

傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼神之狀若劇者發則不識人循衣妄撮怵惕不安微喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱讝語屬承氣湯證若下者勿復服

太陽病過經十餘日心下嗢嗢欲吐而胸中痛大便反溏其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者可與承氣湯不爾者不可與欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝湯證
一云麻黃湯證
太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則
爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒
其表未解醫反下之動數則遲頭痛則眩胃中
空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷
心下因堅則爲結胸屬大陷胸湯證若不結胸
但頭汗出其餘無有齊頸而還小便不利身必

發黃
太陽病下之脉促不結胸者此爲欲解其脉浮
者必結胸其脉緊者必咽痛其脉絃者必兩脇
拘急其脉細而數者頭痛未止其脉沉而緊者
必欲嘔脉沉而滑者挾熱利其脉浮而滑者必
下血
太陽病下之其脉促胸滿者屬桂枝去芍藥湯
若微惡寒桂枝去芍藥加附子湯證

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促表未解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯證

太陽病醫反下之因腹滿時痛爲屬太陰屬桂枝加芍藥湯證其大實痛屬桂枝加大黃湯證

太陽病下之其氣上衝可與桂枝湯不上衝者不可與之也

太陽病二三日終不能臥但欲起者心下必結其脉微弱者此本寒也而反下之利止者必結胸未止者四五日復重下之此挾熱利也

太陽病外證未除而數下之遂挾熱利而止心下痞堅表裏不解屬桂枝人參湯證

大下以後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱屬麻黃杏仁石膏甘草湯證

太陽病五日下之六七日不大便而堅者屬柴胡湯證

太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴

胡湯證續在先與柴胡湯嘔止小安其人欝欝微煩者爲未解屬大柴胡湯證

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讝語一身不可轉側屬柴胡加龍骨牡蠣湯證

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱而微利此證當柴胡湯下之不得利今反利者故知醫以圓藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後屬柴胡加芒硝湯

傷寒十三日過經而讝語內有熱也當以湯下之小便利者大便當堅而反利其脉調和者故知醫以圓藥下之非其治也自利者其脉當微厥今反和者此爲內實屬承氣湯證

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以他藥下之心下滿而堅痛者此爲結胸屬大陷胸湯

陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊憹者飢不能食但頭汗出屬梔子湯證

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿頭堅後溏者不可下之有燥屎者宜承氣湯

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也

陽明病脉遲食難用飽飽即發煩頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下之其腹滿即如故耳所以然者脉遲故也

趺陽脉微弦而如此爲强下之下利其脉浮大此爲虛以强下之故也設脉浮革故爾腸鳴屬當歸四逆湯證

傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急當救裏後身體疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

大下後五七日不大便煩不解腹痛而滿有燥屎者本有宿食故也

大下後口燥者裏虛故也

火逆下之因燒針煩躁屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯

辨可温病形證治第二十

大法冬宜服温熟藥及灸

師曰病發熱頭痛脉反沉若不差身體更疼痛當救其裏宜温藥四逆湯

下利腹滿身體疼痛先温其裏宜四逆湯

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當温之宜四逆輩

少陰病其人飲食入則吐心中嗢嗢欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當温之宜四逆湯

少陰病其脉沉者急當温之宜四逆湯

下利欲食者就當温之

下利脉遲緊爲痛未欲止者當温之得冷者滿

而便腸垢

下利其脉浮大此爲虛以强下之故也設脉浮革因爾腸鳴當温之與水者噦宜當歸四逆湯

少陰病下利脉微澁者卽嘔汗出必數更衣反少當温之

傷寒醫下之而續得下利清穀不止身體疼痛急當救裏宜温之以四逆湯

諸温之屬可與理中四逆附子湯熟藥治之

辨不可火病形證治第二十一

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛卽欲劒陰虛小便難陰陽俱虛竭身體卽枯燥但頭汗出齊頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讝語甚者至噦手足躁擾循衣摸牀小便利者其人可治

太陽病醫發其汗遂發熱惡寒復下之則心下

痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因而煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足温者愈

傷寒加温鍼必驚

陽脉浮陰脉弱者則血虛血虛則筋惕其脉沉者營氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也營氣微者加燒針血留不行更發熱而煩躁也

傷寒脉浮醫以火迫之亡陽驚狂臥起不安屬桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

問曰得病十五六日身體黃下利狂欲走師脉之言當清血如豚肝乃愈後如師言何以知之師曰寸口脉陽浮陰濡而弱陽浮則爲風陰濡弱爲少血浮虛受風少血發熱風則微寒灑淅項强頭眩醫加火熏臀令汗出惡寒遂甚客熱因火而發怫鬱蒸肌膚身目爲黃小便微難短

氣從鼻出血而復下之胃無津液泄利遂不止
熱瘀在膀胱畜結成積聚狀如豚肝當下未下
心亂迷憒狂走赴水不能自制畜血若去目明
心了此皆醫爲無他禍患微難得愈劇者不治
傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必讝語
太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解
必清血
陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

陽明病其脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗
出而不惡寒反惡熱其身體重發其汗即躁心
憒憒而反讝語加温針者必怵惕又煩躁不得
眠
少陰病欬而下利讝語是爲被火氣劫故也小
便必難爲强責少陰汗也
太陽病二日反燒尪熨其背大汗出火熱入
胃胃中水竭燥煩必發讝語十餘日振而反汗

出者此爲欲解其汗從腰以下不得汗其人欲
小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便堅者小
便當數而反不數及多便已其頭必卓然而痛
其人足心必熱穀氣從下流故也
風温爲病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠鼻息
必鼾語言難出若被火者微發黃色劇則如驚
癎時瘛瘲若火熏之一逆尚引日再逆促命期
火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣

湯主之
傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出自嘔
者熏之則發黃不得小便
傷寒發熱頭痛微汗出熏之則喘加温鍼則必
衄
傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者脉
初來大漸漸小更來漸漸大是其候也若熏之
則發黃熨之則咽燥小便利者可救難者危殆

辨可火病形證治第二十二

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下可小發其汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表不得越當解之熏之當汗而不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發其汗則愈何以知汗出不徹以脉濈故知之

下利穀道中痛當温之以爲宜火熬末鹽熨之一方炙枳實熨之

辨不可灸病形證治第二十三

微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脉浮當以汗解而反灸之邪無從出因火而盛

病從腰以下必重而痺此爲火逆若欲自解當須汗出

脉浮熱甚反灸之此爲實實以虛治因火而盛必咽燥唾血

辨可灸病形證治第二十四

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發貴豚氣從小腹上衝者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之

少陰病其人吐利手足不逆反發熱者不死脉不至者灸其少陰七壯

少陰病下利脉微澁者卽嘔汗出必數更衣反少當温其上灸之

諸下利皆可灸足大都五壯一云七壯商丘陰陵泉皆三壯

下利手足厥冷無脉灸之主足厥陰是也灸不
温反微喘者死
傷寒五六日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不
還者死
傷寒脉促手足厥逆可灸之灸少陰厥陰
辨不可刺病形證治第二十五
大怒無刺大一作新後同
新内無刺已一作新下同
大勞無刺已刺無勞
大醉無刺已刺無醉
大飽無刺已刺無飽
大饑無刺已刺無饑
大渴無刺已刺無渴
大驚無刺
無刺熇熇之熟無刺漉漉之汗無刺渾渾之脉
身熱甚陰陽皆爭者勿刺也其可刺者急取之

不汗則洩所謂勿刺者有死徵也
無刺病與脉相逆者上工刺未生其次刺未盛
其次刺已衰麤工逆此謂之伐形

辨可刺病形證治第二十六

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲
作再經者當鍼足陽明使經不傳則愈
太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風
池風府却再與桂枝湯則愈

傷寒腹滿而讝語寸口脉浮而緊者此爲肝乘
脾名曰縱當刺期門
傷寒發熱嗇嗇惡寒其人大渴欲飲酢漿者其
腹必滿而自汗出小便利其病欲解此爲肝乘
肺名曰横當刺期門
陽明病下血而讝語此爲熱入血室但頭汗出
者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈
婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱

除脉遲身涼胸脇下滿如結胸狀其人譫語此爲熱入血室當刺期門隨其實而取之平病云熱入血室無犯胃氣及上二焦與此相反豈謂藥不謂鍼

太陽與少陽併病心下痞堅頸項强而眩當刺大椎第一間肺俞肝俞勿下之

婦人傷寒懷娠腹滿不得大便從腰以下重如有水氣狀懷娠七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便利則愈

傷寒喉痺刺手少陰少陰在脘當小指後動脉是也鍼入三分補之

少陰病下利便膿血者可刺

辨不可水病形證治第二十七

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

傷寒吐下之極虛復極汗出者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦者胃中寒冷故也

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀胃中虛冷其人不能食飲水即噦

下利其脉浮大此爲虛以强下之故也設脉浮革因爾腸鳴當温之與水者噦

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉矢氣者此爲但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不能食欲飲水者即噦

病在陽當以汗解而反以水潠之若灌之其熱却不得去須臾益煩皮上粟起意欲飲水反不渴服文蛤散不差與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小白散

身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水灌之洗之其熱被劫益不得去當汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

寸口脉浮大醫反下之此爲大逆浮即無血大

則爲寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知而反飲
水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人必鶻
寸口脉濡而弱濡卽惡寒弱則發熱濡弱相搏
藏氣衰微胸中苦煩此非結熱而反搏之居水
漬布冷銚貼之陽氣遂微諸府無依陰脉凝閉
結在心下而不肯移胃中虛冷水穀不化小便
縱通復不能多微則可救劇則寒在心下當奈
何

辨可水病形證治第二十八

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不能眠
其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈
厥陰病渴欲飲水者與水飲之卽愈
太陽病寸口緩關上小浮尺中弱其人發熱而
汗出復惡寒欲嘔但苦心下痞者此爲下之故
也若不下其人復不惡寒而渴者爲轉屬陽明
病小便數者大便必堅不更衣十日無所苦也

欲飲水者與之但當如法救之宜五苓散
寸口脉洪而大數而滑洪大則營氣長滑數則
胃氣實營長則陽盛怫鬱不得出胃實則堅難
大便則乾燥三焦閉塞津液不通醫發其汗陽
盛不周復重下之胃燥熱蓄大便遂擯小便不
利營衛相搏心煩發熱兩眼如火鼻乾面赤舌
燥齒黃焦故大渴過經成壞病鍼藥所不能制
與水灌枯槁陽氣微散身寒温衣覆汗出表裏

通利其病即除形脉多不同此愈非法治但醫
所當慎妄犯傷營衛
霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水屬五
苓散證
嘔吐而病在膈上後必思水者急與豬苓湯飲
之水亦得也
論熱病陰陽交併生死證二十九
問曰温病汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂

言不能食病名爲何對曰病名陰陽交交者死人所以汗出者生于穀穀生于精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者邪勝也不能食者精無俾也汗出而熱留者壽可立而傾也夫汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不能勝其病也狂言者是失志失志者死此有三死不見一生雖愈必死

熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生

熱病脈尚躁盛而不得汗者此陽脈之極也死脈躁盛得汗者生

熱病已得汗而脈尚躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死熱病陰陽交者死

熱病陽進陰退頭獨汗出死陰進陽退腰以下

15/3514

至足汗出亦死陰陽俱進汗出已熱如故亦死
陰陽俱退汗出已寒慄不止鼻口氣冷亦死
熱病所謂并陰者熱病已得汗因得泄是謂并
陰故治一作活
熱病所謂并陽者熱病已得汗脉尚躁盛大熱
汗出雖不汗出若劒是謂并陽故治

金匱玉函經卷第六 終

金匱玉函經

八七

金匱玉函經卷第七

方藥炮製

凡野葛不入湯入湯則殺人不謂今葛根也凡半夏不咬咀以湯洗十數度令水清滑盡洗不熟有毒也茱萸椒之類不咬咀生薑一觔出汁三合半生薑皆薄切之乃擣絞取汁湯成乃熟煮如升數無生者用乾者一兩當二兩附子大黃之類皆破解不咬咀或炮或生皆去黑皮刀

剖取裏白者故曰中白用木芍藥刮去皮大棗擘去核厚朴卽斜削如脯法桂削去皮用裏黑潤有味者爲佳細辛斬折之麻黃亦折之皆先煮數沸生則令人煩汗出不可止折節益佳用桃核杏核皆須泡去皮乃熬勿取兩人者作湯不熬巴豆去皮心復熬變色瞿麥小草斬折不咬咀石葦手撲速吹去毛盡曝令燥復撲之不盡令人淋藜蘆去頭毛葶藶皆熬黃黑色巴豆桃仁杏仁皆不可從藥別擣令如膏乃稍納藥末中更下麤羅凡咬咀藥欲如大豆麤則藥力不盡凡煎藥皆去沫沫濁難飲令人煩膠乃成下去滓乃納之飴亦然凡圓藥膠炙之乃可搗用膠炙令盡沸凡搗圓藥欲各異搗藥有難易搗耳凡煮藥用遲火火駛藥力不出盡當以布絞之綿不盡汁也凡飾藥欲細篩篩訖更合治之和調蜜圓者益杵數爲佳凡散石藥以藥計

金匱玉函經

分之下絹篩佳散藥麤篩佳凡作膏欲生熟則力少

桂枝湯方第一

桂枝三兩　芍藥三兩　甘草二兩炙

生薑三兩切　大棗十二枚劈

右五味㕮咀三物水七升微火煮取三升去滓溫服一升須臾飲熱粥一升餘以助藥力溫覆令汗出一時許益佳若不汗再服如前

又不汗後服當小促其間令半日許三服盡病重者一日一夜服晬時觀之服一劑盡病證猶在當復作服若汗不出者服之二三劑乃解

桂枝麻黃各半湯方第二

桂枝一兩十六銖　芍藥　生薑

甘草炙　麻黃各一兩　大棗四枚

杏仁二十四枚

右七味咬咀以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓温服六合本方二湯各三合併爲六合頓服令裁爲一方

桂枝二麻黃一湯方第三

桂枝一兩十芍藥一兩十六銖 麻黃十六銖 生薑一兩六銖 杏仁十六枚 甘草一兩二銖 大棗五枚

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓温服一升本方桂枝湯三分麻黃湯一分合爲二升分再服令合爲一方

桂枝二越婢一湯方第四

桂枝二兩 芍藥 甘草 麻黃各十八銖 生薑一兩三銖 大棗四枚 石膏二十四銖

右七味咬咀以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升本方當裁爲越脾湯桂枝湯合之飲一升令合爲一方桂枝湯二分越脾湯一分

桂枝加桂湯方第五

桂枝　五兩　芍藥　三兩　甘草　二兩　炙
生薑　二兩　大棗　十二枚

右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升故長按生薑二兩疑當作三兩

本方桂枝湯今加桂

桂枝加附子湯方第六

桂枝　芍藥　各三兩　甘草　二兩　炙
生薑　三兩　大棗　十二枚　附子　一枚炮去皮破八片

右六味咬咀三物以水七升煮取三升去滓溫服一升本方桂枝湯今加附子

桂枝去芍藥湯方第七

桂枝　三兩　甘草　二兩　炙
生薑　三兩

大棗十二枚

右四味㕮咀以水七升煮取三升去渣温服一升本方桂枝湯今去芍藥

桂枝去芍藥加附子湯方第八

桂枝三兩　甘草二兩炙　生薑三兩

大棗十二枚　附子一枚炮

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓温服一升本方桂枝湯今去芍藥加附子

桂枝去桂加茯苓白朮湯方第九

芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩

大棗十二枚　茯苓　白朮各三兩

右六味㕮咀以水七升煮取三升去滓温服一升小便利卽愈本方桂枝湯今去桂加茯苓朮

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方第十

桂枝三兩　甘草二兩炙　生薑三兩

蜀漆三兩洗去腥　大棗十二枚　牡蠣五兩熬
龍骨四兩
右七味㕮咀以水八升先煮蜀漆減二升納
諸藥取三升去滓温服一升本方桂枝湯今
去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣一法以水一斗二
升煮取五升

桂枝加芍藥生薑人參湯方第十一

桂枝三兩　芍藥　生薑各四兩

甘草二兩炙　人參三兩　大棗十二枚
右六味㕮咀四味以水一斗一升煮取三升
去滓温服一升本方桂枝湯今加芍藥生姜
人參

桂枝倍加芍藥湯方第十二

桂枝三兩　芍藥六兩　生薑三兩
甘草二兩炙　大棗十二枚
右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓温服

一升本方桂枝湯今加用芍藥
桂枝加大黃湯方第十三
桂枝三兩　芍藥六兩　生薑三兩
甘草二兩炙　大棗十二枚　大黃三兩
右六味㕮咀以水七升煮取三升去滓溫服
一升
桂枝人參湯方第十四
桂枝　甘草各四兩炙　人參

桂枝甘草湯方第十六

桂枝四兩　甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

桂枝加葛根湯方第十七

桂枝三兩　芍藥二兩　甘草二兩

生薑三兩　大棗十二枚　葛根四兩

右六味以水九升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓温服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法

葛根湯方第十八

葛根四兩　麻黃　生薑各三兩

桂枝　芍藥　甘草各二兩

大棗十二枚

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮取一升去滓温服一升取汗不須啜粥

故長按煮取一升疑當作三升

葛根加半夏湯方第十九

葛根 四兩　麻黃　生薑

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去

大棗 十二枚　半夏 半升洗　甘草 各二兩　芍藥

桂枝

上洙內諸藥煮取三升去滓溫服一升取汗

葛根黃芩黃連湯方第二十

葛根 半斤　甘草 二兩炙　黃芩

黃連 各三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內

諸藥煮取二升去滓溫分服

麻黃湯方第二十一

麻黃 三兩　桂枝 二兩　甘草 一兩炙

杏仁 七十枚

右四味以水九升先煮麻黃減二升去

上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合溫

覆出汗不須啜粥餘如桂枝法

麻黃杏子甘草石膏湯方第二十三

麻黃四兩　杏子五十枚　石膏半觔碎綿裹　甘草一兩炙

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升

麻黃附子甘草湯方第二十三

麻黃二兩　附子一枚泡去皮破八片　甘草二兩炙

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫

內諸藥煮取二升半去滓溫服八合

麻黃附子細辛湯方第二十四

麻黃二兩　附子一枚去皮破作八片炮　細辛二兩

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升

麻黄連軺赤小豆湯方第二十五

麻黄　連軺　生薑各二兩　赤小豆一升　杏仁三十枚　一兩去皮尖　甘草炙　大棗十二枚　生梓白皮一升

右八味以潦水一斗先煮麻黄一二沸去上沫内諸藥煮取三升去滓温服一升

麻黄升麻湯方第二十六

麻黄二兩半　升麻　當歸各一兩六銖

黄芩　萎蕤　知母各十八銖　石膏碎綿裹　甘草炙　桂枝　芍藥　乾薑　白朮　茯苓　麥門冬去心各六銖

右十四味㕮咀以水一斗先煮麻黄一二沸去上沫内諸藥煮取三升去滓分温三服一

大青龍湯方第二十七

飯間當出汗愈

大青龍湯方第二十八

麻黃 六兩　桂枝 二兩　甘草 二兩　炙
石膏 雞子大碎綿裹　杏仁 四十枚　生薑 三兩
大棗 十二枚

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆令汗出
多者溫粉撲之一服汗者停後服若復服汗
多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠

小青龍湯方第二十八

麻黃 芍藥　細辛
桂枝 乾薑　甘草
五味子 碎　半夏 各半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升　渴者去
半夏加栝樓根三兩　微利去麻黃加蕺花
如雞子熬令赤色　噎者去麻黃加附子一
枚炮　小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓

敬長按甘草下疑脫各三兩三字

四兩　喘者去麻黃加杏仁半升　薤花不
治利麻黃定喘令反之者疑非仲景意
小建中湯方第二十九
桂枝　甘草炙　生薑各三兩
芍藥六兩　大棗十二枚　膠飴一升
右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更
上火消解温服一升嘔家不可服以甘故也
小柴胡湯方第三十

柴胡半斤　黃芩　人參
甘草　生薑各三兩　半夏半升
大棗十二枚
右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓
再煮取三升温服一升日三若胸中煩不
嘔者去半夏人參加栝蔞實一枚若渴者
去半夏加人參合前成四兩半栝蔞根四兩
若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脅下

痞堅者去大棗加牡蠣四兩若心下悸小
便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外
有微熱者去人參加桂三兩温覆微發其汗
若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾
薑二兩

柴胡桂枝乾薑湯方第三十一

柴胡半觔　桂枝二兩　乾薑二兩
甘草二兩　牡蠣二兩　栝蔞根四兩
炙　熬

黃芩三兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎
取三升温服一升初服微煩復服汗出愈

柴胡桂枝湯方第三十二

柴胡四兩　黃芩　人參各一
兩半
半夏二合　甘草一兩　桂枝
半　炙

芍藥　生薑各一
兩半　大棗六枚

右九味以水七升煮取三升去滓温服一升

柴胡加龍骨牡蠣湯方第三十三

柴胡四兩　黃芩　生薑
龍骨　人參　桂枝
牡蠣熬　黃丹　茯苓各一兩半
半夏二合半　大棗六枚　大黃二兩

右十二味以水八升煮取四升內大黃更煮取二升去滓溫服一升本方柴胡湯內加龍骨牡蠣黃丹桂茯苓大黃也今分作半劑

大柴胡湯方第三十四

柴胡半斤　黃芩三兩　芍藥三兩
半夏半升　生薑三兩　枳實四枚
大棗十二枚　大黃二兩

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升一方無大黃然不加不得名大柴胡湯也

柴胡加芒硝湯方第三十五

柴胡二兩十六銖　黃芩一兩　人參一兩
甘草一兩炙　生薑一兩　半夏五枚
大棗四枚　芒硝二兩
右七味以水四升煮取二升去滓分二服以
解爲差不解更作服

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯方第三十六
柴胡二兩　黃芩　人參
甘草炙　生薑各十八銖　半夏五枚
大棗四枚　芒硝三合　大黃四兩
桑螵蛸五枚
右前七味以水四升煮取二升去滓下芒硝
大黃桑螵蛸煮取一升半去滓溫服五合微
下卽愈本方柴胡湯再服以解其外餘一服
加芒硝大黃桑螵蛸

茯苓桂枝甘草大棗湯方第三十七
茯苓半斤　桂枝四兩　甘草二兩炙

故長按瀾疑當作爛

大棗十五枚

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓温服一升日三

茯苓桂枝白朮甘草湯方第三十八

茯苓四兩　桂枝　白朮各三兩　甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分温三服小便即利

茯苓甘草湯方第三十九

茯苓三兩　甘草一兩炙　桂枝二兩　生薑三兩

右四味以水四升煮取二升去滓分温三服

五苓散方第四十

豬苓十八銖　澤瀉一兩六銖　茯苓十八銖　桂半兩　白朮十八銖

右五味爲末以白飲和服方寸七日三服多

飲煖水汗出愈

甘草乾薑湯方第四十一

甘草二兩炙　乾薑二兩

右二味㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服

芍藥甘草湯方第四十二

芍藥四兩　甘草四兩炙

右二味㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服

炙甘草湯方第四十三

甘草四兩炙　生薑三兩　人參二兩　生地黃一斤　桂枝三兩　阿膠

麥門冬半升去心　麻子仁半升　大棗三十枚

右九味酒七升水八升煮取三升去滓內膠烊盡温服一升日三服

甘草湯方第四十四

故長按阿膠下疑脫二兩二字

甘草二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓温服七合日二服

厚朴生薑半夏甘草人參湯方第四十五

厚朴　生薑　半夏各半觔

甘草二兩　人參一兩

右五味㕮咀以水一斗煮取三升去滓温服一升日三服

梔子豉湯方第四十六

梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服温進一服得快吐止後服

梔子甘草豉湯方第四十七

梔子十四枚擘　甘草二兩　香豉四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子甘草得二升半

內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進一服
得快吐止後服

梔子生薑豉湯方第四十八

梔子十四枚擘　生薑五兩　香豉四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子生薑得二升半
內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進一服
得快吐止後服

梔子厚朴湯方第四十九

梔子十四枚擘　厚朴四兩　枳實四枚去穰炒

右三味以水三升煮取一升半去滓分爲二
服溫進一服得吐止後服

梔子乾薑湯方第五十

梔子十四枚擘　乾薑二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分爲三服
溫進一服得快吐止後服

梔子黃檗湯方第五十一

梔子十四枚擘　黄檗二兩十六銖　甘草一兩炙
右三味㕮咀以水四升煮取一升半去滓分温再服

金匱玉函經卷第七終

金匱玉函經卷第八

小陷胸湯方第五十二

栝樓實一枚　黄連二兩　半夏半升
右三味以水六升先煮栝樓取三升去滓内諸藥煮取二升去滓分温三服

大陷胸湯方第五十三

大黄六兩去皮　芒硝一升　甘遂一錢
右三味以水六升先煮大黄取二升去滓内

芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利
止後服
大陷胸圓方第五十四
大黃半觔　葶藶　芒硝
杏仁各半升
右四味搗和取如彈圓一枚甘遂末一錢七
白蜜一兩水二升煮取一升頓服一宿乃下
又大陷胸湯方第五十五

桂枝四兩　甘遂四兩　大棗十二枚
栝樓實一枚去皮　人參四兩
右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升
胸中無堅勿服之
文蛤散方第五十六
文蛤五兩
右一味爲散沸湯和服一方寸匕
白散方第五十七

桔梗　貝母各十八銖　芭豆六銖去皮心熬黑

右三味爲散白飲和服强人半錢羸人減之

病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一盃

大黄瀉心湯方第五十八

大黄二兩　黄連一兩

右二味咬咀以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分温再服

附子瀉心湯方第五十九

大黄二兩　黄連　黄芩各一兩

附子一枚炮去皮破別煮取汁

右四味咬咀三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓内附子汁分温再服

半夏瀉心湯方第六十

半夏半升　黄芩　乾薑　甘草炙　人參各三兩　黄連一兩

大棗 十六枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升温服一升日三服

甘草瀉心湯方第六十一

甘草 四兩　黃芩 三兩　乾薑 三兩

半夏 半升　黃連 一兩　大棗 十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

生薑瀉心湯方第六十二

生薑 四兩　人參　甘草

黃芩 各三兩　半夏 半升　乾薑

黃連 各一兩　大棗 十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

禹餘糧圓方

闕

赤石脂禹餘糧湯方第六十三

赤石脂一觔碎　禹餘糧一觔碎

右二味以水六升煮二升去滓分温三服

旋覆代赭石湯第六十四

旋覆花三兩　代赭石一兩　人參二兩

大棗十二枚　生薑五兩　半夏半升

甘草二兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升温服一升日三服

瓜蒂散方第六十五

瓜蒂熬黃　赤小豆各六銖

右二味各別搗篩爲散合治之取一錢匕以

香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁

和散温頓服之不吐者少少加得快吐乃止

諸亡血虛家不可與瓜蒂散

白虎湯方第六十六

石膏一觔碎　知母六兩　甘草二兩
粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

白虎加人參湯方第六十七

白虎加人參三兩　石膏一觔　知母六兩
甘草二兩　粳米六合

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

桂枝附子湯方第六十八

桂枝四兩　附子三枚炮　甘草二兩炙
大棗十五枚　生薑三兩

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

術附湯方第六十九

白朮四兩　附子三枚炮　甘草三兩炙
生薑二兩　大棗十五枚

敬長按二兩疑

當作三兩

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服一服覺身痺半日許再服如冒狀勿怪也即是附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使之耳法當加桂四兩其人大便堅小便自利故不加桂也

甘草附子湯方第七十

桂枝四兩　甘草三兩炙　附子二枚炮　白朮三兩

右四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三服汗出即解能食汗止復煩者服五合恐一升多者宜服六七合爲始

芍藥甘草附子湯方第七十一

芍藥　甘草各一兩　附子一枚炮

右三味�once咀以水三升煮取一升三合去滓分温三服

乾薑附子湯方第七十二

金匱玉函經　卷八　十七

乾薑一兩　附子一枚

右二味以水三升煮一升頓服之

十棗湯方第七十三

芫花熬　甘遂　大戟

右三味等分爲散以水一升半先煮棗十枚取八合去滓內藥末强人一錢羸人半錢若下少病不除明日加半錢

附子湯方第七十四

附子二枚炮　茯苓三兩　人參二兩

白朮四兩　芍藥三兩

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

大承氣湯方第七十五

大黃四兩酒洗　厚朴半觔炙去皮　枳實五枚炙

芒硝三合

右四味以水一斗先煮二味取五升去滓內

大黃煮取二升去滓內芒硝更上微火一兩
沸分温再服得下餘勿服

小承氣湯方第七十六

大黃四兩 厚朴二兩炙去皮 枳實三枚大者炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温
三服初服當更衣不爾盡飲之若更衣勿復
服

調胃承氣湯方第七十七

大黃四兩酒浸 甘草二兩炙 芒硝半升

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓內芒
硝更上火微煮令沸少少温服

桃仁承氣湯方第七十八

桃仁五十枚去皮尖 大黃四兩 桂枝二兩

甘草二兩炙 芒硝二兩

右五味以水七升先煮四味取二升半去滓
內硝更煮微沸温服五合日三服微利

豬苓湯方第七十九

豬苓 茯苓 阿膠

澤瀉 滑石 碎各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠消盡溫服七合日三服

蜜煎導方第八十

蜜七合

右一味內銅器中微火煎如飴勿令焦俟可

丸捻作挺如指許長二寸當熱作令頭銳內

穀道中以手急抱欲大便時乃去之

又大豬膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中

如一食頃當大便出宿食惡物

麻子仁圓方第八十一

麻子仁 二升 芍藥 半觔 大黃 一觔

厚朴 一觔 炙 枳實 半觔 炙 杏仁 一觔

右六味爲末煉蜜爲圓桐子大飲服十圓日

三服漸加以和爲度

抵當圓方第八十二

水蛭二十箇熬　蝱蟲二十五箇　桃仁三十箇去皮尖

大黃三兩

右四味杵分爲四圓以水一升煮一圓取七合服之腑時當下血若不下更服

抵當湯方第八十三

水蛭三十箇熬　蝱蟲三十箇熬去翅足

桃仁二十箇去皮尖　大黃三兩酒浸

右四味爲末以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

茵蔯蒿湯第八十四

茵蔯蒿六兩　梔子十四枚擘　大黃二兩去皮

右三味以水一斗先煮茵蔯減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

黃連阿膠湯方第八十五

黃連四兩　黃芩一兩　芍藥二兩
雞子黃二枚　阿膠三兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內
膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合
日三服

黃連湯方第八十六

黃連二兩　甘草炙一兩　乾薑一兩
桂枝二兩　人參二兩　半夏五合
大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓分五服日
三服夜二服

桃花湯方第八十七

赤石脂一斛一半全用一半篩末　乾薑一兩
粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合

內赤石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿
服
吳茱萸湯方第八十八
吳茱萸一升洗　人參三兩　生薑六兩
大棗十二枚
右四味以水七升煮取二升去滓温服七合
日三服
豬膚湯方第八十九

豬膚一斤
右以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白
粉五合熬香和相得温分六服
桔梗湯方第九十
桔梗一兩　甘草二兩
右二味以水三升煮取一升去滓分温再服
苦酒湯方第九十一
雞子一枚去黃內苦酒於殼中　半夏洗破如棗核大十四

枚內苦
酒中

右以雞子殼置刀鐶中安火上三沸去滓細
含嚥之不差更作

半夏散方第九十二

半夏　桂枝　甘草炙各等分

右三味各別搗篩合治之白飲和服方寸七
日三服若不能散服以水一升煎七沸內散
一二方寸匕更煎三沸下火令小冷少少嚥

之

白通湯方第九十三

蔥白四莖　乾薑一兩　附子一枚生用去皮破

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

白通加豬膽汁湯方第九十四

蔥白四莖　乾薑一兩　附子一枚生

人尿五合　豬膽汁一合

右以水三升煮一升去滓內人尿膽汁和相

得分温再服無膽亦可

眞武湯方第九十五

茯苓　芍藥　生薑各三兩

白朮二兩　附子一枚炮

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服

若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩

若小便利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩若嘔者去附子加生薑足前成半觔

烏梅圓方第九十六

烏梅三百箇　細辛六兩　乾薑十兩

黄連一觔　當歸四兩　附子六兩炮

蜀椒四兩去子　桂枝六兩　人參六兩

黄檗六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟取擣成泥和藥令

相得內臼中與蜜杵二千圓如梧桐子大先
食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生冷
滑物食臭等

乾薑黃芩黃連人參湯方第九十七

乾薑　黃芩　黃連
人參　各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服
白頭翁湯方第九十八

白頭翁　黃連　黃檗
秦皮　各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓温服一升
不愈更服一升

黃芩人參湯方九十九

黃芩　人參　桂枝
乾薑　各二兩　半夏　半升　大棗　十二枚

右六味以水七升煮取二升去滓分温再服

黃芩湯方第一百　芍藥二兩

黃芩　甘草二兩　大棗十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升日再服夜一服

黃芩加半夏生薑湯方第一百一

黃芩三兩　芍藥　甘草各二兩　大棗十二枚　半夏半升　生薑一兩半

右六味以水一斗煮取三升去滓温服一升

敬長按黃芩下疑脫三兩二字

日再服夜一服

理中圓及湯方第一百二

人參　甘草炙　白朮　乾薑各三兩

右四味搗篩爲末蜜和圓如雞黃大以沸湯數合和一圓研碎温服之日三服夜二服腹中未熱益至三四圓然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓温服一

升日三服

加減法

若臍上築者腎氣動也去术加桂四兩

吐多者去术加生薑三兩下多者還用术

悸者加茯苓二兩

渴欲得水者加术足前成四兩半

腹中痛者加人參足前成四兩半

寒者加乾薑足前成四兩半

腹滿者去术加附子一枚

服湯後如食頃飲熱粥一升許微自温勿發

揭衣被

四逆散方第一百三

甘草炙 柴胡 芍藥

枳實炙各十分

右四味爲散白飲服方寸七日三服 咳者

加五味子乾薑各五分并主久痢 悸者加

桂枝五分　小便不利者加茯苓五分　腹
痛者加附子一枚炮　泄利下重者先以水
五升煮薤白三升取三升去滓以散三方寸
匕內湯中煮取一升半分温再服

四逆湯方第一百四

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生去皮破

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温
再服强人可大附子一枚乾薑三兩

通脉四逆湯方第一百五

乾薑三兩强人四兩　甘草二兩炙　附子大者一枚生用破

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温
再服其脉即出者愈

面色赤者加葱九莖　腹中痛者加芍藥二
兩　嘔者加生薑二兩　咽痛者加桔梗二
兩　利止脉不出者加人參二兩

人參四逆湯方第一百六

人參一兩　甘草二兩炙　乾薑一兩半

附子一枚生

右四味以水三升煮取一升二合去滓分温再服

再服

茯苓四逆湯方第一百七

茯苓四兩　甘草二兩炙　乾薑一兩半

附子一枚生　人參一兩

右五味咬咀以水五升煮取一升二合去滓分温再服

通脉四逆加豬膽汁湯方一百八

乾薑三兩　甘草二兩炙　附子大者一枚生

豬膽汁四合

右三味以水三升煮取一升二合去滓内豬膽汁分温再服

當歸四逆湯方一百九

當歸　桂枝　芍藥各三兩

細辛 一兩 大棗二十枚 甘草炙
通草各二兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方第一百十

當歸 桂枝 芍藥
細辛 甘草炙 通草各三兩
大棗二十五枚 吳茱萸二兩 生薑半觔

右九味㕮咀以水四升清酒四升煮取三升去滓温服一升日三

燒裩散方第一百十一

右取婦人中裩近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便卽利陰頭微腫則愈婦人病取男子裩當燒灰

枳實梔子豉湯方第一百十二

枳實三枚炙 梔子十四枚擘 豉一升綿裹

右以清漿水七升空煎減三升內枳實梔子
煮取二升內豉更煮五六沸去滓分温再服
取汗出若有宿食加大黄如博棊子大五六
枚

牡蠣澤瀉散方第一百十三

牡蠣熬 澤瀉 栝蔞根
蜀漆洗去腥 葶藶熬 商陸根熬
海藻洗去鹹 各等分

右七味爲散白飲和服方寸匕小便利卽止

竹葉石膏湯方第一百十四

竹葉二把 石膏一觔 半夏半升
人參三兩 甘草二兩 粳米半升
麥門冬一升去心

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮
米熟湯成去米温服一升日三服

麥門冬湯方第一百十五

麥門冬七升半夏一升 人參二兩
甘草二兩 粳米三合 大棗十二枚
右六味以水一斗六升煮取六升温服一升
日三夜一服
附遺
調氣飲 治赤白痢小腹痛不可忍下重或面
青手足俱變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶
化入黃連末五錢攪勻分三次熱服神妙

猪肚黃連丸 治消渴飲水用雄猪肚一枚入
黃連末五兩栝樓根白粱米各四兩知母三
兩麥門冬三兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每
服三十丸米飲下
青木香丸 主陽衰諸不足用崑崙青木香六
路訶子皮各二十兩擣篩糖和丸梧子大每
空腹酒下二十三十丸日再其效尤速
治五噎吐逆心膈氣滯煩悶不下用蘆根五兩

45
3575

劑以水三大盞煮取二盞去渣温服

治小兒羸瘦用甘草三兩炙焦爲末蜜丸綠豆

大每温水下五丸日二服

治小兒撮口發噤用生甘草二錢半水一盞煎

六分温服令吐痰涎後以乳汁點兒口中

治小兒中蠱欲死者用甘草五錢水二盞煎五

分服當吐出

金匱玉函經卷第八　終

平安

博文堂
廣文堂　發行

金匱玉函經卷第八　終

平安　博文堂
廣文堂　發行