金匱要略

漢張仲景著

ヤ 9
1146

千金及外臺皆無金匱之名出于唐以後之匯也
雖癸小建中陽大半復一越婢一之類見于此則全文
可廢也擇用

洙說文市朱切
讀如殊

金匱要略方論序

張仲景爲傷寒雜病論合十六卷、今世但傳傷寒論十卷、雜病未見其書、或於諸家方中、載其一二矣、翰林學士王洙在館閣日、於蠹簡中、得仲景金匱玉函

91-2002

要略方三卷、上則辯傷寒、中則
論雜病、下則載其方、幷療婦人、
乃錄而傳之、士流才數家耳、嘗
以對方證對者、施之於人、其効
若神、然而或有證而無方、或有
方而無證、救疾治病、其有未備、
國家詔儒臣、校正醫書、臣奇先
校定傷寒論、次校定金匱玉函
經、今又校成此書、仍以逐方次
於證候之下、使倉卒之際、便於
檢用也、又採散在諸家之方、附
於逐篇之末、以廣其法、以其傷

寒文多節略、故取自雜病以下
終於飲食禁忌、凡二十五篇、除
重復、合二百六十二方、勒成上
中下三卷、依舊名曰金匱方論、
臣奇嘗讀魏志華佗傳云、出書
一卷曰、此書可以活人、每觀華

佗凡所療病、多尚奇怪、不合聖
人之經、臣奇謂活人者、必仲景
之書也、大哉炎農聖瀧屬我盛
且、恭惟
主上丕承大統、撫育元元、頒行
方書、拯濟疾苦、使和氣盈溢、而

萬物莫不盡籀矣、太子右贊
善大夫臣高保衡尚書都官員
外郎臣孫奇尚書司封郎中祕
閣校理臣林億等傳上

金匱要略方目次

卷之上 臟腑經絡先後一ヲ痙濕暍五ウ

栝蔞桂枝湯 六ウ　葛根湯 六ウ
大承氣湯 七ヲ　麻黃加朮湯 八ウ
麻黃杏仁薏苡甘艸湯 八ウ
防己黃耆湯 九ヲ　桂枝附子湯 九ウ
白朮附子湯 九ウ　甘艸附子湯 十ヲ
白虎人參湯 十ウ　一物瓜蒂湯 十一ヲ

百合狐惑陰陽毒 十一ヲ
百合知母湯 十二ヲ
滑石代赭湯 十二ヲ
百合雞子湯 十二ウ
百合地黃湯 十二ウ
百合洗方 十三ヲ
括蔞牡蠣散 十三ヲ
百合滑石散 十三ウ
甘艸瀉心湯 十四ヲ
雄黃熏方 十四ヲ
赤小豆當歸散 十四ウ
升麻鼈甲湯 十五ヲ
○瘧病 十五ヲ
鼈甲煎丸 十五ウ
白虎加桂枝湯 十六ウ
蜀漆散 十六ウ

牡蠣湯 十七ヲ
柴胡桂薑湯 十七ウ
柴胡去半夏加括蔞湯 十七ヲ
○中風歷節 十七ウ
候氏黑散 十八ヲ
風引湯 十九ヲ
防己地黃湯 十九ヲ
頭風摩散 十九ウ
桂枝芍藥知母湯 二十ヲ
烏頭湯 二十ウ
攀石湯 二十一ヲ
續命湯 二十一ヲ
三黃湯 二十一ウ
朮附湯 二十二ヲ
八味丸 二十二ヲ
越婢加朮湯 二十二ウ

○血痺虛勞 二十二ウ
桂枝加龍骨牡蠣湯 二十三ヲ
小建中湯 二十四ヲ
薯蕷丸 二十五ウ
大黃䗪蟲丸 二十六ヲ
獺肝散 二十六ウ
甘艸乾薑湯 二十七ヲ
皀莢丸 二十八ウ
黃芪建中湯 二十五ヲ
酸棗湯 二十六ヲ
炙甘艸湯 二十六ウ
肺痿肺癰欬嗽上氣 二十七ヲ
射干麻黃湯 二十八ウ
厚朴麻黃湯 二十九ヲ
天雄散 二十四ヲ

澤漆湯 二十九ウ
葶藶大棗瀉肺湯 三十ヲ
越婢加半夏湯 三十ウ
麥門冬湯 二十九ウ
桔梗湯 三十ヲ
炙甘艸湯 三十一ヲ
生薑甘艸湯 三十一ウ
桔梗白散 三十二ヲ
○奔豚氣 三十二ウ
桂枝加桂湯 三十三ヲ
茯苓桂枝甘艸大棗湯 三十三ウ
小青龍加石膏湯 三十一ヲ
甘艸湯 三十一ヲ
桂枝皀莢湯 三十一ウ
薑萎湯 三十二ヲ
奔豚湯 三十二ウ

○胸痺心痛短氣 三十三ウ
括蔞薤白半夏湯 三十四ヲ
人參湯 三十四ウ
橘枳薑湯 三十五ヲ
桂薑枳實湯 三十五ウ
九痛丸 三十六ヲ
厚朴七物湯 三十七ヲ
厚朴三物湯 三十七ウ
大承氣湯 三十八ヲ
大黃附子湯 三十九ヲ
烏頭煎 三十九ウ
烏頭桂枝湯 四十ヲ
烏頭湯 四十一ヲ
走馬湯 四十一ウ
●卷之中
痲子仁丸 四十四ウ
括蔞薤白白酒湯 三十四ヲ
枳實薤白桂枝湯 三十四ウ
茯苓杏仁甘艸湯 三十五ヲ
薏苡附子湯 三十五ウ
赤石脂丸 三十五ウ
腹滿寒疝宿食 三十六ヲ
附子粳米湯 三十七ウ
大柴胡湯 三十八ヲ
大建中湯 三十八ウ
赤丸 三十九ヲ
當歸生薑羊肉湯 三十九ウ
桂枝湯 四十ウ
柴胡桂枝湯 四十一ヲ
瓜蒂散 四十一ウ
○五臟風寒積聚 四十二ヲ
甘艸乾薑茯苓白朮湯 四十五ヲ

痰飲欬嗽 四十六ヲ
甘遂半夏湯 四十七ヲ
十棗湯 四十八ウ
大青龍湯 四十八ウ
木防己湯 四十九ヲ
木防己加茯苓芒硝湯 四十九ウ
澤瀉湯 四十九ウ
厚朴大黃湯 四十九ウ
小半夏湯 五十ヲ
巳椒藶黃丸 五十ヲ
小半夏加茯苓湯 五十ウ
茯苓散 五十ウ
茯苓飲 五十一ヲ
桂苓五味甘艸湯 五十一ウ
苓甘五味薑辛湯 五十二ヲ
桂苓味甘去桂加薑辛夏湯 五十二ウ
茯苓甘薑味辛夏仁湯 五十二ウ
茯甘薑味辛夏仁黃湯 五十三ヲ
消渴小便利淋 五十三ヲ
支蛤散 五十四ヲ
括蔞瞿麥丸 五十四ウ
蒲灰散 五十四ウ
滑石白魚散 五十四ウ
茯苓戎鹽湯 五十五ヲ
豬苓湯 五十五ヲ
水氣病 五十五ヲ
防巳黃耆湯 五十九ヲ

越婢湯 五十九ウ 防已茯苓湯 六十ヲ
越婢加朮湯 六十ヲ 甘艸麻黄湯 六十ヲ
麻黄附子湯 六十ウ 杏子湯 六十ウ
黄耆桂苓苦酒湯 六十一ヲ 桂枝加黄耆湯 六十一ウ
桂枝去芍藥加麻辛附子湯 六十二ウ 枳朮湯 六十二ウ
○黄疸病 六十三ヲ 茵陳湯 六十五ヲ
消瞿散 六十五ウ 梔子大黄湯 六十五ウ
猪膏髮煎 六十六ヲ 茵陳五苓散 六十六ヲ
大黄消石湯 六十六ヲ 麻黄醇酒湯 六十六ウ
瓜蒂湯 六十六ウ 驚悸吐衄下血胸滿瘀血 六十七ヲ
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 六十七ヲ
半夏麻黄丸 六十八ウ 栢葉湯 六十八ウ
黄土湯 六十八ウ 瀉心湯 六十九ヲ
○嘔吐噦下利 六十九ヲ 茱萸湯 七十ヲ
半夏瀉心湯 七十ウ 黄芩加半夏生薑湯 七十ウ
猪苓散 七十一ヲ 四逆湯 七十一ヲ

小柴胡湯 七十一ウ
大黃甘艸湯 七十二ヲ
文蛤湯 七十二ウ
生薑半夏湯 七十二ウ
橘皮竹茹湯 七十三ヲ
桂枝湯 七十四ウ
桃花湯 七十五ウ
梔子豉湯 七十五ウ
大半夏湯 七十一ウ
茯苓澤瀉湯 七十二ヲ
半夏乾薑散 七十二ウ
橘皮湯 七十三ヲ
四逆湯 七十四ウ
小承氣湯 七十五ヲ
白頭翁湯 七十五ウ
通脉四逆湯 七十六ヲ
紫參湯 七十六ヲ
黃芩湯 七十六ウ
薏苡附子敗醬散 七十七ヲ
王不留行散 七十八ヲ
排膿湯 七十八ウ
跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲 七十九ヲ
雞屎白散 七十九ウ
甘艸粉蜜湯 七十九ウ
烏梅丸 八十ヲ
詞梨勒散 七十六ヲ
瘡癰腸癰浸淫 七十六ウ
大黃牡丹湯 七十七ウ
排膿散 七十八ウ
黃連粉 七十八ウ
蜘蛛散 七十九ウ

卷之下

桂枝茯苓丸 八十一ヲ
當歸芍藥散 八十二ウ
當歸貝母苦參丸 八十二ウ
當歸散 八十三ヲ
婦人産後 八十四ヲ
大承氣湯 八十四ウ
枳實芍藥散 八十五ヲ
婦人妊娠 八十一ヲ
芎歸膠艾湯 八十二ヲ
乾薑人參半夏丸 八十二ウ
葵子茯苓散 八十三ヲ
白朮散 八十三ウ
小柴胡湯 八十四ウ
當歸生薑羊肉湯 八十五ヲ
下瘀血湯 八十五ヲ
竹葉湯 八十六ヲ
白頭翁加甘艸阿膠湯 八十七ヲ
三物黃芩湯 八十七ウ
婦人雜病 八十七ウ
甘艸小麥大棗湯 八十八ウ
瀉心湯 八十九ヲ
土瓜根湯 九十ウ
大黃甘遂湯 九十一ヲ
竹皮大丸 八十六ヲ
半夏厚朴湯 八十八ウ
小青龍湯 八十九ヲ
溫經湯 九十ヲ
旋覆花湯 九十ウ
抵當湯 九十一ウ

礬石丸 九十一ウ
當歸芍藥散 九十一ウ
腎氣丸 九十二ヲ
狼牙湯 九十二ウ
小兒疳蝕齒方 九十二ウ
四時加減柴胡飲 九十三ヲ
三物備急丸 九十三ウ
救卒死方 九十四ウ
紅藍花酒 九十一ウ
小建中湯 九十二ヲ
蛇床子散 九十二ヲ
膏髮煎 九十二ウ
雞瘳 九十三ヲ
長服訶梨勒丸 九十三ウ
紫石寒食散 九十四ヲ
救卒死而壯熱者 九十四ウ

救卒死而目閉者方 九十四ウ
救卒死而張口反折者方 九十五ヲ
救卒死而四肢不收失便者方弁灸 九十五ヲ
救小兒卒死而吐利不知是何病方 九十五ヲ
治尸蹶方 二方 九十五ウ
救卒死客忤方 二方 九十五ウ
救自縊死方 九十六ヲ
療中暍方 九十六ウ
救溺死方 九十七ヲ
治馬墜及一切筋骨損方 九十七ウ
禽獸魚蟲禁忌 九十七ウ
治自死六畜肉中毒 九十九ウ

治食鬱肉漏脯中毒方 九十九ウ
治黍米中藏乾脯食之中毒方 一百ヲ
治食生肉中毒方 一百ヲ
治食六畜鳥獸肝中毒方 一百ヲ
治馬肝毒中人未死方二方 一百ウ
治食馬肉中毒欲死方二方 一百ウ
治食噉蛇牛肉欲死方三方 百一ヲ
治食牛肉中毒方 百一ヲ
治食犬肉不消成病方 百二ヲ
治食鳥獸中箭肉毒方 百三ヲ
治食鱠不化成癥病方一方 百四ヲ
治食魚後食毒雨種煩亂方 百四ヲ
治食鱟鮭魚中毒方 百四ヲ
治食蠑中毒二方 百四ウ
果實菜穀禁忌 百四ウ
治食諸果中毒方 百五ウ
治食諸菌中毒悶亂欲死方 百五ウ
治誤食蜀椒中毒方 百六ヲ

食躁式躁方　百七ウ
治誤食鉤吻殺人解之方　百七ウ
治誤食水蔓菁中毒方　百八ヲ
治食芹菜中龍精毒方　百八ヲ
治食苦瓠中毒方　百八ヲ
治凡飲食中毒方　百九ヲ
貪食食多不消心腹堅滿痛治之方　百九ヲ
金匱要略方目次終

漢張仲景著　晉王叔和撰次

臟腑經絡先後病脉證第一

論十三首
脉證二條

問曰、上工治未病何也、師曰、夫治未病者、見肝之病、知肝傳脾、當先實脾、四季脾王、不受邪、即勿補之、中工不曉相傳、見肝之病、不解實脾、惟治肝也、夫肝之病、補用酸、助用焦苦、益用甘味

此昏殊覺类煩雜混淆旦下合仲景之意者多矣其不合仲景之意者以青批之余不出于仲景之手而其仲景亦多

東洞先生曰臟腑経絡之說非疾病医之美故余家不取之

肝虛當作脾肝

之藥調之、酸入肝、焦苦入心、甘入脾、脾能傷腎、腎氣微弱、則水不行、水不行、則心火氣盛、心火氣盛、則傷肺、肺被傷、則金氣不行、金氣不行、則肝氣盛、故實脾、則肝自愈、此治肝補脾之要妙也、肝虛則用此法、實則不在用之、經曰、虛虛實實、補不足、損有餘、是其義也、餘藏準此、●夫人(沈曰五運陰陽之常氣)稟五常因風氣而生長、風氣雖能生萬物、亦能害萬物、如水(荀子)能浮舟、亦能覆舟、若五臟元眞通

一本無疾字

又 邪之字無也音寤傷也与上捨同

沈 註曰謂外因必須早治也更益王法

暢、人即安和、客氣邪風中人多死、千般疢難、不越三條、一者經絡受邪、入臟腑、爲內所因也、二者四肢九竅、血脉相傳、壅塞不通、爲外皮膚所中也、三者房室金刃蟲獸所傷、以此詳之、病由都盡、若人能養愼、不令邪風干忤經絡、適中經絡、未流傳腑臟、即醫治之、四肢纔覺重滯、即導引吐納鍼灸膏摩、勿令九竅閉塞、更能無犯王法、禽獸(与災同)災傷房室、勿令竭乏、服食節其冷熱苦

苦吳本作若

酸辛甘、不遺形體有衰、病則無由入其腠理、腠者、是三焦通會元眞之處、爲血氣所注、理者、是皮膚臟腑之文理也、●問曰、病人有氣色見於面部、願聞其說、師曰、鼻頭色青、腹中痛、苦冷者死、一云腹中冷、鼻頭色微黑者有水氣、色黃者苦痛者也、胸上有寒、色白者亡血也、設微赤非時者死、其目正圓(目不動也)者痓、不治、又色青爲痛、色黑爲勞、色赤、爲風、色黃者便難、色鮮明者有留飲、●師曰、病

君達云張果匡說云仲景之師長伯祖也南陽之人

吸一作息

金鑑云促字當是遠字遠字當是促字

人語聲寂然、喜驚呼者、骨節間病、語聲噫(噫不出見)噫然不徹者、心膈間病、一作痛、●師曰、息搖肩者、心中堅、息引胸中上氣者、欬、息張口短氣者、肺痿唾沫、●師曰、吸而微數、其病在中焦實也、當下之即愈、虛者不治、在上焦者、其吸促、在下焦者其吸遠、此皆難治、呼吸動搖振振者、不治、●師曰、寸口脈動者、因其王時而動、假令肝王色青、四時各隨其色、肝

色青而反色白、非其時色脉、皆當病○問曰、有未至而至、有至而不至、有至而不去、有至而太過、何謂也、師曰、冬至之後、甲子夜半少陽起、少陽之時、陽始生、天得温和、以未得甲子、天因温和、此爲未至而至也、以得甲子、而天未温和、此爲至而不至也、以得甲子、而天大寒不解、此爲至而不去也、以得甲子、而天温如盛夏五六月時、此爲至而太過也、○師曰、病人脉浮者在前、

金鑑云、寸脉以下十八字文理不須衍字也、血字當是一厥字、

傷寒論成註、引此論病上有諸字、

其病在表、浮者在後、其病在裏、腰痛背強不能行、必短氣而極也、○問曰、經云、厥陽獨行、何謂也、師曰、此爲有陽無陰、故稱厥陽、○問曰、寸脉沉大而滑、沉則爲實、滑則爲氣、實氣相搏、血氣入臟即死、入腑即愈、此爲卒厥、何謂也、師曰、脣口青身冷、爲入臟、即死、如身和汗自出、爲入腑即愈、○問曰、厥脫入臟即死、入腑即愈、何謂也、師曰、非爲一病、百病皆然、譬如浸淫瘡、從口起

名護屋氏註解曰、謂六腑之病此謂微者、此臟腑則稍輕微而已、

流向四肢者可治、從四肢流來入口者不可治、病在外者可治、入裏者即死、●問曰、陽病十八、何謂也、師曰、頭痛項腰脊臂脚掣痛、陰病十八、何謂也、師曰、汝上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急、五臟病各有十八、合爲九十病、人又有六微、微有十八病、合爲一百八病、五勞七傷六極婦人三十六病、不在其中、清邪居上、濁邪居下、大邪中表、小邪中裏、檠飪之邪、從口入者宿食也、

五邪中人、各有法度、風中於前、寒中於暮、濕傷於下、霧傷於上、風令脉浮、寒令脉急、霧傷皮膚、濕流關節、食傷脾胃、極寒傷經、極熱傷絡、●問曰、病有急當救裏救表者、何謂也、師曰、病醫下之、續得下利清穀不止、身體疼痛者、急當救裏、後身體疼痛清便自調者、急當救表也、●夫病痼疾加以卒病、當先治其卒病、後乃治其痼疾也、●師曰、五臟病、各有得者愈、五臟病、各有所

惡、各隨其所不喜者爲病、病者素不應食而反暴思之、必發熱也、●夫諸病在臟欲攻之、當隨其所得而攻之、如渴者與猪苓湯、餘皆倣此、

痙濕暍病脉證治第二　論一首　脉證十二條　方十一首　一作痙　餘同

太陽病、發熱無汗、反惡寒者、名曰剛痙、●太陽病、發熱汗出、而不惡寒、名曰柔痙、●太陽病、發熱脉沉而細者、名曰痙、爲難治、●太陽病、發汗太多、因致痙、●夫風病、下之則痙、復發汗必拘急、●瘡家雖身疼痛、不可發汗、汗出則痙、●病者身熱足寒、頸項強急、惡寒、時頭熱面赤、目赤、獨頭動搖、卒口噤、背反張者、痙病也、若發其汗者、寒濕相得、其表益虛、即惡寒甚、發其汗已、其脉如蛇、一云其脉如故、反伏、弦者痙、●夫痙脉、按之緊如弦、直上下行、一作築築而弦、脉經云脉伏緊直上下●痙病有灸瘡、難治、●太陽病其證備、身體強几几然、脉反

沉遲、此爲痓、括樓桂枝湯主之、●括樓桂枝湯方、括蔞根二兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘艸二兩 生薑三兩 大棗十二枚 右六味、以水九升、煮取三升、分温三服、取微汗、汗不出、食頃、啜熱粥發之、●太陽病、無汗而小便反少、氣上衝胸、口噤不得語、欲作剛痓、葛根湯主之、●葛根湯方、葛根四兩 麻黃三兩 去節 桂二兩 芍藥二兩 甘艸二兩 生薑三兩 大棗十二枚 右七味、以水一斗、先煮

麻黃葛根、減二升、去沫、內諸藥、煮取三升、去滓、温服一升、覆取微似汗、不須啜粥、餘如桂枝湯法、將息及禁忌、●痓爲病、一本痓字上有剛字 胸滿口噤、卧不著席、脚攣急、必齘齒、可與大承氣湯、●大承氣湯方、大黃四兩 酒洗 厚朴半斤 炙 枳實五枚 炙 芒硝三合 右四味、以水一斗、先煮二物、取五升、去滓、內大黃、煮取二升、去滓、內芒硝、更上火、微一二沸、分温再服、得下止服、●太陽病、關節疼痛

而煩、脉沉而細一作者、此名濕痺、玉函云中濕濕痺之候、小便不利大便反快、但當利其小便●濕家之爲病、一身盡疼、一云疼煩、發熱、身色如熏黃也、●濕家、其人但頭汗出、背强、欲得被覆向火、若下之早則噦、或胸滿、小便不利、一云利舌上如胎者、以丹田有熱、胸上有寒、渴欲得飲、而不能飲、則口燥煩也、●濕家下之、額上汗出、微喘小便利一云不利者死、若下利不止者亦死、●風濕相搏、一身盡疼痛、法當汗出而解、值天陰雨不止、醫云此可發汗、汗之病不愈者何也、蓋發其汗、汗大出者、但風氣去濕氣在、是故不愈也、若治風濕者、發其汗、但微微似欲出汗者、風濕俱去也、●濕家病、身疼發熱、面黃而喘、頭痛鼻塞而煩、其脉大、自能飲食、腹中和無病、病在頭中寒濕、故鼻塞、內藥鼻中則愈、脉經云病人喘而無濕家病以下至而喘十一字●濕家身煩疼、可與麻黃加朮湯、發其汗爲

宜、慎不可以火攻之、●麻黃加朮湯方、麻黃三兩去節 桂枝二兩去皮 甘艸二兩炙 杏仁七十箇去皮尖 白朮四兩 右五味、以水九升、先煮麻黃、減二升、去上沫、內諸藥、煮取二升半、去滓、溫服八合、覆取微似汗、病者一身盡疼、發熱日晡所劇者、名風濕、此病、傷於汗出當風、或久傷取冷所致也、可與麻黃杏仁薏苡甘艸湯、●麻黃杏仁薏苡甘艸湯方、麻黃去節半兩 湯泡 甘艸二兩炙 薏苡仁半兩 杏仁十箇去皮尖 白朮七錢 黃耆一兩一分去蘆 右

去皮尖炒 右剉麻豆大、每服四錢七、水一盞半、煮八分、去滓、溫服、有微汗、避風、●風濕脈浮身重、汗出惡風者、防已黃耆湯主之、●防已黃耆湯方 防已一兩 甘艸半兩炙 白朮七錢半 黃耆一兩一分去蘆 右剉麻豆大、每抄五錢匕、生薑四片、大棗一枚、水一盞半、煎八分、去滓溫服、良久再服、喘者加麻黃半兩、胃中不和者加芍藥三分、氣上衝者加桂枝三分、下有陳寒者加細辛三分、服後當如蟲

行皮中、從腰下如水、後坐被上、又以一被繞腰以下、温令微汗差、●傷寒八九日、風濕相搏、身體疼煩不能自轉側、不嘔不渴、脉浮虚而濇者、桂枝附子湯主之、若大便堅小便自利者、去桂加白朮湯主之、●桂枝附子湯方、桂枝去皮四兩　生薑三兩　甘艸二兩炙　大棗十二枚擘　右五味、以水六升、煮取二升、去滓、分温三服、○白朮附子湯方、白朮二兩　附子一枚半炮去皮　甘艸一兩炙　生薑一兩半切　大棗六枚擘　右五味、以水三升、煮取一升、去滓、分温三服、一服覺身痺、半日許再服、三服都盡、其人如冒狀、勿怪、即是朮附並走皮中、逐水氣未得除故耳、●風濕相搏、骨節疼煩、掣痛不得屈伸、近之則痛劇、汗出短氣、小便不利、惡風不欲去衣、或身微腫者、甘艸附子湯主之、○甘艸附子湯方　甘艸二兩炙　附子二枚炮去皮　白朮二兩　桂枝四兩去皮　右四味、以水六升、煮取三升、去

制字唱列反曳也之滯

此字疑衣字乎趣气

傷寒論疼煩二字顛倒

淬、溫服一升、日三服、初服得微汗則解、能食汗出復煩者、服五合、恐一升多者、服六七合爲妙、

● 太陽中暍、發熱惡寒、身重而疼痛、其脉弦細芤遲、小便已、洒洒然毛聳、手足逆冷、小有勞、身即熱、口前開、板齒燥、若發其汗、則其惡寒甚、加溫針、則發熱甚、數下之、則淋甚、● 太陽中熱者暍是也、汗出惡寒、身熱而渴、白虎加人參湯主之、○白虎人參湯方、知母六兩 石膏一斤 甘艸二兩 粳米六合 人參三兩 右五味、以水一斗、煮米熟湯成、去滓、溫服一升、日三服、● 太陽中暍、身熱疼重、而脉微弱、此以夏月傷冷水、水行皮中所致也、一物瓜蒂湯主之、● 一物瓜蒂湯方、瓜蒂二七箇 右剉、以水一升、煮取五合、去滓、頓服

百合狐惑陰陽毒病證治第三　論一首　脉證三條

方十　二首

論曰、百合病者、百脉一宗、悉致其病也、意欲食、

淅 音析 寒驚良

千金微作發

復不能食、常默然、欲卧不能卧、欲行不能行、飲食或有美時、或有不用聞食臭時、如寒無寒、如熱無熱、口苦小便赤、諸藥不能治、得藥則劇吐利、如有神靈者、身形如和、其脉微數、每溺時、頭痛者、六十日乃愈、若溺時頭不痛淅然者、四十日愈、若溺快然但頭眩者、二十日愈、其證或未病而預見、或病四五日而出、或病二十日、或一月微見者、各隨證治之、●百合病發、汗後者、

外臺滑石上有百合二字

百合知母湯主之、●百合知母湯方、百合七枚擘 知母三兩切 右先以水洗百合、漬一宿、當白沫出、去其水、更以泉水二升、煎取一升、去滓、別以泉水二升、煎知母、取一升、去滓、後合和、煎取一升五合、分温再服、●百合病、下之後者、滑石代赭湯主之、●滑石代赭湯方、百合七枚擘 滑石三兩碎綿裹 代赭石如彈丸大一枚碎綿裹 右先以水洗百合、漬一宿、當白沫出、去其水、更以泉水二升、煎取一升、

去滓、別以泉水二升、煎滑石代赭、取一升、去滓後合和、重煎取一升五合、分温服、○百合病、吐之後者、用後方主之、○百合雞子湯方、百合七枚　擘雞子黄一枚　右先以水洗百合、漬一宿、當白沫出、去其水、更以泉水二升、煎取一升、去滓、內雞子黄攪勻、煎五分温服、●百合病、不經吐下發汗、病形如初者、百合地黄湯主之、○百合地黄湯方、百合七枚　擘生地黄汁二升　右以水洗百合、漬一宿、當白沫出、去其水、更以泉水二升、煎取一升、去滓、內地黄汁、煎取一升五合、分温再服、中病勿更服、大便當如漆、●百合病一月不解、變成渴者、百合洗方主之、○百合洗方、右以百合一升、以水一斗、漬之一宿、以洗身、洗已、食煮餅、勿以鹽豉也、●百合病、渴不差者、用後方主之、●括蔞牡蠣散方、括蔞根　牡蠣熬等分　右爲細末、飲服方寸匕、日三服、●百合病、變發熱

脉經陽法作陰陰法作陽法

病源目下有掌字

者、一作發寒熱百合滑石散主之、○百合滑石散方、百合一兩 滑石三兩 右爲散、飲服方寸匕、日三服、當微利者止服、熱則除、○百合病、見於陰者、以陽法救之、見於陽者、以陰法救之、見陽攻陰、復發其汗、此爲逆、見陰攻陽、乃復下之、此亦爲逆、○狐惑之爲病、狀如傷寒、默默欲眠、目不得閉、臥起不安、蝕於喉爲惑、蝕於陰爲狐、不欲飲食、惡聞食臭、其面目乍赤乍黑乍白、蝕於上部則聲嗄、一作嗌 甘艸瀉心湯主之、○甘艸瀉心湯方、甘艸四兩 黃芩 人參 乾薑各三兩 黃連一兩 大棗十二枚 半夏半斤 右七味、水一斗、煮取六升、去滓再煎、溫服一升、日三服、○蝕於肛者、雄黃熏之、雄黃、右一味爲末、筒瓦二枚合之、燒向肛熏之、脉經云病人或從呼吸止蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上爲惑蝕下爲狐狐惑病者猪苓散主之 病者脉數、無熱微煩、默默但欲臥、汗出、初得之三

本艸綱目三升下有水字

四日、目赤如鴆眼、七八日目四眥一本此有黃字黑、若能食者、膿已成也、赤豆當歸散主之、○赤小豆三升浸令芽出曝乾當歸十兩右二味、杵爲散、漿水服方寸匕、日三服、○陽毒之爲病、面赤斑斑如錦文、咽喉痛唾膿血、五日可治、七日不可治、升麻鱉甲湯主之、○陰毒之爲病、面目青、身痛如被杖、咽喉痛、五日可治、七日不可治、升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之、○升麻鱉甲

脈經弦緊下有數字千金同

湯方、升麻二兩當歸一兩蜀椒炒去汗甘艸二兩鱉甲手指大一片炙雄黃半兩研右六味、以水四升、煮取一升、頓服之、老小再服取汗、肘後千金方陽毒有桂陰毒用甘艸湯無雄黃

瘧病脈證幷治第四　證二條　方六首

師曰、瘧脈自弦、弦數者多熱、弦遲者多寒、弦小緊者下之差、弦遲者可温之、弦緊者可發汗針灸也、浮大者可吐之、弦數者風發也、以飲食消

息止之、〇病瘧以月一日發、當以十五日愈、設不差、當月盡解、如其不差、當云何、師曰、此結爲癥瘕、名曰瘧母、急治之、宜鼈甲煎丸、〇鼈甲煎丸方、鼈甲十二分炙　烏扇三分燒　黃芩三分　柴胡六分　鼠婦三分熬　乾薑三分　大黃三分　芍藥五分　桂枝三分　葶藶一分熬　石韋三分去毛　厚朴三分　牡丹五分去心　瞿麥二分　紫葳三分　半夏一分　人參一分　廣蟲五分　阿膠三分炙　蜂窠四分炙　赤消十二分　蜣螂六分熬　桃仁二分右二十三味、爲末、取鼈甲下灰一斗、清酒一斛五斗浸灰、候酒盡一半、著鼈甲於中、煮令泛爛如膠漆、絞取汁、內諸藥、煎爲丸、如梧子大、空心服七丸、日三服、千金方用鼈甲十二枚一分蜚蟲五分無鼠婦赤消二味以鼈甲煎和諸藥爲丸　〇師曰、陰氣孤絕、陽氣獨發、則熱而少氣煩冤、手足熱而欲嘔、名曰癉瘧、若但熱不寒者、邪氣內藏於心、外舍分肉之間、令人消鑠脫肉、●溫瘧者、其脉如平、

外臺云寒多者名牝癘牡蠣湯主之牡牝之誤也

千金二合作六合

一本蜀漆下燒字作洗外臺癘發時服一錢匕七字在上半錢下

身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎加桂枝湯主之、○白虎加桂枝湯方、知母六兩甘艸二兩石膏一斤粳米二合桂枝去皮三兩右剉、每五錢、水一盞半、煎至八分、去滓溫服、汗出卽愈、○瘧多寒者、名曰牡瘧、蜀漆散主之、○蜀漆散方、蜀漆燒去腥雲母燒二日龍骨等分右三味、杵爲散、未發前、以漿水服半錢、溫瘧加蜀漆半分、臨發時、服一錢匕、一方雲母作雲實

附外臺秘要方○牡蠣湯、治牡瘧、牡蠣四兩熬麻黃去節四兩甘艸二兩蜀漆三兩右四味、以水八升、先煮蜀漆麻黃、去上沫、得六升、內諸藥、煮取二升、溫服一升、若吐則勿更服、○柴胡去半夏加栝蔞湯、治瘧病發渴者、亦治勞瘧、柴胡八兩人參甘艸各三兩黃芩四兩生薑二兩括蔞根大棗十二枚右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓再煎、取三升、溫服一升、

日三服、●柴胡桂薑湯、治瘧寒多微有熱、或但寒不熱、服一劑二兩括蔞根四兩黃芩三兩牡蠣三兩甘艸炙二兩右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓再煎、取三升、温服一升、日三服、初服微煩、復服汗出便愈、

○中風歷節病脉證并治第五　論一首　脉證三條　方十二首

夫風之爲病、當半身不遂、或但臂不遂者、此爲痺、脉微而數、中風使然、●寸口脉浮而緊、緊則爲寒、浮則爲虛、寒虛相搏、邪在皮膚、浮者血虛、絡脉空虛、賊邪不瀉、或左或右、邪氣反緩、正氣即急、正氣引邪、喎僻不遂、邪在於絡、肌膚不仁、邪在於經、即重不勝、邪入於腑、即不識人、邪入於臟、舌即難言、口吐涎、●候氏黑散、治大風四肢煩重、心中惡寒不足者、外臺治風癲　菊花四十分　白

术十分細辛三分茯苓三分牡蠣三分桔梗八分
防風十分人參三分礬石三分黃芩五分當歸
三分乾薑三分芍藥三分桂枝三分右十四味、
杵爲散、酒服方寸匕、日一服、初服二十日、溫酒
調服、禁一切魚肉大蒜、常宜冷食六十日止、即
藥積在腹中不下也、熱食即下矣、冷食自能助
藥力、○寸口脉遲而緩、遲則爲寒、緩則爲虛、榮
緩則爲亡血、衛緩則爲中風、邪氣中經、則身痒

一木四錢字並作分

而癮疹、心氣不足、邪氣入中、則胸滿而短氣、○
風引湯除熱、癲癎、大黃 乾薑 龍骨 各四兩 桂
枝三兩 甘艸 牡蠣 各二兩 寒水石 滑石 赤
石脂 白石脂 紫石英 石膏 各六兩 右十二
味、杵麤篩、以韋囊盛之、取三指撮、井花水三升、
煮三沸、溫服一升、治大人風引少小驚癎瘈瘲
巢氏云脚氣日數十發醫所不療除熱方
宜風引湯○防已地黃湯、治病如狂狀、妄行
獨語不休、無寒熱、其脉浮、防已一錢 桂枝三錢

防風三錢甘艸一錢右四味以酒一盃漬之一宿絞取汁更絞地黃汁和分再服●頭風以銅器盛其汁一枚鹽等分右二味爲散沐了摩散方大附子一枚炮以方寸匕已摩疾上令藥力行●寸口脉沉而弱沉卽主骨弱卽主筋沉卽爲腎弱卽爲肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節●趺陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出●少陰脉浮而弱弱則血不足浮則爲風風血相搏卽疼痛如掣●盛人脉濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致●諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐桂枝芍藥知母湯主之●桂枝芍藥知母湯方桂枝四兩芍藥三兩甘艸二兩麻黃二兩生薑五兩白朮五兩知母四兩防風四兩附子二兩炮右九味以水七升煮取二升温服七合日三

千金已字無脉經以弱即爲肝接下文味酸則傷筋遍爲一章汗出以下十八字無

尪烏光反弱也瘣也

服、●味酸則傷筋、筋傷則緩、名曰泄、鹹則傷骨、骨傷則痿、名曰枯、枯泄相搏、名曰斷泄、榮氣不通、衛不獨行、榮衛俱微、三焦無所御、四屬斷絶、身體羸瘦、獨足腫大、黃汗出、脛冷、假令發熱、便爲歷節也、●病歷節、不可屈伸、疼痛、烏頭湯主之、●烏頭湯方、治脚氣疼痛、不可屈伸、麻黃 芍藥 黃耆 各三兩 甘艸三兩 川烏五枚 炙 咀 以一升即出烏頭 右五味、㕮咀四味、以水三升、煮取一升、去滓、內蜜煎中、更煎之、服七合、不知、盡服之、○

鰲石湯、治脚氣冲心、鰲石二兩右一味、以漿水一斗五升、煎三五沸、浸脚良、

附方古今錄驗續命湯、治中風痱、身體不能自收、口不能言、冒昧不知痛處、或拘急不得轉側、姚云與大續命同無治婦人麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏 乾薑 甘艸 各二兩 芎藭一兩 杏仁四十枚 右九味、以水一斗、煮

一本五錢字並作分方後同

取四升、温服一升、當小汗、薄覆脊、憑几坐、汗出則愈、不汗更服、無所禁、勿當風、并治但伏不得卧、欬逆上氣、面目浮腫、○千金三黄湯、治中風手足拘急、百節疼痛、煩熱心亂、惡寒經日不欲飲食、麻黄五錢　獨活四錢　細辛二錢　黄芩三錢　右五味、以水六升、煮取二升、分温三服、一服小汗、二服大汗、心熱加黄蘗二錢、腹滿加枳實一枚、氣逆加人參三錢、悸加牡蠣三錢、渴加括蔞根三錢、先有寒加附子一枚半炮去皮、甘艸一兩炙　右三味剉、每五錢七、水盞半、煎七分、去滓温服、○近効方、术附湯、治風虚頭重眩苦極、不知食味、暖肌補中益精氣、白术二兩　附子一枚半炮去皮　甘艸一兩炙　右三味剉、每五錢七、水盞半、煎七分、去滓温服、○崔氏八味丸、治脚氣上入小腹不仁、乾地黄八兩　山茱萸　薯蕷各四兩　澤瀉　茯苓　牡丹皮各三兩　桂枝　附子炮各一兩　右八味、末之煉

蜜和、九梧子大、酒下十五九、日再服○千金方、越婢加朮湯、治肉極、熱則身體津脫、腠理開、汗大泄厲風氣、下焦脚弱、麻黃六兩石膏半斤生薑三兩甘艸二兩白朮四兩大棗十五枚右六味、以水六升、先煮麻黃去上沫、內諸藥、煮取二升、分温三服、惡風加附子一枚炮、

血痺虛勞病脉證并治第六 論一首 脉證九條 方九首

問曰、血痺病、從何得之、師曰、夫尊榮人、骨弱肌膚盛重、因疲勞汗出、臥不時動搖、加被微風、遂得之、但以脉自微濇在寸口、關上小緊、宜鍼引陽氣、令脉和、緊去則愈○血痺陰陽俱微、寸口關上微、尺中小緊、外證身體不仁、如風痺狀、黃著桂枝五物湯主之○黃著桂枝五物湯方、黃著三兩芍藥三兩桂枝三兩生薑六兩大棗十二枚右五味、以水六升、煮取二升、温服七合、日三

脉經頌下有熱字

服、一方有人參●男子面色薄者、主渴及亡血、卒喘悸、脉浮勞、●男子面色薄者、主渴及亡血、卒喘悸、脉浮者、裏虛也、●男子脉虛沉弦、無寒熱、短氣裏急、小便不利、面色白、時目瞑無所見、小腹滿、此爲勞使之然、●勞之爲病、其脉浮大、手足煩、春夏劇、秋冬瘥、陰寒精自出、酸削不能行、●男子脉浮弱而濇、爲無子、精氣清冷、一作冷○天失精家、小腹弦急、陰頭寒、目眩、一作目髮落、脉極虛芤遲、爲清穀亡血失精、○脉得諸芤動微緊、男子失精、女子夢交、桂枝龍骨牡蠣湯主之、●桂枝加龍骨牡蠣湯方小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白微附子各三分故曰二加

龍骨 牡蠣各三兩 右七味、以水七升、煮取三升、分温三服、○天雄散方、天雄三兩白朮八兩桂枝六兩廣雅曰一歲爲烏喙三歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄龍骨三兩右四味、杵爲散、酒服半錢匕、日三服、不知稍增之、○男子平人、脉虛弱細

爲則曰天雄散不載主治今考時珍本中載此方言仲景治男子失精方則時珍所見之本在此註而今本脱予或男子失精夢交主之加龍骨牡蠣一主之下脱天雄亦主之六字予又笑則以時珍之見不笑言來附失精夢交也今從千本中治失精小便不利信

而有徵夫失精水病故仲景用天雄附子而焉逐水

微者、善盜汗也、●人年五六十、其病脉大者、痺俠背行、苦腸鳴、馬刀俠癭者、皆爲勞得之、⊙脉沉小遲、名脫氣、其人疾行則喘喝、手足逆寒、腹滿甚則溏泄、食不消化也、⊙脉弦而大、弦則爲減、大則爲芤、減則爲寒、芤則爲虛、虛寒相搏、此名爲革、婦人則半産漏下、男子則亡血失精、●虛勞裏急悸衄腹中痛、夢失精、四肢痠痛、手足煩熱、咽乾口燥、小建中湯主之、○小建中湯方、

桂枝三兩去皮 甘艸三兩炙 大棗十二枚 芍藥六兩 生薑三兩 膠飴一升

右六味、以水七升、煮取三升、去滓、內膠飴、更上微火、消解、溫服一升、日三服、嘔家不可用建中湯以甜故也○千金療男女因積冷氣滯或大病後不復常苦四肢沉重骨肉痠疼吸吸少氣行動喘乏胷滿氣急腰背強痛心中虛悸咽乾脣燥面體少色或飲食無味脇肋腹脹頭重不舉多臥少起甚者積年輕者百日漸致瘦弱五藏氣竭則難可復常六脉俱不足虛寒乏氣少腹拘急羸瘠百病名●虛勞裏急、諸不足、黃耆建中湯主之、於小建中湯內加黃耆一兩半餘依上法又有人參二兩

○氣短胸滿者加生薑腹滿者去棗加茯苓一兩半及療肺虛損不足補氣加半夏三兩○虛勞諸不足風氣百疾薯蕷丸方　薯蕷三十分　當歸　桂枝　乾地黃　豆黃卷各十分　甘艸二十八分　人參十分　麴　芎窮　芍藥　白朮　麥門冬　杏仁各六分　柴胡　桔梗　茯苓各五分　阿膠七分　乾薑三分　白斂二分　防風六分　大棗百枚爲膏　右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一丸一百丸爲劑○虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之○酸棗湯方　酸棗仁二升　甘艸一兩　知母二兩　茯苓二兩　芎藭二兩○深師有生薑二兩　右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服○五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃䗪蟲丸主之○大黃

蠐螬丸方、大黃十分蒸 黃芩二兩 甘艸三兩 桃仁一升杏仁一升芍藥四兩 乾地黃十兩 乾漆一兩 蝱蟲一升水蛭百枚 蠐螬一升 蠐螬半升右十二味、末之、煉蜜爲丸、小豆大、酒飲服五丸、日三服、

附方●千金翼炙甘艸湯、一云復脉湯治虛勞不足、汗出而悶、脉結、悸、行動如常、不出百日、危急者十一日死、甘艸四兩炙 桂枝 生薑各三兩 麥門冬半升人參 阿膠各二兩 麻仁半升 棗三十枚 生地黃一斤右九味、以酒七升水八升、先煮八味、取三升、去滓內膠消盡、溫服一升、日三服、●肘後獺肝散、治冷勞、又主鬼疰一門相染、●獺肝一具、炙乾末之、水服方寸匕、日三服、

肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證治第七

論三首 脉證四條 方十五首

問曰熱在上焦者、因欬爲肺痿、肺癰之病、從何得之、師曰、或從汗出、或從嘔吐、或從消渴小便利數、或從便難、又被快藥下利、重亡津液故得之、○問曰、寸口脈數、其人欬、口中反有濁唾涎沫者何、師曰、爲肺癰之病、若口中辟辟燥、欬即胸中隱隱痛、脈反滑數、此爲肺癰、欬唾膿血、脈數、虛者爲肺痿、數實者爲肺癰、○問曰、病欬逆、脈之、何以知此爲肺癰、當有膿血、吐之則死、其

脈何類、師曰、寸口脈微而數、微則爲風、數則爲熱、微則汗出、數則惡寒、風中於衛、呼氣不入、熱過於榮、吸而不出、風傷皮毛、熱傷血脈、風舍於肺、其人則欬、口乾喘滿、咽燥不渴、多唾濁沫、時時振寒、熱之所過、血爲之凝滯、畜結癰膿、吐如米粥、始朋可捋、膿成則死、○上氣、面浮腫、肩息、其脈浮大不治、又加利尤甚、○上氣喘而躁者、屬肺脹、欲作風水、發汗則愈、○肺痿、吐涎沫而

不欬者、其人不渴、必遺尿小便數、所以然者、以上虛不能制下故也、此爲肺中冷、必眩多涎唾、甘艸乾薑湯以温之、若服湯已渴者、屬消渴、○甘艸乾薑湯方、甘艸四兩炙 乾薑二兩炮 右㕮咀、以水三升、煮取一升五合、去滓、分温再服、○欬而上氣、喉中水雞聲、射干麻黄湯主之、○射干麻黄湯方、射干十三枚一云三兩 麻黄四兩 生薑四兩細辛 紫菀 款冬花 各三兩 五味子半升 大棗七枚 半夏大者洗八枚一法半升 右九味、以水一斗二升、先煮麻黄兩沸、去上沫、内諸藥、煮取三升、分温三服、○欬逆上氣、時時唾濁、但坐不得眠、皂莢丸主之、○皂莢丸方、皂莢八兩刮去皮用酥炙 右一味末之、蜜丸梧子大、以棗膏和、湯服三丸、日三、夜一服、○欬而脉浮者、厚朴麻黄湯主之、○厚朴麻黄湯方、厚朴五兩 麻黄四兩 石膏如雞子大 杏仁半升半夏半升 乾薑二兩 細辛二兩 小麥一升 五味子

千金眠作臥

外臺云上氣脉沉

外臺著字無

半升右九味、以水一斗二升、先煮小麥熟、去滓內諸藥、煮取三升、温服一升、日三服、●脉沉者、澤漆湯主之、●澤漆湯方、半夏半升紫參五兩一作紫菀澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升生薑五兩白前五兩甘艸黄芩人參桂枝各三兩右九味、㕮咀、內澤漆汁中、煮取五升、温服五合、至夜盡、●大逆上氣咽喉不利、止逆下氣者、麥門冬湯主之、○麥門冬湯方、麥門冬七升半夏一升人參二兩甘艸二兩粳米三合大棗十二枚右六味、以水一斗二升、煮取六升、温服一升、日三夜一服、●肺癰喘不得臥、葶藶大棗瀉肺湯主之、●葶藶大棗瀉肺湯方、葶藶熬令黄色搗如彈丸大棗十二枚右先以水三升、煮棗取二升、去棗內葶藶、煮取一升、頓服、●欬而胸滿、振寒、脉數、咽乾不渴、時出濁唾腥臭、久久吐膿如米粥者、爲肺癰、桔梗湯主之、●桔梗湯方、亦治血痺桔梗一兩甘艸二兩右二

味、以水三升、煮取一升、分温再服、則吐膿血也、
●欬而上氣、此爲肺脹、其人喘、目如脫狀、脉浮大者、越婢加半夏湯主之、●越婢加半夏湯方、麻黄六兩　石膏半斤　生薑三兩　大棗十五枚　甘艸二兩　半夏半升　右六味、以水六升、先煮麻黄去上沫、内諸藥、煮取三升、分温三服、●肺脹、欬而上氣、煩躁而喘、脉浮者、心下有水、小青龍加石膏湯主之、〇小青龍加石膏湯方、千金證治同外更加嗽下

痛引鉄盆　麻黄　芍藥　桂枝　細辛　甘艸　乾薑各三兩　五味子　半夏各半升　石膏二兩　右九味、以水一斗、先煮麻黄去上沫、内諸藥、煮取三升、强人服一升、羸者減之、日三服、小兒服四合、
附方●外臺炙甘艸湯、治肺痿涎唾多、心中温温液液者、方見虚勞中
●千金甘艸湯、甘艸二兩　右一味、以水三升、煮減半、分温三服、●千金生薑甘艸湯、治肺痿、欬唾涎沫不止、咽燥而渴、

生薑五兩人參三兩甘艸四兩大棗十五枚右
四味、以水七升、煮取三升、分温三服、●千金
桂枝去芍藥加皂莢湯、治肺痿吐涎沫、桂枝
生薑各三兩甘艸二兩大棗十枚皂莢二枚去皮子炙
焦右五味、以水七升、微微火煮、取三升、分温
三服、●外臺桔梗白散、治欬而胸滿、振寒脈
數、咽乾不渴、時出濁唾腥臭、久久吐膿如米
粥者、爲肺癰、桔梗貝母各三分巴豆一分去皮熬研
如脂右三味爲散、強人飲服半錢匕、羸者減之、
病在膈上者、吐膿血、膈下者瀉出、若下多不
止、飲冷水一盃則定、●千金葶藶湯、治欬有
微熱煩滿胸中甲錯、是爲肺癰、葶藶二升熬
苡仁半升桃仁五十枚瓜瓣半升右四味、以水
一斗、先煮葶藶、得五升、去滓內諸藥、煮取二
升、服一升、再服當吐如膿、●肺癰胸滿脹、一
身面目浮腫、鼻塞清涕出、不聞香臭酸辛、欬

逆上氣、喘鳴迫塞、葶藶大棗瀉肺湯主之、方見上三日一劑可至三四劑此先服小青龍湯一劑乃進小青龍方見欬嗽門中

奔豚氣病脈證治第八　論二首　方三首

師曰、病有奔豚、有吐膿、有驚怖、有火邪、此四部病、皆從驚發得之、●師曰、奔豚病、從小腹起、上衝咽喉、發作欲死、復還止、皆從驚恐得之、●奔豚氣、上衝胸腹痛、往來寒熱、奔豚湯主之、●奔豚湯方、甘艸芍藥　當歸各二兩　半夏四兩　黃芩二兩　生葛五兩　芍藥二兩　生薑四兩　甘李根白皮一升　右九味、以水二斗、煮取五升、溫服一升、日三、夜一服、●發汗後、燒針令其汗、針處被寒、核起而赤者、必發貴豚、氣從小腹上至心、灸其核上各一壯、與桂枝加桂湯主之、●桂枝加桂湯方、桂枝五兩　芍藥三兩　甘艸三兩　生薑三兩　大棗十二枚　右五味、以水七升、微火煮取三升、去滓、溫服一升、●發汗後、臍下悸者、欲作貴豚、狀

苓桂枝甘艸大棗湯主之●茯苓桂枝甘草大棗湯方、茯苓半斤甘艸二兩大棗十五枚桂枝四兩炙

右四味、以甘爛水一斗、先煮茯苓、減二升、內諸藥、煮取三升、去滓、溫服一升、日三服、甘爛水法置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

胸痺心痛短氣病脈證治第九

論一首　方十首　脈證一條

師曰、夫脈當取太過不及、陽微陰弦、即胸痺而痛、所以然者、責其極虛也、今陽虛知在上焦、所以胸痛心痛者、以其陰弦故也●平人無寒熱、短氣不足以息者實也●胸痺之病、喘息欬唾、胸背痛、短氣、寸口脈沉而遲、關上小緊數、栝蔞薤白白酒湯主之●括蔞薤白白酒湯方、括蔞實一枚薤白半升白酒七升右三味、同煮取二升、分溫再服●胸痺不得臥、心痛徹背者、括蔞薤白半夏湯主之●括蔞薤白半夏湯方、括蔞

實一枚薤白三兩半夏半升白酒一斗右四味、同煮取四升、温服一升、日三服、●胸痺心中痞、留氣結在胸、胷滿脇下逆搶心、枳實薤白桂枝湯主之、人參湯亦主之、●枳實薤白桂枝湯方、枳實四枚厚朴四兩薤白半斤桂枝一兩括蔞一枚搗右五味、以水五升、先煮枳實厚朴、取二升、去滓、內諸藥、煮數沸、分温三服、●人參湯方、人參甘艸乾薑白朮各三右四味、以水八

升、煮取三升、温服一升、日三服、○胸痺、胸中氣塞短氣、茯苓杏仁甘艸湯方、茯苓三兩杏仁五十箇之、●茯苓杏仁甘艸湯方、茯苓三兩杏仁五十箇甘艸一兩右三味、以水一斗、煮取五升、温服一升、日三服、不差更服、●橘枳薑湯方、橘皮一斤枳實三兩生薑半斤右三味、以水五升、煮取二升、分温再服、肘後千金云治胸痺胸中幅幅如滿噎塞習習如癢喉中澁燥唾沫●胸痺緩急者、薏苡附子散主之、●薏苡附子

散方、慧苡仁十五兩　大附子十枚炮　右二味、杵爲散、服方寸匕、日三服、○心中痞諸逆心懸痛、桂枝生薑枳實湯主之、○桂薑枳實湯方、桂枝　生薑各三兩　枳實五枚　右三味、以水六升、煮取三升、分温三服、○心痛徹背、背痛徹心、烏頭赤石脂丸主之、○赤石脂丸方、蜀椒一兩一法二分　烏頭一分炮　附子半兩炮一法一分　乾薑一兩一法一分　赤石脂一兩一法二分　右五味、末之、蜜丸如梧子大、先食服一丸、日三服、

千金狼牙作狼毒

不知稍加服、○九痛丸、治九種心痛、附子三兩炮　生狼牙一兩　巴豆一兩去皮心人參　乾薑　吳茱萸各一兩　右六味、末之、煉蜜丸、如梧子大、酒下、强人初服三丸、日三服、弱者二丸、兼治卒中惡、腹脹痛、口不能言、又治連年積冷流注、心胸痛、並冷衝上氣、落馬墜車血疾等、皆主之、忌口如常法、

腹滿寒疝宿食病脉證治第十　論一首　脉證十

六條
方十五首

脈經云肢一作脚

趺陽脉微弦、法當腹滿、不滿者、必便難、兩胠疼痛、此虛寒從下上也、當以溫藥服之、●病者腹滿、按之不痛爲虛、痛者爲實、可下之、舌黃未下者、下之黃自去、●腹滿時減、復如故、此爲寒、當與溫藥、○病者痿黃、躁而不渴、胸中寒實、而利不止者死、○寸口脉弦者、卽脇下拘急而痛、其人嘔嘔惡寒也、○夫中寒家、喜欠、其人清涕出、發熱色和者善嚏、○中寒、其人下利、以裏虛也、欲嚏不能、此人胠中寒、一云痛●夫瘦人繞臍痛、必有風冷、穀氣不行、而反下之、其氣必衝、不衝者、心下則痞也、○病腹滿、發熱十日、脉浮而數、飲食如故、厚朴七物湯主之、●厚朴七物湯方、

厚朴 半斤 甘州 大黃 各三兩 大棗 十枚 枳實 五枚
桂枝 二兩 生薑 五兩 右七味、以水一斗、煮取四升、溫服八合、日三服、嘔者、加半夏五合、下利去

大黃、寒多者、加生薑至半斤、○腹中寒氣雷鳴
切痛、胸脇逆滿嘔吐、附子粳米湯主之、○附子
粳米湯方、附子一枚炮 半夏半升甘艸一兩大棗
十枚 粳米半升右五味、以水八升、煮米熟湯成、
去滓、溫服一升、日三服、○痛而閉者、厚朴三物
湯主之、○厚朴三物湯方、厚朴八兩大黃四兩
枳實五枚 右三味、以水一斗二升、先煮二味、取
五升、內大黃、煮取三升、溫服一升、以利爲度、○
按之心下滿痛者、此爲實也、當下之、宜大柴胡
湯主之、○大柴胡湯方、柴胡半斤黃芩三兩芍
藥三兩半夏半升洗 枳實四枚炙 大黃二兩大棗十
枚生薑五兩 右八味、以水一斗二升、煮取六升、
去滓再煎、溫服一升、日三服、○腹滿不減、減不
足言、當須下之、宜大承氣湯、○大承氣湯方、大
黃四兩酒洗 厚朴半斤去皮炙 枳實五枚芒硝三合右四
味、以水一斗先煮二物、取五升、去滓內大黃、煮

取二升、內芒硝更上火微一二沸、分溫再服、得下餘勿服、○心胸中大寒痛、嘔不能飲食、腹中寒、上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近、大建中湯主之、○大建中湯方、蜀椒二合去汗乾薑四兩人參二兩右三味、以水四升、煮取二升、去滓、內膠飴一升、微火煎取一升半、分溫再服、如一炊頃、可飲粥二升、後更服、當一日食糜、溫覆之、○脇下偏痛發熱、其脈緊弦此寒也、以溫藥

千金有附子二兩射罔如大棗一兩共爲六味

下之、宜大黃附子湯、○大黃附子湯方、大黃三兩附子三枚炮細辛二兩右三味、以水五升、煮取二升、分溫三服、若強人、煮取二升半、分溫三服、服後如人行四五里、進一服、○寒氣厥逆、赤丸主之、○赤丸方、茯苓四兩半夏四兩洗一方用桂烏頭二兩炮細辛一兩千金作人參右六味末之、內真朱爲色、煉蜜丸如麻子大、先食酒飲下三丸、日再夜一服、不知稍增之、以知爲度、○腹痛脈弦而緊、弦則

衛氣不行、即惡寒、緊則不欲食、邪正相搏、即爲寒疝、寒疝遶臍痛、若發則自汗出、手足厥冷、其脉沉弦者、大烏頭煎主之、●烏頭煎方、烏頭大者五枚、熬去皮不咬咀、右以水三升、煮取一升、去滓、內蜜二升、煎令水氣盡、取二升、強人服七合、弱人服五合、不差明日更服、不可一日再服、●寒疝腹中痛、及脇痛裏急者、當歸生薑羊肉湯主之、●當歸生薑羊肉湯方、當歸三兩、生薑五兩、羊肉一斤、

弦一本作緊

後下金作許

右三味、以水八升、煮取三升、溫服七合、日三服、若寒多者、加生薑成一斤、痛多而嘔者、加橘皮二兩、白朮一兩、加生薑者、亦加水五升、煮取三升二合服之、●寒疝、腹中痛、逆冷、手足不仁、若身疼痛、灸刺諸藥不能治、抵當烏頭桂枝湯主之、●烏頭桂枝湯方、烏頭大者五枚、熬去皮、不咬咀、以桂枝湯五合解之、得一升後、初服二合、不知、即服三合、又不知、復加至五合、其知

者如醉狀、得吐者爲中病、●桂枝湯方、桂枝三兩
去皮 芍藥三兩 甘艸二兩 生薑三兩 大棗十二
枚
右五味、㕮咀、以水七升、微火煮、取三升、去滓、〇其
脉數而緊乃弦、狀如弓弦、按之不移、脉數弦者、
當下其寒、脉緊大而遲者、必心下堅、脉大而緊
者、陽中有陰、可下之、
附方●外臺烏頭湯、治寒疝腹中絞痛、賊風
入攻五藏、拘急不得轉側、發作有時、使人陰

縮、手足厥逆、方見〇外臺柴胡桂枝湯方、治
心腹卒中痛者、柴胡 四兩 黃芩 人參 芍
藥 桂枝 生薑各一兩半 甘艸一兩半 夏二合
半
大棗六枚 右九味、以水六升、煮取三升、溫服
一升、日三服、●外臺走馬湯、治中惡心痛、腹
脹大便不通、巴豆二枚去皮心熬 杏仁二枚 右二味、
以綿纏搥令碎、熱湯二合、捻取白汁飲之、當
下、若小量之、通治飛尸鬼擊病、

○問曰、人病有宿食、何以別之、師曰、寸口脈浮而大、按之反濇、尺中亦微而濇、故知有宿食、大承氣湯主之、○脈數而滑者實也、此有宿食、下之愈、宜大承氣湯、○下利不飲食者、有宿食也、當下之、宜大承氣湯、○大承氣湯見前痙病中　○宿食在上脘、當吐之、宜瓜蒂散、○瓜蒂散方、瓜蒂一分　赤小豆一分　右二味、杵爲散、以香豉七合、熬黃煮取汁、和散一錢匕、溫服之、不吐者、少加之、以

傷寒論小豆下煮字無又云香豉一合熬湯七合

脈經腹上有或字

快吐爲度而止、亡血及虛者　○脈緊如轉索無常者、有宿食也、不可與之　○脈緊頭痛風寒、腹中有宿食不化也、一云寸口脈緊

漢張仲景著　晉王叔和撰次

五臟風寒積聚病脉證并治第十

論二首　脉證十
七條　方二首

肺中風者、口燥而喘、身運而重、冒而腫脹、●肺中寒、吐濁涕、●肺死臟、浮之虛、按之弱、如葱葉下無根者死、●肝中風者、頭目瞤、兩脇痛、行常偃、令人嗜甘、●肝中寒者、兩臂不舉、舌本燥、喜

大息、胸中痛、不得轉側、食則吐而汗出也、脉經千金云時盜汗欬食已吐其汁●肝死藏、浮之弱、按之如索不來、或曲如蛇行者死、●肝著、其人常欲蹈其胸上、先未苦時、但欲飲熱、旋復花湯主之、臣億等按諸本旋復花湯方皆同●心中風者、翕翕發熱、不能起、心中餓、食卽嘔吐、○心中寒者、其人苦病心如噉蒜狀、劇者心痛徹背、背痛徹心、譬如蟲注、其脉浮者、自吐乃愈、○心傷者、其人勞倦卽頭面赤而下重、心中痛而自煩發熱、當臍跳、其脉弦、此爲心臟傷所致也●心死藏、浮之實如麻豆、按之益躁疾者死、⊙邪哭、使魂魄不安者、血氣少者屬於心、心氣虛者、其人則畏、合目欲眠、夢遠行、而精神離散、魂魄妄行、陰氣衰者爲癲、陽氣衰者爲狂●脾中風者、翕翕發熱、形如醉人、腹中煩重、皮目瞤瞤而短氣●脾死藏、浮之大堅、按之如覆盃、潔潔狀如搖者死、臣億等詳五臟各有一本目作肉

中風中寒今脾只載中風腎中風中寒俱不載者以古文簡亂極多去古既遠無文可以補綴也

●趺陽脈、浮而濇、浮則胃氣强、濇則小便數、浮濇相搏、大便則堅、其脾爲約、麻子仁丸主之、

●麻子仁丸方、麻子仁二升芍藥半斤枳實一斤大黃一斤厚朴一尺杏仁一升右六味末之、煉蜜和丸、梧子大、飲服十丸、日三、以知爲度、

●腎著之病、其人身體重、腰中冷、如坐水中、形如水狀、反不渴、小便自利、飲食如故、病屬下焦、身勞汗出、衣一作表裏冷濕、久久得之、腰以下冷痛、腰重如帶五千錢、甘薑苓朮湯主之、

●甘草乾薑茯苓白朮湯方、甘艸乾薑茯苓白朮各二兩右四味、以水五升、煮取三升、分溫三服、腰中卽溫、

●腎死臟、浮之堅、按之亂如轉丸、益下入尺中者死、

●問曰、三焦竭部、上焦竭善噫何謂也、師曰、上焦受中焦、氣未和、不能消穀、故能噫耳、下焦竭、卽遺溺失便、其氣不和、不能自禁

制、不須治、久則愈、● 師曰、熱在上焦者、因欬爲肺痿、熱在中焦者、則爲堅、熱在下焦者、則尿血、亦令淋秘不通、大腸有寒者、多鶩溏、有熱者、便腸垢、小腸有寒者、其人下重便血、有熱者必痔、● 問曰、病有積有聚有槩氣、何謂也、師曰、積者藏病也、終不移、聚者府病也、發作有時、展轉痛移爲可治、槩氣者、脇下痛、按之則愈、復發爲槩氣、諸積大法、脈來細而附骨者乃積也、寸口積

在胸中、微出寸口、積在喉中、關上積在臍傍、上關上、積在心下、微下關、積在小腹、天中積在氣衝、脈出左、積在左、脈出右、積在右、脈兩出、積在中央、各以其部處之、

○痰飲欬嗽病脈證并治第十二　論一首　脈證二十一條　方十九首

問曰、夫飲有四、何謂也、師曰、有痰飲、有懸飲、有溢飲、有支飲、問曰、四飲何以爲異、師曰、其人素

千金藥下更有藥字

盛今瘦、水走腸間、瀝瀝有聲、謂之痰飲、飲後水流在脇下、欬唾引痛、謂之懸飲、飲水流行、歸於四肢、當汗出而不汗出、身體疼重、謂之溢飲、欬逆倚息、短氣不得臥、其形如腫、謂之支飲、●水在心、心下堅築、短氣惡水、不欲飲、●水在肺、吐涎沫、欲飲水、●水在脾、少氣身重、●水在肝、脇下支滿、嚏而痛、○水在腎、心下悸、○夫心下有留飲、其人背寒冷、如手大、○留飲者、脇下痛引

脈經云目泣自出一作目眩

一本裏作喜

缺盆、欬嗽則轉已、一作轉甚○胸中有留飲、其人短氣而渴、四肢歷節痛、脈沈者有留飲、○膈上病痰滿喘欬吐、發則寒熱、背痛腰疼、目泣自出、其人振振身瞤劇、必有伏飲、㊀夫病人飲水多、必暴喘滿、凡食少飲多、水停心下、甚者則悸、微者短氣、㊀脈雙弦者寒也、皆大下後裏虛、脈偏弦者飲也、㊀肺飲不弦、但苦喘短氣、㊀支飲亦喘而不能臥、加短氣、其脈平也、●病痰飲者、當以

温藥和之、○心下有痰飲、胸脇支滿目眩、苓桂
朮甘湯主之、○夫桂朮甘湯方、茯苓四兩 桂枝
白朮各三兩 甘艸二兩 右四味、以水六升、煮取三
升、分温三服、小便則利、○夫短氣有微飲、當從
小便去之、苓桂朮甘湯主之、方見上 腎氣丸亦主
之、方見婦人雜病中 ○病者脉伏、其人欲自利、利反快、
雖利心下續堅滿、此爲留飲欲去故也、甘遂半
夏湯主之、○甘遂半夏湯方、甘遂大者三枚 半夏二十
枚以水一升煮芍藥五枚甘艸如指大一枚炙取半升去滓
四味、以水二升、煮取半升、去滓、以蜜半升和藥
汁、煎取八合、頓服之、○脉浮而細滑、傷飲、○脉
弦數、有寒飲、冬夏難治、○脉沉而弦者、懸飲内
痛、○病懸飲者、十棗湯主之、○十棗湯方、芫花
熬 甘遂 大戟各等分 右三味、搗篩、以水一升五
合、先煮肥大棗十枚、取九合、去滓内藥末、强人
服一錢七、羸人服半錢、平旦温服之、不下者、明

日更加半錢、得快下後、糜粥自養、●病溢飲者、當發其汗、大青龍湯主之、小青龍湯亦主之、●
大青龍湯方、麻黃六兩去節　桂枝二兩去皮　甘艸二兩炙　杏仁四十箇去皮尖　生薑三兩　大棗十二枚　石膏如雞子大碎
七味、以水九升、先煮麻黃、減二升、去上沫、內諸藥、煮取三升、去滓、溫服一升、取微似汗、汗多者、溫粉粉之、●小青龍湯方、麻黃三兩去節　芍藥三兩　五味子半升　乾薑三兩　甘艸三兩炙　細辛三兩　桂枝三兩去皮　半夏半升洗　右八味、以水一斗、先煮麻黃、減二升、去上沫、內諸藥、煮取三升、去滓、溫服一升、●腸間支飲、其人喘滿、心下痞堅、面色黧黑、其脈沉緊、得之數十日、醫吐下之不愈、木防已湯主之、虛者即愈、實者三日復發、復與不愈者、宜木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯主之、●木防已湯方、木防已三兩　石膏十二枚雞子大　桂枝二兩　人參四兩　右四味、以水六升、煮取二升、分溫再

服、○木防已加茯苓芒硝湯方、木防已　桂枝各二兩　芒硝三合　人參　茯苓各四兩　右五味、以水六升、煮取二升、去滓內芒硝、再微煎、分溫再服、微利則愈、○心下有支飲、其人苦冒眩、澤瀉湯主之、○澤瀉湯方、澤瀉五兩　白朮二兩　右二味、以水二升、煮取一升、分溫再服、○支飲胸滿者、厚朴大黃湯主之、○厚朴大黃湯方、厚朴一尺　大黃六兩　枳實四枚　右三味、以水五升、煮取二升、分溫再服、○支飲不得息、葶藶大棗瀉肺湯主之、方見肺癰中　○嘔家本渴、渴者爲欲解、今反不渴、心下有支飲故也、小半夏湯主之、千金云小半夏湯加茯苓　小半夏湯方、半夏一升　生薑半斤　右二味、以水七升、煮取一升半、分溫再服、○腹滿口舌乾燥、此腸間有水氣、已椒藶黃丸主之、○已椒藶黃丸方、防已　椒目　葶藶熬　大黃各一兩　右四味末之、蜜丸如梧子大、先食飲服一丸、日三服、

千金液下有此字

稍增、口中有津液、渴者加芒硝半兩、○卒嘔吐、心下痞、膈間有水、眩悸者、半夏加茯苓湯主之、

●小半夏加茯苓湯方、半夏一升生薑半斤茯苓三兩一云四兩右三味、水七升、煮取一升五合、分温再服●假令瘦人臍下有悸、吐涎沫而癲眩、此水也、五苓散主之、●五苓散方、澤瀉一兩一分猪苓三分白朮三分桂二分去皮右五味、爲末、白飲服方寸七、日三服、多飲暖水、汗出愈、

附方○外臺茯苓飲、治心胸中有停痰宿水、自吐出水、後心胸間、虚氣滿不能食、消痰氣、令能食、茯苓 人參 白朮 各三兩 枳實二兩 橘皮二兩半 生薑四兩右六味、水六升、煮取一升八合、分温三服、如人行八九里進之、

家家、其脉弦、爲有水、十棗湯主之、方見上○夫有支飲家、欬煩胸中痛者、不卒死、至一百日、或一歲、宜十棗湯、方見上○久欬數歲、其脉弱者可治、

實大數者死、其脉虛者、必苦冒、其人本有支飲、
在胸中故也、治屬飲家、●欬逆倚息不得臥、小
青龍湯主之、方見肺癰中　●青龍湯下已、多唾口燥、
寸脉沈、尺脉微、手足厥逆、氣從小腹上衝胸咽、
手足痺、其面翕然如醉狀、因復下流陰股、小便
難、時復冒者、與茯苓桂枝五味甘艸湯、治其氣
衝、●桂苓五味甘艸湯方、茯苓四兩　桂枝四兩　去皮
甘艸炙三兩　五味子半升　右四味、以水八升、煮取

三升、去滓、分温三服、衝氣即低、而反更欬、胸滿
者、用桂苓五味甘艸湯、去桂加乾薑細辛、以治
其欬滿、●苓甘五味薑辛湯方、茯苓四兩　甘艸
乾薑　細辛各三兩　五味半升　右五味、以水八升、
煮取三升、去滓、温服半升、日三服、欬滿即止、而
更復渴、衝氣復發者、以細辛乾薑爲熱藥也、服
之當遂渴、而渴反止者、爲支飲也、支飲者、法當
冒、冒者必嘔、嘔者復內半夏、以去其水、○桂苓

味甘去桂加薑辛夏湯方、茯苓四兩甘艸細辛乾薑各二兩五味半夏各半升右六味、以水八升、煮取三升、去滓、溫服半升、日三服、水去嘔止、其人形腫者、加杏仁主之、其證應內麻黃、以其人遂痺、故不內之、若逆而內之者必厥、所以然者、以其人血虛、麻黃發其陽故也、○茯苓甘薑味辛夏仁湯方、茯苓四兩甘艸三兩五味半升乾薑三兩細辛三兩半夏半升杏仁半升去皮尖右

七味、以水一斗、煮取三升、去滓、溫服半升、日三服、若面熱如醉、此爲胃熱上衝熏其面、加大黃以利之、○茯苓甘薑味辛夏仁黃湯方、茯苓四兩甘艸三兩五味半升乾薑三兩細辛三兩半夏半升杏仁半升大黃三兩右八味、以水一斗、煮取三升、去滓、溫服半升、日三服、○先渴後嘔、爲水停心下、此屬飲家、小半夏茯苓湯主之、方見上

消渴小便利淋病脉證并治第十三

脉證九條　方六首

厥陰之爲病、消渴、氣上衝心、心中疼熱、飢而不欲食、食卽吐蚘、下之不肯止、○寸口脉、浮而遲、浮卽爲虛、遲卽爲勞、虛則衛氣不足、勞則榮氣竭、○趺陽脉浮而數、浮卽爲氣、數卽消穀、而大堅、一作緊　氣盛則溲數、溲數卽堅、堅數相搏、卽爲消渴、○男子消渴、小便反多、以飲一斗、小便一斗、腎氣丸主之、方見婦人雜病中　○脉浮小便不利、微熱消渴者、宜利小便發汗、五苓散主之、○渴欲飲水、水入則吐者、名曰水逆、五苓散主之、方見上　○渴欲飲水不止者、文蛤散主之、○文蛤散方、

文蛤　四兩

右一味、杵爲散、以沸湯五合和、服方寸匕、○淋之爲病、小便如粟狀、小腹弦急、痛引臍中、○趺陽脉數、胃中有熱、卽消穀引食、大便必堅、小便卽數、○淋家不可發汗、發汗則必便血、○小便不利者、有水氣、其人苦渴、括蔞瞿麥

丸主之、●括蔞瞿麥丸方、括蔞根 二兩 茯苓 薯蕷 各三兩 附子一枚炮 瞿麥一兩 右五味、末之、煉蜜丸梧子大、飲服三丸、日三服、不知增至七八丸、以小便利腹中温爲知、●小便不利、蒲灰散主之、滑石白魚散、茯苓戎鹽湯并主之、●蒲灰散方、蒲灰 七分 滑石 二分 右二味、杵爲散、飲服方寸匕、日三服、●滑石白魚散方、滑石 二分 亂髮 二分燒 白魚 二分 右三味、杵爲散、飲服方寸匕、日三服、○茯苓戎鹽湯方、茯苓 半斤 白朮 二兩 戎鹽 彈丸大 右三味、下闕一本云先將茯苓白朮煎成入鹽再煎分温三服、●渴欲飲水、口乾舌燥者、白虎加人參湯主之、方見中暍中、●脉浮發熱、渴欲飲水、小便不利者、猪苓湯主之、●猪苓湯方、猪苓 去皮 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉 各一兩 右五味、以水四升、先煮四味、取二升、去滓、內膠烊消、温服七合、日三服、

論七首　脈證五
條方十首

師曰、病有風水、有皮水、有正水、有石水、有黃汗、風水、其脉自浮、外證骨節疼痛惡風、皮水、其脉亦浮、外證附腫、按之没指、不惡風、其腹如鼓、不渴、當發其汗、正水、其脉沈遲、外證自喘、石水、其脉自沈、外證腹滿不喘、黃汗、其脉沈遲、身發熱胸滿、四肢頭面腫、久不愈、必致癰膿、○脉浮而洪、浮則爲風、洪則爲氣、風氣相搏、風强則爲隱疹、身體爲瘾、瘾爲泄風、久爲痂癩、氣强則爲水、難以俛仰、風氣相擊、身體洪腫、汗出則愈、惡風則虛、此爲風水、不惡風者、小便通利、上焦有寒、其口多涎、此爲黃汗、○寸口脉沈滑者、中有水氣、面目腫大有熱、名曰風水、視人之目裏上微擁如蠶新臥起狀、其頸脉動、時時欬、按其手足上、陷而不起者風水、○太陽病、脉浮而緊、法當骨節疼痛、反不疼、身體反重而酸、其人不渴、汗

出卽愈、此爲風水、惡寒者、此爲極虛、發汗得之、渴而不惡寒者、此爲皮水、身腫而冷、狀如周痺、胸中窒、不能食、反聚痛、暮躁不得眠、此爲黃汗、痛在骨節、欬而喘不渴者、此爲脾脹、其狀如腫、發汗卽愈、然諸病此者、渴而下利、小便數者、皆不可發汗、●裏水者、一身面目黃腫、其脈沈、小便不利、故令病水、假如小便自利、此亡津液、故令渴也、越婢加朮湯主之、方見中風中 ●趺陽脈當

論注云脾恐是肺字

脈經黃作跳

伏、今反緊、本自有寒疝瘕、腹中痛、醫反下之、下之卽胸滿短氣、●趺陽脈當伏、今反數、本自有熱、消穀小便數、今反不利、此欲作水、●寸口脈浮而遲、浮脈則熱、遲脈則潛、熱潛相搏、名曰沈、趺陽脈浮而數、浮脈卽熱、數脈卽止、熱止相搏、名曰伏、沈伏相搏、名曰水、沈則絡脈虛、伏則小便難、虛難相搏、水走皮膚、卽爲水矣、●寸口脈弦而緊、弦則衛氣不行、卽惡寒、水不沾流、走於

腸間、㊀少陰脉緊而沉、緊則爲痛、沉則爲水、小便卽難、㊀脉得諸沉、當責有水、身體腫重、水病脉出者死、●夫水病人、目下有卧蠶、面目鮮澤、脉伏、其人消渴、病水腹大、小便不利、其脉沉絶者有水、可下之、●問曰、病下利後渴飲水、小便不利、腹滿因腫者何也、答曰、此法當病水、若小便自利、及汗出者、自當愈、○心水者、其身重而少氣不得卧、煩而躁、其人陰腫、○肝水者、其腹大不能自轉側、脇下腹痛、時時津液微生、小便續通、●肺水者、其身腫、小便難、時時鴨溏、○脾水者、其腹大、四肢苦重、津液不生、但苦少氣小便難、○腎水者、其腹大、臍腫腰痛、不得溺、陰下濕如牛鼻上汗、其足逆冷、面反瘦、○師曰、諸有水者、腰以下腫、當利小便、腰以上腫、當發汗乃愈、●師曰、寸口脉沉而遲、沉則爲水、遲則爲寒、寒水相搏、趺陽脉伏、水穀不化、脾氣衰則驚溏、

胃氣衰則身腫、少陽脈革、少陰脈細、男子則小便不利、婦人則經水不通、經爲血、血不利則爲水、名曰血分。●問曰、病者苦水、面目身體四肢皆腫、小便不利、脈之不言水、反言胸中痛、氣上衝咽、狀如炙肉、當微欬喘、審如師言、其脈何類、師曰、寸口脈沉而緊、沉爲水、緊爲寒、沉緊相搏、結在關元、始時當微、年盛不覺、陽衰之後、榮衛相干、陽損陰盛、結寒微動、腎氣上衝、喉咽塞噎、

脇下急痛、醫以爲留飲而大下之、氣擊不去、其病不除、復重吐之、胃家虛煩、咽燥欲飲水、小便不利、水穀不化、面目手足浮腫、又與葶藶丸下水、當時如小差、食飲過度、腫復如前、胸脇苦痛、象若奔豚、其水揚溢則浮欬喘逆、當先攻擊衝氣令止、乃治欬、欬止其喘自差、先治新病、病當在後。●風水脈浮、身重汗出惡風者、防已黃耆湯主之、腹痛加芍藥。●防已黃耆湯方、防已　二兩

黃耆一兩一分　白朮三分　甘艸半兩　炙　右剉、每服五錢匕、生薑四片、棗一枚、水盞半、煎取八分、去滓溫服、良久再服、●風水、惡風一身悉腫、脉浮不渴、續自汗出、無大熱、越婢湯主之、●越婢湯方、麻黃六兩　石膏半斤　生薑三兩　大棗十五枚　甘艸二兩　右五味、以水六升、先煮麻黃、去上沫、內諸藥、煮取三升、分溫三服、惡風者、加附子一枚、炮　風水、加朮四兩、古今錄驗●皮水爲病、四肢腫、水氣在皮

膚中、四肢聶聶動者、防已茯苓湯主之、●防已茯苓湯方、防已三兩　黃耆三兩　桂枝三兩　茯苓六兩　甘艸二兩　右五味、以水六升、煮取二升、分溫三服、●裏水、越婢加朮湯主之、甘艸麻黃湯亦主之、●越婢加朮湯　見上　於內加白朮四兩又見中風中甘艸麻黃湯方、甘艸二兩　麻黃四兩　右二味、以水五升、先煮麻黃、去上沫、內甘艸、煮取三升、溫服一升、重覆汗出、不汗再服、愼風寒、●水之爲病、其

脉沈小屬少陰浮者爲風無水虛脹者爲氣水發其汗即已脉沈者宜麻黄附子湯浮者宜杏子湯○麻黄附子湯方麻黄三兩甘艸二兩附子一枚炮右三味以水七升先煮麻黄去上沫內諸藥煮取二升半溫服八分日三服○杏子湯方未見恐是麻黄杏仁甘艸石膏湯○厥而皮水者蒲灰散主之方見消渴中○問曰黄汗之爲病身體腫一作發重熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黄如檗汁

脉自沉何從得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之宜著芍桂酒湯主之○黄著芍桂苦酒湯方黄著五兩芍藥三兩桂枝三兩右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也一方用美酒醯代苦酒○黄汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱者久久其

身必甲錯、發熱不止者、必生惡瘡、若身重汗出已愈、輕者、久久必身瞤、即胸中痛、又從腰以上必汗出、下無汗、腰髖弛痛、如有物在皮中狀、劇者不能食、身疼重煩躁、小便不利、此爲黃汗、桂枝加黃耆湯主之、●桂枝加黃耆湯方、桂枝一兩　芍藥各三兩　甘艸二兩　生薑三兩　大棗十二枚　黃耆二兩　右六味、以水八升、煮取三升、溫服一升、須臾飲熱稀粥一升餘、以助藥力、溫覆取微汗、若不汗更服、●師曰、寸口脈遲而澁、遲則爲寒、澁爲血不足、趺陽脈微而遲、微則爲氣、遲則爲寒、寒氣不足、則手足逆冷、手足逆冷、則榮衛不利、榮衛不利、則腹滿脇鳴相逐、氣轉膀胱、榮衛俱勞、陽氣不通、即身冷、陰氣不通、即骨痛、陽前通則惡寒、陰前通則痺不仁、陰陽相得、其氣乃行、大氣一轉、其氣乃散、實則失氣、虛則遺尿、名曰氣分、●氣分心下堅、大如盤邊、如旋杯、水飲所

作、桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之、●桂枝去芍藥加麻辛附子湯方 桂枝 生薑 三兩 甘艸二兩 大棗十二枚 麻黃 細辛 各二兩 附子一枚 炮 右七味、以水七升煮麻黃去上沫、內諸藥煮取二升、分溫三服、當汗出如蟲行皮中、即愈、●

心下堅、大如盤、邊如旋杯、水飲所作、枳朮湯主之、●枳朮湯方 枳實 七枚 白朮 二兩 右二味、以水五升煮取三升、分溫三服、腹中耎、即當散也、

附方○外臺防已黃耆湯、治風水脈浮為在表、其人或頭汗出、表無他病、病者但下重、從腰以上為和、腰以下當腫及陰、難以屈伸、方見

風濕中

黃疸病脈證幷治第十五 論二首 脈證十四條

寸口脈浮而緩、浮則為風、緩則為痺、痺非中風、四肢苦煩、脾色必黃、瘀熱以行、●趺陽脈緊而

數數則爲熱、熱則消穀、緊則爲寒、食卽爲滿、尺脉浮爲傷腎、跌陽脉緊爲傷脾、風寒相搏、食穀卽眩、穀氣不消、胃中苦濁、濁氣下流、小便不通、陰被其寒、熱流膀胱、身體盡黃、名曰穀疸○額上黑、微汗出、手足中熱、薄暮卽發、膀胱急、小便自利、名曰女勞疸、腹如水狀、不治、○心中懊憹而熱、不能食、時欲吐、名曰酒疸○陽明病、脉遲者、食難用飽、飽則發煩頭眩、小便必難、此欲作穀疸、雖下之、腹滿如故、所以然者、脉遲故也、○夫病酒黃疸、必小便不利、其候心中熱、足下熱、是其證也、○酒黃疸者、或無熱、靖言了腹滿欲吐、鼻燥、其脉浮者、先吐之、沉弦者、先下之、○酒疸心中熱欲嘔者、吐之愈、○酒疸下之、久久爲黑疸、目青面黑、心中如啖蒜虀狀、大便正黑、皮膚爪之不仁、其脉浮弱、雖黑微黃、故知之、○師曰、病黃疸、發熱煩喘、胸滿口燥者、以病發時、火

劫其汗、兩熱所得、然黃家所得、從濕得之、一身盡發熱、面黃肚熱、熱在裏、當下之、○脉沉、渴欲飲水、小便不利者、皆發黃、○腹滿舌痿黃躁不得睡、屬黃家、舌痿疑作身痿○黃疸之病、當以十八日爲期、治之十日以上瘥、反劇爲難治、○疸而渴者、其疸難治、疸而不渴者、其疸可治、發於陰部、其人必嘔、陽部其人振寒而發熱也、○穀疸之爲病、寒熱不食、食即頭眩、心胸不安、久久發黃、爲穀疸、茵蔯蒿湯主之、○茵蔯湯方、茵蔯蒿六兩　梔子十四枚　大黃二兩　右三味、以水一斗、先煮茵蔯、減六升、內二味、煮取三升、去滓、分溫三服、小便當利、尿如皂角汁狀、色正赤、一宿腹減、黃從小便去也、○黃家日晡所發熱、而反惡寒、此爲女勞得之、膀胱急、少腹滿、身盡黃、額上黑、足下熱、因作黑疸、其腹脹如水狀、大便必黑、時溏、此女勞之病、非水也、腹滿者難治、　消石礬石散

主之、●消礬散方、消石　礬石燒等分　右二味、爲末、以大麥粥汁和、服方寸匕、日三服、病隨大小便去、小便正黃大便正黑、是候也、●酒黃疸心中懊憹、或熱痛、梔子大黃湯主之、●梔子大黃湯方、梔子十二枚　大黃一兩　枳實五枚　豉一升　右四味、以水六升、煮取二升、分溫三服、●諸病黃家、但利其小便、假令脈浮、當以汗解之、宜桂枝加黃耆湯主之、方見水病中　○諸黃、猪膏髮煎主之、

○猪膏髮煎方、猪膏半斤　亂髮如雞子大三枚　右二味和膏中煎之、髮消藥成、分再服、病從小便出、●

黃疸病、茵蔯五苓散主之、一本云茵蔯湯及齒陳五苓散方　茵蔯蒿末十分　五苓散五分　方見痰飲中　右二物和、先食飲方寸匕、日三服、●黃疸腹滿、小便不利而赤、自汗出、此爲表和裏實、當下之、宜大黃消石湯、●大黃消石湯方、大黃　黃蘗　滑石各四兩　梔子十五枚　右四味、以水六升、煮取三

升去滓、內滑石更煮取一升頓服、● 黃疸病、小便色不變、欲自利、腹滿而喘、不可除熱、熱除必噦、噦者小半夏湯主之、方見痰飲中 ● 諸黃腹痛而嘔者、宜柴胡湯、必小柴胡湯方見嘔吐中 ● 男子黃、小便自利、當與虛勞小建中湯、方見虛勞中

附方 ● 瓜蒂湯、治諸黃、方見病中 ● 千金麻黃醇酒湯、治黃疸、麻黃三兩右一味、以美清酒五升、煮取二升半、頓服盡、冬月用酒、春月用水煮之、

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證治第十六 脈證十二條 方五首

寸口脈動而弱、動即爲驚、弱則爲悸、● 師曰、尺脈浮、目睛暈黃、衄未止、暈黃去、目睛慧了、知衄今止、● 又曰、從春至夏衄者太陽、從秋至冬衄者陽明、● 衄家不可汗、汗出必額上陷、脈緊急、直視不能眴、不得眠、● 病人面無血色、無寒熱、

脉沉弦者衄、浮弱手按之絶者下血、煩欬者必吐血、○夫吐血欬逆上氣、其脉數而有熱、不得臥者死、○夫酒客欬者必致吐血、此因極飲過度所致也、○寸口脉弦而大、弦則爲減、大則爲乾、減則爲寒、乾則爲虛、寒虛相擊、此名曰革、婦人則半産漏下、男子則亡血、○亡血不可發其表、汗出則寒慄而振、○病人胸滿脣痿舌青口燥、但欲嗽水、不欲嚥、無寒熱、脉微大來遲、腹不滿、其人言我滿爲有瘀血、○病者如熱狀、煩滿口乾燥而渴、其脉反無熱、此爲陰伏、是瘀血也、當下之、○夫邪者、桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之、○桂枝救逆湯方、桂枝二兩去皮甘草三兩生薑六兩牡蠣五兩熬龍骨四兩大棗十枚蜀漆三兩洗去腥右爲末、以水一斗二升、先煮蜀漆、減二升、內諸藥、後取三升、去滓、溫服一升、○心下悸者、半夏麻黃丸主之、○半夏麻黃丸方、

半夏　麻黃等分右二味、末之、煉蜜和、丸小豆大、飲服三丸、日三、●吐血不止者、柏葉湯主之、

●柏葉湯方、柏葉　乾薑各三兩　艾三把　右三味、以水五升、取馬通汁一升、合煮取一升、分溫再服、●下血、先便後血、此遠血也、黃土湯主之、○

黃土湯方、亦主吐血衄血　甘艸　乾地黃　白朮　附子炮　阿膠　黃芩各三兩　竈中黃土半斤　右七味、以水八升、煮取三升、分溫二服、●下血、先血後便、此近血也、赤小豆當歸散主之、方見狐惑中●心氣不足、吐血衄血、瀉心湯主之、●瀉心湯方、亦治霍亂　大黃二兩　黃芩　黃連各一兩　右三味、以水三升、煮取一升、頓服之、

嘔吐噦下利病脈證治第十七　論一首　脈證二十三條

夫嘔家有癰膿、不可治嘔、膿盡自愈、●先嘔却渴者、此爲欲解、先渴却嘔者、爲水停心下、此屬

飲家、⊙嘔家本渴、今反不渴者、以心下有支飲故也、此屬支飲、●問曰、病人脉數、數爲熱、當消穀引食、而反吐者何也、師曰、以發其汗、令陽微膈氣虛、脉乃數、數爲客熱、不能消穀、胃中虛冷故也、●脉弦者虛也、胃氣無餘、朝食暮吐、變爲胃反、寒在於上、醫反下之、今脉反弦、故名曰虛、⊙寸口脉微而數、微則無氣、無氣則榮虛、榮虛則血不足、血不足則胸中冷、〇趺陽脉浮而濇、浮則爲虛、虛則傷脾、脾傷則不磨、朝食暮吐、暮食朝吐、宿穀不化、名曰胃反、脉緊而濇、其病難治、〇病人欲吐者、不可下之、⊙噦而腹滿、視其前後、知何部不利、利之即愈、●嘔而胸滿者、茱萸湯主之、●茱萸湯方、吳茱萸一升　人參三兩　生薑六兩　大棗十二枚　右四味、以水五升、煮取三升、溫服七合、日三服、●乾嘔、吐涎沫、頭痛者、茱萸湯主之、方見上●嘔而腸鳴、心下痞者、半夏瀉

心湯主之、●半夏瀉心湯方、半夏半升洗　黄芩
乾薑　人參各三
兩　黄連一兩　大棗十二枚　甘艸三
兩
炙
右七味、以水一斗、煮取六升、去滓再煮、取三
升、溫服一升、日三服、●乾嘔而利者、黄芩加半
夏生薑湯主之、●黄芩加半夏生薑湯方、黄芩
三兩　甘艸二兩　半夏半斤　生薑四兩
炙
大棗十二枚　右六味、以水一斗、煮取三升、去滓、溫
服一升、日再、夜一服、○諸嘔吐、穀不得下者、小

半夏湯主之、方飲
水者解、急與之、思水者、猪苓散主之、●猪苓散
方、猪苓　茯苓　白朮　各等分　右三味、杵爲散、飲
服方寸匕、日三服、●嘔而脉弱、小便復利、身有
微熱、見厥者難治、四逆湯主之、●四逆湯方、附
子一枚　生用　乾薑一兩　甘艸二兩
炙
右三味、以水三升、
煮取一升二合、去滓、分溫再服、强人可大附子
一枚、乾薑三兩、●嘔而發熱者、小柴胡湯主之、

●小柴胡湯方、柴胡半斤　黄芩三兩　人參三兩
甘艸二兩　半夏半斤　生薑三兩　大棗十二枚　右七
味、以水一斗二升、煮取六升、去滓再煎、取三升、
溫服一升、日三服、●胃反嘔吐者、大半夏湯主
之、（千金云治胃反不受食食入即吐外臺云治嘔心下痞鞕者）
半夏二升洗　人參三兩　白蜜一升　右三味、以水
完用
一斗二升、和蜜、揚之二百四十遍、煮取二升半、
溫服一升、餘分再服、●食已即吐者、大黄甘艸

湯主之（外臺又治吐水）　大黄　甘艸湯方、大黄四兩　甘艸
一兩　右二味、以水三升、煮取一升、分溫再服、●
胃反吐而渴、欲飲水者、茯苓澤瀉湯主之、●茯
苓澤瀉湯方、（外臺治消渴脉絶胃反茯苓半斤
吐食者有小麥二升）
澤瀉四兩　甘艸二兩　桂枝二兩　白朮三兩　生薑
四兩　右六味、以水一斗、煮取三升、內澤瀉、再煮
取二升半、溫服八合、日三服、●吐後渴欲得水、
而貪飲者、文蛤湯主之、兼主微風脉緊頭痛●

文蛤湯方、文蛤 五兩 麻黃 甘艸 生薑 各三兩
石膏 五兩 杏仁 五十箇 大棗 十二枚 右七味、以水六升、煮取二升、溫服一升、汗出卽愈、●乾嘔吐逆、吐涎沫、半夏乾薑散主之、●半夏乾薑散方、半夏 乾薑 各等分 右二味、杵爲散、取方寸匕、漿水一升半、煎取七合、頓服之、●病人胸中似喘不喘、似嘔不嘔、似噦不噦、徹心中憒憒然無奈者、生薑半夏湯主之、●生薑半夏湯方、半夏 半斤

生薑汁一升 右二味、以水三升、煮半夏、取二升、內生薑汁、煮取一升半、小冷、分四服、日三夜一、嘔止停後服、●乾嘔噦、若手足厥者、橘皮湯主之、●橘皮湯方、橘皮 四兩 生薑 半斤 右二味、以水七升、煮取三升、溫服一升、下咽卽愈、●噦逆者、橘皮竹茹湯主之、●橘皮竹茹湯方、橘皮 二斤 大棗 三十枚 生薑 半斤 甘艸 五兩 人參 一兩 右六味、以水一斗、煮取三升、溫服一升、日

三服、●夫六府氣絕於外者、手足寒、上氣脚縮、五臟氣絕於內者、利不禁、下甚者、手足不仁、●下利脉沉弦者、下重、脉大者爲未止、脉微弱數者、爲欲自止、雖發熱不死、●下利、手足厥冷、無脉者、灸之不溫、若脉不還、反微喘者死、少陰負趺陽者、爲順也、●下利有微熱而渴、脉弱者、令自愈、設脉緊、●下利脉數、有微熱汗出、令自愈、設脉緊、爲未解、●下利脉數而渴者、令自愈、設不差、必清膿血、以有熱故也、●下利脉反弦、發熱身汗者自愈、●下利氣者、當利其小便、●下利、寸脉反浮數、尺中自澁者、必清膿血、●下利清穀、不可攻其表、汗出必脹滿、●下利脉沉而遲、其人面少赤、身有微熱、下利清穀者、必鬱冒、汗出而解、病人必微厥、所以然者、其面戴陽下虛故也、●下利後、脉絕手足厥冷、晬時脉還手足溫者生、脉不還者死、●下利腹脹滿、身體疼痛者、先

溫其裏、乃攻其表、溫裏宜四逆湯、攻表宜桂枝湯、●四逆湯方見上○桂枝湯方、桂枝三兩去皮芍藥三兩甘艸三兩炙生薑三兩大棗十二枚右五味、�once咀、以水七升、微火煮取三升、去滓、適寒溫、服一升、服已須臾、啜稀粥一升、以助藥力、溫覆令一時許、遍身漐漐微似有汗者益佳、不可如水淋漓、若一服汗出病差、停後服、○下利、三部脈皆平、按之心下堅者、急下之、宜大承氣湯、○下利、

脈遲而滑者實也、利未欲止、急下之、宜大承氣湯、㊀下利、脈反滑者、當有所去、下乃愈、宜大承氣湯、㊀下利已差、至其年月日時復發者、以病不盡故也、當下之、宜大承氣湯、㊉大承氣湯方見痙病中●下利讝語者、有燥屎也、小承氣湯主之、㊀小承氣湯方、大黃四兩厚朴二兩炙枳實大者三枚右三味、以水四升、煮取一升二合、去滓、分溫二服、得利則止、●下利、便膿血者、桃花湯主之、

○桃花湯方、赤石脂一斤一半剉 乾薑一兩 粳米一升 右三味、以水七升煮米令熟、去滓、溫七合、內赤石脂末方寸匕、日三服、若一服愈、餘勿服、○熱利下重者、白頭翁湯主之、○白頭翁湯方、白頭翁二兩 黃連 黃檗 秦皮各三兩 右四味、以水七升、煮取二升、去滓、溫服一升、不愈更服、○下利後更煩、按之心下濡者、爲虛煩也、梔子豉湯主之、○梔子豉湯方、梔子十四枚 香豉四合

絹裹 右二味、以水四升、先煮梔子、得二升半、內豉煮取一升半、去滓、分二服、溫進一服、得吐則止、○下利清穀、裏寒外熱、汗出而厥者、通脈四逆湯主之、○通脈四逆湯方、附子大者一枚生用 乾薑三兩強人 甘艸二兩炙 右三味、以水三升、煮取一升二合、去滓、分溫再服、○下利肺痛、紫參湯主之、○紫參湯方、紫參半斤 甘艸三兩 右二味、以水五升、先煮紫參、取二升、內甘艸、煮取一升半、

分溫三服、疑非仲景方●氣利、訶梨勒散主之、●訶梨勒散方、訶梨勒十枚右一味、爲散、粥飲和、頓服、疑非仲景方

附方千金翼小柴胡湯、治大便不通、噦數譫語、方見上●外臺黃芩湯、治乾嘔下利、黃芩人參乾薑各三兩桂枝一兩大棗十二枚半夏半斤右六味、以水七升、煮取三升、分溫三服、

瘡癰腸癰浸淫病脈證并治第十八

論一首　脈證三條　方五首

諸浮數脈、應當發熱、而反洒淅惡寒、若有痛處、當發其癰、●師曰、諸癰腫、欲知有膿無膿、以手掩腫上、熱者爲有膿、不熱者爲無膿、●腸癰之爲病、其身甲錯、腹皮急、按之濡如腫狀、腹無積聚、身無熱、脈數、此爲腸內有癰膿、薏苡附子敗醬散主之、●薏苡附子敗醬散方、薏苡仁十分附子二分敗醬五分右三味、杵爲末、取方寸匕、

以水二升煎減半頓服小便當下○腸癰者小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

●大黃牡丹湯方　大黃四兩　牡丹一兩　桃仁五十箇　瓜子半升　芒消三合　右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血○問曰寸口脉浮微而澁法當亡血若汗出設不汗者云何答曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也○病金瘡王不留行散方王不留行十分八月採　朴消三月採　甘州細葉十分七月桑東南根白皮十分三月採　十八日採　川椒三分除目及閉口去汗　黃芩二分　乾薑二分　厚朴二分　右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令灰過各別杵篩合治之爲散服方寸匕小瘡即粉之大瘡但服之產後亦可服如

風寒、桑東根勿取之前三物皆陰乾百日、●排膿散方、枳實十六枚　芍藥六分　桔梗二分右三味、杵爲散、取雞子黃一枚、以藥散與雞黃相等、揉和令相得、飲和服之、日一服、●排膿湯方、甘艸一兩　桔梗三兩　生薑一兩　大棗十枚右四味、以水三升、煮取一升、溫服五合、日再服、●浸淫瘡、從口流向四肢者可治、從四肢流來入口者不可治、●浸淫瘡、黃連粉主之、方未見

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病脈證并治第十九　論一首　脈證一條　方四首

師曰病跌蹶、其人但能前不能却、刺腨入二寸、此太陽經傷也、●病人常以手指臂腫動、此人身體瞤瞤者、藜蘆甘艸湯主之、●藜蘆甘艸湯方未見　●轉筋之爲病、其人臂脚直、脈上下行微弦、轉筋入腹者、雞屎白散主之、●雞屎白散方、雞屎白一味、爲散、取方寸匕、以水六合和、溫

服、●陰狐疝氣者、偏有小大、時時上下、蜘蛛散主之、●蜘蛛散方、（俗云女師ケモ地）蜘蛛十四枚 桂枝半兩 右二味、為散、取八分一匕、飲和服、日再服、蜜丸亦可、●問曰、病腹痛有蟲、其脉何以別之、師曰、腹中痛、其脉當沉若弦、反洪大、故有蚘蟲、●蚘蟲之為病、令人吐涎、心痛發作有時、毒藥不止、甘艸粉蜜湯主之、●甘艸粉蜜湯方、甘艸二兩 粉一兩 蜜四兩 右三味、以水三升、先煮甘艸取二升、去滓內粉蜜、攪令和、煎如薄粥、溫服一升、差即止、○蚘厥者、當吐蚘、令病者靜而復時煩、此為藏寒、蚘上入膈、故煩、須臾復止、得食而嘔、又煩者、蚘聞食臭出、其人當自吐蚘、蚘厥者、烏梅丸主之、●烏梅丸方、烏梅三百箇 細辛六兩 乾薑十兩 黃連一斤 當歸四兩 附子六兩 川椒四兩 桂枝六兩 人參六兩 黃檗六兩 右十味、異搗篩、合治之、以苦酒漬烏梅一宿、去核、蒸之五升米下、飯

熟擣成泥、和藥令相得、內臼中、與蜜杵二千下、
丸如梧子大、先食飲服十丸、日三服、稍加至二
十丸、禁生冷滑臭等食、

金匱要略卷之中

金匱要略卷之下

漢張仲景著　晉王叔和撰次

婦人妊娠病脉證并治第二十

脉證三條
方八首

師曰、婦人得平脉、陰脉小弱、其人渴不能食、無寒熱、名妊娠、桂枝湯主之、（見下、利中）於法六十日當有此證、設有醫治逆者、却一月加吐下者、則絶之、●婦人宿有癥病、經斷未及三月、而得漏下

不止、胎動在臍上者、爲癥痼害、妊娠六月動者、前三月、經水利時胎也、下血者、後斷三月衄也、所以血不止者、其癥不去故也、當下其癥、桂枝茯苓丸主之、●桂枝　茯苓　丹皮去心　桃仁去尖熬　芍藥各等分　右五味、末之、煉蜜和、丸如兎屎大、每日食前服一丸、不知加至三丸、●婦人懷娠六七月、脈弦發熱、其胎愈脹、腹痛惡寒者、少腹如扇、所以然者、子藏開故也、當以附子湯溫其藏、方見未●師曰、婦人有漏下者、有半産後因續下血都不絶者、有妊娠下血者、假令妊娠腹中痛、爲胞阻、膠艾湯主之、●芎歸膠艾湯方、一方加乾薑一兩胡洽芎窮　阿膠　甘艸各二兩　艾葉　當歸各三兩　芎藥四兩　乾地黃右七味、以水五升清酒五升、合煮取三升、去滓、內膠令消盡、溫服一升、日三服、不差更作、●婦人懷妊、腹中疗痛、當歸芍藥散主之、●當

地黃分量、千金用四兩

歸芍藥散方、當歸三兩芍藥一斤茯苓四兩白朮四兩澤瀉半斤芎窮半斤一作三兩右六味、杵爲散、取方寸匕、酒和日三服、○妊娠嘔吐不止、乾薑人參半夏丸主之、○乾薑人參半夏丸方乾薑人參各一兩半夏二兩右三味末之、以生薑汁糊爲丸、如梧子大、飲服十丸、日三服、○妊娠小便難、飲食如故、歸母苦參丸主之、○當歸貝母苦參丸方男子加滑石半兩當歸貝母苦參各四兩右三味末之、煉蜜丸、如小豆大、飲服三丸、加至十丸、○妊娠有水氣、身重小便不利、洒淅惡寒、起即頭眩、葵子茯苓散主之、○葵子茯苓散方、葵子一斤茯苓三兩右二味、杵爲散、飲服方寸匕、日三服、小便利則愈、○婦人妊娠、宜常服當歸散主之、○當歸散方、當歸芎藭芍藥各一斤白朮半斤右五味、杵爲散、酒飲服方寸匕、日再服、妊娠常服、即易産、胎無苦疾、産後百

病、悉主之、○婦姙娠養胎、白朮散主之、○白朮散　見外臺方　白朮　芍藥　蜀椒三分去汗　牡蠣右四味、杵爲散、酒服一錢匕、日三服、夜一服、但苦腹痛、加芍藥、心下毒痛倍加芍藥、心煩吐痛、不能食飲、加細辛一兩半夏大者二十枚、服之後更以醋漿水服之、復不解者、小麥汁服之、已後渴者、大麥粥服之、病雖愈、服之勿置、○婦人傷胎、懷身腹滿、不得小便、從腰以下、重如有水氣狀、懷身七月、太陰當養、不養、此心氣實、當刺瀉勞宮及關元、小便微利則愈、見玉函

婦人產後病脈證治第二十一　論一首　脈證六首

問曰、新產婦人有三病、一者病痙、二者病鬱冒、三者大便難、何謂也、師曰新產血虛、多汗出、喜中風、故令病痙、亡血復汗寒多、故令鬱冒、亡津

液胃燥、故大便難、產婦欝冒、其脉微弱、嘔不能食、大便反堅、但頭汗出、所以然者、血虛而厥、厥而必冒、冒家欲解、必大汗出、以血虛下厥、孤陽上出、故頭汗出、所以產婦喜汗出者、亡陰血虛、陽氣獨盛、故當汗出、陰陽乃復、大便堅、嘔不能食、小柴胡湯主之、方見嘔吐中病解能食、七八日更發熱者、此爲胃實、大承氣湯主之、方見痙中●產後腹中疠痛、當歸生薑羊肉湯主之、並治腹中寒疝、虛勞不足、○當歸生薑羊肉湯方見寒疝中●產後腹痛煩滿不得卧、枳實芍藥散主之、●枳實芍藥散方、枳實燒令黑勿太過芍藥等分右二味、杵爲散、服方寸匕、日三服、并主癰膿以麥粥下之、●

師曰、產婦腹痛、法當以枳實芍藥散、假令不愈者、此爲腹中有乾血著臍下、宜下瘀血湯主之、亦主經水不利、●下瘀血湯方、大黃二兩桃仁二十蟅蟲二十枚熬去足右三味、末之、煉蜜和爲四丸、

脈經云煩躁者不能食讀諸氣則愈

以酒一升煎二丸取八合頓服之新血下如豚肝●產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱切脉微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱也方見痙病中●產後中風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽且證續在耳可與陽且湯即桂枝湯方見下利中●產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之●竹葉湯方竹葉一把葛根三兩防風桔梗桂枝人參甘艸各一兩附子一枚大棗十五枚生薑五兩右十味以水一斗煮取二升半分溫三服溫覆使汗出頸項強用大附子一枚破之如豆大煎藥揚去沫嘔者加半夏半升洗●婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸方生竹茹二分石膏二分桂枝一分甘艸七分白薇一分

右五味末之、棗肉和丸彈子大、以飲服一丸、日三夜二服、有熱者倍白薇、煩喘者加梔實一分、

●產後下痢虛極、白頭翁加甘艸阿膠湯主之、

●白頭翁加甘艸阿膠湯方、白頭翁　甘艸　阿膠各二兩　秦皮　黃連　蘗皮各三兩　右六味、以水七升、煮取二升半、內膠令消盡、分溫三服、

附方●千金三物黃芩湯、治婦人在草蓐、自發露得風、四肢苦煩熱、頭痛者、與小柴胡湯、頭不痛但煩者、此湯主之、黃芩一兩　苦參二兩　乾地黃四兩　右三味、以水六升、煮取二升、溫服一升、多吐下虫、●千金內補當歸建中湯、治婦人產後虛羸不足、腹中刺痛不止、吸吸少氣、或苦少腹拘急痛引腰背、不能食飲、產後一月日、得服四五劑爲善、令人強壯、當歸四兩　芍藥六兩　生薑三兩　甘艸二兩　桂枝三兩　大棗十二枚　右六味、以水一斗、煮取三升、分溫

三服、一日令盡、若大虛、加飴糖六兩、湯成內之、於火上煖令飴消、若去血過多、崩傷內衄不止、加地黃六兩、阿膠二兩、合八味、湯成內阿膠、若無當歸、以芎藭代之、若無生薑、以乾薑代之、

婦人雜病脈證并治第二十二

論一首　脈證合十四條
方十三首

婦人中風、七八日續來、寒熱、發作有時、經水適斷、此爲熱入血室、其血必結、故使如瘧狀、發作有時、小柴胡湯主之、方見嘔吐中　婦人傷寒發熱、經水適來、晝日明了、暮則讝語、如見鬼狀者、此爲熱入血室、治之無犯胃氣及上二焦、必自愈、

婦人中風、發熱惡寒、經水適來、得七八日、熱除脈遲、身凉和胸脇滿、如結胸狀、讝語者、此爲熱入血室也、當刺期門、隨其實而取之、陽明病下血讝語者、此爲熱入血室、但頭汗出、當刺

期門、隨其實而瀉之、濈然汗出者愈、●婦人咽中如有炙臠、半夏厚朴湯主之、●半夏厚朴湯方　千金作胸滿心下堅咽中帖帖如有炙肉吐之不出呑之不下半夏一升厚朴三兩茯苓四兩生薑五兩乾蘇葉二兩右五味、以水七升、煮取四升、分溫四服、日三夜一服、●婦人藏躁、喜悲傷欲哭、象如神靈所作、數欠伸、甘麥大棗湯主之、●甘艸小麥大棗湯方、甘艸三兩小麥一升大棗十枚右三味、以水六升、

煮取三升、分溫三服、亦補脾氣、●婦人吐涎沫、醫反下之、心下即痞、當先治其吐涎沫、小青龍湯主之、涎沫止、乃治痞、瀉心湯主之、●小青龍湯方　見肺癰中●瀉心湯方　見驚悸中●婦人之病、因虛積冷結氣、爲諸經水斷絶、至有歷年血寒積結胞門、寒傷經絡、凝堅在上、嘔吐涎唾、久成肺癰、形體損分、在中盤結、繞臍寒疝、或兩脇疼痛、與藏相連、或結熱中、痛在關元、脉數無瘡、肌若魚

程本未作來

一本下利作下血

鱗時著男子非止女身在下未多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝急痛膝脛疼煩奄忽眩冒狀如厥癲或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行其針藥治危得安其雖同病脈各異源子當辯記勿謂不然○問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱

脣口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證脣口乾燥故知之當以溫經湯主之○溫經湯方吳茱萸三兩　當歸　芎藭　芍藥　人參　桂枝　阿膠　牡丹皮　生薑　甘艸各二兩　半夏半升　麥門冬一升去心　右十二味以水一斗煮取三升分溫三服亦主婦人少腹寒久不受胎兼治崩中去血或月水來過多及至期不來●帶下經水

不利、少腹滿痛、經一月再見者、土瓜根散主之、

●土瓜根　芍藥　桂枝　蠐螬各三分

右四味、杵爲散、酒服方寸匕、日三服、亦主之　土瓜根

●寸口脉弦而大、弦則爲減、大則爲芤、減則爲寒、芤則爲虛、寒虛相搏、此名曰革、婦人則半産漏下、旋覆花湯主之、●旋覆花湯方、旋覆花三兩　葱十四莖　新絳少許

右三味、以水三升、煮取一升、頓服之、●婦人少腹滿、如敦

臣億等校諸本無膠薑湯方想是前妊娠中膠艾湯

狀、小便微難而不渴、生後者、此爲水與血俱、結在血室也、大黃甘遂湯主之、●大黃甘遂湯方、大黃四兩　甘遂二兩　阿膠二兩

右三味、以水三升、煮取一升、頓服之、其血當下、●婦人經水不利下、抵當湯主之、亦治男子膀胱急有瘀血者　抵當湯方、水蛭三十箇熬　蠐螬三十枚熬　桃仁二十箇去皮尖　大黃三兩酒浸

右四味、爲末、以水五升、煮取三升、去滓、溫服一

升、●婦人經水閉不利、藏堅癖不止、中有乾血、下白物、礬石丸主之、●礬石丸方、礬石三分燒 杏仁一分 右二味、末之、煉蜜和、丸棗核大、內藏中、劇者再內之、●婦人六十二種風、及腹中血氣刺痛、紅藍花酒主之、●紅藍花酒方 疑非仲景方 紅藍花一兩 右一味、以酒一大升、煎減半、頓服一半、未止再服、●婦人腹中諸疾痛、當歸芍藥散主之、●當歸芍藥散方 見前婦中 ●婦人腹中痛、小建中湯主之、●小建中湯方 見前虛勞中 ●問曰、婦人病飲食如故、煩熱不得臥、而反倚息者何也、師曰、此名轉胞、不得溺也、以胞系了戾、故致此病、但利小便則愈、宜腎氣丸主之、●腎氣丸方、乾地黃八兩 薯蕷四兩 山茱萸四兩 澤瀉三兩 茯苓三兩 牡丹皮三兩 桂枝 附子 炮各一兩 右八味、末之、煉蜜和、丸梧子大、酒下十五丸、加至二十五丸、日再、服、●蛇牀子散方、溫陰中、坐藥、蛇

雄黃等藥分兩闕本仲景目云各等分

牀子仁右一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裹內之自然溫○少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之○狼牙湯方狼牙二兩右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯瀝陰中日四遍○胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之○膏髮煎方見黃疸中○小兒疳蟲蝕齒方疑非仲景方雄黃亭歷右二味末之取臘月豬脂鎔以槐枝綿裹

頭四五枚黙藥烙之

雜療方第三十三　論一首　脉證一條　方二十三首

退五藏虛熱四時加減柴胡飲子方冬三月加柴胡八分白朮八分大腹檳榔四枚分皮子用陳皮五分生薑五分桔梗七分○春三月加枳實減白朮共六味○夏三月加生薑三分枳實五分甘艸三分共八味○秋三月加陳皮三分共八味右各咬咀分爲三帖一帖以水三升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服

如四體狸、添甘州少許、每帖分作三小帖、每小帖、以水一升、煮取七合溫服、再合滓爲一服、重煮都成四服、疑非仲景方

●長服訶梨勒丸方　疑非仲景方

訶梨勒煨　陳皮　厚朴各三兩　右三味、末之、煉蜜丸、如梧子大、酒飲服二十丸、加至三十丸、●三物備急丸方　見千金　司空裴秀爲散用亦可

得八至良驗　大黃一兩　乾薑一兩　巴豆一兩去皮心熬別研如脂　右藥各須精新、先擣大黃乾薑爲末、研巴豆內

中、合治一千杵、用爲散、蜜和丸亦佳、密器中貯之、莫令歐氣、主心腹諸卒暴百病、若中惡客忤心腹脹滿、卒痛如錐刺、氣急口禁、停尸卒死者、以煖水若酒、服大豆許三四丸、或不下、捧頭起灌、令下咽、須臾當差、如未差、更與三丸、當腹中鳴、即吐下便差、若口禁、亦須折齒灌之、●治傷寒令愈不復、紫石寒食散方　見千金翼　紫石英　白石英　赤石脂　鍾乳　碓鍊　括蔞根　防風

桔梗　丈蛤　鬼臼各十分　太一餘糧十分燒乾　薑桂枝去皮　附子炮去皮各四分　右十三味、杵爲散、酒服方寸匕、○救卒死方、雞搗汁、灌鼻中、又方、雄雞冠、割取血、管吹內鼻中、猪脂如雞子大、苦酒一升、煮沸灌喉中、雞肝及血、塗面上、以灰圍四旁、立起、大豆二七粒、以雞子白并酒和、盡以吞之、○救卒死而壯熱者方、礬石半斤、以水一斗半、煮消、以漬脚、令沒踝、○救卒死而目閉者方、騎牛臨面、搗雞汁灌耳中、吹皂莢末鼻中、立效、○救卒死而張口反折者、方、灸手足兩爪後、十四壯了、飲以五毒諸膏散、有巴豆者○救卒死而四肢不收失便者、方、馬屎一升、水三斗、煮取二斗、以洗之、又取牛洞稀糞一升、溫酒灌口中、灸心下也一寸、臍上三寸、臍下四寸、各一百壯差、○救小兒卒死而吐利、不知是何病、方、狗屎一丸、絞取汁、以灌之、無濕者、水煮乾者取汁、○尸厥脉動

而無氣氣閉不通故靜而死也治方脈証見上卷首蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌下又方別取左角髮方寸燒末酒和灌令入喉立起

●救卒死客忤死還魂湯主之方千金方云主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已無脈口禁拗不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右足踏肩引之藥下復增取一升須臾立甦麻黃三兩去節杏仁去皮尖一方四兩七十箇甘艸一兩炙●千金右三味以水八升煮取三升去滓分飲之●救自縊死且至暮雖已冷必可治暮至且小難也恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一日以上猶可治之方徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以脚踏其兩肩手少挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按據胸土數動

烏梅二七箇　吳茱萸半升右三味以水一斗煮取六升去滓分溫三服

以病人擔內中三沸擔浮者生沉者死煮取三升去滓分飲之●救自縊死且至暮雖已冷必可治暮至且小難也恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一日以上猶可治之方徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以脚踏其兩肩手少挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按據胸土數動

之、一人摩捋臂脛屈伸之、若已殭、但漸漸強屈之、并按其腹、如此一炊頃、氣從口出、呼吸眼開、而猶引按莫置、亦勿苦勞之、須臾可少柱湯及粥清含與之、令潤喉、漸漸能嚥吸稍止、若向令兩人、以管吹其兩耳眾好、此法最善、無不活者、外臺桑作喪程本作來

●凡中暍死、不可使得冷、得冷便死、療之方、屈草帶繞暍人臍、使三兩人溺其中、令溫、亦可用熱泥和屈草、亦可扣屋椓底、按及車缸、以著暍外臺按及作若脫

人、取令溺不得流去、此謂道路窮卒無湯、當令溺其中、欲使多人溺、取令溫、若湯便可與之、不可泥及車缸、恐此物冷、暍既在夏月、得熱泥土殘車缸、亦可用也、●救溺死方、取竈中灰兩石餘、以埋人、從頭至足、水出七孔、即活、●右療自縊溺暍之法、並出自張仲景、為之、其意殊絕、殆非常情所及、本草所能關、實救人之大術矣、傷寒家數有暍病、非此遇熱之暍、見外臺肘後●治馬外臺若湯閒有有字不可作不用

墜及一切筋骨損、方、見肘後方　大黃一兩切浸緋帛如手大燒灰　亂髮如雞子大燒灰用　久用炊單布一尺燒灰用　敗蒲一握三寸　桃仁四十九箇去皮尖熬甘艸如中指節炙剉　右七味、以童子小便量多少煎、湯成內酒一大盞、次下大黃、去滓、分溫三服、先剉敗蒲席半領、煎湯浴、衣被蓋覆、斯須通利數行、痛楚立差、利及浴水赤、勿怪、卽瘀血也、

禽獸魚蟲禁忌并治第二十四　論辨二首

凡飲食滋味、以養於生、食之有妨、反能爲害、自非服藥煉液、焉能不飲食乎、切見時人、不閑調攝、疾疢競起、莫不因食而生、苟全其生、須知切忌者矣、所食之味、有與病相宜、有與身爲害、若得宜、則益體、害則成疾、以此致危、例皆難療、凡煮藥飲汁以解毒者、雖云救急、不可熱飲、諸毒病、得熱更甚、宜冷飲之、○肝病禁辛、心病禁鹹、

脾病禁酸、肺病禁苦、腎病禁甘、春不食肝、夏不食心、秋不食肺、冬不食腎、四季不食脾、辯曰、春肝氣王、脾氣敗、若食肝、則又補肝、脾氣敗尤甚、不可救、又肝王之時、不可以死氣入肝、恐傷魂也、若非王時即虛、以肝補之佳、餘藏準此、○凡肝臟、自不可輕啜、自死者彌甚、○凡心、皆爲神識所舍、勿食之、使人來生復其報對矣、○凡肉及肝、落地不著塵土者、不可食之、

○諸肉落水浮者、不可食、○諸肉及魚、若狗不食、鳥不啄者、不可食、○諸肉不乾、火炙不動、見水自動者、不可食之、○肉中有如朱點者、不可食之、○六畜肉、熱血不斷者、不可食之、○父母及身本命肉食之、令人神魂不安、○食肥肉及熱羹、不得飲冷水、○諸五藏及魚、投地塵土不汚者、不可食之、○穢飯餕肉臭魚、食之皆傷人、○自死肉口閉者、不可食之、○六畜自死、皆疫

死、則有毒、不可食之、○獸自死、北首及伏地者、
食之殺人、○食生肉、飽飲乳、變成白蟲、一作○血蟲
疫死牛肉、食之令病洞下、亦致堅積、宜利藥下
之、○脯藏米甕中有毒、及經夏食之、發腎病、○
治自死六畜肉中毒方、黃蘗屑搗、服方寸匕、○
治食鬱肉漏脯中毒方、鬱肉密器蓋之隔宿者是也漏脯茅屋漏下沾
着者是也燒犬屎、酒服方寸匕、每服人乳汁亦良、飲
生韭汁三升、亦得、○治黍米中藏乾脯食之中

毒方、大豆濃煮汁、飲數升即解、亦治狸肉漏脯
等毒、○治食生肉中毒方、掘地深三尺、取其下
土三升、以水五升煮數沸、澄清汁飲一升、即愈、
○治六畜鳥獸肝中毒方、水浸豆豉絞取汁、服
數升、愈、○馬脚無夜眼者、不可食之、○食駿馬
肉、不飲酒、則殺人、○馬肉不可熱食、傷人心、○
馬鞍下肉、食之殺人、○白馬黑頭者、不可食之、
○白馬青蹄者、不可食之、○馬肉犉肉、共食飽

醉臥、大忌、○驢馬肉合猪肉食之、成霍亂、○馬肝及毛、不可妄食、中毒害人、○治馬肝毒中人未死方、雄鼠屎二七粒、末之、水和服、日再服、屎尖者是、又方、人垢取方寸匕、服之佳、○治食馬肉中毒欲死方、香豉二兩、杏仁三兩、右二味、蒸一食頃、熟杵之、服、日再服、又方、煮蘆根汁飲之良、○疫死牛、或目赤、或黃、食之大忌、○牛肉共猪肉食之、必作寸白蟲、○青牛腸、不可合犬肉食之、

○牛肺、從三月至五月、其中有蟲、如馬尾、割去勿食、食則損人、○牛羊猪肉、皆不得以楮木桑木蒸炙食之、令人腹內生蟲、○噉蛇牛肉殺人、何以知之、噉蛇者、毛髮向後順者是也、○治噉蛇牛肉食之欲死方、飲人乳汁一升立愈、又方、以泔洗頭、飲一升愈、牛肚細切、以水一斗、煮取一升、煖飲之、大汗出者愈、○治食牛肉中毒方、甘艸煮汁飲之即解、○羊肉、其有宿熱者、不可

食之、〇羊肉不可共生魚酪食之害人、〇羊蹄甲中有珠子白者、名羊懸筋、食之令人癲、〇白羊黑頭、食其腦、作腸癰、〇羊肝共生椒食之、破人五藏、〇猪肉共羊肝和食之令人心悶、〇猪肉以生胡荽同食、爛人臍、〇猪脂不可合梅子食之、〇猪肉和葵食之少氣、〇鹿肉不可和蒲白作羹食之發惡瘡、〇麋脂及梅李子若妊婦食之、令子青盲、男子傷精、〇麞肉不可合蝦及生菜梅李果食之、皆病人、〇痼疾人不可食熊肉、令終身不愈、〇白犬自死不出舌者、食之害人、〇食狗鼠餘、令人發瘻瘡、〇治食犬肉不消心下堅、或腹脹、口乾大渴、心急發熱、妄語如狂、或洞下方、杏仁一升合皮尖一味、以沸湯三升、和取汁、分三服、利下肉片、大驗、〇婦人妊娠、不可食兔肉山羊肉、及鼈雞鴨、令子無聲音、〇兔肉、著肉、不可合白雞肉食之、令人面發黃、〇兔肉、著

千金翼作趾

乾薑食之、成霍亂、○凡鳥自死、口不閉、翅不合者、不可食之、○諸禽肉肝青者、食之殺人、○雞有六翮四距者、不可食之、○鳥雞自首者、不可食之○雞不可共胡蒜食之、滯氣、一云雞子○山雞不可合烏獸肉食之、○雉肉久食之、令人瘦、○鴨卵不可合鼈肉食之、○婦人姙娠食雀肉令子淫亂無恥、○雀肉不可合李子食之、○燕肉、勿食入水、爲蛟龍所噉、○鳥獸有由毒箭死者、其肉有毒、解之方、大豆煮汁、及鹽汁服之解、○魚頭正白、如連珠至脊上、食之殺人、○魚無腸膽者、不可食無腮者、不可食之、三年陰不起、女子絶生、○魚頭似有角者、不可食之、○魚目合者、不可食之、○六甲日、勿食鱗甲之物、○魚、不可合雞肉食之、○魚、不得合鸕鷀肉食之、○鯉魚鮓、不可合小豆藿食之、其子不可合猪肝食之害人、○鯉魚、不可合犬肉

肘后中作臘

食之、●鯽魚、不可合猴雉肉食之、一云、不可合猪肝食、●鰻魚合鹿肉生食、令人筋甲縮、●青魚鮓、不可合生胡荽及生葵、幷麥中食之、●鮓纏、不可合白犬血食之、●龜肉、不可合酒果子食之、●鼈目凹陷者、及厭下有王字形者、不可食之、其肉、不得合雞鴨子食之、●龜鼈肉不可合苋菜食之、●鰕無鬚、及腹下通黑、煮之反白者、不可食之、●食膾飲乳酪、令人腹中生蟲爲瘕、●鱠食之、在心胸間不化、吐復不出、速下除之、久成癥病、治之方、橘皮一兩大黃二兩朴消二兩右三味、以水一大升、煮至小升、頓服即消、●食鱠多不消、結爲癥病、治之方、馬鞭草、右一味、搗汁飲之、或以薑葉汁飲之一升、亦消、又可服吐藥吐之、●食魚後食毒、兩種煩亂、治之方、橘皮濃煎汁、服之即解、●食鯸鮧魚中毒方、蘆根煮汁服之即解、●蝲目相向、足班目赤者、不

千金療食魚中毒方煮橘皮停冷服之一

中毒下當有治之三字

米恐累之誤

可食之、○食蠏中毒、治之方、紫蘇煮汁飲之三升、紫蘇子搗汁飲之亦良、又方、冬瓜汁飲二升、食冬瓜亦可、○凡蠏未遇霜多毒、其熟者乃可食之、○蜘蛛落食中、有毒、勿食之、○凡蜂蠅蟲蟻等多集食上、食之致瘕、

菓實菜穀禁忌幷治第二十五

果子生食生瘡、○果子落地經宿、蟲蟻食之者、人大忌食之、○生米停留多日、有損處、食之傷人、○桃子多食令人熱、仍不得入水浴、令人病淋瀝寒熱病、○杏酪不熟傷人、○梅多食壞人齒、○李不可多食令人臚脹、○林檎不可多食、令人百脉弱、○橘柚多食令人口爽、不知五味、○梨不可多食令人寒中、金瘡産婦亦不宜食之、○櫻桃杏多食、傷筋骨、○安石榴不可多食、損人肺、○胡桃不可多食令人動痰飲、○生棗多食令人熱渴氣脹寒熱、羸瘦者彌不可食、傷

人、○食諸果中毒、治之方、猪骨、燒過右一味末之、水服方寸匕、亦治馬肝漏脯等毒、●木耳赤色、及仰生者、勿食、●菌仰卷、及赤色者、不可食、○食諸菌中毒、悶亂欲死、治之方、人糞汁飲一升、土漿飲一二升、大豆濃煮汁飲之、服諸吐利藥、並解、○食楓樹菌、而笑不止、治之以前方、○誤食野芋、煩毒欲死、治之方、以前方、其野芋根山東人名魁芋人種芋三年不收亦成野芋並殺人●蜀椒閉口者、有毒、誤食之、

戟人咽喉氣閉欲絶、或吐下白沫、身體痺冷、急治之方、肉桂煎汁飲之、多飲冷水一二升、或食蒜、或飲地漿、或濃煮豉汁飲之、並解、●正月勿食生葱、令人面生游風、○二月勿食藜、傷人腎、○三月勿食小蒜、傷人志性、○四月八月勿食胡葵、傷人神、○五月勿食韭、令人乏氣力、○五月五日勿食一切生菜、發百病、○六月七月勿食菜萸、傷神氣、○八月九月勿食薑、傷人神、○十

月勿食椒、損人心、傷心脉、〇十一月十二月勿食韭、令人心、傷心脉、〇十一月十二月勿食薤、令人久病、〇四季勿食生葵、令人飲食不化、發百病、非但食中、藥中皆不可用、深宜愼之、〇時病差未健、食生菜、手足必腫、〇夜食生菜、不利人、〇十月勿食被霜生菜、令人面無光、目澁心痛腰疼、或發心瘧、瘧發時手足十指爪皆青、困委、〇葱韭初生芽者、食之傷人心氣、〇飲白酒食生韭、令人病增、〇生葱不可共蜜食之、殺人、獨顆蒜彌忌、〇棗合生葱食之、令人病、〇生葱、和雄雞雉白犬肉食之、令人七竅經年流血、〇食糖蜜、後四日內、食生葱蒜、令人心痛、〇夜食諸薑蒜葱等、傷人心、〇蕪菁根多食、令人氣脹、〇薤、不可共牛肉作羹食之、成瘕病、韭亦然、〇蕈多食、動痔疾、〇野苣不可同蜜食之、作內痔、〇白苣不可共酪同食、作蠱蟲、〇黃瓜食之、發熱病、〇葵心不可食、傷人、葉尤冷、黃背

一本蒜作韭

別錄冷下有利字

赤莖者、勿食之、○人不可食胡荽、及黃花菜、○芋不可多食、動病、○妊婦食薑、令子餘指、○蔘多食、發心痛、○蔘和生魚食之、令人奪氣、陰核疼痛、○芥菜、不可共兔肉食之、成惡邪病、○小蒜多食、傷人心力、○食躁或躁方、豉濃煮汁飲之、○鉤吻與芹菜相似、誤食之殺人、解之方、（肘後云與菜莨菪相似）荽花八兩食芹和兩（鉤吻生地傍無他草）

（或一作式醫宗金鑑云食躁或躁者即今之食後時或惡心欲吐不吐之病也）

莖有毛者、以此分之、○菜中有水莨菪、葉圓而光、有毒、誤食之令人狂亂、狀如中風、或吐血、治之方、甘艸煮汁服之即解、○春秋二時、龍帶精入芹菜中、人偶食之爲病、發時手青、腹滿痛不可忍、名蛟龍病、治之方硬糖二三升、右一味、日兩度服之、吐出如蜥蜴三五枚、差、○食苦瓠中毒、治之方、黍穰煮汁數服之、解、○扁豆寒熱者不可食之、○久食小豆、令人枯燥、○食大豆屑、忌噉猪肉、○

大麥久食、令人作癬、○白黍米不可同飴蜜食、亦不可合葵食之、○荛麥麪多食、令人髮落、○鹽多食、傷人肺、○食冷物、氷人齒、○食熱物、勿飲冷水、○飲酒食生蒼耳、令人心痛、○夏月大醉汗流、不得冷水洗著身、及使扇、即成病、○飲酒、大忌炙腹背、令入腸結、○醉後勿飽食、發寒熱、○飲酒食猪肉、卧秣稻穰中、則發黃、○食飴多飲酒、大忌、○凡水及酒、照見人影動者、不可

飲之、○醋合酪食之、令人血痕、○食白米粥、勿食生蒼耳、成走痓、○食甜粥已、食鹽即吐、○屋角筋、攪飲食沫出、及澆地蹟起者、食之殺人、○飲食中毒煩滿、治之方、苦參三兩、苦酒一升、右二味、煮三沸、三上三下、服之吐食出即差、或以水煮亦得、又方、犀角湯亦佳、○貪食食多不消、心腹堅滿痛、治之方、鹽一升、水三升、右二味、煮令鹽消、分三服、當吐出食便差、○礬石生入腹

破人心肝、亦禁水、○商陸以水服殺人、○葶藶
子傳頭瘡、藥氣入腦、殺人、○水銀入人耳、及六
畜等、皆死、以金銀著耳邊、水銀則吐、○苦楝無
子者、殺人、○凡諸毒、多是假毒以投、元知時、宜
煮甘艸薺苨汁飲之、通除諸毒藥、

寛保三年癸亥三月原刻
天明八年戊申六月再刻
文化三年丙寅正月新刻

平安書肆　文泉堂林權兵衛

元恐无之誤

醫書藏板目錄

宋板傷寒論	漢張仲景先生著 二冊	
小刻傷寒論	香川先生校正 一冊	
傷寒論辨正	深齋中西先生著 三冊	
刪訂傷寒論	中西先生著 小本一冊	
傷寒劉氏傳	白水先生著 四冊	
古今醫統	四十冊	
金匱要畧方	後藤先生校正 二冊	
金匱要畧論註	白水先生著 三冊	
金匱通玄類證	烏巢道人著 一冊	
傷寒通玄類證	烏巢道人著 一冊	
傷寒明理論	紫霞僊先生句讀 四冊	
傷寒直格	劉河澗著 四冊	
作劑鑑	白水先生著 小刻 一冊	
方的	烏巢道人著 一冊	

金匱要畧折義 後藤先生著 三冊

藥徵 吉益先生著 二冊

類聚方 吉益先生著 小本一冊

古方區別 本間先生著 一冊

挨穴捷徑 杉原敦公著 小本一冊

復古傷寒論 泰岳先生著 四冊

古文金匱要畧 東都桃井先生著 一冊

傷寒古訓傳 東谷先生著 五冊

醫療歌配劑 古林先生著 小刻一冊

傷風約言 後藤先生著 一冊

艾灸通說 後藤先生著 一冊

温疫論 台州萩生校正 二冊

醫學至要鈔 淺井先生著 三冊

皇都書林 林權兵衛

東都書林 須原屋孫七