不藥良方

卷上

C116/2535
v.1





方藥之書尚矣漢書藝文志所載
經方十一家二百七十四卷今皆不傳
其所用藥無可攷見傳於今者以
葛稚川肘後備急方為最古唐
宋以來如陸宣公蘇文忠沈存中許
叔微通儒大賢亦俱留意於此往

往著有成書其它作者日益夥矣
頒方書多而世之知醫者尠僻
邑遐壤肆不備藥投方以求或
且無有即有之不能辨其性味
六經不敢用也乾隆中漢寧
王桂舟方伯嘗游蓋平何氏不藥

良方一書試之多驗其方所用類
皆艸木金石鳥獸蟲魚尋常之品
得之既易識之不難公以其便於遐
僻之地與不知醫之人因而廣之
勒為兩卷既而搜采益富又續成
十卷鋟木以傳歲久版佚 公孫仲

和鹹尹星輔大令遜重刻之所以擧
先志廣仁術也或謂琭曰顏師古注
急就篇謂艸木金石爲獸蟲魚之
類堪愈疾者總名爲藥是編諸方
所用大氏皆是物也而何氏以不藥
名其書公亦仍之何歟琭應之曰

子之言拘矣說文曰藥治病艸是
藥也者治病艸之專名也其它艸
木金石爲獸蟲魚之類有可以治
病者故本艸收之人口呼之爲藥
爾實則藥之稱可以抵諸物而
諸物不能專藥之名今試取治

病艸以示人〻必曰此藥也取其它
艸木金石鳥獸蟲魚之類以示人
曰此藥也則將有悵然不應者矣
何氏之名書與說文古義合公故
仍之安可議哉線於醫術無所
解本不足以序是書頗以鹺尹

昆仲謠諉之勤不能終辭用釋
何氏名書之義即以畣或人者
書以為序
光緒辛巳冬日越人汪琭譔

序

禮云醫不三世不服其藥書云若藥勿瞑眩厥疾勿瘳若是乎醫藥之難於良耶況乎荒徼遐陬深山窮谷醫不能徧通舟車道路逆旅徑人藥不能猝辦難於此而有不藥可愈

之術鮮不奉為良醫矣予昔見盖平何氏刊行不藥良方其所需皆尋常之物無診候之煩携諸行囊屢試輒驗予既歎其神因思廣其意偶有見聞隨手抄錄數年來歷滇南山左吳越豫荆採擇更多裒然成帙遂分為十二門以便臨時之翻閱久思壽梨公世緣塵轍靡寧因循不果癸卯秋量移西蜀於篋笥中撿付梓人非敢謂功侔良相也以是編既便於取携復易於傳述濟醫藥之所窮而占勿藥之有喜是

六活人之一術云爾

乾隆四十八年十二月既望

桂舟王咕桂題

不藥良方總目

卷上

急救

頭面

耳目

口齒

身體

心腹

手足
卷下
雜症
損傷
瘡毒
婦人
小兒

不藥良方卷上

急救門

治中暑昏眩煩悶欲死　挖地深二尺取新汲水傾入坑內攪濁飲數甌即愈

治自縊死　繩索不可刀割要人抱定以膝蓋頂前後陰輕輕解下不可放倒安放平坦仰面朝天手提頭髮將頭抽直脚踏兩肩將糞門用力頂住不令洩氣用鷄冠血滴入口鼻俟氣轉徐徐曲伸其

手足再將筆管吹其兩耳用手按摩其胸中雖氣絕時久多吹多摩亦可救活　再以皂角細辛吹其鼻

治水溺死　用牛一頭或鐵鍋一口將溺者橫卧於上口中放簪一枝使水可出再以老生薑摻於鴨血灌之即活

治暴死　燒炭一爐以陳醋潑之令氣入鼻中即活或韭汁灌鼻亦好

治驚嚇死　以醋酒灌之

治魘死　不可火照咬其脚根即醒

治凍死　凡凍將死有氣者灰炒熱囊盛熨心胸冷即易灰若不先温其心便以火烘則冷與火爭必死

治熱死　用道上土研細圍其臍中溺熱小便令滿可活

治溺死　用單被裹溺者以竈內温灰一二担鋪地

令溺者卧灰上上亦以厚灰蓋之須臾即活

治鹽滷毒　用生豆腐漿灌下吐出即活或肥皂水亦可俱忌熱水

治從高墜下瘀血冲心欲死　抉開其口以熱小便灌之

中風不省人事　柏葉一握葱白一握連根細搗如泥無灰酒一大鍾煎一二十沸去滓温服

治吞針妙方　蚕豆煮同韭菜食針與菜自從大便而出

治五絕一自縊一墻壁木石壓三溺水四魘魅五產死　半夏一兩搗羅爲末冷水丸如大豆納鼻孔中即愈心頭温者雖經一日可活

溺死　鴨血灌之即可活

辟時氣　紅棗蒼朮二味不時薰之

治吞金

羊脛骨燒焦研細末三錢米飲送下其物由大便

自出

羊脛骨一方吞五金同治最為神妙如無羊脛骨用鴨血亦能吞金多者用數鴨之血方可救若用羊血更是仙丹

吞銅　勒薺多食之自化

吞鐵　柴炭末和粥食之自下

頭面門

治大頭瘟頭面皆腫者　福建靛花三錢燒酒一鍾鷄蛋清一箇攪勻吃下神方也

治鼻血不止　毛頭紙一張四摺將水濕透鋪於頭

男女鼻血及婦女血崩有流一半日而死者用毛頭紙竹帛亦可七層如大錢大將行匿遠以鼻血對後腦窩血崩對頂心用流行一壺對紙上遍熨之即止此救命仙丹也

雲韶傳方

治疟腮　青靛花敷之　或用赤小豆研末陳醋調

自出

頭面門

治大頭瘟頭面皆腫者　福建靛花三錢燒酒一鍾鷄蛋清一箇攪勻吃下神方也

治鼻血不止　毛頭紙一張四摺將水濕透鋪於頭頂上將熨斗熨之獨頭蒜切開貼於脚心即愈左鼻貼左右鼻貼右又用線札中指根左鼻札左右鼻札右

治疙瘩腮　青靛花敷之　或用赤小豆研末陳醋調

敷如乾常常潤之卽愈

治下頦落　烏梅含一箇卽上

治偏腦疼　白雞冠花向陽之子晒乾爲末每用一錢五分黃酒調服

治鼻內流血不止　取胎髮或自己梳下髮燒灰一二錢黃酒送下立愈

治鼻衄不止　用蘿蔔自然汁和無灰黃酒飲之則止

又方　用大紙一張作八摺於水內濕置頂中以熨斗熨至一重或二重紙乾立止

治頭眩昏倒方　用白果二個去殼生搗爛冲滾水空心服至重者五服卽安老年更效

治酒齄鼻　蕎麥麵燒灰存性研細麻油塗之

治偏頭痛　鯽魚頭一個居中切開（如左邊頭痛用左邊魚頭如右邊頭痛用右邊魚頭）放在火上烟燻鼻孔

又方　用蘄艾四兩白菊花四兩小袋盛放枕內睡

久不發

治面上疳瘡　舊土墻上白螺螄殼不拘多少用水洗去泥沙燒灰存性香油調末搽數次愈

頭上梅花癬　活鯽魚一個去肚磔不可見水以生礬末一錢信三分共入魚腹內用麻油浸半日焙乾爲末先用花椒鹽茶水洗頭後俟乾將藥末搽之

癩頭　蘿蔔整株搗爛加麝香三分塗勻以布包之

漏　豬肺一個水製淨入開口川椒照人年紀每歲三顆煮熟食之

又方　蒼耳子辛夷花各三錢煎服

鼻衄　髮洗淨燒灰吹鼻孔再以水服一錢如右孔出血用線札右手中指左孔出血札左手中指兩孔出血左右中指俱札血自止

又方　搗蒜敷足心血止即拭去

又方　頂心泥丸宮上畧剪去頭髮一圓如錢大用

粗草紙疊厚五六層如酒杯大浸入井水濕透罨在頂心上燒熱烙鐵在紙上熨之若紙乾再易濕紙如前熨之以血止爲度

鼻內生肉氣閉　辛夷白芷升麻藁本防風川芎細辛木通甘草每味各一錢五分共爲末每服三錢茶調下外用白礬燒爲末加硇砂少許吹鼻中鼻中生瘡　元參研末塗之或以水浸軟塞鼻中亦可

鼻血不止　白茂研末津調塗山根上仍以水服一錢

又方　馬蘭根塞之

又方　蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中

又方　茅花五錢水一鍾煎服卽止

偏正頭痛百藥不治者　香白芷二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩　共爲末每服一錢細茶

薄荷湯下

耳目門

治諸虫入耳　不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然　或用高醋麻油韭汁葱汁羌汁此數種因便而灌耳中其虫自出

治迎風流淚兼治眼目昏花　霜後桑葉煎水頻洗

治眼皮生瘤　櫻桃核磨水渣之自消

治耳底　蚕木鱉一個磨水滴耳內即愈

治飛絲入目　京墨磨濃用新筆蘸墨點眼角內閉目片時其絲自然成塊用手輕沫卽出如尙未盡再點自出

治雜物迷目　東墻上馬齒菜燒灰研細點眥頭片時而出

治火藥冲眼欲瞎　急用熱小便頻洗卽愈

治眼中生翳　食荸薺十數日自退

治迎風流淚　每日五更後以唾津抹六七次日久自愈

耳痛　鬱金浸水滴之

忽大痛　如虫在內走或流血水或乾痛

蛇蛻燒灰吹入之

耳閉不通又作痛　田螺一個撥開益入麝香五分自化成水滴入之

又方　每日平明以大指食指捏住鼻孔勿令泄氣咬牙瞪目口唇相粘使氣俱入耳竅悶極放手有

閉即照前行之久則自效

耳內流水　香附研末糝入之

耳痛有膿 先緻淨 桑螵蛸一個燒灰存性同麝香半分共研末糝之

眼生翳障　荸薺去皮搗爛已鐵器將漿濾出陰乾研末成粉每一兩加冰片一錢用針點兩眼角

風眼下淚　鷄冠血點之

又方　臘月不落桑葉煎湯日日溫洗之 或加入芒硝少許

天絲累目　用木梳垢爲小丸放於眼角邊即出

用珊瑚屑亦可

明目去風爛　採女貞子陰乾按歲服風爛可除至老不花宗丞徐公試服甚驗迄今七十而目力如少年時 女貞子即冬青樹子

風爛眼　蘆甘石 童便煅研細末 三分當歸二分胆礬一分

冲滾水時時燻熱洗之

耳閉 年老者不效　眞細辛石菖蒲木通各一分麝二

匣共爲細末綿裹塞耳中

口齒門

治單雙乳蛾　明礬五錢巴豆七粒去皮去油銀礶內火煆礬枯豆黑去豆將礬研末用少許吹喉吐出流涎立愈

又方　用兩手從臂上抹至大拇指間四五十下以繩扎住男左女右大指甲旁以針刺出血即愈又云兩手大拇指旁縫刺出血亦好

治骨鯁　以野苧根洗淨搗爛如泥丸如龍眼大雞

骨傷以雞湯下魚骨傷以魚湯下

治口吐清水　艾葉煎汁飲之愈

治牙床出血　松針熬汁一鍾入麥麵少許攪勻澄清飲之即愈

治走馬牙疳　人龍瓦上焙乾研極細青黛冰片各少許研勻吹入即愈

治口瘡　陳白螺螄殼燒灰加兒茶少許爲末吹患處一次即愈諸疳悉治

治冬月唇乾出血　桃仁搗爛猪油調塗

治口瘡　胆礬一塊百沸湯泡開含漱即愈

治舌腫伸出口外　雄雞冠血一盞浸之即縮入

治牙縫出血　以鹽湯常常漱之仍以鹽研細末擦牙

治牙虫　韭子以油拌置小瓦片上燒烟放在水碗內上以漏升蓋之以虫牙受漏升口中所出之烟其虫如針俱落水中

治睡中咬牙　候患人睡沉取彼卧席下塵一撮納口中勿令人知卽愈

治咽喉腫痛　山豆根寸餘含口內愈

治風火牙疼　松木節一小片咬疼牙上立止

治乳蛾　用磁鋒輕鑿頂門數百下出血卽愈

治喉腫　凡咽喉初覺壅塞一時無藥以紙攪探鼻中或鼾皂末歛嚏數次可解熱毒仍以李樹近根皮磨水塗喉外卽愈

治舌腫塞喉　用朴硝白礬爲末擦舌立消

治噎食病久方　韭菜汁牛乳一樣多時時嚥之有痰隔者加羌汁少許服久自愈

又方　常食奶酥油以潤胃口更效忌勞碌色慾生冷魚麵等永戒燒酒

喉生雙單蛾　土牛膝連根帶土搗爛如彈子大用酸醋浸汁漱口

又方　白壁喜蛛窩燈上燒爲灰每一分用冰片一

分調勻吹之

又方　人指甲瓦上焙焦黃色研細末以竹管吹入喉內

喉風　猪牙皂角揭爛以酸醋調入喉四五嗽痰大吐痛卽止

喉風掀腫藥食不能下者　好胆星一粒含口內卽開

骨鯁　人指甲燒灰吹下喉中卽去

又方　威靈仙砂糖共酒煎服一切竹木刺入喉亦效

誤吞銅錢　砂仁一兩水煎濃汁服之

又方　羊角燒灰存性研末黃酒調服

又方　砂糖一小鍾用白炭燒紅放入糖內共搗爛爲團吃下并不論鉄錫皆治

又方　食荸薺自化

牙疼　冰片硃砂等分共研末擦之

又方　火疼細辛石膏各三錢水二鍾煎服卽以少許

漱口

又方 治疼 胡椒二粒母丁香二粒皂礬二分共爲末用綿棉或用布包緊咬在疼處漱去粘水熱涎其疼卽止

反胃 猪母糞煆存性拌砂糖服

又方 年久陳石灰炒熱研末酸醋爲丸如豆大每服七丸薑湯送下三服卽愈

又方 梨汁韭汁薑汁各三分共一盞用牛乳薑一

倍入三汁內鍋底乳結成取出日食三次至數日可愈

治噎食 韭菜汁牛乳一樣多時時嚥之有痰隔者加薑汁少許服久自愈忌勞碌色慾生冷魚麵等類

口上疔瘡 上好銀硃三錢大荔枝三枚取肉口嚼爛拌硃敷患處

口瘡 朴硝含之漸愈

一切喉內火毒兼治喉風單雙蛾及小兒口瘡 人

中白煆一錢硼砂五分胆礬三分冰片五厘共爲細末吹患處

走馬牙疳　大公雞肝一個不要見水以雄黃作麵洒於肝上在飯鍋蒸熟去雄黃與兒食二三個卽愈

咽喉戳傷飲食不下　雞蛋一個鑽一小孔去黃留白入生半夏一個以微火煨熱將蛋白服之卽愈

固齒　生大黃生石羔各等分爲末擦齒洗眼

舌忽吐出口外自不能收者　暑月始宜　井水一桶令一人提起立候一人引病人前來不可說明將近身卽劈面潑去其舌自收

身體門

治筋骨疼痛如夾板狀不可忍者　騾子修下爪甲燒灰存性研末黃酒調服立愈

治夜不得睡　燈草煎湯代茶飲卽得睡

治二便不通　皂莢燒灰存性研末米湯下三錢立效

治小便不通　小麥稭一掬煎湯飲之立效

治小便下血淋症　益母草搗汁服一升卽愈　苧

麻根煎湯飲之甚妙

治疝氣囊腫　將兩脚第二指對縛一處用筋頂大艾炷從第二指頂上合縫灸之立愈　又方用艾灸脚大指甲肉相連之處二三壯卽愈

治小便縮入腹內者　用肥母雞一隻將快刀於脊上劈開不去毛屎以手扯開急急合在病人腹臍上令人以脚踏雞須臾熱氣透入小便卽出

治睡後轉筋　男子左痛以手挽腎向左右痛挽腎向右女子挽乳照式最妙

治小便不通　生猪胆一個以小便插入胆中少頃汁入尿自出如婦人以汁滴入陰中

治尿後有鮮血　柿餅三枚燒灰陳米煎湯調服

治夜夢遺精　韭菜子一兩爲末每清晨酒調二錢送下白滾水調亦可

治狐臭　每夜取熱小便頻頻洗之　或用明礬研碎每日擦三四次久之自愈

治大便結燥　淡豆豉七粒連根葱白三莖搗極爛貼臍上便出卽揭去

治大便下血　服回龍湯卽愈

治小便不通　犀角琍琄二味研水服之立效

治小便不通出血痛甚方　甘草節三錢鹽三錢煎湯服之卽愈

治遺精白濁　用猪肚一個擦淨油氣將蓮子半觔去心留翳入猪肚內蒸爛或下酒或下飯重則三個輕則二個卽愈

治脫肛奇方　用蟬退爲末菜油調敷立收

腸風下血　蜜炙蘿蔔任意食之

又方　荸薺紅棗各半煮熟連湯隨便飲之

又方　粗草紙燒灰砂糖拌勻開水服

又方　蕎麥麵三升炒熟用紅糖早辰調服

小便出血不拘痛否皆治　鏡面草呼俗爲螺螄眼搗汁無灰酒下之或用淡豆豉煎湯服

陰囊腫痛　煨葱入鹽杵如泥塗之

又方　葱白乳香搗爛塗之

陰腫如斗　雄黃礬石各二兩甘草一尺水五升煮二升浸洗自愈

半身不遂並瘋癱痰症　番木鱉一兩砂鍋微炒後用陳土炒再用麵炒又用眞麻油微炒研細麵糊爲丸硃砂爲衣如菉豆大每服量人壯弱至一錢止燒酒臨卧服之

大便不通　桃花瓣一大撮用滾水半碗冲服鮮者更佳或採來陰乾以備急用亦可

二便不通　飛鹽塡實臍眼上襯蒜片艾灸三次

又方　食鹽炒熟候冷塡臍中灸七壯立通

小便不通　棕皮毛燒灰存性薄酒調下

又方　麥桿草不拘新舊於節處剪斷按一歲一根煎湯飲

尿管澁痛　牛膝用好酒濃煎服之

下陰腫疼　絲瓜子一兩擂如泥熱黃酒冲服

又腫如燈籠　灶口黃土蒼朮炒牡蠣煅各等分爲末用紗作袋撲之

水便無度因腎虛者卽效　補骨脂茴香等分研末蜜丸服

尿血小便有血不疼者爲尿血主虛　白芷當歸等分爲末服

腎囊瘋痒　花椒一錢每夜煎水洗腎再用甘草黃柏枯礬各三分共爲末調猪胆搽之

又方并治黃水瘡　砂仁壳將米泔水煎極濃湯洗之洗後卽坐晒熱土磚上取出毒水水盡卽愈

又方　艾葉蘇葉明礬各三錢煎水洗

濕痒　麪炭紫蘇葉共爲末撲之

大氣脬　白毛藤無灰酒服

陽痿挺脹　甘草稍二兩黑豆半升水濃煎服

腎漏長硬不痠痛出指之則脹痒如針刺　補骨脂韭子研末各一兩

每三錢水煎服一日三次

小腸氣　牛蒡子根搗爛酒沖服

又方　胡桃一枚燒灰研末熱酒服

又方　油核桃七個火煨去壳用肉八角回香七個酒煎空服

又方　雞子一個尖上開孔入硫黃末三錢火煅成灰研末白湯送下

又方　荔枝核龍眼核各七個俱燒灰大回香二個炒共爲末好酒調下外用生羌二兩搗爛敷腎俞消

又方　姜蚕鹽洗香附酒洗小回香鹽洗各等分爲末每服好酒送下一錢

陰痿　蛇床子煎濃湯浸洗

小便遺精　蓮子心一撮爲末入辰砂一分每服一錢白滾湯下日服二次

睡着即遺　韭子一合白龍骨一兩共爲末每服二

錢空心酒調服

遺精日久如水之漏者　文蛤八個白茯苓二兩白龍骨一兩各爲末米糊丸如桐子大每服七十丸空心淡鹽湯下臨睡再一服

夜長醒不寐　酸棗炒熟白茯苓各五錢共研末每服三錢蜜水調下

癩頭瘡　并治諸惡瘡　白蜜調甘草末敷之

癩頭疳瘡　冰片一分研末燈心燒灰研末先用甘草湯洗後將二味調勻敷之外用烏金紙貼上一日換三次

脫出腸頭　貼水荷葉焙乾研末酒服二錢再將荷葉成末坐之

又方　白礬五錢五棓五錢煎湯薰洗後以木賊按之即收

老小溺床　白紙一張鋪於身下待遺尿在上取出晒乾燒灰冲酒服

小腸氣　荔枝核一枚微開一洞填入炒鹽煆灰酒送痛甚者小回香煎湯送之

治陰奇癢難忍　蛇床子吳茱萸苦參等分煎湯洗之

剝皮丹　蚯蚓糞新瓦罌焙麻油調敷

又方　青夏布舊蚊帳燒灰存性麻油調敷之如發再敷

胡臭　甘遂一兩大蒜一枚共搗爛爲餅夾在兩脇須熱天蓋被取汗再用甘草三錢煎服俟汗大出即愈

遍身紅痱　鱔魚血塗之即愈

中暑發熱口乾小便不利　白滑石六錢甘草一錢微炒共爲末每服二三錢和蜜少許冷水調服

治大腸閉結　蘆薈白朮各等分以蜜爲丸如桐子大服之立便大解不可多服也

受寒小腹痛　小茴香青皮各一錢不愈者而腹尤

疼加吳茱萸八分煎服

小腸氣　木香三錢沉香三錢澤瀉五錢陳皮五錢小茴香三錢香附酒炒五錢烏藥五錢丁香二錢荔枝核五錢以酒爲丸如桐子大鹽水送下每日服二錢

心腹門

治痞積效方　雄雞糞泡在缸內夏十日春秋二十日冬四十日每日攪四五次去其渣滓用木柴熬膏用砂鍋不用鐵器貼患處神效

治腹瀉初起用此方神效　細茶二錢燒核桃仁五個生薑三錢紅砂糖三錢水二碗煎八分次早温服

治憂心疼　山羊血一分燒酒化下

治醋心上攻　吳萸湯泡去苦味一合水三鍾煎七分食遠服

治心疼　淡豆豉五錢煎湯半鍾服之立愈

治噎食　生薑汁童便韭菜汁各一鍾同放大碗內入鍋中隔水煮數沸候冷取出露一宿重煎温服日日服之以愈爲止

治膈食膨脹神方　五六月用老薑二三觔盛竹簍內或麻布袋浸糞缸內七日取出洗淨竹刀刮去皮切片懸空陰乾爲末每服三錢火酒調下不過三服全愈

治鼓脹（草靈丹）　四五月黃牛糞陰乾微炒黃色爲末每服一兩煎半時濾清服之三服全愈

治胃腕疼　以鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰愈

治腹痛緊急　用鹽微炒布裹熨痛處立止

治翻胃　以柿餅就乾飯食之忌飲水旬日即愈

治噎食　大橘子一箇胆礬七分將橘子頂上切去一片以礬納入仍以切下之片蓋上用鹽和黃泥團一大毬以炭火煅過候冷取出將橘肉灰爲末每服三分滾水調下卽愈

治臌脹　好黃牛肉一觔以河水煨極爛加皮硝一兩隨意食之二三日其腫卽消至重者　食一觔卽全愈百日內忌醋醃葷腥油膩生冷粘硬之物

治水臌　冬瓜不限多少任意食之或取汁服亦可

治痞積　以葱蜜同搗爛攤在布上貼患處用熨斗微火熨之痞立下

治熱病後行房腎子入腹疼痛將死者　用婦人月經小衣取有血之處燒灰爲末滾水冲服立效

治食下卽響響而卽瀉諸藥不效　生紅柿核紙包水濕灰火燒熟食之不三四個卽止

治胃氣痛　男左女右於小指第三節下掌紋盡頭握拳高起處灸艾三炷立愈

治心痛成方　烏梅七個去核紅棗八個去核杏仁十個去皮尖共搗成膏爲丸如雞頭子大每服一丸熟酒下或鹽湯亦可

治水鼓方　精猪肉一二兩加甘遂一分用濕紙包煨香熟爲度細嚼好酒送下便去一切惡物至重者不過三服

治嘔吐不止兼惡心　用生薑一大塊直切薄片勿令折斷層層摻鹽於內以水濕苧蔴密纏外用紙包水濕火煨令熟取去蔴紙用薑搗爛和稀米飲服之

治翻胃噎膈　用抱出鷄子殼燒灰每服二錢酒下

又方　猫生子胞衣陰乾燒灰存性酒調服　須急急取之稍遲則猫食矣

腹中硬塊膏　臭椿皮在上中者佳要一大束去粗皮止用白皮二觔切碎入鍋內水煮攪去渣用文武火熬成膏薄攤標布上先以生薑搓去垢膩後

以火熠熱膏藥貼痞塊上其初微痛半日後卽不痛俟其自落一張卽好永不再發貼膏時微撒麝少許於膏上然後貼之貼上膏藥週圍破壞出水卽驗　此方已驗多人卽脹滿腹硬過臍者貼一二張卽愈眞神方也珍之重之

治飢逆不止　用荔枝七枚連殼燒灰存性爲末白湯調服立止　如病後飢逆不止用刀豆子燒灰存性白湯調服二錢卽止　尋常飢逆以紙撚取

噦卽止

肝心痛　老母雞翅毛七根煆灰冷水服

又方　年久老桑上採取桑黃晒乾用酒一鍾磨桑黃二分熱服卽腹鳴痛止

又方　雄黃一錢烏梅湯調服

胃疼　六稜椹子殼煆灰存性三錢酒冲服二三次卽效

又方　沙魚翅煎湯磨沉香三四分冲入服

又方　石燕一雙醋煆七次温酒送下

腹疼不識何症　鹽微炒以布裹熨痛處

腹脇痞塊　雄黃一兩白礬一兩共爲末麵糊調膏攤貼之如未見功再貼待大便如數百觔之重便愈

治痞初起　如痞似鍾大者緝其根用桃腦七枝每枝七葉獨蒜頭一個共搗爛入麝香二分攤膏貼之鼻聞麝香即揭下此膏

又方　臭椿皮在上中者佳一大束去粗皮止用白皮二觔切碎入鍋內水熬攄去渣用文武火熬成膏薄攤標布上先以生薑搓去患處垢膩後以火熁熱膏藥微撒麝香少許於膏上貼痞塊處其初微痛半日後便止俟其自落待週圍破壞出水即驗

沙肚痛　砂仁五錢炒黑食鹽三錢炒黃汲無根井水煎湯將二味研末入內用筷打至將冷一大碗頓服之愈

暴下　車前子二錢爲末米湯下

蠱脹　線雞糞一升炒黃色好酒三碗淬下煮作一碗濾去渣服之皮皺未消再一服更入田螺肉三枚同又煮一碗再服之愈後以温粥調理數日

水臌脹起病時頭腫四肢瘇肚腹大　大烏魚一個重六七觔的帶壳砂仁從活魚口中塞入俟塡滿用水和黃泥通身裹沿用炭火煨一夜其內成黑炭樣取出研細末每服三錢淡開水送下

黃胖　饅頭一個用竹刀剜濶其口不宜大四圍不可插破將皂礬塡滿在竹刳上烘鬆燥莫使太焦搗如細麵滾水和丸如桐子大每服二錢或一錢五分量人大小服之

氣臌脹　陳香圓多年者佳以布袋盛放清糞坑內浸一晝夜取出晒乾又以清水浸一晝夜取出仍放坑內如此製五次晒乾切片用新瓦焙黃色存性研爲末以黃酒調送空心每服一圓三次愈

酒肉過多脹滿不快　鹽花擦牙用温水漱下二三
次卽舒暢
停食或因醉飽卽睡胸膈痰飲積熱氣結滿悶　陳
皮五錢微炒研末以水濃煎如茶呷服卽寬
大小人積食諸藥不能消者　陳年火腿骨煅黑色
研末三錢用火肉一觔煮熟去汁上肥油取清湯
一碗將末送下
大小人腹內諸虫　取向東楝樹根去皮洗淨晒乾炒黃
爲末砂糖調服七八錢卽化爲水矣　楝樹根須年久開過花者方可用

手足門

治指頭被刀剉落疼痛流血不止　以銅末摻之立止痛

遠行足打成泡　水調生麵塗之一夜卽平

治脚上雞眼　用葱剖開將有汁沫一邊貼雞眼上包住數次卽消

治手足凍爛　蠣殼燒存性蜜調塗

治脚指縫白爛　用鵝掌黃皮燒存性爲末敷之如

有水出用飛過黃丹入花乳粉擦之

治手足裂破　油胭脂烘熱塗之

閃拘手足　生姜葱白同搗爛和麵炒熱熨之

又方　活蜊打爛如泥塗之極效

鵝掌瘋　大梨搗爛兩手搓九二三枚即愈

又方　柑簏汁擦之

閃肭脚踝作痛並治夾棍瘡　爛稻草燒灰童便拌作餅遇疼處

又方　菉豆炒熱以紬包裹熨之更效

凍瘡　山藥一截磨泥敷之或用貂鼠煆灰以麻油和塗之

又方　鴿糞煎湯洗三日而愈

遠行脚腫并除膝風及腰冷疼　草烏細辛防風各等分共爲末作護膝或襯鞋底

脚軟　杜仲一兩半酒半水煎服三日能行五日全愈

遠行脚底起泡　生麵水調塗之一夜卽平

病愈後大便日久不下　蘆薈硃砂各一錢研末開水服

身手瘡毒紅爛　馬桶底挖濕沙敷之一日愈

手足瘡口無力不能收口　取大路口多人撒尿木板爛成白色者以炭火煆化研細末加冰片少許糝之卽愈

脚上皮蛙生水孔而皮濕爛　豆腐渣貼二日卽愈不要落生

水

脚上生瘡其孔久不長肉　人中白海螵蛸各等分加冰片少許糝之卽愈



不藥良方

卷下

C116/2538
v.2

雜症門

治乾霍亂腹痛出汗吐瀉不出危在頃刻　食鹽一兩生姜五錢切片同炒色變以水一碗煎服不宜熱服好後不可即吃飲食

治霍亂吐瀉　枯白礬末一錢百沸湯冲温服蒜頭搗碎扎脚底心立刻止痛即洗去

治羊顛風　用肥皂子去黑皮取仁焙熟研末每服

五分空心白湯下不可間斷

治痢症　細茶三錢同鹽炒去鹽梹榔三錢水煎服即愈

治噤口痢神方　鹿角二兩煅存性爲末大人每服三錢小兒每服二錢早辰用酒送下　用蘿蔔搗自然汁調蜜緩緩飲之亦效

治痢疾兼治積食症　白朮枳實各等分爲末水滴成丸每服三錢輕者三服重者五服神效

治水瀉不休　漳州好橘餅一個切薄片作二次冲滾水服

治久瀉　黃丹一兩飛過枯礬一兩黃蠟一兩將蠟溶化小銅杓內再以丹礬二味細末投入乘熱爲丸如豆大每服二丸空心白湯下

治瘧疾不拘老幼一服即愈　苦參一味爲細末用好醋打麵糊丸桐子大臨發之日早辰用桃枝七寸柳枝七寸泡湯服三錢

治一切咳嗽　甜梨一個刺五十孔每孔納胡椒一粒麵裹煨熟待冷去椒食梨

治吼病　每日清晨飲豆腐漿久久自愈

治轉筋霍亂　扶病人坐起將涼水淋兩腿筋即不轉或以水二桶將病人脚浸入水內過曲膝即愈

治乾霍亂　令病人面墻直立一人以手蘸溫水在腿灣內反手拍打數十下有青紅脉突起即將針刺其上出黑血立止

吼病霍亂轉筋均有寒熱之分此二方均係專治熱症若寒症則大不相宜也

鮑雲超注

姜頻擦亦效

治痱子　棗葉搗汁揩熱痱瘡最好

治陰症　大葱白十根生姜一兩搗爛作餅熱炙貼臍中以熨斗微火熨之俟熱氣入內覺響即住

治水泄　團魚蛋一個要鹽水泡久者煮食即止

治痢疾初起　立夏前揀大荸薺晒乾燒酒浸封固

治一切咳嗽　甜梨一個刺五十孔每孔納胡椒一粒麵裹煨熟待冷去椒食梨

治吼病　每日清晨飲豆腐漿久久自愈

治轉筋霍亂　扶病人坐起將涼水淋兩腿筋即不轉或以水二桶將病人脚浸入水內過曲膝即愈

治乾霍亂　令病人面墻直立一人以手蘸温水在腿灣內反手拍打數十下有青紅脉突起即將針刺其上出黑血立止

治黃疸　枸杞根搗汁熱生白酒調服

治白癜風　雄雞腎白果仁各三枚搗爛敷患處生姜頻擦亦效

治痈子　桑葉搗汁指熱痈瘡最好

治陰症　大葱白十根生姜一兩搗爛作餅熱炙貼臍中以熨斗微火熨之俟熱氣入內覺響即住

治水泄　團魚蛋一個要鹽水泡久者煮食即止

治痢疾初起　立夏前揀大荸薺晒乾燒酒浸封固

遇此疾服三四枚即愈

治禁口痢　烏梅一觔打碎置大鐵鍋內水十餘碗煎滾以鍋置一桶內令病人坐桶上週圍堵塞不令出氣使熱氣冲上肛門如溫即洗之其人即睡去隨扶令就枕待醒即思飲食先予以粥湯半盞食少頃即入粥半碗不宜飽食漸漸加食可也

治疝氣偏墜　猪毛燒灰每服二錢空心熱酒送下加小茴香更妙

治血崩　胎髮燒灰二錢黃酒沖服服後用紫籐花黃酒調空心服即止

治寸白虫　檳榔煎水飲一碗愈

治傷寒時症有起死回生之力　菉豆一茶鍾水一碗煎一滾即離火落滾又置火上如是三次去豆

血崩最為險症服藥不能見功往往誤了惟用毛頭帋貼頂心外用湯熨之法立止如神此此不為功大

雲谿注

遇此疾服三四枚即愈

治禁口痢　烏梅一觔打碎置大鐵鍋內水十餘碗煎滾以鍋置一桶內令病人坐桶上週圍堵塞不令出氣使熱氣沖上肛門如溫即洗之其人即睡去隨扶令就枕待醒即思飲食先予以粥湯半盞食少頃即入粥半碗不宜飽食漸漸加食可也

治疝氣偏墜　猪毛燒灰每服二錢空心熱酒送下加小茴香更妙

治血崩　胎髮燒灰二錢黃酒沖服服後用紫藤花又方陳棕燒灰一撮好黃酒調空心服即止

治寸白虫　栀榔煎水飲一碗愈

治傷寒時症有起死回生之力　菉豆一茶鍾水一碗煎一滾即離火落滾又置火上如是三次去豆

用白蜂蜜一酒鍾入豆湯內調勻温服如牙關已閉者撬開灌之神效

治黃病兼治積食腹痛及手足癱軟無力小兒好食磚炭茶葉等物　此方治病如神江南一僧以此致富愼勿輕視　針砂好醋浸二宿炒紅色糯米炒畧枯研細二味各等分用河井水各半調和丸如菀豆大大人每服二錢小兒每服一錢清晨米湯送下有病者三五服卽效無病者常常服之精神百倍真神方也

治暴吐血方　以蛛網爲丸米湯飲下立止

治中風方　荆芥穗三錢以生姜汁調灌立醒

又方　白礬末二錢以生姜汁調灌立醒

治傷寒　用白蜜半盞黃酒一鍾同煎熱服登時汗出而瘥

治傷寒初起　生姜帶皮者二三兩搗爛將熱酒泡飲出汗而愈

又方　葱帶鬚七根生姜連皮七片共搗碎加白糯米一撮水三碗煎二碗加好醋少許乘熱飲之汗出卽愈

治傷食　用鹽花擦牙温水漱下不過三次卽時通快

化痰丸　絲瓜一條燒存性爲細末棗肉爲丸如彈子大每服一丸好酒下立效

治咳嗽　連皮生姜自然汁一勺蜜一匙同放碗內重湯煮一滾温服

治哮吼　核桃肉一兩細茶葉末五錢和勻入蜜三四匙搗成丸如彈子大不拘時噙化（寒吼者效）

治瘧疾　老生姜自然汁露一宿於臨發日五更時令患者向北立飲卽止未止再服

又方　用隔年全歷日端午日午時燒灰糊丸如桐子大當發日早每服一丸無根水送下

治痢疾腹痛不問赤白冷熱　用老生姜細茶各三

錢用新汲水煎服 一方加連根韭菜三味同搗汁酒調服亦可

治水腫 粟米菉豆各一抄猪肚一片切碎三味煮作粥食之至重者不過五次其腫自消切忌氣惱生冷

治黃病水腫 用皂礬半觔炒過雄黃一錢爲末先以三指撮一劑次以四指撮一劑又以五指撮一劑入麵加塩花椒末芝蘇三次烙乾餅食之從腿肚中去黃水大效

治陰症 用舊胡棉頭髮二味燒存性各五分香油調稀一服立應

治吐血 用側柏葉搗爛入童便二分酒一分温服

治百邪鬼魅 頭垢作丸一小豆大水吞服

治不寐 酸棗仁一兩炒香爲末每二錢不拘時竹葉湯調下

治下陰腫大痛仙方 絲瓜子一兩擂如泥熟黃酒

冲服效

瘋痴不知人事一發即治　桐油四兩煎豆腐八塊盡量與吃吃完吐痰盡即愈要餓一日夜餓極方與飲食吃爲妙

痰核　鯽魚同薯蓣塗之

中風不語　令人尿澆其面即醒

中風口噤　荆芥穗爲末調好酒服二錢

中風痰厥　香麻油一盞灌入口中仍用鵝毛探吐

痰涎立出

又方　肥皂角一個猪油擦七次火上焙七次研末好酒灌下

黃胆沙　草菩提子根搗汁服之

又方　半邊蓮搗服

又方　鏡面草搗汁黃酒冲服數次

又方　黑棗頭二十個蒲黃五個煎湯服

又方　雞子一個去一小孔入明礬五分放鍾内置

鍋中頓熟好酒半碗將蛋傾酒內攪勻每早熱服
一歲一個

瘧疾　斑猫一個用膏藥貼額上一週須早一日貼之

又方　當歸一錢青皮二錢柴胡三錢何首烏六錢煎服

久瘧積食者　辣蓼頭七個搗爛同飯爲丸陰陽水下

截瘧發三四次後方可服　何首烏生者五錢知母五錢柴胡二錢廣皮二錢酒水各一碗煎八分露一宿臨發日黎明温服

又方孕婦勿服　五月五日取青蒿葉一二十勉焙乾爲末加好麝香一錢神麯打糊爲丸如桐子大不拘新久陰陽等症當班者姜湯送二錢

脾瀉腸滑噦逆不止　石蓮子六枚炒赤黄色研末冷熱水半盞和服

老人氣湧痰盛時喘懶食　紫蘇子白芥子蘿蔔子各二錢微炒研末煎服

積痰　頂大葱白頭二三十個畧搗爛入鍋內炒熱俟微温塗於胸坎不久痰卽盡出

破傷風　蘇木三錢研末酒服或用降香研細末服之更效

瘟疫　稻草櫳糠不拘多少用盛火器內於病人牀前不時薰之漸愈烟多卽侍病人亦不致傳染

治酒積　金距子又名雞距子煎湯服之卽愈此子色黃其葉如石楠狀如蓮子越中山間墳傍可得葉可煎湯亦解宿醒若能多採爲膏便可時時救醉人

冷哮　海螵蛸三錢卽明甫骨研末入蓋鍾再以氷糖一錢放於海螵蛸之內在飯鍋內蒸化滾水清晨沖服一月卽愈

損傷門

治吐血下血不止口鼻俱出血如湧泉須臾不救荆芥一兩燒過盆地上出火毒研細末米湯調下三錢立愈連進二服鍋底煤研末米湯下錢許亦好

治瘋狗咬傷　先用蓑衣草紮住患處兩頭以衆人熱小便洗去血水次用核桃殼半個以本人熱糞裝滿蓋患處艾火灸七壯如本人不欲大便旁人

亦可急取班毛七個去頭足並翅酒洗和濕糯米
銅杓內炒米熟爲度卽將二物研成細末加六一
散三兩分作七分每日清晨一服白滾水調下本
人頭頂心必有紅髮一根要不時尋覓拔去
治被人咬傷　用溏雞屎塗咬處立刻止痛不作膿
治湯泡火燒　用煮熟雞蛋黃炒出油一鍾調生大
黃末一錢敷之卽愈
治跌撲損傷血流不止　用慈白搗爛敷三四次卽
愈
治咯血　用新棉燒灰五分好酒送下
治騎驛馬兩股打破　雞蛋清攤作膏藥貼之卽愈
治跑驛馬兩股腫痛　熱水洗過在炭火上烤之卽
愈
治吐血　兎首一箇整燒存性爲末黃酒調服二錢
孕婦忌
治竹木惡刺入肉不出　象牙刮細末水調敷上或

嚼生栗子敷之

治火燒　雞蛋一個煮極老去白用黃以微火炒之久烟起即生油以油塗患處甚效

治湯盪火燒未破　槐子炒黃色研爲末猪苦胆調塗或用乾燒酒泡搽之立止疼痛

治騾馬咬及踢傷　白煮猪肉一大片本人同飯自嚼貼患處立時止痛

治狗咬傷　刮磚青和牛糞敷之即愈

治湯盪火燒火藥烘灼等症　紅要子陰陽瓦焙存性爲末香油調敷

治湯火燒盪方　石灰一塊水潑過性去灰存水以香油農調敷之立效

蝦蟆膾即愈

塗脊骨看油乾處以艾灸兩頭三炷

吐血　瓜子壳一茶鍾煎湯一碗吃下血止

損其即內傷勞損從跌打損傷之　雲貂注

嚼生栗子敷之

治火燒　雞蛋一個煮極老去白用黃以微火炒之久烟起卽生油以油塗患處甚效

治湯盪火燒未破　槐子炒黃色研爲末猪苦胆調塗或用乾燒酒泡搽之立止疼痛

治驟馬咬及踢傷　白煮猪肉一大片本人同飯自嚼貼患處立時止痛

治狗咬傷　刮磚青和牛糞敷之卽愈

治湯盪火燒火藥烘灼等症　紅要子陰陽瓦焙存性爲末香油調敷

治湯火燒盪方　石灰一塊水潑過性去灰存水以香油濃調敷之立效

治猘犬咬方　食蝦蟆膾卽愈

治損　猪油去膜塗舂骨看油乾處以艾炙兩頭三炷

吐血　瓜子壳一茶鍾煎湯一碗吃下血止

多年咳嗽嘔血痰中帶血并肺血　白皮不拘多少
爲末每服二錢臨臥棗米湯調送下
吐血癆　凡癆症受補能絶酒色并賭博勞神等事
其命可保矣　白蓮藕搗爛取汁一斤　人乳白蜜各四三兩
味攪勻以磁瓶盛放水鍋內蒸一炷香早晚服一
鍾　此藥忌飲茶如渴用藕煎湯代飲靜養病自
愈
跌打損傷　青松絲不拘多少同陳酒糟搗爛敷患
處
又方　榆樹皮搗爛醋調敷患處
又方　毛竹節底中間白片即是蝦過存性爲末服
一二分立驗或加木耳末服蝦過等分爲妙
又損傷久不愈　冬瓜仁炒研末酒沖儘量服
湯泡　急用粗紙在燒酒內拖濕透敷患處
火燒　若因痛用冷水一浸則火氣入內難治用酒
洗發熱毒自出　不化石灰研末不拘麻油香油調勻塗

又方　筆店內用剩零星鬼皮取來連毛燒灰存性研末敷之

火燒破爛　先用好酒頓熱洗之次以杉木炭研末敷之

又方　地榆滑石研末等分敷之止痛不潰爛愈後亦無疤痕　兼治湯泡

又方　大黃炒研末用桐油調敷

又方　銀硃研細用菜油調敷二次即愈

又方　真桐油　雞蛋　烏梅研末和勻塗之

口咬傷　先以童便洗患處即用生栗細嚼敷上每日一換

狗咬　桑樹砍出自然汁塗之

又方　雄黃五錢麝香一錢共爲末酒送下作二服

蜈蜂傷　不可使四眼看見暗取涼水一盆向房屋上潑濕各瓦上待流下水來盛搽患處痛即止

蜂叮疼痛　以野莧菜搗爛敷之立止

蛇嚙　人屎厚塗患處帛裹漸消

又方　青木香不拘多少煎服痛止再白礬滾水泡洗即愈

又方　擣大蒜和胡粉塗之

又方　辣蓼草以手揉擦之

又方　扁豆葉搗爛絞汁酒冲服渣敷患處

毒蛇傷重垂危者　五靈脂雄黃各等分爲末調二

毒蛇傷　飲擬辣旱烟油立愈此仙丹也烟油味最苦惟患者服之反覺共甜

雲貂傳方

頃復灌二錢其苦

木器手足及騾馬

痛　生半夏松香

或煮或壓去油各等分爲末敷傷處

又方　鮮石菖蒲連根用黃米飯拌入搗爛敷上血即止

打杖腫疼　鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上

蜂叮疼痛　以野莧菜搗爛敷之立止

蛇嚙　人屎厚塗患處帛裹漸消

又方　青木香不拘多少煎服痛止再白礬滾水泡洗即愈

又方　擣大蒜和胡粉塗之

又方　辣蓼草以手揉擦之

又方　扁豆葉搗爛絞汁酒冲服渣敷患處

毒蛇傷重垂危者　五靈脂雄黃各等分爲末調二錢灌之即甦仍以渣敷咬處少頃復灌二錢其苦皆去

一切傷損急救神方　不拘金石木器手足及驟馬咬傷等類見血敷上即封口止痛　生半夏松香或煮或壓去油各等分爲末敷傷處

又方　鮮石菖蒲連根用黃米飯拌入搗爛敷上血即止

打杖腫疼　鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上

一夜血散卽愈

墮撲損傷瘀血在內煩悶者　蒲黃研末空心温酒服三錢

惡虫傷　蛇退煎湯洗之

斷指及刀斧傷　直蘇木爲末敷之外以蚕繭包固不可見風

又方　獨克大栗焙乾爲末敷金瘡及刀斧瘡立愈

蜈蚣傷　胡椒嚼碎塗之

從高墮下及墮馬傷　取淨土和醋蒸熱布熨之痛卽止

刀傷　陳石灰研細末六兩錦文大黃切粗片一兩同炒灰紫色去大黃羅極細末敷之卽愈

又方　黃柏細辛各等分研細末敷之立愈極驗

又方　用蜜臘金末搽之止痛

湯火泡　地榆煆灰爲末糝泡處或泡爛燒焦以好麻油調敷

又方　水粉井水同銀硃調勻以鵞毛拭之

跌傷　精猪肉貼愈時無疤痕

蹠跌傷筋骨　蠏全身打爛如泥滚酒冲服

又方　公雞一隻不去毛活舂如泥裹于痛處

狗咬　茶葉簍內竹箬煆灰敷之或虎骨研末塗患處

蜈蚣咬　公雞涎塗之即消

蛇咬　雄黃塗之

磕碣大傷出血不止　降香細末糝於傷處重者另

磕跌大傷　用五月艾葉去霞和油捶溶敷之仙丹也

鮑雲韶傳方

竹木刺入肉　生腸噴爛敷之自出

又方　用生白果泡入菜油壇內如遇刺戳挑不出者將白果搗爛塗上過宿自出

又方　水粉并水同銀硃調勻以鵝毛拭之

跌傷　精猪肉貼愈時無疤痕

蹉跌傷筋骨　蠏全身打爛如泥滾酒冲服

又方　公雞一隻不去毛活舂如泥裹于痛處

狗咬　茶葉簍內竹箸煆灰敷之或虎骨研末塗患處

蜈蚣咬　公雞涎塗之即消

蛇咬　雄黃塗之

磕碰大傷出血不止　降香細末糝於傷處重者另服玉屏風散一貼恐其入膜也已腫而進風者必須服玉屏風散

竹木刺未出　牛膝嚼爛敷之即出

又方　用生白果泡入菜油壇內如遇刺戳挑不出者將白果搗爛塗上過宿自出

瘡毒門

治疔瘡仙方　用愚者耳垢齒垢刮手足指甲屑和勻如豆大放茶匙內燈下炙少許作丸將銀簪挑開疔頭抹入外用棉帋一層津濕覆之痛立止並治髮疔紅絲疔面白疔真仙方也

治中燒酒毒　鍋蓋上氣流水半盞灌下即醒

治一切大毒初起　槐花子一大把砂鍋內炒褐色好酒一碗冲入乘熱飲之取汗即愈未散再服

治對口瘡秘方　活鯽魚一尾入砂鍋內搗碎再加髮垢四兩攪勻敷瘡上極厚外以紙貼之一二日即愈

治發背　鮮王瓜切薄片貼上一週時一換若破爛用花椒湯洗淨王瓜貼上二三日即收

治搭手　全蝎去毒三五枚核桃肉研末好酒沖服一二次即消

治凍瘡　鴿子糞煎湯洗之自效　又方用蠣殼燒灰存性菜油敷　又方預用燒酒揸手面烤乾即不凍

治大毒　用敗龜版去筋塗黃蜡炙透爲末酒服四錢有奇驗兼治乳癰

治黃水瘡　真柏油熬稠揸之立效

治魚口　生左胯內名魚口瓦松爲末雞子清調敷不出膿效

治繡毬風　雞子煮熟去白留黃炒枯出油再用老

杉木燒灰存性調油搽之

治陰頭生瘡　白蜜調生甘草末塗之卽效

治陰毛內生虫　或紅或白癢不可忍用生白果仁嚼爛搽之卽愈

治傷手瘡　黑豆熬水常常洗之卽愈

治腹內生瘡　在腸胃不可醫治者取皂角刺不拘多少好酒一碗煎至七分溫服其膿血俱從小便中出

治疔方　家園菊花取汁一碗服下卽愈無花取根葉搗汁亦可諸瘡悉治奏效甚捷

治唇上生疔毒　大腿灣中紫筋上銀針刺出血卽愈

治疔瘡發背　取常用馬桶洗淨刮下桶內碢爲末貼之

治一切無名腫毒　蒸白七根蜂蜜一兩同搗敷之神效

治各樣癬　土蒺藜連根帶葉搗爛熬水盪洗即愈

治臁瘡　柿葉燒灰存性同川椒爲末搽患處神效

治瘰癧　不拘已破未破用蝦過牡蠣四兩生甘草一兩每日食後用臘茶湯調服一錢其效如神

治痔漏仙方　子月巳日採槐角取子每日清晨白滾水送下一粒　尋常採取者每服七粒亦效

治禿瘡棒瘡疥瘡一應潰爛瘡毒　滕黃五錢研末眞香油二兩白蠟三錢用砂鍋將油煎沸入蠟溶化離火入滕黃攪成膏貼患處神效

治中一切毒物　急飲甘草湯或菉豆湯數大碗

治痔腫癢痛　無花果葉煎湯薰洗

治痔漏有管　用白鴿糞一升入礶內以滾水沖入即坐在礶口上其管自落礶中數日即收口要坐久忍痛方效

治瘰癧潰爛久不愈者　蜈蚣一條瓦上燒灰研末清油調塗三四次即愈

治鼠瘡　馬蜂窩一箇水片三分將蜂窩燒灰存性共爲末醋熬成膏攤貼膏上剪一孔出膿水

治蝎螫　白糖一撮按痛處揉之立止

治毒蛇蜈蚣咬傷　獨頭蒜擦患處痛卽止最宜飲酒食蒜

治蜂刺　醋磨雄黃塗之

治癰疽發背初起或已結未結赤熱腫痛未見頭腦或有一粒如粟米者　先以濕紙貼上視其紙先乾者卽是結疽頭處取獨頭蒜切片如三個錢厚放在頭上用艾火灸三壯換一片再灸痛者灸至不痛不痛者灸至痛方住最要早覺早灸方發一二日十灸十愈過七日則不可灸矣若有十數頭者用大蒜搗成膏作餅鋪上聚艾燒之亦能安也

治對口疽　鯽魚一尾燈草一錢量用醋糟共搗爛敷之

治一切腫毒疔瘡　白菊花搗爛敷之無花用葉無

葉用根取汁服之或以好酒煎服出汗死者可以復生

治癩子瘡　大山藥搗爛敷上卽消

治惡瘡及癬　驟糞燒灰糝之

治臁瘡　取牛蹄甲燒灰香油調敷

治一切頑癬　雞子三四枚和香油葱椒炒作餅子乘熱貼患處效

治一應惡瘡無名腫毒神效　用豆腐渣在砂鍋內焙熱看紅腫處大小量作餅子貼上冷卽更換以愈爲度

治鼠瘡瘰癧已潰未潰其效如神　用活蝎三百箇上好香油一觔將蝎煤極酥濾去入飛過黃丹四兩畧煎便成稀膏敷患處

痔漏兼治牛皮等癬　黃蜂窩一個內有蜂子者佳明礬研細末填滿蜂窩內以微火煆之俟窩內礬滾透窩亦成灰研成細末以香油調搽患處三四次愈

便紅及痔瘡　烏梅好醋煮爛去核半觔百草霜研末二兩胡黃連四兩用猪大腸節將胡黃連納入兩頭線縛在飯鍋內蒸以腸爛爲度去腸晒乾研末以上藥俱入烏梅中搗成膏作丸如桐子大每清晨服三錢一料而愈

痔生管　服燈草灰每服一錢

漆瘡作痒　羊乳敷之

又方　蝌黃塗之即愈

鼠咬成瘡　麝香封之

蚕咬成瘡　麝香以蜜調敷之

治癬　蜜蜂壳明礬共燒灰存性爲末用好醋姜磨調搽數次愈

又方　米糖一大把於碗上隔紙一張摘細洞將艾火炙油搽之

頑癬　黑鉛敲薄用膏藥貼之

又方　花椒煮濃汁乘熱泡洗仍研爛敷之

汗斑　蜜陀僧爲末黃瓜蒂擦之神效

又方　用硼砂川貝母各等分爲末滾湯調勻雞毛掃掃上三四次卽愈

一切風癬　防風荊芥白芷苦參各等分煎湯洗

牛皮癬　皮舖內燒牛皮的烟煤二兩研末清油調先用穿山甲畧刨破以藥敷上一二次

荷葉癬　荔枝核米醋磨敷

小圈癬　擂地胡椒春夏生於野地蔓衍石縫葉圓多缺大如指頂青蔓夏開白花胡椒氣味者是用穿山甲將患處畧刮以此草連蔓團擦之數次愈

諸癬陳年不愈者　土槿皮不拘多少煎濃汁時醮抹患處燥後再抹一日數次

諸瘡一掃光　凡風癬疥癩坐板血風瘙痒疼痛皆治　蛇床子五錢炒爲末大風子去壳五錢爲末水銀二錢白錫一錢枯礬一錢先將錫化開次入水銀攪勻後入蛇床等藥研勻用柏油調搽

瘡　乾荷葉連蒂新瓦上焙乾研末敷患處

黃水瘡　黃豆末或綠豆粉搽之其水自止

膿窠瘡　淡竹葉煨灰糝之　如瘡眼乾以麻油調敷

蠟梨瘡　松香半觔用紙捲於燈上燒滴凝塊放入滋泥溝內二三日取出洗淨用活螺螄一個全搗爛如泥塗頭上過一宿卽愈

遍身風痒瘡疥　大風子七個杏仁七粒樟腦枯礬水銀各等分麝香少許共研細末蜜爲丸擦之

無名腫毒　初起速用雞蛋一個摘小孔瀝出清黃不可用在粗碗內將生礬一塊磨如薄腐渣不時塗患處如未消再瀝雞子清磨礬塗之三次卽消　若患多日則治難效

又方　麥粉不拘多少用陳醋熬膏貼患處

又方　對口發背初起亦治　荔支肉七個硃砂一錢加礬須搗至一千下用敷患處

又方　生黃芪金銀花當歸各五錢　上部加羌活三錢　下部加獨活三錢　無灰酒煎空心服

又方　一切腫毒疔瘡等類忽然發出頭疼難忍白明礬三錢研細末用葱白七根去葉去鬚和礬搗爲丸七個每個用酒一一送下取汗如無汗多用葱湯催之汗透聽其緩緩自乾尤效

癰疽　乾荷葉心當中如錢片不拘多少研爲細末每用三五茶匙水二盞慢火煎至一盞半放温淋洗之乾後以太白膏貼上

太白膏方　寒水石研細飛過用臘肉猪油調成膏隨瘡大小薄紙攤貼之

懸癰　凡毒生陰囊後肛門前者是　大黃粉甘草五錢酒煎服

疔瘡　牛糞晒乾爲末水調敷患處其毒漸消不走入臟腑矣

又方　陳梅乾一個荔枝一個銀硃一錢共搗爛敷

患處週時其根拔出

又方　白麪用水調稠圈住瘡之週圍將白蠟切極薄片放瘡上以火逼化再將蠟片放上又逼至疼就住次日揭去麵蠟其疔根自拔而愈矣

對口　桑樹根去粗皮取木外嫩白皮同蜂蜜搗爛入生桐油少許敷之

又方并治背毒　初發時用童子雞去骨小炒敷上過夜肉白有虫數次即愈

發背并治癰疽無名腫毒　紫花地丁三伏時收下　以白麵和成塩醋浸一宿貼之

附骨疽　側柏葉青松葉轆軸葉各等分　搗爛同白米半升煮成稀乾飯將白酒藥一顆搓碎同搗和敷於患處油紙蓋好不得移動每週時一換

大麻風　風茄花七朶川芎牛膝各二錢陳酒三斤浸三日每服一小杯

楊梅結毒　土茯苓二兩川椒開口三錢二味貫猪大腸

內線紮兩頭煮熟去苓椒食腸飲湯二三次
一切惡瘡發背魚口兼治無名腫毒　白礬不拘多
少鎔化爲丸如綠豆大硃砂爲衣每服十丸用連
鬚葱七八根水煎送下汗出卽愈
瘡口不合　秦艽爲末摻之
天蛇毒　眞鹽滷醋滾過乘熱浸一週時次日愈
棉花瘡毒及下疳初感　毒盛經久難愈者速用新
槐花蓳揀淨不必炒每食前清酒吞下三錢早午
晚皆服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之
患亦無寒涼敗脾之慮如不能飲酒滾水鹽湯亦
可但不及酒之效捷耳
大指蛇頭　雞蛋一個加入雄黃套指上熱則另換
諸惡瘡　猪胆汁生姜汁蜂蜜各半酒杯共和一盞
內不住手塗四圍一夜卽消
治無名腫毒　金銀花五錢全當歸七錢生黃芪五
錢生甘草節三錢以酒一碗水一碗煎八分服毒

在下者加牛膝二錢

對口　初起時用生肥猪板油炭火燒熱在瘡上擦磨隨乾隨擦可以消退若已出毒用蝦蟆肝貼之自愈

又方　用蒜板灸或用鼠糞作餅灸得艾氣則毒止而可散切忌手擠傷形

對口背疽　凡肉腐而傷形者用香糟加蜂房一個貼于患處一日一換其毒自淨而肉不爛瘡口須留出

膿科疥瘡　麻黃二兩木別子一個蜂房半個大楓子肉不要油者六七錢斑毛三個外用好猪板油三兩將麻黃切寸斷同木別子斑毛蜂房入于油中同熬以麻黃成炭爲度將油漉出去渣搗大楓子肉成泥擦於瘡疥之上二日大發三日漸消五日全愈

白蛇纏　紅土用眞麻油調塗之

服鹽滷毒　生豆腐漿灌之

中巴豆毒　黃連煎湯服之

中砒霜毒　醬調水服　若在胸中作楚急用胆礬研水灌之直至菜油亦可

又方　立煎防風一二兩灌之

逆鮮食中未知何毒　苦參煎汁飲之令吐去自愈

又方　生甘草薺苨煎湯飲之

中石灰毒　飲冷水即解

誤中河豚毒　五倍子白礬等分水服

婦人門

治婦人白帶　馬齒莧搗汁三大合雞子清二枚微温頓飲之不過再服卽愈

治婦人小便不通　杏仁七粒去皮尖麩炒黃研細水調服立通

治下乳簡便方　紅砂糖煎豆腐不用油鹽以黃酒共食之

治孕婦痢疾神效　用雞蛋一個破一孔如指頂大

以銀簪攪勻加入黃丹五分將紙封好放飯鍋內蒸熟食之卽愈

催生神效方　茉莉花晝內夾乾用七朵白滾湯送下

治婦人陰瘡　猪肝切大片葱川椒猪油拌肝熬熟待冷納陰戶中少頃取出再換一片其虫俱鑽入肝出盡爲度再以川椒葱白明礬蛇床子五倍子苦參煎湯頻洗

治婦人赤白帶下　貫衆一個搥去毛及花萼以好醋蘸慢火炙之香熟候冷爲末空心滾水服二錢甚效

治孕婦腹內小兒有聲　急令孕婦自己將箬掃地卽無聲

治乳癰疼痛並發寒熱　白蘿蔔和鹽少許搗爛敷患處

治胎產不下　端午日取猪心內淨血去血裏筋和

黃丹爲丸以硃砂爲衣如黃豆陰乾臨產時用滾水服一粒卽下此海上奇方也

治新產數日受風寒或瘀血不行　黑豆一大鍾炒焦成炭用黃酒不拘多少煎黑豆滾數次去豆不用以黃酒與病人熱飲卽愈

治產婦血暈　用人扶正坐用炭燒紅以醋淬之令醋氣入鼻卽愈

調經止痛　紫蘇陰乾俟經期如肚腹膨痛煎湯盡洗下部摩運小腹每期洗摩三四日則經正痛止

經血不止　陳蓮蓬壳燒灰存性研末每服二錢熱酒下

月水不通　茶一碗入砂糖少許露一宿服之

又方　蚕沙炒煮酒飲一盞

陰痛　青布裹鹽熨之

陰癢　桃仁杵爛用綿裹塞之

白帶　牛口刺根五錢酒煎服

又方 亦治男子白濁 冬瓜子仁用隔年陳者炒末每服五錢空心白滾湯下

經水不調及產後惡血不下兼治冷熱勞傷腰脊骨節疼痛等症 丹參洗淨晒乾研末每服二錢溫酒調下

血崩 甜杏仁上黃皮燒存性研末每服空心熱酒調下 又 故棕燒灰用湯服下立止

又方 生豆腐漿一碗生韭菜汁半碗入漿內空心服一二次

又方 山裏紅菓子根煎湯日服

又方 熱者宜之 正南屋上春北瓦松七顆俱要松頭向北者用陰陽瓦焙乾研末熱黃酒下

大小便屢次同出 薏米仁研末白糯米研末每早晨用薏米仁二錢糯米一錢銅鑵內熬作粥臨吃用白沙糖調服

雞眼疼痛 地骨皮紅花二味共研爛極細敷痛處

如成瘡者次日卽結蓋

裹脚易小　白鳳仙蓮花葉根搗爛燒湯頻洗之骨肉柔軟易小

妊娠心痛　鹽燒赤酒服一撮

胎動　硃砂研末一錢和雞子白三枚攪頓服胎死卽下未死卽安

胎上衝心　葡萄煎湯飲

難產　桃仁一佪劈開將一片寫可字一片寫出字吞之卽生

又方　用舊時憲書黃紙面於灶下燒灰服之易生

柘樹枝葉二三兩剪濃湯沖無灰酒吃一二碗卽生

胞破不生并治子死腹中　鬼臼又名久臼不拘多少黃毛者去毛爲細末不用篩羅只手撚之如粉爲度每服一錢無灰酒一杯同煎八分通口服

胞衣不下　以水入醋少許噀面有效

又方　產婦自將髮梢放入口中一惡心卽下

又方并治產後心痛　荷葉炒香爲末服方寸匕卽二分五厘或沸湯或童便調下

又方　吞雞子清一枚

又方　鹿角霜三分爲末薑湯調下

因觸傷胎動腹痛　縮砂蜜不計多少熨斗內盛煨火炒令熱透去皮用仁搗爛爲末每服二錢用熱酒調下覺胎動處熱則胎安

子死腹中　巴豆莖麻子麝香各等分研作餅貼臍上

死胎并橫生逆養　麝香五分研末酒下

盤腸生　未產腸先盤出急將淨盆盛溫水寒天則熱水少入香油養潤待兒並胞衣下時產母畧似卧自已吸氣上升穩婆香油塗手徐徐送入

一法腸出盛以潔淨器濃煎黃芪湯浸之腸卽上

又一法以半夏爲末搐鼻中腸自上

橫生　益母草六兩酒煎濃汁和童便一大杯飲之

產後陰戶燥熱遂成翻花　澤蘭四兩煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之

產下子腸帶出切不可剪致傷母命　枳殼煎湯熏洗卽收

乳少　脂麻炒研入鹽少許食之

又方　牛乳一兩洋糖三錢米粉三合共調勻每日清晨白滾湯下

乳結　蓮蓬桿一把煎湯熏洗數次卽散荷葉桿亦可

乳吹　蒲公英煎服甚效

乳汁不通　鯉魚頭一個燒末每服一錢酒調下

乳毒　綿羊糞晒乾研末生白礬研末共等分蜜丸桐子大硃砂爲衣每服五錢用金銀花湯送下數次愈

一方　桑花陳酒煎服

又方　蒲公英金銀花各等分水同酒煎服

產未滿月行房腹內脹痛　荔枝四兩連壳核同搗爛用好酒一升煎至一碗熱服之

產後小便不通　陳皮一兩去白為末空心溫酒服二錢

產後口渴　用煉過蜜不拘多少熱水和服

種子得男　凡行房完着令婦人先向左邊睡多時然後換身不妨其孕必生男若即向右睡必生女此陰陽之分也

婦人髮少能多　少年更效　側柏葉不拘多寅陰乾為末加油塗之其髮驟生

又方　用梧桐梗浸水抿頭髮不亂　眉髮墜落半夏塗之即生

小兒門

治小兒走馬牙疳　女人溺桶中白以火煅研末一錢銅綠三分麝一分共爲末揩患處卽愈

治小兒痢疾　秋日取黃瓜藤放霜雪內遇此疾取藤燒灰存性研細香油調塗臍內上護煖臍膏立效

治小兒驚風　用螞蜡焙乾爲末姜湯少許送下卽愈

治小兒夜啼　燈花五個研細揸乳頭上令兒吮之

治小兒初生大小便不通　急令婦人以熱水漱口吸小兒前後心及臍下數次即通

治小兒痢疾　雞子一個冷水下鍋煮熟去白用黃研碎以生薑汁半鍾和勻與食之不用茶神效

治小兒噤口痢　甜梨一個挖孔入蜜塡滿紙包火煨熟吃立止

治小兒軟癤　銅綠不拘多少研細末用柏油熬化布攤膏貼之立消

治急慢驚風　硃砂用新汲水研塗頂心兩手足心前後心立效

治小兒痢疾　白楊樹上落下楊狗不拘多少煎水洗脚底心即止不可洗脚背　並治一切牙疼煎水頻漱不可嚥下

治小兒丹毒聖神方　小兒頭面皮膚忽生瘡瘍火燎丹發起赤腫暈有小瘡及赤暈上瘡初發如錢

漸暈開一二尺良久遍身入口耳到臟腑即不救此症可畏宜速治之此乃自積熱起　甘草一兩或五錢拍破入水一盞或半盞温温令乳母全口呷漱徐徐吐淋洗病處以手掌與指不得犯指甲仍與小兒甘草湯吃一用即不暈開三四次即愈

治小兒遊腫　以生布一片搵油以火燃之持照病上咒曰　日遊日遊不知着脂火燎你頭咒七遍愈

治急驚神方　用燈心二十根每根長五六寸蟬蛻七個去頭足翅蓋只用肚皮明殼上好辰砂三錢以新白紗扎緊用線繫物墜於砂礶兩邊懸空放水中量小兒大小或用水鍾半煎一鍾或用水一鍾煎七分服下即愈

稀痘神方　孕婦懷孕時用生白芝麻五升或一二升置於常出入處孕婦隨便食十個月生後小兒不受胎毒無痘可出即出亦稀而無害此江南薛

浩然屢驗之方

治痘癢妙方　用松樹葉於痘上輕掃之卽止

治小兒霍亂吐瀉不止　用高粱連殼炒焦煎湯取
竈內年久竈心土爲細末重籬飾過每服二錢用
高粱湯調服立愈

治小兒頭疽　用有妻室的卧房門內地下脚踏處
取土煆過用麻油調敷疽週圍留頂上如棋子大
孔其膿血出卽愈

治小兒男婦口內生瘡兩腿青腫名曰牙疳　用松
枏枝葉煎濃汁服亦不時將汁含漱並服白馬乳
卽效

預稀痘疹　孕婦懷胎時用生白芝麻不拘多少置
於來往處隨便撮食之及十月滿足生下子女不
受胎毒

又方　每年臘月清辰摘帶露綠萼梅蕊一百加上
白洋糖搗成小餅令食之

又方　銀花金者不用陰乾　鍋巴每一升入銀花一兩　共研末用洋糖或做糕餅或開水調和每日令小兒食之

預除驚癇　初生未開乳時用江西淡豆豉三錢粉

[illegible]度永無

[illegible]邊草主

小兒夜啼着母臥薦勿令知之

咳嗽　生姜四兩煎湯浴之

陰被蚯蚓呵腫　令婦人用吹火筒吹腫處即消

肚臍爛成瘡　杏仁去皮研末敷之

急慢驚風　大蚯蚓一條從中摘斷置地上看兩頭跳動急用急跳者慢用慢跳者　硃砂一錢白梅乾一個麝香三分共搗極爛量加人乳浸勻重湯頓熱服

又方　取人指甲長一寸外者煎湯服之立愈

卒然發暈　白蒺藜微炒研末滾水調服

痺驚久瀉吐後成驚也　鮮艾頭七個葱白七段母丁

蚯蚓是根寒之物以治急驚神妙無比若治慢驚恐致誤事蓋慢驚係虛寒之症大不相宜亦加詳審　鮑雲韶注

又方　銀花金者不用陰乾銀花一兩每一升入鍋巴用陰乾鍋巴一兩共研末用洋糖或做糕餅或開水調和每日令小兒食之

預除驚癇　初生未開乳時用江西淡豆豉三錢粉甘草三錢煎濃汁頻頻與飲須一酒杯爲度永無驚癇等症

小兒夜啼　當歸焙研末乳和灌之　井口邊草主小兒夜啼着母卧薦勿令知之

咳嗽　生姜四兩煎湯浴之

陰被蚯蚓咬腫　令婦人用吹火筒吹腫處即消

肚臍爛成瘡　杏仁去皮研末敷之

急慢驚風　大蚯蚓一條從中摘斷置地上看兩頭跳動急用急跳者慢用慢跳者硃砂一錢白梅乾一個麝香三分共搗極爛量加人乳浸勻重湯頓熱服

又方　取人指甲長一寸外者煎湯服之立愈

卒然發暈　白蒺藜微炒研末滾水調服

痢驚　久瀉吐後成驚也鮮艾頭七個葱白七段母丁

香七個上桂五分麝香二三分共搗如泥用青布一方週圍攤萬應膏留中放藥貼臍上俟口內香出則得救矣

口舌生瘡　吳茱萸研末米醋調敷脚心移夜卽愈

熱癮瘡　菊花根搗汁酒送節在下身空心服在上身飽服

肥瘡　雞蛋二三個煮熟去白用黃炒出其油搽瘡數次自愈

鱔拱頭　陳香圓一個破開去穰其患處先用葱頭洗淨卽將香圓盖上四圍用麵糊好俟香圓有潮氣便另換數次卽愈

急驚風　并治半夜驚啼　琥珀防風各一錢硃砂五分共爲末調猪乳汁或抹母乳頭上或抹小兒口中如加眞牛黃三分麝香一分尤妙

又方　剪破貓尾滴血沖滾水灌下

又方　明礬五錢取無根水煎數滾灌之

又方　黃泥二錢金銀花三錢神砂三分艾葉一錢

共泡水一小鍾去渣灌之

又方 并治撮口臍風 鉤藤五分甘草五分水煎服

風痰急驚 并治大人中風痰 生石膏一兩神砂五分

共爲末每服一錢一歲至四五七歲俱用一錢五

分入歲後俱用二錢五分大人則每服三錢

疳疾 黃瘦肚大臍突是疳症也宜速治 明雄黃一兩

黃丹二兩水浸晒乾共研細末如三歲內用一錢

勻作三服五歲內外勻作兩服以雄雞肝一枚用

竹刀或銅刀割碎將藥末摻入肝內不可拋散五

更時蒸熟與小兒空心服下莫剩連服三次不可

間斷

又方 旱蓮草自然汁和麪作燒餅與食之

口疳 青黛石羔煆各二錢黃丹一錢水片一分研

細末吹之

又方 烏梅炭白梅炭各一錢水片二分硼砂一錢

研末摻之

走馬疳　用婦人淨桶倒淨晾乾將底處積垢用碗磁之類刮下來研細末糝塗內外牙唇遂止延爛經一夜即痊

又方　痼虫一條如無於糞厠內檢尋用針將兩頭釘定以篾片劃開畧洗去內外穢垢陰陽瓦焙乾研末加氷片少許調勻糝之

又方　陳年南棗核燒灰研末糝之

虫疼不止或面上兩頰帶紅多因過食米糕內生痼虫扭結動時即痛也

史君子用溼紙煨熟去殼打碎須按年紀一歲一個先將猪肉數塊令小兒吃之使痼虫口開向上然後吃史君子吃三日則虫解出但痼虫上半月頭向上下半月頭向下須上半月內服之有效

夜遺　大烏梅三錢益母仁一歲一粒打碎鹽一撮共水煎空心服

久瀉食少羸瘦　白朮土炒白茯苓各一錢黃米一

合共煮粥只飲米飲汁自止

愛吃泥土　乾黃土爲末濃煎黃連汁和爲餅令食

即愈

又方　榧子不拘多寡炒熟食久自愈

又方　黃芩石羔陳皮白朮去蘆茯苓甘草各五分

水煎服

頭上生瘡　白乾松香五分猪骨髓一段共搗勻搽

患處

痘瘡　松樹葉於痘上輕掃之即止瘡

痘初發一片紅色不分界限　紅紙蘸油點燈火照

之則分界而出

痘疹回毒　青松子燒灰存性麻油調敷患處

又方　核桃殼燒灰存性研末麻油塗之用眞香油

亦可

初生啼聲不出俗呼草迷往往誤傷其生

人多不知小兒肛門內有應破膜皮未破氣不能

通致有此症宜用骨簪或銀簪輕輕向肛門通進一二指許扎破即啼

初生身無皮膚　淨地泥爲丸身上捩之即生皮人身中泥更妙

不藥良方終

不藥良方

續集卷一

C116/2585
v.3

欽使留公遠駐藏中六年來徵是集並因詔地向無醫藥劄飭照集中所需物料悉為購備齎全陸續附郵馳遞以便

敘

癸卯冬余刻不藥良方一集意在便取携而廣施濟也三年以來行之頗效求者益多

給求濟衆未知果能一一經驗否也而是書固已不脛而走矣夫良工備物待用無遺吉人爲善惟日不足前編祇就余遊篋所藏彙成一卷門類不多按症而求尚寡缺略因又網羅舊集採擇新知所得加三倍於前方俱著驗而理有可信者選訂閱一寒暑始付剞劂是編原因便於行篋而設故凡諸大方仍畧而弗錄行初志貽畫一也集成爰復敘而識之

乾隆五十一年冬至月桂舟王詰柱書於四川藩署怡情育物之堂

名藥良方續集總目

卷一

傷寒附同傷寒辟瘟方

中風

類中風

傷風

痙病

痺病

痿病
腳氣
內傷
虛損
癆瘵
自汗盜汗
卷二
失血
消渴
神病
癲狂癎症
氣病
遺精濁帶
痰飲
欬嗽喘吼
腫脹

瘧疾
霍亂
噎膈翻胃
嘔吐噦
卷三
瀉症
痢症
黃疸

積聚
疝症
頭痛眩暈
目症
耳症
牙齒
卷四
唇口舌

咽喉
肩背胸脇
心腹諸痛
腰痛
小便閉癃遺尿不禁
大便燥結
卷五
婦科
胎前諸症
生育
産後
乳症
前陰
卷六
小兒初生
幼科雜症

卷七
外科　頭面項背腰五部
外科　眼鼻耳口唇齒舌喉胸乳十部
卷八
外科　下臀股膝脛足六部
外科　發無定處
卷九
外科雜治　治跌打損傷及砲子箭頭竹刺諸物入肉湯火燒蟲蛇禽獸咬傷并驟馬汗涎入瘡一切中毒急救各方均載此卷
卷十
外科　嬰兒
外科　總治
附奇症并家常宜知方

不藥良方續集卷一

傷寒 附同傷寒辟瘟法

傷寒欬逆日夜不止寒氣攻胃也　胡椒三十粒打碎麝香五分酒一鍾煎半鍾熱服

一方　畢澄茄高良薑各等分爲末每服二錢水一碗煎十沸入酢少許服之良

傷寒汗下後結胸者　栀椰二兩酒一盞煎半盞分二服服之

傷寒下後痞滿乃陰病下早而成痞按之虛軟而不痛者　梹榔枳實各等分爲末每服二錢黃連煎湯下

傷寒熱病　馬梹榔用井華水每一枚用水一口嚼下數枚卽清其熱

傷寒口乾　用生藕汁生地黃汁童便各半盞煎温服

傷寒發斑狂燥熱極　急吞黃雞生雞蛋一枚速妙

傷寒脫陽　大茴香末以生薑自然汁調敷臍上再用大茴香末入盆元散服之

傷寒陽毒熱盛攻心昏逆者　以夏氷一塊置臍中穴卽愈穴在兩乳間陷中卽是須仰面取之方得

傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷者　以青羖羊湯一升和鹽豉搗漬

傷寒時毒攻手足腫痛欲斷　以水牛肉裹之腫消痛止

傷寒後嘔噦　野葡萄藤卽蘡薁搗汁飲之良　並治

一切噦逆兼能止渴去腸胃積垢利小便

傷寒食復病後過食難消復生煩熱 用麴一餅煮汁飲之孕婦忌服

傷寒勞復病後勞役復生煩熱 抱出雞蛋殼熬令黃黑爲末熱湯和一合服汗出卽愈

傷寒發汗不出 以火煆地用水洒之乾桃葉厚三寸席卧温覆取汗傳粉極燥卽瘥麥麩鹽砂皆可如此法用

病後勞復或因梳頭或因食物復發 取洗手足水飲之神效

同傷寒

疫氣瘟病 以水獺肉煮汁服之卽不傳染

時行熱狂 臘月以紅沙糖入甁內密封窖糞坑中臨症絞汁服之甚妙

辟禳瘟疫 揀白馬骨絳袋盛佩男左女右

一方 取赤馬懸蹄絳袋盛佩男左女右

一方 臘月除夜以小豆川椒各七七粒投井中勿令人知能却瘟疫及一切病症

一方　元旦以大麻子三七粒投井中勿令人知

一方　冬至日取赤雄雞作臘至立春日煮食至盡勿分他人

一方　明雄黃末菜油調搽兩鼻孔早晨飲雄黃酒一杯

一方　黑豆一撮暗投井中或缸內勿令人知

一方　入病人家先用麻油搽兩鼻孔出則撚紙捻洗鼻取嚏不患傳染

辟瘟吉祥如意香　蒼朮二觔甘松一兩白檀香五錢研末煮紅棗肉爲丸如龍眼大黃丹爲衣晒乾焚之

一方　以艾灶密燒床之四角勿令人知

一方　病人衣服以甑上蒸過他人衣着不患傳染

辟四季時疫　以貫仲一個浸水缸中日飲其水不患時疫

中風是症先宜取嚏開噤吹鼻探吐

卒中不省取嚏法　通關散即南星皂角細辛薄荷生半夏等分爲末吹鼻中有嚏可治無嚏多死

卒中口噤軟噤法　開關散即烏梅肉氷片生南星各等分爲末擦牙軟之即開

卒中不省薰鼻法　用巳豆油紙捲皂角末燒烟薰鼻自省

卒中口噤難言解語法　取竈尿點在舌下言語自

易

卒中口噤難開湯藥難下者　用開關散調如麪茶含在不病人口內用筆管或葦管插入病人鼻孔使氣連藥吹之其藥自能入咽不可用金器撬之恐傷其齒

中風痰涎壅盛無汗表實者　用三聖散即防風藜蘆瓜蒂等分爲末服之取吐　有汗裏實者　用瓜蒂散即瓜蒂熬黃赤小豆等分爲末每取錢大一匙以香豉一合熟湯七合煮作稀糜去渣取汁和散溫頓服之不吐者少少加服得快吐即止勿再過服致傷胃氣或加全蠍二方乃吐之輕劑也

中風痰涎壅盛重者　五元散即藜蘆赤小豆白礬皂角胆礬爲末服之取吐　或用巴礬丸即巴豆枯白礬爲丸服之取吐二方乃吐之重劑也

中風腹滿便閉神昏口噤結痰不下者乃風邪中藏府之閉症也

奪命散卽巴豆白芷半夏葶藶生南星等分爲末
服之取吐卽愈（亦治尸厥氣實兼痰）
卒中不省口眼喎斜半身不遂四肢厥冷六脉沉伏
寒盛而氣實者（不問經絡藏府皆可治之）三生飲卽生南星
一兩生川烏生附子俱去皮臍各五錢爲末每服五錢
薑水煎服若氣虛者每服加人參五錢虛極將脫者
大倍之方不致倒戈之患也並治痰厥氣厥
卒中痰湧喎斜癱瘓氣實者（不問經絡藏府素有痰飲之人卽宜用之）
青州白丸子卽半夏水浸至生衣七日南星白附
子各二兩川烏去皮臍五錢俱生爲末袋盛水擺
出粉再濾再擺以盡爲度磁盆盛貯日晒夜露春
五夏三秋七冬十日糯米爲丸痰盛薑湯下癱瘓
酒下又爲治小兒驚痰妙藥薄荷湯下
宣吐風痰　連殼蝦米半觔入蔥薑醬煮汁先喫蝦
後喫汁緊束肚腹以雞翎探引取吐
卒中不省　先以麝香二錢研末入清油和勻灌之

通竅即甦後免語蹇癱瘓之症

一方　防風荆芥各一兩升麻五錢生薑三片水二盞煎一盞以半盞將絲瓜子仁研取漿水以半盞和勻灌之如手足麻癢以羌活煎湯洗之

一方　生白礬三錢研細末生薑搗汁調灌即醒

中風頭眩　烏驢頭肉一枚如常治法入豉汁煮食良

口眼喎斜　巴豆去油一錢研末麝香二錢用棉花一塊放病人手掌上中留一孔入二藥末貼掌心以錫壺盛滾水放在面上熱即熨之喎左熨右喎右熨左壺冷即換正即去之

一方　黃鱔魚血同麝香少許左喎塗右右喎塗左正即去之

一方　水牛鼻不拘乾濕以火炙熱如前法熨之俟正即去之

口喎　丹雞冠血塗頰正即洗去如前法塗之

一方　生鹿肉割片同生薑搗貼正卽洗之貼如前法

風症喎僻骨疼煩燥　烏驢皮炙去毛如常治淨蒸熟入豉汁中和五味煮食之

風症煩熱皮膚癢癢　醍醐卽酥上如油者四兩每用温酒和半匙服之每日一服

心肺風熱手足風痺不隨筋脉五緩恍惚煩燥　熊肉一觔切入豉汁中和葱薑椒鹽作腌臘空腹食之自愈

强褓中風　取烏驢背前交春中毛一拇指大八麝香一豆許以乳汁和銅器中浸炒爲末仍用乳汁和灌之

口眼喎斜　白附姜蠶去絲薑汁炒全蝎去足等分爲末酒服二錢甚效名牽正散

筋骨急强虛中風也採羚羊肉和五味炒熟投酒中經宿飲之

類中風與眞中風相似但無口眼喎斜偏廢不仁不用等形

尸厥脉動無氣乃正氣暴爲邪氣閉塞故靜而似死及卒死皆爲尸厥也　菖蒲屑吹兩鼻孔中仍以桂屑着舌下即活如不活即剔本人左角髮方寸燒末酒和灌令入喉即起髮乃血餘血乃心生用燒則發其陽酒行氣血剔本人者取一氣相通也

卒死壯熱爲陽厥府病也　礬石半觔以水一斗半煮消以漬脚令沒踝自然熱退人醒

卒死目閉（爲陰厥藏病也）急着人騎牛臨患人之面用薤搗汁灌耳中吹皂角末於鼻內立效騎牛臨面蓋厭邪之法也

卒死口張身反（亦陰厥藏病）急灸手足兩爪後十四壯畢飲以五毒諸膏散藥（要有巴豆）灸手足甲後以通外陽法也

卒死四肢不收失便（亦陰厥藏病）馬屎一升水三斗煮二斗以洗之又取牛稀糞（名牛洞）一升温酒灌口中灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯卽瘥

馬屎乃取吐灸乃通外陽法也

卒然昏死（卽尸厥也）以大豆二七粒用雞子白并酒和吞之

一方　羚羊角作末蜜調服

陽厥嘔吐欲死　飲新汲水三升甚佳

卒死　臘月收雄狐胆臨症急以温水灌入喉中卽活移時則不及矣

卧忽不省乃中魘也 切勿以火照之火照則殺人但唾面痛嚙其踵及大趾中際即活以犀角爲枕即不魘

一方 青牛蹄甲或馬蹄甲臨入頭上即活

惡風入腹 用鯉魚長一尺五寸者以尿浸一宿平旦以木箆從頭貫至尾炙火炙熟去皮空心頓食切忌用鹽醋

卒中五尸 生猪脂一雞子大苦酒一升煮汁灌喉中即活

驚怖卒死 温酒灌之即醒

中惡客忤卒死 韭菜一把烏梅二七個吳茱萸炒半升以水一斗煮之將病人櫛置於中煮三沸櫛浮者生沉者死煮取三升去滓分數次飲之

卒中山嵐瘴氣頭身重痛或昏冒便泄浮腫 犀牛角磨水服之甚良

一方 羚羊角末水服一錢即愈

一方及中惡客忤　麝香三分研細末醋和灌之即醒廣利方

鬼擊卒死　吹醋少許入鼻中即醒

中惡卒死　斷猪尾取血飲之并縛豚枕之即活

一方　薤白作汁灌鼻中即醒韭汁亦可肘後方

一方　紅雞肝及血塗面上以灰圍四旁立起

一方及驚忤　雄雞冠血入筆管中吹鼻內即起即數分

一方　鷹屎白燒灰酒服方寸匕勿令本人知之

卒中惡毒風邪而死或昏亂不識人　羚羊角燒末酒調服之

卒中惡症　取虎皮燒灰飲之或繫衣服甚驗

中惡卒死或先病痛或卧而忽絶　取白雄鴨向死人口斷其頭瀝血入口外以竹筒吹其下部急則易入氣通即活也

中惡卒死或吐利不止不知是何病症無論大人小兒　用馬糞一丸絞汁灌之乾者水煮汁亦可此扁散法也赤白馬糞

俱可用

中暑卒死或昏眩煩悶欲絶　大蒜一握道上熱土搗爛以涼水和飲一碗卽醒

一方　用熱土圍臍將熱尿灌於中間卽活

中風中暑中氣中毒惡乾霍亂一切卒暴之病　生薑汁與童便服之立可解散蓋薑能開痰下氣童便降火也

小兒卒死而吐利不知何症　犬屎一丸絞汁灌之卽愈無

濕者水煮乾者取汁

卒然昏厥四肢不舉　用瓜蒂散方見類中核痰者用作湯數鍾飲一鍾隨用指探吐不吐再飲通快卽止若因感受寒風者以薑作湯探吐之倘因過飽或緣惱怒氣塞胸中者以鹽作湯探吐之卽愈

長途中暑昏憒不省蒸蒸自汗而垢喘渴壯熱心煩或兼嘔瀉中陽暑也　初中不省急以熱物熨臍蒜汁合水灌之卽醒繼服辰砂益元散神效

辟惡瘟疹家用 胡荽懸掛壁間能辟邪惡

傷風宜分氣虛氣實寒邪傷肺熱邪入腦

發散寒邪 胡椒丁香各七粒碾碎以葱白擣膏和塗兩手心合掌握定束於兩大腿內側温覆取汗即愈

一切風寒 神白散白芷一兩甘草五錢淡豉五十粒薑三片葱白三寸水煎服取汗忌婦人窺探并雞犬并宜至誠乃效

一方 葱白一握淡豉一升名葱豉湯 肘後方 傷寒

初起頭痛身熱亦宜此二方以代麻黃加阿膠治胎動

傷風有汗　白朮防風各二兩炙甘草一兩分二服水煎服之

虛傷風兼內傷　香附紫蘇各二錢陳皮去白一錢甘草七分加薑葱煎服

熱邪入腦而成鼻淵鼻流濁涕也症見目眩頭疼濁涕不止鼻中塞熱甚至孔熱而痛及其腦者　蒼耳散即蒼耳子炒去刺研破一兩加辛夷三錢白芷薄荷各一錢爲末以葱白三莖煎湯沖服以散熱邪自愈

鼻淵日久熱深鼻孔成瘡而痛　以豬胆汁調氷硼散敷之

鼻淵日久　奇授藿香丸藿香連枝葉八兩研細末雄猪胆汁和丸梧子大每服五錢食後蒼耳子湯下或黃酒送下

鼽鼻不通　乾薑末蜜調塞鼻中即愈

鼽鼻作臭　雄雞腎一對與脖前肉等分入豉七粒

焙研以雞子清和作餅安鼻前引蟲出忌婦人雞犬見之

鼽鼻不通（內生瘜肉） 北細辛爲末吹少許入鼻日二次

一方 氷片爲末點之瘜肉自化並治耳聾

散寒發汗 胡桃慈白薑茶等分搗煎神妙

傷風與寒及酒食（初起無藥） 飲百沸湯酸薑水探肚探吐汗出卽已密煖房中以熱湯澡浴亦發散之一法

痙病

痙病症見項背強直手足反張剛痙無汗柔痙有汗剛實柔虛虛宜補正爲主實宜去邪爲主

風痙項強身急 取活鼠去五臟乘熱貼之卽瘥

產後搐搦強直（乃因去血過多風邪乘虛入藏與破傷風同不可誤作中風而治） 魚鰾膠一兩以螺粉炒焦爲末分三服煎蟬脫湯下其驗不可發汗

產寶方小黑豆一升炒令極熟投清酒三升令熱

飲其汁自半鍾至一鍾得微汗身潤則風邪除矣
如無前症產後亦宜飲之能逐敗血散結除痛免
疾

產後風痙身體强直　黑荆芥搗爲末入童便調勻
熱服口噤者挑齒灌之或灌鼻中神效并治產後
血暈名華陀愈風散忌風

發痙 因破傷風襲角弓反張牙噤項强　雄鼠一頭和尾燒灰以臘
脂和敷甚妙

痺病 因風寒濕三氣雜合而成風勝爲行痺寒甚爲痛痺濕甚爲着痺又有五痺之名皮脈肌肉骨也久痺邪入於藏又有肺心脾肝腎五痺之名也更有腸痺胞痺三焦痺胃痺冷痺熱痺種種名色再有周痺症同脈痺但患有定處脈痺則左右相移也近言痛風流火歷節白虎諸症皆行痺之俗名也

風寒濕痺 五緩六急　常食烏骨母雞即愈

濕痺風痺 風痺即行痺其痛流走濕痺即着痺其痛重着　用烏龜肉和五味煮食之以微瀉爲效

一方　生薑搗汁和黃明膠熬膏貼之甚妙

風寒濕痺　醍醐即酥上油二兩溫酒每服下一匙甚效

行痺歷節疼痛　黑驢骨煮湯浴之

一方　虎脛骨酒炙三兩沒藥七兩去油爲末每服三錢溫酒下日三服

一方歷節走痛　虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛置二斗於清酒中浸五宿隨性飲之甚妙

一方　熊骨煮湯浴之

一方　牛皮膠一兩薑汁半盃同熬成膏攤紙上熱貼之冷即易神效一方加乳香

白虎風痛即行痺痛見晝靜夜劇　虎脛骨塗酥炙黃黑色附子炮製去皮各一兩爲末每服二錢酒下日二服

一方　三年醯醋五升煎五沸再入葱白三升煎一沸濾出以布染水乘熱裹之痛止爲度

痛風癱瘓亦行痺也　紫荆皮炒肉桂不見火草烏炒小回炒甘草炒各等分各爲細末和勻每服一錢卧時用好陳酒送下避風痛輕者三四十服甚者五

六十服自愈

筋骨急痛為寒勝新痛多寒若久痛則熱　虎骨和通草煮汁空肚服半升覆卧少時汗出為效切忌熱食損齒小兒不可與食恐齒不生

筋攣骨節疼痛屈而不伸筋痺也　松節散茯神心木一兩乳香一錢石器內炒研每服二錢木瓜湯下

骨節疼痛亦筋痺也并治肌痺　白芥子為末醋研敷之凡風腫毒氣亦可敷之

筋骨疼痛亦筋痺也　龜一個取肉分作四脚每用一脚人天花粉枸杞子各一錢二分雄黃五分麝香五分槐花三錢水一碗煎服

一方　鹿角燒存性為末須極細每以酒服二錢日二服

肌痺肌肉頑木不知痛癢　駱駝峰脂即背上肉鞍內油名曰峰子　以火炙熱摩之取熱氣透內自愈亦治風瘡惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮及腕損筋骨

面上木痺亦屬肌痺 牛皮膠化開和桂末厚塗一二分良甚

脚底木硬亦屬肌痺 牛皮膠以生薑汁化開調南星末塗上烘物熨之

周痺患有定處痛無歇止或上及下或下及上 駱駝肉鞍肉脂鍊淨一觔入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服其症內不在藏腑而外未發於皮獨居分肉之間乃眞氣不周之故也

一方兼見緩急偏廢(即數分) 薏苡仁十五兩大附子炮製十枚爲末每服方寸匕日二服治痿躄更妙孕婦忌服

心痺心痛或心煩悸嗌乾噫氣有時而恐(即叭)病脉痺復感於邪而致也 取白狗心血和蜀椒末爲丸梧子大每服五丸日五服

骨肉疼痛額角紅腫不可忍 芸薹菜葉搗敷隨手而愈

腰脚肢腿疼痛 以葡萄根及藤煎湯淋洗即愈

諸風脚膝骨中疼痛不能履地 以鹿蹄肉同豉汁

五味煮食之甚妙

一切風毒骨節疼痛　黑驢皮膠煎食之卽止酒服更佳

骨中一切風症　黑驢毛一觔炒黃投酒一斗漬三日空心細飲令醉煖卧取汗明日如前再飲之自愈忌陳倉米麪

風痺　採經霜桑葉煎湯洗手足卽愈

風蹙頑痺腰膝疼痛　傳信方海桐皮薏苡仁各二兩牛膝川芎羌活地骨皮五加皮各一兩甘草五錢生地十兩酒二斗浸之早中晚飲常令醺醺自愈是方藥味不宜增減

風冷氣痺　以百沸湯淋洗脚至膝厚覆取汗取其助陽氣行經絡耳

痿病 痿有心肝脾肺腎五症皆因肺熱而生症見皮毛焦瘁不能行走痿病不痛惟兩足痿弱痺病則通身肢節疼痛也痿症不可用風藥以痿多虛痺多實

丈夫脚冷不能行走並不隨人者 醇酒三斗水三斗入甕中灰火温之漬脚至膝常着温火勿令冷三日方止自愈

諸痿 蒼朮黄柏爲末服之爲二妙散加牛膝爲三妙散

脚氣此乃內有濕熱外感風寒相合爲病發時則往來寒熱而似傷寒火盛則兩脚腿痛腫其熱如火寒盛則不腫不熱而痛名曰乾脚氣濕盛則重腫表實宜汗裏實宜下濕盛宜逐寒濕宜消中兼溫寒虛宜補濕熱分虛實其中又有名鶴膝風者即兩膝腫大疼痛膝上至髀膝下脛足枯細但存皮骨狀若鶴膝也更有痾風之名者症同鶴膝風病後得之也

脚氣疼痛屬寒 以羊角一副燒爲末熱酒調塗以帛裹之取汗永不再發

寒濕脚氣 牛皮膠一塊經切麪炒成珠研末每服

一錢酒下其痛立止

一方 以麋皮作靴韈永除其患麋皮亦妙

一方 川椒二三升疎布囊盛之日以脚踏并煎湯洗足卽自瘥也花椒葉亦可洗之

脚氣壅痛壅者衝上也 以沙牛尿一盞磨檳榔一枚空心煖服

脚氣疼痛 熊肉半觔切入豉汁中和葱薑鹽作臛臘空心食之並治風癉五緩筋骨

脚氣癉弱 水牛乳或黃牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三合羊乳亦可

軟脚氣 豺狗皮熟之纏裹患處卽瘥

風毒脚氣痛腫而熱 猪肝和生膾食之取利

脚氣濕盛重腫 胰濕餅子卽黑白丑頭末甘遂末各五錢蕎麥麪一兩五錢水和作餅每以三錢煮熟空心茶清服逐之

脚氣衝心症見嘔吐喘滿若目額皆黑恍惚讝妄則難痊也 檳榔爲末以

童便薑汁温酒調服

脚氣總治方　防已煎服自愈　屬濕則腫加苡仁蒼朮木瓜木通屬熱則痛加黄柏香附木香屬風加羌活蓽薢屬痰加竹瀝南星活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加胆草總以防已爲主藥

寒濕脚氣　熟艾夾入襪内穿之自不發丹田氣弱臍腹冷者用以裝袋兜臍腹甚妙

一方　甘公香煎易林先巾愈

早晚痞結　原本原作下早痞結當時不解故改刻早晚今閱綱目有下早成痞之症則下早二字固無錫誤矣但仍不識解故特記之

此条恐係錯出脇是何處脇是何處部位先差了　戟門又記

戟門不知醫然常見醫書中有論傷寒不宜早下早下即成結胷之語或即此早下二字請即訪之高明　戟門注　又看前傷寒門第一月其明証也

三升煮分二服若一服得以快利即停後服

脚氣　赤小豆袋盛朝夕踐踏之自愈

一方　常以鯽魚作膾食之良並治上氣

童便薑汁温酒調服

脚氣總治方　防已煎服自愈　屬濕則腫加苡仁蒼朮木瓜木通屬熱則痛加黃柏香附木香屬風加羌活蕁薤屬痰加竹瀝南星活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加胆草總以防已爲主藥

寒濕脚氣　熟艾夾入襪內穿之自不發丹田氣弱臍腹冷者用以裝袋兜臍腹甚妙

一方　甘松香煎湯淋洗即愈

風毒脚氣　桑枝一升細剉炒香水三升熬至二升一日服盡名桑枝煎

一方早晚痞結脇塊如石昏困且死者　杉木湯杉木節一升橘葉一升無葉以皮代大腹檳榔七枚連子搥碎童便三升煮分二服若一服得以快利即停後服

脚氣　赤小豆袋盛朝夕踐踏之自愈

一方　常以鯽魚作膾食之良並治上氣

內傷勞役傷元氣宜補有熱中寒中濕熱暑熱火鬱之分飲食傷胃府宜消有飲食失節過於温涼之不一

上氣喘嗽煩熱食卽吐逆　白沙糖薑汁等分相和漫煎二十沸每嚥半匙取效

過食脯腊筋痛悶絶　酸漿水煮入少許鷹屎和食卽愈

過食瓜菓停滯不化　以生熟湯飲之卽解以口中如酒菓氣味爲效

過食菱角腹脹　煖熟薑酒仍燒菱角服之卽消

過食荔枝（發熱煩渴口乾鮝血）　飲蜜漿一杯卽解

一方（致醉而煩熱者）　卽以荔枝殼浸水飲之解

食氷太過而患脾疾百藥不效者　以氷煎大理中丸服之卽愈　此楊介治宋徽宗之方取治受病之源也

脾弱不食　大豆黃二升大麻子三升熬香爲末每服一合飯下日四五服孕婦忌之

脾胃虛冷　乾薑以漿水煮透取出焙乾搗末作粥爲丸梧子大每三五十丸白湯下

脾胃虛冷腹滿刺痛　黃肥狗肉半觔用水同鹽豉煮粥頻食一兩

脾胃虛弱飲食難化無力肌瘦　用乾薑炒研四兩以白餳切塊水浴過入鐵銚溶水和丸梧子大每空心米飲下三十丸

脾胃虛弱水穀不清（噫氣吞酸吐食及霍亂泄瀉膿血臍腹疼痛裏急頻併不思飲

食諸症　象肉四兩炒肉豆蔻炮只殼炒各一兩柯子肉炒甘草炙各二兩乾薑五錢炮共爲末每服二錢水一盞煎八分和滓熱服食前每日三服

脾胃虛弱惡心不欲飲食　虎肉半觔切以蔥椒醬調炙熟空食如熱食則損齒（開口）

脾胃虛熱　猪脾同陳橘紅人參生薑蔥白陳米煮羹食之

脾虛胸膈不快不進飲食　用蓽澄茄爲末薑汁和神曲爲丸梧子大每薑湯下七十丸日二服

久患吞酸諸藥不效　用魚膾（鮮活魚薄切洗淨血腥沃以蒜虀薑醋五味而食是也）食之卽愈勿夜食及飲冷水

食卽汗出（乃脾胃虛也）　猪肝一具薄切瓦上焙乾爲末煮白粥絹絞汁衆手爲丸梧子大空心服下四五十丸日五次

食後善嘔　鹿角燒末二兩人參一兩爲末薑湯服方寸匕（卽數分）日三次

消食酒糯米諸積　陳米麴研末酒服立愈

酒積面黃鼓脹　以猪項肉一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨乾食之酒下卽愈

中酒嘔吐煩亂　煮赤小豆汁徐徐飲之卽愈

酒後暴熱　冬至後第三成日爲臘收取是日雪溫服之

諸果成積　麝香一錢生桂末一兩飯和丸綠豆大大人十五丸小兒七丸白湯下

醋心吐水　檳榔四兩橘皮一兩爲末每服方寸匕空心蜜湯調下

嘔吐痰水　白檳榔一顆烘熟橘皮二錢五分炙爲末一盞煎半盞溫服

腹中緊脹　白糖以酒三升煮服之不過一服卽愈

好食茶葉　每日食榧子七枚以愈爲度

磨麪食殺三蟲　野灰藿菜子作飯食之卽愈

壯胃健脾　白羊肉三觔切碎粱米二升同煮下五

味作粥食

健脾能食　猪舌和五味煮汁食之

補脾　臘月以黃牛脾淡煮日食一度即健運矣

健脾進食飲酒不醉　乾葛粉白蔻仁砂仁丁香各五錢甘草百藥煎各一錢木瓜四兩炒鹽一兩爲末不能飲者温酒調服一錢即能飲名醉鄉寶屑

病後胃弱不能飲食　蓮肉膏蓮肉糠米俱炒各四兩白苓二兩共爲末白糖調作膏每五六匙白滾

湯下

脾胃虛弱久服益精神悅顏色　太和膏淮山藥芡實蓮肉白苓各二兩早米糯米各半升入白糖蒸餅常服極妙二方無論大人小兒俱可用之

酒多致病　長壽仙人柳晒乾爲末每服一錢温酒調下

汗出不滴腰腳瘦怯垂耳聾者　米醋浸荆三稜夏四日冬六日爲丸醋湯調下二錢即瘥

肚腹脹滿飲食如常乃濕熱生蟲之象勿作水鼓治　石榴桂樹東引根皮梹榔各五錢空心服瀉下怪血即愈此夏成方也

酒菓過度積熱極脾多食多飲小便頻數非消渴也　麝香當門子以酒濡作十許丸棘枸子煎湯吞之即愈

傷粽成積　神麯炒爲末少加木香鹽湯下數日口中聞酒香其積即散

腹脹有水食者宜之　蔓菁子搗研濾汁飲之或吐或利腹中自寬得汗愈

虛損陰陽氣血榮衛精神骨髓津液俱不足爲虛外而皮脉肉筋骨內而肺心脾肚腎消損爲損日久不愈復因陽虛外感於寒陰虛而生內熱或因飲食勞倦而成五勞七傷六極也五勞者心肝脾肺腎也七傷者恐懼傷精怵惕思慮傷神喜樂無極傷魄悲哀動中傷魂憂愁不已傷意盛怒不止傷志勞倦過度傷氣六極者筋極肉極血極骨極精極氣極也

補益虛損　甘枸杞和羊肉作羹以粳煮粥入葱豉五味食之甚妙

一方　烏毛骨雄雞一隻治淨五味煮極爛食之如

生反損人

一方　水芝丹蓮子半升酒浸三宿以公猪肚一個洗淨入蓮在內縫定煮熟取出晒乾爲末酒煮米糊丸梧子大每服五十丸食前温酒送下如小便頻數下焦眞氣虛弱者以醋糊爲丸服之

潤肺氣助五臟生津液虛損人心肺燥熱要法　白沙糖取堅白成塊者和棗肉巨勝子二末爲丸噙之

虛勞不眠　乾薑爲末煎湯服三錢取微汗良

虛勞口乾　青羊脂一雞子大醋酒半觔棗七枚漬七日食之立愈

虛勞尿精　法製鹿角白膠二兩爲末酒二升和温服

虛勞尿血　鹿角白膠三兩炙水二升煮一升分四次服之

虛勞白濁　青羖羊脊骨炙爲末酒服方寸七日三服　即數分

腎虛陰痿（身體羸瘦精力衰少）用豬腎（豬音樊卽健猪也）一對切片枸杞葉半觔以豉汁一盞同椒鹽煮羹食之

虛勞腎損（夢遺精滑溺白）韭菜子爲末空心温酒調服卽愈

腎虛精竭　羊腎一對切於豉汁中以五味采揉作羹粥食之

盜汗遺精　法製鹿角白膠霜二兩生龍骨炒牡蠣煆各一兩爲末酒糊丸梧子大每鹽湯下四十丸

陽痿便數（面色無光）鹿茸酒煖鹿茸酥炙一兩切片山藥末一兩絹袋裹置酒中七日開瓶日飲三杯將茸烘作丸服之但須節慾爲妙

夢遺便溏　牡蠣粉醋糊爲丸桐子大每用米飲下三十丸

男婦虛勞咳唾膿血　以津符子（産雲南口外緬甸地方）每日啖十枚一日勿間斷自愈治肺癆肺痿同方

肺痿咳唾膿血　苡仁十兩杵破水三升煎一升酒

少許服之

肺痿咳嗽傷中脉絶　鹿髓煎鹿茸生地汁各七合酥蜜各一兩杏仁桃仁各三兩去皮炒酒一升同搗取汁先煎杏桃地黃至減半再入鹿髓酥蜜煎如稀餳退火氣每舍一匙嚥下日三次

肺損嘔血開胃止嘔　阿膠炒二錢木香一錢糯米一合半爲末每服一錢百沸湯點服日一服

肺痿吐血　鹿血和酒服即止

勞損風濕　黑牛髓或黃牛髓羊脂各二勺白蜜汁薑汁酥油各三升煎三上三下令成膏隨意以温酒和服之

勞傷虛冷　肥白羊肉一腿蜜蓋煮爛絞取汁服並食肉

冷勞及臟虛冷泄久滑及赤白帶下　猪子肝一葉薄批搵着煨熟訶子末炙之再搵再炙盡末半兩空腹細嚼陳米飲送下

骨蒸虛冷　白毛羊肉一觔山藥一觔各煮爛研如泥以米煮粥食之

思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸　龍眼肉酸棗仁炒黃者炙白朮焙茯神各一兩木香五錢炙甘草二錢五分咬咀每服五錢薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾服亦名歸脾湯

心下怔忡夜多惡夢健忘　每日空心食海梧子出林邑十數枚月餘自愈

骨虛勞極　鹿角二兩炙牛膝酒浸焙一兩五錢爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下

虛損勞傷　羊腎一枚治淨米一升水一斗煮九升服日三服

精血耗涸　鹿茸去毛酒蒸當歸酒浸各一兩焙爲末烏梅肉煮爛搗丸梧子大每米飲服五十丸

久患寒熱經年不愈　十一月內令病人坐石槽中平旦用冷水灌至百數冷顫欲死良久冷汗出以

粉撲之即愈此華陀治一婦人之奇方也

憤患冷疾　冬月水雪時令病人解衣坐石上取新汲水從頭洗之盡一百斛定俟背下有熱氣時覺不可忍爲驗永不再發此徐嗣伯治大將房伯玉之妙方也

陰血不足　補陰丸用龜下甲酒炙地黃各六兩黃柏鹽水浸炒知母酒炒各四兩石器爲末以猪脊髓和丸梧子大每服百丸空心温酒下一方去地

黃加五味炒一兩

勞傷吐咯血　水牛髓一枚塗紙上陰乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各一觔香油四兩熬乾爲末每空心燒酒服二錢七分

肺痿吐血　黃明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃汁調下

上氣虛乏欬逆勞熱　以猪獾肉和五味煮食神妙

心虛煩熱少睡多渴　小麥作飯食之

痨瘵久病虛弱即成痨氣血兩敗爲瘵形壯能食不瀉者可治形衰不食溏瀉者主死是症久則有腹生惡蟲身死後多遭傳染名爲傳尸痨

天灸痨瘵　八月朔日清旦收取百草頭上露水點膏盲穴最爲神妙

一方　每逢癸亥日以艾灸兩腰眼各七壯內服青麟丸自愈

痨瘵累年　日煮鰻魚食之即愈（鰻魚即桂魚也）

一方　白鱔魚任意煮食之

癆瘵失血　龜肉和葱椒醬油煮食補陰降火治虛癆失血咯血咳嗽寒熱累用經驗（六甲日不可食猪肉蒜米瓜莧不可合食）

癆痢　黃狗頭骨和乾薑莧苕炒見烟爲丸空心白飲服十九極效　久痢同方

傳尸癆（及童子癆症）　猫屎須撿房上晒乾色白者多收之以土焙極乾火煨研粉每晨服二錢黃糖拌食不可間斷屢效良方

追取癆蟲　臘月取白兔屎四十九粒（兔屎名明月砂又名玩月砂）硇砂如兔屎大四十九粒爲末生蜜丸梧子大月望前以水浸甘草一夜五更初取汁送下七丸有蟲下急鉗入油鍋內煎殺三日不下再服以下爲度方名明月丹

一方　水獺足爲末酒服可殺其蟲如前法除之獺肉及肝並可

一方　取黑貓肝一具生晒研末每於朔望五更時

酒調服之亦如前法殺蟲自愈

骨蒸癆熱　採青蒿葉以童便和搗取汁熬膏每日以白飲送二錢自愈

一方（日晡潮熱）　秦艽柴胡各一兩甘草五錢爲末每服二錢聖惠方

傳屍癆　危氏神授丸川椒炒出汗（開口）爲末米飲下三錢昔有人患是症遇異人傳此方服至二劑吐出蟲如蛇而安肺胃素弱者忌服

癆瘵　猪腎一對童便二分酒一分瓦罐煨熟五更食如此服至一月卽愈

傳屍癆　獺肝丸獺肝炕乾爲末水服二錢日三服以瘥爲度

癆瘵　多煮饅魚食之自愈亦治蟲心痛多吐冷氣上攻滿悶

自汗盜汗無因汗出曰自汗睡則汗出覺則汗止曰盜汗自汗汗出惡寒爲表陽虛蒸熱汗出不惡爲裏陽實盜汗有心虛不固心火傷陰之分

自汗盜汗　每夜卧時帶飢吃蒸餅一枚不過數日即止

虛汗盜汗　浮小麥帶皮文武火炒爲末每服二錢五分米飲下日三服或煎湯代茶飲之

盜汗　椒目（閇口）微炒碾細用五分生猪上唇煎湯一合睡時調服極效蓋椒目能行水又治水蠱也

自汗不止　糯米龍骨牡蠣各等分爲粉撲之卽止

斂汗　麻黃根牡蠣粟米或糯米各等分爲粉袋盛撲之或入煎劑

盜汗　五棓子焙研細末以自己漱口水調敷臍上

神效鄭贊襄方

汗出不止服固表藥而不效者　酸棗仁炒研同生地白芍北味麥冬竹葉龍眼肉煎服卽止

夜汗不止衣被皆透多年不能瘥者　採帶露桑葉焙乾爲末每日空心米飲下二錢數日卽愈



不藥良方

續集卷二

C116/2535
v.4

不藥良方續集卷二

失血

九竅一齊出血曰大衄鼻血曰鼻衄鼻血如泉曰腦衄耳出血曰耳衄目出血曰目衄皮膚出血曰肌衄齒牙出血曰齒衄又曰牙宣若從口出爲內衄有嗽血唾血咯血欬血嘔血吐血又有溺血淋血又有肺癆咳吐膿血及腸風下血臟毒下血臟毒血多濁腸風血多清

大衄不止　阿膠炙二兩蒲黃炒黑五錢每服二錢水二盞生地汁一合煎至六分温服急以帛繫兩乳自愈

九竅出血不止　新汲水隨左右洗足卽止

一方　用冷水噀面卽止

一方　新汲水浸紙貼顯門上以熨斗熨之立止

鼻衄　醋和胡粉半棗許服之

一方　用醋和土塗陰囊乾卽易之

一方大蒜搗碎塗脚心止卽拂去取以引熱下行之意也

一方　黃鱓血滴數點於鼻中卽止

一方　海螵蛸同槐花末吹鼻中卽止

鼻衄不止　乾薑削尖煨塞鼻中卽止

一方　取老鴉鳥翅間大骨微炙研末吹鼻中卽止

一方　鯉魚鱗炒成灰每冷水服二錢甚效　普濟方

一方　牛耳垢車前子末等分和勻塞鼻中卽止

一方　白馬屎敷頭頂卽止

一方　黑驢屎燒灰吹鼻中卽止

一方　猬皮燒灰吹鼻中卽止

一方　藕節搗汁飲之并塗鼻中

鼻衄成碗　每早辰吞生雞蛋三四枚內加白茨細末三四分服至五七日永不再發忌燒酒炙煿等物

鼻衄垂危　以溺器中垢新瓦上烘乾研細五錢麝香少許用温水一碗調勻緩緩服之

鼻衄時作　乾鹿血炒枯將酒酵先薰二三次仍用酒酵半蓋服之

鼻中涕血　以三煉酥中精液灌鼻中日三夜一最良

鼻淵腦衄　藕節川芎焙研爲末每服二錢米飲下

腦衄　麝香水片胎髮灰各一錢爲末吹鼻中三兩次即愈

牙宣露痛　絲瓜根藤臨用時火煅存性研末擦之

海上方

一切吐血　四聖飲生地熟地側柏葉藕節各四錢

水煎服

一方　菉豆一升頭伏天將白布爲袋以豆裝入縫口入遠年糞窖內浸七日取出二伏天連袋繫於長流水中漂七日不可着地恐生豆芽三伏天將豆日晒夜露七日去袋入砂礶內煮爛每日早晚用白蜜一鍾豆半鍾和勻煮汁送下極妙

吐血不止　黑乾薑爲末童便調服二錢卽愈

一方　阿膠炒二兩蒲黃炒黑六合生地黃三升水五升煮三升分服

吐血成斗命在頃刻　藕汁一碗韭菜汁一碗側柏葉汁一碗俱澄清末髮灰五錢攪衆末三錢入瓶內重湯煮一炷香取出待温入童便一杯黃酒半杯對之頻頻温服去柏葉末攪衆末亦可

吐血色似鵝鴨肝日久不止　用生犀角生桔梗爲末酒服二錢

吐血咳嗽　寶珠山茶花瓦上焙黑色調紅糖日服

不拘多少

一方　寶珠山茶十朵紅花五錢白茯一兩紅棗四兩水煎一碗服之渣再服紅棗不拘時亦取食之

吐血喘咳　青羊角灰二枚桂末二兩爲末每服一匕糯米飲下日三服

卒然吐血　海螵蛸末米飲下一錢神效

一方　先食蒸餅兩三個以槌子爲末白湯服三錢日三服

一方　雙荷散藕節荷蒂各七個以蜜少許搗爛用水二鍾煎至八分去滓温服或爲末丸服之亦可

勞心吐血　蓮子心七個糯米二十粒爲末酒服此臨安張上舍方也

吐下血不止　煮芫荽汁服下

嘔血不止　魚鰾膠長八寸廣二寸炙黃刮二錢以甘蔗節三十五個取汁調下

咯血　用新棉燒灰五分好酒送下

吐血咯血　黃明膠一兩切片炙黃新棉一兩燒研
合勻每服一錢食後米飲服日再服
一切肺病欬吐膿血不止　好酥五十勭煉三遍當
出醍醐即酥上油也　每服一合日三服以瘥爲度
肺破出血或嗽血不止　黃明膠一大片炙黃塗酥
再炙研末用白湯化三錢服之即愈
肺癰咯血　苡仁三合搗爛水二大盞煎一盞入酒
少許分二服服之立效或以猪肺蘸苡仁末服之
亦治痿瘡咳吐膿血
胸痛悶者　醇苦酒煮苡仁令濃
有血當吐出即愈
肺癰咳唾膿血腥臭　不問膿成未成　柘木耳即柘黃　研末同
百草霜二錢陳米餬丸梧子大米飲下三十丸其
效甚捷
衄血一月不止　刺青羊血熱飲之即瘥
一方　黃明膠盪軟貼山根至髮際即止

吐血咯血　黃明膠一兩切片炙黃新棉一兩燒研合勻每服一錢食後米飲服日再服

一切肺病欬吐膿血不止　好酥五十勭煉三遍當出醍醐（即酥上油也）每服一合日三服以瘥爲度

肺破出血或嗽血不止　黃明膠一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即愈

肺癰咯血　苡仁三合搗爛水二大盞煎一盞入酒少許分二服服之立效或以猪肺蘸苡仁末服之亦治痿瘡咳吐膿血

肺癰咳唾不休心胸痛悶者　醇苦酒煮苡仁令濃微濕炖服肺中有血當吐出即愈

肺癰咳唾膿血腥臭（不問膿成未成）　柘木耳（即柘黃）研末同百草霜二錢陳米飯丸梧子大米飲下三十丸其效甚捷

衄血一月不止　刺青羊血熱飲之即瘥

一方　黃明膠炙軟貼山根至髮際即止

下血不止　水獺肝一副煮熟入五味食之

大便下血　羊血煮熟醋食最妙

一方　先用海螵蛸炙黃去皮研末每服一錢木賊湯下後服猪臟黃連丸

一方　黃牛角胎一具煅末煮豉汁每服二錢日三服

一方　藕節晒乾研末人參白蜜煎湯調服二錢日二服

一方　勃薺搗汁大半鍾好酒半鍾空心温服日三服

一方　南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

一方腸風　火漆三錢研細末以豆腐皮分包三十包白滾水送下至重三服即愈

腸風下血　生炭三錢只殼燒存性研極細每服三錢米飲下

一方 百合花中子酒炒微赤研末白湯送下

一方 猬皮炙末飲服方寸匕 即數分

一方 霜後乾絲瓜燒存性爲末空心酒服二錢

一方 皂角樹上木耳瓦焙乾爲末每服一錢溫酒下

一方 活鯽魚一大尾去腸留鱗入五棓子末填滿泥固煆存性爲末酒服一錢或飯丸日三服或用硫黃一兩同上法煆服亦良

一方 西瓜子殼煎水服之自愈

一方 生柿子二個竹刀切去蒂核以棉花子塞入柿內仍蓋好瓦上煆存性研細末米飲熱調服重者三服全愈

一方 烏梅七個熱猪血半觔全煮好食去梅不用鹽重者不過三服即愈

一方 陳棕毛煆灰椿皮白榆皮青皮桑白皮俱生用各五錢煎湯沖服即愈

一方　鴨蛋一枚炒熟去殼常吃自愈

一方　蕨菜花焙爲末每服二錢米湯下

腸風下血因勞傷者　野猪外腎連皮燒存性研末米飲服之

腸風下血因酒毒者　大田螺五個燒至殼白肉乾研末作一服熱酒下

一方　米麴一塊濕紙包煨爲末空心米湯服二錢神效

一方　酒煮鮰魚常食最妙

酒痢便血腹痛或如魚腦五色者　乾絲瓜一枚連皮燒研空心酒服二錢一法煨熟食之

下血不止其勢危篤　絲瓜燒存性槐花減半爲末每空心米飲服二錢

積年下血　野猪頭骨一枚桑枝向西者一握附子一枚同入甑內煆過爲末每服二錢粥飲空心服

風冷下血脫肛疼痛　野狸即果狸野貓也一隻治淨大瓶

盛之泥固火煅存性取研末入麝香二錢食前米飲服二錢

溺血　小麥麪炒香以肥猪肉蘸食之

一方　萵苣菜搗敷臍上卽愈　小便不通同方敷之卽通

失血溺吐因飽食用力或因持重努傷脉絡　苧歸飲當歸二兩或三兩酒浸洗撫苧一兩微炒水三碗酒一碗半煎至八分分二次服之取其引血歸經　並治跌撲墮打而傷脉絡令人大吐者二症中如有瘀血或加大黃下之或加桃仁紅花破之或加鬱金黃酒行之審症酌加其應甚速

齒衄牙縫出血　醋浸竹茹含之竹茹功能清肺涼胃

大腸下血屬風熱　柿乾燒灰以飲服二錢卽愈

鼻衄　以白茅根搗汁服之卽止　亦治血淋及撲損瘀血

一方　以壯婦頭髮燒灰吹鼻中卽止

舌上出血（舌衄也）　以油頭髮煆末茅根湯服之

一切失血　括樓仁去油炒香酒服一錢取其降火瀉者切忌之

咯血　青黛飛淨合杏仁研置柿餅中煨食卽愈名聖餅子

便血尿血　地骨皮鮮者搗汁服之

鼻衄（實火者）　山梔炒極黑爲末白湯沖服一錢

舌衄　槐花炒研摻之

遠年下血　櫻櫚燒存性側柏卷柏俱燒存性等分爲丸服下並可煎服

齒衄不止　醋浸竹茹合之卽愈

吐血衄血　荷葉末熬香服崩淋損傷產瘀同方

鼻衄　百草霜水調塗之紅見黑卽止以水制火也

吐血衄血　韭菜汁童便服並治損傷血瘀

欬血（胸中哽噎怵怵如蟲行者）　猪獾子膏油入酒和服或下或吐或自消也

一方　駱駝屎乾研末吹鼻中卽止

消渴上消屬肺飲多小便如常中消屬胃飲多小便短赤下消屬腎飲多小便渾濁三消不可皆以熱論亦有屬寒者也飲多尿少而渾赤者屬熱是火盛耗水而渾也飲少尿多而清白者屬寒是火虛不能耗水也是症便鞕脉大能食爲胃實熱下之尚可醫治若不能食濕多舌色白滑者久則變爲水腫泄瀉熱多舌色紫乾者久則發爲瘡疽而死也

消渴　以李根白皮煮汁飲之

一方　水牛鼻同石燕煮汁服之

消渴飲水　苡仁煮粥飲并仁食之

一方　金豆丸白扁豆浸去皮爲末以天花粉汁同

蜜和丸梧子大金箔爲衣每服二三十丸天花粉汁下日二服忌炙煿酒色服後用滋腎藥服之

一方　乾生薑末一兩以鯽魚胆汁和丸梧子大每服七丸米飲下

一方　鮸魚十頭陰乾去頭尾燒灰乾荷葉等分爲末每服一錢新汲水調下日三服名沃焦散

一方　麝香當門子酒和作十餘丸枳椇子煎湯送下益麝香敗酒壞果枳椇子亦敗酒也

一方　鯽魚一枚去腸留鱗以茶葉填滿紙包煨熟食之不過數枚卽愈

一方　用浮石蛤蚧蟬蜕等分爲末以鯽魚胆七枚調服三錢

一方　取燔毋湯濾淨一碗飲之勿令病人知之消渴飲水無度　用燔雄雞水濾淨澄清服之不過一雞之水卽愈

一方　白花鴿子一只切作小片以上酥煎之含咽

自愈

消渴不止　大冬瓜一枚去皮埋濕地中一月取出破開以瓜中清水日日飲之或燒熟絞汁飲之

一方　臘月採取白兎頭骨煮汁俟渴卽服之

一方　乾冬瓜子麥冬黃連各二兩水煎飲之冬瓜黃葉俱治此候不論新葉乾葉不拘新久之患皆能治之

一方　冬瓜瓤乾者一兩水煎服苗葉亦可用

消渴便短赤濁　羊肉二脚瓠子六枚薑汁拌白蜜二兩同鹽葱炒食

腎消尿數　鹿角一具炙搗爲末以温酒每服方寸匕（分）卽數七日二服

一方　黃母雞治淨煮汁冷飲并作羹食肉自愈

腎消尿多（心脾中熱下焦虛冷）　水牛乳羊乳每飲三四合良

熱中消渴（羸瘦小便不禁）　白兎骨和大麥苗煮汁服之極效

消渴羸瘦　白兔一隻去皮爪五臟以水一斗半煎稠去滓澄冷渴時即飲之不過二兔痊愈

多年消渴　以牝驢骨煮汁服之極驗

消渴久變水腫渴而且煩小便少者　冬瓜白瓤水煮汁淡飲之神效

老人消渴　鹿頭一個去毛煮爛和五味空心食以汁嚥之

消渴骨蒸　大冬瓜一枚去瓤入黃連末鋪滿安甕內待瓜消盡同爲丸梧子大每服三四十丸仍煎冬瓜湯下

消渴　芭蕉根搗汁飲之

一方　土瓜根搗汁飲之

一方　白兔屎澄汁冷飲即愈海上方

一方　繰繭絲湯飲之即止取其能抑心火也

消渴上消　紫背浮萍搗汁服之

上熱消渴　以甘枸杞日以湯泡飲之代茶方也

一方中下消 以經霜帶露桑葉泡湯代茶飲之

消渴腹中有蟲耗其津液者 取苦練根白皮濃煎加麝香少許服之蟲下渴止

一方 買極好雪梨每日食一枚以顏貌腴澤症愈爲度梨乾者泡湯和滓食之與菜菔相間收藏則不爛

一方 萊菔子搗汁服之

神病神者五臟所藏之七神即心藏神脾藏意與智肺藏魄肝藏魂腎藏精與志出七情亦由五藏而生即心生喜肝生怒脾生憂思肺生悲腎生恐也氣和則志達故生喜笑氣暴則志憤故生恚怒繫心不解散故生憂思淒心則哀苦故生悲心內生恐懼故欲人作伴外觸非常事物故一聞響動即自驚駭也神傷心虛諸邪相乘即如驚悸怔忡健忘恍惚失志傷神與夫氣怯膽弱恐畏不敢獨卧等病是也

心昏多忘 白牛馬猪雞各心乾之爲末每酒服方寸七(數分)日三七則智慧日生患痢者勿食食則痞悶加甚(即)

清心甯神　用蓮子肉於沙盆中擦去赤皮去心爲末入龍腦點湯服之

睡卧譫語　以靈床果子（卽先亡坐上祭果）食之卽止

化痰定驚安神　五月五日午時有雨急伐竹節中水曰神水飲之甚妙

鎮心安神益好顏色　平旦取第一汲井水（卽井華水）和硃砂服之

心藏燥熱悲傷歌笑洪若神靈　大棗十枚小麥一升甘草一兩爲末每服二兩白湯下仲景方

心虛病笑不能休止　鹽煆赤煎沸飲之以水制火取其既濟之義

癲狂癇症癲疾始發志意不樂甚則精神呆癡言語不倫而睡如平時以邪併於陰也狂疾始發多怒不卧甚則兇狂欲殺目直詈罵不識親疎而夜多不寐以邪併於陽也癇疾發時則吐涎神昏卒倒無知口噤抽搐時之多寡不等而省後居起飲食皆如平人癇有雞馬牛羊猪五者之分言病狀偶類是也其實不離乎痰火氣驚四者而已幾症治法皆同

癲狂癇三症初起多痰者　治法先以三聖散吐之若風盛有痰者用青州白丸子服之二方俱載中風門

癇病灸法　發時以艾炷灸百會穴穴在頭頂正中不拘壯數以魅爲止再發再灸以愈爲度

癇病去痰法　發時用皂角汁灌鼻內其風痰卽從鼻口中涕唾而出如魅後涎痰不止以鹽湯服之自止

狂症多因驚憂痰血塞於心竅所致　白金丸鬱金七兩白礬三兩米餬爲丸隨早晚俱可服之每一二錢白湯下形氣虛者勿服

癲狂不語目不識人　以驢脂和酒服三升良

癲狂鬼魅　以多年喜鵲巢燒水服仍呼祟物名號卽愈　中蠱毒同方

癲狂風盛痰多　茶葉梔子各一兩煎濃汁一碗服之良久探吐痰涎去病愈

癲癇熱盛有痰　蚯蚓去泥入葱管中化爲水飲之甚驗或去泥以鹽塗之化爲水亦良

癲癇瘈瘲　鴟頭三枚鉛丹一觔爲末蜜丸梧子大

每酒服三九日三服

癲疾驚癇　猪心血調硃砂末服之　卒中惡死同方

癇症　以象齒屑炒黃研末飲服

心熱氣癇　黑驢乳煖服三合日二次

驚癇恍惚或語言不倫歌哭不休　蔺子核生交趾合浦間七枚燒末入硃砂少許薑湯下方寸匕自愈

驚癇恍惚語言錯亂　狐肉及五臟治淨入豉汁煮熟入五味作羹或作粥食羹中以羊骨汁鯽魚代豉汁亦妙名狐肉羹

風痰恍惚心煩腹痛或時悶絕復甦　青羖羊角犀角微炒爲末隨時温酒服一錢自不復發

斷除風痰　邕州風貍腦酒浸服之即永不發

癲狂　靈苑辰砂散辰砂一兩飛淨乳香去油棗仁炒各五錢酒下恣飲沈醉聽睡一二日勿輕驚醒驚醒則不可治或加人參一兩名甯志膏

每酒服三九日三服

癲疾驚癎　猪心血調硃砂末服之　卒中惡死同方

癎症　以象齒屑炒黃研末飲服

心熱氣癎　黑驢乳煖服三合日二次

驚癎恍惚或語言不倫歌哭不休　蔺子核生交趾合浦間七枚燒末入硃砂少許薑湯下方寸匕即數分自愈

驚癎恍惚語言錯亂　狐肉及五臟治淨入豉汁煮熟入五味作羹或作粥食羹中以羊骨汁鯽魚代豉汁亦妙名狐肉羹

風痰恍惚心煩腹痛或時悶絕復甦　青羖羊角犀角微炒爲末隨時溫酒服一錢自不復發

斷除風痰　邕州風貍腦酒浸服之即永不發

癲狂　靈苑辰砂散辰砂一兩飛淨乳香去油棗仁炒各五錢酒下忽飲沈醉聽睡一二日勿輕驚醒驚醒則不可治或加人參一兩名甯志膏

狂症不愈　以桃花令病人日日食之自瘥取能清痰逐瘀也

邪祟發狂或悲或泣　鼈紙燒灰酒水任下

氣病人身以氣爲主氣盛則强虛則衰順則平逆則病爲病有九寒則氣收而成寒症見則氣泄而成暑症見者火也喜極氣散而患暴脫勞極氣耗而患脾虛勞倦思甚氣結而患鬱氣悲甚氣消而患諸虛恐則氣下而患畏懼怯弱怒則氣逆上患嘔血下患殘泄驚則氣亂而患心動不安怔忡諸症凡此諸病壯者易愈弱者不能速痊也

氣痛走注　醯醋拌小麥麩皮炒熱袋盛熨之

氣逆煩滿　青羖羊角燒灰研末服方寸匕（即數分）即愈

血氣逆煩　羚羊角燒末服方寸匕（即數分）

三焦滯氣　陳米麵炒萊菔子炒等分爲末每服三

錢水煎入麝香少許服孕婦忌之

暴逆氣上　噙生薑兩三片屢驗

積垢作痛　皂角樹上木耳泡湯飲之微泄爲效未已再服

膈氣疼痛　壁上陳白螺螄燒灰研末每服一錢酒下甚效

抑結不散　龜下甲酒炙五兩側柏葉炒一兩五錢香附童便浸炒三兩爲末酒糊丸梧子大每空心温酒服一百丸

下一切氣（二便壅塞不通也）　用大鱧魚一頭（即七星魚）開肚入胡椒末五錢大蒜片三顆縫合同小豆一升煮熟下蘿蔔三五顆葱一握俱切碎煮熟空腹食之至飽并飲其汁至夜洩出惡氣無限也五日更一作

氣滯腹脹（手背脚膝疼痛）　大麥醋糟炒熱布裹熨之三兩換當愈

腹中脹滿　棉裹熨薑納下部冷即易之

大小便閉鼓脹氣促 八角茴香七個大麻仁五錢爲末生薑葱白三七根同研煎湯調五苓散服之

血上逆心煩悶刺痛 水牛角燒末酒服方寸匕即數分

呃逆不止 荔枝七個連皮核燒存性爲末白湯調下立止

病後呃逆不止 刀豆子燒存性白湯調服二錢即止取其下氣歸元而噫自止也

驚病心氣實者 鎮心丹即硃砂龍齒等分爲末猪心血爲丸芡實大每服三丸麥冬湯下

一切呃逆 柿蒂丁香等分爲末生薑湯服之即止

遺精濁帶 不夢而遺乃心腎虛弱也因夢而後遺乃二火煽動不固也又有精出不止陽強不倒名爲強中乃因過服房術補藥或貪淫過慾而成也若不急治虛極必死卽不死亦必患消渴大癆也濁帶之症赤多屬熱久則亦有寒者白多屬寒久則亦有熱者不可以赤定屬熱白定屬寒一概而論若屬濕熱必苦精竅窘痛倘屬虛寒則多見頭疼噦噦痰壅氣逆也

腎虛遺精 黃明膠二兩研末以酒二碗化服日三服

夢遺 黃狗鼻梁骨燒灰研末卧時酒服一錢

一方　蓮子心一撮爲末入辰砂一分每服一錢白湯下日二服

遺精　荷葉爲末酒服二錢

夢遺精滑　金櫻子茨實等分爲丸不拘時空心服

名水陸二仙膏

腎虛精滑　五倍子一兩炒茯苓二兩爲丸白湯或鹽湯下

遺精白濁下元虛冷者　白果蓮米俱去心糯米各五錢胡椒一錢爲末鳥雞一隻治淨裝各末入腹煮熟空心食之赤白帶下同方

陽虛陰痿精寒而滑　以山獺陰莖酒磨少許服之

陰痿　鯉魚胆雄雞肝各一枚爲末雀卵爲丸小豆大每吞一丸

赤白帶下　冬葵花子空心酒調末服之赤治赤白治白

一方　魚縫膠三尺燒黃研末同雞蛋煎餅好酒食之

一方　煉臘猪脂三合酒五合煎沸頓服

一方　常炙猪腎食之

一方　母猪毛燒灰三錢以黑豆一碗好酒一碗半煮至一碗調服即愈　崩中同方

一方　馬毛二兩花椒（開口）二兩和搓成團入灰火中過一宿取出碾末酒下一錢白毛治白帶青毛治赤帶

一方　用雞冠花擂爛每早沖酒醉去渣飲之赤用紅花白用白花

白濁白帶　分清丸芡實粉白芩粉黃蠟化蜜和丸梧子大每服百丸鹽湯下

一方　陳冬瓜仁炒爲末空心飲服五錢婦人白帶同方

白濁　生半夏一兩爲末雞子清爲丸桐子大每服二錢空心白滾水送下重者三料全愈

赤白帶下　白扁豆炒爲末每米飲服二錢

濁帶不止　黃狗頭骨燒灰爲細末每酒服一錢日三服

心虛赤濁　蓮子六一湯蓮肉去心六兩炙甘草一兩爲末每服一錢燈心湯下

遺精白濁　蓮米去心龍骨煅益智仁去皮膜微炒各等分爲末每服二錢空心米飲下

一方　蓮肉白芩等分爲末白湯調服

便數遺精（因思慮勞役過度損傷心氣者）　秋石白芩芡實蓮肉各二兩爲末蒸棗和丸梧子大每服三十丸空心鹽湯下名四精丸

强陰益精（能令有子）　枸杞酒蒸菟絲酒洗各八兩五味酒蒸覆盆酒洗去蒂各二兩車前二兩搗如泥蜜和爲丸梧子大每鹽湯下三錢慣遺洩者車前易蓮子甚妙

帶下（熱濕於內者）　地骨皮一觔生地五觔酒煮每日飲之

陰痿羸瘦　經驗方猪腎同枸杞葉豉汁入葱椒鹽開口作羹食之

痰飲　清稀爲飲稠濁爲痰其痰稠濁爲熱痰屬心清稀爲寒痰屬腎少而粘連難出爲燥痰屬肺多則易出爲濕痰屬脾搐搦眩暈爲風痰屬肝也　飲留於膈則膈上痰滿嘔吐痰涎爲伏飲飲留於肺則喘欬面腫難臥爲支飲留於肢體則身體重痛爲溢飲留於脇則欬嗽引脇疼痛爲懸飲留於腸胃則人忽瘦痰涎有聲爲痰飲凡飲留於胃肺則喘滿短氣而渴飲留於膈下則心下悸或背心寒也

痰涎爲害　栝樓爲末白湯下每服一錢

上焦痰熱　藕汁梨汁各半蓋和服

風痰　萊菔子生用以水研末服之取吐即愈

膈上伏飲　甘遂麪裹煨熟甘草等分煎服此取相反以成功之法也

飲留膈下　頭疼背寒嘔酸不食　吳仙丹茯苓吳茱萸湯泡七次等分蜜丸梧子大每白湯或薑湯下三錢諸方無及於此也

暑月因怒病呃　舉身跳動昏不知人乃痰因怒鬱於上膈也　參蘆五錢以逆流煎服取其大吐頑痰令睡多時即愈其人汗甚亦無驚形氣虛者勿服性燥味厚多怒之人易患此症

欬嗽喘吼　有聲無痰爲欬有痰無聲爲嗽有聲有痰爲咳嗽其症或爲風寒外感或爲痰熱傷肺致氣上逆而然或爲久嗽傷肺成勞皆不外乎風寒火鬱燥飲積熱虛寒種種爲患用藥者或虛或實屬氣屬血不可不審也　喘急者呼吸氣促哮吼者喘急而更喉中有聲也實邪作喘者氣粗胷滿不能布息若兼熱則更見痰稠便鞕也虛邪作喘者氣乏息微不能續息若兼寒則更見清稀痰涎也

寒熱欬嗽初起者　燒生薑一塊含嚥之

冷氣欬嗽　乾生薑熬酒調服五分或飴糖沖服

寒痰欬嗽　燒酒四兩猪脂白蜜香油茶末各四兩

同浸酒內煮成一處每日挑食以茶下之取效

咳嗽面腫夜不能寐　蛤粉五錢青黛五分研極細末白滾水和酸薑菜一羹匙調藥二錢並滴香油四五點服之

欬嗽　鯽魚骨燒灰研末飲服

上氣欬逆　猪肉切作鎚子猪脂蒸熟食之

一方　猪肪卽猪油之凝者臘月收淨肪　四兩煮白沸切片和醬醋食之

一方　獾骨燒存性研末每酒服三合日三服以愈爲度

卒得欬嗽　猪腎二枚乾薑三兩水七升煎二升稍取汁服

一方　驢脂煉熟和酒等分服之良

一方　烏雄雞一隻治淨酒浸半日飲之

肺虛欬嗽　猪肺一具以竹刀切片麻油炒熟同粥食之

肺虛嗽血　猪肺煮熟蘸苡仁末食之

肺燥欬嗽　松子仁一兩胡桃仁二兩研膏和熟蜜五錢收之每服二錢食後沸湯點服

欬嗽不止　生薑五兩飴糖半升水煎熟食服三四次即效

一方　黃明膠炙研末每服一錢人參末一錢薄荷湯二盞葱白少許煎沸嗽時温呷三五口

久嗽不瘥　猪腎二枚入椒（開口）四七粒煮啖之

一方　阿膠炒人參各二兩爲末每服二錢豉湯一盞入葱白少許煎服日三次

遠年欬嗽　白羊脬三具大棗百枚酒五升漬七日飲之

一方即二三十年者　生龜三枚治如食法去腸以水五升煮取三升浸麴釀秫米四升如常飲令盡永不發

一方　生龜一枚着炊中令人溺之浸至三日燒研以醇酒一升和末如乾飯頓服須臾大吐嗽至囊

出則愈小兒減半

久患欬嗽噫氣　生薑汁半合蜜一匙煎温日服三服即愈

老嗽　臘月臘日取人哥一隻治淨五味醃炙食之或作羹或作散蜜丸服之

老人久嗽　夜卧後用連皮核桃仁三箇生薑三片細嚼嚥畢飲熱水一二口頃刻再如法嚼嚥飲水即愈

化痰止嗽　絲瓜燒存性爲末棗肉和丸彈子大每服一丸温酒化下

痰喘欬嗽　多年陳白蜆壳燒存性爲極細末以米飲調服一錢日三飲

卒嗽不止　白蜆壳燒搗爲細末以熟米飲調服一錢日三服聖惠方

一方　白蜆壳同屋上白螺壳燒存性搗爲丸酒服方寸七丸即數分

肺熱嗽　欵冬花燒烟以竹筒吸鼻中每次少許以
愈爲度
肺熱咳嗽痰血　百合欵冬花揀淨以甘草水浸等
分爲末蜜丸梧子大每服三錢白湯下名百花膏
欬逆上氣　杏仁連皮炒研蜜和爲膏含嚥自愈
肺熱久嗽身如火炙嘔逆口渴瘦將成勞者　枇杷葉蜜炙欵冬花
甘草水浸紫苑去頭鬚蜜浸焙乾杏仁去皮尖桑
白皮蜜炙木通各等分大黃酒蒸減半爲末蜜丸

櫻桃大每食後夜卧各含化一丸效驗如神
氣嗽痰喘欬吐膿血　萊菔子炒研末煎湯服之
老人痰嗽喘滿懶食　白芥子去脇下皮裏膜外之痰　紫蘇子開痰降氣
白芥主痰紫蘇主氣萊菔主食各微炒研末看病所主爲君點湯
服之
痰嗽面腫不能寐　蚌壳煆粉少加青黛以淡虀水
如麻油數點調服其驗如神
肺虛欬嗽　蜜和薑汁服之良　治痢同方

哮喘不止風熱在上膈者　瓜蒂七枚爲末調飲服取吐膠痰卽愈

肺風喘促　透明阿膠切炒以紫蘇烏梅肉焙研等分水煎服

痰喘　人參和連皮胡桃煎湯服之卽愈神效

諸喘不止　椒目（閇口）炒碾二錢白湯調服用至二三服效後當隨痰火用藥

痰喘咳嗽不能睡卧（兼停飲也）　好茶末一兩白殭蠶一兩薑汁炒去絲放碗內蓋定傾沸湯一小盞卧時上氣喘促時有效嗽　茶子百合等分爲末蜜丸梧子大每服七九新汲水下

再添湯點服

喘嗽哮吼　糯米泔水少許磨茶子滴鼻中令吸入口服之口咬竹筒少頃涎出如線不過二三次痊愈屢驗小兒同方

年久哮吼　黃雞雛蛋略敲損浸尿缸中三四日煮

食之卽愈

鹽吼痰喘　烏臼皮去粗皮搗汁和麪作餅烙熟食之

寒痰氣喘　青陳皮一片展開入巴豆一個麻紮定火上燒存性研末薑汁和酒一鍾呷服

久近痰嗽自胷膈下塞停飲至於藏府　二母散知母鹽水炒貝母去心爲末巴豆三十粒去油合勻每服一字用薑三片一面蘸藥細嚼嚥下便睡次早必瀉一回其嗽立止弱者去巴豆

鬼疰欬嗽　以桃仁煮粥食之自愈

黃昏咳嗽火嗽也　五倍子炒北五味等分煎湯飲之

心下伏熱及煩滿欬逆　雞子白生吞之

咳嗽失音火鬱也　雪梨搗汁頻服自愈

腫脹 此症皆因內傷七情外感六氣或飲食先節與勞役過度則邪正相攻榮衛失和之所致也其脹有脉脹日久則成單腹脹有虛脹日久則成氣鼓脹單鼓二脹有屬氣屬血之分又有腸覃石瘕二症皆係女病男子則爲痞症也詳在痞症並婦科又有水脹之症內有石水風水之分上腫爲風水下腫爲石水石水屬陰邪乃寒水所結風水屬陽邪乃熱濕所凝也

浮腫脹滿 氣鼓也 **豬肝一具洗切着葱豉薑椒炙食之或單煮羹食亦可**

浮腫脹滿不食 **豬脊肉一觔煮熟切片以生蒜薤**

拌食之

水腫脹滿小便澁者　水牛肉一觔蒸極熟以薑醋空心食之或以水牛尾條切煮熟拌醋食或生肉拌醋食之

一方　肥犬肉五觔熟蒸空腹食之

氣腫濕腫濕即水也　海蛤海帶海藻海螵蛸海昆布皂莢茨荔枝殼各治淨等分爲末以流水沖服日二服每一二錢

一方　多煮野鴨食之即愈

氣水鼓脹　白狗或黑狗肉切和米煮粥空心食之

水腫脹滿　椒目開口少許搗如膏每酒服方寸匕即數分

一方　青頭雄鴨煮汁飲之厚蓋取汗上腫者宜汗或和米並五味熟煮作粥食亦良

一方　白鴨一隻治淨以豉半升同椒薑開口入鴨腹中縫定蒸熟食之

一方　赤尾鯉魚一勉破開不見水及鹽以生礬五錢研末入腹內火紙包裹外用黃泥包好放竈內煨熟取出去紙送粥食頭者上消食身尾者下消須一口食盡屢試經驗

一方　海蛤杏仁漢防已棗肉各二兩葶藶六兩爲末陳米餬和爲丸梧子大每服十丸至利水爲妙

一方　田螺一佪車前草葉一片獨頭蒜一佪合搗作餅貼臍上俟一時其水隨二便出之則愈

一方　木油樹根皮晒乾爲末和枯白礬等分每服一錢空心白滾水調服

一方　黃瓜一佪破開連子以醋煮一半至爛空心全食之須臾下水也以上四方皆石水症藥

石水腫症少腹及腿足皆腫而脹　赤小豆煮汁用鯉魚作羹食子濕水從小便而出卽愈

一方　大鯉魚一尾醋三升煮乾食一日一作

一方　大鯉魚一尾赤小豆一升水二斗煮食汁一

頓服盡當見下利爲愈　妊娠水腫同方

風水腫症（面及手足皆腫也）　以驢脂和鹽塗之

一方　蔓椒（一名猪椒氣臭如狗矢生雲中山谷）枝葉煎如汁熬如飴狀每空心服一匙日三服　賊風攣急同方

一方（身面皆腫）　黃母雞雛子黃白相和塗腫處乾再上　解毒同方

風石二水腫症　生猪肝一具細切醋洗入蒜醋食之勿用鹽

水腫喘急（屬陰）分　郁李仁二兩以水濾汁煮苡仁飯每日食二次自愈

水腫發熱（屬陽）分　海蛤木通猪苓澤瀉滑石黃葵子桑白皮各一錢燈心三分水煎服日二服

水脹日久不瘥垂死者　獾子肉或獾大腸作羹食之甚良

風水虛脹　取水獺一頭去皮連五臟及頭骨炙爲末水服方寸七日二服十日瘥若冷氣虛脹者不（即數分）

宜爲其性寒耳

十種水氣垂死者　鱧魚一觔即七星魚俗云火柴頭魚是也治淨煮汁和冬瓜葱白作羹食之

水腫不愈　黑驢脂絞汁每食五合良

卒患水腫　鯽魚三尾去腸留鱗以商陸以花白者之根方可用黑豆湯浸蒸赤小豆等分塡滿扎定用水三升煮糜去魚食豆飲汁二日一作不過三次小便利病自愈

黃腫腹脹　亞腰甜壺蘆連子燒存性每服一佃食前溫酒下不飲酒者白湯下十餘日見效

大腹鼓脹體寒者　鸕鷀肉燒存性爲末米飲服之立愈取其利水也

身腫攻心　生猪油以漿水洗壓乾切膾蒜薤啖一日二次

水腫危急屬熱　冬瓜不拘多少任意喫之神效無雙

水腫屬熱屬濕者　甘遂末傅腫處仍煎甘草湯服之其

腫立消若因熱與毒者亦效蓋藉其相反以立功也

水腫便澁　赤花商陸三分搗貼臍上小便利腫自消卽去之

水腫屬暑熱者　香薷熬膏服之取利小便

水腫　冬葵子榆皮去粗皮等分煎服取利

水病足腫　葱子煮湯漬之日三五度卽愈

脾濕腫滿　伐木丸蒼朮二觔米泔浸黃酒麴麵四兩炒絳礬一觔卽皂礬炒赤者醋拌晒乾入瓶火煆爲末醋糊丸酒下不必忌鹽後亦不發但病愈後卽不宜服多能致瀉也張三丰傳方

腫滿便閉腹堅如石腿裂出水飲食下咽上嘔下閉皆因奉養太過所致　黃柏知母各一兩酒洗焙研桂一錢爲引水叠成丸梧子大每服二百丸以小便如刀刺火燒溺出如流爲效名滋腎丸

瘧疾四時瘧疾皆因風寒外束暑邪內伏之故也一日一作其邪淺間一日一作或間二三日一作及間數日一作其邪深晝作邪淺夜作邪深病欲已則夜轉爲晝病若進則晝轉爲夜又有晏作早作者乃邪與衛氣會合有早晏也瘧有風寒溫瘴瘧食久虛勞痰及瘧母三陰瘧鬼瘧之名瘧疾忌雞魚豆腐麵食羹湯熱粥熱物

却瘧痢百病　立秋日五更取井華水長幼各飲一杯可免一切病症

寒熱瘧疾　秋後霜一錢熱酒服之卽愈

一方　生薑四兩搗自然汁一杯露一宿於發日五

更面北立飲卽止未止再服

一方　苦參細末醋糊爲丸梧子大不論三日或一日一發待三次後臨發五更時以向東桃柳枝各截長一寸冲滾水一碗先薰兩太陽少刻用此湯泡九藥三錢服之卽止

虛寒瘧疾　黃狗肉煮臛入五味食之

脾寒瘧疾　乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一盞煎至七分服之

癉瘧發熱連胷背者　大茴香子搗汁服之

勞瘧癉瘧　野狐肝一具陰乾重五日五更初向北斗下受氣爲末粳米爲丸菉豆大每用一丸緋帛裹繫手之中指男繫左手指女繫右手指

三日一瘧　白朮一觔龜板一觔首烏四兩水煮成珠下蜜熬膏晚間挑二三匙調下極效

一方久不愈者　必思苔產回部田地中三枚酒一盞煎半飲之卽愈

諸瘧不止　夜明砂淨末每以冷茶服一錢立效

久瘧不愈　雞子黃和常山末爲丸竹葉湯服

一方　白朮土炒爲末每服二錢酒調服十劑除根

脾寒瘧方

多年瘧疾　以驢脂和烏梅爲丸於未發時服二十丸神效

寒熱鬼瘧發作無時　臘月採房上乾白貓屎以泥封固燒存性收之臨時以水和服

一方　雄狐胆一個硃砂飛淨砒霜各五錢阿魏麝香黃丹菜豆粉各一分爲末五月五日午時以黍角尖和丸梧子大空心及發前時冷醋湯服二十丸忌熱物

斷瘧擦法　魚腥草一握搗爛絹包周身摩擦俟得睡有汗卽愈臨發之一時作之

截瘧膏　斑蝥一個研末放膏藥上發日貼印堂中卽止

痰瘧不眠乃陽盛陰虛之故也　半夏湯服之卽愈其法以半夏生末一升取遠流水八升將夏揚至萬餘遍澄清五升煮之一法用葦薪火以桃米一升半夏淨粉五合炊至一升去渣飲汁一日三次以安爲度

瘧痢　鼈肉煮作羹加生薑沙糖食之不用鹽醬名鼈糖湯

寒熱瘴瘧　草豆蔻麪裹煨熟淨仁知母鹽水炒等分煎服取其一陰一陽之義也

瘧痢不止　龜殼燒存性研末酒服方寸匕卽數分

辟瘧法　五月五日午時取黑羊糞每粒分爲二丸

霍亂是症乃因風寒暑邪食水雜採爲患亂於腸胃清濁相干發時則揮霍變亂生於倉卒心腹大痛上吐下瀉也若心腹大痛吐瀉不出則爲乾霍亂又名絞腸痧如更舌卷囊縮卵陰入腹則難治也因暑則多吐濕則多瀉暑熱甚者宜安神清熱寒極肢厥脉伏者宜温之是症最忌熱飲藥湯

霍亂吐瀉　飲新汲水一碗仍以水一盆浸兩足立止忌食熱物奇妙便方

一方　酸漿水煎乾薑屑呷之

一方　白扁豆香薷各一升水六升煎一升分服中

暑者宜之

一方　白兎骨煮汁服之

一方　生藕搗汁服之

一方　胡椒三十粒以飲吞之

一方　胡椒四十九粒菉豆一百四十九粒研勻木瓜湯服一錢神效

一方　鹽醋同煎服甚良

一方　菉豆四十九粒胡椒七粒水煎服若渴卽用新汲水沖服極效

乾霍亂　透明生白礬研三錢熱滾水新涼水各半盞調勻俟温服之立止此藥或水陸二路及深夜荒郊遇此患者用之可作仙丹

一方　食鹽一兩用熱水調灌入口鹽氣到痛卽止如痛甚以手拍病人膝灣有紫黑點用針刺去黑血卽愈

一方　飛鹽四五錢調童便三飲而三吐之卽愈

一方 馬屎研汁飲之立愈

一方 檳榔末五錢童便半盞水一盞煎服

一方 蕎麪炒焦爲末温熱沖服

一方 痛脹欲死 地漿水五盞飲之卽愈切忌米飲

一方 甚至不能納食服藥病在垂急者 先飲生熟湯數口卽定自可納食服藥也

一方 煩脹欲死 好醋三升飲之

一方 乾嘔不止 蓮子煎汁服之

一方 生薑五兩牛兒屎一升水四升煎二升分二服卽止

霍亂轉筋中暑 白扁豆爲末好米醋和服用豆葉亦可

一方 因中寒手足拘急痛不可忍甚至陰囊入腹者 雞屎白一味爲末取方寸匕以水六合和勻温服

一方 用故綿浸米醋中飯蒸熟裹之冷卽易裹勿停自止

一方入腹欲死　生薑三兩搗酒一升煮三兩沸仍以薑搗貼痛處

一方　嚼大蒜令爛涼水送下

霍亂煩渴　藕汁一鍾薑汁半鍾和勻飲之

霍亂煩悶　茶末一錢煎水調乾薑末一錢服之即安

霍亂症後惡心嘔噦　葡萄根及藤葉煮汁飲之

時氣煩渴　生藕汁一盞生蜜一合和勻細服

熱渴煩悶　地漿水一盞飲之即愈

卒然煩熱　鴨肉和葱豉煮汁飲之立止

中暑吐瀉　滑石飛淨三錢爲末井水調服

霍亂吐瀉　蘆稷米煎湯温服神效

素慣轉筋　青羊毛醋煮裹脚數次即不發

一方　黙呼木瓜名或寫木瓜二字皆愈或煮木瓜汁飲之

熱悶煩渴不可解者　新汲水浸青衣瓦熨之妙

汗出蜜和飲之

暑消後預防霍亂及熱病　暑後以香薷代茶冷飲數次甚妙

噎膈翻胃胃之上口爲賁門賁門熱結乾枯故不能納物爲噎膈小腸之上口爲幽門幽門熱結乾枯故不放食入反出爲翻胃也二症日久則大腸傳導路狹故魄門自應燥澁難行也若更見胷痛如刺胃腕傷也便如羊糞津液枯也吐沫嘔血血液不行皆逆候也總之是症多難療治耳

五噎膈氣煩悶吐逆不納飲食　蘆筍根日日煎濃湯飲之甚效金匱方

一方　黃犬乾餓數日用生粟或米乾飼之俟其下糞淘洗米粟令淨煮粥入薤白一握泡熟去薤入

沉香末三錢食之

一方 狼喉醫日乾爲末每用五分入飯內食之甚妙

一方 畢澄茄白豆蔻等分爲末乾舐之

一方 白鵝毛燒灰酒服

一方 水老鴉頭燒灰研酒服

一方 水老鴉啄銜口中便安

一方 鵂鶹未生毛者一對用黃泥封固臍煅存性爲末每用一匙温酒服

噎膈不通 羚羊角屑爲極細末飲服方寸匕（即數分）並以屑摩喉管

一方 野貓頭骨炒爲末酒服

翻胃吐食 以柿餅每日同飯吃勿飲茶湯自愈奇妙方也

一方 猬肉去淨骨炙黃食亦可煮汁飲之

一方 家貓胎衣燒灰入硃砂末少許壓舌下甚妙

一方　生虎肚一個勿洗存滓穢新瓦固煅存性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神妙食膈者方可用之

一方　以反毛雞一隻煮爛去骨入人參當歸食鹽各五錢再同煮爛食之至盡此乃迷類之義也

一方　抱出雞子殼爲末酒服二錢即愈

一方　石蓮肉爲末入肉豆蔻煨去油少許米湯調服

一方　青羖羊胲子即腹中積塊草也煅存性每一勫入棗肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下

一方及藥物難下者　白水牛喉一條去兩頭節并筋膜及如阿膠黑片收俟乾時用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡爲度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效

一方　胡椒醋浸日乾如此七日爲末酒糊丸梧子

大每服三四十丸醋湯下

一方 胡椒七錢五分煨薑一兩水煎分二服

一方 胡椒半夏湯泡等分爲末薑汁糊丸梧子大每薑湯下三十丸

一方 及吐出黑汁諸藥不愈者 畢澄茄爲末米糊丸梧子大每薑湯下三四十丸日一服愈後服平胃散數十帖自無後虞

一方 屬熱者 眞蛤粉每服二錢搗生薑汁一盞再入米醋同調送下

一方 黃蜆即螺螄黃者 并田螺壳俱須在泥中者等分炒成白灰每二兩白梅肉四枚搗和丸再入砂盒子內蓋定泥固煅存性研細末每服二錢人參砂仁湯下或陳倉米湯亦可

一方 田螺洗淨水養待吐出泥澄取晒乾爲丸梧子大每服三十丸霍香湯下爛亮研服亦可或以田螺燒研水服俱效

一方　烏雄雞一隻治淨入胡荽子半斛於腹內烹食食二隻即愈

一方　鯉魚一頭童便浸一夜　爲末同米粥食之

一方　大鯽魚去腸留鱗入綠礬末令滿泥固煅存性研末每米飲服一錢日二服

一方食下即吐　陳粟米爲粉水丸桐子大每九丸煮爛吞之日服三五次即效或煮入醋中細吞之

一方　大鯽魚一枚去腸留鱗切大蒜片填滿紙包十重泥封晒半乾炭火煅熟取肉和平胃散末一兩杵丸梧子大蜜封每三十丸米飲下

一方或食下即吐或朝食暮吐暮食朝吐　羅晃子出廣西者其皮七層肰如橄欖出橫州者其皮九層故又名九層皮菓即數分七服完爲度即愈

翻胃吐痰　柳樹上蕈五七個煎服之即驗

虛冷翻胃　白毛羊肉去脂煮熟作片以蒜薤空腹

食之立驗

一方反胃　虎脂半勺清油一勺瓦瓶浸一月蜜封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞温服以瘥爲度油盡再添

噎膈反胃大便燥結　生羊乳時時嚥之並服四物湯神效人乳勿用

一方　糯米和牛涎拌小丸煮熟食之

一方　虎肚傍小肚名惡貫　陰陽瓦焙乾研末一錢五分檀樹上黃形如香蕈取下剉末一錢以黃酒頓服

一方　老薑一勺切片棉布包入厠内浸七日取出洗浸晒乾爲末每服五分酒調服

一方　核桃肉水浸去皮搗爛如泥合陳大麥麪煮成稠糊每日食之俟十餘日其症漸好方可少進粥　調理全愈

一方清潤乾燥之方　五汁飲蘆錐勃薺甘蔗竹瀝薑汁等

分飲之

一方 清利熱結之方　大黃湯大黃切片以薑汁炙至黑黃色量人强弱每服二三錢加陳倉米一撮葱二莖煎去滓服

一方 形氣虛寒者　以四君六君或理中湯內加丁沉水煎温服

一方 便秘壅遏者　只壳厚朴大黃人參甘草藿香木香當歸檳榔桃仁大麻仁等分蜜丸服之自瘥名利腸丸

一方 吐逆不止　汞硫丸汞一分硫二分研如墨以老酒薑汁服之次日取下穢物服飲藥湯則不吐也

噎膈　黃花地丁草根搗汁酒和服之

一方　昆布微洗去鹹味含之嚥汁

翻胃　竹瀝和米煮粥食之

一方　甘蔗汁薑汁和服梅師方嘔噦同方

一方　牛乳韭汁薑汁和勻細細温服

一方　取驢尿服二合吐稍減再服二合自漸不吐緩緩以粥食之即漸愈

卒噎　祀竈飯取一粒食之即下

嘔吐噦嘔者有物有聲吐者有物無聲噦者無物有聲即乾嘔也是症若見面色青手甲黑中痛不止肢冷不回則爲凶症初吐切不可下下則轉逆有氣盛氣虛熱盛寒盛燥盛之分墜吐化滯之法遇是症者宜詳之

嘔逆不止　眞火酒一杯新汲井水一杯和服甚妙

霍亂亦治

一方　生薑一兩醋漿二合銀器煎收四合連滓呷之並能殺腹內長蟲

一方　竈心土一塊如核桃大煎水去渣澄清服之

嘔噦不止　以水獺骨煮汁服之即止

心痞嘔噦心下痞滿也　生薑半斤水三升煮一升半夏五合水五升取汁同煮一升半分二服

乾嘔厥逆　頻嚼生薑嘔家聖藥也

卒然乾噦　雞子黃生吞數枚良

天行嘔逆　黃雞雞子一枚水煮三五沸冷水浸少頃吞之

噦逆不止　石蓮肉六枚炒赤黃色研末冷熱水各半盞和服便止乾霍亂同方

病後嘔逆　青羖羊肝作羹淡食之不過三度即不嘔矣



不藥良方

續集卷三

C116/2585
V.5

不藥良方續集卷三

瀉症

水多腸鳴腹不爲水瀉濕瀉濡瀉亦爲水瀉瀉如鴨溏澄澈清冷腹痛腸鳴如雷爲寒瀉瀉時直下爲洞瀉亦爲寒瀉完穀不化爲飧瀉食後即瀉腹滿爲脾瀉每於早辰行瀉數次爲腎瀉噫氣腹痛瀉下之物穢而且黏爲食瀉爲胃瀉渴而飲飲而瀉瀉而復渴渴而復飲飲而復瀉爲飲瀉時或瀉時或不瀉爲痰瀉瀉一陣痛一陣喜飲冷爲火瀉日久不禁爲滑瀉口糜則瀉止瀉止則口糜爲糜瀉

水瀉不止　車前子炒爲末每服六錢米湯調下

一方　車前炒澤瀉等分煎湯頻飲之

久患水瀉　米醋煮黃母雞雞子食之卽止

一方　青羖羊角一枚白礬末塡滿燒存性爲末每新汲水服二錢神效

水瀉　花椒（開口）一分去目碾末調少許塗臍上日三度

濕瀉（亦屬水瀉）　川椒（開口）炒取紅肉豆蔻煨各一兩爲末米飯丸梧子大每量人米飲服五六十丸或百丸

寒濕洞瀉　頭燒酒飲之

一方　乾薑炮研粥飲服三錢立效

脾虛滑瀉　烏骨母雞一隻治淨用肉豆蔻麪裹煨一兩草果仁麪裹煨二枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之

一方　石蓮肉炒爲末每服二錢陳倉米調下甚妙

噤口久痢入香蓮丸內服之

腎瀉（日久不止）　猪腎一個批開摻骨碎補去毛蜜炙末煨熟食之

殘瀉　川椒（閙口）一兩炒蒼朮二兩土炒碾末醋糊丸梧

子大每米飲下五十丸久痢屬寒濕者同方

冷瀉及霍亂　胡椒碾末飯丸梧子大每米飲下四十丸

飲酒成瀉骨立不能食但飲即瀉　嫩鹿茸一具酥炙肉蓯蓉去鱗煨一兩麝香五分爲末陳白米飯丸梧子大每米飲下五十丸名香茸丸

滑瀉　新鮮核桃硬皮中黃肉不拘多少水煎湯服即止

老人泄瀉　乾糕一兩即糯米合粳米磨粉而成者　薑湯泡化代飯食之以愈爲度

胃風泄瀉風客於胃也　藁本熬湯飲之取其能除風去濕耳

溏瀉數載不愈犯生冷油膩肉食即痛服升澁藥反瀉甚脉沉滑法仍當下以臘匱巴豆丸服之每服二十丸薑湯下二三日即愈亦治痢疾

瀉痢至於脫肛　石榴皮陳壁土加明礬少許濃煎

薰洗再用五倍子炒研細末敷托而上

四時暴患瀉痢 四肢臍腹俱冷 煎百沸湯令患者[illegible]

一方 多用熱紫灰敷臍根用布包好冷則隨換立止如神比炒塩熨之法尤為妙也 鮑雲韶傳方

痢症 裏急後重數至厠而難便莖中疼痛為大瘕瀉溲澁便 血少腹痛為小腸瀉食後窘迫大便色白腸中切痛為大腸瀉初患殮瀉久則腹痛下血為腸癖瀉積滯垢膩與濕熱滯於腸中因而作瀉為滯下下痢不食或嘔不食為噤口痢糟粕膿血雜下為水穀痢所下清血症似腸風但有墜痛為風痢下如黑豆汁之渾濁為濕痢形如魚腦稠黏而穢為熱痢稀澼色白清而且腥為寒痢時發時止為休息痢五色膿血雜下為五色痢以上諸痢初起俱忌止澁藥

痢疾初起 裏熱盛上衝心作嘔噤口者宜先攻之 大黃黃連等分好煎服攻之神效

薰洗再用五倍子炒研細末敷托而上

四時暴患瀉痢四肢臕腹俱冷　煎百沸湯令患者坐深湯中浸至膝上爲度生陽之藥無速於此

痢症裏急後重數至厠而難便莖中疼痛爲大瘕瀉溲澁便　血少腹痛爲小腸瀉食後窘迫大便色白腸中切痛爲大腸瀉初患殽瀉久則腹痛下血爲腸癖瀉積滯垢膩與濕熱滯於腸中因而作瀉爲滯下下痢不食或嘔不食爲噤口痢糟粕膿血雜下爲水穀痢所下清血症似腸風但有墜痛爲風痢下如黑豆汁之渾濁爲濕痢形如魚腦稠黏而穢爲熱痢稀溏色白清而且腥爲寒痢時發時止爲休息痢五色膿血雜下爲五色痢以上諸痢初起俱忌止澁藥

痢疾初起裏熱盛上衝心作嘔噤口者宜先攻之　大黃黃連等分好煎服攻之神效

痢疾噤口實而堪下者亦用前方下之不堪下者內加人參石蓮子煎湯緩緩服下卽好外以王瓜藤莖葉經霜者燒灰香油調納臍中極妙名貼臍王瓜藤散

噤口痢大田螺二枚搗爛入麝香三分作餅貼臍中半日時以涼水潤膚熱氣下行卽思食矣甚效

一方雞內金焙研乳汁服之

一方臘猪肉脯煨熟食之

一方紅糖半觔烏梅一個水二碗煎一碗時時飲之自效

一方砂糖白蜜蘿蔔汁各一盞飯上炖化灌下一二次立效

赤痢薤白同黃柏煮服卽止

一方馬齒莧搗汁一合入蜜二匙空心溫服大人小兒並方

一方葵花葉炙過者食之

一方黃牛角胎燒灰飲服水牛者治冷痢瀉血水

瀉及水腫

血痢不止　乾薑燒黑存性放冷水爲末每服一錢米飲下

一方　牛乳餅一兩漿水一鍾煎服

血痢便血　牛血煮拌醋食之

一方　龜肉沙糖水拌椒和炙熟食之多度即愈

一方　木耳炒研五錢酒調服即止亦有用井花水服或以水煮鹽醋食之以汁送下

下痢解血　犀角地丁生地各一兩爲末煉蜜丸彈子大每服一丸水一升煎五合去滓温服

血痢作痛　檳榔一枚以麥冬煎湯細磨濃汁一盞空心服日二次

血痢脇熱　猪大臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗丸梧子大每服三十丸温酒下

血痢内熱　海蛤末蜜水調服二錢日二服

血痢及疝氣並卒然迷悶　羚羊角研極細末蜜調服

氣痢氣逆也　水牛乳半觔煎葦茎三錢減半空服飲之立愈

赤白痢　薺菜根燒灰蜜湯調服

一方　生薑切細和好茶一兩碗任意呷之便瘥熱痢留薑皮冷痢去薑皮蓋薑能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調和陰陽且解濕熱及酒食暑氣諸毒不問赤白通用

一方　以李根白皮煎汁飲之

一方　竹蓐即慈竹林內夏日逢雨滴汁着地而生似鹿角白色者　和薑醬食之

一方　牛乳餅切如豆大麪拌酸漿水煮二十沸頓服小兒服之彌良

一方　五日午時取完好勃臍洗淨拭乾勿令損破放瓶內入好燒酒浸之黃泥密封收貯遇有患者取二枚令細嚼之空心用原酒送下

一方　胡椒菜豆各一歲一粒爲末糊丸梧子大紅

用生薑白用米湯下

一方 黃連三錢三分（吳萸炒黑去萸） 枳殼二錢七分（麩炒去麩） 廣香五分各爲末紅用連白用殼紅白兼用重者加木香一錢冲服

一方 大黃三觔銅刀切片入砂鍋內用好白蜜黃酒煮三日令極爛木香五兩厚朴二觔（生薑半觔取汁銅鍋炒乾）俱爲末合大黃泥搗爲丸梧子大每服一錢白痢薑湯下紅痢燈心湯下噤口痢米飲下不拘新久皆宜 內府方

一方（不論新久） 柿餅一個開一口入白蠟三分將紙包裝好以水濕透放灰火中煨熟食之大人兩個小兒一個卽愈

赤白久痢 米醋煮黃母雞雞子食之

一方 白馬屎燒灰水服

一方 荔枝殼椽斗殼炒石榴皮炒甘草炙各等分每用五錢水一盞半煎七分溫服日二服

寒痢痢見青色微痛　乾薑切大豆大每米飲服六七枚日三夜一累用得功

虛痢危困因血氣衰弱者　鹿茸酥炙一兩爲末入麝香五分以燈心煎棗肉爲丸梧子大每空心米飲下三五十丸

久痢不止食蟹所致者以此　新采藕節搗爛熱酒調下數服卽愈藕能解蟹毒故也

久冷下痢　蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒一升拌作粥食不過三升卽瘥

久痢寒熱不分總宜調和爲主　烏梅胡黃連竈下土各等分爲末茶調服之

久痢不止　五倍子枯白礬等分醋糊丸梧子大每空心米飲下四十丸甚驗

一方或至百餘日者　鹽梅肉研爛合蠟茶入醋服之卽愈錢五分炒爲末

蜡茶即上半茶末

紀注

寒痢痢見青色微痛　乾薑切大豆大每米飲服六七枚日三夜一累用得功

虛痢危困因血氣衰弱者　鹿茸酥炙一兩爲末入麝香五分以燈心煎棗肉爲丸梧子大每空心米飲下三五十九

久痢不止食蟹所致者以此　新采藕節搗爛熱酒調下數服卽愈藕能解蟹毒故也

久冷下痢　蜀椒三升醋漬一宿麴三升同椒一升拌作粥食不過三升卽瘥

久痢寒熱不分總宜調和爲主　烏梅胡黃連竈下土各等分爲末茶調服之

久痢不止　五倍子枯白礬等分醋糊丸梧子大每空心米飲下四十丸甚驗

一方或至百餘日者　鹽梅肉研爛合蠟茶入醋服之卽愈

新久瀉痢　乾木耳一兩鹿角膠二錢五分炒爲末每服三錢溫酒調下

積熱下痢　冬瓜葉嫩心搥爛煎餅食之亦治火瀉

一方　好茶一勺炙搗末濃煎一二盞服之久痢亦宜

一方　臘茶二錢湯點七分入麻油一蜆殼和服須臾腹痛大下即止

一方　臘茶赤者以密水煎服白者以連皮自然薑汁同水煎服二三服即愈

一方　臘茶末以白梅肉和丸赤者甘草湯下白者烏梅湯下

一方　建茶合醋煎熱服即止

胃寒下痢　羊肉一片萇菪子末一兩和以綿裹納下部二度即瘥

大腸冷痢即大腸瀉也　犂牛角胎燒灰飲服二錢日二次赤白二痢亦治

虛痢即虛滑痢也　黃母雞一隻炙以鹽醋塗抹煮熟食之

久痢噤口　金絲鯉魚一尾重者爲佳如常治法用鹽醬葱必入胡椒三四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽病即除根屢治有效

休息痢　猪肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏仁入童便二升文火煮乾取食日一次

一方　白狗骨燒灰米飲日一次

一方　即經年不愈者　虎骨炙焦搗末飲服方寸七日三服　即數分

取效

痢疾　消磨積滯　沙糖調炒焦蕎麪二錢服之即愈　脾瀉同方

一切下痢　鯽魚頭燒灰研末酒服

一方　醋煮水牛肝食之　瘧痢同方有補肝明目之功

一方　白死鱔魚一條焙爲末好酒調服三錢即愈

一方　粳米一茶杯冷水一茶杯同入乳鉢內輕輕

漫擂成米漿用罐熬熟再將米放冷水一大茶杯再擂成米漿即冲入熱漿內和勻服之神妙

治痢煖臍膏　麝香一分雄黃一分以蝸牛一個搗和二末攤貼臍上

一切脫肛　狗涎沫之自上

樗皮即椿樹皮

純注

日夜二付斃者　樗

[illegible]一兩為末空心溫酒或米飲下二錢至效此作痢疾而治也

噤口痢　參苓白朮散加菖蒲末八分米飲下胸次開豁自思飲食

血痢　是齋方平胃散一兩川續斷二錢五分每服二錢米飲下時痢及腸風下血俱同方

赤白痢　葱白煮粥食之薤亦可並治吐衄便血痢血

噤口痢　百一方山藥半生半炒米飲下

一方　新鮮萊菔生用搗汁飲之

漫擂成米漿用鑵熬熟再將米放冷水一大茶杯再擂成米漿即冲入熟漿內和勻服之神妙

治痢煖臍膏　麝香一分雄黃一分以蝸牛一個搗和二末攤貼臍上

一切脫肛　狗涎沫之自上

下痢膿血雜下因貪飲無度多食魚蟹日夜二三十度痛甚諸藥不效年餘待斃者　櫌皮入參各一兩爲末空心温酒或米飲下二錢至效此作痢疾而治也

噤口痢　參苓白朮散加菖蒲末八分米飲下胸次開豁自思飲食

血痢　是齊方平胃散一兩川續斷二錢五分每服二錢米飲下時痢及腸風下血俱同方

赤白痢　慈白煮粥食之薤亦可並治吐衄便血痢血

噤口痢　百一方山藥半生半炒米飲下

一方　新鮮萊菔生用搗汁飲之

血痢　蜜和蔓菁子汁服之

熱痢　六一散加紅麴治赤痢加乾薑治白痢紅白並用

久患噤口粉米不進　常服牛乳久之自瘥

熱毒血痢　金銀花濃汁服之

黃疸此症面目身黃但欲安臥小便黃渾其病已成也有胃疸即穀疸酒疸女勞疸瘀血發黃黃汗皆因濕熱而成又有陰黃一症則因寒濕而致

穀疸已食如飽食難用飽飽則心煩頭眩身面皆黃　黃牛膽一枚苦參三兩龍膽草一兩爲末和蜜丸梧子大每薑湯下五十九

一方　絲瓜連子燒存性爲末每二錢因麪者麪湯下因酒者温酒下連進數服即愈

酒疸　鹿葱根搗汁服之

一方　蝸蠃又名鬼眼睛即小螺螄　清明前取之過則有蟲養去泥土日日煮汁飲之奇效

女勞疸屬實者　石膏散飛滑石煆石膏等分每服二錢大麥湯調服屬虛者　以升麻散火湯減去芍藥治之方見諸書中

濕熱發黃或因大飢過食或因素有濕熱汗出浴身而成者　生薑時時周身擦之其黃自退或加茵陳蒿尤妙

一方　取蟹燒存性研末酒糊丸梧子大每服五十丸白湯下日二服

黃汗汗出黃色染衣面目微腫得於素有濕熱汗出浴身而致　蔓菁子爲細末每服二錢日三服井華水調服小便白則愈

一方　萊菔子爲末調服千金方

黃疸如金通身皆黃金色　薏苡仁根煎湯頻頻飲之

一方　陳糯米煮汁服之

一方更苦小便熱赤　萊菔子碾末白湯調服

黃疸吐血因病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效者　蝸蠃十個水漂去

泥搗爛露一夜五更取清服二三次血止卽愈屢用經驗

黃疸無汗　芫荽搗汁一酒杯冲滾水服被蓋取汗卽愈

一方諸疸無汗者並宜　麻黃茵蔯等分用無灰好酒煎服取汗如陽黃不便者以茵蔯梔子大黃各等分煎服下之陰黃身重痛肢厥冷者以茵蔯梔子蘗皮清之小煎服温補之無三症者以茵蔯製附乾薑煎服温補之無三症者以茵蔯梔子蘗皮清之小便少則用利法此治疸之要方也

黃疸百藥不效者　驢頭肉同薑薤煮汁每日服之以愈爲度

一切黃疸病未甚者　猪膏髮煎猪膏半勑亂髮如雞子大三枚入膏中煎之髮消藥成分二服其病從小便出卽愈

一方　小麥麪饅頭五個底下掐一小孔每個塡入廣木香末三分仍將原麪塡好以文武火煅存性

再用去過皮黑棗二十枚同煆過饅頭搗成泥作五丸每晨用茵蔯三錢煎湯化服最妙

一方　水楊枝煎濃汁服之

一方　甜瓜蒂合赤小豆煎服或吹鼻中取出黃水奇妙方

積聚　肥氣伏梁痞氣息賁奔豚爲五積積着經絡緩筋募原膂筋腸後輸脉爲六聚蛟蛇鼈肉髮虱米爲七癥青黃燥血脂狐蛇鼈爲八癥積在腸外月以時狀如懷子爲腸蕈積在胞中月事違時亦狀如懷子爲石癥積外結募原肌肉之間爲痃其積淺積內結隱伏膂脊腸胃之後爲癖其積深積有常處聚無常處癥痃不移而可見與積相類瘕癖俱能移有時隱伏與聚相類五積中奔豚最爲難治

心腹積聚即蟲痛　五月五日午時有雨即伐竹節中水名曰神水和獺肝爲丸服之立愈

積聚脹滿　白馬糞同蒜搗膏付脹處即愈

癖疾　生芋子一勫壓破酒五升漬一七日每空腹飲一升其效如神

一方　黃牛肉一勫常山三錢同煮食肉飲汁癖自潛消

一方　猪胵一具炙蘸元胡末食之

脾積痞滿無論男婦皆治　牛腦丸黃沙牛腦子一個去皮筋擂爛皮硝一勫蒸餅六個晒乾和勻陳倉米糊爲丸梧子大每服二十丸空心好酒送下日三服

百日有驗

一方　痞塊冲痛而滿　黃牛肉四兩切片以風化石灰一錢擦上蒸熟食之常食自下

一方　黃牛肝和朴硝作脯食之

疫癖　生大黃煎湯服

虛寒癖積　在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久則榮衛凝滯潰爲瘡疽多致不救　急用胡椒二百五十粒蠍尾四個生木香二錢五分爲末粟米飯爲丸菉豆大每服二十丸橘皮湯下

鼈瘕多在心下 黑貓頭一枚燒灰酒服方寸匕日三服即數分

癥瘕久痼諸病 麻雀屎和蜜爲丸服之

酒後奔豚 茯苓一兩炙甘草一錢桂枝三錢大棗二枚以甘瀾水取流水置大盆中揚至千萬遍者是也二升煮之分服神效

積消熱渴 白冬瓜皮每食後喫三二兩五七度即愈

補五臟厚腸胃塡骨髓腹有冷積者 狼肉煮食甚良

一切氣血癥瘕 瓦楞子即蚶殼煆紅醋淬三次爲末醋膏爲丸梧子大每服五六十丸白湯下蓋蚶能散痰積也

疝症 少腹痛引陰丸氣上衝心不得二便爲衝疝少腹痛引陰丸氣逆衝胃作吐爲厥疝

少腹氣不能伸左右癥塊作痛爲瘕疝臥則入腹立則入囊爲狐疝橫骨兩端約文中狀如黃瓜內有膿血爲瘭疝亦爲癩疝少腹痛引陰丸小便不通爲癃疝氣疝卽偏墜筋疝卽下疝小便不利卽水疝胞癉卽膀胱氣皆爲癃疝少腹不痛陰囊腫大頑硬爲癩疝衝疝似小腸氣而更連腰痛凡患疝症皆歸咎於肝腎二經疝症左陰丸屬血右陰丸屬氣寒則收引而痛甚熱則放縱而痛微濕則腫而重墜虛亦腫墜但不甚重也

衝疝 連臍衝心作痛 **連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒調下甚者二三服卽消**

衝疝厥疝（臍悸奔豚疼痛上攻）　吳茱萸鹽水炒一味爲末少入肉桂澤瀉茯苓水煎服

厥疝（卒發腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得）　大茴香莖葉生搗汁一合投熱酒一合溫服　卒作惡心腹中不快同方

癩疝（囊腫頑硬）　荔枝核炒黑色大茴炒等分爲末每服一錢溫酒調下

一方　橄欖核荔枝核山楂核等分燒存性研末每空心回香湯調送二錢

一方　樟木末盛砂鍋內覆布蓋好放炭火上燒烟起將患處燻之卽愈

小腸氣痛（或墜）　大茴小茴各三錢炒乳香去油少許水服取汗

一方　大茴一兩花椒（開口）五錢炒研每酒服一錢

一方　每飧用鯽魚十個同茴香煮食久食自愈不發

一方　荔枝核一枚煨存性研末新酒調服

氣痂（即偏墜也）　絲瓜架上初結者留下待瓜結盡葉落取下燒存性爲末蜜煉調成膏每晚好酒服一匙在左左睡在右右睡

一方　絲瓜葉燒存性三錢雞子殼燒灰二錢温酒調服

一方　雞頭根（即茨實根）切片煮熟鹽醋食之

一方　楝樹簞烘燥爲末酒送下不拘多少

一方　（痛甚欲死者）雄黃五分飛淨爲細末或薑湯或陳酒送下其效如神

瘕痂血痂（血痂即便毒魚口）　大黃皂刺各三錢酒煎服

癩痂（重墜囊大如斗如盆）　薏苡仁用東壁土炒水煮爲膏數服即消此辛稼軒患是症一道人所傳之方也

一方　海梧子（出林邑）　燒灰服之即愈

一方　（腫而痛）　荔枝核燒灰研末酒服

一方　荔枝核青橘皮回香等分各炒研末酒服二錢日二服

狐疝陰丸左右偏大偏小時出時入少腹拘急而痛乃寒濕襲陰之故　蜘蛛散蜘蛛十四枚熬煎晒乾桂枝五錢爲末取八分飲一匙和勻服之日二服或蜜丸亦可服後若下勿驚膀胱氣　大茴杏仁各一兩葱白焙乾五錢爲末每服二錢嚼胡桃送下

一方　楥榔十二枚一生一熟爲末酒煎服之良

疝氣入腎　大茴炒作二包更換熨之良

小腸氣　牡牛卵囊一具煮爛入小茴香鹽少許拌食之

腎陰卒痛　牛屎燒灰酒和傅之

疝積腹痛　猬皮燒灰酒冲服

一方　羅晃子出廣西七枚酒煎服卽效

寒疝　胡椒四十九粒荔枝核十枚爲末好酒送下

疝症熥囊法　松樹柴細灰一大碗將陰囊埋於灰內一時灰濕再換埋三日卽愈

卒急疝氣　乾薑研細末放在手心內用唾沫調勻

將腎囊放手心有藥處再用右手蓋上候囊與手出汗腹內大熱方輕起右手不可冒風腹大熱痛即止

一切疝症灸法　急以艾灸大敦穴（是穴屬肝經）在足大指甲後有毛處灸之即安

冷氣入囊（腫滿疼痛）　大薊煎汁服之立瘥本事方

陰疝（即狐疝）　大小茴各一兩爲末猪脬一個連尿入藥酒煮爛爲丸服之

筋疝（即下疳）　掘鮮地骨皮同新鮮小薊濃煎汁浸之甚效

冷氣入囊（腫滿疼痛）　生川椒（開口）擇淨帛裹着丸囊厚半寸須臾熱氣大通日再易以消爲瘥　梅師方用桂末塗之亦良

頭痛眩暈 頭痛有因風熱氣痰濕或兼氣血兩虛因風而痛謂之頭風必眩暈因熱而痛暈者則煩渴因氣鬱而痛暈者則志意不伸因痰而痛暈者則嘔吐痰涎因濕而痛暈者則頭重不起因虛而痛暈者動則更痛更暈在右者氣虛多因痰熱在左者血虛因血少並因風也又有雷頭風痛者症見頭面疙瘩耳聞雷聲更有偏正頭風等名頭鮮眞痛眞痛者痛連腦內手足青冷至肘膝之節朝發夕必死凡頭痛眩暈時時迷悶及頭目卒然大痛目視不見或瀉多之後皆凶症也至於頭暈諸症亦與頭痛治法同

頭風 活蟬二個令自死日晒夜露不可着雨焙乾研末川芎一錢煎湯調服重者不過二服立愈

一方　好陳茶同川芎葱白煎服即愈

一方　苦痛不止　狠嗦下皮搓作條勒頭即瘥永不再發

一方　並能明目　蔥豆不去皮作枕枕之此風熱頭痛之方也

偏頭風痛　白丁香研細末絹包塞鼻內熱氣入腦自漸止

偏正頭風　不拘遠近諸藥不效者　白芷川芎各三錢爲細末以黃牛腦搽末在上入磁器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗

一方　麝香五分皂角末一錢薄紙裹置患處以布包炒鹽於上熨之冷則易之如此數次永不再發

八般頭風　魚鰾燒存性爲末臨臥以葱酒調服二錢

一切頭風兼熱者　華茇爲細末用猪胆汁拌過噙鼻中作嚏立愈如兼濕者以瓜蒂松蘿茶爲末噙鼻中出黃水立愈

雷頭風痛　薄荷蒼朮升麻各等分煎服之名清震湯

天白蟻其症頭腦鳴響狀如蟲蛀　茶子爲末吹入鼻中取效

氣虛頭痛　用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒烟燻之晒乾擂細每服一即二分五厘字別入好茶末食後絞白湯服之立愈

頭暈　鹿茸五錢無灰酒三盞煎一盞入麝香少許溫服

一方胃冷生痰吐逆　乾薑炮二錢五分甘草炒一錢二分水一鍾半煎至減半服之屢驗

頭風暈眩　鴟頭一枚炒黃眞藺茹白朮各一兩川開椒五錢炒去汗爲末蜜和丸梧子大每酒下二十丸

一方或虛運　取車風一枚即鷹頭去毛焙川芎微炒一兩爲末酒服三錢

老人風眩　白羊頭一具如常治法食之

點太陽穴法　八月朔日清旦取百花草頭上露水磨墨點太陽愈多次則永不發神效

頭目昏痛（症屬陽明）　白芷湯泡四五遍爲末蜜丸彈子大每服一丸荆芥點臘茶嚼下

眉稜骨痛（乃風熱與痰也）　白芷黃芩同以酒浸晒乾爲末茶下

偏正頭風　蓽茇爲末吹一字（即二分五厘）入鼻口中須含温水捷效（吹法照後方）

一方　萊菔搗汁仰臥左痛注右鼻右痛注左鼻或兩鼻齊注即數十年不愈者二注而愈

卒患頭痛如破（非中冷中風乃由痰厥氣上冲所致名厥頭痛）　單煎濃茶恣飲取吐直吐出胆汁乃已渴而即瘥

頭風　馬蹄決明作枕枕之甚於黑豆

一方　白芷一兩五錢川芎川烏甘草各一兩爲末每服一錢茶下神效

一方　明天麻一兩白芷三兩爲末蜜丸每丸重二

錢遇症用一丸先將荆芥一錢五分細辛一錢煎湯細嚼藥丸下之甚者不過一丸百一選方

頭風薰藥　天南星一個艾五錢燒烟薰之

寒熱頭風　童便一盞入葱頭煎服陶隱居屢驗方

血虛頭風　赤白首烏各五錢川芎紫蘇細辛白芍藥藁本各五錢甘草一錢水煎服

頭風因風寒濕痛　採單辦白鳳仙花一瓶燒酒浸滿蒸熟去火性隨量飲之以出汗爲度單方全集

偏正頭風　切陳醬姜一片厚一分許放痛處用蘸艾炙七壯或九壯以知艾香爲度永不再發

一方　硫黃一錢川椒（閉口）紅皮爲末三分拌勻溶爲小餅左疼塞左鼻清涕從右鼻孔出右疼塞右鼻正疼左右俱塞清涕盡即愈神驗

頭痛致耳邊發太陽穴腮俱疼難忍　生大黃末以葱汁調敷四圍中露一頂不日即愈

一方症同前　醋調石灰敷之即消

一方症同前　大黃一兩青木香薑黃檳榔各三錢爲細末用醋蜜和勻塗患處中留一孔出氣乾再易之

燻頭疼　鯊魚頭一個正中切開左邊疼用右邊魚頭右邊疼用左邊魚頭放火上燒烟燻鼻立止

眼目

目病有內外不內外三因內障皆因喜怒憂思悲恐驚七情過傷以致藏府內損精神不能上注於目也初患如同好眼不紅不腫但視物常見五色花飛昏而不明如在霧烟之中瞳中隱隱似翳漸無精彩射人瞳色變異無定久則成黃綠黑烏青五風之症也外障皆因暑寒燥濕火風六氣所感然必因其人內熱外蒸腠理不密相召外邪乘虛而入故初患赤痛腫澁眵淚久或翳膜遮睛也外障有四十八症不及詳載不內外因皆緣飲食不節傷飽失飢起居不愼勞疫過度或遭擊振或被刺損其邪無定體故或成內障或成外障之病也外障多屬有餘當以除風散熱爲主內障多屬不足當以補精益氣爲主不內外因又當隨症用藥也

睛上生暈　鯉魚長一尺二寸者取膽汁滴於銅鏡上陰乾竹刀刮下每點少許神效　雀目同方

眼生黑花年久不可治者　椒目（開口）炒一兩蒼朮炒一兩爲末醋糊爲丸梧子大每服二十丸醋湯下

眼目昏花　白礬砂黃連青魚膽一個野菊花四錢入砂鍋內煎湯冷洗之不拘時候

脾虛目暗　白犬膽一枚螢火蟲二七枚陰乾爲末點之

目生障翳漸漸昏暗視物不見　檜罟子出廣西浸白蜜內每日連蜜啖一顆一月卽退盡復明

眼翳黑花如飛蠅上下視物不明　水獺膽調入眼藥中點之

目翳遊移無一定處此乃血分病也　五靈脂以酒飛去砂石爲細末一兩雄黃飛淨五錢每以酒調服二錢未去再服以翳退爲止

目翳重層　取猪膽皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒研極細末點之不過三五度卽瘥

翳膜遮睛　熟羊眼中白珠二枚於細石上和裹核
磨汁頻點之三四日自漸明矣

目中障翳　李樹上膠煎汁洗之定痛消腫

風翳　猪鼻燒灰水服方寸匕日二服（即數分）

赤白障翳　野葡萄藤以水浸過吹氣取汁滴入耳中甚妙

風熱目暗（因肝腎氣虛風熱上攻目暗面腫也）　白兎肝一具米三合和豉汁如常煮粥食之

風熱目暗　鯽魚作臛食之

老人風虛目暗　烏雄雞肝煮一具以豉和米作羹成粥食之

雀目夜盲　眞蛤粉炒黃爲末以油臘化和丸皂子大綱於猪腰子中麻紮定蒸食一日一服肝亦可

目痛累年（或三四十年生翳者）　活海螺入黃連末在內取汁點之無連卽取汁洗之

病後目腫（經年不開）　龜胆點之甚妙

病後失明　青羊胆點之

內外障翳　夜明砂淨末等入雄猪肝內煮食之立效作丸治雀目

羞明怕日　石決明以鹽同東流水煮一沸時研細末以水飛過黃菊甘草各一錢水煎冷服

目赤初起　以鴨胆點之

一方　以黃連浸黑驢乳點之甚驗

赤目疼痛　蓮肉去皮研末一盞粳米半升以水煮粥常服

目赤腫痛　猪膽汁一枚和鹽硃五分點之

一方　以臘雪洗之

一方　鯉魚膽十枚臘粉一錢和勻瓶收日日點之

一方　鯉魚膽五枚黃連末五錢和勻入蜂蜜少許瓶盛安飯上蒸熟每用點目大眥一日五七次亦治飛血赤脉

目赤澁痛　白姜末水調貼足心甚妙

目赤瘡痛　猪肝一具薄切水洗淨以五味煮食之

目赤澁癢　上伏日採取白犬膽汁注目中神驗目出膿水以膽酒服之

目赤初起　燒酒入鹽飲之即痛止腫消益燒酒性走引鹽通行經絡使鬱結開而邪熱散此反治刦劑也

目流熱淚不止　以三年所存烏雞冠上血日點三次即愈　暴赤火眼同方

一方及一切浮翳　烏賊魚骨研細末和蜜點之　牛馬障翳亦治

一方　五倍子蔓荊子煎湯洗後用烏雄雞胆點之

目流冷淚　木耳一兩燒存性木賊一兩爲末每二錢以清米泔煎服

一方及目昏　乾薑粉一字（即二分五厘）泡湯點洗之

疳眼流淚　海螵蛸牡蠣等分爲末米糊丸皂子大每用一方同猪肝一具米泔煮熟食之

目常流淚　猬膽點之卽愈亦點痘後風眼

迎風流淚　皮硝六錢水一碗煎七分洗數次卽愈

爛弦風眼　明礬一錢五分青鹽一分黑豆擦淨三錢滾水冲候少温以淨絹蘸水頻洗每日四五次其水日換七日卽瘥

一方　膽礬五分蜂蜜一兩五錢研極細和勻搽眼邊上

一方及障翳　青羯羊産北地口外膽同蜜蒸九次點之神

妙名二百味草花膏

一方　烏鴉膽點之卽愈

一方　雞冠血點之日三度以愈爲度

赤眼昏暗　取蚌長者爲蚌以黃連末納入取汁點之

目赤疼痛火眼　紅甘蔗一段黃連二錢入蔗內炭火炙出水取抹眼上卽愈

一方　五月取老黃瓜一條開小孔去穰入芒硝令滿懸陰處待霜透出刮下點之甚效

一方熱痛　以雞子白生吞之

一方　青羖羊肝一具切洗和五味食之

青盲眼疾因胎中受風與邪生後瞳人端好黑白分明但視物不見或夜臥多驚嘔吐

鯉魚腦蒸熟和蒸熟鯉魚胆等分點兩眥極效

血風赤眼婦人多患之　海螵蛸二錢銅綠一錢爲末每用一錢熱湯泡洗

青盲眼疾　夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩爲末牛胆汁和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十丸至五更米飲下二十丸以瘥爲度

十年青盲　白犬生子目未開時取犬乳時時點之俟犬子目開卽瘥

青盲眼疾　雄鼠胆鯉魚胆各二枚和勻滴之立效

努肉攀睛起於大眥初則漸浸風輪久則掩過瞳人或痒或痛漸漸積厚　鮮鯽魚取一片中央開孔貼於眼眶上一日三五度良

水浸一夜頭圓者爲

白丁生不可多用恐傷瞳人

雲龍注答

一方熱痛　以雞子白生吞之

一方　青羖羊肝一具切洗和五味食之

青盲眼疾　因胎中受風與邪生後瞳人端好黑白分明但視物不見或夜臥多驚嘔吐

鯉魚腦蒸熟和蒸熟鯉魚胆等分點兩眥極效

血風赤眼婦人多患之　海螵蛸二錢銅綠一錢爲末每用一錢熱湯泡洗

青盲眼疾　夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩爲末牛胆汁和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十丸至五更米飲下二十丸以瘥爲度

十年青盲　白犬生子目未開時取犬乳時時點之俟犬子目開即瘥

青盲眼疾　雄鼠胆鯉魚胆各二枚和勻滴之立效

努肉攀睛起於大眥初則漸浸風輪久則掩過瞳人或痒或痛漸漸積厚　鮮鯽魚取一片中央開孔貼於眼眶上一日三五度良

一方赤脉冒瞳者　取白丁香即麻屎也　甘草水浸一夜去水焙乾和頭男乳點之即消丁香兩頭圓者爲

雌一頭尖挺者爲雄男病用雌女病用雄臘月採之

目赤障翳　熊胆丸取熊胆每以少許化開入水片一二片研極細以銅器點之絶妙或淚而痒加生薑粉些須

一方　青羊睛曝乾爲末點之

一方　白羊髓敷之

肝虛目赤　青羊肝薄切水浸吞之極效痛後失明同方

風火眼痛　健猪胆一枚以火炙滾點眼三日見效

目忽不見　令人嚼母薑以舌日舐六七次以明爲度

暴風客熱胞腫疼痛淚多攙赤白睛脹起　古銅錢刮薑取汁於錢唇點之淚出今日點明日愈

一方　臘月取生薑搗絞汁陰乾取粉入銅青末等分每以少許用沸湯泡澄清温洗泪出即愈

一方 或更弦赤而爛 歸尾一分黃連一分胆礬銅綠如棗豆大各二塊研細共入大酒鍾內滾水冲多半鍾候冷透洗眼至夜露宿神效

天行赤眼 此症沿門傳染赤腫澁淚羞明疼痛受邪深淺視人强弱先後而愈也 秦皮杏仁歸尾菊花生白礬各等分頻洗一二日愈

一方 每日於井上視井旋轉三遍能洩火氣

風火眼痛 銅綠七錢白礬三錢用烏梅去核飯上蒸透研丸如黃豆大用時將一丸以白滾湯泡水洗之

一方 天蠶洗目散膽礬白礬銅綠鉛粉川連杏仁各一兩研末每用蠶繭一個開口(開口)入末五分並加川椒九粒在口線縫繭口以滾水半茶杯浸泡至綠色每日洗七次三日痊愈藥繭掛乾一枚可治三人

鎮肝明目 以黃牛膽釀黑豆俟百日取出每夜吞一枚

明目堅齒去腎火利老眼　海鹽以百沸湯泡散取清汁於銀器內或石器中熬取雪白鹽花新瓦器盛之每早晚揩牙漱水以大指甲點水洗目閉坐良久乃洗面能以明視極遠之物法極神妙開口

一方　青鹽二兩白鹽四兩以川椒四兩煎汁拌二鹽炒乾日用揩牙洗目永無疾病

目能遠視　取八哥目睛和乳汁研滴目中明能遠見微物

一方　鷹睛和乳汁研之日三注眼中三日可見碧霄中物烟熏謹避

目永無疾　以甘菊花甘枸杞等分煉蜜爲丸日日服之永無目疾

目痛眥傷或赤腫　用川連浸於人乳中點之胡連亦可

頭目昏暗羞明及障翳青盲乃肝經不足風熱上攻之故　羊肝一具黃連一兩搗爲丸每日服之名羊肝丸

雀目澁痛　地膚子葉泡湯洗之

目弦蟲　覆盆子葉絞汁澄清滴目中卽愈

小兒雀目　羯羊肝一具不洗竹刀割開入穀精草瓦器煮熟食之或作丸茶下

明目去風　採經霜桑葉煎湯洗之

老能夜書　每年九月二十三日桑葉洗目一次至老永絕昏暗且夜能細書奇妙便方須五月五日六月六日立冬日採者爲佳同黑芝麻等分蜜丸名扶桑丸能除風濕烏鬚明目

青盲眼疾　夜明夜洵淨石決明煆存性等分猪肝煎服名決明夜靈散

風淚障翳不論赤白　臘月採青羊膽一枚入蜜於膽中紙套籠住懸簷下待霜出掃取點之甚效

目熱赤痛　田螺一個入鹽花少許取汁點之

目腫　五倍子煎水洗之卽消

目赤腫痛　用自己小便乘熱抹洗卽閉目少頃此

以眞氣而退邪熱之法也眼目不清或患眼初或作痒亦用此法

眼中有星　胡椒七粒爲末飯搗爲丸棉裹塞鼻內即去

破損目睛　牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥

目爲物傷　青羊膽二枚雞膽二枚鯉魚膽二枚和勻日點之

諸物眯目　麥芒　大麥煮汁洗之即出

一方　塵沙　以貂鼠毛皮拭之即出或用大珍珠拭之更妙

一方　麥芒塵沙　大藕皮搗棉裹汁入目中即出

一方　灰塵　烏雞膽汁點之

一方　灰塵　青羊筋熟嚼納背中仰臥即出

諸物眯目　以酥油少許隨左右納鼻中垂頭少頃令流入目中則物與泪同出即愈

火藥冲眼　急以小便頻洗之即愈

風火眼痛　海桐皮煎湯洗之

目赤膚翳　以水片乳調日點數次良薑火鬱發之

從治之法也

塵沙眯目　取生羌蛾一枚以背於眼上影之自出

麥芒眯目　取老木蠹以新布覆目中持其蠹從布上摩之芒即着布上而出

赤翳白膜　取老木蟲汁滴目中障翳即出

清心明目　清旦取柏葉及菖蒲上露水飲之或洗目最良百花上露俱可惟凌霄花露不入藥

洗眼奇方　方出道藏不論瞽目犯土雲霧風眼火眼皆花久洗自明　用皮硝六錢生桑白皮一兩水煎每遇日期熱洗數十次

正月初五　二月初二　三月初三　四月初九　五月初五　六月初四

七月初三　八月初十　九月十二　十月十二　十一月初四　十二月初四

閏月照本月　以上吉星日子乃通光明也其方千金不易屢用屢驗

眼中起星　取勒薅搥碎將水洒紙上成粉候乾刮

取點患處

七十二種眼　羊胆一枚入蜂蜜一錢綿紮兩手揉勻白水煮一滾卽取出涼水浸半日去生水傾出內汁點之秘方集驗

眼目昏花　童便煎甘菊洗數次卽愈

暴發腫痛　先將青布一塊水浸洗令乾另用生薑汁白礬末將布蘸搽眼胞上閉目少頃淚出痛止

明目補腎兼治筋骨疼痛　小紅棗十二枚冷水洗淨去核甘枸杞三錢馬料豆四錢水二碗煎一碗早晨空心連湯共食之

天絲入目　石菖蒲槌碎左目塞右鼻右目塞左鼻萬發萬中

一方　用木梳垢爲小丸放眼角邊卽出

烟渣入目　如將他物洗之愈洗愈疼必至眼盲而後止須　用亂頭髮或綜纓緩緩揉之卽愈

睛破打傷　如突出卽揉進　用生猪肉一片將當歸赤石脂

末摻肉上貼之去毒血卽愈單方集驗

洗眼仙方　防風五分硼砂一釐胆礬二釐半同煎水洗之立愈

仙傳洗眼神效奇方　公雞胆三個研破用　苦杏仁七個研開口　酸梅三個研碎　眞川椒一錢　胆礬一錢　青鹽一錢　白礬一錢　砂仁一錢　銅末一錢亦可　水二鍾入羣藥於內用鐵針三個並入水內泡五七日如針未化再泡幾日總以針化爲度每日洗五七次夏日用涼水冬日用開水二八月用温水碗上覆白紙一張蓋滿不可近塵土洗五七日一換無論遠年近日一切雲翳障蔽等症三四服後無不愈者眞能瞽目重開不可輕

視愈後廣傳濟人其功莫大

耳症

腎虛耳聾　烏骨雄雞一隻治淨以無灰酒三升煮熟乘熱食之三五隻即能見效

一方　鹿腎一對去脂膜切以豉汁入粳米二合煮粥食亦可作羹食之

耳中發癢　隔三五日用雞翎蘸新汲水撚之常用此方至老不聾

耳聾氣閉　蚯蚓三條入葱內晒三日即化爲水滴

入即通

耳中卒痛　磨刀石上鐵漿滴少許即愈

耳卒聾閉　竹筒盛鯉魚腦於飯上蒸過注入耳中即能聽鮹魚亦妙

一方　鼠胆二枚每以汁少許滴入如雷鳴時即通

一方　巴豆一粒紙裹針刺孔竅通氣塞之取效

耳聾氣閉　甘遂甘草末絲帶捲之塞在耳內

一方　鼠脂半合青鹽一錢蚯蚓一條同化以棉蘸

撚滴耳中塞之

一方　鼠腦棉蘸撚滴耳中塞之

一方　猬脂溶滴少許入耳即能聞

一方　鮹魚胆一枚烏驢脂少許生麻油五錢和勻納入樓葱管中七日取滴耳中日二次

一方　水壺蘆即小野鴨本名鵁鶄膏滴耳中即愈

一方　滴黃鱔尾血數點入耳中即通

一方　搗蟹汁滴入耳中即能聽

一方　以醋醋微火炙附子屑尖塞之

一方　以棉裹珍珠塞耳中即能聽

多年聾疾　以生驢脂和生椒搗熟棉裹塞耳中

一方　驢前蹄脛骨打破向日中瀝出髓以瓷盆盛收每用棉點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用並須極白顏色者爲佳稍黃者即不堪用

一方　以酒三升漬牡荆子一升漬至七日去滓任性飲之

耳卒聾閉　以苣麻仁一粒搗爛棉裹塞耳或塞鼻通即去之

耳聾　巴豆一粒斑蝥三枚麝香氷片各少許爲末慈蜜爲丸麥子大用絮棉包裹納耳中三日後出黃水不痛不痒即愈也

一方　上好新鐵片三塊咬口內用好磁石塞兩耳靜坐其耳忽鳴而通有頃刻通者有坐數日通者

腎虛耳鳴　麝香少許全蝎十四個薄荷十四葉裹

麝蝎瓦上焙乾研末滴水捏作錠子塞耳內極效

一方　巴豆蒼蒲同研松脂黃占和條納耳中抽之

神效綱目

耳忽大痛如蟲走或流血或乾痛　蛇蛻燒灰吹入立止

牙齒牙齒乃骨之餘屬腎家若無故齒長疏豁而動則爲腎衰牙齦上屬足陽明胃下屬手陽明大腸痛乃牙齦痛也痛有胃火風寒蟲四者之外除寒痛之外皆爲胃火邪風濕熱也痛連頭腦但不腫不蛀喜飲熱湯爲寒不甚腫痛不怕冷熱爲風多腫喜飲冷得寒更疼爲火一牙作痛蝕盡一牙又蝕一牙作痛爲蟲又有骨槽牙疳二症如牙齦連頰硬腫疼痛牙齦腐爛而出膿血爲骨槽風因骨槽潰後腫硬不消唯出臭血而不出膿水爲牙疳二症皆因痘疹癖疾之後而成也牙疳貴在攻法若人不思食難任攻下則屬逆症

風蟲寒牙痛呻呼不止　胡椒九粒蓖豆十一粒布裹搥碎以綿棉包作一粒令患者咬定涎出吐去立愈

一方　胡椒一錢五分以羊脂拌作四十丸擦之追涎

風火及蟲牙痛　白色巴豆半粒塞於疼牙縫內追涎立止

風蟲牙痛　川椒（開口）紅末水和白麪爲丸皂子大燒熱咬之數度卽愈

一方　花椒（開口）四錢牙皂子七七個醋一碗煎漱之

一方（兼寒）　胡椒蓽茇等分爲末臘丸梧子大每用一丸塞蛀孔中

一方　熊胆三錢片腦四分每以猪胆調少許搽之

一方　燒酒浸花椒（開口）頻頻漱之

一方　經霜乾絲瓜燒存性爲末搽之

風牙疼痛　苡仁根四兩水煎含漱冷卽易之

一方　生絲瓜一個擦鹽燒存性研末頻擦涎盡卽愈若腮腫是兼火甚以水調瓜末貼之

一方　荔枝連殼燒存性研末擦牙卽止

一方　大荔枝一個剔開塡鹽滿殼煆研搽之再以防風川椒（開口）甘草浮麥煎湯漱口卽愈

蟲牙疼痛　苡仁桔梗生研末點服大人小兒並用

一方　魚腥草花椒（開口）菜子油等分搗勻入泥少許和作小丸如豆大隨看左右塞耳內兩邊輪換不可一齊恐閉耳氣塞一日夜取看有細蟲爲驗

一方　啄木散啄木鳥舌一枚巴豆一枚研勻每以猪騣一莖點少許於牙齦上立愈

一方　香油抹筋頭蘸麝香末棉裹炙熱咬之換二三次其蟲卽死斷根甚妙

一方　韭菜三十根捆於紬絹內拴竹筋上以燈火烘熱蘸香油少許再烘極熱咬之唾出清水卽愈

風牙疼痛　秦椒煎醋含漱

一方　日以虎鬚插齒縫痛卽止

一方　李樹根白皮煎水含漱之

風火牙痛　米醋煮枸杞根白皮一升取半升含漱

風寒牙痛　黃柏蜜炙乾細辛洗炙氷片草烏各等分爲末敷之

火牙痛　大王瓜切頭上一二寸將子挖盡入皮硝細末塡滿仍將頭合蓋外用稻草爲絡掛於過風簷下俟硝出瓜面用竹刮下磁瓶收貯遇症搽敷一次卽愈

風蟲牙痛不止　老生薑瓦焙枯礬末同搽之

一方兼寒　炮乾薑川椒（開口）等分爲末摻之

齒露或腫或疎動疼痛　壺盧子八兩牛膝四兩每服五錢煎水含漱日三四次自愈

風熱齒痛　獨活生地等分爲末每服三錢

腎虛牙疼　骨碎補炒黑爲末擦牙嚥下亦良

火牙腫痛　山豆根含之嚥汁良

蟲牙疼痛　海桐皮煎服或含漱並效

一方　韭菜子燒烟熏之最妙

火牙疼痛　生石膏研細末擦之且能固齒

風蟲牙痛　露蜂房煎水含漱之

一方　巴豆一粒研細飯丸棉裹咬之吐涎不可吞

一方　巴豆一粒煨黃去殼蒜一瓣切一頭剜去心入豆在內蓋定棉裹隨左右塞耳中不痛即去

一方　巴豆刺針上燒令烟出熏痛處三五次即愈

風熱齒痛　槐枝燒熱烙之

風蟲牙痛　松上脂滾水泡化漱之即止或塞患牙其蟲即從脂出

牙疳及齒蠹　黑皮羊脂萇茗子等分入盃中燒烟向口熏之

一方　檄欖燒研入麝香少許貼之

飲酒齒疼　新汲水頻含漱之

一切牙痛　木耳荆芥等分煎湯頻服

一方　燕屎爲丸梧子大於疼處咬之丸化痛止

一方　辛連散川連細辛等分爲末搽之控去涎

刮牙取牙　鯽魚一個去腸入砒在內露於陰處待

有霜刮下瓶收以針撥開牙齦點少許欬嗽自落

一方入硇砂少許

齒牙長出口外不能飲食名曰髓溢　白朮一味以乳炒煎服

神效千金方

取牙　白茄根以馬尿浸三日晒炒爲末每用點牙

即落屢驗

擦牙固齒　赤首烏二兩大熟地二兩青鹽一兩桑

椹子八兩當歸一兩沒石子雄雌各四對雄長雌

圓猴薑一兩共爲細末每晨揩牙四十九下左右

如數不獨固齒令鬚髮並黑

一方　青羖羊脛骨煆爲末入飛鹽二錢同研勻日

用揩之且去黔黯

漱齒却病　長用冷水漱口冬日用氷水更妙日日

行之於牙齒有益

烏鬚揩牙　烏鉛四兩鐵鍋內炒成灰青鹽四兩槐枝四兩

入鍋內盛水平枝煎數沸次下青鹽煎乾去枝留

鹽和入鉛灰研細每日清早洗面時手指蘸鹽擦牙將擦過口水洗鬚能烏不白

潤鬚轉黑　早午二膳後及臨臥時每用冷水泡鬚久之黃者能黑黑者不白冬日用連氷水泡之更佳愈久愈妙

齒折多年不生　以雄鼠脊骨研末日日揩之甚效

齒生疼痛　用鼠一個去皮以硇砂揩上三日內爛化至盡取骨瓦焙枯爲末入蟾酥二分樟腦一錢每用少許點牙齦上立生

風虛牙腫　腫齦腫也　獨子肥皂一個以青鹽實之燒存性研末傅之

風蟲牙痛　用粗碗一隻川椒鋪底樟腦蓋面覆碗一隻於上鹽泥封固慢火煆一夜次早研細每用一釐擦牙齦立愈秘方集驗

風熱牙痛　五倍子一枚稍開一孔用鹽填滿炭火中燒紅存性略出火氣研末以指擦牙漱津片時

吐出數次卽愈

齒衄　三製大黃末二錢枳殼湯加童便調服卽止

取痛齒法　白馬尾燒灰存性點上卽落但不可沾好齒沾之卽落

一方　用白龍骨末三錢臨用以大蒜一瓣搗爛入末一二分拌勻貼痛處半炷香卽下

風火蟲牙　雄黃精明礬各三分牙硝一錢氷片一分爲極細末以半分擦患處流涎卽愈極驗

預除牙痛　青鹽三兩平砂三錢胆礬三分用鹽內皂角一錢共爲細末撿大個五棓子七個將藥末勻裝五棓子用火紙每個包過七層又共包七層將黃泥包裹炭火煨煉出緣烟爲止取出裝好每早擦牙一次其功甚大

牙疼總方　石膏煅（或三錢或五錢）防風荆芥青皮生地丹皮各一錢二分甘草五分水煎食後食

上前門牙屬心火加黃連麥冬

下前門牙屬腎火加黃柏知母俱鹽水拌炒

上兩傍牙屬胃火加川芎白芷

下兩傍牙屬脾火加白朮白芍

上左盡牙屬胆火加羌活胆草

下左盡牙屬肝火加柴胡山梔

上右盡牙屬大腸火加大黃枳殼孕婦忌用大黃

下右盡牙屬肺火加黃芩桔梗　各加一錢五分

不藥良方

續集卷四

C116/2535
v.6

不藥良方續集卷四

唇口舌

唇口屬脾經舌屬心經口舌生瘡名曰口糜乃心脾二經蘊熱深也平人口淡乃脾和也胃熱則口出臭氣口內溢酸乃肝熱淫脾苦味乃肺熱淫脾鹹味乃腎熱淫脾也舌唇之症有六如舌腫硬不痛爲木舌舌下腫大似舌爲重舌其本舌腫大爲舌腫唇腫痛厚爲唇腫唇腫潰裂成瘡爲唇瘡唇緊而小燥裂爲緊繭唇是皆心脾胃經蘊熱也暴發腫痛爲實熱宜下之日久色淡瘡白時痛不痛爲虛熱宜補中兼清或涼藥不愈須用引火歸原之藥可也

口舌生瘡即口糜也　醋浸黃柏含之只以醋含亦良

一方 茄蒂燒灰敷之取其甘以緩火之義也

一方 滿口潰爛 生薑自然汁頻頻漱吐亦可爲末搽之

一方 大人小兒虛實皆治 雞內金燒灰敷之

一方 無論新久輕重 乾薑黃柏等分各研末合一處研勻乾搽口內温水漱口內服清熱去濕藥

一方 薔薇根角蒿等分煎湯含漱之

一方 黃連細辛煎湯含漱之

一方 腎水不足虛火上炎者 黃柏窯炒研末含之

一方 中氣不足虛火上炎者 用理中湯甚加附子或噙上桂引火歸元

一方 因過飲酒 田螺煮汁飲之

一方 吳茱萸爲末醋調貼足心移夜便愈引熱下行之藥也

一方 孩兒茶同硼砂等分含之

一方 舌腫同治 羊乳含漱即愈

一方 赤白皆治 蟑螂俗名老木蟲 取汁頻搽神效

一方實火 黃連爲末每服一字（即二分五厘）容水調下

一方 黃丹巴豆同炒焦去豆用丹摻之立止

一方 白礬煅二錢硼砂一錢咽痛吹入口疼蜜調

一方虛火 黃柏末壹兩青黛三錢肉桂二錢氷片二

分研細合一處每用少許搽之

口出臭氣胃熱故也 大茴香煮羹及生食並良

一方 香薷含或漱口即去其氣

一方 以象膽棉裹少許貼齒齦平旦漱去數次即

愈永不發

一方 正旦含井華水吐棄廁中數次即瘥

一方 以紅沙糖漱解之

一方 陀參一錢醋漱之且含口香

一方 以草豆蔻麪裹煨熟入大茴香煎漱之

重舌乃舌下生舌起如小舌狀 以氷硼散搽之方見咽喉

木舌其舌腫硬不痛也 糖醋時時含漱之

舌腫謂舌腫大也 醋和釜底墨敷舌上下脫則更敷須

臭即消

重舌 更見出涎 特牛乳飲之特牛三歲牛也

舌上生瘡 羊脛骨中髓和胡粉塗之甚妙

重舌 蛇蛻燒末敷之

一方 膽礬研細敷之

舌腫 蒲黃末頻摻之或加乾薑等分摻之蒲黃涼血得薑是陰陽相濟也重舌同方

舌上生胎 薄荷泡湯含漱即愈亦治口臭

舌胎 及諸病熱胎 以布染井水抹後用薑片時時摻之

緊繭唇 燥裂痛甚 猪脂浸酒摻之

一方 橄欖仁研爛敷之欖肉泡湯服或胭脂敷之

唇瘡 唇腫潰裂成瘡 橄欖炒研猪脂和勻調塗

唇吻生瘡 吻口邊也 菜瓜 即越瓜 燒灰敷之

一方 龜甲燒灰敷之

一方 檳榔燒研入輕粉末少許敷之

一方 苡麻油作紙撚燒烟熏之

口疳即口糜　紅棗十枚燒存性加梅片二分吹患處

一方　用砂仁殼煅研擦之即愈

口破兼治牙疳鵝口　滑石一錢辰砂三錢冰片二分研末

摻患處凡口破俱禁水漱

木舌口舌俱硬有衣不能開　薄荷細茶共煎露一宿青絹裹

指上蘸藥徐徐抹上自愈

咽喉胸膈上有風熱則咽喉腫痛風熱邪甚則生單雙乳蛾熱極則成喉閉若更見痰盛則爲纏喉緊喉二風皆屬險危之症也咽喉會厭兩旁高腫如蠶蛾或如棗栗紅腫疼痛爲乳蛾雙者輕單者重生於關前易見者急以針刺之如生於關後難見者急用探吐法若兼痰壅氣急聲小探吐不出者急用三稜針刺少商穴出紫血仍用吹服藥緩緩取效如咽喉腫痛而赤腮腫甚則項外漫腫喉中有塊如拳湯水難嚥語言不出呼吸不通則爲喉閉其症初起惟覺如傷寒身發寒熱宜急刺少商合谷二穴外用生羊肉片貼之內服疎散藥寒熱已退服清熱疎風藥兼吹漱等藥若痰盛者急用探吐法倘項外並腫而痛者切不宜針急用皂角吹鼻法或用皂末醋調厚敷項外須臾即破也又有喉腫色黃

其人面赤目睛上視爲酒毒喉閉亦急用探吐法次服解毒藥并用吹藥如咽喉內外腫痛聲音難出湯水不下痰壅如拽鋸聲爲纏喉風初發亦急刺少商穴如痰盛急用吐法吐後用甘草漱解油氣內服解毒藥吐下之并用吹藥開關後宜服清熱疎風藥至於緊喉風一症亦與纏喉風同形惟項外不見腫痛也諸症隨治隨效者則順若面青唇黑鼻汎泠涕者則逆潰破出膿則吉若潰後不出膿仍然腫痛湯水不下則危殆矣見是症者切宜詳審施治

少商穴屬手太陰肺經在大指內側之端去爪甲如韭葉許白肉之際刺宜微出紫血在左刺左在右刺右在左右刺左右忌灸

合谷穴屬手陽明大腸經在手大指次指之虎口後兩歧骨間陷中刺深三分左右如前法

單雙乳蛾紅腫疼痛痰涎壅塞氣急聲小探吐不出者急用三稜針刺少商穴出紫黑血以先瀉其熱再用吹服等藥

喉閉初起急刺少商或合谷穴以瀉熱開關並先服荊防敗毒散疎散風熱並用吹漱等藥隨症酌方治之纏喉緊喉二風初起亦宜急刺少商穴餘

桐油四匙太多病人難受 古法止用數釐今擬改用一分

鮑雲龍籤注

同治法

乳蛾等症吹藥 吹喉七寶散火硝牙皂全蠍雄黃硼砂白礬膽礬等分細研如塵取一字吹入患處（即二分五厘）

神效

溫水半碗喉內撚之連探四五次總以痰涎吐盡人醒聲高爲度吐後隨以甘草湯漱之以解油氣再用解毒清熱及吹

藥

纏緊探吐法（痛腫未止聲音難出猶有風火凝聚也）用雄黃解毒丸

一方 用巴豆末紙包燒烟薰鼻真是仙丹前後喉症均可用

雲龍傳方

白粒共研極

服嚥下並用

石膏煅一錢五分硼砂一錢煅硝服礬各五分元明粉三分冰片三分共研如塵以筆管吹入喉內緩服清熱利腸諸藥

喉閉項外俱腫而痛（當防咽喉穿透切禁輕針）急用皂角末吹

同治法

乳蛾等症吹藥　吹喉七寶散火硝牙皂全蠍雄黃硼砂白礬膽礬等分細研如塵取一字（即二分五厘）吹入患處

神效

喉閉及緊纏二風（痰壅氣急探吐法）　桐油餞用温水半碗加桐油四匙攪勻用硬雞翎蘸油探入喉內撚之連探四五次總以痰涎吐盡人醒聲高爲度吐後隨以甘草湯漱之以解油氣再用解毒清熱及吹

藥

纏緊探吐法（痛腫未止聲音難出猶有風火凝聚也）　用雄黃解毒丸雄黃一兩鬱金一錢巴豆去皮油十四粒共研極細末醋糊爲丸黍米大每服五分津液嚥下並用石膏煅一錢五分硼砂一錢焰硝膽礬各五分元明粉三分氷片三分共研如塵以筆管吹入喉內緩服清熱利腸諸藥

喉閉項外俱腫而痛（當防咽喉穿透切禁輕針）　急用皂角末吹

鼻取嚏其腫即破或兼用皂末醋調厚敷項外須
臾即破或仍以李樹近根處皮磨水塗喉外良驗

喉閉 寒熱已退 咽乃腫痛 以淡竹葉燈[illegible]或

此治虛寒喉痹仙丹隨含隨嚥亦無礙也

雲韶籤注 [illegible]寒涼諸藥 以蜜炙附

子片含之勿嚥

乳蛾及咽喉腫痛 氷硼散氷片五分硼砂元明粉
各五錢硃砂六分共研極細末以蘆筒吹入喉中

立效並治鵞口瘡滿口白瘡鑽牙疳牙瘡慢喉風
啞瘴喉風上腭瘡鑽喉毒等症

喉風 壁上喜窩剝去裹皮數個用患人腦後髮一
根捆定瓦上焙乾研末吹之血散痰消即愈乳蛾
並治

一方 絲瓜根以瓦瓶盛水浸飲之

一方 以鹽蟹汁滿含細嚥之即消

一方 臘月初一日收猪胆不拘大小五六枚用黃

鼻取噓其腫卽破或兼用皂末醋調厚敷項外須與卽破或仍以李樹近根處皮磨水塗喉外良驗

喉閉寒熱已退咽仍腫痛 以淡竹葉燈心煎湯時時嚥之或吹鼻良效

卒然聲啞吞吐不利乃寒氣客於會厭切忌寒涼諸藥 以蜜炙附子片含之勿嚥

乳蛾及咽喉腫痛 氷硼散氷片五分硼砂元明粉各五錢硃砂六分共研極細末以蘆筒吹入喉中立效並治鵝口瘡滿口白瘡鑽牙疳牙瘡慢喉風啞瘡喉風上腭瘡鑞喉毒等症

喉風 壁上喜窩剝去裏皮數個用患人腦後髮一根捆定瓦上焙乾研末吹之血散痰消卽愈乳蛾並治

一方 絲瓜根以瓦瓶盛水浸飲之

一方 以鹽蟹汁滿含細嚥之卽消

一方 臘月初一日收猪胆不拘大小五六枚用黃

連青黛薄荷殭蠶白礬風化硝各五錢裝入胆內青紙包之將地掘一孔方深各一尺用竹橫懸猪胆在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去胆皮青紙取藥研末密收每吹少許神效

一方 牛鼻草拳燒灰用筆管吹入喉中甚效

單雙乳蛾 霜梅一個去核蚰蜒二條搗丸彈子大臨症將丸噙口中嚥汁卽愈 兼治噤口痢

一方 小核桃殼半個將麝香裝滿右喉患症繫左手脉上左喉患症繫右手脉上若雙蛾左右皆繫週時卽消

喉閉 生薑二片搗汁蜜五合煎勻每服一合日五服甚驗

一方 絲瓜研汁灌之

一方 荔枝花及皮根以水煮汁細細含嚥之

一方將死者 急以臘月收取陰乾鱉魚膽點入少許卽蘇或水灌之

一方　海螵蛸同銀硃末吹入鼻中取吐卽消

一方　臘月取毋猪尾燒灰水服

一方（腫閉欲死者）　沙牛角燒灰酒服一錢甚驗

一方（口噤者）　牛涎一盞入鹽少許頓服之

喉閉已破（瘡口作痛者）　猪腦髓蒸熟入薑醋喫之卽愈

喉痛難食（危在旦夕者）　芥菜搗取汁灌入喉內少時用

黃柏水嚼口取吐血痰卽愈但須忌甜物十餘日

咽喉疼痛（飲食不下）　兎毛敗筆頭燒灰漿飲服二錢

咽喉腫痛　老黃瓜一枚去子入硝填滿陰乾爲末每以少許吹之

風熱腮腫　絲瓜燒存性研末水調搽之

一切熱毒腮腫及脣腫　雞子白和赤小豆末塗之

喉閉　商陸薄切醋炒爲末塗喉中甚效

一方　射千（卽扁竹花根）擂汁醋和嚼之引涎出卽愈

一方　馬勃爲末吹入或加白礬甚妙

預防喉閉　初覺咽喉腫痛卽用硼砂含化嚥津自

無虞也

喉閉將死　取鱷胆汁點入即瘥

一方　白殭蠶條直者佳糯米泔浸去絲焙乾拭淨肉毛口甲炒爲末薑湯調下一錢以吐出頑痰爲驗最妙方也

腮腫　以蚯蚓泥傳之

喉痺痰盛　炒甘草二兩桔梗一兩米泔水浸一夜每服五錢水一鍾半入阿膠半片煎服即瘥

喉閉垂死止存餘氣　巴豆去皮線穿納喉中牽出即通纏喉風　巴豆二粒紙捲作角切斷兩頭以針穿孔內入喉中氣透即通

一方　用紙撚蘸巴豆油燃火刺喉中或搗巴豆綿裹隨左右納鼻吐出惡血頑涎即寬鼻雖少生瘡無碍

喉閉　膽礬爲末醋調嚥吐痰涎立效

喉風　急取溺壺內厚甲半盞蜜五匙灌下即愈

此方升麻四兩過於升提恐誤之宜慎之

雲韶注

一方　急用皂莢搥研擂水灌服取吐即不吐亦可灌服

[illegible]粒研爛

候乾去巴豆取礬研末臨症用少許入喉中取頑痰吐出即愈

一方纏喉風　白殭蠶二錢生薑自然汁少計和水灌下即愈

一方纏喉風　用萬年青根頭切碎打爛絞汁灌下吐出頑痰即愈倘口閉用小牙刷掘開灌下如不吐再用髮稍進喉間吐涎即愈

乳蛾　臘月八日雄猪胆一個裝入白礬末陰乾之後研末再入臘八日猪胆內如此三四次如遇患者用一二分吹之即愈

單乳蛾喉癬喉瘡腫痛吐嚥不下命在須臾者　鳳凰衣微火焙黃橄欖核瓦上火煅存性孩兒茶各等分爲極細末每一錢加冰片半分吹之即能進食極效

一方　急用皂莢搥研擂水灌服取吐卽不吐亦可

一方緊喉風　升麻四兩剉碎水四碗煎一碗灌服

一方緊喉風　白礬三錢火煅化入巴豆肉二粒研爛候乾去巴豆取礬研末臨症用少許入喉中取頑痰吐出卽愈

一方纏喉風　白殭蠶二錢生薑自然汁少許和水灌下卽愈

一方纏喉風　用萬年青根頭切碎打爛絞汁灌下吐出頑痰卽愈倘口閉用小牙刷掘開灌下如不吐再用鬚稍進喉間吐涎卽愈

乳蛾　臘月八日雄猪胆一個裝入白礬末陰乾之後研末再入臘八日猪胆內如此三四次如遇患者用一二分吹之卽愈

單乳蛾喉癬喉癌腫痛吐嚥不下命在須臾者　鳳凰衣微火焙黃橄欖核瓦上火煅存性孩兒茶各等分爲極細末每一錢加氷片半分吹之卽能進食極效

喉風口噤死在須臾　胆礬五分半生半熟熊胆木香各三分爲細末用番木鱉磨井華水調和以雞翎蘸掃患處卽消

喉閉及纏喉風單雙乳蛾湯藥不下者　巴豆七粒去殼三生四熟性　明雄皂子大一塊鬱金一伯如蠶肚大者佳爲細末每服半劑清茶調服如口噤咽塞用竹管吹納喉中須臾吐痰卽愈

肩背胸脇諸痛　肩背痛乃太陽經症多因風濕而成也常常作痛爲兼氣鬱滯痛時痛時止爲兼氣虛夜甚時止爲兼血虛痛則項强爲風氣鬱甚痛則肩背重着爲濕氣鬱盛痛則喘眩爲痰風凝鬱也　胸痛之症有氣血鬱痛熱飲鬱痛頑痰作痛頑痰老痰也吐唾稠黏痰盛也　脇痛左屬瘀血右屬痰氣肝實痛則太息難以轉側虛則痛引肩胸積食痛則脇間扛起一條積飲痛則欬嗽痰盛稠黏也

肩背疼痛　通氣防風湯羌活獨活各一錢川芎炙草藁本防風各五分蔓荆子三分水二鍾煎一鍾温熱服如有寒濕加附片防已　兼氣鬱加木香

陳皮香附　氣虛加升柴參耆　血虛加歸芍
血瘀加薑黃靈脂紅花　風盛加威靈仙　濕盛
加二朮　痰風加南星半夏
胸痺刺痛（難當）　栝蔞仁去油薤白白酒煎服若更喘
息短氣不時欬嗽難卧加半夏
胸痛　顛倒木金散木香鬱金各爲末每服二錢老
酒調下氣痛倍木香血痛倍鬱金虛者加人參
胸脇滿痛（爲寒者）　生薑一觔搗渣留汁慢炒待潤以
絹包於患處欵欵熨之再以汁炒再熨良久自愈
脇下刺痛　小茴一兩枳殼五錢麩炒爲末每服二
錢鹽酒調服神效
胸腹俱滿　羚羊角燒灰水服方寸匕（即數分）
脾中積冷食已胸滿而痛　橘皮一兩炙草白鹽各
四兩煮乾點服覺腹疼稍時瀉下惡臭即愈
風濕臂痛　白鳳仙花浸燒酒飲之
痰注臂痛　天仙藤白朮羌活白芷各三錢薑黃六

錢法半夏五錢薑五片水煎服

脇痛 紅及半身甚發水泡 紅花五分粉甘草二錢大瓜蔞一個重一二兩者連皮搗爛一劑而愈醫旨緒餘

風濕臂痛 防風當歸各二錢麻黃五錢秦艽一錢木瓜豨薟草海風藤白茄根各三錢酒二觔沙鑵內煎四五滾在臂上薰洗每日二次不可怠略卽愈此方用之無不響應

心腹諸痛世少眞心疼痛眞心痛者則面黑肢冷至節在肢骨陷處疼痛乃逆症也

若痛時橫滿連胸爲肺心痛連胃脘名胃心痛連臍名脾心痛連腰名腎心痛連小腹名大腸小腸痛連脇名肝心痛時痛時止口吐清水名蟲心痛中惡腹痛名痓痛寒邪外干名中寒痛悸而痛名悸心痛水停心下爲飲痛思慮傷心爲傷痛也又有停食停水停痰胃火氣滯血疾諸痛皆不死之候也

卒心痛 急燒陳倉米灰和蜜服之不爾則逆

一方 白羊乳温熱服之

一方 猪心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食之

一方 楓子生南海地方根皮燒存性研以新汲水服一錢極驗

心下大痛 胡椒四十九粒乳香去油一錢研勻男用生薑女用醋當歸酒下

一方 胡椒五分沒藥三錢去油研細分二服用温酒下

一方 胡椒菜豆各四十九粒研爛分二服酒下

胃心痛冷氣 香附醋淬七次良薑酒炒七次各研末分開用蠟封因氣者附二錢薑一錢因寒者薑二錢附一錢兼病者各一錢或一錢五分以葱一根鹽少許開水調服名薑良散又名獨步散

一方 草菓延胡索靈脂與沒藥男用酒女用開水點醋服心痛手帖却四味等分為末每服二錢

一方 厚朴薑汁炒二兩官桂二兩五靈脂醋炒二兩為末每服一錢或酒或開水送下

一方 桑黃三錢肉桂一錢五分為細末無灰酒冲

服神效

一方 卒痛並治 乾薑末米飲服一錢

胃火痛 田螺殼燒研水服

一方 敗兔毫筆頭三個燒灰無根水服之中惡腹痛並治

蟲痛 苡仁根一勫切碎水七升煮三升服之蟲死盡出也

一方 白鴿屎燒存性研末米飲服一錢 屎名古蟅越

一方 熊胆一大豆許和水服之立愈 攻心大痛欲死面白見鬼

一方 羅晃子 出廣西 犀牛子各七枚水煎服其蟲自下 開口

一方 兼寒 川椒四兩炒出汗酒二碗淋之酒服

一方 或厥肢 梹榔二兩酒一盞煎半盞分二服

一方 發則心痛欲死 甘草粉蜜湯甘草二兩胡粉一兩蜜四兩以水三升先煮甘草取水二升去滓內粉蜜攪令勻煎如薄粥温服一升即止

一方無分老幼並治　雷丸炮一兩檳榔一兩生大黃一兩生甘草一兩俱忌見火晒乾或帶人身邊令燥各等分爲細末每服三錢雞鳴時用紅糖一兩沖湯調服仍卧兩時卽愈

疰痛風尸鬼邪惡氣中在皮中注灌如針刺着人腹痛不可忍及走痛無常　野貓頭骨燒灰酒服二錢

誤中飛尸　以麂頭骨燒灰飲服

鬼排　卽鬼擊其痛着人如刀刺狀胸腹內切痛不可抑按或吐血下血　以醋酒吹兩鼻內卽止

疰痛中惡刺痛　靑羖羊屎燒烟熏鼻卽愈諸瘡中毒及痔瘻熏之亦良

一方中惡　犀牛角燒灰水調服兼治飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶中風失音等症服同上法

脾心痛冷痛者　乾薑良薑等分炮研末米糊丸梧子大每食後後猪皮煎湯服三十丸

一方 檳榔良薑各一錢半陳米百粒水煎服

一方 荔枝核爲末醋服二錢數服卽愈

肝心痛 其人色蒼欲死 雄狐屎 屎在竹木及石灰上尖頭者方是 灰喉如喘息 卽數分

二升燒灰和薑黃三兩搗末空腹酒下方寸匕日二服甚效

停水腹痛 椒目二兩巴豆一兩去皮心熬膏以棗膏爲丸麻子大每服二丸溫水下其痛卽止

停痰心痛 小白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服方寸匕立止 卽數分

蟲痛 寸白蟲痛 日食檳子七顆滿七日皆化爲水也

一方 檳子一百枚去皮尖火撚啖之經宿則蟲消下也胃弱者五十枚須上半月服之小兒蟲痛亦同方

一方 諸蟲在藏久不愈者皆可治之 檳榔五錢炮爲末每服二錢以葱蜜煎湯調服弱者每服一錢

心腹冷痛 以布裹胡椒安痛處用熨斗熨之令椒

出汗即止

一方 胡椒三七枚清酒吞之或一歲一粒

一方 燒酒入飛鹽飲之即止

一方 久年不愈者 煎胡椒茶以頭醋和勻服之

一方 新汲水飲一杯即愈男子病女人取之女人病男子取之

氣滯痛 米醋磨青木香温服

一方 眞蛤粉炒極白同香附醋炒末等分薑汁調服或白湯淬服

一方 黃雞雞子一枚打破醋三合調服

一方 並滯氣者 黃鼠狼即鼬鼠也心肝肺一具陰乾瓦焙爲末入乳香沒藥俱去油孩兒茶血竭末各三分每服一錢燒酒調下立止

一方 臘月取白兔血和茶末四兩乳香末二兩搗

一方 韭菜自然汁飲數次共效如神 雲谿傳方

出汗即止

一方　胡椒三七枚清酒吞之或一歲一粒

一方　燒酒入飛鹽飲之即止

一方久年不愈者　煎胡椒茶以頭醋和勻服之

一方　新汲水飲一杯即愈男子病女人取之女人病男子取之

氣滯痛　米醋磨青木香温服

一方　眞蛤粉炒極白同香附醋炒末等分薑汁調服或白湯淬服

血瘀痛其痛如刺　烏賊魚腹中墨醋磨服之藏器炒研醋服亦可

一方　黃雞雞子一枚打破醋三合調服

一方並滯氣者　黃鼠狼即鼬鼠也心肝肺一具陰乾瓦焙爲末入乳香沒藥俱去油筱兒茶血竭末各三分每服一錢燒酒調下立止

一方　臘月取白兔血和茶末四兩乳香末二兩搗

爲丸芡實子每温酒醋化服一丸

一方及蟲痛　黑驢屎絞汁澄清飲之疰癖癥瘕及翻胃不止牙痛皆效

陰毒腹痛　燒酒温飲汗出卽止

陰陽易症少腹急痛　熱酒吞猪卵二枚卽瘥

陰症腹症面色青者　白鴿屎一大抄研末熱酒一鍾和勻澄清頓服卽愈

冷氣入腹漸見陰囊腫滿日夜疼悶欲死　以布裹川椒包囊下令開口

熱氣大通日再易之以消爲度

停痰痛　白芥子炒末用酒醋調服

血瘀痛因傷損精血者　上伏日取青犬或白犬胆一枚熱酒服半個瘀血盡下凡血積痛並治

九種氣痛　石菖蒲良薑各二錢爲末每服一錢滾水調服

腹痛嘔瀉　秫秫子連苗一兩杉木鑷花一兩水二碗煎一碗服之卽止

胃心冷痛　胡椒乾核桃皮紅棗肉焙乾各等分研細末白燒酒爲丸每丸重一錢疼時用燒酒調服不善飲者白滾水下

蟲痛寸白蟲爲患　石榴根皮椿樹根皮楝樹各五錢爲末先吃雞肉湯後服此藥三錢或五錢卽愈

氣滯痛　紅豆子七個燒存性研末甜酒送下卽愈

九種氣痛　桂心末一錢五分酒一鍾煎半鍾去渣温服二三次卽愈

悸心痛　丹砂白礬等分爲末每服五分白開水下

蟲痛或血瘀痛　猪牙皂灰火煨半焦研極細末每用二釐酒調下五分

急心痛　烏梅一個棗核二個杏仁七個男酒女醋調下

尸注中惡腹痛如刺　烏白皮煎濃汁合丹砂末一錢服之

心腹急痛係蟲作痛　乾地黃搗汁和麪作餜飣食之卽

下其蟲忌用鹽

一方氣滯血瘀 蒲黃炒五靈脂製等分爲末每服三錢酒煎服名失笑散產後心腹絞痛或血迷不省人事最妙首方並治崩血心腹痛甚

一方血瘀痛 南山查肉炒一兩水煎用童便紅沙糖和服亦止兒枕痛名獨聖散

蟲心痛 鶴蝨炒爲末肥肉汁調服

一方 蕪荑和麪炒黃爲末米飲下

氣滯胃痛 荔枝煆存性五錢香附醋炒一兩爲末每服二錢鹽湯或米飲下單服醋湯下亦效並治婦人血氣作痛名蠲痛散

血瘀作痛因食熱物及鬱怒致死血留胃作痛者 韭汁合桔梗湯服之

腎氣上攻致心作痛者 五苓散合韭汁爲丸空心茴香湯下每服三錢

陰毒腹痛 急用葱白搗熨臍上

心腹卒然脹痛　備急方急煮熱湯（須百沸湯）以漬手足冷即易之

中惡心腹痛　宰白毛烏骨雞覆心口上即瘥即死亦以此法治之要骨俱黑者良（如鬼擊用血塗之或滴目中俱妙）

蟲心痛　取白馬尿服之即止

大小腸血瘀痛（痛在少腹切痛不止）　婦人油髮燒灰酒服二錢

腸中瘀血作痛　韭菜汁冷飲下之即愈

心胃痛（火痛也）　山梔七枚炒焦黃水一盞煎七分入薑汁三匙熱服立止

一方（寒痛）　陳皮香附吳茱萸良薑石菖蒲各等分水一碗煎七分滴麻油五點熱服即愈

一方（積滯痛）　巴豆一粒燒灰棗肉爲丸服一小丸立止再用一大丸畧臍內立愈

胃脘急痛（非勞即痰）　用鹽五分放尖刀頭上炭火上燒紅冷水一茶杯將燒紅刀鹽淬入攪和飲或吐或

不吐卽愈

心痛　硃砂木香各三錢黃占一兩化開爲丸如菉豆大每燒酒服七丸極痛時方服衛生備要

蟲心痛牙關緊閉欲死　老葱白五莖去皮鬚搗汁用匙送入咽喉中隨灌麻油四兩但得下咽卽甦少頃蟲積皆化黃水而下神效

一方　用麻油一鍾煎滾冲燒酒一小鍾乘痛急飲

一方　烏梅三個川椒（開口）十四粒煎服卽愈

一方　心頭疼急不能當吾有仙人海上方萹蓄醋煎通口服管教時刻立安康

一方　雄黃末一錢烏梅肉三錢爲丸如豆大俟痛時卽用酒冲服輕者二丸重者三丸集驗方

一方　生芝蘇不拘多少預備之俟痛時亦不必看隨手取來放銅鍋內炒黑爲末以好酒送下極效

一切氣痛　烏藥酒浸一夜炒茴香炒青皮去白炒良薑炒各等分爲末溫酒或童便調下

一切氣痛發則欲死者　香附薑黃甘草等分爲末每用鹽湯下三錢溫當神方

冷氣腹痛　艾葉同香附醋煮爲丸梧子大每薑湯下五十丸

胃氣疼痛及九種心痛　千年石灰一兩生熟白礬各五錢共爲末薑汁丸桐子大或薑湯燒酒送下七丸即愈

鬼箭打　鐵屑細淨末二兩胡桃一觔淨肉桃仁八兩同入磁器內加好酒四觔隔湯煮以糯米置上俟熟爲度每日不拘時隨量煖服蓋被發汗服時痛稍甚服完漸愈勿以服藥時痛而中止也

一方　炒山梔炒麪桃頭七個杵餅貼患處次日作七丸投炭火中燒响即愈單方全集

神箭　狗骨燒灰三錢山梔七個飛麪香椿各一兩醋調敷不可針刺

蟲心痛腹中一切蟲積皆可治之　小楝樹根四兩向東不出土者佳

君子去殼二兩生薑片三兩作一服水煎去渣再煮至一碗加蜜四兩又煮至一碗露一夜擇朔日五更徐徐熱服蟲出立愈多者再服除根小兒減半

一方　槟榔二錢陳皮八分木香五分黑丑二錢研末每用沙糖湯調服五錢行三四次以米湯補之忌魚腥油膩三五日小兒三錢醫方纂要

腰痛　凡患腰痛極甚面色忽紅忽黑是心腎交爭爲逆症也悠悠作痛腰不能舉爲腎虛痛疼痛無常掣引手足爲風痛得熱則減爲寒痛冷痛重着遇寒即發爲寒濕痛氣滯聚痛不散爲氣滯痛痛難反側伸屈爲閃挫痛血瘀不移痛如錐刺爲血瘀痛有日輕夜重者熱注於足時止時痛爲濕熱痛腰如物覆往來走痛爲濕痰痛也

腎虛腰痛　破故紙十兩酒浸蒸爲末胡桃肉二十兩去皮研如泥蜜和每日酒調一匙或水調服故紙屬火堅固元陽胡桃屬木潤燥養血有木火相生之義忌芸薹羊血加杜仲名青娥丸

一方　大茴炒研以猪腰子割開摻末在內濕紙裹煨熟空心鹽酒送下

一方　猪腰子一枚切片以椒鹽（開口）淹去水入杜仲鹽炒末二錢在內荷葉包煨食之酒下

一方　青羖羊脊骨一具搥碎和蒜薤食飲少用酒

神效

一方　羊腎去膜煮熟陰乾爲末酒服方寸匕（即數分）日三服屢驗

一方　鹿角屑蜜浸焙至少帶黃色晒乾搗篩爲末三兩空心酒服方寸匕（即數分）日三服

一方　四味菓（出祁連山竹刀剖之則甜餘刀非宜）同犬腰煮熟同食之每日一次久患者食一月痊愈

虛寒腰痛（即寒痛也）　白羊頭一具草菓仁麪裹煨熟四枚肉桂一兩生薑半觔哈昔泥一豆許胡椒煮去藥食肉

一方　鹿茸酥炙兔絲子酒浸炒各一兩加鹽炒小

茴香五錢爲末以黑羊腎二對去膜同酒煮爛搗如泥和丸梧子大陰乾每服三十五丸温酒曰三服極妙

一方（痛而覺冷）健猪腎一對桂心二錢水八升煮三升分三服

寒濕腰痛　大茴香炒研末每食前酒服二錢

一方　槟榔十二枚半生半熟爲末酒煎服甚良

血瘀腰痛（或滯氣）　山查核五錢无上焙乾煅存性爲末老酒吞服二三次痊愈

一方（其痛如刺）　大茴炒研每食前鹽湯下二錢外以糯米一二升炒熟袋盛拴於痛處亦治寒濕痛

濕熱腰痛　絲瓜仁炒焦擂酒服以渣封之

一方　絲瓜根燒存性爲末每用温酒服二錢

閃挫腰痛　神麯煅過淬以酒温服

濕痰腰痛　猪腰子一枚批片鹽椒醃過入甘遂末（開口）三錢荷葉包煨熟食之酒送下

閃挫　煎好濃茶五合投醋二合頓服

損傷腰痛　冬瓜皮燒灰研末酒服一錢

腰脊卒痛不能轉側　鹿角五寸燒赤投酒浸之隨意飲服自愈

腎虛腰痛　杜仲故紙俱鹽水炒蓯蓉酒浸去甲劈破除內膜酒蒸半日焙乾青塩各五錢爲末猪腰子一對破開入藥在內煨熟酒送下

腰腎冷痛　橘核炒研末酒沖服

小便閉癃遺尿不禁

膀胱熱結則成閉癃輕者一日數十次或勤出無度莖中澁痛也重者爲閉症見小便閉無點滴下出少腹脹痛難伸也膀胱寒虛則成遺尿不禁輕者爲遺尿謂不知而尿出也重者爲不禁謂知而不能固也癃閉不通如因熱實不化則大便亦鞕陽虛不化則多厥冷惡寒陰虛不化則午後發熱而不渴氣虛不化則小便不急滿但多倦怠懶言凡患諸淋不可概以實熱而論如果純熱而實則必口渴咽乾淋痛尿血少腹急滿也有石血膏氣勞五淋又有痰淋一症如精結成石爲石淋血與尿同出而痛爲血淋精溺俱出如膏混濁或如粥形爲膏淋便濇餘瀝爲氣淋內傷勞脾或勞腎或思慮勞心而成爲勞淋也至於七情過度初患梅核

氣久變噎膈上吐下秘或婦人肥白多痰氣鬱白濁帶下日久而成淋爲痰淋閉癃諸淋總宜通氣清心平火利濕若專用補劑病反增劇也如係內傷氣虛陽虛陰虛則又宜於温補中加以清利忌用攻下也遺尿不禁及諸淋白者多爲虛寒赤者或補之不應則必有虛熱也

癃閉陰陽熨臍法　用葱白一觔細切入麝香五分拌勻分作二包以一包置臍上先以炭火熨斗熨至半炷香時換一包又以冷水熨斗熨之互相遞熨以尿通爲度

癃閉探吐法是症諸藥不效或服藥即吐或服攻下藥不利急以　木通老葱煎湯服之頃時探吐再服再吐以尿通爲度

癃閉汗法諸藥不效或身無汗者　以葱湯入木桶內令病人坐於机上没臍爲度匝腰繫裾以覆之少時汗出其便自利欲尿時不可出桶即於桶內溺之恐出桶氣收而尿又回也

石淋　鯉魚齒一升研末以三年醋和分三服一日服盡卒患者用酒送下

一方　燕屎末以冷水服五錢旦服至食時當尿石水下

一方　牛角燒灰酒服方寸匕（即數分）日五服以尿石水爲愈奇效

一方　胡椒朴硝等分爲末每服二錢白湯下日三服即愈

一方（熱甚痛不可忍）　苡仁水煎汁熱飲夏月冷飲即愈

石淋及諸淋　石首魚頭中石十四個當歸等分爲末水二升煮一升頓服立愈

血淋　蓮房燒存性爲末入麝香少許每用米飲調服二錢五分日二服

一方（痛脹將死）　以藕汁調髮灰二錢服之至三日即血止痛除時珍方

血淋及諸淋　木龍湯木龍（即蘡薁山中野葡萄也）　竹園荽淡竹葉麥冬連根苗紅棗肉燈心草烏梅當歸各等分煎湯代茶飲之

膏淋　青羖羊春骨燒研末榆白皮煎湯服二錢

血淋　海螵蛸末一錢生地黃汁調服或加赤苓等分爲末每服一錢柏葉車前湯下

一切熱淋脹滿　芝麻皮一兩炙甘草三兩水七盞煎一盞日三服取效

一方無分男女　野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎七分入童便三分空心温服婦人血瘀腹痛同方

一方　生藕汁生地黃汁野葡萄根汁各等分每服一盞入蜜温服

卒患淋症　牛耳中毛燒灰取五分水服尾毛亦可

久患淋症　啖粟米粥月餘卽瘥但宜絶去他味

淋瀝不止卽氣淋也　取敗鼓皮燒灰飲之

淋症莖痛　麪煨槟榔赤芍各五錢爲末每燈心湯服二錢空心日二服

五淋　石決明以鹽同東流水煮一沸時去粗皮研末水飛熟水服二錢每日二服如淋中有硬物卽

如朴木末五分

五淋白濁　小螺螄一碗連殼炒熟入白酒三碗煮至一碗挑肉食之以酒下數次卽愈

老人五淋（身熱腹滿）　小麥一升通草二兩水三升煮一升飲之

小便閉澁　急流水煎清利藥飲之卽愈

小便滯澁（身體煩熱）　嫩鹿茸合葱苗煮食之

上吐下閉（爲關膈閉塞）　生猪脂薑汁各二升微火煎至二升入酒五合煎五上五下每服方寸匕（卽數分）噎膈翻胃及大便閉結者亦用此方

小便不通　磨刀交股水一盞服之立效

一方　雞子黃生吞數枚卽通

一方　大麥奴（卽麥中黑者是也）煎濃汁頻服之

一方　苦壺蘆煮汁漬陰囊卽通不利者以兎毛燒灰水服

一方　燕屎豆豉各一合陳米糊丸梧子大每以白

湯下三九日三服

一方 脹急 象牙生煎服之立通或以象肉煮汁服之亦妙

一方 數而微腫者 陳久兔毫筆頭一枚燒灰水服

一方 千歲子出交趾境 十數枚打碎煎清飲下即通

一方 葡萄根煮汁飲之亦消腫滿

一方 臘生猪脂一勺水二升煎三沸飲之立通

一方 田螺一個鹽一錢葱一根合搗勻封臍上立通

一方 螻蛄三個田螺一個麝香一釐先安臍內猪牙皂共搗爛作餅貼臍上煮好俟便下數次方去

一方 大蒜頭揀如菜豆大一粒指頭捻熟放馬口內即通

一方 韭菜汁車前汁以酒冲服即通

下虛遺尿 羊脬一個裝水在內炙熟空腹食之四五次即愈

夢中遺尿　猪脬洗淨炙熟食之

一方　白朮四兩苦參四兩牡礪粉六兩爲細末以黑健猪胆二個煮爛共搗丸菉豆大每淡鹽湯服三錢自愈

老小尿牀　熟飯一碗傾尿牀處拌與食之卽止勿令本人知之

小便頻數　大茴不拘多少淘淨入鹽少許炒研爲末糯米粥蘸食之

腎虛便數　鹿茸一對酥炙爲末每服二錢温酒下日三服

一方　鹿角霜白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服三十丸鹽湯下男子陽虛同方

一方　益智仁鹽水炒烏藥等分酒煮淮山藥爲糊丸鹽湯下名縮泉丸遺尿同方

小便不禁　雞腸一具作臛和酒服

一方　以雞腸水煮汁服日三服遺尿遺精白濁消

渴同方男用雌女用雄

一方　白雄雞翎燒研酒服方寸匕　即數分

一方　取喜雀重巢中草一團燒灰每服二錢以薔薇根皮二錢煎湯服之日三服

一方　上熱下寒者　法製鹿角霜爲末酒糊丸梧子大每三四十丸空心温酒下

胞轉淋閉　阿膠三兩水二升煮七合温服

女子轉胞　小便不通腹脹如鼓數日垂死者　用猪脬吹脹以翎管安上插入陰孔捻脬氣透入即大尿而愈

小便過多　象牙燒灰飲之或象肉亦可

小便不通　因熱者　栝樓仁焙去油研末酒調服或米飲下二錢

一方　陽虛不化者　葱管吹鹽入莖中即通轉胞危急者用亦極效

遺尿　胎前産後遺不知時乃熱甚之故以致陰孔鬱結神無所依是以不能收禁也　白薇去鬚酒洗白芍酒炒爲末等分酒服三錢

尿牀　以桑樹上桑螵蛸炙食之卽止小兒最驗

淋症　石韋去毛微炒爲末冷酒調服崩中同方

石淋血淋屬熱者　牝牛膝濃煎汁加乳香麝香少許服之

五淋腫滿　榆白皮搗屑作粥食以便利爲瘥

小便不通　用烏臼根皮煎湯飲之

淋症　海金沙滑石飛淨生甘草等分每燈心湯下二錢

血淋　蜣螂燒存性研末水服

小兒遺尿　大甘草頭煎湯夜夜飲之自愈

妊娠遺尿或不禁　雞內金燒灰爲末酒調服一錢

二便不通　杵葱白塡臍中艾火灸七壯立通集要方

一方　臘月取白兔屎一匙安臍中冷水滴之令透自通也

一方　雄鼠屎爲末敷臍中立效

一方　栝樓爲末蜜湯調服二錢或以童便葱白同煎服之

一方　胡椒二十一粒打碎水一盞煎六分去滓入芒硝五分煎化服之

一方　腹脹如鼓諸藥不效　水中新採大螺連殼一枚以鹽和搗碎帛繫臍下一寸三分須臾即通

一方　秦艽爲末以牛乳點服兼治黃疸煩渴便赤

一方　因素多酒色脹滿呻吟數日不愈乃濕熱之邪壅滯精路也　川楝實入茴香川山甲各一錢宰牛二錢各法製爲末分二服急流水煎湯送下自愈

多則二服即通

一方　烏臼皮南向根白皮晒乾爲末熱服二錢須先以芒硝二錢煎湯服取吐爲妙

一方　猪蹄一個以硃砂少許入蹄內線紮緊煮熟

一方　柹椰爲末蜜湯調服二錢或以童便葱白同煎服之

一方　胡椒二十一粒打碎水一盞煎六分去滓入芒硝五分煎化服之

一方　腹脹如鼓諸藥不效　水中新採大螺連殼一枚以鹽和搗碎帛繫臍下一寸三分須臾即通

一方　秦艽爲末以牛乳點服兼治黃疸煩渴便赤

一方　因素多酒色脹滿呻吟數日不愈乃濕熱之邪壅滯精路也　川楝實入茴香川山甲各一錢穿牛二錢各法製爲末分二服急流水煎湯送下自愈

一方　經月閉結欲死者　推車客即蜣螂也七枚男用頭女用身土狗七枚男用身女用頭新瓦焙乾用虎目椒南向皮煎汁調服多則二服即通

一方　烏臼皮南向根白皮晒乾爲末熱服二錢須先以芒硝二錢煎湯服取吐爲妙

一方　猪蹄一個以硃砂少許入蹄內線紮緊煮熟

食之

一方 六七月糞中大蜣螂十餘枚用線穿陰乾收之臨症用一枚須全者放淨磚上四面以灰火烘乾當腰切斷如大便不通用上截小便不通用下截各爲細末取井華水服之若二便不通全用之

淋症 男婦血淋 酒瓶頭箬葉 三五年者佳 每用七片燒存性入麝香少許陳米飲下日三服

一方 或血糞或沙石脹痛 川牛膝一兩水煎服

一方 蜀葵花根洗剉煎五六沸服之如神

一方 熱淋如血 蠶紙燒灰入麝少許水服二錢極效

一方 兎絲子酒蒸五錢澤瀉二錢五分桑螵蛸炙五錢爲末蜜丸梧子大每空心米飲服二錢

尿血 兼治肺疽吐血或吞上出血若鼻衄吹之立止 茅草根車前子湯調髮灰下立效赤水元珠

小便不通 麥麪和作圈圈臍外鯽魚一尾連鱗腸搗爛入麝香三分生蜜四兩和勻填滿臍上圈內

以碗覆之熟睡立通

一方 用獨頭大蒜一枚梔子七枚鹽花少許搗爛塗紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立效

一方 閉而垂危者 桃枝柳枝木通川椒枯礬各一兩葱開口白七莖燈心一把水三十碗煎半用磁罐熬盛一半薰外腎週圍以被圍繞不令外風得入冷即易之其效大奇醫宗必讀

腎水 玉莖長强不痿精流不歇乃爲腎滿 韭菜子破故紙各一兩爲末每服二錢水一鍾煎六分作三次飲愈則勿服

經驗良方

小便不通 腹脹欲死 蚯蚓五七條研爛投入凉水一碗攪勻澄去泥滓飲下即通

一方 腹脹如鼓危急將死 鳳眼草 即臭椿樹子 皂角四兩水煎五六沸加麝少許入磁罐內將玉莖入罐口內薰半炷香時使藥氣入竅即通屢用屢驗

男子下淋婦人赤白帶下 寒水石蕎麪各等分研

細末五月五日用水爲丸彈子大陰乾臨服時用一丸燒灰存性爲末黃酒調服汗出卽愈如得病重者先以熱鹽熨臍或以白雞血塗臍男用雌女用雄其效如神

傷寒後便閉　生薑八九塊杵碎水十餘碗麻布五六尺同煎數沸用桶盛候可通手以布頻熨小便良久用紅豆末一錢江茶二錢井華水調服小便如注赤水元珠

大便燥結　燥有熱寒實虛氣血風及直腸結之分熱燥爲陽結其人能食脉浮數有力與三陽熱症同見也寒燥爲陰結其人不能食脉沉遲有力與三陰寒症同見也實燥卽胃實鞕燥與腹滿同見也虛燥卽脾虛先鞕後溏之燥與少氣腹縮同見也氣燥卽氣道阻滯之燥與噎膈翻胃同見也血燥卽血液乾枯之燥與久病老虛同見也風燥卽久患風病之燥當從風治也直腸結卽燥屎巨鞕結在肛門難出之燥也宜詳審之

大便熱燥不通　症因胃實諸積熱結於裏而成痞滿燥實三焦大實大熱者　大黃酒洗四兩厚朴炙去皮半觔枳實炙五枚芒硝三合以水一斗先煮朴實取五升去滓次入大黃

更煮取二升去滓再入芒硝更上微火一兩沸俟温分服得下卽止勿再服此方果見日晡潮熱譫語發狂手足濈濈汗出肚腹滿痛大便鞕小便數脉實大而滑胃滿不能卧者方可與之

一方表症已去宜忌解而反發汗利小便亡其津液病轉入胃以致大便難者　麻仁二升芍藥半觔只實半觔大黃去皮一觔厚朴去皮一觔杏仁去皮尖熬另作脂一升六味以蜜和爲度桐子大每飲服十丸日三服漸加以大便和爲度

此方惟熱甚而裏實者可用若熱微而虛者切禁之

一方或吐或下或發汗後不解胃家失潤症見微煩小便數大便因鞕裏熱未甚者　大黃四兩厚朴去皮炙二兩枳實炙三枚以水四升煮取一升二合去滓分温二服初服湯若大便利卽止不爾者再令緩緩服之

一方胃家受病自汗出或發汗小便自利爲津液內竭故腸胃乾燥糞留滯直腸難出　蜜煎導方用蜜七合一味納銅器中微火煎之稍凝

似餡之狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺子令頭銳大如指長二寸許當乘熱時急作冷則硬以納穀道中用手急抱欲大便時乃去之

一方外導法　內臺方用蜜五合煎凝時加皂角末五錢熬捻作挺以猪胆汁或油潤穀道納之

一方外導法　大猪胆一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效

一方外導法　內臺方以小竹管插入猪胆口留一頭用油潤納入穀道中以手將胆捻之汁自入內矣

一方外導法　肘後方採土瓜根搗汁用筒吹入穀道

一方外導法　以豆醬汁灌入穀道卽通

一方外導法　以生薑削長二寸塗鹽入穀道卽通

一方外導法　以青羊胆灌之卽通

一方外導法兼結胸者　瓜蔞蒂溫水泡吹入穀道卽通以上皆熱燥導法

大便寒實不通症因寒氣冷食留胃心腹滿痛大便不通者　大黃二兩

乾薑二兩巴豆去皮研如脂一兩先搗黃薑爲末再納巴豆搗至千餘杵和蜜爲丸如豆大藏蜜器中勿洩氣用時每服三四丸煖水或酒下兼治中惡心腹脹痛如錐氣急口噤如卒死者灌之當差不差更與三丸取腹鳴吐利便愈若口噤者當用一以吹鼻自能下咽此直攻寒實結於腸胃也

大便寒虛不通老人腸胃枯竭以致大便虛秘 硫半丸硫黃入猪大腸內爛煮三時半夏以麻油浸至三五日炒乾爲末各等分生薑糊爲丸每服二錢白湯下外用握藥方巴豆仁乾薑韭子良薑硫黃甘遂白槟榔各五分爲末合均水和分二粒先以花椒湯洗手麻油塗手心握藥移時便瀉欲止則以冷水洗手

大便虛秘大便先鞕後溏乃膀胱虛之故 松子仁栢子仁麻子仁俱去油各等分研如泥溶白蠟和丸梧子大每五十丸黃芪湯下名三仁丸

一方 以補中益氣湯加大黃朴硝煎服之

大便血燥秘結血燥者血液乾枯也　潤腸丸白當歸生地黃大枳殼桃仁麻仁等分爲末蜜丸米飲每早服之風燥者以生地枳殼易羌活大黃神效久病老虛患此症者亦宜用之

一方三陽熱結亡其津液以致腸胃乾燥大便不通亦血燥也　更衣丸硃砂五錢研如飛麪蘆薈七錢研細生用二味以好酒少許和丸每次服一錢二分好酒下飯丸亦可

氣燥此症因七情感傷以致上氣喘急胸膈不快妨悶飲食　四磨飲人參檳榔沉香烏藥四味各磨濃水取七分煎三五沸放溫空心服之卽愈

一方　大檳榔二枚麥冬煎湯磨汁溫服或以蜜湯調末二錢服

老人虛秘　透明阿膠二錢葱白三根水煎化入蜜二匙溫服

燥結導法　烏梅十顆湯煮去核納肛中卽通

老人虛秘　以人乳常服之甚良

大便血燥難出　桃仁爲末水調服方寸匕即愈

大便熟燥　烏臼木根方長一寸劈破水煎半盞服之立通但不可多服

大便虛秘或老人或久病諸虛或產後難行導藥者　蘇子胡麻各半合研極細用水再研取汁一碗煮粥食之先下結漸得通利此方最妙最穩效若影響

一方　松子仁去皮酒一鍾研極爛滾水冲服即利

大腸火盛肛門腫痛難便或生痔並肛門邊生癤毒者　槐米不拘多少炒深黃色土地上去火毒爲末空心黃酒調服三錢服三四次即愈若生痔或癤毒多服自消極驗

一方吐傷津液以致胃中壅熱胸不脹滿而腰腹脹滿者　大黃去皮酒浸四兩甘草炙二兩芒硝半升水三升先煮二味取一升去滓入芒硝更微煮兩沸少少温服之上皆爲胃家實症首方爲熱甚致燥故以攻熱爲急二三四方爲奪血致燥故以滋燥爲主也

不藥良方

續集卷五

C116/2535
v. 7.

不藥良方續集卷五

婦科

婦人經水調勻何患不育如不調則血有紫黑黃泔淡紅淺白瘀塊諸形或稠粘臭穢或清澈臭腥之氣甚至內潰而見五色似乎膿血及臟腑敗氣或先期或後期或經行發熱時熱或寒熱身痛或腹痛或吐瀉或錯妄吐衄或過多兼時下白帶或患血滯血虧血枯諸般經閉或經閉嗽久成勞及五色帶下崩漏癥瘕痃癖積痞瘀血血蠱症形症

月經不調　阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱酒服之即安虛者或加辰砂末五分

經血妄行或吐或衄或血崩也　魚膠切炒新棉燒灰每用二錢米飲調下即愈

經行不止　牡蠣煅研成粉以米醋摶成團再煅研醋調艾末熬膏爲丸桐子大醋湯下四五十丸

一方　阿膠蛤粉炒焦爲末酒服二錢

一方　瑞蓮散陳蓮蓬殼燒存性研末每服二錢熱酒下神效

崩漏經血忽然大下不止爲經崩經行之後淋漓不止爲經漏　木耳半觔炒見烟爲末二錢一分頭髮灰三分共二錢四分以應二十四氣好酒調服少出汗

一方或白帶　以韞燒灰酒服二錢白用白韞紅用紅韞如兼見者紅白俱用

崩血　鯽魚一個長五寸者去腸入血竭乳香在內棉包燒存性研末每二錢熱酒調下

一方　勃薺一歲一個燒存性研末酒服之

一方　陳年蒸餅燒存性米飲服二錢

一方 腹中疼痛 毛蟹殼燒灰米飲服一錢

一方 蟹殼煆槐花香附醋浸炒各等分研末每服三錢黃酒調加童便送下至重者三服即愈

一方 不止者 老絲瓜燒灰棕櫚燒灰等分鹽酒下或鹽湯下

一方 不止者 蓮房荊芥穗各燒存性等分爲末每米飲服二錢

赤崩白帶 淡菜燒熟飽食一頓即愈

一方 即馬項上毛也燒灰酒服赤用赤馬毛白用白馬毛

一方 及諸氣疼痛欲絕 以鹿血和酒飲之立愈

一方 取開口數分 椒目炒研細每温酒服一鈎

崩血及赤白帶下 以水牛角胎燒灰飲服日二次

積年漏下不斷困篤者即數分 以喜鵲重巢中柴燒灰研末飲服方寸七日三服一月取效

經閉 苡仁根一兩水煎服數次即愈

一方　乾絲瓜一個爲末同白鴿血調成餅晒乾研末每服二錢空心酒下但須先服四物湯三服

一方　白馬駒胎衣煆存性爲末入麝香少許空腹時用新汲水下三錢不過二服卽通

一方　野貓陰莖燒灰東流水服之男子陰癨同方

一方　茶清一瓶入沙糖少許露一宿服之

一方　數月不行而所積之血與濕化而成白物時時自下宜先去濕　明礬煆三分杏仁一分爲末煉蜜丸棗核大納入陰中卽愈甚者再納之神效

室女經閉其人素弱難任攻下者　澤蘭葉湯澤蘭葉三兩當歸白芍各一兩甘草五錢爲粗末每服五錢以水二盞煎一盞溫服兼服柏子仁丸柏子仁炒去油另研牛膝酒洗卷柏各五錢澤蘭葉續斷各二兩熟地三兩五錢蜜丸梧子大每空心米飲下三十丸

一方　雄鼠屎一兩炒研空心溫酒二錢

經斷復來已過七七經水復來屬血熱也　黃芩心末二兩醋和爲九溫酒下

五色帶下　白馬左懸蹄燒灰酒服方寸匕（即數分）日三服

室女白帶　鹿茸酒蒸焙二兩金色狗脊製白斂製各一兩爲末用艾煎湯糯米糊丸梧子大每溫酒下五十九日二服

婦人帶下　白羊脬一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之必死

一方　臘月收存白兔皮燒烟盡爲末酒服方寸匕（即數分）以瘥爲度

卒然赤白帶下　以李根白皮炙黃煎湯飲之日二服即愈

白帶滑數虛冷者　鹿角屑炒黃爲末酒服二錢

血氣疼痛　紅麴擂酒服之良產後惡露不盡同方

孕婦忌服

血氣刺痛　荔枝核燒存性五錢香附炒一兩爲末

每服一錢鹽湯或米飲下

一方　紅藍花一兩以酒一大升煎至減半頓服一半未止再服取其通經行血也

乾血氣痛　絲瓜一枚燒存性空心温酒服

崩血不止　諸藥不效須防滑脫　地榆苦酒煎地榆一兩醋煎露一宿次早温服立止止後隨症調治之

帶下　屬濕熱少腹脹痛汚水連綿　導水丸牽牛頭末滑石水飛黄芩川大黄生用等分爲末蒸餅作丸量虚實服

一方　屬寒濕少腹冷痛黑水不止　萬安丸牽牛頭末胡椒木香小茴香焙各等分爲末水泛爲丸量虚實服

一方　或因瘀血所結或瘡瘍濃出及白濁白淫者　威喜丸白茯苓四兩去皮作塊用猪苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出晒乾去猪苓以茯苓爲末用黄臘四兩煉化爲丸彈子大空心細嚼滿口生津徐徐咽服以小便清爲度忌米醋只喫糠醋忌動氣

血滯經閉　茜草一兩煎服神驗

月經逆行逆行者吐衄也　鬱金末和韭汁薑汁童便量人虛實服之

卒然崩血　黃芩一兩水煎入酒少許服之

經水不調　條芩酒炒白朮土炒各一兩當歸酒浸洗八錢白芍酒炒七錢爲末酒糊作丸如黃豆大每二十五丸經水前一日服四五服

經閉及赤白帶崩漏或産後積血癥瘕腹痞並男子腸風下血五淋五勞七傷小兒骨蒸潮熱諸症　無極丸錦紋大黃一觔分四分一分以童便一盞食鹽二錢浸一日晒乾一分以醋酒一碗浸一日切晒再以巴豆三十五粒同炒去豆一分以紅花四兩泡水一碗浸一日去歸切晒各依法製共爲細末煉蜜丸梧子大每五十丸空腹温酒下取下惡物爲驗未下再服此藥宜六癸合之乃武當高士孫碧雲方也

經水不調或前後或多少及胎前不安産後惡血不下兼治冷熱虛勞腰脊骨節煩痛並寒疝

痛引陰中自汗欲死　明理方丹參洗淨切晒爲末每服二錢温酒調下常服功倍四物

白帶不止因濕熱者　槐花牡蠣煆過等分爲末每酒調服二錢

崩血或下血　槐花一兩棕灰五錢白鹽一錢水三鍾煎至減半服之

崩血不止　槐花三兩黃芩二兩爲末每服五錢酒一碗銅秤錘一枚以桑柴火燒紅浸入酒內調服

漏血不止　槐花燒存性研末每服二錢食前用温酒送下

白帶　松香五兩酒二觔煮乾木臼杵細酒糊丸梧子大每服二三十丸取效

令婦有子　二月丁亥日取杏花桃花陰乾爲末戊子和井華水服方寸匕(即數分)日三服

一方　楢罟子(出廣西)浸好酒內三日取飲每日飲二次百日當主懷孕

一方　立春日所下雨水是日夫婦清旦虔取各飲一杯可以有孕取其資始發育萬物之義也

令婦產男　採虎鼻懸門中一年取下作屑熬與婦飲便生男兒但勿令人及婦知之知則不驗

轉女成男　明徹丹砂重三五兩者令孕婦佩之良

月經壅滯臍腹疼痛　當歸元胡各等分爲粗末每服三錢加生薑三片水煎服名元歸散

臍腹疼痛不省人事者　木通去皮芍藥炒五靈脂炒各等分咬咀每服五錢醋水各半盞煎七分温服

種子奇方不但種子且無小產產後諸症　香附砂鍋內醋煮熟水洗焙末一勘當歸身酒洗焙末十兩鹿角刮去粗皮爲末三兩綿紙墊鐵鍋內火炒末二兩和勻醋爲丸每服三錢早晚各一服白湯下一月後入房即孕名歸附丸

婦人常服却病方　神仙附益丸香附一勘童便浸透水洗淨露一宿晒乾再如此三次用益母草十二兩洗烘爲末再用香附四

雨艾葉一兩煮汁加醋大半共爲糊丸梧子大每日百丸空心下　此方能治婦人百病生育之功如神胎前産後俱服神妙無比藥雖不貴而功效倍常眞仙方也宜常服之

白帶　雞子一枚頭開一孔放硫黃末五六分用紙封好外用濕紙重重包裹火內煨熟空心燒酒送下連進三枚卽愈

一方　雞子一枚頭開小孔入白礬末一錢五分辰砂末五分用紙重重包裹醋浸濕火內煨透帶微烟存性去紙將蛋並殼爲末加麝香五釐分二服每早熟黃酒調服卽愈重者再服一蛋無不痊矣

赤白帶下　白朮五錢白芩二錢車前子一錢雞冠花三錢白帶用赤花赤帶用白花水煎服神效

經行不止　側柏葉白芍藥各等分水煎半沖酒服

經閉　厚朴炙三兩桃仁紅花各二錢水煎一碗空心二次服三貼卽通

崩血不止　陳年舊棕燒灰存性每服三錢酒下

一方　好桂心不拘多少瓦上煅存性空心米飲服三錢神效

婦女血厥平居並無疾苦忽然目閉口噤如死狀或微知人事眩冒移時方醒是卽血厥乃因出汗過多血少陽氣獨上以致氣塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方醒　白薇當歸各一兩人參五錢甘草一錢五分每服五錢水二盞煎半溫服

崩血　血餘四兩絲瓜灰四兩好酒送下

血熱妄行　荷葉艾葉側柏葉生地黃俱生用各等分搗爲丸雞子大每服水二鍾煎八分服

胎前諸症 婦人受孕即宜分房靜養則不生相火不受胎孕謹戒飲食五味則脾胃調和母之氣血易生子之形成必育內調七情外避風寒起居安順不持重用力不安逸多睡不登高涉險刻保胎元不致有犯則母無病子亦安生育亦順不然則百患隨之矣

胎前不慎有惡阻胞阻子種子滿子煩子懸子癇子嗽轉胞子淋激經胎漏胎動不安小產墮胎子死腹中胎痿不長子瘖藏燥鬼胎等症其餘胎前傷寒食瘧痢霍亂泄瀉與男子雜症門中參治之

胞阻 即妊娠腹腰疼痛 **鹿角截五寸長燒赤投一升酒中** 即數分 **又燒又浸如此數次研細末空心服方寸匕**

一方 更兼內熱大小便閉 用蜂蜜芒硝煎化服之以二便通爲驗經曰有故無隕是也名蜜硝煎

胎上逼心 以葡萄根及藤葉煎汁飲之卽安

胎動不安 阿膠炙研末二兩香豉一升葱白一升水三升煮取一升入膠化服

一方 腰痛下血 阿膠炒二兩熟艾葉二兩葱白一升水四升煮一升分服

一方 因數慣傷胎下血不止者 鯉魚一尾治淨阿膠炒一兩糯米二合水二升入葱薑橘皮鹽各少許煮臞食之五七日見效

一方 腹痛下黃水 陳糯米一合黃芪川芎各五錢水一升煎至八分作二次溫服胎漏下黃汁或如豆汁同方但黃芪須二兩川芎一兩

胎漏 卽妊娠無故下血也血出人門腹不痛 卽數分 豆醬二升去汁取豆炒研酒服方寸匕日三服

一方 童子雞一隻去毛臟塞生嫩黃芪在腹內縫

好用沙鍋盛雞安鐵鍋內不用水以稻草在鍋底緩緩燒熟將雞肉淡喫之黃芪烘乾研末每黃酒服五錢俟用三隻全愈

一方　蓮房燒研麪糊丸梧子大每服百丸湯酒隨下日二服

妊娠尿血尿與血同出也尿血出尿孔亦不痛　豆醬一大碗乾生地爲末每服一錢米飲下

一方　阿膠炒黃爲末食前粥飲下三錢

一方屬膀胱熱也　四物湯加血餘白茅根煎服以涼之

妊娠下血　阿膠三兩炙爲末酒一升半煎化服之

一方　阿膠二兩炒爲末生地黃半觔搗汁入清酒二升分三服

一方　黃明膠二兩酒煮化頓服

一方　生鹿角屑當歸各五錢水三盞煎至減半頓服二服卽愈

一方初胎至四五個月下血者　取葱白一大把煎湯飲之卽安

下血皆屬胎漏也

妊娠血痢　阿膠二兩酒一升半煮至一升頓服

一方久痢不愈者　龜甲一枚醋炙爲末米飲服一錢日二服取效產後下痢不止者亦宜之

妊娠感寒　鯉魚頭燒灰爲末酒服方寸匕（即數分）令汗出即愈

一方　大鯽魚一頭燒灰酒服方寸匕（即數分）若無汗腹中緩痛者以醋服取汗

妊娠瘧疾　夜明沙末三錢空心温酒服

一方　端午日午時用大蒜頭黃丹和爲丸桐子大臨症令患者清早向東南方服四丸無根水下

胎痿不長　鯉魚肉同鹽棗煮汁服

子啼孕婦腹中或有鐘聲或兒在腹中啼哭爲子啼　黃連煎黃連一味煎湯調空房中鼠穴內土服之自愈

臟燥孕婦無故時時傷悲哀痛象若神靈憑依爲臟燥　甘麥大棗湯甘草三兩小麥一升大棗十枚以水六升煮取三升分

三次温服此方亦能補脾虛

胎傷欲墮症因跌撲築磕致痛欲墮 益母丸五月五日或六月六日採益母草陰乾以石器碾爲細末煉蜜丸如彈子大每用一丸入童便好酒各半杯研化以川芎當歸煎湯沖服

墮胎腹痛下血不止 羚羊角燒灰三錢豆淋酒下

若面黃唇白者則宜服獨參湯

墮胎腹痛因中毒藥者 生白扁豆去皮爲末米飲服方寸匕煎濃汁飲亦可

墮胎血瘀不下狂悶寒熱脹痛 生鹿角屑一鍾爲細末以香豉湯服一錢日三服須臾血下即安亦治子死腹中湯中加葱白

子死腹中不下 取伏龍肝水調三錢服之其土當於兒頭戴出博救方

一方胞衣亦不下血上沖心 雀麥一把水五升煮二升温服亦治産難

一方　麝香當門子一枚桂心末二錢温酒服即下

一方　雄鼠屎二七枚水三升煮一升取汁作粥食之即下

一方　濕黃牛糞墜腹上即下

一方　烏骨母雞一隻去毛以水三升煮至二升去雞用帛蘸汁摩臍下自出

一方　夜明沙燒灰酒服方寸匕即下（即數分）

一方（月未足者）　大豆煮醋服三升立便分解未下再服

妊娠小便不通（因伏飲者）　萊菔子炒爲末燈心湯下產寶方

孕中有癰　苡仁煮汁頻頻飲之

妊娠少腹痛尿澁（乃膀胱水病熱甚也）　導赤散生地三錢木通二錢甘草梢一錢燈心一團煎服

死胎不下　丹砂一兩水煎和酒研服即下

一方　用珍珠末一兩苦酒調服即下胞衣不下用之亦良

轉胞症見飲食如常但煩不能臥不得小便是也　血餘一團燒灰酒服

立通

托胎不墜慣墜胎者受孕一兩月以此方托之　杜仲八兩糯米煎湯浸透炒斷絲續斷二兩酒浸淮山藥六兩乳蒸爲糊丸或棗肉爲丸米飲下亦治胎漏

子死腹中　榆白皮煮汁服之立下

子煩孕婦別無他症惟時時心煩爲胎熱乘心　產乳方以竹瀝汁不拘多少細服卽止梅師方加茯苓煎

驗胎法　婦人經過三月用川芎末空心熱湯調一匙服腹中微動者是胎不動者卽知經閉也

死胎不下　麝香一錢水研服立下

固胎法　常以四五年老母雞治取清湯煮粥食之永免墮胎

胎漏或下黃汁或如豆汁甚多者　銀苧酒苧麻根二兩剉碎紋銀五兩清酒一盞以水二大盞煎至一大盞去渣分二次溫服

預防難產臨產一月方服之　乳香去油五錢枳殼一兩爲末蜜丸每服三十九

妊娠傷寒護胎法　井底泥青黛伏龍肝爲末攪勻塗孕婦臍中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

死胎不下未足月者　川芎三錢當歸益母草各五錢爲末調勻服夏月加大黃三錢麝香五分冬月加肉桂三錢麝香五分或再加丹參五錢更妙

妊娠胎動已見黃水者　乾荷葉蒂二枚炙研糯米泔水調服卽安

妊娠血痢　白芍三錢條芩一錢五分地榆白朮各八分甘草水煎服三服卽愈

妊娠浮腫先自兩足漸至喘悶足趾出水乃素有風氣或冲動血脈並非水腫也宜服後二方

香附陳皮甘草烏藥天仙藤微炒洗各等分焙末每服三錢水一盞薑三片木瓜紫蘇各三分煎七分空心日三服腫消卽止

一方　羌活蘿蔔子同炒香去子取活爲末每服三

錢溫酒調下每日一服五服立愈皆驗方也

死胎不下　用芒硝二錢童便溫酒調服立下

生育孕婦房內四時俱要寒溫適中太熱太寒均非得宜夏須清涼勿令炎熱以致產母中暑暈迷倘有其事不妨少與涼水以解之冬須溫煖勿令寒冷以致血凝難當多備火爐使產母腰背下身就火烘之穩婆本不可少之人然須先擇老成歷練明白經事者無故切勿令其先使試水探漿等事手法房中人多語聲喧嘩以致產母心氣虛怯產時困乏名曰驚生須急摒去只留服役一二人使寂靜而無嘈雜則母心始安胎亦帖靜如至八九個月或腹內疼痛痛定仍然如常名曰試胎宜服養血安胎之藥若月數已足腹痛或作或止而腰不痛者名曰弄胎二者皆非正產之時不宜躁擾憂疑惟宜靜待其時將至臨產坐草不宜太早如兒身未順帖可寬待倘使產母用力太早往往逼胎不正多至

橫倒悔遲之憂既至臨產腹內如覺動轉疼痛亦須安詳切勿驚慌惟舒體仰臥或時時緩步容兒身轉如兒頭頂正當產門穀道挺出胞漿大下腹腰重痛中指中節或本節跳動方爲正產之時方可臨盆是時用力送兒自然順生矣生育時有交骨不開盤腸難產等症臨症者宜詳審其因而治之

交骨難開　開骨散當歸二兩或三兩川芎二兩敗龜板酷炙一具油髮一團燒存性須用生過子女婦人之髮爲末合勻每服五錢水一盞酒半盞煎八分乘熱沖服未效再服若氣血不足加人參塞

加薑桂熱加黃芪汗加桂枝摘加荊穗以意消息

加減其效如神髮灰燒未化者服之恐偶滲入肺管用時務將未化之髮去淨爲要

預防難產及血氣痛　有妊時取海馬雌雄成對帶於身邊（雄者青色雌者黃色）臨時燒末飲之並以手握之卽易產

一方　以水獺皮毛令產母帶之卽易產

一方　馬齒莧同馬齒煮食臨產易下忌鱉肉

一方　葵花葉煮汁飲之葉黃莖赤者不堪用不可與鯉魚黍米同食葵花心亦不可食

一方　冬葵子秋種經冬至春始結子者取一二合杵破水煮服即數分

一方　取雄鼠燒灰研末井華水服方寸匕日三服

一方　臨產時細嚼馬槟榔數枚井華水送下須臾立產再以四枚去殼兩手各握二枚神效然此藥婦人不宜常食恐冷子宮絕孕

難產　取蓮花一瓣上書人字吞之即易產

一方　採人面子出海南及廣中令產婦手握一枚單日用右手雙日用左手握之即下

一方　七月七日取不落水猪心一個帶血用乳香不去油不拘多少拌勻搗丸每丸約三錢二三分硃砂爲衣俟乾錫瓶封固臨期令婦面東以滾湯調服一丸即下亦名開骨散橫生倒生用之實驗

一方　新鮮黃牛糞三錢百草霜三錢茅草燒鍋者佳生漆渣三錢靈仙三錢用無灰酒煎一二滾或煎至一茶杯或半杯服之立產

一方　金毛狗脊半個燒去毛打碎煎水服自順速

一方　取臘月白兔血以蒸餅染之紙裹陰乾爲末每服二錢乳香湯下

一方　臘月取白兔腦子一個攤紙上夾勻陰乾剪作符子於面上書生字一個候產母痛極時用釵股夾定燈上燒灰煎丁香酒調下

一方　臘月採白兔頭骨收之臨症連毛燒灰酒服

一方　眞兔毫敗筆頭三個金箔三片以蠟和丸燒灰酒服二錢

一方　羚羊角一枚削尖上末酒服方寸匕（即數分）催之

一方　以騾蹄燒灰入麝香少許酒服一錢即下

一方　取郎君子一個或一對令產婦手握之則兒即下極驗（此物產南海有雌雄狀似杏仁亦難得之物若置醋中即兩相盤旋不能已）

一方　白雄雞距子燒灰酒冲服即易產

一方　用龜甲燒末酒服方寸匕（即數分）即下

一方（水衣先破不即產者）　魚鰾膠五寸燒存性爲末溫酒服

一方（經日不下者）　鹿糞乾濕各三錢研末薑湯調服

難產及胞衣不下　以雞子白生吞之

難產及胞衣不下痲血攻心脹欲死者（即數分）　臘月收白兔毛臨症燒灰酒服方寸匕極效

難產或子死腹中及胞衣不下者　採必思答產回部見忽必烈飲膳正要集中酒煎服之即下

一方　以慈菇搗汁一升服之即下

盤腸產（腸乾不上）諸藥不效　以磨刀水少許潤腸煎好磁石水一盃温服自然收上此乃扁鵲神方

一方　以萆麻子仁搗爛貼產婦頭頂心處俟腸收上急以水先淨內服大補氣血藥加以升提之味預防暈迷

滑胎易產　孕婦將產急取井華水服半升屢驗

難產催生　外臺方大麥芽一升炒研末和蜜一升服之神驗

難產及子死腹中　以蟹爪煎湯服之即下

橫生倒生（手先出爲橫生又爲頁臨生足先出爲倒生皆孕婦將產錯用努力所致也）

手先出者急令產母仰臥略以鹽半分塗兒手心仍以香油抹之輕輕送入推上扶直待兒之身轉頭正然後服芎歸湯以助精力如渴則以蜜半小盞香油半小盞入滾水化開飲之可以潤燥滑胎令其易產饑則食以稀粥令其中氣不乏審是兒欲來方扶挾產母起身用力送之兒即生矣如送手入後兒轉快則不必服藥足先出亦如上治法

死胎不下　以平胃散一兩投朴硝五錢煎三五沸

温服其胎即化水而下切勿輕易用刀動傷兩命

盤腸生　未產腸先出也并有產後腸仍不收　急將淨盆盛温水遇寒天則用熱水少入香油養潤待兒并胞衣下時令產母略略仰臥自己吸氣上升并令穩婆以香油塗手徐徐送入

一方　以半夏爲末搐鼻中其腸自上

一方　以麻油潤火紙撚點火吹滅將烟熏產母鼻中腸自上

一方　以潔淨器盛所出之腸濃煎黃芪湯浸之腸即上此法最佳收後再服大劑補中湯更妙或因產母用力太早兒并胞衣下後膀胱壅出產戶者亦同前法徐徐送入收後宜服安內臟藥

逆產催生　催生如神散百草霜取釜底心者白芷不見火各爲末等分每服三錢以童便米醋調和如膏加沸湯下或童便酒煎進二服此方大能固血潤血

一切難產　益母草酒煎濃汁加童便一大杯服之

難產或遇一兩日夜不能生下或橫生倒生及胎衣不下　生半夏白蘞等分爲細末急以無灰酒調服一錢神驗之極

一方　順生散用婦人舊頭繩一條燒灰服之虛者加參服之

湖南鮑雲韶云金箱易閉喉管服之暴亡道光二十八年春衣瘦席氏生產三日不下醫生葉西園法以此方登時不語以手指口而亡以此涉訟人多知之此集法難產方甚多可擇他方用之此方務宜詳審為要

溫水半

按產婦

一方　以潔淨器盛所出之腸濃煎黃芪湯浸之腸即上此法最佳收後再服大劑補中湯更妙或因產母用力太早兒并胞衣下後膀胱壅出產戶者亦同前法徐徐送入收後宜服安內臟藥

逆產催生　催生如神散百草霜取釜底心者白芷不見火各爲末等分每服三錢以童便米醋調和如膏加沸湯下或童便酒煎進二服此方大能固血潤血

一切難產　益母草酒煎濃汁加童便一大杯服之

難產或遇一兩日夜不能生下或橫生倒生及胎衣不下　生半夏白蘞等分爲細末急以無灰酒調服一錢神驗之極

一方　順生散用婦人舊頭繩一條燒灰服之虛者加參服之

一方三兩日不下者　眞金箔十張溫水研勻再添溫水半盞先令產婦虛坐令一婦用兩手將大指按產婦兩肩穴服下其胎即下矣

一方　灶心土一錢爲末酒送下仍以酒調搽母臍中卽產

一方　酒娘麻油蜂蜜童便雞子白各半盞煎温服卽下

一方經日不下者　眞雲母粉五錢温酒調服卽產

產後丹溪曰胎前當以清熱養血爲主產後宜以大補氣血爲主雖有雜症從未治之益恐後之學者不善用之多有風寒未解瘀血未盡亥施補劑反致大害不可不察也產後有胞衣不下產門不閉血暈惡露不下惡露不絕頭疼心胃痛腹痛少腹痛脇痛腰痛偏身痛腹中塊痛筋攣傷食嘔吐阨逆氣喘浮腫發熱寒熱自汗頭汗中風痙病痰癖抽搐不語驚悸恍惚亥言見鬼發狂虛煩發渴咳嗽衄血痢疾瘧疾勞虛羸血崩大便秘結小便淋閉及頻數不禁淋漓大便出血敗血成癰種種形症臨症者不可拘泥一偏當合形症脉三者詳審虛實庶不致悞

胞衣不下　蓮房酒煎服之卽下蓮蒂亦可是症多

因血入衣中爲血所脹故不得下治之稍緩則脹滿沖心疼痛喘急多屬難治

一方 奪命散沒藥血竭各等分研細未兒纔產下即用童便甜酒各半盃煎一兩沸調下二分良久再服其惡血自隨胞衣而下自免上衝心胸且免諸疾

一方 以洗兒水一盞與飲之即下勿令產母知之

一方 以草紙燒烟熏產母鼻令氣內納即下

一方 以滾水一鍾磨好墨一二匙沖服即下或以酒磨更妙

一方 以草麻子仁四十九粒搗塗右脚心衣下速洗之

一方 令產母將自己頭髮填入口中作嘔即下

一方 黑牛糞略焙帶潤以布裹之束於腹上即下

一方 以酒和臘生豬脂能凝者爲脂煎服之多服爲佳

一方 生豬脂一兩水一盞煎五七沸服之即下

一方　生鹿角屑三錢爲末薑湯調服速驗

一方　急以水入醋少許噀面即下神效

玉門腫痛因初產傷重玉門腫痛者　濃煎甘草湯洗之其腫自平如玉門不閉則爲氣血不足所致宜大補湯預防血暈　荆芥穗微炒爲末三錢俟兒一產下即用童便入温水調服或豆淋酒調服名華陀愈風散虚者加人參五錢

血暈產後或因去血過多面唇色白或因惡露不盡面青色赤俱宜　川乾漆燒烟及用火燒鐵釘醋淬時時熏之自醒

一方因去血過多血脱而暈者　清魂散澤蘭二錢人參二錢川芎五錢荆芥穗微炒一兩炙甘草二錢共爲末温酒熱湯各半盞調一錢灌之下咽眼即開氣定即醒血瘀者以佛手散服之

一方血瘀　清酒一升和生地黄汁煎服

一方因血瘀者　魚鰾膠燒存性酒和童便調服三五錢其效如神

一方 因血瘀者 鹿角屑一段燒存性出火毒爲末酒調灌下卽愈

迷痧脹 卽產時昏迷也 產婦頭頂中必有紅髮三根急用烏鴉糞母猪糞各一兩滾水冲和澄清去渣並速將頭頂紅髮用銀針挑下以火煅入糞水內温服卽醒

血暈 因血瘀者 苧麻皮與產婦作枕枕之

惡露不下 皆因產後風冷相干以致氣滯血凝而不行腹中脹痛宜攻之 以酒下螃蟹立通

一方 取雞子一枚入醋一半攪服

一方 大黑豆熬令烟盡酒淋服

一方 蒲黃生用五靈脂研末酒飛去砂石生用各等分爲末童便與酒各半盞調服

一方 巴蕉根搗汁飲之

惡露不絕 卽產後汚血日久不斷時時淋滴乃因瘀行未盡停留腹內隨化隨行者 以臘月猪取白兔頭骨連毛燒灰酒冲服若因衝任

虛損血不收攝者又當用大補氣血之藥也

心胃痛因風冷寒凝氣血滯澁者　生薑五兩水八升煎服

一方　新羊血一盞飲之三兩次即止中風血暈欲死熱飲一升即活

一方血上攻心刺痛欲死　取搏母猪湯温飲一大盞即愈

一方　以藕煮汁隨意温飲之梅師方

血滯腹痛及吐血崩中帶下　鯉魚鱗燒灰酒冲服

一方血滯者　以兔頭炙熟摩腹間即止

一方　黃犬頭骨燒灰酒服一錢甚效

一方瘀血未盡以致作痛　鹿角屑燒灰研極細末豉汁服方寸七日三服

一方血滯者　苧麻皮安產婦腹上即安

一方產後胞寒者　以香桂散服之即佛手散加桂心等分酒調服

少腹痛產後蓄水作痛症見小便不利淋滴脹痛　馬齒莧搗汁三合煎沸入蜜一合攪勻服之產寶方

兒枕痛 產後少腹微痛乃血塊未盡惡露積於太陰也 用山查煮汁以沙糖調服

一方 以蟹殼燒灰酒沖服

腹中塊痛 因新產之後風冷乘虛而入以致瘀血凝結者 大茴香二十七瓣葱頭三莖胡桃三枚兩前陳茶一撮白糖一撮水酒各半碗煎八分服之卽愈

產後呃逆 皆因氣血兩傷脾胃虛寒中焦之氣逆而不順所致 丁香豆蔻散

丁香白豆蔻伏龍肝各等分爲末生薑湯點服或用桃仁吳萸煎湯沖服如不止以參附湯大補之若見發熱面赤小便紅乃屬熱實也宜用茹橘飲

竹茹橘紅各三錢柿乾一枚水薑煎服

一方 呃逆煩亂 取柿餅一個煮汁熱飲產寶方

產後氣喘乃極危之症 如因惡露不行敗血攻肺而喘則面色紫黑屬實症奪命散下之瘀去喘止方見胞衣不下 若面色淡白則屬虛症也用二味參蘇飲入參一兩爲末以蘇木二兩煎湯沖服

氣分浮腫症見輕虛浮腫心胸脹滿因素有水飲所致也　枳术湯枳實炒白术土炒各二兩水煎分服

虛汗　小麥麩牡蠣等分爲末以猪肉汁調服二錢日二服

一方　猪肝薑汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸匕（即數分）

產後悶亂口乾腹痛因血氣上攻也　梅師方生藕汁三升飲之

一方　藕汁生地黃汁童便等分煎服

產後寒熱心悶極脹　自病青羖羊角燒灰酒服方寸匕（即數分）即愈

產後煩悶汗出不識人　羚羊角燒灰爲末東流水服方寸匕（即數分）若因敗血冲心者加芍藥枳實等分炒研末飲下

產後煩燋不食　白犬骨燒灰研末水服方寸匕（即數分）

產後痙瘛抽搐或頭身强直乃因去血過多風入於臟與破傷風同不可遂作中風而治

魚鰾膠一兩以螺粉炒焦去粉爲末分三服煎蟬
湯調服甚效

產後中風角弓反張口噤攣搐五緩六急手足麻痺
頭暈眼眩嘔吐煩悶惡血不下等症俱宜
產寶方小黑豆一升炒令極熟乘熱投清酒三
升令熱飲自半鍾至一鍾得微汗身潤則風邪自
除宍如無前症產後飲之亦能逐敗血散結氣除
痛免疾

產後虛羸　煮黃母雞取汁煎藥服黃者土色雌老
者坤象味甘歸脾氣温益胃故所治皆脾胃之病
也

產後咳逆嘔吐心沖目運　石蓮子一兩五錢白苔
一兩丁香五錢爲末每以米飲三錢

產後血崩或因暴怒或因停瘀者　蓮房五個香附二兩各燒
存性爲末每服二錢米飲下日二服

產後肉線不收即腸脫也　老薑連皮三觔搗爛入麻油
二觔拌勻炒乾以熟絹五尺折作方結令人輕輕

盛起肉線使之屈曲三團納入產戶乃以絹袋盛薑就近蓐之冷則更換温至一日一夜縮入大半二日乃盡入也是症亦屬陰挺之候

產後發狂　羊心一具益母草二兩童便浸同煮服汁甚效

產後痢疾有餘之症　以濁水煮黃雞子一枚連水服之

一方血痢作渴屬熱　蓮薏即蓮米中心　生研末米飲服二錢

一方久患渴痢津液枯竭四肢浮腫口舌乾燥　冬瓜一枚以黃土泥裹厚五寸煨熟絞汁飲之傷寒痢渴同方

一方虛症滑脫　以米醋煮雞子黃食之

一方痛下不止　肉豆蔻五個麪包煨至焦黃色乳香沒藥各二錢去淨油爲末入酒炒白芍湯內加砂糖六七匙和勻頓熱服

產後虛悶　阿膠炒枳殼炒各一兩滑石飛過二錢五分共爲末蜜丸梧子大每五十九温水下取效

產後痢疾　蒼耳子葉搗汁服之聖惠方

產後血暈原因產後即臥以致惡血上衝此方仍云寢牀於上不識有無妨礙擬用大窓格令人於住產婦屯於其上或將枕頭墊高或將窓格下側庶可引血下行矣　高明酌之　謹識

玉門不閉　蛇牀子炒熱熨之

產後口渴氣喘面赤有斑大便泄用行經利水之藥不效者　杜牛膝一名地松濃煎膏飲以下血小便通利爲愈此乃破血之劑也用之者勿忽之

血暈因血瘀者　蘇木煮汁服或加乳香去油酒調服

一方　以火淬醋令婦聞其氣自醒

一方　以五靈脂半炒半生水調服一錢

血氣攻心潮熱作渴　百草霜二錢紅花三錢爲末童便一鍾好酒半鍾冲服立止

產後却病　新產時即取烏骨雄雞煮極爛取汁作粳米粥與食自無百病

一方　以烏骨母雞治淨和五味炒香投酒二升封一宿取飲令產母肥白或再加炒芝麻入酒中極妙酒少量加之烏色屬水肥象屬陰故烏雞所治

產後血暈垂死者　紅花數十觔煮湯寢婦於上熏之

湯冷再加不過半日即蘇

玉門不閉　蛇牀子炒熱熨之

產後口渴氣喘面赤有斑大便泄用行經利水之藥不效者　杜牛膝一名地松濃煎膏飲以下血小便通利爲愈此乃破血之劑也用之者勿忽之

血暈因血瘀者　蘇木煮汁服或加乳香去油酒調服

一方　以火淬醋令婦聞其氣自醒

一方　以五靈脂半炒半生水調服一錢

血氣攻心潮熱作渴　百草霜二錢紅花三錢爲末童便一鍾好酒半鍾冲服立止

產後却病　新產時即取烏骨雄雞煮極爛取汁作粳米粥與食自無百病

一方　以烏骨母雞治淨和五味炒香投酒二升封一宿取飲令產母肥白或再加炒芝麻入酒中極妙酒少量加之烏色屬水肥象屬陰故烏雞所治

皆血分之病亦從其類也

胞衣不下　荷葉剉碎水煎濃汁服之即下神效

產後中風　荊芥薄荷等分研末童便冲酒服神效

子腸不收　新鮮鯽魚煮焙研細一半搽腸一半酒服即時收上

玉門不閉　吳茱萸兔絲子各一兩五錢蛇床子一兩硫黃四兩每用四錢水一碗煎湯頻洗自愈

乳症

婦人乳汁不行不脹痛者乃因去血過多血少不行也若脹痛者乃因瘀血停留氣脉壅滯也乳汁自湧者即產後乳汁自湧不止乃氣血大虛非大補不可若少壯者見之又當酌審也又有乳癰之症乃乳房忽然紅腫硬痛增寒壯熱頭痛日久成癰潰則難治初起宜消毒寒熱宜解散成膿穿後或潰後宜培補日久不斂宜大補爲主也吹乳乳巖妒乳乳懸皆婦乳病也吹乳者即乳管結核不通係兒吹所致當早消之久則成癰也乳巖者初起乳內結核如圍棋子不腫不痛且不痒但堅硬不散綿纏數年則從內潰破嵌空玲瓏洞窾深陷有如洞岩皆緣抑鬱不伸或性急多怒傷損肝脾所致其症甚克如不謹戒七情遠葷味解鬱怒多難痊愈也妒乳者即乳頭慢生小瘡疼痛也乳懸一症乃因

產後瘀血上攻兩乳忽然細長下垂過腹也

乳汁不行因瘀血停留者　赤小豆汁煮飲之即下

一方　萵苣菜煎酒服之

一方　母猪蹄一具水二斗煮至六升飲之或加通草六分

一方　狗蹄肉煮汁服之

一方　羊肉六兩麞肉八兩鼠肉五兩作臛啖之

一方　水牛皮作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效

一方　以麞肉或鼠肉一物作羹食均勿令婦知

一方　絲瓜連子燒存性研酒服一二錢被覆取汗其乳自下

一方　因去血過多者　四物湯加花粉王不留行木通猪蹄熬湯煎藥服之外用葱白煎湯時時淋洗自通

一方　穿山甲七片炒研王不留行三錢猪蹄同煮汁飲之其乳如泉

一方 二母散知母貝母牡蠣等分爲細末每用猪蹄湯調服三錢

一方 因瘀血停留者 白丁香王不留行花粉漏蘆殭蠶以猪蹄煎湯服之名湧泉散

乳汁自湧 産後食少乳多欲回其乳者 免懷散歸尾紅花赤芍牛膝各二錢煎服

一方 産後無兒食乳欲斷乳者 麥芽煎麥芽三兩水煎作茶飲

一方 産後乳汁暴下不止者乃氣血大虛宜 大補湯倍用參芪

一方 無兒食乳欲回乳者 神曲炒研爲末酒服二錢日二服

乳汁清少 用死鼠一枚燒灰酒服方寸匕(即數分)勿令乳婦知之

乳癌初起 雄鼠屎七枚研末同搗爛慈白温酒服取汗即散吹乳初起同方

一方 初起腫痛作寒熱 取蕪菁(即蘿蔔苗也)去土不必洗淨用鹽少許搗和封乳患處熱即換之冬用根代一切瘡疽皆可搗敷之醋調敷禿瘡

一方初起者　黃牛齒一個燒存性研末酒調服

一方初起者　煮蒲公英苗飲之及封之立消

一方已成者　新濕鼠屎黃連大黃各等分爲末以黍米粥清和塗四邊即散

一方潰爛者　貓兒腹下毛拑鍋內煅存性搽之

乳癰初發即乳癌症　黃明膠以濃醋化塗立消

乳癌初起　蒲公英金銀花俱須新鮮等分水煎入酒服搗敷亦良

乳癰及乳巖　敗龜板煅存性每服三錢糖拌酒下盡量飲之立消或用燒酒研服

乳癌不論已未破一服即愈　用栝蔞兩個穿山甲酥炙每栝蔞一個用一錢人弱者只用五分粉甘草六錢每個分藥一半搥一孔將藥裝入瓜內用好酒二觔水二觔同煮至一大碗臨臥熱服渣搗爛再用酒水各一觔煎連服將渣乘熱敷滿乳用布捆住蓋被出汗無不立愈

一方 並治吹乳 葱連根搗爛炒熟鋪患處上用瓦罐盛火熨葱上一時葱蒸熟出汗即愈或以葱搗爛炒熟敷之冷即換再炒敷上登時立消此奇穩妙方也

一方 初起者 澤蘭一兩青皮三錢白芨五錢橘葉三十片水煎加酒半盞冲服立效

一方 未結即散已結即潰 橘香散麝香一分陳皮去白五錢研末酒服二錢被蓋出汗即愈

一方 初起二三日者立消 活鯽魚一尾連頭骨生搗極爛香臘糟一團再研勻敷上一日候消小即去不消再貼屢驗第一方

吹乳 即乳管結核不散不早治之日久成瘡 栝蔞散栝蔞實乳香沒藥當歸甘草酒熬服即散服後不散加皂角刺膿成即潰未成即消外用南星半夏殭蠶白芷皂角刺草烏爲末以葱汁合蜜調勻敷之

一方 芸薹子搗爛敷之

一方發寒熱者　生猪脂冷水浸榻熱即易立效

一方硬痛不止　五月五日收黃鱔皮燒灰空心溫服

一方掀痛難忍　鹿角屑炒黃爲末酒服三錢令汗出仍以頭梳梳之立止

一方　韮菜地中蚯蚓糞二錢葱子一錢共爲細末醋調敷乾即易之三次即愈

乳巖未潰　以青皮甘草等分爲末煎濃薑湯常常服之外用木香生地搗餅貼患處以熱器熨之仍常服十六味流氣飲謹戒七情葷腥怒氣如已潰爛又宜十全八珍歸脾等劑培補其氣血爲主也

乳巖初起不腫不痛不痒但堅硬不散　堅硬結核相去乳頭甚遠者先用蒜墊於核上用艾灸三四壯以知疼爲度如平時覺發寒即用新蒲公英連梗葉搗爛加酒糟等分搗如泥敷至數次即止若不發寒反覺熱者即用蚯蚓泥即雨後積水處蚓行所遺之泥加酒醋調敷立效其核若與乳頭較近切忌灸之

乳癌　鮮山藥搗爛塗之外用綿紙蓋定上用絹縛
緊日易二次

妒乳　即乳頭忽生細小瘡痛也　鹿角散鹿角甘草各等分爲末
雞子黃調銅器內炙乾敷之內服清熱涼血藥

一方　榆白皮爲末和陳醋滓調塗日六七次

乳懸　即産後瘀血上攻兩乳細長下垂過腹痛不可忍是也　川芎當歸各二
觔以牛觔剉未入瓦器內　水煎不拘時服其餘觔牛剉
大塊用香爐慢火燒烟安病人面前棹下令烟氣

不絕須口鼻及病乳常吸烟氣以乳上爲度如縮
而仍不復舊用冷水磨蕁麻子一粒於頭頂心塗
片時收即去之

欲令回乳　生炒麥芽各一兩入小雞腹內重湯久
炖去芽食雞食二三隻外用青菜葅葉柏軟貼乳
斷兒吮乳　斷兒之乳須滿三週早則令兒氣血不足　畫眉膏山梔三枚
炒存性雄黃辰砂各少許爲末入生麻油輕粉各
少許候兒睡抹兩眉醒來即不食未效再抹之

前陰婦女前陰有陰腫陰痛陰痒陰挺陰瘡陰痔陰冷陰吹及交接出血諸症陰腫即痰癖也其症子戶腫脹墜痛及兩　疼痛有因心肝二經火盛濕熱下流有因中氣素虛下陷所致也陰痛又名小嫁痛其症陰戶痛極往往手足不能伸屈由鬱熱傷肝脾濕熱下注所致也陰痒者多因濕熱生蟲陰戶痒痛甚則肢體倦怠小便淋漓也陰挺即癲疝也其症陰中突出一物如蛇或如菌如雞冠或因胞絡傷損或因分娩用力太過或因氣虛下陷及熱濕下注所致屬熱者必腫痛小便赤數屬虛者必重墜小便清長也陰瘡又名蠶瘡其症多因七情鬱火傷損肝脾之氣血凝氣滯以致濕熱下注久而生蟲蟲蝕成瘡膿水淋漓有若蟲行其中或有少腹脹悶溺赤頻數食少體倦內熱晡熱經候不調赤白

帶下種種兼症見之或腫疼或重墜潰爛出水而痛宜逐細審治之陰痔俗名茄子疾是症陰中有肉突出流黃水者易治流白水者難治症有虛實之分陰冷一症皆因風寒乘虛容於藏久之血凝氣滯多變他症且難於受孕宜早治之陰吹者陰中時時氣出有聲如穀道轉失氣狀乃由穀氣實胃氣下泄之故亦有虛實之分交接出血者言每於交接轉出血皆因傷損心脾也

陰腫重墜因氣虛下陷也　用防風三錢蘄艾一團大戟一錢熬湯熏洗更以枳實廣皮爲末炒熱騰之內服補中湯其腫自消而痛自定也或用秦艽六錢石菖蒲當歸各三錢葱白五個水二鍾煎一鍾食前服

一方　以新馬鞭草搗汁塗之此治濕熱下流之方與氣虛下陷者不同也

陰痛又名小戶嫁痛症　以四物湯末一料合乳香搗餅納陰中內服逍遙散加丹梔其痛卽止

一方　以海螵蛸燒存性酒冲服亦治陰蝕腫痛

一方或陰痒　以蛇床子同白礬煎湯洗之

陰痒　鯽魚骨燒灰敷數次即愈亦治陰蝕

一方汗出　以生黃豆嚼爛塗之

一方　桃仁雄黃膏桃仁五錢研膏雄黃末三錢二味研勻用雞肫肝切片蘸藥納戶中其蟲即鑽入肝內吮食俟痒止即將肝提出內服逍遙或龍膽瀉肝湯即愈

陰挺氣虛下陷　蛇床子五錢烏梅九枚熬湯薰洗更以藜蘆爲末用猪脂調敷內服補中加青皮梔子自愈

一方　鯽魚頭燒灰研服仍以油調搽之亦治脫肛

陰蝕又名齲瘡陰戶外生疙瘩內生小蟲作痒　生雄雞肝切片納入陰中引蟲出盡即瘥

一方　肥猪肉煮汁洗之不過七八次即瘥男子陰蝕亦治之

一方　光粉炒黃雞雞子裝稀絹罨納陰中引蟲出盡即愈

一方 以水牛肝納入陰戶引蟲出盡即愈

一方 以貓頭燒灰服之

一方及陰症諸瘡 鯽魚炙爲末和油塗之能殺蟲止痛

一方 狼牙草煎湯洗之如瘡深洗不可及以草四兩水四升煮至半升用綿纏筋如繭形浸湯瀝陰內一日四遍蟲取其寒能勝熱苦能殺蟲也

陰脫陰戶開而不閉痛痒出水由產後得者 用荆芥枳殼訶子文蛤大劑煎湯薰洗內服補中湯加北味醋炒白芍服之即愈其薰方如遇因憂思太過而成者亦宜用之內宜服逍遥歸脾等劑俱加柴栀芍丹服之

陰挺 陳石灰熬黃水泡澄清溫洗數次即愈

陰脫 煎羊脂頻塗之神效

陰痔俗名茄子疾 以烏頭燒存性用釅醋熬薰內服逍遥或補中歸脾等劑量其虛實酌而行之

陰冷 用遠志乾薑蛇床子吳茱萸研細末綿裹納陰中一日二次換溫名溫中坐藥宜多服桂附地

黃丸自不覺於受孕矣

一方（陰戶掣痛少腹惡寒）蛇床子散蛇床子末一味用白粉少許水和勻如棗大綿裹納戶中每日溫之

陰吹　膏髮煎婦人頭髮一團用猪膏熬化服之小便利則愈虛甚者以十全湯加升柴以升提之

交接出血　千金方桂心釜底墨等分共爲末酒服（即數分）方寸匕或用歸脾湯加伏龍肝煎服之

不藥良方

續集卷六

c116/2535
v.8

不藥良方續集卷六

小兒初生 有拭口斷臍浴兒藏衣剃頭諸法症有不啼不乳眼不開吐不止石大小便二便不通肛門內合噤口撮口臍濕臍瘡臍突臍風天釣內釣盤腸氣目爛懸癍重齦鵝口吐舌弄舌重舌木舌吐乳夜啼胎黃胎赤赤遊風初生無皮變蒸急驚風慢驚風慢脾風等症用藥施方

最宜詳愼庶不致誤

拭口 小兒初生口中自多不潔 速用軟棉裹指拭口令淨隨以臙脂蘸茶清擦口齒舌頰自免諸病臙脂法

下胎毒 不論四時虛實俱宜 用粉甘草一節水煎濃汁以棉

纏指蘸汁令兒吮之則胎毒自解矣甘草法

一方看兒有胎熱者　用黃連搥碎湯浸出汗時時以少許滴兒口中以臍糞下爲度其毒自清矣黃連法

一方胎熱便閉者　硃砂一大豆許研細水飛過煉蜜調勻乳汁化服最佳稟氣弱者不宜用之砂蜜法

一方怯弱之兒或值冬月以此解之　用豆豉煎取濃汁與兒吮至三五口其毒自開矣豆豉法

一方　韭菜汁少許灌之卽吐惡血永無疾病

一方落地卽用之　橄欖一個燒灰硃砂末五分和勻嚼生芝麻一口吐唾和二藥絹包如棗核大安兒口中待咂一個時辰方可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾及出痘稀少也

一方初生三日宜去驚邪辟惡氣　以牛黃一豆許赤蜜如棗核許研勻棉蘸令兒吮之一日吮盡

一方　俟臍帶自脫卽用帶置新瓦上以灰火四圍燒至烟將盡放土上用磁杯蓋一時辰研末預將

辰砂研末水飛晒乾如帶重一錢加辰砂五分用生地當歸煎汁調前末抹兒上腭間及母乳頭上以一日內服盡次日大便遺下穢濁則終不患瘡瘡及諸疾生一子則得一子矣名延生第一方

拭口　每日夜將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有白點卽以細針挑破取桑樹內汁濾清塗之永無驚風撮口之患慈幼外編方

斷臍法　嬰兒生下先用剪刀向火烘熱剪斷臍帶以六寸爲主　短則傷臟長則損肌斷訖次用火器繞臍帶烙之又用預備烙臍餅子卽豆豉黃蠟等分麝香少許先以豉香研勻鎔蠟量臍大小捻爲餅子貼臍上以防風邪外入隨用細熟艾一塊圍臍帶用軟絹封裹之以避尿濕風邪

三朝灸臍法　用麪和水成薄餅置兒腹穿臍帶於麪上將艾火灸臍帶近臍處或三五炷須下帳避風灸畢仍將臍帶紮好聽其自落至七日方脫者

元氣足也

裹臍法　用白練採軟方四寸新棉厚半寸與帛等合之緩急得中急則令兒吐不可輕解解時閉戶下帳冬間用火令帳內温煖仍以温粉敷之若臍不乾或用枯礬五錢龍骨黃丹各一錢麝香少許爲末敷之或用亂髮燒灰敷之或用黃柏末敷之俱好千金論方

三朝浴兒法　須擇無風處浴之適可而止不可久在水中冬恐受寒夏恐傷熱　以桃槐桑梅柳五枝熬湯加入猪胆洗之能去污穢滋肌膚免生瘡疾

一方　能解惡氣去瘡疥驚風驚癇鬼疰却一切病症　以虎頭骨煎湯浴之腔骨更妙

一方　用苡仁葉煎湯浴之無病

除夜浴兒　七八月或三伏或中秋日剪壺蘆鬚如環子脚者陰乾於除夜煮湯浴之則可免出痘

藏胎衣法　用新瓶一個將胎衣裝入以青布裹瓶

口擇向陽高燥地方天德月空方位處掘地三尺埋之若不嚴密於兒不利　天德卽正丁二坤三壬四辛五乾六甲七癸八艮九丙十乙十一巽十二庚方是也　月空卽正三五七九十一六個月單月在丙壬二方二四六八十十二六個月雙月在甲庚二方是也居家者不可不知

彌月剃頭方須於密室温處剃之爲其氣血未盈寒風易入剃後　用杏仁三枚研細入薄荷三葉再同研將麻油滴三四點合膩粉拌勻搽頭上能避風邪免生瘡癤熱毒不啼俗名草迷　急以葱莖輕輕擊背氣通則出聲矣如無葱以手輕擊之亦可遇夏或灌冷水少許一方其氣欲絶者　急以綿裹抱懷中未可斷臍將臍帶且置炭火上烘之仍作大紙條蘸芝麻油點着於臍帶上往來遍燎之使火氣入臍內則臍中温煖更用熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴斷臍切記之

一方　用石菖蒲搗生汁入口即活赤水元珠

一方恐係肛門爲脂皮閉塞　急用簪通開自能出聲

一方即看喉間恐生懸癗或前腭上有一泡　用棉裹長針微露鋒刺破以帛拭去惡血勿令嚥下即能通氣吮乳

熏臍帶法兒方離腹或值天寒氣爲寒閉聲不能出　急用棉絮裹抱於懷中且勿斷臍用紙撚蘸油點火於臍帶下往來熏之令熱氣入腹則寒得温散氣得煖通啼聲自出矣

初生不乳　慈白寸許破開以乳汁同入磁器內煎三四沸灌下

一方兒生後因腹中臍糞未下致兒腹滿氣短嘔吐不能食乳　以一撿金爲細末用少許合蜜水調服

一方兼兒鼻塞不通　用三煉酥中精液二合木香零陵香各四分煎成膏塗頭上并塞鼻中甚良

一方或因剪刀股裹緊吃乳不下　用獨蒜切薄片放在兩腮以艾灸之如哭即好不哭無救

眼不開由胎中受熱也 熊胆黃連各少許煎水洗之一日七八次其目自開如三日又宜服四物加甘草花粉服之

吐不止脫胎後因便秘腹中穢惡不淨令兒腹滿所致 以一捻金爲末少許飲服之若因感寒及受熱者切勿與之

不小便胎熱流於下也 導赤散生地木通生草燈心竹葉水煎服加黃連滑石赤苓更妙

一方熱甚者 豆豉膏淡豆豉一勺田螺十九個葱一大束搗爛用芭蕉汁調貼臍上內服導赤散不大便又名鎖肚皆在胎受熱毒氣滯肛門所致其兒必面赤腹脹不乳多啼 先用硃蜜法藥治之如不應以一捻金量兒與之卽令婦人温水漱口吸咂兒之前後心手足心并臍心共七處以皮見紅赤色爲度須臾大便自通亦治二便不通

不小便 大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時分四服卽通便通卽能乳若臍四圍有青黑色及口

撮口即臍風又名撮口臍風又名七日風在初生七日內而發也因在母腹受飲食熱毒釀成心肝脾三經之火最為惡症純是火毒人謂傷於風濕非也下方用犀角羚羊最為對症又後九頁灸臍風法不亞仙丹　如未現青筋細看臍上有一紅珠如不見用手摸之必有一珠用墨丘定取皂角邊上之筋快手丘燃在珠上燒一兩下或灯草丘火亦可必然大哭而安可無一失此救臍風第一良方與灸青筋之法功效相同是用別法恐致悞事悔不可追

鮑雲韶補注

猪爭滴少許入口自愈

撮口　口撮如囊不能吮食舌强面色黃赤乃心脾之熱受自胎中而然也其症為危侯如氣高痰盛

辰砂殭蠶散辰砂五分殭蠶一錢直者佳去絲嘴薑炒蛇脫皮一錢炒麝香五分為末用蜜調敷唇口

一方　鯽魚燒研酒調少許灌之仍掐手足兒一歲半仍以魚網洗水灌之

一方是症必先大便熱　生犀角及羚羊角磨水和蜜汁飲之即效急則用大黃甘草各二錢煎服

撮者不可救也

噤口 百日內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭白虫 薄切生猪脂擦之

一方 身熱吐沫 取東行牛口中及頤上白愈之即愈

亦治小兒流涎

一方 及重舌出涎 烏驢乳猪乳各二升煎一升五合服

七日口噤 牛黃爲末以淡竹瀝化一匙灌之更以猪乳滴少許入口即愈

撮口 口撮如囊不能吮食舌强面色黃赤乃心脾之熱受自胎中而然也其症爲危候如氣高痰盛

辰砂殭蠶散 辰砂五分殭蠶一錢直者佳去絲嘴薑炒蛇脫皮一錢炒麝香五分爲末用蜜調敷唇口

一方 鯽魚燒研酒調少許灌之仍掐手足兒一歲半仍以魚網洗水灌之

一方 是症必先大便熱 生犀角及羚羊角磨水和蜜汁飲之即效急則用大黃甘草各二錢煎服

一方七日內面赤喘急啼聲不出卽名撮口臍風看齒齦上有小泡如粟米狀　急以溫水蘸青軟帛裹指擦破卽愈

一方　用殭蠶四枚去絲嘴炒爲末蜜調敷唇內卽愈奇效

臍瘡　皆因尿濕浸臍以致瘍赤成瘡　金黃散川連二錢五分胡粉龍骨煆各一錢研細末敷之

一方　蠟猴猪頭肉燒灰敷之

臍突　卽臍忽腫赤虛大光淨是也乃兒腹中溫熱無所發瀉頻頻伸引睡卧不甯努脹其氣沖入臍

間而成　二豆散赤小豆不去皮豆豉南星去皮臍白蘞各一錢爲細末用五分芭蕉汁調敷臍之四旁日二次內服消毒藥再忌寒涼之品

一方　猪頰車骨中髓十二銖杏仁五錢研敷之

臍瘡　海螵蛸燕脂爲末油調搽之

臍風　是症皆因斷臍後乳母不愼以致水濕風冷之氣入於兒臍中令兒臍腫多啼面赤喘急不乳急用艾燒灰塡臍中卽愈

一方　全蠍一個去翅足酒炙麝香一分爲細末金

器煎湯沖服卽愈

撮口發驚　甘草生用二錢五分水一盞煎六分温服令吐痰涎後以乳汁點兒口中自愈

天釣眼目上翻手足瘈瘲爪甲色青症似驚風但目多仰視較之驚風稍異　用蟬蛻以漿水煮一日晒乾爲末每用一字冷水調下

灸臍風法　兒生七日若有臍風肚腹必發青筋一道行至肚却生兩垒待行至心則不治必詳視其青筋初起連照青筋頭上灸三壯或行至兩垒亦照兩垒頭盡處各灸三壯青筋自消而風去矣

臍瘡　伏龍肝研末敷之

盤腸風皆由寒邪所搏肝腎居下故痛時曲腰不乳緊蹙雙眉　乳香沒藥俱去油等分爲末木香磨水煎沸調末一錢服效外用熨臍法淡豆豉生薑切碎各二錢葱白五莖食鹽一兩同炒熟置臍上熨之

目爛胞邊赤爛痛痒難睜　燈心蘸烏雄雞胆點之內服生地黃湯卽四物湯加花粉甘草

目赤　青羖羊肝切薄片井水浸貼以愈爲度

懸癰　即喉裏上腭腫起如蘆笋盛水之狀　以綿纏長針留鋒刺之瀉出毒黃赤汁如未消來日再刺刺後以鹽湯拭口

氷片朴硝各一字（即二分五厘）爲極細末蜜調少許鵝翎蘸藥搽口中即愈亦治重齦

鵝口　滿口白屑如鵝之口自內生出可治自外生入不可治　用食草白鵝所下清糞濾汁入沙糖少許搽之或用雄鵝糞眠倒者燒灰入麝香少許搽之立效

一方　雞內金爲末和人乳服五分

一方　或重舌　海螵蛸同雞子黃塗之

一方　甘草黃連各一錢煎濃以帛裹指入口中拭去以不復生爲度自不復發

一方　黃丹爲細末竹瀝調塗口中洗之其白點即落一日洗三次再以辰砂益元散燈心湯下神效

白膜裹舌　即鵝口也　先將舌輕刮出血以白礬少許敷之吞則發驚

舌瘡飲乳不得　白礬和雞子置醋中塗兒足底二七日即愈永不復發

懸癰喉舌腫塞疼痛　五棓子殭蠶甘草等分爲末以白梅去核搗丸彈子大噙嚥其癰自破外科秘寶

鵝口　先用髮蘸井水拭口次以保命散即白礬燒灰硃砂水飛各二錢五分馬牙硝五錢研細末以白鵝糞水攪取汁塗舌與口角上內服清熱瀉肝火藥

吐舌其舌伸長而收緩面紅煩燥口渴尿赤　木通生地黃連生甘草等分燈心作引煎服即愈名保心導赤湯亦治弄舌木舌急驚心經有熱

重舌舌上近舌根處腫似舌形　露蜂房燒灰酒和敷舌下數次即愈

一方　三家屠猪肉切指大摩舌上兒立止啼

一方　鹿角生末塗舌下日三次

一方及口瘡　鯽魚頭燒灰研末飲服如頭瘡以末搽

之目翳洗之

鵝口　地龍擂水塗之立愈

目澁月內目閉不開或腫或羞明或出血各慢肝風　甘草一節以猪胆汁炙爲末每用米泔水調少許灌之

木舌兒舌滿腫不能轉動　鮮鯽魚切片貼之頻換取效或鯉魚片貼之以帛繫之亦妙

一方　川消散朴硝五分眞紫雪二分白鹽一分爲極細末以竹溲調敷舌上內服瀉心導赤湯方見吐舌

一方　百草霜芒硝滑石爲末酒調敷之

臍瘡　螬蟲卽俗云老木蟲研末敷之不過數次卽愈

口瘡　勃臍燒存性研末摻之

一方　青羊脂煎苡仁根塗之無苡仁卽以乳細濾入口含之數次卽愈

一方　青羊鬚燒灰和油敷之並治蠷螋尿瘡

流涎　鹿角屑末米飲服一字一字卽二分五厘

吐乳因寒而吐者面色青白糞清多沫手足指冷　白蔻砂仁各十四粒

生炙甘草各二錢爲末常摻入兒口中卽止若直出不停者以炒麥芽三錢橘紅一錢丁香三分水煎服立止危氏得效方

夜啼但啼別無他症　硃砂書甲寅二字貼床頭卽止

一方　蟬花散蟬蛻不拘多少下半截研細末每以少許煎薄荷湯調下

一方　以豺狗皮和狼屎中骨頭燒灰等分水服少許卽止

一方　白馬骨燒灰敷乳頭令兒吮之卽止

一方　赤馬懸蹄燒灰敷乳頭令兒吮之卽止

一方　青牛蹄甲研末貼臍上卽止

一方　牛屎一塊安席下勿令婦知

一方　取母猪窠中草密安席下勿令婦知

一方　以白雄雞左右翅硬毛安席下勿令婦知

一方　以紅雞冠血塗兒臍中男用雌女用雄

一方　因心經有熱症見面赤唇紅身腹俱熱小便不利煩燥多啼者　導赤散服之

方見不小便

一方狀似邪祟　牛黃一豆許乳汁化服仍以硃筆密於兒臍下寫一田字卽止屢驗形色虛者勿用黃

一方凡在一百二十日內者　蟬蛻四十九個用下半截爲末分四服鈎藤湯下

驚啼　蟬蛻二十個去翅足入硃砂末一字卽二分五厘密調吮之

日啼不止兒在月內者　牛黃神砂飛各五釐爲極細末塗兒舌上立止

夜啼　用燈花燒灰塗乳頭令兒吮之或用燈花四五九捻爛以燈心湯化下

一方　雞糞塗兒臍中極妙男雌女雄

一方　用井邊草或雞窠中草安席下勿令婦知

胎黃徧身面目皆黃其色如金乃兒在胎受母熱毒之故　眞牛黃一豆許入蜜調成膏乳汁化開時時滴兒口中若形色虛者宜忌之亦治驚癇嚼舌迷悶仰目

月內胎驚　母猪乳同牛乳硃砂少許抹口甚效

赤遊風 皮膚赤熱而腫色若丹塗遊走不定行於偏身若歸心腹則逆　川山甲炒炙血餘蝦等分爲末每服五分輕者三分黑糖拌百滾湯送下外用千脚泥一兩晒乾或烘加珍珠三分同研細菜油調敷卽愈

一方　野葡萄根搗如泥塗之

一方 兒在百日之外者　外用砭血法及敷藥先以口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者將筋頭劈開夾住用線縛定兩指輕撮筋梢令磁鋒對聚血處再用筋一根頻擊刺出毒血砭後毒甚者用敷藥卽黃蘗炒生草烏各爲末等分用漱口水調敷頻以漱口水潤之若毒輕者砭之卽不敷恐作痛也如患在頭者勿用砭法祇宜用針倒挑患處出毒血則愈

一方 兒在百日之內者　外治法用生猪肉切片貼於赤腫處數數更換自愈或用赤小豆不拘多少研細末

用雞子清調塗乾則再塗兒在百日內外俱宜內服清熱解毒藥

一方　竈心土不拘多少雞子清調至得宜敷之

一方　船底青苔爲末調敷

初生無皮　因月分未足生育太早遍體浸漬紅軟而光面白肢冷者　用撲粉法

用早稻白粳米作粉時時撲之肌膚自生

一方　因遺毒傳染或上或下或下半身赤爛甚至色帶紫黑者　用未經水濕成塊石灰四兩用水泡之沒指半許露一宿面上有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多寡對小磨麻油亦如之以順攪成膏爲度用雞翎搽之自愈

臍中出汁　赤腫潰爛　赤石脂煆研末敷之立愈獨行方

三朝哺兒法　兒生三日應開腹助穀神壯胃氣　用粟米煮熟研如乳煮與兒一大豆許飲之甚佳且與少乳之兒甚便不可合他物及雜藥同食

一法　以晚陳粳米煮粥如乳量食之兒稍長則合

芡實煮粥食之香粳米更佳

急慢驚風一見搐搦必神氣昏憒皆由痰壅氣塞壅結胸中而致急用通關散生半夏皂角細辛薄荷各等分爲細末用筆管吹鼻內少許有嚏主可治無嚏主不治其搐以男左手女右手男大指在外女大指在內爲順反則爲逆治者宜切記之如有嚏及指順者則審表裏虛實隨症治之

急驚風暴發壯熱煩急面紅唇赤痰壅氣促牙關緊急二便秘濇遠年白螺殼燒灰入麝香少許水調灌之此治熱極生風之藥一方因熱極者熱牛糞用麻布擩汁一盞入當門眞麝少許攪勻灌之立愈

急慢驚風急驚形症已見前條慢驚發則緩緩搐搦時作時止面色淡黃或青白相兼身溫和昏睡眼合或睡卧露睛脉來遲緩神氣慘慘大便青色急驚陽症屬有餘慢驚半陰半陽症屬不足也一半硃砂一半雪即水片各一兩爲細末其功全在青蒿節節內蟲名向南蟲秋末收取蟲汁爲丸如菜豆大每歲一粒任他死去亦還魂服時須用生人血即母乳也用以調服無乳用鉤藤煎濃湯服之

一方　一錢硃砂七分雪即冰片七個殭蠶去絲嘴薑汁製三個全蠍去頭足焙乾爲末不拘急慢與驚風皆能治之調服時須用蜜與血乳也兒小者分三服

一方　先用白鳳仙花根汁半盞服下即用方頭蚱蜢焙乾研末滾水調下即愈

驚風　以五苓散服之會世榮方

一方急慢皆治　用杜牛膝一名地菘　取汁澄清入好酒灌之即醒仍以醋拌渣敷項下即愈

慢驚風　代赭石五分煆紅醋淬水飛爲末冬瓜仁湯調下

驚熱　血餘洗淨入罐封固煆存性爲末合雞子黃煎汁服之

一方　牛黃一豆許杏仁竹瀝薑汁各一合和勻服

驚啼發歇不定　臘月縛母猪繩燒灰水服少許其驗如神

一方　麝香一字即二分五厘清水調服日三服

驚哭　燈心裝青竹筒中拷實乾泥塞口糯糠內煨一夜取出悶隱存性每服三五分薄荷湯下神驗

胎驚　鎮驚散硃砂水飛五分牛黃五釐麝香少許猪乳汁調稀服之

卒驚　丹雄雞冠血少許滴口中甚妙

驚風不醒　白毛鳥骨雄雞血抹唇上卽醒

驚後瞳斜　阿膠炒成珠人參各一錢水一盞煎七分日再服卽愈

魅症　卽邪祟也　以紅紗袋盛夜明砂佩之

一方　及驚癇等症　白馬眼與兒母帶之

客忤聞異　以牛涎令兒吮之或以牛鼻中津水和水少許灌之

一方　黑驢膊上旋毛一彈方圓同乳汁煎服

一切癇症　有陰陽驚痰食風諸癇　青羖羊肝一具薄切水洗和五味醬食之永不再發

一方　青羖羊角燒存性以酒服少許卽愈

牛癇　以六畜齒燒灰水灌之牛齒更佳

馬癇　白馬齒水磨服之以上四方大人並可治之

卒癇　刺白犬血一升含之並塗身上

驚癇 吐舌急叫面色乍紅乍白悽惕不安如人捕狀乃偶被驚邪所觸而致　犀角磨濃水服之立效爲末亦可亦治驚熱

一方　五月五日取猪齒臨症燒灰服之

一方 及天釣　棉蘸母猪乳汁吮之大人猪雞癇及鬼毒去來寒熱五癰亦治之

一方　以竹瀝化熊胆兩豆許服之去心中涎痰良

一方 或客忤項強欲絶者　以熟水研麝香少許和乳汁塗兒口中取效酷調亦可取其鎮心安神則驚自止

一方 眼目上視手足搐搦角弓反張者　用人面子 出海南及廣中 核燒灰服之神效

一方　丹雄雞腦髓燒灰酒服

小兒毛髮焦枯睡中自語 欲發驚候者　牛黃六分硃砂五分同研細以犀角磨汁調服分二次

辟驚癇　雁自脫落翎毛令兒佩之

中惡卒死　雄黃水飛研末同桃樹枝煎湯調灌立生

卒死不知何病　狗糞一丸絞汁灌之卽活

客忤　以黃丹飛淨窯和灌之

一方　赤白陀僧燒紅研粉水調灌少許

驚癇及夜啼　虎睛爲末竹瀝調服

驚掣膚如鱗甲皆由氣血不足也亦名胎垢　殭蠶煎湯浴之

胎赤風眼　槐枝如馬鞭大長二寸作火棒烙之

胎瘡　水邊烏臼根晒研入雄黃末少許敷之

臍瘡　急用大草紙燒灰敷之則不致變風癇或加枯礬或再加龍骨燒灰等分入麝香少許撒之

臍風小兒初生身皮紅狀如湯潑與胎赤相似若煽赤者　以煆石膏研細敷之不煽赤者用粳米粉敷之

幼科雜症

脾疳 面黃消瘦身體發熱困倦喜睡心下痞鞕乳食懶進睡卧喜冷好食泥土肚腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥粘　乾黃土爲末濃煎黃連汁和成餅服之立愈此治小兒好喫泥土之方

一方　好吃泥土或茶葉生米及布疋等物　綠礬土炒紅棗去皮核飯上蒸熟和勻濕紙包煨研末每服五分酒下或爲丸服如面黃加茵陳爲丸每服三四十丸淡湯下

一方　好食土者　綠礬煆過以猪胆汁爲丸菉豆大量兒

大小服之

疳痢亦脾疳也煩熱毛焦鼻口瘡痛皮膚枯稿四肢癱軟時時下痢或紅或白腹中窘疼青黛水飛淨仍以水調服甚效不論强弱皆治

一方及神不安以虎胆研水服之亦治驚癇

一方以光粉炒黃雞子食之

諸疳下痢以豺狗皮煮汁飲之或燒灰酒服亦治腹中蟲痛

一方臘月採白兔頭骨燒灰水服

一方臘月採白兔尿炒五錢乾蝦蟆一枚燒灰爲末綿裹如蓮子大納下部日三易之

諸疳羸瘦熊胆史君子爲末等分研勻盛磁器內蒸餅爲丸麻子大每米飲下二十九

蛔疳黃瘦公猪肚釀黃糯米即糯粟蒸搗爲丸服之大人男婦一切虛弱勞熱虛損並可用此服之益猪水畜也胃屬土故方藥用補虛以胃治胃也

疳瘦不長肌肉以獾肉和五味煮食大能肥健

諸疳　以野猪胆水研棗許服之日二次

一方　明雄五分黃丹七分爲細末每服一分四釐以雞肝一具（男用雌女用雄）先將肝入碗內蒸熟取入藥末搗爛和勻用熟黃酒沖入五更時服藥分八次服完其病卽愈

一方　五穀蟲史君子肉各一兩不拘時服卽茶酒粥飯俱可同食病深者二料卽愈

一方　面黃腹脹形瘦髮立食無飢飽　牡蠣一兩炭火煆紅用好醋一碗將蠣入於醋內浸之如此燒浸七次研細末放冷地三日出火氣用未經落水雞軟肝一具以竹刀剖碎撒蠣粉於肝上蒸熟食之不用鹽並忌茶每歲用蠣粉一分其效如神

疳蟲蝕齒　雄黃蕳蔥等分爲末取獵月猪脂溶以槐枝綿裹枝頭點藥烙之四五枝卽愈

疳蟲蝕口　文蛤燒灰以臘猪脂和塗之取效

疳疾目盲（眼疳也）　猪肝二三兩用竹刀切開將威靈

仙二錢焙爲末塞肝內將箸札好入飯鍋底飯熟取出去藥食肝三服痊愈

諸疳寒熱及腹大貪眠者　採雄鼠去臟黃泥裹定燒熟取骨取肉和五味豉汁作羹食之亦治哺露疳

腦疳鼻痒毛髮作穗黃瘦者　鯽魚胆汁滴鼻中三五日甚效

無辜疳其症頭項生瘡或項內有核如彈按之轉動軟而不疼其中有蟲如米粉若不速治則蝕臟腑便利膿血身體羸瘦面黃發熱　夜明沙水淘去灰土惡氣取細沙晒乾揭熬爲末拌飯與食之

牙疳齦肉赤爛疼痛口臭血出甚則牙枯脫落穿腮蝕脣則爲危急之症　急以苦竹筍入鹽燒灰研水搽之

一方　大鯽魚一尾去腸留鱗入當歸末泥固燒存性入煆過鹽和勻日日搽之

一方腫痛不止　青羖羊肝一具煮熟蘸赤石末任意食之自愈

眼疳及脾疳　穀精草爲末雞軟肝一具同酒漿飯上蒸熟去藥食肝日日常服凡小兒目盲垂死者立

愈或加小青草亦妙

疳熱　黃連五兩入猪肚蒸爛飯丸米飲下仍服調血清心藥佐之蓋小兒之病非疳即熱也

腦疳　以蝟酥和乳滴少許入鼻中良

小兒羸瘦　甘草二兩炙焦爲末蜜丸茶豆大每温水下五丸日二服

一切疳疾　雞軟肝一具竹刀剖開摻入飛淨雄黃末三分先將穀精草一撮貯飯碗底再用海粉一片置草上次入肝於粉上用酒漬一時飯鍋上蒸熟濾去草餘俱服之即愈不愈再服無不愈者雞肝男用雄女用雌此方治眼疳目盲其效更速

嘔吐痰飲　夾驚吐或吐　黃丹細研小棗肉和丸芡實大白湯送下或加硃砂白礬等分和丸每丸針穿一孔臨用時仍以針穿燒研末服之

上吐下瀉　巴豆一枚針穿燈上燒過並用黃蠟一豆許燈上燒滴入水中同杵爲丸黍米大每服五

七九白湯下

吐瀉慢驚小兒或因誤服冷藥吐瀉以致脾虛生風痰嗽慢驚　天南星一個去臍重八九錢者佳入黃土坑深三寸以炭火五觔煆赤再入好酒半盞安南星在內浸半時許仍架炭三條在上俟發裂取出剖片再炒熟爲末次用煨熟明天麻一錢研末麝香一字和勻如三歲之兒每用半錢以生薑防風煎湯下亦治久嗽惡心

即二分五厘

受寒吐瀉不早治之多成慢驚　小丁香陳皮等分水煎服

傷乳吐吐出乳片身熱面黃肚腹臌脹宜用　香附二兩製神麴炒麥芽炒各一兩陳皮八錢縮砂仁炒炙甘草各五錢爲細末滴水爲丸粟米大量兒大小服之薑湯化下神效

吐症夾驚因食時被驚所致其症頻吐青涎身體發熱心神煩燥睡卧不甯　丁香二十一粒蠍梢去毒四十九條薑製半夏三個爲細末煮棗肉爲丸黍米大每服七丸金器煎湯化服

停滯實吐 兒素壯實偶然停滯胸腹脹滿二便閉澁痞硬疼痛口渴思飲 芒硝生軍枳實麪炒生甘草厚朴薑炒入生薑水煎服

寒吐 多因兒傷生冷或乳母貪涼與乳所致其候朝食暮吐不化不臭不酸四肢逆冷面唇色白 白薑二錢陳皮一兩炙甘草一錢爲細末每服一錢溫棗湯調服寒甚者以理中湯加丁香吳萸

噦症 有聲無物爲噦即乾嘔也 鹿角粉大豆末等分和乳調塗乳上飲之

小兒水瀉 王瓜葉晒乾爲末米飲下一方 水牛乳二合薑汁一合入銀器內文火煎五六沸量兒與服

瀉痢 土木別一個母丁香四粒麝香一分研末以津爲丸芡實大納臍中外用膏藥貼牢立止

痢病 雞子一個煮二三沸取起去白用黃研碎以薑汁半鍾和勻與兒服之忌食茶神效

熱吐 因兒過食煎煿或母過食厚味以致小兒熱積胃中食入即吐口渴飲冷吐酸身熱唇赤小便赤 清腸散蟬蛻五十個去泥沙翅足滑石一兩

爲末每用二錢水一盞入蜜調服

脾瀉不止　紅棗二十枚去核以官粉入棗內用陰陽瓦焙乾去棗爲末量兒大小飲調服

赤白痢　官粉一兩雞子清和炙焦爲末分數次白湯調服

泄瀉不止　棗肉搗爛入白礬煅黃丹炒等分粳米飯爲丸彈子大每丸穿一孔臨用燈上燒存性爲末米飲下一丸

下痢　巴豆一錢煨熟去油百草霜二錢研末飛麵煮糊丸黍米大每服五七丸白湯下

水瀉　巴豆一枚針頭上燒存性蠟和作丸倒流水服

火瀉　瀉時暴注下迫腹痛心煩口渴瀉多黃水小便赤色　玉露散寒水石石膏各一兩甘草生用三錢爲細末量大小溫湯隨時調服俟熱清再用四苓引以燈心水煎服卽愈

熱痢　裏熱也其症腹中窘痛頻頻下痢尿短色紅舌赤唇焦喜飲冷水　葵花葉炙

過煮食之

一方　嫩黃瓜同蜜食十餘枚卽愈

渴痢　冬瓜汁飲之

火瀉　雞子白生吞之

滯下痢　牟牛角胎燒灰水服方寸匕卽數分

一方赤白　鹿角灰髮灰等分水服三錢日二服

洞注下痢　鹿角燒灰水調服

白痢似魚腦爲寒痢　白鴨熱血滾酒沖服卽止

久痢不愈　石榴皮煮蛋食之皮蛋更妙

一方　黃犬頭骨燒灰白湯下

滯下痢　用蜜擂芝麻滾水調服

一方　羚羊角中骨燒末飲服方寸匕卽數分

刮腸痢不能飲食卽噤口痢　精猪肉一兩薄切炙香以臘粉末五分鋪上食之或置鼻頭聞香自然欲食也

一方　五穀蟲水洗淨瓦上焙黃爲末黑糖拌勻新汲水送下卽愈

一方　活蝦蟆一隻搗爛入麝香六分研勻貼臍上
用布束裝半日卽能下飲食兩日全愈二方大人
亦治
水瀉　渣肉末三錢白糖三錢拌勻溫熱水空心調
服重者不過三服卽愈并治霍亂吐瀉
水瀉卽痢疾　大蒜五個火灰煨熟食之一日二次重
者不過二日必愈神驗二方大人男婦並治
熱痢　黃連黃柏秦皮白頭翁等分水煎服或香連
丸米飲下
噤口痢　人參川連薑炒蓮肉各等分爲細末米飲
調下卽愈
四時感冒風寒初起者　葱白連鬚五根生搗汁沖
開水服取微汗大人沖酒服
蝦蟆瘟卽時行感冒寒熱咳嗽　以金線田雞搗汁水調空腹
炖飲極效
時疫不染　蒼朮三錢三分三釐米泔水浸切片甘草一錢

六分六釐川芎八錢五分乾葛一錢二分六釐薑三片連根葱白三莖水二碗煎八分已病者愈未病者不致傳染大小皆治

停食傷寒　陳香糟六兩生薑四兩水菖蒲根四兩鹽二兩共搗熱爲餅敷胸前痛處火熨之內响即大如口渴任喫茶水待大便下惡物即愈大小皆治見單方全集

辟惡去疫　狐尾燒灰熏之雄狐尿或頭骨亦可

辟除惡魅　虎爪并指骨或毛繫兒臂中邪魅遠去

辟一切邪惡　以狼牙佩之

一方　臘月取雄鼠燒之

一方　以狼皮置枕則邪惡不敢近身此法最良

一方　以虎爪蟹爪赤砂雄黃爲末松脂和丸每於正旦焚之則室中一切邪氣永除

瘟疫此症邪氣皆由口鼻而入其症在裏宜攻　大黃四兩皂角二兩爲末水丸每服一錢量兒大小與之用無根水下

傷暑吐瀉昏迷不省　採背陰側柏葉如手掌大三枝入井水三盞搗以絹絞汁新窰三茶匙和勻灌之即活經驗方

暑風因暑熱攻肝內生風病手足搐搦狀似驚風煩渴身熱有汗二便黃赤急宜　香薷黃連扁豆炒厚朴薑炒羌活燈心引水煎服以先疏其風再以玉露散服之以清其熱自愈勿作驚癎治之玉露散見前火瀉

霍亂　以牛涎灌一合即愈

瘡疾　雞內金燒存性男用雌女用雄母乳調服

一方　鹿角生研為末先於發時以乳調一字服之（即二分五厘）

小兒邪瘡　以麝香研墨書去邪辟惡四字於額上其瘡即愈

瘡疾不止　硃砂五分砒霜一豆大代赭石五塊醋煅用紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末油調一分塗鼻尖上及眉心四肢神效

瘡毋　青黃散青黛澄去灰土雄黃水飛等分為末

每歲一分空心及夜淡醋湯調下塊消瘧止

咳嗽　生薑四兩煎湯浴之

熱嗽　甘草二兩猪胆汁浸五宿炙研末蜜丸菉豆大食後薄荷湯下名涼膈丸

吼喘　活鯽魚七個以器盛之令兒自便尿養之待紅煨熟食之

痰喘　巴豆一粒杵爛棉裹塞鼻男左女右痰卽下

鹽喘痰喘　烏臼皮去粗皮搗汁和瓦麪作餅烙熟食之卽愈

寒痰氣喘　青橘皮一片展開入巴豆一粒麻紮緊火上燒存性研末薑汁和酒服之大人亦治之

失音不語　蝦蟆胆點舌尖上立效

停痰喘急不得卧　南蘇子炒苦葶藶子微炒各等分爲細末蒸棗肉爲丸麻子大每服五丸至七丸淡薑湯下極驗名蘇葶丸

暴喘卽馬脾風也其症胸高氣促肺脹喘滿兩脇搧動陷下作坑鼻竅搧張神氣悶亂初起

急用五虎湯蜜炒麻黃杏仁炒去皮尖生甘草石膏研末細茶各等分生薑水煎臨用藥沖石膏服之繼以一捻金下之倘得氣開其喘自止如兒在百日內見此病者多不救

痰吼日久不愈　海螵蛸末米飲服一錢甚驗

寒疝因兒過食生冷或卧濕地以致陰結氣滯日久復爲風冷所束水濕所傷故發時囊冷結硬牽引少腹作痛初得時兼見表症者以　桂枝赤芍炙草烏頭炮等分入生薑水煎服如寒甚者用金鈴子肉一兩吳茱萸五錢爲細末酒煮麵糊爲丸麻子大每服數丸鹽湯下極效

濕熱感寒疝因兒過食厚味濕熱下行入囊復爲風寒所束而成發時囊縱紅腫常常刺痛

烏頭炮梔子炒等分用順流水入薑汁煎服

胎疝因兒母啼泣過傷氣結不散蘊於胞中令兒生下胞硬腫痛　川練子肉酒蒸焙乾爲末一歲一分淡薑湯下

陰腫乃濕熱風冷二氣相搏氣不得通故結聚而腫大或蟲蟻所吹因風多痒濕多墜熱多疼

蟬蛻五錢煎水洗仍服五苓散卽愈

一方　狐陰莖炙爲末空心酒服良

一方　硼砂一分水研塗之大有功效

一方　因風熱者外腎瘍赤腫痛日夜啼哭不數日退皮如雞子殼狀　老杉木燒灰入膩粉清油調敷神效

小腸氣受症之因亦與疝氣同發時少腹脹控睾丸有引腰而痛有痛而衝心之分痛衝心痛者失笑散五靈脂蒲黃膈紙炒元胡醋炒各等分爲細末每服一二錢水酒調下

蟲痛因腹中蟲動不安故痛其候面色乍赤乍青時痛時止時吐清水當以安蟲爲主勿妄攻下也新患蟲痛以錢氏安蟲散胡粉炒黃鶴蝨炒黃枯白礬川練肉去皮核各二錢五分米飲調下痛時服之如久不愈者用加減理中湯去甘草加川椒是也

一方日久身體羸瘦　生猪膏服之

黃疸腸黃症是症陰陽二症皆因久鬱濕熱而致其候遍體皆黃甚則深黃而如烟熏之狀腸黃則面紅口渴尿赤色亮身熱乃脾家濕熱之故陽黃表實者宜發汗　茵陳麻黃湯茵陳蒿麻黃等分水煎加黃酒少許服之

陽黃裏實二便秘濇腹滿　茵陳六兩梔子十四枚剖川大黃生二兩燈心引水煎量兒與服若無上之表裏二症則惟以利小便爲主以五苓散加茵陳燈心水煎服水利病愈

陰黃口不渴面色暗黃身冷如氷乃脾腎寒熱之故　脾濕陰黃理中湯加茵陳服之

一方腎寒陰黃　製附片乾薑茵陳炙草等分水煎服

風水浮腫其腫在頭面肩背至腰即止症因風起法宜發汗　絲瓜燈草葱白等分煎濃汁服并洗之

食乳不化肚腹腫脹　推車蟲一個取上半截焙乾研末人乳調送即愈

一方腹脹煩悶欲死　燒鼠二枚爲末日服二錢白湯下

腹脹　胡粉鹽熬色變摩腹上即愈

發熱病後虛熱者　以白蜜一合攪黃雞雞子三顆服之立見功效

一方　以醋煮雞子黃食之煩熱煎食

熱渴裏熱表寒　蓮實二十枚炒浮萍二錢五分生薑少許水煎分二服

飲乳不快形似喉閉　犀牛角燒灰塗乳上嚥下即瘥

咽喉閉痛　鯉魚胆二七枚和竈底土塗咽喉立效

中水　以麝香如豆大三枚奶汁調分三四服服之

瘧疾肚熱驚癇　以李樹葉煎湯浴之甚驗

癥疾即癖也　鼈肉二兩切焙蜀椒三百枚炒同搗末以雞子白和丸小豆大每服二三丸白湯下

一方　鼠肉去骨煮汁作粥食之

癖疾　全蠍三枚去頭足土鼈三個去足大桑黃一個同焙乾芝蘇一撮銅杓內炒為末好建糖調五更時服酒送下

一方　鼈甲一錢醋炙全蠍三隻去頭足新瓦上焙乾雄黃二分研細末芝蘇一撮畧炒白糖拌五更時送下十歲服十服二十歲服二十服即愈

一方大人男婦並治　紅藜花子又名水紅花每日清晨生服三

錢白湯下多服自消驗甚

一方　用醋碟一個朴消裝滿雄黃末蓋面綿紙糊口以針刺孔合定疾上將秩細緊三日卽消

冷汗　五棓子爲末以人乳調塞鼻中卽止

表虛自汗不止不發熱不惡寒　黃芪蜜炙防風白朮土炒各等分水煎卽愈

嘈雜不甯腹中有蟲也　清油和猪血食之立效

衄血乃熱傷陽絡也此症鼻中出血乾燥身熱不渴但苦頭疼無論有汗無汗　取壯實人頭髮陰陽瓦煆成灰放在地上去火性研細末吹入鼻中卽止

一方　黑梔子末吹鼻卽止

尿血　甘草梢一兩二錢水六合蒸煎二合一歲兒一日服盡

大便下血初起有臟毒腸風之分皆因小兒過食肥甘所致先血後糞血色黯濁爲藏毒多腫痛先糞後血血色鮮清爲腸風不腫不痛　俱宜用大黃皂刺湯皂刺生軍各等分量兒大小年歲及虛實酌其多少

水酒煎服

脫肛多因久患瀉痢所致 以葱湯熏洗令軟送上

一方 以五棓子末敷後以棉帛托入或煎湯洗之

一方 以鱉頭燒存性香油調敷卽收

一方 用鮮蚌肉敷之立刻縮上

一方 魚腥草搗如泥先以朴硝水洗過用芭蕉托住藥坐之自入

一方 冬瓜藤煎湯洗之

一方 小螺螄一二升鋪桶內坐之少頃卽收

一方 訶子赤石脂龍骨煆各等分爲細末臘茶調敷和藥揉腸頭上綿帛揉入奇效

肛腫翻脫肛腫便難翻脫不還 乾地蟠龍一兩略去土焙風化朴硝二錢爲細末和勻每以二錢至三錢肛門濕潤者乾塗乾燥者用清油調塗先用荆芥生葱煎水候温洗浴輕與拭乾然後敷藥皂刺大黃湯方見小兒便血

解顱卽顖大骨之縫不合是也其人面色㿠白形體瘦弱目多白睛悲愁少笑　螃蜞肉白芨搗塗以合爲度但是症猶花木無根內當多服補腎扶元之方庶幾轉危而安也

一方　猪牙車骨煎取水敷之三日卽合

一方　黃犬頭骨炙爲末雞子白和塗之

一方　黑驢頭骨燒灰和油塗之卽合

一方　黑驢懸蹄燒灰和油塗之以合爲度

一方　雄鼠腦同鼠肝搗爛塗之卽合

一方　封顖散柏子仁防風天南星各四兩爲細末每用一錢以猪胆汁調勻攤在緋絹帛上看顖大小剪貼一日一換不得令乾時時以湯潤之內服滋陰補氣之藥

龜背　因兒生早被客風吹入脊膂遂致傴僂曲折背高如龜往往爲終身痼疾　取龜尿點兒骨節上須頻頻點之勿自厭煩或以灸法用艾灸肺俞心俞膈俞三穴各三五壯亦可見效

顖陷　雄黃二錢川烏附子生各五錢爲細末用生

葱和根葉細切杵爛入前藥末同煎作膏每早空心貼頗處內服補氣藥

脫肛　以龜血塗之卽收

肛門翻脫係大腸蘊熱者　以五棓子老葱頭朴硝煎湯洗之立收

骨蒸潮熱食減瘦弱陽明有熱也　秦艽炙草各一兩每服一二錢或加薄荷

牙疳　人中白研末擦之立效

瘡科瘡症初起大抵與傷寒相似其候發熱不時驚悸口鼻氣粗兩眼發擬惟中指耳獨冷耳後有紅筋之爲驗也症之順逆與險自始至終只以形色分之形之順者瘡始出時頂尖根圓起脹時漸綻充肥成漿時根紅斂束瘡壳完固結痂時痂如螺壳先後循次脫落是也形之逆者瘡始出時隱如蚊咬或如熱痈寒粟蠶種起脹時平頂不突板實不綻成漿時壳軟皮薄甚至痒塌結痂時痂落如麩潰爛粘臭是也色之順者瘡始出時色如桃紅而漸加滋潤起服時頂漸放白根紅光潤生漿時白而漸黃蒼而涼厚結痂時蒼如粟壳是也色之逆者瘡始出時色卽淡白乾紫晦而不亮起脹時頂色灰滯根血散漫或地脚深紅生漿時灰乾不潤或漿薄清稀結痂時色如麩白是也痂落之後疤痕顏色

總以紅潤凸起爲順若淡白黑紫平凹無突起之狀皆爲逆也形色既明順逆可法

解毒免痘稀痘　每至除夜以白鴿子煮炙飼兒仍以毛煎湯浴之則出痘稀少

一方　白鴿蛋一對入竹筒封置厠中半月取出以蛋白和辰砂三錢爲丸如菉豆大每三十丸以赤黑菉三豆煮湯下使毒從大小便出永不出痘即出亦稀

一方　陰陽二血丸鹿血兔血各以青紙盛置灰上晒乾乳香沒藥各一兩雄黃黃連各五錢硃砂麝香各一錢爲末煉蜜丸菉豆大每服十丸空心酒下兒小者減半服之未出者可免已出者則稀

一方　臘月取白兔頭煎湯浴之令小兒清熱去毒出痘稀疎

一方　除夕黃昏時用大烏魚即七星魚一尾小者二三尾煎湯密室烘煖浴兒遍身七竅俱到不可嫌腥以水洗去若不信只留一手足不洗遇出痘時則

未洗處偏多此異人所傳方也

一方　大寒日早用雞子七枚裝麻布口袋內浸廁中七日第八日早取出埋土內七日至立春日早取出於砂鍋內煮熟令兒隨意食之此日忌飲茶多者能少少者可免屢效

一方　赤豆黑豆菉豆各一兩研末入新竹筒中削皮留節鑿孔入藥杉木塞緊用蠟封固臘月浸廁中一月取出風乾每藥一兩配梅花片三錢每服一錢霜後絲瓜藤煎湯下稀痘神效朱禹功仙方

一方　保嬰靈丹眞劈砂一錢麝香五釐草麻子三十六粒去皮殼肥大者佳三味或午節或七夕或重九打成膏分作十三股塗小兒頭頂心兩手心兩足心兩臂灣兩腿灣兩脇肋前後心共十三穴塗如象棋大不可使藥有餘亦不可洗去聽其自落塗過多次可免出痘

一方　解毒護童膏金銀花一觔用水入銅器內煎

至渣無苦味爲度粉草四兩用水煎至渣無甜味爲度去渣以二水沖勻用文武火慢煎約十碗至三四碗入米白糖收成膏埋土內一日出火氣每早以百沸湯沖一鐘付兒食之則一切瘡毒不生併可稀痘若初出痘後煎服此膏則遺毒皆盡勝多吃胡桃也

一方　金銀花揀淨七兩六安茶四兩愈陳者佳共爲粗末衝湯代茶每日飲數次終身不出天花雖出亦稀神異

一方　用眞麻油燉水豆腐於春分秋分前後半月早與小兒食之此方驗者甚多勿以平易輕視痘瘡不出　採未經出土冬筍煮粥食即有生發之意也

一方　酒煎芫荽俟酒沸勿令洩氣候冷去渣微微從頂以下噴之惟頭面勿噴即出

一方　荔枝肉浸酒飲并食之忌生冷

痘瘡不快　老絲瓜近蒂三寸連皮燒存性入硃砂研末蜜水調服甚妙或沙糖水調服初出或未出多者可少少者令免

已出不起　狗蠅七枚搗爛和酒娘服即日發起紅潤可觀冬日取蠅在狗耳內

痘出無漿心不爽快　以荔枝殼煎湯飲之

黑陷乃心熱血凝也　生玳瑁生犀角同磨汁一合入猪心血少許紫草湯五匙和勻温服紅潤起發

一方　臘月鶚鳥頭一二枚燒灰酒服當即起發

一方　牛黃二粒硃砂一分研末蜜浸胭脂取汁調搽即起

一方因出不快而黑陷者　人牙末煆一錢獖猪血調服

一方因服涼藥而血澁倒陷者　人牙末煆一錢麝香酒調服

一方頂陷漿滯不起　水楊柳枝煎湯浴之內服助氣血藥

倒靨　橄欖核磨汁服之

一方垂危者　家猫牙同人牙猪牙犬牙燒灰等分研

末蜜水服一字即二分五厘即發起

一方　白犬或黑犬飼以生粟米候下屎取來洗淨爲末臨症時入麝香少許以新汲水調服二錢神效

黑陷　用猪第二番血一匙調水片少許新汲水調服或半酒半水温服取利一二次痘即紅活

倒靨　猪齒燒灰水服一錢

痘瘡潰爛　臘月黃牛屎燒取白灰敷之或卧之痂即易落而無瘢痕

一方　海螵蛸研末敷之

一方　身無完膚膿水浸淫沾黏衣服　用茶葉揀去梗入滾水一煤即撈起再揀去梗濕鋪床上上隔草紙令兒卧之一夜膿乾甚效

痘潰難靨　牆上白螺螄殼洗淨煅研摻之

一方　牆上多年爛茅草白茅草尤妙洗焙爲末摻之取其性塞解毒又多受霜雪能燥濕也水痘變瘡摻

之亦效

瘡瘡潰爛　用麥麩裝褥臥之性涼而軟此誠妙法

瘡瘡不收　象牙屑銅銚內炒黃紅色爲末每服七八分或一錢白水下

瘡痂不落　以羊脛骨髓煉一兩輕粉一錢和成膏塗之可去痂滅瘢

一方　沙糖調新汲水一盃服之白湯調亦可日二服神妙

免瘡疤瘢痕　生白蜆即白扁螺螄浸水洗之

一方洗瘢法　白羊脛二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明旦以猪蹄湯洗之

瘡瘡入目　白狗血濾淨點之

一方　防風穀精草白蒺藜去刺炒研等分爲末每日食後服二錢五分米泔水調下

瘡後兩目痒腫　蛔蟲自然汁搽數次即愈

瘡後目翳　以白鱔血少許點之

一方　水煮水螺螄常食之甚佳

一方　石決明火煅水飛過穀精草等分爲細末以猪肝蘸食自愈

一方　乘臘月採白兎屎日乾爲末臨症每服二錢茶下卽安

痘瘡入目　浮萍陰乾爲末三錢羊肝半個竹刀切碎搗爛共汁和勻空心調服清茶過口傷目者數服自愈小兒減半

一方或生瘴翳　蟬蛻洗淨白菊等分爲末每服二錢蜜湯調服數服痊愈

痘毒斷不可開刀　用羯羊糞以新瓦磨光洗淨置糞於中上下以瓦覆定文武火炙燥烟盡存性取出爲末麻油調敷神效

一方　鵝肉蒸熟淡喫之其毒自消若潰爛不愈剜泥蛤蚷皮貼上卽愈蚷音哲

一方　大蚌一個取肉用黃泥四圍封固火煅至紅

色取蚌肉存性研末油調敷立愈

一方 以哺雞雞蛋殼細研麻油調搽神效

痘毒入心 痘瘡始有白泡忽搐入腹紫黑無膿 鬱金一兩甘草二錢五分煮乾焙研末入水片五分每用一錢加猪血五七滴新汲水下

痘疔 用甘蕉滓晒乾以眞香油點燈燒成灰以津液調勻銀針挑破點上立效或加珍珠末油燕脂調搽更效

一方 紫草三錢雄黃一錢爲末以燕脂汁調勻銀簪挑破點之極妙

一方 注命疔生兩足心腫硬如錢如豆如椒有紫筋直透足股用銀針挑之去淨血即用 田螺水點之次用偃火草菜豆浸脹搗爛敷

一方 忘汲疔生於眼沿邊如封蛤頗熱而紫宜以銀針挑破用 燕脂嚼汁點之兼以蒲公英煎湯洗之

一方 紫虎疔生於耳內於成膿之時宜挑破 拔疽散硇砂白礬硃砂食鹽用鐵繡刀燒紅將礬鹽放刀上煅過各等分擇丁日午時研細

末收臨症搽之化堅搜根

一方 燕窩疔生於腋下腫硬而赤譫語如疔在左腿則右體之痘沉伏失色在右亦如左宜挑去根以拔疔散搽之內服消毒藥

一方 透腸疔生肛門旁在六七日腫硬如錐亦急挑之 先用銀花防風煎湯洗之次用輕粉珍珠冰片白薇末塗之內服解毒湯即愈

痘風瘡 先發細瘡作痒次延成片脂水漸長浸淫宜 密陀僧滑石各二兩白芷五錢研細末乾用白蜜調搽如濕則乾撒之須避風戒口名滲濕救苦散

一方 黃豆燒黑研末香油調塗

痘疳 雄黃牛糞尖燒灰存性爲末每一錢加冰片二分研細末敷之立愈

痘時鎮邪 取胡麥懸掛床側或門閫間可辟邪

預解痘毒 兔血丸臘月八日取生兔血和蕎麪加雄黃四五分和丸菉豆大初生小兒乳汁送下二三丸週身發出紅點則免出痘即出亦稀

痘黶　荷葉殭蠶等分爲末胡荽湯下

痘瘡生瘡　燒雞尾毛和酒敷之

疹症　疹有瘡疹癮疹温疹蓋痘疹皆非正疹惟痲疹爲正也痲疹初起多有咳嗽噴嚏鼻流清涕眼泪汪汪雨胞浮腫身體漸熱二三日或四五日始見點於皮膚之上形如痲粒色若桃花間有類於痘大者惟見形之後形尖稀疎漸次稠密有顆粒而無根暈微起泛而不生漿大異於痘也雖云較痘稍輕而變化則速始終調治俱宜留神總之初起宜先表發透散最忌寒涼已出時當用清利收散後貴於養血兼雜症者則隨症參治之温疹症見傷寒也若發於未痘之先爲瘡疹月内爲爛衣瘡百日内爲百日瘡發則遍身紅點如粟米之狀乃兒在母腹受熱所致調攝謹慎自能速愈痘方愈而疹隨出爲蓋痘疹發則徧身出疹色赤作痒始如粟米漸成雲片因痘後餘毒未盡更兼恣意飲食外受風寒

之所致宜疎風清熱爲主至疹出多痒色紅赤隱於皮膚中爲癮疹乃心火灼於肺金更兼外受風濕而成治宜先散風濕後清熱毒斯得其法皆非痲疹稟諸胎元毒也

疹發不出 名悶疹 櫻桃四五觔入磁瓶內密封埋土中過兩三個月俱化爲水遇此症危急者取此汁一杯略温灌下垂死回生經驗無比不可忽視有志仁人多預製以濟人功德不小

一方 喘嗽悶亂 赤樫柳葉一名西河柳 風乾爲末水調服四錢立效或鮮者煎湯服五六錢亦妙兒之頂門必有紅筋紅瘰急挑破即出

一方 西河柳煎湯去渣半温用芫荽蘸水擦之但勿洗頭面並忌夜間洗之蓋痧疹晝發而夜斂也乳母並兒仍以西河柳煎湯飲之更妙

痧疹後痢 西河柳爲末四錢砂糖調服

癮疹 鯉魚皮燒灰水調服

一方 及疥癬疔腫 槐葉煎湯熏洗之

一方 心下迷悶 巴豆五十粒去皮水七升煎二升以帛

染拭之隨手而愈

疹後生翳　以黃鱔魚血點少許即退

癮疹　蟬蛻薄荷等分爲末酒調服

不藥良方

續集卷七

C116/2535
v.9

不藥良方續集卷七

外科　頭面項背腰五部

腦發疽一名勇疽生於太陽穴初起如粟漸腫疼痛形如伏鼠面目浮腫七日不潰火毒攻睛腐爛損目若至十一日針出黃膿乃吉黑血爲凶　臘月採白兎頭搗爛入瓶內密封愈久愈佳遇是症初起速用塗帛上厚封之熱痛即如氷也頻換取瘥乃止並塗發背及一切癰疽熱癤惡瘡

油風俗名鬼剃頭毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮痒如蟲行　銅青一錢白芷

一錢爲細末麻油調敷若年久不愈宜鍼砭其光亮出紫血毛髮可生

一方　貓兒毛燒灰以貓膏和敷之

白屑風初生髮內延及面目耳項燥痒日久飛起白屑脫去又生燥痒難當　黃犬骨燒灰淋汁沐之

一方　以豹頭骨燒灰淋汁洗之

肥瘡即禿瘡初起也又名錢癬生於小兒頭面騷痒不爽　猪牙車骨中髓和臘粉成劑入火中煨香取出研細末先以温鹽水洗淨敷之小兒頭瘡及疳瘡并治

一方　巴豆仁三枚連油杵成泥以生絹包搽日一二次三日全愈

一方　輕粉飛丹雄黃白礬等分研末入葱管內兩頭紮好煨過加龜板灰少許研細菜油調抹立效

禿瘡即肥瘡日久延漫成片髮焦脫落又名癩頭瘡　先以艾葉鴿糞煎湯洗淨瘡痂再用猪肉湯洗之隨用躑躅花油即躑躅花根四兩搗爛用菜油一碗煤枯去渣加黃蠟

少許布濾候冷以青布蘸搽日三次氈帽戴之勿令見風則風散癢止髮生久搽甚效

一方 及疥瘡 生石膏一兩硫黃五錢生白礬五錢入言四分生猪油一兩搗爛夏布包裹頻塗之即效

一方 生炭燒紅投沸湯中温洗一二次其瘡立愈

一方 油煎胡荽敷之

一方 鯽魚燒灰醬汁和塗

一方 鯽魚去腸皂礬燒研搽之

一方 大鯽魚去腸入亂髮填滿燒研入雄黃末二錢先以鹽水洗拭後方將前藥用生油調搽

一方 白鴿屎研末敷先以醋泔洗淨後敷亦可燒研摻之

一方 先將瘡洗刮令淨隨以猪脬乘熱裹之當引蟲出即愈

一方 象肉燒灰和油塗之

一方 新破猪肚勿洗熱楊之須臾蟲出如不盡再

作神妙方也

一方 以羊肉如作脯法炙香熱搗數次即愈

一方 生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水洗曰二次數曰即愈

一方 白牡馬肉煮汁洗之並治小兒一切頭瘡

一方 以新熱牛屎厚封之或燒灰封之能滅瘢痕

一方 以虎骨為末油調敷之或以虎骨膏煎化塗之

一方 不生頭髮 以熊腦髓摩上能去風生髮或以熊脂敷上亦妙

一方 鼠屎瓦上煆存性同輕粉麻油調塗

一方 並治疥癬 猬脂塗之能以殺蟲

一方 初起者即肥瘡 大黃蒲黃雌黃雄黃各一兩煆蝦蟆衣二大張四黃末入衣內再套一衣晒乾為細末醋調頻搽之

一方 皂礬川練子燒研末油調塗之

一方 皂礬一兩淡豆豉一兩炒黑臘二錢研勻油調敷之

一方 松油五錢猪油一兩熬搽一日一次取效

一方 松樹蒼皮入豆豉爲末油調塗之

一方 鴿屎新瓦焙乾存性爲末麻油調搽三次即愈如瘡靡堆起先用清水泔水同葱椒煎湯洗之

一方 牛皮破鞋底一兩白礬雄黃各五錢舊毡三錢共燒爲細末以猪油加麪調勻連搽三次即愈

並治黃水臁腿瘡風癬疥癩海上方

一方 以黃柏研末敷之

一方 以山豆根爲末麻油調敷立效亦敷蛇犬蜘蛛咬傷

一方 以生芝麻生嚼敷之

一方 蕪菁子爲末以醋調敷

一方 以馬齒莧燒灰塗或煎膏塗之俱良

赤禿髮落 臘月取母猪尾燒灰和猪脂塗之

一方　牛角羊角燒灰等分和猪脂調塗

一方　以白犬乳頻塗之甚良

一方　以赤馬皮白馬皮燒灰和臘猪脂敷之甚效

一方膿出不止　以晝開夜合白馬懸蹄燒灰生油調塗即愈

小兒頭瘡　鮰魚長四寸一枚去腸附子一枚去皮研末塡入炙焦研末敷再搗蒜封之

一方　龜甲燒灰敷之

一方　野外久乾牛屎不壞者燒灰入輕粉和麻油敷之神效

一方　白馬骨燒灰醋和敷身上瘡同方

一方　水磨槟榔晒乾取粉和生油塗之

一方　田螺燒存性清油調塗

一方　海螵蛸白膠末各二錢輕粉五分爲末先以油將爛處洗淨後搽前藥末二三次即愈

頭瘡生瘡　白鴿屎五合醋煮三沸杵爛敷之日三

次甚驗

一方　雞子黃炒出油和元粉敷之大人小兒皆治

小兒眉瘡　即奶癬瘡也　黑驢屎燒灰油調塗之立效

一方　小麥麩炒黑研末酒調塗

頭耳諸瘡　肥皂煅存性一錢枯白礬一分研勻香油調搽

眉瘡燕窩瘡並治

蠟栗頭瘡　肥皂去子填入沙糖並巴豆二枚紮定鹽泥固臍燒存性入槟榔輕粉五七分研勻香油

調搽

一方　酒肉店內油透陳竹燈臺一個劈碎裝磁瓶內口上用舊書鐵絲覆瓶上倒轉下再用一空瓶以此瓶合於下瓶口上用火煅之其汁溜下取以抹瘡神效

一方　以花椒煎湯或苦參湯洗淨用猪骨髓或黃連末搽之

火珠瘡　其瘡如珠始於髮中相染不已亦有傷命者　用生蘿蔔搗爛將

醋浸敷患處即愈

螻蛄癤生兒頭上俗名貉貓未破如曲蟺拱頭破後形似螻蛄串穴有因受胎毒者或因受暑熱者其癤孰小根堅破後出膿堅硬不退癤口收斂越時復發本毒未罷他處又生甚屬纏綿難斂

皮底舊鞋去泥淨燒存性研末菜油調敷其膿自出屢試有效

一方 屋內倒掛烟塵以猪胆汁調敷

一方 用磁器搥碎如粉以雞子油調敷

一方 百草霜研末菜油調圍立效

一方 銅青一兩松香五錢葱三根草麻仁六十粒搗爛成膏青布攤貼

一方 日久不愈癤口周圍作癢抓破津水相延成片形類黃水瘡者 化銅舊罐子一個研細末香油調敷自能滲濕祛風癤口易斂頭上軟癤 大芋子搗如泥敷之即乾

一方 牆上小白螺螄殼燒灰入倒掛塵等分油調塗之

一方 銅綠不拘多少研細末用柏油熬化布攤成

膏貼之立消

一方 翠玉膏通明懸青八兩銅綠二兩麻油三錢雄猪膽汁三個先溶懸青等藥後下麻油熬至軟硬合宜取傾水中扯扳器盛每用緋帛攤貼不須再換

銳毒生在耳後一寸三分高骨後初如黍粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤軟諸瘡疼痛倍增若紅腫速潰者順堅硬黑陷者逆左耳後見之爲天疽俱危症也務宜急治之遲則無救此方男女大小皆效

大天南星煆存性爲末醋塗三次即愈

一方 大黃一兩青木香三錢薑黃槟榔各三錢共爲末蜜調貼中留一孔甚效

一方 金銀花歸尾赤芍連翹殭蠶大力子元參等分接服兩大劑即愈

腮毒 大黃末薑汁和勻周圍搽轉止露一頭不日即愈也

面上毒瘡初起者 急尋水蜒蚰一二條用醬少許共搗塗紙上貼之即退紙上留小孔出氣極效

小兒耳邊腮腫　五棓子濕紙包一個燒灰存性研末雞子白調糊遍敷立效

肺熱面瘡　苦絲瓜牙皂並燒灰等分油調搽之

面上風瘡　鹿角尖磨酒塗之

疙腮　赤小豆爲末以苧根和調雞子白調搽即愈

瘡疽並敷

腦疽有透腦侵腦二疽之分透腦生於百會穴前頗門穴前侵腦生於透腦疽前側下五處穴皆險症也　槐花子蒂丁千頭子即掃箒子各等分水煎通口温服加蟾酥少許尤妙治疔瘡更效偏正對口亦名正腦疽偏腦疽此方並治之

燕窩瘡生於下頦俗名羊鬍子瘡　碧玉散黃柏末紅棗肉各五錢研細末香油調搽內服平胃散加芩連生薑引

一方　鼠屎研末香油搽即愈

雀斑生於面上其色淡黃碎點無數由火鬱血分風邪外搏而發　時珍玉容散

猪牙皂角紫背浮萍白梅肉甜櫻桃枚各一兩焙乾兌鷹屎白三錢共研細末每早晚用少許在手

心內水調濃搓面上良久以溫水洗面至七八日後其斑皆沒神效

一方及黎黑斑點　苦酒浸木常常拭之

面上黑痣形如衛點小者如黍大者如豆比皮膚高起一層有自幼生者有中年生者

巴豆一錢石灰炒人言各一錢酒米五分炒研點之

一方　每夜以煖酸漿水洗面用布揩赤再以白檀香磨汁塗之

一方人生惡肉　黃豆稍燒灰入豆油炒點之即去

一方　羚羊胆牛胆各一枚醋二升同煮三沸頻塗

一方　巴豆七粒石灰等分爲末以糯米用伏未中鹹水浸之候米爛將痣用針撥破米膏點之三日勿洗其痣自落

黧黑皯黯一名黧黑斑初起色如塵垢日久黑似煤形枯暗不澤大小不一小者如粟粒赤豆大者似蓮子芡實或長或斜或圓與膚相平婦女多有之

一方及酒皰鼻令人悅顏色　冬月間新生雞子取白酒漬之

密封七日取出每夜塗面最良

一方 鹿角尖磨濃汁厚厚塗之神效

一方 李子仁去皮細研以雞子白和如稀餳塗之至旦以漿水洗去後塗胡粉不過五六日見效但須忌見風

一方 冬瓜藤煎洗之亦洗疥瘡

一方 以米醋浸黃雞子候至壞時敷之

一方 鷹屎白二分胡粉二分蜜和封之

一方 冬瓜練即瓜瓤洗之且能悅澤白皙

一方 密陀僧爲末以陳醋浸敷之隨手而愈每年一次並治癜風

一方 蜜陀僧六錢雄黃三錢硫黃三錢先以薑搽斑上次用藥末搽之次日即焦永不再發並治癜風

對口 亦名腦疽有偏正之名正者易治偏者難治皮厚難破爲腦疽皮薄易破爲腦瘡宜別之

貓頭骨燒存性研末每服三五錢酒下

一方　熱雞冠血頻頻塗之取效爲度

一方　偏對口及一切色白陰毒初起　活鯽魚一個生山藥一段樣長用白糖二錢同搗極爛敷上乘消卽去並治瘰癧初起如婦人乳癌初起用臘糟同搗敷上立消

一方　甘蔗渣焙燥研末白狗屎焙燥研末和勻用竹管將稀絹包一頭入藥篩在膏藥上貼之卽愈危者亦愈

一方　初起者　桃葉尖九個搗爛摻入卽愈

一方　用抱小雞窩中母雞熱屎取塗之

一方　鮮茄蒂七個鮮首烏輕粉各等分水二鍾煎八分一服出膿再服收口

一方　猪苦胆剖開碗盛其汁塗完卽癒　男用雄女用母

一方　天茄　卽白牽牛葉帶莖子採之同生薑三片搗敷早晚一換三日全愈

瘰癧小者爲瘰大者爲癧名色甚多項前爲瘿瘰項後爲瘤瘰左右兩側形軟遇怒卽腫爲氣癧堅硬筋縮爲筋癧若連綿如貫珠者卽爲瘰癧又有馬刀子母重臺蛇盤鎖項蜂窩惠袋燕窩瓜藤瘨

瘍流注單窠蓮子門門及風石鼠瘰鼠瘰即俗之鼠瘡形名各異受病固不外痰濕風熱氣毒而成然必兼恚怒忿鬱幽滯謀慮不遂而致者也　初起成塊未破者將甕揑成薄條照瘡大小略離患處作圈圍着再用新鋤於土內取出槐樹根上白皮數條照甕皮作圈放趄皮上用艾作小尤放栗子中心灸之內略覺痛即拂去艾尤另灸每日如此三遍甕圈不必動槐皮要換三次　連灸三日即消

瘰癧初起未破以前疎滯消腫止痛要方　白膠香海螵蛸降眞香心無土氣者佳各等分研末溫水調稠薄紙攤貼神效

瘰癧不拘已破未破並久近者　花粉苦參各五錢皂角四十九個土茯苓三觔共煎湯當茶飲忌牛肉屢驗奇方

一方　枇杷葉一觔四兩去毛梗淨焙燥爲末水白糖一觔拌勻不拘時服白湯過口服完即愈

一方未破即消已潰爛牽至兩肩胸膛茄子大及連年不愈者　沈香五錢芫花炒三錢月季花即月月紅用二錢碎剉入大鯉魚腹中魚須

放尿內遊死出就以魚腸封固酒水各一碗煮熟服之即愈

瘰癧內消驗方　鼠糞七錢大楓子仁五錢巴豆三錢共搗入大鯽魚肚內用紙包縛再用黃泥封固如法煅煉俟烟盡取出冷定研細末米糊丸菜豆大每空心黃酒下二錢十日全消神效

一方　雞蛋一枚頭開小孔採綠蔓梅花將開者七朵入蛋內封好煮熟去花食蛋如此七枚全愈

諸般瘰癧未成者能消已成者能潰　定粉磨刀石泥三稜莪朮二藥酒浸炒乾昆布去土酒洗各五錢研極細滾水調塗患處用此消堅尤速李梁龍泉散

一方已潰者能生肌長肉未潰者則能消散　以雞蛋微開一孔用川貝母心七條入內仍以紙封固飯上蒸熟食之每日飯後食一枚二十餘日定能全愈

一方內消法　斑蝥七個粘米炒去足翅黑丑炒一錢荊芥炒黑一錢各為末夏枯草煎湯調服以下出之物如

膿血爲驗

一方 白鴿屎炒研末飯和丸梧子大每三五十九米飲下

一方 無論蟻瘻蜂瘻瘰癧惡瘡 猬心肝燒灰酒服一錢

癧串 革麻肉嫩松香各等分搥萬餘下攤青絹上貼之卽愈

瘰癧鼠瘻 貓眼睛燒灰井華水服方寸匕卽數分日三服

或以貓舌生研敷之

一方 以貓口中涎將癧刺破塗之

一方或已潰者 以狐頭骨同野貓頭骨燒灰敷之

瘰癧腫痛久不瘥者 野貓頭蹄骨以酥炙黃爲末每日空服米飲下一錢七分

鼠瘻瘰癧 猪膏醃生地黃煎六七沸塗之

一方及鬼疰毒氣在皮中如針刺者 兎頭皮燒灰白水調服

癧瘻潰爛 用貓腦紙上陰乾同莽草等分爲末納孔中甚效

一方 臘月貓屎以陰陽瓦合鹽泥封固煅過研末油調塗之

一方 雄鼠一枚亂髮一雞子大以三歲臘猪脂煎令消盡以一半塗之一半酒服

一方 新鼠屎一百粒收蜜器中五六十日杵碎敷之神效

一方 田螺連肉燒存性香油調搽

一方 土牆上白螺螄殼爲末日日搽之

一方 汁出不止 白鴨脂調半夏末敷之

瘰癧多年不愈 貓頭蝙蝠各一個俱撒上黑豆同燒存性爲末摻之乾則以油調搽內服五香連翹湯取效

瘰癧潰久不斂 乾薑爲末薑汁打糊作丸劑以黃丹爲衣每日隨瘡大小入藥以追膿盡肉生口合爲度如不合以葱汁調大黃末搽之即愈

乳癌潰爛幾見臟腑 土練樹子 經霜者炒川練不用 雄鼠屎露蜂房

各三錢俱煆存性爲末每酒服三錢間三日一服不數日膿盡收斂

鼠瘻　黑參漬酒日日飲之

一方已破出膿血者　白蘚皮煮汁服一觔當吐如鼠子即愈肘後方

瘰癧疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者　雞鳴散黑丑一兩胡粉一錢生大黃二錢朴硝炒成粉二錢共細末每服二錢雞鳴時井華水調服以二便通利爲度如未利再服之

風痰瘰癧遶項而生　每藁以蕎麥炒過去麥白殭

斑蝥最毒每用七個若多用只宜同炒〻過即去取其氣味而已始免毒人　此係古方荊芥殭蚕黑丑三味各用四錢原本誤作二錢又脫漏斑蝥不用五字如於大米炒之旁添註去斑蝥不用五字方合　魏雲韶註

先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再服一錢

各三錢俱煅存性爲末每酒服三錢間三日一服不數日膿盡收斂

鼠瘻　黑參漬酒日日飲之

一方已破出膿血者　白蘚皮煮汁服一觔當吐如鼠子即愈肘後方

瘰癧疼痛及熱毒結核或多頭悶熱而不寒者　雞鳴散黑丑一兩胡粉一錢生大黃二錢朴硝炒成粉二錢共細末每服二錢雞鳴時井華水調服以二便通利爲度如未利再服之

風痰瘰癧遶項而生無寒熱者　海藻以蕎麥炒過去麥白殭蠶微去絲等分爲細末用白梅肉泡湯爲丸梧子大飯後或臨卧時每服六七十丸米湯送下忌魚腥厚味自愈

誤食毒物致成瘰癧　荆芥穗殭蠶炒去絲黑丑各二錢斑蝥二十八個去頭足翅大米炒爲末卧時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再服一錢

五更初卽用温酒調藥一錢或二三錢量强弱用之服後如小水未下惡物次早再用一服仍不行第三日五更初先喫白糯米粥再服一服更以燈心湯調琥珀末一錢以利下惡物爲愈如孔痛用青黛一錢以甘草湯調下其痛卽止

瘰癧堅硬難消難潰　整文蛤一個攢孔金頭蜈蚣一條研粗末裝文蛤內紙糊封口外再用紙糊七層晒乾麪麪拌炒以紙黑焦爲度去紙研極細末加麝香一分再研勻陳醋調稠温敷堅硬核處外用薄紙蓋之每日一換神效

二方　貝母去心一錢薑棗引服效

三發背　上背又名脾肚發中背又名對心發下背又名對臍發上發在天柱骨之下中發與心相對下發正對臍上三症無論老少總以高腫紅活燃痛者爲順若漫腫塌陷焦枯紫黑者爲逆初起者不論虛實卽宜隔蒜艾灸灸之則就患瘡頂當肉灸之至知痛爲效不知痛者則多以大化小移深居幾灸後用針當瘡頂點破一孔隨用拔

法務使毒氣內外疎通庶不致內攻如有兼症隨症參詳汗下雙解之法而治之潰後則與瘡疽瘡瘍同法治之

一方初起者　生薑一塊炭火炙一層刮一層爲末以猪胆汁調塗之

一方初起者　羊脂猪脂切片冷水浸貼熱則易之數日即癒亦治乳發

一方初起　以黃明膠四兩酒一碗重湯炖化隨意飲盡不飲者用白湯下之不致惡毒內攻

一方初起者　黃明膠新瓦上燒存性研末酒二碗服之神妙

一方欲潰不能者　穿山甲四片黃明膠炒存性研末以酒冲服

一方初起者　鹿角燒灰醋和塗之日五六易甚效

一方未潰或初起者　千歲子出交趾地方不拘多少搗爛如泥醋調塗之三次見效

一方熱腫痛甚　魚腥草搗塗之中留孔以洩熱毒即易塗神效

一方及一切癰疽　母猪蹄一隻通草六分綿裹煑羹食

一方已潰及腫毒　雞嗉子及肫內黃皮焙研濕則乾搽乾則油調搽

一方疼痛欲死　冬瓜壹個去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡已漸愈矣乃用膏藥貼之

一方及一切癰疽　削瓜一大塊置瘡上熱則易之可去熱毒蓋取其走而性急久病及陰虛者忌用

五雲膏又名銀黝五枝膏為治瘰癧仙丹　又治各項有名無名瘡毒未破者即破而易收功已破者即拔膿生肌　瘡中有骨者名多骨疽此膏最能拔骨　又治風濕腰痛腿足痛均有奇功此集中治外科第一奇妙良方也　鮑雲韶註

一方熱腫痛甚 魚腥草搗塗之中留孔以洩熱毒卽易塗神效

一方及一切癆疽 毋猪蹄一隻通草六分綿裹煮羹食

一方已潰及腫毒 雞嗉子及肫內黃皮焙研濕則乾搽乾則油調搽

一方疼痛欲死 冬瓜壹個去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡已漸愈矣乃用膏藥貼之

一方及一切癆疽 削瓜一大塊置瘡上熱則易之可去熱毒盖取其走而性急久病及陰虛者忌用

濕毒瘰癧漫腫疼痛皮色如常有日久將潰皮色透紅微熱痛甚 初腫者神攻散製烏頭嫩黃芪各等分研細末米醋調稠温敷腫處每日一換總不宜於寒涼藥

諸般瘰癧未潰者不辨肉色不問大小及日月深遠或有赤硬腫痛並皆貼之 生山藥車麻子肉等分搗勻攤貼之奇驗

馬刀瘰癧及鼠瘡已潰者 五雲膏銀黝子四兩搥碎黃丹八兩飛淨香油二十兩用砂鍋一口盛香油

火温候油熟將黜子投入油內用桃柳桑槐棗五枝攪之候起珍珠花撈去渣用布濾淨復將油下鍋慢慢將黃丹篩入油內仍用五枝不住手攪之以滴水成珠為度取出收貯用時勿用見火以重湯炖化紅緞攤貼功效甚大

一方瘰癧潰後用之專消餘毒　蛇蛻膏蜜蜂二十一個蛇蛻七分半蜈蚣二條端午前收者佳用香油四兩將三藥入油內文武火煤枯撈去渣入定粉二兩用如飴粗桑枝七條急攪候冷出火氣七日夜方用紙攤貼患處極效

鈕扣風生於頭下天突穴之間起如粟米搔癢無度抓破流水犯水則浸淫成片　輕者用獨勝散芥菜花研細醋調敷之立能止癢消腫

一方　重者水硫散用白蘿蔔一個掏空以硫黃一兩潮腦川椒生白礬各二錢研細末入蘿蔔內仍用皮蓋定紙包三四層灰火內煨半時許待冷將藥取出用熟猪脂油調稠搽之自愈

上石疽又名小石癤生頸項兩旁形如桃李皮色如常堅硬如石臀痛不熱乃疲頑之症也

採二蠶桑葉滴下之水點之以愈爲度

一方氣虛者　外用葱蜂蜜搗泥敷貼內服養榮湯加香附酒炒

發背及一切瘡疽皆因熱毒者多症見眼花頭運口乾身熱四肢麻木背有紅暈者　槐花子一大把鐵鍋炒至瑒色冲好酒一盞乘熱飲之一汗而愈如未退再服極效保壽堂屢驗方縱成膿亦無不驗

背毒未成　活蟾一隻繫放瘡上半日必昏憒置水中救其命再易一隻必跟蹌再易其蟾如舊則毒散矣累用極效勿輕視之

發背或搭手破爛者　生山藥一兩白糖霜四兩打爛塞入毒內不臭爛肉去則新肉自生初時日換三次三日後一日換一次煎甘草湯或猪蹄湯洗用軟鵞毛數根紮之洗去再敷待肉長滿方止

發背散血方　槐花菉豆粉各一觔同炒至象牙色

研勻細茶一兩煎一碗露一宿調末三錢敷之留
頭勿犯婦人手極效
發背潰後去餘毒　眞定粉二兩麻油三兩慢火熬以
柳木急攪至滴水成珠爲度再入白膠末少許置
磁器中水浸兩日臨症攤貼中留一孔極妙
發背初起　以石韋去黃毛炒爲末冷酒調服
發背潰爛　黑毛黃牛糞多年者晒乾爲末入百草
霜研細摻之

一方　雞肫黃皮同棉絮焙末搽之
三搭手　上搭生眷骨第三節傍開一寸半肺俞穴間
左右同中搭生於眷骨第四節傍開三寸膏
肓穴間一名龍疽下搭生於眷骨　初起者以全
第十四節傍開三寸肓門穴間　蝎去頭足
尾甲　炙胡桃肉等分研細末酒冲服一二次
即消
丹毒發生於背形如湯火所傷細瘡無數赤暈延
開發時其渴非常由素服丹石剛劑所致
大甘草二觔搥碎河水浸一宿採取濃汁去盡筋
渣再用絹濾過銀器內慢火熬成膏用磁罐收貯

每服三錢無灰温酒調下或白滾水亦可外用牛肉薄片貼之

中石疽皆由寒氣瘀血凝結生腰胯之間纏綿難愈其疽時覺木痛難消難潰堅硬如石皮色如常

初起速用鮮商陸搗爛貼於患處隨用艾壯當頂灸之以疽軟爲止內服行瘀和血藥如潰後以生肌長肉膏藥貼之自愈

纏腰火丹俗名蛇串瘡又名白蛇纏腰色有乾濕紅黃之異皆纍纍如珠形若不速治纏腰已遍毒氣入臍令入膨脹悶嘔者則不救

蛇蛻一條燒灰存性厠坑板上浮泥刮下同研細用童便調敷數次一二日

一方 旱烟池烟屎敷之真是仙丹百方不及此 鮑雲韶傳方

一方 鍋臍灰將臭飯脚水調敷

一方 柏葉散側柏葉蚯蚓韭菜地內屎黃柏大黃各五錢雄黃赤小豆輕粉各三錢爲細末先將丹皰用針穿破方以前末敷之此不速治則多逆矣

黧黑皯黯及雀斑 白殭蠶二兩黑丑二兩細辛一兩

每服三錢無灰温酒調下或白滚水亦可外用牛肉薄片貼之

中石疽皆由寒氣瘀血凝結生腰胯之間纏綿難愈其疽時覺木痛難消難潰堅硬如石皮色如常

初起速用鮮商陸搗爛貼於患處隨用艾壯當頂灸之以疽軟爲止內服行瘀和血藥如潰後以生肌長肉膏藥貼之自愈

纏腰火丹俗名蛇串瘡又名白蛇纏腰色有乾濕紅黃之異皆纍纍如珠形若不速治纏腰已遍毒氣入臍令入膨脹悶嘔者則不救

蛇蛻一條燒灰存性厠坑板上浮泥刮下同研細用童便調敷數次一二日即愈

一方 白芨八錢水龍骨糞斑者佳共研末無根水調敷

一方 鍋臍灰將臭飯脚水調敷

一方 柏葉散側柏葉蚯蚓韭菜地內屎黃柏大黃各五錢雄黃赤小豆輕粉各三錢爲細末先將丹皰用針穿破方以前末敷之此不速治則多逆矣

黧黑皯黯及雀斑 白殭蠶二兩黑丑二兩細辛一兩

研細末煉蜜爲丸彈子大日洗數次一月全愈

面上靨痕并一切瘢痕　鷹屎白二錢以人乳和勻入蜜少許塗面三四日即光

面上白駁似癬非癬皮漸生白無藥可治　鰻鱺魚脂火炙出一兩先拭駁上刮令燥疼後以油塗上不過三次即愈

面上皯贈及汗斑雀斑　紫背浮萍漢防己煎水洗或晒乾爲末擦之神效

黑痣　藜蘆五兩用滾水一大碗淋汁於銅器中外以湯煮如黑膏以針微撥破痣處點之不過二次即脫

瘰癧結核　日以山慈菇醋磨塗之

癧瘦　露蜂房炙研末猪脂和塗自愈

少年氣盛面上生瘡皰　以麋脂化開塗之

去靨痣並爛瘡疽惡肉　甜蕎麥稭即麥藁皮也燒灰淋汁取鹽蒸乾同石灰等分蜜收點之最妙

滅諸瘢痕　春夏用大麥麩秋冬用小麥麩篩粉和

酥油敷之

一方 大雄鼠一枚以臘猪脂四兩煎至銷盡濾淨油日塗三五次先以布拭後塗並治赤遊風

外科 眼鼻耳口唇齒舌喉胸乳九部

眼胞菌毒生於眼之上下眼胞邊形如豆漸長垂出如菌堅凝不痛如經年不愈消之不應者翠雲錠子即杭粉五兩銅綠黃連各一兩輕粉一錢爲細末用糯米百粒水一碗煎半碗去米再煎至三分和藥作錠陰乾用時水磨令濃蘸塗之但先當用軟綿紙蘸水潤眼皮菌毒處少頃用左手大脂甲墊於毒根右手持鈹針尖頭磨根切下然後敷藥其血即止內服清脾火藥忌海腥煎炒

針眼生於眼皮毛睫間形如豆粒有尖如破後被風侵瘡口以致頭面浮腫目赤澁痛諸藥不效者

苦皮散川苦二兩青皮一兩爲末每服二錢菊花湯調服外用鹽湯洗淨以枯白礬末調雞子清敷之

一方 用南星末同生地黃搗貼太陽穴自消

眼胞瘀核生於上下眼胞皮裏內外或如棗或如豆推之移動皮色如常硬腫不疼從眼皮裏潰破者多難斂 內用二陳湯加殭蠶炒川連研細末荷葉煎湯合先梧子大每服二錢白滾水送下外用生南星醋磨濃頻搽眼皮日數次淺者即消日深者亦宜常塗令皮薄軟微微撥損以手指甲擠出白粉汁即消後貼生肌膏藥

椒瘡粟瘡椒瘡生於眼胞之裏形如椒粒色赤形硬難消粟瘡形如黃米色黃形軟易愈二瘡若眼皮內有紅絲堆纍者乃血熱有餘也 以燈草刮瘡令血出即愈

鼻淵鼻竅中時流黃色濁滯乃內因胆經之熱移於腦髓外因風寒凝結火邪而成 藿香先藿香連枝葉八兩研細末雄猪胆汁和先梧子大每服五錢食後蒼耳子湯下或黃酒送下

一方 白芷一兩蒼耳子炒辛夷仁各二錢五分薄荷五分爲末葱茶清調服

控腦砂一名腦漏乃鼻淵久而不愈鼻中淋漓膩臭血水頭眩虛暈而痛必係有蟲蝕腦也天羅散絲瓜藤近根處者燒存性爲末每用三錢食後黃酒送下

一方 用破瓢白雞冠花白螺螄殼等分燒灰加血竭麝香各五分以好酒洒濕熟艾和作餅貼頂門熨斗熨之以愈爲度

一方 熊胆湯化抹之並治鼻齆瘡

鼻齆瘡多生小兒鼻翅兩旁色紫斑爛膿汁浸淫痒而不痛由風熱客於肺經所致 海螵蛸白芨各一錢輕粉二字(即五分)爲末搽之

一方 以牛皮草拳燒灰爲末搽之(即穿牛鼻草繩)

鼻瘡生於鼻竅內初覺燥痛瘡如粟粒甚則鼻外色紅微腫痛如火炙 杞竈飯燒研末塗之或用飯盆邊零飯燒灰研末敷之

一方 猪油調犬骨敷之

一方 馬拌繩燒灰摻之

一方 或鼻疳蟲蝕口鼻 牛骨犬骨燒灰臘猪脂和敷神效

一方 烏牛或黑牛耳垢敷之

一方 杏仁去皮尖搗爛以人乳和杏泥敷之

一方 陀僧白芷各一兩爲細末摻之

鼻痔 生於鼻內形如石榴子漸大下垂色紫微硬掌塞鼻孔凝人氣息難通肺熱也 瓜蒂

鼻痔 藕節晒乾燒枯研末時嗅鼻中可斷根神效無比 鮑雲貂傳方

水一日一次自愈

鼻中瘜肉 惡肉也人之臭息是也 蟯蝦一枚納青竹筒中油紙密封置厠坑內四十九日取出晒乾入麝香少許爲末塗之當化爲水也

一方 藜蘆三分雄黃一分蜜和日點三次勿點兩畔

肺風粉刺 由肺經血熱而成發於面鼻起碎疙瘩形如黍屑色赤腫痛破出粉汁日久成白屑如黍 大黃硫黃等分研細末共合一處再研勻以涼水調敷名顛倒散內服清肺熱藥自愈

一方 或鼻疳蟲蝕口鼻 牛骨犬骨燒灰臘猪脂和敷神效

一方 烏牛或黑牛耳垢敷之

一方 杏仁去皮尖搗爛以人乳和杏泥敷之

一方 陀僧白芷各一兩爲細末摻之

鼻痔 生於鼻內形如石榴子漸大下垂色紫微硬撐塞鼻孔礙人氣息難通肺熱也 瓜蒂炒甘遂炒各四錢枯白礬五分爲末松香五分香油調和爲丸即以松香爲衣入鼻內點之即化臭水一日一次自愈

鼻中瘜肉 惡肉也人之臭息是也 蟯蝦一枚納青竹筒中油紙密封置厠坑內四十九日取出晒乾入麝香少許爲末塗之當化爲水也

一方 藜蘆三分雄黃一分蜜和日點三次勿點兩眸

肺風粉刺 由肺經血熱而成發於面鼻起碎疙瘩形如黍屑色赤腫痛破出粉汁日久成白屑如黍 大黃硫黃等分研細末共合一處再研勻以涼水調敷名顛倒散內服清肺熱藥自愈

一方　益母草燒灰一兩肥皂一兩共搗爲丸日洗三次十日後粉刺自然不生須忌酒薑則不發

鼻赤（亦酒皶鼻粉刺之屬也）　硫黃皮硝等分研極細末臨卧擦之一月全愈

一方　陀僧二兩細末日擦之自愈

酒皶鼻（生於鼻準頭及鼻兩邊先紅後紫久變爲黑最爲纏綿）　硫黃四兩裝入猪大腸頭內線紮定兩頭水煮三炷香取硫黃陰乾磁瓶收好用時加水片少許以指擦之每日數次自漸全愈

一方　以勒臍日日不時擦之自瘥

一方（日久不愈者）　梔子仁九梔子仁研末黃蠟溶化和九彈子大每用一九茶清送下忌辛辣之物

一方（出膿血者）　正月取鼠頭燒灰以臘月猪脂調敷

一方　水老鴉屎一合研末以臘月猪脂和勻每夜塗上至日洗之並治面上黑皯癜瘕疵

一方　當歸苦參各四兩爲末和勻酒糊九桐子大

食後熱茶吞八十丸藥盡即愈

一方　蛇床子紅豆等分爲末早洗晚搽

一方起非日久者　麻黃及根各二兩頭生酒將藥入酒內重湯煮三炷香露一宿早晚各飲三五杯至三五日出膿成瘡十餘日則膿盡膿盡則紅色退先黃後白而愈并以顛倒散敷之更妙方見粉刺

鼻塞　萆麻仁三百粒大棗一觔搗勻綿裹塞日易一月全愈

粉刺皰瘡　胡粉水銀臘猪脂三味同研如泥夜間敷面勿洗三日即瘥

酒皶鼻　蜜陀僧一兩研極細用人乳或蜜調如薄糊每夜略蒸待熱敷面次早洗去半月後面如玉鏡生光相傳楊貴妃所製方也

耳內黑疔生耳竅暗處色黑形如椒目疼如錐刺痛引腮腦破流血水有因腎經火毒所發亦有因服丹石熱藥藥積毒而成者　急服蟾酥丸汗之再用蟾酥丸水調濃滴耳竅內立效

耳中生核大痛難忍 以燒酒滴入仰之半時即可箝出

耳疳震耳纏耳停耳風耳俱係耳內悶腫出膿但膿色不一而名亦各異耳疳則出黑色臭膿震耳則出青膿纏耳則出白膿停耳則出黃膿俱由胃濕與肝火相兼而成惟風耳則出紅膿偏於肝經血熱 外俱宜醬茄自然油滴之俟膿浮用滴耳油時時滴之方即核桃仁研細擠油去渣得油一錢兌冰片二分每用少許滴耳內則腫消肌生自愈風耳內服四物加丹皮石菖蒲餘症內服清肺瀉肝諸藥

二方有蟲膿血不止 鯉魚酢三兩鯉魚腦一枚鯉魚腸一具烏麻子炒研一升同搗入器中微火炙腋布裹貼耳外以血蟲出盡爲度即愈

一方 鯉魚腦和桂末搗勻棉裹塞耳內引蟲出則愈驗方

一方有膿 石首魚即魚頭中石子鼈研末或燒存性研摻耳中

一方有膿及耳聾 海螵蛸五分同麝香一字即二分五厘爲末以棉杖微微吹耳中

一方出汁　夜明沙二錢麝香一字（即三分五厘）爲末拭淨摻之

一方出膿　犬膽一枚枯礬一錢調勻棉裹塞耳內三四次即瘥

一方出汁　取鼠肝如棗核大乘熱塞之能引蟲出

一方膿出不止　水龍骨一錢硼砂五分爲末吹入耳門上用棉塞之二服斷除名停耳丹

耳痺　龍骨麝末輕粉枯礬等分爲末吹入耳即愈

耳疳及諸般耳症　用頭髮在新瓦上燒灰存性爲細末羅過每灰一錢加氷片七釐研勻吹少許入耳內即愈極驗

一方　燕脂燒灰爲末加氷片少許吹之即愈

耳衄耳竅中時流鮮血腎脉虛數者　生地麥冬去心各五錢水二鍾煎八分食後服外用神塞丸麝香一分生白礬一錢沉香三分糯米五十粒研細末麪糊爲丸梧子大每丸薄棉裹之如左耳出血塞右鼻右耳出血塞左鼻兩耳出血塞兩鼻如鼻衄亦按耳衄法

塞耳

耳痔耳蕈耳挺皆生耳內耳痔形如櫻桃或如羊奶挺形如棗核細條而長蕈形類初生時蘑菇頭大蒂小耳腎經相火胃經積火凝結而成微腫悶疼色紅皮破不當鬲犯偶犯之痛引腦顛 俱宜硇砂一錢輕粉雄黃各三分冰片五釐研細末水調濃用穀草細梗咬毛蘸點患上內服清肝熱藥漸漸自愈

耳瘑眩目 黑雌雞膽汁塗之日三次

旋耳瘡是瘡盛衰隨月盈虧故又名月蝕瘡生耳後縫間及耳摺上下如刀裂之狀色紅時津黃水由胆脾濕熱所致 輕粉研隔紙微炒穿山甲炙鉛粉黃丹水飛過各三錢研極細香油調敷

一方 龜甲燒灰敷之

一方 烏雄雞腦日塗三次數日即愈

一方 敗鼓皮掌大一片以苦酒三升漬一宿塗之或燒灰以豬脂調塗

一方 虎頭骨二兩搗膏研末和豬脂一觔熬膏塗之即愈

一方　白馬骨燒灰和油敷之並治小兒陰瘡

一方　望夜取白兔屎納蝦蟆腹中同燒爲末敷之

一方　以檳榔細末吹之

大人虛火口瘡其色淡紅滿口白斑微點甚者陷露龜蚊脉虛不渴　柳花散

黃柏末一兩青黛三錢肉桂二錢氷片二分各研細再合一處研勻每用少許搽患處內服四物加梔柏丹皮桂少許服之即愈

大人實火口瘡其色艷紅滿口爛斑甚者腮舌俱腫脉實口乾　赴筵散黃芩黃連梔子生乾薑黃柏末細辛各等分共研細或出手不意在窓外連打大鉢擊或用大缸鉢擲地使聞聲一驚其舌目收　鮑雲韶補注

鬚邊生癤　貓頭上毛同猪脛上毛各一把鼠屎一牙根出血有流二三日不止而死者用豆腐渣敷之即止此腎經虛火內服六味地黃湯數劑方免復發此福建邵武縣誌所載也　鮑雲韶傳方

一方　白馬骨燒灰和油敷之並治小兒陰瘡

一方　望夜取白兔屎納蝦蟆腹中同燒爲末敷之

一方　以檳榔細末吹之

大人虛火口瘡其色淡紅滿口白斑微黠甚者陷露齦蚊脉虛不渴　柳花散

黃柏末一兩青黛三錢肉桂二錢氷片二分各研細再合一處研勻每用少許搽患處內服四物加梔柏丹皮桂少許服之即愈

大人實火口瘡其色艷紅滿口爛斑甚者腮舌俱腫脉實口乾　赴筵散黃芩黃連梔子生乾薑黃柏末細辛各等分共研細末每用少許搽患處吐去涎內服涼膈散方見諸書功效如神二火俱禁水漱

鬚邊生瘡　貓頭上毛同猪脛上毛各一把鼠屎一豆許燒灰研末油調敷之

牙齦牙根出血非實熱者　小薊散小薊百草霜蒲黃微炒香附米醋浸晒乾各五錢研細末用搽牙上俟半刻時溫茶漱之內服滋陰降火或補氣藥隨症酌與

之功效甚强

牙生黑疔 生於旁邊牙縫腫起一粒形如粟米痛連腮項或兼麻痒破流血水疼痛異常俱屬腎經火毒 俱急用銀簪尖挑破見血爲度隨搽拔疔散 方見痘科 再以蟾酥丸噙化徐徐嚥之遲治則逆

走馬牙疳 多由癖疾積火或疹痘餘毒上攻最爲迅速總因積火熱毒而成牙根作爛隨變異

走馬牙疳 快如走馬遲則難救 原本鄉英方白砒射矢方 蘆薈散青蓮膏此數方均有神功的不及之 鮑雲龍註

根松蘿茶煎濃汁乘熱以雞翎蘸洗患處去淨腐肉見流鮮血再敷此藥日敷三次若爛至咽喉以蘆筒吹之

一方 牙齦青紫漸腐甚至腮穿齒搖 外勢重者蘆薈散蘆薈一錢黃柏末五分人言五分 用紅棗五枚去核每棗入人言一分 火燒存性共研細末先用米泔水漱淨疳毒後敷此藥於堅硬及腐處如牙縫黑腐不盡及腐爛深坑藥不能到即用勒馬聽嶶絲即白砒末一分麝香末三分青綿撕碎青黛飛末各一兩用香油拌勻用時

之功效甚強

牙生黑疔 生於旁邊牙縫腫起一粒形如粟米痛連腮項或兼麻痒破流血水疼痛異常俱屬腎經火毒 俱急用銀簪尖挑破見血爲度隨探拔疔散方見瘡科再以蟾酥丸噙化徐徐嚥之遲治則逆走馬牙疳 多由癖疾積火或疹瘡餘毒上攻最爲迅速總因積火熱毒而成牙齦作爛隨變黑色臭穢難聞 外勢輕者溺白散溺垢須婦人桶中者火煆五錢白霜梅燒存性枯礬各二錢研細末先用韮菜根松蘿茶煎濃汁乘熱以雞翎蘸洗患處去淨腐肉見流鮮血再敷此藥日敷三次若爛至咽喉以蘆筒吹之

一方 牙齦青紫漸腐甚至腮穿齒搖 外勢重者蘆薈膏散蘆薈膏一錢黃柏末五分人言五分用紅棗五枚去核每棗入人言一分火燒存性共研細末先用米泔水漱淨疳毒後敷此藥於堅硬及腐處如牙縫黑腐不盡及腐爛深坑藥不能到即用勒馬聽簌絲即白砒末一分麝香末三分青綿撕碎青黛飛末各一兩用香油拌勻用時

先以清米泔水漱口次用鑷尖將絲挑少許塞於牙齦縫內日三易之再用手法去其黑腐總以內見紅肉流鮮血者則爲吉也

一方 頑肉難脫堅硬腐爛漸開以致穿腮破唇 青蓮膏青黛二錢乳香輕粉各一錢麝香五分白砒一分爲細末用香油調稠薄攤紙上用搥搥實陰乾收之每於卧時以泔水漱淨口拭乾隨疳症大小煎膏藥貼之至曉揭去再以泔水將口漱淨吐之至晚再貼見是症者俱宜內服消疳解毒藥當謹忌食山藥栗子鵝蟹甜辣等物稍犯必發身熱不退者亦主逆症

一方 白馬懸蹄燒灰入鹽少許摻之卽出其蟲

一方 黑貓頭燒灰酒服方寸匕 卽數分

一方 鮰魚一尾去腸入砒一分生地黃一兩紙包燒存性入枯礬麝香少許爲末摻之

一方 五棓子青黛枯礬等分爲末先以鹽水漱淨隨以藥末摻之立效

一方　銅青滑石杏仁等分爲末擦之卽愈

一方（透骨穿腮危症）　生南星一個剜空入雄黃一塊麪裹燒候雄黃成汁以盃合定出火毒去麪爲末入麝少許拂瘡數日甚效經驗方

一方　青礬入鍋內炭火煆紅以醋拌勻如此三次爲末臨用時入麝香少許再研勻擦之卽愈

一方　蠶退紙燒存性入麝香枯礬各少許蜜和擦之立效

齒齲初起牙齦宣腫覺痛遇風痛甚常作歪日吸氣之狀牙齦腐孔時出臭膿久則齦齒宣露也

初起者用白馬懸蹄少許以棉裹之塞入膿孔內服清胃火藥甚效

紫舌脹由心經火盛血壅以致舌腫滿口堅硬疼痛　宜用衣針紮筋頭上露鋒分許當舌刺數十針令血出紅色者輕紫色者重隨以温水漱口搽氷硼散方見內科雜症咽喉乳娥自愈或內服瀉心火藥

痰包生於舌下結硬如匏光軟如綿塞脹舌下有妨飲食言語一色黃木痛由火稽痰延流注而成

宜用立剪當包上剪破出痰涎如雞子清稠黏不斷拭淨後搽氷硼散方見內科雜症咽喉乳蛾內服二陳加黃連薄荷水二鍾薑三片煎八分食前服忌煎炒火酒即愈

舌衄舌上忽生孔或小如針尖或大如筋頭色紫屬熱甚如色黑則舌尖爛血出如泉湧由心火上

舌衄此症有血流不止而死者服極辣旱烟屎數分或一二錢并不覺苦臭反有甜味可救性命此仙丹也

鮑雲韶傳方

沙側柏葉五錢外用必勝散螺青另研蒲黃各一錢炒共研細搽之後用溫鹽湯漱口血自歸經而愈

痰核舌上生核强硬作痛乃心脾痰涎鬱熱也宜用衣針點破搽氷硼散方見內科雜症咽喉乳蛾內服二陳加芩連薄荷即愈

舌疳惡症也初起如豆次如菌故又名舌菌疼痛紅爛無皮朝輕暮重由心脾毒火所致急用北庭丹番硇砂人中白各五分瓦上青苔瓦松溏雞矢各一錢用傾銀罐子二個將藥裝入封嚴

宜用立剪當包上剪破出痰涎如雞子清稠黏不斷拭淨後搽氷硼散方見內科雜症咽喉乳蛾內服二陳加黃連薄荷水二鍾薑三片煎八分食前服忌煎炒火酒卽愈

舌衄舌上忽生孔或小如針尖或大如筋頭色紫屬熱甚如色黑則舌尖爛血出如泉湧由心火上炎以致血熱妄行　升麻小薊根茜根各一兩三錢艾葉七錢五分寒水石三兩共研每三錢水一鍾煎七分澄去渣入生地汁一盞匙再煎二滾温服或加沙參柏葉五錢外用必勝散螺青另研蒲黃各二錢炒共研細搽之後用温鹽湯漱口血自歸經而愈

瘰核舌上生核强硬作痛乃心脾痰涎鬱熱也　宜用衣針點破搽氷硼散方見內科雜症咽喉乳蛾內服二陳加芩連薄荷卽愈

舌疳惡症也初起如豆次如菌故又名舌菌疼痛紅爛無皮朝輕暮重由心脾毒火所致　急用北庭丹番硇砂入中白各五分元上青苔瓦松塘雞矢各一錢用傾銀鑵子二個將藥裝入封嚴

外用鹽泥固好以炭火煅紅待三炷香爲度候冷開鑵取出入氷麝各一分共研細末臨用時先以磁針刺破血菌用丹少許點之再以蒲黃蓋之良舌衄　海螵蛸同蒲黃等分炒研細末塗之

喉癬一名天白蟻咽嗌乾燥初覺時癢次生苔癬色暗木紅燥裂疼痛時吐臭涎妨碍飲食由過食炙煿藥酒五辛所致　用頭胎黃牛屎以新瓦洗淨盞屎周圍用文武火煅至烟盡存性取出研末將蘆管徐徐吹入自愈

一方　氷片牛黃各一分膽礬三分硼砂八分山豆根二錢雄黃兒茶各八分白梅去核三個共研細末次將白梅搗入藥和勻丸如龍眼大臨卧含口內過夜卽消

一方未潰者　白礬不拘多少研末用方磚一塊以火燒紅洒水於磚上將礬末布於磚上以磁盤覆蓋四面灰攤一日夜礬飛盤上掃下用二錢白霜梅去核二個明雄山甲炙各一錢共研細以小筆管吹入喉內名礬精散

一方潰後腐長疼痛 硼砂三錢入中白煆二錢黃連末一錢薄荷六分冰片五分青黛四分共研極細末吹入腐處俱宜內服清火解毒藥自痊

上腭癌又名懸癌生於口中上腭形如紫葡萄更苦舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕寒熱大作不潰 急用燒鹽散食鹽火燒枯礬各等分研細末以筋頭蘸點患上日三五次其癌自消

喉爛 槐花 牛膝兒茶黃連各一錢共爲細末夏天西瓜水服冬天梨汁服九如綠豆大每服三

九神效

喉中結塊不通水食 百草霜蜜和九莢子大水化一九灌下甚者不過二九

咽喉熱毒諸藥不效丹溪云症係鼻生紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂至咽門而止是以飲食不入並非候症用 土牛膝根獨條肥大者搗碎入好醋三五滴打出汁滴入鼻中二三點即系斷珠破吐出瘀血立安

喉結 杏仁殼一個敲開以半個用蒜泥塗邊蓋手

一方潰後腐裏疼痛　硼砂三錢人中白煆二錢黃連末一錢薄荷六分冰片五分青黛四分共研極細末吹入腐處俱宜內服清火解毒藥自痊

上腭瘡又名懸瘡生於口中上腭形如紫葡萄更苦舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕寒熱大作不潰　急用燒鹽散食鹽火燒枯礬各等分研細末以筯頭蘸點患上日三五次其瘡自消

喉爛　槐花　牛膝兒茶黃連各一錢共爲細末夏天西瓜水服冬天梨汁服丸如綠豆大每服三丸神效

喉中結塊不通水食　百草霜蜜和丸茨子大水化一丸灌下甚者不過二丸

此方土牛膝根甚妙但不易取不如用瓜子菜即馬齒莧另有一種葉不似瓜子形者用之不效取自然汁滴入鼻中效驗如神且易尋採也

乾雲詔傳方

喉結　杏仁殼一個敲開以半個用蒜泥塗邊蓋手

腕窩上糊紮用艾於上灸之立愈結在左灸右手在右灸左手雙結灸左右手

喉卒癌腫　吞苡仁二枚甚良

乳發初起乳房熇赤腫痛不治則成癌漏難治　鹿角磨濃汁塗之並令人嗽去黃水即散

酒皶鼻　凌霄花爲末和密陀僧唾調敷之甚驗

一方亦可作面脂　藁本和白芷爲末日塗之夜塗頭髮內次早梳之令垢滯俱盡

去頭白屑　側柏葉三片胡桃七個訶子五個消梨一個同搗爛用井水浸片時擦頭不生白屑

小兒燕口口角生瘡也　亂油髮燒灰和猪脂調塗之

牙齒長出口外艱於飲食爲髓溢　白朮爲末人乳拌蒸飲服即愈千金方

外科　腹腋肋內癰肩臑臂手八部

臍癌初起腫大如瓜高突如鈴無紅無熱　急用蒜片塌患處以艾灸之則免潰時難治也

臍中出水不痛不腫唯癢甚時流黃水乃腸胃久積濕熱　用平胃散加黃連研細末每服二錢白滾水調服外用三妙散柳生蒼术生黃柏各等分為末乾撒之能止癢滲濕又能治濕癬以蘇合油調搽甚效

少腹疽生於臍下一寸五分氣海或二寸關元或三寸丹田三穴皆由七情火鬱而生　初

起者急用艾灸腫頂七壯至三七壯以痛癢通徹爲度此症高腫紅活疼痛牽背易潰稠膿者易治若濕腫堅硬綿潰腐爛膿如水者多逆

黯疔生腋下堅硬若釘癢而且痛寒熱往來四肢拘急其色紫黑煩燥作嘔痛引半身甚至昏狂急採經行路上烏臼根皮二尺許去皮搗爛敷之其餘按疔門治之

狐臭　黃牛脂和胡粉塗之日三度永瘥

一方　三年釅醋和石灰敷之

一方　薑汁頻塗之自愈不發

一方　夜明沙和豉汁調敷之

一方　龍眼核六枚同胡椒二七枚研細俟汗出即搽之自痊

一方　細銅末四兩好醋泡一夜搽之日二次三四日即愈不發

一方　猪精肉二大片入甘遂末一兩拌勻五更時挾腋下至天明用生甘草十一兩煎湯飲之良久瀉出穢物須在人跡稀少處便之恐穢氣傳人用

之二三次全愈虛者間日爲之

一方　田螺一個水浸三日將針挑開入巴豆一粒仍蓋之放磁碗內自然化水加膽礬麝香少許和勻五更用水搽兩腋搽完用枯礬蛤粉各五錢樟腦一錢共研末搽之永不再發

一方　鳳仙花不拘紅白搗成大丸挾於腋每日換三四次二日卽愈看腋下或有紅黑隧下用礦灰調水點之

一方　古錢十文鐵線穿上燒紅用米醋淬十次入麝香末調塗用薑汁頻洗

一方　石綠三錢輕粉一錢爲末濃醋調塗自愈

一方　大田螺一個入麝香三分日埋土內至夜取出露至四十九日備用先以墨塗腋下洗去視有墨點處卽係患孔以螺汁點之立愈

一方　大蜘蛛一個以黃泥赤石脂及鹽少許裹蜘蛛煅存性爲末入輕粉少許醋調臨臥塗之次早

看有黑汁出數點立愈

一方 以自己小便乘熱洗之多次即愈

一方 伏龍肝爲末調水塗之

一方 銀爐灰一勫水浸七日薑三錢百草霜二錢將薑搗爛布盛入灰水內一晝夜取出換挾患處自愈

一方 陀僧二兩細辛一兩焙乾胆礬六錢明雄六錢枯礬二兩輕粉四錢爲末頻搽

一方 陀僧爲末油調搽之或以蒸熟熱饅頭劈開摻陀僧末挾腋下亦佳

淵疽 生於肋下初起堅硬腫而不紅日久方潰得稠白膿者順如豆漿水者險瘡口有聲似乎兒啼此屬內膜透也 急宜灸陽陵穴二七壯其聲即止穴在膝膑骨外膝下一寸陷中蹲坐取之即得若疽在將潰尤未潰之際宜多服護膜散即白蠟白芨各等分爲細末輕劑一錢中劑二錢大劑三錢黃酒調服米湯亦可凡肋胸脇腰腹空軟之處如患瘡

肺癰仙方　灰之菜（即馬齒莧另有一種有刺其葉不如灰之形者用之不效）煮食之（不用鹽）即愈

一人生肺癰昏沉將死請洋人醫治不效中國一名醫用馬齒莧與食立刻清醒而愈洋人知之請入洋婦用迷藥破胸視之見馬齒莧粘補肺間方知此方神妙美測千方百方均不及此凡有咽病人及愛食煎炒厚味者常食此味以免咳嗽并免生肺癰（鮑雲韶傳方）

去核以水三鍾煎至一鍾服之（此癰膿木成之方也）

一方（欬有微熱煩滿胸中甲錯膿欲成者）千金葦莖湯葦莖二升苡仁炒冬瓜仁各半升桃仁五十粒（去皮尖炒研）水煎服

一方（吐膿腥臭形如米粥者）桔梗湯苦桔梗一兩生甘草二兩水煎服此方能排餘膿清熱解毒開提肺氣

一方（吐膿腥臭欬而胸滿者）外臺桔梗白散苦桔梗貝母各三分巴豆一分去皮熬研如脂爲細末强者飲服半錢匕弱者減半病在膈上者吐膿病在膈下者

疽者俱宜多服護膜可免透膜之患

內發丹毒生於肋骨延及腰胯色赤如霞遊走如雲痛如火燎急向赤腫週圍砭出紫黑血以瘦牛肉片貼之羊肉片亦可乾再易貼以不乾爲度再用藍靛清汁時時敷之內服解毒諸藥自愈

脇漏出水不止以烏牛耳垢敷之

肺癰症見口乾喘滿咽燥不渴胸中隱痛甚則肢腫唾稠黏黃痰兼臭穢膿血如氣壅喘滿難卧者

葶藶大棗湯苦葶藶輕者五錢重者一兩大棗輕者五枚重者十枚去核以水三鍾煎至一鍾服之此癰膿未成之方也

一方治中甲錯膿欲成者千金葶藶湊湯葶藶二升苡仁炒冬瓜仁各半升桃仁五十粒去皮尖炒研水煎服

一方治吐膿腥臭形如米粥者桔梗湯苦桔梗一兩生甘草二兩水煎服此方能排餘膿清熱解毒開提肺氣

一方治吐膿腥臭欬而胸滿者外臺桔梗白散苦桔梗貝母各三分巴豆一分去皮熬研如脂爲細末强者飲服半錢匕弱者減半病在膈上者吐膿病在膈下者即五分

瀉之若下不止飲冷水一盞則定

一方 咯吐膿血兼午後身熱煩燥者宜 金鯉湯金色活鯉魚一尾重四兩者 貝母二錢先將魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末摻入肚內線紮好以上白童便半大碗將魚浸之重湯炖煮以魚眼突出爲度少頃取出去鱗骨取淨肉浸入童便內炖熱肉與童便作二三次一日食盡一枚功效甚捷乃罕稀妙方也

一方 洋糖二觔半牯猪肚一副杉木炭一分肉桂一分糯米七粒先將猪肚洗淨以諸藥裝入線縫好鍋煮一天每早割一塊水酒下只宜用牯猪肉肚肺及鯽魚餘葷俱戒一百二十天全愈屢效俱用醃芥菜澮水浸每於早未洗面時先冲水飲一鍾洗面後服前藥其菜水陳者尤佳亦飲壹百廿天

一方 初起者即消日久者即生肉 元參半觔天冬四兩桔梗二兩炙草一兩水十碗煎至二碗再用蒲公英五錢金銀花五錢再煎一碗飯食後服之神效

一方　用日久齷齪竹油燈絡子一個連宿油膩燒灰存性爲末黃酒送下三錢即愈極神效方也不可忽視

大小腸癰俱由濕熱氣滯凝結而成或努力瘀血或產後敗瘀蓄積流注於二腸之中初起發熱惡風自汗身皮甲錯關元天樞二穴隱痛微腫按之腹內急痛大腸癰多大便墜腫小腸癰多小便澁滯脉俱遲緊是膿尚未成　宜大黃湯大黃炒牡丹皮消石研末芥子桃仁炒去皮尖各等分剉碎每五錢水二鍾煎至一鍾去渣空心溫服以利下膿血爲度未利再服若小便閉澁仍宜是湯加琥珀末木通利之自效此膿尚未成之驗方也

一方癰成日久不潰身皮甲錯內無積聚腹急腹痛身無熱而脉數者是腸內陰冷不能爲膿也　薏苡附子散附子炮二分敗醬五分薏以仁炒一錢爲末每服方寸匕即數分以水二合煎之空心頓服以小便利爲驗

一方症見肚臍高突腹痛脹滿不食動轉側身則有水聲便淋刺痛爲癰膿已成也　薏苡湯薏苡仁栝蔞仁各三錢丹皮桃仁泥各二錢水

二鍾煎至一鍾不拘時服

小腸瘡　五月五日收黃鱓頭蛇頭地龍頭燒灰酒調服神效

腸瘡腹痛　白馬懸蹄燒灰和雞子白塗之即拔去毒氣

一方　蛔蟲七條新瓦焙乾研末陳酒下即愈

一方　以黃犬血冲酒服二碗良

手發背　生於手背初起形如芒刺漸覺疼痛高腫紅活焮熱潰速爲瘡若漫腫堅硬無紅無熱潰遲爲疽　生炙甘草各五錢角刺二錢半土炒土貝五錢半夏一錢五分山甲二錢五分炒黑知母二錢五分加薑葱水酒煎服二劑即愈

蛇頭疔　生於指頂尖自筋骨發出根深毒重初起小泡色紫疼痛堅硬如釘形　急宜內服蟾酥丸汗之外用雄黃散即明雄三錢輕粉五分蟾酥二分冰片一分共研細末新汲水調濃重湯炖溫敷於患指用薄紙蓋之日換三四次

一方　雞蛋一枚開指大一孔套指於中數枚即愈

一方及天蛇毒　白大蘿蔔一段挖空勿透勿破入雄黃末三分蒸半熟套指上卽愈

天蛇毒俗名天蛇頭亦生於指頂尖自肌肉發出其毒稍輕初起悶腫無頭色紅痛如火燎之狀急宜內服蟾酥尤汗之外用雄黃二錢牡蠣煅四錢另研細共和一處再研勻蜜水調濃重湯炖溫塗於患指卽止痛消腫日敷五六次爲效

一方　蜈蚣一條雄黃三錢共研細末雞子清調搽卽愈

一方　猪胆一個入雄黃末五分蜈蚣五分套指上紮緊卽愈

纏指毒瘡或生足指上者　以活田螺一枚生搗爛縛之

熱毒攻肢手足腫痛欲脫　以水煮馬屎汁漬之

手指掣痛　豆醬清和蜜溫熱浸之愈乃止

熱毒攻手腫痛欲脫　猪膏和羊屎塗之

手指腫痛　酸漿水入鹽少許熱漬之冷卽易之

指上瘡腫及一切腫毒　獨頭大蒜一顆百合數葉和臘

糟敷之

蛇眼蛇背蛀節蛇腹四疔及泥鰍疽　五症初起俱宜速服蟾酥丸汗之外敷雄黃散方見蛇頭疔

代指生指甲身內初起先腫燃熱疼痛應心宜用　甘草朴硝各五錢熬水浸洗即癒如痛仍不止三四日後指甲背面上微透一點黃白色此係內膿已成但無門潰出急用線針在指甲身就膿近處撚一小孔膿方得出隨手揑盡餘膿用黃柏薑黃黃連歸尾生地搗成

膏貼之

一方　以猪膏和白蠟土敷之

癆指　生雞蛋一枚頂開一孔去黃用燒酒調雄黃細末三分裝入將指插入蛋內逾時膿出痛止

瘡瘡生兩手及指掌中形如茱萸兩手對生亦有成攢者起黃白膿胞痒痛無時破流黃汁水時好時發極其疲頑難痊　鮒魚鮓批片貼或同桃葉搗敷更可殺蟲神效

一方日久不愈蟲痒倍增　藜蘆膏藜蘆苦參各一兩猪脂油

八兩將藥煤枯濾去渣入松香一兩溶化開離火再加枯礬雄黃末各一兩攪勻候溫塗之以癒為度

小兒瘡瘡　猪牙車骨年久者搥碎炙黃隨取出乘熱塗之

狐尿刺　一名狐狸刺由蟑螂盛暑交媾精汁染於諸物乾久有毒人之手足誤觸之則成此患初起紅紫斑點肌膚乾燥悶腫煩痛不眠若時至十日後腐開則瘡口自寬　初起未潰時以蒲公英連根濃煎溫洗若得鮮者搗汁塗之更妙內服黃連解毒湯即愈若潰後按後總治潰瘍治之

一方腫痛欲死　破烏毛雞揚之良效

鷲掌風　生於掌心中多由梅毒未盡又兼血燥復受風毒凝結而成初起紫白斑點疊起白皮堅硬且厚乾枯燥烈延及偏手亦有因脾胃有熱血燥生風血不榮養皮膚而成久則成癬難愈

二礬散　白礬皂礬各四兩兒茶五錢側柏葉八兩水十盌煎數滾聽用先以桐油搽患處再用紙撚桐油浸透火點向患處薰片時次用煎湯乘熱貯

木桶內手架桶上以布將手連桶口蓋嚴湯氣薰手勿令泄氣待微熱將湯傾入盆內蘸洗良久一次卽愈七日切不可見水再以牛油柏油香油銀硃各一兩官粉麝香研細各二錢先將三油火化入黃蠟一兩溶化離火再下硃麝粉末攪勻成膏搽患處火烘之以油乾滋潤爲度或內再服地黃丸加祛風之藥自愈

一方 白鴿屎雄雞屎炒研煎水日洗之

一方 雄黃同山甲火燒薰之數次自愈乃呂祖法也

一方 眞艾四兩水四碗煮數滾入大瓦瓶內用麻布二層蓋紮將手心放瓶口薰之如冷再熱再薰無不應效

一方 鴿子屎水龍骨各一兩常山一兩五錢爲末將桐油搽掌上患處用藥薰之數次卽愈

一方 猪胆一枚黃柏八分乳香五分煎猪油搽之

奇效

一方　槐皮大麥花椒骨皮艾葉鴿屎白芷煎湯先洗後薰每日數次愈或用猪蹄湯洗之亦妙

一方　硃砂明雄各一錢輕粉五分為細末用桐油調塗患處以微火烘一炷香為度年遠者五七次年近者二三次即愈屢驗方

一方　核桃大鉛彈子一個每日在手內搓弄搓熟將鉛彈子握緊晝夜不歇如此十餘日即愈但宜常用是法則不復發

不藥良方

續集卷八

C116/2535
v.10

不藥良方續集卷八

外科　下臀股膝脛足六部

懸癰　一名騎馬癰生於纂間係前陰之後後陰之前即會陰穴也初如蓮子微癢多痛日久漸腫形如桃李由三陰虧損兼憂思氣結濕熱壅滯而成其色紅則爲作膿欲潰時也若破後潰深久則成漏以致瘁盡氣血變爲瘡勞又有因過食膏粱厚味或房勞過度而致者皆非易治之疾　於初起未成膿時急用甘草稍四兩水煎服外用大黃三錢熟石膏一兩紫金錠一錠同搗碎水調敷之謹戒房勞怒氣魚腥發物並寒苦之藥

一方 即潰亦效并治一切惡毒瘡　大甘草一兩切三寸以泉水一碗浸透漫火炙乾仍浸水內再炙以一碗水乾爲度切細用好酒一碗煎至七分去渣空心服至半月盡消

一方　甘草不拘多少河水浸二宿採取汁連水入砂鍋內煮成膏每服三匙酒下或滾水下如神捷效

一方　大粉草四兩長流水浸透炭火炙乾再浸再炙三次後切片同歸身三兩水三碗慢火煎去渣再煎以稠厚爲度每用三錢好酒一杯化膏空心服未成即消已成即潰潰即收口

便毒　又名血疝又名便癰潰後即名魚口男女皆生發於小腹下腿根上摺紋縫中或由忍精或慾念不遂而成又有爲暴怒而發初如杏核漸如鵝卵堅硬木痛微熱不紅令人寒熱往來者

荆防敗毒散服之取汗自愈外用黃明膠水溶化塗之即消

一方　已成未成俱能即散　斑蝥三個去足滑石三錢分三服

空心下一服其毒即從小便出如痛用直前木通

斑蝥係豆苗中細小蟲嘗親採用之乾其每一錢約三四百隻本草綱目云斑蝥有大毒不可輕用所載治瘰癧方用斑蝥一錢薄荷八錢共為末用雞蛋清為丸綠豆大每服三丸加至五丸為止每次所服不及一厘此者斑白散用至一錢加白芷八分為末每服六分共中斑蝥四分有餘未免太多恐致誤事必係一分誤作一錢看上一方亦只用斑蝥三隻可見不敢多用務宜詳審為要至囑囑

湘西鮑雲韶特識

一方　石首魚膠一兩燒存性研末酒調服外以石菖蒲生研封之甚妙

一方　鯽魚一枚山藥五錢同搗敷之即消

一方　初起者　取肥皂搗爛敷之甚效

魚口　便毒潰後瘡口潰大身立口合身屈口張因名楊梅症亦有兼此者　木鱉子去殼油三個巴豆去殼油二個俱火炙山甲炒四片殭蠶去絲嘴炒三錢五棓子炒五錢為末黃酒調服

空心下一服其毒即從小便出如痛用車前木通澤瀉猪苓煎服

一方 斑白散斑蝥炒一錢白芷八分爲末每服六分空心酒下即時見效

一方 大蝦蟆一個剝皮連腸搗爛入葱五莖再搗敷即用皮覆貼其上

一方 腫痛不止 魚鰾膠以熱湯或醋煎軟乘熱研爛貼之神效

一方 石首魚膠一兩燒存性研末酒調服外以石菖蒲生研封之甚妙

一方 鯽魚一枚山藥五錢同搗敷之即消

一方 初起者 取肥皂搗爛敷之甚效

魚口 便毒潰後瘡口潰大身立口合身屈口張因名楊梅症亦有兼此者 木鱉子去殼油三個巴豆去殼油二個俱火炙山甲炒四片殭蠶去絲嘴炒三錢五棓子炒五錢爲末黃酒調服

一方　白魚膠五錢剉寸長炒黑黃色研末老酒調成團空心時以茶匙挑在舌上溫黃酒送下其藥直至患處如瘡大再服五錢即消潰亦能合必須多酒送之爲妙

一方（雙魚口）　斑蝥七個胡米炒爲末用大麯酒四兩調敷之

疽瘡　又名姤精瘡乃統名也如生於馬口下者名下疽莖上者名蛀疽莖上瘡皮腫脹包裹者名袖口疽久而徧潰者名蠟燭疽痛引睾丸陰囊腫墜者名雞膧疽痛而多痒潰却不深形如剝皮爛杏者名癌疽生馬口旁有孔如脉眼眼內作癢捻之有微出者名漏根疽生楊梅時誤用薰搽等藥以致腐爛如臼者名楊梅疽又有生楊梅時服諸劫藥以致便溺骨內刺痛者名楊梅內疽此又皆名異而形殊也　外俱用黑豆一合生甘草一兩赤皮葱三莖槐條六十寸水煎濃澄湯候溫日洗二次大能止癢消疼解毒內服利水消毒諸藥自愈如紅腫熟痛以鯉魚胆汁敷之

一方（已潰者）　鳳衣散一錢輕粉四分冰片二分黃丹一錢共研細末鴨蛋清調敷或乾撒亦可能以止

癢定痛生肌

一方 潰爛痒痛者 旱螺散白田螺殼煅三錢輕粉一錢冰麝各三分研細末香油調敷能止痛癢去腐生肌神妙

一方 玉莖蟲蝕腐損並治楊梅莖爛 銀粉散上好錫六錢火化開入硃砂末二錢攪炒砂枯去砂留錫再化開投水銀一兩和勻傾出聽用定粉一兩研極細鋪綿紙上捲成一條一頭點火煨至紙盡爲度吹去紙灰用粉同前錫汞再加輕粉一兩共合一處研極細末先以甘草湯淋洗患處拭乾隨撒此藥能生肌止痛收斂甚效

一方 爲蟲蝕爛者 同春脫疳散黑鉛五錢火化開投水銀二錢五分研不見星爲度再加寒水石三錢五分輕粉二錢五分硼砂一錢共研細末先以葱艾花椒煎湯洗患處隨撒此藥奇效

一方 下疳蛀疳 溪港年久螺螄殼燒灰敷之

一方 下蛀二疳 牛蹄甲燒灰油調敷之

一方 瘙疳及蠟燭者 絲瓜連子搗汁和五棓末頻搽

一方 下疳 以象皮燒灰和油敷之

一方 諸般疳瘡皆治 橄欖核燒存性研末敷之或加兒茶等分調敷亦妙

一方 甘草煎湯温洗後臘茶末敷之

一方 海螵蛸研末敷之小兒疳瘡同方

一方 下疳蛀疳 蝸牛焙乾研末枯礬各一錢濕則乾摻

乾用香油調塗卽愈

一方 蘆甘石火煅醋淬五次一兩兒茶三錢爲末麻油調敷

一方 銀硃水飛一錢輕粉五分兒茶一錢老茶葉三分黃柏灰三分以黃蠟二錢溶化入諸藥爲丸作二十丸好酒空心下其效無比

蠟燭疳 狗橘七枚煎湯入罐內將陰莖掛罐口離湯一二寸俟熱氣薰上湯將温時傾盆內洗陰莖

如此三日全愈

一方　紅把子燒灰存性一錢梅花片五厘麻油調搽即愈

囊腫如斗　取蕪菁根搗汁敷之

陰蝕瘡　一名八脚蟲生於前陰毛之際內由淫慾失洗而致瘡癢難忍抓破色紅中含紫點宜服六味地黃丸一料加蘆薈五錢蜜炒黃柏一兩外用針挑破去蝕隨以檳榔煎水洗之即除或以銀硃搽之亦妙

一方　銀杏不拘多少搗爛搽之

腎囊瘡　生於腎囊紅腫瘍熱疼痛身發寒熱口乾飲冷由肝腎濕熱下注而成潰則費治初起者宜荆防敗毒散汗之外用葱鹽熬湯燙之

一方　瓜蔞五錢甘草節金銀花各五錢連翹柴胡青皮各七錢水煎服

囊瘡潰後　以蚌殼黃連青黛各等分研細敷之

下部濕瘡　臍腹二陰遍生濕瘡熱痒而痛出黃汁二便澁因嗜酒喜食魚蝦所致諸藥不效者馬齒莧四兩研爛入青黛一兩和塗則熱痛皆

紫蘇葉色敷法雖腎子爛出大有奇功此仙方也

鮑雲韶注

去仍服八正散即愈謹戒酒與發物犯之則作腸風內痔則難治也

囊䘌（失治潰深）是症多險然不可棄而不治宜杉

腎囊風（一名綉球風初起乾燥痒極喜浴熱湯甚起疙瘩形如赤粟麻痒搔破浸淫脂水皮熱痛如火燎）蚯蚓泥同眞粉等分井水調敷以脂水全盡爲妙永不再發

一方（痒不可忍）大葉楊柳葉一握煎水乘熱薰洗後以蚯蚓屎焙燥研末摻之三四次即瘥

一方　牆頭上醬扳豆草（或鮮或收乾）煎湯洗之即愈繡毬花煎洗之尤妙

一方（濕痒不止）麩炭紫蘇葉末撲之

一方（濕痒不止）肥皂一枚燒存性爲末香油調搽

一方（濕痒不止）海螵蛸蒲黃爲末撲之

一方（痒甚者）猪脬火炙以鹽酒下之

去仍服八正散即愈謹戒酒與發物犯之則作腸風內痔則難治也

囊癌 失治潰深露睾丸者 是症多險然不可棄而不治宜杉木灰托之蘇子葉包之患者仰卧靜以養之或可取效

腎囊風 一名綉球風初起乾燥痒痒極喜浴熱湯甚起疙瘩形如赤粟麻痒搔破浸淫脂水皮熟痛如火燎 蚯蚓泥同眞粉等分井水調敷以脂水全盡爲妙永不再發

一方 痒不可忍 大葉楊柳葉一握煎水乘熱薰洗後以蚯蚓屎焙燥研末摻之三四次即瘥

一方 牆頭上醬扳豆草 或鮮或收乾 煎湯洗之即愈續毬花煎洗之尤妙

一方 濕痒不止 麪炭紫蘇葉末撲之

一方 濕痒不止 肥皂一枚燒存性爲末香油調搽

一方 濕痒不止 海螵蛸蒲黃爲末撲之

一方 痒甚者 猪脬火炙以鹽酒下之

臀癤 生臀內厚處腫潰斂俱極遲慢初起宜隔蒜片艾灸以殺其熱毒 已成膿者用五爪龍連根搗汁酒漉服日進四五次則膿從大便而出未成膿者可內消之如有頭以渣敷上

立效

臟毒 發於外者爲陽毒易治由醇酒厚味勤勞辛苦而致肛門兩旁腫如桃李大便秘結小水短赤甚者肛門重墜緊閉下氣不通刺痛如錐脉數有力內宜通利 外用菩提露即熊胆三分冰片一分涼水十茶匙調化搽於患處如膿脹痛急宜針之膿出後按照後之總治門潰

瘍方治之

臟毒 發於內者爲陰毒難治兼由陰虛濕熱下注而致肛門內結壅腫刺痛如錐大便虛閉小水淋漓寒熱往來遇夜尤甚 脉數微細爲虛爲濕宜 五灰散即血管鵝翎血餘蜈蚣山甲生鹿角各燒存性各等分研細共合勻每服五錢空心温黃酒調下膿毒自潰潰後亦按潰瘍治法

痔瘡 有二十四種或肛門內生或肛門外生初起成瘤不破爲治易療破潰而出膿血黃水浸淫淋瀝不止則爲漏難痊其名雖多總不外乎風濕燥熱四氣而成 初起疼痛用田

螺一枚將刀挑起螺靨入冰片五厘平放磁盤內待片時俟水出用雞翎蘸起勤點患處止痛消腫有奇妙之功菩提露亦可點之（方見臟毒）

一方（初起堅硬作痛）大五棓子一枚敲小孔以乾荔枝用草揉碎塞入令滿紙塞其孔濕紙包煨片時許取出去紙研細末每一錢加輕粉三分冰片五厘共研極細末唾津調塗之兼用朴硝葱湯洗之自愈

一方（內痔不出者）喚痔散枯礬五分食鹽炒三分生草烏刺猬皮煅存性各一錢冰片二分麝香五分研細末先以温水洗淨肛門隨用唾津調藥三錢填入片時即出隨以朴硝葱頭煎湯洗之自愈

痔漏有管　胡連淨末一兩山甲香油內炸黃石決明煅槐花微炒各五錢共研細末煉蜜爲丸麻子大每服一錢空心清米湯送下早晚服二次至重者不過四十日而愈此方可代針刀藥線之力如漏四邊有硬肉突起者加殭蠶二十條炒研末入

藥內凡偏身諸般漏症服此皆效

痔漏（污從孔出）胡連切片薑汁炒研末刺猬皮炙切片再炒黃研末各一兩麝香二分研細共和一處研勻軟飯爲丸麻子大每服一錢溫酒送下服後膿水反多者乃藥力到也勿以爲懼

痔瘡（無論未破已破成漏）俱宜用土地黃苗（名喇叭花）日日煎湯洗之兼戒房勞河豚海腥辛辣椒酒生冷硬物濕麪之類

一方（未破者）大生甘草節一百個爲末煉蜜爲丸桐子大每空心用槐米湯送下輕則三錢重則五錢服半料或一料卽愈戒房事百日永不再發神驗

第一

一方　酥合油熊胆各五分頭生雞子二個取清煎油和勻敷之神效卽垂死者用此立愈

一方　冰片一分朴硝五分熊胆三分蝸牛螺肉各一兩擂欖核灰五錢搗爛入藥浸一夜取水并藥

敷之無不斷根

一方 熊胆一味塗之甚效卽至十年者卽愈

一方 大田螺一個以銅青氷麝各末共五釐放螺內取水塗之

一方 外痔長寸 槐花煎湯頻洗並服之數日自縮

一方 及腸風瀉血 猬皮燒灰爲末油調敷水調亦佳猬胆塗之亦良

一方 外痔 百一方先用木鱉煎湯薰洗隨以青葱涎對蜜調敷其凉如冰自愈

一方 杜牛膝根煎湯薰洗之渣亦敷之卽瘥

一方 疼痛熱甚者 魚腥草一握煎湯薰洗仍以渣托之

一方 腫痛因熱盛者 冬瓜煎湯洗之

一方 諸方不效者 木耳煮成羹食之

一方 以水化烏雄雞胆塗之 卽數分

一方 日久不愈 駱駝頷下毛燒灰酒服方寸匕

一方 諸痔皆效 鹿肉燻熟以薑醋進之大有奇效

一方 腫痛者 麝香印城鹽等分爲末塗之不過三次即愈捷驗

一方 諸痔腫痛 無花果葉一名映日紅四川產者爲天竹菓 煎湯頻頻薰洗取效

一方 團魚頭骨磨陳醋於骨上安置肛門患處俟癢極至於不癢方止一二次即愈

一方 腫痛 木鱉子磨陳濃茶安置肛門一二次即癒或以磨出汁雞翎掃搽陳醋磨亦可

一方 生煤炭研極細末以舌餂之酸者不堪用無味者方佳每服二錢淸晨空腹煎湯服之十餘次自愈

鼠尾痔 牛角胎燒灰酒服方寸匕

鼠尾痔漏 野猪皮燒灰塗之

脫肛痔漏 絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢爲末以猪胆雞子淸及香油調貼之收上乃止

一方 虎脛骨兩節以蜜二兩炙赤搗末蒸餅丸梧子大每淸晨温酒下三十丸取效

肛門凸出　虎骨燒末水服方寸七

痔漏有蟲　鯉魚腸切斷炙熟帛裹坐之以引蟲盡爲度

一方　取白蟮魚燒烟薰之仍燒炙爲末空腹食之三五度卽愈此方能殺腹中諸蟲

一方　白蟮骨燒烟薰之並可敷惡瘡

一方及蛀疳瘡　七星魚腸及肝以五味調和炙香貼之以引蟲盡爲度

一方　犬肉煮熟空腹食之能引蟲出

一方　犬肉蘸藍子汁空心食之七日見效

痔漏疼痛　鯉魚鱗二三片棉裹如棗形納入坐之其痛卽止儒門事親方

痔漏出水　黃牛胆猬胆各一枚臘粉二錢麝香二錢和勻入牛胆中懸四十九日取出爲丸如大麥大以紙撚送入瘡內以有惡物流出爲驗

痔漏下蟲不止　臘月取白兎屎慢火炒黃爲末每

服二錢入乳香五分空心温酒下日三服

腸痔滴血不止　常以鮸魚作羹食之

一方　白頭翁搗爛敷之

一方　活鮸魚趨側穿去腸留鱗入白礬末二錢以櫻包紙裹煨存性研末每服二錢米飲下日二服

血痢噤口同方

一方　七星魚作鱠以蒜虀食之忌生冷毒物

內痔出血　黃鱔魚煮食常常用之自愈取性涼也

久痔下血　野猪肉二觔着五味炙熟空腹食之或作羹亦可

腸痔下血　水獺燒爲末水服一錢即愈

痔痛有頭多年不愈　猬皮炙爲末水服方寸匕即數分

患痔不收　白蜜二鍾入蚰蜒七條浸放磁瓶中封埋土內七日取出遇症日點之即愈

酒痔　絲瓜燒存性研末酒服二錢

肛門腫痛欲成痔瘡　急取屠刀磨水服之甚效

痔瘡有核　白鵝胆二三枚取汁入熊胆二分冰片五釐研勻磁器蜜封用時以手指蘸塗之立效或以鴨胆塗之

年久痔漏　龜二三個煮取肉入回香葱醬常食忌糖醋

腸風痔漏　熊胆五分冰片少許研和猪胆汁塗之

各種痔漏　生薑連皮切大片塗白礬末炙焦研細貼之勿動良

痔漏　取鷹頭燒灰入麝香少許和酥油塗之

一方　野貓頭骨炙末和雄黃麝香爲丸服之

一方　旱蓮草一把連根洗搗爛滾酒冲汁服之

一方（出水不止）　蜣螂一枚陰乾入冰片少許爲細末紙撚蘸末入孔內肉自漸生藥自退出神效

一方　青苔（青石上者）焙末加生礬少許再研細聽用先將瓦花一把水煎滾加鹽滷一碗坐上浴洗其痔漸漸縮小揩乾將藥抹上但要痛三四次即愈永

不再發

一方　金銀花揀淨梗葉一觔粉甘草一觔二味各將半觔爲末煉蜜丸桐子大每服二錢日三服所餘各半觔浸黃酒送藥一料卽愈一切痔症俱枯落漏管漸漸退盡神效無比

坐板瘡一名風痛　初起時以芫花川椒黃柏熬湯燙洗卽消若毒盛癢痛仍不止者用油缸青布三指寬一條香油調雄黃末一錢攤於布上捲成條燃着吹滅以焰頭向瘡烘之其癢痛卽止瘡亦漸愈

一方　絲瓜皮焙乾爲末燒酒調搽

一方　砂仁殼燒灰先將鹽茶洗淨瘡後用麻油調藥搽之

一方　松香五錢雄黃一錢爲末和勻棉紙包撚作紙條二個臘猪油溶化浸透火燒滴下油搽瘡上立效如濕加蒼朮二錢

穀道生瘡　雞內金燒存性爲末搽之甚效

偷糞鼠　貓屎井底泥和勻圍之立愈

一方　棉花子炒去殼磨粉每早午夕攪糊各服一碗半月全愈

附骨疽　生大腿外側初起不熱不紅甚則錐痛難以屈伸動轉久則寒鬱爲熱熱甚作膿外形腫胖無頭皮色如常漸透紅亮一點則爲內膿已成　初起無頭無膿者黃占三錢古銅錢末三分油胡桃六個搗碎和勻軟腐衣包好空心酒冲服

一方　露蜂房蟬蛻亂髮燒灰等分爲末酒服

一方　黃犬頭骨燒烟日日薰之

一方　成漏　蜣螂七枚和大麥搗敷

一方　潰後膿水不止　生剝鼠皮貼之卽追出膿血而愈

橫痃疽　生左腿夾縫摺紋中其形長如蛤慢腫堅硬時疼甚則痛牽拳丸上及少腹膿極深一兩月方能潰破破後稠膿可愈敗漿最難斂口若日久成漏則多逆　患未及潰者青殼雞蛋一個蒺藜一合好酒煮之俟蛋熟去殼再煎服之立愈此症如在右腿則爲陰疽治法同

一方　及楊梅魚口　土茯苓米泔水洗搥碎忌鐵器白者佳紅者能殺人

粉霜朴硝皂礬明礬水銀各二錢銀罐合好鹽泥封固放爐中文武火昇之一症止用六釐黃米飲爲丸切作七服每服或三粒五粒雄黃爲衣空心酒下忌房事一切毒物大小便不可令人觸之

腿遊風 生兩腿裏外忽生赤腫形如堆雲燃熱疼痛 先施砭石放出惡血隨以牛肉片貼之拔去風毒即瘥

青腿牙疳 先從兩腿起形如雲片色似茄黑大小不一肉體頑硬步履艱難其毒上攻致生牙疳牙齦腐腫出臭血若至穿腮破唇腐爛色黑或形衰不食或牙齒潰落或腿大腫及枯皆逆初起用青白馬乳早午晚隨擦隨服甚效雜色馬乳亦可

一方 馬腦子一個用竹刀挑去筋膜放碗內先將馬腦攪勻再用滾黃酒冲服或一勉或半勉俱可倘一次不能服盡分作二次冲服夜間發出大汗自愈此方較之馬乳爲效倍速外用砭法出毒血更以牛肉片貼拔積毒神效

一方 用煮馬肉湯燙洗

一方　用羊肝割片貼黑處

一方　芥菜子搗麪燒酒調敷黑腫處

膝眼風　生在膝眼穴又名鬼眼穴左右兩膝四穴皆同徐膝眼隱疼風勝則走注作痛寒勝則如錐刺痛濕則腫屈不伸病在筋則伸不能屈在骨則動移不遂沉痼之候也　狗骨三錢燒灰荔枝七個桃膠尖七個以飛麪酒糟各一兩搗爛加醋調敷即愈如痛甚以熱熨斗熨之

鶴膝風　一名遊膝風一名鼓槌風痢後得者爲痢風單輕雙重初腫如棉皮色不變亦無瘡熱疼痛日增日久膝腫粗大上下股脛枯細如至潰腐則爲敗症是症寒勝則隱痛風勝則筋攣濕勝則無力　臘糟四兩肥皂去子一觔苦硝北味砂糖各一兩研勻日日塗之加火酒更妙

一方　陳艾菊花作護膝內久自除患

一方　陳酒糟蒸熟貼患處將布包好三四次即愈

一方　潰後出白漿浮皮雖腐腫痛如前不可用蝕藥　宜芙蓉菊花葉各五錢研末大麥米麪拌勻貼之或用豆腐渣蒸熟搥餅貼亦可止疼此係敗症收功甚難當善調爲妙

上水魚　生在腿四摺紋兩稍腫如高埂長如魚形色紫作痛左右皆同　宜磁針砭

人面瘡用馬尿洗之至效如神功在貝母之上

雲韶氏傳方

出惡血用顛倒散末方見鼻部粉刺香油調敷甚效

人面瘡生兩膝或兩肘類人形眉　用貝母末加水

驢眼瘡圍如臁瘡形　日蜈去殼搗爛敷數次自愈

裙帶瘡　嫩長桑根皮勿見水猪油搗乾即換敷取

效心鏡傳方

一方　梨葉百片猪油二兩將葉在鍋內炒拌次下

好白蠟二兩亦搗爛拌在內令化在葉上又下鹽

一兩亦拌在內用微火炒不可炒爛取起待冷貼

之神效

一方　爐甘石醋煆七次研細末每日以香油調敷

自愈亦治臁瘡

臁瘡生腿之廉骨外臁易治內臁急難全愈當戒勞動發物　初起者三香膏

輕粉乳香松香各等分爲細末香油調稠用夾紙

一面以針蜜刺細孔將藥夾搽紙內先以葱湯洗

淨患處後以藥紙有針孔一面對瘡貼之三日一

出惡血用顛倒散末方見鼻部粉刺香油調敷甚效

人面瘡 生兩膝或兩肘類人形眉目口鼻皆具得飼肉不痛 用貝母末和水以小葦筒敷灌其口數日瘡消結痂而愈

驢眼瘡 生脚脛骨週圍如臁瘡形 田螺去殼搗爛敷數次即愈

裙帶瘡 嫩長桑根皮勿見水猪油搗乾即換敷取效心鏡傳方

一方 梨葉百片猪油二兩將葉在鍋內炒拌次下好白蠟二兩亦搗爛拌在內令化在葉上又下鹽一兩亦拌在內用微火炒不可炒爛取起待冷貼之神效

一方 爐甘石醋煅七次研細末每日以香油調敷自愈亦治臁瘡

臁瘡 生腿之廉骨外臁易治內臁急難全愈當戒勞動發物 初起者三香膏輕粉乳香松香各等分爲細末香油調稠用夾紙一面以針蜜刺細孔將藥夾搽紙內先以葱湯洗淨患處後以藥紙有針孔一面對瘡貼之三日一

換甚良

一方 日久瘡色紫黑者　解毒紫金膏明淨松香末皂礬煅赤各一觔研極細末香油調稠先用葱艾甘草煎湯洗淨患處再搽末藥油紙蓋住以軟布紮緊三日一換並治楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓用之甚驗

一方 日久頑癬皮色烏黑下陷臭穢不堪者　蜈蚣餞蜈蚣甘草獨活白芷各一錢桐油二兩將藥煎滾先以米泔水洗淨患處水和白麪作圈圍在瘡之四邊勿令洩氣將腿放平以茶匙挑油漸漸乘熱加滿待油稍温取下已後風毒自散腐肉自脫仍蓋黃蠟膏血竭赤石脂煅龍骨煅各三錢共爲細末香油一兩入血餘栗子大一團煤枯去渣再入黃蠟一兩白膠香三錢溶化盡離火下血竭等末攪勻候冷磁器盛之用時揑作薄片貼瘡上絹帛縛之三日後翻過貼之其效甚速

一方　蜜陀僧五錢樟腦三錢研細末菜油調稠攤油紙上貼之

一方　黃臘二兩熬化入銅綠末二兩攪成膏用油紙條石膏上拖過粘膏藥一面貼患處日換三四次取追毒水每貼膏時須先用猪蹄殼葱頭米泔水煎湯洗淨然後貼之

一方　蛀爛者　小蝦三十尾去頭足殼用糯米飯研爛隔紗貼瘡上別以紗罩之一夜解下掛看皆足小蟲即以葱椒湯洗淨用舊茶籠內白竹葉隨瘡之大小煎貼一日三換待汁出盡逐日煎苦練根湯洗之以好膏藥貼之將次生肉勿換膏藥忌發物

一方　及血風瘡　生蝦黃丹擣貼之一日一換以愈爲度忌發物

一方　腐臭者　生龜一枚取殼醋炙黃更煆存性出火氣入輕粉麝香葱湯洗淨搽之

一方　不斂者　黃牛胞衣一具燒存性研末搽之即愈

一方 潰爛者 以薑汁洗拭刮虎骨末敷之

一方 腫爛不愈 青牛蹄甲燒灰和桐油塗之

一方 潰爛者 川椒松香黃蠟各一錢四分共研忌鐵器用連根蔥白十四段共搗爛做夾紙膏攤貼之

一方 鉛一兩打極薄片剪碎和水銀三錢入猪板油去皮研爛攤油紙上外以川椒二兩煎湯洗淨貼之即五六年者並愈

一方 黃牛屎尖用陰陽水各一碗和勻化開濾去渣要醋一碗大冬青葉四十九片沙鑵內文武火煮乾留水醋半盞浸在內每日換三次貼瘡葉盡即消永不再發或單用冬青葉醋煮熟貼亦效

一方 年久不愈 鑵口泥研末摻之立愈

一方 不拘遠近 舊爛牛皮鞋掌子取下砍碎陰陽瓦煅存性為末麻油調敷即愈

一方 油麪饊子一兩把蔥白五六根同搗極爛將瘡洗淨敷上用布紮緊即愈神驗之極不可輕視

鱔漏生於腿肚痛癢相兼破流黃水纏綿難愈孔如鑽眼肌冷 以艾葉老葱熬湯每日先薰後洗瘡口發熱覺癢時即貼黃蠟膏見前瘡內收斂而愈

一方 以石灰泡水乘温先薰後洗覺癢時爲效洗之數次即瘥

四彎風生兩腿彎脚彎每月一發形如風癬搔破流水極癢 以大麥一升熬湯先薰後洗次搽三妙散見膚中出水 最能滲濕殺蟲漸漸取效

甲疽因割嵌指甲傷肉或剔傷或甲長侵肉穿窄小靴鞋以致甲旁潰腫破爛時流黃水努肉高突其痛難忍宜用 鹽湯燙洗並用華陀累效散乳香礞砂各一錢輕粉五分橄欖核燒存性三枚黃丹二分共研細末香油調敷神效

一方延爛者 綠礬五兩燒存汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚敷以軟帛絞裹當日即可使汗斷瘡乾每日一遍鹽水洗淨其痂乾處即不須近鹽水洗後或作白膿即擦破敷之自瘥

一方 未破爛者 礬石燒灰敷能餌惡肉生好肉細細割取甲角愈

足跟疽 又名兔齧生於足掌跟初腫紅紫疼痛潰破膿水淋漓狀如兔咬宜急治之 初起者宜隔蒜片灸之以解其毒內服養榮地黃等滋補之藥如不收斂用鹽湯洗之白芷研末敷之兩日一易謹戒一切勞碌即安

臭田螺 生脚丁破爛其患甚小其癢搓之不能解必搓至皮爛津腥臭水覺疼時其癢方止次日仍癢經年不愈極其纏綿 甘草薏苡仁煎湯洗之嚼細茶塗之破爛甚者用末入水小鵝掌黃皮煆存性研末香油調敷甚效

一方 蚌蛤粉乾搽之

甲疽 以橘皮湯浸洗輕輕剪去甲虎骨末敷之痛即止

牛程蹩 生於足跟及足掌皮肉頑硬腫起高埂色黃痛不能行多因走急腳熱着水或寒風襲凝而致 用盆一個內安新磚磚上安鴿糞糞上合罩籬以腳踏籬上次以滾水從旁沖入蒸之浸漬之

冷則易之自愈

一方　新磚燒紅韭菜汁潑之將病足踏於其上燙之即消

一方　日久破裂膿水浸流　每日米泔水浸洗并用牛角散松香輕粉水龍骨即舊船底油石灰牛角尖燒灰共爲末牛骨髓調搽四圍頑皮浮起剪之搽以生肌斂口藥

肉刺　俗名雞眼生於脚指根陷內裏頂起硬凸疼痛步足不得或因纏足或着窄鞋而生　紫玉簪花根搗爛貼塗以油紙蓋之

一方　地骨皮紅花等分研細香油調敷

一方　新鑄脚後以石燕蘸水磨濃汁搽之

一方　先刺破患處以新酒酢和羊脂塗之一合即愈

一方　黃丹枯礬朴硝各等分爲細末炒葱白塗之

一方　割後用葶藶搗爛敷之以絹縛之即瘥切不可用鐵刀割傷只宜以磁針割之則不再生

一方　萆麻子爲細末敷上一二時其刺自出痛亦

即止神效

一方 生蜈蚣一條搗爛少許貼上片時拔根

一方 及腳繭 葱根荸薺搗汁一碗煎再取松香四兩麻油再煎滴水成珠方入前汁攤膏貼之即落

一方 蜈蚣一條硼砂等分放鍾內拌埋地七日取出銀簪點上即脫

脚上腫毒 及脚氣上攻結成腫核者 甘遂末水調敷內用甘草汁服之即消

脚墊痛 因長路行急被石塊脚底墊腫不能行步痛不可忍 急用舊草鞋浸尿桶內一夜將新磚燒紅以浸濕草鞋放磚上隨以腫脚踏上火逼尿氣入內即消若不早治恐潰爛難愈如行長路脚腫疼痛者亦用此法

脚心腫痛 因久行久立所致 蚯蚓屎水和敷一夕即愈

風癢足瘡 遠近流黃水者 黃柏去皮 不拘多少 用猪胆汁塗搽晒乾數次酥透柏皮方研末先用花椒煎湯洗過拭乾隨以末藥敷之二三次即愈

血注脚瘡　桑木耳及諸色木耳牛屎耳菰各五錢
髮灰三錢男用女髮女用男髮研細末和油塗之乾再塗
脚汗　白礬五錢乾薑五錢爲末連洗五日自無汗
臁瘡　桐油二兩加川椒三十粒煎枯去椒加入細
輕粉末二錢以白蠟一兩熬成膏用綿紙拖成膏
藥貼時先用苦參洗淨患處兩日一換三次全愈
下部蠶蟲痛癢膿血旁生孔竅　蜣螂七枚五月五日收者新
牛糞五錢肥羊肉一兩炒黃同搗成膏爲丸蓮子

脚析裂破及冬月患此行步疼痛　用湯洗淨拭乾將黃蠟一
兩溶化入松香末三分用少許安刀頭上溶化滴
入析中卽愈
足跟腫痛　黃牛屎入鹽炒罨之甚驗
足上寒濕瘡　九月收茄根煎湯洗之數次卽愈並
洗夏月趾腫不能行走
雨足癬瘡　白犬血塗之立愈
下注脚瘡　鹿角燒存性入輕粉同研調塗之

大炙熟棉裹納肛中半日即令大便中蟲出四度永瘥神驗無比

脚上濕瘡極痒有蟲　烏臼根爲末敷之少時有涎出良

雞眼睛即內刺　蜈蚣焙研末敷之以南星末醋調敷四圍神效

腸風臟毒　猪大臟一條入芫荽在內煮食之

一方　猪大臟入黃連末在內煮爛搗爲梧子大每米飲下三十丸

一方　猪大腸入槐花末令滿縛定醋煮爛搗爲丸梧子大每服三十丸清酒下

外科發無定處

疔瘡其形小其根深隨處可生火症也生於口耳鼻者爲明疔易治生於身體四肢者爲暗疔難療發時悞認傷寒半日不治或失治法毒多走黃入心人即昏憒立判存亡書云疔瘡先刺血內毒宜汗瀉禁灸不禁針怕綿不怕鐵初發項以上者三陽受毒必用鈹針刺之挑斷疔根項以下者三陰受毒即當艾灸如不痛亦須針出惡血以挑至流解血知痛乃止速用蝸牛連殼搗爛敷之或加銀硃等分亦可或家菊花根搗如得立馬回疔丹敷摻於針孔內更妙俱用菊根汁和熱酒下出汗即愈疔毒一染皮肉即僵雖針亦不覺痛須用胆速針慎勿遲延而悞時刻也

一方 手足間生黃泡或紫黑色有一條紅線急宜以針於紅線所至盡之處刺出惡血免毒入攻唯刀鐮疔忌刺刀鐮疔狀濶狹如韮菜長一寸疔之左側肉黑如燒烙刺後 用益母草葉熏燒灰敷並用明礬末三錢葱白七根搗爛分作七塊每塊熱酒一杯送下以衣被蓋之如無汗再服葱白湯一鍾少頃汗出從容減去衣被其病若脫忌風寒房事酒肉魚腥蒜葱辛辣油膩生冷及怒氣諸香並孝服經婦僧道雞犬等項犯之必致反覆愼之

一方 爲者用服卽愈 土蜂房一具焙脫一條黃泥圍臍燒存性爲末每空心好酒服一錢少刻大痛痛止其瘡已化爲黃水

一方 或怕用針刀者 用巴豆一粒米飯一粒研貼瘡上立時拔去毒根再尋蝸牛搗爛貼之再用菊花葉搗汁服一碗煖睡取汗立愈

一方 馬齒莧燒灰和疏頭垢搗如泥封之

一方 馬齒莧燒灰和陳醋渣先灸後封之根卽出

一方　野灰藋菜薑芽葉燒灰撥開瘡皮唾津調少許點之血出爲度

一方　山丹蕊即紅白合花蕊也研末敷之

一方　荊芥末和醋敷之即瘥

一方先刺出惡血　海螵蛸爲末摻之其疔即出

一方　白犬血塗之頻頻取效

一方　白扁螺螄生浸取汁洗之

一方　以田螺入氷片化水點瘡上即消

一方　水老鴨屎和猪脂油敷之

一方　黑牛耳垢敷之

一方　鼠屎和亂髮等分燒灰先針瘡頭以灰納入

一方　荔枝五個或三個以狗糞中米淘淨爲末與糯米粥同研成膏攤紙上貼之留一孔出毒氣

一方　荔枝肉白梅各三個搗作餅子貼瘡上其根即出也

一方　魚腥草搗爛敷之痛一二時不可去草痛後

一二日即愈

一方　新鮮蚵蠣以童便洗淨瓦上炙至淡黃色加冰片共研末米醋調敷患處如乾加醋潤之最妙

一方　急用飯一碗鹽一把搗如泥圈敷患處緊咬收籠如途中突患此症雖不能散亦可免走黃以致費治

一方　白茂末五錢水澄去水攤於厚紙上貼之

一方　楊柳樹上大烏殼硬蟲或地上新糞內及沙堆中者以蜜湯浸死新瓦焙焦爲末先以燒過針撥開疔頭再以好醋調藥末敷之

一方　以蟬脫炒爲末蜜水調服一錢外以津和塗之立效

一方　蟬脫殭蠶等分爲末醋調塗瘡四圍侯根出拔去再塗

爛頭疔　白菊花根一把白梅二個蚰蜒大者二條共搗爛加雄黃同敷如乾再另敷易一二遍神驗

紫馬疔　用生白酒煎蒻薟草紫花地丁車前草服之立愈切忌食肉

羊毛疔　初則寒熱類傷寒但前心後心有紅點又如疹形視其斑點色紫黑者爲老色淡紅者爲

按羊毛疔用針挑之後生屢見誤多瀉沸不已用下明雄方擦之神妙無比　雲韶注

一方　用明雄末二錢青布包紫蘸熱燒酒於前心擦之自外圈入內其毛即奔至後心再於後心擦之其毛俱拔出於布上埋之忌茶水一日即愈

流注　發無定處隨處所生初起漫腫無頭連接三四處皮色不變凝結日久微熱漸痛紅腫作膿

初起時即宜石膏一兩官硼三錢飛麪糊作十丸將丸穿一孔貫以鐵線炭火燒紅取酒一碗投入俟冷又燒紅入酒內以丸盡爲度其酒熱即服一日二服即消

一方　近遠皆治　地榆苦參各二兩紅花金銀花各三錢酒水各半盞煎服近者三服遠者七服即消

紫馬疔　用生白酒煎蒻薟草紫花地丁車前草服之立愈切忌食肉

羊毛疔初則寒熱類傷寒但前心後心有紅點又如疹形視其斑點色紫黑者爲老色淡紅者爲嫩色也　先將紫黑斑點用衣針挑出如羊毛狀前後心共挑數處用黑豆蕎麥研粉塗之卽時汗出而愈

一方　用明雄末二錢青布包紫蘸熱燒酒於前心擦之自外圈入內其毛卽奔至後心再於後心擦之其毛俱拔出於布上埋之忌茶水一日卽愈

流注發無定處隨處所生初起漫腫無頭連接三四處皮色不變凝結日久微熱漸痛紅腫作膿

初起時卽宜石膏一兩官硼三錢飛麪糊作十丸將丸穿一孔貫以鐵線炭火燒紅取酒一碗投入俟冷又燒紅入酒內以丸盡爲度其酒熱卽服一日二服卽消

一方近遠皆治　地榆苦參各二兩紅花金銀花各三錢酒水各半盞煎服近者三服遠者七服卽消

一方　薑黃母子　即薑黃傍小薑黃是也　爲末將小紅棗去核藥末入內塡平用絲線紮緊塞入鼻孔內隨量飲醉蓋煖出汗已潰者自然全愈未潰者內消神效之極鼻孔照男左女右塞之藥不可經婦人之手

一方　用野花椒半勌山茱萸半勌用酒浸煮三炷香冷定將酒盡量飲醉發汗一身其毒自散神效

一方　金銀花帶葉和酒糟研爛用淨瓦罐盛藥火中煨熟敷患處立愈

癭瘤　二症發於皮膚血肉筋骨之處癭多生於肩項兩頤瘤則隨處有之皆不痛痒癭症屬陽色紅高突皮寬不急帶小下垂瘤症屬陰色白漫腫皮欵光亮頂小根大癭有五種肉癭則肉色不變筋癭則筋脉現露血癭則赤脉交結氣癭則隨喜怒消長石癭則堅硬推之不移瘤有六種筋瘤又名石瘤肉瘤氣瘤若日久化膿流出又名膿瘤骨瘤脂瘤即粉瘤諸癭瘤中惟脂瘤可破餘皆不可若破則多傷生又有黑砂瘤髮瘤蟲瘤三瘤又皆可破之更有蟲瘤則當同癌疽腫瘍潰瘍門法參以治之　常食紫菜湯即消　蓋以鹹能軟堅也但性寒有毒多食令人腹疾發吐白沫以醋飲少許即消　須去小螺誤食損人

贅癭焦法　甘草煎膏筆粧患之四圍上三次乃用

芫花大戟甘遂等分爲末醋調別以筆粧其中勿近甘草次口縮小又以甘草粧小暈三次如前仍上自然焦縮

氣癭　小麥一升醋一升漬之晒乾爲末以海藻洗研末三兩和勻每以酒服方寸匕日三服（即數分）

一方　羊靨（即會咽）一具去脂酒浸炙熟含之嚥汁每日一具七日即瘥

腋下癭瘤　用長柄茶壺盧燒灰研末搽之出水消盡而愈

一切癭疾　萬州黃藥子半觔（他州出者力慢倍用）取好酒一斗入藥封瓶口以糠火煨一週時待酒冷時時飲一杯不令絕酒三五日後常把鏡自照覺消即勿飲其效如神並將燒酒香氣時聞之以瓶口有津即止

贅瘤（並瘊子）　天南星（揀極大者）研極細同重羅麪醋調搽之自愈

粉瘤　糜肉或鹿肉剖如厚脯炙熟搗之四炙四易出膿而愈不出再以新肉炙之並治黑砂髮蝨三

瘤

髮瘤　多生耳後髮下寸許軟小高突按之不痛　用針刺之令粉髮齊出

肉瘼擠盡以生肌藥敷之自愈

多骨疽　一名剩骨一名朽骨多生腮胯牙床眼胞頤下手足腿膊等處又有初生落草後身中即有如脆骨者其人長大後是處突腫生疽潰後骨脫其口方收又有多骨出之不休者名曰骨脹多難愈　俱宜用附子餅灸法灸之以宣寒淤令骨速

脫方即生附子爲末黃酒合作餅如三錢厚每瘡上以艾壯灸之每日灸數壯但令微熱勿令疼痛如餅乾再易餅灸之務以瘡口紅活爲度

積年骨疽（附骨疽方）　以生鯉魚置疽上拉之頃時剖視蟲出更洗淨敷藥蟲盡則愈

骨疽出膿（附骨疽方）　黑色鯽魚一個去腸入白礬令滿紮定以水一盞石器內煮至乾焦爲末豬油調搽少痛勿驚

瘭疽 一名蛇瘴初起紅點次變黑色形如栗豆或如梅李隨處可生疼痛應心不止腐爛筋骨潰破膿如豆汁今日拭淨次日膿水復滿愈而復發 初起者以蟾酥餅貼之如寒熱交作以寸金丹服之自愈

一方 日飲犀角汁取瘥

一方 大鯽魚一尾長三四寸者 加亂髮一雞子大猪脂一升同煎膏塗之

烏癩風瘡 遍身皆發初覺皮毛變黑發若癮疹或如蟲行手足頑麻針刺不痛目視物若垂絲心常驚而妄語凡飲食言語之時開口出氣而鳴 大腹子連皮勿傷動以酒一升浸之慢火熬乾爲末臘猪脂和敷之內常飲苦參酒自愈酒藥方苦參五觔露蜂房五兩刺猬皮一具酥炙共研粗末用水三斗煎湯至一斗去渣浸細麴五觔炊黍米三斗拌如常醞法酒熟壓去糟每於食前温飲一小盞惡疾自除

白癩風瘡 初起皮色漸變白斑語聲嘶嗄目視不明四肢頑疼身體大熱心常懊惱手脚緩縱背脊拘急肉如針刺鼻生瘜肉瞳生白沫 螫螫膏螫螫十四枚大腹蛇一條頭尾全者晒乾以酒七碗同藥入瓶內用糠火

煨酒至一碗濾去渣收貯每用薄薄塗於患上以毒攻惡其癩自平內亦常服苦參酒

大麻風又名厲風自上而下者順自下而上者逆漸來可治頓發難風毒入裏化生爲蟲蟲蝕五臟則形應藏而損卽爲險症若更見五死之症見一卽爲敗惡不治之候若能清心寡慾戒日早治或有可生若日味不能清淡色慾不能斷絕卽愈後仍不免再發終成不救 老蝦蟆一個白矾三錢銅綠二錢入中白二錢研末裝入蟆口內線縫好外以泥包裹火煅烟盡爲度取起去泥約有五錢隨輕重配苦參五松各一兩神麴糊爲丸梧子大每服五分滾水或麻黃湯或酒下亦可如眉毛先落爲肝損加石決明先損眼目爲心損加山梔面起紫泡爲肺損加葶藶遍身如癬爲脾損加白芷脚底先破穿爲腎損加故紙如麻木不仁爲皮死蒼朮湯下割切不痛爲肉死苦參湯下潰爛無膿爲血死生地湯下手足脫落爲筋死續斷湯下鼻梁崩塌眼弦斷裂唇翻聲啞脚下穿孔爲骨死薏苡牛膝湯下

一方洗藥每日洗一兩次 桑皮大黃芒硝各一撮水煎無

風處洗之如有蟲加鴿屎同煎如爛用琥珀末搽患處此方神驗之極

一方　凌霄散蟬蛻地龍去土焙白殭蠶全蝎各七枚凌霄花五錢爲末每服二錢酒調下不時沐浴每浴坐湯中浸一時久服是藥神效

一方洗藥　蘄艾半觔明礬四兩練樹皮半觔白椿皮半觔煎湯浴數次自愈

一方　蓖麻子去皮用黃連水浸每晨卽用浸水吞一粒至三四粒甚良但一生不可食炒豆

一方　皂莢刺三觔燒灰一觔蒸一時辰晒乾爲末食後煎濃大黃湯調一匙飲至一旬鬚眉再生肌潤目明矣

一方初起卽覺者　消風散全蝎白芷人參各一兩研細末每用二錢勿食晚飯次日空心温酒調服覺身微燥爲效次日卽服後載追風散方

一方　皂刺蒸晒爲末大黃湯調下

一方初起者　追風散大黃六兩鬱金炒一兩八錢皂角刺一兩五錢研細末每用五錢加大楓子油一錢五分朴硝一錢五更時空心溫酒調服直待辰時又如前調藥加熟蜜少許服之以蜜解口切不可卧良久痛瀉數次不妨以稀粥補之先一日須服上方瘦弱者十日內此只用一服老弱者勿服

一方牙齦出血者　黃連貫衆等分煎湯漱之並揩類聚祛風散硫黃寒水石枯礬貫衆各二兩蛇床子一兩朴硝五錢研細末臘月猪脂搗爛調和遍敷仍以地骨荆芥苦參細辛各二兩河水煎湯浸浴薰洗

一方見上部損敗者　醉仙散牛蒡子炒胡麻甘杞蔓荆各一兩苦參白蒺藜防風花粉各五錢研細末每服一錢加輕粉一分二釐研勻茶清調服晨午晚各一服五七日後先於牙縫內出臭黃涎渾身疼悶如醉然後利下膿血惡物臭氣病根乃出

一方見下部損敗　通天再造散煨大黃一兩皂角刺一兩五錢鬱金五錢白丑頭末半生半炒六錢研細末每服二錢早辰面東醞酒調下當日利下惡物或膿或蟲爲效

楊梅瘡　又名廣瘡時瘡棉花瘡翻花楊梅天泡瘡楊梅痘楊梅疹楊梅斑楊梅圈等候皆不出氣精二化氣化傳染者輕精化傳染者重氣化先從上部見之皮膚作癢筋骨微疼其形小而且乾若精化先從下部見之筋骨多痛或小水濇淋瘡形大而且堅　初起急先服護面散女人頭髮煅存性雄黃各三分研細香油半酒鍾研勻滾黃酒冲服一日三服則服表藥不致毒攻頭面

一方瘡勢已發於面皮愈後斑痕不退者　翠雲散輕粉石膏煅各一兩胆礬銅綠各五錢研極細末濕卽乾撒乾以公猪胆汁調濃點之日三次斑痕自退

一方已行瀉後筋骨疼痛纏綿狀者　升麻解毒湯升麻皂刺各四錢土茯苓一觔水八碗煎半作四次一日服盡每次燒熟加香油三茶匙和勻量病上下食之前後

食之如瘡生項上加白芷咽內加桔梗胸腹加白芍肩背加羌活下部加牛膝神效

一方 行下後筋骨不疼瘡色淡白則爲內毒已解矣 金蟬脫殼酒醇酒五勫大蝦蟆一個土茯苓五兩浸酒內瓶封煮三炷香時取出次日以飲醉爲度無論冬夏蓋煖出汗餘酒次日隨量飲之酒盡瘡愈並治結毒筋骨疼痛諸藥不效者更妙服酒七日後禁見風忌口及房事

一方 潰爛時膿穢浸淫成片而痛者 鵝黃散輕粉粉石膏煆黃柏炒等分爲細末乾撒之卽可生痂再爛再撒以毒盡爲度如翻花楊梅以是散加雄黃末香油調敷卽愈

一方 鍾乳粉三分琥珀冰片各半分丹砂二分爲末入炒飛麪分半分十二股每日用土茯苓一勫水煎十二碗清晨一碗入藥一股溫服其茯苓湯須一日服盡不可別飲湯水并茶重者再服一料無不愈者

忌雞鵝牛羊房事此方古今第一亦治結毒上攻口鼻

一方初薰瘡法　辰砂末一錢綿紙分作七條香油浸透每次薰二條薰時板櫈坐着暑日用單被寒天用夾被蓋之不可出氣要口含水恐傷口皮薰完吐出不可吞下其效如神亦治結毒

一方　牛角羊角山甲三味用濕紙裹煨焦取淨末各二兩皂角刺三錢生大黃十二兩爲末和勻每服五錢陳老酒調服出恭時於空地上解完即將土掩之恐惡氣害人也間二日再服一服最重者不過三服即愈

一方　土茯苓二觔用石打碎猪胰子一個去油水四升同熬至二升去渣用汁再入好酒二觔金銀花生地桔梗當歸各五錢熬成二升温服渣再煎減半四服全愈第一奇方

一方　大黃麻黃黃蓍陳皮蟬蛻各四兩猪肉一觔四兩分作六塊酒六碗水六碗煎至六碗每日食

內一塊湯一碗分作六日吃三天發汗三天長齊三天貫漿三天結靨共十二天全愈並無回毒屢驗只用一服不可以平易忽之

一方 雄黃一錢五分杏仁去皮三十粒輕粉一錢共爲末先將瘡洗淨用雄猪胆汁調搽二三日卽愈百發百中

一方 疽毒臭爛不堪者 橄欖核一個燒存性冰片三釐共爲細末用麻油調塗卽愈無比效方也

一方 疽毒臭爛者 圓厚五棓子一個去頂砂仁三顆搗碎入五棓內仍以頂合好濕紙包裹火內煨極黑取爲末摻患處卽愈或用五棓燒存性爲末加冰片少許摻之亦妙

一方 疽毒臭爛不堪 大訶子燒灰入麝少許爲末以荆芥黃柏甘草馬鞭草葱白煎湯將疽洗淨然後敷之卽玉蕊爛至一二寸用此亦妙

一方 潰爛者 大牆大螺蜊殼辰砂等分片腦少許爲

末搽之

一方 筋骨疼痛 椰子殼 產海南地方 燒存性臨燒以滾酒泡服二三錢暖卧取汗其痛卽止

一方 銀硃安息香硃砂百草霜各等分研細末和勻秤准三分加艾末一分同入紙捻內將頭用黑帕兜蓋口內含水或含銀將紙捻點着入帕內但鼻勿嗅其氣薰至九次共用藥二錢七分自愈

一方 槐花四兩略炒入酒一盞煎十餘沸熱服胃

寒者忌之

天泡瘡 亦梅瘡因其夾濕而生白泡故名 天蘿蔔水調官粉敷之若日久作爛疼痛不已膿水淋漓者石膏煅輕粉各一兩青黛黃柏各三錢共爲末甘草湯洗淨摻之其疼卽止

一方 輕粉青黛等分爲末瓦花汁調搽之立效

一方 荔枝核以醋磨塗卽愈

一方 絲瓜取汁調辰砂末頻搽之

一方　以蓮房燒存性研末井泥調塗神效或以荷花貼之

解梅瘡傳染　待從患者之人服之則無患傳染　護從丸雄黃川椒（開口）各五錢杏仁一百粒炒去皮尖研末燒酒打麪糊爲丸梧子大每服十五丸白湯下於病人初發瘡時服之則不患傳染也

楊梅結毒　因患梅瘡誤服汞藥希圖速效一時僥倖而愈致毒潛藏髓竅中日久因虛外攻故名結毒倒發其始先從筋骨疼痛隨處結腫皮色如常將爛時色方紫紅腐臭不堪以致腦頂塌陷腮唇鼻梁損壞穿喉蝕目手足拘攣等患終成痼疾　初起結腫筋骨疼痛用搜風解毒湯土茯苓一兩白蘇皮金銀花苡仁防風木通木瓜各五分皂角子四分水二鍾煎一鍾服之一日三服氣虛加人參七分血虛加當歸七分常服即愈切忌清茶牛羊雞鵝魚肉燒酒房慾等件

一方　遍身破爛臭穢而兼筋骨疼痛氣實毒盛者　化毒散生大黃一兩山甲炙歸尾各五錢白殭蠶炒三錢蜈蚣炙黃一

條共研末每服二錢溫酒調下一日二服

一方 年久臭爛鼻破損壞者 結毒紫金丹龜板放炭火上炙焦用白酒漿塗之再炙以焦黃爲度研末二兩硃砂六錢石決明六錢用九孔大者煅紅童便淬一次各研極細末和勻爛米飯爲丸麻子大每服一錢量病上下食前後服之筋骨疼痛酒下

腐爛者土茯苓湯下

一方 鼻中瘡毒結塞不通 通鼻散壺蘆殼燒灰石鍾乳胆礬冰片各等分共爲末入鼻內出黃水日吹二三次

三二日卽通

一方 結毒攻喉腐爛臭蝕疼痛不休 硫黃不二散硫黃一錢靛花一分共研細末用凉水一酒鍾調服

一方 筋骨疼痛朝輕夜重喜熱手按揉者 鉛丹散黑鉛半觔銅杓化開傾水中取起再化再傾以鉛化盡爲度澄去水將鉛灰傾在三重紙上下用灰收乾水氣鉛灰日中晒乾硫黃各等分共研細末每服一錢溫酒調服重者不過三次卽效

一方 猪大腸一段納土茯苓一兩川椒（開口）三錢線紮

兩頭煮熟去苓椒食腸飲湯五七次即愈

一方　皂莢當歸薤皮加皮金銀花各二兩作八貼每貼加土茯苓四兩服之立效

一方久爛者　土茯苓一觔生薑四兩共煎數碗服之不十日而愈其潰處以藥汁調麪糊糊之漸愈會有陰莖爛完半年不愈服此得生

赤白遊風發於肌膚遊走無定起如雲片浮腫燉熱痛癢相兼高纍如粟名赤白者乃風邪熱毒滯於血分則發赤色滯於氣分則發白色也　初起俱宜荆防敗毒散疎解方見諸書其毒外用牛肉片或猪羊肉片貼之如遊走太速者以磁針砭出惡血甚妙忌魚腥鷄鵝動風燥血之物犯則難愈

一方及一切遊風　野貓頭燒灰酒調服立效

白遊風腫　小螺螄肉入鹽少許搗泥貼之神效

一方赤白遊風　蝦米搗碎敷之

紫白癜風俗名汗斑紫癜色紫暗斑白癜其色粉紅斑中有白點多生面項延及偏身成片初無痛痒久之微痒　猪胰子一具酒浸一時飯上蒸熟食

之不過十具卽痊外附子硫黃等分爲末薑汁調勻先以粗布擦洗患處令淨後以茄蒂蘸藥擦之白用白茄紫用紫茄

一方 蜜陀僧散雄黃硫黃蛇床子各二錢蜜陀僧石黃各一錢輕粉五分共研末醋調搽之令汗出則風濕自解而愈

紫癜風癢不止 羚羊角磨水摩之數百遍取效

白癜風及癮瘡風 以雄雞翅下血塗之

一方 紅灰藿菜爲藜菜有紅心者五觔茄子根莖三觔煮耳根莖五觔並晒乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成膏再以乳香五錢鉛粉一分臙粉一分鍊過牛脂二兩和勻每日塗二次取效

一方 清晨韭葉上露水塗之

白癜風 取樹木孔中水温洗之洗後搗桂心牡蠣唾和敷之日二次或用面油塗日三夜一甚妙

白癜風 小麥灘石上燒鐵物壓出油搽之甚效

白駁風生面及頸項肉色忽然變白狀類班點並不疼痛日久則延及遍身　初宜浮萍散紫背浮萍大者佳洗淨晒乾爲細末蜜丸彈子大每服一丸豆淋酒送下造酒法以黑豆一升炒至烟起沖入醇酒三勫浸一日夜去豆用酒送藥次服蒼耳膏蒼耳鮮者連根帶葉取五七十勫洗淨切碎入大鍋內煮爛取汁絹濾熬膏磁罐盛之用時以桑木匙挑一匙噙口內用黃酒送下服後有風處必生小瘡如豆粒大此風毒出也刺破出汁盡卽愈忌猪肉至於初起外治以穿山甲先刮患處至燥痛取鰻鱺魚服曰三塗之

一方　以白鱔魚脂曝乾微炙取油塗之卽時色轉

五七度卽瘥若炙熱搽之三次卽愈

癜瘍風發於皮膚多生頸項胸腋其色紫白點點相連亦無癢疼較白駁形圓不延蔓開大

五月五日取牛轍中水洗之或牛蹄中水亦可

一方　豆醬清和硫黃細末日日揩之或醋和敷之

一方　取塗中死蜣螂杵爛揩瘡令熱封之一宿瘥

一方　羊蹄草根和硫黃醯醋於綉鐵片上研濃汁日二三次極驗

丹毒　一名　肉中忽有赤色如丹塗之狀其大如掌甚至偏身痒痛而無定處又有形如雞冠爲雞冠丹　如雲片爲茱萸丹初起白斑漸透黃色光亮皮中恍如有水脹墜破流黃水濕爛多痛爲水丹又名風丹多生腿膝屬脾肺有熱而爽濕也又色赤而乾發熱作癢形如雲片爲赤遊丹屬血分有　而受風也如遍起白泡無熱無痛遊走不定爲冷瘼即冷丹由火毒　發肌膚外受寒鬱而致也丹名雖多其理則總屬心火三焦風邪而成其勢暴速自胸腹起於四肢者順從四肢起於胸腹者逆　初起俱宜牛羊精肉片貼之甚則用砭法用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊用筋一根將頭劈開夾而縛之用二指輕捺筋稍以磁鋒對患處懸寸許再用重筋一根頻擊筋頭令毒血出盡如次日腫未全消再量行砭之以紅消腫散爲度但宜刺皮忌太深傷肉如色重不散以柏葉散敷之（方見纏腰火丹）

一方　臘月猪脂和伏龍肝末調勻敷之或加雞子白

一方 初起者 以苦薑葉研末靛青調敷甚效
一方 大火丹大人小兒皆治 芝蘇炒研油調敷
一方 火丹走串皮中 以螬糟搗爛塗之
一方 取樹孔中水飲之 名半天河水
一方 天火丹 野雞尾燒灰和麻油塗之
一方 赤形如疥 煎青羊脂摩之數次卽愈
一方 天火丹 用小兒胎衣瓶內水將雞毛抹之隨手而愈

一方 諸色皆治 鹿角燒爲末漬猪脂敷之卽消
一方 遍身赤丹 羚羊角燒灰雞子清和塗神效
一方 丹從臍起及瘡 梹榔末以醋調敷卽瘥
一方 以蚯蚓去泥入葱管中化爲水名蝒膏水飲之甚效或去泥以鹽塗化爲水亦佳
枯筋箭 一名胗子初起如赤豆枯則微槁日久破裂鑽出筋頭鬚鬆枯槁如花之蓝多生於手足胸乳之間如 根大項小者用銅錢一文套胗子上以草紙攘代艾連灸三壯其患枯落胗形若大用草

紙蘸濕套在肬上灸之

一方　盜取酸酒酹洗而祝曰肬肬肬不知羞酸酒酹洗你頭急急如律令呪七遍自落

一方小兒生者　雞內金黃皮榻之自落

一方　以蒜臼接草房簷前雨水洗之奇效狐仙傳方

一方及黑子惡肉　紅灰藋紅心者　莖灰荻灰蒿灰等分和蒸取汁煎膏點之自落

一方　以猪脂揩之令血出少許神驗不可及

一方　牛口中涎頻塗之自落

疥瘡有乾濕蟲砂膿五者之分然皆由各經蘊毒日久生火兼受風濕化生斯疾或傳染而生諸疥先從手丫生起遶徧周身痛癢無度　楓子肉五錢蛇床子五錢水銀二錢枯礬白錫各一錢爲末先將錫化開次入水銀再入末藥柏油其搗勻搽之宜乾些臘猪油亦可此方並治血風瘡坐板瘡及癬瘡蟲瘡其效甚速

一方 膿疥瘡腎經濕熱或脾經濕盛而致 烟膏一兩黃丹一兩雄黃硫黃各三錢輕粉一錢爲末醃猪油調搽如連片將油紙攤藥縛好不動三日脫光

一方 久患不愈食白鴿子立愈仍以鴿屎炒研末敷之

一方 膿疥瘡 硫黃三錢雞蛋二個煮熟去白用黃銅器內微炒取油聽用 胡椒四十九粒爲末菜油二兩川椒三錢去核焙末將二椒末併蛋油黃共入菜油內熬數沸搽之加飛礬少許更妙凡患肥胭濕風坐板諸瘡亦極神效但不用白礬

一方 膿疥 以土茯苓煎湯代茶甚良

一方 蟲疥瘙癢皮枯而起白屑 繡球九川椒輕粉樟腦雄黃枯礬水銀各二錢楓子肉一百枚另研合細末再碾勻加柏油一兩化開和勻作丸以二掌合搓如圓眼大先以鼻聞次搽患處

一方 蟲疥瘡 巴豆十粒炮黃去皮心右手順研入酥

少許膩粉少許抓破點上不得近目及腎如薰目著腎以黃丹塗之

一方 濕疥劈腫作痛破流黃水甚流黑水或頂含稠膿瘡疼相兼 臭靈丹硫黃油核桃生猪油各一兩水銀一錢搗膏搽之

一方 瘡痛不止 猪膏頻塗之或以羊乳頻敷甚妙

一方 蟲疥瘡及蟲癬瘡痛者 猪膏煎芫花塗之

一方 灰藿菜連莖煎湯洗之牆樹下者勿用

一方 猪肚一具同皂莢煮熟去莢食肚即愈

一方 土茵燒灰敷之

疥癬諸瘡 蒼朮宮南蒼朮十觔切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以朮無味為度併汁一處用小砂鍋再煎如乾一寸加汁一寸煎成膏加蜂蜜四兩和勻每服二羹匙空心白滾水調服外搽臭靈丹方見前條

癬瘡 有六形如乾癬瘙瘡則起白屑索然彫枯濕癬瘙瘡則出黏汁浸淫如蟲行風癬即年久頑癬瘙則痺頑不知痛瘡牛皮癬狀如牛領之皮厚而且堅松皮癬狀如蒼松之皮紅白斑點相連時時作瘡刀癬輪郭全無縱橫不定總由風熱濕邪浸襲皮膚鬱久風盛而化為蟲是以瘙瘡之無休也

俱宜以殺蟲滲濕消毒之藥敷之又有面上風癬初如痦瘟或漸成細瘡時作痛癢發於春月又名吹花癬卽俗所謂桃花癬也　輕者用羊蹄根散羊蹄根末八錢枯礬二錢共研勻米醋調搽卽愈羊蹄根卽杜黃連

一方　久頑者必效散川槿皮四兩海桐皮大黃各二兩百藥煎一兩四錢巴豆去油一錢五分盤蝥一個全用雄黃輕粉各四錢共研極細末用陰陽水調藥將癬抓損薄敷藥乾必待自落

一方　硫黃末木炭灰等分爲極細末將癬用山甲刮破擦數次卽愈

一方　馬蹄決明一兩爲末入水銀輕粉少許研不見星將癬刮破撚之立愈

一方　馬蜂窩一個仰放瓦上以枯礬末塡滿孔內炭火炙焦爲末用蠟脚醋調塗立愈

一方　蔓延　盤蝥雄黃銅青等分爲末無根水調服起泡刺破柏燭油敷五六次潔淨不發

一方　羊蹄根一握洗淨搗爛濾汁用白梅數枚去

核同汁搗爛以山甲刮破患處抹數次即愈

荷葉癬　田螺一個開厝入信二分待內化水抹上即痊神妙方也

牛皮癬及頑癬　紅粉霜五分明礬槿皮杏仁去油皮各一錢陀僧三錢爲末津調抹之一日三次三日全愈極驗

一方　牛皮燒灰油調敷立愈

一方乾癬　九硫一信三巴豆俱爲細末菜油調勻搽之俟半時候用紙抹之三日見效

頑癬　白信一分硫黃九分硝三分白礬四分冰片半分爲末津調搽之

圈癬　穀樹皮剪如癬樣大小以毛背一面用唾貼肉以手不時撲之即愈

癬瘡不愈　川槿皮煎湯取肥皂去核及內膜浸湯內時時搽之

牛皮癬　石榴皮蘸明礬末抹之切勿用醋以致隱

下

一方　蛇床子一錢銅綠五分研末菜油調搽二三次全愈

一方　每日五更炙黃牛肉一片食之卽以酒調輕粉敷瘡多次無不愈者

一方　牛蹄甲驢糞各一兩燒存性爲末油調抓破敷之五七日卽愈

一方　生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰油調搽之名一掃光

癬瘡　及小兒頭身諸瘡　抱出雞子殼燒灰油調塗之

一方　諸癬皆效　冰片麝香等分爲末以燈心染成小把切齊一頭蘸上藥末乾搽之數次見微有水出爲驗

一方　錢癬卽肥瘡　取大蒜苗上生小子十餘粒搗爛同蜜調搽患處卽起一皰次日卽消而愈

一方　濕癬及惡瘡　黑驢屎燒灰和油塗之甚效

一方　田螺十枚槿皮末一兩同入碗內蒸熟搗爛入礬紅三錢以鹽水調搽

一方燥癢者　以雄雞血頻頻塗之

一方蟲癬　清晨抹露水絲瓜葉七片逐片捺瘡七下效驗如神忌雞魚發物

一方浸淫者　醬瓣和人尿塗之

瘡疥刺風　醋磨白兔骨塗之久患疥者更妙

梅花癬瘡　乳香沒藥各五分雄黃一錢花椒十粒用淡猪油搗勻紅紙包裹火撚滴油塗之

桃花癬瘡春日即發又名吹花癬惟婦女多有之　消風玉容散綠豆麪三兩白菊花白附白芷各一兩熬白食鹽五錢共研細末加冰片五分再研勻收貯每日洗面以代肥皂風除癬去內服疎風清熱藥其效更妙

黃水瘡初如粟米而癢兼痛破流黃水浸淫成片隨處可生由脾胃濕熱外受風邪相搏而成　熱甚者宜青蛤散蛤粉煆一兩青黛三錢石膏煆二兩輕粉五錢黃柏生五錢共研細末先用香

油調成塊次用涼水調稀塗之神效並治鼻齇瘡

一方 濕盛者以碧玉散敷之方見面部燕窩瘡

一方在面上者 酸棗燒存性荆芥燒存性羊鬚燒存性各一錢好膩粉五錢共爲細末槐條煎水洗淨敷之其功甚捷

一方 芋苗晒乾燒存性研末搽之

一方 鯽魚頭和醬汁塗之小兒面上生者用之

一方 雄猪胆一個入黃柏一兩浸焙乾爲末敷之

一方 雄黃硫黃黃丹陀僧各八分爲末敷之

一方 黃丹飛人中白爲細末等分搽之

一方 楓子肉樟腦水銀油核桃等分爲末搽之

一方 赤石脂石膏煆大黃各八分爲末敷之

一方 大黃微炒當歸等分爲末搽之

一方 皂礬石膏等分爲末搽之

一方 菜豆松香等分爲末搽之

一方 滑石六錢甘草一錢枯礬三錢爲末搽之

一方　松香二兩枯礬二兩官粉二兩黃丹一兩共爲末加香垢香油熬膏搽之

暑令瘍毒小癤初發背心肌膚紅暈次生腫痛發熱無時日夜不止頭目眩暈口苦舌乾心煩背熱肢體倦怠　初起宜服荆防敗毒散加藿香黃連

石膏外貼翠玉膏方見頭部

一方　五月五日午時取獨頭大蒜切片貼眉心至夏即不發

諸癤孔肉凸出努肉　取烏梅肉搗爛量大小攤貼即消

黃水瘡　黃丹松香鉛粉等分研細以眞麻油調勻先以米泔水洗淨方敷前藥若乾洗淨再敷不過二三次即瘥

一方　用磁碟盛面粉菜油調稠多捲紙板點着合薰時時攪勻待徧黃時去靨點之立愈

翻花瘡　因生瘡潰後努肉自瘡口突出其狀如菌頭大蒂小愈努愈翻雖不大痛癢然誤有觸損流血不止　內服逍遙散方見諸書外用烏梅煅灰輕粉各等分研末撒之立愈

一方　馬齒莧煆灰猪脂油調敷奇效

一方　牛蒡子搗爛和猪脂貼之及一切瘡腫

血風瘡　徧身如粟米極癢抓破時流脂水浸淫成片煩渴日輕夜重　初起以雄黃解毒散雄黃寒水石煆各一兩生白礬四兩研末滾水調敷即愈忌椒酒鵝雞動風等物

一方　元粉四兩水調入盌內以艾燒烟薰乾入乳香少許研細末摻之

一方　陀僧末香油入粗碗內磨化油紙攤膏反覆貼之

浸淫瘡　初生如疥瘙癢無時蔓延不止抓流黃水浸淫成片甚則身熱肌膚浸淫從口流向四肢者順反者則逆　黃連爲末搽之取苦以燥濕寒以除熱之義抓破流血者以青蛤散搽之　方見黃水瘡

一方　生鯽魚切片和鹽搗貼頻易取效

魚脊瘡　多生筋骨之間陽氣虛寒之人則患之只在皮膚堅凝譽痛初起白泡漸長狀如魚脊破流黃水正膿生遲　初起時無論已未潰破宜蒜片榻瘡以艾灸之以通陽氣外用眞君妙貼散蕎麪五觔

硫黃十勉爲末白麵五勉共一處清水微拌乾濕得宜趕成薄片微晒單紙包裹風中陰乾收之臨用研細末新汲水調敷如潰破流水者用麻油調敷

一方　臙猴猪頭肉燒灰敷之

風癬　生穀道形如風癬作癢破流黃水浸淫遍體微疼　如聖膏當歸五錢巴豆三錢去殼香油八兩將藥煤枯去渣入黃蠟三兩化盡離火絹濾淨將凝時入輕粉二錢攪勻搽之神效

漆瘡　初起面癢而腫抓之漸似癮疹色紅偏傳肢體燃痛皮破爛斑流水甚者寒熱交作　三白散鉛粉一兩輕粉五錢石膏煅三錢共研勻韭菜汁調敷紙蓋或涼水調亦可內服消斑解毒湯升麻石膏連翹去心牛蒡子炒研人中黃黃連知母黑參各一錢淡竹葉二十片水二鍾煎八分服之忌浴熱水或油膩厚味發物否則復發或成頑癬

一方　神曲研末生蟹黃調塗尤效

一方　用蟹唾抹之或磨刀水泥塗或杉木煎湯洗或蟹殼滑石研末乾者蜜和塗之濕者乾末摻之俱極效

血箭　發無定處一名肌衄由心肺火盛逼血從毛孔中出出如箭　宜涼血地黃湯生地三錢黃連當歸各一錢五分黃芩二錢梔子生研元參甘草各一錢水二鍾煎八分量病上下服之外用桃花散白石灰半升用水潑成末與大黃片一兩五錢同炒以灰變紅色爲度去大黃將石灰篩細用涼水調敷其效通靈

血痣　初起如痣色紅漸大如豆觸破時流鮮血　黃鱔血同蒜汁徽墨汁頻塗之　並塗赤遊風　血出甚者內服涼血地黃湯方見前條

脧痛　脧音鐫症係暴寒侵襲肌膚之中寒鬱不行偶犯衣觸或以手捺疼痛連心似乎無皮之狀　宜胡椒四錢燒酒四兩共入磁碗內重湯炖煮以軟綿蘸酒溫湯熨之即效

瘡口誤入毒中　或驢馬尿糞或皂角或木刺所傷　煽腫疼痛至骨

者先以温水將瘡洗淨拭乾再用金蟬散乾蝦蟇一個胡椒十五粒皂角子七粒入乾鍋內瓦蓋鍋口慢火煅至烟盡取出存性爲末撒瘡內外以好膏藥蓋好良久毒水流盡有刺亦自出矣

一方 誤入毒水或因風襲腫痛難忍 以麝香末二分五厘一字納瘡中出盡膿水便愈

疔瘡因風侵襲腫痛難忍 驢屎炒熨瘡上五十遍極效

打傷諸瘡因風侵襲腫痛難忍 驢屎炒焦熨之冷卽易熨以愈爲度

瘡口冒風腫痛 白芋燒灰敷之乾卽易之

刺瘡傷風傷水作腫 鯉魚目燒灰敷之汁出卽愈

時行熱瘧瘡 青羯羊胆北地口外出者和醋服之甚驗

諸瘡生蜈蚣 夏月諸瘡潰爛腐臭或孤獨及懶惰之人失於洗浴積膿污穢蒼蠅聞穢叢聚以致生蛆 急服蟬花散蛇蛻燒存性研末一兩蟬蛻青黛各五錢細辛二錢五分爲末每服三錢黃酒調服日二服則蛆化爲水蜈亦不敢近矣

痘爛生蛆　蟬花散服之方見前條外用寒水石末摻之

夏月潰瘡生蛆係陰濕所化者　海參爲末撒之或皂礬飛過爲末撒之蛆亦化爲水

頭瘡生蛆　絲瓜葉擠水搽之蛆蟲自出以盡爲度

冬瓜癰及四肢癰毒腫滿　新石灰先以水一潤即用醋一碗化開敷上再加醋甲敷上立消身毒忌用其效如神

諸般流火　野芥辣子四五錢研細醋調敷之

寒濕瘡　雞子煮熟去白用黃慢火炒去油加黃柏末摻上立效

金絲瘡形如繩線大細不一上下至心即逆　急於瘡頭上截住刺之出血後即嚼浮萍塗之即愈

遍身瘡癢　蒼耳子熬湯浴之即止

風濕瘙癢　蛇床子熬湯浴之即止

急黃欲死乃血熱所致也　麻雀屎湯化服之立甦男雌女雄臘月採者佳兩頭圓爲雌頭尖挺直爲雄

一方　山豆根爲末水調敷之並治馬生急黃

夏月痈瘡　以慈姑葉調蚌粉塗之

一方 及腋下赤腫者　將冬天雪水以雞翎掃盛瓶中密封陰處遇症和蚌粉敷之或即以採收臘雪抹之俱驗

手足皺裂　以猪脂着熟湯中洗之或以酒化猪腦洗之並塗良

一方　以酒浸猪胞洗並敷之

一方　白犬脂並胞洗之並可入面脂去皴黯柔五金奇妙方

一方　以牛膽敷之羊脂亦可

一方　用臘採備兔腦生塗之

冬月唇裂　煉過猪脂日日塗之

豌豆瘡 其形如疥黑色　煎青羊脂塗之

一方　白牡馬肉煮清汁洗之

一方　白兔毛煎湯洗之

香瓣瘡生面上耳邊浸淫水出日久不愈　青羊鬍鬚荊芥乾棗肉各二錢燒存性入輕粉五分每用時先洗拭潔淨後以清水調搽二三次即愈

不藥良方

續集卷九

C116/2535
V.11

不藥良方續集卷九

外科　雜治

跌撲瘀血滯痛　白芥子和生薑研微煖塗之

一方　薑汁和酒調生麪塗之

一方　損傷者　乾冬瓜皮一兩黃明膠一兩剉炒存性

一方者　海螵蛸末敷之

雲谿傳方

不藥良方續集卷九

外科　雜治

跌撲瘀血滯痛　白芥子和生薑研微煖塗之

一方　薑汁和酒調生麪塗之

一方損傷者　乾冬瓜皮一兩黃明膠一兩剉炒存性研末每服五錢好酒熱服仍飲酒一瓶厚蓋取汗其痛即止一宿如初極效

一方出血者　海螵蛸末敷之

一方自高墜下瘀血衝心面青氣短者　取烏鴉右翅七片燒研末酒服當吐血便愈

一方傷痛者　青羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦爲末每以熱酒下二錢仍揉痛處

一方墜損疼痛　用故馬韁兩段酒五升鹽一抄煮熟罨之冷卽易三五度卽愈

一方蹉跌損傷血瘀骨痛　生鹿角末酒服方寸匕三服　卽數分

一方墜損嘔血不止乃血積心胃也　乾荷花爲末每酒服方寸匕　卽數分

不藥良方續集卷九

外科雜治

跌撲瘀血滯痛　白芥子和生薑研微煖塗之

一方　薑汁和酒調生麪塗之

一方損傷者　乾冬瓜皮一兩黃明膠一兩剉炒存性研末每服五錢好酒熱服仍飲酒一瓶厚蓋取汗其痛卽止一宿如初極效

一方出血者　海螵蛸末敷之

一方自高墜下瘀血衝心面青氣短者　取烏鴉右翅七片燒研末酒服當吐血便愈

一方傷痛者　青羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦爲末每以熱酒下二錢仍揉痛處

一方墜損疼痛　用故馬韁兩段酒五升鹽一抄煮熟裹之冷卽易三五度卽愈

一方蹉跌損傷血瘀骨痛　生鹿角末酒服方寸七日三服　卽數分

一方墜損嘔血不止乃血積心胃也　乾荷花爲末每酒服方寸七　卽數分

一方墜馬血瘀積留胸腹吐血無數者　乾藕根爲末酒服方寸七　卽數分

一方墜馬昏迷　急扶令伸足坐起用長手巾一條疊二寸餘寬橫勒於眉之上一指際其手巾兩頭同髮辮背後着一人用左手緊緊搭住以右手輕輕頻振左膊則醒如仍不醒以一人立於受傷人之對面踢其脚心醒後或飲童便或飲黃酒扶令行走一二百步則無防矣

一方跌撲瘀血作痛垂危者　歸尾五錢熟大黃一兩桃仁二

十一粒共研細末雞鳴時熱黃酒調服至明取下瘀血卽愈神效無比

一方 損傷血出不止　頂好降眞香刮末研極細摻之卽收口速妙若行路難覓以烟代之

一方 腕損筋骨　駱駝肉鞍肉脂以火炙熟摩之取熱氣透內自愈凡頑痺風瘡惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮皆可摩之神驗

一方 損傷瘀血在腹　白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸七日卽數分

三夜一則血化爲水也婦人血氣痛並治

一方 從高墜下瘀血衝心欲死者　倉卒取藥不及擘開口以熱小便灌之韭菜汁亦可或卒墮壓倒打死將本人如僧打坐令一人將頭髮放低用半夏末吹入鼻中醒後以生薑汁眞麻油攪勻灌之再以乾荷葉燒灰熱小便調下三錢日進三服自愈

一方 筋骨折傷　急取雄雞一隻刺血量患人酒量冲服痛立止神效

一方腦破骨折 蜜和慈白搗勻厚敷立效

一方墜車落馬筋骨疼痛不止 元胡索爲末酒服二錢日進二服卽愈

一方跌撲折足 菉豆粉新銚內炒紫色井水調厚敷紙貼杉木紮定其效如神大士夢授神驗方

一方折傷 骨碎補爲末粥和敷之

跌打損傷 取淨土蒸熟以布裹更互熨之勿大熱恐破肉雖血凝積氣絕欲死者亦效

一方 萊菔子生搗塗之并塗湯火傷

一方跌打絕骨者 生地一觔瓜蔞糟一觔生蔞四兩炒熱罨傷打處冷則易之

一方撲損瘀血積滯 生地汁三升酒升半煮服卽愈

一方折骨者 白芨爲末酒服三錢甚效

一方腦破及手足骨或指頭破裂出血不止 慈白搗爛焙乾乘熱敷上外用絹帛封之立能定痛止血

一方肌膚青腫 老黃大茄在枝上者一個切一指厚片

瓦上焙乾爲末臨睡酒調一錢服一夜卽消

一方打撲傷損　龜血和酒飲仍搗生肉塗之

一方損骨　公雞一隻將毛退去餘全用　胡椒四兩生薑四觔合雞搗如泥用布緊捆於患處十餘日方開極驗

一方骨斷　金櫻子根去皮煎酒熱服渣敷患處立愈

奇效方

跌磕傷損　黃牛屎炒熱封之裹定神效

手足閃拘　生薑慈白搗爛和麪炒熱熨之

折傷筋骨　以牡鼠一枚搗敷患處三日一易甚驗

折損瘀痛或筋骨疼痛　鼠屎燒爲末猪脂和敷急裹之不過半日痛止

打傷青腫　炙猪肉搨之或以新開羊皮臥之卽散猪肝貼亦可

一方　大豆黃卽作醬生黃衣之豆也爲末水和塗立效

打損瘀血留滯　飴糖熬焦酒服取下卽免後患

一方　生薑葉一升當歸三錢爲末溫酒服

傷目青腫　羊肉煮熟熨之即退

多年傷損不痊者　冬瓜子仁爲末温酒服之

鼻擦破傷　貓兒頭上毛煎碎唾粘敷之

打撲折傷及湯火傷　臘月取牡鼠以油煎化撈去渣再熬成膏貼之如湯火傷瘡入黃蠟在內則愈後無疤痕極妙

牙齒打動　蒺藜根燒灰敷之

接骨　跌撲骨離者接骨金丹菜豆粉炒成茶葛色乘熱同眞米醋濃調敷之先將鹽蒲包麻根煎湯吃一碗餘湯洗透患處方敷藥三日全愈

續筋　新採金沸草搗汁滴傷處渣敷其上俟半月後方開筋自續矣

一方　蟹殼三個燒存性研末沖酒盡量服後損骨中有響聲即可全愈渣仍塗之乾蟹用燒酒服

一方指斷者　松香明礬各等分研末敷之裹好立效

一方　青牛蹄甲一具乳香沒藥各一錢爲末入甲

內燒灰黃米粉糊和成膏敷之

一方 打損者 黃犬頭骨一個燒存性爲末熱醋調敷

痿臥神效

一方 取鷹骨及鴞鵰等骨燒灰每服二錢酒下在上食後服在下食前服即接如初蓋鷙鳥之力在骨故以骨治骨從其類也

一方 折傷筋骨 螃蜞生搗炒暑之能續斷絕筋骨去殼以肉同黃搗爛微炒入瘡中筋即連也

一方 骨斷碎者 五加皮四兩雄雞一隻重六兩黑者更妙去毛連骨皮血同加皮搗爛敷上用布包好貼一週時揭之切不可太過是時肉自完好仍用加皮五兩酒煎服盡量飲醉睡爲妙

一方 半兩錢 錢上止有半兩二字者 以火煆之入醋內淬數次研極細末七釐甜瓜子火焙乾爲末七釐和勻用生酒服下即愈不宜多服多則旁長一骨矣神驗

一方　大路旁牆脚下往來便溺處日久碎瓦片不拘多少拾來洗淨桑柴火煆好醋淬五七次至黃色以指捻成粉爲度研極細末每服二三錢好黃酒送下其朽骨自接痛卽止不可以輕而忽之

一方（令接而不知疼痛）　鳳仙花根酒磨服半寸最多一寸然後揉托而上則不知痛但多服傷人以一寸爲度極驗秘方

鬪毆內傷（墜壓者）　酒和童便連灌三服卽甦亦可煎服

滅打傷疤痕　用鷹屎白白附子各一兩爲末醋和敷日三五次滅痕乃止

一方　鷹屎白白附子各一兩爲末醋和敷日三五次滅痕乃止

金瘡（金刃傷箭鏃傷或磁鋒刺傷）　輕者皮肉破損血流不住以桃花散敷之（方見前）

一方（血出不止）　慈白連根葉焙熟搗爛敷之冷卽易簡

便奇方

一方　以黃犬頭骨燒灰敷之

一方（傷損血出不已）　稗子米搗敷或研末摻之即止

一方　葵花葉燒爲末敷之

一方（金刃）　生薑嚼爛敷之勿動次日即生肉甚妙

一方（金刃）　古石灰新石灰絲瓜根葉須初種纔放兩葉者各等分搗千餘下作餅陰乾爲末搽之止血定痛生肌神效

一方（金刃）　鵲烏絨毛貼之立愈鵲烏即天鵝

一方　五月五日取牡鼠同石灰搗如泥收之遇患敷之極效

一方（惡心時作）　白楊柳四兩橘皮一兩爲末每空心生蜜湯服二錢

一方（刀傷）　陳石灰不拘多少加韭菜汁搗勻晒乾研細再用雞蛋和勻瓦上焙乾研細搽之

一方（金刃毆跌傷重者）　玉珍散防風白芷白附子南星羌

活天麻各等分研細末磁瓶收之無論兎傷每服二錢温童便調服能受藥者定效嘔吐者難痊若

腹破腸出　好醋蒸熱用舊筆洗之洗一寸入一寸腸紙腐爛亦能入然後用桑樹皮縫之百發百中

熱雲詔傳方

極冷令病人臥蓆上含汁噀之腸自漸入

一方刀斧損傷　白芨石膏煆等分爲末摻之即可收口

一方及杖瘡　青松樹皮煆存性研末敷之

一方　揀剃下黑頭髮數觔洗淨油膩濾乾將鮮大竹一段打空一節將髮裝入築極緊用木塞口黃泥封固放微火灰內煆一夜存性打開髮即成粉收貯磁罐內遇刀傷者敷之極其神驗

一方　半夏松香將香用新磚二塊火內燒極熱上下多襯紙中放松香壓二三次則油盡如霜白油去不淨反令瘡疼　二味等分爲極細末拌勻用以敷之神驗無比

活天麻各等分研細末磁瓶收之無論兇傷每服二錢温童便調服能受藥者定效嘔吐者難痊若刀傷肉破骨損即用藥摻敷忌口即驗此方屢用甚效凡爲民上者脩合濟人既可救傷者死亡併免兇於抵償亦一功德也

一方 腸出者 小麥五升水九升煮四升綿濾取汁待極冷令病人臥蓆上含汁噀之腸自漸入

一方 刀斧損傷 白芨石膏煆等分爲末摻之即可收口

一方 及杖瘡 青松樹皮煆存性研末敷之

一方 揀剃下黑頭髮數觔洗淨油膩濾乾將鮮大竹一段打空一節將髮裝入築極緊用木塞口黃泥封固放微火灰內煆一夜存性打開髮即成粉收貯磁罐內遇刀傷者敷之極其神驗

一方 半夏松香 將香用新磚二塊火內燒極熱上下多襯紙中放松香壓二三次則油盡如霜白油去不淨反令瘡疼 二味等分爲極細末拌勻用以敷之神驗無比

一方　眞降香切片火上炙去油　荔枝核血竭各等分爲極細末敷患處即止痛止癢不三日即愈雖斷指亦能續也

一方　荔枝核燒存性爲細末塡瘡口一夜即平復

一方　龍眼核去外黑殼爲極細末敷傷處立止血定痛神效

一方　龍骨末敷之血即止

一方　刀割斧砍夾剪鎗箭一切損傷　生半夏研細帶血敷上立止

痛能收口生肌

一方　刀傷　用圖書石滑石二末摻之切不可見水

一方　刀傷　用刀刮青石末摻之

一方　刀傷　大黃炒黑篩末摻之

一方　刀傷　堅實細炭老松香各等分研篩細末以韭菜汁拌陰乾再篩研細末摻去韭亦可

一方　出血不止　花蕊石形如硫黃有白班點者火煅七次　刮末敷之即合且不作膿如箭頭入肉不出用以研末敷四圍

箭頭自出

一方 出血不止 乘臘月以黃牛胆入陳石灰末陰乾臨症爲末敷之

一方 刀斧傷 桑葉爲末乾貼之甚妙

一方 鮮藕生搗極爛罨之並敷傷折

箭鏃傷 陳臘肉去皮骨搗爛 入象牙人指甲各二錢爲末須極細拌肉內厚敷週圍即如銳子打入肉以銀鑵入傷處其鉛自化仍從傷處隨水銀出神效

仙方不可忽視

踢傷 或手足或面及擦破皮肉 冬青葉同醋煮數沸略滴麻油少許取葉換貼自愈

箭頭入肉 鉗之不出 解骨九蜣螂研雄黃研象牙末各等分和勻蜜丸黍米大納傷口處外用羊腎脂細嚼貼之覺癢忽之極癢箭頭漸冒撼動拔出即以人尿洗之貼以生肌好膏藥日換貼之傷口自斂或單以象牙刮末水和敷之即出

中毒箭 交廣夷人用燋銅作箭鏃甚毒人若中之纔傷皮肉便悶臚沸爛而死 急飲金汁外亦用金汁抹之若無金汁速灌人糞並外敷之非此不能解也

中射茵 亦出交廣人若中之甚毒 急用葛氏方用藍靛汁一碗灌之外亦仍塗抹傷處

一方 用大豆並猪羊血內服外敷解毒亦效

箭鏃不出 搗鼠肝塗之或鼠腦搗爛厚厚塗之即出荆棘竹木入肉並塗治之

一方 用巴豆仁半個略熬與蜣螂一個同研塗之須臾痛定微癢忍之待極癢不可忍便搖動拔出以黃連貫衆熬湯洗之石灰末敷之或生肌散敷亦妙

一方 白蔹丹皮半夏等分爲末酒服

中毒箭 煮藕汁時時飲之以愈爲度

一方 以山獺骨研末以少許敷之

金瘡 採鮮劉寄奴草搗爛敷之立愈

一方　急以自己小便淋患處口渴切不可飲水但食肥膩之物解渴若食薄粥則血沸而出必死

一方出血　五棓子降眞香等分炒末敷之皮肉自痊捷效

一方出血　龍骨煆二錢白礬半生半枯一兩五棓子半生半焙二兩乳香沒藥各三錢無名異一兩爲末乾摻不作膿不怕風立時止血定痛生肌如神

鐵針入肉針入肉中無眼者不動有眼者隨氣遊走若走向心窩胸腫者險　急用烏鴉翎數根炙焦黃色研細末酒調服一錢或二錢或醋調俱可外用神聖膏車脂輦油不拘多少研如膏調磁石末攤紙上如錢許貼之每日二換但患一二日者方可用之

諸鐵及雜物入肉　以象牙刮屑和水敷之如骨刺入肉以水煮白梅肉和象牙末調塗其骨自軟矣

諸刺入肉軟淺者以針撥如硬深者當以蝼蛄搗塗之少時即出刺出仍痛再塗之即愈

惡刺瘡痛　李葉裹葉搗汁點之甚妙

蛇骨刺入肉（痛甚者）　用死鼠燒灰敷之

惡刺入肉　雄狐屎燒灰和臘月猪脂封之

惡刺入眼　取螬糟搗爛塗之

竹刺入肉　多年薰肉切片包裹之卽出

一方（或竹或木）　以烏雄雞肉生搗塗之卽出

一方　鹿角末燒灰爲末水和塗之久者不過一夕立出

針刺入肉　萇麻子搗爛敷之頻看刺出卽去藥恐咎出好肉也

諸刺入肉　烏梅嚼爛罨之卽出

竹木刺入肉　鮮牛膝搗爛罨之卽出縱瘡口已合刺猶自出

鐵針誤入咽喉（無藥可施者）　用舊箬籬煆存性研末每服三錢黃酒調服則針自化

一方　用飴糖一觔食盡自出

諸物刺喉中　以象齒磨水服之立出舊梳屑亦可
誤吞銅錢或鐵釘諸骨金銀　不能轉送覺墜者多食青菜
猪脂或羊脂自然送入大腸與糞同出甚效
一方　鐵針　以蠶豆二合煮熟同韭菜食之自然大便而出
一方　野苧麻根搗爛或含口中嚥汁其針自化
一方　金銀銅鐵等項腹中作痛　以櫟柴炭燒紅急爲末煎湯服之甚者刮末三錢井水調服未效再服亦治中水銀輕粉毒
一方　銅及鐵　羊脛骨燒灰爲末米飲下三錢諸骨骾咽並服之
骨骾咽喉由嚥物急遽致骾妨碍飲食吐嚥刺痛宜急治之不可妄服凉藥若骨勢大者與飲食難下餓倒胃氣者俱屬難救　魚骨骾者急用河中養蓄活鴨倒掛垂涎以磁碗接下令患人仰臥頻灌其骨盡化若咽喉腫痛潰膿宜用冰硼散吹之
一方　獸骨硬者用狗一隻倒掛接涎如前法頻灌

其骨盡化若腫潰者亦用冰硼散吹之俱極效

一方魚骨骾　取新汲水一盂令口向水張口取水氣骨當自下

一方諸骨　磁石火煅醋淬陳橘紅焙以多年酸漿水脚炒等分爲末另以漿水脚和丸芡子大每含嚥一丸

一方諸骨　七月七日取絲瓜根陰乾燒存性遇症每服二錢以原骨物煮湯服之

一方魚骨　鯉魚皮燒灰卽六七日不出者日二服卽效

一方魚骨　水老鴉嗉吞之或以羽燒灰水服五分

一方魚骨卽數分　水老鴉骨燒灰水服卽下或以鴉屎研水服方寸匕并以水和塗喉外卽化

一方獸骨卽數分　虎骨爲末水服方寸匕或象牙磨水吞之

一方獸骨　鹿角爲末含嚥津卽愈

一方魚骨　以水獺燒灰酒調服之或以獺骨含口中

即下或以獺足煮汁服并以爪爬喉即潛消俱神妙

一方　青果嚼汁嚥之

一方魚骾或食鮪成積及河豚魚毒　橄欖核磨汁服之自消用欖肉汁更妙

一方諸骨　以白雄雞足一隻燒灰水服

一方魚骨　默調鸕鷀不已便下

一方魚骾及魚骨入肉不出痛甚者以　翠鳥肉燒灰研末飲之或煮汁亦佳

一方諸骨　以白雄雞左右翮大毛各一枚燒灰水服

一方諸骨　海螵蛸陳橘紅炒等分爲末寒食麪和飴糖丸芡子大每用一丸含化嚥下

一方魚骨　白鴨脛內黃皮炙研末水服一錢即愈取其消導也

一方諸骨　玉簪花爲末無花用根取汁好醋調服不可犯牙犯之即落

一方 魚骨 以大蒜納鼻中卽出

一方 諸骨及竹木刺喉 以酒化鯇魚胆二枚 卽浙湖林坪所蓄草魚 温呷取吐卽愈

一方 諸鳥獸骨骾 鵰鳥屎燒灰酒服方寸匕 卽敷分 卽下

一方 諸骨及竹木刺喉 收鰐魚胆懸北簷下令乾每用一皂子大煎酒温呷則骨物隨涎而出更服以吐爲度隨量飲之無不出者鱷鯽胆皆治之

一方 一切物骾 生鱓魚線縛其頭以尾先入鍋煮食之

立出

一方 魚骨 鯉魚脊三十六鱗焙研凉水服之其刺自跳出神效筆峰雜興方諸魚鱗燒灰服之亦效極便方也

一方 諸骨 鳳仙花子二十粒白滾水吞服卽下

一方 諸骨 縮砂草果威靈仙清水砂糖共配煎接連服下二三碗諸般骨骾化爲涎古仙方

一方 竹木骨骾 草麻子一兩凝水石二兩研勻以一捻

置舌根噙嚥自然不見

一方 雞魚骨 苧麻根搗如泥作龍眼樣雞骨雞湯下

魚骨魚湯下

一方 諸骨 以硼砂含之嚥汁自下鹹能軟堅也

一方 諸骨 楮實子煎湯飲之楮實能以軟骨

誤吞頭髮繞喉 即以自己亂髮燒灰白湯調下一錢即愈髮灰須去盡渣為要 即數分

食骾 鷹屎燒灰水服方寸匕

桃李骾咽 白犬骨煮湯摩頂上即消

穀賊咽喉即穀芒也 以鵝涎灌之即愈或鴨涎和粳米嚥下亦妙

杖瘡腫痛 小鼠同桑椹子入麻油中浸釀臨時取塗甚效

一方及打損傷瘡風襲作痛者 白馬屎炒熱包熨五十遍極妙

一方肺損者 白茭為末米飲日服取效

一方 元粉一兩赤石脂一兩水銀一分共為末敷

之神效

一方 久爛中有四五分深澤不能收口用此方摻之數日即愈 血竭一錢硃丹輕粉各二錢白古一錢爲末摻之一日夜其肉四圍生起兩日即平

一方 杖後即飲童便一碗以免血上攻心再用熱豆腐鋪在杖傷處其氣如蒸其腐即紫復易之令紫色散盡轉淡紅色爲度若杖瘡腫痛用雄黃二分陀僧一分研水調敷極妙

夾棍傷 大黃白蠟各四兩松香乳香各二兩沒藥骨碎補各一兩續斷五錢麝香二錢當歸敗龜板各三兩各爲細末猪板油三兩將白蠟松香乳末置銅鍋內同猪油化開再將各藥入油攪勻爲膏貼之第二日即可行走

一方出署即宜治之 急用熱童便一盆將足浸之如便冷燒紅磚二塊淬之即熱直至童便面上浮起白油其傷盡出矣不痛不潰再用肥皂搗如泥入雞子

清和勻罨患處以草紙包裹脚縛緊一夜不可動即效內用牛膝末調酒服或用歸尾川芎乳香獨活壁虱胡麻骨碎補紅花加皮各一錢生白酒一壺煎數沸盡量飲之避風寒厚被出汗立愈如骨傷加土鱉一枚

杖瘡　未杖先服三七一二錢則血不衝心杖後仍以三七敷之能去瘀消腫易愈

破傷風　由破傷中肉風邪襲入經絡初起先發寒熱牙關緊急[illegible]則身如角弓反張之狀口吐涎沫四肢抽搐無有寧時不省人事瘡口銹澁是症最宜早治有風　在表在裏或半表裏之分當知汗下和三法審定用藥則不患有誤也如　邪在表者其人寒熱拘急口噤咬牙用千里奔散用遠行路騾蹄心陰陽瓦煆存性研細每服三錢熱黃酒冲服次用蜈蚣星風散蜈蚣二條江鰾三錢南星防風各二錢或各二錢五分研細末每二錢黃酒調服日二服追盡臭汗自愈

一方　邪在裏者則驚而抽搐臟腑秘澁宜江鰾九天麻雄黃各一錢蜈蚣二條江鰾殭蠶炒野鴿糞炒各五分

共研細末分兩分一分飯丸如桐子大硃砂爲衣一分加巴豆霜二分五釐飯丸如桐子大每硃砂藥二十丸加巴豆藥一丸二服加二丸白滾水送下至便利爲度再服硃砂藥病愈卽止

一方　邪在半表半裏頭汗多出而身無汗者不可發汗宜榆丁散

防風地榆紫花地丁馬齒莧各五錢共研細末每服三錢温米湯調下以和解如頭身俱無汗者則宜羌活湯表之方見諸書

一方身汗不止二便秘赤　天苓黃湯黃芩羌活大黃各二錢川芎一錢水煎服以微利爲度凡是症不論表裏半表半裏初起一二日間外治之法俱宜以灸法灸之令汗出其風邪方解若日數已多則禁灸之宜以羊尾油煮微熱絹包乘熱熨破處數換拔盡風邪未盡者次日再熨兼用漱口水洗之日敷玉眞散白附子南星白芷天麻羌活防風各一兩共研細末唾津調濃敷傷處如破傷風初起角弓反

張牙關緊急每用三錢熱童便調服立奏功效

一方先表太過臟腑雖和而自汗不止者　防風當歸湯防風當歸川芎生地各二錢五分水煎服

一方發表之後表熱不止者　小芎黃湯川芎三錢黃芩二錢生甘草五分水煎服奇效

一方潰後風侵手戰搖不已者　硃砂指甲散人手足指甲燒存性六錢硃砂南星獨活各二錢共研細末每熱黃酒調下四錢速效

一方邪在表者　糞堆內蠐螬蟲三枚舊草房上草內者亦可　將蟲脊背捉住捏之口吐黃水搽於瘡上覺麻身上汗出爲驗如病危急急滴蟲水於熱酒中飲之取汗即愈甚效

一方　烏魚頭風乾愈久愈妙臨用時以陰陽瓦焙乾存性爲極細末酒冲服立愈

一方攣搐不已　魚膠燒存性一兩麝香少許爲末每服二錢蘇木煎酒調下仍煮蘇木封口

一方 抽搐者 紅魚膠五錢炒焦蜈蚣一對炙研爲末以防風羌活川芎等分煎湯調服一錢

一方 速令婦人取無根水一盞即新汲水也入百草霜調捏作餅敷患處三五換神效

一方 寒熱垂死 蟬蛻四兩燒灰熱水調服即愈

一方 傷濕發痛强直如痫及撲跌打傷金刃傷皆治 南星防風等分爲末水調敷之水出爲妙仍以温酒調一錢已死心上温者熱童便調灌二錢

一方 全蝎蚕七釐小人三釐糯米炒焦一分三釐以上二味共爲末黄酒冲服即愈大能起死回生

一方 頭腫如斗或垂死者 鴿糞尖炒三錢白麥麪炒一兩天麻不拘分兩燒存性爲細末好黄酒調灌之立生

一方 用手足十指甲香油炒黄爲末黄酒冲服汗出即愈眞奇方也

一方 雄黄白芷等分爲末酒煎灌下即愈

湯燙火燒 好肉暴傷皮膚疼痛外起燎泡即挑出毒水使毒就輕傷輕易治重則防火毒熱氣

攻裏令人煩燥作嘔便秘甚則神昏悶絕始終禁用冷水及井泥浸塌傷處則不致轉成險逆之症

初起時即用冷燒酒一鍾於無意中望患者胸前

一方 不論蠟燭油猪油牛油羊油隨用一樣要整塊共敷之三日即愈并無疤痕百方均又及此真簡便神妙也

鮑雲鶴傳方

清汁一碗加香油一碗以筯頭攪數百轉令其稠黏如糊用雞翎掃患處以解毒止痛並不致臭爛次以鸎粟膏即鸎粟花十五朵無花以葉代之香油四兩將花煠枯濾淨入白蠟三錢溶化傾盆內待將凝時入輕粉二錢攪勻炖水中令冷取出臨用時用抿脚挑膏手心中捺化搽上綿紙蓋好日換二次自然痛止膿生次日用軟帛挹淨腐皮再搽之時換生肌藥貼自愈第一要方

一方 以炭末入香油調塗立愈

一方 小麥炒黑研入膩粉油調塗之勿犯冷水

一方 饅頭餅燒存性研末油調遍敷之

攻裏令人煩燥作嘔便秘甚則神昏悶絕始終禁用冷水及井泥浸塌傷處則不致轉成險逆之症

初起時即用冷燒酒一鍾於無意中望患者胸前一潑被吃一驚其氣必一吸一呵則內之熱毒隨呵而出矣如仍作煩者以新童便灌之外用清涼膏用水潑開石灰末一升加水四碗攪渾澄清取清汁一碗加香油一碗以筋頭攪數百轉令其稠黏如糊用雞翎掃患處以解毒止痛並不致臭爛次以罌粟膏即罌粟花十五朵無花以葉代之香油四兩將花煠枯濾淨入白蠟三錢溶化傾盆內待將凝時入輕粉二錢攪勻炖水中令冷取出臨用時用抿脚挑膏手心中捺化搽上綿紙蓋好日換二次自然痛止膿生次日用軟帛揩淨腐皮再搽之時換生肌藥貼自愈第一要方

一方　以炭末入香油調塗立愈

一方　小麥炒黑研入臘粉油調塗之勿犯冷水

一方　饅頭餅燒存性研末油調遍敷之

一方 以醋淋洗并以醋泥塗之甚妙且免疤痕

一方 以葵花葉搗碎敷之

一方 絲瓜葉焙研入辰砂一錢蜜調搽之生者搗敷一日卽好

一方 鰂魚蒸出油以油瓶盛埋土中遇症塗之良

一方 及跌傷出血 海螵蛸研末敷之

一方 蛤粉油調塗之

一方 已成瘡者 多年乾小白螺螄殼煆研細油調敷之

一方 猪胆調黃柏末敷之

一方 母猪毛燒灰和麻油調塗留竅出頭則無痕或加輕粉硼砂各少許

方 虎骨炙焦研末敷之或濕牛屎搗塗並妙

一方 牛皮膠水煎如糊冷掃患上卽愈

一方 鹿角膠水煎稠待冷塗之

一方 小鼠泥包燒研末菜油調塗

一方 死鼠頭以臘月猪脂煎令消盡敷且不作瘢

一方　老王瓜每個順劈兩瓣去子生大黃切片用瓦罐一個內裝王瓜一層加大黃一層以罐之大小裝滿爲度封收數月其瓜如醬臨症取塗痛隨止患卽愈速驗便方

一方　用磁瓶貯麻油採單瓣秋葵花浸油中年年採添瓶內花多添油泡之愈久愈妙臨症敷之刻見功効

一方　急搗蘿蔔汁或童便服之外用槐花炒研末油調敷立時止痛或爛用茶末敷如爛見骨者百花霜三錢輕粉一錢五分爲末麻油調搽神效如遍身燒爛者服童便後隨用好酒一二甕入浴缸內令患者浸酒中極重者亦不致死

一方　劉寄奴爲細末用桐油或菜油調敷其泡立消痛卽止頃刻結靨神驗

一方　圓眼殼燒灰爲末桐油調塗一二次卽愈

一方　犬骨煅成灰爲細末麻油調敷立愈

一方　鐵銹花磨水塗之立愈

一方　白芨末油調敷之

一方　生大黃和醋搗調敷止痛無痕

一方　蓖子音斗和蜜搗敷立效

一方　急以鹽末摻之可以護肉不壞再用藥敷良

一方　側柏葉搗爛水調塗立愈

一方　山茶花麻油調末塗之

一方　以好雪梨切片貼之

砲震手掌患腫者　即以自己熱肉熨之頓飯時即愈

火燒成瘡　免腹下毛貼之候毛落即痊

凍瘡由觸犯嚴寒之氣傷及皮肉着凍以致氣血凝結肌肉硬腫瘡木不知痛癢　即於着凍處墊衣揉搓令氣血流動次用涼水頻洗覺熱殭木處遍活如故則已揉搓二三次自愈

一方日久凍殭疙瘩不散者　用冰一塊絹包溺之以殭疙瘩化盡爲度二方乃從治之法也

一方或因暴凍即着熱或進煖屋或用火烘湯泡以致肉死損形輕則潰爛重則骨脫筋連者宜

急剪去筋　否則浸淫好肉初治宜養榮湯方見諸書加酯酒服之潰爛者外用潰瘍諸方治之

一方經年不愈者　獨勝膏六月初六十六二十六日用獨頭蒜杵爛日中晒熱塗之卽於日中晒乾息見水

一方足上者　以醋洗足研藕敷之

一方足上者　茄根連枯莖及葉煎湯洗之如潰爛燒灰敷之

一方耳上者　生薑自然汁熬膏塗之

一方手足凍者　老絲瓜燒存性和臘猪油調敷之

一方手足凍者　蟹殼燒存性蜜和塗之

一方足上者　鵝掌黃皮焙乾研末油調塗之或鴨腦塗之

一方　野雞腦子塗之

一方作癢者　啖猪肉嚼塗之

一方手足凍者　橄欖核燒研油調塗之

一方 足凍裂坼 蒸熟藕搗爛塗之

一方 鴿糞煎水洗之自愈

一方 手足凍裂 鮮桂花一碗猪脂半觔同入碗內飯上蒸化貯罐內冬日搽之甚妙

一方 五棓子猪油搗成膏塡入裂處如耳凍用薑汁煎塗脚跟凍茄根煎湯洗之凍坼者以油臙脂烘熱敷之立效

一方 黃柏炙末耳凍酒炙足凍鹽炙乳調塗之

一方 陀僧爲末熟桐油調敷

一方 耳上者 白蔹爲末同黃柏末油調塗之

預防凍瘡 於未至嚴寒時常用燒酒擦手臉烤乾即不凍

人齕傷 人之牙齒食用炙煿之物漸潰有毒初齕一受其傷則腫痛臭爛異於尋常

時用童便浸傷處洗之去牙黃汚血貼蟾酥餅以萬應膏蓋之出微膿即愈若失治則爛痛發腫仍用童便浸洗次用麻油紙撚點火於患處熏之良

久插蟾酥條如傷口大作餅罨之萬應膏蓋之俟腫消時用葱白二兩甘草五錢水煎日洗一次換生肌藥敷之上以萬應膏蓋之口自收矣

一方　隨於潰後即用童便洗之大黃塗之或浸指在內如腫潰時以人中黃熬湯時洗較諸治法尤覺神妙

一方　潰爛者　龜板骨鱉肚骨各一片燒研油調塗之

一方　急噙生白果塗之

熊虎及狼牙爪傷人　皮肉成瘡者　初以葛根濃煎服一二鍾外洗日十度或煮生鐵有味者洗之又用青布急捲爲繩撚着納竹筒中注瘡口熏之出毒水次宜獨窠栗子生嚼塗瘡口極效

虎傷成瘡　但飲酒常令大醉當吐毛出而愈

一方　內服生姜汁外仍以汁洗之用白礬末敷之

虎狼傷人　以乾薑末敷之

一方　虎爪傷　刺猬脂日日敷之內服香油自愈

虎傷成瘡　螃蟧搗爛塗之

虎咬傷　搗青松汁數斗頻頻飲之以渣敷咬傷處

頻易取效

馬咬傷　用栗子嚼爛敷之如毒氣入裏心煩嘔悶

馬齒莧煎湯飲之即效外用馬鞭子梢手及鞭穗

煆灰存性研末猪脂搗合貼之俱效

一方　白馬屎和猪脂塗之

一方　毒氣入裏心煩嘔悶及諸瘡腫痛作熱者　鼠屎二七枚故馬鞭稍五寸同燒存性研末猪脂調敷奇驗

一方　及踏傷　急取童便

敷之旬日即愈

一方　及剝驢馬被傷者

瘋犬齧傷　犬因五傷必致傷人九死一生之症也　而成瘋犬一經齧　初被齧時急就齧處刺令出血以口含漿水吮洗傷處並看患者頂心有紅髮一根速宜拔去自無患矣

一方　初被齧時即用砂燒酒壺兩個盛多半壺燒

酒先以一壺上火令滾無聲傾去酒即按在瘡口拔出污黑血水滿則自落再以次壺仍按瘡口輪流提拔以盡爲度其症立愈並拔去頭頂紅髮

一方 被毆時即以人尿洗之拭乾隨用核桃殼半邊以人糞填滿罨患處着艾灸之殼焦糞乾再易灸至百壯以玉眞散方見破傷風 唾津調敷次日再灸漸灸至三五百壯爲度於初灸時須急服扶危散

蟾蜍去翅足加糯米同炒去米按日數用之如被毆已竟七日用七個十日用十個滑石水飛一兩雄黃一錢麝香二分共研細末每服一錢温酒調下不飲酒者米湯下使惡物血片逐從小水中出即愈並拔去紅髮

一方 被傷後毒物血片堵塞壅中致小水滯澁若淋者 用琥珀碧玉散滑石六兩甘草一兩琥珀五錢青黛八分共研細末每服三錢燈心煎湯調下則惡毒盡從小水中出矣並拔去紅髮爲妙

一方 被毆時即用豆豉研末香油調稠丸如彈子

大常揩拭傷處摺開看豉丸內並有狗毛茸茸然此係毒氣已出易丸再揩至無茸毛方止甚效並拔去紅髮是症始終禁忌必當愼重終身忌食狗肉及蠶蛹赤豆百日內忌見麻物忌飲酒三年內忌食一切毒物及房事可常食杏仁以防其毒自無他患

一方 傷後治遲其毒入心煩亂腹脹口吐血沫者 用虎頭骨虎牙及脛骨爲末酒調二錢服之若發狂叫喚其聲似犬眼神露白屬逆不治

一方 及湯火傷未成瘡者急以 豆醬塗之頻頻取驗

一方 乾薑末水調二匙生薑汁服亦良並以薑汁熱熨之

一方 取本犬腦髓敷之後不復發或以犬肝並心腎搗塗之

一方 狼牙刮末水調服神效

一方 鼠屎二升燒灰以沙糖和敷奇驗

一方急於無風處揑去惡毒孔乾者用針刺之鹽湯洗淨搗葱貼上包好不可着風並急將頂上紅髮拔去以糯米一撮番木鱉半個切碎蟹蝥七個去翅足若過一日加一個過兩日加兩個炒黃去蟹蝥將糯米木鱉研末酒調服禁忌如前如服後腹內仍有犬聲再用木鱉一個蟹蝥二十個如前泡製以黃連二錢甘草二錢煎服解之是症若至三月內誤聞鑼鼓聲復發難治矣大約七日一發若三七不發則可全免倘以疼止瘡合即謂已全而不治者多死此藥服愈後復發乃垂危之極候也急以雄黃五錢當門眞麝一分共研細酒調服之或可起死回生也

一方雄黃五分麝香二分半蟹蝥七個去頭足同糯米炒用水酒煎空心熱服必俟腹疼便出惡物方愈如腹疼不止用甘草八分同鮮肉煎湯服之即止

一方蟹蝥七個去頭足以糯米炒杏仁七粒去皮尖雄黃白芷各八分共爲細末黃酒送下毒從小便出即愈

一方利下之藥服後腹痛者以靛青或黃連水服之即解

惡犬齕傷　先以人尿洗淨傷毒隨以熱牛屎封之即時痛止

一方　青草鵝糞搽之即愈

一方　刮肉店墩板上油膩炒沙糖敷之

貓咬傷　薄荷汁塗之立效

一方　雄鼠屎燒灰油和敷之

馬汗入瘡　症係潰瘡未合誤入馬汗之毒以致瘡口四旁忽復焮痛紫腫　急宜砭腫處令出紫血以烏梅嚼爛塗之若腫悶發熱則宜防毒入腹以致不救急用醋酒煎馬齒莧飲之盡醉為效但莧性寬滑凡瘡潰未合氣血未復而又受以汗毒必量人壯弱用一兩或五錢切勿太過

驢涎入瘡　是症與中馬汗同毒　宜用冬瓜片下青皮晒乾研末敷之熬湯洗之毒甚者亦用馬齒莧酒飲之

馬汗入瘡　或馬毛入瘡　隨以新汲水浸之頻易水仍飲好酒立愈

一方　白馬頭骨燒灰敷之出白汁即愈

一方毒氣攻心欲死者　粟榦燒灰淋汁浸洗以瘡出白汁爲效

剝馬中毒或被骨刺破垂危　以馬腸中粟屎搗敷並用屎洗之或後以粟屎飲之速效

猪齩傷瘡　龜板燒灰研末香油調搽

蛇齩傷　即時飲好醋一二碗使氣不隨血走以繩紮傷處兩頭若昏困用五靈脂五錢雄黃二錢五

毒蛇蜈蚣蠍子百項毒蟲咬傷極辣臭早烟吐敷之毒攻心者服之有起死回生之功千方百方不及此

雲谿氏添註

一方　白扁豆花搗爛敷之立效或搗蒜敷之或苦茶亦可毒蟲沙蝨咬傷亦敷

一方　以酥油和血塗之

一方及蜘蛛蜂螫瘡毒　暖酒淋洗日三次即愈

一方　白馬頭骨燒灰敷之出白汁即愈

一方　毒氣攻心欲死者　粟殼燒灰淋汁浸洗以瘡出白汁爲效

刺馬中毒或被骨刺破垂危　以馬腸中粟屎搗敷並用屎洗之或後以粟屎飲之速效

猪齧傷瘡　龜板燒灰研末香油調搽

蛇齧傷　即時飲好醋一二碗使氣不隨血走以繩紮傷處兩頭若昏困用五靈脂五錢雄黃二錢五分共爲末酒調二錢灌之少時齧處出黃水水盡則腫消以雄黃末摻之口合而愈

一方　以兩刀於水中相摩飲其汁自愈

一方　以猪槽中水浸洗之

一方　白扁豆花搗爛敷之立效或搗蒜敷之或苦茶亦可毒蟲沙蝨咬傷亦敷

一方　以酥油和血塗之

一方　及蜘蛛蜂螫瘡毒　暖酒淋洗日三次即愈

一方及蟲咬傷　魚腥草搥面草烟葉草決明等分杵爛敷之神效

一方蛇蝮毒　蕨根燒灰油調敷之

一方腹蛇傷　生薑末敷乾再易敷卽愈

一方及蝤蛑　乾薑雄黃等分爲末盛袋佩之遇有傷者卽敷之便定

一方久潰不斂者　小茴搗末敷之

一方及蟲咬並瘡腫毒痛及署毒箭等傷　以鹽研芋葉爲末敷之

一方及蟲咬傷　蒼鵝屎汁敷之

一方　鸚鳥嘴燒存性爲末一半酒服一半塗之

一方　烏牛或黑牛耳垢敷之

一方或狗咬　以猪耳垢塗之

一方及中牛肉毒　猪齒燒灰水服一錢或野猪齒亦可

一方　蒲公英搗爛貼之卽愈

一方　野鼠屎燒灰油和敷之

一方　以田鼠屎研末猪油調塗

一方　勒薺葉搗爛敷之

一方　烟管燒熱滴油搽之百試百效或用泥蛤蚧搗爛敷之即瘥

一方赤練蛇咬　先用活雞刀割一塊貼患處換貼二三塊自愈

一方　白芷末一兩水服下死者立生

一方爛入骨者　白芷末加胆礬麝香少許日日摻之

一方　穿山甲木香各一錢五分爲末酒送下

一方　全蝎二個研蜈蚣一條炙研末酒下即愈此捕蛇師傳

一方　細辛白芷各五錢紅黃五分爲末每服一錢酒下即效

一方　貝母三錢爲末酒調盡量飲醉須臾酒從傷處化水而出候水流盡隨將貝母渣敷之即重亦可回生

一方　雞蛋三枚敲破蛋頭合在患處聽蛋內有聲

變黑色再用一個合俟蛋內色變黃白不甚黑再
一蛋合之自愈不疼奚極妙良方

一方　木香不拘多少水煎服效不可述

一方　天南星爲末水調箍之

蛇入七竅　割母猪尾血滴入即出

蜈蚣齩傷　取雄雞倒控少時以手蘸雞內口涎沫
搽傷處其痛立止甚者生雞血熱飲之立效

一方及蜘蛛咬　醋磨生鐵敷之

一方　白鴈皮貼之

一方　以陽溝泥搽之或燈草燒灰搽之

一方　烏骨白毛雞屎白醋和塗之並治蚯蚓毒

一方及蟲蟻入耳　炙猪脂入耳掩少時自出

一方　以大蜘蛛一個對瘡待蜘蛛收盡毒氣即愈
蜘蛛仍放水中毒亦解出即放之若中其毒以桑
汁鹽蒜塗之神效

一方　以蚰蜒塗上即止

一方及蠍螫　白礬生半夏各等分好醋調和敷之疼即止毒即出而愈或爲錠子磨敷亦可

一方及蠍螫以下方八方並治蠍螫　燒鐵刀頭令赤置白礬於刀頭上化汁乘熱將礬汁滴於傷處立瘥

一方　用手指探入雞喉內取涎塗之立愈或將雞嘴對傷處吸之吸盡其毒雞自去亦效

一方　雞子一個輕敲一小孔合傷處立瘥

一方　用木梳齒內垢燈上燒油滴傷處立愈

一方　用人頭垢封傷甚驗

一方　用雞冠血塗之立止疼痛

一方　細嚼香附塗之立效

一方　五靈脂三錢炒令烟盡蒲黃炒二錢各爲末醋調塗之立愈

蜈蚣入腹　猪血灌之或飽食少頃即食桐油當吐出即愈

誤食蜈蚣　生雞蛋數枚取清傾碗中令吃之良久

索生油嚥之須臾大吐蛋清纏蜈蚣而出絕妙方

蠍螯　取大蝸牛一個搗爛塗之其痛立止一時不得即將螯處擠出毒水急用膏藥烤開熱貼之

一方　以新汲水浸青布冷敷之煖即易自愈

一方　先急飲清醋一二碗令毒不散隨用醋磨附子汁敷之

一方　海螵蛸一錢同白礬末二分吹鼻右吹左左吹右神驗

一方　黑驢耳垢塗之

一方　臘月收貓屎臨症水研塗之三五次即瘥

一方　苦李仁嚼爛塗之

一方　雄者螯人痛在一處雌者痛牽遍身　用井底泥敷之乾再易敷即愈

蠶齧　苧根搗汁塗之即愈

一方　咸瘡者　蜜調麝香敷之

一方　或蟲及蜘蛛咬傷　野灰藿菜搗爛和油敷之牆樹下

生者不可用

射工傷射工即樹間雜毛蟲又名瓦剌人觸着則能放毛射人初癢次痛勢如火燎久則外癢內痛骨肉皆爛諸藥罔效用豆豉清油搗敷之少時則毛出可見去豆豉用白芷煎湯洗之如肉已爛用海螵蛸末摻之即愈

一方以猪血飲之即解

蚯蚓傷即受蚯蚓之毒也有令人眉髯皆落狀如大麻風更異至夜蚓鳴於體中也用鹽湯頻頻洗之其毒自出

一方白鴨熱血塗之即愈或白鴨屎和雞子清調塗之更妙

天蛇瘡即草中花蜘蛛螫傷復被露水所侵而致其症生於肌膚似癩非癩以秦艽煎湯徐徐飲之外敷拔毒藥甚效

一方炮薑切片貼之

一方渾身生絲者牛乳常飲之自愈或以羊乳數碗飲之即時可解

一方黑驢尿下泥敷之

一方　大藍汁一碗入雄黃麝香少許點患處仍服其汁神異之極卽至頭面腫痛垂危者兩日可愈

蟢蛛傷　其蟲咬人亦有致死者　以桑柴灰煎取汁調白礬末敷之極效

蠷螋瘡　一名多足蟲藏於壁間以尿射人若誤中其毒令人皮膚起燎漿水泡痛如火烙初如飯粒次如豆大急宜　用鹽湯綿撮瘡上數換卽消甚者則毒延及遍身瘡癢無度宜二味拔毒散明雄白礬各等分爲末用茶清調化鵝翎蘸掃患處癢痛自止甚效

一方　醋和胡粉封之

一方　鹿角燒末苦酒調服

一方　烏雞翎燒灰雞子清調敷

蜂螫傷　新芋梗破開擦之

一方　蟹殼燒存性研末蜜湯調塗

一方　牛角胎燒灰醋和敷之或牛屎燒灰苦酒和敷亦妙

一方以酥油塗之

一方黃蜂蟄　蚯蚓糞渣敷之

一方小便洗淨拭乾用香油搽之或雄黃末或蜂房末搽之俱效

鐵胡蜂蟄　取芋艿莖子磨汁搽患處即愈

鼠咬瘡痛　貓頭燒灰油調敷之以瘡爲度或以貓毛燒灰入麝香少許唾和封之貓鬚亦可或貓屎搽之俱有神效

一方鼷鼠咬者　野貓脂摩之

一方　螫蝥燒灰麝香少許津唾調塗或抹貓尿極效

水弩射入　熊胆塗之更以雄黃同酒磨服即愈

諸蟲咬傷　生芝麻嚼塗即愈並塗小兒頭面諸瘡

狼烟入口　用醋少許飲之即解

蝎牛咬傷毒行遍身者　青蘘子煎水洗之立愈不可近陰

壁虎咬傷　以清水淋壁上取水注傷處自愈

諸蟲咬傷　薑汁先洗隨用二味拔毒散塗之方見蠍螻傷

抓癢傷水腫痛難忍者　用耳垢封之一夕水盡出全愈

百蟲入耳如蠅蚊小蟲之類　以麻油數點滴入耳中蟲即死取出即癒

一方如蚰蜒等物　以肉炙香置於耳旁蟲聞香氣自出

一方如在夜間暗入者　切勿驚惶喧叫逼蟲內攻宜端坐點燈光向耳竅其蟲見光自出若使有人其蟲不出人皆旁避方效

一方飛鵝蝨蚊　滴豆醬清少許於耳中即可取蟲出

一方諸蟲　貓尿灌少許即出取貓尿法用蒜半個搽鼻即溺

一方百節蚰蜒或蚊蟲　以醋注入起行即出

一方諸蟲　薑汁少許滴耳中自出

一方諸蟲　萵苣搗汁滴入自出

一方諸蟲 五月五日取黃蟬頭燒灰研末臨用綿裹塞之立出

一方蚰蜒 商苣葉乾者一分雄黃一分爲末糊丸如棗核大蘸生油塞耳中引出

一方諸蟲 取丹雄雞冠血滴入卽出

一方蚰蜒 生油調雞心血滴入卽出

一方蚰蜒 以白羊乳滴入卽化爲水

一方蚰蜒 以牛乳少許滴入卽出若入腹者飲乳一二升卽化爲水

一方蚰蜒及飛蟲 黑驢乳滴少許卽化爲水

一方諸小蟲 韭菜汁滴少許卽死取出

一方諸蟲 胆礬和醋灌入卽出

一方諸蟲 鱔魚頭燒灰研末綿裹塞之卽出

天絲入咽 凡露地飲食有飛絲入口食之令人咽喉生瘡 急以白礬巴豆燒灰吹入卽愈

中百藥毒 甘草菉豆水煎俟凉時服之卽解並解

一切食物牛馬金石等毒

一方 服藥過多生出毒病頭腫如斗唇裂流血或心口飽悶或臍腹作痛者 黑小豆菜豆各半升煮汁飲並食豆寬愈

一方 附子川烏天雄蟾蜍毒 馬料豆煎汁服之

一方 皂礬毒 急取麪糊一缽服之

一方 相反藥毒 蠶退紙燒灰細研一錢冷水調下頻服取效爲度

一方 砒硫及金銀丹石毒 菜豆粉細篩四兩黃泥篩四兩生雞清九枚共一處以浸豆水和卽解若有黑羊血用以吞之更妙凡服砒者不可仰臥恐毒流四肢難治愈後忌烟酒薑椒煎炒百日

一方 信石毒 速取樑間燕子窠用井水四大碗放水桶內將手攪調勻用夏布手巾如柞腐法篩去泥葉取所攪之水連灌二三碗自吐不吐再灌吐盡方醒

一方 斷腸草毒 雞抱卵孵開以清油調勻灌之或服生

雞蛋三四枚或服熱羊血碗許總以吐盡爲度方
醒也

一方鉛粉毒多因婦人打胎用之是物不惟不效每
至欲死不能求生不得且生子多癡呆身體多
瘡毒有誤服者急搗蘿蔔汁飲之

一方花椒毒口吐血沫身冷欲絕地漿水飲之卽解
掘得黃土有泉滲出謂之地漿水得黃土方可用
之中野芋毒同方

一方野蕈毒飲地漿水三四碗且解百毒

一方白果毒麝香一分煎湯服之

一方砒石或烏啄多飲新汲水得吐利卽解亦治蒙汗
藥毒

一方砒霜毒地漿法見花椒毒調鉛粉服之卽解

一方砒霜毒白扁豆生研新汲水絞汁飲之

一方藥物並一切魚肉果菜及諸菌熱毒煩悶者取新汲水入控黃土
坑內三尺爲度攪濁少頃取清水飲一升神妙

一方信石薜荔一錢爲末清水一盞調服

一方砒霜毒　豆醬汁調水服卽解

一方輕粉毒口破者　以三年陳豆醬化水頻漱之

一方及癲犬傷萵苣毒　生薑汁飲之卽解

一方菌毒發笑不止　苦茶白礬調新汲水嚥下無不立愈

一方諸藥毒　用玳瑁甲磨水飲之卽解

一方野葛毒　白鴨熱血三二點飲之已死者入咽卽活及中生金生銀及銅鐵錫五金並丹石砒霜或諸蟲毒或溺水死者灌之卽活

一方鍾乳毒下利不止　食生猪肉則愈

一方及丹石與酒毒發　牛肚中脆卽百葉肚也　同肝作羹以薑醋食之

一方菌毒嘔吐　鮮金銀花根葉生食之立效乾者亦可

一方砒石毒　冬青子樹葉根皮搗爛取汁洽水和飲三碗卽解

一方諸毒下利不止　炮乾薑炒黃連各等分研細每錢二錢涼水調服

一方 砒石毒欲死者 絲瓜根木槿葉研涼水吃二三碗立時卽解

一方 砒霜並一切毒藥垂死者 潔白白糖靛花淡豆豉生甘草各等分研勻冷水調灌立甦

一方 砒霜及疔腫 烏臼不拘根皮枝葉搗汁多飲得大利患自愈也虛人忌用

中一切有毒食物及誤食毒物並丹石毒發 如誤食宿食毒惡之物腹脹作霍亂 以鹽投生熟水中進二三升令吐盡

痰食卽愈

一方 食黃鱔魚犯荊芥或中菌毒以致煩亂垂危者 地漿水 取法見前花椒毒 飲之

一方 河豚毒消渴甚者 溺坑中水飲一小盞三度卽愈

一方 諸鳥肉毒 生白扁豆末冷水服之

一方 六畜肉毒 白扁豆燒存性研塗乃以水服之

一方 一切魚肉蔬菜葷毒 以豆醬清飲之並塗蛇蟲蜂螫

一方 豆腐毒 萊菔子煎湯入消導藥服之卽愈

一方雞子毒　飲醋少許即消

一方魚毒　以冬瓜汁飲之

一方魚毒煩亂或成癥疾　以魚鱗燒灰水服二錢

一方花椒毒　白雄雞毛燒烟一錢吸之並水調毛灰服之即解尾毛亦可

一方猪肝毒　生猪膏頓服一觔即愈並解牛肉毒及中惡

一方馬肝漏脯藥菜諸毒　猪骨燒爲末水服方寸匕日三服即數分

一方啖蛇中毒垂危　黃牛及水牛肚細切水一斗煮五升取汗即瘥

一方牛肉作脹及中牛肉毒　以聖蘆即牛腸胃中未化草也即數分煮汁服之或嚼之或用狼牙燒灰水服方寸匕即解

一方食牛肉致發心悶者　飲清酒即解濁酒則更加悶痛

一方雉毒吐瀉不止　犀角末用新汲水調方寸匕即瘥即數分

一方野鳥肉毒　野貓頭骨燒灰水調服即愈

一方馬肝毒　雄雞屎三七枚和水研服之或以人垢

取方寸匕（即數分）服之取吐即愈

一方蟹毒　生藕汁飲之即解

一方菌毒　以蓮房水煎服之即解

一方桐油毒　乾柿餅食之即解

一方食鱉誤同莧菜致腹中生子鱉　白馬尿一碗服之三服則子鱉皆化爲水

一方自死六畜肉毒　黃柏搗末飲服方寸匕（即數分）即解或壁上黃土二錢水調服或飲人乳一碗極效

一方宿肉漏脯毒　燒犬屎酒服方寸匕（即數分）或以人乳汁服之生韭汁亦可

一方黍米中藏乾脯或狸肉漏脯毒　大豆濃煎汁飲之亦治中菌野芋毒捷驗

一方馬肉毒欲死者　香豉二兩杏仁三兩同蒸一食頃杵爛服之日二服或煮蘆根飲之俱妙

一方食蛇并牛肉毒欲死者　飲人乳汁一升立愈或以米泔水洗頭飲一升即愈

一方牛肉毒　甘草一味煮汁飲之

一方食犬馬肉滯不消心下墜或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞下者　杏仁一升合皮蒸熟研爛用沸湯三升和勻取汁分三服利下兩三便大驗下利後服冷醋一碗則毒解思食

一方食被毒箭射死鳥獸肉毒　先以鹽汁服之次以大豆煮汁飲之即解不及者多死

一方食魚膾滯胃不化吐亦不出　以橘皮一兩大黃二兩朴硝二兩以水一大升煮至一小升頓服即消

一方食膾不消結爲癥病　馬鞭草搗汁飲之或以薑葉搗汁飲一升即消或用吐藥吐之

一方食魚後食毒兩種煩亂　橘皮濃煎汁服之即解

一方鯸鰊魚毒即河豚魚也　蘆根煮汁飲之即解

一方蟹毒　紫蘇煮汁飲三升即解或蘇子搗汁飲之或冬瓜汁飲三升食冬瓜亦可黑豆汁俱妙

一方菌毒悶亂狂笑垂危　以人糞汁飲一升即解

一方閉口椒毒　肉桂煎汁飲或食大蒜即解或以豆豉濃煎汁飲之取吐即解此方亦治食後惡心欲吐不吐以此吐之

一方鉤吻毒　薺苨八兩以水六升煮二升俟温分二服服之

一方莨菪毒令人狂亂狀如中風或吐血　甘草煮汁服之

一方芹菜毒手青腹滿痛不可忍名蛟龍病　粳米飴糖二三觔每日服兩度吐出如蜥蜴三五度即瘥

一方食苦瓠吐利不止　黍穰煮汁日常飲之

一方飲食中忽然煩悶不解何毒　以犀角熬湯飲之

一方牛肉毒　烏臼樹根皮酒煎同熱酒服或菊花連根搗汁酒服

一方鱉毒　飲藍汁數碗或靛清水亦可

一方黃鱔中誤入荊芥　地漿水取法見前花椒毒服之即解

一方桐油毒　急飲熱酒即愈

一方鹽滷毒　生豆腐漿灌下再以鵝翎絞喉數次令

吐卽活

一方 誤食螞蝗嗜芹菜者多得此患 空心食地漿水 取法見前花椒毒 少許自下

一方 鹽滷毒 肥皂水灌下取吐如不盡飲熱豆漿三五碗卽愈

一方 誤吞水蚯卽螞蝗成疾脹滿黃瘦者 牛血熱飲一二升次早化猪脂一升飲之卽下出也

中五蠱毒 以猪槽中水服之或白雞血飲之

一方 玳瑁磨汁服如避蠱毒則以生玳瑁佩之

一方 腹痛 以猪肝一具蜜一升共煎作二十次服或爲丸服

一方 下血 以乾羊皮燒灰服之或以生羊肺一具割開洗淨入雄黃麝香等分吞之

一方 或下血如肝或吐血或心腹切痛如有物咬不卽治之食人五臟卽死欲知是蠱令患者吐水沉者是浮者非也 用敗鼓皮燒灰酒服方寸匕須臾自呼蠱主之姓

一方　取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如指拇大以水一升酒三升煮二升服之當卽下蟲病愈

一方　五種蟲　麝香雄黃等分爲末用生羊肝如指大以刀割開裹末吞之

一方　臘月採倫獾子乾屎泡以湯摩如雞子許空腹食之

一方　並中惡　臘月採倫狐腸燒灰爲末臨用冷水服卽數分方寸匕卽愈

一方　燕屎三合炒獨蒜去皮十枚和搗爲丸梧子大每服三丸蟲當隨利而下

一方　先取炙甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨卽吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服若含甘草而不吐者非毒也

一方　毒在上者用升麻煎湯吐之在腹者用鬱金煎湯下之或合二味服之不吐則瀉活人甚捷

一方　一覺腹中不快即以生豆腐試之入口不聞腥氣此中毒也急以升麻濃煎連飲以手摳吐即愈極效

辟蠱　常以荸薺末服之則不患其暗中

免蛇蟲傷　採羚羊肉和五味炒熟投酒中經宿飲之可免中蟲

預防蠱毒　自年少時食貓肉則蠱不能害亦不患勞痊鼠瘺

服硫發瘡　醋和皮研膏敷之燥則易敷

硫黃毒發氣悶　新羊血熱服一合即解亦治砒石毒神效

中金銀銅鐵毒　白鴨屎絞汁服之即解

一方　烏骨白毛雄雞屎白水淋汁服之

乳石發動煩熱　白鴨屎一合湯一盞漬之澄清冷服即解

服丹石毒發下痢赤白日久不愈者　採獾子肉煮熟露一宿

空腹和醬食一頓卽瘥

一方 毒上衝目昏暗不能見物 採初生白兔肝一具入羊肝洗治食之羊肝明目因其氣有餘以補不足也兔肝能瀉熱葢兔目瞭而性冷故也

中酒毒 菉豆粉盪皮水調服卽解

一方 白扁豆生嚼卽解並解河豚砒毒

一方 及一切魚毒或諸毒 以青菜生食或以急流水煮飲之

一方 燒酒毒 以氷一塊置膻中卽解

一方 燒酒毒火燒悶絕或受煤烟毒 白蘿蔔汁或熱尿灌之俱效

一方 以蔓青子根爲末服之

一方 酒醉不醒 田螺螄以葱豉煮汁飲之卽解

一方 燒酒醉死 急以新汲水漬髮外用帛浸濕貼胸膈仍細細灌之俟甦乃止

一方 燒酒毒 鍋葢上氣水接服卽醒

斷酒法 蠐螬研末酒調服

一方 酒七升硃砂五錢瓶浸緊封安猪圈內任猪

搖頭七日取出頓飲之

一方　以白犬乳加酒服之

一方　以黑驢胞衣研酒服方寸匕　即數分

一方　水老鴨屎燒灰研末水服方寸匕日一服　即數分

一方　老鷹毛煮汁飲之即止酒也

吃烟中毒　胡黃連合茶服之甚效

辟河豚魚毒　煮河豚時用橄欖在內不患中毒

預防飲食毒及諸毒　常煮甘草薺苨湯飲之則勿碍一切食也

中煤炭毒　一時暈倒不救殺人　急以新汲清水灌之立醒

誤吞金子　羊脛骨燒焦研末三錢米飲下從大便出神效

誤吞鐵物　栗樹炭一塊將鐵錘搗極細砂糖和丸服三錢立止

不藥良方

續集卷十

C116/2535
v.12

不藥良方續集卷十

外科　嬰兒部

赤遊丹毒小兒是症皆由胎毒所致欲發時先身熱啼叫驚搐不寧次生紅暈由小漸大其色如丹遊走無定起於背腹流散四肢者順起於四肢流入胸腹者逆或初生之後外以熱水洗浴兼以火烘衣物以致觸動內熱遂成此症　先宜砭出惡血看血色紅者輕紫者重黑者死次用牛羊肉徧貼紅暈處微乾再易貼俟肉片不乾復以藍靛敷之內服消毒犀角飲犀角鎊防風各一錢甘草生五分黃連生

三分水二鍾燈心二十根煎四分徐徐服之便秘加大黃三五分卽安

一方 赤小豆爲末好醋調敷卽效

一方 患從起遊至陰頭赤腫出血者 鯽魚肉切五合赤小豆末二合搗勻入水和敷神效

胎癬瘡 又名奶癬瘡生頭頂或眉端癢起白屑形如癬疥由胎中血熱落草受風纏綿是爲乾癬如誤用湯洗皮膚起粟瘡癢無度黃水浸淫延及徧身卽成濕癬 乾者潤肌膏香油四兩奶酥油二兩當歸五錢紫草一錢將歸草八二油內浸二日文火煠焦去渣加黃臘五錢溶化盡用布濾傾盆內不時用柳枝攪冷成膏每用少許日擦二次如濕者用嫩黃柏頭末與滑石等分撒之痂過厚再以潤肌膏潤之神效內俱服消風導赤湯生地赤芍各一錢牛蒡炒研白蘚皮金銀花薄荷木通各五分黃連酒炒生甘草各三分燈心五十寸水煎徐徐服之

一方 熱極者皮膚火熱紅暈成片遊走狀如火丹治忌收斂 亦以潤肌膏抹

之內服發散化毒諸藥自愈若癢甚者不論濕乾俱用烏雲膏松香末二兩硫黃末一兩研勻香油拌如糊攤南青布上半指厚捲成條線紮之再用香油泡一日取出刮去餘油以火點着一頭下用粗碗接之布灰陸續剪去取所滴藥油浸冷水內一宿出火毒抹患上乳母俱忌河海魚腥鷄鵝辛辣動風發物緩緩自效

胎驚丹毒 小兒過歲以上忽兩眼胞紅暈面色青黯煩熱夜啼或面如胭脂乃屬伏熱在內散發於外狀如水豆根脚微紅出時延及頭項繼發丹毒 初起用四聖散木賊秦皮紅棗燈心黃連各五錢研粗末每用二錢水一鍾煎七分頻洗兩目餘皆同小兒赤遊丹毒治之

一方 患延胸乳痰喘抽搐乃火毒攻裏防轉驚風 急服五和湯生大黃枳殼麩炒炙甘草各七錢五分赤苓當歸酒洗各五錢共研粗末每服二錢水一鍾煎七分不拘時服

滯熱丹毒初起形如赤遊丹毒較之赤遊丹毒走緩慢因兒乳食過多不能運化蘊熱於中達於肌表而生發熱面赤口酸等形 如舌有黃胎者宜服保和丸白芽半夏製查肉神麴炒各一兩陳萊菔子炒連翹去心各五錢研細末粥丸加梧子大每服三十丸白滾水化下消其食滯餘同赤遊丹治法

一方 若兒唇焦便秘者一捻金爲細末每服一字二分五厘蜜水調下餘亦同赤遊丹治法如清利之後丹毒仍作者再服犀角散犀角升麻防已生山梔朴硝黃芩黃芪各一錢牛黃五分爲細末每服五分竹葉煎湯調下量兒加減用之不拘時服

火丹赤腫 蕎麪醋調糊敷之

一方 鯉魚血塗之或猪肉片貼之

一方 芸薹菜子搗爛敷之

一方 馬齒莧搗汁飲唾津敷之

各種火丹皆胎中熱毒遠則五六日近則兩三日形雖不同總爲丹毒 如從頭腫起者名飛龍丹用葱汁塗之

急竈丹從頭上起色紅腫痛　赤小豆和雞子清塗之

鬼火丹從面上起色赤而腫　竈心土研雞子清塗之

天火丹從背上起赤色點疱　桑白皮爲末羊脂調塗

天竈丹從兩背起赤腫黃色　用柳木燒灰水調塗之

水丹從兩脇虛腫處　用生鐵劉末猪糞調敷之

胡吹丹從臍上起黃腫　用檳榔末米泔水調塗之

烟火丹從兩手起赤白點　用猪槽下土麻油調塗之

野火丹從兩足起赤腫　用乳香末羊脂調塗之

胡漏丹從陰起黃腫　用屋漏處土羊脂調塗之

纏腰丹腰生一紅絲若纏至臍則必死　兩邊生紅用京墨磨濃和雄黃末塗之

冷丹白色塊者　用薑皮一撮煎湯洗之

熱丹紅色塊者　用紫背浮萍煎湯洗之

丹瘤或生頷下如櫻桃突出色赤而光　棉羊腰子同朴硝研爛貼之立效或草麻子研勻水和敷之大人同方

火丹遍身紅腫　當歸赤芍甘草大黃等分爲粗末每服

三錢水半鍾煎三四分食後服

赤遊風忽然腫癢流汗不止是症至急救遲則死 雄黃五棓子等分爲細末醋調塗之

一方 用無名異爲末蜜汁調塗立消或鐵銹水塗之或新生荷葉搗爛入鹽少許塗之俱甚驗

重瓣上喉前上腭下垂如珠紅腫脹滿不能吮乳三四日後宜用針刺一二分放血 以氷硼散抹之方見諸書曰三次乳母忌血腥辣物

臍突兒臍突出赤腫虛大生後即腫宜清母子之熱不必敷治恐反爲害如在十日之外兒臍忽腫如吹不赤捻動微响或驚悸作啼者 內服白芍藥湯白芍酒炒一兩澤瀉五錢生甘草一錢二分肉桂採薄者刮去粗皮一錢研粗末每用二錢水一鍾煎四分空心頻服如臍下痛加鉤藤一錢生薑一片食鹽五釐外用外消散大黃牡礪炒各五錢朴硝二錢研細末用活田螺數十枚洗淨再以清水半盞養之過宿取田螺清水調藥敷於患處螺仍放水中勿害方效

陰腫即脫囊或因坐濕地寒凝或因叫怒閉結而成者 桃仁九桃仁去皮

尖炒七錢五分白蒺藜炒去刺桂心丹皮各五錢
黑丑頭末二錢五分研細蜜丸黍米大每服十丸
黃酒送下外用立消散赤小豆風化消赤芍枳殼
商陸各五錢俱不宜見火晒乾共研爲末用側柏
葉煎湯候冷調敷立效

內弔 亦陰腫症也因寒氣而得陰囊腫痛腹痛冷汗引縮二丸入腹痛止方出 宜烏梅
散烏梅肉甘草半生半炙元胡各五錢鉤藤乳香沒藥俱去淨油各二錢五分共搗粗末每服二錢水一鍾煎
七分服外亦敷外消散立效或服後勻氣散亦妙

陰腫 其莖全縮不見或不縮而陰囊腫光亮不燥不疼者乃肝腎氣虛也 宜勻氣散
桔梗二錢炒陳皮去白一錢茴香炒砂仁炒各五錢炙甘草四分薑炭二分五釐共研細末每服五分或一錢白滾水調下或橘核湯調下外亦敷外消散

一方 囊腫及四肢俱腫二便不利者 宜白牽牛散白牽牛半生半熟頭道末炙甘草橘紅白朮炒桑白皮木通各等分

水煎服神效外亦敷外消散

女孩陰戶腫脹乃心熱相傳宜導赤湯生地木通甘草

水煎服外亦敷外消散立效

陰腫爲蚯蚓吹者雄鴨涎沫之卽消

一方發熱而腫蚯蚓屎水調敷之

肛門作癢乃蟲蝕也兒之下唇必生小白瘡或耳之前後結小核如串諸書曰下唇有瘡蟲蝕其肛以雄黃銅綠等分爲末撒之卽效

遺毒有稟受染受之分父母先患梅瘡後結胎元者百無一生如先結胎元父母後患梅毒傳於胎中兒生後頭上坑凹肌膚先出紅點次發斑爛甚者毒攻口角眼眶耳邊及前陰穀道破爛

初起卽用人中黃細末三五分土茯苓煎湯調稠日二三服如腫用紫金錠磨水塗之如破爛者用黃柏蜜炙爲末撒之乾用香油調搽投藥應效者後服二黃散十中可保三四若毒延及徧身日夜啼哭不喫乳食者終難救活二黃散卽胡連山慈菇各二錢生甘草一錢五分牛黃七分爲細末每服三分蜜湯調服

一方 百合花曝乾研末油調搽之

一方 起於口內延及身膚 五梔子濕紙包一個燒灰存性 雞子白調爲糊遍敷之立消

熱瘡 雞子五枚煮熟去白取黃亂髮如雞子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即髮焦乃有液出旋取置碗中以液盡爲度取塗瘡上即以苦參末敷之

外科總治

癰疽瘡瘍 經云諸痛癢瘡瘍皆屬心火故知四者原因火毒以致榮衛不足氣血凝結經絡阻隔而生也瘡大一寸以上曰癰一寸以下曰瘡瘍癰發於肉脈屬陽疽發於筋骨屬陰瘍毒發於皮裏肉外瘡癤只發於皮膚之上實而痛者爲熱虛而痒者爲寒如癰疽陽盛者初起則燬腫赤痛易潰易斂順而易治如陰盛者初起色暗不紅塌陷不腫木硬不痛則難潰斂逆而難治如半陰半陽者慢腫不高微痛微燬色淡紅則屬險治之得宜尤可轉險爲順諸瘡瘍如見五善者爲順見七惡者爲逆諸癰疽見五善者亦順七惡者亦逆見三善者則必生見四惡者則必死若能審定形色脈症温涼補汗下五法得宜庶有濟也是症不外外因六淫八風不正之氣內因六慾七情過傷或不

內外因飲食不節起居不愼過飲醇酒茶水過食五辛傷飢失飽及晝日過勞負重挑輕跌撲搥墜損其身形或夜不靜息强力入房勞傷精氣而成也如　初起如粟麻癢瘀痛身體或先熱而後惡寒或先癢而後疼如不疼最惡候也　卽屬毒甚纔覺時或七日以前形勢未成不論陰陽先當以艾壯於痛處灸之痛則灸至癢癢則灸至痛輕者使毒氣隨火而散重者拔引鬱毒通徹內外實良法也凡毒初起皆灸之如患在頭頂以上痛者小壯灸三五壯不痛者無妨大壯多灸　如失之於初瘡勢已成又當隨症審治得毒消膿潰方爲可治症灸法取紫色獨蒜切片貼腫心灶艾其上不痛者以灸至覺痛方止如痛者以灸至不痛爲度如蒜乾焦易新蒜再灸之

一方　初起癰疽用乾薑一兩泡炒紫色研末醋調敷四圍留頭甚妙

一方癰疽三日內或五日內宜服護心散眞蓖豆粉一兩乳香五錢燈心灰同研勻以生甘草濃煎湯

調服一錢時時呷之若毒氣衝心漸生嘔吐或鼻生瘡菌大宜服此三日內卽無嘔吐等形亦須速進數服方免變症服至一兩則香徹瘡孔中眞聖藥也

一方灸法　癰疽發背對口惡瘡頑瘡一切無名腫毒及久近臁瘡先以濕麪隨腫處作圈高寸餘實貼皮上如井口形勿令滲漏圈外圍布數重防火氣烘膚圈內鋪蠟屑三四分厚次以銅漏杓盛桑木炭火懸蠟上烘之令蠟化至滾再添蠟屑隨添以井滿爲度皮不痛者毒淺灸至知痛爲度皮痛者毒深灸至不知痛爲度去火卽噴冷水少許於蠟上俟冷起蠟蠟底之色青黑此毒出之徵也如漫腫無頭者亦以濕紙試之於瘡之先乾處灸之初起者一二次卽消已成者二三次卽潰如瘡久潰不斂四圍頑硬者卽於瘡口上灸之蠟從孔入愈深愈妙其頑腐瘀膿盡化收斂而愈

癰疽將成　急流水調牡蠣粉塗之乾再塗以拔其毒神效

一方赤腫　用米醋和蚌粉塗之乾即易塗甚良

一方及癌毒　黃犬頭骨灰芸薹子等分爲末水和敷之甚驗

一方及疔腫　白馬齒燒灰唾和塗之出根爲驗

一方癤腫　黃明膠一兩水半升化開入黃丹一兩煮勻以翎掃患口如未成者塗四圍即消

一方諸毒初起及經十日以上腫熟瘡痛　用雞子一枚新狗糞如蛋大攪勻微火熬令稀稠得宜撿作餅貼腫頭上以帛包扶時時看視覺餅熱即易勿令輕動及歇氣經一宿自定如日多者三日貼之一日一易至瘥乃已一切諸方皆不及也

一方瘡毒初起即令解散　蒲公英當歸身生黃芪甘草節各五錢水酒各半盞煎服發汗即愈

一方瘍腫初起紅腫無頭　肥皂去皮弦子及節　搗爛醋調敷立效

或火煆存性粉調敷之

一方癮疹及一切無名腫毒初起　赤小豆爲末入苧根末同研則不粘井水調敷毒氣立散或雞子清調塗亦佳

一方癮疹初起　黃明膠四兩炖化川山甲四片燒存性入膠內酒冲或酒炖服之三五日用之則毒不內攻勝服蠟礬丸

一方癮疹瘡瘍初起潰後皆可用之　薑製香附爲末每服二錢米飲下遂愈初作時以末煎湯代茶時時飲之

一方一切癮疹無名腫毒　用清涼膏芙蓉花或葉或皮或根生搗或乾研末敷於四圍中間留頭乾則頻換初起者卽覺清涼痛止腫消已成者卽膿出已潰者卽易斂又名清露飲鐵箍散或加赤小豆末或蒼耳燒存性爲末加入亦妙

癰腫惡毒　茴香苗葉搗汁一升服之日三四次仍以渣貼之冬月用根

一方　塗猪腦於紙上貼之乾則易貼多次卽消

一方 尙未成膿 以烏牛耳垢封之

一方 及發背疔瘡一切腫毒不問已成未成但見煩痛者 槐花微炒胡桃仁各二兩無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服卽效

一方 以三七用好醋磨塗卽散已破者研末摻之

一方 用獨蒜搗爛麻油調塗四圍卽愈

一方 野間殘糞下土篩細末敷之如水着背

一方 白芥子爲末醋調敷之或以蕪菁子搗爛敷之

一方 猪膽汁磨好墨塗之醋磨亦可

一方 伏龍肝末用醋調塗

一方 露蜂房炙乾研末醋調塗之如洗瘡煎湯用

一方 皂角樹上木耳磨醋塗之

癰疽不潰 好醋和雀屎如小豆大敷瘡頭卽潰也

一方 冬葵子吞三五粒俟出頭作膿

一方 白芷針以酒煮服一針潰一孔二針潰二孔

一方不痛不腐及瘰癧流注頑臁惡瘡不愈者　桑木片紮成小把燃火吹熄灸患處內服補托之藥甚良

一方無頭不潰　蠶繭燒灰酒服一枚出一頭二枚出二頭奇妙

癰疽潰後不斂　老鼠一枚燒灰敷之或鼠皮燒灰封之俱效

一方因瘡口太深不能合者　絲瓜搗汁頻塗之

一方膿水不散　以黑驢懸蹄燒灰敷之立愈

一方癰久不斂　牛屎燒灰用雞子白和封之俟乾卽易

一方或搭手發背破爛者　定疼散山藥白糖霜打爛塞入毒內卽不臭使爛肉去新肉自生初時日換三次三日後一日換一次煎甘草湯或猪蹄湯洗用軟鵝毛數根紮洗洗去再敷待肉長滿方止

癰疽有蟲　鹿角燒灰爲末苦酒和鹽磨汁亦可

一切惡瘡　白鱔魚骨炙爲末入諸色膏藥中貼之外以紙護之甚良

一方 以母猪懸蹄同赤朮燒烟薰之卽愈

一方 日久不愈 黃犬頭骨灰同黃丹末等分敷之

一方 日久不愈 洗碗水煎沸以鹽投入洗之立效

一方 其瘡似癩日久不愈 鯽魚燒灰研末和清醬敷之

一方 及腫毒 內食馬板椰一枚冷水下仍嚼塗之卽無所傷

一方 及腫並小兒遊丹毒俱效 慈菇葉搗爛塗之

一方 用線香或棒香研細末和燒酒調敷卽愈

一方 陳米飯斂作團煆存性和麻油膩粉調敷

一方 多年者 馬齒莧搗爛敷兩三遍卽瘥並治一切腫毒妊娠忌用

一方 瘡癩遍身 紫背浮萍濃煮汁浴之甚妙浮萍一味蜜丸酒服能治三十六種風濕癱瘓

一方 及沙蟲水弩惡疽 五月五日收蜣螂蒸過陰乾爲末油和敷之或杵汁塗之

一方 多年者 冬瓜葉焙乾研末塗之

一方 雄黃一錢五分杏仁去皮三十粒輕粉一錢爲末洗淨以猪胆汁調塗二三日卽愈百發百中

一切無名腫毒未破者 胆南星大黃等分爲細末燒酒調塗露頂卽消神效

一方未破者 尿缸底下垢研細濃塗四圍露頂乾再敷潤之卽消

一方未破者 蟹殼一個瓦上炙脆爲細末臨睡黃酒冲服卽消患小者一殼患大者二殼卽愈

一方未破者 生山藥鯽魚同搗爛敷之卽愈極效

一方未破者 用葱連鬚同白蜜搗爛敷之露頂如重換敷三二次卽消如已有膿將破不可用

一方未破者 芥菜子末同柏葉搗塗卽消神效或萊菔子爲末醋調敷

一方已潰將潰並治 用大栝蔞一個切去頂上一片將子挖盡裝入婦人油髮一大團再入明礬以滿爲度仍將切下一片蓋口週身用黃泥封裹以新瓦微

火煆過去泥取蔓爲細末黃酒送下未潰者內消將潰者卽出膿收口重者不過三服全愈

一方未潰 全當歸一兩重者一叢金銀花二兩木通五錢甘草節二錢鹿膠一兩用無灰酒不拘多少煮服盡量飲之煖卧取汗其毒卽消而愈

一方初起者 金銀花五錢生黃芪五錢當歸八錢甘草一錢八分水煎服數服全愈如在上部加白芷中部加杜仲下部加牛膝各一錢八分

一方壯盛者用之 牛膝一兩山甲土炒研 何首烏各二兩水酒煎服神效

一方 熱飯敷之

一方 醋調大黃末塗之

一方 鯽魚燒灰醋和塗之以愈爲度

一方及諸瘡 鯽魚一觔重者去腸柏葉填滿紙裹泥包煆存性入輕粉二錢爲末麻油調搽之

一方或已成或未成者 牛皮膠一片水漬軟當頭開孔貼

之未有膿者自消已潰者令膿自出

一方　羚羊角磨汁塗之

一方癰毒腫痛　脆鹿角尖磨濃汁塗之

一方及諸瘡　大黃鼠即禮鼠一個清油一勉慢火煎焦水上試油不散濾去渣再煎傾入炒紫黃丹五兩柳枝不住手攪勻滴水成珠下黃蠟一兩熬焦乃成去火毒三日脩用臨症如常貼法貼之能去痛退熱

一方　赤龍散野葡萄根晒研末水調塗之即消

一方　生南星生貝母芙蓉葉狼毒各等分研細末春夏用蜂糖蛋清調敷秋冬用陳醋調敷之中留一孔甚效

一方或疔毒發背　糯米飯白糖銀硃獨頭蒜獨脚簷塵一線掛者方入藥非一線者反起泡各搗勻敷之乾再敷之神驗第一

一方及風氣　滕黃四兩白蠟半勉研極細篩過小磨

麻油十二兩先將油煎至滴水成珠入滕黃攪勻再入白蠟不住手攪之以磁瓶收好面上仍以麻油養之臨用攤貼極效

一切瘡疥　黃豆炙油塗之

諸瘡久潰　絲瓜兒根熬水掃之大涼即愈

一切漏瘡不斂　霜後苦壺蘆晒乾研末敷之

一方　以紙粘臘猪油納瘡中日五夜三自愈

一方　雞內金皮日日貼之

一方　鹿皮燒灰和猪脂塗之日五六易以愈爲度

三十六種風結瘡　馬齒莧葉水煮澄清入蠟三兩煎成膏塗之甚效亦治白禿赤癬敷杖瘡多年惡瘡及馬咬馬汗入瘡射工毒採莧葉時須揀葉小節間有水銀珠者方可用

身體卒腫（不因熱即因毒也）　醋和蚯蚓屎塗之

遊腫諸毒　白芥子爲末猪胆汁調如泥封之

一切風瘡　七星魚一尾去腸肚以蒼耳塡滿外以

蒼耳安鍋底置魚於上着水慢火煨熱去皮骨淡食忌鹽醬甚效

熱毒風及惡瘡（腹中一切蟲症並諸小熱瘡）多食野鴨即愈

久患一切風濕惡症　黃鱔魚作臛空服飽食煖卧取汗如膠從腰脚中止候汗乾以五枝湯煖浴之避風三五日一作甚妙

漏瘡惡穢　大腹皮煎湯洗之

身上浮風　白芋煮汁浴之忌風半日

風熱毒氣　用煎過水牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三次取效

消毒解熱　生犀角尖磨濃汁頻飲之

一切濕瘡　白扁螺螄燒灰塗之

灸瘡不痊　烏賊骨白礬等分爲末日日塗之

小兒肌膚諸瘡（及停耳有蟲）　鯉魚腸和鯉魚酢搗爛帛裹塗塞之以蟲盡爲度

小兒遍身諸瘡（或面生瘡爛成孔或患遺毒）　用蒸糯米甑蓬四

邊氣水以盤取掃瘡上不數日卽愈神妙

一切腫毒　黑大豆搗爛塗之

諸般熱毒　蕪菁子根搗汁雞子清調塗立消

瘡中努肉　白梅搗餅貼之卽收

寒濕蟲瘡　乾艾作湯入白礬三錢洗之然後敷藥

蓋人之血氣冷必假艾力以佐陽而艾性又能殺蟲也

天行時毒　苦參一兩或酒煎或醋煮取吐卽瘥

一切漏瘡不拘蜂癆鼠癆　蜣螂燒爲末醋和敷之

灸瘡出血不止　死蜣螂燒同猪脂研塗卽止

定痛生肌被傷出血不止者　紫金藤卽好降眞香爲末敷之

一切風熱體如蟲行　鹽湯浴三四次卽止卽癢痛亦止

附奇症並家常宜知方

頭上生蝨　水銀和棗肉研爛塗氈帽上帶一夕其蝨盡死

蝨出怪病　臨卧渾身蝨出血肉俱壞每夕漸多痛痒難言且舌尖出血身齒俱黑唇動鼻開用鹽醋為湯飲至半月即安夏子益方

筋肉化蟲　有蟲如蟹走於皮下作聲如兒啼急用　雄黃雷丸各一兩為末摻猪肉上炙熟啖盡自愈腹內應聲亦治

大腸蟲出　行坐不能　鶴蝨灰水調五錢服之自愈

惡肉瘡毒 一女年十四歲腕軟處生物如豆半在肉中紅紫色痛極甚 用水銀四兩白紙二張揉蘸揉之三日自落 李樓方

行步歪斜 兩足不痠不痛每行動絕不聽用左右扭墜之玄而行一步不能正走乃筋軟不能束骨之故也宜用 人參黃芪白芍苡仁虎骨龜板杜仲鐵華粉各等分爲末煉蜜丸早晚服之自愈此方取其補肺金壯筋骨制肝木也 孫文垣方

氣奔 人忽滿身皮疹混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔 苦參細辛青黛各一兩作一服水煎一大碗細飲盡卽愈

麻骨 有自項麻至心窩而死者或自足心麻至膝而死者 用人屎燒灰豆腐調飲卽止

眉動 時時動搖目不交睫喚之不應但能飲食有經日不止者 用蒜三兩取汁酒冲服卽止

發斑 眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅乃熱毒結於下焦所致 白礬滑石各一兩爲末作一服水三碗煎半不住服卽愈

破腸 腸破出肚門鼻穢難聞 急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋之皮自合矣吃羊腎粥十日卽愈

惡肉瘡毒一女年十四歲腕軟處生物如豆半在肉中紅紫色痛極甚　用水銀四兩白紙二張揉蘸搽之三日自落李樓方

行步歪斜兩足不痠不痛每行動絕不聽用左右扭墜之玄而行一步不能正走乃筋軟不能束骨之故也宜用　人參黃芪白芍苡仁虎骨龜板杜仲鐵華粉各等分爲末煉蜜丸早晚服之自愈此方取其補肺金壯筋骨制肝木也孫文垣方

氣奔人忽滿身皮疵混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔　苦參細辛青鹽各一兩作一服水煎一大碗細飲盡即愈

麻骨有自項麻至心窩而死者或自足心麻至膝而死者　用人屎燒灰豆腐調飲即止

眉動時時動搖目不交睫喚之不應但能飲食有經日不止者　用蒜三兩取汁

樞子使君子為治百種蟲疾疳疾無價仙丹隨用一樣每服三五錢服此二三兩立見奇功百方千方不及此但病愈即止不可多服　雲谿注藏

參枸杞淋之皮自合矣吃羊腎粥十日即愈

脉濇毛竅出血或血不出皮脹如鼓須臾眼耳口鼻俱脹合 以生薑汁合水各一盞飲之即安

截腸大腸頭出名曰截腸初截寸餘可治若腸盡則不治 芝麻油盛於器唇坐上飲天麻子汁數升即愈

女人病邪與邪交通獨言獨笑悲思恍惚者 雄黃一兩松脂一兩溶化以虎爪攪之丸如彈子大夜燒籠中令女坐上被蓋露頭在外不過三貼自斷仍以雄黃入參防風北味各等分為末每旦井水服方寸匕即數分附後方

妖魅貓鬼病人不肯自言 鹿頭肉煎汁服之作膠彌善

夜夢鬼物 鹿角屑搗末水服方寸匕即數分即言一方 水獺肝末水服方寸匕日三服

夜夢魘寐 以赤氈一尺枕之即愈或以虎骨及豹骨枕之

夢與鬼交及狐狸猪魅一切邪氣 以虎豹鼻水煮服之如狐精則以狐鼻水煎服之

中諸邪祟昏迷笑哭或作鬼語 急將兩手大指縛作一排用

艾圓嵌中間爪中盡頭連肉處灸七壯或十七壯邪卽出若仍昏沉卽用麻黃三兩杏仁七十粒甘草一兩水二碗煎半灌之愈後仍服參苓等補正之藥秘方集驗

熱死　用路上熱土和大蒜勻勻研爛水調去渣飲

鬼魘　竈心土碎死井水調服二錢更挑半指甲許吹鼻中如不醒用艾灸人中穴并兩足大指離用一韭葉各七壯卽甦五絶並可同法灸之

尸厥　由入廟弔喪問病而得者　用附子七錢重者炮熟去皮臍爲末　分二服每服酒三盞煎一盞如無附子以生薑汁半盞水一盞同煎百沸連灌二服卽醒

腹皮青色　不速治須臾死　胡粉乃錫粉非鉛粉鹽熬色變摩腹上腹內寢病　卽痞積之類　自死殭蠶白馬尿煎服卽愈

貪食非常諸物　男婦好吃生米或茶葉布頭泥炭瓦塊并酒積氣塊心痛腹痛或飽悶小兒疳疾一服除根　甘草春夏四錢秋冬五錢　黑丑頭末一兩二錢　檳榔一兩二錢雷丸五錢爲細末每服三錢五更用糖湯下天

明利下積物卽愈名萬全不易妙靈丹

一方 如茶葉壁泥桴炭石灰生米等類 芝麻一碟拌雄黃三分初服白湯下三日後只吃炒芝麻半月卽愈

一方 同前 生槌子一觔每日蘸沙糖吃數十粒以食完爲度或加史君子肉四五枚半生半熟更妙

一方 史君子肉二兩檳榔南星各一兩薑汁製如吃生米加穀芽炒一觔吃茶葉加茶葉炒一觔吃黃土加壁土火炒一觔吃黑炭加炭一觔爲末蜜丸梧子大每五十丸清早沙糖水下

癲狂 鬱金七兩明礬三兩爲末糊丸梧子大每白湯下十丸卽患數年者服之定覺胸中有物脫去神氣洒然再服全愈李時珍製

一方 癲癎並治 猪心二個切入硃砂二兩燈心三兩在內麻紮石器煮一伏時取砂爲末同茯神末三兩酒打糊丸梧子大每服九丸漸增二十五丸麥冬湯下甚者乳香人參湯下

明利下積物即愈名萬全不易妙靈丹

一方 如茶葉壁泥桴炭石灰生米等類 芝麻一碟拌雄黃三分初服白湯下三日後只吃炒芝麻半月即愈

一方 同前 生榧子一觔每日蘸沙糖吃數十粒以食完爲度或加史君子肉 四五枚半生半熟 更妙

一方 史君子肉二兩檳榔南星各一兩薑汁製如吃生米加穀芽炒一觔吃茶葉加茶葉炒一觔吃黃土加壁土火炒一觔吃黑炭加炭一觔爲末蜜丸梧子大每五十丸清早沙糖水下

癲狂 鬱金七兩明礬三兩爲末糊丸梧子大每白湯下十丸即患數年者服之定覺胸中有物脫去

蛇半瘡及被蛇咬或腹中生蛇生蟲生龜 用椒辣炙早烟油冲多服之均賽仙丹 雲韶註

酒打糊丸梧子大每服九丸漸增二十五丸麥冬湯下甚者乳香人參湯下

久癇　猪心一個須不落水者去肉心血入射干三錢泥封固煨待紅取出存性研末每服三錢百試百驗

腹痛緊急不識何症男婦並治　川鹽微炒以布裹熨之其效如神

霍亂痧痘烏痧陰痧陽痧絞腸等痧　明礬二錢爲末大粗末用陰陽水送下再用針刺眉心頭頂十指尖出血立愈但不可食熱湯熱物

一方　急用滾水冷水各半蓋和勻吞服鹽一錢或吞一錢卽止或將鹽納臍中以艾葉灸之死亦可治

一方　用蘄艾一握水煎温服奇效

一方　用大蒜搗爛塗兩足心立愈

一切痧脹中暑霍亂等症　食鹽一握在心口背心兩脇頻擦擦出許多紫點爲度卽垂死者亦活第一良方

中惡卒死或往死喪墳廟來家卒死口鼻清血似乎尸厥但腹不鳴心下温煖　急用犀角同麝香少許爲末服二錢卽醒

一切卒死　紫金錠磨水服之立醒

蟻漏頂下忽腫一塊漸延至頸刺破即出水不止瘡久不合緣飯中有蟻誤食所致　用穿山甲燒存性爲末敷之立效

蛇串瘡因食烏蛇渾身變黑漸至遍生鱗甲　晚蠶沙五錢淘淨日服五錢服至一二斗久之自退或將沙於新瓦上炙爲末少加雄黃麻油調敷之

古井有毒及五月井中恐有毒以雞毛投入如有毒則毛迴旋不下無毒則毛直下也以熱醋數斗投入俟一二日方可汲飲恐中毒氣也

酒醋欲腐　以井華水投入即正

地多蟲蟻　稗子米煮汁沃之即能却去

壁蝨　蕎麥穰作薦即辟之或蟹殼燒烟薰之俱妙

除床席上諸蟲　三月三日日未出時採薺菜花放床席下甚效

燒烟薰蚊　乾鱖魚燒烟薰之或夜明沙鱉甲燒烟薰或以駱駝屎燒烟薰之

斷蛀蟲薰禪及屋舍竹林蟲蟻　鰻鱺魚燒烟薰之

斷衣箱內蟲　以鰻鱺魚骨置箱內永可去之

井中生蟲　投烏賊魚骨即死

辟盜　正旦燒喜鵲巢撒門內賊難進

一法　用栗木爲門拴能辟難進

除水蚤蟲　取白馬頭骨浸於水之上流則除之

入山辟蛇　以麝香着足爪中則無蛇蟲當道因麝嗽蛇故以壓之

辟邪　伏內庚日采青蒿懸門庭能辟諸邪或冬至元旦各服青蒿二錢亦妙

預識蠱毒　預知子綴衣領中凡遇蠱毒則聞其聲而預知之

去腳臭氣　樟腦和烏頭爲末醋丸彈子大置足心微火烘之汗出即效

腹中水鳴　由抑鬱而致腹中有塊作痛行動則水聲漉漉甚至吐酸寒熱者　黃芪五錢柴胡三錢白芍二錢甘草一錢陳皮貝母枳

實各五分薑三片水煎服三貼即愈

身生碎蟲　大楓子二錢五分油核桃肉二錢五分水銀一錢信一分共六錢五分丸作六丸每日用一丸上身多於臍上搽之下身多於臍下搽之空臍處不搽連用五日用去五丸歇下一日再用第六丸收功

脾橫爪赤　煎青羊脂摩之

多眠不醒　白馬頭骨燒灰水服方寸匕（即數分）日三夜一

即令人不睡作枕亦良

咽傷聲破　酒一合醋一匙乾薑末二匙和服日二次

穀不生蟲　冬至後第三戌日取雪貯之俟侵種時以是水浸則耐旱不生蟲

治水渾濁　以桃仁或杏仁擂末連汁投入攪勻片時即清

治井無毒　以黑鉛爲井底最能清水散結飲之無

疾入丹砂鎮之令人長壽

鼠多　以蓮梗塞其穴則鼠自去

補腎方　黑豆入鹽煮時常食之最能補腎黑豆乃腎之穀鹽能通腎故也 馬蒔方

吞豆補臟到老不衰　每晨水吞黑豆二七枚謂之五臟穀 李守愚方

萱花代茶 即鹿葱花名宜男草又名忘憂　萱花能安五臟利心志令人好樂忘憂輕身明目利心膈

服藥煩悶　飲東流水從西來者也一二升即安地漿水亦可

一方 因過劑卒嘔不已　新汲水飲一升即安

一方　犀角燒末水服方寸匕 即數分

服藥過劑　白鴨屎爲末水服二錢甚妙

辟山中邪惡及虎狼　以青羖羊角燒之

宜蠶法　白馬頭骨埋於桑樹之午地則蠶盛其家

食忌苦蕒菜及苦菜如蠶見之則爛

令髮長黑　熊膽蔓荊子末等分和勻醋調塗之

令髮不落　榧子三枚胡桃二個側柏葉一兩擣浸雪水梳頭其髮永不脫落且潤也

髮毛黃色　以熊脂塗髮梳散入床底伏地一食頃即出便黑不過用脂一升即效

髮落不生　以酢泔洗淨布揩令熱以臘猪脂入生鐵煮三沸塗之遍生

沐髮光澤　以猪膽汁入湯沐之

髮長且黑　芸薹菜子取油敷之狐臭人忌之

髮常光潤　以芝麻葉一握同芝麻五升搗和浸三日去滓沐髮並去風除垢

兒髮欲黑而潤　取甑氣水常沐兒頭甚有驗

辟山嵐瘴氣　早行用生薑一片含之則不患嵐氣

惡夢　以絳囊貯丹砂戴髮根即安眠無惡夢

辟果樹上烏鴉　以生人頭髮掛樹上則不敢來

皂莢不結　將樹鑿一孔入鐵封之則結莢矣

辟衣箱蛀蟲　以樟腦薰衣箱裝衣永不生蟲

齒齲　人食烏梅齒齲者嚼胡桃即解

辟蛟　以紫背浮萍燒烟薰之

收梨不壞　收梨時與葵菔相間收藏則不爛或削梨蒂扦葵菔上亦妙

海水傷裂（及風吹裂痛不可忍）　以蜜半勺水酒三十勺防風當歸羌活荆芥各二兩爲末煎湯浴之一夕即愈

拔白轉黑　狗膽汁塗之或白犬青犬皆妙

鬚髮早白　龜尿調水蛭極細末日日抹之自黑

少婦鬢髮黃白（李仙妨方）　黑豆一升青石榴一個搥碎入好醋三升同煮爛去豆不用再煎至一升收貯每早敷髮則黑而潤

擦牙烏髭　泥鰌槐蕊狼把草各一兩雄燕子一個酸石榴皮五錢搗成團入瓦罐內鹽泥固濟先文後武火燒炭十勺爲度取研日用之一月以來白者皆黑

烏鬚髮　取胡桃外面青皮壓油抹之自黑

浣油潤膚　以白果取漿抹面及手去油膩而澤肌膚甚妙

烏髭鬚　採鮮覆盆子榨汁日塗之則髭髮不白

去垢香澤　夏月取孩兒菊置髮中則髮不膩浸油塗髮去垢香澤

面黑令白　冬瓜一個竹刀去皮切片酒一升半水一升煮爛濾去渣熬成膏瓶收每夜塗之瓜仁亦可作面脂更佳又去皮風好顏

去黯黯　冬瓜藤燒灰搽之

面欲光潤　取啄木鳥血庚日向西熱飲之神妙

一方（光華赤白）　以麋角熬成漿磨塗面上極妙

一方（能肥白美顏色）　以麋骨煮汁釀酒飲之

牛犬羸瘦　鮓魚一二枚與食立肥

馬出黑汗　採乾酪以水化灌之即牛羊乳熬酥之渣也

喂馬誤食殭蠶烏梅　以桑葉喂之卽解或搗汁灌之甚妙

牛病瘟疫　狐腸燒灰和水灌之或狐頭並尾骨燒灰和水灌之或以水獺肉煮汁灌之

辟邪氣止馬驚　以狼毛繫馬胸前則夜行不驚

自刎食喉已斷氣未斷者可治　熊膽調水洗傷口滲去乾血塊用大鰱魚去鱗取魚皮貼傷處四圍搗三七末敷好以絹帕紮之一日一換如結實則不可換屢用屢效

自縊心下猶溫者　急刺丹雞冠血滴口中卽活男用雌女用雄

不藥良方續集終

先大父桂舟公宦遊西蜀手輯是書凡二集十二卷試之多驗鋟木以行嘉慶甲子重刻於京師嗣以　先君出仕江浙轉而山左數十年內奔走弗遑諸伯叔亦俱遊歷四方遂致此板散佚每撫手澤能勿戚然今秋詳加校對再鐫於羊城以繼先志以廣濟施篇次俱仍其舊惟增目錄於前所以便於檢閱也於戲風塵歷碌幾從南北以奔馳編簡幸存當與箕裘而並重雕刊既竟爰述始終俾

後世子孫無忘寶護焉

光緒七年歲次辛巳仲冬月孫貴奎成謹跋