

KODAK Color Control Patches ©The Tiffen Company, 2009 Kodak

傷寒論世無善本余所藏治平官
刊大字景寫本而外惟此趙清常本
耳已友宗室伯芳祭酒曾勉重金購
此本不可得僅得日本安政丙辰覆刻
本（近蜀中又有刻本亦從日本之出）今夏從廠賈魏子敏得此本
完好無缺惜伯芳不及見矣　坊記（時戊申中秋日戊辰）

北宋人官刻经注皆大字單詠皆小字所以別尊卑也治平官本傷寒論乃大字经也千金方外臺秘要皆小字詠也林億諸人深於醫矣南宋已後烏足知此



刻仲景全書序

歲乙未吾邑疫厲大作予家臧獲率六七就枕席吾吳和緩睭卿沈君南昉在海虞藉其力而起死亡殆徧予家得大造于沈君矣不知沈君操何術而若斯之神曰詢之君曰予豈探龍藏秘典剖青囊奧旨而神斯也哉特于仲景之傷寒論窺一斑兩斑耳予曰吾聞

是書于家大夫之日久矣而書肆間絶不可得君曰予誠有之予讀而知其爲成無已所解之書也然而魚亥不可正句讀不何雖矣已而搆得數本字爲之正句爲之雖補其脫略訂其舛錯沈君曰是可謂完書仲景之忠臣也予謝不敏先大夫命之爾其板行斯以惠厥同胞不肖孤曰唯乃沈君曰金匱要略仲景治雜證之秘也盍并刻之以見古人改弊補漏緩急調停之心法先大夫曰小子識之不肖孤曰敬哉既合刻則名何從先大夫曰可哉命之名仲景全書既刻已復得宋板傷寒論爲予暴閱知成注非全文及得是書不啻拱璧轉卷間而後知成之荒也因復并刻之所以承先大夫之志歟又故紙中檢得傷

寒類證三卷所以隱括仲景之書去其煩而歸之簡聚其散而彙之一其于病證脈方若標月指之明且盡仲景之法于是粲然無遺矣乃并附于後予因是哀夫世之人向故不得盡命而死也夫仲景殫心思于軒岐辨證候于絲髮著為百十二方以全民命斯何其仁且愛而躋一世于仁壽之域也乃今之業醫者舍本逐

末超者曰東垣局者曰丹溪已矣而最稱高識者則玉機微義是宗若素問若靈樞若玄珠密語則嗒焉茫乎而不知旨歸而語之以張仲景劉河間幾不能知其人与世代猶靦然曰吾能已病足矣奚高遠之是務且于今之讀軒岐書者必加誚曰是夫也徒讀父書耳不知兵變已夫不知變者世誠有之以其

變之難通而遂棄之者是猶食而咽也去食以求養生者哉必且不然矣則今日是書之刻烏知不為肉食者大嗤乎說者謂陸宣公達而以奏疏醫天下窮而聚方書以醫萬民吾子固悠然有世思哉予曰不〻是先大夫之志也先大夫固嘗以奏疏醫父子之倫醫朋黨之漸醫東南之民瘼以直言敢諫

醫諂諛者之膏肓故躓之日多達之日少而是書之刻也其先大夫宣公之志與今先大夫歿垂四年而書成先大夫處江湖退憂之心蓋與居廟堂進憂之心同一無窮矣客曰子實為之而以為先公之志殆所謂善則稱親與不肖孤曰不〻是先大夫之志也

萬曆己亥三月穀旦海虞清常道

人趙開美序

傷寒論序

夫傷寒論蓋祖述大聖人之意諸家莫其倫擬故晉皇甫謐序甲乙鍼經云伊尹以元聖之才撰用神農本草以為湯液漢張仲景論廣湯液為十數卷用之多驗近世太醫令王叔和撰次仲景遺論甚精皆可施用是仲景本伊尹之法伊尹本神農之經得不謂祖述大聖人之意乎張仲景漢書無傳見名醫錄云南陽人名機仲景乃其字也舉孝廉官至長沙太守始受術於同郡張伯祖時人言識用精微過其師所著論其言精而奧其法簡而

詳非淺聞寡見者所能及自仲景于今八百餘年惟王叔和能學之其間如葛洪陶景胡洽徐之才孫思邈輩非不才也但各自名家而不能備明之開寶中節度使高繼沖曾編錄進上其文理舛錯未嘗考正歷代雖藏之書府亦闕於讐校是使治病之流舉天下無或知者國家詔儒臣校正醫書臣奇續被其選以為百病之急無急於傷寒今先校定張仲景傷寒論十卷總二十二篇證外合三百九十七法除複重定有一百一十二方今請頒行太子右贊善大夫臣高保衡尚書屯田員外郎

臣孫奇尚書司封郎中祕閣校理臣林億等謹上

醫林列傳

張機

張機字仲景南陽人也受業於同郡張伯祖善於治療尤精經方舉孝廉官至長沙太守後在京師爲名醫於當時爲上手以宗族二百餘口建安紀年以來未及十稔死者三之二而傷寒居其七乃著論二十二篇證外合三百九十七法一百一十二方其文辭簡古與雅古今治傷寒者未有能出其外者也其書爲諸方之祖時人以爲扁鵲倉公無以加之故後世稱爲醫聖

王叔和

王叔和高平人也性度沉靜博好經方尤精診處洞識養生之道深曉療病之源採摭羣論撰成脉經十卷叙陰陽表裏辨三部九候分人迎氣口神門條十二經二十四氣奇經八脉五藏六府三焦四時之病纖悉備具咸可按用凡九十七篇又次張仲景方論為三十六卷大行於世

成無已

成無已聊攝人家世儒醫性識明敏記問該博譔述傷寒義皆前人未經道者指在定體分形析證若同而異者明之似是而非者辨之古今言傷寒者祖張仲景但因其證而用之初未有發明其意義成無已博極研精深造自得本難素靈樞諸書以發明其奥因仲景方論以辨析其理極表裏虛實陰陽死生之說究藥病輕重去取加減之意真得長沙公之旨趣所著傷寒論十卷明理論三卷論方一卷大行於世

國子監

准　尚書禮部元祐三年八月八日符元祐三年八月七日酉時准　都省送下當月六日勑中書省勘會下項醫書冊數重大紙墨價高民間難以買置八月一日奉

聖旨令國子監別作小字雕印內有浙路小字本者令所屬官司校對別無差錯即摹印雕版並候了日廣行印造只收官紙工墨本價許民間請買仍送諸路出賣奉

勑如右牒到奉行前批八月七日未時付禮部施

行續准禮部符元祐三年九月二十日准
都省送下當月十七日
勅中書省尚書省送到國子監狀據書庫狀准
朝旨雕印小字傷寒論等醫書出賣契勘工錢約
支用五千餘貫未委於是何官錢支給應副使用
本監比欲依雕四子等體例於書庫賣書錢内借
支又緣所降
朝旨候雕造了日令只收官紙工墨本價即別不
收息慮日後難以撥還欲乞
朝廷特賜應副上件錢數支使候指揮尚書省勘
當欲用本監見在賣書錢候將来成書出賣每部
只收息壹分餘依元降指揮奉
聖旨依國子監主者一依
勅命指揮施行
治平二年二月四日
進呈奉
聖旨鏤版施行
朝奉郎守太子右贊善大夫同校正醫書飛
騎尉賜緋魚袋臣高保衡
宣德郎守尚書都官員外郎同校正醫書騎

都尉臣孫奇

朝奉郎守尚書司封郎中充祕閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億

翰林學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰宗正寺脩玉牒官兼判太常寺兼禮儀事兼判祕閣祕書省同提舉集禧觀公事兼提舉校正醫書所輕車都尉汝南郡開國侯食邑一千三百戶賜紫金魚袋臣范鎮

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事柱國天水郡開國公食邑三千戶食實封八百戶臣趙槩

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事柱國樂安郡開國公食邑二千八百戶食實封八百戶臣歐陽脩

推忠協謀同德佐理功臣特進行中書侍郎兼戶部尚書同中書門下平章事集賢殿大學士上柱國廬陵郡開國公食邑七千一百戶食實封二千二百戶臣曾公亮

推忠協謀同德守正佐理功臣開府儀同三司
行尚書右僕射兼門下侍郎同中書門下
平章事昭文館大學士監脩國史兼譯經
潤文使上柱國衛國公食邑一萬七百戶
食實封三千八百戶臣韓琦

知兗州錄事參軍監國子監書庫臣郭直卿
奉議郎國子監主簿雲騎尉臣孫準
朝奉郎行國子監丞上騎都尉賜緋魚袋臣
何宗元

朝奉郎守國子司業輕車都尉賜緋魚袋臣
豐稷
朝請郎守國子司業上輕車都尉賜緋魚袋
臣盛僑
朝請大夫試國子祭酒直集賢院兼徐王府
翊善護軍臣鄭穆

中大夫守尚書右丞上輕車都尉保定縣開國
男食邑三百戶賜紫金魚袋臣胡宗愈
中大夫守尚書左丞上護軍太原郡開國侯食

邑一千八百户食實封二百户賜紫金魚
袋臣王存
中大夫守中書侍郎護軍彭城郡開國侯食邑
一千一百户食實封二百户賜紫金魚袋
臣劉摯
正議大夫守門下侍郎上柱國樂安郡開國公
食邑四千户食實封九百户臣孫固
太中大夫守尚書右僕射兼中書侍郎上柱國
高平郡開國侯食邑一千六百户食實封
五百户臣范純仁

太中大夫守尚書左僕射兼門下侍郎上柱國
汲郡開國公食邑二千九百户食實封六
百户臣呂大防

仲景全書目錄

翻刻宋板傷寒論全文

卷第一
辨脉法　平脉法
卷第二
傷寒例　辨痓濕暍脉證
辨太陽病脉證并治上
卷第三
辨太陽病脉證并治中
卷第四

辨太陽病脉證并治下
卷第五
辨陽明病脉證并治
辨少陽病脉證并治
卷第六
辨太陰病脉證并治
辨少陰病脉證并治
辨厥陰病脉證并治
卷第七
辨霍亂病脉證并治
辨陰陽易差病脉證并治
辨不可發汗病脉證并治
辨可發汗病脉證并治
卷第八
辨發汗後病脉證并治
辨不可吐　辨可吐
卷第九
辨不可下病脉證并治
辨可下病脉證并治
卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治
○成無已註解傷寒論
首卷
南政三陰六圖　北政三陰六圖
南政陰陽交四圖　北政陰陽交四圖
三陽上下加臨補瀉病證三圖
三陰上下加臨補瀉病證三圖
五運六氣主病加臨轉移之圖
運氣圖解
釋運氣加臨民病吉凶圖
汗差棺墓總括歌
運氣加臨五圖
卷第一　無方
辨脉法
平脉法
卷第二　方六道
傷寒例
辨痓濕暍脉證
辨太陽病脉證并治上
桂枝湯　桂枝二越婢一湯

甘草乾薑湯　芍藥甘草湯
調胃承氣湯　四逆湯
卷第三　方二十七道
辨太陽病脉證并治中
葛根湯　葛根黃芩黃連湯
麻黃湯　大青龍湯
小青龍湯　乾薑附子湯
麻黃杏仁甘草石膏湯
桂枝甘草湯　茯苓桂枝甘草大棗湯
厚朴生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯
芍藥甘草附子湯　茯苓四逆湯
五苓散　茯苓甘草湯
梔子豉湯　梔子厚朴湯
梔子乾薑湯　小柴胡湯
小建中湯　大柴胡湯
桃核承氣湯　柴胡加龍骨牡礪湯
救逆湯　桂枝甘草龍骨牡礪湯
抵當湯　抵當丸
卷第四　方一十九道

辨太陽病脉證并治下
大陷胸丸　大陷胸湯
小陷胸湯　文蛤散
白散　柴胡桂枝乾薑湯
半夏瀉心湯　十棗湯
大黃黃連瀉心湯　赤石禹餘粮湯
旋伏代赭湯　桂枝人參湯
瓜蒂散　黃芩湯
黃連湯　桂枝附子湯
甘草附子湯　白虎湯

灸甘草湯
卷第五　方十道
辨陽明病脉證并治
大承氣湯　小承氣湯
猪苓湯　蜜煎導方
猪膽汁方　茵蔯蒿湯
吳茱萸湯　麻人丸
梔子蘗皮湯　麻黃連軺赤小豆湯
辨少陽病脉證并治
卷第六　方二十道

辨太陰病脉證并治
辨少陰病脉證并治
麻黃附子細辛湯　麻黃附子甘草湯
黃連阿膠湯　附子湯
桃花湯　猪膚湯
甘草湯　桔梗湯
苦酒湯　半夏散及湯
白通湯　白通加猪膽汁湯
真武湯　通脉四逆湯
四逆散

辨厥陰病脉證并治
烏梅丸　當歸四逆湯
麻黃升麻湯
乾薑黃芩黃連人參湯
白頭翁湯
卷第七　方五道
辨霍亂病脉證并治
理中丸　理中湯附
辨陰陽易差病脉證并治
燒裩散　枳實梔子湯

牡礪澤瀉散　竹葉石膏湯
辨不可發汗病脉證并治
辨可發汗病脉證并治
卷第八　無方
辨發汗後病脉證并治
辨不可吐
辨可吐
卷第九　無方
辨不可下病脉證并治
辨可下病脉證并治

卷第十　無方
辨發汗吐下後病脉證并治
此下二十五方雖於隨證下有之緣多以加減爲文似未詳備故復載方在末卷
桂枝加葛根湯　桂枝加厚朴杏子湯
桂枝加附子湯（朮附湯方附）　桂枝去芍藥湯
桂枝去芍藥附子湯　桂枝麻黄各半湯
桂枝二麻黄一湯　白虎加人參湯
桂枝去桂茯苓白朮湯（已上九方證在第二卷）
葛根加半夏湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯
梔子甘草豉湯　梔子生薑豉湯
柴胡加芒消湯
桂枝加桂湯 已上六方證在第三卷
附子瀉心湯　柴胡桂枝湯
甘草瀉心湯　生薑瀉心湯
黃芩加半夏生薑湯 已上五方證在第四卷
桂枝加大黃湯　桂枝加芍藥湯
四逆加吳茱萸生薑湯 已上三方證在第六卷
四逆加人參湯
四逆加猪膽汁湯方 已上二方證在第七卷

已上十卷內計方一百一十二道

此經方劑並按古法錙銖分兩與今不同謂如咬咀者即今之剉如麻豆大是也云一升者即今之大白盞也云銖者六銖為一分即二錢半也二十四銖為一兩也云三兩者即今之一兩云二兩即今之六錢半也料例大者只合三分之一足矣

傷寒類證

卷上

嘔吐門第一

頭痛門第二

頭汗門第三　頭眩門第四
目門第五　衄血門第六
口門第七　白胎門第八
身疼門第九　自汗門第十
惡風門第十一　惡寒門第十二
發斑門第十三　寒斑門第十四
潮斑門第十五

卷中

厥門第十六　喘門第十七
咳門第十八　渴門第十九
咽痛門第二十　項强門第二十一
胃滿門第二十二　結胸門第二十三
心下痞悶門第二十四　心下滿痛門第二十五
心下悸門第二十六　脇滿門第二十七
腹滿門第二十八　腹痛門第二十九
少腹滿門第三十　下利門第三十一
下利膿血門第三十二　大便硬門第三十三
大便難門第三十四　不大便門第三十五
小便不利門第三十六　小便難門第三十七
小便數門第三十八　小便自利門第三十九

小便清門 第四十
卷下
冒門 第四十一　煩門 第四十二
躁煩門 第四十三　發狂門 第四十四
心中懊憹門 第四十五　發黃門 第四十六
不得眠門 第四十七　身瞤門 第四十八
噦噫門 第四十九　雜門 第五十
金匱要畧方論
卷上
臟腑經絡先後第一　論十三首　脉證二條

痓濕暍第二　論一首　脉證十二條　方十一首
括蔞桂枝湯　葛根湯
大承氣湯　麻黃加朮湯
麻黃杏仁薏苡甘草湯
防己黃耆湯　桂枝附子湯
白朮附子湯　甘草附子湯
白虎人參湯　瓜蒂散
百合狐惑陰陽毒第三　論一首　證三條　方十一首
百合知母湯　滑石代赭湯
百合雞子湯　百合地黃湯

百合洗方　括蔞牡蠣散
百合滑石散　茸草瀉心湯
雄黃熏方　赤小豆當歸散
升麻鱉甲湯
瘧病第四　證二條　方六首
鼈甲煎丸　白虎加桂枝湯
蜀漆散
附方
牡蠣湯　柴胡桂枝生姜湯
柴胡去半夏加括蔞湯

中風歷節第五　論一首　脉證三條　方十二首
戾氏黑散　風引湯
防風地黃湯　頭風摩散
桂枝芍藥知母湯　烏頭湯
礬石湯
附方
續命湯　三黃湯
术附湯　八味圓
越婢加术湯
血痺血勞第六　論一首　脉證九　方十首

黃耆桂枝五物湯　桂枝加龍骨牡蠣湯
天雄散　小建中湯
黃芪建中湯　薯蕷丸
大黃䗪蟲丸　酸棗湯
附方
炙甘草湯　獺肝散
肺痿肺癰欬嗽上氣第七　論三首　脈證四條　方十六首
甘草乾姜湯　射干麻黃湯
皂莢丸　厚朴麻黃湯
澤漆湯　麥門冬湯
葶藶大棗瀉肺湯　桔梗湯
越婢加半夏湯　小青龍加石膏湯
附方
炙甘草湯　甘草湯
生姜甘草湯　桂枝皂莢湯
桔梗白散　薏苡湯
奔豚氣第八　論二首　方三首
奔豚湯　桂枝加桂湯
茯苓桂枝甘草大棗湯
胸痺心痛短氣第九　論一首　脈證一條　方十首

括蔞薤白白酒湯　括蔞薤白半夏湯
枳實薤白桂枝湯　人參湯
茯苓杏仁甘草湯　橘皮枳實生姜湯
薏苡附子湯　桂枝生姜枳實湯
赤石脂丸　九痛丸
腹滿寒疝宿食第十　論一首　脉證十六條　方十八首
厚朴七物湯　附子粳米湯
厚朴三物湯　大柴胡湯
大承氣湯　大建中湯
大黃附子湯　赤丸

烏頭煎　當歸生姜羊肉湯
烏頭桂枝湯　桂枝湯
附方
烏頭湯　柴胡桂枝湯
走馬湯　瓜蒂散

卷中

五臟風寒積聚第十一　論二首　脉證十七條　方二首
麻子仁丸　甘草乾姜茯苓白朮湯
痰飲欬嗽第十二　論一首　脉證二十一條　方十八首
茯苓桂枝白朮甘草湯　甘遂半夏湯

十棗湯　大青龍湯　小青龍湯
朮防已湯　朮防已加茯苓芒硝湯
澤瀉湯　厚朴大黃湯　小半夏湯
防已椒目葶藶大黃丸
小半夏加茯苓湯　五苓散
附方　茯苓飲
桂苓五味甘草湯　苓甘五味姜辛湯
茯苓五味甘草去桂加姜辛夏湯
茯苓甘草五味姜辛湯
茯甘姜味辛夏仁黃湯

消渴小便利淋第十三　脈證九條　方六首

文蛤散　括蔞瞿麥丸
蒲灰散　滑石白魚散
茯苓戎鹽湯　豬苓湯

水氣病第十四　論七首　脈證五條　方十一首

防已黃耆湯　越婢湯
防已茯苓湯　越婢加朮湯
甘草麻黃湯　附子麻黃湯
杏子湯　黃耆芍藥桂枝苦酒湯
桂枝加黃耆湯　枳實白朮湯

桂枝去芍藥加麻黃辛附湯
黃疸病第十五 論二首 脉證十四條 方八首
茵蔯蒿湯 消石礬石散
梔枳大黃湯 猪膏髮煎
茵蔯五苓散 大黃黃蘗梔消湯
附方
瓜蒂湯 麻黃醇酒湯
驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六 脉證十二條 方五首
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
半夏麻黃丸 柏葉湯
黃土湯 瀉心湯
嘔吐噦下利第十七 論一首 脉證二十七條 方二十四首
茱萸湯 半夏瀉心湯
黃芩半夏生姜湯 猪苓散
四逆湯 小柴胡湯
大半夏湯 大黃甘草湯
茯苓澤瀉湯 文蛤湯
半夏乾姜散 生姜半夏湯
橘皮湯 橘皮竹茹湯
四逆湯 桂枝湯

小承氣湯　桃花湯
白頭翁湯　梔子豉湯
通脉四逆湯　炙參湯
訶梨勒散
附方
黃芩湯
瘡癰腸癰浸淫第十八　論一首　脉證三條　方五首
薏苡附子敗醬散　大黃牡丹湯
王不留行散　排膿散
排膿湯

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲第十九　論一首　脉證一條　方四首
雞屎白散　蜘蛛散
丹草粉蜜湯　烏梅丸

卷下

婦人妊娠第二十　證三條　方八首
桂枝茯苓丸　膠艾湯
當歸芍藥散　乾姜人參半夏丸
當歸貝母苦參丸　葵子茯苓散
當歸散　白朮散

婦人產後病第二十一　論一首　證六條　方十首
小柴胡湯　大承氣湯
當歸生姜羊肉湯　枳實芍藥散
下瘀血湯　竹葉湯
竹皮大丸　白頭翁加甘草阿膠湯
附方
三物黃芩湯　內補當歸建中湯
婦人雜病第二十二　論一首　脈證十四條　方十七首
半夏厚朴湯　甘草小麥湯
小青龍湯　瀉心湯
溫經湯　土瓜根湯
旋覆花湯　大黃甘遂湯
抵當湯　礬石丸
紅藍花酒　當歸芍藥散
小建中湯　腎氣丸
蛇床子散　狼牙湯
小兒痘疹餘齒方
雜療第二十三　論一首　證一條　方二十二首
四時加減柴胡飲　長服訶梨勒丸
三物備急丸　紫石寒食散

救卒死方 共五方
救卒死而壯熱方
救卒死而目閉者方
救卒死而張口反折者方
救卒死而四肢不收失便方
治屍厥方 共二方
救小兒卒死而吐利不知何病方
救卒死客忤方 共二方
救自縊死方
療中暍方
救溺死方
馬墜及一切筋骨損方
禽獸蟲魚禁忌第二十四 論辯二首 九法 方二十首

治自死六畜肉中毒方
治食鼈肉漏脯中毒方
治食生肉中毒方
治黍米中藏干脯食之中毒方
治食六畜鳥獸肝中毒方
治馬肝毒中人未死方二
治食馬肉中毒欲死方
治食噉蛇牛肉欲死方二
治食牛肉中毒方
治食犬肉不消成病方

治食鳥獸中箭肉毒方
治食鱠不化成癥病方二
治食魚後食毒兩種煩亂方
治食鯸鮧魚中毒方

果實菜穀禁忌第二十五

治食諸果中毒方
食諸菌中毒悶亂欲死方
食躁式躁方
治誤食鈎吻殺人解之方
治誤食水莨菪中毒方
治食芹菜中龍精毒方
治食苦瓠中毒方
治凡飲食中毒方
貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

傷寒論卷第一　仲景全書第一

漢　張仲景述　晉　王叔和撰次

宋　林　億校正

明　趙開美校刻

沈　琳仝校

辨脉法第一

平脉法第二

辨脉法第一

問曰。脉有陰陽。何謂也。答曰。凡脉大浮數動滑。此名陽也。脉沈濇弱弦微。此名陰也。凡陰病見陽脉者生。陽病見陰脉者死。

問曰脉有陽結陰結者何以別之荅曰其脉浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脉沈而遲不能食身體重大便反鞕音硬下同名曰陰結也期十四日當劇

問曰病有洒淅惡寒而復發熱者何荅曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之曰何謂陽不足荅曰假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也曰何謂陰不足荅曰尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也陽脉浮一作微陰脉弱者則血虛血虛則筋急也其脉沈者榮氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也榮氣微者加燒針則血留不行更發熱而躁煩也

脉躊躇如車蓋者名曰陽結也一云秋脉

脉累累如循長竿者名曰陰結也一云夏脉

脉瞥瞥如羹上肥者陽氣微也

脉縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也一云陰氣

脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血也

脉来緩時一止復来者名曰結脉来數時一止復来者名曰促一作縱脉陽盛則促陰盛則結此皆病脉

陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也

陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰脉與陽脉同等者名曰緩也

脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無常也

脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脉浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故當汗出而解也若脉浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但汗出耳不發戰也

問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脉大而浮數故知不戰汗出而解也

問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脉自微此以曾發汗若吐若下若亡血以內無津液此陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也

問曰。傷寒三日。脉浮數而微。病人身涼和者。何也。
荅曰。此為欲解也。解以夜半。脉浮而解者。濈然汗出也。脉數而解者。必能食也。脉微而解者必大汗出也。
問曰。脉病欲知愈未愈者。何以別之。荅曰。寸口關上尺中三處。大小浮沈遲數同等。雖有寒熱不解者。此脉陰陽為和平。雖劇當愈。
師曰。立夏得洪（一作浮）大脉。是其本位。其人病身體苦疼重者。須發其汗。若明日身不疼不重者。不須發汗。若汗濈濈自出者。明日便解矣。何以言之。立夏脉洪大。是其時脉。故使然也。四時倣此。
問曰。凡病欲知何時得。何時愈。荅曰。假令夜半得病者。明日日中愈。日中得病者。夜半愈。何以言之。日中得病。夜半愈者。以陽得陰則解也。夜半得病。明日日中愈者。以陰得陽則解也。
寸口脉浮為在表。沈為在裏。數為在府。遲為在藏。假令脉遲。此為在藏也。
趺陽脉浮而濇。少陰脉如經者。其病在脾。法當下利。何以知之。若脉浮大者。氣實血虛也。今趺陽脉浮而濇。故知脾氣不足。胃氣虛也。以少陰脉弦而

浮（一作沈）纔見此為調脉故稱如經也若反滑而數者故知當屎膿也（玉函作溺）

寸口脉浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗也

趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便鞕氣噫而除何以言之本以數脉動脾其數先微故知脾氣不治大便鞕氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如法病者則飢數脉不時則生惡瘡也

師曰病人脉微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲濇故知亡血也

脉浮而大。心下反鞕。有熱。屬藏者。攻之。不令發汗。屬府者。不令溲數。溲數則大便鞕。汗多則熱愈。汗少則便難。脉遲尚未可攻。

脉浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。此為命絕也。又未知何藏先受其災。若汗出髮潤。喘不休者。此為肺先絕也。陽反獨留。形體如煙熏。直視搖頭者。此為心絕也。唇吻反青。四肢漐習者。此為肝絕也。環口黧黑。柔汗發黃者。此為脾絕也。溲便遺失。狂言目反直視者。此為腎絕也。又未知何藏陰陽前絕。若陽氣前絕。陰氣後竭者。其人死身色必青。陰氣前絕。陽氣後竭者。其人死身色必赤。腋下溫。心下熱也。

寸口脉浮大。而醫反下之。此為大逆。浮則無血。大則為寒。寒氣相搏。則為腸鳴。醫乃不知而反飲冷水。令汗大出。水得寒氣。冷必相搏。其人即餲。音噎下同

趺陽脉浮。浮則為虛。浮虛相搏。故令氣餲。言胃氣虛竭也。脉滑則為噦。此為醫咎。責虛取實。守空迫血。脉浮。鼻中燥者。必衄也。

諸脉浮數。當發熱而洒淅惡寒。若有痛處。飲食如常者。畜積有膿也。

脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者差遲遲為無陽不能作汗其身必痒也寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛胫酸所為陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣為慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相涸內外不通上焦怫音佛下同鬱藏氣相熏口爛食斷也中焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中為濁榮衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經絡出入藏府熱氣所過則為癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣內入噫而出之聲嗢乙骨切咽塞寒厥相追為熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不盡一作闔清便下重令便數難齊築淅痛命將難全

脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥踡臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足温者此為欲解或到八日以上反大發

熱者此為難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也

脉陰陽俱緊至於吐利其脉獨不解緊去入安此為欲解若脉遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者為欲解病六七日手足三部脉皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也若脉和其人大煩目重臉內際黃者此欲解也

脉浮而數浮為風數為虛風為熱虛為寒風虛相搏則洒淅惡寒也

脉浮而滑浮為陽滑為實陽實相搏其脉數疾衛氣失度浮滑之脉數疾發熱汗出者此為不治

傷寒欲逆上氣其脉散者死謂其形損故也

平脉法第二

問曰脉有三部陰陽相乘榮衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作效象形容春弦秋浮冬沈夏洪察色觀脉大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願為具陳令得分明師曰子之所問道之

根源脉有三部尺寸及關榮衛流行不失銖分出入升降沈心洪肺浮肝弦此自經常不失銖分出入升降漏刻周旋水下百刻一周循環當復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沈潛水濇支飲急弦動則為痛數則熱煩諺有不應知變所緣三部不同病各異端大過可怪不及亦然邪不空見終必有奸審察表裏三焦別焉知其所舍消息診看料度府藏獨見若神為子條記傳與賢人

師曰呼吸者脉之頭也初持脉來疾去遲此出疾入遲名曰內虛外實也初持脉來遲去疾此出遲入疾名曰內實外虛也

問曰上工望而知之中工問而知之下工脉而知之願聞其說師曰病家人請云病人苦發熱身體疼病人自臥師到診其脉沈而遲者知其差也何以知之若表有病者脉當浮大今脉反沈遲故知愈也假令病人云腹內卒痛病人自坐師到脉之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脉當沈而細今脉浮大故知愈也

師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病

人向壁臥此熱已去也設令脉不和處言已愈設令向壁臥聞師到不驚起而眄視若三言三止脉之瞤唾者此詐病也設令脉自和處言此病大重當須服吐下藥針灸數十百處乃愈

師持脉病人欠者無病也脉之呻者病也言遲者風也搖頭言者裏痛也行遲者表強也坐而伏者短氣也坐而下一脚者腰痛也裏實護腹如懷卵物者心痛也

師曰伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有伏氣當須脉之若脉微弱者當喉中痛似

傷非喉痺也病人云實咽中痛雖爾今復欲下利

問曰人恐怖者其脉何狀師曰脉形如循絲累累然其面白脫色也

問曰人不飲其脉何類師曰脉自濇唇口乾燥也

問曰人愧者其脉何類師曰脉浮而面色下白下赤

問曰經說脉有三菽六菽重者何謂也師曰脉人以指按之如三菽之重者肺氣也如六菽之重者心氣也如九菽之重者脾氣也如十二菽之重者肝氣也按之至骨者腎氣也菽者小豆也假令下利寸

口關上尺中悉不見脉然尺中時一小見脉再舉頭一云按按者腎氣也若見損脉来至為難治腎為脾所勝脾勝不應時

問曰脉有相乘有縱有横有逆有順何謂也師曰水行乘火金行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰横水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也

問曰脉有殘賊何謂也師曰脉有弦緊浮滑沈濇此六脉名曰殘賊能為諸脉作病也

問曰脉有災怪何謂也師曰假令人病脉得太陽

與形證相應因為作湯比還送湯如食頃病人乃大吐若下利腹中痛師曰我前来不見此證今乃變異是名災怪又問曰何緣作此吐利荅曰或有舊時服藥今乃發作故為災怪耳

問曰東方肝脉其形何似師曰肝者木也名厥陰其脉微弦濡弱而長是肝脉也肝病自得濡弱者愈也假令得純弦脉者死何以知之以其脉如弦直此是肝藏傷故知死也

南方心脉其形何似師曰心者火也名少陰其脉洪大而長是心脉也心病自得洪大者愈也假令

脉来微去大故名反病在裏也脉来頭小本大故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死西方肺脉其形何似師曰肺者金也名太陰其脉毛浮也肺病自得此脉若得緩遲者皆愈若得數者則劇何以知之數者南方火火剋西方金法當癰腫為難治也

問曰二月得毛浮脉何以處言至秋當死師曰二月之時脉當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝屬木脉應濡弱反得毛浮脉者是肺脉也肺屬金金来剋木故知至秋死他皆倣此

師曰脉肥人責浮瘦人責沈肥人當沈今反浮瘦人當浮今反沈故責之

師曰寸脉下不至關為陽絶尺脉上不至關為陰絶此皆不治決死也若計其餘命生死之期期以月節剋之也

師曰脉病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人者短命則死人病脉不病名曰内虚以無穀神雖困無苦

問曰翕奄沈名曰滑何謂也師曰沈為純陰翕為

正陽陰陽和合故令脉滑關尺自平陽明脉微沈食飲自可少陰脉微滑滑者緊之浮名也此為陰實其人必股內汗出陰下濕也

問曰曾為人所難緊脉從何而来師曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脉緊也假令欬者坐飲冷水故令脉緊也假令下利以胃虛冷故令脉緊也

寸口衛氣盛名曰高（高者暴在而肥）榮氣盛名曰章（章者暴羸而光）高章相搏名曰綱（綱者身筋急脉強直故也）衛氣弱名曰惵榮氣弱名曰卑（卑者心中常自羞愧）惵卑相搏名曰損（損者五藏六府俱之氣虛憊故也）衛氣和名曰緩（緩者四肢不能自收）

榮氣和名曰遲（遲者身體俱重但欲眠也）緩遲相搏名曰沈（沈者腰中直腰內急痛但欲臥不欲行）

寸口脉緩而遲緩則陽氣長其色鮮光其聲商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮鞕陰陽相抱榮衛俱行剛柔相得名曰強也

趺陽脉滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強痛還自傷以手把刃坐作瘡也

寸口脉浮而大浮為虛大為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆

趺陽脉伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得

入名曰關格。

脉浮而大。浮為風虛。大為氣强。風氣相搏。必成隱瘮。身體為痒。痒者名泄風。久久為痂癩。眉少髮稀。身有乾瘡。而腥臭也。

寸口脉弱而遲。弱者衛氣微。遲者榮中寒。榮為血。血寒則發熱。衛為氣。氣微者心內飢。飢而虛滿。不能食也。

趺陽脉大而緊者。當即下利。為難治。

寸口脉弱而緩。弱者陽氣不足。緩者胃氣有餘。噫而吞酸。食卒不下。氣填於膈上也。一作下

趺陽脉緊而浮。浮為氣。緊為寒。浮為腹滿。緊為絞痛。浮緊相搏。腸鳴而轉。轉即氣動。膈氣乃下。少陰脉不出。其陰腫大而虛也。

寸口脉微而濇。微者衛氣不行。濇者榮氣不逮。榮衛不能相將。三焦無所仰。身體痺不仁。榮氣不足則煩疼。口難言。衛氣虛者則惡寒數欠。三焦不歸其部。上焦不歸者。噫而酢吞。中焦不歸者。不能消穀引食。下焦不歸者。則遺溲。

趺陽脉沈而數。沈為實。數消穀。緊者病難治。

寸口脉微而濇。微者衛氣衰。濇者榮氣不足。衛氣

衰面色黃榮氣不足面色青榮為根衛為葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆嘔腥吐涎沫也
趺陽脈浮而芤浮者衛氣虛芤者榮氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相搏宗氣微衰四屬斷絶（四屬者謂皮肉脂髓俱竭宗氣則衰矣）
寸口脈微而緩微者衛氣疎疎則其膚空緩者胃氣實實則穀消而水化也穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成榮盛則其膚必疎三焦絶經名曰血崩
趺陽脈微而緊緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣
少陰脈弱而濇弱者微煩濇者厥逆
趺陽脈不出脾不上下身冷膚鞕
少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃脘宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰服與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門巨闕（宗氣者三焦歸氣也有名無形氣之神使也下榮玉茎故宗筋聚縮之也）
寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗知陰常在絶不見陽也
寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊為寒諸

乘寒者則為厥鬱冒不仁以胃無穀氣脾濇不通口急不能言戰而慄也

問曰濡弱何以反適十一頭師曰五藏六府相乘故令十一

問曰何以知乘府何以知乘藏師曰諸陽浮數為乘府諸陰遲濇為乘藏也

傷寒論卷第二　仲景全書第二

漢　張仲景述　晉　王叔和撰次

宋　林　億校正

明　趙開美校刻

沈　琳仝校

傷寒例第三　辨痓濕暍脉證第四

辨太陽病脉證并治上第五

傷寒例第三

四時八節二十四氣七十二候決病法

立春正月節斗指艮　雨水正月中指寅

驚蟄二月節指甲　春分二月中指卯
清明三月節指乙　穀雨三月中指辰
立夏四月節指巽　小滿四月中指巳
芒種五月節指丙　夏至五月中指午
小暑六月節指丁　大暑六月中指未
立秋七月節指坤　處暑七月中指申
白露八月節指庚　秋分八月中指酉
寒露九月節指辛　霜降九月中指戌
立冬十月節指乾　小雪十月中指亥
大雪十一月節指壬　冬至十一月中指子
小寒十二月節指癸　大寒十二月中指丑

二十四氣節有十二中氣有十二五日為一候氣亦同合有七十二候決病生死此須洞解之也

陰陽大論云春氣温和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰列此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為温病至夏變為暑病暑病者熱極重於温也是以辛苦之人春夏多温熱

病者皆由冬時觸寒所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也夫欲候知四時正氣為病及時行疫氣之法皆當按斗曆占之九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而為雨水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便涼從霜降以後至春分以前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒

也九月十月寒氣尚微為病則輕十一月十二月寒列已嚴為病則重正月二月寒漸將解為病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即為病也其冬有非節之暖者名為冬温冬温之毒與傷寒大異冬温復有先後更相重沓亦有輕重為治不同證如後章從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為温病從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為

寒所折。病熱則重。七月八月。陽氣已衰。為寒所折。病熱亦微。其病與溫及暑病相似。但治有殊耳。十五日得一氣。於四時之中。一時有六氣。四六名為二十四氣。然氣候亦有應至仍不至。或有未應至而至者。或有至而太過者。皆成病氣也。但天地動靜。陰陽鼓擊者。各正一氣耳。是以彼春之暖為夏之暑。彼秋之忿為冬之怒。是故冬至之後。一陽交升。一陰交降也。夏至之後。一陽氣下。一陰氣上也。斯則冬夏二至。陰陽合也。春秋二分。陰陽離也。陰陽交易。人變病焉。此君子春夏養陽。秋冬養陰。順天地之剛柔也。小人觸冒。必嬰暴疹。須知毒烈之氣留在何經。而發何病。詳而取之。是以春傷於風。夏必飧泄。夏傷於暑。秋必病瘧。秋傷於濕。冬必咳嗽。冬傷於寒。春必病溫。此必然之道。可不審明之。傷寒之病。逐日淺深。以施方治。今世人傷寒。或始不早治。或治不對病。或日數久淹。困乃告醫。醫人又不依次第而治之。則不中病。皆宜臨時消息制方。無不效也。今搜採仲景舊論。錄其證候診脉聲色。對病真方。有神驗者。擬防世急也。

又土地溫涼高下不同。物性剛柔。飡居亦異。是故

黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟者臨病之工宜須兩審也。

凡傷於寒則為病熱熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死。

尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脉上連風府故頭項痛腰脊強。

尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥。

尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脉循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾此三經皆受病未入於府者可汗而已。

尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發以其脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾。

尺寸俱沈者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴。

尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮此三經皆受病已入於府可下而已。

若兩感於寒者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱

病則腹滿身熱不欲食譫之廉切又女監切下同語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行藏府不通則死矣其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹滅如故則思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也若過十三日以上不間寸尺陷者大危若更感

異氣變為他病者當依後壞病證而治之若脈陰陽俱盛重感於寒者變成溫瘧陽脈浮滑陰脈濡弱者更遇於風變為風溫陽脈洪數陰脈實大者更遇溫熱變為溫毒溫毒為病最重也陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變為溫疫一本作瘧以此冬傷於寒發為溫病脈之變證方治如說

凡人有疾不時即治隱忍異差以成痼疾小兒女子益以滋甚時氣不和便當早言尋其邪由及在腠理以時治之罕有不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制此為家有患備慮之要凡作

湯藥不可避晨夜覺病須史即宜便治不等早晚則易愈矣如或差遲病即傳變雖欲除治必難為力服藥不如方法縱意違師不須治之

凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有温覆而當不消散者不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能為禍也若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利頻躁諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣

夫陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背千里吉凶之機應若影響豈容易哉況桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃陰盛以亡死生之要在乎須臾視身之盡不暇計日此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹懵然不知病源為治乃誤使病者殞沒自謂其分至令冤魂塞於冥路死屍盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟

凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而

執迷用意者乃云神丹并遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違夫智者之舉錯也常審以慎愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉世上之士但務彼翕習之榮而莫見此傾危之敗惟明者居然能護其本近取諸身夫何遠之有焉

凡發汗温瘧湯藥其方雖言日三服若病劇不解當促其間可半日中盡三服若與病相阻即便有所覺病重者一日一夜當晬時觀之如服一劑病證猶在故當復作本湯服之至有不肯汗出服三劑乃解若汗不出者死病也

凡得時氣病至五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更與人作病也至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之也忽然大汗出是為自愈也

凡得病反能飲水此為欲愈之病其不曉病者但聞病飲水自愈小渴者乃强與飲之因成其禍不可復數也

凡得病厥脉動數。服湯藥更遲。脉浮大減小。初躁後靜。此皆愈證也。

凡治温病。可刺五十九穴。又身之穴三百六十有五。其三十穴灸之有害。七十九穴刺之為災。并中髓也。

脉四損。三日死。平人四息。病人脉一至名曰四損。

脉五損。一日死。平人五息。病人脉一至名曰五損。

脉六損。一時死。平人六息。病人脉一至名曰六損。

脉盛身寒。得之傷寒。脉虛身熱。得之傷暑。脉陰陽俱盛。大汗出不解者死。脉陰陽俱虛。熱不止者死。

脉至乍數乍踈者死。脉至如轉索。其日死。譫言妄語。身微熱。脉浮大。手足温者生。逆冷脉沈細者。不過一日死矣。此以前是傷寒熱病證候也。

辨痓濕暍脉證第四 痓音熾又作痙巨郢切下同

傷寒所致太陽病。痓濕暍此三種。宜應別論。以為與傷寒相似。故此見之。

太陽病發熱無汗。反惡寒者。名曰剛痓。

太陽病發熱汗出。而不惡寒。病源云惡寒。名曰柔痓。

太陽病。發熱脉沈而細者。名曰痓。

太陽病。發汗太多。因致痓。

病身熱足寒頭項强急惡寒時頭熱而赤目脉赤獨頭面搖卒口噤背反張者痓病也

太陽病關節疼痛而煩脉沈而細一作緩者此名濕痺一云中濕濕痺之候其人小便不利大便反快但當利其小便濕家之為病一身盡疼發熱身色如似熏黃濕家其人但頭汗出背强欲得被覆向火若下之早則噦胃滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒渴欲得水而不能飲口燥煩也濕家下之額上汗出微喘小便利一云不利者死若下利不止者亦死

問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲出汗者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

太陽中熱者。暍是也。其人汗出惡寒。身熱而渴也。太陽中暍者。身熱疼重。而脉微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中所致也。

太陽中暍者。發熱惡寒。身重而疼痛。其脉弦細芤遲。小便已。洒洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口開前板齒燥。若發汗。則惡寒甚。加温針。則發熱甚。數下之。則淋甚。

辨太陽病脉證并治上第五　合一十六法。方一十四首。

太陽中風。陽浮陰弱。熱發汗出。惡寒鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。第一。五味。前有太陽病一十一證。

太陽病。頭痛發熱汗出惡風者。桂枝湯主之。第二。用前第一方。

太陽病。項背强几几。反汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。第三。七味

太陽病。下之後。其氣上衝者。桂枝湯主之。第四。用前第一方。下有太陽壞病一證。

桂枝本為解肌。若脉浮緊。發熱汗不出者。不可與之。第五。下有酒客不可與桂枝一證。

喘家作桂枝湯。加厚朴杏子。第六。下有服湯吐膿血一證。

太陽病。發汗。遂漏不止。惡風小便難。四肢急難

以屈伸桂枝加附子湯主之第七六味
太陽病下之後脉促胷滿者桂枝去芍藥湯主之第八四味
若微寒者桂枝去芍藥加附子湯主之第九五味
太陽病八九日如瘧狀熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯第十七味
太陽病服桂枝湯煩不解先刺風池風府却與桂枝湯第十一用前第一方
服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯若形似瘧一日再發者宜桂枝二麻黃一湯第十二七味

服桂枝湯大汗出大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之第十三五味
太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者宜桂枝二越婢一湯第十四七味
服桂枝或下之頭項强痛發熱無汗心下滿痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之第十五六味
傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急與桂枝得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之厥愈更作芍藥甘草湯與之其脚伸若

胃氣不和。與調胃承氣湯。若重發汗。加燒針者。四逆湯主之第十六（甘草乾薑湯芍藥甘草湯並二味。調胃承氣湯。四逆湯並三味。）

太陽之為病。脉浮。頭項强痛而惡寒。

太陽病。發熱汗出。惡風脉緩者。名為中風。

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒體痛嘔逆。脉陰陽俱緊者。名為傷寒。

傷寒一日太陽受之。脉若靜者。為不傳。頗欲吐。若躁煩脉數急者。為傳也。

傷寒二三日陽明少陽證不見者。為不傳也。

太陽病。發熱而渴。不惡寒者。為温病。若發汗已。一云灼熱者。名風温。風温為病。脉陰陽俱浮。自汗出。身重。多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癎。時瘛瘲。若火熏之。一逆尚引日。再逆促命期。

病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽。七日愈。發於陰。六日愈。以陽數七。陰數六。故也。

太陽病。頭痛至七日以上自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。針足陽明。使經不傳。則愈。

太陽病欲解時從巳至未上風家表解而不了了者十二日愈病人身大熱反欲得衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之方一

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　甘草二兩炙

生薑三兩切　大棗十二枚擘

右五味㕮咀三味以水七升微火煮取三升去滓適寒温服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力温覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯主之方二用前第一方

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之方三

葛根四兩　麻黃二兩去節　芍藥二兩

生薑三兩切　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

桂枝二兩去皮

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌臣億等謹按仲景本論太陽中風自汗用桂枝傷寒無汗用麻黃今證云汗出惡風而方中有麻黃恐非本意也第二卷有葛根湯證云無汗惡風正與此方同是合用麻黃也此云桂枝加葛根湯恐是桂枝中但加葛根耳

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不得與之四

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與之也觀其脉證知犯何逆隨證治之桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與之也常須識此勿令誤也五

若酒客病不可與桂枝湯得之則嘔以酒客不喜甘故也

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳六

凡服桂枝湯吐者。其後必吐膿血也。
太陽病。發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。方七。

桂枝 三兩 去皮　芍藥 三兩　甘草 三兩 炙
生薑 三兩 切　大棗 十二枚 擘　附子 一枚 炮去皮破八片

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加附子。將息如前法。
太陽病下之後。脉促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。方八。（促一作纔）

桂枝 三兩 去皮　甘草 二兩 炙
生薑 三兩 切　大棗 十二枚 擘

右四味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥。將息如前法。
若微寒者。桂枝去芍藥加附子湯主之。方九。

桂枝 三兩 去皮　甘草 二兩 炙　生薑 三兩 切
大棗 十二枚 擘　附子 一枚 炮去皮破八片

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥。加附子。將息如前法。
太陽病。得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脉微緩者。

為欲愈也。脉微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出。身必痒。宜桂枝麻黃各半湯方十。

桂枝一兩十六銖去皮　芍藥　生薑切　甘草炙

麻黃各一兩去節　大棗四枚擘　杏仁二十四枚湯浸去皮尖及兩仁者

右七味。以水五升。先煑麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煑取一升八合。去滓。溫服六合。本云桂枝湯三合。麻黃湯三合。併為六合。頓服。將息如上法。臣億等謹按桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二枚。麻黃湯方麻黃三兩。桂枝二兩。甘草一兩。杏仁七十箇。今以算法約之。二湯各取三分之一。即得桂枝一兩十六銖。芍藥生薑甘草各一兩。大棗四枚。杏仁二十三箇。零三分枚之一。收之得二十四箇。合方。詳此方乃三分之一。非各半也。宜云合半湯。

太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。十一用前第一方。

服桂枝湯。大汗出。脉洪大者。與桂枝湯。如前法。若形似瘧。一日再發者。汗出必解。宜桂枝二麻黃一湯。方十二。

桂枝一兩十七銖去皮　芍藥一兩六銖　麻黃十六銖去節

生薑一兩六銖切　杏仁十六箇去皮尖　甘草一兩二銖炙

大棗五枚擘

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。本云桂枝湯二分。麻黃湯一分。合為二升。分再服。今合為一方。將息如前法。臣億等謹按桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二枚。麻黃湯方。麻黃三兩。桂枝二兩。甘草一兩。杏仁七十箇。今以算法約之。桂枝湯取十二分之五。即得桂枝芍藥生薑各一兩六銖。甘草二十銖。大棗五枚。麻黃湯取九分之二。即得麻黃十六銖。桂枝十銖。三分銖之二。收之得十一銖。甘草五銖。三分銖之一。收之得六銖。杏仁十五箇九分枚之四。收之得十六箇。二湯所取相合。即共得桂枝一兩十七銖。麻黃十六銖。生薑芍藥各一兩六銖。甘草一兩二銖。大棗五枚。杏仁十六箇合方。

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人參湯主之。方十三。

知母六兩　石膏一斤碎綿裹　甘草炙二兩　粳米六合　人參三兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。

申

太陽病。發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此無陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯。方十四。

桂枝去皮　芍藥　麻黃　甘草各十八銖炙　大棗四枚擘　生薑一兩二銖切　石膏二十四銖碎綿裹

右七味。以水五升。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本云當裁為越婢湯桂枝湯。合之飲一升。今合為一方。桂枝湯二分。越婢湯一分。臣億等謹按桂枝湯方桂枝芍藥生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚。越婢湯方麻黃二兩。生薑三兩甘草二兩石膏半斤。大棗十五枚。今以算法約之。桂枝湯取四分之一。即得桂枝芍藥生薑各十八銖甘草十二銖。大棗三枚。越婢湯取八分之一。即得麻黃十八銖。生薑九銖。甘草六銖。石膏二十四銖。大棗一枚八分之七。棄之。二湯所取相合。即共得桂枝芍藥甘草麻黃各十八銖。生薑一兩三銖。石膏二十四銖。大棗四枚。合方舊云。桂枝三。今取四分之一。即當云桂枝二也。越婢湯方見仲景雜方中。外臺秘要一云趺腫湯。

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。方十五。

芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑切　白朮　茯苓各三兩　大棗十二枚擘

右六味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。小便利則愈。本云桂枝湯。今去桂枝加茯苓白朮。

傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝。欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不

和讝語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之方十六

甘草乾薑湯方

甘草四兩炙　乾薑二兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分温再服

芍藥甘草湯方

白芍藥　甘草各四兩炙

右二味以水三升煮取一升五合去滓分温再服

調胃承氣湯方

大黃四兩去皮清酒洗　甘草二兩炙　芒消半升

右三味以水三升煮取一升去滓內芒消更上火微煮令沸少少温服之

四逆湯方

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾薑三兩

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而讝語師曰言夜半手足當温兩脚當伸

後如師言何以知此荅曰寸口脉浮而大浮為風大為虛風則生微熱虛則兩脛攣病形象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子温經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明内結譫語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微溏則止其譫語故知病可愈

漢　張仲景述　晋　王叔和撰次
宋　林　億校正
明　趙開美校刻
沈　琳仝校

辨太陽病脉證并治中第六　合六十六法方三十九首并見太陽陽明合病法

太陽病項背强几几無汗惡風葛根湯主之第一　七味

太陽陽明合病必自利葛根湯主之第二　用前第一

方一云用後第四方

太陽陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之第三八味

太陽病桂枝證醫反下之利不止葛根黃芩黃連湯主之第四四味

太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯主之第五四味

太陽陽明合病喘而胃滿不可下宜麻黃湯主之第六用前第五方

太陽病十日以去脉浮細而嗜臥者外已解設胃滿痛與小柴胡湯脉但浮者與麻黃湯第七用前第五方小柴胡湯七味

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之第八七味

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之第九用前第八方

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬小青龍湯主之第十八味加減法附

傷寒心下有水氣欬而微喘小青龍湯主之第十一用前第十方

太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯第十二五味

太陽病下之微喘者表未解桂枝加厚朴杏子湯主之第十三七味

太陽病外證未解不可下也下之為逆解外宜桂枝湯第十四用前第十二方

太陽病先發汗不解復下之脉浮者當解外宜桂枝湯第十五用前第十二方

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證在發汗已發煩必衄麻黃湯主之第十六

用前第五方下有太陽病并二陽併病四證

脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯第十七用前第五方一法用桂枝湯

脉浮數者可發汗宜麻黃湯第十八用前第五方

病常自汗出榮衛不和也發汗則愈宜桂枝湯第十九用前第十二方

病人藏無他病時自汗出衛氣不和也宜桂枝湯第二十用前第十二方

傷寒脉浮緊不發汗因衄麻黃湯主之第二十一用前第五方

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯小便清者知不在裏當發汗宜桂枝湯第二十二用前第十二方

傷寒發汗解半日許復熱煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯第二十三用前第十二方下別有三病證

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沈微者乾薑附子湯主之第二十四二味

發汗後身疼痛脉沈遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之第二十五六味

發汗後不可行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯第二十六四味

發汗過多其人叉手自冒心心悸欲得按者桂枝甘草湯主之第二十七二味

發汗後臍下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之第二十八四味下有作甘爛水法

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之第二十九五味

傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胷頭眩脉沈緊者茯苓桂枝白朮甘草湯主之第三十四味

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之第三十一　三味

發汗若下之不解煩躁者茯苓四逆湯主之第三十二　五味

發汗後惡寒虛故也不惡寒但熱者實也與調胃承氣湯第三十三　三味

太陽病發汗後大汗出胃中乾躁不能眠欲飲水小便不利者五苓散主之第三十四　五味即猪苓散是

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之第

用前第三十四方

傷寒汗出而渴者五苓散不渴者茯苓甘草湯主之第三十六　四味

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆五苓散主之第三十七　用前第三十四方下別有三病證

發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之第三十八　梔子豉湯二味梔子甘草豉湯梔子生薑豉湯並二味

發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯主之第三十九用上方

傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者梔子豉湯主之第四十用上方

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之第四十一三味

傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之第四十二二味下有不可與梔子湯一證

太陽病發汗不解仍發熱心下悸頭眩身瞤真武湯主之第四十三五味下有不可汗五證

汗家重發汗必恍惚心亂雹餘粮丸主之第四十四方本闕下有吐蚘先汗下二證

傷寒醫下之清穀不止身疼痛急當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯第四十五桂枝湯用前第十二方四逆湯三味

太陽病未解脉陰陽俱停陰脉微者下之解宜調胃承氣湯第四十六用前第三十三方一云用大承胡湯前有太陽病一證

太陽病發熱汗出榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯第四十七用前第十二方

傷寒五六日中風往来寒熱胷脅滿不欲食心煩喜嘔者小柴胡湯主之第四十八再見柴胡湯加減法附

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣分爭往来寒熱休作有時小柴胡湯主之第四十九用前方渴者陽明證附下有柴胡不中與一證

傷寒四五日身熱惡風項强脅下滿手足温而渴者小柴胡湯主之第五十用前方

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者小柴胡湯主之第五十一用前方小建中湯六味下有嘔家不可用建中湯并服小柴胡一證

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之第五十二用前第五十一方

太陽病過経十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在微煩者大柴胡湯主之第五十三加大黄八味

傷寒十三日不解胷脅滿而嘔日晡發潮熱柴胡加芒消湯主之第五十四入味

傷寒十三日過経譫語者調胃承氣湯主之第五十五用前第二十二方

太陽病不解熱結膀胱其人如狂宜桃核承氣湯第五十六 五味

傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利讝語身重者柴胡加龍骨牡蠣湯主之第五十七 十二味

傷寒腹滿讝語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門第五十八

傷寒發熱嘔而惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利此肝乘肺也名曰橫刺期門第五十九 下有太陽病二證

傷寒脉浮醫火劫之亡陽必驚狂臥起不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之第六十 七味下有不可火五證

燒針被寒針處核起必發奔豚氣桂枝加桂湯主之第六十一 五味

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之第六十二 四味下有太陽四證

太陽病過經十餘日溫溫欲吐胷中痛大便微溏與調胃承氣湯第六十三 用前第三方

太陽病六七日表證在脉微沈不結胷其人發狂以熱在下焦少腹滿小便自利者下血乃愈

抵當湯主之第六十四　四味

太陽病。身黃。脉沈結。少腹鞕。小便自利。其人如狂者。血證諦也。抵當湯主之第六十五　用前方。

傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。有血也。當下之。宜抵當丸第六十六　四味。下有太陽病一證。

太陽病。項背強几几。無汗。惡風。葛根湯主之方一。

葛根　四兩　麻黃　三兩　去節　桂枝　二兩　去皮　生薑　三兩　切　甘草　二兩　炙　芍藥　二兩　大棗　十二枚　擘

右七味。以水一斗。先煮麻黃葛根。減二升。去白沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。餘如桂枝法將息及禁忌。諸湯皆倣此。

太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之方二　用前第一方。一云用後第四方。

太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之方三。

葛根　四兩　麻黃　三兩　去節　甘草　二兩　炙　芍藥　二兩　桂枝　二兩　去皮　生薑　二兩　切　半夏　半升　洗　大棗　十二枚　擘

右八味。以水一斗。先煮葛根麻黃。減二升。去白

沫。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。

太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩黃連湯主之。方四。促一作縱。

葛根半斤　甘草二兩炙　黃芩三兩

黃連三兩

右四味。以水八升。先煮葛根。減二升。內諸藥煮取二升。去滓。分溫再服。

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。方五。

麻黃三兩去節　桂枝二兩去皮　甘草一兩炙

杏仁七十箇去皮尖

右四味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。

太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯。

太陽病十日以去。脉浮細而嗜臥者。外已解也。設胸滿脅痛者。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃湯。七

用前第五方。

小柴胡湯方

柴胡半斤　黃芩　人參　甘草炙　生薑各三兩切　大棗十二枚擘　半夏半升洗

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

太陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脉微弱。汗出惡風者。不可服之。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此為逆也。大青龍湯方。八。

麻黃六兩去節　桂枝二兩去皮　甘草二兩炙　杏仁四十枚去皮尖　生薑三兩切　大棗十枚擘　石膏如雞子大碎

右七味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉粉之。一服汗者。停後服。若復服。汗多亡陽。遂（一作逆）虛。惡風煩躁。不得眠也。

傷寒脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯發之。九用前第八方。

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴或

利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之方十

麻黃去節 芍藥 細辛 乾薑
甘草炙 桂枝各三兩去皮 五味子半升 半夏半升洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升若渴去半夏加栝樓根三兩若微利去麻黃加莞花如一雞子熬令赤色若噎者去麻黃加附子一枚炮若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升去皮尖且莞花不治利麻黃

主喘今此語反之疑非仲景意臣億等謹按小青龍湯大要治水又按本草莞花下水又按千金形腫者應內麻黃乃內杏仁者以麻黃發其陽故也以此證之豈非仲景意也

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之十一用前第十方

太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯方十二

桂枝去皮 芍藥 生薑各三兩切
甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升須

更啜熱稀粥一升助藥力取微汗
太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯主之方十三

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切
芍藥三兩　大棗十二枚擘　厚朴二兩炙去皮
杏仁五十枚去皮尖

右七味以水七升微火煮取三升去滓温服一升覆取微似汗

太陽病外證未解不可下也下之為逆欲解外宜桂枝湯十四用前第十二方

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故在外當須解外則愈宜桂枝湯十五用前第十二方

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黄湯主之十六用前第五方

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷

者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈

脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知然以榮氣不足血少故也

脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯十八用前第五方

病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯十九用前第十二方法用桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯二十用前第十二方

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之二十

一用前第五方

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者（一云大便青）知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必劇宜桂枝湯二十二用前第十二方

傷寒發汗已解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯二十三用前第十二方

凡病若發汗若吐若下若亡血亡津液陰陽自和者必自愈

大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱者乾薑附子湯主之方二十四

乾薑一兩　附子一枚生用去皮切八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後身疼痛脈沈遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之方二十五

桂枝二兩去皮　芍藥四兩　甘草二兩炙

人參三兩　大棗十二枚擘　生薑四兩

右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今加芍藥生薑人參

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯方二十六

麻黃四兩去節　杏仁五十箇去皮尖　甘草二兩炙

石膏半斤碎綿裹

右四味以水七升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升本云黃耳杯

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂

枝甘草湯主之方二十七

桂枝四兩去皮　甘草二兩炙

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之方二十八

茯苓半斤　桂枝四兩去皮　甘草二兩炙

大棗十五枚擘

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水

上有珠子五六千顆相逐。取用之。

發汗後。腹脹滿者。厚朴生薑半夏甘草人參湯主之。方二十九。

厚朴半斤炙去皮　生薑半斤切　半夏半升洗

甘草二兩　人參一兩

右五味。以水一斗。煑取三升。去滓。溫服一升。日三服。

傷寒若吐。若下後。心下逆滿。氣上衝胷。起則頭眩。脉沈緊。發汗則動經。身為振振搖者。茯苓桂枝白朮甘草湯主之。方三十。

茯苓四兩　桂枝三兩去皮　白朮　甘草各二兩炙

右四味。以水六升。煑取三升。去滓。分溫三服。

發汗。病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。方三十一。

芍藥　甘草各三兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右三味。以水五升。煑取一升五合。去滓。分溫三服。疑非仲景方。

發汗。若下之。病仍不解。煩躁者。茯苓四逆湯主之。方三十二。

茯苓四兩　人參一兩　附子一枚生用去皮破八片

甘草二兩炙　乾薑一兩半

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日二服

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯方三十三（王函云與小承氣湯）

芒消半升　甘草二兩炙　大黃四兩去皮清酒洗

右三味以水三升煮取一升去滓內芒消更煮兩沸頓服

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散主之方三十四（即豬苓散是）

豬苓十八銖去皮　澤瀉一兩六銖　白朮十八銖

茯苓十八銖　桂枝半兩去皮

右五味擣為散以白飲和服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈如法將息

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之三十五（用前第三十四方）

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之方三十六

茯苓二兩　桂枝二兩去皮　甘草一兩炙　生薑三兩切

右四味。以水四升。煮取二升。去滓。分温三服。中風發熱。六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。三十七。用前第三十四方。

未持脉時。病人手叉自冒心。師因教試令欬而不欬者。此必兩耳聾無聞也。所以然者。以重發汗虚故如此。發汗後。飲水多必喘。以水灌之亦喘。發汗後。水藥不得入口為逆。若更發汗。必吐下不止。發汗吐下後。虚煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。音到下同心中懊憹。上烏浩下奴冬切下同梔子豉湯主之。若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。三十八。

梔子豉湯方

梔子十四箇擘 香豉四合綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。內豉。煮取一升半。去滓。分為二服。温進一服。得吐者止後服。

梔子甘草豉湯方

梔子十四箇擘 甘草二兩炙 香豉四合綿裹

右三味。以水四升。先煮梔子甘草。取二升半。內

豉煮取一升半去滓分二服温進一服得吐者止後服

梔子生薑豉湯方

梔子十四箇擘　生薑五兩　香豉四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子生薑取二升半內豉煮取一升半去滓分二服温進一服得吐者止後服

發汗若下之而煩熱胷中窒者梔子豉湯主之三十九用上汾方

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之四十用上汾方

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之方四十一

梔子十四箇擘　厚朴四兩炙去皮　枳實四枚水浸炙令黃

右三味以水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服得吐者止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之方四十二

梔子十四箇擘　乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服

温進一服得吐者止後服。

凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服之。

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗一作僻地者真武湯主之方四十三。

茯苓　芍藥　生薑各三兩切　白朮二兩　附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服。

咽喉乾燥者不可發汗。

淋家不可發汗發汗必便血。

瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痙。

衄家不可發汗汗出必額上陷脈急緊直視不能眴音絢又胡絹切下同一作瞬不得眠。

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振。

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘粮丸四十四方本闕

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘一作逆

本發汗而復下之此為逆也若先發汗治不為逆本先下之而反汗之為逆若先下之治不為逆。

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯四十五用前第十二方

病發熱頭痛脉反沈若不差身體疼痛當救其裏四逆湯方

甘草二兩炙 乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾薑三兩

太陽病先下而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也裏未和然後復下之

太陽病未解脉陰陽俱停一作微必先振慄汗出而解但陽脉微者先汗出而解但陰脉微一作尺脉實者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯四十六用前第三十三方一云用大柴胡湯

太陽病發熱汗出者此為榮弱衛强故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯四十七方用前法

傷寒五六日中風往來寒熱胷脅苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微

熱或欬者。小柴胡湯主之。方四十八。

柴胡半斤　黃芩三兩　人參三兩

半夏半升洗　甘草炙　生薑各三兩切

大棗十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。若胷中煩而不嘔者去半夏人參。加栝樓實一枚。若渴去半夏加人參。合前成四兩半。栝樓根四兩。若腹中痛者去黃芩。加芍藥三兩。若脅下痞鞕去大棗加牡蠣四兩。若心下悸小便不利者去黃芩。加茯苓四兩。若不渴外有微熱者。去人參。加桂枝三兩温覆微汗愈。若欬者去人參大棗生薑加五味子半升。乾薑二兩。

血弱氣盡腠理開邪氣因入。與正氣相搏。結於脅下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。嘿嘿不欲飲食。藏府相連。其痛必下。邪高痛下。故使嘔也。（一云藏府相違其病必下脅下痛）小柴胡湯主之。服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之。四十九用前方

得病六七日。脉遲浮弱。惡風寒。手足温。醫二三下之。不能食而脅下滿痛。面目及身黃。頸項强。小便

難者與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦

傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之五十用前方

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者小柴胡湯主之五十一用前方

小建中湯方

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

芍藥六兩　生薑三兩切　膠飴一升

右六味以水七升煑取三升去滓內飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却復發熱汗出而解

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之五十二用前第五十一方

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急一云嘔止小安鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈方五

十三。

柴胡半斤　黃芩三兩　芍藥三兩
半夏半升洗　生薑五兩切　枳實四枚炙
大棗十二枚擘

右七味。以水一斗二升煮取六升。去滓再煎溫服一升。日三服。一方加大黃二兩。若不加。恐不為大柴胡湯。

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此本柴胡證。下之以不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。此非其治也。潮熱者。實也。先宜服小柴胡湯以解外。後以柴胡加芒消湯主之。五十四。

柴胡二兩十六銖　黃芩一兩　人參一兩
甘草一兩炙　生薑一兩切　半夏二十銖本云五枚洗
大棗四枚擘　芒消二兩

右八味。以水四升煮取二升。去滓。內芒消。更煮微沸。分溫再服。不解更作。臣億等謹按金匱玉函方中無芒消。別一方云。以水七升。下芒消二合。大黃四兩。桑螵蛸五枚。煮取一升半。服五合。微下即愈。本云柴胡再服。以解其外。餘二升加芒消大黃桑螵蛸也。

傷寒十三日。過經譫語者。以有熱也。當以湯下之。

若小便利者大便當鞕而反下利脉調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯主之五十五用前第三十三方

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯方五十六後云解外宜桂枝湯

桃仁五十箇去皮尖　大黃四兩　桂枝二兩去皮　甘草二兩炙　芒消二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利讝語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之方五十一

柴胡四兩　龍骨　黃芩　生薑切　鉛丹　人參　桂枝去皮　茯苓各一兩半　半夏二合半洗　大黃二兩　牡蠣一兩半熬　大棗六枚擘

右十二味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一兩沸去滓溫服一升本云柴胡湯今

加龍骨等。

傷寒腹滿讝語。寸口脉浮而緊。此肝乘脾也。名曰縱。刺期門。五十八。

傷寒發熱。嗇嗇惡寒。大渴欲飲水。其腹必滿。自汗出。小便利。其病欲解。此肝乘肺也。名曰橫。刺期門。五十九。

太陽病。二日反躁。凡熨其背而大汗出。大熱入胃。一作二日內燒瓦熨背。大汗出。火氣入胃。胃中水竭躁煩。必發讝語。十餘日。振慄自下利者。此為欲解也。故其汗從腰以下不得汗。欲小便不得。反嘔。欲失溲。足下惡風。大便鞕。小便當數。而反不數。及不多。大便已。頭卓然而痛。其人足心必熱。穀氣下流故也。

太陽病。中風。以火劫發汗。邪風被火熱。血氣流溢。失其常度。兩陽相熏灼。其身發黃。陽盛則欲衄。陰虛小便難。陰陽俱虛竭。身體則枯燥。但頭汗出。劑頸而還。腹滿微喘。口乾咽爛。或不大便久則讝語。甚者至噦。手足躁擾。捻衣摸床。小便利者。其人可治。

傷寒脉浮。醫以火迫劫之。亡陽。必驚狂。臥起不安者。桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。方

六十。

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切
大棗十二枚擘　牡蠣五兩熬　蜀漆三兩洗去腥
龍骨四兩

右七味。以水一斗二升。先煮蜀漆。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥。加蜀漆牡蠣龍骨。

形作傷寒。其脉不弦緊而弱。弱者必渴。被火必譫語。弱者發熱。脉浮。解之當汗出愈。

太陽病以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必清血。名為火邪。

脉浮熱甚。而反灸之。此為實。實以虛治。因火而動。必咽燥吐血。

微數之脉。慎不可灸。因火為邪。則為煩逆。追虛逐實。血散脉中。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。脉浮宜以汗解。用火灸之。邪無從出。因火而盛。病從腰以下必重而痺。名火逆也。欲自解者。必當先煩。煩乃有汗而解。何以知之。脉浮。故知汗出解。

燒針令其汗。針處被寒核起而赤者。必發奔豚。氣

從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更加桂二兩也方六十一

桂枝五兩去皮　芍藥三兩　生薑三兩切　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今加桂滿五兩所以加桂者以能泄奔豚氣也

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之方六十二

桂枝一兩去皮　甘草二兩炙　牡蠣二兩熬　龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

太陽傷寒者加溫針必驚也

太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脉細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也

病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脉乃數也數為客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胷中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胷中痛微溏者此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也調胃承氣湯六十三用前第三十三方

太陽病六七日表證仍在脉微而沈反不結胷其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之方六十四

水蛭熬　蠐螬各三十箇去翅足熬　桃仁二十箇去皮尖
大黃三兩酒洗

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下更服

太陽病身黃脉沈結少腹鞕小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之六十五用前方

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血

也當下之不可餘藥宜抵當丸方六十六。

水蛭二十箇熬　蝱蟲二十箇去翅足熬　桃仁二十五箇去皮尖　大黃三兩

右四味搗分四丸以水一升煮一丸取七合服之睡時當下血若不下者更服。

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也。

傷寒論卷第四　仲景全書第四

漢　張仲景述　晉　王叔和撰次

宋　林億校正

明　趙開美校刻

沈　琳仝校

辨太陽病脉證并治下第七　合二十九法方三十首并見太陽少陽合病法。

結胸項强如柔痙狀下則和宜大陷胸丸第一。

六味前後有結胸藏結病六證。

太陽病心中懊憹陽氣內陷心下鞕大陷胸湯

主之第二（三味）

傷寒六七日結胸熱實脈沈緊心下痛大陷胸湯主之第三（用前第二方）

傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與大柴胡湯第四（八味水結附）

太陽病重發汗復下之不大便五六日舌燥而渴潮熱從心下至少腹滿痛不可近者大陷胸湯主之第五（用前第二方）

小結胸病正在心下按之痛脈浮滑者小陷胸湯主之第六（三味下有太陽病二證）

病在陽應以汗解反以水潠熱不得去益煩不渴服文蛤散不差與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服第七（文蛤散一味五苓散五味小陷胸湯用前第六方白散三味）

太陽少陽併病頭痛眩冒心下痞者刺肺俞肝俞不可發汗發汗則讝語讝語不止當刺期門第八

婦人中風經水適來熱除脈遲胷下滿讝語當刺期門第九

婦人中風七八日寒熱經水適斷血結如漆狀

小柴胡湯主之第十七味

婦人傷寒經水適来讝語無犯胃氣及上二焦自愈第十一

傷寒六七日發熱微惡寒支節疼微嘔心下支結柴胡桂枝湯主之第十二九味

傷寒五六日已發汗復下之胷脅滿小便不利渴而不嘔頭汗出往来寒熱心煩柴胡桂枝乾薑湯主之第十三七味

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大便鞕脉細者為陽微結非少陰也可與

小柴胡湯第十四用前第十方

傷寒五六日嘔而發熱以他藥下之柴胡證仍在可與柴胡湯蒸蒸而振却發熱汗出解心滿痛者為結胷但滿而不痛為痞宜半夏瀉心湯

第十五七味下有太陽併病并氣痞二證

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之十棗湯主之第十六三味下有太陽一證

心下痞按之濡者大黃黃連瀉心湯主之第十七二味

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之第

十八。四味

心下痞與瀉心湯不解者。五苓散主之第十九。用前第七證方

傷寒汗解後胃中不和。心下痞生薑瀉心湯主之第二十。八味

傷寒中風。反下之。心下痞。醫復下之。痞益甚。甘草瀉心湯主之第二十一。六味

傷寒服藥利不止。心下痞。與理中。利益甚。宜赤石脂禹餘粮湯第二十二。二味。下有痞一證

傷寒發汗若吐下。心下痞噫不除者。旋復代赭

湯主之第二十三。七味

下後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯第二十四。四味

太陽病。外未除。數下之。遂協熱而利。桂枝人參湯主之第二十五。五味

傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。不可攻痞。先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯第二十六。瀉心湯用前第十七方。

傷寒發熱。汗出不解。心中痞。嘔吐下利者。大黃甘草湯主之第二十七。用前第四方

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉浮胷中痞氣上衝不得息當吐之宜瓜蒂散第二十八（三味下有不可與瓜蒂散證）

病胷下素有痞連臍痛引少腹者此名藏結第二十九

傷寒若吐下後不解熱結在裏惡風大渴白虎加人參湯主之第三十（五味下有不可與白虎證）

傷寒無大熱口燥渴背微寒者白虎加人參湯主之第三十一（用前方）

傷寒脉浮發熱無汗表未解不可與白虎湯渴者白虎加人參湯主之第三十二（用前第三十方）

太陽少陽併病心下鞕頸項強而眩者刺大椎肺俞肝俞慎勿下之第三十三

太陽少陽合病自下利黃芩湯若嘔黃芩加半夏生薑湯主之第三十四（黃芩湯四味加半夏生薑湯六味）

傷寒胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔者黃連湯主之第三十五（七味）

傷寒八九日風濕相搏身疼煩不能轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之大便鞕一云膀胱下心下鞕小便自利者去桂加白朮湯主之第

三十六。桂附湯加术湯並五味

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。汗出短氣小便不利。惡風。或身微腫者。甘草附子湯主之。第三十七。四味

傷寒脉浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。第三十八。四味

傷寒脉結代。心動悸。炙甘草湯主之。第三十九。九味

問曰。病有結胷。有藏結。其狀何如。答曰。按之痛。寸脉浮。關脉沈。名曰結胷也。

何謂藏結。答曰。如結胷狀。飲食如故。時時下利。寸脉浮。關脉小細沈緊。名曰藏結。舌上白胎滑者。難治。

藏結無陽證。不往來寒熱。一云寒而不熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。

病發於陽。而反下之。熱入。因作結胷。病發於陰。而反下之。一作汗出。因作痞也。所以成結胷者。以下之太早故也。結胷者。項亦強。如柔痓狀。下之則和。宜大陷胷丸方。

大黃半斤　葶藶子半升熬　芒消半升

杏仁（半升去皮尖熬黑）

右四味擣篩二味內杏仁芒消合研如脂和散取如彈丸一枚別擣甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法

結胸證其脈浮大者不可下下之則死

結胸證悉具煩躁者亦死

太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛（一云頭痛即眩）胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞕則為結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘處無汗剋頸而還小便不利身必發黃

大陷胸湯方二

大黃（六兩去皮）　芒消（一升）　甘遂（一錢七）

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

傷寒六七日結胸熱實脉沈而緊心下痛按之石鞕者大陷胸湯主之三用前第二方

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脅也但頭微汗出者大陷胸湯主之四用前第二方

大柴胡湯方

柴胡半斤　枳實四枚炙　生薑五兩切　黃芩三兩　芍藥三兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服一方加大黃二兩若不加恐不名大柴胡湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯主之五用前第二方

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之方六

黃連一兩　半夏半升洗　栝樓實大者一枚

右三味以水六升先煮栝樓取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脉微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止

者四日復下之此作協熱利也
太陽病下之其脉促一作縱不結胸者此為欲解也
脉浮者必結胸脉緊者必咽痛脉弦者必兩脅拘
急脉細數者頭痛未止脉沈緊者必欲嘔脉沈滑
者協熱利脉浮滑者必下血
病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱
被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不
渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無
熱證者與三物小陷胸湯用前第六方
白散亦可服七一云與三物小白散

文蛤散方
文蛤五兩
右一味為散以沸湯和一方寸七服湯用五合
五苓散方
猪苓十八銖去黑皮　白术十八銖　澤瀉一兩六銖
茯苓十八銖　桂枝半兩去皮
右五味為散更於臼中治之白飲和方寸七服
之日三服多飲煖水汗出愈
白散方
桔梗三分　巴豆一分去皮心熬黑研如脂　貝母三分

右三味為散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢七歲者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水潠之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胷心下痞鞕者當刺大椎第一間肺俞肝俞愼不可發汗發汗則讝語脉弦五日讝語不止當刺期門

婦人中風發熱惡寒經水適来得之七八日熱除而脉遲身涼胷脅下滿如結胷狀讝語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方十

柴胡半斤　黄芩三兩　人參三兩
半夏半升洗　甘草三兩　生薑三兩切
大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

婦人傷寒發熱經水適来晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈十一。

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之方十二。

桂枝去皮 一兩　黃芩 一兩半　人參 一兩

甘草 一兩炙　半夏 二合半洗　芍藥 一兩半

大棗 六枚擘　生薑 一兩半切　柴胡 四兩

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升本云人參湯作如桂枝法加半夏柴胡黃芩復如

柴胡法今用人參作半劑。

傷寒五六日已發汗而復下之胷脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往来寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之方十三。

柴胡 半斤　桂枝 三兩去皮　乾薑 二兩

栝樓根 四兩　黃芩 三兩　牡蠣 二兩熬

甘草 二兩炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈。

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脉細者此為陽微結必有表復有裏也脉沈亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也脉雖沈緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解十四用前第十方

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而

鞕痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯方十五

半夏半升洗　黃芩　乾薑　人參　甘草炙各三兩　黃連一兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服須大陷胸湯者方用前第二法一方用半夏一升

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩

脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡

但氣痞耳。

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人溏溏汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之方十六。

芫花 熬 甘遂 大戟

右三味等分各別擣為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養。

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足溫者易愈。

心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之方十七。

大黃 二兩 黃連 一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服臣億等看詳大黃黃連瀉心湯諸本皆二味又後附子瀉心湯用大黃黃連黃芩附子恐是前方中亦有黃芩後但加附子也故後云附子瀉心湯本云加附子也。

心下痞而復惡寒汗出者。附子瀉心湯主之。方十八。

大黃二兩　黃連一兩　黃芩一兩

附子一枚炮去皮破別煮取汁

右四味。切三味。以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。內附子汁。分溫再服。

本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利者。五苓散主之。十九。一方云忍之一日乃愈。用前第七證方

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞕。乾噫食臭。胸下有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。方二十。

生薑四兩切　甘草三兩炙　人參三兩

乾薑一兩　黃芩三兩　半夏半升洗

黃連一兩　大棗十二枚擘

右八味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。附子瀉心湯。本云加附子半夏瀉心湯。甘草瀉心湯。同體別名耳。生薑瀉心湯本云理中人參黃芩湯。去桂枝术。加黃連并瀉肝法。

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之

方二十一

甘草四兩炙　黃芩三兩　乾薑三兩

半夏半升洗　大棗十二枚擘　黃連一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服臣億等謹按上生薑瀉心湯法本云理中人參黃芩湯今詳瀉心以療痞痞氣因發陰而生是半夏生薑甘草瀉心二方皆本於理中也其方必各有人參今甘草瀉心中無者脫落之也又按千金并外臺祕要治傷寒厭食用此方皆有人參知脫落無疑

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘粮湯主之復不止者當利其小便赤石脂禹餘粮湯方二十二

赤石脂一斤碎　太一禹餘粮一斤碎

右二味以水六升煮取二升去滓分溫三服

傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞕脅下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿

傷寒發汗。若吐若下。解後心下痞鞕。噫氣不除者。旋復代赭湯主之。方二十三。

旋復花 三兩 人參 二兩 生薑 五兩
代赭 一兩 甘草 三兩 炙 半夏 半升 洗
大棗 十二枚 擘

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。

下後不可更行桂枝湯。若汗出而喘。無大熱者。可與麻黄杏子甘草石膏湯。方二十四。

麻黄 四兩 杏仁 五十箇 去皮尖 甘草 二兩 炙
石膏 半斤 綿裹 碎

右四味。以水七升。先煮麻黄減二升。去白沫。内諸藥。煮取三升。去滓。温服一升。本云黄耳杯。

太陽病。外證未除而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞鞕。表裏不解者。桂枝人參湯主之。方二十五。

桂枝 四兩 別切 甘草 四兩 炙 白朮 三兩
人參 三兩 乾薑 三兩

右五味。以水九升。先煮四味。取五升。内桂。更煮取三升。去滓。温服一升。日再夜一服。

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯二十六瀉心湯用前第十七方

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯主之二十七用前第四方

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞕氣上衝喉咽不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散方二十八

瓜蒂一分熬黃　赤小豆一分

右二味各別擣篩為散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

病胷下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死二十九

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之方三十

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　人參二兩　粳米六合

右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。此方立夏後。立秋前。乃可服。立秋後不可服。正月二月三月尚凜冷。亦不可與服之。與之則嘔利而腹痛。諸亡血虛家。亦不可與。得之則腹痛。利者但可溫之。當愈。

傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒者。白虎加人參湯主之。三十一。用前方

傷寒脉浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。三十二。用前方

太陽少陽併病。心下鞕。頸項强而眩者。當刺大椎肺俞肝俞。愼勿下之。三十三。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。三十四。

黃芩湯方

黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

黃芩加半夏生薑湯方

黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

半夏半升洗 生薑一兩半一方三兩切

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

傷寒胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之方三十五

黃連三兩 甘草三兩炙 乾薑三兩 桂枝三兩去皮

人參二兩 半夏半升洗 大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服晝三夜二疑非仲景方

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之若其人大便鞕一云臍下鞕小便自利者去桂加白朮湯主之方三十六

桂枝附子湯方

桂枝四兩去皮 附子三枚炮去皮破 生薑三兩切

大棗十二枚擘 甘草二兩炙

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

去桂加白朮湯方

附子三枚炮去皮破 白朮四兩 生薑三兩切

甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分温三服。初一服。其人身如痺。半日許。復服之。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。此以附子术併走皮内。逐水氣。未得除。故使之耳。法當加桂四兩。此本一方二法。以大便鞕。小便自利。去桂也。以大便不鞕。小便不利。當加桂。附子三枚。恐多也。虚弱家及産婦。宜減服之。

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯主之。方三十七。

甘草二兩炙　附子二枚炮去皮破　白术二兩

桂枝四兩去皮

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。温服一升。日三服。初服得微汗則解。能食。汗止。復煩者。將服五合。恐一升多者。宜服六七合為始。

傷寒脉浮滑。此以表有熱。裏有寒。白虎湯主之。方三十八。

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙

粳米六合

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。温服一升。

日三服。臣億等謹按前篇云。熱結在裏。表裏俱熱者。白虎湯主之。又云。其表不解。不可與白虎湯。此云脉浮滑。表有熱。裏有寒者。必表裏字差矣。又陽明一證云。脉浮遲。表熱裏寒。四逆湯主之。又少陰一證云。裏寒外熱。通脉四逆湯主之。以此表裏自差明矣。千金翼云。白通湯非也。

傷寒脉結代。心動悸。炙甘草湯主之。方三十九。

甘草四兩炙　生薑三兩切　人參二兩

生地黃一斤　桂枝三兩去皮　阿膠二兩

麥門冬半升去心　麻仁半升　大棗三十枚擘

右九味。以清酒七升。水八升。先煑八味。取三升。去滓。內膠烊消盡。溫服一升。日三服。一名復脉湯。

脉按之來緩。時一止復來者。名曰結。又脉來動而中止。更來小數。中有還者。反動。名曰結。陰也。脉來動而中止。不能自還。因而復動者。名曰代。陰也。得此脉者。必難治。

世讓堂
翻刻
板仙氏
藏印



傷寒論卷第五

漢 張仲景述 仲景全書卷五
晉 王叔和撰次
宋 林億校正
明 趙開美校刻
沈 琳仝校

辨陽明病脉證并治第八

辨少陽病脉證并治第九

辨陽明病脉證并治第八 合四十四法。方一十首。一方附并見陽明少陽合病法。

陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。第

一。三味前有陽明病二十七證。

陽明病脉遲汗出不惡寒身重短氣腹滿潮熱大便鞕大承氣湯主之若腹大滿不通者與小承氣湯第二。大承氣四味小承氣三味

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯若不大便六七日恐有燥屎與小承氣湯若不轉失氣不可攻之後發熱復鞕者小承氣湯和之第三。用前第一方下有二病證

傷寒若吐下不解至十餘日潮熱不惡寒如見鬼狀微喘直視大承氣湯主之第四。用前第二方

陽明病多汗胃中燥大便鞕讝語小承氣湯主之第五。用前第二方

陽明病讝語潮熱脉滑疾者小承氣湯主之第六。用前第二方

陽明病讝語潮熱不能食胃中有燥屎宜大承氣湯下之第七。用前第二方下有陽明病一證。

汗出讝語有燥屎在胃中過經乃可下之宜大承氣湯第八。用前第二方下有傷寒病一證。

三陽合病腹滿身重讝語遺尿白虎湯主之第九。四味

二陽併病太陽證罷潮熱汗出大便難讝語者宜大承氣湯第十用前第二方

陽明病脉浮緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之第十一二味

若渴欲飲水舌燥者白虎加人參湯主之第十二五味

若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之第十三五味下有不可與猪苓湯一證

脉浮遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之第十四二味下有二病證

陽明病下之外有熱手足温不結胷心中懊憹不能食但頭汗出梔子豉湯主之第十五用前第一方

陽明病發潮熱大便溏胷滿不去者與小柴胡湯第十六七味

陽明病脅下滿不大便而嘔舌上胎者與小柴胡湯第十七用上方

陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脅下及心痛鼻乾不得汗嗜臥身黃小便難潮熱而嘰與小柴

胡湯第十八。用上方
脉但浮無餘證者與麻黄湯第十九。四味
陽明病自汗出若發汗小便利津液内竭雖鞕不可攻之須自大便鼜煎導而通之若土瓜根豬膽汁第二十。一味。猪膽方附二味
陽明病脉遲汗出多微惡寒表未解宜桂枝湯第二十一。五味
陽明病脉浮無汗而喘發汗則愈宜麻黄湯第二十二。用前第十九方
陽明病但頭汗出小便不利身必發黄茵蔯蒿湯主之第二十三。三味
陽明證喜忘必有畜血大便黑宜抵當湯下之第二十四。四味
陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者宜大承氣湯第二十五。用前第二方下有一病證
病人煩熱汗出解如瘧狀日晡發熱脉實者宜大承氣湯脉浮虚者宜桂枝湯第二十六。大承氣湯用前第二方桂枝湯用前第二十一方
大下後六七日不大便煩不解腹滿痛本有宿食宜大承氣湯第二十七。用前第二方

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱宜大承氣湯第二十八（用前第二方）

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之第二十九（四味）

太陽病發熱汗出惡寒不嘔心下痞此以醫下之也如不下不惡寒而渴屬陽明但以法救之宜五苓散第三十。（五味。下有二病證。）

趺陽脉浮而濇小便數大便鞕其脾為約麻子仁丸主之第三十一。（六味）

太陽病三日發汗不解蒸蒸熱者調胃承氣湯主之第三十二（用前第一方）

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯第三十三（用前第一方）

太陽病若吐下發汗後微煩大便鞕與小承氣湯和之第三十四（用前第二方）

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞕小便利屎定鞕宜大承氣湯第三十五（用前第二方）

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難宜大承氣湯第三十六（用前第二方）

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯第三

十七用前第二方發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯第三十八用前第二方腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯第三十九用前第二方陽明少陽合病必下利脉滑而數有宿食也當下之宜大承氣湯第四十用前第二方病人無表裏證發熱七八日脉數可下之假令已下不大便者有瘀血宜抵當湯第四十一用前第二十四方下有二病證

傷寒七八日身黃如橘色小便不利茵蔯蒿湯主之第四十二用前第二十三方傷寒身黃發斑梔子蘗皮湯主之第四十三二味傷寒瘀熱在裏身必黃麻黃連翹赤小豆湯主之第四十四八味

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約一云絡是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

陽明之為病胃家實一作寒是也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中主土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然者是轉屬陽明也

傷寒三日陽明脈大

傷寒脈浮而緩手足自温者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞕者為陽明病也

傷寒轉繫陽明者其人濈然微汗出也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也

陽明病若能食名中風不能食名中寒
陽明病若中寒者不能食小便不利手足濈然汗出此欲作固瘕必大便初鞕後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也
陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共并脉緊則愈
陽明病欲解時從申至戌上
陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀癉雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也
陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也
陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛一云冬陽明
陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛若不欬者咽不痛一云冬陽明

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃。
陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃。
陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出。
陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄。
陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此必大便鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也。

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之。
陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈。
陽明病面合色赤不可攻之必發熱色黃者小便不利也。
陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯方一。
甘草二兩炙　芒消半升　大黃四兩清酒洗
右三味切以水三升煮二物至一升去滓內芒消更上微火一二沸溫頓服之以調胃氣。
陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹

滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也（一法與桂枝湯）其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下大承氣湯方二

大黃（四兩酒洗）　厚朴（半斤炙去皮）　枳實（五枚炙）　芒消（三合）

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取二升去滓內芒消更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯方

大黃（四兩）　厚朴（二兩炙去皮）　枳實（三枚大者炙）

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則

噦其後發熱者必大便復鞕而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也小承氣湯三用前第二方

夫實則讝語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視讝語喘滿者死下利者亦死

發汗多若重發汗者亡其陽讝語脉短者死脉自和者不死

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安一云順衣妄撮牀惕不安微

喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱讝語者大承氣湯主之若一服利則止後服四用前第一方

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則讝語小承氣湯主之若一服讝語止者更莫復服五用前第二方

陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也為難治不可更與承氣湯也六用前第二方

陽明病讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎

五六枚也若能食者但鞕耳宜大承氣湯下之七（用前第二方）

陽明病下血讝語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而寫之濈然汗出則愈（汗一作臥）出讝語者以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜大承氣湯（用前第二方一云大柴胡湯）

傷寒四五日脉沈而喘滿沈為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則讝語

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢（又作枯）

（向云經）讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之方九

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之則愈宜大承氣湯十（用前第二方）

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒（公對切）反

讝語若加温針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之方十一

肥梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味以水四升煮梔子取二升半去滓內豉更煮取一升半去滓分二服温進一服得快吐者止後服

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之方十二

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合　人參三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服

若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之方十三

豬苓去皮　茯苓　澤瀉　阿膠　滑石碎各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊消温服七合日三服

陽明病汗出多而渴者不可與豬苓湯以汗多胃

中燥猪苓湯復利其小便故也。
脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之方十四。

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温二服强人可大附子一枚乾薑三兩。
若胃中虚冷不能食者飲水則噦。
脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄。
陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之十五用前第十

一方

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脅滿不去者與小柴胡湯方十六。

柴胡半斤　黄芩三兩　人參三兩

半夏半升洗　甘草三兩炙　生薑三兩切

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服。
陽明病脅下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然

汗出而解。十七用上方

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿。脅下及心痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜臥。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脉續浮者。與小柴胡湯。十八用上方

脉但浮。無餘證者。與麻黃湯。若不尿。腹滿加噦者。不治。麻黃湯方十九。

麻黃二兩去節　桂枝二兩去皮　甘草一兩炙

杏仁七十箇去皮尖

右四味。以水九升。煮麻黃減二升。去白沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微似汗。

陽明病。自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。雖鞕不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根及大猪膽汁。皆可為導。二十。

蜜煎方

食蜜七合

右一味。於銅器內。微火煎。當須凝。如飴狀。攪之勿令焦著。欲可丸。併手捻作挺。令頭銳大如指。長二寸許。當熱時。急作。冷則鞕。以內穀道中。以手急抱。欲大便時。乃去之。疑非仲景意。已試甚

良。

又大猪膽一枚瀉汁和少許法醋以灌穀道內。如一食頃當大便出宿食惡物甚效。

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯二十一。

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　生薑三兩　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升須臾啜熱稀粥一升以助藥力取汗。

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯二

十二。用前第十九方

陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃茵蔯蒿湯主之方二十三

茵蔯蒿六兩　梔子十四枚擘　大黃二兩去皮

右三味以水一斗二升先煮茵蔯減六升內二味煮取三升去滓分三服小便當利尿如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也。

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑者宜

抵當湯下之方二十四。

水蛭熬　蝱蟲去翅足熬各三十箇　大黃三兩酒洗　桃仁二十箇去皮尖及兩人者

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下更服。

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯二十五用前第二方

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也。

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯二十六大承氣湯用前第二方桂枝湯用前第二十一方。

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯二十七用前第二方

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒一作脹不能臥者有燥屎也宜大承氣湯二十八用前第二方

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也吳茱萸湯方二十九

吳茱萸一升洗　人參三兩　生薑六兩切

大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但

以法救之渴者宜五苓散方三十

猪苓去皮　白朮　茯苓各十八銖

澤瀉一兩六銖　桂枝半兩去皮

右五味為散白飲和服方寸七日三服

脉陽微而汗出少者為自和如一作也汗出多者為太過陽脉實因發其汗出多者亦為太過太過者為陽絶於裏亡津液大便因鞕也

脉浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絶

趺陽脉浮而濇浮則胃氣强濇則小便數浮濇相

搏大便則鞕其脾為約麻子仁丸主之方三十一

麻子仁二升芍藥半斤枳實半斤炙　大黃一斤去皮　厚朴一尺炙去皮　杏仁一升去皮尖熬別作脂

右六味蜜和丸如梧桐子大飲服十丸日三服漸加以知為度

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之三十二用前第一方

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯三十三用前第一方

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯和之愈三十四用前第二方

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不受食一云不大便但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大承氣湯三十五用前第二方

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯三十六用前第二方

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯三十七。用前第二方。一云大柴胡湯。

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯三十八。用前第二方

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯三十九。用前第二方

陽明少陽合病必下利其脉不負者為順也負者失也互相剋賊名為負也脉滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯四十。用前第二方

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之。

假令已下脉數不解合熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯四十一。用前第二十四方

若脉數不解而下不止必協熱便膿血也。

傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之。

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵蔯蒿湯主之四十二。用前第二十三方

傷寒身黃發熱梔子蘗皮湯主之方四十三。

肥梔子十五箇擘　甘草一兩炙　黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分温再服

傷寒瘀熱在裏身必黃麻黃連翹赤小豆湯主之。
方四十四。

麻黃二兩去節　連翹二兩連翹根是　杏仁四十箇去皮尖
赤小豆一升　大棗十二枚擘　生梓白皮切一升
生薑二兩切　甘草二兩炙

右八味以潦水一斗。先煮麻黃再沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。半日服盡。

辨少陽病脉證并治第九　方一首并見三陽合病法

太陽病不解轉入少陽。胷下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱尚未吐下。脉沈緊者。與小柴胡湯。第

一。七味

少陽之為病。口苦咽乾目眩也。
少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胷中滿而煩者。不可吐下。吐下則悸而驚。
傷寒脉弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發汗則讝語。此屬胃。胃和則愈。胃末和。煩而悸。一云躁。
本太陽病。不解轉入少陽者。胷下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱尚未吐下。脉沈緊者。與小柴胡湯。方

柴胡八兩 人參三兩 黃芩三兩
甘草三兩炙 半夏半升洗 生薑三兩切
大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

若已吐下發汗溫針讝語柴胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之

三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故也

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

傷寒三日少陽脉小者欲已也

少陽病欲解時從寅至辰上

傷寒論卷第六

漢 張仲景述
晉 王叔和撰次
宋 林億校正
明 趙開美校刻
沈 琳仝校

仲景全書第六

辨太陰病脉證并治第十

辨少陰病脉證并治第十一

辨厥陰病脉證并治第十二 厥利嘔噦附

辨太陰病脉證并治第十 合三法。方三首。

太陰病。脉浮可發汗。宜桂枝湯。第一。五味。前有太陰病三

證。

自利不渴者。屬太陰。以其藏寒故也。宜服四逆輩第二。下有利自止一證

本太陽病。反下之。因腹滿痛。屬太陰。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。第三。桂枝加芍藥湯五味加大黃湯六味減大黃芍藥法附。

太陰之為病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胃下結鞕。

太陰中風。四肢煩疼。陽微陰濇而長者。為欲愈。

太陰病。欲解時。從亥至丑上。

太陰病。脉浮者。可發汗。宜桂枝湯方一。

桂枝 三兩 去皮　芍藥 三兩　甘草 二兩 炙

生薑 三兩 切　大棗 十二枚 擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾。啜熱稀粥一升。以助藥力。溫覆取汗。

自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒故也。當溫之。宜服四逆輩二。

傷寒脉浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。太陰當發身黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。雖暴煩。下利日十餘行。必自止。以脾家實。腐穢當去故也。

本太陽病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。三。

桂枝加芍藥湯方

桂枝三兩去皮　芍藥六兩　甘草二兩炙

大棗十二枚擘　生薑三兩切

右五味。以水七升。煑取三升。去滓。溫分三服。本云桂枝湯。今加芍藥。

桂枝加大黃湯方

桂枝一兩去皮　大黃二兩　芍藥六兩

生薑三兩切　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右六味。以水七升。煑取三升。去滓。溫服一升。日三服。

太陰為病。脉弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱。易動故也。下利者。先煎芍藥三沸。

辨少陰病脉證并治第十一　合二十二法。方一十九首。

少陰病。始得之。發熱脉沈者。麻黃細辛附子湯主之。第一　三味。前有少陰病二十證。

少陰病。二三日。麻黃附子甘草湯。微發汗。第二。三味

少陰病二三日以上心煩不得臥黃連阿膠湯主之第三五味

少陰病一二日口中和其背惡寒附子湯主之第四五味

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沈者附子湯主之第五用前第四方

少陰病下利便膿血者桃花湯主之第六三味

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利便膿血者桃花湯主之第七用前第六方下有少陰病一證

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之第八四味

少陰病下利便膿血者桃花湯主之第六三味

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利便膿血者桃花湯主之第七用前第六方下有少陰病一證

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之第八四味

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之第九三味

少陰病二三日咽痛與甘草湯不差與桔梗湯第十甘草湯一味桔梗湯二味

少陰病咽中生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之第十一三味

少陰病咽痛半夏散及湯主之第十二三味

少陰病下利白通湯主之第十三三味

少陰病下利脉微與白通湯利不止厥逆無脉

乾嘔者白通加猪膽汁湯主之第十四（白通湯用前第十二方加猪膽汁湯五味）

少陰病至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利真武湯主之第十五（五味加減法附）

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絶惡寒或利止脉不出通脉四逆湯主之第十六（三味加減法附）

少陰病四逆或欬或悸四逆散主之第十七（四味加減法附）

少陰病下利六七日欬而嘔渴煩不得眠猪苓湯主之第十八（五味）

少陰病二三日口燥咽乾者宜大承氣湯第十九（四味）

少陰病自利清水心下痛口乾者宜大承氣湯第二十（用前第十九方）

少陰病六七日腹滿不大便宜大承氣湯第二十一（用前第十九方）

少陰病脉沈者急温之宜四逆湯第二十二（三味）

少陰病食入則吐心中温温欲吐手足寒脉弦遲當温之宜四逆湯第二十三（用前第二十二方下有少陰病

一證。

少陰之為病。脉微細。但欲寐也。

少陰病。欲吐不吐。心煩。但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰也。虛故引水自救。若小便色白者。少陰病形悉具。小便白者。以下焦虛。有寒不能制水。故令色白也。

病人脉陰陽俱緊。反汗出者。亡陽也。此屬少陰。法當咽痛。而復吐利。

少陰病。欬而下利。讝語者。被火氣劫故也。小便必難。以強責少陰汗也。

少陰病。脉細沈數。病為在裏。不可發汗。

少陰病。脉微。不可發汗。亡陽故也。陽已虛。尺脉弱澁者。復不可下之。

少陰病。脉緊。至七八日自下利。脉暴微。手足反温。脉緊反去者。為欲解也。雖煩下利。必自愈。

少陰病。下利。若利自止。惡寒而蜷臥。手足温者。可治。

少陰病。惡寒而蜷時。自煩。欲去衣被者。可治。

少陰中風。脉陽微。陰浮者。為欲愈。

少陰病。欲解時。從子至寅上。

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者至一作足灸少陰七壯

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭為難治

少陰病惡寒身蜷而利手足逆冷者不治

少陰病吐利躁煩四逆者死

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

少陰病四逆惡寒而身蜷脈不至不煩而躁者死一作吐利而躁逆者死

少陰病六七日息高者死

少陰病脈微細沈但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

少陰病始得之反發熱脈沈者麻黃細辛附子湯主之方一

麻黃二兩去節　細辛二兩　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗也方二

麻黃二兩去節　甘草二兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿膠湯主之方三

黃連四兩　黃芩二兩　芍藥二兩

雞子黃二枚　阿膠三兩一云三挺

右五味以水六升先煮三物取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之方四

附子二枚炮去皮破八片　茯苓三兩　人參二兩

白朮四兩　芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沈者附子湯主之

少陰病下利便膿血者桃花湯主之方六。

赤石脂一斤一半全用一半篩末 乾薑一兩 粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七合內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服。

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之七用前第六方

少陰病下利便膿血者可刺。

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之方八。

吳茱萸一升 人參二兩 生薑六兩切

大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓温服七合日三服。

少陰病下利咽痛胷滿心煩猪膚湯主之方九。

猪膚一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得温分六服。

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯方十。

甘草湯方

甘草二兩

右一味。以水三升。煮取一升半。去滓。温服七合。日二服。

桔梗湯方

桔梗一兩　甘草二兩

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。温。分再服。

少陰病。咽中傷。生瘡。不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。方十一。

半夏洗破如棗核十四枚　雞子一枚去黃內上苦酒着雞子殼中

右二味。內半夏。着苦酒中。以雞子殼置刀環中。

安火上。令三沸。去滓。少少含嚥之。不差。更作三劑。

少陰病。咽中痛。半夏散及湯主之。方十二。

半夏洗　桂枝去皮　甘草炙

右三味。等分。各別擣篩已。合治之。白飲和服方寸匕。日三服。若不能散服者。以水一升。煎七沸。內散兩方寸匕。更煮三沸。下火。令小冷。少少嚥之。半夏有毒。不當散服。

少陰病。下利。白通湯主之。方十三。

葱白四莖　乾薑一兩　附子一枚生去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。分温再服。
少陰病。下利脉微者。與白通湯。利不止。厥逆無脉。乾嘔煩者。白通加猪膽汁湯主之。服湯脉暴出者。死。微續者生。白通加猪膽湯方十四。白通湯用上方。

葱白四莖　乾薑一兩　附子一枚生去皮破八片
人尿五合　猪膽汁一合

右五味。以水三升。煮取一升。去滓。内膽汁人尿。和令相得。分温再服。若無膽。亦可用。
少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重。疼痛。自下利者。此為有水氣。其人或欬或小便利。或下利。或嘔者。真武湯主之。方十五。

茯苓三兩　芍藥三兩　白朮二兩
生薑三兩切　附子一枚炮去皮破八片

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。温服七合。日三服。若欬者。加五味子半升。細辛一兩。乾薑一兩。若小便利者。去茯苓。若下利者。去芍藥。加乾薑二兩。若嘔者。去附子。加生薑足前為半斤。
少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脉微欲絶。身反不惡寒。其人面色赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止。脉不出者。通脉四逆湯主之。方十六。

甘草二兩炙　附子大者一枚生用去皮破八片

乾薑三兩强人可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服其脉即出者愈面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩病皆與方相應者乃服之

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之方十七

甘草炙　枳實破水漬炙乾　柴胡　芍藥

右四味各十分擣篩白飲和服方寸七日三服欬者加五味子乾薑各五分并主下利悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚炮令坼泄利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸七內湯中煮取一升半分温再服

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之方十八

猪苓去皮　茯苓　阿膠　澤瀉

滑石各一兩

右五味。以水四升。先煮四物。取二升。去滓。內阿膠。烊盡。溫服七合。日三服。

少陰病。得之二三日。口燥咽乾者。急下之。宜大承氣湯。方十九。

枳實五枚炙　厚朴半斤去皮炙　大黃四兩酒洗　芒消三合

右四味。以水一斗。先煮二味。取五升。去滓。內大黃。更煮取二升。去滓。內芒消。更上火。令一兩沸。分溫再服。一服得利。止後服。

少陰病。自利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。可下之。宜大承氣湯。二十。用前第十九方。一法用大柴胡。

少陰病。六七日。腹脹。不大便者。急下之。宜大承氣湯。二十一。用前第十九方。

少陰病。脉沈者。急溫之。宜四逆湯。方二十二。

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

少陰病。飲食入口則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脉弦遲者。此胷中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐也。當溫之。宜

四逆湯二十三方依上法
少陰病下利脉微濇嘔而汗出必數更衣反少者
當温其上灸之脉經云炎厥陰可五十壯
辨厥陰病脉證并治第十二厥利嘔噦附昏十六首
傷寒病蚘厥靜而時煩為藏寒蚘上入膈故煩
得食而嘔吐蚘者烏梅丸主之第一十味前後四證厥逆十九味
傷寒脉滑而厥裏有熱白虎湯主之第二四味
手足厥寒脉細欲絶者當歸四逆湯主之第三

七味
若内有寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯第四九味
大汗出熱不去内拘急四肢疼下利厥逆惡寒者四逆湯主之第五二味
大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之第六用前第五方
病人手足厥冷脉乍緊心下滿而煩宜瓜蒂散第七三味
傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯

第八。四味

傷寒六七日。大下後。寸脉沈遲。手足厥逆。麻黃升麻湯主之。第九。十四味。下有欲自利一證。

傷寒本自寒下。醫復吐下之。若食入口即吐。乾薑黃芩黃連人參湯主之。第十。四味。下有下利一十病證。

下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脉四逆湯主之。第十一。三味

熱利下重者。白頭翁湯主之。第十二。四味

下利腹脹滿。身疼痛者。先溫裏。乃攻表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。第十三。四逆湯。用前第五方。桂枝湯。五味

下利欲飲水者。以有熱也。白頭翁湯主之。第十四。用前第十二方

下利讝語者。有燥屎也。宜小承氣湯。第十五。三味

下利後更煩。按之心下濡者。虛煩也。宜梔子豉湯。第十六。二味

嘔而脉弱。小便利。身有微熱。見厥者難治。四逆湯主之。第十七。用前第五方。前有嘔膿一證。

乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。第十八。四味

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。第十九。七味。下有噦二證。

厥陰之為病消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐蚘下之利不止

厥陰中風脉微浮為欲愈不浮為未愈

厥陰病欲解時從丑至卯上

厥陰病渴欲飲水者少少與之愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐為除中一云消中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後

日脉之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦為九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脉之而脉數其熱不罷者此為熱氣有餘必發癰膿也

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死

傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其唉為痺發熱無汗而利必自止若不止必便

膿血便膿血者其喉不痺。

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤。

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈。

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷者是也。

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為藏厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘令病

者靜而復時煩者此為藏寒蚘上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人常自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之又主久利方。

烏梅三百枚 細辛六兩 乾薑十兩

黃連十六兩 當歸四兩 附子六兩炮去皮

蜀椒四兩出汗 桂枝去皮六兩 人參六兩

黃蘗六兩

右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服

十九日三服稍加至二十九禁生冷滑物臭食等。

傷寒熱少微厥指（一作稍）頭寒嘿嘿不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胷脅煩滿者其後必便血。

病者手足厥冷言我不結胷小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也。

傷寒發讙四日厥反三日復熱四日厥少熱多者其病當愈四日至七日熱不除者必便膿血。

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故為進也。

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死。

傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死。

傷寒發熱下利至甚厥不止者死。

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也。

傷寒五六日不結胷腹濡脉虛復厥者不可下此亡血下之死。

發熱而厥七日下利者為難治。

傷寒脉促。手足厥逆。可灸之。促一作縱。

傷寒脉滑而厥者。裏有熱。白虎湯主之。方二。

知母六兩　石膏一斤碎綿裹　甘草二兩炙

粳米六合

右四味。以水一斗。煑米熟湯成。去滓。温服一升。日三服。

手足厥寒。脉細欲絶者。當歸四逆湯主之。方三。

當歸三兩　桂枝三兩去皮　芍藥三兩

細辛三兩　甘草二兩炙　通草二兩

大棗二十五枚擘一法十二枚

右七味。以水八升。煑取三升。去滓。温服一升。日三服。

若其人内有久寒者。宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯。方四。

當歸三兩　芍藥三兩　甘草二兩炙

通草二兩　桂枝三兩去皮　細辛三兩

生薑半斤切　吳茱萸二升　大棗二十五枚擘

右九味。以水六升。清酒[illegible]煑取五升。去滓。温。分五服。一方水酒各四升

大汗出。熱不去。内拘急。四肢疼。又下利厥逆而惡

寒者。四逆湯主之。方五。

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味。以水三升。煑取一升二合。去滓。分温再服。若强人可用大附子一枚。乾薑三兩。

大汗。若大下利而厥冷者。四逆湯主之。六。用前第五方

病人手足厥冷。脉乍緊者。邪結在胷中。心下滿而煩。飢不能食者。病在胷中。當須吐之。宜瓜蔕散。方七。

瓜蔕　赤小豆

右二味。各等分。異擣篩合。内臼中。更治之。別以香豉一合。用熱湯七合。煑作稀糜。去滓。取汁。和散一錢匕。温頓服之。不吐者。少少加。得快吐。乃止。諸亡血虚家。不可與瓜蔕散。

傷寒厥而心下悸。宜先治水。當服茯苓甘草湯。却治其厥。不爾。水漬入胃。必作利也。茯苓甘草湯。方八。

茯苓二兩　甘草一兩炙　生薑三兩切

桂枝二兩去皮

右四味。以水四升。煑取二升。去滓。分温。三服。

傷寒六七日。大下後。寸脉沈而遲。手足厥逆。下部

脉不至喉咽不利唾膿血泄利不止者為難治麻黃升麻湯主之方九

麻黃二兩半去節　升麻一兩一分　當歸一兩一分
知母十八銖　黃芩十八銖　菱蕤十八銖一作菖蒲
芍藥六銖　天門冬六銖去心　桂枝六銖去皮
茯苓六銖　甘草六銖炙　石膏六銖綿裹碎
白朮六銖　乾薑六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分温三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自利也

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃芩黃連人參湯主之方十

乾薑　黃芩　黃連　人參各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服

下利有微熱而渴脉弱者今自愈

下利脉數有微熱汗出今自愈設復緊為未解一云設脉浮復緊

下利手足厥冷無脉者灸之不温若脉不還反微

喘者死少陰負趺陽者為順也

下利寸脉反浮數尺中自濇者必清膿血

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

下利脉沈弦者下重也脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖發熱不死

下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利脉數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也

下利後脉絶手足厥冷晝時脉還手足温者生脉不還者死

傷寒下利日十餘行脉反實者死

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之方十一

甘草二兩炙　附子大者一枚生去皮破八片　乾薑三兩強人可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服其脉即出者愈

熱利下重者白頭翁湯主之方十二

白頭翁二兩　黄檗三兩　黄連三兩

秦皮 三兩

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服一升。不愈更服一升。

下利腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。十三。四逆湯用前第五方。

桂枝湯方

桂枝 三兩 去皮　芍藥 三兩　甘草 二兩 炙

生薑 三兩 切　大棗 十二枚 擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾。啜熱稀粥一升。以助藥力。

下利欲飲水者。以有熱故也。白頭翁湯主之。十四。用前第十二方

下利讝語者。有燥屎也。宜小承氣湯。方十五。

大黃 四兩 酒洗　枳實 三枚 炙　厚朴 二兩 去皮 炙

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分二服。初一服讝語止。若更衣者。停後服。不爾。盡服之。

下利後更煩。按之心下濡者。為虛煩也。宜梔子豉湯。方十六。

肥梔子 十四箇 擘　香豉 四合 綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子。取二升半。內豉。更

煑取一升半。去滓。分再服。一服得吐。止後服。

嘔家有癰膿者。不可治。嘔膿盡。自愈。

嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥者難治。四逆湯主之。十七。用前第五方

乾嘔。吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。方十八。

吳茱萸一升湯洗七遍　人參三兩　大棗十二枚擘

生薑六兩切

右四味。以水七升。煑取二升。去滓。温服七合。日三服。

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。方十九。

柴胡八兩　黄芩三兩　人參三兩

甘草三兩炙　生薑三兩切　半夏半升洗

大棗十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煑取六升。去滓。更煎取三升。温服一升。日三服。

傷寒大吐大下之。極虚。復極汗者。其人外氣怫鬱。復與之水。以發其汗。因得噦。所以然者。胃中寒冷故也。

傷寒噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之即愈。

傷寒論卷第七

漢 張仲景述 晉 王叔和撰次
宋 林億校正
明 趙開美校刻
沈 琳仝校

仲景全書第七

辨霍亂病脉證并治第十三

辨陰陽易差後勞復病脉證并治第十四

辨不可發汗病脉證并治第十五

辨可發汗病脉證并治第十六

辨霍亂病脉證并治第十三 合六法。方六首。

世讓堂翻宋板

惡寒脉微而利利止者亡血也四逆加人參湯主之第一四味前有吐利三證
霍亂頭痛發熱身疼熱多飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之第二五苓散五味理中丸四味作加減法附
吐利止身痛不休宜桂枝湯小和之第三五味
吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之第四三味
吐利小便利大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絕四逆湯主之第五用前第四方

吐已下斷汗出而厥四肢不解脉微絕通脉四逆加豬膽湯主之第六四味下有不勝穀氣一證
問曰病有霍亂者何荅曰嘔吐而利此名霍亂
問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病荅曰此名霍亂霍亂自吐下又利止復更發熱也
傷寒其脉微濇者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者此屬陽明也便必鞕十三日愈所以然者經盡故也下利後當便鞕鞕則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過

一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也惡寒脈微（一作緩）而復利利止亡血也四逆加人參湯主之方一

甘草（二兩炙）　附子（一枚生去皮破八片）　乾薑（一兩半）　人參（一兩）

右四味以水三升煮取一升二合去滓分温再服

霍亂頭痛發熱身疼痛煩多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之二

五苓散方

豬苓（去皮）　白朮　茯苓（各十八銖）　桂枝（半兩去皮）　澤瀉（一兩六銖）

右五味為散更治之白飲和服方寸七日三服多飲煖水汗出愈

理中丸方（下有作湯加減法）

人參　乾薑　甘草（炙）　白朮（各三兩）

右四味擣篩蜜和為丸如雞子黃許大以沸湯數合和一丸研碎温服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓温服一升日三

服若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者還用朮悸者加茯苓二兩渴欲得水者加朮足前成四兩半腹中痛者加人參足前成四兩半寒者加乾薑足前成四兩半腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之方三

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　生薑三兩

甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之方四

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚乾薑三兩

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之五用前第四方

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽湯主之方六

甘草二兩炙　乾薑三兩强人可四兩　附子大者一枚生去皮破八片

豬膽汁半合

右四味。以水三升。煑取一升二合。去滓。內豬膽汁。分溫再服。其脉即來。無豬膽。以羊膽代之。

吐利發汗。脉平小煩者。以新虛。不勝穀氣故也。

辨陰陽易差後勞復病脉證并治第十四合六法。方六首。

傷寒陰易病。身重。少腹裏急。熱上衝胷。頭重不欲舉。眼中生花。燒褌散主之。第一。一味

大病差後勞復者。枳實梔子湯主之。第二。三味下有宿食。加大黃法附。

傷寒差以後。更發熱。小柴胡湯主之。第三。七味

大病差後。從腰以下。有水氣者。牡蠣澤瀉散主之。第四。七味

大病差後。喜唾。久不了了。胷上有寒。當以丸藥溫之。宜理中丸。第五。四味

傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。竹葉石膏湯主之。第六。七味。下有病新差一證。

傷寒陰易之為病。其人身體重。少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胷。頭重不欲舉。眼中生花。花一

作膀膝脛拘急者燒褌散主之方一。

婦人中褌近隱處取燒作灰。

右一味水服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫此為愈矣婦人病取男子褌燒服。

大病差後勞復者枳實梔子湯主之方二。

枳實三枚炙　梔子十四箇擘　豉一升綿裹

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗若有宿食者內大黃如博碁子五六枚服之愈。

傷寒差以後更發熱小柴胡湯主之脉浮者以汗解之脉沈實緊一作者以下解之方三。

柴胡八兩　人參二兩　黃芩二兩

甘草二兩炙　生薑二兩　半夏半升洗

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服。

大病差後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之方四。

牡蠣熬　澤瀉　蜀漆煖水洗去腥

葶藶子 熬 商陸根 熬 海藻 洗去鹹 栝樓根 各等分

右七味異搗下篩為散更於臼中治之白飲和服方寸匕日三服小便利止後服

大病差後喜唾久不了了胷上有寒當以丸藥溫之宜理中丸方五

人參 白朮 甘草 炙 乾薑 各三兩

右四味搗篩蜜和為丸如雞子黃許大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三服

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之

方六

竹葉 二把 石膏 一斤 半夏 半升 洗 麥門冬 一升 去心 人參 二兩 甘草 二兩 炙 粳米 半升

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服

病人脈已解而日暮微煩以病新差人强與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

辨不可發汗病脈證并治第十五 一法方本闕

汗家不可發汗發汗必恍惚心亂小便已陰疼

宜禹餘粮丸第一。方本闕前後有二十九病證。

夫以為疾病至急。倉卒尋按。要者難得。故重集諸可與不可方治。比之三陰三陽篇中。此易見也。又時有不止是三陽三陰。出在諸可與不可中也。

少陰病。脉細沈數。病為在裏。不可發汗。

脉浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。何以知然。以榮氣不足。血少故也。

少陰病。脉微不可發汗。亡陽故也。

脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。微反在上。濇反在下。微則陽氣不足。濇則無血。陽氣反微。中風汗出而反躁煩。濇則無血。厥而且寒。陽微發汗。躁不得眠。

動氣在右。不可發汗。發汗則衄而渴。心苦煩。飲即吐水。

動氣在左。不可發汗。發汗則頭眩。汗不止。筋惕肉瞤。

動氣在上。不可發汗。發汗則氣上衝。正在心端。

動氣在下。不可發汗。發汗則無汗。心中大煩。骨節苦疼。目運惡寒。食則反吐。穀不得前。

咽中閉塞。不可發汗。發汗則吐血。氣微絕。手足厥

冷欲得踡臥不能自温。

諸脉得數動微弱者不可發汗。發汗則大便難腹中乾。一云小便難胞中乾胃躁而煩其形相象根本異源。

脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得温微弦為虛不可發汗。發汗則寒慄不能自還。

欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中飢煩睟[illegible]而發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發[illegible]而苦滿腹中復堅。

厥[illegible]不可發汗。發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不得前。

諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死。一云讝言目眩睛亂者死命將難全。

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少。其人不嘔清便續自可一日二三度發脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗也。

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者無陽也不可發汗。

咽喉乾燥者不可發汗。

亡血不可發汗發汗則寒慄而振。

劒家不可發汗。汗出必額上陷。脈急緊。直視不能眴。不得眠。（首見上）

汗家不可發汗。發汗必恍惚心亂。小便已。陰疼。宜禹餘粮丸。（方本闕）

淋家不可發汗。發汗必便血。

瘡家雖身疼痛。不可發汗。汗出則痓。

下利不可發汗。汗出必脹滿。

欬而小便利。若失小便者。不可發汗。汗出則四肢厥逆冷。

傷寒一二日至四五日厥者。必發熱。前厥者。後必熱。厥深者。熱亦深。厥微者。熱亦微。厥應下之。而反發汗者。必口傷爛赤。

傷寒脉弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。傷寒頭痛。衄。發熱。形象中風。常微汗出。自嘔者。下之益煩。心懊憹如飢。發汗則致痓。身强難以伸。屈熏之。則發黃。不得小便。久則發欬唾。

太陽與少陽併病。頭項强痛。或眩冒。時如結胷。心下痞鞕者。不可發汗。

太陽病。發汗。因致痓。

少陰病。欬而下利讝語者。此被火氣劫故也。小便

必難。以强責少陰。汗也。

少陰病。但厥無汗。而强發之。必動其血。未知從何道出。或從口鼻。或從目出者。是名下厥上竭。為難治。

辨可發汗病脉證并治第十六（合四十一法方一十四首）

太陽病。外證未解。脉浮弱。當以汗解。宜桂枝湯。第一。（五味。前有四法。）

脉浮而數者。可發汗。屬桂枝湯證。第二。（用前第一方。一法用麻黃湯。）

陽明病。脉遲。汗出多。微惡寒。表未解也。屬桂枝湯證。第三。（用前第一方。下有可汗二證。）

病人煩熱。汗出解。又如瘧狀。脉浮虛者。當發汗。屬桂枝湯證。第四。（用前第一方）

病常自汗出。此榮衛不和也。發汗則愈。屬桂枝湯證。第五。（用前第一方）

病人藏無他病。時發熱。汗出。此衛氣不和也。先其時發汗則愈。屬桂枝湯證。第六。（用前第一方）

脉浮緊。浮為風。緊為寒。風傷衛。寒傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。可發汗。宜麻黃湯。第七。（四味）

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。愈。外

未解者屬桂枝湯證第八用前第一方
太陽病下之微喘者表未解宜桂枝加厚朴杏子湯第九七味
傷寒脉浮緊不發汗因衄者屬麻黃湯證第十用前第七方
陽明病脉浮無汗而喘者發汗愈屬麻黃湯證第十一用前第七方
太陰病脉浮者可發汗屬桂枝湯證第十二用前第一方
太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日表證

在當發汗屬麻黃湯證第十三用前第七方
脉浮者病在表可發汗屬麻黃湯證第十四用前第七方一法用桂枝湯
傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏續在表屬桂枝湯證第十五用前第一方
下利腹脹滿身疼痛者先温裏乃攻表温裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯第十六四逆湯二味桂枝湯用前第一方
下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝

湯第十七用前第一方

太陽病頭痛發熱汗出惡風寒者屬桂枝湯證

第十八用前第一方

太陽中風陽浮陰弱熱發汗出惡寒惡風鼻鳴乾嘔者屬桂枝湯證第十九用前第一方

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強屬桂枝湯證

第二十用前第一方

太陽病下之氣上衝者屬桂枝湯證第二十一用前第一方

太陽病服桂枝湯反煩者先刺風池風府却與

桂枝湯愈第二十二用前第一方

燔針被寒針處核起者必發奔豚氣與桂枝加桂湯第二十三五味

太陽病項背強几几汗出惡風者宜桂枝加葛根湯第二十四七味注見第二卷中

太陽病項背強几几無汗惡風者屬葛根湯證第二十五用前方

太陽陽明合病自利屬葛根湯證第二十六用前方一云用後第二十八方

太陽陽明合病不利但嘔者屬葛根加半夏湯

第二十七。八味四味

太陽病。桂枝證。反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。喘而汗出。屬葛根黃芩黃連湯。第二十八。

太陽病。頭痛發熱。身疼。惡風無汗。屬麻黃湯證。第二十九。用前第七方

太陽陽明合病。喘而胃滿者。不可下。屬麻黃湯證。第三十。用前第七方

太陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼不汗而煩躁者。大青龍湯主之。第三十一。七味。下有一病證。

陽明中風。脉弦浮大。短氣腹滿。脅下及心痛。鼻乾。不得汗。嗜臥。身黃。小便難。潮熱。外不解。過十日。脉浮者。與小柴胡湯。脉但浮。無餘證者。與麻黃湯。第三十二。小柴胡湯七味。麻黃湯用前第七方。

太陽病。十日以去。脉浮細。嗜臥者。外解也。設胃滿痛者。與小柴胡湯。脉但浮。與麻黃湯。第三十三。並用前方

傷寒脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證。可與大青龍湯發之。第三十四。用前第三十一方

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。

或利或噎或小便不利或喘小青龍湯主之第三十五八味加減法附

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴屬小青龍湯證第三十六用前方

傷寒五六日中風往来寒熱胷脅苦滿不欲飲食心煩喜嘔者屬小柴胡湯證第三十七用前第三十二方

傷寒四五日身熱惡風頸項强脅下滿手足温而渴屬小柴胡湯證第三十八用前第三十二方

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之第三十九九味

少陰病得之二三日麻黄附子甘草湯微發汗第四十二味

脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散第四十一五味

大法春夏宜發汗

凡發汗欲令手足俱周時出似漿漿然一時間許益佳不可令如水流離若病不解當重發汗汗多者必亡陽陽虛不得重發汗也

凡服湯發汗。中病便止。不必盡劑也。
凡云可發汗。無湯者。丸散亦可用。要以汗出為解。
然不如湯隨證良驗。
太陽病外證未解。脉浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。
方一。

桂枝 三兩 去皮 芍藥 三兩 甘草 二兩 炙
生薑 三兩 切 大棗 十二枚 擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。啜粥將息。如初法。

脉浮而數者。可發汗。屬桂枝湯。證二。用前第一方法用麻黃

湯。

陽明病。脉遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。屬桂枝湯。證三。用前第一方

夫病脉浮大。問病者言但便鞕耳。設利者。為大逆。鞕為實。汗出而解。何以故。脉浮當以汗解。
傷寒其脉不弦緊而弱。弱者必渴。被火必讝語。弱者發熱。脉浮。解之當汗出愈。
病人煩熱。汗出即解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脉浮虛者。當發汗。屬桂枝湯。證四。用前第一方

病常自汗出者。此為榮氣和。榮氣和者。外不諧。以

衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脉中。衛行脉外。復發其汗。榮衛和。則愈。屬桂枝湯。證五。用前第一方

病人藏無他病。時發熱自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗則愈。屬桂枝湯。證六。用前第一方

脉浮而緊。浮則為風。緊則為寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。可發其汗。宜麻黃湯。方七。

麻黃三兩去節　桂枝二兩　甘草一兩炙

杏仁七十箇去皮尖

右四味。以水八升。先煑麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煑取二升半。去滓。溫服八合。溫覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝將息。

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外未解者。尚未可攻。當先解其外。屬桂枝湯。證八。用前第一方

太陽病。下之微喘者。表未解也。宜桂枝加厚朴杏子湯。方九。

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　生薑三兩切

甘草二兩炙　厚朴二兩炙去皮　杏仁五十箇去皮尖

大棗十二枚擘

右七味。以水七升。煑取三升。去滓。溫服一升。

傷寒脉浮緊不發汗因致衄者屬麻黃湯證十用前第七方

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈屬麻黃湯證十一用前第七方

太陰病脉浮者可發汗屬桂枝湯證十二用前第一方

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在當復發汗服湯已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯證十三用前第七方

脉浮者病在表可發汗屬麻黃湯證十四用前第七方二

法用桂枝湯

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者一云大便青知不在裏續在表也當須發汗若頭痛者必衄屬桂枝湯證十五用前第一方

下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表温裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯十六用前第一方

四逆湯方

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾薑三兩

下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗十七用前第一方

太陽病頭痛發熱汗出惡風寒者屬桂枝湯證十八用前第一方

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者屬桂枝湯證十九用前第一方

太陽病發熱汗出者此為榮弱衛强故使汗出欲救邪風屬桂枝湯證二十用前第一方

太陽病下之後其氣上衝者屬桂枝湯證二十一用前第一方

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈二十二用前第一方

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上撞心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯方二十三

桂枝五兩去皮　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

芍藥三兩　生薑三兩切

右五味以水七升煑取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今加桂滿五兩所以加桂者以能洩

奔豚氣也。

太陽病。項背強。几几反汗出惡風者。宜桂枝加葛根湯。方二十四。

葛根四兩　麻黃三兩去節　甘草二兩炙
芍藥三兩　桂枝二兩　生薑三兩
大棗十二枚擘

右七味。以水一斗。煮麻黃葛根。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥助藥力。餘將息依桂枝法。（注見第二卷中）

太陽病。項背強。几几無汗。惡風者。屬葛根湯。證二十五。（用前第二十四方）

太陽與陽明合病。必自下利。不嘔者。屬葛根湯。證二十六。（用前方一云用後第二十八方）

太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。宜葛根加半夏湯。方二十七。

葛根四兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘
桂枝去皮二兩　芍藥二兩　甘草二兩炙
麻黃三兩去節　生薑三兩

右八味。以水一斗。先煮葛根麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似

汗。

太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。喘而汗出者。宜葛根黃芩黃連湯。方二十八。（促作縱）

葛根八兩　黃連三兩　黃芩三兩　甘草二兩炙

右四味。以水八升。先煮葛根。減二升。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫再服。

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。屬麻黃湯。證二十九。用前第七方

太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。屬麻黃湯。證三十。用前第七方。

太陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脉微弱。汗出惡風者。不可服之。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此為逆也。大青龍湯。方三十一。

麻黃六兩去節　桂枝二兩去皮　杏仁四十枚去皮尖

甘草二兩炙　石膏如雞子大碎　生薑三兩切

大棗十二枚擘

右七味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內

諸藥煑取三升。溫服一升。覆取微似汗。汗出多者。溫粉粉之。一服汗者。勿更服。若復服。汗出多者。亡陽。遂（一作逆）虛。惡風煩躁。不得眠也。

陽明中風。脉弦浮大而短氣。腹都滿。脅下及心痛。久按之。氣不通。鼻乾不得汗。嗜臥。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。過十日。脉續浮者。與小柴胡湯。脉但浮。無餘證者。與麻黃湯。（用前第七方）不溺腹滿。加噦者不治。三十二。

小柴胡湯方

柴胡（八兩）　黃芩（三兩）　人參（三兩）

甘草（三兩炙）　生薑（三兩切）　半夏（半升洗）

大棗（十二枚擘）

右七味。以水一斗二升。煑取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

太陽病。十日以去。脉浮而細。嗜臥者。外已解也。設胷滿脅痛者。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃湯。三十三。（並用前方。）

傷寒脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。可與大青龍湯發之。三十四。（用前第三十一方）

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者宜小青龍湯方三十五

麻黃二兩去節　芍藥二兩　桂枝二兩去皮　甘草二兩炙　細辛二兩　五味子半升　半夏半升洗　乾薑三兩

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升若渴去半夏加栝樓根三兩若微利去麻黃加芫花如一雞子熬令赤色若噎去麻黃加附子一枚炮若小便

不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升去皮尖且芫花不治利麻黃主喘今此語反之疑非仲景意（注見第三卷中）

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也屬小青龍湯證三十六（用前方）

中風往來寒熱傷寒五六日以後胷脅苦滿嘿嘿不欲飲食煩心喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者屬小柴胡湯證三十七（用前第三十二方）

傷寒四五日身熱惡風頸項强脅下滿手足溫而

渴者屬小柴胡湯證三十八用前第三十二方

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之方三十九

柴胡四兩　黃芩一兩半　人參一兩半

桂枝一兩半去皮　生薑一兩半切　半夏二合半洗

芍藥一兩　大棗六枚擘　甘草一兩炙

右九味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服本云人參湯作如桂枝法加半夏柴胡黃芩如柴胡法今著人參作半劑

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗也四十

麻黃二兩去根節　甘草二兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合日三服

脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散利小便發汗四十一

豬苓十八銖去皮　茯苓十八銖　白朮十八銖

澤瀉一兩六銖　桂枝半兩去皮

右五味擣為散以白飲和服方寸七日三服多飲煖水汗出愈

傷寒論卷第八

漢 張仲景述
晉 王叔和撰次
宋 林億校正
明 趙開美校刻
沈 琳仝校

仲景全書第八

辨發汗後病脉證并治第十七

辨不可吐第十八　辨可吐第十九

辨發汗後病脉證并治第十七 合二十五法方二十四首

太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢急難以屈伸者屬桂枝加附子湯第一六味前有八病證

太陽病服桂枝湯煩不解先刺風池風府却與桂枝湯第二五味

服桂枝湯汗出脉洪大者與桂枝湯若形似瘧一日再發者屬桂枝二麻黃一湯第三七味

服桂枝湯汗出後煩渴不解脉洪大者屬白虎加人參湯第四五味

傷寒脉浮自汗出小便數心煩惡寒脚攣急與桂枝攻表得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯厥愈更作芍藥甘草湯其脚即伸若胃氣不和與調胃承氣湯若重發汗加燒針者與四逆湯第五甘草乾薑湯芍藥甘草湯並二味調胃承氣湯四逆湯並三味

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼八九日不解服湯已發煩必劒宜麻黃湯第六四味

傷寒發汗已解半日復煩脉浮數者屬桂枝湯證第七用前第二方

發汗後身疼脉沈遲者屬桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯第八六味

發汗後不可行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯第九四味

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者

屬桂枝甘草湯第十二味

發汗後臍下悸欲作奔豚屬茯苓桂枝甘草大棗湯第十一四味甘爛水法附

發汗後腹脹滿者屬厚朴生薑半夏甘草人參湯第十二五味

發汗病不解反惡寒者虛也屬芍藥甘草附子湯第十三三味

發汗後不惡寒但熱者實也當和胃氣屬調胃承氣湯證十四用前第五方

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠若

脉浮小便不利渴者屬五苓散第十五五味

發汗已脉浮數煩渴者屬五苓散證第十六用前第十五方

傷寒汗出而渴者宜五苓散不渴者屬茯苓甘草湯第十七四味

太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤動欲擗一作僻地者屬真武湯第十八五味

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞乾噫腹中雷鳴下利者屬生薑瀉心湯第十九八味

傷寒汗出不解心中痞嘔吐下利者屬大柴胡

湯第二十。八味

陽明病。自汗。若發其汗。小便自利。雖鞕不可攻。須自欲大便。宜蜜煎。若土瓜根。豬膽汁為導。第二十一。蜜煎一味。豬膽方二味。

太陽病。三日發汗不解。蒸蒸發熱者。屬調胃承氣湯證。第二十二。用前第五方

大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利厥逆惡寒者。屬四逆湯證。第二十三。用前第五方

發汗後不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。第二十四。四味

發汗多。亡陽讝語者。不可下。與柴胡桂枝湯。和其榮衛。後自愈。第二十五。九味

二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之為逆。如此可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。熏之。若發汗不徹不足言。陽氣怫鬱不得越。當汗不汗。其人煩躁不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得。其人短氣。但坐。以汗出不徹故也。更發汗則愈。何以知汗出不徹。以脉濇故知也。

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不即欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者必大便鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕當問小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液

當還入胃中故知不久必大便也

發汗多若重發汗者亡其陽讝語脉短者死脉自和者不死

傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕（一作溫）在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者屬桂枝加附子湯方一

桂枝（三兩去皮） 芍藥（三兩） 甘草（二兩炙） 生薑（三兩切） 大棗（十二枚擘） 附子（一枚炮）

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加附子。

太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。卻與桂枝湯。則愈。方二。

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　生薑三兩切　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾。熱粥一升。以助藥力。

服桂枝湯。大汗出。脈洪大者。與桂枝湯。如前法。若形似瘧。一日再發者。汗出必解。屬桂枝二麻黃一

湯方三。

桂枝一兩十七銖　芍藥一兩六銖　麻黃一十六銖去節　生薑一兩六銖　杏仁十六箇去皮尖　甘草一兩二銖炙　大棗五枚擘

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。本云桂枝湯二分。麻黃湯一分。合為二升。分再服。今合為一方。

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。屬白虎加人參湯。方四。

知母六兩　石膏一斤碎綿裹　甘草二兩炙
粳米六合　人參二兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。日三服。

傷寒脉浮自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝。欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。讝語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。與四逆湯。五。

甘草乾薑湯方

甘草四兩炙　乾薑二兩

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

芍藥甘草湯方

白芍藥四兩　甘草四兩炙

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

調胃承氣湯方

大黃四兩去皮清酒洗　甘草二兩炙　芒消半升

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。內芒消。更上微火煮。令沸。少少溫服之。

四逆湯方

甘草二兩 炙 乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

太陽病。脉浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當復發汗。服湯已。微除。其人發煩目瞑。劇者。必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。宜麻黃湯方六。

麻黃三兩 去節 桂枝二兩 去皮 甘草一兩 炙

杏仁七十箇 去皮尖

右四味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。

傷寒發汗已解半日許。復煩。脉浮數者。可更發汗。屬桂枝湯證七用前第二方

發汗後。身疼痛。脉沈遲者。屬桂枝加芍藥生薑各一兩。人參三兩。新加湯方八。

桂枝三兩 去皮 芍藥四兩 生薑四兩

甘草二兩炙　人參三兩　大棗十二枚擘

右六味。以水一斗二升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加芍藥生薑人參。

發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘無大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯。方九。

麻黃四兩去節　杏仁五十箇去皮尖　甘草二兩炙

石膏半斤碎

右四味。以水七升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本云黃耳杯。

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。屬桂枝甘草湯。方十。

桂枝二兩去皮　甘草二兩炙

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。

發汗後。其人臍下悸者。欲作奔豚。屬茯苓桂枝甘草大棗湯。方十一。

茯苓半斤　桂枝四兩去皮　甘草一兩炙

大棗十五枚擘

右四味。以甘爛水一斗。先煮茯苓。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

作甘爛水法。取水二斗。置大盆內。以杓揚之。水

上有珠子五六千顆相逐取用之。

發汗後腹脹滿者屬厚朴生薑半夏甘草人參湯方十二。

厚朴半斤炙　生薑半斤　半夏半升洗

甘草二兩炙　人參一兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服。

發汗病不解反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯方十三。

芍藥三兩　甘草三兩　附子一枚炮去皮破六片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫三服疑非仲景方。

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣屬調胃承氣湯證十四。用前第五方。一法用小承氣湯。

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者屬五苓散方十五。

猪苓十八銖去皮　澤瀉一兩六銖　白朮十八銖

茯苓十八銖　桂枝半兩去皮

右五味擣為散以白飲和服方寸匕日三服多

飲煖水。汗出愈。

發汗已。脉浮數煩渴者。屬五苓散。證十六。用前第十五方。傷寒汗出而渴者。宜五苓散。不渴者。屬茯苓甘草湯。方十七。

茯苓二兩　桂枝二兩　甘草一兩炙　生薑一兩

右四味。以水四升。煮取二升。去滓。分温三服。

太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩身瞤動。振振欲擗一作僻地者。屬真武湯。方十八

茯苓三兩　芍藥三兩　生薑三兩切　附子一枚炮去皮破八片　白朮二兩

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。温服七合。日三服。

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞕。乾噫食臭。脅下有水氣。腹中雷鳴下利者。屬生薑瀉心湯。方十九。

生薑四兩　甘草三兩炙　人參三兩　乾薑一兩　黄連一兩　黄芩三兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右八味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。生薑瀉心湯。本云理中人參

黃芩湯去桂枝术加黃連并瀉肝法。

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者屬大柴胡湯方二十。

柴胡半斤　枳實四枚炙　生薑五兩

黃芩三兩　芍藥三兩　半夏半升洗

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服一方加大黃二兩若不加恐不名大柴胡湯。

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液内竭雖鞕不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大豬膽汁皆可為導二十一。

蜜煎方

食蜜七合

右一味於銅器内微火煎當須凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指許長二寸當熱時急作冷則鞕以内穀道中以手急抱欲大便時乃去之疑非仲景意已試甚良

又大豬膽一枚瀉汁和少許法醋以灌穀道内。

如一食頃當大便出宿食惡物甚效。

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也屬調胃承氣湯證二十二用前第五方

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者屬四逆湯證二十三用前第五方

發汗後不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯方二十四。

大黃四兩酒洗　厚朴半斤炙　枳實五枚炙

芒消三合

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃更煮取二升去滓內芒消更一二沸分再服得利者止後服。

發汗多亡陽讝語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈方二十五。

柴胡四兩　桂枝一兩半去皮　黃芩一兩半　芍藥一兩半　生薑一兩半　大棗六箇擘　人參一兩半　半夏二合半洗　甘草一兩炙

右九味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服。

辨不可吐第十八合四證

太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脉細數者以醫吐之過也若得病一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣者此為吐之內煩也

少陰病飲食入口則吐心中温温欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胷中實不可下也若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當温之

諸四逆厥者不可吐之虛家亦然

辨可吐第十九 合二法五證

大法春宜吐

凡用吐湯中病便止不必盡劑也

病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胷中痞鞕氣上撞咽喉不得息者此為有寒當吐之（一云此以内有久痰宜吐之）

病胷上諸實（一作寒）胷中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利日十餘行其脉反遲寸口脉微滑此可吐之吐之利則止

少陰病飲食入口則吐心中温温欲吐復不能吐

者宜吐之。
宿食在上管者當吐之。
病手足逆冷脉乍結以客氣在胃中心下滿而煩欲食不能食者病在胃中當吐之。

世讓堂翻宋板

傷寒論卷第九

漢 張仲景述 晉 王叔和撰次 宋 林億等校正 明 趙開美校刻 沈琳全校

仲景全書第九

辨不可下病脉證并治第二十

辨可下病脉證并治第二十一

辨不可下病脉證并治第二十 合四法方六首

陽明病潮熱大便微鞕與大承氣湯若不大便六七日恐有燥屎與小承氣湯和之第一 大承氣四

味小承氣二味。
前有四十病證。

傷寒中風。反下之。心下痞。醫復下之。痞益甚。屬甘草瀉心湯第二。六味

下利脉大者。虛也。以强下之也。設脉浮革腸鳴者。屬當歸四逆湯第三。七味。下有陽明病二證。

陽明病。汗自出。若發汗。小便利。津液內竭。雖鞕不可攻。須自大便。宜蜜煎若土瓜根猪膽汁導之第四。蜜煎一味。猪膽汁二味。

脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。微反在上。濇反在下。微則陽氣不足。濇則無血。陽氣反微。中風汗出而反躁煩。濇則無血。厥而且寒。陽微則不可下。下之則心下痞鞕。

動氣在右。不可下。下之則津液內竭。咽燥鼻乾。頭眩心悸也。

動氣在左。不可下。下之則腹內拘急。食不下。動氣更劇。雖有身熱。臥則欲蜷。

動氣在上。不可下。下之則掌握熱煩。身上浮冷。熱汗自泄。欲得水自灌。

動氣在下。不可下。下之則腹脹滿。卒起頭眩。食則下清穀。心下痞也。

咽中閉塞不可下。下之則上輕下重。水漿不下。臥則欲蹉身急痛。下利日數十行。

諸外實者。不可下。下之則發微熱。亡脉厥者。當齊握熱。

諸虛者。不可下。下之則大渴。求水者易愈。惡水者劇。

脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。弦反在上。微反在下。弦為陽運。微為陰寒。上實下虛。意欲得温。微弦為虛。虛者不可下也。微則為欬。欬則吐涎。下之則欬止而利。因不休。利不休。則胷中如蠶醬粥入則出。小便不利。兩脅拘急。喘息為難。頸背相引。臂則不仁。極寒反汗出。身冷若冰。眼睛不慧。語言不休。而穀氣多入。此為除中（亦云消中）口雖欲言。舌不得前。

脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。浮反在上。數反在下。浮為陽虛。數為無血。浮為虛。數生熱。浮為虛自汗出而惡寒。數為痛。振而寒慄。微弱在關。胷下為急。喘汗而不得呼吸。呼吸之中。痛在於胷。振寒相搏。形如瘧狀。醫反下之。故令脉數發熱。狂走見鬼。心下為痞。小便淋滴。少腹甚鞕。小便則尿血也。

脉濡而緊。濡則衛氣微。緊則榮中寒。陽微衛中風。

發熱而惡寒榮緊胃氣冷。微嘔心內煩。醫謂有大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭。卒起而頭眩。客熱在皮膚。悵怏不得眠。不知胃氣冷。緊寒在關元。投巧無所施。汲水灌其身。客熱應時罷。慄慄而振寒。重被而覆之。汗出而冒巔。體惕而又振。小便為微難。寒氣因水發。清穀不容間。嘔變反腸出。顛倒不得安。手足為微逆。身冷而內煩。遲欲從後救。安可復追還。

脉浮而大浮為氣實。大為血虛。血虛為無陰。孤陽獨下陰部者。小便當赤而難。胞中當虛。今反小便利而大汗出。法應衛家當微。今反更實。津液四射榮竭血盡乾煩而不眠。血薄肉消而成暴（一云黑）。醫復以毒藥攻其胃。此為重虛。客陽去有期。必下如汗泥而死。

脉浮而緊。浮則為風。緊則為寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。當發其汗。而不可下也。趺陽脉遲而緩。胃氣如經也。趺陽脉浮而數。浮則傷胃。數則動脾。此非本病。醫特下之。所為也。榮衛內陷。其數先微。脉反但浮。其人必大便鞕。氣噫而除。何以言之。本以數脉動脾。其數先微。故知脾氣

不治大便鞕氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如法病者則飢數脉不時則生惡瘡也

脉數者欠數不止止則邪結正氣不能復正氣却結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脉數者不可下下之必煩利不止

少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺中弱濇者復不可下之

脉浮大應發汗醫反下之此為大逆也

脉浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈汗少則便難脉遲尚未可攻

二陽併病太陽初得病時而發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下下之為逆

結胷證脉浮大者不可下下之即死

太陽與陽明合病喘而胷滿者不可下

太陽與少陽合病者心下鞕頸項强而眩者不可下

諸四逆厥者不可下之虛家亦然。

病欲吐者不可下。

太陽病有外證未解不可下下之為逆。

病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞。

病脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞。

夫病陽多者熱下之則愈。

本虛攻其熱必嘔。

無陽陰強大便鞕者下之必清穀腹滿。

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自

痛下之必胷下結鞕。

厥陰之為病消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐蚘下之利不止。

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胷中實不可下也。

傷寒五六日不結胷腹濡脉虛復厥者不可下此亡血下之死。

傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人熏之則喘不得小便心腹滿下之則短氣小便難頭痛背強加温針則衄。

傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者脉初来大漸漸小更来漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛若熱多者目赤脉多晴不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多便清穀熱多便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者可救之若小便難者為危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制貪水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足温者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則目閉貪水者若下之其脉必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則譫懊陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩躁脉數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下痞至四日雖能食以承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少雖不大便但頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之

藏結無陽證不往来寒熱其人反靜舌上胎滑者

不可攻也。

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之。

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大便必復鞕而少也宜小承氣湯和之不轉失氣者愼不可攻也大承氣湯方一。

大黃四兩厚朴八兩炙枳實五枚炙芒消三合

右四味以水一斗先煮二味取五升下大黃煮取二升去滓下芒消再煮一二沸分二服利則止後服。

小承氣湯方

大黃四兩酒洗厚朴二兩炙去皮枳實三枚炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温再服。

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但

以胃中虛客氣上逆故使鞕也屬甘草瀉心湯方二。

甘草四兩炙　黃芩三兩　乾薑三兩
大棗十二枚擘　半夏半升洗　黃連一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升。溫服一升日三服有人參見第四卷中

下利脉大者虛也以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴者屬當歸四逆湯方三。

當歸三兩　桂枝三兩去皮　細辛三兩
甘草二兩炙　通草二兩　芍藥三兩

大棗二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升半日三服。

陽明病身合色赤不可攻之必發熱色黃者小便不利也。

陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈。

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖鞕不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通之。若土瓜根及豬膽汁皆可為導方四。

食蜜七合

右一味於銅器內微火煎當須凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞕以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之疑非仲景意已試甚良又大豬膽一枚瀉汁和少許法醋以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效

辨可下病脉證并治第二十一　合四十四法方一十一首

陽明病汗多者急下之宜大柴胡湯第一　加大黃心

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯第二　四味

少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜大承氣湯第三　用前第二方

少陰病下利清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣湯第四　大柴胡湯用前第一方大承氣湯用前第二方

下利三部脉平心下鞕者急下之宜大承氣湯第五　用前第二方

下利脉遲滑者內實也利未止當下之宜大承氣湯第六　用前第二方

陽明少陽合病下利脉不負者順也脉滑數者有宿食當下之宜大承氣湯第七用前第二方

寸脉浮大反濇尺中微而濇故知有宿食當下之宜大承氣湯第八用前第二方

下利不欲食者以有宿食當下之宜大承氣湯第九用前第二方

下利差至其年月日時復發者以病不盡當下之宜大承氣湯第十用前第二方

病腹中滿痛此為實當下之宜大承氣大柴胡湯第十一大承氣用前第二方大柴胡用前第一方

下利脉反滑當有所去下乃愈宜大承氣湯第十二用前第二方

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯第十三大柴胡用前第一方大承氣用前第二方

傷寒後脉沈沈者內實也下之解宜大柴胡湯第十四用前第一方

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實也急下之宜大承氣大柴胡湯第十五大柴胡用前第一方大承氣用前第二方

太陽病未解脉陰陽俱停先振慄汗出而解陰

脉微者下之解宜大柴胡湯第十六用前第一方一法用調胃承氣湯

脉雙弦而遲者心下鞕脉大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯第十七用前第二方

結胷者項亦強如柔痙狀下之和第十八結胷門用大陷胷丸

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之宜大柴胡湯第十九用前第一方

太陽病表證仍在脉微而沈不結胷發狂少腹滿小便利下血愈宜下之以抵當湯第二十四味

太陽病身黃脉沈結少腹鞕小便自利其人如狂血證諦屬抵當湯證第二十一用前第二十方

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利為有血當下之宜抵當丸第二十二四味

陽明病但頭汗出小便不利身必發黃宜下之茵蔯蒿湯第二十三三味

陽明證其人喜忘必有畜血大便色黑宜抵當湯下之第二十四用前第二十方

汗出讝語以有燥屎過經可下之宜大柴胡大承氣湯第二十五大柴胡用前第一方大承氣用前第二方

病人煩熱汗出如瘧狀日晡發熱脈實者可下之宜大柴胡大承氣湯第二十六大柴胡用前第一方大承氣用前第二方

陽明病讝語潮熱不能食胃中有燥屎若能食但鞕耳屬大承氣湯證第二十七用前第二方

下利讝語者有燥屎也屬小承氣湯第二十八三味

得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下痞小便利屎定鞕宜大承氣湯第二十九用前第二方一云大柴胡湯

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之屬十棗湯第三十二味

太陽病不解熱結膀胱其人如狂宜桃核承氣湯第三十一五味

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者屬茵蔯蒿湯證第三十二用前第二十三方

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐下利者屬大柴胡湯證第三十三用前第一方

傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者屬大柴胡湯證第三十四用前第一方

但結胸無大熱水結在胸脅也頭微汗出者屬大陷胸湯第三十五三味

傷寒六七日結胸熱實脉沈緊心下痛者屬大陷胸湯證第三十六用前第三十五方

陽明病多汗津液外出胃中燥大便必鞕讝語屬小承氣湯證第三十七用前第二十八方三味

陽明病不吐下心煩者屬調胃承氣湯第三十八三味

陽明病脉遲雖汗出不惡寒身必重腹滿而喘有潮熱大便鞕大承氣湯主之若汗出多微發熱惡寒桂枝湯主之大承氣湯用前第二方小承氣湯用前第二十八方桂枝湯五味

陽明病潮熱大便微鞕與大承氣湯若不大便六七日恐有燥屎與小承氣湯若不轉氣不可攻之後發熱大便復鞕者宜以小承氣湯和之第四十並用前方

陽明病讝語潮熱脉滑疾者屬小承氣湯證第四十一用前第二十八方

二陽併病太陽證罷但發潮熱汗出大便難讝

黃芩 三兩　芍藥 三兩　大棗 十二枚擘

半夏 半升洗

右七味以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服一方云加大黃二兩若不加恐不成大柴胡湯

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯方二

大黃 四兩酒洗　厚朴 半斤炙去皮　枳實 五枚炙

芒消 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃更

語者下之愈宜大承氣湯第四十二用前第二方

病人小便不利大便乍難乍易微熱喘冒者屬大承氣湯證第四十三用前第二方

大下六七日不大便煩不解腹滿痛者屬大承氣湯證第四十四用前第二方

大法秋宜下

凡可下者用湯勝丸散中病便止不必盡劑也

陽明病發熱汗多者急下之宜大柴胡湯方一法用小承氣湯

柴胡 八兩　枳實 四枚炙　生薑 五兩

煑取二升。去滓。內芒消。更上微火一兩沸。分溫再服。得下。餘勿服。

少陰病。六七日腹滿不大便者。急下之。宜大承氣湯。三。用前第二方

少陰病。下利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。可下之。宜大柴胡大承氣湯。四。用前第二方

下利。三部脉皆平。按之心下鞕者。急下之。宜大承氣湯。五。用前第二方

下利。脉遲而滑者。內實也。利未欲止。當下之。宜大承氣湯。六。用前第二方

陽明少陽合病。必下利。其脉不負者。為順也。負者。失也。互相剋賊。名為負也。脉滑而數者。有宿食。當下之。宜大承氣湯。七。用前第二方

問曰。人病有宿食。何以別之。師曰。寸口脉浮而大。按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食。當下之。宜大承氣湯。八。用前第二方

下利不欲食者。以有宿食故也。當下之。宜大承氣湯。九。用前第二方

下利差。至其年月日時復發者。以病不盡故也。當下之。宜大承氣湯。十。用前第二方

病腹中滿痛者此為實也當下之宜大承氣大柴胡湯十一用前第一方

下利脉反滑當有所去下乃愈宜大承氣湯十二用前第二方

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯十三用前第一第二方

傷寒後脉沈沈者內實也下之解宜大柴胡湯十四用前第一方

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣大柴胡湯十五用前第一第二方

太陽病未解脉陰陽俱停一作微必先振慄汗出而解但陰脉微一作尺脉實者下之而解宜大柴胡湯十六用前第一方一法用調胃承氣湯

脉雙弦而遲者必心下鞕脉大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯十七用前第二方

結胷者項亦強如柔痙狀下之則和十八結胷門用大陷胷丸

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之宜大柴胡湯十九用前第一方

太陽病六七日表證仍在脉微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿而小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之以抵當湯方二十。

水蛭三十枚熬　桃仁二十枚去皮尖　蝱蟲三十枚去翅足熬

大黃三兩去皮破六片

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下者更服。

太陽病身黃脉沈結少腹鞕滿小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦屬抵當湯證

二十一用前第二十方

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之宜抵當丸方二十二。

大黃三兩　桃仁二十五箇去皮尖　蝱蟲去翅足熬

水蛭各二十箇熬

右四味搗篩為四丸以水一升煮一丸取七合服之晬時當下血若不下者更服。

陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者以瘀熱在裏身必發黃宜下之以茵蔯蒿湯方二十

三。

茵蔯蒿六兩　梔子十四箇擘　大黃二兩破

右三味。以水一斗二升。先煮茵蔯減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

陽明證。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖鞕大。便反易。其色必黑。宜抵當湯下之。二十四用前第二十方

汗一作臥出讝語者。以有燥屎在胃中。此為風也。須下者。過經乃可下之。下之若早者。語言必亂。以表虛裏實故也。下之愈。宜大柴胡大承氣湯。二十五用前第一方

病人煩熱汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脉實者。可下之。宜大柴胡大承氣湯。二十六用前第一方

陽明病。讝語有潮熱。反不能食者。胃中有燥屎五六枚也。若能食者。但鞕耳。屬大承氣湯。證二十七用前第二方

下利讝語者。有燥屎也。屬小承氣湯方。二十八。

大黃四兩　厚朴二兩炙去皮　枳實三枚炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温再服若更衣者勿服之

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下痞至四五日雖能食以承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不大便但初頭鞕後必溏此未定成鞕也攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大承氣湯

二十九用前第二方一云大柴胡湯

太陽病中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脅下痛乾嘔則短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也屬十棗湯方三十

芫花熬赤　甘遂　大戟各等分

右三味各異擣篩秤已合治之以水一升半煮大肥棗十枚取八合去棗內藥末強人服重一錢七羸人半錢温服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外未解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯方三十一

桃仁五十枚去皮尖　大黃四兩　甘草二兩炙

芒消二兩　桂枝二兩去皮

右五味。以水七升。煑四物。取二升半。去滓。內芒消。更上火煎。微沸。先食。溫服五合。日三服。當微利。

傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。屬茵蔯蒿湯。證三十二。用前第二十三方

傷寒發熱。汗出不解。心中痞鞕。嘔吐而下利者。屬大柴胡湯。證三十三。用前第一方

傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。屬大柴胡湯。證三十四。用前第一方

但結胷。無大熱者。以水結在胷脅也。但頭微汗出者。屬大陷胷湯。方三十五。

大黃六兩　芒消一升　甘遂末一錢七

右三味。以水六升。先煑大黃。取二升。去滓。內芒消。更煑一二沸。內甘遂末。溫服一升。

傷寒六七日。結胷熱實。脉沈而緊。心下痛。按之石鞕者。屬大陷胷湯。證三十六。用前第三十五方

陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞕。鞕則讝語。屬小承氣湯。證三十七。用前第二十八方

陽明病不吐不下心煩者屬調胃承氣湯方三十八

大黃四兩酒洗　甘草二兩炙　芒消半升

右三味以水三升煮取一升去滓內芒消更上火微煮令沸溫頓服之

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗出多微發熱惡寒者外未解也桂枝湯主之其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下三十九大承氣湯用前第二方小承氣用前第二十八方

桂枝湯方

桂枝去皮　芍藥　生薑切各三兩　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升服湯後飲熱稀粥一升餘以助藥力取微似汗

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也

乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大便必復鞕而少也宜以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也四十。並用前方

陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也為難治不可更與承氣湯四十一。用前第二十八方

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之則愈宜大承氣湯四十二。用前第二方

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也屬大承氣湯證四十三。用前第二方

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也屬大承氣湯證四十四。用前第二方

傷寒論卷第九

世讓堂翻宋板

傷寒論卷第十　仲景全書第十

漢　張仲景述　晉　王叔和撰次

宋　林　億校正

明　趙開美校刻

沈　琳全校

辨發汗吐下後病脉證并治第二十二　合四十八法方三十九首

太陽病八九日如瘧狀熱多寒少不嘔清便脉微而惡寒者不可更發汗吐下也以其不得小汗身必癢屬桂枝麻黃各半湯第一七味止前有二十二病

證。

服桂枝湯或下之仍頭項強痛發熱無汗心下滿痛小便不利屬桂枝去桂加茯苓白朮湯第二十六味

太陽病發汗不解而下之脉浮者為在外宜桂枝湯第三十五味

下之後復發汗晝日煩躁夜安靜不嘔不渴無表證脉沈微者屬乾薑附子湯第四二味

傷寒若吐下後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩脉沈緊發汗則身為振搖者屬茯苓桂枝白朮甘草湯第五四味

發汗若下之病不解煩躁者屬茯苓四逆湯第六五味

發汗吐下後虛煩不眠若劇者反覆顛倒心中懊憹屬梔子豉湯少氣者梔子甘草豉湯嘔者梔子生薑豉湯第七梔子豉湯二味梔子甘草豉湯梔子生薑豉湯並三味

發汗下之而煩熱胷中窒者屬梔子豉湯證第八用上湯方

太陽病過經十餘日心下欲吐胷中痛大便溏

腹滿微煩先此時極吐下者與調胃承氣湯第九三味

太陽病重發汗復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡潮熱心腹鞕滿痛不可近者屬大陷胸湯第十三味

傷寒五六日發汗復下之胷脅滿微結小便不利渴而不嘔頭汗出寒熱心煩者屬柴胡桂枝乾薑湯第十一七味

傷寒發汗吐下解後心下痞鞕噫氣不除者屬旋覆代赭湯第十二七味

傷寒下之復發汗心下痞惡寒表未解也表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯第十三桂枝湯用前第三方大黃瀉心湯二味

傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱惡風大渴舌上燥而煩欲飲水數升者屬白虎加人參湯第十四五味

傷寒吐下後不解不大便至十餘日日晡發潮熱不惡寒如見鬼狀劇者不識人循衣摸床惕而不安微喘直視發熱讝語者屬大承氣湯第十五四味

三陽合病腹滿身重口不仁面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上汗手足逆冷自汗出者屬白虎湯第十六四味

陽明病脉浮緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出反惡熱身重若發汗則譫語加温針必怵惕煩躁不眠若下之則心中懊憹舌上胎者屬梔子豉湯證第十七用前第七方

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎可攻宜大承氣湯第十八用前第十五方

太陽病吐下發汗後微煩小便數大便鞕者與小承氣湯和之第十九二味

大汗大下而厥者屬四逆湯第二十三味

太陽病下之氣上衝者與桂枝湯第二十一用前第三方

太陽病下之後脉促胷滿者屬桂枝去芍藥湯第二十二四味

若微寒者屬桂枝去芍藥加附子湯第二十三五味

太陽桂枝證反下之利不止脉促喘而汗出者屬葛根黄芩黄連湯第二十四四味

太陽病下之微喘者表未解也屬桂枝加厚朴杏子湯第二十五七味

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯小便清者一云大便青知不在裏當發汗宜桂枝湯第二十六用前第三方

傷寒五六日下之後身熱不去心中結痛者屬梔子豉湯證第二十七用前第七方

傷寒了後心煩腹滿臥起不安屬梔子厚朴湯第二十八三味

傷寒以丸藥下之身熱不去微煩者屬梔子乾薑湯第二十九二味

傷寒下之續得下利不止身疼痛急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯第三十並用前方

太陽病過經十餘日二三下之柴胡證仍在與小柴胡嘔止小安鬱鬱微煩者可與大柴胡湯第三十一八味

傷寒十三日不解胸脅滿而嘔日晡發潮熱微利潮熱者實也先服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之第三十二八味

傷寒十三日過經譫語有熱也若小便利當大便鞕而反利者知以丸藥下之也脉和者內實也屬調胃承氣湯證第三十三用前第九方

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者屬柴胡加龍骨牡蠣湯第三十四十二味

火逆下之因燒針煩躁者屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯第三十五四味

太陽病脉浮而動數頭痛發熱盜汗惡寒反下之膈內拒痛短氣躁煩心中懊憹心下因鞕則為結胸屬大陷胸湯證第三十六用前第十方

傷寒五六日嘔而發熱者小柴胡湯證具以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心滿而鞕痛者此為結胸大陷胸湯主之但滿而不痛者為痞屬半夏瀉心湯第三十七七味

本以下之故心下痞其人渴而口燥煩小便不利者屬五苓散第三十八五味

傷寒中風下之其人下利日數十行腹中雷鳴心下痞鞕乾嘔心煩復下之其痞益甚屬甘草

瀉心湯第三十九 六味

傷寒服藥下利不止心下痞鞕復下之利不止與理中利益甚屬赤石脂禹餘粮湯第四十 二味

太陽病外證未除數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解屬桂枝人參湯第四十一 五味

下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者屬麻黃杏子甘草石膏湯第四十二 四味

陽明病下之外有熱手足温心中懊憹飢不能食但頭汗出屬梔子豉湯證第四十三 用前第七方

傷寒吐後腹脹滿者屬調胃承氣湯證第四十四 用前第九方

病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數可下之假令已下脉數不解不大便者有瘀血屬抵當湯第四十五 四味

本太陽病反下之腹滿痛屬太陰也屬桂枝加芍藥湯第四十六 五味

傷寒六七日大下寸脉沈而遲手足厥下部脉不至喉咽不利唾膿血者屬麻黃升麻湯第四十七 十四味

傷寒本自寒下復吐下之食入口即吐屬乾薑黃芩黃連人參湯第四十八四味

師曰病人脉微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲濇故知亡血也

寸口脉浮大而醫反下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人則餚

太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞病桂枝不中與之也觀其脉證知犯何逆隨證治之

脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液和便自汗出愈

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液陰陽脉自

和者必自愈。

大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈。

下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以内外俱虛故也。

本發汗而復下之此為逆也若先發汗治不為逆本先下之而反汗之為逆若先下之治不為逆。

太陽病先下而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也得表和然後復下之。

得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足温醫二三下之不能食而脅下滿痛面目及身黃頸項强小便難者與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡不中與也食穀者噦。

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脉微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胷未止者四日復下之此作協熱利也。

太陽病下之其脉促一作縱不結胷者此為欲解也。

脉浮者必結胷脉緊者必咽痛脉弦者必兩脅拘急脉細數者頭痛未止脉沈緊者必欲嘔脉沈滑

者協熱利脉浮滑者必下血。
太陽少陽併病而反下之成結胷心下鞕下利不止水漿不下其人心煩。
脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡。但氣痞耳。
傷寒吐下發汗後虛煩脉甚微八九日心下痞鞕胷下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿。
陽明病能食下之不解者其人不能食若攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦。

陽明病脉遲食難用飽飽則發煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也。
夫病陽多者熱下之則鞕汗多極發其汗亦鞕。
太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也。
太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胷下結鞕。
傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷

故也。

吐利發汗後脉平小煩者以新虛不勝穀氣故也

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足温者易愈。

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少。其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者為欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其

不能得小汗出身必癢屬桂枝麻黃各半湯方一。

桂枝一兩十六銖　芍藥一兩　生薑一兩切　甘草一兩炙　麻黃一兩去節　大棗四枚擘　杏仁二十四箇湯浸去皮尖及兩人者

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓温服六合本云桂枝湯三合麻黃湯三合併為六合頓服。

服桂枝湯或下之仍頭項强痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者屬桂枝去桂加茯苓白朮湯方二。

芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩切

白朮三兩　茯苓三兩　大棗十二枚擘

右六味。以水八升。煑取三升。去滓。溫服一升。小便利則愈。本云桂枝湯。今去桂枝加茯苓白朮。

太陽病。先發汗不解。而下之。脉浮者。不愈。浮為在外。而反下之。故令不愈。今脉浮故在外。當須解外則愈。宜桂枝湯。方三。

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　生薑三兩切

甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味。以水七升。煑取三升。去滓。溫服一升。須臾啜熱稀粥一升。以助藥力。取汗。

下之後。復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脉沈微。身無大熱者。屬乾薑附子湯。方四。

乾薑一兩　附子一枚生用去皮破八片

右二味。以水三升。煑取一升。去滓。頓服。

傷寒若吐若下後。心下逆滿。氣上衝胷。起則頭眩。脉沈緊。發汗則動經。身為振振搖者。屬茯苓桂枝白朮甘草湯。方五。

茯苓四兩　桂枝三兩去皮　白朮二兩　甘草二兩炙

右四味。以水六升。煑取三升。去滓。分温三服。

發汗若下之後。病仍不解。煩躁者。屬茯苓四逆湯。方六。

茯苓四兩　人參一兩　附子一枚生用去皮破八片

甘草二兩炙　乾薑一兩半

右五味。以水五升。煑取二升。去滓。温服七合。日三服。

發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。屬梔子豉湯。若少氣者。梔子甘草豉湯。若嘔者。梔子生薑豉湯。七。

肥梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味。以水四升。先煑梔子。得二升半。內豉。煑取一升半。去滓。分為二服。温進一服。得吐者。止後服。

梔子甘草豉湯方

肥梔子十四箇擘　甘草二兩炙　香豉四合綿裹

右三味。以水四升。先煑二味。取二升半。內豉。煑取一升半。去滓。分二服。温進一服。得吐者。止後服。

梔子生薑豉湯方

肥梔子十四箇擘　生薑五兩切　香豉四合綿裹

右三味以水四升先煑二味取二升半內豉煑取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

發汗若下之而煩熱胷中窒者屬梔子豉湯證八用前初方

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胷中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胷中痛微溏者此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也調胃承氣湯方九

大黃四兩酒洗　甘草二兩炙　芒消半升

右三味以水三升煑取一升去滓內芒消更上火令沸頓服之

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱一云日晡所發心胷大煩從心下至少腹鞕滿而痛不可近者屬大陷胷湯方十

大黃六兩去皮酒洗　芒消一升　甘遂末一錢匕

右三味以水六升煑大黃取二升去滓內芒消煑兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

傷寒五六日已發汗而復下之胸脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也屬柴胡桂枝乾薑湯方十一。

柴胡半斤　桂枝三兩去皮　乾薑二兩　栝樓根四兩　黃芩三兩　甘草二兩炙　牡蠣二兩熬

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩後汗出便愈。

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者屬旋復代赭湯方十二。

旋復花三兩　人參二兩　生薑五兩　代赭一兩　甘草三兩炙　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服。

傷寒大下之復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃攻痞解表宜桂枝湯用前方攻痞宜大黃黃連瀉心湯方十三。

大黃二兩酒洗　黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫

再服。有黃芩見第四卷中。

傷寒若吐下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩欲飲水數升者。屬白虎加人參湯。方十四。

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙

粳米六合　人參三兩

右五味。以水一斗。煑米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。

傷寒若吐若下後。不解。不大便。五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸牀。惕而不安。一云順衣妄撮。怵惕不安。微喘直視。脉弦者生。濇者死。微者但發熱。讝語者。屬大承氣湯。方十五。

大黃四兩去皮酒洗　厚朴半斤炙　枳實五枚炙

芒消三合

右四味。以水一斗。先煑二味。取五升。內大黃。煑取二升。去滓。內芒消。更煑。令一沸。分溫再服。得利者。止後服。

三陽合病。腹滿。身重。難以轉側。口不仁。面垢。又作枯。一云向經。

讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗若手足逆冷自汗出者屬白虎湯十六。

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升。日三服。

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒而反讝語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者屬梔子豉湯。

用前第七方

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯第十八用前第十五方

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯和之愈方十九。

大黃四兩酒洗　厚朴二兩炙　枳實三枚炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服。

大汗若大下而厥冷者屬四逆湯方二十。

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煑取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾薑四兩

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯若不上衝者不得與之二十一用前第三方

太陽病下之後脉促胷滿者屬桂枝去芍藥湯方二十二促一作縱

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩

大棗十二枚擘

右四味以水七升煑取三升去滓温服一升本云桂枝湯今去芍藥

若微寒者屬桂枝去芍藥加附子湯方二十三

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切

大棗十二枚擘　附子一枚炮

右五味以水七升煑取三升去滓温服一升本云桂枝湯今去芍藥加附子

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者屬葛根黄芩黄連湯方二十四促一作縱

葛根半斤　甘草二兩炙　黄芩三兩

黃連 三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓溫分再服

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚朴杏子湯方二十五

桂枝 三兩 去皮　芍藥 三兩　生薑 三兩 切

甘草 二兩 炙　厚朴 二兩 炙 去皮　大棗 十二 枚擘

杏仁 五十箇 去皮尖

右七味以水七升煮取三升去滓溫服一升

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小

便清者（一云大便青）知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必劇宜桂枝湯二十六用前第三方

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也屬梔子豉湯證二十七用前第七方

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者屬梔子厚朴湯方二十八

梔子 十四 枚擘　厚朴 四兩 炙　枳實 四箇 炙令赤

右三味以水三升半煮取一升半去滓分二服

温進一服得吐者止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者屬梔子

乾薑湯方二十九。

梔子十四箇擘　乾薑二兩

右二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。一服得吐者。止後服。

凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與服之。

傷寒醫下之續得下利清穀不止。身疼痛者。急當救裏後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯三十。並用前方

太陽病。過經十餘日。反二三下之。後四五日。柴胡證仍在者。先與小柴胡。嘔不止。心下急。一云。嘔止小安。鬱鬱微煩者。為未解也。可與大柴胡湯。下之則愈。方三十一。

柴胡半斤　黃芩三兩　芍藥三兩

半夏半升洗　生薑五兩　枳實四枚炙

大棗十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。一方加大黃二兩。若不加。恐不為大柴胡湯。

傷寒十三日不解。胸脅滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此本柴胡下之。不得利。今反利者。知醫以

九藥下之此非其治也潮熱者實也先服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之方三十二

柴胡二兩六銖　黃芩一兩　人參一兩
甘草一兩炙　生薑一兩　半夏二十銖舊云五枚洗
大棗四枚擘　芒消二兩

右八味以水四升煮取二升去滓內芒消更煮微沸溫分再服不解更作

傷寒十三日過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞕而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為內實也屬調胃承氣湯證三十三 用前第九方

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者屬柴胡加龍骨牡蠣湯方三十四

柴胡四兩　龍骨一兩半　黃芩一兩半
生薑一兩半切　鉛丹一兩半　人參一兩半
桂枝一兩半去皮　茯苓一兩半　半夏二合半洗
大黃二兩　牡蠣一兩半熬　大棗六枚擘

右十二味以水八升煮取四升內大黃切如碁

子更煮一兩沸去滓温服一升本云柴胡湯今加龍骨等

火逆下之因燒針煩躁者屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯方三十五

桂枝一兩去皮　甘草二兩炙　龍骨二兩　牡蠣二兩熬

右四味以水五升煮取二升半去滓温服八合日三服

太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈内拒痛一云頭痛卧眩胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣内陷心下因鞕則為結胸屬大陷胸湯證若不結胸但頭汗出餘處無汗剄頸而還小便不利身必發黃用前第十方三十六

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為結胸也大陷胸湯主之用前方但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之屬半夏瀉心湯

方三十七。

半夏半升洗　黃芩二兩　乾薑三兩

人參三兩　甘草三兩炙　黃連一兩

大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服。

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者屬五苓散方三十八。一方云忍之一日乃愈。

猪苓十八銖去黑皮　白朮十八銖　茯苓十八銖

澤瀉一兩六銖　桂心半兩去皮

右五味為散白飲和服方寸七。日三服多飲煖水汗出愈。

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也屬甘草瀉心湯方三十九。

甘草四兩炙　黃芩三兩　乾薑三兩

半夏半升洗　大棗十二枚擘　黃連一兩

右六味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。有人參見第四卷中

傷寒服湯藥下利不止。心下痞鞕。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中焦。此利在下焦。屬赤石脂禹餘粮湯。復不止者。當利其小便。方四十。

赤石脂一斤碎　太一禹餘粮一斤碎

右二味。以水六升。煮取二升。去滓。分温三服。

太陽病。外證未除。而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞鞕。表裏不解者。屬桂枝人參湯。方四十一。

桂枝四兩別切去皮　甘草四兩炙　白朮三兩　人參二兩　乾薑三兩

右五味。以水九升。先煮四味。取五升。內桂。更煮取三升。去滓。温服一升。日再。夜一服。

下後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。屬麻黄杏子甘草石膏湯。方四十二。

麻黄四兩去節　杏仁五十箇去皮尖　甘草二兩炙　石膏半斤碎

右四味。以水七升。先煮麻黄。減二升。去上沫。內

諸藥煮取三升去滓溫服一升本云黃耳杯
陽明病下之其外有熱手足溫不結胷心中懊憹
飢不能食但頭汗出者屬梔子豉湯證四十三用前第七劑方
傷寒吐後腹脹滿者屬調胃承氣湯證四十四用前第九方
病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數者可下之
假令已下脉數不解今熱則消穀喜飢至六七日
不大便者有瘀血屬抵當湯方四十五
大黃三兩酒洗　桃仁二十枚去皮尖　水蛭三十枚熬

蠐螬去翅足三十枚熬

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下更服
本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也
屬桂枝加芍藥湯方四十六
桂枝三兩去皮　芍藥六兩　甘草二兩炙
大棗十二枚擘　生薑三兩切
右五味以水七升煮取三升去滓分溫三服本
云桂枝湯今加芍藥
傷寒六七日大下寸脉沈而遲手足厥逆下部脉

不至咳咽不利唾膿血泄利不止者為難治屬麻黃升麻湯方四十七

麻黃二兩半去節　升麻一兩六銖　當歸一兩六銖
知母十八銖　黃芩十八銖　萎蕤十八銖作昌蒲
芍藥六銖　天門冬六銖去心　桂枝六銖去皮
茯苓六銖　甘草六銖炙　石膏六銖碎綿裹
白朮六銖　乾薑六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分温三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈

仲景本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐屬乾薑黃芩黃連人參湯方四十八

乾薑　黃芩　黃連　人參各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服

傷寒論卷第十

長洲趙應期獨刻

世讓堂翻宋板

傷寒論後序

夫治傷寒之法歷觀諸家方書得仲景之多者惟孫思邈猶曰見大醫療傷寒惟大青知母等諸冷物投之極與仲景本意相反又曰尋方之大意不過三種一則桂枝二則麻黃三則青龍凡療傷寒不出之也嗚呼是未知法之深者也奈何仲景之意治病發於陽者以桂枝生薑大棗之類發於陰者以乾薑甘草附子之類非謂全用温熱藥蓋取素問辛甘發散之說且風與寒非辛甘不能發散之也而又中風自汗用桂枝傷寒無汗用麻黃中

風見寒脉傷寒見風脉用青龍若不知此欲治傷寒者是未得其門矣然則此之三方春冬所宜用之若夏秋之時病多中暍當行白虎也故陰陽大論云脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑又云五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重別論云太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴白虎主之若誤服桂枝麻黃輩未有不黃發斑出脫血而得生者此古人所未至故附于卷之末云。

5



註解傷寒論序

夫前聖有作後必有繼述之者則其教乃
得著於世矣醫之道源自炎黃以至神之
妙始興經方繼而伊尹以元聖之才撰成
湯液俾黎庶之疾疢咸遂蠲除使萬代之
生靈普蒙拯濟後漢張仲景又廣湯液為
傷寒卒病論十數卷然後方大備茲先聖
後聖若合符節至晉太醫令王叔和以仲

景之書撰次成序得為完秩昔人以仲景方一部為衆方之祖蓋能繼述先聖之所作迄今千有餘年不墜於地者又得王氏闡明之力也傷寒論十卷其言精而奥其法簡而詳非寡聞淺見所能賾究後雖有學者又各自名家未見發明僕忝醫業自幼徂老躰味仲景之書五十餘年矣雖粗得其門而迻升乎堂然未入於室常為之

憮然昨者解后聊攝成公議論該博術業精通而有家學註成傷寒論十卷出以示僕其三百九十七法之内分析異同彰明隱奥調陳脉理區別陰陽使表裏以昭然俾汗下而灼見百一十二方之後通明名號之由彰顯藥性之主十劑輕重之攸分七精制用之斯見別氣味之所宜明補瀉之所遷又皆引内經旁牽衆說方法之辨

莫不允當寔前賢所未言後學所未識是得仲景之深意者也昔所謂懵然者今悉達其奧矣覩其書誠難默默不揆荒蕪聊序其畧時甲子中秋日洛陽嚴器之序

傷寒卒病論集

論曰余每覽越人入虢之診望齊侯之色未嘗不慨然歎其才秀也怪當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末忽棄其本華其外而悴其內皮之不存毛將安附焉卒然遭邪風之氣嬰非常之疾患及禍至而方震慄降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗賚百年之壽命持至貴之重器委付凡醫恣其所措咄嗟嗚呼厥身

已斃神明消滅變為異物幽潛重泉徒為啼泣痛夫舉世昏迷莫能覺悟不惜其命若是輕生彼何榮勢之云哉而進不能愛人知人退不能愛身知已遇災值禍身居厄地蒙蒙昧昧惷若遊魂哀乎趨世之士馳競浮華不固根本忘軀徇物危若冰谷至於是也余宗族素多向餘二百建安紀年以来猶未十稔其死亡者三分有二傷寒十居其七感往昔之淪喪傷横夭之莫救乃勤求古訓博采衆方撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚藥錄并平脉辨證為傷寒雜病論合十六卷雖未能

盡愈諸病庶可以見病知源若能尋余所集思過半矣夫天布五行以運萬類人稟五常以有五藏經絡府俞陰陽會通玄冥幽微變化難極自非才高識妙豈能探其理致哉上古有神農黄帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉公下此以往未之聞也觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家技終始順舊省疾問病務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無髣髴明堂闕

庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生實為難矣孔子云生而知之者上學則亞之多聞博識知之次也余宿尚方術請事斯語



南政三陰在泉脉

右手 尺部應 甲寅 土運 尺不應 甲申 左手

太陽 厥陰 少陰

北政三陰司天脉

太陰 少陰 厥陰 丙戊庚 壬子午 左手 尺不應 金運 尺不應 右手

南政三陰在泉脉

右手 尺不應 甲辰 土運 尺部應 甲戌 左手

少陰 太陰 少陽

北政三陰司天脉

少陰 厥陰 太陽 乙辛丁 癸巳亥 左手 尺不應 火運 尺部應 右手

北政三陰在泉脉

左手 寸口應 丙戊庚 木運 寸不應 庚寅申 右手

太陽 厥陰 少陰

北政三陰司天脉

少陽 太陰 少陰 乙辛丁 癸丑未 左手 尺部應 水運 尺不應 右手

北政三陰在泉脉

左手 寸不應 丙戊庚 金運 寸口應 壬辰戌 右手

少陰 太陰 少陽

北政三陰在泉脉

左手 寸不應 乙辛丁 火運 寸不應 癸卯酉 右手

厥陰 少陰 太陰

南政陰陽脉交死

少陰 巳巳
厥陰
太陽 巳亥

交天左

南政陰陽脉交死

交地左

甲寅
甲申

太陽
厥陰
少陰

南政陰陽脉交死

少陽 巳丑
太陰
少陰 巳未

交天左

南政陰陽脉交死

交地左

甲辰
甲戌

少陰
太陰
少陽

北政陰陽脉交死

少陰 乙辛丁
厥陰
太陽 癸巳亥

交天左

北政陰陽脉交死

交地左

丙戊庚
壬寅申

太陽
厥陰
少陰

北政陰陽脉交死

少陽 乙辛丁
太陰
少陰 癸丑未

交天左

北政陰陽脉交死

交地左

丙戊庚
壬辰戌

少陰
太陰
少陽

太陽上下加臨補瀉病證之圖



南政寸尺脉反死



北政寸尺脉反死



少陰司天

南政寸尺脉反死



北政寸尺脉反死



少陰在泉

陽明上下加臨補瀉病證之圖



少陽上下加臨補瀉病證之圖



太陰上下加臨補瀉病證之圖


太陰
下少陰
以下生上
瀉甘補醎
下少陽
瀉苦補辛
下太陽
瀉辛補苦
下陽明
瀉鹹補辛
下太陰
瀉辛補甘
下厥陰
瀉酸補辛
下少陰
瀉苦補鹹

厥陰上下加臨補瀉病證之圖



五運六氣主病加臨轉移之圖



夫五運六氣主病陰陽虛實無越此圖經曰上天也下地也周天謂天周也五行之位天垂六氣地布五行天順地而左回地承天而東轉木運之後天氣常餘餘氣不加君火却退一步加臨相火之上是以每五歲已退一位而右遷故曰左右周天餘而復會會遇也言天地之道常五歲畢則以餘氣遷加復與五行座位再相會合而為歲法也周天謂天周地位非周天之六氣也經曰加臨法曰先立其年以知其氣左右應見然後乃言生死也

運氣圖解

經曰天地之氣勝復之作不形於診也言平氣及勝復皆以形證觀察不以診知也脉法曰天地之變無以脉診此之謂也又曰隨氣所在期於左右於左右尺寸四部分位察之以知應與不應過與不過也從其氣則和違其氣則病謂當沉浮濇鈎弦大之類而不應蓋至而和則平至而甚則病至而反則病至而不至者病未至而至者病陰陽易者危不當其位者病見於他位也迭移其位者病謂左見右脉右見左脉氣差錯故爾失守其位者危已見於他部本宮見賊殺之氣故病危尺寸反者死子午卯酉四歲有之反謂歲當陰在寸而脉反見於尺歲當陽在尺而脉反見於寸尺寸俱見乃為反也若尺獨然或寸獨然是不應氣非反也陰陽交者死寅申巳亥丑未辰戌

八年有之。交。謂歲當陰在右。脉反見左。歲當陽在左。脉反見右。左右交見。是謂交。若左獨然。或右獨然。是不應氣。非交也。先立其年。以知其氣左右應見。然後乃可以言生死之逆順也。凡三陰司天在泉。上下南北二政。或左或右。兩手寸尺不相應。皆為脉沉下者。仰手而沉。覆手則沉為浮。細為大者也。若不明此法。如過淵海問津。豈不愚乎。區區白首不能曉明也。況因旬月邪。僕亦留入式之法。加臨五運六氣。三陰三陽標本。南北之政。司天在泉。主病立成圖局。易曉其義。又何不達於聖意哉。

釋運氣加臨民病吉凶圖

金見丁辛火乙丁　丙巳木水乙巳并
戊壬土水火丙巳　水木元來號甲丁
土水甲巳從來道　金土丁壬汗似蒸
木土丙辛之日差　火金乙巳汗如傾
水金甲戊言交汗　木火乙戊不差爭
土火乙庚疾大減　金木安康在丙庚
金燥水寒中土濕　木風火熱氣和清
此是加臨安愈訣　莫與迷人取次輕

汗差棺墓總括歌

木土棺臨墓上知　屍臨墓下土金歸

二木棺中無氣止　金水屍中有命隨
火水氣前逢命者　金火屍中有氣微
木火棺中生有氣　屍臨棺下木金危
水火命前逢氣可　土木逢之不可推
墓臨棺上多應死　屍臨棺下救應遲
金土屍來臨墓上　病人危困不須疑
屍向棺頭金木立　患家猶是好求醫

夫運氣陰陽者各有上下相得不得乃可從天令乎於是立此圖局細述在前布分十二經令配合五運六氣虛實盛衰或逆或順相生不和自知民病吉凶各有所歸對六十首圖周而復始各隨氣運中明解利安愈凶兆并生數相假定其徵驗也且如二木者丙巳火者乙丁土者戊壬金者丁辛二水者乙巳蓋以土無成數惟九宮為準其餘氣運並化總不離十干從甲至癸內藏九日明矣

運氣加臨汗差手經指掌之圖



運氣加臨汗差足經指掌之圖



運氣加臨棺槨墓手經指掌之圖



運氣加臨棺墓足經指掌之圖



運氣加臨脉候寸尺不應之圖



婁東仁宇楊士成校圖

註解傷寒論卷第一

仲景全書第十一

漢　長沙守　張仲景　述

晉　太醫令　王叔和　撰次

宋　聊攝人　成無已　註解

明　虞山人　趙開美　校正

辨脉法第一

問曰。脉有陰陽者。何謂也。荅曰。凡脉。大浮數動滑。此名陽也。脉沉濇弱弦微。此名陰也。凡陰病見陽脉者生。陽病見陰脉者死。內經曰。微妙在脉。不可不察。察之有紀。從陰陽始。始之有經。從五行生。茲首論脉之陰陽者。以脉從陰陽始故也。陽脉有五。陰脉有五。以脉從五行

生故也。陽道常饒。大浮數動滑五者。比之平脉也有餘故謂之陽。陰道常之沉濇弱弦微五者。比之平脉也不及故謂之陰。傷寒之為病。邪在表。則見陽脉。邪在裏。則見陰脉。陰病見陽脉而主生者。則邪氣自裏之表。欲汗而解也。如厥陰中風。脉微浮為欲愈。不浮為未愈者是也。陽病見陰脉而主死者。則邪氣自表入裏。正虛邪勝。如讓言妄語。脉沉細者死是也。金匱要畧曰。諸病在外者可治。入裏者即死。此之謂也。

問曰。脉有陽結陰結者。何以別之。荅曰。其脉浮而數。能食。不大便者。此為實。名曰陽結也。期十七日當劇。其脉沉而遲。不能食。身體重。大便反鞕。名曰陰結也。期十四日當劇。結者。氣偏結固。陰陽之氣不得而相離。以為和。不離之。陰中有陽。陽中有陰。陰陽相離。以為結。浮數陽脉也。能食而不大便。裏實也。為陽氣結固。陰不得而離之。是名陽結。沉遲陰脉也。不能食。身體重。陰病也。陰病見陰脉。則當下利。

今大便鞕者。為陰氣結固。陽不得而離之。是名陰結。論其數者。傷寒之病。一日太陽。二日陽明。三日少陽。四日太陰。五日少陰。六日厥陰。至六日為傳經盡。七日當愈。七日不愈者。謂之再經。言再經者再自太陽而傳至十二日再至厥陰。為傳經盡。十三日當愈。十三日不愈者。謂之過經。言再過太陽之經。亦以次而傳之也。陽結為火。至十七日傳少陰。水水能制火。火邪解散。則愈。陰結屬水。至十四日傳陽明土。土能制水。水邪解散。則愈。彼邪氣結甚。水又不能制火。土又不能制水。故當劇。內經曰。一候後則病。二候後則病甚。三候後則病危也。問曰。病有洒淅惡寒而復發熱者何。荅曰。陰脉不足。陽往從之。陽脉不足。陰往乘之。曰。何謂陽不足。荅曰。假令寸口脉微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則洒淅惡寒也。曰。何謂陰不足。荅曰。假令尺脉弱。名曰陰不足。陽氣下陷入

陰中則發熱也。一陰一陽謂之道。偏陰偏陽謂之疾。陰偏不足。則陽得而從之。陽偏不足。則陰得而乘之。陽不足則陰氣上入陽中。為惡寒者。陰勝則寒矣。陰不足陽氣下陷入陰中。為發熱者。陽勝則熱矣。陽脉浮。陰脉弱者。則血虛。血虛則筋急也。陽為氣。陰為血。陽脉浮者。衛氣強也。陰脉弱者。榮血弱也。難經曰。氣主呴之。血主濡之。血虛則不能濡潤筋絡。故筋急也。其脉沉者。榮氣微也。內經云。脉者。血之府也。脉實則血實。脉虛則血虛。此其常也。脉沉者。知榮血內微也。其脉浮而汗出如流珠者。衛氣衰也。鍼經云。衛氣者。所以溫分肉。充皮毛。肥腠理。司開闔者也。脉浮汗出如流珠者。腠理不密。開闔不司。為衛氣外衰也。浮主候衛。沉主候榮。以浮沉別榮衛之衰微。理固然矣。然而衰甚於微。所以於榮言微。而衛言衰者。以其汗出如流珠。為陽氣外絕。所以衛病甚於榮也。榮氣微者。加燒針。則血留不行。更發熱而躁煩也。衛陽也。榮陰也。燒針益陽而損陰。榮氣微者。謂陰虛也。內經曰。陰虛而內熱。方其內熱。又加燒針。以補陽不惟兩熱相合。而榮血不行。必更外發熱而內躁煩也。脉譜譜如車蓋者。名曰陽結也。譜譜如車蓋者。大而厥厥聶聶也。為陽氣鬱結於外。不與陰氣和雜也。脉瞥瞥如羹上肥者。陽氣微也。瞥瞥輕浮而主微也。脉縈縈如蜘蛛絲者。陽氣衰也。縈縈濕也。若縈縈惹惹之不利也。如蜘蛛絲者。至細也。微為陽微。細為陽衰。脉要曰。微為氣痞。是未至於衰。內經曰。細則氣少。以至細為陽衰。宜矣。脉綿綿如瀉漆之絕者。亡其血也。綿綿者。連綿而軟也。如瀉漆之絕者。前大而後細也。正理論曰。天樞開發。精移氣變。陰陽交會。胃和脉生。脉復生也。陽氣先至。陰氣後至。則脉前為陽氣。後為陰氣。脉來前大後細。為陽氣有餘。而陰氣不足。

陰氣鬱結於內。不與陽氣和雜也。脉瞥瞥如羹上肥者。陽氣微也。瞥瞥輕浮而主微也。脉縈縈如蜘蛛絲者。陽氣衰也。縈縈濕也。若縈縈惹惹之不利也。如蜘蛛絲者。至細也。微為陽微。細為陽衰。脉要曰。微為氣痞。是未至於衰。內經曰。細則氣少。以至細為陽衰。宜矣。脉綿綿如瀉漆之絕者。亡其血也。綿綿者。連綿而軟也。如瀉漆之絕者。前大而後細也。正理論曰。天樞開發。精移氣變。陰陽交會。胃和脉生。脉復生也。陽氣先至。陰氣後至。則脉前為陽氣。後為陰氣。脉來前大後細。為陽氣有餘。而陰氣不足。

是知亡血。脉來緩。時一止復來者。名曰結。脉來數。時一止復來者。名曰促。脉陽盛則促。陰盛則結。此皆病脉。脉一息四至曰平。一息三至曰遲。小駛於遲曰緩。一息六至曰數。時有一止者。陰陽之氣不得相續也。陽行也速。陰行也緩。緩以候陰。若陰氣勝而陽不能相續。則脉來緩而時一止。數以候陽。若陽氣勝而陰不能相續。則脉來數而時一止。傷寒有結代之脉。動而中止。不能自還為死脉。此結促之脉。止是陰陽偏勝。而時有一止。即非脫絕而止云。此皆病脉。陰陽相搏。名曰動。陽動則汗出。陰動則發熱。形冷惡寒者。此三焦傷也。動為陰陽相搏。方其陰陽相搏。而虛者則動。陽動為陽虛。故汗出。陰動為陰虛。故發熱也。如不汗出發熱。而反形冷惡寒者。三焦傷也。三焦者。原氣之別使。主行氣於陽。三焦既傷。則陽氣不通而微。致身冷而惡寒也。金匱要畧曰。陽氣不通。即身冷。經曰。陽微則惡寒。若數脉見于

關上。上下無頭尾。如豆大。厥厥動搖者。名曰動也。脉經云。陽出陰入。以關為界。關為陰陽之中也。若數脉見於關上。上下無頭尾。如豆大。厥厥動搖者。是陰陽之氣相搏也。故名曰動。陽脉浮大而濡。陰脉浮大而濡。陰脉與陽脉同等者。名曰緩也。陽脉。寸口也。陰脉。尺中也。上下同等。無有偏勝者。是陰陽之氣和緩也。非若遲緩之有邪也。陰陽偏勝者。為結為促。陰陽相搏者。為動。陰陽氣和者。為緩。學者不可不知也。脉浮而緊者。名曰弦也。弦者狀如弓弦。按之不移也。脉緊者。如轉索無常也。脉經云。弦與緊相類。以弦為虛。故雖緊如弦。而按之不移。不移則不足也。經曰。弦則為減。以緊為實。是切之如轉索無常而不散。金匱要畧曰。脉緊如轉索無常者。有宿食也。脉弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。寒虛相搏。此名為

革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。弦則為減。減則為寒。寒者。謂陽氣少也。大則為虛。虛謂血少不足也。所謂革者。言其既寒且虛。則氣血改革。不循常度。男子得之。為真陽減而不能內固。故主亡血失精。婦人得之。為陰血虛而不能滋養。故主半產漏下。問曰。病有戰而汗出。因得解者。何也。荅曰。脈浮而緊。按之反芤。此為本虛。故當戰而汗出也。其人本虛。是以發戰。以脈浮。故當汗出而解也。浮為陽。緊為陰。芤為虛。陰陽爭則戰。邪氣將出。邪與正爭。其人本虛。是以發戰。正氣勝則戰。戰已復發熱。而大汗解也。若脈浮而數。按之不芤。此人本不虛。若欲自解。但汗出耳。不發戰也。浮數。陽也。本實。陽勝。邪不能與正爭。故不發戰也。問曰。病有不戰而汗出而解者。何也。荅曰。其脈自微。此以曾經發汗。若吐若下。若亡血。以內無津液。此陰陽自和。必自愈。故不戰不汗出而解也。脈微者。邪氣微也。邪氣已微。正氣又弱。脈所以微。既經發汗吐下。亡陽亡血。內無津液。則不能作汗。得陰陽氣和而自愈也。問曰。傷寒三日。脈浮數而微。病人身涼和者。何也。荅曰。此為欲解也。解以夜半。脈浮而解者。濈然汗出也。脈數而解者。必能食也。脈微而解者。必大汗出也。傷寒三日。陽去入陰之時。病人身熱。脈浮數而大。邪氣傳也。若身涼和。脈浮數而微者。則邪氣不傳。而欲解也。解以夜半者。陽生於

于也。脈浮主漐然汗出而解者。邪從外散也。脈數主能食而解者。胃氣和也。脈微主大汗出而解者。邪氣微也。問曰病脈欲知愈未愈者何以別之。荅曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等。雖有寒熱不解者。此脈陰陽為和平。雖劇當愈。三部脈均等。即正氣已和。雖有餘邪何害之有。立夏得洪大脈是其本位。其人病身體苦疼重者。須發其汗。若明日身不疼不重者。不須發汗。若汗漐漐自出者。明日便解矣。何以言之。立夏得洪大脈是其時脈。故使然也。四時倣此。脈來應時為正氣內固。雖外感邪氣。但微自汗出而亦解耳。內經曰脈得四時之順者病無他。問曰凡病欲知何時得。何時愈。荅曰假令夜半得病。明日日中愈。日中得病夜半愈。何以言之。日中得病者。陽受之。夜半得半愈者。以陰得陽則解也。日中得病者。陽受之。夜半得和。是解以夜半陰不和。得陽則和。是解以日中。經曰用陽和陰。用陰和陽。寸口脈浮為在表。沉為在裏。數為在府。遲為在藏。假令脈遲。此為在藏也。經曰諸陽浮數為表府。諸陰遲濇為裏藏。趺陽脈浮而濇。少陰脈如經也。其病在脾。法當下利。何以知之。若脈浮大者。氣實血虛也。今趺陽脈浮而濇。故知脾氣不足。胃氣虛也。以少陰脈弦而浮緩見。此為調脈。故稱如經也。若反滑而數者。故知當屎膿也。趺陽者。胃

之脉診得浮而濇者。脾胃不足也。浮者。以為氣實。濇者。以為血虛者。此非也。經曰。脉浮而大。浮為氣實大為血虛。若脉浮大。當為氣實血虛。今趺陽脉浮而濇。浮則胃虛濇則脾寒。脾胃虛寒。則穀不消而水不別。法當下利。少陰。腎脉也。腎為肺之子。為肝之母。浮為肺脉。弦為肝脉。少陰脉弦而浮。為子母相生。故云調脉。若滑而數者。則客熱在下焦。使血流腐而為膿。故屎臭也。

寸口脉浮而緊。浮則為風。緊則為寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。當發其汗也。脉經云。風傷陽。寒傷陰。衛為陽。榮為陰。風為陽。寒為陰。各從其類而傷也。易曰。水流濕火就燥。若是矣。衛得風則熱。榮得寒則痛。榮衛俱病。故致骨節煩疼。當與麻黃湯發汗則愈。趺陽脉遲而緩。胃氣如經也。

趺陽脉浮而數。浮則傷胃。數則動脾。此非本病。醫特下之所為也。榮衛內陷。其數先微。脉反但浮。其人必大便鞕。氣噫而除。何以言之。本以數脉動脾。其數先微。故知脾氣不治。大便鞕。氣噫而除。今脉反浮。其數改微。邪氣獨留。心中則饑。邪熱不殺穀。潮熱發渴。數脉當遲緩。脉因前後度數如法。病者則饑。數脉不時。則生惡瘡也。經常也。趺陽之脉。以候脾胃。故遲緩之脉為常。若脉浮數。則為醫妄下。傷胃動脾。邪氣乘虛內陷也。邪在表。則見陽脉。邪在裏。則見陰脉。邪在表之時。脉浮而數也。因下裏虛。榮衛內陷。邪客於脾。以數則動脾。今數先微。則是脾邪先陷於裏也。胃虛脾熱。津液乾少。大便必鞕。鍼經曰。脾病善噫。得後出餘氣。則快然而衰。今脾客邪熱。故氣噫而除。脾能磨消水穀。今邪氣獨留於脾。脾氣不治。心中鮮飢。而不能殺穀也。脾主為胃行其津液。脾為熱燥。故潮熱而發渴也。趺陽之脉。本遲而緩。因下之後。變浮為數。榮衛內陷。數復改微。是脉因前後

度數如法。邪熱內陷於脾。而心中善飢也。數脉不時者。為數當改微。而復不微。如此。則是邪氣不傳於乘。但關於榮衛之中。必出自肌皮。為惡瘡也。師曰。病人脉微而濇者。此為醫所病也。大發其汗。又數大下之。其人亡血。病當惡寒。後乃發熱無休止。時夏月盛熱。欲着複衣。冬月盛寒。欲裸其身。所以然者。陽微則惡寒。陰弱則發熱。此醫發其汗。令陽氣微。又大下之。令陰氣弱。五月之時。陽氣在表。胃中虛冷。以陽氣內微。不能勝冷。故欲着複衣。十一月之時。陽氣在裏。胃中煩熱。以陰氣內弱。不能勝熱。故欲裸其身。又陰脉遲濇。故知亡血也。微為亡陽。濇則無血。不當汗而強與汗之者。令陽氣微。陰氣上

入陽中。則惡寒。故曰陽微則惡寒。不當下而強與下之者。令陰氣弱。陽氣下陷入陰中。則發熱。故曰陰弱則發熱。氣為陽。血為陰。陽脉以候氣。陰脉以候血。陰脉遲濇為禁血不足。故知亡血。經曰。尺脉遲者。不可發汗。以禁氣不足。血少故也。

脉浮而大。心下反鞕。有熱屬藏者。攻之不令發汗。浮大之脉。當責邪在表。若心下反鞕者。則熱已甚而內結也。有熱屬藏者。為別無虛寒而但見裏熱也。藏屬陰。為悉在裏。故可下之。攻之。謂下之也。不可謂脉浮大。更與發汗。病源曰。熱毒氣乘心。心下痞滿。此為有實。宜速下之。屬府者。不令溲數。溲數則大便鞕。汗多。則熱愈。汗少。則便難。脉遲尚未可攻。雖心下鞕。若餘無裏証。但見表証者。為病在陽。謂之屬府。當先解表。然後攻痞。溲。小便也。勿為飲結而利小便。使其溲數。大便必鞕也。經曰。小便數者。大便必鞕。謂走其津液也。汗多。則邪氣除而熱愈。汗少。則邪熱不盡。又走其津液。必便難也。鞕家當下。設脉遲。則未可攻。以遲為

不足。即裏氣未實故也。脉浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。體形不仁。乍靜乍亂。此為命絕也。病有不可治者。為邪氣勝於正氣也。內經曰。大則邪至。又曰。大則病進。脉浮而洪者。邪氣勝也。身汗如油。喘而不休者。正氣脫也。四時以胃氣為本。水漿不下者。胃氣盡也。一身以榮衛為充。形體不仁者。榮衛絕也。不仁為痛痒俱不知也。針經曰。榮衛不行。故為不仁。爭則亂。安則靜。乍靜乍亂者。正與邪爭。正負邪勝也。正氣已脫。胃氣又盡。榮衛俱絕。邪氣獨勝。故曰命絕也。又未知何藏先受其災。若汗出髮濕。喘不休者。此為肺先絕也。肺為氣之主。為津液之帥。汗出髮濕者。津脫也。喘不休者。氣脫也。陽反獨留。形體如煙熏。直視搖頭者。此心絕也。肺主氣。心主血。氣為陽。血為陰。陽反獨留者。則為身體大熱。是血先絕。而氣獨在也。形體如煙熏者。為身無精華。是血絕不榮于身也。心脉俠咽系目。直視者心經絕也。頭為諸陽之會。搖頭者。陰絕而陽無根也。脣吻反青。四肢厥冒者。此為肝絕也。脣吻者。脾之候。肝色青。肝絕則真色見。于所勝之部也。四肢者。脾所主。肝主筋。肝絕則筋脉引急。拘于所勝之分也。環口黧黑。柔汗發黃者。此為脾絕也。脾主口脣。絕則精華去。故環口黧黑。柔為陰。柔汗冷汗也。脾胃為津液之本。陽氣之宗。柔汗發黃者。脾絕而陽脫。真色見也。溲便遺失。狂言目反直視者。此為腎絕也。腎司開闔。禁固便溺。溲便遺失者。腎絕不能約制也。腎藏志。狂言者。志不守也。內經曰。狂言者。是失志矣。失志者死。鍼經曰。五藏之精氣。皆上注于目。骨之精為瞳子。目反直視者。腎絕則骨之精不榮于瞳子。而瞳子不轉也。又未知何藏陰陽前絕。若陽氣前絕。陰氣後竭者。其人死。身色必青。陰氣前絕。陽氣後竭者。其人死。身

色必赤。腹下温。心下熱也。陽主熱而色赤。陰主寒而色青。其人死也。身色青。則陰未離乎體。故曰陰氣後竭。身色赤。腹下温。心下熱。則陽未離乎體。故曰陽氣後竭。經曰。人有兩死而無兩生。此之謂也。寸口脉浮大。而醫反下之。此為大逆。浮則無血。大則為寒。寒氣相搏。則為腸鳴。醫乃不知而反飲冷水。令汗大出。水得寒氣。冷必相搏。其人即鶴。經云。脉浮大。應發汗若反下之。為大逆。浮大之脉。邪在表也。當發其汗。若反下之。是攻其正氣。邪氣得以深入。故為大逆。浮則無血者。下後亡血也。大則為寒者。邪氣獨在也。寒邪固裏虛而入。寒氣相搏。乃為腸鳴。醫見脉大。以為有熱。飲以冷水。欲令水寒勝熱而作大汗。裏先虛寒。又得冷水。水寒相搏。使中焦之氣滿滯。故令鶴也。跌陽脉浮。浮則為虛。浮虛相搏。故令氣鶴。言胃氣虛竭也。脉滑則為噦。此為醫咎。責虛取實。守空迫血。脉浮。鼻中燥者。必衄也。跌陽脉浮為鶴。脉滑為噦。皆醫之咎。責虛取實之過也。內經曰。陰在內。陽之守也。陽在外。陰之使也。發汗攻陽。亡津液而陽氣不足者。謂之守空。經曰。表氣微虛。裏氣不守。故使邪中于陰也。陰不為陽守。邪氣因得而入之內。搏陰血。陰失所守。血乃妄行。未知從何道而出。若脉浮。鼻燥者。知血必從鼻中出也。諸脉浮數。當發熱而洒淅惡寒。若有痛處。飲食如常者。畜積有膿也。浮數之脉。主邪在經。當發熱而洒淅惡寒。病人一身盡痛。不欲飲食者。傷寒也。若鮮發熱惡寒。而痛偏着一處。飲食如常者。即非傷寒。是邪氣鬱結于經絡之間。血氣壅遏不通。欲畜聚而成癰膿也。脉浮而遲。面熱赤而戰惕者。六七日當汗出而解。反發熱者。差遲。遲為無陽。不能作汗。其身必痒也。脉浮面熱赤者。邪氣外浮于表也。脉遲戰惕者

本氣不足也。六七日為邪傳經盡。當汗出而解之時。若當汗不汗。反發熱者。為裏虛。津液不多。不能作汗。既不汗。邪無從出。是以差遲。發熱為邪氣浮於皮膚。必作身痒也。經曰。以其不能得小汗出。故其身必痒也。

寸口脉陰陽俱緊者。法當清邪中於上焦。濁邪中於下焦。清邪中上。名曰潔也。濁邪中下。名曰渾也。陰中於邪。必內慄也。表氣微虛。裏氣不守。故使邪中于陰也。陽中於邪。必發熱。頭痛。項強。頸攣。腰痛。脛酸。所謂陽中霧露之氣。故曰清邪中上。濁邪中下。陰氣為慄。足膝逆冷。便溺妄出。表氣微虛。裏氣微急。三焦相溷。內外不通。上焦怫鬱。藏氣相熏。口爛食斷也。中焦不治。胃氣上衝。脾氣不轉。

胃中為濁。榮衛不通。血凝不流。若衛氣前通者。小便赤黃。與熱相搏。因熱作使。遊於經絡。出入藏府。熱氣所過。則為癰膿。若陰氣前通者。陽氣厥微。陰無所使。客氣內入。噎而出之。聲嗢咽塞。寒厥相逐。為熱所擁。血凝自下。狀如豚肝。陰陽俱厥。脾氣孤弱。五液注下。下焦不闔。清便下重。令便數難。臍築湫痛。命將難全。浮為陽。沉為陰。陽脉緊。則霧露之氣中于上焦。陰脉緊。則寒邪中于下焦。上焦者。太陽也。下焦者。少陰也。發熱。頭痛。項強。頸攣。腰疼。脛酸者。霧露之氣。中于太陽之經也。濁邪中下。陰氣為慄。足膝逆冷。便溺妄出者。寒邪中于少陰也。因表氣微虛。邪入而客之。又裏氣不守。邪乘裏弱。遂中于陰。陰虛遇邪。內為懼慄。致氣微急矣。內經曰。陽病者。上行極而下。陰病者。下行

極而上。此上焦之邪甚。則下干中焦。下焦之邪甚。則上干中焦。由是三焦混亂也。三焦主持諸氣。三焦既相混亂。則內外之氣。俱不得通。膻中為陽氣之海。氣因不得通于內外。佛鬱于上焦而為熱。與藏相熏。口爛食斷。內經曰。膈熱不便。上為口糜。中焦為上下二焦之邪混亂。則不得平治。中焦在胃之中。中焦失治。胃氣因上衝也。脾坤也。坤助胃氣磨消水穀。脾氣不轉。則胃中水穀不得磨消。故胃中濁也。金匱要畧曰。穀氣不消。胃中苦濁。榮者。水穀之精氣也。衛者。水穀之悍氣也。氣不能布散。致榮衛不通。血凝不流。衛氣者。陽氣也。榮血者。陰氣也。陽主為熱。陰主為寒。衛氣前通者。陽氣先通。而熱氣得行也。內經曰。膀胱者。津液藏焉。氣化則能出。以小便赤黃知。衛氣前通也。熱氣與衛氣相搏而行。出入藏府。遊于經絡。經絡客熱。則血凝肉腐而為癰膿。此見其熱氣得行。若陰氣前通者。則不然。陽在外為陰之使。因陽氣厥微。陰無所使。逆陰氣前通也。內經曰。陽氣者。衛外而為固也。陽氣厥微。則不能衛外。寒氣因而客之。鼻者。肺之候。肺主降寒氣內入者。客于肺經。則噎而出之。降喘咽塞。寒者外邪也。厥者內邪也。外內之邪合併。相逐為熱。則血凝不流。今為熱所擁。使血凝自下。如豚肝也。上焦陽氣厥下。焦陰氣厥二氣俱厥。不相順接。則脾氣獨弱。不能行化氣血。滋養五藏。致五藏俱虛而五液注下。鍼經曰。五藏不和。使液溢而下流于陰。謂合也。清冷也。下焦氣脫而不合。故數便而下重。腎為生氣之原。腎藏濕痛。則生氣欲絕。故曰命將難全。脈陰陽俱緊者。口中氣出。唇口乾燥。踡臥足冷。鼻中涕出。舌上胎滑。勿妄治也。到七日已來。其人微發熱。手足温者。此為欲解。或到八日已上。反大發熱者。此為難治。設使惡寒者。必欲嘔也。腹內痛者。必欲利也。脈陰陽俱緊。為表裏客寒。寒為陰。得陽則解。口中氣出。唇口乾燥者。陽氣漸復。正氣方温也。雖尔。然而陰未盡。踡臥足冷。鼻中涕出。舌上滑胎。知陰猶在也。方陰陽未分之時。不可妄治。以偏陰陽之氣。到七日已來。其人

微發熱。手足温者。為陰氣已絕。陽氣將復。是為欲解。若過七日不解。到八日已上。反發大熱者。為陰極變熱。邪氣勝正。故云難治。陽脈緊者。寒邪發于上焦。上焦主外也。陰脈緊者。寒邪發于下焦。下焦主內也。設使惡寒者。上焦寒氣勝。是必欲吐也。腹內痛者。下焦寒氣勝。是必欲利也。脈陰陽俱緊至於吐利。其脈獨不解。緊去入安。此為欲解。若脈遲至六七日不欲食。此為晚發。水停故也。為未解。食自可者。為欲解。脈陰陽俱緊。為寒氣甚于上下。至于吐利之後。緊脈不罷者。為其脈獨不解。緊去。則入安。為欲解。若脈遲至六七日不欲食者。為吐利後。脾胃大虛。內經曰。欲入于胃。遊溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。脾胃氣強。則能輸散水穀之氣。若脾胃氣虛。則水穀內停也。所謂晚發者。後來之疾也。若至六七日而欲食者。則脾胃已和。寒邪已散。故云欲解。病六七日。手足三部脈皆至。大煩而口噤不能言。其人躁擾者。必欲解也。煩熱經之時。病人身大煩。口噤不能言。內作躁擾。則陰陽爭勝。若手足三部脈皆至。為正氣勝邪氣。微陽氣復。寒氣散。必欲解也。若脈和。其人大煩。目重。瞼內際黃者。此為欲解也。脈經曰。病人兩目皆有黃色。起者其病方愈。病以脈為主。若目黃。大煩。脈不和者。邪勝也。其病為進。目黃。大煩。而脈和者。為正氣已和。故云欲解。脈浮而數。浮為風。數為虛。風為熱。虛為寒。風虛相搏。則洒淅惡寒也。內經曰。有者為實。無者為虛。氣并則無血。血并則無氣。風則傷衛。數則無血。浮數之脈。風邪并于衛。衛勝。則榮虛也。衛為陽。風搏于衛。所以為熱。榮為陰。榮氣虛。所以為寒。風并于衛者。發熱惡寒之證。其人。脈浮而滑。浮為陽。滑為實。陽實相搏。其脈數疾。衛氣失度。浮滑之脈。數疾。發熱汗出者。此為

不治。浮為邪氣并于衛。而衛氣勝。滑為邪氣并于榮。而榮氣實。邪氣勝。實擁于榮衛。則榮衛行速。故脉數疾。一息六至曰數。平人脉一息四至。衛氣行六寸。今一息六至。則衛氣行九寸。計過平人之半。是脉數疾。知衛氣失其常度也。浮滑數疾之脉。發熱汗出而當解。若不解者。精氣脫也。必不可治。經曰。脉陰陽俱盛。大汗出。不解者死。傷寒欬逆上氣。其脉散者死。謂其形損故也。千金方云。以喘嗽為欬逆。上氣者肺病。散者心脉。是心火刑于肺金也。內經曰。心之肺。謂之死陰。死陰之屬。不過三日而死。以形見其損傷故也。

平脉法第二

問曰。脉有三部。陰陽相乘。榮衛血氣。在人體躬。呼吸出入。上下於中。因息遊布。津液流通。隨時動作。効象形容。春弦秋浮。冬沉夏洪。察色觀脉。大小不同。一時之間。變無經常。尺寸參差。或短或長。上下乖錯。或存或亡。病輒改易。進退低昂。心迷意惑。動失紀綱。願為具陳。令得分明。師曰。子之所問。道之根源。脉有三部。尺寸及關。寸為上部。關為中部。尺為下部。榮衛流行。不失衡銓。衡銓者。稱也。可以稱量輕重。內經曰。春應中規。夏應中衡。秋應中矩。冬應中權。榮行脉中。衛行脉外。榮衛與脉相隨上下。應四時。不失其常度。腎沉心洪。肺浮肝弦。此自經常。不失銖分。腎比方水。王于冬。而脉沉。心。南方火。王于夏。而脉洪。肺。西方金。王于秋。而脉浮。肝。東方木。王于春。而脉弦。此為經常銖分之不差也。出入升降。漏刻周旋。水下百刻。一周循環。人身之脉。計長一十六丈二尺。一呼。脉行三寸。一吸。脉行三寸。一呼一吸為一息。脉行六寸。一日一夜。漏水下百刻。人一萬三千五

百息。脉行八百一十丈。五十度周于身。則一刻之中。人一百三十五息。脉行八丈一尺。水下二刻。人二百七十息。脉行一十六丈二尺。一周于身也。脉經之行。終而復始。若循環之無端也。當復寸口。虛實見焉。經脉之始。從中焦注于手太陰寸口。二百七十息。脉行一周身。復還至于寸口。寸口為脉之經始。故以診視虛實焉。經曰。虛實死生之要。皆見于寸口之中。變化相乘。陰陽相干。風則浮虛。寒則牢堅。沉潛水畜。支飲急弦。動則為痛。數則熱煩。風傷陽。故脉浮虛。寒傷陰。故脉牢堅。畜積于內者。謂之水畜。故脉沉潛。支散于外者。謂之支飲。故脉急弦。動則陰陽相搏。相搏則痛生焉。數為陽。邪氣勝。陽勝則熱煩焉。設有不應。知變所緣。三部不同。病各異端。脉與病不相應者。必緣傳變之所致。三部以候五藏之氣。隨部察其虛實焉。太過可怪。不及亦然。邪不空見。中必有姧。審察表裏。三焦別焉。知其所舍。消息診看。料度府藏。獨見若神。為子條記。傳與賢人。太過不及之脉。皆有邪氣干於三氣。審看在表在裏。入府入藏。隨其所舍而治之。師曰。呼吸者。脉之頭也。難經曰。一呼脉行三寸。一吸脉行三寸。以脉隨呼吸而行。故言脉之頭也。初持脉。來疾去遲。此出疾入遲。名曰內虛外實也。初持脉。來遲去疾。此出遲入疾。名曰內實外虛也。外為陽。內為陰。內經曰。來者為陽。去者為陰。是出以候外。入以候內。疾為有餘。有餘則實。遲為不足。不足則虛。來疾去遲者。陽有餘而陰不足。故曰內虛外實。來遲去疾者。陽不足而陰有餘。故曰內實外虛。問曰。上工望而知之。中工問而知之。下工脉而知之。願聞其說。師曰。病家人請。云病人苦發熱身體疼。病人自卧。師到。診其脉沉而遲者。知其差也。

何以知之表有病者脉當浮大今脉反沉遲故知愈也望以觀其形証問以知其所苦脉以別其表裏病苦發熱身疼邪在表也當卧不安而脉浮數今病人自卧而脉沉遲者表邪緩也假令病是有裏脉而無表證則知表邪當愈也

人云腹内卒痛病人自坐師到脉之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脉當沉而細今脉浮大故知愈也腹痛者裏寒也痛甚則不能起而脉沉細今病人自坐而脉浮大者裏寒散也是有表脉而無裏證也則知裏邪當愈是望証問病切脉三者相參而得之可為十全之醫鍼經曰知一為上知二為神知三神且明矣師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁卧此熱已去也設令脉不和處言已愈發熱煩極則不能靜卧今向壁靜卧知熱已去設令

向壁卧聞師到不驚起而眄視若三言三止脉之燕唾者此詐病也設令脉自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈詐病者非善人以言恐之使其長懼則愈醫者師其意也此其是歟師持脉病人欠者無病也鍼經曰陽引而上陰引而下陰陽相引故欠陰陽不相引則病陰陽相引則和是欠者無病也脉之呻者病也呻為呻吟之聲身有所苦則然也言遲者風也風客于中則經絡急舌強難運用也搖頭言者裏痛也裏有病故言則頭為之戰搖行遲者表強也表強者由筋絡引急而行步不利也坐而伏者短氣也短氣者裏不和也故坐而喜伏坐而下一脚者腰痛也内經曰腰者身之大關節也腰痛為大關節不利故坐不能正下一脚以緩腰中之痛也裏實護腹如懷卵物者其

心痛也。心痛則不能伸仰。護腹以按其痛。師曰。伏氣之病。以意候之。今月之內。欲有伏氣。假令舊有伏氣。當須脉之。若脉微弱者。當喉中痛似傷。非喉痺也。病人云。實咽中痛。雖爾。今復欲下利。冬時藏寒。伏藏于經中。不即發者。謂之伏氣。至春分之時。伏寒欲發。故云今月之內。欲有伏氣。假令伏氣已發。當須脉之。審在何經。得脉微弱者。知邪在少陰。少陰之脉。循喉嚨。寒氣客之。必發咽痛。腎司開闔。少陰治在下焦。寒邪內甚。則開闔不治。下焦不約。必成下利。故云雖爾。咽痛復欲下利。問曰。人病恐怖者。其脉何狀。師曰。脉形如循絲纍纍然。其面白脫色也。內經曰。血氣者。人之神。恐怖者。血氣不足。而神氣弱也。脉形似循絲纍纍然。面白脫色者。鍼經曰。血奪者。色夭然不澤。其脉空虛。是知恐怖為血氣不足。問曰。人不飲。其脉何類。師曰。

脉自濇。唇口乾燥也。濇為陰。雖主亡津液。而唇口乾燥。以陰為主內。故不飲也。問曰。人悒者。善也。悒則神氣怯弱。故脉浮而面色變改不常也。問曰。經說脉有三菽六菽重者。何謂也。師曰。脉者人以指按之。如三菽之重者。肺氣也。如六菽之重者。心氣也。如九菽之重者。脾氣也。如十二菽之重者。肝氣也。按之至骨者。腎氣也。菽。豆也。難經曰。如三菽之重。與皮毛相得者。肺部也。如六菽之重。與血脉相得者。心部也。如九菽之重。與肌肉相得者。脾部也。如十二菽之重。與筋平者。肝部也。按之至骨。舉指來疾者。腎部也。各隨所主之分。以候藏氣。

假令下利。寸口關上尺中悉不見脉。然尺中時一小見。脉再舉頭者。腎氣也。

若見損脉來至爲難治。脉經曰。冷氣在胃中。故令脉不通。下利不見脉。則冷氣客于脾胃。今尺中時一小見。爲脾虛。腎氣所乘。脉再舉頭者。脾爲腎所乘也。若尺中之脉。更或減損。爲腎氣亦衰。脾復勝之。鬼賊相刑。故云難治。是脾勝不應時也。問曰。脉有相乘。有縱有橫。有逆有順。何也。師曰。水行乘火。金行乘木。名曰縱。火行乘水。木行乘金。名曰橫。水行乘金。火行乘木。名曰逆。金行乘水。木行乘火。名曰順也。金勝木。水勝火。縱者。言縱任其氣。乘其所勝。橫者。言其氣橫逆。反乘所不勝也。縱橫與恣縱恣橫之義通。水爲金子。火爲木子。子行乘母。其氣逆也。母行乘子。其氣順也。問曰。脉有殘賊。何謂也。師曰。脉有弦緊浮滑沉濇。此六者名曰殘賊。能爲諸脉作病也。爲人病者。名曰入邪。風寒暑濕傷于外也。飢飽勞逸傷于內也。

經脉者。榮衛也。榮衛者。陰陽也。其爲諸經脉作病者。必由風寒暑濕傷于榮衛。客于陰陽之中。風則脉弦。寒則脉緊。中暑則脉滑。中濕則脉濇。傷于陰則脉沉。傷于陽則脉浮。所以謂之殘賊者。傷良曰殘。害良曰賊。以能傷害正氣也。問曰。脉有災恠。何謂也。師曰。假令人病。脉得太陽。與形證相應。因爲作湯。比還送湯如食頃。病人乃大吐。若下利。腹中痛。師曰。我前來不見此證。今乃變異。是名災恠。又問曰。何緣作此吐利。荅曰。或有舊時服藥。今乃發作。故名災恠耳。醫以脉證與藥相對。而反變異。爲其災可恠。故名災恠。問曰。東方肝脉。其形何似。師曰。肝者。木也。名厥陰。其脉微弦濡弱而長。是肝脉也。肝病自得濡弱者。愈也。難經曰。春脉弦者。肝東方木也。其

萬物始生。未有枝葉。故脈來濡弱而長。故曰弦。假是肝之平脈。肝病得此脈者。為肝氣已和也。假令得純弦脈者死。何以知之。以其脈如弦直。是肝藏傷。故知死也。純弦者為如弦直而不軟。是中無胃氣為真藏之脈。內經曰。死肝脈來。急益勁。如新張弓弦。南方心脈。其形何似。師曰。心者火也。心王于夏。夏則陽外勝。氣血淖溢。故其脈來洪大而長也。假令脈來微去大。故名反。病在裏也。脈來頭小本大者。故名覆。病在表也。上微頭小者。則汗出。下微本大者。則為關格不通。不得尿。頭無汗者可治。有汗者死。心脈來盛去衰為平。來微去大。是反本脈。內經曰。大則邪去。小則平。微為正氣。大為邪氣。來以候表。來微則知表和。去以候裏。去大則知裏病。內經曰。心脈來不盛去反盛。此為不及。病在中。頭小本大者。即前小後大也。小為正氣。大為邪氣。則邪氣先在裏。今從還于表。故名曰覆。不云去而止云來者。是知在表脈經曰。在上為表。在下為裏。汗者心之液。上微為浮之而微。頭小為前小。則表中氣虛。故上汗出。下微沉之而微。本大為後大。沉則在裏。大則病進。內經曰。心為牡藏。小腸為之使。今邪甚下行。格閉小腸使正氣不通。故不得尿。名曰關格。脈經曰。陽氣上出。汗見于頭。今關格正氣不通。加之頭有汗者。則陽氣不得下通而上脫也。其無汗者。雖作關格。然陽氣未衰。而猶可治。西方肺脈。其形何似。師曰。肺者金也。名太陰。其脈毛浮也。肺病自得此脈。若得緩遲者。皆愈。若得數者。則劇。何以知之。數者南方火。火尅西方金。法當癰腫。為難治也。輕虛浮曰毛。肺之平脈也。緩遲者。脾之脈。脾為肺之母。以子母和生。故云皆愈。數者心之脈。火

尅金。為鬼賊相刑。故劇。肺主皮毛。數則為熱。熱客皮膚。留而不去。則為癰瘍。經曰。數脉不時。則生惡瘡。

問曰。二月得毛浮脉。何以處。言至秋當死。師曰。二月之時。脉當濡弱。反得毛浮者。故知至秋死。二月肝用事。肝脉屬木。應濡弱。反得毛浮者。是肺脉也。肺屬金。金來尅木。故知至秋死。他皆倣此。當春時反見秋脉。為金氣乘木。肺來尅肝。奪主脉而見。至秋肺王。肝氣則絕。故知至秋死也。

師曰。脉肥人責浮。瘦人責沉。肥人當沉。今反浮。瘦人當浮。今反沉。故責之。肥人肌膚厚。其脉當沉。瘦人肌膚薄。其脉當浮。今肥人脉反浮。瘦人脉反沉。必有邪氣相干。使脉反常。故當責之。

師曰。寸脉下不至關。為陽絕。尺脉上不至關。為陰絕。此皆不治。決死也。若計其餘命死生之期。期以月節尅之也。脉經曰。陽生于寸。動于尺。陰生于尺。動于寸。寸脉下不至關者。則陽絕不能下應于尺也。尺脉上不至關者。為陰絕不能上應于寸也。內經曰。陰陽離鈌。精氣乃絕。此陰陽偏絕。故皆決死。期以月節尅之者。謂如陽絕死于春夏。陰絕死于秋冬。

師曰。脉病人不病。名曰行尸。以無王氣。卒眩仆不識人者。短命則死。人病脉不病。名曰內虛。以無穀神。雖困無苦。脉者。人之根本也。脉病人不病。為根本內絕。形雖且強。卒然氣脫。則眩運僵仆而死。不曰行尸而何。人病脉不病。則根本內固。形雖且羸。止內虛爾。穀神者。穀氣也。穀氣既足。自然安矣。內經曰。形氣有餘。脉氣不足。死。脉氣有餘。形氣不足。生。

問曰。翕奄沉。名曰滑。何謂也。沉為純陰。翕為正陽。陰陽和合。故令脉滑。關尺自平。陽明脉微沉。食飲自可。少

陰脉微滑。滑者緊之浮名也。此為陰實。其人必股內汗出。陰下濕也。脉來大而盛。聚而沉。謂之翕奄沉。正如轉珠之狀也。沉為藏氣。故曰純陰。翕為府氣。故曰正陽。滑者。陰陽氣不為偏勝也。關尺自平。陽明脉微沉者。當陽部見陰脉。則陰偏勝而陽不足也。陽明胃脉。胃中陰多。故食飲自可。少陰脉微滑者。當陰部見陽脉。則陽偏勝而陰不足也。以陽湊陰分。故曰陰實。股與陰。少陰之部也。令陽熱湊陰。必熏發津液泄達于外。股內汗出。而陰下濕也。問曰。曾為人所難。緊脉從何而來。師曰。假令亡汗。若吐。以肺裏寒。故令脉緊也。假令欬者。坐飲冷水。故令脉緊也。假令下利。以胃中虛冷。故令脉緊也。金匱要畧曰。寒令脉急。經曰。諸緊為寒。寸口衛氣盛。名曰高。高者。暴狂而肥。內經曰。陰不勝其陽。則脉流薄疾。并乃狂。衛為陽氣。衛盛而暴狂者。陰不勝陽也。鍼經曰。衛氣者。所以溫分肉。充皮毛。肥腠理。司開闔者也。衛氣盛為肥者。氣盛于外也。榮氣盛。名曰章。章者。暴澤而光。榮者。血也。榮華于身者也。榮盛故身暴光澤也。高章相搏。名曰綱。綱者。身筋急脉直。榮衛俱盛。則筋絡滿急。衛氣弱。名曰惵。惵者。心中氣動迫怯。衛出上焦。弱則上虛。而心中氣動迫怯也。榮氣弱。名曰卑。卑者。心中常自羞愧。鍼經曰。血者。神氣也。血弱則神弱。故常自羞愧。惵卑相搏。名曰損。損者。五藏六府之虛惙也。衛以護陽。榮以養陰。榮衛俱虛。則五藏六府。失于滋養。致俱乏。氣虛惙也。衛氣和。名曰緩。緩者。四肢不能自收。衛氣獨和。不與榮氣相諧。則榮病。內經曰。肝受血而能視。足受血而能步。掌受血而能握。指受血而能攝。四肢不收。由榮血病。不能灌養故也。榮氣和。名曰遲。遲者。身體重。但欲眠也。榮氣獨和。不與衛氣相諧。則衛病。身體重而眠。欲眠者。衛病而氣不敷布也。遲緩相搏。名曰沉。沉者。腰中直。腹內急痛。但欲卧。不欲行。榮

氣獨和于內。衛氣獨和于外。榮衛不相和諧。相搏而為病。腰中直者。衛不利于外也。腹內痛者。榮不和于內也。但欲卧。不欲行者。榮衛不營也。寸口脉緩而遲。緩則陽氣長。其色鮮。其顏光。其聲商。毛髮長。遲則陰氣盛。骨髓生。血滿。肌肉緊薄鮮鞕。陰陽相抱。榮衛俱行。剛柔相得。名曰強也。緩為胃脉。胃合衛氣。衛温分肉。充皮毛。肥腠理。司開闔。衛和氣舒。則顏色光潤。辭清毛淨矣。遲為脾脉。脾合榮氣。榮養骨髓。實肌肉。濡筋絡。利關節。榮和血滿。則骨正髓生。肌肉緊硬矣。陰陽調和。二氣相抱。而不相疾。榮衛流通。剛柔相得。是為強也。趺陽脉滑而緊。滑者。胃氣實。緊者。脾氣強。持實擊強。痛還自傷。以手把刃。坐作瘡也。趺陽之脉。以候脾胃。滑則氣實。是為胃實。緊則陰氣勝。是為脾強。以脾胃一實一強。而相搏擊。故令痛也。若一強一弱相持。則不能作痛。此脾胃兩各

強實相擊。府藏自傷而痛。譬若以手把刃而成瘡。豈非自貽其害乎。寸口脉浮而大。浮為虛。大為實。在尺為關。在寸為格。關則不得小便。格則吐逆。經曰。浮為虛。內經曰。大則病進。浮則為正氣虛。大則為邪氣實。在尺則邪氣關閉下焦。榮氣不得下通。故不得小便。在寸則邪氣格拒上焦。使食不得入。故吐逆。趺陽脉伏而濇。伏則吐逆。水穀不化。濇則食不得入。名曰關格。伏則胃氣伏而不宣。中焦閉格。正氣壅塞。故吐逆而水穀不化。濇則胃氣濇而不布。邪氣拒于上焦。故食不得入。脉浮而大。浮為風。虛大為氣強。風氣相搏。必成癮疹。身體為痒。痒者名泄風。久久為痂癩。痂癩者。眉少髮稀。身有乾瘡而腥臭。內經曰。脉風成為癩。寸口脉弱而遲。弱者衛氣微。遲者榮中寒。榮為血。血寒則發熱。衛

為氣。氣微者心內飢。飢而虛滿。不能食也。衛為陽。榮為陰。弱者衛氣微。陽氣不足也。遲者榮中寒。經中客邪也。榮客寒邪搏而發熱也。陽氣內微。心內雖飢。飢而虛滿。不能食也。趺陽脉大而緊者。當即下利。為難治。大為虛。緊為寒。胃中虛寒。當即下利。下利脉當微小。反緊者。邪勝也。故云難治。經曰。下利脉大者為未止。寸口脉弱而緩。弱者陽氣不足。緩者胃氣有餘。噫而吞酸。食卒不下。氣填於膈上也。弱者陽氣不足。陽能消穀。陽氣不足。則不能消化穀食。緩者胃氣有餘。則胃中有未消穀物也。故使噫而吞酸。食卒不下。氣填于膈上也。金匱要畧曰。中焦未和。不能消穀。故令噫。趺陽脉緊而浮。浮為氣。緊為寒。浮為腹滿。緊為絞痛。浮緊相搏。腸鳴而轉。轉即氣動。膈氣乃下。少陰脉不出。其陰腫大而虛也。

浮為胃氣虛。緊為脾中寒。胃虛則滿。脾寒則痛。虛寒相搏。腸鳴而轉。轉則膈中之氣因而下泄也。若少陰脉不出。則虛寒之氣至于下焦。結于少陰。而聚于陰器。不得發泄。使陰腫大而虛也。寸口脉微而濇。微者衛氣不行。濇者榮氣不逮。榮衛不能相將。三焦無所仰。身體痺不仁。榮氣不足。則煩疼。口難言。衛氣虛。則惡寒數欠。三焦不歸其部。上焦不歸者。噫而酢吞。中焦不歸者。不能消穀引食。下焦不歸者。則遺溲。人養三焦者。血也。護三焦者。氣也。榮衛俱損。不能相將而行。三焦無所依仰。身體為之頑痺而不仁。內經曰。榮氣虛則不仁。鍼經曰。衛氣不行。則為不仁。榮為血。血不足。則煩疼。榮屬心。榮弱心虛。則口難言。衛為陽。陽微。則惡寒。衛為氣。氣虛則數欠。三焦因榮衛不足。無所依仰。其氣不能歸其部。金匱要畧曰。上焦竭。善噫。上焦受中焦氣。中焦未和。不能消穀

故令噫耳。下焦竭。即遺溺失便。以上焦在膈上。物未化之分也。不歸者。不至也。上焦之氣不至其部。則物未能傳化。故噫而酢吞。中焦在胃之中。主腐熟水穀。水穀化。則思食。中焦之食不歸其部。則水穀不化。故云不能消穀引食。下焦在膀胱上口。主分別清濁。溲。小便也。下焦不歸其部。不能約制溲便。故遺溲。趺陽脉沉而數。沉為實。數消穀。緊者。病難治。沉為實者。沉主裏也。數消穀者。數為熱也。緊為肝脉。見于脾部。木來尅土。為鬼賊相刑。故云難治。

寸口脉微而濇。微者。衛氣衰。濇者。榮氣不足。衛氣衰。面色黃。榮氣不足。面色青。榮為根。衛為葉。榮衛俱微。則根葉枯槁。而寒慄。欬逆。唾腥。吐涎沫也。衛為氣。面色黃者。衛氣衰也。榮為血。面色青者。榮血衰也。榮行脉中為根。衛行脉外為葉。榮為陰。衛為陽。榮為根。衛為葉。根葉俱微。則陰陽之氣內衰。致生寒慄。而欬逆唾腥吐涎沫也。趺陽脉浮而芤。浮者。衛氣衰。芤者。榮氣傷。其身體瘦。肌肉甲錯。浮芤相搏。宗氣衰微。四屬斷絕。經曰。衛氣盛。名曰高。高者。暴作而肥。榮氣盛。名曰章。章者。暴澤而光。其身體瘦而不肥者。衛氣衰也。肌肉甲錯而不澤者。榮氣傷也。宗氣者。三焦歸氣也。四屬者。皮肉脂髓也。榮衛衰傷。則宗氣亦微。四屬失所滋養。致斷絕矣。

寸口脉微而緩。微者。衛氣疎。疎則其膚空。緩者。胃氣實。實則穀消而水化也。穀入於胃。脉道乃行。水入於經。其血乃成。榮盛。則其膚必疎。三焦絕經。名曰血崩。衛為陽。微為亡陽。脉微者。衛氣疎。衛溫分肉肥腠理。衛氣既疎。皮膚不得溫肥。則空虛也。經曰。緩者。胃氣有餘。有餘為實。故云緩者胃氣實。內經曰。食入于胃。淫精于脉。是穀入於胃。脉道乃行也。鍼經曰。飲而液滲于絡。合和于血。是水入于經。其血乃成也。胃中穀消水化而為血氣。今衛疎

榮盛。是榮氣強而衛氣弱也。衛氣弱者。外則不能固密皮膚。而氣為之疎。內則不能衛護其血。而血為之崩。經常也。三焦者。氣之道路。衛氣疎。則氣不循常度。三焦絕其常度也。

趺陽脉微而緊。緊則為寒。微則為虛。微緊相搏。則為短氣。中氣虛且寒。氣自短矣。

少陰脉弱而濇。弱者微煩。濇者厥逆。煩者。熱也。少陰脉弱者。陰虛也。陰虛則發熱。以陰部見陽脉。非大虛也。故生微煩。厥逆者。四肢冷也。經曰。陰陽不相順接。便為厥。厥者。手足厥冷是也。少陰脉濇者。陰氣濇。不能與陽相順相接。故厥逆也。

趺陽脉不出。脾不上下。身冷膚鞕。脾胃為榮衛之根。脾能上下。則水穀磨消。榮衛之氣得以行。脾氣虛衰。不能上下。則榮衛之氣不得通營于外。故趺陽脉不出。身冷者。衛氣不溫也。膚鞕者。榮血不需也。

少陰脉不至。腎氣微。少精血。奔氣促迫。上入胷膈。宗氣反聚。血結心下。陽氣退下。熱歸陰股。與陰相動。令身不仁。此為尸厥。當刺期門。巨闕。尸厥者。為其從厥而生。形無所知。其狀若尸。故名尸厥。少陰脉不出。則厥氣客於腎。而腎氣微。少精血。厥氣上奔。填塞胷膈。壅遏正氣。使宗氣反聚。而血結心下。鍼經曰。五穀入於胃。其糟粕津液。宗氣分為三逐。宗氣積于胷中。出于喉嚨。以貫心肺。而行呼吸。又曰。營氣者。泌其津液。注之於脉。化而為血。以營四末。今厥氣太甚。宗氣反聚而不行。則絕其呼吸。血結心下而不流。則四體不仁。陽氣為厥氣所壅。不能宣發。退下至陰股間。與陰相動。仁者柔也。不仁者。言不柔和也。為寒熱痛痒俱不覺知者也。陽氣外不為使。內不得通。榮衛俱不能行。身體不仁。狀若尸也。內經曰。厥氣上行滿脉去形。刺期門者。以通心下結血。刺巨闕者。以行胷中宗氣。血氣流通。厥氣退。則甦矣。

寸口脉微。尺脉緊。其人虛損。多汗。知陰常在。絕不見陽也。寸微為亡陽。尺緊為陰勝。陽微陰勝。故云虛損。又加之多汗。則愈損陽氣。是陰常在。而絕不見

陽也。寸口諸微亡陽。諸濡亡血。諸弱發熱。諸緊為寒。諸乘寒者。則為厥。欬胃不仁。以胃無穀氣。脾濟不通。口急不能言。戰而慄也。衛陽也。微為衛氣微。故云亡陽。榮。血也。濡為榮氣弱。故云亡血。無弱為陰虛。虛則發熱。緊為陰勝。故為寒。諸乘寒者。則陰陽俱虛。而為寒邪乘之也。寒氣乘虛。抑伏陽氣。不得宣發。遂成厥也。欬胃。為胃不知人也。不仁。為強直而無覺也。為尸厥焉。以胃無穀氣。致脾濟不通於上下。故使口急不能言。戰者。寒在表也。慄者。寒在裏也。問曰。濡弱何以反適十一頭。師曰。五藏六府相乘。故令十一。濡弱者。氣血也。往反有十一頭者。五藏六府共有十一也。問曰。何以知乘府。何以知乘藏。師曰。諸陽浮數為乘府。諸陰遲濇為乘藏也。府。陽也。陽脉見者。為乘府也。藏。陰也。陰脉見者。為乘藏也。

釋音

見音現 職廉切 病人下同 讝戕而自語也 剉蝸戟切 甚也 鞕音硬 下同 灑浙上所下切 下切 音析 寒驚貌 惡烏路切 呴音句 切噓氣性來也 濡汝朱切 潤也 闥音到 切於蓋合 躁子動也 譫旨於切 瞥匹滅切 縈於營切 駃音快 疾貌 痞音備 而濡音軟 柔也 轉索上株戀反 下蘇各反 濈阻立切 汗出也 趺音夫 腐音府 爛也 燥蘇到切 乾也 噫乙界切 爍式灼切 溼所留切 溽弱也 縶直立切 俠音協 又音夾 黧力支切 色黑而黃也 餉音瞳 義同 曦於月切 逆氣也 劒女六切 慄音栗 懼貌 邪中音衆 懈湎切 溷胡困切 濁亂也 怫鬱上音弗 下音鬱 痺於容切 嗢乙骨切 嗢咽也 豚徒渾切 盍音合 圊七精切 厠也 湫子由切 又子小切 斷魚斤切 麋音眉 悍胡旦切 眥靜訾切 參差上初簪切

下楚宜切銓七全切銖音殊滀音畜水聚也其差楚懈切呻音申卵盧管切嚨力公切喉嚨也菽音叔豆也勁居正切健也淖奴教切覆芳救切牝藏上毗忍切下才浪切陰藏也瘍以章切僵仆上音薑下音副翕奄上音吸下音掩見陽音現股音古髀也惵徒頰切動懼貌諧音鞋和也戾音利痂癩上音加下力代切噫烏介切酢音醋冒音帽昏冒也芤苦侯切

註解傷寒論卷第二　仲景全書第十二

漢　長沙守　張仲景　述

晉　太醫令　王叔和　撰次

宋　聊攝人　成無已　註解

明　虞山人　趙開美　校句

傷寒例第三

陰陽大論云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冷冽。此則四時正氣之序也。春夏為陽。春溫夏熱者。陽之動。始于溫。盛於暑故也。秋冬為陰。秋涼而冬寒者。以陰之動。始于清。盛于寒故也。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷於寒。觸冒之者。乃名傷寒

耳。冬三月純陰用事。陽乃伏藏。水氷地坼。寒氣嚴凝。當是之時。善攝生者。泄霧固密。去寒就温。則不傷于寒。其涉寒冷。觸冒霜雪。為病者。謂之傷寒也。其傷於四時之氣。皆能為病。春風夏暑。秋濕冬寒。謂之四時之氣。以傷寒為毒者。以其最成殺厲之氣也。熱為陽。陽主生。寒為陰。陰主殺。陰寒為病。最為酷殺毒厲之氣。中而即病者。名曰傷寒。不即病者。寒毒藏於肌膚。至春變為温病。至夏變為暑病。暑病者。熱極重於温也。内經曰。先夏至日為温病。後夏至日為暑病。温暑之病。本傷于寒而得之。故太醫均謂之傷寒也。是以辛苦之人。春夏多温熱病。皆由冬時觸寒所致。非時行之氣也。凡時行者。春時應暖而復大寒。夏時應大熱而反大凉。秋時應凉而反大熱。冬時應寒而反大温。此非其時而有其氣。是以一歲之中。長幼之病多相似者。此則時行之氣也。（四時氣候不正為病。謂之時行之氣。時氣時行為病。非暴觸之氣。感受必同。是以一歲之中。長幼之病多相似也。）

夫欲候知四時正氣為病。及時行疫氣之法。皆當按斗曆占之。（四時正氣者。春風夏暑。秋濕冬寒。是也。時行者。時行之氣是也。温者冬時感寒。至春發者是也。疫者。暴厲之氣是也。占前斗建。審其時候之寒温。察其邪氣之輕重而治之。故下文曰。）九月霜降節後。宜漸寒。向冬大寒。至正月雨水節後。宜解也。所以謂之雨水者。以氷雪解而為雨水故也。至驚蟄二月節後。氣漸和暖。向夏大熱。至秋便凉。（冬寒春温夏熱秋凉。為四時之正氣也。）從霜降以後。至春

分以前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也九月十月寒氣尚微為病則輕十一月十二月至即為病也五十四字案宋本作正文今作註誤也寒列已嚴為病則重正月二月寒漸將解為病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即為病也此為四時正氣中而即病者也其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為治不同證如後章此為時行之氣前云冬時應寒而反大溫者是也從立春節後其中無暴大寒又不氷雪而有人壯熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病此為溫病也內經曰冬傷于寒春必病溫從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳此為疫氣也是數者以明前斗曆之法占其隨時氣候發病寒熱輕重不同耳十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名為二十四氣也節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而不去者或有至而太過者皆成病氣也疑脫或有至而不去句今補按金匱要畧曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何故也師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陰之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子

而天未温和。此為至而不至。以得甲子。天大寒不解。此為至而不去也。以得甲子而天温如盛夏五六月時。此為至而太過也。內經曰。至而和則平。至而甚則病。至而反者病。至而不至者病。未至而至者病。即是觀之。脱漏明矣。但天地動靜。陰陽鼓擊者。各正一氣耳。內經曰。陰陽者。天地之道。清陽為天。動而不息。濁陰為地。靜而不移。天地陰陽之氣。鼓擊而生春夏秋冬。寒熱温凉。各正一氣也。是以彼春之暖。為夏之暑。彼秋之慘。為冬之怒。春暖為夏暑。從生而至長也。秋慘為冬怒。從肅而至殺也。是故冬至之後。一陽爻升。一陰爻降也。夏至之後。一陽氣下。一陰氣上也。十月六爻皆陰。坤卦為用。陰極陽來。陽生于子。冬至之後。一陽爻升。一陰爻降。於卦為復。言陽氣得復也。四月六爻皆陽。乾卦為用。陽極陰來。陰生于午。夏至之後。一陽氣下。一陰氣上。于卦為姤。言陰得遇陽也。內經曰。冬至四十五日。陽氣微上。陰氣微下。夏至四十五日。陰氣微上。陽氣微下。斯則冬夏二至。陰陽合也。春秋二分。陰陽離也。陽生于子。陰生于午。是陰陽相接故曰合。陽退于酉。陰退于卯。是陰陽相背。故曰離。內經曰。氣至之謂至。氣分之謂分。至則氣同。分則氣異。陰陽交易。人變病焉。天地陰陽之氣。既交則而不正。人所以變病。內經曰。陰陽相錯。而變由生也。此君子春夏養陽。秋冬養陰。順天地之剛柔也。內經曰。養生者必順于時。春夏養陽。以涼以寒。秋冬養陰。以温以熱。所以然者。從其根故也。小人觸冒。必嬰暴疹。須知毒烈之氣。留在何經。而發何病。詳而取之。不能順四時調養。觸冒寒温者。必成暴病。醫者當在意審詳而治之。是以春傷於風。夏必飧泄。夏傷於暑。秋必病瘧。秋傷於濕。冬必咳嗽。冬傷於寒。春必病温。此必然之道。可不

審明之。當春之時。風氣大行。春傷于風。風氣通于肝。肝以春適王。風雖入之。不能即發。至夏肝衰。然後始動。風猶未疾。則當發于四肢。夏以陽氣外盛。風不能外發。故攻內而為隕泄。飧泄者下利未穀不化而色黃。當秋之時。濕氣大行。秋傷於濕。濕則干於肺。肺以秋適王。濕雖入之。不能即發至冬。肺衰。然後濕始動也。兩足腰疾。則當發為下利。冬以陽氣內固。濕氣不能下行。故上逆而為咳嗽。當夏之時。暑氣大行。夏傷于暑。夏以陰為主內。暑雖入之。勢未能動。及秋陰出而陽為內主。然後暑動。搏陰而為痎瘧。痎者。三日一發。瘧者。一日一發。當冬之時。寒氣大行。冬傷於寒。冬以陽為主內。寒雖入之。勢未能動。及春陽出而陰為內主。然後寒動。搏陽而為溫病。是感冒四時正氣為病。必然之道。傷寒之病。逐日淺深。以施方治。內經曰。未滿三日者可汗而已。其滿三日者可泄而已。今世人傷寒。或始不早治。或治不對病。或日數久。淹困乃告醫。醫人又不依次第而治之則不中病。皆宜臨時消息制方。無不妙也。今搜採仲景舊論。錄其證候診脉辭色。對病真方有神驗者。擬防世急也。仲景之書。逮今千年。而顯用于世者。王叔和之力也。又土地溫涼高下不同。物性剛柔。飡居亦異。是黃帝與四方之問。岐伯舉四治之能。以訓後賢。開其未悟者。臨病之工。宜須兩審也。東方地氣溫。南方地氣熱。西方地氣涼。北方地氣寒。西北方高。東南方下。是土地溫涼高下不同也。東方安居食魚。西方陵居華食。南方濕處而嗜酸。北方野處而食乳。是飡居之異也。東方治宜砭石。西方治宜毒藥。南方治宜微針。北方治宜灸焫。是四方醫治不同也。醫之治病。當審其土地所宜。

凡傷於寒。則為病熱。熱雖甚不死。內經曰。風寒客于人。使人毫毛畢直。皮膚閉而為熱。是傷寒為病熱也。鍼經曰。

多熱者陽已多寒者難已是熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死裏表俱病者謂之兩感尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脉上連風府故頭項痛腰脊強太陽為三陽之長其氣浮于外故尺寸俱浮是邪氣初入皮膚外在表也當一二日發風府穴名也項中央太陽之脉從巔入絡腦還出別下項是以上連風府其經循肩膊內俠脊抵腰中故病頭項痛腰脊強尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得卧陽明血氣俱多尺寸俱長者邪併陽明而血氣涌溢也太陽受邪不已傳于陽明是當二三日發其脉俠鼻者陽明脉起於鼻交頞中絡於目陽明之脉正上頗顙還出繫目系身熱者陽明主身之肌肉緼經曰陽明氣盛則身以前皆熱目疼鼻乾者經中客邪也不得卧者胃氣逆不得從其道也內經曰胃不和則卧不安尺寸俱

弦者少陽受病也當三四日發以其脉循脇絡於耳故脇脇痛而耳聾內經曰陽中之少陽通于春氣春脉弦尺寸俱弦者知少陽受邪也三四日陽明之邪不已傳于少陽是當三四日發脇脇痛而耳聾者經壅而不利也此三經皆受病未入于府者可汗而已三陽受邪為病在表法當汗解然三陽亦有便入府者入府則宜下故云未入于府者可汗而已尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾陽極則陰受之邪傳三陽既遍次乃傳于陰經在陽為在表在陰為在裏邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉陽邪傳陰邪氣內陷故太陰受病而脉尺寸俱沉細也自三陽傳于太陰是當四五日發也邪入于陰則漸成熱腹滿而嗌乾者脾經壅而成熱也尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎

絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。少陰腎水也。性趨下。少陰受病。脉尺寸俱沉也。四五日太陰之邪不已。至五六日。則傳于少陰也。是少陰病當五六日發。人傷于寒。則為病熱。謂始為寒而終成熱也。少陰為病。口燥舌乾而渴。邪傳入裏。熱氣漸深也。尺寸俱微緩者。厥陰受病也。當六七日發。以其脉循陰器。絡於肝。故煩滿而囊縮。緩者。風脉也。厥陰脉微緩者。邪傳厥陰。熱氣已劇。近于風也。當六七日發。以少陰邪傳于厥陰。煩滿而囊縮者。熱氣聚于內也。此三經皆受病已入於府。可下而已。三陰受邪。為病在裏。于法在經則宜汗。故云已入于府者可下而已。經曰。臨病之工。宜須兩審。若兩感於寒者。一日太陽受之。即與少陰俱病。則頭痛口乾煩滿而渴。二日陽明受之。即與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食譫語。三日少陽受之。即與厥陰俱病。則耳聾囊縮而厥者。厥陰水漿不入。不知人者。六日死。若三陰三陽。五藏六府皆受病。則榮衛不行。府藏不通。則死矣。陰陽俱病。表裏俱傷者。為兩感。以其陰陽兩感。病則兩證俱見。至于傳經。則亦陰陽兩經俱傳也。始得一日頭痛者。太陽口乾煩滿而渴者。少陰至二日則太陽傳于陽明。而少陰亦傳于太陰。身熱譫語者。陽明腹滿不欲食者。太陰至三日。陽明傳于少陽。而太陰又傳于厥陰。耳聾者。少陽囊縮而厥者。厥陰水漿不入。不知人者。胃氣不通也。內經曰。五藏已傷。六府不通。榮衛不行。如是之後。三日乃死。何也。岐伯曰。陽明者。十二經脉之長也。其血氣盛。故云不知人。三日其氣乃盡。故死矣。謂三日六經俱病。榮衛之氣不得行于內外。府藏之氣不得通于上下。至六日。府藏之氣俱盡。榮衛之氣俱絕。則死矣。其不兩感於寒。更不傳經。不加異氣者。

至七日。太陽病衰。頭痛少愈也。八日陽明病衰。身熱少歇也。九日。少陽病衰。耳聾微聞也。十日太陰病衰。腹減如故。則思飲食。十一日。少陰病衰。渴止舌乾已而嚏也。十二日。厥陰病衰。囊縱。少腹微下。大氣皆去。病人精神爽慧也。六日傳遍。三陰三陽之氣皆和。大邪之氣皆去。病人精神爽慧也。若過十三日以上。不問尺寸陌者。大危。閒者。瘳也。十二日傳經盡。則當瘳。愈指過十三日已上不瘳。尺寸之脈沉陌者。即正氣內衰。邪氣獨勝。故云大危。若更感異氣。變為他病者。當依後壞證病而治之。若脈陰陽俱盛。重感於寒者。變為溫瘧。異氣者。為先病未已。又感別異之氣也。兩邪相合。變為他病。脈陰陽俱盛者。傷寒之脈也。難經曰。陽

寒之脈。陰陽俱盛而緊滿。經曰。脈盛身寒。得之傷寒。則為前病熱未已。再感于寒。寒熱相傳。變為溫瘧。陽脈浮滑。陰脈濡弱者。更遇於風。變為風溫。此前熱未歇。又感于風者也。難經曰。中風之脈。陽浮而滑。陰濡而弱。風來乘熱。故變風溫。陽脈洪數。陰脈實大者。遇溫熱。變為溫毒。溫毒為病最重也。此前熱未已。又感溫熱者也。陽主表。陰主裏。洪數實大。皆熱也。兩熱相合。變為溫毒。以其表裏俱熱。故為病最重。陽脈濡弱。陰脈弦緊者。更遇溫氣。變為溫疫。以此冬傷於寒。發為溫病。脈之變證。方治如說。此前熱未已。又感溫氣者也。溫熱相合。變為溫疫。凡人有疾。不時即治。隱忍與羞。以成痼疾。凡覺不佳。急須求治。苟延時日。則邪氣入深。難可復制。千金曰。凡有少苦。似不如平常。即須早治。若隱忍不治。冀望自差。須臾之間。以成痼疾。此之謂也。小

兒女子。益以滋甚。小兒氣血未全。女子血室多病。凡所受邪易于滋蔓。時氣不和。便當早言。尋其邪由。及在腠理。以時治之。罕有不愈者。腠理者。津液腠泄之所。文理縫會之中也。金匱要畧曰。腠者。是三焦通會元真之處。為血氣所注。理者。是皮膚藏府之文理也。邪客于皮膚。則邪氣浮淺。易為散發。若以時治之。罕有不愈者矣。金匱玉函曰。主候常存。形色未病。未入腠理。針藥及時。服將調節。委以良醫。病無不愈。患人忍之。數日乃說。邪氣入藏。則難可制。此為家有患。備慮之要。邪在皮膚。則外屬陽而易治。邪傳入裏。則內屬陰而難治。內經曰。善治者。治皮毛。其次治肌膚。其次治筋脈。其次治六府。其次治五藏。治五藏者。半死半生也。昔桓侯怠于皮膚之微疾。以至骨髓之病。家有患者。不可備慮。凡作湯藥。不可避晨夜。覺病須臾。即宜便治。不等早晚。則易愈矣。千金曰。凡始覺不快。即須治療。迄至於病湯食纏遲。折其毒勢。自然而差。若或差遲。病即傳變。雖欲除治。必難為力。傳。有常也。變。無常也。傳為循經而傳。如太陽傳陽明是也。變為不常之變。如陽證變陰證是也。邪既傳變。病勢深也。本草曰。病勢已成。可得半愈。病勢已過。命將難全。服藥不如方法。縱意違師。不須治之。內經曰。拘于鬼神者。不可與言至德。惡于針石者。不可與言至巧。病不許治者。病不必治。治之無功矣。凡傷寒之病。多從風寒得之。凡中風與傷寒為病。自古通謂之傷寒。千金曰。夫傷寒病者。起自風寒。入於腠理。與精氣分爭。榮衛偏隔。周身不通而病。始表中風寒。入裏。則不消矣。始自皮膚。入于經絡。傳于藏府是也。未有溫覆而當不消散者。風寒初客于皮膚。便投湯藥。溫暖發散而當者。則無不消散之邪。不在證治。擬欲攻之。猶當先解表。乃可下之。先解表而後下之。則無復

傳之邪也。若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除。表證雖罷。裏不至大堅滿者。亦未可下之。是邪未收斂成實。下之則裏虛而邪復不除。猶生寒熱也。若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日。不能為禍也。外無表證裏有堅滿為下證悉具外臺云。表和裏病。下之則愈。下證既具。則不必拘于日數。若不宜下而便攻之內虛熱入。協熱遂利。煩躁諸變。不可勝數。輕者困篤。重者必死矣。下之不當。病輕者。證猶變易而難治。又況重者乎。夫陽盛陰虛。汗之則死。下之則愈。陽虛陰盛。汗之則死。表為陽。裏為陰。陰虛者。陽必湊之。陽盛之邪乘其裏虛而入于府者。為陽盛陰虛也。經曰。尺脈弱者曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱者矣。下之除其內熱而愈。若反汗之則竭其津液而死。陰脈不足。陽往從之。陽脈不足。陰往乘之。陰邪乘其表虛。客于榮衛之中者。為陽虛陰盛也。經曰。假令寸口脈微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則洒淅惡寒者是矣。汗之散其表寒。則愈。若反下之。則脫其正氣而死。經曰。本發汗而復下之。此為逆也。本先下之而反汗之為逆。夫如是則神丹安可以誤發。甘遂何可以妄攻。虛盛之治。相背千里。吉凶之機。應若影響。豈容易哉。神丹者。發汗之藥也。甘遂者。下藥也。若汗下當。則吉。汗下不當。則凶。其應如影隨形。如響應聲。況桂枝下咽。陽盛則斃。桂枝湯者。發汗藥也。承氣湯者。下氣入胃。陰盛以亡。桂枝湯者。發汗藥也。金匱玉函曰。不當汗而強與汗之者。令人奪其津液。枯槁而死。不當下而強與下之者。令人開腸洞泄。便溺不禁而死。死生之要。在乎須臾。視身之盡。不暇計日。桂枝湯不當則發汗。立見。豈暇計其日數哉。此陰陽虛實之交錯。其候至微。發汗吐下之相反

其禍至速而醫術淺狹懵然不知病源為治乃悞使病者殞歿自謂其分至令冤魂塞於冥路死屍盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹甘遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違夫智者之舉錯也常審以慎愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉世上之士但務彼翕習之榮而莫見此傾危之敗惟明者居然能護其本近取諸身夫何遠之有焉兩感病俱作欲成不治之疾醫者大宜消息醫其先後次第而治之若妄意攻治以求速效者必致傾危之敗凡發汗溫暖湯藥其方雖言日三

服若病劇不解當促其間可半日中盡三服若與病相拒即便有所覺重病者一日一夜當晬時觀之如服一劑病證猶在故當復作本湯服之至有不肯汗出服三劑乃解若汗不出者死病也發汗溫暖服者易為發散也日三服者藥勢續也病勢稍重當促急服之以折盛熱不可拘于本方設藥病不相對湯入即便知之如陰多者投以凉藥即寒逆隨生陽多者飲以温劑則熱毒即起是便有所覺晬時者周時也一日一夜服湯藥盡劑更看其傳如病證猶在當復作本湯以發其汗若服三劑不解汗不出者亦氣太甚湯不能勝必成大疾千金口熱病脉躁盛而不得汗者此陽狂之極也死凡得時氣病至五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更與

人作病也。至七八日大渴欲飲水者。猶當依證與之。與之常令不足。勿極意也。言能飲一斗。與五升。若飲而腹滿。小便不利。若喘若噦。不可與之。忽然大汗出。是為自愈也。熱在上焦則為消渴。言熱消津液而上焦乾燥。則生渴也。大熱則能消水。熱少不能消之。若強飲則停飲變為諸病。至七八日。陽勝氣温。向解之時。多生大渴也。亦須少少與之。以潤胃氣。不可極意飲也。若飲而腹滿。小便不利。若喘若噦者。為水飲內停而不散。不可更與之。忽然陽氣通。水氣散。宣發于外。作大汗而解。凡得病反能飲水。此為欲愈之病。其不曉病者。但聞病飲水自愈。小渴者。乃強與飲之。因成其禍。不可復數。小渴者。為裏中熱必若強與水。水飲不消。復為諸飲病也。凡得病厥。脉動數。服湯藥更遍。

脉浮大減小。初躁後靜。此皆愈證也。動數之脉。邪在陽也。湯入而變遲者。陽邪愈也。浮大之脉。邪在表也。而復減小者。表邪散也。病初躁亂者。邪所煩也。湯入而安靜者。藥勝病也。是皆為愈證。凡治温病。可刺五十九穴。五十九穴者。以寫諸經之温熱。鍼經曰。熱病取之諸陽五十九穴。刺以寫其熱。而出其汗。實其陰而補其不足。所謂五十九刺。兩手內外側各三。凡十二病。五指間各一。凡八病。足亦如是。頭入髮際一寸旁三分各三。凡六病。更入髮三寸邊五。凡十病。耳前後口下各一。項中一穴。凡六病。顖上一。顖會一。髮際一。鳧泉一。風池二。天柱二。又內經曰。熱俞五十九。頭上五行。行五者。以寫諸陽之熱。逆也。大杼。膺俞。缺盆。皆俞。此八者。以寫胸中之熱。氣衝三里。巨虛上下廉。此八者。以寫胃中之熱也。雲門。彄骨。委中。髓空。此八者。以寫四支之熱也。五藏俞旁五。此十者。以寫五藏之熱也。凡此五十九穴者。皆熱之左右也。又身之穴三百六十有五。其三十穴。灸之有害。七

十九穴。刺之為災。并中髓也。穴有三百六十五。以應一歲。其灸刺之禁。皆肉薄骨解之處。血脈虛少之分。鍼灸并中髓也。脈四損。三日死。平人四息。病人脈一至。名曰四損。脈五損。一日死。平人五息。病人脈一至。名曰五損。脈六損。一時死。平人六息。病人脈一至。名曰六損。四藏氣絕者。脈四損。五藏氣絕者。脈五損。五藏六府俱絕者。脈六損。脈盛身寒。得之傷寒。脈虛身熱。得之傷暑。內經曰。脈者血之府也。脈實血實。脈虛血虛。寒則傷血。和併於血。則血盛而氣虛。故傷寒者。脈盛而身寒。熱則傷氣。和併於氣。則氣盛而血虛。故傷暑者。脈虛而身熱。脈陰陽俱盛。大汗出不解者。死。脈陰陽俱盛。當汗出而解。若汗出不解。則邪氣內勝。正氣外脫。故死。內經曰。汗出而脈尚躁盛者。死。千金曰。脈陰熱病。已得汗。脈尚躁盛。此陽脈之極也。死。脈陰陽俱虛。熱不止者死。脈陰陽俱虛者。其氣弱也。熱不止者。邪氣勝也。內經曰。病溫虛甚者死。脈至乍疎乍數者死。謂天真榮衛之氣斷絕也。脈至如轉索者。其日死。為緊急而不數。是中無胃氣。故不出其日而死。讝言妄語。身微熱。脈浮大。手足温者生。逆冷。脈沉細者。不過一日死矣。讝言妄語。陽病也。身微熱。脈浮大。手足温。為脈病相應。若身逆冷。脈沉細。為陽病見陰脈。脈病不相應。故不過一日而死。難經曰。脈不應病。病不應脈。是為死病。此以前是傷寒熱病證候也。

辨痙濕暍脈證第四

傷寒所致太陽病。痙濕暍三種。宜應別論。以為與傷寒相似。故此見之。痙。當作痙。傳寫之誤也。痙者。惡也。非強也。內經曰。肺移熱於腎。

傳為柔痓。柔為筋柔而無力。痓謂骨痓而不隨。痓者。強也。千金以強直為痓。經曰。頸項強急。口噤。背反張者。痓即是觀之。痓為痓字明矣。太陽病。發熱。無汗。反惡寒者。名曰剛痓。[一] 千金曰。太陽中風。重感寒濕。則變痓。太陽病。發熱無汗。為表實。則不當惡寒。今反惡寒者。則太陽中風。重感於寒。為痓病也。以表實感寒。故名剛痓。太陽病。發熱。汗出。不惡寒者。名曰柔痓。[二] 太陽病發熱汗出。為表虛。則當惡寒。其不惡寒者。為陽明病。今發熱汗出而不惡寒者。非陽明證。則是太陽中風。重感於濕。為柔痓也。表虛感濕。故曰柔痓。太陽病。發熱。脉沉而細者。名曰痓。[三] 太陽主表。太陽病。發熱為表病。脉當浮大。今脉反沉細。既不愈。則太陽中風。重感于濕而為痓也。金匱要畧曰。太陽病。其證痛。身體強。几几然脉反沉遲。此為痓。括蔞桂枝湯主之。太陽病。發汗太多。因致痓。[四] 太陽病。發汗太多。則亡陽。內經曰。陽氣者。精則養神。柔則養筋。陽微不能養筋。則筋脉緊急而成痓也。病身熱。足寒。頸項強急。惡寒。時頭熱。面赤。目脉赤。獨頭[面] 一本無面字 搖。卒口噤。背反張者。痓病也。[五] 太陽中風。為純中風也。太陽傷寒。為純傷寒也。皆不作痓。惟是太陽中風。重感寒濕。乃變為痓也。身熱足寒者。寒濕傷下也。時頭熱。面赤。目脉赤。風傷于上也。頭搖者。風主動也。獨頭搖者。頭為諸陽之會。風傷陽也。若純傷風者。身亦為之動搖。手足為之搐搦。此者內挾寒濕。故頭搖也。口噤者。寒主急也。卒口噤者。不常噤也。有時而緩。若風寒相搏。則口噤而不時開。此者。加之風濕。故卒口噤也。足太陽之脉。起於目內眥上額。交巔上。其支別者。從巔入絡腦。還出別下項。循肩髆內夾脊。抵腰中下貫臀。以下至足。風寒客於經中。則筋脉拘急。故頸項強急。而背反張也。太陽病。關節疼痛而煩。脉沉而細者。此名濕痺。濕痺之候。其人小便不利。大便反快。但當利其小便。[一] 金匱

要略曰。霧傷皮膚。濕流關節。疼痛而煩者。濕氣內流也。濕同水也。脈沉而細者。水性趣下也。痺痛也。因其關節煩疼。而名曰濕痺。非胸氣之痺也。內經曰。濕勝則濡泄。小便不利。大便反快者。濕氣內勝也。但當利其小便。以宣泄腹中濕氣。古云。治濕之病。不利小便。非其治也。濕家之為病。一身盡疼。發熱。身色如似熏黃。〔二〕此身色如似熏黃。即非陽明瘀熱。身黃發熱者。梔子蘗皮湯主之。為表裏有熱。則身不疼痛。此一身盡疼。非傷寒客熱也。知濕邪在經而使之。胖惡濕傷。則胖病而色見。是以身發黃者。為其黃如煙熏。非正黃色也。濕家。其人但頭汗出。背強。欲得被覆向火。若下之早。則噦。腎滿。小便不利。舌上如胎者。以丹田有熱。胸中有寒。渴欲得水而不能飲。則口燥煩也。〔三〕濕家有風濕有寒濕。此寒濕相搏者也。濕勝則多汗。傷寒則無汗。寒濕相搏。雖有汗而不

能周身。故但頭汗出也。背陽也。腹陰也。太陽之脈夾脊抵腰。太陽客寒。濕表氣不利而背強也。裏有邪者。外不惡寒。表有邪者。則惡寒。欲得被覆向火者。寒濕在表而惡寒也。若下之早。則傷動胃氣。損其津液。故致噦而腎滿。小便不利。下後裏虛上焦陽氣因虛而陷於下焦。為丹田有熱。表中寒乘而入於胸中。為胸上有寒。使舌上生白胎滑也。藏燥則欲飲水。以胸上客寒濕。故不能飲。而但口燥煩也。濕家。下之額上汗出。微喘。小便利者。死。若下利不止者。亦死。〔四〕濕家發汗。則愈。金匱要略曰。濕家身煩疼。可與麻黃加朮四兩。發其汗為宜。若妄下之。則大逆。額上汗出而微喘者。乃陽氣上逆也。小便自利。或下利者。陰氣下流也。陰陽相離。故云死矣。內經曰。陰陽離訣。精氣乃絕。問曰。風濕相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云。此可發汗。汗之病不愈者。何也。荅曰。發其汗。汗大出者。但風

氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也值天陰雨不止明其濕勝也內經曰陽受風氣陰受濕氣又曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之風濕相搏則風在外而濕在內汗大出者其氣暴疎則外邪出而裏邪不能出故風去而濕在汗微微而出者其氣緩緩則內外之邪皆出故風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈五病有淺深證有中外此則濕氣淺者也何以言之濕家不云關節煩疼而云身上疼痛是濕氣不流關節而外客肌表也不云發熱身似重黃復云發熱面黃而喘是濕不干於脾而薄於上焦也陰受濕氣則濕邪為深今頭痛鼻塞而煩是濕客於陽而不客於陰也濕家之脈當沉細為濕氣內流脈大者陽也則濕不內流而外在表也又以自能飲食胃腹別無滿悶為腹中和無病知其濕氣微淺內藥鼻中以宣泄頭中寒濕

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷于汗出當風或久傷取冷所致也六一身盡疼者濕也發熱日晡所劇者風也若汗出當風而得之者則先客濕而後感風若久傷取冷得之者則先傷風而後中濕可與麻黃杏仁薏苡仁甘草湯見金匱要畧中

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也七汗出惡寒身熱而不渴者中風也白虎加人參湯主之見金匱要畧中方太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此亦夏月傷冷水水行皮中所致也八經曰脈虛身熱得之傷暑身熱脈微弱者暍也身體疼重者水也夏時暑熱以水灌洗而得之一物瓜蒂散主之見金匱要畧中方太陽中暍者發熱惡寒

身重而疼痛其脉弦細乳遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加温針則發熱甚數下之則淋甚

病有在表有在裏者有表裏俱病者此則表裏俱病者也發熱惡寒身重疼痛者表中暍也脉弦細乳遲者中暑脉虛也小便已洒洒然毛聳手足逆冷者太陽經氣不足也小有勞身即熱者謂勞動其陽而暍即發也口開前板齒燥者重有熱也內經曰因於暑汗煩則喘喝口開謂喘喝也以喘喝不止故前板齒乾燥若發汗以去表邪則外虛陽氣故惡寒甚若以温針助陽則火熱內攻故發熱甚若下之以除裏熱則內虛而膀胱燥故淋甚

辨太陽病脉證并治法上第五

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

浮者太陽受病太陽主表為諸陽主氣脉浮頭項強痛而惡寒者太陽表病也

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風

風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗出惡風者衛中風榮病發熱無汗不惡風而惡寒衛病則發熱汗出不惡寒而惡風以衛為陽衛外者也病則不能衛固其外而皮腠漏故汗出而惡風也傷寒脉緊傷風脉緩者寒性勁急而風性解緩故也

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

經曰凡傷於寒則為病熱為寒氣客於經中陽經悗結而成熱也中風即發熱者風為陽也及傷寒云或已發熱或未發熱以寒為陰邪不能即熱鬱而方發熱也風則傷衛寒則傷榮衛虛者惡風榮虛者惡寒榮傷寒者必惡寒也氣病者則痛血病者則痛風令氣緩寒令氣迫體痛嘔逆者榮中寒也經曰脉盛身寒得之傷寒脉陰陽俱緊者知其傷寒也

傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐若

燥煩脉數急者為傳也。太陽主表。一日則太陽受邪。至二日。當傳陽明。若脉氣微而不傳。陽明胃經受邪。則喜吐。寒邪傳裏者。則變熱。如頗欲吐。若煩燥脉急數者。為太陽寒邪變熱。傳於陽明也。傷寒二三日。陽明少陽證不見者。為不傳也。傷寒二三日無陽明少陽證。知邪不傳。止在太陽經中也。太陽病。發熱而渴。不惡寒者。為溫病。發熱而渴。不惡寒者。陽明也。此太陽受邪。知為溫病。非傷寒也。積溫成熱。所以發熱而渴。不惡寒也。若發汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫為病。脉陰陽俱浮。自汗出。身重。多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視。失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癇。時瘈瘲。若火熏之。一逆。尚引日。再逆。促命期。傷寒發汗已。則身涼。若發汗已。身灼熱者。非傷寒。為風溫也。風傷於上。而陽受風氣。風與溫相合。則傷衛。脉陰陽俱浮。自汗出者。衛受邪也。衛者。氣也。風則傷衛。溫則傷氣。身重多眠睡者。衛受風溫而氣昏也。鼻息必鼾。語言難出者。風溫外甚。而氣擁不利也。若被下者。則傷藏氣。太陽膀胱經也。內經曰。膀胱不利為癃。不約為遺溺。癃者。小便不利也。太陽之脉。起目內眥。內經曰。瞳子高者。太陽不足。戴眼者。太陽以絕。小便不利。直視。失溲。為下後。竭津液。損藏氣。風溫外勝。經曰。欲絕也。為難治。若被火者。則火助風溫成熱。微者。熱瘀而發黃。劇者。熱甚生風。如驚癇而時瘈瘲也。先曾被火為一逆。若更以火熏之。是再逆也。一逆尚猶延引時日。而不愈。其再逆者。必致危殆。故云促命期。病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者。七日愈。發於陰者。六日愈。以陽數七。陰數六故也。陽為熱也。陰為寒也。發熱而惡寒。寒傷陽也。無熱而惡寒。寒傷陰也。陽法火。陰法水。火成數七。水成數六。陽病七日愈者。火數

足也。陰病六日愈者。水數足也。太陽病。頭痛至七日已上自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。鍼足陽明。使經不傳。則愈。陽寒自一日至六日。傳二陽三陰經盡至七日當愈。經言。七日太陽病衰。頭痛少愈。若七日不愈。則太陽之邪再傳陽明。針足陽明。為迎而奪之。使經不傳。則愈。太陽病。欲解時。從巳至未上。巳為正陽。則陽氣得以復也。以三時為解。而太陽從巳至未。陽明從申至戌。少陽從寅至辰。至於太陰從亥至丑。少陰從子至寅。厥陰從丑至卯者。以陽行也。速。陰行也。緩。陽主晝。陰主於夜。陽三經解時。從寅至戌。以陽道常疏也。陰三經解時。從亥至卯。以陰道常乏也。內經曰。陽中之太陽。通於夏氣。則巳午未。太陽乘王也。風家。表解而不了了者。十二日愈。中風家。發汗解後。未全快暢者。十二日太邪皆去。六經悉和。則愈。病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。皮膚言淺。骨髓言深。皮膚言外。骨髓言內。身熱欲得衣者。表熱裏寒也。身寒不欲衣者。表寒裏熱也。太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嚌嚌惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。[上]陽以候衛。陰以候榮。陽浮者。衛中風也。陰脈弱者。榮虛弱也。風并於衛。則衛實而榮虛。故發熱汗自出也。經曰。太陽病發熱汗出者。此為榮弱衛強者是也。嚌嚌者。不足也。惡寒之貌也。淅淅者。洒洒也。惡風之貌也。衛需則惡風。榮虛則惡寒。榮弱衛強。惡寒復惡風者。以自汗出。則皮膚緩。腠理疎。是亦惡風也。翕翕者。煽煽然而熱也。若合羽所覆。言熱在表也。鼻鳴乾嘔者。風雍而氣逆也。與桂枝湯和榮衛而散風邪也。

桂枝湯方

桂枝叁兩去皮味辛熱　芍藥叁兩味苦酸微寒　甘草貳兩炙味甘平　生薑叁兩切味辛溫　大棗拾貳枚擘味甘溫

內經曰。辛甘發散為陽。桂枝湯辛甘之劑也。所以發散風邪。內經曰。風淫所勝。平以辛佐以苦甘。以甘緩之。以酸瀉之。是以桂枝為主。芍藥甘草為佐也。內經曰。風淫於內。以甘緩之。以辛散之。是以生薑大棗為使也。

右伍味。㕮咀。以水柒升。微火煑取叁升。去滓。適寒溫。服壹升。服已。須臾歠熱稀粥壹升餘。以助藥力。溫覆令壹時許。遍身漐漐。微似有汗者。益佳。不可令如水流漓。病必不除。若壹服。汗出病差。停後服。不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服當小促其間。半日許。令叁服盡。若病重者。壹日壹夜服。周時觀之。服壹劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至貳叁劑。禁生冷粘滑肉麵。五辛酒酪臭惡等物。

太陽病。頭痛。發熱。汗出。惡風者。桂枝湯主之。〔二〕頭痛者。太陽也。發熱汗出惡風者。中風也。與桂枝湯解散風邪。太陽病。項背強几几。反汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。〔三〕几几者。伸頸之貌也。動則伸頸搖身而行。項背強者。動則如之。項背几几者。當無汗。反汗出惡風者。中風表虛也。與桂枝湯以和表。加麻黃葛根以祛風。且麻黃主表實。後葛根湯證云。太陽病。項背強几几。無汗惡風。葛根湯主之。藥味正與此方同。其無汗者。當用麻黃。今自汗出。恐不加麻黃。但加葛根也。太陽病。

下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之【四】太陽病屬表而反下之則虛其裏邪欲乘虛傳裏若氣上衝者裏不受邪而氣逆上與邪爭也則邪仍在表故當復與桂枝湯解外其氣不上衝者裏虛不能與邪爭邪氣已傳裏也故不可更與桂枝湯攻表太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脉證知犯何逆隨證治之太陽病三日中曾經發汗吐下溫針虛其正氣病仍不解者謂之壞病言為醫所壞病也不可復與桂枝湯審觀脉證知犯何逆而治之逆者隨所逆而救之桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也【五】脉浮發熱汗出惡風者中風也可與桂枝湯解肌脉浮緊發熱不汗出者傷寒也可與麻黃湯常須識此勿妄治也若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也酒客內熱喜辛而惡甘桂枝湯甘酒客得之則中滿而嘔喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳【六】太陽病為諸陽主氣風甚氣擁則生喘也與桂枝湯以散風加厚朴杏仁以降氣凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也內熱者服桂枝湯則吐如酒客之類也既亡津液又為熱所搏其後必吐膿血吐膿血謂之肺痿金匱要畧曰熱在上焦為肺痿謂或從汗或從嘔吐重亡津液故得之太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之【七】太陽病因發汗遂汗漏不止而惡風者為陽氣不足因發汗陽氣益虛而皮腠不固也內經曰膀胱者州都之官津溢藏焉氣化則出小便難者汗出亡津液陽氣虛弱不能施化四肢者諸陽之本也四肢微急難以屈伸者亡陽而脫液也針經曰

液脫者。骨屬屈伸不利。與桂枝加附子湯。以溫經復陽。太陽病。下之後。脉促胷滿者。桂枝去芍藥湯主之。

【八】若微惡寒者。去芍藥。方中加附子湯主之。

【九】脉來數。時一止。復來者。名曰促。促為陽盛。則不因下後而脉促者也。此下後脉促。不得為陽盛也。太陽病下之。其脉促。不結胷者。此為欲解。此下後脉促而復胷滿。則不得為欲解。由下後陽虛。表邪漸入。而客於胷中也。與桂枝湯。以散客邪。通行陽氣。芍藥益陰。陽虛者非所宜。故去之。陽氣已虛。若更加之微寒。則必當溫劑以散之。故加附子。太陽病。得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脉微緩者。為欲愈也。脉微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出。身必痒。宜桂枝麻黃各半湯。

【十】傷寒八九日。則邪傳再經。又遍三陽。欲傳三陰之時也。傳經次第。則三日傳遍三陽。至四日。陽去入陰。不入陰者。為欲解。其傳陰經。第六日傳遍三陰。為傳經盡而當解。其不解。傳為再經者。至九日。又遍三陽。陽不傳陰則解。如瘧發作有時也。寒多者。為病進。熱多者。為病退。經曰。厥少熱多。其病為愈。寒多熱少。陽氣退。故為進也。今雖發熱惡寒。而熱多寒少。為陽氣進。而邪氣少也。裏不和者。嘔而利。今不嘔。清便自調者。裏和也。寒熱間日發者。邪氣深也。日一發者。邪氣復常也。日再發者。邪氣淺也。日二三發者。邪氣微也。內經曰。大則邪至。小則平。言邪甚則脉大。邪少則脉微。今日數多而脉微緩者。是邪氣微緩也。故云欲愈。脉微而惡寒者。表裏俱虛也。陽表也。陰裏也。脉微為裏虛。惡寒為表虛。以表裏俱虛。故不可更發汗。更下。更吐也。陰陽俱虛。則面色青白。反有熱色者。表未解也。熱色為赤色也。得小汗則和。不得汗。則不得邪氣外散皮膚。而為痒也。與桂枝麻黃各半湯。小發其汗。以除表邪。太

陽病。初服桂枝湯。反煩。不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯。則愈。[十一]煩者。熱也。服桂枝湯後。當汗出而身涼和。若反煩不解者。風甚而未能散也。先刺風池風府。以通太陽之經。而泄風氣。却與桂枝湯解散。則愈。服桂枝湯。大汗出。脉洪大者。與桂枝湯如前法。若形如瘧。日再發者。汗出必解。宜桂枝二麻黃一湯。[十二]經曰。如服一劑病證猶在者。故當復作本湯服之。服桂枝湯。汗出後。脉洪大者。病猶在也。若形如瘧。日再發者。邪氣客於榮衛之間也。與桂枝二麻黃一湯。解散榮衛之邪。服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人參湯主之。[十三]大汗出。脉洪大而不渴。邪氣猶在表也。可更與桂枝湯。若大汗出。脉洪大而煩渴不解者。表裏有熱。不可更與桂枝湯。可與白虎加人參湯。生津止渴。和表散熱。太陽病。發熱。惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此無陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯。[十四]

桂枝二越婢一湯方

桂枝去皮　芍藥　甘草各拾捌銖　生薑壹兩叁錢切　大棗肆枚擘　麻黃拾捌銖去節　石膏貳拾肆銖碎綿裹

胃為十二經之主。脾治水穀。為卑藏。若婢。內經曰。脾主為胃行其津液。是湯所以謂之越婢者。以發越脾氣。通行津液。外臺方。一名越脾湯。即此義也。

右柒味。㕮咀。以伍升水。煑麻黃壹貳沸。去上沫。內諸藥。煑取貳升。去滓。溫服壹升。本方當裁為

越婢湯。桂枝湯。合飲壹升。今合為一方。桂枝二。

越婢一。

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿。微痛。小便不利者。桂枝去桂。加茯苓白朮湯主之。

【五】頭項強痛。翕翕發熱。雖經汗下。為邪氣仍在表也。心下滿。微痛。小便利者。則欲成結胸。今外證未罷。無汗。小便不利。則心下滿。微痛。為停飲也。與桂枝湯以解外。加茯苓白朮。利小便。行留飲。

傷寒脉浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯。欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩燥吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。讝語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒鍼者。四逆湯主之。

【六】脉浮自汗出。小便數。而惡寒者。陽氣不足也。心煩脚攣急者。陰氣不足也。陰陽血氣俱虛。則不可發汗。若與桂枝湯攻表。則又損陽氣。故為誤也。得之便厥。咽中乾。煩燥吐逆者。先作甘草乾薑湯。復其陽氣。得厥愈。足溫。乃與芍藥甘草湯。益其陰血。則脚脛得伸。陰陽雖復。其有胃燥讝語。少與調胃承氣湯。微溏以和其胃。重發汗為亡陽。加燒針。則損陰。內經曰。榮氣微者。加燒針。則血不流行。重發汗。復燒針。是陰陽之氣太虛。四逆湯以復陰陽之氣。

甘草乾薑湯方

甘草 肆兩炙 味甘平　乾薑 貳兩炮 味辛熱

內經曰。辛甘發散為陽。甘草乾薑相合。以復陽氣。

右㕮咀。以水叁升。煑取壹升伍合。去滓。分溫再

服。

芍藥甘草湯方

白芍藥肆兩苦酸微寒 甘草肆兩炙甘平

芍藥白補而赤瀉。白收而赤散也。酸以收之。甘以緩之。酸甘相合。用補陰血。

右貳味。㕮咀。以水叁升。煮取壹升半。去滓。分温再服之。

調胃承氣湯方

大黃肆兩去皮清酒浸 甘草貳兩炙味甘平 芒消半斤味鹹

苦大寒

內經曰。熱淫於內。治以鹹寒。佐以苦甘。芒消鹹寒。以除熱。大黃苦寒。以湯實。甘草甘平。助二物。

推陳而緩中。

右叁味。㕮咀。以水叁升。煮取壹升。去滓。內芒消。更上火。微煮令沸。少少温服之。

四逆湯方

甘草貳兩炙味甘平 乾薑壹兩半味辛熱 附子壹枚生用去皮破割片辛大熱

內經曰。寒淫於內。治以甘熱。又曰。寒淫所勝。平以辛熱。甘草薑附相合。為甘辛大熱之劑。乃可發散陰陽之氣。

右叁味。㕮咀。以水叁升。煮取壹升貳合。去滓。分温再服。強人可大附子壹枚。乾薑叁兩。

問曰。證象陽旦。按法治之而增劇。厥逆咽中乾。兩脛拘急而讝語。師曰。言夜半手足當溫。兩脚當伸。後如師言。何以知此。荅曰。寸口脉浮而大。浮則為風。大則為虛。風則生微熱。虛則兩脛攣。病證象桂枝。因加附子參其間。增桂令汗出。附子溫經。亡陽故也。厥逆咽中乾。煩燥。陽明內結。讝語煩亂。更飲甘草乾薑湯。夜半陽氣還。兩足當熱。脛尚微拘急。重與芍藥甘草湯。爾乃脛伸。以承氣湯。微溏則止。其讝語。故知病可愈。陽旦。桂枝湯別名也。前證脉微。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。脚攣急。與桂枝湯證相似。是證象陽旦也。與桂枝湯而增劇。得寸口脉浮大。浮為風邪。大為血虛。即與桂枝湯加附子溫經以補虛。增桂令汗出以祛風。其有治之之逆。而增厥者。與甘草乾薑湯。陽復而足溫。更與芍藥甘草湯。陰和而脛伸。表邪已解。陰陽已復。而有陽明內結。讝語煩亂。少與調胃承氣湯。微溏泄。以和其胃。則陰陽之氣皆和。內外之邪悉去。故知病可愈。

釋音

清涼上七正切 疫音役 忿孚吻切 疹之忍切癮疹也 飧泄上音孫下音薛 顖音信 痎音皆瘧也 顑頞上音拙面骨也下音遏鼻也 逮音代及也 砭悲廉切石針也 焫如劣切 中病上音衆 之長音掌 嗌音益咽也 沓徒合切 俱見音現 嚏丁計切 瘳音抽病愈也 痼音固 迄許訖切至也 狹懵上戶甲切下莫孔切 殞羽粉切 晬祖對切周歲也 痏羽軌切 膺於陵切胷也 髃音偶又音虞肩前也 痓充至切惡也一曰風病 暍音謁傷暑也 痙巨井切強

急也几几音殊短羽鳥飛几几也攣力全切內藥上音納晡市胡切

洒蘇狠切驚貌惡寒上烏路切怫音佛鼾音汗卧息也瘙音隆淅恩歷

切熇許酷切熱也歠昌悅切槷直立切汗出貌脛胡定切

註解傷寒論卷第三　仲景全書第十三

漢　長沙守　張仲景　述

晉　太醫令　王叔和　撰次

宋　聊攝人　成無已　註解

明　虞山人　趙開美　校句

辨太陽病脉證并治中第六

太陽病。項背強。几几無汗。惡風。葛根湯主之。[一]太陽病。項背強。几几汗出惡風者。中風表虛也。項背強。几几無汗惡風者。中風表實也。表虛宜解肌。表實宜發汗。是以葛根湯發之也。

葛根湯方

葛根肆兩 麻黃叁兩去節 桂貳兩去皮 芍藥貳兩 甘草貳兩炙 生薑叁兩切 大棗拾貳枚擘

本草云。輕可去實。麻黃葛根之屬是也。此以中風表實。故加二物於桂枝湯中也。

右七味。�咀。以水壹斗。先煮麻黃葛根減貳升。去沫。內諸藥。煮取叁升。去滓。溫服壹升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息及禁忌。

太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。(三)傷寒

有合病。有併病。本太陽病。不解。併于陽明者。謂之併病。二經俱受邪。相合病者。謂之合病。合病者。邪氣甚也。太陽陽明合病者。與太陽少陽合病。陽明少陽合病。皆言必自下利。蓋以邪氣併於陰。則陰實而陽虛。邪氣併於陽。則陽實而陰虛。寒邪氣甚。客于二陽。二陽方外實而不主裏。則裏氣虛。故必下利。與葛根湯以散其邪。加半夏以下逆氣。

葛根加半夏湯方

葛根肆兩 麻黃叁兩去節湯泡去黃汁焙乾秤 生薑叁兩切 甘草貳兩炙 芍藥貳兩 桂枝貳兩去皮 大棗拾貳枚擘 半夏半升洗

右捌味。以水壹斗。先煮葛根麻黃。減貳升。去白沫。內諸藥。煮取叁升。去滓。溫服壹升。覆取微似汗。

太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃連黃芩湯主之。四 經曰不宜下而便攻之。內虛熱入。協熱遂利。桂枝證者。邪在表也。而反下之。虛其腸胃。為熱所乘。遂利不止。邪在表。則見陽脉。邪在裏。則見陰脉。下利脉微遲。邪在裏也。促為陽盛。雖下利而脉促者。知表未解也。病有汗出而喘者。為自汗出而喘也。即邪氣外甚所致。喘而汗出者。為因喘而汗出也。即裏熱氣逆所致。與葛根黃芩黃連湯散表邪。除裏熱。

葛根黃芩黃連湯方

葛根 半斤　甘草 貳兩炙 味甘平　黃芩 貳兩 味苦寒

黃連 叁兩 味苦寒

內經曰。甘發散為陽。表未解者。散以葛根甘草之甘。苦以堅裏。氣弱者。堅以黃芩黃連。

右肆味。以水捌升。先煑葛根減貳升。內諸藥。煑取貳升。去滓。分溫再服。

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。五 此太陽傷寒也。寒則傷榮。頭痛身疼腰痛。以至牽連骨節疼痛者。太陽經榮血不利也。內經曰。風寒客于人。使人毫毛畢直。皮膚閉而為熱者。寒在表也。風并於衛。衛實而榮虛者。自汗出而惡風寒也。寒并于榮。榮實而衛虛者。無汗而惡風也。以榮強衛弱。故氣逆而喘。與麻黃湯以發其汗。

麻黃湯方

麻黃 叁兩 味甘溫去節　桂枝 貳兩去皮 味辛熱

甘草 壹兩炙 味甘平　杏仁 柒拾箇湯去皮尖 味辛溫

內經曰寒淫于內治以甘熱佐以苦辛麻黃甘草開肌發汗桂枝杏仁散寒下氣

右肆味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取貳升半去滓溫服捌合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主之〔六〕陽受氣于胸中喘而胸滿者陽氣不宣發壅而逆也心下滿腹滿皆為實當下之此以為胸滿非裏實故不可下雖有陽明然與太陽合病為肩表是與麻黃湯發汗

太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黃湯〔七〕十日以去向前之時也脉浮細而嗜卧者表邪已罷也病雖已利解之若脉但浮而不細者則邪氣但在表也與麻黃湯發散之

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之〔八〕若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也此中風見寒脉也浮則為風風則傷衛緊則為寒寒則傷榮榮衛俱病故發熱惡寒身疼痛也風并于衛者為榮弱衛強寒并于榮者為榮強衛弱今風寒兩傷則榮衛俱實故不汗出而煩躁也與大青龍湯發汗以除榮衛風寒若脉微弱汗出惡風者為榮衛俱虛反服青龍湯則必亡陽故生厥逆筋惕肉瞤此治之逆也

大青龍湯方

麻黃陸兩去節 桂枝貳兩去皮 甘草貳兩炙
杏仁肆拾箇去皮尖 生薑叁兩切

味溫甘 味辛熱 味甘平 味苦甘溫 味辛溫

大棗拾貳枚擘　石膏如雞子大碎味甘微寒

辛甘均為發散然風宜辛散寒宜甘發汗辛甘相合乃能發散榮衛之風寒麻黃甘草石膏杏仁以發散榮中之寒桂枝生薑棗以解除衛中之風

右柒味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升取微似汗汗出多者溫粉粉之壹服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之九

此傷寒見風脉也傷寒者身疼重此以風勝故身不疼中風者身輕時不久厥吐利無少陰裏證者為風寒外甚也與大青龍湯以發散表中風

寒傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之十

傷寒表不解心下有水飲則水寒相搏肺冷則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行此之謂也與小青龍湯發汗散水水氣內潰則所傳不一故有或為之證隨證增損以解化之

小青龍湯方

麻黃叁兩去節　芍藥叁兩味酸微寒　五味子半升味酸溫

味甘溫　乾薑叁兩味辛熱　甘草叁兩炙味甘平　細辛叁兩味辛溫

桂枝叁兩去皮味辛熱　半夏半升湯洗味辛微溫

寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝甘草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則腎氣惙

內經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。乾薑細辛半夏之辛。以行水氣而潤腎。欲逆而喘。則肺氣逆。內經曰。肺欲收。急食酸以收之。芍藥五味子之酸。以收逆氣而安肺。

右捌味。以水壹斗。先煮麻黃。減貳升。去上沫。內諸藥。煮取叁升。去滓。溫服壹升。

加減法 若微利者。去麻黃。加莞花如雞子。熬令赤色。下利者不可攻其表。汗出必脹滿。麻黃發其陽。水漬入胃。必作利。莞花下十二水。水去利則止。若渴者。去半夏。加栝蔞根三兩。辛燥而苦潤。半夏辛而燥津液。非渴者。肝宜故去之。栝蔞味苦而生津液。故加之。若噎者。去麻黃。加附子一枚炮。經曰。水得寒氣。冷必相搏。其人即噎。加附子溫散水寒。病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。去麻黃。惡發汗。若小便不利。少腹滿。去麻黃。加茯苓四兩。水畜下焦。不行。為小便不利。少腹滿。麻黃發津液於外。非所宜也。以茯苓泄畜水于下。加羽當也。

若喘者。去麻黃。加杏仁半升。去皮尖。金匱要畧曰。其人形腫。汗不內。麻黃內杏仁。以麻黃發其陽故也。喘呼形腫。水氣標本之疾。

傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已渴者。此寒去欲解也。小青龍湯主之。欬而微喘者。水寒射肺也。發熱不渴者。表證未罷也。與小青龍湯發表散水。服湯已。渴者。裏氣溫。水氣散為欲解也。太陽病外證未解。脉浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。脉浮弱者。榮弱衛強也。太陽病下之微喘者。表未解故也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。下後大喘。則為裏氣太虛。和氣傳裏。正氣將脫也。下後微喘。則為裏氣上逆。邪不能傳裏。猶在表也。與桂枝湯以解外。加厚朴杏仁以下逆氣。太陽病外證未解者。不可下也。下之為逆。欲解外者。宜

桂枝湯主之。[十四]經曰。本發汗而復下之。為逆也。若先發汗。治不為逆。太陽病。先發汗不解。而復下之。脉浮者。不愈。浮為在外。而反下之。故令不愈。今脉浮。故知在外。當須解外則愈。宜桂枝湯主之。[十五]經曰。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不為逆。則其類矣。太陽病脉浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服藥已。微除。其人發煩。目瞑劇者。必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。[十六]脉浮緊。無汗發熱。身疼痛。太陽傷寒也。雖至八九日而表證仍在。亦當發其汗。既服溫暖發散湯藥。雖未作大汗。亦微除也。煩者。身熱也。邪氣下為汗解。鬱而變熱。烝于經絡。發于肌表。故生熱煩。肝受血而能視。始者氣傷榮。寒既變熱。則血為熱搏。肝氣不治。故目瞑也。劇者。熱甚于經。迫血妄行。而為衄。得衄。則熱隨血散而解。陽氣重者。熱氣重也。與麻黃湯。以解前太陽傷寒之邪也。太陽病脉浮緊。發熱。身無汗。自衄者愈。風寒在經。不得汗解。鬱而變熱。衄則熱隨血散。故云自衄者愈。二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之為逆。如此。可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之熏之。若發汗不徹。不足言。陽氣怫鬱。不得越。當汗不汗。其人躁煩。不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得。其人短氣。但坐以汗出不徹故也。更發汗則愈。何以知汗出不徹。以

脈濇故知也。太陽病未解。轉併入陽明。而太陽證未罷者。名曰併病。續自微汗出不惡寒者。為太陽證罷。陽明證具也。法當下之。若太陽證未罷者。為表未解。則不可下。當小發其汗。先解表也。陽明之經循面色緣緣正赤者。陽氣怫鬱在表也。當解之熏之。以取其汗。若發汗不徹者。不足言。陽氣怫鬱不得越。故躁煩也。邪循經行。則痛無常處。或在腹中。或在四肢。按之不可得。而短氣。但責以汗出不徹。更發汗則愈。內經曰。逆而從之。從而逆之。是謂亂甚于經

能與榮氣和諧亦不能衛護皮腠是以常自汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛則愈。病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之【二十】藏無他病裏和也衛氣不和表病也外臺云裏和表病汗之則愈所謂先其時者先其發熱汗出之時發汗則愈。傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之【二十一】傷寒脉浮緊邪在表也當與麻黃湯發汗若不發汗則邪無從出擁甚于經迫血妄行因致衄也。傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯【二十二】不大便六七日頭痛有熱者故宜當下若小便清者知裏無熱則不可下經曰小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也況此不大便六七日小便清者不可責邪尤裏足

仍在表也與桂枝湯以解外若頭疼不已為表不罷鬱甚于經迫血妄行上為衄也。傷寒發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯主之【二十三】煩者熱也發汗身涼為已解至半日許身復熱脉浮數者邪不盡也可更發汗與桂枝湯。凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈重亡津液則不能作汗必待陰陽自和乃自愈矣。大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈因亡津液而小便不利者不可以藥利之俟津液足小便利必自愈也。下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外俱虛故也發汗則表虛而亡陽下之則裏虛而亡血振寒者陽氣微也脉微細者陰血弱。下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無

表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之【五四】下之虛其裏汗之虛其表既下又汗則表裏俱虛陽至於晝陽欲復虛不勝邪正邪交爭故晝日煩燥不得眠夜陰為主陽虛不能與之爭是夜則安靜不嘔不渴者裏無熱也身無大熱者表無熱也又無表證而脉沉微知陽氣大虛陰寒氣勝與乾薑附子湯退陰復陽

乾薑附子湯方

乾薑壹兩味辛熱　附子壹枚生用去皮破捌片味辛熱

內經曰寒淫所勝平以辛熱虛寒太甚是以辛熱劑勝之也

右貳味以水叁升煑取壹升去滓頓服

發汗後身疼痛脉沉遲者桂枝加芍藥生姜各壹兩人參叁兩新加湯主之【五五】汗後身疼痛邪氣未盡也脉沉遲榮血不足也經曰其脉沉者榮氣微也又曰遲者榮氣不足血少故也與桂枝湯以解未盡之邪加芍藥生姜人參以益不足之血

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之【五六】發汗後喘當作桂枝加厚朴杏仁湯汗出則喘愈今汗出而喘為邪氣擁甚桂枝湯不能發散故不可更行桂枝湯汗出而喘有大熱者內熱氣甚也無大熱者表邪必甚也與麻黃杏仁甘草石膏湯以散其邪

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃肆兩去節味甘溫　杏仁伍拾箇去皮尖味甘溫

甘草貳兩炙味甘平　石膏半觔碎綿裹味甘寒

內經曰肝苦急急食甘以緩之風氣通於肝風邪外甚故以純甘之劑發之

右肆味。以水柒升。先煮麻黃減貳升。去上沫。內諸藥。煮取貳升。去滓。溫服壹升。本云黃耳柸。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸欲得按者。桂枝甘草湯主之。〔夫〕發汗過多。亡陽也。陽氣受于胸中。胸中陽氣不足。故病叉手自冒心。心下悸欲得按者。與桂枝甘草湯。以調不足之氣。

桂枝甘草湯方

桂枝肆兩去皮 辛熱 味甘平 甘草貳兩炙 味甘平

桂枝之辛。走肺而益陽。甘草之甘。入脾而緩中。

右貳味。以水參升。煮取壹升。去滓。頓服。發汗後。其人臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。〔夫〕汗者。心之液。發汗後。臍下悸者。心氣虛而腎氣發動也。腎之積名曰奔豚。發則從少腹上至心下。為腎氣逆欲上凌心。今臍下悸為腎氣發動。故云欲作奔豚。與茯苓桂枝甘草大棗湯。以降腎氣。

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤 味甘平 甘草貳兩炙 味甘平 大棗拾伍枚 擘 味甘平 桂枝肆兩去皮

茯苓以伐腎和桂枝能泄奔豚。甘草大棗之甘。滋助脾土。以平腎氣。煎用甘爛水者。揚之無力。取不助腎氣也。

右肆味。以甘爛水壹斗。先煮茯苓減貳升。內諸藥。煮取參升。去滓。溫服壹升。日參服。作甘爛水

法。取水貳斗。置大盆內。以杓揚之。水上有珠子伍陸千顆。相逐取用之。

發汗後腹脹滿者。厚朴生薑甘草半夏人參湯主之。元吐後腹脹。與下後腹滿。皆為實。言邪氣乘虛入裏為實。發汗後。外已解也。腹脹滿。知非裏實。由脾胃津液不足。氣滯不通。壅而為滿。與此湯和脾胃而降氣。

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴半斤去皮炙味苦溫　生薑半斤切味辛溫　半夏半升洗味辛平　人參壹兩味溫　甘草貳兩炙味甘平

內經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。用苦泄之。厚朴之苦。以泄腹滿。人參甘草之甘。以益脾胃。半夏生薑之辛。以散滿氣。

右伍味。以水壹斗。煮取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。

傷寒若吐。若下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脉沉緊。發汗則動經。身為振振搖者。茯苓桂枝白朮甘草湯主之。亡吐下後。裏虛。氣上逆者。心下逆滿。氣上衝胸。表虛。陽不足。起則頭眩。脉浮緊為邪在表。當發汗。脉沉緊為邪在裏。則不可發汗。發汗則外動經絡。損傷陽氣。陽氣外虛。則不能止持諸脉。身為振振搖也。與此湯以和經益陽。

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓肆兩味甘平　桂枝叁兩去皮味辛熱　白朮貳兩味苦甘溫　甘草貳兩炙味甘平

陽不足者補之以甘。茯苓白朮生津液而益陽也。桂氣逆者散之以辛。桂枝甘草行陽散氣。

右肆味。以水陸升。煮取叁升。去滓。分温叁服。

發汗。病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。

發汗病解則不惡寒。發汗病不解。表實者亦不惡寒。今發汗病且不解。又反惡寒者。榮衛俱虛也。汗出則榮虛。惡寒則衛虛。與芍藥甘草附子湯以補榮衛。

芍藥甘草附子湯方

芍藥叁兩味 酸微寒 甘草叁兩炙 味甘平 附子壹枚炮去皮破 捌片味辛熱

芍藥之酸。收斂津液而益榮。附子之辛熱。固陽氣而補胃。甘草之甘。調和辛酸而安正氣。

右叁味。以水伍升。煮取壹升伍合。去滓。分温服。

疑非仲景意

發汗若下之。病仍不解。煩躁者。茯苓四逆湯主之。

發汗若下。病宜解也。若病仍不解。則發汗外陽氣。下之內虛陰氣。陰陽俱虛。邪獨不解。故煩躁。與茯苓四逆湯以復陰陽之氣。

茯苓四逆湯方

茯苓陸兩味 甘平 人參壹兩味 甘温 附子壹枚生用去皮 破捌片 味辛熱 甘草貳兩炙 味甘平 乾薑壹兩半 味辛熱

四逆湯以補陽。加茯苓人參以益陰。

右伍味。以水伍升。煮取叁升。去滓。温服柒合。日叁服。

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯（圭）汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡寒但熱者裏實也經曰汗出不惡寒者此表解裏未和與調胃承氣湯和胃氣太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之（圭）發汗已解胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與之胃氣得潤則愈若脉浮者表未解也飲水多而小便少者謂之消渴裏熱甚實也微熱消渴者熱未成實上焦燥也與五苓散生津液和表裏

五苓散方

猪苓拾捌銖味甘平去皮　澤瀉壹兩陸銖味甘平　白朮拾捌銖味甘平　桂半兩去皮味辛熱　茯苓拾捌銖味甘平

淡者一也口入一而為甘甘甚而反淡甘緩而淡滲猪苓白朮茯苓三味之甘潤虛燥而利津液鹹味下泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水辛甘發散為陽桂枝之辛甘以和肌表

右伍味為末以白飲和服方寸匕日參服多飲暖水汗出愈

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之（圭）發汗已脉浮數者表邪未盡也煩渴亡津液胃燥也與五苓散和表潤燥傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之（圭）傷寒汗出而渴者亡津液胃燥邪氣漸傳裏也五苓散以和表裏若汗出不渴者邪氣不傳裏但在表而表虛也與茯苓甘草湯和表合衛

茯苓甘草湯方

茯苓貳兩味甘平　桂枝貳兩去皮味辛熱　生薑叁兩切味辛溫　甘草壹兩炙味甘平

茯苓甘草之甘。益津而和衛。桂枝生薑之辛。助陽氣而解表。

右肆味。以水肆升。去滓。分溫叁服。

中風發熱。六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。【三七】中風發熱至六七日則當解。若不解。煩者。邪在表也。渴欲飲水。邪傳裏也。裏熱甚。則能飲水。水入則不吐。裏熱少。則不能消水。停積不散。飲而吐水也。以其因水而吐。故名水逆。與五苓散。和表裏。散停飲。未持脉時。病人手叉自冒心。師因教試令欬而不欬者。必兩耳聾無聞也。所以然者。以重發汗。虛。故如此。發汗多亡陽。胷中陽氣不足者。病人手叉自冒心。師見外證。知陽氣不足也。又試令欬而不即欬者。耳聾也。知陽氣虛明矣。耳聾者。陽氣虛。精氣不得上通於耳故也。發汗後。飲水多。必喘。以水灌之。亦喘。喘。肺疾。飲水多喘者。飲冷傷肺也。以冷水灌洗而喘者。形寒傷肺也。發汗後。水藥不得入口。為逆。若更發汗。必吐下不止。發汗後。水藥不得入口。為之吐逆。發汗亡陽。胃中虛冷也。若更發汗。則愈損陽氣。胃氣太虛。故吐下不止。發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯主之。【三八】發汗吐下後。邪熱乘虛。客於胷中。謂之虛煩者。熱也。胷中煩熱。鬱悶而不得發散者。是也。熱氣伏於裏者。則喜睡。今熱氣浮於上。煩擾陽氣。故不得眠。心惡熱。熱甚則必神昏。是以劇者。反覆顛倒而不安。心中懊憹而憒悶。懊憹

者俗謂鵝突是也。內經曰。其高者因而越之。與梔子豉湯以吐胃中之邪。

梔子豉湯方

梔子拾肆枚擘　香豉肆合綿裹　味苦寒

酸苦湧泄為陰。苦以湧吐。寒以勝熱。梔子豉湯相合。吐劑宜矣。

右貳味。以水肆升。先煮梔子。得貳升半。內豉煮取壹升半。去滓。分為貳服。溫進壹服。得吐者。止後服。

若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。

少氣者。熱傷氣也。加甘草以益氣。嘔者。熱煩而氣逆也。加生薑以散氣。少氣則氣為熱搏。散而不收者。甘以補之可也。嘔則氣為熱搏。逆而不散者。辛以散之可也。發汗若下之而煩熱。胸中窒者。梔子豉湯主之。亮

陽受氣於胸中。發汗若下。使陽氣不足。邪熱客於胸中。結而不散。故煩熱而胸中窒塞。與梔子豉湯以吐胸中之邪。

傷寒五六日。大下之後。身熱不解。心中結痛者。未欲解也。梔子豉湯主之。罕

傷寒五六日。邪氣在裏之時。若大下後身熱去。心胸空者。為欲解。若大下後身熱去。而心結痛者。結胸也。身熱不去。心中結痛者。虛煩也。結胸為熱結胸中。為實。是熱氣已收。欲於內。則外身熱去。虛煩為熱客胸中。未結為熱。散漫為煩。是以身熱不去。六七日為欲解之時。以熱為虛煩。故云未欲解也。與梔子豉湯以吐除之。傷寒下後心煩腹滿。臥起不安者。梔子厚朴湯主之。罕

下後滿而不心煩。即邪氣入裏為裏實。但心煩而不腹滿。即邪氣在胸中。為虛煩。既煩且滿。則邪氣壅於胸腹間也。滿則不能坐。煩則不能臥。故臥起不安。與梔子厚朴湯。吐煩泄滿。

梔子厚朴湯方

梔子 拾肆枚擘 味苦寒 厚朴 肆兩薑炙 味苦溫 枳實 肆枚 水浸去穰 炒味苦寒

酸苦湧泄。梔子之苦。以湧虛煩。厚朴枳實之苦。以泄腹滿。

已上叁味。以水叁升半。煮取壹升半。去滓。分貳服。溫進壹服。得吐者止後服。

傷寒醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯主之。丸藥不能除熱。但損正氣。邪氣乘虛。留於胸中。而未入深者。則身熱不去。而微煩。與梔子乾薑湯。吐煩益正氣。

梔子乾薑湯方

梔子 拾肆枚擘 味苦寒 乾薑 貳兩切 味辛熱

苦以湧之。梔子之苦以吐煩。辛以潤之。乾薑之辛以益氣。

右貳味。以水叁升半。煮取壹升半。去滓。分貳服。溫進壹服。得吐者止後服。

凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與服之。病人舊微溏者。裏虛而寒在下也。雖煩。則非極熱。故不可與梔子湯。內經曰。先泄而後生他病者。治其本。必且調之。後乃治其他病。太陽病。發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。眞武湯主之。發汗不解。仍發熱。邪氣未解也。心下悸。頭眩。身瞤動。振振。欲擗地者。汗出亡陽也。裏虛為悸。上虛為眩。經虛為身瞤振振搖。與眞武湯主之。溫經復陽。

咽喉乾燥者。不可發汗。津液

不足也。淋家不可發汗。發汗必便血。膀胱裏熱則淋。反以湯藥發汗。亡津液。增益客熱。膀胱虛燥。必小便血。瘡家雖身疼痛。不可發汗。發汗則痓。表虛裏熱則生瘡。瘡家身疼。如傷寒不可發汗。發汗則表氣愈虛。熱勢愈甚。生風。故變痓也。衄家不可發汗。汗出必額上陷。脈急緊。直視不能眴。不得眠。衄者。上焦亡血也。若發汗。則上焦津液枯竭。經絡乾澁。故額上陷。脈急緊。諸脈者皆屬於目。筋脈緊急。則牽引其目。故直視不能眴。眴瞬合目也。針經曰。陰氣虛。則目不瞑。亡血為陰虛。是以不得眠也。亡血家不可發汗。發汗則寒慄而振。針經曰。奪血者無汗。奪汗者無血。亡血發汗。則陰陽俱虛。故寒慄而振搖。汗家重發汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。與禹餘粮丸。調服者。汗心之液。汗家重發汗。則心虛。恍惚心亂。奪汗則無水。故小便已陰中疼。病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。病人有寒。則當温散。反發汗損陽。氣胃中冷。必吐蚘也。

本發汗而復下之。此為逆也。若先發汗。治不為逆。本先下之而反汗之為逆。若先下之。治不為逆。病在表者。汗之為宜。下之為逆。病在裏者。下之為宜。汗之為逆。經曰。陽盛陰虛。汗之則死。下之則愈。陽虛陰盛。汗之則愈。下之則死。傷寒醫下之。續得下利清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。[罨]傷寒下之。續得下利清穀不止。身疼痛者。急當救裏。裏者以裏氣不足。必先救之。急與四逆湯。得清便自調。知裏氣已和。然後急與桂枝湯。以救表。身疼者。表邪也。內經曰。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。此以寒為本也。病發熱。頭痛。脈反沉。若不差。身體疼痛。當救其

裏宜四逆湯。發熱頭痛。表病也。脉反沉者。裏脉也。經曰。表有病者。脉當浮大。今脉反沉遲。故知愈也。見表病而得裏脉。則當差。若不差。為內虛寒甚也。與四逆湯。救其裏。太陽病先下之而不愈。因復發汗。以此表裏俱虛。其人因致冒。冒家汗出自愈。所以然者。汗出表和故也。裏未和。然後復下之。冒者。瞤也。下之則裏虛而亡血。汗之則表虛而亡陽。表裏俱虛。寒氣怫鬱。其人因致冒。金匱要畧曰。亡血復汗寒多。故令瞤冒。汗出。則怫鬱之邪得解。則冒愈。金匱要畧曰。冒家欲解。必大汗出。汗出。表和而裏未和者。然後復下之。太陽病。未解。脉陰陽俱停。必先振慄。汗出而解。但陽脉微者。先汗出而解。但陰脉微者。下之而解。若欲下之。宜調胃承氣湯主之。冥 陰陽脉俱停。無偏勝者。陰陽氣和也。經曰。寸口。關上。尺中。三處大小浮沉遲數同等。此脉陰陽為和平。雖則當愈。今陰陽既和。必先振慄。汗出而解。但陽脉微者。陽不足而陰有餘也。經曰。陽虛陰盛。汗之則愈。陰脉微者。陰不足而陽有餘也。經曰。陽盛陰虛。下之則愈。太陽病。發熱汗出者。此為榮弱衛強。故使汗出。欲救邪風者。宜桂枝湯。冥 太陽中風。風併於衛。則衛實而榮虛。榮者。陰也。衛者。陽也。發熱汗出。陰弱陽強也。內經曰。陰虛者。陽必湊之。故少氣時熱而汗出。與桂枝湯。解散風邪。調和榮衛。傷寒五六日中風。往來寒熱。胷脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胷中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞕。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。與小柴胡湯主之。冥 病有在表者。有在裏者。有在表裏之間者。此邪氣在表裏之間。謂之半表半裏證。五六日。邪氣自表傳裏之時。中風者。或傷寒

至五六日也。五函曰。中風五六日。傷寒往來寒熱即是或中風或傷寒。非是傷寒再中風。中風復傷寒也。經曰。傷寒中風。有柴胡證。但見一證便是。不必悉具者。正是謂或中風或傷寒也。邪在表。則寒。邪在裏。則熱。今邪在半表半裏之間。未有定處。是以寒熱往來也。邪在表。則心腹不滿。邪在裏。則心腹脹滿。今止言胷脇苦滿。知邪氣在表裏之間。未至於心腹滿也。默默靜也。邪在表。則呻吟不安。邪在裏。則煩悶亂。內經曰。陽入之陰。則靜默默者。邪方自表之裏。在表裏之間也。邪在表。則能食。邪在裏。則不能食。不欲食者。邪在表裏之間。未至於必不能食也。邪在表。則不煩。不嘔。邪在裏。則煩滿而嘔。煩喜嘔者。邪在表方傳裏也。邪初入裏。未有定處。則所傳不一。故有或為之證。有柴胡證。但見一證便是。即是此或為之證。

小柴胡湯方

柴胡半斤味苦微寒　黃芩叁兩味苦寒　人參叁兩味甘温

甘草叁兩味甘平　半夏半斤洗味辛温　生薑叁兩切味辛温

大棗拾貳枚擘味甘温

內經曰。熱淫於內。以苦發之。柴胡黃芩之苦。以發傳邪之熱。棗不足者。以甘緩之。人參甘草之甘。以緩中和之氣。邪半入裏。則裏氣逆。半以散之。半夏以除煩嘔。邪在半表。則榮衛爭之。辛甘解之。薑棗以和榮衛。

右柒味。以水壹斗貳升。煮取陸升。去滓。再煎取叁升。温服壹升。日叁服。後加減法。

若胷中煩而不嘔。去半夏人參。加栝蔞實壹枚。胷中煩而不嘔。熱聚而氣不逆也。甘者令人中滿。方熱聚。無用人參之補。辛散逆氣。既不嘔。無用半夏之辛温熱。宜寒。療聚宜苦。栝蔞實苦寒。以泄胷中蘊熱。若渴者。去半夏加人參。

合前成肆兩半。栝蔞根肆兩。半夏燥津液。非渴者所宜。人參甘而潤。栝蔞根苦而涼。徹熱生津。二物為當。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥叁兩。去黃芩。惡寒中。加芍藥。以通壅。若脇下痞鞕。去大棗。加牡蠣肆兩。甘令人中滿。痞者去大棗之甘。鹹以耎之。痞鞕者。加牡蠣之鹹。若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓肆兩。飲而水畜不行。為悸。小便不利。內經曰。腎欲堅。急食苦以堅腎。則水益堅。故去黃芩。淡味滲泄為陽。茯苓甘淡。以泄伏水。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂叁兩。溫覆取微汗。愈。不渴者。裏和也。故去人參。外有微熱。表未解也。加桂以發汗。若欬者。去人參大棗生薑。加五味子半升。乾薑貳兩。欬者。氣逆也。甘則壅氣。故去人參大棗。內經曰。肺欲收。急食酸以收之。五味子之酸以收逆氣。肺寒則欬。散以辛熱。故易生薑以乾薑之熱也。

血弱氣盡。腠理開。邪氣因入。與正氣相搏。結於脇下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。默默不欲飲食。藏府相連。其痛必下。邪高痛下。故使嘔也。小柴胡湯主之。

【究】人之氣血。隨時盛衰。當月郭空之時。則為血弱氣盡。腠理開疎之時也。邪氣乘虛。傷人則深。針經曰。月郭空。則海水東盛。人血氣虛。衛氣去。形獨居。肌肉減。皮膚緩。腠理開。毛髮殘。膽理薄。垢落。當是時。遇賊風。則其入深者是矣。邪因正虛。自表之裏。而結於脇下。與正分爭。作往來寒熱。默默不欲飲食。此為自外之內。經絡與藏府相連。邪氣隨經。必傳於裏。故曰其痛下。痛一作病。邪在上焦。為邪高。邪漸傳裏。為痛下。裏氣與邪氣相搏。逆而上行。故使嘔也。與小柴胡湯以解半表半裏之邪。

服柴胡湯已。渴者。屬陽明也。以法治之。服小柴胡湯。表邪已而渴。裏邪傳於陽明也。以陽明治之。得病六七日。脉遲浮弱。惡

風寒手足温醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足温則邪氣在半表半裏未為實反二三下之虛其胃氣損其津液邪氣蘊於裏故不能食而脇下滿痛胃虛為熱烝之熏發於外面目及身悉黃也頸項強者表仍未解也小便難者內亡津液雖本柴胡湯證然以裏虛下焦氣溢而小便難若與柴胡湯又走津液後必下重也不因飲水而嘔者柴胡湯證若本因飲而嘔者水停心下也金匱要畧曰先渴却嘔者為水停心下此屬飲家飲水者水停而嘔食穀者物聚而噦皆非小柴胡湯所宜二者皆柴胡湯之戒不可不識也

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小柴胡湯主之 辛 身熱惡風頸項強者表未解也脇下滿而渴者裏不和也邪在表則手足通熱邪在裏則手足厥寒今手足温者知邪在表裏之間也與小柴胡湯以解表裏之邪

傷寒陽脉澁陰脉弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之 辛 脉陽澁陰弦而腹中急痛者當作裏有虛寒治之與小建中湯温中散寒若不差者非裏寒也必由邪氣自表之裏裏氣不利所致與小柴胡湯去黃芩加芍藥以除傳裏之邪

小建中湯方

桂枝叁兩去皮 味辛熱 甘草叁兩炙 味甘平 大棗拾貳枚擘 芍藥陸兩 味酸微寒 生薑貳兩切 味辛温 膠飴壹升 味甘温

建中者建脾也內經曰脾欲緩急食甘以緩之膠飴大棗甘草之甘以緩中也辛潤散也禁衛

不足潤而散之。桂枝生薑之辛以行榮衛。殿收也。泄也。正氣虛弱收而行之芍藥之酸以收正氣。

右陸味以水柒升。煮取叁升。去滓。內膠飴。更上微火消解。溫服壹升。日叁服。嘔家不可用建中湯以甜故也。

傷寒中風有柴胡證。但見一證便是。不必悉具。柴胡證是邪氣在表裏之間也。或胷中煩而不嘔。或渴或腹中痛。或脇下痞鞕。或心下悸小便不利。或不渴身有微熱。或欬。但見一證。便宜與柴胡湯治之。不必待其證候全具也。凡柴胡湯病證而下之。若柴胡證不罷者。復與柴胡湯。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。邪在半表半裏之間。為柴胡證。即未作裏實。醫便以

藥下之。若柴胡證仍在者。藥下之。不為逆。可復與柴胡湯以和解之。膏湯。邪氣還表者。外作蒸蒸而熱。先經下裏虛。邪氣欲出內。則振振然也。正氣勝陽氣生。却復發熱汗出而解也。傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。三 傷寒二三日。和氣在表。未當傳裏之時。心中悸而煩。是非邪氣搏所致。心悸者。氣虛也。煩者。血虛也。以氣血內虛。與小建中湯。先建其裏。太陽病。過經十餘日。反二三下之。後四五日。柴胡證仍在者。先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。為未解也。與大柴胡下之。則愈。三 日數過多。累經攻下。而柴胡證不罷者。亦須先與小柴胡湯。以解其表。經曰。凡柴胡湯疾證而下之。若柴胡證不罷者。復與柴胡者。是也。嘔止者。表裏和也。若嘔不止。鬱鬱微煩者。裏熱已甚。結於胃中也。與大柴胡湯。下其裏熱。則愈。

大柴胡湯方

柴胡半斤味甘平　黃芩叁兩味苦寒　芍藥叁兩味酸微寒

半夏半升洗味辛溫　生薑伍兩切味辛溫　枳實肆枚炙味苦寒

大棗拾貳枚擘甘溫

柴胡黃芩之苦。入心而折熱。枳實芍藥之酸苦。湧泄而扶陰。辛者。散也。半夏之辛。以散逆氣。辛甘。和也。薑棗之辛甘。以和榮衛。

右柒味。以水壹斗貳升。煑取陸升。去滓。再煎。溫服壹升。日叁服。壹方加大黃貳兩。若不加大黃。恐不為大柴胡湯也。

傷寒十三日不解。胷脇滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此本柴胡證。下之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者。實也。先宜小柴胡湯。以解外。後以柴胡加芒消湯主之。

【五十四】傷寒十三日再傳經盡。當解之時也。若不解。胷脇滿而嘔者。邪氣猶在表裏之間。此為柴胡湯證。若以柴胡湯下之。則更無潮熱自利。醫反以丸藥下之。虛其腸胃。邪熱乘虛入府。日晡所發潮熱。熱已而利也。潮熱雖為熱實。然胷脇之邪未已。故先與小柴胡湯。以解外。後以柴胡加芒消。以下胃熱。

傷寒十三日不解。過經。譫語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當鞕。而反下利。脉調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脉當微厥。今反和者。此為內實也。調胃承氣湯主之。

【五十五】傷寒十三日。再傳經

盡謂之過經讝語者陽明胃熱也當以諸承氣湯下之若小便利者津液漏泄大便當鞕反下利者知醫以丸藥下之也下利脈微而厥者虛寒也今脈調和則非虛寒由腸虛胃熱熇熇而利也與調胃承氣湯以下胃熱太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

桃核承氣湯方

桃仁伍拾箇去皮尖味甘平　桂枝貳兩去皮味辛熱　大黃肆兩　芒消貳兩　甘草貳兩炙

甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃仁之甘下焦畜血散以桂枝辛熱之氣寒以取之熱甚待血故加三物於調胃承氣湯中也

右伍味以水柒升煮取貳升半去滓內芒消更上火微沸下火先食溫服伍合日參服當微利

傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利讝語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

傷寒八九日邪氣已成熱而復傳陽經之時下之虛其裏而熱不除胷滿而煩者陽熱客於胷中也驚者心惡熱而神不守也小便不利者裏虛津液不行也讝語者胃熱也一身盡重不可轉側者陽氣內

行於裏。不營於表也。與柴胡湯以除胷滿而煩。加龍骨牡蠣鉛丹。收斂神氣而鎮驚。加茯苓以行津液。利小便。加大黃以逐胃熱。止讝語。加桂枝以行陽氣。而解身重。錯雜之邪。斯悉愈矣。

柴胡加龍骨牡蠣湯方

半夏貳合洗　大棗陸枚　柴胡肆兩　生薑壹兩半　人參壹兩半　龍骨壹兩半　鉛丹壹兩半　桂枝壹兩半去皮　茯苓壹兩半　大黃貳兩　牡蠣壹兩半熬

右拾壹味。以水捌升。煑取肆升。內大黃。切如碁子。更煑壹貳沸。去滓。溫服壹升。

傷寒腹滿讝語。寸口脉浮而緊。此肝乘脾也。名曰縱刺期門。【五六】腹滿讝語者。脾胃疾也。浮而緊者。肝脉也。脾病見肝脉。木行乘土也。經曰。水行乘火。木行乘土。名曰縱。此其類矣。期門者。肝之募。刺之以瀉肝經盛氣。傷寒發熱。嗇嗇惡寒。大渴欲飲水。其腹必滿。自汗出。小便利。其病欲解。此肝乘肺也。名曰橫刺期門。【五七】傷寒發熱。嗇嗇惡寒。肺病也。大渴欲飲水。肝氣勝也。玉函曰。作大渴。欲飲酢漿。是知肝氣勝也。傷寒欲飲水者愈。若不愈而腹滿者。此肝行乘肺。水不得行也。經曰。木行乘金。名橫。刺期門。以瀉肝之盛氣。肝肺氣平。水散而津液得通。外作自汗出。內為小便利而解也。太陽病二日反躁。凡熨其背而大汗出。大熱入胃。胃中水竭。躁煩。必發讝語。十餘日。振慄自下利。一本下利二字作汗者。此為欲解也。故其汗從腰已下不得汗。欲小便不得。反嘔。欲失

溲。足下惡風大便鞕。小便當數而反不數。及不多。大便已。頭卓然而痛。其人足心必熱。穀氣下流故也。太陽病二日。則邪在表。不當發躁而反躁者。熱氣行於裏也。反熨其背而發汗。大汗出。則胃中乾燥。火熱入胃。胃中燥熱。躁煩而讝語。至十餘日。振慄自下利者。火邪勢微。陰氣復生。津液得復也。故為欲解。火邪去。大汗出則愈。若從腰以下不得汗。則津液不得下通。故欲小便不得。熱氣上逆而反嘔也。欲失溲。足下惡風者。氣不得通於下而虛也。津液漏滲。令大便鞕者。小便當數。經曰。小便數者。大便必鞕也。此以火熱內燥。津液不得下通。故小便不數。及不多也。若火熱消津液和。則結鞕之便得闊。因自大便也。便已。頭卓然而痛者。先大便鞕。則陽氣不得下通。既得大便則陽氣降下。頭中陽虛。故卓然而痛。穀氣者。陽氣也。先陽氣不通於下之時。足下惡風。今陽氣得下。故足心熱也。太陽病中風以火劫發汗。邪風被火熱。血氣流溢。失其常度。兩陽相熏灼。其身發黃。陽盛則欲衄。陰虛則小便難。陰陽俱虛竭。身體則枯燥。但頭汗出。劑頸而還。腹滿微喘。口乾咽爛。或不大便。久則讝語。甚者至噦。手足躁擾。捻衣摸牀。小便利者。其人可治。風為陽邪。因火熱之氣。則邪風愈甚。迫於血氣。使血氣流溢。失其常度。風與火氣謂之兩陽。兩陽相熏灼。熱發於外。必發身黃。若熱持於經。經為陽。陽盛外熱。逼血上行。必衄。熱持於內者。為陰。陰虛內熱。必小便難。若熱消血氣。血氣少。為陰。陽俱虛。血氣虛少。不能榮於身體。為之枯燥。三陽經絡至頭。三陰至胸中而還。但頭汗出。劑頸而還者。熱氣炎上。搏陽而不搏於陰也。內經曰。諸脹腹大。皆屬於熱。腹滿微喘者。熱氣內鬱也。內經曰。火氣內發。上為口乾咽爛者。火熱上熏也。熱氣上而不下者。則大便不鞕。若熱氣下入胃。消耗津液。則大便鞕。故云或不大便。久則胃中躁熱。必發讝語。內經曰。病

深者。其聲噦。火氣大甚。正氣逆亂。則噦。內經曰。四肢者。諸陽之本也。陽盛。則四肢實。火熱大甚。故手足躁擾。捻衣摸牀。擾亂也。小便利者。為火末劇。津液未竭而猶可治也。

傷寒脉浮。醫以火迫劫之。亡陽必驚狂。起卧不安者。桂枝去芍藥。加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。

[圖]傷寒脉浮。責邪在表。醫以火劫發汗。汗大出者。亡其陽。汗者。心之液。亡陽則心氣虛。心惡熱。火邪內迫。則心神浮越。故驚狂。起卧不安。與桂枝湯。解未盡表邪。去芍藥。以芍藥益陰。非亡陽所宜也。火邪錯逆。加蜀漆之辛以散之。陽氣亡脫。加龍骨牡蠣之澁以固之。本草云。澁可去脫。龍骨牡蠣之屬是也。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方

桂枝叁兩去皮　甘草貳兩炙　生薑叁兩切　牡蠣伍兩熬味酸鹹　龍骨肆兩味甘平　大棗拾貳枚擘　蜀漆叁兩洗去腥味辛平

右為末。以水壹斗貳升。先煑蜀漆減貳升。內諸藥。煑取叁升。去滓。溫服壹升。

形作傷寒。其脉不弦緊而弱。弱者必渴。被火者必讝語。弱者發熱脉浮。解之。當汗出愈。形作傷寒。謂頭痛身熱也。脉不弦緊。則無傷寒表脉也。經曰。諸弱發熱。則脉弱為裏熱。故云弱者必渴。若被火氣。兩熱相合。傳於胃中。胃中躁煩。必發讝語。脉弱發熱者。得脉浮。為邪氣還表。當汗出而解矣。

太陽病以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必清血。名為火邪。此火邪迫血。而血下行者也。太陽病用火熏之。不得汗。則熱無從出。陰虛被火。必發躁也。六日傳經盡。至七日。再到太陽經。則熱氣當解。若不解。熱氣迫血下行。必清血。清厠也。

脉浮熱

甚反灸之此為實實以虛治因火而動必咽燥唾血此火邪迫血而血上行者也脈浮熱甚為表實醫以脈浮為虛用火灸之因火氣動血迫血上行故咽燥唾血微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也微數之脈則為熱也灸則除寒不能散熱是懷不可灸也若反灸之熱因火則甚逐為煩逆灸本以是虛而復逐熱為實熱則傷血又加火氣使血散脈中氣主呴之血主濡之氣血消散不能濡潤筋骨致骨焦筋傷血散而難復也脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也脈浮在表宜以汗解之醫以火灸取汗而不得汗邪無從出又加火氣相助則熱愈甚身半以上同天之陽身半以下同地之陰火性炎上則腰已下陰氣獨治故從腰以下必重而痺也欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解也煩熱也邪氣逐表則為煩熱汗出而解以脈浮故為邪氣表也燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各壹壯與桂枝加桂湯更加桂貳兩㊀燒針發汗則損陰血而驚動心氣因驚而虛腎氣乘寒氣而動發為奔豚金匱要畧曰病有奔豚從驚發得之腎氣欲上乘心故其氣從少腹上衝心也先灸核上以散其寒與桂枝加桂湯以泄奔豚之氣火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之㊀先火為逆復以下除之棗氣因虛又加燒針棗虛而為火熱所煩故生煩躁與桂枝甘草龍骨牡蠣湯以散火邪

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝壹兩　甘草貳兩　牡蠣貳兩　龍骨貳兩

辛甘發散。桂枝甘草之辛甘也。以發散經中火邪。從可去脫。龍骨牡蠣之澁。以收斂浮越之正氣。

右為末。以水伍升。煮取貳升半。去滓。温服捌合。日參服。

太陽傷寒者。加温針必驚也。寒則傷榮。榮氣微者。加燒針。則血留不行。驚者温針損榮血而動心氣。金匱要畧曰。血氣少者屬於心。太陽病當惡寒發熱。今自汗出。不惡寒發熱。關上脉細數者。以醫吐之過也。一二日吐之者。腹中饑。口不能食。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。以醫吐之所致也。此為小逆。惡寒發熱為太陽表病。胃汁出不惡寒發熱者。陽明證。不太陽表病。醫反吐之。傷動胃氣。表邪乘虛。傳於陽明也。以關脉細數。知醫吐之所致。病一二日為表邪尚寒而未成熱。吐之則表寒傳於胃中。胃中虛寒。故腹中飢而口不能食。病三四日。則表邪已傳成熱。吐之。則表熱乘虛入胃。胃中虛熱。故不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐也。朝食暮吐者。晨食入胃。胃虛不能熟化。即知至暮。胃氣行棗。與邪氣相搏。則胃氣反逆。而以胃氣尚在。故止云小逆。太陽病吐之。但太陽病當惡寒。今反不惡寒。不欲近衣。此為吐之內煩也。太陽表病。醫反吐之。傷於胃氣。邪熱乘虛入胃。胃為邪熱內煩。故不惡寒。不欲近衣也。病人脉數。數為熱。當消穀引食。而反

吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脉乃數也數為客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也陽受氣於胸中發汗外虛陽氣是令陽氣微膈氣虛也數為熱本熱則令消穀客熱則不能消穀因發汗外損陽氣致胃中虛冷故吐也太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯㊀若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也下溫溫欲吐鬱鬱微煩胸中痛當責邪熱客於胸中大便反溏腹微滿則邪熱已下於胃也日數雖多若不經吐下止是傳邪亦未可下當與柴胡湯以除上中二焦之邪若曾吐下傷損胃氣胃虛則邪乘虛入胃為實非柴胡湯所能去與調胃承氣湯下胃熱以嘔知胃氣先曾傷動也太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之㊁太陽經也膀胱府也此太陽隨經入府者也六七日邪氣傳裏之時脉微而沉邪氣在裏之脉也表證仍在者則邪氣猶淺當結於胸中若不結於胸中其人發狂者熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞕滿小便不利者為無血也小便自利者血證諦也與抵當湯以下畜血

抵當湯方

水蛭 去拾箇熬 味鹹苦寒 蝱蟲 叁拾箇熬去翅足味苦微寒 桃仁 貳拾箇去皮尖味苦甘平 大黃 叁兩酒浸味苦寒

苦走血。鹹勝血。蝱蟲水蛭之鹹苦。以除畜血。甘緩結。苦泄熱。桃仁大黃之苦。以下結熱。

右肆味為末。以水伍升。煑取叁升。去滓。溫服壹升。不下。再服。

太陽病身黃。脉沉結。少腹鞕。小便不利者。為無血也。小便自利。其人如狂者。血證諦也。抵當湯主之。

【奎】身黃脉沉結。少腹鞕。小便不利者。胃熱發黃也。可與茵陳湯。身黃脉沉結。少腹鞕。小便自利。其人如狂者。非胃中瘀熱。為熱結下焦。而為畜血也。與抵當湯。以下畜血。

傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。為有血也。當下之。不可餘藥。宜抵當丸。

【奎】傷寒有熱。少腹滿。是畜血於下焦。若熱畜。津液不通。則小便不利。其熱不畜。津液行。小便自利者。乃為畜血。當與桃仁承氣湯。抵當湯下之。然此無身黃尿黑。又無喜忘發狂。是未至於甚。故不可餘駃峻之藥也。可與抵當丸。小可下之也。

抵當丸方

水蛭貳拾箇味苦寒　蝱蟲貳拾伍箇味苦微寒　桃仁貳拾箇去皮尖　大黃叁兩

右肆味。杵。分為肆丸。以水壹升。煑壹丸。取柒合服之。晬時當下血。若不下者。更服。

太陽病小便利者。以飲水多。必心下悸。小便少者。必苦裏急也。

飲水多而小便自利者。則水不內畜。但腹中水多。令心下悸。金匱要畧曰。食少飲多。水停心下。甚者則悸。飲水多而小便不利。則水畜於內而不行。必苦裏急也。

音釋

內諸藥上音納啜粥上昌悅切飲水也協熱上音挾見風脉上音現漬疾智切漚也蚘音回人腹中長蟲也茈音柴瞑音冥視不明也悸其季切心動也人葠下音參㕮咀上音父下才與切㕮咀嚼也剉如麻豆也更衣音庚改也沫音末懊憹上於刀切下奴刀切又女江切心亂也懊憹痛悔聲室陟栗切塞也擗脾入切眴音縣目搖也慄音栗懼也蘊紆問切積也嘿音墨靜也但見下音現飴音怡餳也烝諸仍切火氣上行也募音墓滲色蔭切諦音帝審也水蛭音質蝱音肓駃峻上音決下思俊切嶮也

註解傷寒論方卷第三

吳門趙應貞刻



註解傷寒論卷第四

漢 長沙守 仲景全書第四 張仲景述
晉 太醫令 王叔和撰次
宋 聊攝人 成無己註解
明 虞山人 趙開美校句

辨太陽脉證并治下第七

問曰病有結胸有藏結其狀何如荅曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胸也何謂藏結荅曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治結胸者邪結在胸藏結者邪結在藏二者

皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結者為結胸結胸以陽受氣於胸中故爾與陰相結者為藏結以陰受之則入五藏故爾與宜通而塞故痛邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞕痛寸脉浮關脉沉知邪結在陽也寸脉浮陽脉小細沉緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛猶食亦自如故陰氣乘陽虛而下故時時自下利陰得陽則能藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者其胸中亦寒故云難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也藏結於法當下無陽證為表無熱不往來寒熱為半表半裏無熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如胎者以毋田有熱胸中有寒邪氣以表裏皆寒故不可攻病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽邪入裏結於胸中為結胸無熱惡寒者發於陰也而反下之表中之陰入裏結於心下為痞結胸者項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸(二)結胸病項強者為邪結胸中胸膈結滿心下緊實但欲仰而不能俛是項強亦如柔痓之狀也與大陷胸丸下結泄滿

大陷胸丸方

大黃半斤味苦寒　葶藶半升熬味苦寒　芒消半升味酸寒

杏仁半升去皮尖熬黑味苦甘溫

大黃芒消之苦鹹所以下熱葶藶杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以下泄滿實物也

右肆味搗篩貳味內杏仁芒消合研如脂和散

取如彈丸壹枚。別搗甘遂末壹錢匕。白蜜貳合。水貳升。煑取壹升。溫頓服之。壹宿乃下。如不下。更服。取下為效。禁如藥法。

結胷證。其脉浮大者。不可下。下之則死。結胷為邪結胷中。屬上焦之分。得寸脉浮。關脉沉者。為在裏則可下。若脉浮大。心下雖結。是在表者猶多。未全結也。下之重虛。邪氣復結。則難可制。故云下之則死。結胷證悉具。煩躁者亦死。結胷證悉具。邪結已深也。煩躁者。正氣散亂也。邪氣勝正。病者必死。太陽病。脉浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞕。則為結胷。大陷胷湯主之。[三]若不結胷。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。動數。皆陽脉也。當責邪在表。脉而汗出者。謂之盜汗。為邪氣在半表半裏。則不惡寒。此頭痛發熱。微盜汗出。反惡寒者。表未解也。當發其汗。醫反下之。虛其胃氣。表邪乘虛則陷。邪在表。則見陽脉。邪在裏。則見陰脉。邪氣內陷。動數之脉。所以變遲而浮脉獨不變者。以邪結胷中。上焦陽結。脉不得而沉也。客氣者。外邪乘胃中空虛入裏。結於胷膈。膈中拒痛者。客氣動膈也。金匱要畧曰。短氣不足以息者。實也。短氣躁煩。心中懊憹。皆邪熱為實。陽氣內陷。氣不得通于膈。壅于心下。為鞕滿而痛。成結胷也。與大陷胷湯。以下結熱。若胃中空虛。陽氣內陷。不結於胷膈。下入於胃中者。遍身汗出。則為熱越。不能發黃。若但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利者。熱不得越。必發黃也。

大陷胸湯方

大黃陸兩去皮苦寒 芒消壹升 甘遂壹錢苦寒

大黃謂之將軍以苦蕩滌芒消一名消石以其鹹能耎堅夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣可以直達透結陷胸三物為允

右叁味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒消煮壹兩沸內甘遂末溫服壹升得快利止後服

傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞕者大陷胸湯主之三病在表而下之熱入因作結胸此不云下後而云傷寒六七日則是傳裏之實熱也沉為在裏緊為裏實以心下痛按之實鞕是以為結胸與大陷胸湯

以下結熱傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯四但結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之傷寒十餘日熱結在裏是叫下之法復往來寒熱為正邪分爭未全歛結與大柴胡湯下之但結胸無大熱者非熱結也是水飲結於胸脇謂之水結胸周身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水欲不得外泄停畜而不行也與大陷胸湯以逐其水太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯主之五重發汗而復下之則內外重亡津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞕滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱甚也與大陷胸

湯以下其邪。小結胸病正在心下。按之則痛。脉浮滑者。小陷胸湯主之。六正在心下。按之則痛。是熱氣猶淺。謂之小結胸。結胸脉沉緊。或寸浮關沉。今脉浮滑。知熱未深結。與小陷胸湯。以除胸膈上結熱。

小陷胸湯方

黃連壹兩苦寒 半夏半升洗辛温 栝蔞實大者壹箇苦寒

苦以泄之。辛以散之。黃連栝蔞實。苦寒以泄熱。半夏之辛以散結。

右叁味。以水陸升。先煮栝蔞。取叁升。去滓。內諸藥。煮取貳升。去滓。分温叁服。

太陽病二三日不能卧。但欲起。心下必結。脉微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止。必作結胸。未止者。四日復下之。此作協熱利也。太陽病二三日。邪在表也。不能卧。但欲起。心下必結者。以心下結滿。卧則氣壅而愈甚。故不能卧。而但欲起也。心下結滿。有水分。有寒分。有氣分。今脉微弱。知本有寒分。醫見心下結而反下之。則太陽表邪乘虛入裏。利止。則邪氣畜結為結胸。利不止。至次日。復如前下利不止者。是邪熱下攻腸胃。為挾熱利也。太陽病。下之其脉促。不結胸者。此為欲解也。脉浮者。必結胸也。脉緊者。必咽痛。脉弦者。必兩脇拘急。脉細數者。頭痛未止。脉沉緊者。必欲嘔。脉沉滑者。協熱利。脉浮滑者。必下血。此太陽病。下之後。邪氣傳變。其脉促。者。為陽盛。下後。脉促。為陽勝陰也。故不作結胸。為欲解。下後脉浮。為上焦陽邪結而為結胸也。經曰。結胸者。寸脉浮。關脉沉。下後脉緊。則太陽之邪。傳於少陰。經曰。脉緊者。屬少陰。內經曰。邪客於少陰之絡。令人喘痛。不可內食。所以脉緊

者。必咽痛。蒂弦。則太陽之邪。傳於少陽。經曰。尺寸俱弦者。少陽受病也。其脉循脇。絡於耳。所以脉弦者。必兩脇拘急。下後邪氣傳裏。則頭痛未止。脉細數。為邪未傳裏而傷氣也。細為氣少。數為在表。故頭痛未止。脉沉緊。則太陽之邪。傳於陽明。為裏實也。沉為在裏。緊為裏實。陽明裏實。故必欲嘔。脉滑。則太陽之邪。傳於腸胃。以滑為陰氣有餘。知邪氣入裏。干於下焦也。沉為血。勝氣虛。是為協熱利。浮為氣。勝血虛。是知必下血。經曰。不宜下而便攻之。諸變不可勝數。此之謂也。

病在陽。應以汗解之。反以冷水潠之。若灌之。其熱被劫。不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。寒實結胷。無熱證者。與三物小陷胷湯。白散亦可服。

七　病在陽。為邪在表也。法當汗出而解。反以冷水潠之。灌洗。熱被寒水。外不得出。則反攻其裏。彌更益煩。肉上粟起者。水寒之氣。客於皮膚也。意欲飲水者。裏有熱也。反不渴者。寒在表也。與文蛤散。以散表中水寒之氣。若不差。是水熱相搏。欲傳於裏。與五苓散。發汗以和之。始熱在表。因水寒制之。不得外泄。內攻於裏。結於胷膈。心下鞕痛。本以水寒伏熱為實。故謂之寒實結胷。無熱證者。外無熱。而熱悉收斂於裏也。與小陷胷湯。以下逐之。白散。下熱。故亦可攻。

文蛤散方

文蛤　伍兩味鹹寒　鹹走腎。則可以勝水氣。

右壹味。為散。以沸湯和壹錢匕。服。湯用伍合。

白散方

桔梗　叁分味辛苦微溫　芭豆　壹分去皮心熬黑研如脂平溫

貝母叁分味辛苦平

辛散而苦泄。桔梗貝母之苦辛。用以下氣。芭豆之辛。用以散實。

右件叁味。為末。內芭豆。更於臼中杵之。以白飲和服。強人半錢。羸者減之。病在膈上。必吐。在膈下。必利。不利。進熱粥壹杯。利過不止。進冷粥壹杯。身熱皮粟不解。欲引衣自覆者。若以水潠之洗之。益令熱却。不得出。當汗而不汗。則煩。假令汗出已。腹中痛。與芍藥叁兩。如上法。

太陽與少陽併病。頭項強痛。或眩冒。時如結胷。心下痞鞕者。當刺大椎第一間。肺俞。肝俞。慎不可發汗。發汗則讝語。脉弦五日。讝語不止。當刺期門。

太陽之脉。絡頭下項。頭項強痛者。太陽表病也。少陽之脉。循胷絡脇。如結胷。心下痞鞕者。少陽裏病也。太陽少陽。相併為病。不純在表。故頭項不但強痛而或眩冒。亦未全入裏。故時如結胷。心下痞鞕。此邪在半表半裏之間也。刺大椎第一間肺俞。以寫太陽之邪。刺肝俞。以寫少陽之邪。邪在表。則可發汗。邪在半表半裏。則不可發汗。發汗則亡津液。損動胃氣。少陽之邪。因干於胃。土為木刑。必發讝語。脉弦。至五六日。傳經盡。邪熱去。而讝語當止。若復不止。為少陽邪熱甚也。刺期門。以寫肝膽之氣。

婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脉遲。身凉。胷脇下滿。如結胷狀。讝語者。此為熱入血室也。當刺期門。隨其實而寫之。

九　中風。發熱惡寒。表病也。若經水不來。表邪傳裏。則入府。而不入血室也。因經水適來。血室空虛。至七八日。邪氣傳裏之時

更不入府。乘虛而入於血室。熱除脉遲。身涼者。邪氣內陷而表證罷也。肾脇下滿。如結肾狀。讝語者。熱入血室而裏實。期門者。肝之募。肝主血。刺期門者。寫血室之熱。審有何經氣實。更隨其實而寫之。

婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此為熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。十 中風七八日。邪氣傳乘之時。本無寒熱。而續得寒熱。經水適斷者。此為表邪乘血室虛。入於血室。與血相搏。而血結不行。經水所以斷也。血氣與邪分爭。故寒熱如瘧。而發作有時。與小柴胡湯。以解傳經之邪。

婦人傷寒。發熱。經水適來。晝日明了。暮則讝語。如見鬼狀者。此為熱入血室。無犯胃氣及上二焦。必自愈。十 傷寒發熱者。寒已成熱也。經水適來。則血室虛空。邪熱乘虛入於血室。若晝日讝語。為邪客於府。與陽爭也。此晝日明了。暮則讝語。如見鬼狀。是邪不入府。入於血室。與陰爭也。陽盛讝語。則宜下。此熱入血室。不可與下藥。犯其胃氣。熱入血室。血結寒熱者。與小柴胡湯。散邪發汗。此雖熱入血室。而無痛結。不可刺期門。犯其中焦。必自愈者。以經行。則熱隨血去。血下也。已。則邪熱悉除。而愈矣。所為發汗為犯上焦者。發汗則動衛氣。衛氣出上焦。故也。刺期門為犯中焦者。刺期門。則動榮氣。榮氣出中焦。故也。脉經曰。無犯胃氣及上二焦。必自愈。豈謂華。不謂針耶。

傷寒六七日。發熱。微惡寒。支節煩疼。微嘔。心下支結。外證未去者。柴胡加桂枝湯主之。十一 傷寒六七日。邪當傳裏之時。支。散也。嘔而心下結者。裏證也。法當攻裏。發熱微惡寒。支節煩疼。為外證未去。不可攻裏。與柴胡桂枝湯。以和解之。

傷寒五六日。已發汗。而復下之。肾脇滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此

按前此雖熱入血室句下別本有而無血結寒熱不可與小柴胡湯發汗以犯上焦熱入血室向脫今補

為未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。十三 傷寒五六日。已經汗下之後。則邪當解。今胷脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。即邪氣猶在半表半裏之間。為未解也。胷脇滿。微結。寒熱。心煩者。邪在半表半裏之間也。小便不利而渴者。汗下後。亡津液。內燥也。若熱消津液。令小便不利而渴者。其人必嘔。今渴而不嘔。知非裏熱也。傷寒汗出則和。今但頭汗出。而餘處無汗者。津液不足。而陽虛於上也。與柴胡桂枝乾薑湯。以解表裏之邪。復津液而助陽也。

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡 半斤 苦平　桂枝 叁兩去皮 味辛熱　乾薑 貳兩 辛熱

括蔞根 肆兩 苦寒　黃芩 叁兩 苦寒　牡礪 貳兩熬 鹹寒

甘草 貳兩炙 味甘平

內經曰。熱淫於內。以苦發之。柴胡黃芩之苦。以解傳裏之邪。辛甘發散為陽。桂枝甘草之辛甘。以散在表之邪。鹹以耎之。牡礪之鹹。以消胷脇之滿。辛以潤之。乾薑之辛。以固陽虛之汗。津液不足而為渴。苦以堅之。括蔞之苦。以生津液。

右柒味。以水壹斗貳升。煑取陸升。去滓。再煎。取叁升。溫服壹升。日叁服。初服。微煩。復服。汗出便愈。

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞕。脉細者。此為陽微結。必有表。復有裏也。脉沉。亦在裏也。汗出為陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此為半在裏半在外也。脉雖

沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯㊀設不了了者得屎而解傷寒五六日邪當傳裏之時頭汗出微惡寒者表仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞕脈細者邪結於裏也大便鞕為陽結此邪熱雖傳於裏然以外帶表邪則熱結猶淺故曰陽微結脈沉雖為在裏若純陰結則更無頭汗惡寒之表證諸陰脈皆至頸胸中而罷不上循頭今頭汗出知非少陰也與小柴胡湯以除半表半裏之邪服湯已外證罷而不了了者為裏熱未除與湯取其微利則愈故云得屎而解傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為結胸也大陷

胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯㊁傷寒五六日邪在半表半裏之時嘔而發熱邪在半表半裏之證是為柴胡證具以他藥下之柴胡證不罷者不為逆却與柴胡湯則愈若下後邪氣傳裏者仍在半表半裏則陰陽俱有邪至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下後陽邪傳裏者則結於胃中為結胸以胃中為陽受氣之分與大陷胸湯以下其結陰邪傳裏者則留於心下為痞以心下為陰受氣之分與半夏瀉心湯以通其痞經曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因此作痞此之謂也

半夏瀉心湯方

半夏半升洗 辛平 黃芩 苦寒 乾薑 辛熱 人參 甘溫 各叁兩 黃連壹兩 苦寒 大棗拾貳枚 擘 溫甘 甘草

參兩炙
甘平

辛入肺而散氣。半夏之辛。以散結氣。苦入心而瀉熱。黃芩黃連之苦。以泄痞熱。脾欲緩。急食甘以緩之。人參甘草大棗之甘。以緩之。

右柒味。以水壹斗。煮取陸升。去滓。再煮。取叁升。溫服壹升。日叁服。

太陽少陽併病。而反下之。成結胸。心下鞕。下利不止。水漿不下。其人心煩。太陽少陽併病。為邪氣在經之邪。乘虛而入。太陽表邪入裏。結於胸中。為結胸。心下鞕。少陽裏邪。乘虛下于腸胃。遂利不止。若邪結陰分。則飲食如故。而為藏結。此為陽邪內結。故水漿不下。而心煩。脉浮而緊。而復下之。緊反入裏。則作痞。按之自濡。但氣痞耳。浮而緊浮為傷陽。緊為傷陰。當發其汗。而反下之。若浮入裏為陽邪入裏。則作結胸。浮不入裏。而緊入裏者。陰邪入裏。則作痞。太陽中風。下利嘔逆。表解者。乃可攻之。其人榮榮汗出。發作有時。頭痛。心下痞鞕。滿引脇下痛。乾嘔。短氣。汗出不惡寒者。此表解。裏未和也。十棗湯主之。

十棗湯方

芫花熬 味辛苦 溫 甘遂苦寒 大戟苦寒 大棗拾枚 擘甘

下利嘔逆。裏受邪也。邪在裏者。可下。亦須待表解者。乃可攻之。其人榮榮汗出。發作有時。不惡寒者。表已解也。頭痛。心下痞鞕。滿引脇下痛。乾嘔。短氣者。邪熱內畜。而有伏飲。是裏未和也。與十棗湯下熱逐飲。

十棗湯方

辛以散之。芫花之辛。以散飲。苦以泄之。甘遂大戟之苦。以泄水。水者腎所主也。甘者脾之味也。大棗之甘者。益土而勝水。

右上叁味等分。各別擣為散。以水壹升半。先煑大棗肥者拾枚。取捌合。去滓。內藥末。強人服壹錢匕。羸人服半錢。溫服之。平旦服。若下少。病不除者。明日更服。加半錢。得快下。利後。糜粥自養。

太陽病。醫發汗。遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裏俱虛。陰陽氣並竭。無陽則陰獨。復加燒針。因胷煩。面色青黃。膚瞤者。難治。今色微黃。手足溫者。易愈。太陽病。因發汗。遂發熱惡寒者。外虛陽氣。邪復不除也。因復下之。又虛其裏。表中虛邪內陷。傳於心下為痞。發汗表虛為竭陽。下之裏虛為竭陰。表證罷為無陽。裏有痞為陰獨。又加燒針。虛不勝火。火氣內攻。致胷煩也。傷寒之病。以陽為主。其人面色青。膚肉瞤動者。陽氣太虛。故云難治。若面色微黃。手足溫者。即陽氣得復。故云易愈。

心下痞。按之濡。其脉關上浮者。大黃黃連瀉心湯主之。[七]心下鞕。按之痛。關脉沉者。實熱也。心下痞。按之濡。其脉關上浮者。虛熱也。大黃黃連湯。以導其虛熱。

大黃黃連瀉心湯方

大黃貳兩味苦寒　黃連壹兩味苦寒

內經曰。火熱受邪。心病生焉。苦入心。寒除熱。大黃黃連之苦寒。以導瀉心下之虛熱。但以麻沸湯漬服者。取其氣薄。而泄虛熱。

右貳味。以麻沸湯貳升。漬之。須臾絞去滓。分溫

再服。

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之[丈]心下痞者虛熱內伏也惡寒汗出者陽氣外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽。本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之[无]本因下後成痞當與瀉心湯除之若服之痞不解其人渴而口燥煩小便不利者為水飲內畜津液不行非熱痞也與五苓散發汗散水則愈。一方忍之一日乃愈者不飲者外水不入胕停之水得行而痞亦愈也。傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之[王]胃為津液之主陽氣之源大汗出後外亡津液胃中空虛客氣上逆心下痞鞕全匱要畧曰中焦氣未和不能消穀故令噫氣

噫食臭者胃虛而不殺穀也脅下有水氣腹中雷鳴下弱不能勝水也與瀉心湯以攻痞加生薑以益胃傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之[王]傷寒中風是傷寒或中風也邪氣在表醫反下之虛其腸胃而氣內陷也下利日數十行穀不化腹中雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞鞕乾嘔心煩不得安者胃中空虛客氣上逆也與瀉心湯以攻痞加甘草以補虛前以汗後胃虛是外傷陽氣故加生薑此以下後胃虛是內損陰氣故加甘草。傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚

理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘粮湯主之。[主]復利不止者。當利其小便。傷寒服湯藥下後。利不止而心下痞鞕者。氣虛而客氣上逆也。與瀉心湯攻之。則痞已。醫復以他藥下之。又虛其裏。致利不止也。理中丸。脾胃虛寒下利者。服之愈。此以下焦虛。故與之。其利益甚。聖濟經曰。滑則氣脫。欲其收也。如開腸洞泄。便溏遺失。澁劑所以收之。此利由下焦不約與。赤石脂禹餘粮湯。以澁固泄。下焦主分清濁。下利者。水穀不分也。若服澁劑而利不止。當利小便。以分其氣。

赤石脂禹餘粮湯方

赤石脂 壹斤碎 味甘温 禹餘粮 壹斤碎 味甘平

本草云。澁可去脫。石脂之澁。以收斂之。重可去怯。餘粮之重。以鎮固。

已上貳味。以水陸升。煮取貳升。去滓。參服。

傷寒吐下後。發汗。虛煩。脉甚微。八九日。心下痞。脇下痛。氣上衝咽喉。眩冒。經脉動惕者。久而成痿。

傷寒吐下後。發汗。則表裏之氣俱虛。虛煩脉甚微。皆為正氣內虛。邪氣獨在。至七八日。正氣當復。邪氣當罷。而心下痞。脇下痛。氣上衝咽喉。眩冒者。正氣內虛而不復。邪氣留結而不去。經脉動惕者。經絡之氣虛極。又則熱氣還經。必成痿弱。

傷寒發汗。若吐若下。解後。心下痞鞕。噫氣不除者。旋復代赭石湯主之。[主]大邪雖解。以曾發汗吐下。胃氣弱而未和。虛氣上逆。故心下痞鞕。噫氣不除。與旋復代赭石湯。降虛氣而和胃。

旋復代赭石湯方

旋復花 叁兩 味鹹温 人參 貳兩 味甘温 生薑 伍兩 切味辛温 代赭石 壹兩 味苦寒 大棗 拾貳枚 擘甘温 甘草

參兩炙 味甘平 半夏 半升洗 味辛溫

鞕則氣堅。鹹味所以耎之。旋復之鹹。以耎痞鞕。怯則氣浮。重劑所以鎮之。代赭之重。以鎮虛逆。辛者散也。生薑半夏之辛。以散虛痞。甘者緩也。人參甘草大棗之甘。以補胃弱。

右件柒味。以水壹斗。煮取陸升。去滓。再煎。取參升。溫服壹升。日參服。

下後。不可更行桂枝湯。若汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯。

前第三卷。廿六證云。發汗後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。為與此證治法同。汗下雖殊。既不當攝正氣。則一邪氣所傳。既同。遂用一法治之。經所謂若發汗若下。若吐後者是矣。

太陽病。外證未除。而數下之。遂恊熱而利。利下不止。心下痞鞕。表裏不解者。

桂枝人參湯主之

外證未除。而數下之。為重虛其裏。邪熱乘虛而入。裏虛恊熱。遂利不止。而心下痞。若表解而下利。心下痞者。可與瀉心湯。若不下利。表不解而心下痞者。可先解表。而後攻痞。以表裏不解。故與桂枝人參湯。和裏解表。

桂枝人參湯方

桂枝 肆兩去皮 味辛熱 甘草 肆兩炙 味甘平 白朮 參兩 味甘平 人參 參兩 甘溫 乾薑 參兩 辛熱

表未解者。辛以散之。裏不足者。甘以緩之。此以裏氣大虛。表裏不解。故加桂枝甘草於理中湯也。

右伍味。以水玖升。先煮肆味。取伍升。內桂更煮。取參升。溫服壹升。日再。夜壹服。

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯【夫】大下後復發汗則表裏之邪當悉已此心下痞而惡寒者表裏之邪俱不解也因表不解而下之為心下痞先與桂枝湯解表表解乃與大黃黃連瀉心湯攻痞內經曰從外之內而盛於內者先治其外而後調其內傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯主之【主】傷寒發熱寒已成熱也汗出不解表和而裏病也吐利心腹濡耎為裏虛嘔吐而下利心下痞鞕者是裏實也與大柴胡湯以下裏熱病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散【夫】病如桂枝證為發熱汗出惡風言邪在表也頭痛項強為桂枝湯證也若頭不痛項不強則邪不在表而傳裏也浮為在表沉為在裏今寸脉微浮則邪不在表亦不在裏而在胸中也胸中與表知應故知邪在胸中者猶如桂枝證而寸脉微浮也以胸中痞鞕上衝咽喉不得息知寒邪客於胸中而不在表也千金曰浮上部填塞胸心胸中滿者吐之則愈與瓜蒂散以吐胸中之邪

瓜蒂散方

瓜蒂壹分熬黃　赤小豆壹分味酸溫

味苦寒

其高者越之越以瓜蒂香豉之苦在上者湧之以赤小豆之酸內經曰酸苦湧泄為陰

右貳味各別搗篩為散已合治之取壹錢匕以香豉壹合用熱湯柒合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡

血虛家。不可與瓜蒂散。

病脇下素有痞連在臍傍。痛引少腹。入陰筋者。此名藏結。死元素有宿昔之積。結於脅下為痞。今因傷寒。邪氣入裏。與宿積相助。使藏真之氣結而不通。痞連在臍傍。痛引少腹。入陰筋而死。傷寒病若吐。若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。

若吐若下後七八日。則當解。後不解而熱結在裏。表熱者。身熱也。裏熱者。內熱也。本因吐下後。邪氣乘虛內陷為結熱。若無表熱而純為裏熱。則邪熱結而為實。此以表熱未罷。時時惡風。若邪氣純在表。則惡風無時。若邪氣純在裏。則更不惡風。以時時惡風。知表裏俱有熱也。邪熱結而為實者。則無大渴。邪熱散漫則渴。今雖熱結在裏。表裏俱熱。未為結實。邪氣散漫。熏蒸焦腸。故大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升。與白虎加人參湯。散熱生津。傷寒無大熱。口燥渴。心煩背微惡寒者。白虎加人參湯主之。

無大熱者。為身無大熱也。口燥渴心煩者。當作陽明病然以背微惡寒為表未全罷。所以屬太陽也。背為陽。背惡寒。口中和者。少陰病也。當與附子湯。今口燥而渴。背雖惡寒。此裏也。則惡寒亦不至甚。故云微惡寒。與白虎湯。解表散熱。加人參止渴生津。傷寒脉浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。

傷寒。脉浮。發熱無汗。其表不解。不渴者。宜麻黃湯。渴者。宜五苓散。非白虎所宜。大渴欲飲水。無表證者。方可與白虎加人參湯。以散裏熱。瞞病之工。大宜精別。太陽少陽併病。心下鞕。頸項強而眩者。當刺大椎肺俞肝俞。慎勿下之。

心下痞鞕而眩者。少陽也。頸項強者。太陽也。刺大椎肺俞。以瀉太陽之邪。以太陽脉下項

使脊故耳肝俞以瀉少陽之邪以膽為肝之府故耳太陽為在表少陽為在裏即是半表半裏證前第八證云不可發汗發汗則讝語是發汗攻太陽之邪少陽之邪益甚干胃必發讝語此云慎勿下之攻少陽之邪太陽之邪乘虛入裏必作結胸經曰太陽少陽併病而反下之成結胸太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生姜湯主之（太陽陽明合病自下利為在裏當與芍根湯發汗陽明少陽合病自下利為在裏可與承氣湯下之此太陽少陽合病自下利為在半表半裏非汗下所宜故與黃芩湯以和解半表半裏之邪嘔者胃氣逆也故加半夏生薑以散逆氣）

黃芩湯方

黃芩叁兩味苦寒　甘草貳兩炙味甘平　芍藥貳兩味酸平

大棗貳拾枚擘味甘温

虛而不實者若以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱

右肆味以水壹斗煮取叁升去滓温服壹升日再夜壹服若嘔者加半夏半升生薑叁兩

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之（温家下後舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰不得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不得降而獨治於上為胸中熱欲嘔吐與黃連湯升降陰陽之氣）

黃連湯方

黃連味苦寒　甘草炙味甘平　乾薑味辛熱　桂枝

去皮味辛熱各叁兩 人參貳兩味甘溫 半夏半升洗味甘溫
大棗拾貳枚擘味甘溫

上熱者泄之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛桂薑半夏之辛以升陰脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以益胃

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日叁服夜貳服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之 [三]傷寒與中風家至七八日再經之時則和氣多在裏身必不苦疼痛今日數多復身體疼煩不能自轉側者風濕相搏也煩者風也身疼不能自轉側者濕也經曰風則浮虛脉經曰脉來濇者為病寒濕也不嘔不渴裏無和也脉得浮虛而濇身有疼煩知風濕但在經也與桂枝附子湯以散表中風濕若其人大便鞕小便自利者去桂枝加白朮湯主之 [三]桂發汗走津液此小便利大便鞕為津液不足去桂加朮

桂枝附子湯方

桂枝陸兩去皮味辛熱 附子叁枚炮去皮破割片辛熱 生薑叁兩切辛溫 甘草貳兩炙味甘溫 大棗拾貳枚擘味甘溫

風在表者散以桂枝甘草之辛甘濕在經者逐以附子之辛熱薑棗辛甘行榮衛通津液以和表也

右伍味以水陸升煮取貳升去滓分溫叁服

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇

汗出短氣。小便不利。惡風。不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯主之。【三六】風則傷衛。濕流關節。風濕相搏。兩邪亂經。故骨節疼煩掣痛。不得屈伸。近之則痛劇也。風勝則衛氣不固。汗出短氣。惡風不欲去衣。為風在表。濕勝則水氣不行。小便不利。或身微腫。為濕外搏也。與甘草附子湯。散濕。固衛氣。

甘草附子湯方

甘草貳兩炙味甘平　附子貳枚炮去皮破味辛熱　白朮貳兩味甘溫　桂枝肆兩去皮味辛熱

桂枝甘草之辛甘。發散風邪而和衛。附子白朮之辛甘。解濕氣而溫經。

右肆味。以水陸升。煑取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。初服得微汗則解。能食。汗出復煩者。服伍合。恐壹升多者。宜服陸柒合為妙。

傷寒脉浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。【三七】浮為在表。滑為在裏。表有熱。外有熱也。裏有寒。有邪氣傳裏也。以邪未入腑。故止言寒。如瓜蔕散證。云胷上有寒者是矣。與白虎湯。以解內外之邪。

白虎湯方

知母陸兩味苦寒　石膏壹斤碎味甘寒　甘草貳兩甘溫　粳米陸合味甘平

內經曰。熱淫所勝。佐以苦甘。知母石膏之苦甘以散熱。熱則傷氣。甘以緩之。甘草粳米之甘以益氣。

右肆味。以水壹斗。煑米熟湯成。去滓。溫服壹升。

日叁服

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之【罕】結代之脉動而中止能自還者名曰結不能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也心中悸動知真氣內虛也與炙甘草湯益虛補血氣而復脉

炙甘草湯方

甘草肆兩炙味甘平　生薑叁兩切味辛溫　桂枝叁兩去皮味辛熱　人參貳兩味甘溫　生地黃壹斤味甘寒　阿膠貳兩味甘溫　麥門冬半斤去心味甘平　麻子仁半升味甘平　大棗拾貳枚擘味甘溫

補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰津耗散為枯五藏痿弱榮衛涸流濕劑所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脉通心也

右玖味以清酒柒升水捌升先煑捌味取叁升去滓內膠烊消盡溫服壹升日叁服一名復脉湯

脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必難治結代之脉一為邪氣留結一為真氣虛衰脉來動而中止若能自還更來小數止是邪氣留結名曰結陰若動而中止不能自還因其呼吸陰陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰為難治之脉經曰脉結者生代者死此之謂也

釋音

俛音免俯也　瞤如倫切目動也　匱求位切匣也　痿於危切痺病也　耎音軟柔也

椎音鎚　掣昌列切挽也　涸乎各切竭也　烊音羊爍也

傷寒論卷之四

註解傷寒論卷第五　仲景全書第十五

漢　長沙守　張仲景　述

晉　太醫令　王叔和　撰次

宋　聊攝人　成無已　註解

明　虞山人　趙開美　校句

辨陽明脉證并治第八

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。荅曰。太陽陽明者。脾約是也。陽明。胃也。邪自太陽經傳之入府者。謂之太陽陽明。經曰。太陽病。若吐若下。若發汗後。微煩。小便數。大便因鞕者。與小承氣湯。即是太陽陽明脾約病也。正陽陽明者。胃家實是也。邪自陽明經傳入府者。謂

之正陽陽明。經曰。陽明病脉遲。雖汗出不惡寒。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。外欲解。可攻裏也。手足濈濈然汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。即是正陽陽明胃家實也。少陽陽明者。發汗。利小便已。胃中燥煩。實大便難是也。邪自少陽經傳之入府者。謂之少陽陽明。經曰。傷寒脉弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。此屬胃。即是少陽陽明病也。陽明之為病。胃家實也。邪傳入胃。熱毒皆結。則胃家為實。華佗曰。熱毒入胃。要須下去之。不可留於胃中。是知邪在陽明為胃家實也。問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣內實。大便難者。此名陽明也。本太陽病。不解。因汗利小便。亡津液。胃中乾燥。太陽之邪入府。轉屬陽明。古人登厠必更衣。不更衣者。通為不大便。不更衣則胃中物不得泄。故為內實。

胃氣津液加之。畜熱大便則難。為陽明裏實也。問曰。陽明病外證云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。陽明病為邪入府也。邪在表。則身熱汗出而惡寒。邪既入府。則表證已罷。故不惡寒。但身熱汗出而惡熱也。問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。答曰。雖得之一日。惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。邪客在陽明。當發熱而不惡寒。今得之一日。猶不發熱而惡寒者。即邪未全入府。尚帶表邪。若表邪全入。則更無惡寒。必自汗出而惡熱也。問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒二日自止。此為陽明病也。胃為水穀之海。主養四旁。四旁有病。皆能傳入於胃。入胃則更不復傳。如太陽傳之入胃。則更不傳陽明。陽明病傳之入胃。則更不傳少陽。少陽病傳之入胃。則更不傳三陰。本太

陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也傷寒傳經者則一日太陽二日陽明此太陽傳經故曰轉屬陽明傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然者是轉屬陽明也傷寒發熱無汗嘔不能食者陽明受病也若反汗出濈濈然者太陽之邪轉屬陽明也經曰陽明病法多汗傷寒三日陽明脉大傷寒二日邪傳陽明之時經曰尺寸俱長者陽明受病當二三日發陽明氣血俱多又邪併於經是以脉大傷寒脉浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞕者為陽明病也浮為陽邪緩為脾脉傷寒脉浮緩太陰客熱邪在三陽則手足熱邪在三陰則手足寒今手足自溫是知繫在太陰也太陰土也為邪烝之則色見于外當發身黃小便自利者熱不內畜不能發黃至七八日大便鞕者即太陰之邪入府轉屬陽明也傷寒轉繫陽明者其人濈然微汗出也傷寒則無汗陽明法多汗此以傷寒邪轉繫陽明故濈然微汗出陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也脉浮在表緊為裏實陽明中風口苦咽乾腹滿微喘者熱傳於裏也發熱惡寒者表仍未解也若下之裏邪雖去表邪復入于裏又亡津液故使腹滿而小便難陽明病若能食名中風不能食名中寒陽明病以飲食別受風寒者以胃為水穀之海風為陽邪陽殺穀故中風者能食寒為陰邪陰邪不殺穀故傷寒者不能食陽明病若中寒不能食小便不利手足濈然汗出此欲作固瘕必大便初鞕後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也陽明中寒不能食者寒不殺穀

也。小便不利者津液不化也。陽明病法多汗則胃身汗出。此手足疏然而汗出。而身無汗者。陽明中寒也。固瘕者寒氣結積也。胃中寒甚欲留結而為固瘕。則津液不得通行。而大便必鞕者。若汗出小便不利者。為實也。此以小便不利。水穀不別。雖大便初鞕。後必溏也。陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併。脉緊則愈。陽病客熱初傳入胃胃熱則消穀而欲食。陽明病熱為實者。則小便當數。大便當鞕。今小便反不利大便自調者。熱氣散漫。不為實也。欲食。則胃中穀多。內經曰。食入于陰。長氣于陽。穀多則陽氣勝。熱消津液。則水少。經曰。水入于經其血乃成。水少則陰血弱。釜置要署曰。陰氣不通即骨疼。其人骨節疼者。陰氣不足也。熱甚于表者。翕翕發熱。熱甚于裏者。烝烝發熱。此熱氣散漫。不專著于表裏。故翕翕如有熱狀。奄。忽也。忽然發狂者。陰不勝陽也。內經曰。陰不勝其陽者。則脉流薄疾。并乃狂。陽明蘊熱為實者。須下之愈。熱氣散漫。不為實者。必待汗出而愈。故云濈然而汗出解也。水穀之等者。陰陽氣平也。水不勝穀氣。是陰不勝陽也。汗出。則陽氣衰。脉緊則陰氣生。陰陽氣平。兩無偏勝。則愈。故云與汗共并。脉緊則愈。陽明病欲解時從申至戌上。四月為陽土王於中酉戌。向王時。是為欲解。陽明病不能食攻其熱必噦。所以然者胃中虛冷故也。以其人本虛。故攻其熱必噦。不能食。胃中本寒。攻其熱。復虛其胃。虛寒相搏。故令噦也。經曰。關脉弱。胃氣虛。有熱不可大攻之。熱去則寒起。此之謂也。陽明病脉遲。食難用飽。飽則微煩頭眩。必小便難。此欲作穀疸。雖下之腹滿如故。所以然者。脉遲故也。陽明病。脉遲則邪方入陰。長氣於陽。胃中有熱。食難用飽。飽則微煩而頭眩者。穀氣與熱氣相搏也。兩熱相合。消蒸津液。必

小便難。利者不能發黃。言熱得泄也。小便不利。則熱不得泄。身必發黃。疸。黃也。以其發於穀氣之熱。故名穀疸。熱實者下之則愈。脉遲為熱氣未實。雖下之。腹滿亦不減也。經曰。脉遲尚未可攻。陽明病法多汗。反無汗。其身如蟲行皮中狀者。此以久虛故也。胃為津液之本。氣虛津液少。病則反無汗。胃候身之肌肉。其身如蟲行皮中者。知胃氣久虛也。陽明病。反無汗而小便利。二三日嘔而欲手足厥者。必苦頭痛。若不欲不嘔。手足不厥者。頭不痛。陽明病。法多汗。反無汗而小便利者。陽明傷寒。邪發於外也。必苦頭痛。若不欲不嘔。手足不厥者。是寒邪俱攻裏而不外發。其頭亦不痛也。陽明病。但頭眩。不惡寒。故能食而欲。其人必咽痛。若不欲者。咽不痛。陽明病身不重痛。但頭眩而不惡寒者。陽明中風。而風氣內攻也。經

曰。陽明病若能食。名中風。風邪攻胃。胃氣上逆。則欲嗽。門者胃之系。欲甚。則咽傷。故必咽痛。若胃氣不逆。則不欲。其咽亦不痛也。陽明病無汗。小便不利。心中懊憹者。身必發黃。陽明病無汗而小便不利者。熱蘊於內。而不得越。心中懊憹者。熱氣鬱蒸。欲發於外而為黃也。陽明病被火。額上微汗出。小便不利者。必發黃。陽明病。則為內熱。被火。則火熱相合而甚。若遍身汗出。而小便利者。熱得泄越。不能發黃。今額上小汗出。而小便不利。則熱不得越。鬱蒸於胃。必發黃也。陽明病脉浮而緊者。必潮熱。發作有時。但浮者。必盜汗出。浮為在經。緊者裏實。脉浮而緊者。表熱裏實也。必潮熱發作有時者。脉但浮而不緊者。止是表熱也。必盜汗出。盜汗者。睡而汗出也。陽明病裏熱者。自汗。表熱者。盜汗。陽明病。口燥。但欲漱水。不欲嚥者。此必衄。陽明之脉。起於鼻。絡於口。陽明裏熱則渴欲飲水。此口燥。但欲

飲水。不欲嚥者。是熱在經。而裏無熱也。陽明氣血俱多。經中熱甚。迫血妄行。必作衄也。陽明病。本自汗出。醫更重發汗。病已差。尚微煩不了了者。此大便必鞕故也。以亡津液。胃中乾燥。故令大便鞕。當問其小便日幾行。若本小便日三四行。今日再行。故知大便不久出。今為小便數少。以津液當還入胃中。故知不久必大便也。先亡津液。使大便鞕。小便數少。津液分別。大便必自下也。傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻之。嘔者。熱在上焦。未全入府。故不可下。陽明病。心下鞕滿者。不可攻之。攻之利遂不止者。死。利止者。愈。陽明病。腹滿者。為邪氣入府。可下之。心下鞕滿。則邪氣尚淺。未全入府。不可便下之。得利止者。為邪氣去。正氣安。正氣安。則愈。若因下利不止。者為正氣脫而死。陽明病。面合赤色。不可攻之。必發熱色黃。小便不利也。合。通也。陽明病面色通赤者。熱在經也。不可下之。下之虛其胃氣。耗其津液。經中之熱。乘虛入胃。必發熱色黃。小便不利也。陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。[一]吐後心煩。謂之內煩。下後心煩。謂之虛煩。今陽明病不吐不下。心煩。即是胃有鬱熱也。與調胃承氣湯。以下鬱熱。陽明病。脉遲。雖汗出。不惡寒者。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濈然而汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。若汗多。微發熱。惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。[二]微和胃氣。勿令大泄下。陽明

病脉遲若汗出多微發熱惡寒者表未解也若脉遲雖汗出而不惡寒者表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽之本津液足為熟烝之則周身汗出津液不足為熟烝之其手足濈然而汗出知大便已鞕也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱不潮足熱未成實故不可便與大承氣湯雖有腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣

大承氣湯方

大黃肆兩苦寒洒洗　厚朴半斤苦溫炙去皮　枳實伍枚苦寒炙　芒消叁合酿寒

內經曰燥濕所勝以苦下之大黃枳實之苦以潤燥除熱又曰燥濕所勝治以苦溫厚朴之苦下結燥又曰熱濕所勝治以鹹寒芒消之鹹以攻蘊熱

右肆味以水壹斗先煮貳物取伍升去滓內大黃煮取貳升去滓內芒消更上火微壹兩沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯方

大黃肆兩　厚朴貳兩炙去皮　枳實叁枚大者炙

大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大甚故於大承氣湯去芒消又以結不至堅故少減厚朴枳實也

已上三味以水肆升煮取壹升貳合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者

不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞕而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

三 潮熱者實得大便微鞕者便可攻之若不鞕者則熱未成實雖有潮熱亦未可攻若不大便六七日恐有燥屎當先與小承氣湯漬之如有燥屎小承氣湯熱勢緩不能宣泄必轉氣下失若不轉失氣是胃中無燥屎但腸間少鞕耳止初頭鞕後必溏攻之則虛其胃氣致腹脹滿不能食也胃中乾燥則欲飲水水入胃中虛寒相搏氣逆則噦其後却發熱者則熱氣乘虛還復聚於胃中胃燥得熱必大便復鞕而少與小承氣湯微利與和之

故以重云不轉失氣不可攻內慎之至

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲重語也

內經曰邪氣盛則實精氣奪則虛譫語由邪氣盛而神識昏也鄭聲由精氣奪而聲不全也譫語者言語不次也鄭聲者鄭音不正也論語云惡鄭聲之亂樂又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆言鄭聲不正也今新差氣虛人聲轉者是所謂重語者也若聲重亦聲轉之故

直視譫語喘滿者死下利者亦死

直視譫語邪勝也喘滿為氣上脫下利為氣下脫是皆主死

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脉短者死脉自和者不死

亡陽胃燥譫語者脉短津液已絕不可復治脉自和為王氣未衰而尤可生也

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘

直視脉弦者生濇者死微者但發熱讝語者大承氣湯主之

四 若一服利止後服 若吐若下皆傷胃氣不大便五六日上至十餘日者亡津液胃氣虛邪熱內結也陽明王於申酉戌日晡所發潮熱者陽明熱甚也不惡寒者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也以為熱氣有餘若劇者是熱氣甚大也熱大甚於內昏冒正氣使不識人至於循衣模牀惕而不安微喘直視傷寒陽勝而陰絕者死陰勝而陽絕者死熱劇者為陽勝脉弦為陰有餘澁為陰不足陽熱雖劇脉弦知陰未絕而猶可生脉澁則絕陰不復可治其邪熱微而未至於劇者但發熱讝語可與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下藥中病即止不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則止後服

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則讝語小承氣湯主之

五 若一服讝語止更莫復服 亡津液胃燥大便鞕而讝語雖無大熱內結亦須與小承氣湯和其胃氣得一服讝語止則胃燥以潤更莫復與承氣湯以本無實熱故也

陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之

六 因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉失氣勿更與之明日不大便脉反微澁者裏虛也為難治不可更與承氣湯也 陽明病讝語發潮熱若脉沉實者內實者也則可下若脉滑疾為裏熱未實則未可下先與小承氣湯和之湯入腹中轉失氣者中有燥屎可更與小承氣湯一升以除之若不轉失氣者是無燥屎不可更與承氣湯至明日邪氣傳時脉得沉實緊牢之類是裏實也反得微澁者裏氣大虛也若大便利後脉微澁者止為裏虛而猶可此又不大便脉反微澁是正氣內衰為邪所勝故云難治

陽明病讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者

但鞕尒宜大承氣湯下之七讝語潮熱為胃熱當消谷引食反不能食者胃中有燥屎而胃中實也若能食者胃中虛熱雖鞕不得為有燥屎雜病虛為不欲食實為欲食傷寒則胃實熱甚者不能食胃中虛熱甚者能食與雜病為異也大承氣湯以下燥屎逐結熱陽明病下血讝語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈陽明病熱入血室迫血下行使下血讝語陽明病法多汗以奪血者無汗故但頭汗出也刺期門以散血室之熱隨其實而瀉之以除陽明之邪熱散邪除熱榮衛得通津液得復濈然汗出而解汗出讝語者以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈宜大承氣湯八胃中有燥屎則讝語以汗出為表未罷故云風也燥屎在胃則當下以表未和則未可下須過太陽經無表證乃可下之若下之早燥屎雖除則表邪乘虛復陷於裏為表虛裏實胃虛熱甚語言必亂與大承氣湯却下胃中邪熱則止傷寒四五日脉沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則讝語喘滿裏證具也則當下之反發其汗令津液越出胃中乾燥大便必難久則屎燥胃實必發讝語三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之九腹滿身重難以反側口不仁讝語者陽明也針經曰少陽病甚則面微塵此面垢者少陽也遺尿者太陽也三者以陽明證多故出陽明篇中三陽合病為表裏有邪若發汗攻表則燥熱益甚必愈讝語若下之攻裏表熱乘虛內陷必額上汗出手足逆冷若自汗出者

三陽經熱甚也。內經曰。熱則腠理開。榮衛通。汗大泄。與白虎湯。以解內外之熱。二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足漐漐汗出。大便難而讝語者。下之則愈。宜大承氣湯。十 本太陽病。併於陽明。名曰併病。太陽證罷。是無表證。但發潮熱。是熱併陽明。一身汗出。為熱越。今手足漐漐汗出。是熱聚於胃也。必大便難而讝語。經曰。手足漐然而汗出者。必大便已鞕也。與大承氣湯以下胃中實熱。陽明病脉浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則躁。心憒憒。反讝語。若加燒針。必怵惕煩躁。不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。梔子豉湯主之。十一 脉浮為邪在表。咽燥口苦。為熱在經。脉緊腹滿而喘。汗出不惡寒。反惡熱。身重。為邪在裏。此表裏俱有邪。

行當和解之。若發汗攻表。表熱雖除。而內熱益甚。故躁而憒憒。反讝語。憒憒者。心亂。經曰。榮氣微者。加燒針。則血不行。更發熱而躁煩。此表裏有熱。若加燒針。則損動陰氣。故怵惕煩躁不得眠也。若下之。裏熱雖去。則胃中空虛。表中客邪之氣乘虛陷於上焦。煩動於膈。使心中懊憹而不了了也。舌上胎黃者。熱氣客於胃中。舌上胎白。知熱氣客於胃中。與梔子豉湯以吐胃中之邪。若渴欲飲水口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。十二 若下後邪熱客於上焦者。為虛煩。此下後邪熱不客於上焦。而客於中焦者。是為乾燥煩渴。與白虎加人參湯。散熱潤燥。若脉浮發熱渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。十三 此下後客熱客於下焦者也。邪氣自表入裏。客於下焦。三焦俱帶熱也。脉浮發熱者。上焦熱也。渴欲飲水者。中焦熱也。小便不利者。邪客下焦。津液不得下通也。與猪苓湯利小便。以瀉下焦之熱也。

豬苓湯方

豬苓 去皮 甘平　茯苓 甘平　阿膠 甘平　滑石 碎甘寒　澤瀉 甘鹹寒 各壹兩

甘甚而反淡淡味滲泄為陽。豬苓茯苓之甘以行小便。鹹味滑泄為陰。澤瀉之鹹以泄伏水。滑利竅。阿膠滑石之滑以利水道。

右伍味。以水肆升。先煮肆味。取貳升。去滓。內下阿膠。烊消。溫服柒合。日叁服。

陽明病。汗出多而渴者。不可與豬苓湯。以汗多胃中燥。豬苓湯復利其小便。故也。針經曰。水穀入於口。輸於腸胃。其液別為五。天寒衣薄。則為溺。天熱衣厚。則為汗。是汗溺一液也。汗多為津液外泄。胃中乾燥。故不可與豬苓湯利小便也。脉浮而遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之 十四 浮為表熱。遲為裏寒。下利清穀者。裏寒甚也。與四逆湯溫裏散寒。若胃中虛冷。不能食者。飲水則噦。噦者。咳逆是也。千金曰。咳逆者。噦逆之名。胃中虛冷。得水。則水寒相搏。胃氣逆而噦。脉浮發熱。口乾鼻燥。能食者。則衄。脉浮發熱。口乾鼻燥者。熱在經也。能食者。裏和也。熱甚於經。迫血為衄。胃中虛冷。陰勝也。水入於經。其血乃成。飲水者。助陰氣。逆為噦。發熱口乾。陽勝也。食入於陰。長氣於陽。能食者。助陽血。妄為衄。三者。偏陰偏陽之疾也。陽明病。下之。其外有熱。手足溫。不結胸。心中懊憹。饑不能食。但頭汗出者。梔子豉湯主之 十五 表未罷而下者。應邪熱內陷也。熱內陷者。則外熱無而手足寒。今外有熱而手足溫者。熱雖內陷。猶而不深。故不作結胸也。心中懊憹。饑不能食者。熱客胃中。為虛煩也。熱自胃中熏烝

於上。故但頭汗出。而身無汗。與梔子豉湯。以吐胷中之虛煩。陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胷脇滿。不去者。小柴胡湯主之。

十六 陽明病。潮熱為胃實。大便鞕而小便數。今大便溏。小便自可。則胃熱未實。而水穀不別也。大便溏者。應氣降。而胷脇滿去。今反不去者。邪氣猶在半表半裏之間。與小柴胡湯。以去表裏之邪。陽明病。脇下鞕滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。

十七 上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濈然而汗出解也。陽明病。腹滿。不大便。舌上胎黃者。為邪熱入府。可下。若脇下鞕滿。雖不大便而嘔。舌上白胎者。為邪未入府。在表裏之間。與小柴胡湯。以和解之。上焦得通。則嘔止。津液得下。則胃氣因和。汗出而解。陽明中風。脉弦浮大而短氣。腹部滿。脇下及心痛。久按之。氣不通。鼻乾不得汗。嗜卧。一身

及面目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脉續浮者。與小柴胡湯。

十八 脉但浮。無餘證者。與麻黃湯。

十九 若不尿。腹滿加噦者。不治。浮大為陽。風在表也。弦則為陰。風在裏也。短氣腹滿。脇下及心痛。風熱壅於腹中而不通也。若寒客於內而痛者。按之則寒氣散而痛止。此以風熱內壅。故雖久按而氣亦不通。陽明病。鼻乾不得卧。自汗出者。邪在表也。此鼻乾不得汗而嗜卧者。風熱內攻。不干表也。一身面目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦者。風熱攻於胃也。陽明之脉。出大迎。循頰車。上耳前。過客主人。熱勝則腫。此風熱在經。故耳前後腫。刺之。經氣通。腫則小差。如此者。外證罷。則可攻。若外證不解。雖過十日。脉續浮者。邪氣猶在半表半裏。與小柴胡湯以和解之。若其脉但浮而不弦。又無諸裏證者。是邪但在表也。可與麻黃湯以發其汗。若不尿。腹滿加噦者。關格之疾也。故云不治。難經曰。關格者。不得盡其

命而死。陽明病。自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。雖硬不可攻之。當須自欬大便宜蜜煎導而通之。若土瓜根及與大猪膽汁。皆可為導。[干]津液內竭。腸胃乾燥。大便因硬。此非結熱。故不可攻。宜以藥外治而導引之。

蜜煎導方

蜜柒合。壹味內銅器中。微火煎之。稍凝似飴狀。攪之勿令焦著。欲可丸。併手捻作挺。令頭銳大如指。長二寸許。當熱時急作。冷則硬。以內穀道中。以手急抱。欲大便時乃去之。

猪膽汁方

大猪膽壹枚。瀉汁和醋少許。以灌穀道中。如一食頃。當大便出。

陽明病。脉遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。[三]陽明病。脉遲。汗出多。當責邪在裏。以微惡寒。知表未解。與桂枝湯和表。

陽明病。脉浮。無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。[三]陽明傷寒。表實脉浮。無汗而喘也。與麻黃湯以取汗。陽明病。發熱汗出。此為熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此為瘀熱在裏。身必發黃。茵蔯湯主之。[三]但頭汗出。身無汗。劑頸而還者。熱不得越也。小便不利。渴引水漿者。熱甚於胃。津液內竭也。胃為上。而色黃。胃為熱烝。則色奪於外。必發黃也。與茵蔯湯。逐熱退黃。

茵蔯湯方

茵蔯蒿陸兩苦微寒　梔子拾肆枚擘苦寒　大黃貳兩去皮苦寒

小熱之氣涼以和之。大熱之氣寒以取之。茵蔯梔子之苦寒。以通胃燥。宜下必以苦。宜補必以酸。大黃之苦寒以下瘀熱。

右參味。以水壹斗。先煮茵蔯減陸升。內貳味。煮取叁升。去滓。分溫叁服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

陽明證。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖鞕。大便反易。其色必黑。宜抵

當湯下之。內經曰。血并於下。亂而喜忘。此下之有久瘀血。所以喜忘也。津液少。大便鞕。以畜血在內。屎雖鞕。大便反易。其色黑也。與抵當湯以下瘀血。陽明病。下之心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。可攻。腹微滿。初頭鞕。後必溏。不可攻之。若有燥屎者。宜大承氣湯。下後心中懊憹而煩者。虛煩也。當與梔子豉湯。若胃中有燥屎者。非虛煩也。可與大承氣湯下之。其腹微滿。初頭鞕。後溏。是無燥屎。此熱不在胃而在上也。故不可攻。病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁。發作有時者。此有燥屎。故使不大便也。不大便六七日者。則大便必結為燥屎也。胃中燥實。氣不得下通。故繞臍痛。煩躁。發作有時也。病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脉實者。宜下之。脉浮虛者。宜發汗下之。與

大承氣湯發汗宜桂枝湯【二十六】雖得陽明證未可便為裏實審看脉候以別內外其脉實者熱已入府為實可與大承氣湯下之其脉浮虛者是熱未入府猶在表也可與桂枝湯發汗則愈大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯【二十七】大下之後則胃弱不能消穀至六七日不大便則宿食以結不消故使煩熱不解而腹滿痛是知有燥屎也與大承氣湯以下除之病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯【二十八】小便利則大便鞕此以有燥屎故小便不利而大便乍難乍易胃熱者發熱喘冒無時及嗜卧也此燥屎在胃故時有微熱喘冒不得卧也與大承氣湯以下燥屎食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之【二十九】得湯反劇者屬上焦也上焦主內胃為之市食穀欲嘔者胃不受也吳茱萸湯以溫胃氣得湯反劇者上焦不內也以治上焦法治之

吳茱萸湯方

吳茱萸壹升洗辛熱　人參叁兩甘溫　生薑陸兩切辛溫

大棗拾貳枚擘甘溫

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以緩脾

右肆味以水柒升煑取貳升去滓溫服柒合日叁服

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人

不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必鞕。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。渴者宜五苓散（三十）太陽病。脉陽浮陰弱為邪在表。今十餘日浮尺弱。邪氣漸傳裏。則發熱汗出。復惡寒者。表未解也。傳經之邪入裏。裏不和者。必嘔。此不嘔。但心下痞者。醫下之早。邪氣留于心下也。如其不下者。必漸不惡寒而渴。太陽之邪轉屬陽明也。若吐若下。若發汗後。小便數。大便鞕者。當與小承氣湯和之。此不因吐下發汗後。小便數。大便鞕。若是無滿實。雖不更衣十日。無所苦也。候津液還入胃中。小便數少。大便必自出也。渴欲飲水者。少少與之。以潤胃氣。但審邪氣所在。以法救之。如渴不止。與五苓散是也。脉陽微而汗出少者。為自和也。汗出多者。為太過。（脉陽微者。邪氣少。汗出少者。為適當。故自和。汗出多者。反損正氣。是汗出太過也。）陽脉實。因發其汗出多者。

亦為太過。太過為陽絕於裏。亡津液。大便因鞕也。（陽脉實者。表熱甚也。因發汗。熱乘虛。烝津液。外泄。汗出太過。汗出多者。亡其陽。陽絕於裏。胃氣燥。大便因鞕也。）脉浮而芤。浮為陽。芤為陰。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。（浮芤相搏。陰陽不諧。胃氣鬱冶。釀而生熱。消爍津液。其陽為絕。）趺陽脉浮而澁。浮則胃氣強。澁則小便數。浮澁相搏。大便則難。其脾為約。麻人丸主之（三）趺陽者。脾胃之脉。診浮為陽。知胃氣強。澁為陰。知脾為約。約者。儉約之約。又治家之約。內經曰。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸於膀胱。水精四布。五經並行。是脾主為胃行其津液者也。今胃強脾弱。約束津液。不得四布。但輸膀胱。致小便數。大便難。與脾約丸通腸潤燥。

麻人丸方

麻子人 貳升 甘平 芍藥 半斤 酸平 枳實 半斤炙 苦寒
大黃 壹觔去皮苦寒 厚朴 壹尺炙去皮苦温 杏仁 壹斤去皮尖熬別作脂甘温

內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也

右陸味為末煉蜜為丸桐子大飲服十丸日貳服漸加以知為度

太陽病三日發汗不解烝烝發熱者屬胃也調胃承氣湯主之 烝烝者如熱熏烝言甚熱也太陽病三日發汗不解則表邪已罷烝烝發熱胃熱為甚與調胃承氣湯下胃熱 傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯 內經曰諸脹腹大皆屬於熱熱在上焦則吐吐後不解復腹脹滿者邪熱入胃也與調胃承氣湯下其胃熱 太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯和之愈 吐下發汗皆損津液表邪乘虛傳裏大煩者邪在表也微煩者邪入裏也小便數大便因鞕者其脾為約也小承氣湯和之愈 得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大承氣湯 針經曰脉軟者病將下弱為陰脉當責邪在裏得病二三日脉弱是日數雖淺而邪氣已

入裏也。無太陽證為表證已罷。無柴胡證為無半表半裏之證。煩躁心下鞕者。邪氣內甚也。胃實熱甚則不能食。胃虛熱甚。至四五日雖能食。亦當與小承氣湯微和之。至六日則熱甚。與大承氣湯一升。若不大便六七日小便多者。為津液內竭。大便必鞕。則可下之。小便少者。則胃中水穀不別。必初鞕後溏。雖不能食。為胃實。以小便少。則未定成鞕。亦不可攻。須小便利屎定鞕。乃可攻之。傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此為實也。急下之。宜大承氣湯。〔云〕內經曰。諸脈者皆屬於目。傷寒六七日。邪氣入裏之時。目中不了了。睛不和者。邪熱內甚。上熏于目也。無表裏證。大便難者。裏實也。身大熱者。表熱也。身微熱者。裏熱也。針經曰。熱病目不明。熱不已者死。此目中不了了。睛不和。則證近危惡也。須急與大承氣湯下之。陽明發熱。汗多者。急下之。宜大承氣湯。〔毛〕邪熱入府。外發熱。汗多者。熱迫津液將渴。急與大承氣湯以下

其府熱。發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。發汗不解。邪熱傳入府而成腹滿痛者。傳之迅也。是須急下之。腹滿不減。減不足言當下之。宜大承氣湯。〔元〕腹滿不減。邪氣實也。經曰。大滿大實。目可除下之。大承氣湯下其滿實。若腹滿時減。非內實也。則不可下。金匱要畧曰。腹滿時減。後如故。此為寒。當與溫藥。是減不足言也。陽明少陽合病。必下利。其脉不負者。順也。負者。失也。互相尅賊。名為負也。脉滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。〔早〕陽明十。少陽水。二經合病。氣不相和。則必下利。少陽脉不勝。陽明不負。是不相尅為順也。若少陽脉勝。陽明脉負者。是鬼賊相尅為正氣失也。脉經曰。脉滑者為病食也。又曰。滑數則胃氣實。下利者。脉當微厥。今脉滑數。知胃有宿食。與大承氣湯以下除之。病人無表裏證。發熱七八日。雖脉浮

数者可下之假令已下脉数不解合熱則消穀喜饑至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯望七日邪入府之時病人無表裏證但發熱雖脉浮数亦可與大承氣湯下之浮為熱客于氣数為熱客于血下之邪熱去而浮数之脉相當解若下後数脉去而脉但浮則是榮血間熱併于衛氣間也當為邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴之證此下之後浮脉去而数不解即是衛氣與熱合于榮血間也熱氣合併迫血下行胃虚協熱消穀喜飢血至下焦若大便利者下血乃愈若六七日不大便則血不得行畜積于下為瘀血與抵當湯以下去之若脉数不解而下不止必脇熱而便膿血也下後脉数不解而不大便者是熱不得泄畜血于下為瘀血也若下後脉数不解而下利不止者為熱得下泄迫血下行必便膿血傷寒發汗已身目為黄所以然者以寒濕在裏不解故也以

為不可下也於寒濕中求之發黄要略曰黄家所起從濕得之汗出熱去則不能發黄發汗已身目為黄者風氣去濕氣在也脾惡濕濕氣内着脾色外奪者身目為黄若瘀血在裏發黄者則可下此以寒濕在裏故不可下當從寒濕法治之傷寒七八日身黄如橘子色小便不利腹微滿者茵蔯蒿湯主之望常熱甚之時身黄如橘子色是熱毒發泄於外内經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出小便不利小腹滿者熱氣甚于外而津液不得下行也與茵蔯湯利小便退黄逐熱傷寒身黄發熱者梔子蘗皮湯主之望傷寒身黄胃有瘀熱當須下去之此以發熱為熱未實與梔子蘗皮湯解散之

梔子蘗皮湯方

梔子壹拾伍箇　甘草壹兩　黄蘗貳兩

簡苦寒　甘平

右叁味以水肆升煮取壹升半去滓分温再服傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軺赤小豆湯主之濕熱相交民多病瘅瘅黃也傷寒為寒濕在表發黃為瘀熱在裏與麻黃連翹赤小豆湯除熱散濕

麻黃連軺赤小豆湯方

麻黃貳兩甘温去節　赤小豆壹升甘平　連軺貳兩連翹房也苦寒　杏仁肆拾箇甘温去皮尖　大棗拾貳枚甘温　生梓白皮壹升苦寒　生薑貳兩辛温切　甘草貳兩炙甘平

右柒味以潦水壹斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取叁升分温叁服半日服盡

內經曰濕上甚而熱治以苦温佐以甘辛以汗為故而止此之謂也又煎用潦水者亦取其水味薄則不助濕氣

已上捌味以潦水壹斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取叁升分温叁服半日服盡

辨少陽病脉證并治第九

少陽之病口苦咽乾目眩也足少陽膽經也內經曰口有病口苦者名曰胆瘅甲乙經曰瞻者中精之府五藏取決於瞻咽為之使少陽之脉起于目鋭眥少陽受邪故口苦咽乾目眩少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚少陽之脉起于目背走于耳中其支者下胸中貫膈風傷氣氣則為熱少陽中風氣壅而熱故耳聾目赤胷滿而煩邪在少陽為半表半裏以吐除煩吐則傷氣氣虛者悸以下除滿下則亡血血虛者驚傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則讝語此屬胃

胃和則愈胃不和則煩悸經曰三部俱弦者少陽受病脈細者邪漸傳裏雖頭痛發熱為表未解以邪客少陽為半在表半在裏則不可發汗發汗亡津液胃中乾燥少陽之邪因傳入胃必發讝語當與調胃承氣湯下之胃和則愈不下則胃為少陽木邪干之故煩而悸

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯(二)

太陽轉入少陽是表邪入干裏脇下鞕滿不能食往來寒熱者邪在半表半裏之間若已經吐下脈沉緊者邪陷入府為裏實尚未經吐下而脈沉緊為傳裏雖深未全入府外猶未解也與小柴胡湯以和之若已吐下發汗溫鍼讝語柴胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之(少陽之邪在表裏之間若妄吐下發汗溫鍼損耗津液胃中乾燥未邪干胃必發讝語若柴胡證不罷者則不為逆柴胡證罷者壞病也詳其因何治之逆以法救之)三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗(關脈以候少陽之氣太陽之脈浮陽明之脈大脈浮上關上知三陽合病膽熱則睡少陰病但欲眠睡目合則無汗以陰不得有汗三陽合病膽有熱也)傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故也(表為陽裏為陰邪在表則外有熱六七日邪氣入裏之時外無大熱內有躁煩者表邪傳裏也故曰陽去入陰)傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也(傷寒四日表邪傳裏裏不和則不能食而嘔今反能食而不嘔是邪不傳陰但在陽也)傷寒三日少陽脈小者欲已也(內經曰大則邪至小則平傷寒三日邪傳少陽脈當弦緊今脈小者邪氣微而欲已也)少陽病欲解時從寅至辰上(內經曰陽中之少陽通于春氣

寅卯辰。少陽木生之時。

釋音

廁 初吏切圊溷也　瘕 音假腹中久病　疸 音旦黃病　憒 古對切心亂也

怵 勑律切恐也　惕 音踢敬也又憂懼也　癉 丁賀切勞病也

註解傷寒論卷第五

註解傷寒論卷第六　仲景全書第十六

漢　長沙守　張仲景　述

晉　太醫令　王叔和　撰次

宋　聊攝人　成無已　註解

明　虞山人　趙開美　校句

辨太陰脉證并治第十

太陰之為病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胷下結鞕。太陰為病。陽邪傳裏也。太陰之脉布胃中。邪氣壅而為腹滿。上不得降者。嘔吐而食不下。下不得上者。自利益甚。時腹自痛。陰寒在內而為腹痛者。則為常痛。此陽邪干裏。雖痛而亦不常痛。但時時腹自痛也。若下之。則陰邪留於胷下。為結鞕。經曰。病發

於陰而反下之。因作痞。太陰中風。四肢煩疼。陽微陰澁而長者。為欲愈。太陰脾也。主營四末。太陰中風。四肢煩疼者。風淫末疾也。表邪少則微。裏向和則澁而長。長者陽也。陰病見陽脉則生。以陰得陽則解。故云欲愈。太陰病。欲解時。從亥至丑上。脾為陰主。王於丑亥子向王。故云解時。太陰病。脉浮者。可發汗。宜桂枝湯。〔一〕經曰浮為在表。沉為在裏。太陰病。脉浮者。邪在經也。故當汗散之。自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒。故也。當温之。宜服四逆輩。〔二〕自利而渴者。屬少陰。為寒在下焦。自利不渴者。屬太陰。為寒在中焦。與四逆等湯。以温其藏。傷寒脉浮而緩。手足自温者。繫在太陰。太陰當發身黄。若小便自利者。不能發黄。至八日。雖暴煩。下利日十餘行。必自止。以脾家實。腐穢當去故也。太陰病。至七八日。大便鞕者。為太陰入府。傳于陽明也。今至七八日暴煩。下利十餘行者。脾家實。腐穢去也。下利煩躁者死。此以脾氣和。逐邪下泄。故雖暴煩下利日十餘行。而利必自止。本太陽病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。〔三〕表邪未罷。醫下之。邪因乘虛傳于太陰。裏氣不和。故腹滿時痛。與桂枝湯以解表。加芍藥以和裏。大實痛者。桂枝加大黄湯主之。大實。大滿。自可除下之。故加大黄以除大實。太陰為病。脉弱。其人續自便利。設當行大黄芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱。易動故也。腹滿痛者。太陰病也。脉弱。其人續自便利。則邪雖在裏。未成大實。欲與大黄芍藥攻滿痛者。宜少與之。以胃氣尚弱。湯為動利也。

辨少陰病脉證并治第十一

少陰之為病。脉微細。但欲寐也。少陰為病。脉微細。為邪氣傳裏深也。衛氣行於陽則寤。行於陰則寐。邪傳少陰。則氣行於陰而不行於陽。故但欲寐。少陰病。欲吐不吐。心煩。但欲寐。五六日。自利而渴者。屬少陰也。虛故引水自救。若小便色白者。少陰病形悉具。小便白者。以下焦虛。有寒。不能制水。故令色白也。欲吐不吐。心煩者。表邪傳裏也。若腹滿痛。則屬太陰。此但欲寐。則知屬少陰。五六日。邪傳少陰之時。自利不渴者。寒在中焦。屬太陰。此自利而渴。為寒在下焦。屬少陰。腎虛水燥。渴欲引水自救。下焦虛寒。不能制水。小便色白也。經曰。下利欲飲水者。以有熱故也。此下利雖渴。然以小便色白。明非裏熱。不可不察。病人脉。陰陽俱緊。反汗出者。亡陽也。此屬少陰。法當咽痛。而復吐利。脉陰陽俱緊。為少陰寒。法當無汗。反汗出者。陽虛不固也。故云亡陽。以無陽陰獨。是屬少陰。內經曰。邪客少陰之絡。令人嗌痛。不可內食。少陰寒甚。是當咽痛而復吐利。少陰病。欬而下利。讝語者。被火氣劫故也。小便必難。以強責少陰汗也。欬而下利。裏寒而亡津液也。反以火劫強責少陰汗者。津液內竭。加火氣煩之。故讝語小便難也。少陰病。脉細沉數。病為在裏。不可發汗。少陰病始得之。反發熱。脉沉者。為邪在經。可與麻黃附子細辛湯發汗。此少陰病脉細沉數。為病在裏。故不可發汗。少陰病。脉微。不可發汗。亡陽故也。陽已虛。尺脉弱濇者。復不可下之。脉微為亡陽。表虛。不可發汗。脉弱濇為亡陰。裏虛。復不可下。少陰病。脉緊。至七八日自下利。脉暴微。手足反溫。脉緊反去者。為欲解也。雖煩下利。必自愈。少陰病。脉緊者。寒甚也。至七八日傳經盡。欲解之時。自下利。脉

暴微者寒氣得泄也若陰寒勝正陽虛而泄者則手足厥而脉緊不去今手足反温脉緊反去知陽氣復寒氣去故為欲解下利煩燥者逆此正勝邪微雖煩下利必自止少陰病下利若利自止惡寒而蜷卧手足温者可治少陰病下利惡寒蜷卧寒極而陰勝也利自止手足温者裏和陽氣得復故為可治少陰病惡寒而蜷時自煩欲去衣被者可治惡寒而蜷陰寒甚也時時自煩欲去衣被為陽氣得復故云可治少陰中風脉陽微陰浮者為欲愈少陰中風陽脉當浮而陽脉微者表邪緩也陰脉當沉而陰脉浮者裏氣和也陽中有陰陰中有陽陰陽調和故為欲愈少陰病欲解時從子至寅上一陽生于子子為陽丑為二陽寅為三陽少陰解于此者陰得陽則解也少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至灸少陰七壯經曰少陰病吐利躁煩四逆者死吐利手足不厥冷者則陽氣不衰雖反發熱不死脉不至者吐利暴虛也灸少陰七壯以通其脉少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也膀胱太陽也少陰太陽為表裏少陰病至八九日寒邪變熱復傳太陽太陽為諸陽主氣熱在太陽故一身手足盡熱太陽經多血少氣為熱所乘則血散下行必便血也少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治但厥無汗而強發之熱行於裏也而強發汗虛其經絡熱乘經虛迫血妄行從虛而出或從口鼻或從目出諸厥者皆屬于下但厥為下厥血亡于上為上竭傷氣損血邪甚正虛故為難治少陰病惡寒身蜷而利手足逆冷者不治針經曰多熱者易已多寒者難治此内外寒極純陰無陽故云不治少陰病吐利躁煩四逆者死吐利者寒甚于裏四

逆者。寒甚于表。躁煩。則陽氣欲絕。是便死矣。少陰病。下利止而頭眩。時時自冒者。死。下利止。則水穀竭。眩冒。則陽氣脫故死。少陰病。四逆惡寒。而身踡。脉不至。不煩而躁者。死。四逆惡寒。而身踡。則寒甚。脉不至。則真氣絕。煩。熱也。躁。亂也。若憤躁之躁。從煩至躁。為熱來有漸。則猶可。不煩而躁。是氣欲脫而爭也。譬猶燈將滅而暴明。其能久乎。少陰病。六七日。息高者。死。腎為生氣之源。呼吸之門。少陰病六七日不愈。而息高者。生氣斷絕也。少陰病。脉微細沉。但欲卧。汗出不煩。自欲吐。至五六日自利。復煩躁。不得卧寐者。死。陰氣方盛。至五六日傳經盡。陽氣得復。則愈。反更自利。煩躁不得卧寐。則正氣弱。陽不能復。病勝藏故死。少陰病。始得之。反發熱。脉沉者。麻黃附子細辛湯主之。[一]少陰病。當無熱惡寒。反發熱者。邪在表也。雖脉沉。以始得。則邪氣未深。亦當溫劑發汗以散之。

麻黃附子細辛湯方

麻黃貳兩去節甘熱　細辛貳兩辛熱　附子壹枚炮去皮破捌片辛熱

內經曰。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。以辛潤之。麻黃之甘。以解少陰之寒。細辛附子之辛。以溫少陰之經。

右叁味。以水壹斗。先煑麻黃。減貳升。去上沫。內藥煑取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。

少陰病。得之二三日。麻黃附子甘草湯。[二]發微汗。以二三日無證。故微發汗也。二三日。邪未深也。既無吐利厥逆諸裏證

則可與麻黃附子甘草湯微汗以散之。

麻黃附子甘草湯方

麻黃貳兩去節　甘草貳兩炙　附子壹枚炮去皮

麻黃甘草之甘以散表寒。附子之辛以溫經氣。

右叁味。以水柒升。先煮麻黃壹兩沸。去上沫。內諸藥煮取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。

少陰病得之二三日以上。心中煩不得卧。黃連阿膠湯主之。三脉經曰。風傷陽。寒傷陰。少陰受病。叫得之于寒。二三日已上。寒極變熱之時。熱煩于內。心中煩不得卧也。與黃連阿膠湯。扶陰散熱。

黃連阿膠湯方

黃連肆兩苦寒　黃芩壹兩苦寒　芍藥貳兩酸平

雞子黃貳枚甘温　阿膠叁兩甘温

陽有餘以苦除之。黃芩黃連之苦以除熱。陰不足以甘補之。雞黃阿膠之甘以補血。酸收也。泄也。芍藥之酸收陰氣而泄邪熱。

右伍味。以水伍升。先煮叁物。取貳升。去滓。內膠烊盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫服柒合。日叁服。

少陰病得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之附子湯主之。四少陰客熱則口燥舌乾而渴。口中和者。不苦不燥。是無熱也。背為陽。背惡寒者。陽氣弱。陰氣勝也。經曰。無熱惡寒者。發於陰也。灸之助陽消陰。與附子湯溫經散寒。

附子湯方

附子 貳枚 破八片 去皮辛熱　茯苓 叁兩 甘平　人參 貳兩 甘溫

白朮 肆兩 甘溫　芍藥 叁兩 酸平

辛以散之。附子之辛以散寒。甘以緩之。茯苓人參白朮之甘以補陽。酸以收之。芍藥之酸以扶陰。所以然者。偏陰偏陽。則為病。火欲實。水當平之。不欲偏勝也。

右伍味。以水捌升。煮取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。

少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脉沉者。附子湯主之 五

少陰腎水而主骨節。身體疼痛。支冷。脉沉者。寒成於陰也。身疼骨痛者。脉浮。手足熱。則可發汗。此手足寒。脉沉。故當與附子湯溫經。少陰病下利便膿血者。桃花湯主之 六

陽病下利。便膿血者。協熱也。少陰病下利。便膿血者。下焦不約而裹寒也。與桃花湯。固下散寒。

桃花湯方

赤石脂 壹斤 壹半全用 壹半篩末 甘溫　乾薑 壹兩 辛熱

粳米 壹升 甘平

濇可去脫。赤石脂濇以固腸胃。辛以散寒。乾薑之辛以散裏寒。粳米之甘以補正氣。

右叁味。以水柒升。煮米令熟。去滓。溫服柒合。內赤石脂末方寸匕。日叁服。若壹服愈。餘勿服。

少陰病。二三日至四五日。腹痛。小便不利。下利不止。便膿血者。桃花湯主之 七

二三日以至四五日。寒邪入裏深也。腹痛

秉寒也。小便不利者。水穀不別也。下利不止。便膿血者。腸胃虛弱。下焦不固也。與桃花湯。固腸止利也。少陰病。下痢便膿血者。可刺。下焦血氣晉聚。腐化則為膿血。刺之以利下焦。宣通血氣。少陰病。吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。吐利手足厥冷。則陰寒氣甚。煩躁欲死者。陽氣內爭與吳茱萸湯助陽散寒。少陰病。下痢。咽痛。胸滿心煩者。猪膚湯主之。少陰之脈。從腎上貫肝膈。入肺中。則循喉嚨。其支別者。從肺出絡心。注胸中。和自陽經傳于少陰。陰虛客熱。下利。咽痛。胸滿心煩也。與猪膚湯。調陰散熱。

猪膚湯方

猪膚 壹斤 甘寒

猪水畜也。其氣先入腎。少陰客熱。是以猪膚餅之。加白蜜以潤燥除煩。白粉以益氣斷利。

右壹味。以水壹斗。煮取伍升。去滓。加白蜜壹升。白粉伍合。熬香。和相得。溫分陸服。

少陰病。二三日。咽痛者。可與甘草湯。不差者。與桔梗湯。

陽邪傳于少陰。邪熱為咽痛。服甘草湯若不差。與桔梗湯以和少陰之氣。則差。若寒熱相搏。為咽痛者。服甘草湯。

甘草湯方

甘草 貳兩

右壹味。以水叁升。煮取壹升半。去滓。溫服柒合。日貳服。

桔梗湯方

桔梗壹兩辛甘微温　甘草貳兩甘平

桔梗辛温。以散寒。甘草味甘平。以除熱。甘梗相合。以調寒熱。

右貳味。以水叁升。煮取壹升。去滓。分温再服。

少陰病。咽中傷生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。十一熱傷於絡。則經絡乾燥。使咽中傷生瘡。不能言語。聲不出者。與苦酒湯。以解絡熱。愈咽瘡。

苦酒湯方

半夏洗破如棗核大拾肆枚辛温　雞子壹枚去黃内上苦酒著雞子殼中甘微寒

辛甘散之。半夏之辛。以發音聲。甘以緩之。雞子之甘。以緩咽痛。酸以收之。苦酒之酸。以斂咽瘡。

右貳味。内半夏著苦酒中。以雞子殼置刀鐶中。安火上。令三沸。去滓。少少含嚥之。不差。更作三劑。

少陰病。咽中痛。半夏散及湯主之。十二甘草湯主少陰客熱咽痛。桔梗湯主少陰寒熱相搏。咽痛。半夏散及湯。主少陰客寒咽痛也。

半夏散及湯方

半夏洗辛温　桂枝去皮辛熱　甘草炙甘平　已上各等分

内經曰。寒淫所勝。平以辛熱。佐以甘苦。半夏桂枝之辛。以散經寒。甘草之甘。以緩正氣。

已上叁味。各別搗篩已。合治之。白飲和服方寸匕。日叁服。若不能散服者。以水壹升。煎柒沸。内

散兩方寸匕。更煎叁沸。下火。令小冷。少少嚥之。

少陰病。下利。白通湯主之。[十三] 少陰主水。少陰客寒。不能制水。故自利也。白通湯溫裏散寒。

白通湯方

葱白肆莖辛溫　乾薑壹兩辛熱　附子壹枚生用去皮破捌片辛熱

內經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。葱白之辛。以通陽氣。薑附之辛。以散陰寒。

右叁味。以水叁升。煑取壹升。去滓。分溫再服。

少陰病。下利脉微者。與白通湯。利不止。厥逆無脉。乾嘔煩者。白通湯加猪膽汁湯主之。[十四] 服湯。脉暴出者死。微續者生。少陰病。下利脉微。為寒極陰勝。與白通湯復陽散寒。服湯利不止。厥逆無脉。乾嘔煩者。寒氣太甚。內為格拒。陽氣逆亂也。與白通湯。加猪膽汁湯以和之。內經曰。逆而從之。從而逆之。又曰。逆者正治。從者反治。此之謂也。服湯脉暴出者。正氣因發泄而脫也。故死。脉微續者。陽氣漸復也。故生。

白通加猪膽汁方

葱白肆莖　乾薑壹兩　附子壹枚生去皮破捌片

人尿伍合醎寒　猪膽汁壹合苦寒

內經曰。若調寒熱之逆。令熱必行。則熱物冷服。下嗌之後。冷躰既消。熱性便發。由是病氣隨愈。嘔噦皆除。情且不違而致大益。此和人尿猪膽汁。鹹苦寒物于白通湯熱劑中。要其氣相從。則可以去格拒之寒也。

已上叁味。以水叁升。煑取壹升。去滓。內膽汁人尿。和令相得。分溫再服。若無膽。亦可用。

少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此為有水氣。其人或欬。或小便利。或下利。或嘔者。真武湯主之。【十五】少陰病二三日。則邪氣猶淺。至四五日。邪氣已深。腎主水。腎病不能制水。水飲停為水氣。腹痛者。寒濕內甚也。四肢沉重疼痛。寒濕外甚也。小便不利。自下利者。濕勝而水穀不別也。內經曰。濕勝則濡泄。與真武湯。益陽氣。散寒濕。

真武湯方

茯苓叁兩甘平　芍藥叁兩酸平　生薑叁兩切辛溫

白朮貳兩甘溫　附子壹枚炮去皮破捌片辛熱

脾惡濕。甘先入脾。茯苓白朮之甘。以益脾逐水。寒淫所勝。平以辛熱。濕淫所勝。佐以酸平。附子芍藥生薑之酸辛。以溫經散濕。

右伍味。以水捌升。煑取叁升。去滓。溫服。柒合。日叁服。後加減法。

若欬者。加五味子半升。細辛乾薑各壹兩。氣逆欬者。五味子之酸。以收逆氣。水寒相搏則欬。細辛乾薑之辛。以散水寒。若小便利者。去茯苓。小便利則無伏水。故去茯苓。若下利者。去芍藥。加乾薑貳兩。芍藥之酸。泄氣。乾薑之辛。散寒。若嘔者。去附子。加生薑。足前成半斤。氣逆則嘔。附子補氣。生薑散氣。千金曰。嘔家多服生薑。此為嘔家勝藥。少陰病。下

利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脉微欲絶。身反不惡寒。其人面赤色。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止。脉不出者。通脉四逆湯主之。【十六】下利清穀。手足厥逆。脉微欲絶。為裏寒。身熱不惡寒。面色赤。為外熱。此陰甚于內。格陽於外。不相通也。與通脉四逆湯。散陰通陽。

通脉四逆湯方

甘草貳兩炙　附子大者壹枚生用去皮破剉片

乾薑叁兩強人可肆兩

右叁味。以水叁升。煑取壹升貳合。去滓。分溫再服。其脉即出者愈。

面色赤者。加葱玖莖。葱味辛。以通陽氣。腹中痛者。去葱。加芍藥貳兩。芍藥之酸。通寒利腹中痛。為氣不通也。嘔者加生薑貳兩。辛以散之。嘔為氣不散也。咽痛者去芍藥。加桔梗壹兩。咽中如結。加桔梗則能散之。利止。脉不出者。去桔梗。加人參貳兩。利止脉不出者。亡血也。加人參以補之。經曰。脉微而利。亡血也。四逆加人參湯主之。久病皆與方相應者。乃可服之。少陰病。四逆。其人或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。【十七】四逆者。四肢不溫也。傷寒邪在三陽。則手足必熱。傳到太陰。手足自溫。至少陰。則邪熱漸深。故四肢逆而不溫也。及至厥陰。則手足厥冷。是又甚於逆。四逆散。傳陰之熱也。

四逆散方

甘草炙甘平　枳實破水漬炙乾苦寒　柴胡苦寒

芍藥酸微寒

內經曰。熱淫於內。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。枳實甘草之苦。以泄裏熱。芍藥之酸。以收陰氣。柴胡之苦。以發表熱。

右肆味。各拾分。搗篩。白飲和。服方寸匕。日參服。欬者。加五味子乾薑各伍分。并主下痢。肺寒氣逆則欬。五味子之酸。以收逆氣。乾薑之辛。散肺寒。并主下痢者。肺與大腸為表裏。上欬下痢。治則頗同。悸者。加桂枝伍分。悸者。氣虛而不能通行。心下築築然悸動也。桂枝猶主也。引導陽氣若熱以使。小便不利者。加茯苓伍分。茯苓味甘而淡。用以滲泄腹中痛者。加附子壹枚。炮令坼。裏虛遇邪則痛。加附子以補虛。泄利下重者。先以水伍升。煮薤白取參升。去滓。以散參方寸匕內湯中。煮取壹升半。分溫再服。泄利下重者。下焦氣滯也。加薤白以泄氣滯。

少陰病。下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠者。豬苓湯主之。

下利不渴者。裏寒也。經曰。自利不渴者。屬太陰。以其藏寒故也。此下利嘔渴。知非寒。心煩不得眠。知惡熱也。與豬苓湯滲泄小便。分別水穀。經曰。渴不止者。當利其小便。此之謂歟。

少陰病。得之二三日。口燥咽乾者。急下之。宜大承氣湯。

傷寒傳經五六日。邪傳少陰。則口燥舌乾而渴。為邪漸深也。今少陰病得之二三日。邪氣未深入之時。便作口燥咽乾者。是邪熱已甚。腎水乾也。急與大承氣湯下之。以全腎也。

少陰病。自利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。急下之。宜大承氣湯。

少陰腎水也。青。肝色也。自利色青。為肝邪乘腎。難經曰。從前來者為實邪。以腎藏實邪。必心下痛。口乾燥也。與大承氣湯以下實邪。

病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯三
此少陰入府也六七日少陰之邪入府之時陽明內熱壅甚腹滿不大便也陽明病土勝腎水則乾急與大承氣湯下之以救腎水少陰病脉沉者急温之宜四逆湯三
既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絶者不云急温此少陰有脉沉而云急温者彼雖寒甚然而證已形見於外治之則有成法此初頭脉沉未有形證不知邪氣所之將發何病是急與四逆湯温之少陰病飲食入口則吐心中温温欲吐不吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急温之宜四逆湯三
陽寒表邪傳裏至於少陰少陰之脉從肺出絡心注胸中邪既留於胸中而不散者飲食入口則吐心中温温欲吐陽受氣於胃中邪既留於胸中則陽氣不得宣發於外是以始得之手足寒脉弦遲此是胃中實不可下而當吐其膈上有寒飲乃使人心中温温和手足寒吐則物出嘔則物不出時與嘔別焉胃中實則吐而物出若膈上有寒飲則但乾嘔而不吐也此不可吐可與四逆湯以温其膈少陰病下利脉微濇嘔而汗出必數更衣反少者當温其上灸之脉微為亡陽濇為亡血下利嘔而汗出亡陽亡血也津液不足裏有虛寒必數更衣反少者温其上以助其陽也灸之以消其陰

辨厥陰病脉證并治第十二

厥陰之為病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不欲食食則吐蚘下之利不止邪傳厥陰則熱已深也邪自太陽傳至太陰則腹滿而嗌乾未成渴也邪至少陰者口燥舌乾而渴未成消也至厥陰成消渴者熱甚飲消水故也

飲水多而小便少者。謂之消渴。木生於火。肝氣通心。厥陰客熱氣上撞心。心中疼熱。傷寒六七日。厥陰受病之時。為傳經盡。則當入府。胃虛客熱。饑不欲食。蚘在胃中。無食則動。聞食嗅而出。得食吐蚘。此熱在厥陰經也。若便下之。虛其胃氣。厥陰木邪相乘。必吐下不止。厥陰中風。脉微浮。為欲愈。不浮。為未愈。經曰。陰病見陽脉而生。浮者陽也。厥陰中風。脉微浮為邪氣還表。向汗之時。故云欲愈。厥陰病。欲解時。從丑至卯上。厥陰木也。主於卯。丑寅向王。故為解時。厥陰病。渴欲飲水者。少少與之愈。邪至厥陰。為傳經盡。欲汗之時。渴欲得水者。少少與之。胃氣得潤則愈。諸四逆厥者。不可下之。虛家亦然。四逆者。四肢不溫也。厥者。手足冷也。皆陽氣少而陰氣多。故不可下。虛家亦然。下之。是為重虛。金匱玉函曰。虛者十補。勿一瀉之。傷寒先厥後發熱而利者。必自止。見厥復利。陰氣勝。則厥逆而利。陽氣復。則

發熱。利必自止。見厥。則陰氣還勝而復利也。傷寒始發熱六日。厥反九日而利。凡厥利者。當不能食。今反能食者。恐為除中。食以索餅不發熱者。知胃氣尚在。必愈。恐暴熱來出而復去也。後三日脉之。其熱續在者。期之旦日夜半愈。所以然者。本發熱六日。厥反九日。復發熱三日。并前六日。亦為九日。與厥相應。故期之旦日夜半愈。後三日脉之而脉數。其熱不罷者。此為熱氣有餘。必發癰膿也。始發熱。邪在表也。至六日邪傳厥陰。陰氣勝者。作厥而利。厥反九日。陰寒氣多。當不能食。而反能食者。恐為除中。除去也。中。胃氣也。言邪氣太甚。除去胃氣。胃欲飲食自救。故暴能食。此欲勝也。食以索餅試之。若胃氣絕。得麪則必發熱。若不發熱者。胃氣

尚在也恐是寒極變熱因暴熱來而復去使之能食非除中也金匱要畧曰病人素不能食而反暴思之必發熱後三日脉之其熱續在者陽氣勝也期之旦日或夜半愈若旦日不愈後三日胖數而熱不罷者為熱氣有餘必發癰膿經曰數脉不時則生惡瘡傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死傷寒脉遲六七日為寒氣已深反與黃芩湯寒藥兩寒相搏腹中當冷冷不消穀則不能食反能食者除中也四時皆以胃氣為本胃氣已絕故云必死傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗而利必自止若不止必便膿血者其喉不痺傷寒先厥而利陰寒氣勝也寒極變熱後發熱下利必自止而反汗出咽中痛其喉為痺者熱氣上行也發熱無汗而利必自止利不止必便膿血者熱氣下行也熱氣下而不上其喉亦不痺也傷寒一二日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤前厥後發熱者寒極生熱也前熱後厥者陽氣內陷也厥深熱深厥微熱微陽氣陷之深淺也熱之伏深必須下去之反發汗者引熱上行必口傷爛赤內經曰心氣內發上為口糜傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈陰勝則厥陽勝則熱先厥五日為陰勝至六日陽復勝熱亦五日後復厥者陰復勝若不厥為陽全勝故自愈經曰發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病為愈凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是

也。手之三陰三陽。相接於手十指。足之三陰三陽。相接於足十指。陽氣內陷。陽不與陰相順接。故手足為之厥冷也。傷寒脉微而厥。至七八日膚冷。其人躁無暫安時者。此為藏厥。非為蚘厥也。蚘厥者。其人當吐蚘。令病者靜。而復時煩。此為藏寒。蚘上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔又煩者。蚘聞食臭出。其人當自吐蚘。蚘厥者。烏梅圓主之。[一]又主久利方。藏厥者死。陽氣絕也。蚘厥。雖厥而煩。吐蚘已則靜。不若藏厥而躁。無暫安時也。病人藏寒。胃虛。蚘動上膈。聞食臭出。因而吐蚘。與烏梅圓。溫藏安蟲。

烏梅圓方

烏梅 叁百箇 味酸溫　細辛 陸兩 辛熱　乾薑 拾兩 辛熱

黃連 壹斤 苦寒　當歸 肆兩 辛溫　附子 陸兩 炮 辛熱

蜀椒 肆兩去汗 辛熱　桂枝 陸兩 辛熱　人參 陸兩 甘溫

黃蘗 陸兩 苦寒

肺主氣。肺欲收。急食酸以收之。烏梅之酸。以收陽氣。脾欲緩。急食甘以緩之。人參之甘。以緩脾氣。寒淫於內。以辛潤之。以苦堅之。當歸桂椒細辛之辛。以潤內寒。寒淫所勝。平以辛熱。薑附之辛熱。以勝寒。蚘得甘則動。得苦則安。黃連黃蘗之苦。以安蚘。

右拾味。異搗篩合治之。以苦酒浸烏梅壹宿。去核。蒸之伍升米下。飯熟。擣成泥。和藥。令相得。內臼中。與蜜杵貳千下。員如梧桐子大。先食飲。服拾圓。日叁服。稍加至貳拾圓。禁生冷滑物臭食

等。

傷寒熱少厥微指頭寒。默默不欲食。煩躁數日小便利色白者。此熱除也。欲得食。其病為愈。若厥而嘔。胷脇煩滿者。其後必便血。指頭寒者是厥微熱少也。默默不欲食煩躁者。邪熱初傳裏也。數日之後。小便色白。裏熱去。欲得食為胃氣已和。其病為愈。厥陰之脉挾胃貫膈布脇肋。厥而滿。胷脇煩滿者。傳邪之熱甚於裏也。厥陰肝主血。後數日熱不去。又不得外泄。迫血下行。必致便血。病者手足厥冷。言我不結胷。小腹滿按之痛者。此冷結在膀胱關元也。手足厥。不結胷者。無熱也。小腹滿按之痛下焦冷結也。傷寒發熱四日。厥反三日。復熱四日。厥少熱多。其病當愈四日至七日。熱不除者。其後必便膿血。先熱後厥者陽氣邪傳裏也。發熱為邪氣在表。至四日後厥者傳之陰也。後三日復傳陽經則復熱。厥少則邪微熱多。為陽勝。其病為愈。至七日傳經盡。熱除則愈。熱不除者。為熱氣有餘。內搏厥陰之血。其後必便膿血。傷寒厥四日。熱反三日。復厥五日。其病為進。寒多熱少。陽氣退。故為進也。傷寒。陰勝者先厥。至四日。邪傳裏重。陰必陽却熱三日。七日傳經盡。當愈。若不愈而復厥者。傳作再經。至四日。則當復熱。若不復熱。至五日厥不除者。陰勝於陽。其病進也。傷寒六七日。脉微。手足厥冷。煩躁。灸厥陰。厥不還者。死。傷寒六七日。則正氣當復。邪氣當罷。脉浮身熱。為欲解。若反脉微而厥。則陰勝陽也。煩躁者。陽虛而爭也。灸厥陰。以復其陽。厥不還。則陽氣已絕。不能復正而死。傷寒發熱。下利厥逆。躁不得臥者。死。傷寒發熱。下利厥逆。陽氣虛也。躁不得臥者。病勝藏也。故死。傷寒發熱。下

利至甚厥不止者死（金匱要略曰六府氣絕於外者手足寒五藏氣絕於內者利下不禁傷寒發熱為邪氣獨甚下利至甚厥不止為府藏氣絕故死）傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也（傷寒至七日為邪正爭之時正勝則生邪勝則死始不下利而暴忽發熱下利汗出不止者邪氣勝正陽氣脫也故死）傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此為亡血下之死（傷寒五六日邪氣當作裏實之時若不結胸而腹濡者裏無熱也脈虛者亡血也復厥者陽氣少也不可下下之為重虛故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕）發熱而厥七日下利者為難治（發熱而厥邪傳裏也至七日傳經盡則正氣勝邪當汗出而解反下利則邪氣勝裏氣虛則為難治）傷寒脈促手足厥逆者可灸之（脈促則為陽虛不相續厥逆則為陽虛不相接灸之以助陽氣）傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之（滑為陽厥氣內陷是裏熱也與白虎湯以散裏熱也）手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之（手足厥寒者陽氣外虛不溫四末脈細欲絕者陰血內弱脈行不利與當歸四逆湯助陽生陰也）

當歸四逆湯方

當歸叁兩（辛溫）桂枝叁兩（辛熱）芍藥叁兩（酸寒）

細辛叁兩（辛熱）大棗貳拾伍箇（甘溫）通草貳兩（甘平）

甘草貳兩炙（甘平）

（內經曰脈者血之府也諸血者皆屬心通脈者必先補心益血苦先入於心當歸之苦以助心血心苦緩急食甘以緩之大棗甘草通草之甘以緩陰血）

右柒味。以水捌升。煮取叁升。去滓。温服壹升。日叁服。

若其人內有久寒者。宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。四茱萸辛温以散久寒。生薑辛温以行陽氣。大汗出。熱不去。內拘急四肢疼。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯主之。五大汗出則熱當去。熱反不去者。亡陽也。內拘急下利者。裏甚於表。與四逆湯復陽散寒。大汗若大下利而厥冷者。四逆湯主之。六大汗若大下利內外雖殊。其亡津液損陽氣則一也。陽虛陰勝。故生厥逆。與四逆湯固陽退陰。病人手足厥冷。脉乍緊者。邪結在胷中。心中滿而煩。饑不能食者。病在胷中。當須吐之。宜瓜蒂散。

手足厥冷者。邪氣內陷也。脉緊牢者。為實。邪氣入府。則脉沉。今脉乍緊。知邪結在胷中為實。故心下滿而煩。胃中無邪。則喜飢。以病在胷中。雖飢而不能食。與瓜蒂散。以吐胷中之邪。傷寒厥而心下悸者。宜先治水。當服茯苓甘草湯。七却治其厥。不爾。水漬入胃。必作利也。金匱要畧曰。水停心下。甚者則悸。厥雖寒。勝。熱以心下悸。為水。飲內甚。先與茯苓甘草湯。治其水。而後治其厥。若先治厥。則水飲浸漬入胃。必作下利。傷寒六七日。大下後。寸脉沉而遲。手足厥逆。下部脉不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者。為難治。麻黄升麻湯主之。九傷寒六七日。邪傳厥陰之時。大下之後。下焦氣虛。陽氣內陷。寸脉遲而手足厥逆。下部脉不至。厥陰之脉。貫膈上注肺。循喉嚨。在厥陰。隨經射肺。因亡津液。遂成肺痿。咽喉不利。而唾膿血也。金匱要畧曰。肺痿之病。從何得之。被快藥下利。重亡

津液。故得之。若泄利不止者。為裏氣大虛。故云難治。與麻黃升麻湯。以調肝肺之氣。

麻黃升麻湯方

麻黃貳兩半去節甘溫　升麻壹兩壹分甘平　當歸壹兩壹分辛溫　知母苦寒　黃芩苦寒　萎蕤甘平各拾捌銖　石膏碎綿裹甘寒　白朮甘溫　乾薑辛熱　芍藥酸平　天門冬去心甘平　桂枝辛熱　茯苓甘平　甘草炙甘平各陸銖

玉函曰。大熱之氣。寒以取之。甚熱之氣。以汗發之。麻黃升麻之甘。以發浮熱。正氣虛者。以辛潤之。當歸桂薑之辛。以散寒。上熱者。以苦泄之。知母黃芩之苦。涼心去熱。津液少者。以甘潤之。茯苓白朮之甘。緩脾生津。肺燥氣熱。以酸收之。以甘緩之。芍藥之酸。以斂逆氣。萎蕤門冬石膏甘草之甘。潤肺除熱。

右拾肆味。以水壹斗。先煑麻黃壹兩沸。去上沫。內諸藥。煑取叁升。去滓。分溫叁服。相去如炊叁斗米頃。令盡汗出。愈。

傷寒四五日。腹中痛。若轉氣下趣少腹者。此欲自利也。傷寒四五日。邪氣傳裏之時。腹中痛。轉氣下趣少腹者。裏虛遇寒。寒氣下行。欲作自利也。

傷寒本自寒。下醫復吐下之。寒格更逆吐下。若食入口即吐。乾薑黃連黃芩人參湯主之。十 傷寒邪自傳表。為本自寒。下醫反吐下。損傷正氣。寒氣內為格拒。經曰。格則吐逆。食入口即吐。謂之寒格。更復吐下。則重虛而死。是更逆吐下。與乾薑黃連黃芩人參湯以通寒格。

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑辛熱　黃連苦寒　黃芩苦寒　人參甘溫各參兩

辛以散之甘以緩之乾薑人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格

右肆味以水陸升煑取貳升去滓分溫再服

下利有微熱而渴脉弱者今自愈下利陰寒之疾反大熱者逆有微熱而渴裏氣方溫也經曰諸弱發熱脉弱者陽氣得復也今必自愈下利脉數有微熱汗出今自愈設復緊為未解下利陰病也脉數陽脉也陰病見陽脉者生微熱汗出陽氣得通也利必自愈諸緊為寒設復脉緊陰氣猶勝故云未解下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘者死下利手足厥逆無脉者陰氣獨勝陽氣太虛也灸之陽氣復手足溫而脉還為欲愈若手足不溫脉不還者陽已絕也反微喘者陽氣脫也少陰負趺陽者為順也少陰腎水趺陽脾土下利為腎邪干脾水不勝土則為微邪故為順也下利寸脉反浮數尺中自濇者必清膿血下利者脉當沉而遲反浮數者裏有熱也濇為無血尺中自濇者腸胃血散也隨利下必便膿血清與圓通脉經曰清者厠也下利清穀不可攻表汗出必脹滿下利者脾胃虛也胃為津液之主發汗亡津液則胃氣愈虛必脹滿下利脉沉弦者下重也脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖發熱不死沉為在裏弦為拘急裏氣不足是主下重大則病進此利未止脉微弱數者邪氣微而陽氣復為欲自止雖發熱止由陽勝非大逆也下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必欝冒汗出而解病人必微厥所以然者其

面戴陽。下虛故也。下利清穀。脉沉而遲。裏有寒也。面少赤。身有微熱。表未解也。病人微厥。針經曰。下虛則厥。表邪欲解。臨汗之時。以裏先虛。必鬱冒。然後汗出而解也。下利脉數而渴者。今自愈。設不差。必清膿血。以有熱故也。經曰。脉數不解。而下不止。必脇熱便膿血也。下利後脉絕。手足厥冷。晬時脉還。手足溫者。生。脉不還者。死。下利後。脉絕。手足厥冷者。無陽也。晬時。周時也。周時厥愈。脉出為陽氣復。則得生。若手足不溫。脉不還者。為陽氣絕。則見死也。傷寒下利。日十餘行。脉反實者。死。下利者。裏虛也。脉當微弱。反實者。病勝藏也。故死。難經曰。脉不應病。病不應脉。是為死病。下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脉四逆湯主之。十一下利清穀。為裏寒。身熱不解。為外熱。汗出。陽氣通行於外。則未當厥。其汗出而厥者。陽氣大虛也。與通脉四逆湯。以固陽氣。熱利下利欲飲水者。以有熱故也。白頭翁湯主之。十四用前第十二方

下利讝語者。有燥屎也。宜小承氣湯。方十五。

大黃四兩酒洗　枳實三枚炙　厚朴二兩去皮炙

右三味。以水四升。煑取一升二合。去滓。分二服。初一服讝語止。若更衣者。停後服。不爾。盡服之。

下利後更煩。按之心下濡者。為虛煩也。宜梔子豉湯。方十六。

肥梔子十四箇擘　香豉四合綿裹

右二味。以水四升。先煑梔子。取二升半。內豉。更

煮取一升半。去滓。分再服。一服得吐。止後服。嘔家有癰膿者。不可治。嘔膿盡自愈。

嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥者難治。四逆湯主之。十七。用前第五方

乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。方十八。

吳茱萸一升洗七遍　人參三兩　大棗十二枚擘　生薑六兩切

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。

一日發熱者。小柴胡湯主之。方十九。

涎沫頭痛者吳茱萸湯主之 大乾嘔吐涎沫者。寒也。頭痛者。寒氣上攻也。與吳茱萸湯溫裏散寒。嘔而發熱者。小柴胡證具。傷寒大吐大下之極虛。復極汗出者。以其人外氣怫鬱。復與之水。以發其汗。因得噦。所以然者。胃中寒冷故也。大吐大下。胃氣極虛。復極發汗。又亡陽氣。外邪怫鬱於表。則身熱。醫與之水。以發其汗。胃虛得水。虛寒相搏。成噦也。傷寒噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之則愈。噦而腹滿氣上而不下也。視其前後部有不利者。即利之。以降其氣。前部小便也。後部者。大便也。

釋音

蹉音拳不伸也　憤扶粉切懣也　惡溫上烏路切耻也憎也　撞宅江切擊也

註解傷寒論卷第六

註解傷寒論卷第七

仲景全書第十七

漢　長沙守　張仲景　述

晉　太醫令　王叔和　撰次

宋　聊攝人　成無已　註解

明　虞山人　趙開美　校句

辨霍亂病脉證并治第十三

問曰。病有霍亂者何。荅曰。嘔吐而利。名曰霍亂。三焦者水穀之道路。邪在上焦則吐而不利。邪在下焦則利而不吐。邪在中焦則既吐且利。以飲食不節。寒熱不調。清濁相干。陰陽乖隔。遂成霍亂。輕者止曰吐利。重者揮霍撩亂。名曰霍亂。問曰。病發熱。頭痛。身疼。惡寒。吐利者。此屬何病。荅曰。此名

霍亂自吐下又利止復更發熱也發熱頭痛身疼惡寒若本是傷寒因邪入裏傷於胃胃上吐下利令為霍亂利止裏和復更發熱者還是傷寒必汗出而解傷寒其脉微澁者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬陽明也便必鞕十三日愈所以然者經盡故也微為亡陽澁為亡血傷寒脉微澁則本是霍亂吐利亡陽亡血吐利止傷寒之邪未已還是傷寒却四五日邪傳陰經之時裏虛邪必作自利本嘔者邪甚於上又利者邪甚於下先霍亂裏氣太虛又傷寒之邪再傳為吐利是重虛也故為不治若欲似大便而反失氣仍不利者利為虛不利為實欲大便而反失氣裏氣熱也此屬陽明便必鞕也十三日愈者傷寒六日傳過三陰二陽後六日再傳經盡則陰陽之氣和大邪之氣去而愈也

下利後當便鞕鞕則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也下利後亡津液當便鞕能食為胃和必自愈不能食者為未和到後經中為復過一經言七日後再經也頗能食者胃氣方和過一日當愈不愈者暴熱使之能食非陽明氣和也惡寒脉微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之一惡寒脉微而利者陽虛陰勝也利止則津液內竭故云亡血金匱玉函曰水竭則無血與四逆湯溫經助陽加人參生津液益血霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之三頭痛發熱則邪自風寒而來中焦為寒熱相半之分邪稍高者居陽分則為熱熱多欲飲水者與五苓散以散之邪稍下者居陰分則為寒寒多不用水者與理中丸溫之

理中丸方

人參甘溫　甘草甘平炙　白朮甘溫　乾薑辛熱已上各叁兩

內經曰脾欲緩急食甘以緩之用甘補之人參白朮甘草之甘以緩脾氣調中寒淫所勝平以辛熱乾薑之辛以溫胃散寒

右肆味搗篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合和壹丸研碎溫服之日叁服夜貳服腹中未熱益至叁肆丸然不及湯湯法以肆物依兩數切用水捌升煑取叁升去滓溫服壹升日叁服加減法

若臍上築者腎氣動也去朮加桂肆兩脾虛腎氣動者臍上築動內經曰甘者令人中滿朮甘壅補桂泄奔豚是相易也吐多者去朮加生薑叁兩嘔家不喜甘故去朮嘔家多服生薑以辛散之下多者還用朮悸者加茯苓貳兩下多者用朮以去濕悸加茯苓以導氣渴欲得水者加朮足前成肆兩半津液不足則渴朮甘以緩之腹中痛者加人參足前成肆兩半裏虛則痛加人參以補之寒者加乾薑足前成肆兩半寒淫所勝平以辛熱腹滿者去朮加附子壹枚服湯後如食頃飲熱粥壹升許微自溫勿發揭衣被胃虛則氣壅腹滿甘令人中滿是去朮也附子之辛以補陽散壅吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

吐利止。裏和也。身痛不休。表未解也。與桂枝湯小和之。外證云。裏和表病。汗之則愈。吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者。四逆湯主之

四 上吐下利。裏虛汗出發熱惡寒。表未解也。四肢拘急。手足厥冷。陽虛陰勝也。與四逆湯助陽退陰。

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者。四逆湯主之

五 吐利亡津液。則小便當少。小便復利而大汗出。津液不禁。陽氣大虛也。脈微為亡陽。若無外熱。但內寒下利清穀。為純陰。此以外熱為陽未絕。猶可與四逆湯救之。

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者。通脈四逆加豬膽汁湯主之

六 吐已下斷。津液內竭。則不當汗出。汗出者不當厥。今汗出而厥。四肢拘急不解。脈微欲絕者。陽氣大虛。陰氣獨勝也。若純與陽藥。恐陰為格拒。或嘔或躁。不得復入也。與通脈四逆湯。加豬膽汁。膽苦入心而通脈。

膽寒補肝而和陰。引置陽藥不被格拒。吐利發汗。脈平小煩者。以新虛不勝穀氣故也

內經曰。食入於陰。長氣於陽。新虛不勝穀氣。是生小煩。

辨陰陽易差後勞復病證并治第十四

傷寒陰陽易之為病。其人身體重。少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉眼中生花。膝脛拘急者。燒裩散主之

一 大病新差。血氣未復。餘熱未盡。強合陰陽。得病者名曰陽易。男子病新差未平復。而婦人與之交。得病者名曰陽易。婦人新病差未平復。男子與之交。得病名曰陰易。以陰陽相感。動其餘毒。相染著如瘧易也。其人病身體重。少氣者。損動真氣也。少腹裏急。引陰中拘攣。膝脛拘急。陰氣極也。熱上衝胸頭重。不欲舉眼中生花者。感動之毒。所易之氣。

薰蒸於上也與燒
褌散以道陰氣。

燒褌散方

右取婦人中褌近隱處剪燒灰以水和服方寸
匕日叁服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取
男子褌當燒灰。

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者
加大黃如博碁子大五六枚[二]病有勞復有食復
傷寒新差血氣未平餘熱未盡早作勞動病者名曰勞復病熱少愈
而強食之熱有所藏因其穀氣留傳兩陽相合而
病者名曰食復勞復則熱氣浮越與枳實梔子
豉湯以解之食復則胃有宿積加大黃以下之。

枳實梔子豉湯方

枳實叁枚炙 梔子拾肆枚擘 豉壹升綿裹 右叁味以清漿水柒升空煮取肆升內枳實梔
子煮取貳升下豉更煮伍陸沸去滓溫分再服
覆令微似汗。

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之[三]脉浮者
以汗解之脉沉實者以下解之差後餘熱未盡更發熱者與小柴胡
湯以和解之脉浮者熱在表也故以汗解脉沉者熱在裏也故以下解之大病差後從
腰已下有水氣者牡礪澤瀉散主之[四]大病差後脾胃氣虛

不能制約腎水水溢下焦腎以下為腫也金匱要略曰腎以下腫當利小便與牡礪澤瀉散利小便而散水也。

牡礪澤瀉散方

牡礪酸平 煅 澤瀉鹹寒 栝蔞根苦寒 蜀漆辛平

洗去腥 葶藶苦寒 煅 商陸根煅辛酸鹹平

海藻鹹寒洗去鹹 已上各等分

鹹味瀉泄牡礪澤瀉海藻之鹹以泄水氣內經曰濕淫於內以苦泄之蜀漆葶藶栝蔞商陸之酸辛與苦以導腫濕。

右杀味異搗下篩為散更入臼中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日參服。

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸 五 汗後陽氣不足胃中虛寒不內津液故喜唾不了了與理中丸以溫其胃。傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之 六 傷寒解後津液不足而虛羸餘熱未盡熱則傷氣故少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱。

竹葉石膏湯方

竹葉貳把 辛平 石膏壹斤 甘寒 半夏半升洗 辛溫

麥門冬壹升甘平去心 人參叁兩甘溫 甘草貳兩甘平炙

粳米半升甘微寒

辛甘發散而除熱竹葉石膏甘草之甘辛以發散餘熱甘緩脾而益氣麥門冬人參粳米之甘

以補不足。辛者散也。氣逆者。欲其散。半夏之辛以散氣逆。

右柒味。以水壹斗。煑取陸升。去滓。內粳米。煑米熟。湯成去米。溫服壹升。日叁服。

病人脉已解。而日暮微煩。以病新差。人強與穀。脾胃氣尚弱。不能消穀。故令微煩。損穀則愈。陽明王於申酉戌。宿食在胃。故日暮微煩。當小下之。以損宿穀。

辨不可發汗病脉證并治第十五

夫以為疾病至急。倉卒尋按。要者難得。故重集諸可與不可方治。比之三陰三陽篇中。此易見也。又時有不止是三陰三陽。出在諸可與不可中也。諸不可汗。不可下病證藥方。前三陰三陽篇中經註已具者。更不復出。其餘無者。於此已後經註備見。

脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。微反在上。濇反在下。微則陽氣不足。濇則無血。陽氣反微。中風汗出而反躁煩。濇則無血。厥而且寒。陽微發汗。躁不得眠。寸關為陽脉。當浮盛。弱反在關。則裏氣不及。濡反在巔。則表氣不逮。衛行脉外。浮為在上。以候衛。微反在上。是陽氣不足。榮行脉中。沉為在下。以候榮。澁反在下。是無血也。陽微不能固外。腠理開疎。風因客之。故令汗出而躁煩。無血則陰虛。不與陽相順接。故厥而且寒。陽微無津液。則不能作汗。若發汗則必亡陽而躁。經曰。汗多亡陽。遂虛惡風煩躁。不得眠也。

動氣在右不可發汗。發汗則衄而渴。心苦煩。飲即吐水。動氣者。築築然氣動也。在右者。在臍之右也。難經曰。肺內證。臍右有動氣。按之牢若痛。肺氣不治。正氣內虛。氣動於臍之

右也。發汗則動肺氣。肺主氣。開竅於鼻。氣虛則不能衛血。血溢妄行。隨氣出於鼻為衄。亡津液。胃燥則煩渴而心苦煩。肺惡寒。飲水則傷肺。故飲即吐水。動氣在左。不可發汗。發汗則頭眩。汗不止。筋惕肉瞤。難經曰。肝內證。膶之左有動氣。按之牢若痛。肝氣不治。正氣內虛。氣動於膶之左也。肝為陰之主。發汗。汗不止。則亡陽。外虛。故頭眩筋惕肉瞤。針經曰。上虛則眩。動氣在上。不可發汗。發汗則氣上衝。正在心端。難經曰。心內證。膶上有動氣。按之牢若痛。心氣不治。正氣內虛。氣動於膶之上也。心為陽。發汗亡陽。則愈損心氣。腎乘心虛。欲上凌心。故氣上衝。正在心端。動氣在下。不可發汗。發汗。發汗則無汗。心中太煩。骨節苦疼。目運惡寒。食則反吐。穀不得前。難經曰。腎內證。膶下有動氣。按之牢若痛。腎氣不治。正氣內虛。動氣發於膶之下也。腎者。主水。發汗。則無汗者。水不足也。心中大煩者。腎虛不能制心火也。骨節苦疼者。腎主骨也。目運者。腎病則目眩。眩如有所見。惡寒者。腎主寒也。食則反吐。穀不得前者。腎水乾也。王氷曰。病嘔而吐。食久反出。是無水也。咽中閉塞。不可發汗。發汗則吐血。氣欲絕。手足厥冷。欲得蹉卧。不能自温。咽門者。胃之系。胃經不和。則咽內不利。發汗攻陽。血隨發散而上。必吐血也。胃經不和。而反攻表。則陽虛於外。故氣欲絕。手足冷。欲蹉而不能自温。諸脉得數動微弱者。不可發汗。發汗。則大便難。腹中乾。胃燥而煩。其形相象。根本異源。動數之脉。為熱在表。微弱之脉。為熱在裏。發汗亡津液。則熱氣愈甚。胃中乾燥。故大便難。腹中乾。胃燥而煩。根本雖有表裏之異。逆治之後。熱傷之則一。是以病形相象也。脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。弦反在上。微反在下。弦為陽運。微為陰寒。上實下虛。意欲得温。微弦為

虛不可發汗。發汗則寒慄不能自還。弦在上。則風傷氣。風勝者陽為之運動。微在下。則寒傷血。血傷者裏為之陰寒。外氣拂鬱為上實。裏有陰寒為下虛。表熱裏寒意欲得溫。若反發汗亡陽。陰獨故寒慄不能自還。欬者則劇。數吐涎沫。咽中必乾。小便不利。膈中陽氣虛。心中飢而煩。一日一夜氣大會於肺。邪上相擊。脾時而發。形如寒瘧。但寒無熱。虛而寒慄。發汗攻陽。則陽氣愈虛。陰寒愈甚。故踡而苦滿。腹中復堅。厥脉緊不可發汗。發汗則聲亂咽噤。舌萎聲不得前。厥而脉緊。則少陰傷寒也。法當温裏。而反發汗。則損少陰之氣。少陰之脉入肺中。循喉嚨。挾舌本。腎為之本。肺為之標。本盛則標弱。故聲亂咽噤。舌萎聲不得前。

逆發汗。病微者難差。劇者言亂。目眩者死。命將難全。不可發汗而強發之。輕者因發汗重而難差。重者脫其陰陽之氣。言亂目眩而死。難經曰。脫陽者見鬼。是此言亂也。脫陰者目盲。是此目眩也。眩非玄而見玄。是近於盲也。欬而小便利。若失小便者。不可發汗。汗出則四肢厥逆冷。肺經虛冷。上虛不能治下者。欬而小便利。或失小便。上虛發汗。則陽氣外亡。四肢者諸陽之本。陽虛則不與陰相接。故四肢厥逆冷。傷寒頭痛。翕翕發熱。形象中風。常微汗出。自嘔者。下之益煩。心中懊憹如饑。發汗則致痓。身強難以屈伸。熏之則發黃。不得小便。又則發欬唾。傷寒當無汗惡寒。今頭痛發熱。微汗出。自嘔。則傷寒之邪傳而為熱。欲行於裏。若反下之。邪熱乘虛流於胸中。為虛煩。心懊憹如饑。若發汗。則虛表熱歸經絡。熱甚生風。故身強直而成痓。若

熏之則火熱相合消爍津液故小便不利而發黃肺惡火炙則火熱傷肺必發欬嗽而唾膿

辨可發汗脉證并治第十六

大法春夏宜發汗春夏陽氣在外邪氣亦在外故可發汗凡發汗欲令手足俱周時出以漐漐然一時間許亦佳不可令如水流漓若病不解當重發汗汗多必亡陽陽虛不得重發汗也汗緩緩出則表裏之邪悉去汗大出則邪氣不除但亡陽也陽虛為無津液故不可重發汗凡服湯發汗中病便止不必盡劑汗多則亡陽凡云可發汗無湯者丸散亦可用要以汗出為解然不如湯隨證良驗聖濟經曰湯液主治本乎腠理壅鬱除邪氣者於湯為宜金匱玉函曰水能淨萬物故用湯也夫病脉浮大問病者言

但便鞕爾設利者為大逆鞕為實汗出而解何以故脉浮當以汗解經曰脉浮大應發汗醫反下之為大逆便鞕難雖為裏實亦當先解其外若行利藥是為大逆結胸雖急脉浮大猶不可下下之即死況此便難乎經曰本發汗而復下之此為逆若先發汗治不為逆下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗外臺云裏和表病汗之則愈

釋音

拒音巨抑也　函音含又音咸書函　眊音荒目不明也

註解傷寒論卷第八　仲景全書第十八

漢　長沙守　張仲景　述

晉　太醫令　王叔和　撰次

宋　聊攝人　成無己　註解

明　虞山人　趙開美　校句

辨發汗後病脉證并治第十七

發汗多亡陽讝語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈胃為水穀之海津液之主發汗多亡津液胃中燥必發讝語此非實熱則不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛通行津液生則胃潤讝語自止

此一卷第十七篇凡三十一證前有詳說

辨不可吐第十八

合四證已具太陽篇中。

辨可吐第十九

大法。春宜吐。春時陽氣在上。邪氣亦在上。故宜吐。凡用吐湯中病即止。不必盡劑也。要在適當。不欲過也。病胷上諸實。胷中鬱鬱而痛。不能食。欲使人按之。而反有涎唾。下利日十餘行。其脉反遲。寸口脉微滑。此可吐之。吐之利則止。胷上諸實。或痰實。或熱鬱。或寒結。胷中。鬱而痛。不能食。欲使人按之。反有涎唾者。邪在下。按之。氣下而無涎唾。此按之反有涎唾者。知邪在胷中。經曰。下利脉遲而滑者。內實也。今下利日十餘行。其脉反遲。寸口脉微滑。是上實也。故可吐之。玉函曰。上盛不已。吐而奪之。宿食在上脘者當吐之。宿食在中下脘者則宜下。宿食在上脘者則當吐。內經曰。其高者因而越之。其下者引而竭之。病人手足厥冷。脉乍結。以客氣在胷中。心下滿而煩。欲食不能食者。病在胷中。當吐之。此與第六卷厥陰門瓜蒂散證同。彼云脉乍緊。此云脉乍結。惟此有異。緊為內實。乍緊則實未深。是邪在胷中。結為結實。乍結則結未深。是邪在胷中。所以證治俱同也。

釋音

脘音管胃府也　竭渠孽切盡也　蒂音帝瓜蒂也

註解傷寒論卷第九　仲景全書第十九

漢　長沙守　張仲景　述
晉　太醫令　王叔和　撰次
宋　聊攝人　成無己　註解
明　虞山人　趙開美　校句

辨不可下病脉證并治第二十

脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上澁反在下微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澁則無血厥而且寒陽微不可下下之則心下痞鞕陽微下之陽氣已虛陰氣內甚故心下痞鞕動氣在右不

可下。下之則津液內竭。咽燥鼻乾。頭眩心悸也。動氣在右。肺之動也。下之傷胃。動肺。津液內竭。咽燥鼻乾者。肺屬金。主燥也。頭眩心悸者。肺主氣而虛也。動氣在左。不可下。下之則腹內拘急。食不下。動氣更劇。雖有身熱。卧則欲踡。動氣在左。肝之動也。下之損脾。而肝氣益勝。復行於脾。故腹內拘急。食不下。動氣更劇也。雖有身熱。以裏氣不足。故卧則欲踡。動氣在上。不可下。下之則掌握熱煩。身上浮冷。熱汗自泄。欲得水自灌。動氣在上。心之動也。下之則傷胃。內動心氣。心為火。主熱。針經曰。心所生病者。掌中熱。肝為藏中之陰。病則雖有身熱。卧則欲踡。作表熱裏寒也。心為藏中之陽。病則身上浮冷。熱汗自泄。欲得水自灌。作表寒裏熱也。二藏陰陽寒熱。明可見焉。動氣在下。不可下。下之則腹脹滿。卒起頭眩。食則下清穀。心下痞也。

動氣在下。腎之動也。下之則傷脾。腎氣則動。腎寒乘脾。故有腹滿頭眩。下利則心下痞之證也。咽中閉塞。不可下。下之則上輕下重。水漿不下。卧則欲踡。身急痛下。利日數十行。咽中閉塞。胃已不和也。下之則閉塞之邪。為上輕。復傷胃氣。為下重。至水漿不下。卧則欲踡。身急痛。下利日數十行。知虛寒也。諸外實者。不可下。下之則發微熱。亡脉厥者。當臍握熱。外實者。表熱也。汗之則愈。下之為逆。下後裏虛表熱內陷。故發微熱。厥深者熱亦深。亡脉厥者。則陽氣深陷。客於下焦。故當臍握熱。諸虛者。不可下。下之則大渴。求水者易愈。惡水者劇。金匱玉函曰。虛者十補勿一瀉之。虛家下之為重虛。內竭津液。故令大渴。求水者。陽氣未竭。而猶可愈。惡水者。陽氣已竭。則難可制。脉濡而弱。弱反在關。濡反在巔。弦反在上。微反在下。弦為陽運。微為

陰寒上實下虛意欲得温微弦為虛虛者不可下也虛家下之是為重虛雖經曰實實虛虛損不足益有餘此者是中工所害也微則為欬欬則吐涎下之則欬止而利因不休利不休則胷中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息為難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷如冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此為除中口雖欲言舌不得前內經曰感於寒則受病微則為欬甚則為泄為痛肺咸微寒為欬則脉亦微也下之氣下欬卽止而因利不休利不休則奪正氣而成危惡胷中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息為難者裏氣損也頸背相引腎為不仁極寒反汗出身冷如冰者表氣損也表裏損極至陰陽俱脫眼睛不慧語言不休難經曰脫陽者見鬼脫陰者目盲陰陽脫者應不能食而

穀多入者此為除中是胃氣除去也口雖欲言舌不得前氣已衰脫不能運也脉濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反在下浮為陽虛數為無血浮為虛數為熱浮為虛自汗出而惡寒數為痛振寒而慄微弱在關胷下為急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏形如瘧狀醫反下之故令脉數發熱狂走見鬼心下為痞小便淋瀝小腹甚硬小便則尿血也弱在關則陰氣內弱濡在巔則陽氣外弱浮為虛浮在上則衛不足也故云陽虛陽虛不固故腠理汗出惡寒數亦為虛數在下則榮不足故云亡血亡血則不能温潤脉藏故數而痛振而寒慄微弱在關邪氣傳裏也裏虛遇邪邪胷下為急喘而汗出脇下引痛振寒如瘧此裏邪未實表邪未解醫反下之裏氣益虛邪熱內陷

故脉數發熱狂走見鬼心下為痞此熱陷於中焦者也若熱氣深陷則客於下焦使小便淋瀝小腹甚澁小便尿血也脉濡而緊濡則衛氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩躁為有大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵怏不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施汲水灌其身客熱應時罷懍懍而振寒重被而覆之汗出而胃顛體惕而又振小便為微難寒氣因水發清穀不容間嘔變反腸出顛倒不得安手足為微逆身冷而內煩遲欲從後救安可復追還胃冷禁小寒陽微

中風發熱惡寒微嘔心煩躁不温胃反為有熱解肌發汗則表虛亡陽煩躁心下痞堅先裏不足發汗又虛其表表裏俱虛竭卒起頭眩客熱在表悵怏不得眠躁不救裏但責表熱汲水灌洗以却熱客熱易罷裏寒益增悵而振寒復以重被覆之表虛遂汗出愈使陽氣虛也顛頂也顛胃頂體振寒小便難者亡陽也寒因水發下為清穀上為嘔吐外有厥逆內為躁煩顛倒不安雖欲拯救不可得也本草曰病勢已過命將難全脉浮而大浮為氣實大為血虛血虛為無陰孤陽獨下陰部者小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠血薄肉消而成暴液醫復以毒藥攻其胃此為重虛客陽去有期必下如汚涅而死衛為陽榮為陰衛氣強實陰血虛弱陽乘陰虛

下至陰部。陰部下焦也。陽為熱。則消津液。當小便赤而難。今反小便利而大汗出者。陰氣內弱也。經曰。陰弱者汗自出。是以衛家不微。而反更實。榮竭血盡。乾煩而不眠。血薄則肉消。而成暴液者。津液四射也。醫反下之。又虛其裏。是為重虛。孤陽因下而又脫去。氣血皆竭。胃氣內盡。必下如污溼而死也。

脈數者。久數不止。止則邪結。正氣不能復。正氣却結於藏。故邪氣浮之。與皮毛相得。脈數者。不可下。下之則必煩利不止。數為熱。止則邪氣結於經絡之間。正氣不得復行於表。則却結於藏。邪氣獨浮於皮毛。下之虛其裏。邪熱乘虛而入。裏虛叶熱。必煩利不止。脈浮大應發汗。醫反下之。此為大逆。浮大屬表。故不可下。病欲吐者。不可下。嘔多。雖有陽明證。不可攻之。為邪猶在胸中也。太陽病。外證未解。不可下。下之為逆。表未解者。雖有裏證。亦不可下。當先解外為順。若反下之。則為逆也。經曰。本發汗而復下之。此為逆也。若先發汗。治不為逆。夫病陽多者。熱下之則鞕。陽熱證多。則津液少。下之。雖除多者裏熱也。下之則心下鞕。無陽陰強。大便鞕者。下之則必清穀腹滿。無陽者。亡津液也。陰強者。寒多也。大便鞕則為陰結。下之虛胃陰寒內甚。必清穀腹滿。

傷寒發熱。頭痛微汗出。發汗則不識人。熏之則喘。不得小便。心腹滿。下之則短氣。小便難。頭痛加温針。則吸。傷寒則無汗。發熱頭痛微汗出者。寒邪變熱。欲傳於裏也。發汗則亡陽。增熱。故不識人。若以火熏之。則火熱傷氣。內消津液。結為裏實。故喘不得小便。心腹滿。若反下之。則內虛津液。邪欲入裏。外動經絡。故短氣。小便難。頭痛背強。若加温針。益陽增熱。必動其血。而為衄也。

傷寒。脈陰陽俱緊。惡寒發熱。則脈欲厥厥者。脈初

來大漸漸小更來漸漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛熱多者目赤脉多睛不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多者便清穀熱多者便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者可救之小便難者為危殆脉陰陽俱緊則清邪中上濁邪中下太陽少陰俱感邪也惡寒者少陰發熱者太陽脉欲厥者表邪欲傳裏也惡寒甚者則變熱翕翕汗出喉中痛以少陰之脉循喉龐故也熱多者太陽多也目赤脉多者睛不慧以太陽之脉起於目故也發汗攻陽則少陰之熱因發而上行故咽中傷若復下之則太陽之邪因虛而內陷故兩目閉陰邪下行為寒多必便清穀陽邪下行為熱多必便膿血熏之則火熱甚身必發黃熨之則火熱輕必為咽燥小便利者為津液未竭猶可救之小便難者津液已絕則難可制而危殆矣傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制貪水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足温者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則兩目閉貪水者若下之其脉必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩燥脉數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也傷寒發熱寒發熱也口中勃勃氣出熱客上膈也頭痛目黃血不可制者熱盛於上也千金曰無陽即厥無陰即嘔貪水者必嘔則陰虛也惡水者厥則陽亡也發熱口中勃勃氣出者咽中已熱也若下之亡津液則咽中生瘡熱因裏虛而下若熱氣內結則手足必厥設手足温者熱氣不

結而下行。作滿熱利。下重。便膿血也。頭痛目黃者。下之。熱氣內伏。則目閉也。貪水為陰虛。下之又虛其裏。陽氣內陷。故脉厥。聲嚶。咽喉閉塞。陰虛發汗。又虛其陽。使陰陽俱虛而戰慄也。惡水為陽虛。下之又虛。胃氣虛寒。內甚。故棄冷。不嗜食。陽虛發汗。則上焦虛燥。故口中傷爛。舌上白胎而煩燥也。經曰。脉數不解。合熱則消穀。喜饑。至六七日不大便者。此有瘀血。此脉數實。不大便六七日。熱畜血於內也。七日之後。邪熱漸鮮。迫血下行。必便血也。便血發汗。陰陽俱虛。故小便利。下利脉大者。虛也。以其強下之故也。設脉浮革。固爾腸鳴者。屬當歸四逆湯主之。脉大為虛。以未應下而下之。利因不休也。浮者。按之不足也。革者。實大而長。微弦也。浮為虛。革為寒。寒虛相搏。則腸鳴。與當歸四逆湯補虛散寒。

辨可下病脉證并治第二十一

大法秋宜下。秋時陽氣下行。則邪亦在下。故宜下。凡服下藥。用湯勝丸。中病即止。不必盡劑也。湯之為言蕩也。滌蕩腸胃。下寒。破散邪疾。理順經脉。潤澤枯槁。悅人皮膚。益人血氣。水能淨萬物。故勝丸散。中病即止者。如承氣湯證云。若一服利而止。後服又曰。若一服謏語止。更莫復服。是不盡劑也。下利三部脉皆平。按之心下鞕者。急下之。宜大承氣湯。下利者。脉當微厥。今反和者。此為內實也。下利三部脉平者。已為實。而久按之心下鞕。故知邪甚也。按宜大承氣湯下之。下利脉遲而滑者。內實也。利未欲止。當下之。宜大承氣湯。經曰。脉遲者。食乾物得之。金匱要畧曰。滑則陽氣實。下利脉遲而滑者。胃有宿食也。脾胃傷食。不消水穀。是故下利者。云內實。若但以溫中厚腸之藥利之。必未止。可與大承氣湯下去宿食。利自止矣。問曰。人病有宿食。何以別之。師曰。寸口脉浮而大。按之反澁。尺中亦微而澁。故知有宿

食。當下之。宜大承氣湯。十以候外。尺以候內。浮以候表。沉以候裏。寸口脉浮大者。氣實血虛也。按之反濇。尺中亦微而濇者。胃有宿食。裏氣不和也。與大承氣湯。以下宿食。下利不欲食者。以有宿食故也。當下之。與大承氣湯。傷食則惡食。故不欲食。如傷風惡風。傷寒惡寒之類也。下利差後。至其年月日復發者。以病不盡故也。當下之。宜大承氣湯。乘春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘至陰則脾先受之。乘我則肺先受之。假令春時受病。氣必傷肝。治之難愈。邪有不盡者。至春時元受月日。內外相感。邪必復動而痛也。下利為腸胃疾。宿積不盡。故當下去之。下利脉反滑。當有所去。下之乃愈。宜大承氣湯。脉經曰。脉滑者為病食也。下利脉滑。則內有宿食。故云當有所去。與大承氣湯。以下宿食。病腹中滿痛者。此為實也。當下之。宜大承氣小承氣湯。金匱要畧曰。病者腹滿。按之不痛為虛。痛為實。可下之。腹中滿痛者。裏氣壅實也。故可下之。傷寒後脉沉。沉者。內實也。下解之。宜大柴胡湯。傷寒後為表已解。脉沉為裏未和。與大柴胡湯。以下內實。經曰。傷寒差以後。更發熱。脉沉實者。以下解之。脉雙弦而遲者。必心下鞕。脉大而緊者。陽中有陰也。可以下之。宜大承氣湯。金匱要畧曰。脉雙弦者寒也。經曰。遲為在藏。脉雙弦而遲者。陰中伏陽也。必心下鞕。尺則為陽。緊則為寒。脉大而緊者。陽中伏陰也。與大承氣湯。以分陰陽。

釋音

齒魚結切嚙也　盥音貫澡手也　悵怏上丑亮切望恨也下於亮切不服也　嚶於耕切鳥鳴也　溉灌上居代切下音貫注也

註解傷寒論卷第十

漢　長沙守　仲景全書第二十　張仲景　述

晉　太醫令　王叔和　撰次

宋　聊攝人　成無己　註解

明　虞山人　趙開美　校句

辨發汗吐下後脉證并治第二十二

此第十卷第二十二篇凡四十八證前三陰三陽篇中悉具載之　卷內音釋上卷已有

此已下諸方。於隨卷本證下雖已有。緣止以加減言之。未甚明白。似於覽者檢閱未便。今復校勘備

列于後。

桂枝加葛根湯方

葛根肆兩　芍藥貳兩　甘草貳兩
生薑叁兩切　大棗拾貳枚擘　桂枝貳兩去皮

右陸味。以水壹斗。先煮麻黃葛根減貳升。去上沫。內諸藥。煮取叁升。去滓。溫服壹升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法。

桂枝加厚朴杏子湯方　於桂枝湯方內。加厚朴貳兩。杏仁伍拾箇。去皮尖。餘依前法。

桂枝加附子湯方　於桂枝湯方內。加附子壹枚。炮去皮。破捌片。餘依前法。

方。附於此方內去桂枝。加白朮肆兩。依前法。

桂枝去芍藥湯方　於桂枝湯方內去芍藥。餘依前法。

桂枝去芍藥加附子湯方　於桂枝湯方內去芍藥加附子壹枚。炮去皮。破捌片。餘依前法。

桂枝麻黃各半湯方

桂枝壹兩拾陸銖去皮　芍藥　生薑切　甘草炙各壹兩
麻黃去節　大棗肆枚擘
杏仁貳拾肆箇湯浸去皮尖及兩仁者

右柒味。以水伍升。先煮麻黃壹貳沸。去上沫。內諸藥。煮取壹升捌合。去滓。溫服陸合。

桂枝二麻黃一湯方

桂枝壹兩拾柒銖去皮　芍藥壹兩陸銖　麻黃拾陸銖去節

生薑壹兩陸銖切　杏仁拾陸箇去皮尖

甘草壹兩貳錢炙　大棗伍枚擘

右柒味。以水伍升。先煮麻黃壹貳沸。去上沫。內諸藥。煮取貳升。去滓。溫服壹升。日再。

白虎加人參湯方　於白虎湯方內加人參叁兩。餘依白虎湯法。

桂枝去桂加茯苓白朮湯方　於桂枝湯方內去桂枝。加茯苓白朮各叁兩。餘依前法煎服。小便利則愈。

已上玖方病證。並在第二卷內。

葛根加半夏湯方　於葛根湯方內加入半夏半升。餘依葛根湯法。

桂枝加芍藥生薑人參新加湯方　於第二卷桂枝湯方內。更加芍藥壹兩。生薑各壹兩。人參叁兩。餘依桂枝湯法服。

梔子甘草豉湯方　梔子豉湯方內加入甘草貳兩。餘依前法。得吐。止後服。

梔子生薑豉湯方　梔子豉湯方內加生薑伍兩。餘依前法。得吐。止後服。

柴胡加芒消湯方　小柴胡湯內加芒消陸兩。餘依前法。服不解。更服。

桂枝加桂湯方　第三卷桂枝湯方內。更加桂貳兩。共伍兩。餘依前法。

柴胡桂枝湯方

桂枝去皮　黃芩　人參各壹兩半　甘草壹兩炙

已上陸方病證。並在第三卷內。

半夏貳合半 芍藥壹兩半 大棗陸枚擘
生薑壹兩半切 柴胡肆兩

右玖味以水柒升煮取叁升去滓溫服。

附子瀉心湯方

大黃貳兩 黃連 黃芩各壹兩
附子壹枚炮去皮破別煮取汁

右肆味切叁味以麻沸湯貳升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服。

生薑瀉心湯方

生薑肆兩切 甘草叁兩炙 人參叁兩

乾薑壹兩 黃芩叁兩 半夏半升洗
黃連壹兩 大棗拾貳枚擘

右捌味以水壹斗煮取陸升去滓再煎取叁升溫服壹升日叁服。

甘草瀉心湯方

甘草肆兩 黃芩叁兩 乾薑叁兩
半夏半升洗 大棗拾貳枚擘 黃連壹兩

右陸味以水壹斗煮取陸升去滓再煎取叁升溫服壹升日叁服。

黃芩加半夏生薑湯方 於黃芩湯方內加半夏半升生薑壹兩半餘依黃芩

湯法服。

已上伍方病證。並在第四卷內。

桂枝加大黃湯方

桂枝叁兩去皮　大黃壹兩　芍藥陸兩

生薑叁兩切　甘草貳兩炙　大棗拾貳枚擘

右陸味。以水柒升。煮取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。

桂枝加芍藥湯方於第二卷桂枝湯方內更加芍藥叁兩。通前共陸兩。餘依桂枝湯法服。

四逆加吳茱萸生薑湯方

當歸叁兩　芍藥叁兩　甘草貳兩炙

通草貳兩　桂枝叁兩去皮　細辛叁兩

生薑半斤切　吳茱萸貳升　大棗貳拾伍枚擘

右玖味。以水陸升。清酒陸升。和煮。取伍升。去滓。溫分伍服。一方。水酒各肆升。

已上叁方病證。並在第六卷內。

四逆加人參湯方於四逆湯方內。加人參壹兩。餘依四逆湯法服。

四逆加猪膽汁湯方於四逆湯方內。加入猪膽汁半合。餘依前法服。如無猪膽。以羊膽代之。

已上貳方病證。並在第七卷內。

傷寒類證序

竊聞天地師道以覆載聖人立醫以濟物道德醫藥皆源於一醫不通道無以知造物之機道不通醫無以盡養生之理然欲學此道者必先立其志志立則格物物格則學專學雖專也必得師匠則可入其門矣更能敏惠愛物公正無私方合其道夫掌命之職其大矣哉且聖智玄淡自有樞要強欲穿鑿徒勞皓首僕於常山醫流張道人處審受通玄類證乃仲景之鈐法也彼得之異人而世未有本切念仲景之書隱奧難見雖有上士所見博

達奈以一心目應衆病萬一差悞豈不憂哉今則此書摠其微言宗為直說使難見之文明於掌上故曰舉一綱而萬目張標一言而衆理顯若得是書以補廢志其濟於世也不亦深乎故命工開版廣傳永久豈大定癸未九月望日河内宋雲公述

仲景三百九十七法分為五十門差為四百八十四法但見一證則所患自明而用藥不疑也

傷寒活人略例

尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其上連風府故頭項痛腰脊強

尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥

尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脉循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾此三經皆受病未入於府者可汗而已

尺寸俱沉細太陰受病也當四五日發其脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾

尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮此三經皆受病已入於府可下而已

辰太陽卯陽明寅少陽丑太陰子少陰亥厥陰類證鈐首標辰卯寅丑子亥者便是內外六證也鈐中或言先救裏後攻表盡是兩感傷寒之例

仲景全書 明 虞山人 趙開美校刊

辨嘔吐門第一 二十八法

辰 中三 一	嘔	不下痢	太陽陽明合病	葛根半夏湯八味	
辰 中五 四 二	嘔	胷脇滿	十三日日晡潮熱不解	柴胡加芒消湯八味	
辰 下十五 三	嘔	發熱	鹽以他柴胡証藥下之仍在	小柴胡湯蒸熟而振却發熱汗出解結胷大陷胷湯痞半夏瀉心湯表解可攻之十棗湯	
辰 下十六 四	嘔逆	下利		小柴胡湯七味	
卯 十七 五	嘔	不大便	脇滿舌上胎		

子 十八 六	亥 十七 七	亥 十九 八	辰 下十二 九	辰 中四十八 十	辰 中二十八 十一	辰 下二十四 十二
嘔	嘔	嘔	微嘔	喜嘔	若嘔	若嘔
欬渴	小便自利	發熱	發熱	中風五六日	虛煩	太陽少陽合病
六七日下利	身有微熱		微惡寒	寒熱往來	心中懊憹	下利
煩	見厥難治		支節疼	胷脇滿	不得眠	
不得眠			心下支結	心煩不欲食	發汗吐下後	
	弱					
猪苓湯五味	四逆湯三味	小柴胡湯七味	柴胡桂枝湯九味	小柴胡湯七味	栀子生薑豉湯三味	黃芩加半夏生薑湯五味

辰 下二十五 十三	卯 廿九 十四	辰 上一 十五	辰 中十 十六	寅 一 十七	子 十四 十八	亥 十八 十九
欲嘔	食穀欲嘔	乾嘔	乾嘔	乾嘔	乾嘔	乾嘔
腹痛	屬陽明也	汗	發熱	寒熱	利不止	吐涎沫
胷中有熱		惡寒	欬	太陽病不解轉入少陽	厥逆	頭痛
胃中有邪		發熱	表不解	脇下硬不能食		
		中風鼻鳴	心下有水氣	尚未吐下		
		陽浮陰弱		沉緊	無脉	
黃連湯七味	吳茱萸湯四味	桂枝湯五味	小青龍湯八味	小柴胡湯七味	白通加猪膽汁湯五味若只下利脉微白通湯主之	吳茱萸湯四味

辰 十六 二十 吐逆 自汗出心煩微脚攣急咽乾小便數惡寒與桂枝厥 躁煩 浮 甘草乾薑湯二味若厥愈更與芩藥甘草湯其脚伸若胃氣不和譫語語胃承氣重汗加燒針四逆

辰 中二七 二十二 水入則吐 六七日不解欲飲水 發熱腹痛 煩 有表裏證 五苓散五味

亥 十 二十二 吐 本自寒若食入下鬱復吐下之則吐

辰 下二七 二十三 嘔吐 汗 發熱心下痞 下利 乾薑黃連黃芩人參湯四味

亥 一 廿四 吐 蚘嘔 蚘厥 煩 為藏得禽寒嘔吐 大柴胡湯八味

子 八 廿五 吐利 厥欲死者 躁煩 烏梅丸十味

霍亂 四 廿六 吐利 汗出惡寒 發熱 厥 四肢拘急 吳茱萸湯四味

霍亂 五 廿七 吐利 大汗出 下利 小便利 內寒脈微 四逆湯三味

勞復 六 廿八 欲吐 傷寒蠹蝕少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之七味

頭痛門第二 九法

辰 上二 一 頭痛 汗 惡風 發熱 桂枝湯五味

辰 上二五 二 頭痛 發熱項強 心下滿痛 小便不利 桂枝去桂加白朮茯苓湯六味

辰 中二五 三 頭痛身疼惡風 發熱 汗 喘無 麻黃湯四味

辰 中二三 四 頭痛六七日有熱不大便 承氣湯看熱多少用小承氣湯

辰 中廿二 五	頭痛 有熱	不大便	小便清	知不在裏			可發汗桂枝湯五味
辰 下八 六	頭痛	心下痞	太陽少陽併病		眩冒		刺肝俞肺俞不可發汗汗之則譫語不止當刺期門
亥 十八 七	頭痛	乾嘔	吐涎沫				吳茱萸湯四味
濕 五 八	頭痛身疼	發熱	面黃而喘	鼻塞而煩	腹中和無病	大	故內藥鼻中則愈
霍亂 二 九	頭痛	身疼	發熱				熱多欲飲水者五苓散寒多不用水者理中丸

頭汗門第三

五法

辰 下十三 一	頭汗	寒熱往來	胷脇滿渴不嘔	小便不利	發汗復下之	心煩	柴胡桂枝乾薑湯七味
辰 下十四 二	頭汗	手足冷惡寒	大便硬	心下滿不欲食	五六日	細	為陽微結非少陰小柴胡湯七味
卯 十五 三	頭汗	懊憹	手足溫不結胷	不能食	下之外有熱	得快吐止後服	梔子豉湯二味
卯 廿二 四	頭汗	小便不利	黃				茵蔯蒿湯三味
濕 三 五	頭汗	口燥	白胎	渴噦	胷滿		

頭眩門第四

四法

辰 中三十 一	頭眩	吐下後	心下逆滿	氣上衝胷		沉緊	茯苓桂枝白朮甘草湯四味
辰 中四十三 二	頭眩	發熱	心悸	瞤	發汗不解		真武湯五味

辰 下八 三	頭眩	頭痛	心下痞	胃	太陽少陽併病	刺肝俞肺俞不可發汗汗之則讝語不止當刺期門
辰 下二十三 四	頭眩	項強	太陽少陽併病	心下硬慎勿下		刺大椎肺俞

目門第五　三法

卯 三十六 一	目中不了了	大便難	睛不和	無表裏證	六七日	大承氣湯四味
痓 五 二	目赤	口噤	惡寒	項強	身熱足寒	太陽病發熱脉沉而細者名曰痓
勞復 一 三	眼中花	身重	小腹裏急	熱上衝胷	頭重不欲舉	烧褌散一味

衄血門第六　二法

辰 中十六 一	衄血	身疼	發熱	發煩	無汗八九日不解表	浮緊	麻黃湯四味
辰 中廿一 二	衄血	不發汗	因衄血			浮緊	麻黃湯四味

口門第七　六法

子 二十 一	口乾	心下痛	下利	清水		口乾　口苦　口燥　口噤
卯 十一 二	咽燥口苦	自汗發熱	腹滿喘欬懊憹	惡熱身重	客氣動隔舌上胎	浮緊	大承氣湯四味
辰 下三十一 三	口燥渴	背微寒	無大熱				若下之則胃中空虛梔子豉湯二味
子 十九 四	口燥	咽乾	二三日				白虎加人參湯五味
							大承氣湯四味

濕 三五 口燥 頭汗 白胎身疼 渴噦 胷滿小便不利

痓 五六 口噤 目赤 惡寒 胷滿項強 身熱足寒

太陽病發汗太多因致痓

白胎門第八 一法

濕 二一 白胎 頭汗 口燥 渴噦胷滿 小便不利

身疼門第九 十四法

四肢疼 骨節疼

辰 中五一 身疼 頭痛 惡風發熱 喘 無汗

麻黃湯四味

辰 中八二 身疼 惡寒 躁煩 發熱 汗不出 浮緊

大青龍湯七味

辰 中六三 身疼 衄血 發熱 煩無汗 八九日不解表 浮緊

麻黃湯四味

辰 中廿五四 身疼痛 汗後 沉遲

桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯六味

辰 中四十五五 一身疼痛 反下之清穀不止 急當救裏 後清便自調當救表

救裏四逆湯三味救表桂枝湯五味

辰 下十三六 身疼 微喘 微惡寒 發熱 支節疼心下支結 六七日

柴胡桂枝湯九味

辰 下三十六七 身疼 煩 風濕相搏不得轉側 不嘔不渴 八九日 浮虛而濇

桂枝附子湯六味

子 五八 骨節疼 厥 沉

附子湯五味

亥 十三九 身疼 腹脹滿 下利 先溫裏後攻表

溫裏四逆三味攻表桂枝湯五味

濕 二十	身疼	發熱	懊憹				
濕 五十一	身疼	頭痛發熱	面黃而喘	鼻塞煩腹中和無病		大	故鼻塞內藥鼻中即愈瓜蔕散三味
濕 六十二	身疼	發熱	日晡所劇者此名風濕	此病傷於汗出當風	或久傷冷所致		麻黃杏仁薏苡甘草湯
霍亂 二十三	身疼	頭痛	發熱				熱多飲水者五苓散寒多不用水者理中丸四味
霍亂 三十四	身疼	吐利止而不休					當消息和解其外桂枝湯五味

自汗門第十

三十四法

辰 上一一	汗	乾嘔惡寒	發熱	中風鼻鳴		陽浮陰弱	桂枝湯五味
辰 上二二	汗	頭痛	惡風	發熱			桂枝湯五味
辰 上三三	自汗	惡風	項強				桂枝加葛根湯七味
辰 上七四	發汗	惡風	小便難	四肢微急難以屈伸			桂枝附子湯六味
辰 上十六五	汗出	惡寒	小便數	心煩	脚攣急		不可與桂枝與之則厥脚攣急與芍藥湯二味
辰 中十九六	汗	榮衛不和	發汗則愈				桂枝湯五味
辰 中廿七	汗	藏無他病	衛氣不和				桂枝湯五味
辰 中廿六八	汗出	喘	無大熱	發汗後	不可與桂枝		麻黃杏子甘草石膏湯四味

辰 中三十六 九	汗出	渴					五苓散不渴者茯苓甘草湯四味
辰 中四十七 十	汗	發熱	榮弱衛強	故使汗出	欲救邪風		桂枝湯五味
辰 中五十九 十一	汗	嗇嗇惡寒	發熱	大渴飲水者	腹滿小便利	肝乘肺名曰橫	刺期門
辰 下十八 十二	汗出	惡寒	痞				附子瀉心湯四味
辰 下廿四 十三	汗出	喘	無大熱	下之後不可行桂枝			麻黃杏仁甘草石膏湯四味
辰 下廿七 十四	汗出	嘔吐	發熱	痞	下利	汗出不解	大柴胡湯八味
辰 下三十八 十五	汗出短氣	惡風	小便不利	風濕相搏	不得屈伸	骨節疼身微腫	甘草附子湯四味

卯 二 十六	汗	潮熱	腹滿大便硬	不惡寒	身重短氣	遲	大承氣湯四味若腹大滿通者小承氣湯
卯 五 十七	汗	大便硬	讝語	胃中燥			小承氣湯三味
卯 八 十八	汗	讝語	有燥屎在胃中	過經乃可下之			大承氣湯四味
卯 十 十九	汗出	二陽併病	潮熱	大便難	讝語		大承氣湯四味
卯 十一 二十	汗出	咽乾口若發熱腹滿	喘懊憹	惡熱身重下之則胃中空虛	客氣動膈舌上胎	浮緊	梔子豉湯二味
卯 二十 二十一	自汗	小便自利津液內竭		雖硬不可攻之	須自大便		蜜煎可丸如指長二寸許內穀道而通之若土瓜根猪膽汁二味
卯 二十一 二十二	汗多	微惡寒	表未解			遲	桂枝湯五味

卯 廿六 二十三	汗出解	日晡發熱	煩	如瘧狀		實	脉實者大承氣四味脉虛浮者桂枝湯五味
卯 三十 二十四	汗出	寒熱	惡寒	痞而不嘔	以墜下之如不下不惡寒而渴	屬陽明	但以法救之五苓散五味
卯 三十七 廿五	汗多	發熱					急下之大承氣湯四味
亥 五 廿六	汗	惡寒	厥	下利	四肢疼熱不去內拘急		四逆湯三味
亥 六 廿七	汗	厥	下利				四逆湯三味
亥 十一 廿八	汗	厥	下利清穀裏寒外熱				通脉四逆湯三味
柔痓 二 廿九	汗	發熱					太陽發熱汗出而當惡寒今不惡寒名曰柔痓

痓 四 三十	汗	太多致痓					病身熱足寒項頸強急恶寒時頭熱面赤目脉赤獨頭而搖卒口禁背反張者痓也
暍 一 三十一	汗	惡寒	渴	太陽中熱是也			
霍亂 四 三十二	汗出	吐利	惡寒發熱	厥	四肢拘急		四逆湯三味
霍亂 五 三十三	汗出	吐利	下利	小便復利	內寒外熱	微欲絕	四逆湯三味
霍亂 六 三十四	吐已下斷汗出	厥	四肢拘急不解			微欲絕	通脉四逆加猪膽汁湯四味

惡風門第十一　八法

辰 上二 一	惡風	頭痛	汗	發熱			桂枝湯五味

辰 上三 二	惡風	汗	几几項強				桂枝加葛根湯七味
辰 上七 三	惡風	發汗	小便難	四肢拘急難以屈伸			桂枝加附子湯六味
辰 中一 四	惡風	几几項背強	無汗				葛根湯七味
辰 中五 五	惡風	頭痛身疼	發熱	喘	無汗		麻黃湯四味
辰 中五十 六	惡風	手足溫而渴	項強	身熱脇滿	四五日		小柴胡湯七味
辰 下三十 七	惡風	大渴	若吐下後不解	熱結在裏			白虎加人參湯五味
辰 下卅八 八	惡風	汗出短氣小便不利	骨節疼	掣痛煩	風濕相搏不得屈伸	或身微腫	甘草附子湯四味

惡寒門第十二

二十法

辰 上一 一	嗇嗇惡寒	乾嘔汗	發熱中風	鼻鳴	淅淅惡風	陽浮陰弱	桂枝湯五味
辰 上十六 二	惡寒	汗	小便數	心煩脚攣急		浮	不可與桂枝同嘔吐門
辰 中八 三	惡寒	發熱	躁煩	汗不出	身疼痛	浮緊	大青龍湯七味
辰 中三十 四	惡寒	發汗不解	虛故也				芍藥甘草附子湯三味
辰 中五十九 五	惡寒	大渴發熱	腰滿小便利	自汗出	肝乘肺名曰橫		刺期門
辰 下十四 六	惡寒	頭汗	厥	痞	心下滿不欲食	大便硬脉細	為陽微結非少陰也可與小柴胡湯治之七味

辰 下十八 七	惡寒	汗	痞				附子瀉心湯四味
辰 下廿六 八	惡寒	痞	大下後 復發汗	不可攻 痞先攻其表	表解乃可攻痞		解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯
辰 下三十一 九	背微惡寒	口燥舌乾	渴	無大熱			白虎加人參湯五味
卯 二十一 十	微惡寒	汗出	表未解			遲	桂枝湯五味
子 十六 十一	惡寒	厥	下利清穀	裏寒外熱		微欲絕或不出	通脉四逆湯三味
子 四 十二	背惡寒	三日	日中和				附子湯五味
亥 五 十三	惡寒	大汗出 下利	厥逆四肢疼	熱不去內拘急			四逆湯三味

亥 四 十四	內有寒						當歸四逆加吳茱萸生薑湯七味
霍亂 一 十五	惡寒	脉微	而利				止者亡血也四逆加人參湯主之
剛痓 一 十六	惡寒	發熱					葛根湯七味
痓 五 十七	惡寒	目赤	口噤	項強	身熱足寒		
暍 一 十八	惡寒	汗	渴	太陽中熱是也			
暍 三 十九	惡寒	發熱	厥	身重而疼痛	口開前板齒燥	弦細芤遲	發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚下之則淋甚
霍亂 四 二十	惡寒	吐利汗出	發熱厥	四肢拘急			四逆湯三味

發熱門第十三

三十四法

辰 上一 一	發熱	乾嘔	惡寒	中風鼻鳴	陽浮陰弱	桂枝湯五味
辰 上二 二	發熱	頭痛	汗出	惡風		桂枝湯五味
辰 上五 三	發熱	汗不出			浮緊	不可與桂枝
辰 十五 四	發熱	頭痛	項強	心下滿痛	小便不利	桂枝加白朮湯五味
辰 中五 五	發熱	頭痛身疼	惡風	喘無汗		麻黃湯四味
辰 中八 六	發熱	身疼	惡寒	躁煩	汗不出	浮緊 大青龍湯七味

辰 中十 七	發熱	乾嘔	咳	表解心下有水氣		小青龍湯八味
辰 中十六 八	發熱	衄血	八九日不解表	身疼痛	發煩無汗	浮緊 麻黃湯四味
勞復 一九	熱上衝胷	傷寒陰陽易病少腹急	頭重不欲舉		眼中生花	烧褌散第一味
辰 中二十七 十	發熱	渴煩	有表裏證	水入則吐名曰水逆	六七日不解	欲飲水 五苓散五味
辰 中四十三 十一	發熱	頭眩	心悸	瞤	發汗不解	真武湯五味
辰 中五十九 十二	發熱	汗出惡寒	渴欲飲水	腹滿小便利	肝乘肺名曰橫	期門穴刺之
辰 下十五 十三	發熱	嘔	醫以他藥下之	柴胡証仍在		小柴胡湯蒸蒸而振却發汗出解 小柴胡湯七味

辰 下廿七 十四	發熱	嘔吐	汗出不解	心下痞	下利		大柴胡湯七味
辰 下二十二 十五	發熱	無汗	表未解			浮	不可與白虎湯渴者白虎加人參湯五味
卯 十一 十六	發熱	咽燥口苦舌上胎	汗喘腹滿	惡熱身重懊憹	若下之則胃中空虛	浮緊	梔子豉湯二味
卯 十三 十七	發熱	渴欲飲水	小便不利			浮	猪苓湯五味
卯 廿六 十八	發熱	汗出解	煩	如瘧狀	日晡發熱		脉實者大承氣湯四味 脉浮者桂枝湯五味
卯 卅二 十九	蒸蒸發熱	發汗不解				浮	調胃承氣湯三味
卯 二十七 二十	發熱	汗多	急下之				大承氣湯四味

卯 四十一 二十一	發熱	無表裏證	七八日可下之			數	假令已下不大便有瘀血下抵當湯主之四味
卯 四十三 二十二	發熱	黃					梔子黃蘗皮湯三味
子 一 二十三	發熱	始得之				沉	麻黃細辛附子湯三味
勞復 三 廿四	發熱						小柴胡湯七味
亥 十九 廿五	發熱	嘔					小柴胡湯七味
剛痓 一 廿六	發熱	惡寒					太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓
痓 二 廿七	發熱	自汗	不惡寒				名曰柔痓

痓 三 廿八	發熱						沉細
濕 二 廿九	發熱	身疼					
濕 五 三十	發熱	頭痛 身疼	面黃 而喘	鼻塞 而煩	腹中和 無病	大	故鼻塞內藥鼻中即愈
濕 六 三十一	發熱	身疼	日晡所劇者此名風濕	此病傷于汗出當風	或久傷冷所致		麻黃杏仁薏苡甘草湯
暍 二 卅二	發熱	惡寒	厥	身重 疼痛	口開前 板齒燥	弦細 芤遲	
霍亂 二 卅三	發熱	頭痛	身疼				熱多飲水者五苓散寒多不用水者理中丸
霍亂 四 卅四	發熱	吐利	汗出 惡寒	厥	四肢 拘急		四逆湯三味

寒熱門第十四 十法

辰 上十一	熱多 寒少	不嘔清 便自可	八九日	如瘧狀			桂枝麻黃各半湯六味
辰 上十四 二	熱多 寒少	發熱 惡寒				微弱	桂枝二越婢一湯七味
辰 中四十八 三	往來 寒熱	喜嘔	胷脇 滿	心煩	不欲 食	五六日	小柴胡湯七味
辰 中四十九 四	往來 寒熱	休作 有時					血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣分爭小柴胡湯七味
辰 下四 五	往來 寒熱	熱結 在裏	十餘日				大柴胡湯八味
辰 下十 六	往來 寒熱	婦人中風七八日間	經水 適斷	血結如 瘧狀			小柴胡湯七味

辰 下十二 七	發熱 微寒	微嘔	支節 疼	心下 支結		柴胡桂枝湯九味
辰 下十三 八	寒熱	頭汗 不嘔	胷滿 心煩	渴小便 不利	已發汗 復下之	五六日 柴胡桂枝乾薑湯七味
卯 三十 九	發熱 惡寒	汗渴	不嘔心 下痞	此壓下 之也	如不下 不惡寒 而渴	屬陽 明 俱以法救之五苓散五味
寅 一 十	寒熱	乾嘔	太陽病 不解轉 入少陽	脇下硬 不能食	尚未 吐下	沉緊 小柴胡湯七味

潮熱門第十五　十法

辰 中五十四 一	日晡 潮熱	嘔	胷脇 滿	十三日 不解		柴胡加芒消湯八味
辰 下五 二	潮熱從 心下至	舌燥 而渴	五六日 不大便	少腹滿 痛不可 近	重發汗 復下之	大陷胷湯三味

卯 二 三	潮熱	汗腹 滿	大便硬 不惡寒	身重 短氣		遲 大承氣湯四味若腹大滿不通小承氣湯三味
卯 三 四	潮熱	大便 微硬				大承氣湯四味若不大便六七日恐有燥屎小承氣湯
卯 四 五	潮熱	微喘	若吐下 十餘日 不解	如見鬼 狀直視 不惡寒		大承氣湯四味
卯 六 六	潮熱	讝語	不能 食	胃中有 燥屎		滑疾 小承氣湯三味
卯 七 七	潮熱	讝語	胃中有 燥屎	不能 入食		大承氣湯四味
卯 十 八	潮熱	二陽 併病	太陽 證罷	汗	大便 難	讝語 大承氣湯四味
卯 十六 九	潮熱	胷滿 不去	大便 溏			小柴胡湯七味

卯 十八 十	潮熱	心脇痛 腹滿	嗜卧小 使難黃 嚏	鼻乾 短氣	不得 汗	弦浮 大

小柴胡湯七味

傷寒類證卷中

仲景全書二十二

明 虞山人 趙開美校刊

厥門第十六

二十法

辰 下十四 一	厥	頭汗 惡寒	心下 滿痛	不欲 食	五六日 大便硬	細
子 五 二	厥	身疼骨 節痛				沉
子 八 三	厥欲 死者	吐利 燥煩				
子 十四 四	厥	利不 止	乾嘔			無脉
子 十六 五	厥	惡寒	下利 清穀	裏寒 外熱		微欲絕 或不出

為陽微結非少陰也小柴胡湯七味

附子湯五味

吳茱萸湯四味

白通加猪膽汁湯下利脉微白通湯

通脉四逆湯三味

子 十七 六 厥或悸或咳 四逆散加減附

子 廿三 七 厥 食入心中温則吐濕吐 四逆湯三味 弦遲

亥 一 八 蚘厥 靜而得食為藏時煩嘔吐寒 烏梅丸十味

亥 二 九 厥 熏有熱 白虎湯四味 滑

亥 三 十 厥 細欲絶 當歸四逆湯七味

亥 五 十二 厥 汗出腹疼熱去惡寒下利內拘急 四逆湯三味

亥 六 十三 厥大汗大下利 四逆湯三味

亥 七 十三 厥 心下滿煩 瓜蒂散二味 緊

亥 八 十四 厥 心悸宜先治水 茯苓甘草湯四味

亥 九 十五 厥 六七日大下後 十脈沉遲 麻黄升麻湯十四味

亥 十一 十六 厥汗 下利熏寒清穀外熱 通脈四逆湯三味

亥 十七 見厥難治 嘔 小便自利身有微熱 四逆湯三味 弱

曷 三 十八 厥 惡寒身重鼻前發熱疼痛齒燥 弦細芤遲

霍亂 四 十九 厥 吐利惡寒四肢汗出發熱拘急 四逆湯三味

霍亂 六二　厥　汗出 四肢拘急不解　吐已下　微欲絶　通脉四逆加猪膽汁湯四味

喘門第十七　十一法

辰 上六一　喘　桂枝加厚朴杏仁湯七味

辰 中五二　喘　頭痛身疼　惡風發熱　無汗　麻黃湯四味

辰 中六三　喘　胷滿　太陽陽明合病　不可下　麻黃湯四味

辰 中十四　喘　欬　表不解心下有水氣　小青龍湯八味

辰 中十三五　下之微喘　表未解　桂枝加厚朴杏仁湯七味

辰 中十六六　喘　汗出　無大熱　發汗後不可行桂枝　麻黃杏仁甘草石膏湯四味

卯 四七　微喘　潮熱　若吐下十餘日不解　不惡寒如見鬼狀直視　大承氣湯四味

卯 十一八　喘　咽乾呈　發熱懊憹　汗腹滿舌上胎　惡熱身重客氣動隔　若下之則胃中空虛　浮緊　梔子豉湯二味

卯 二十二九　喘　無汗　發汗則愈　浮　麻黃湯四味

濕 四十　喘　小便自利　下之額上汗出死

濕 五十一　面黃而喘　頭痛身疼　發熱煩　鼻塞　腹中和無病　大　故鼻塞內藥鼻中則愈

欬門第十八　四法

辰 中十一	咳	乾嘔	發熱 表不解心下有水氣			小青龍湯八味
辰 中十二	咳	微喘 心下有水氣				小青龍湯八味
子 十七三	咳	喘	心悸			四逆散主之
子 十八四	咳	嘔	六七日下利	煩	不得眠	猪苓湯五味

渴門第十九　十九法

辰 上十三一	渴	煩	發汗後		洪	大	白虎加人參湯五味
辰 中卅五二	渴	煩	發汗已		浮	數	五苓散五味

辰 中卅六三	渴	汗出				五苓散五味不渴者茯苓甘草湯四味
辰 中卅七四	渴	水入則吐	名曰水逆	發熱煩	有表裏證	六七日	五苓散五味
辰 中五十五	渴	惡風	身熱脇滿	手足溫而渴	四五日	頃強	小柴胡湯七味
辰 中五十九六	大渴飲水	腹滿汗出	惡寒發熱	小便自利	肝乘肺名曰橫		刺期門穴
辰 下五七	舌燥而渴	潮熱心下至	少腹滿痛不可迫	五六日不大便	重發汗後下之		大陷胷湯三味
辰 下十三八	大渴	不嘔頭汗	寒熱胷滿	心煩小便不利	發汗	後下之	柴胡桂枝乾薑湯七味
辰 下三十九	大渴	惡風	若吐下不解	熱結在裏			白虎加人參湯五味

辰 下卅一 十	渴	口燥 舌乾	無大 熱	背微 寒			白虎加人參湯五味
辰 下卅二 十一	渴	發熱	無汗	表未 解		浮	白虎加人參湯不渴者白虎湯四味
卯 十二 十二	渴	口乾 舌燥	欲飲 水				白虎加人參湯五味
卯 十三 十三	渴欲 飲水	發熱	小便 不利			浮	猪苓湯五味
卯 三十 十四	渴	惡寒 發熱	汗寒熱 心下痞	不嘔	此鹽下之也如不下不惡寒渴	屬陽 明	但以法救之五苓散五味
子 十八 十五	渴	咳嘔	六七日 下利	煩	不得 眠		猪苓湯五味
濕 三 十六	渴	頭汗 口燥	白胎 膏滿	小便 不利	噦		

暍 一 十九	渴	汗	惡寒	太陽中熱是也			

咽痛門第二十　三法

子 九 一	咽痛	膏滿 下利	心煩				猪膚湯三味
子 十 二	二三日 咽痛						甘草湯一味不差者桔梗湯二味半夏及湯三味
子 十一 三	咽中 生瘡	不能 言語	聲不 出者				苦酒湯二味

項強門第二十一　七法

辰 上三 一	項強	汗	惡風				桂枝加葛根湯七味

辰 上十五 二	項強	頭痛發熱	心滿微痛	小便不利	無汗	桂枝去桂加白朮茯苓湯六味
辰 中一 三	項強	惡風	几几	無汗		葛根湯七味
辰 中五十 四	項強	惡風	手足溫渴	身熱脇滿	四五日	小柴胡湯七味
辰 下一 五	項強	結胷	如柔痓狀	下則和		宜大陷胷丸六味
辰 下卅三 六	項強	頭眩	太陽少陽併病	心下硬	慎勿下之	刺大椎肝俞肺俞
痓 五 七	項強	目赤	口噤	發熱	身熱足寒	

胷滿門第二十二　十二法

辰 上八 一	胷滿			下後	脉促	桂枝去芍藥湯四味
辰 上九 二	胷滿	微寒		下後脉促		桂枝去芍藥加附子湯五味
辰 中六 三	胷滿	喘	太陽陽明併病	不可下		麻黃湯四味
辰 中七 四	胷滿	十日已去	嗜臥外已解	脇痛	浮細	小柴胡湯七味但脉浮者麻黃湯四味
辰 中四十八 五	胷滿	喜嘔	寒熱	心煩	不欲食	五六日中風往來 小柴胡湯七味
辰 中五十四 六	胷滿	嘔	日晡潮熱	十三日不解		柴胡加芒消湯八味
辰 中五十七 七	胷滿	小便不利	譫語驚煩	八九日下之身重		柴胡加龍骨牡蠣湯十二味

辰 下十三 八	胷滿	頭汗寒熱	小便不利	心煩嘔而不渴	五六日已發汗	復下之	柴胡桂枝乾薑湯七味
卯 十六 九	胷滿	潮熱	大便溏				小柴胡湯七味
子 九 十	胷滿	咽痛	下利	心煩			猪膚湯三味
濕 三 十一	胷滿	頭汗口燥	白胎	噦渴	小便不利		
勞復 五 十二	胷滿	胷上有寒					大病差後喜唾久不了了胷上有寒當以丸藥溫之理中丸四味

結胷門第二十三　四法

辰 下一 一	結胷	項強	如柔痓狀	下則和			大陷胷丸六味
辰 下三 二	六七日結胷	熱實	心痛			沉緊	大陷胷湯三味
辰 下六 三	小結胷	按之心下痛				浮滑	小陷胷湯三味
辰 下七 四	結胷	寒實	無熱証				病在陽應以汗解反以水潠熱不得去益煩不渴服文蛤散不差五苓散寒實結胷無熱症小陷胷白散亦可

心下痞門第二十四　十三法

辰 下八 一	痞	頭痛	瞀	太陽少陽併病			刺肝俞肺俞不可發汗汗之則讝語不止當于期門穴刺之
辰 下十五 二	心下滿痛為結胷但滿而不痛為痞	五六日嘔而發熱	醫絕藥下之柴胡証仍在	蒸蒸而振却發熱汗出解			結胷大陷胷湯三味痞宜半夏瀉心湯五味
辰 下十七 三	痞					按之濡	大黃黃連瀉心湯三味

辰 下十八 四　痞　汗　惡寒　附子瀉心湯四味

辰 下十九 五　痞　渴口燥煩小便不利　瀉心湯主之不解者五苓散五味

辰 下二十 六　痞　汗解後胃中不和　心下痞鞕　生薑瀉心湯主之八味

辰 下二十一 七　痞　反下之　心下痞益甚　甘草瀉心湯七味

辰 下二十二 八　心下痞　服藥利與理中不止　利益甚　赤石脂禹餘粮湯二味

辰 下二十三 九　痞　發汗吐下後　噫不除　旋復代赭湯七味

辰 下二十六 十　痞　惡寒　大下後復發汗　不可攻痞　先解表表解乃可攻痞　解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

辰 下廿七 十一　痞　吐利　汗出不解　發熱　胷滿　大柴胡湯八味

辰 下廿八 十二　痞　病如桂枝症　頭不痛項不強　氣上衝不得息　當吐之　寸浮　瓜蔕散二味

卯 三十 十三　痞　不嘔發熱　渴汗　惡寒　此鹽下之也如不下不惡寒而渴者　屬陽明　五苓散五味

心下滿痛門第二十五　七法

辰 下十五 一　心下滿痛　頭痛發熱　項強　小便不利　桂枝去桂加白朮茯苓湯六味

辰 中四十 二　心中結痛　身熱不去　五六日　大下之　梔子豉湯二味

辰 下三 三　心下滿痛　結胷　實熱　沉緊　大陷胷湯三味

辰 下六 四　心下滿痛　小結胷　寒實　浮滑　小陷胷湯三味

辰 下十五 五　心下滿痛為結胷症　但滿而不痛為痞　結胷大陷胷湯痞半夏瀉心湯

卯 十八 六　心下滿痛　潮熱　腹滿小便難　嗜卧身黄　嚥乾不得汗　弦浮大　小柴胡湯七味

子 二十 七　心下滿痛　心痛　口乾　下利清水　大承氣湯四味

心下悸門第二十六　五法

辰 中廿七 一　悸　叉手自冒心　發汗過多　欲得按者　桂枝甘草湯二味

辰 中四十三 二　悸　頭眩　發熱　瞤　發汗不解　真武湯五味

辰 中五十二 三　二三日心中悸　煩　小建中湯八味

辰 下四十 四　悸　結代　炙甘草湯九味

子 十七 五　或悸　厥　或欬　四逆散

脇滿門第二十七　二法

辰 中五十二 一　脇滿　惡風　手足溫而渴　身熱項強　四五日　小柴胡湯七味

卯 十七 二　脇滿　嘔　不大便　舌上胎　小柴胡湯七味

腹滿門第二十八　十三法

辰 中四十一 一	腹滿	下後心煩	卧起不安				梔子厚朴湯三味
辰 中五十八 二	腹滿	譫語	肝乘脾名曰縱			寸口浮緊	刺期門穴
卯 二 三	腹滿	汗	大便硬	潮熱不惡寒	身重短氣	遲	大承氣湯四味若腹大滿不通者小承氣湯三味
卯 九 四	腹滿	譫語	三陽合病	身重遺尿			白虎湯四味
辰 中二十九 五	腹滿	發汗後腹脹者					厚朴生薑半夏甘草人參湯五味
卯 十一 六	腹滿	咽乾口苦自汗	發熱喘懊憹	客氣動膈舌上白胎	若下之則胃中空虛	浮緊	梔子豉湯二味
卯 十八 七	腹滿	潮熱心痛	小便難身黃	噦嗜卧不得汗	鼻乾短氣	弦浮大	小柴胡湯七味

卯 二十七 八	腹滿痛	六七日不大便	煩	大下後本有宿食			大承氣湯四味
卯 三十二 九	腹脹滿	吐後					調胃承氣湯二味
卯 三十九 十	腹滿	不減亡不足言					大承氣湯四味
丑 二 十一	腹滿	太陽病反下之屬太陰					桂枝加芍藥湯五味
子 二十一 十二	腹滿	六七日不大便					大承氣湯四味
亥 十二 十三	腹滿	身疼	下利	先溫裏後攻表			溫裏四逆湯攻表桂枝湯

腹痛門第二十九　七法

辰 中五十一 一	腹中急痛						陽濇陰弦	小建中湯八味不差者小柴胡湯六味
辰 下三十五 二	腹痛	欲嘔	胷中有熱	胃中有邪				黃連湯七味
卯 二十七 三	腹滿痛	六七日不大便	煩	大下後本有宿食				大承氣湯四味
卯 三十八 四	腹痛	發汗不解	急下之					大承氣湯四味
丑 三 五	腹痛	太陽病反下之屬太陰						桂枝加芍藥湯五味大實痛者桂枝加大黃湯味六
子 七 六	腹痛	便膿血	二三日至四五日小便不利					桃花湯三味
子 十五 七	腹痛	四五日自下利	小便不利	四肢沉重				真武湯五味

少腹滿門第三十　三法

辰 中六十四 一	少腹滿	小便自利	身黃不結胷	六七日表證在發汗	已熱在下焦	沉微		下血乃愈抵當湯
辰 中六十六 二	少腹滿	小便不利今反利	有熱有血也					抵當丸四味
辰 下五 三	少腹滿痛不可近	潮熱從心下至	舌燥而渴	六七日不大便	重發汗復下之			大陷胷湯三味

下利門第三十一　二十五法

辰 中二 一	下利	太陽陽明合病						葛根湯七味
辰 中四 二	下利	桂枝証反下之						葛根黃連黃芩湯四味

辰 下十六 三	辰 下廿五 四	辰 下二十七 五	辰 下三十四 六	卯 十四 七	卯 四十 八	丑 二 九
下利	下利	下利	下利	下利 清穀	必下利	下利
嘔逆	外未除	嘔吐	太陽少陽合病	表熱裏寒	少陽陽明合病	不渴
	遂脇熱而利	汗			有宿食也	屬太陰
	數下之	發熱				其藏寒故也
		痞				
				浮遲	滑數	
表解乃可攻之十棗湯三味	桂枝人參湯五味	大柴胡湯八味	黃芩湯四味若嘔者黃芩加半夏生薑湯五味	四逆湯三味	大承氣湯四味	宜服四逆輩三味

子 九 十	子 十三 十一	子 十四 十二	子 十五 十三	子 十六 十四	子 十八 十五	子 二十 十六
下利	下利	下利	下利	下利 清穀	下利六 七日	自利 清水
胷滿			腹痛	裏寒外熱	咳而嘔渴	心下痛
心煩			小便不利	手足厥逆	煩不得眠	口乾
咽痛			四肢沉重疼痛	脉微欲絕		
			四五日	或利止脉不出		
		微				
猪膚湯三味	白通湯三味	白通湯若利不止乾嘔厥逆無脉與白通加猪膽汁湯主之	真武湯五味	通脉四逆湯四味	猪苓湯五味	大承氣湯四味

亥 五十七	下利	大汗出	惡寒	厥	熱不去內拘急四肢疼		四逆湯三味
亥 六十八	下利	汗	厥				四逆湯三味
亥 十一十九	下利清穀	汗出而厥	裏寒外熱				通脉四逆湯三味
亥 十二二十	熱利下重者						白頭翁湯四味
亥 十三二十一	下利	腹滿	身疼	先溫裏後攻表			溫裏四逆湯攻表桂枝湯
亥 十四二十二	下利	欲飲水者	有熱也				白頭翁湯四味
亥 十五二十三	下利	讝語	有燥屎也				小承氣湯三味

亥 十六廿四	下利	煩	按之心下濡虛				梔子豉湯二味
霍亂 五廿五	下利清穀	吐利	汗出	小便復利	內寒外熱	微欲絕	四逆湯三味

下利膿血門第三十二

二法

子 六一	下利膿血						桃花湯三味
子 七二	下利膿血	二三日至四五日	小便不利				桃花湯三味

大便硬門第三十三

七法

辰 下十四一	大便硬	頭汗	惡寒	厥	心下滿不欲食	細	小柴胡湯七味

辰 下三十七 二	大便硬	小便自利	身疼煩	風溫相搏不得轉仄	不嘔不渴	浮虛而濇	桂枝附子去桂加白朮湯五味
卯 二 三	大便硬	潮熱汗	腹滿	不惡寒	身重短氣	遲	大承氣湯主之若腹大滿不通者小承氣湯三味主之
卯 三 四	大便微硬	潮熱	大承氣湯四味				若不大便六七日恐有燥屎小承氣湯下之若不轉失氣不可攻之候發熱復硬小承氣湯和之
卯 五 五	大便硬	汗多	讝語	胃中燥			小承氣湯三味
卯 三十一 六	大便硬	小便數	其脾為約			陽浮濇	麻子人丸六味
卯 三十四 七	大便硬	微煩	發汗下後				小承氣湯三味

大便難門第三十四　二法

卯 十 一	大便難	二陽併病太陽証罹	汗	潮熱	讝語		大承氣湯四味
卯 三十六 二	大便難	目中不了了	睛不和無表裏證	六七日			大承氣湯四味

不大便門第三十五　七法

辰 中廿二 一	六七日不大便	頭痛有熱					小承氣湯三味看熱多少用之
辰 中廿二 二	不大便	頭痛有熱	小便清	六七日與小承氣小便清知不在裏			當發汗桂枝湯
辰 下五 三	五六日不大便	潮熱從心下至	舌燥而渴	少腹滿痛不可近者	重發汗復下之		大陷胸湯三味
卯 十七 四	不大便	嘔	脇滿	舌上胎			小柴胡湯七味

卯 二十七 五	六七日不大便	腹滿痛	小便不利	煩	大下後本有宿食	大承氣湯四味
卯 四十一 六	不大便	潮熱	無表裏証	可下之	假令已下不大便有瘀血	七八日脉数	抵當湯四味
子 二十一 七	不大便	腹滿	六七日				大承氣湯四味

小便不利門第三十六　十三法

辰 上十五 一	小便不利	發熱無汗	頭項強痛	心下滿痛	桂枝或下後	桂枝去桂加白朮茯苓湯六味
辰 中二十四 二	小便不利	不得眠	胃中乾煩燥	發汗後大汗出	欲飲水	五苓散五味
辰 中五十七 三	小便不利	下利	讝語	驚煩	八九日下之	身重胷滿	柴胡加龍骨牡蠣湯十二味
辰 下十三 四	小便不利	頭汗寒熱	渴不嘔胷滿	心煩	發汗後復下之	柴胡桂枝乾薑湯七味
辰 下二十八 五	小便不利	汗出短氣惡風	掣痛煩	或身微腫	風濕相搏骨節疼	不得屈伸	甘草附子湯四味
卯 十三 六	小便不利	發熱	渴欲飲水			浮	猪苓湯五味
卯 二十二 七	小便不利	頭汗	黄				茵蔯蒿湯三味
卯 二十八 八	小便不利	大便乍難乍易	時有微熱				大承氣湯四味
卯 四十二 九	小便不利	七八日身黄	如橘色				茵蔯蒿湯三味
子 七 十	小便不利	下利膿血	二三日至四五日	腹痛	小便不利		桃花湯三味

子 十五 十一
小便不利　自下利　四五日腹痛　四肢沉重疼痛
真武湯

濕 三 十二
小便不利　頭汗　口燥　白胎渴噦　脊滿

小便難門第三十七　二法

辰 上七 一
小便難　發汗　遂漏不止　惡風　四肢微急　難以屈伸
桂枝加附子湯六味

卯 十八 二
小便難　潮熱心痛　腹滿嗜臥身黃　短氣噦　鼻乾不得汗　弦浮大
小柴胡湯七味

小便數門第三十八　二法

辰 上十六 一
小便數　自汗微惡寒　心煩脚攣急　脉浮
與桂枝得之便厥　咽乾煩燥吐逆甘草乾薑湯主之　厥愈芍藥甘草湯主之其脚伸若胃氣不和調胃承氣湯主之若重發汗燒針者四逆湯主之

卯 三十一 二
小便數　大便硬　其脾為約
趺陽浮濇
麻子人丸六味

小便自利門第三十九　九法

辰 中五十九 一
小便自利　汗出惡寒　發熱渴欲飲水　腹滿　肝乘肺名曰橫
刺期門穴

辰 中六十四 二
小便自利　少腹滿　不結胸其人如狂　已熱在下焦　六七日表証在　沉微
下血乃愈抵當湯四味

辰 中六十五 三
小便自利　身黃　少腹硬　血證締也　狂　沉結
抵當湯四味

辰 中六十六 四
小便自利　少腹滿　小便不利今反利之　有熱有血也
抵當丸四味

辰 下三十六 五
小便自利　身疼　煩　大便硬
浮虛而濇
桂枝附子去桂加白朮湯五味

卯 二十六	小便自利	自汗若發汗	津液內竭	雖硬不可攻	須自大便		蜜煎導而通之若木瓜根猪膽汁湯主之
卯 三十五 七	小便自利	躁煩	心下硬	屎定硬	無太陽柴胡証	二三日脉弱	大承氣湯四味
亥 十七 八	小便自利	嘔	厥者難治	身有微熱		弱	四逆湯三味
濕 四 九	小便自利	喘					

小便清門第四十　十二法

辰 中廿二 一	小便清	頭痛有熱	不大便六七日	宜承氣湯	小便清者	知不在裏	桂枝湯五味
辰 中五十五 二	小便清	譫語	十三日過經	下利脉和			調胃承氣湯三味
辰 下九 三	小便清	婦人中風	經水適來	脇下滿	譫語	遲	刺期門穴
辰 下十一 四	小便清	婦人傷寒	經水適來	發熱譫語			無犯胃氣及上二焦自愈
卯 五 五	小便清	汗多	大便硬	胃中燥	譫語		小承氣湯二味
卯 六 六	小便清	潮熱	譫語			滑疾	小承氣湯三味
卯 七 七	小便清	潮熱	譫語	不能食	胃中有燥屎		大承氣湯四味
卯 八 八	小便清	譫語	汗出	有燥屎在胃中	過經乃可下之		大承氣湯四味
卯 九 九	小便清	腹滿	三陽合病	身重	譫語	遺屎	白虎湯四味

卯 十十	小便清	二陽併病太陽証罷	汗	潮熱	大便難	譫語
亥 十五 十一	小便清	下利有燥屎				

大承氣湯四味

小承氣湯三味

傷寒類證卷下

明　虞山人　趙開美校刊

冒門第四十一　二法

辰 中二十七 一	叉手冒心	發汗過多	心悸	欲得按者	
辰 下八 二	冒	頭痛	頭眩	心下痞	太陽少陽併病

桂枝甘草湯二味

刺肝俞肺俞不可法汗汗之則譫語不止當刺期門穴

煩門第四十二　三十二法

辰 上十一 一	煩	服桂枝湯不解			
辰 上十三 二	煩	渴	大汗出		洪大

心煩　微煩　益煩　驚煩

刺風池風府却與桂枝湯風府上髮際一寸風池後髮際陷中

白虎加人參湯五味

辰	中十六	中廿三	中卅五	中卅七	中卅八	中卅九	中四十一
三	四	五	六	七	八	九	十
發煩	煩	煩	煩	虛煩	熱煩	心煩	微煩
衄血身疼	發汗半日許後熱	渴	發熱中風	懊憹	胷中窒	腹滿	身熱不去
發汗已		發汗已	渴欲飲水	不得眠	發汗下後	下後卧起不安	醫以丸藥下之
發熱			水入則吐名曰水逆	發汗			
八九日不解表			六七日不解	吐下後			
無汗浮緊	浮數	浮數	有表裏證				
麻黃湯四味	桂枝湯五味	五苓散五味	五苓散五味	梔子豉湯二味少氣者梔子甘草豉湯三味嘔者梔子生薑豉湯三味	梔子豉湯二味	梔子厚朴湯三味	

辰	中四十二	中四十八	中五十二	中五十三	中五十七	下七	下十三
十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	
微煩	心煩	煩	微煩	驚煩	益煩	心煩	
身熱不去	喜嘔	心下悸	過經十餘日	胷滿小便不利	不渴	渴而不嘔	
醫以丸藥下之	往來寒熱	二三日	反三三下之後四五日柴胡證仍在	譫語	病在陽以汗解反以水潠	寒熱	
	胷脇滿			八九日下之身重	熱不去者	胷脇滿	
	不欲食					發汗復下	
	五六日						
梔子乾薑湯二味	小柴胡湯七味	小建中湯八味	大柴胡湯八味	柴胡加龍骨牡蠣湯十二味	文蛤散一味不差者五苓散五味	柴胡桂枝乾薑湯七味	

辰 下卅六 十七	煩	身疼	不嘔不渴			浮虛而濇
辰 下卅六 十八	煩	身疼	大便硬	小便自利		
卯 一 十九	心煩	不吐不下				
卯 二十五 二十	煩	下之心中懊憹	胃中有燥屎			
卯 二十六 二十一	煩	汗出解	日晡發熱	如瘧狀		
卯 二十七 二十二	煩	腹滿痛	六七日不大便	大下後本有痛食		
卯 三十四 二十三	微煩	大便硬	若吐下發汗後			

桂枝附子湯六味

桂枝附子去桂加白朮湯五味

調胃承氣湯三味

大承氣湯四味

脉實者大承氣湯脉虛浮者桂枝湯

大承氣湯四味

小承氣湯和之

子 三 二十四	心煩	不得卧二三日已上				
子 九 二十五	心煩	咽痛	胷滿	下利		
子 十八 二十六	心煩	嘔欬	渴	下利	不得眠	
亥 一 二十七	煩	得食而嘔吐	蚘厥			
亥 七 二十八	煩	厥	心滿			乍緊
亥 十六 二十九	煩	下利	按之心下濡	虛故也		
濕 一 三十	煩	關節疼	小便不利	大便反快		沉細

黃連阿膠湯五味

猪膚湯三味

猪苓湯五味

烏梅丸十味

瓜蔕散二味

梔子豉湯二味

當利小便

濕 五 三十二	煩	身疼頭痛	發熱	面黃而喘	腹中和無病	大
						故鼻塞內藥鼻中即愈

躁煩門第四十三 七法

辰 上十六 一	躁煩	嘔逆咽乾				治厥甘草乾薑湯一味
辰 中八 二	躁煩	身疼惡寒	發熱汗不出	中風		浮緊
						大青龍湯七味
辰 中二十四 三	晝日躁煩	不得眠	不嘔不渴	夜安靜無表證	下之後復發汗	沉微
						乾薑附子湯二味
辰 中三十二 四	躁煩	發汗不解	下之			茯苓四逆湯五味
辰 中六十二 五	躁煩	火逆下之	因燒針			桂枝甘草龍骨牡蠣湯四味
辰 下三十五 六	躁煩	小便自利	無太陽柴胡証	心下硬屎定硬		弱
						大承氣湯四味
子 八 七	躁煩	吐利	厥欲死			吳茱萸湯四味

發狂門第四十四 四法

辰 中五十六 一	發狂	熱結膀胱				桃核承氣湯五味
辰 中六十 二	驚狂	鬱火劫之亡陽	卧起不安	亡陽		浮
						桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
辰 中六十四 三	發狂	少腹滿小便自利	不結胸	已熱在下焦	六七日表正在	沉微
						下血乃愈抵當湯四味
辰 中六十五 四	發狂	小便自利	黃	少腹硬	血證諦也	沉結
						抵當湯四味

心中懊憹門第四十五 五法

辰 中三十八 一	懊憹	虛煩	不得眠	發汗吐下後		梔子豉湯二味少氣者梔子甘草豉湯三味嘔者梔子生薑豉湯三味
辰 下二 二	懊憹	陽氣內陷	心下硬			大陷胸湯三味
卯 十一 三	懊憹	咽乾口苦發熱	腹滿喘汗	惡熱身重苦不可以胃中空虛	客氣動隔舌上白胎	浮緊 梔子豉湯二味
卯 十五 四	懊憹	頭汗	下之外有熱	手足溫不結胸	不能食	梔子豉湯二味
卯 二十五 五	下之懊憹	煩	胃中有燥屎			大承氣湯四味

發黃門第四十六 七法

辰 中六十五 一	發黃	小便利	狂	少腹硬	血證諦也	沉結 抵當湯四味
卯 十八 二	黃	嗜卧潮熱	短氣腹滿心痛	小便難不得汗	鼻乾濊	脉弦浮大 小柴胡湯七味
卯 二十三 三	發黃	頭汗	小便不利			茵蔯蒿湯三味
卯 四十二 四	七八日知橘色	小便不利				茵蔯蒿湯三味
卯 四十三 五	黃	發熱				梔子黃蘗皮湯三味
卯 四十四 六	黃	瘀熱在裏				麻黃連翹赤小豆湯八味
濕 二 七	黃	身疼	發熱			

不得眠門第四十七 五法

辰 中廿四 一	不得眠	晝日躁煩	下之後復發汗	夜安靜無表証	不嘔不渴	沉微
辰 中二十四 二	不得眠	小便不利	胃中有躁屎	發汗後大汗出	欲飲水	
辰 中三十八 三	不得眠	虛煩	懊憹	發汗	吐下後	
子 十八 四	不得眠	嘔欬	渴煩	六七日下利		
子 三 五	不得眠	心煩	二三日已上			

乾薑附子湯二味

五苓散五味

梔子豉湯二味少氣者梔子甘草豉湯三味嘔者梔子生薑豉湯

猪苓湯五味

黃連阿膠湯五味主之

身瞤門第四十八 一法

辰 中四十三 一	瞤	頭眩	發熱	心悸	發汗不解	

真武湯五味

噦噫門第四十九 三法

卯 十八 一	噦	漸熱心悸	腹滿脇下及心痛	小便難嗜卧身黃	鼻乾不得汗	弦浮大
濕 三 二	噦	頭汗	口燥白胎	身疼胷滿	渴	小便不利
辰 下二十三 三	心下痞噫不除	發汗	吐下後			

小柴胡湯七味

旋復代赭湯七味

雜門類第五十 二十四法

辰 上四 一	下之後其氣上衝					

桂枝湯五味

辰	中九	中十二	中十四	中十五	中十七	中廿八
上十二 二	三	四	五	六	七	八
服桂枝大汗出	但重乍輕有時	當汗解	外證未解	發汗不解反下之	可發汗病在表	發汗後臍下悸
	無少陰證	外證未解	不可下之			欲作奔豚
	身不疼		下之為逆			
洪大	浮緩	浮弱		浮	脉浮者脉浮數共二證	
桂枝形似瘧一日再發桂枝二麻黃一湯	大青龍湯七味	桂枝湯五味	桂枝湯五味	桂枝湯五味	麻黃湯四味	茯苓桂枝甘草大棗湯四味

勞復	中三十三	中四十四	中四十六	中六十一	中六十三	下二十九
四九	十	十一	十二	十三	十四	十五
從腰已下有水氣者	發汗後恐寒虛故也	汗家重發汗恍惚心亂	病未解	燒針被寒針處核起	過經十餘日溫溫欲吐	
牡蠣澤瀉散七味主之	不惡寒但熱者實也	小便已陰疼	脉陰陽俱停	必發奔豚氣	胷中痛	
			陰脉微		大便溏	
無水氣者只勞復者枳實梔子湯主之三味	調胃承氣湯三味	禹餘粮丸	下之宜調胃承氣湯三味	乃能泄奔氣桂枝加桂湯五味	調胃承氣湯三味	病在脇下素有痞連胳痛引少腹者此名藏結死

辰 下卅九 十六	表有熱 裏有寒					浮滑	白虎湯四味
卯 十九 十七	無餘證者					浮	麻黃湯四味
卯 二十四 十八	喜忘	必有畜血	大便黑				抵當湯四味
丑 一 十九	可發汗					浮	桂枝湯五味
子 二 二十	三日						麻黃附子甘草湯三味
子 二十二 二十一	急溫之					沉	四逆湯三味
暍 二 二十二	身熱重					微	此夏月傷水水行皮膚中所致

勞 一 廿二	復若已後更發熱						小柴胡湯七味
卯 四十四 廿四	發黃	瘀血在裏					麻黃連翹赤小豆湯八味





金匱要略序

聖人設醫道以濟夭枉俾天下萬世人盡天年惻施濟衆仁不可加矣其後繼聖開學造極精妙著于時名于後者和緩扁鵲之外亦不多見信斯道之難明也與漢長沙太守張仲景以頴特之資徑造閫奥於是採摭羣書作傷寒卒病論方合十六卷以洪後學遵而用之困斃廢起莫不應效若神迹其功在天下猶水火穀粟然是其書可有而不可無者也惜乎後之傳者止得十卷而六卷則亡之宋翰林學士王洙偶得雜病方三卷於廬簡中

名曰金匱方論即其書也豐城之劍不終埋沒何其幸耶林億等奉旨校正並板行于世今之傳者渡失三卷豈非世無和氏而至寶妄倫於荊石與僕幼嗜醫書旁索羣隱乃獲于盱之丘氏遂得與前十卷表裏相資學之者動免掣肘嗚呼張茂先嘗言神物終當有合是書也安知不有所待而合顯於今也故不敢秘特勒諸梓与四方共之由是張氏之學不遺軒岐之道昭著林林總總壽域同躋豈曰小補之哉後至元庚辰樵川王佩鄧珍敬序

金匱要畧方論序

張仲景為傷寒卒病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王洙在館閣日於蠹簡中得仲景金匱玉函要畧方三卷上則辯傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳之士流才數家耳嘗以對方證對者施之於人其効若神然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備國家詔儒臣校正醫書臣奇先校定傷寒論次校定金匱玉函經今又校成此書仍以逐方次於證候

之下使倉卒之際便於檢用也又採散在諸家之方附於逐篇之末以廣其濂以其傷寒文多節畧故所自雜病以下終於飲食禁忌凡二十五篇除重復合二百六十二方勒成上中下三卷依舊名曰金匱方論臣奇嘗讀魏志華佗傳云出書一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尚奇恠不合聖人之經臣奇謂活人者必仲景之書也大哉炎黃聖濂屬我盛旦恭惟主上丕承大統撫育元元頒行方書拯濟疾苦使和氣盈溢而萬物莫不盡蘇矣　太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外郎臣孫奇尚書司封郎中充祕閣校理臣林億等傳上

仲景金匱錄岐黃素難之方近將千卷患其混雜煩重有求難得故周流華裔九州之內收合奇異捃拾遺逸揀選諸經筋髓以為方論一編其諸救療暴病使知其次第凡此藥石者是諸僊之所造服之將來固無夭橫或治療不早或被師誤幸具詳焉

金匱要畧方論卷上　仲景全書二十四

漢　長沙守　張　機仲景述
晉　太醫令　王叔和　集
宋　尚書司封郎中充秘閣校理臣　林億詮次
明　虞山人　趙開美　校刻

臟腑經絡先後病脉證第一

論十三首　脉證二條

問曰。上工治未病。何也。○師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。四季脾王。不受邪。即勿補之。中工不曉相傳。見肝之病。不解實脾。惟治肝

也夫肝之病補用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦苦入心甘入脾脾能傷腎腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛則肝自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用此法實則不在用之經曰虛虛實實補不足損有餘是其義也餘藏準此○夫人稟五常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能害萬物如水能浮舟亦能覆舟若五臟元真通暢人即安和客氣邪風中人多死千般疢難不越三條一者經絡受邪入臟腑為內所因也二者

四肢九竅血脉相傳壅塞不通為外皮膚所中也三者房室金刃蟲獸所傷以此詳之病由都盡若人能養慎不令邪風干忤經絡適中經絡未流傳腑臟即醫治之四肢纔覺重滯即導引吐納鍼灸膏摩勿令九竅閉塞更能無犯王法禽獸災傷房室勿令竭乏服食節其冷熱苦酸辛甘不遣形體有衰病則無由入其腠理腠者是三焦通會元真之處為血氣所注理者是皮膚臟腑之文理也○問曰病人有氣色見於面部願聞其說○師曰鼻頭色青腹中痛苦冷者死一云腹中冷苦痛者死鼻頭色微

黑者有水氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微赤非時者死其目正圓者痙不治又色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者便難色鮮明者有留飲

師曰病人語聲寂然言微為呼者骨節間病語聲喑喑然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者頭中病（一作痛）

師曰息搖肩者心中堅息引胸中上氣者欬息張口短氣者肺癰唾膿

師曰吸而微數其病在中焦實也當下之即愈虛者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振振者不治

師曰寸口脈動者因其王時而動假令肝王色青四時各隨其色肝色青而反色白非其時色脈皆當病

問曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何謂也〇師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陰之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而天大寒不解此為至而至而不至也以得甲子而天未溫和為

不去也。以得甲子而天温如盛夏五六月時。此為至而太過也。

師曰。病人脉浮者在前。其病在表。浮者在後。其病在裏。腰痛背强。不能行。必短氣而極也。

問曰。經云。厥陽獨行。何謂也。○師曰。此為有陽無陰。故稱厥陽。

問曰。寸脉沈大而滑。沈則為實。滑則為氣。實氣相搏。血氣入臟即死。入腑即愈。此為卒厥。何謂也。○師曰。唇口青。身冷。為入臟即死。如身和。汗自出。為入腑即愈。

問曰。脉脫入臟即死。入腑即愈。何謂也。○師曰。非為一病。百病皆然。譬如浸淫瘡。從口起。流向四肢者可治。從四肢流来入口者。不可治。病在外者可治。入裏者即死。

問曰。陽病十八。何謂也。○師曰。頭痛。項腰脊臂脚掣痛。

陰病十八。何謂也。○師曰。欬上氣喘噦咽。腸鳴脹滿。心痛拘急。五臟病。各有十八。合為九十病。人又有六微。微有十八病。合為一百八病。五勞。七傷。六極。婦人三十六病。不在其中。清邪居上。濁邪居下。

大邪中表小邪中裏縈飪之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於暮濕傷於下霧傷於上風令脉浮寒令脉急霧傷皮膚濕流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡

問曰病有急當救裏救表者何謂也○師曰病醫下之續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也○夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也○師曰五臟病各有得者愈五臟病各有所惡各隨其所不喜者為病病者素不應食而反暴思之必

發熱也○夫諸病在藏欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與猪苓湯餘皆倣此

痙濕暍病脉證第二

論一首　脉證十二條　方十一首

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痙（一作痓餘同）

太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔痙○太陽病發熱脉沈而細者名曰痙為難治○太陽病發汗太多因致痙○夫風病下之則痙復發汗必拘急○瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痙

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤

獨頭動搖卒口噤背反張者痓病也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脉如蛇（一云其脉沈）○暴腹脹大者為欲解脉如故反伏弦者痓○夫痓脉按之緊如弦直上下行（一作築築而弦脉經云痓家其脉伏堅直上下）○痓病有灸瘡難治○脉經云痓家其脉伏堅直上下。

太陽病其證備身體強几几然脉反沈遲此為痓。

栝蔞桂枝湯主之。

栝蔞桂枝湯方

栝蔞根二兩　桂枝三兩　芍藥三兩

甘草二兩　生姜三兩　大棗十二枚

右六味以水九升煮取三升分温三服取微汗汗不出食頃啜熱粥發之。

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓葛根湯主之。

葛根湯方

葛根四兩　麻黃三兩去節　桂二兩去皮　芍藥二兩　甘草二兩炙　生姜三兩　大棗十二枚

右七味咬咀以水七升先煮麻黃葛根減二升。

去沫。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝湯法。將息及禁忌。

痙為病。一本痙字上有剛字胷滿口噤。臥不着席。脚攣急。必齘齒。可與大承氣湯。

大承氣湯方

大黃四兩酒洗　厚朴半斤炙去皮　枳實五枚炙　芒硝三合

右四味。以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。內大黃。煮取二升。去滓。內芒硝。更上火。微一二沸。分溫再服。得下止服。

太陽病。關節疼痛而煩。脉沉而細一作緩者。此名濕痺。王函云中濕濕痺之候。小便不利。大便反快。但當利其小便。〇濕家之為病。一身盡疼。一云疼煩發熱。身色如熏黃也。〇濕家其人但頭汗出。背強。欲得被覆向火。若下之早。則噦。或胷滿。小便不利。一云利舌上如胎者。以丹田有熱。胷上有寒。渴欲得飲而不能飲。則口燥煩也。〇濕家下之。額上汗出。微喘。小便利一云不利者死。若下利不止者亦死。〇風濕相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云此可發汗。汗之病不愈者。何也。蓋發其汗。汗大出者。

但嘔氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲出汗者風濕俱去也〇濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈脉經云病人喘而無濕家病以下至而喘十一字〇濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之

麻黃加朮湯方

麻黃三兩去節　桂枝二兩去皮　甘草二兩炙
杏仁七十箇去皮尖　白朮四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃去節半兩湯炮　甘草一兩炙　薏苡仁半兩
杏仁十箇去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢七水盞半煮八分去滓溫服有微汗避風

風濕脉浮身重汗出惡風者防己黃耆湯主之

防已黃耆湯方

防已一兩　甘草半兩炒　白朮七錢半
黃耆一兩一分去蘆

右剉麻豆大。每抄五錢七。生姜四片。大棗一枚。水盞半。煎八分。去滓。溫服。良久再服。〇喘者加麻黃半兩。〇胃中不和者。加芍藥三分。〇氣上衝者。加桂枝三分。〇下有陳寒者。加細辛三分。〇服後當如蟲行皮中。從腰下如氷。後坐被上。又以一被繞腰以下。溫令微汗差。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若大便堅。小便自利者。去桂加白朮湯主之。

桂枝附子湯方

桂枝四兩去皮　生姜三兩切　附子三枚炮去皮破八片
甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。

白朮附子湯方

白朮二兩　附子一枚半炮去皮　甘草一兩炙
生姜一兩半切　大棗六枚

右五味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫三服。一

服覺身痺。半日許。再服。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。即是朮附並走皮中。逐水氣。未得除故耳。

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出。短氣。小便不利。惡風。不欲去衣。或身微腫者。

甘草附子湯主之。

甘草附子湯方

甘草二兩炙　白朮二兩　附子二枚炮去皮

桂枝四兩去皮

右四味。以水六升。煑取三升。去滓。溫服一升。日三服。初服得微汗則解。能食。汗出復煩者。服五合。恐一升多者。服六七合為妙。

太陽中暍。發熱惡寒。身重而疼痛。其脉弦細芤遲。小便已。洒洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口前開。板齒燥。若發其汗。則其惡寒甚。加溫針。則發熱甚。數下之。則淋甚。

太陽中熱者。暍是也。汗出惡寒。身熱而渴。白虎加人參湯主之。

白虎人參湯方

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩

粳米六合　人參三兩

右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

太陽中暍。身熱疼重而脈微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中所致也。一物瓜蒂湯主之。

一物瓜蒂湯方

瓜蒂二十箇

右剉。以水一升。煮取五合。去滓。頓服。

百合狐惑陰陽毒病證治第三

論一首　證三條　方十二首

論曰。百合病者。百脈一宗。悉致其病也。意欲食。復不能食。常默默欲臥。不能臥。欲行不能行。欲飲食。或有美時。或有不用。聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦。小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形如和。其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。淅然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日。或一月微見者。各隨證治之。

百合病發汗後者。百合知母湯主之。

百合知母湯方

百合七枚擘　知母三兩切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

百合病下之後者滑石代赭湯主之

滑石代赭湯方

百合七枚擘　滑石三兩碎綿裹　代赭石如彈丸大一枚碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服

百合病吐之後者用後方主之

百合雞子湯方

百合七枚擘　雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻煎五分溫服

百合病不經吐下發汗病形如初者百合地黃湯主之

百合地黃湯方

百合七枚擘　生地黃汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合分溫再服中病勿更服大便當如漆

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之

百合洗方

右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煑餅勿以鹽豉也

百合病渴不差者用後方主之

括蔞牡蠣散方

括蔞根　牡蠣熬等分

右為細末飲服方寸匕日三服

百合病變發熱者一作發寒熱百合滑石散主之

百合滑石散方

百合一兩炙　滑石三兩

右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復

下之此亦為逆。

狐惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲嗄一作嗌甘草瀉心湯主之。

甘草瀉心湯方

甘草四兩　黃芩三兩　人參三兩

乾姜三兩　黃連一兩　大棗十二枚

半夏半斤

右七味水一斗煮取六升去滓再煎溫服一升。日三服。

蝕於下部則咽乾苦參湯洗之。

蝕於肛者雄黃熏之。

雄黃

右一味為末筒瓦二枚合之燒向肛熏之。脉經云病人或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之。

病者脉數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鴆眼七八日目四眥一本此有黃字黑若能食者膿已成也赤豆當歸散主之。

赤豆當歸散方

赤小豆三升浸令芽出曝乾 當歸

右二味杵為散漿水服方寸匕日三服。

陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治升麻鱉甲湯主之

陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之。

升麻鱉甲湯方

升麻二兩 當歸一兩 蜀椒炒去汗一兩

甘草二兩 雄黃半兩研 鱉甲手指大一片炙

右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗。

肘後千金方陽毒用升麻湯無鱉甲有桂陰毒用甘草湯無雄黃。

瘧病脉證并治第四

證二條 方六首

師曰瘧脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可温之弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之

○病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何○師曰此結為癥瘕名曰

瘧母急治之宜鱉甲煎丸

鱉甲煎丸方

鱉甲十二分炙　烏扇三分燒　黃芩三分
柴胡六分　鼠婦二分熬　乾姜二分
大黃三分　芍藥五分　桂枝三分
葶藶一分熬　石韋三分去毛　厚朴三分
牡丹五分去心　瞿麥二分　紫威三分
半夏一分　人參一分　蠐螬五分熬
阿膠三分炙　蜂窠四分炙　赤消十二分
蜣蜋六分熬　桃仁二分

右二十三味為末取竈下灰一斗清酒一斗五斗浸灰候酒盡一半着鱉甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸日三服

千金方用鱉甲十二片又有海藻二分大戟一分蠐螬五分無鼠婦赤消二味以鱉甲煎和諸藥為丸

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩寃手足熱而欲嘔名曰癉瘧若但熱不寒者邪氣內藏於心外合分肉之間令人消鑠脫肉

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白

虎加桂枝湯主之。

白虎加桂枝湯方

知母六兩　甘草二兩炙　石膏一斤

粳米二合　桂去皮三兩

右剉。每五錢。水一盞半。煎至八分。去滓。温服。汗出愈。

瘧多寒者。名曰牡瘧。蜀漆散主之。

蜀漆散方

蜀漆燒去腥　雲母燒二日夜　龍骨等分

右三味。杵為散。未發前。以漿水服半錢。○温瘧加蜀漆半分。臨發時。服一錢七。一方雲母作雲實。

附外臺秘要方

牡蠣湯治牡瘧

牡蠣四兩熬　麻黃四兩去節　甘草二兩

蜀漆三兩

右四味。以水八升。先煑蜀漆麻黃。去上沫。得六升。内諸藥。煑取二升。温服一升。若吐。則勿更服。○柴胡去半夏。加括蔞湯。治瘧病發渴者。亦治勞瘧。

柴胡八兩　人參三兩　黃芩三兩

甘草三兩　括蔞根四兩　生姜二兩
大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日二服

柴胡姜桂湯治瘧寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神

柴胡半斤　桂枝三兩去皮　乾姜二兩
黄芩三兩　括蔞根四兩　牡蠣三兩熬
甘草二兩炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

中風歷節病脉證并治第五

論一首　脉證三條　方十一首

夫風之為病當半身不遂或但臂不遂者此為痺脉微而數中風使然○寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為虚寒虚相搏邪在皮膚浮者血虚絡脉空虚賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於府即不識人邪入於藏舌即難言

口吐涎。

侯氏黑散治大風四肢煩重心中惡寒不足者。外臺治風癮。

菊花四十分　白朮十分　細辛三分

茯苓三分　牡蠣三分　桔梗八分

防風十分　人參三分　礬石三分

黃芩五分　當歸三分　乾姜三分

芎藭三分　桂枝三分

右十四味。杵為散。酒服方寸七。日一服。初服二十日。溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。自

能助藥力在腹中不下也。熱食即下矣。冷食自能助藥力。

寸口脉遲而緩。遲則為寒。緩則為虛。榮緩則為亡血。衛緩則為中風。邪氣中經。則身痒而癮疹。心氣不足。邪氣入中。則胸滿而短氣。

風引湯除熱癱癇

大黃　乾姜　龍骨各四兩

桂枝三兩　甘草　牡蠣各二兩

寒水石　滑石　赤石脂

白石脂　紫石英　石膏各六兩

右十二味。杵麤篩。以韋囊盛之。取三指撮井花水三升。煑三沸。溫服一升。治大人風引。少小驚癇瘈瘲。日數十後。醫所不療。除熱方巢。○脚氣宜風引。

防已地黃湯。治病如狂狀。妄行獨語不休。無寒熱。其脉浮。

防已一錢　桂枝三錢　防風三錢

甘草二錢

右四味。以酒一盃。浸之一宿。絞取汁。生地黃二斤。㕮咀。蒸之如斗米飯久。以銅器盛其汁。更絞地黃汁。和分再服。

頭風摩散方

大附子一枚炮　鹽等分

右二味。為散。沐了。以方寸匕。已摩疾上。令藥力行。

寸口脉沉而弱。沉即主骨。弱即主筋。沉即為腎。弱即為肝。汗出入水中。如水傷心。歷節黃汗出。故曰歷節。

趺陽脉浮而滑。滑則穀氣實。浮則汗自出。

少陰脉浮而弱。弱則血不足。浮則為風。風血相搏。即疼痛如掣。盛人脉濇小。短氣。自汗出。歷節疼。不

可屈伸。此皆飲酒汗出當風所致

諸肢節疼痛。身體魁羸。脚腫如脫。頭眩短氣。温温欲吐。桂枝芍藥知母湯主之。

桂枝芍藥知母湯方

桂枝 四兩　芍藥 三兩　甘草 二兩

麻黃 二兩　生薑 五兩　白朮 五兩

知母 四兩　防風 四兩　附子 二枚 炮

右九味。以水七升。煮取二升。温服七合。日三服。

味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰泄。醎則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯泄相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛俱微。三焦無所禀。四屬斷絶。身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便為歷節也。

病歷節。不可屈伸。疼痛。烏頭湯主之。

烏頭湯方。治脚氣疼痛。不可屈伸。

麻黃　芍藥　黃芪 各三兩

甘草 炙　川烏 五枚 咬咀。以蜜二升。煎取一升。即出烏豆。

右五味。咬咀四味。以水三升。煮取一升。去滓。內蜜煎中。更煎之。服七合。不知。盡服之。

礬石湯治脚氣沖心

礬石 二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良。古今錄驗續命湯治中風痱身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側（姚云與大續命同兼治婦人產後去血者及老人小兒）

麻黃　桂枝　當歸
人參　石膏　乾姜
甘草各三兩　芎藭　杏仁四十枚

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫。

千金三黃湯治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食。

麻黃五分　獨活四分　細辛二分
黃芪二分　黃芩三分

右五味以水六升煮取二升分溫三服一服小汗二服大汗心熱加大黃二分腹滿加枳實一枚氣逆加人參三分悸加牡蠣三分渴加括蔞根三分先有寒加附子一枚。

近効方术附湯治風虛頭重眩苦極不知食味煖肌補中益精氣。

白朮二兩　甘草一兩炙　附子一枚半炮去皮

右三味剉每五錢七姜五片棗一枚水盞半煎七分去滓溫服

崔氏八味丸治脚氣上入少腹不仁

乾地黃八兩　山茱萸　薯蕷各四兩

澤瀉　茯苓　牡丹皮各三兩

桂枝　附子炮各一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日再服

千金方越婢加朮湯治肉極熱則身體津脫腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱

麻黃六兩　石膏半斤　生姜三兩

甘草二兩　白朮四兩　大棗十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去沫內諸藥煮取三升分溫三服惡風加附子一枚炮

血痺虛勞病脉證并治第六

論一首　脉證九條　方九首

問曰血痺病從何得之〇師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之但以脉自微濇在寸口關上小緊宜鍼引陽氣

令脉和緊去則愈。

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀黃耆桂枝五物湯主之。

黃耆桂枝五物湯方

黃耆三兩 芍藥三兩 桂枝三兩

生姜六兩 大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服（一方有人參）

夫男子平人脉大為勞極虛亦為勞〇男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也〇男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄少腹滿此為勞使之然〇勞之為病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出酸削不能行〇男子脉浮弱而濇為無子精氣清冷（一作冷）〇夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩（一作目睛痛）髮落脉極虛芤遲為清穀亡血失精脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之。

桂枝加龍骨牡蠣湯方（小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白薇附子各三分故曰二加龍骨湯）

桂枝 芍藥 生姜各三兩

甘草二兩　大棗十二枚　龍骨
牡蠣
右七味。以水七升。煮取三升。分温三服。

天雄散方
天雄三兩炮　白朮八兩　桂枝六兩
龍骨三兩
右四味。杵為散。酒服半錢匕。日三服。不知。稍增之。

男子平人脉虛弱細微者。善盜汗也。〇人年五六十。其病脉大者。痺俠背行。若腸鳴。馬刀俠癭者。皆為勞得之。〇脉沈小遲。名脫氣。其人疾行則喘喝。手足逆寒。腹滿甚。則溏泄食不消化也。〇脉弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。虛寒相搏。此名為革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。

虛勞裏急悸衄。腹中痛。夢失精。四肢酸疼。手足煩熱。咽乾口燥。小建中湯主之。

小建中湯方
桂枝三兩去皮　甘草三兩炙　大棗十二枚
芍藥六兩　生姜三兩　膠飴一升

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

千金療男女。因積冷氣滯。或大病後。不復常。若四肢沉重。骨肉痿疾。吸吸少氣。行動喘乏。胷滿氣急。腰背強痛。心中虛悸。咽乾唇燥。面體少色。或飲食無味。脇肋腹脹。頭重不舉。多卧少起。甚者積年。輕者百日。漸致瘦弱。五藏氣竭。則難可復常。六脉俱不足。虛寒之氣。少腹拘急。羸瘠百病。名曰黃耆建中湯。又有人參二兩。

虛勞裏急。諸不足。黃耆建中湯主之。於小建中湯內。加黃耆一兩半。餘依上法。○氣短胷滿者。加生姜。腹滿者去棗。加茯苓一兩半。及療肺虛。損不足。補氣。加半夏二兩。

虛勞腰痛。少腹拘急。小便不利者。八味腎氣丸主之。方見腳氣中。

虛勞諸不足。風氣百疾。薯蕷丸主之。

薯蕷丸方

薯蕷 三十分	當歸	桂枝	
乾地黃	麴	豆黃卷 各十分	
甘草 二十八分	芎藭	麥門冬	
芍藥	白朮	杏仁 各六分	
人參 七分	柴胡	桔梗	
茯苓 各五分	阿膠 七分	乾姜 三分	
白斂 二分	防風 六分	大棗 百枚 為膏	

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一丸一百丸為劑

虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之

酸棗湯方

酸棗仁二升 甘草一兩 知母二兩
茯苓二兩 芎藭二兩 〇深師有生姜二兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分温三服

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃䗪蟲丸主之

大黃䗪蟲丸方

大黃十分 黃芩二兩 甘草三兩
桃仁一升 杏仁一升 芍藥四兩
乾地黃十兩 乾漆一兩 蝱蟲一升
水蛭百枚 蠐螬一升 䗪蟲半升

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五丸日三服

附方

千金翼炙甘草湯一云復脈湯 治虛勞不足汗出而悶

脉結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草四兩炙　桂枝　生姜各三兩　麥門冬半升　麻仁半升　人參　阿膠各二兩　大棗三十枚　生地黃一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠消盡溫服一升日三服

肘後獺肝散治冷勞又主鬼疰一門相染

獺肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服

肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證治第七

論三首　脉證四條　方十六首

問曰熱在上焦者因欬為肺痿肺痿之病何從得之○師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重亡津液故得之曰寸口脉數其人欬口中反有濁唾涎沫者何師曰為肺痿之病若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脉反滑數此為肺癰欬唾膿血脉數虛者為肺痿數實者為肺癰○問曰病欬逆脉之何以知此為肺癰當有膿血吐之則死其脉何類○師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮

毛熱傷血肺風含於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴時唾濁沫時時振寒熱之所過血為之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可捄膿成則死○上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚○上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾甘草乾姜湯以溫之若服湯已渴者屬消渴

甘草乾姜湯方

甘草四兩炙　乾姜二兩炮

右㕮咀以水三升煑取一升五合去滓分溫再服

欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

射干麻黃湯方

射干十三枚一云三兩　麻黃四兩　生姜四兩

細辛三兩　紫菀三兩　欵冬花三兩

五味子半升　大棗七枚　半夏大者八枚洗一法半升

右九味以水一斗二升先煑麻黃兩沸去上沫內諸藥煑取三升分溫三服

欬逆上氣時時吐濁但坐不得眠皂莢丸主之。

皂莢丸方

皂莢八兩刮去皮用酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸日三夜一服。

欬而脉浮者厚朴麻黃湯主之。

厚朴麻黃湯方

厚朴五兩　麻黃四兩　石膏如雞子大

杏仁半升　半夏半升　乾姜二兩

細辛二兩　小麥一升　五味子半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升溫服一升日三服。

脉沈者澤漆湯主之。

澤漆湯方

半夏半升　紫參五兩一作紫菀　澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升

生姜五兩　白前五兩

甘草　黃芩　人參

桂枝各三兩

右九味咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡。

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯主之
麥門冬湯方
麥門冬 七升 半夏 一升 人參 三兩
甘草 二兩 粳米 三合 大棗 十二枚
右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服
肺癰喘不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之
葶藶大棗瀉肺湯方
葶藶 熬令黃色搗如彈丸 大棗 十二枚
右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服

欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰桔梗湯主之
桔梗湯方 亦治血痺
桔梗 一兩 甘草 二兩
右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也
欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半夏湯主之
越婢加半夏湯方

麻黃六兩　石膏半斤　生姜三兩
大棗十五枚　甘草二兩　半夏半升

右六味。以水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮取三升。分溫三服。

肺脹。欬而上氣煩燥而喘。脉浮者。心下有水。小青龍加石膏湯主之。

小青龍加石膏湯方　千金證治同。外更加膀下痛引缺盆。

麻黃　芍藥　桂枝
細辛　甘草　乾姜各三兩
五味子　半夏各半升　石膏二兩

右九味。以水一斗。先煮麻黃去沫。內諸藥煮取三升。強人服一升。羸者減之。日三服。小兒服四合。

附方

外臺炙甘草湯。治肺痿涎唾多。心中溫溫液液者。方見虛勞

千金甘草湯

甘草

右一味。以水三升。煮減半。分溫三服。

千金生姜甘草湯。治肺痿欬唾涎沫不止。咽燥而

渴。

生姜五兩　人參三兩　甘草四兩

大棗十五枚

右四味。以水七升。煑取三升。分溫三服。

千金桂枝去芍藥。加皂莢湯。治肺痿吐涎沫。

桂枝三兩　生姜三兩　甘草二兩

大棗十枚　皂莢二枚去皮子炙焦

右五味。以水七升。微微火煑取三升。分溫三服。

外臺桔梗白散。治欬而胸滿。振寒。脉數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。為肺癰。

桔梗　貝母各三分　巴豆一分去皮熬研如脂

右三味。為散。强人飲服半錢匕。羸者減之。病在膈上者。吐膿血。膈下者瀉出。若下多不止。飲冷水一杯則定。

千金韋莖湯。治欬。有微熱煩滿。胸中甲錯。是為肺癰。

葦莖二升　薏苡仁半升　桃仁五十枚

瓜瓣半升

右四味。以水一斗。先煑葦莖。得五升。去滓。內諸藥。煑取二升。服一升。再服。當吐如膿。

肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞喜臥大棗瀉肺湯主之方見上三日一劑可至三四劑此先服小青龍湯一劑方進小青龍方見欬嗽門中

奔豚氣病脉證治第八

論二首　方三首

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之○師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

奔豚湯方

甘草　芎藭　當歸各二兩　半夏四兩　黃芩二兩　生葛五兩　芍藥二兩　生姜四兩　甘李根白皮一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

發汗後燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上至心灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主之

桂枝加桂湯方

桂枝五兩　芍藥三兩　甘草二兩炙

生姜三兩　大棗十二枚

右五味。以水七升。微火煑取三升。去滓。温服一升。

發汗後。臍下悸者。欲作賁豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤　甘草二兩炙　大棗十五枚

桂枝四兩

右四味。以甘爛水一斗。先煑茯苓減二升。内諸藥。煑取三升。去滓。温服一升。日三服。甘爛水法取水二斗置大盆内。以杓揚之。水上有珠子五六千顆相逐。取用之。

胸痺心痛短氣病脉證治第九

論一首　證一首　方十首

師曰。夫脉當取太過不及。陽微陰弦。即胸痺而痛。所以然者。責其極虚也。今陽虚知在上焦。所以胷痺。心痛者。以其陰弦故也。○平人無寒熱。短氣不足以息者。實也。

胸痺之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脉沈而遲。關上小緊數。括蔞薤白白酒湯主之。

括蔞薤白白酒湯方

括蔞實一枚搗　薤白半升　白酒七升

右三味。同煑。取二升。分溫。再服。

胸痺不得臥。心痛徹背者。括蔞薤白半夏湯主之。

括蔞薤白半夏湯方

括蔞實一枚　薤白三兩　半夏半升

白酒一斗

右四味同煑。取四升。溫服一升。日三服。

胸痺。心中痞。留氣結在胸。胸滿。脇下逆搶心。枳實薤白桂枝湯主之。人參湯亦主之。

枳實薤白桂枝湯方

枳實四枚　厚朴四兩　薤白半斤

桂枝一兩　括蔞一枚搗

右五味。以水五升。先煑枳實厚朴取二升。去滓。內諸藥。煑數沸。分溫三服。

人參湯方

人參　甘草　乾姜

白朮各三兩

右四味。以水八升。煑取三升。溫服一升。日三服。

胸痺。胸中氣塞。短氣。茯苓杏仁甘草湯主之。橘枳姜湯亦主之。

茯苓杏仁甘草湯方

茯苓三兩　杏仁五十箇　甘草一兩

右三味。以水一斗。煑取五升。溫服一升。日三服。不差。更服。

橘枳姜湯方

橘皮一斤　枳實三兩　生姜半斤

右三味。以水五升。煑取二升。分溫再服。肘後千金云。治胷痺。胷中愊愊如滿。噎塞習習如癢。喉中澁。唾燥沫。

胸痺緩急者。薏苡附子散主之。

薏苡附子散方

薏苡仁十五兩　大附子十枚炮

右二味。杵為散。服方寸匕。日三服。

心中痞。諸逆心懸痛。桂枝生姜枳實湯主之。

桂枝枳實湯方

桂枝三兩　生姜三兩　枳實五枚

右三味。以水六升。煑取三升。分溫三服。

心痛徹背。背痛徹心。烏頭赤石脂丸主之。

赤石脂丸方

蜀椒一兩一法二分　烏頭一分炮　附子半兩炮一法一分

乾姜一兩一法一分　赤石脂一兩一法二分

右五味末之蜜丸如桐子大先食服一丸日三服（不知稍加服）

九痛丸治九種心痛

附子（三兩炮） 生狼牙（一兩炙香） 巴豆（一兩去皮心熬研如脂） 人參 乾姜 吳茱萸（各一兩）

右六味末之煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸〇兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷腫上氣落馬墜車血疾等皆主之忌口如常法

腹滿寒疝宿食病脉證第十

論一首 脉證十六條 方十四首

趺陽脉微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下上也以溫藥服之〇病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃未下者下之黃自去〇腹滿時減復如故此為寒當與溫藥〇病者痿黃躁而不渴胸中寒實而利不止者死〇寸口脉弦者即胁下拘急而痛其人喜嘔惡寒也〇夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏〇中寒其人下利以裏虛也欲嚏不能此人肚中寒（一云痛）〇夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反

下之其氣必衝不衝者心下則痞也

病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故厚朴七物湯主之

厚朴七物湯方

厚朴半斤　甘草三兩　大黃三兩

大棗十枚　枳實五枚　桂枝二兩

生姜五兩

右七味以水一斗煑取四升溫服八合日三服

○嘔者加半夏五合○下利去大黃○寒多者加生姜至半斤

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主之

附子粳米湯方

附子一枚炮　半夏半升　甘草一兩

大棗十枚　粳米半升

右五味以水八升煑米熟湯成去滓溫服一升日三服

痛而閉者厚朴三物湯主之

厚朴三物湯方

厚朴八兩　大黃四兩　枳實五枚

右三味。以水一斗二升。先煮二味。取五升。內大黃煮取三升。溫服一升。以利為度。

按之心下滿痛者。此為實也。當下之。宜大柴胡湯。

大柴胡湯方

柴胡半斤　黃芩三兩　芍藥三兩

半夏半升洗　枳實四枚炙　大黃二兩

大棗十二枚　生姜五兩

右八味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎溫服一升。日三服。

腹滿不減。減不足言。當須下之。宜大承氣湯。

大承氣湯方

大黃四兩酒洗　厚朴半斤去皮炙　枳實五枚炙

芒硝三合

右四味。以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。內大黃。煮取二升。內芒硝。更上火。微一二沸。分溫再服。得下。餘勿服。

心胸中大寒痛。嘔不能飲食。腹中寒上衝。皮起出見有頭足。上下痛而不可觸近。大建中湯主之。

大建中湯方

蜀椒二合去汗　乾姜四兩　人參二兩

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分温再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜温覆之

脇下偏痛發熱其脉緊弦此寒也以温藥下之宜大黃附子湯

大黃附子湯方

大黃三兩　附子三枚炮　細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分温三服若强人煮取二升半分温三服服後如人行四五里進一服

寒氣厥逆赤丸主之

赤丸方

茯苓四兩　烏頭二兩炮　半夏四兩洗一方用桂　細辛一兩作人參

右四味末之內真朱為色如麻子大先食酒飲下三丸日再夜一服不知稍增之以知為度

腹痛脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝遶臍痛若發則白汗出手足厥冷其脉沈弦者大烏頭煎主之

烏頭煎方

烏頭大者五枚熬去皮不咬咀

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡取二升強人服七合弱人服五合不差明日更服不可日再服

寒疝腹中痛及脇痛裏急者當歸生姜羊肉湯主之

當歸生姜羊肉湯方

當歸三兩　生姜五兩　羊肉一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生姜成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩加生姜者亦加水五升煮取三升二合服之

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之

烏頭桂枝湯方

烏頭

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之得一升後初服二合不知即服三合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者為中病

桂枝湯方

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　甘草二兩炙
生姜三兩　大棗十二枚

右五味剉。以水七升。微火煮取三升。去滓。
其脉數而緊。乃弦狀如弓弦。按之不移。脉數弦者。
當下其寒。脉緊大而遲者。必心下堅。脉大而緊者。
陽中有陰。可下之。

附方

外臺烏頭湯。治寒疝腹中絞痛。賊風入攻五臟拘
急不得轉側。發作有時。使人陰縮。手足厥逆。方見

外臺柴胡桂枝湯方。治心腹卒中痛者。

柴胡四兩　黄芩　人參
芍藥　桂枝　生姜各一兩半
甘草一兩　半夏二合半　大棗六枚

右九味。以水六升。煮取三升。温服一升。日三服。
外臺走馬湯。治中惡心痛腹脹。大便不通。

杏仁二枚　巴豆二枚去皮心熬

右二味。以綿纏。搥令碎。熱湯二合。捻取白汁飲
之。當下。老小量之。通治飛尸鬼擊病。

問曰。人病有宿食。何以別之。○師曰。寸口脉浮而大。按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食。大承氣湯主之。○脉數而滑者。實也。此有宿食。下之愈。宜大承氣湯。○下利不飲食者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

大承氣湯方 見前痓病中

宿食在上脘。當吐之。宜瓜蒂散。

瓜蒂散方

瓜蒂 一分熬黃　赤小豆 一分煮

右二味。杵為散。以香豉七合。煮取汁。和散一錢七。溫服之。不吐者。少加之。以快吐為度而止。亡血及虛者。不可與之。

脉緊如轉索無常者。有宿食也。○脉緊。頭痛風寒腹中有宿食不化也。一云。寸口脉緊。

音釋

⿱殸殺 音穀即穀也　几 音殊　齘 音介憂也

金匱要畧方論卷中　仲景全書二十五

漢　長沙守　張機仲景述

晉　太醫令　王叔和　集

宋　尚書司封郎中充秘閣校理臣　林億詮次

明　虞山人　趙開美　校刻

五臟風寒積聚病脉證并治第十一

論二首　脉證十七條　方二首

肺中風者。口燥而喘。身運而重。冒而腫脹。〇肺中寒。吐濁涕。〇肺死藏浮之虛按之弱如葱葉。下無根者死。

肝中風者頭目瞤兩脇痛行常偃令人嗜甘〇肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胸中痛不得轉側食則吐而汗出也（脉經千金云時盜汗然食已吐其汁）〇肝死藏浮之弱按之如索不來或曲如蛇行者死〇肝着其人常欲蹈其胸上先未苦時但欲飲熱旋復花湯主之（臣億等校諸本旋復花湯方皆同）

心中風者翕翕發熱不能起心中飢食即嘔吐〇心中寒者其人苦病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心譬如蠱注其脉浮者自吐乃愈〇心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發

熱當臍跳其脉弦此為心藏傷所致也〇心死藏浮之實如麻豆按之益躁疾者死〇邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者為癲陽氣衰者為狂

脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮目瞤瞤而短氣〇脾死藏浮之大堅按之如覆盃潔潔狀如搖者死（臣億等詳五藏各有中風中寒今脾只載中風腎中風中寒俱不載者以古文簡亂極多去古既遠無文可以補綴也）

趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相

搏大便則堅其脾為約麻子人丸主之。

麻子人丸方

麻子人二升　芍藥半斤　枳實一斤

大黃一斤　厚朴一尺　杏仁一升

右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十丸日三。以知為度。

腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣（一作裏）裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘姜苓朮湯主之。

甘草乾薑茯苓白朮湯方

甘草二兩　白朮二兩　乾薑四兩

茯苓四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中即溫。

腎死藏浮之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死。

問曰三焦竭部上焦竭善噫何謂也。〇師曰上焦受中焦氣未和不能消穀故能噫耳下焦竭即遺溺失便其氣不和不能自禁制不須治久則愈。〇師曰熱在上焦者因欬為肺痿熱在中焦者則為

堅熱在下焦者則尿血亦令淋秘不通大腸有寒者多鶩溏有熱者便腸垢小腸有寒者其人下重便血有熱者必痔

問曰病有積有聚有蓐氣何謂也〇師曰積者藏病也終不移聚者府病也發作有時展轉痛移為可治蓐氣者脇下痛按之則愈復發為蓐氣諸積大法脈来細而附骨者乃積也寸口積在胸中微出寸口積在喉中關上積在臍傍上關上積在心下微下關積在少腹尺中積在氣衝脈出左積在左脈在右積在右脈兩出積在中央各以其部處之

痰飲欬嗽病脈證并治第十二

論一首 脈證二十一條 方十八首

問曰夫飲有四何謂也〇師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲〇問曰四飲何以為異〇師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲〇水在心心下堅築短氣惡水不欲飲〇水在肺吐涎沫欲飲

水。○水在脾。少氣身重。○水在肝。脇下支滿。嚏而痛。○水在腎。心下悸。○夫心下有留飲。其人背寒冷如手大。○留飲者。脇下痛引缺盆。欬嗽則輒已。一作轉甚○胸中有留飲。其人短氣而渴。四肢歷節痛。脉沈者。有留飲。○膈上病痰。滿喘欬吐。發則寒熱。背痛腰疼。目泣自出。其人振振身瞤劇。必有伏飲。○夫病人飲水多。必暴喘滿。凡食少飲多。水停心下。甚者則悸。微者短氣。脉雙弦者。寒也。皆大下後善虛。脉偏弦者。飲也。○肺飲不弦。但苦喘短氣。○支飲亦喘而不能臥。加短氣。其脉平也。○病痰飲者。當以溫藥和之。

心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。苓桂朮甘湯主之。

茯桂朮甘湯方

茯苓四兩　桂枝三兩　白朮三兩

甘草二兩

右四味。以水六升。煑取三升。分溫三服。小便則利。

夫短氣。有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。方見上　腎氣丸亦主之。方見脚氣中

病者脉伏。其人欲自利。利反快。雖利。心下續堅滿。

此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之。

甘遂半夏湯方

甘遂大者三枚　半夏十二枚以水一升煮取半升去滓　芍藥五枚　甘草如指大一枚炙一本作無

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之。

脉浮而細滑傷飲。○脉弦數有寒飲冬夏難治。○脉沈而弦者懸飲內痛。○病懸飲者十棗湯主之。

十棗湯方

芫花熬　甘遂　大戟各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取九合去滓內藥末強人服一錢七羸人服半錢平旦溫服之不下者明日更加半錢得快下後糜粥自養。

病溢飲者當發其汗大青龍湯主之。○小青龍湯亦主之。

大青龍湯方

麻黃六兩去節　桂枝二兩去皮　甘草二兩炙　杏仁四十箇去皮尖　生姜三兩切　大棗十二枚　石膏如雞子大碎

右七味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗多者。溫粉粉之。

小青龍湯方

麻黃三兩去節　芍藥三兩　五味子半升
乾姜三兩　甘草三兩炙　細辛三兩
桂枝三兩去皮　半夏半升洗

右八味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

腦鬧支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黧黑。其脈沈緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜木防己湯去石膏。加茯苓芒硝湯主之。

木防己湯方

木防己三兩　石膏十二枚雞子大　桂枝二兩
人參四兩

右四味。以水六升。煮取二升。分溫再服。

木防己加茯苓芒硝湯方

木防己二兩　桂枝二兩　人參四兩
芒硝三合　茯苓四兩

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。內芒硝。再微煎。分溫再服。微利則愈。

心下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉湯主之

澤瀉湯方

澤瀉五兩　白朮二兩

右二味。以水二升。煮取一升。分溫再服。

支飲胸滿者。厚朴大黃湯主之。

厚朴大黃湯方

厚朴一尺　大黃六兩　枳實四枚

右三味。以水五升。煮取二升。分溫再服。

支飲不得息。亭歷大棗瀉肺湯主之。方見肺癰中。

嘔家本渴。渴者為欲解。今反不渴。心下有支飲故也。小半夏湯主之。千金云。小半夏加茯苓湯。

小半夏湯方

半夏一升　生姜半斤

右二味。以水七升。煮取一升半。分溫再服。

腹滿口舌乾燥。此腸間有水氣。巳椒歷黃丸主之

巳椒歷黃丸方

防巳　椒目　亭歷熬　大黃各一兩

右四味。末之。蜜丸如梧子大。先食飲服一丸。日

三服。稍增。口中有津液。渴者。加芒硝半兩。

卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。半夏加茯苓湯主之。

小半夏加茯苓湯方

半夏一升　生姜半斤　茯苓三兩一法四兩

右三味。以水七升。煑取一升五合。分温再服。

假令瘦人臍下有悸。吐涎沫而癲眩。此水也。五苓散主之。

五苓散方

澤瀉一兩一分　猪苓三分去皮　茯苓三分

白朮三分　桂二分去皮

右五味。為末。白飲服方寸匕。日三服。多飲煖水。汗出愈。

附方

外臺茯苓飲。治心胷中有停痰宿水。自吐出水後心胸間虚氣滿不能食。消痰氣。令能食。

茯苓　人參　白朮各三兩

枳實二兩　橘皮二兩半　生姜四兩

右六味。水六升。煑取一升八合。分温三服。如人行八九里。進之。

欬家其脉弦為有水十棗湯主之方見上

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日一歲宜十棗湯方見上

久欬數歲其脉弱者可治實大數者死其脉虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家

欬逆倚息不得臥小青龍湯主之方見上文見肺癰中

青龍湯下已多唾口燥寸脉沈尺脉微手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝

桂苓五味甘草湯方

茯苓四兩　桂枝四兩去皮　甘草三兩炙

五味子半升

右四味以水八升煮取三升去滓分三溫服

衝氣即低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘草湯去桂加乾姜細辛以治其欬滿

苓甘五味姜辛湯

茯苓四兩　甘草三兩　乾姜三兩

細辛三兩　五味半升

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日

三。

欬滿即止。而更復渴。衝氣復發者。以細辛乾姜為熱藥也。服之當遂渴。而渴反止者。為支飲也。支飲者。法當冒。冒者必嘔。嘔者復內半夏。以去其水。

茯苓五味甘草去桂加姜辛夏湯方

茯苓四兩　甘草二兩　細辛二兩

乾姜二兩　五味子　半夏各半升

右六味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服半升。日三。

水去嘔止。其人形腫者。加杏仁主之。其證應內麻黃。以其人遂痺。故不內之。若逆而內之者。必厥。所以然者。以其人血虛。麻黃發其陽故也。

茯苓甘草五味姜辛湯方

茯苓四兩　甘草三兩　五味半升

乾姜三兩　細辛三兩　半夏半升

杏仁半升去皮尖

右七味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服半升。日三。

若面熱如醉。此為胃熱上衝。熏其面。加大黃以利之。

茯苓甘姜味辛夏仁黃湯方

茯苓四兩　甘草三兩　五味半升

乾姜二兩　細辛三兩　半夏半升

杏仁半升　大黃三兩

右八味以水一斗煮取三升去滓温服半升日三

先渴後嘔為水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之方見上

消渴小便利淋病脉證并治第十三

脉證九條　方一首

厥陰之為病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不欲食食即吐下之不肯止○寸口脉浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭趺陽脉浮而數浮即為氣數即為消穀而大堅一作緊氣盛則溲數溲數即堅堅數相搏即為消渴

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之方見脚氣中

脉浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主之方見上

渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之方見

渴欲飲水不止者文蛤散主之

文蛤散方

文蛤 五兩

右一味杵為散以沸湯五合和服方寸匕

淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中○趺陽脉數胃中有熱即消穀引食大便必堅小便即數○淋家不可發汗發汗則必便血

小便不利者有水氣其人若渴用括蔞瞿麥丸主之

括蔞瞿麥丸方

括蔞根 二兩 茯苓 三兩 薯蕷 三兩

附子 一枚炮 瞿麥 一兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之

蒲灰散方

蒲灰 七分 滑石 三分

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

滑石白魚散方

滑石 二分　亂髮 二分燒　白魚 二分

右三味。杵為散。飲服方寸七。日三服。

茯苓戎鹽湯方

茯苓 半斤　白朮 二兩　戎鹽 彈丸大一枚

右三味。

渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。方見中暍中。

脉浮。發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。

豬苓湯方

豬苓 去皮　茯苓　阿膠

滑石　澤瀉 各一兩

右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內膠烊消。溫服七合。日三服。

水氣病脉證并治第十四

論七首　脉證五條　方八首

師曰。病有風水。有皮水。有正水。有石水。有黃汗。風水。其脉自浮。外證骨節疼痛。惡風。皮水。其脉亦浮。外證附腫。按之沒指。不惡風。其腹如鼓。不渴。當發其汗。正水。其脉沈遲。外證自喘。石水。其脉自沈。外

證腹滿不喘黃汗其脉沈遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿〇脉浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風强則為隱疹身體為癢癢為泄風久為痂癩氣强則為水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗〇寸口脉沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目裏上微擁如蚕新臥起狀其頸脉動時時欬按其手足上陷而不起者風水〇太陽病脉浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而酸其

人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛暮躁不得眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為脾脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗〇裏水者一身面目黃腫其脉沈小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加朮湯主之方見下〇趺陽脉當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之下之即胸滿短氣〇趺陽脉當伏今反數本自有熱消穀小便數今

反不利此欲作水○寸口脉浮而遲浮脉則熱遲脉則潛熱潛相搏名曰沈跌陽脉浮而數浮脉即熱數脉即止熱止相搏名曰伏沈伏相搏名曰水沈則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚即為水矣○寸口脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒水不沾流走於腸間○少陰脉緊而沈緊則為痛沈則為水小便即難脉得諸沈當責有水身體腫重水病脉出者死○夫水病人目下有臥蚕面目鮮澤脉伏其人消渴病水腹大小便不利其脉沈絕者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈○心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫○肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津液微生小便續通○肺水者其身腫小便難時時鴨溏○脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難○腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦○師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈○師曰寸口脉沈而遲沈則為水遲則為

寒寒水相搏跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣衰則身腫少陽脉卑少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分

問曰病者苔水面目身體四肢皆腫小便不利脉之不言水反言胷中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脉何類○師曰寸口脉沈而緊沈為水緊為寒沈緊相搏結在關元始時當微羊盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝咳咽塞噎脇下急痛醫以為留飲而丸下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象若奔豚其水揚溢則浮咳喘逆當先攻擊衝氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後

風水脉浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之腹痛加芍藥

防已黃耆湯方

防已一兩　黃耆一兩一分　白朮三分

甘草半兩炙

右剉。每服五錢七。生姜四片。棗一枚。水盞半。煎取八分。去滓。温服。良久再服。

風水惡風。一身悉腫。脉浮不渴。續自汗出。無大熱。

越婢湯主之。

越婢湯方

麻黄六兩　石膏半斤　生姜三兩

大棗十五枚　甘草二兩

右五味。以水六升。先煑麻黄。去上沫。内諸藥。煑取三升。分温三服。○惡風者。加附子一枚炮○

風水。加朮四兩。古今錄驗

皮水為病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。

防巳茯苓湯主之。

防巳茯苓湯方

防巳三兩　黄耆三兩　桂枝三兩

茯苓六兩　甘草二兩

右五味。以水六升。煑取二升。分温三服。

裏水。越婢加朮湯主之。甘草麻黄湯亦主之。

越婢加朮湯方見上。於内加白朮四兩。又見脚氣中。

甘草麻黄湯方

甘草二兩　麻黃四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再服愼風寒水之為病其脉沈小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗即已脉沈者宜麻黃附子湯浮者宜杏子湯

麻黃附子湯方

麻黃三兩　甘草二兩　附子一枚炮

右三味以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升半溫服八分日三服

杏子湯方 未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

厥而皮水者蒲灰散主之 方見消渴中

問曰黃汗之為病身體腫一作重發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如柏汁脉自沈何從得之

○師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之宜耆芍桂酒湯主之

黃耆芍桂苦酒湯方

黃耆五兩　芍藥三兩　桂枝三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止

者以苦酒阻故也。一方用美酒醯代苦酒。

黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重汗出已。輒輕者。久久必身瞤。瞤即胷中痛。又從腰以上必汗出。下無汗。腰髖弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩燥。小便不利。此為黃汗。桂枝加黃耆湯主之。

桂枝加黃耆湯方

桂枝三兩　芍藥三兩　甘草二兩

生姜三兩　大棗十二枚　黃耆二兩

右六味。以水八升。煑取三升。溫服一升。須臾飲熱稀粥一升。餘以助藥力。溫服取微汗。若不汗。更服。

師曰。寸口脉遲而濇。遲則為寒。濇為血不足。趺陽脉微而遲。微則為氣。遲則為寒。寒氣不足。則手足逆冷。手足逆冷。則榮衛不利。榮衛不利。則腹滿脇鳴。相逐氣轉膀胱。榮衛俱勞。陽氣不通。即身冷。陰氣不通。即骨疼。陽前通。則惡寒。陰前通。則痺不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失

氣虛則遺尿名曰氣分。

氣分。心下堅大如盤。邊如旋杯。水飲所作。桂枝去芍藥。加麻辛附子湯主之。

桂姜草棗黃辛附子湯方

桂枝三兩　生姜三兩　甘草二兩

大棗十二枚　麻黃二兩　細辛二兩

附子一枚炮

右七味。以水七升。煑麻黃。去上沫。內諸藥。煑取二升。分溫三服。當汗出。如蟲行皮中。即愈。

心下堅大如盤。邊如旋盤。水飲所作。枳朮湯主之。

枳朮湯方

枳實七枚　白朮二兩

右二味。以水五升。煑取三升。分溫三服。腹中耎。即當散也。

附方

外臺防已黃耆湯。治風水。脉浮為在表。其人或頭汗出。表無他病。病者但下重。從腰以上為和。腰以下當腫及陰。難以屈伸。方見風濕中

黃疸病脉證并治第十五

論二首　脉證十四條　方七首

寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行〇趺陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為滿尺脉浮為傷腎趺陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸〇陽明病脉遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也〇夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也〇酒黃疸者或無熱請言小腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沉弦者先下之〇酒疸心中熱欲嘔者吐之愈〇酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如噉蒜薤狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之〇師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當下之〇脉沈渴欲飲水小便不利者皆發黃〇腹滿舌痿黃燥不得睡屬黃

家。舌痿疑作身痿。○黃疸之病。當以十八日為期。治之十日以上。瘥反極為難治。○疸而渴者。其疸難治。疸而不渴者。其疸可治。發於陰部。其人必嘔。陽部其人振寒而發熱也。

穀疸之為病。寒熱不食。食即頭眩。心胷不安。久久發黃為穀疸。茵蔯湯主之。

茵蔯湯方

茵蔯蒿六兩　梔子十四枚　大黃二兩

右三味。以水一斗。先煮茵蔯。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

黃家。日晡所發熱而反惡寒。此為女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時溏。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。用消石礬石散主之。

消石礬石散方

消石　礬石燒等分

右二味為散。以大麥粥汁。和服方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是候也。

酒黃疸。心中懊憹。或熱痛。梔子大黃湯主之。

梔子大黃湯方

梔子十四枚　大黃一兩　枳實五枚

豉一升

右四味以水六升煮取二升分温三服

諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝加黃耆湯主之方見水病中

諸黃猪膏髮煎主之

猪膏髮煎方

猪膏半斤　亂髮如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

黃疸病茵蔯五苓散主之一本云茵蔯湯及五苓散並主之

茵蔯五苓散方

茵蔯蒿末十分　五苓散五分方見痰飲中

右二物和先食飲方寸匕日三服

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜大黃消石湯

大黃消石湯

大黃　黃蘗　消石各四兩　梔子十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內消更煮取

一升頓服。

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之（方見消渴中）

諸黃腹痛而嘔者宜柴胡湯（必小柴胡湯方見嘔吐中）

男子黃小便自利當與虛勞小建中湯（方見虛勞中）

附方

瓜蒂湯治諸黃（方見喝病中）

千金麻黃醇酒湯治黃疸。

麻黃 三兩

右一味以美清酒五升煮取二升半頓服盡冬月用酒春月用水煮之。

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脉證治第十六

脉證十二條　方五首

寸口脉動而弱動即為驚弱則為悸〇師曰夫脉浮目睛暈黃衄未止暈黃去目睛慧了知衄今止〇又曰從春至夏衄者太陽從秋至冬衄者陽明〇衄家不可汗汗出必額上陷脉緊急直視不能眴不得眠〇病人面無色無寒熱脉沈弦者衄浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血〇夫吐血欬逆上氣其脉數而有熱不得臥者死〇夫酒客欬

者必致吐血此因極飲過度所致也〇寸口脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相擊此名曰革婦人則半產漏下男子則亡血〇亡血不可發其表汗出則寒慄而振〇病人胸滿唇痿舌青口燥但欲嗽水不欲嚥無寒熱脉微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血〇病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脉反無熱此為陰狀是瘀血也當下之。

火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。

救逆湯方

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生姜三兩

牡蠣五兩熬　龍骨四兩　大棗十二枚

蜀漆三兩洗去腥

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升。

心下悸者半夏麻黃丸主之。

半夏　麻黃等分

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三丸日三

服

吐血不止者。栢葉湯主之。

栢葉湯方

栢葉　乾姜各三兩　艾三把

右三味。以水五升。取馬通汁一升。合煮。取一升。分温再服。

下血先便後血。此遠血也。黃土湯主之。

黃土湯方　亦主吐血。衄血。

甘草　乾地黃　白朮　附子　炮

阿膠　黃芩各三兩　竈中黃土半斤

右七味。以水八升。煮取三升。分温二服。

下血先血後便。此近血也。赤小豆當歸散主之。方見狐惑中

心氣不足。吐血衄血。瀉心湯主之。

瀉心湯方　亦治霍亂

大黃二兩　黃連一兩　黃芩一兩

右三味。以水三升。煮取一升。頓服之。

嘔吐噦下利病脉證治第十七

論一首　脉證二十七條　方二十三首

夫嘔家有癰膿。不可治。嘔膿盡。自愈。〇先嘔却渴

者此為欲解先渴却嘔者為水停心下此屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲○問曰病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者何也○師曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於上醫反下之今脉反弦故名曰虛○寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胸中冷○趺陽脉浮而濇浮則為虛濇則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉

[illegible]而濇其病難治○病人欲吐者不可下之○[illegible]而腹滿視其前後知何部不利利之即愈○嘔而胸滿者茱萸湯主之○

茱萸湯方

吳茱萸一升　人參三兩　生姜六兩

大棗十二枚

右四味以水五升煑取三升溫服七合日三服

乾嘔吐涎沫頭痛者茱萸湯主之方見上

嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之○

半夏瀉心湯

半夏半升洗　黃芩三兩　乾姜三兩

人參三兩　黃連一兩　大棗十二枚

甘草三兩炙

右七味。以水一斗。煑取六升。去滓。再煑取三升。溫服一升。日三服。

乾嘔而利者。黃芩加半夏生姜湯主之。

黃芩加半夏生姜湯方

黃芩三兩　甘草二兩炙　芍藥二兩

半夏半升　生姜三兩　大棗二十枚

右六味。以水一斗。煑取三升。去滓。溫服一升。日再。夜一服。

諸嘔吐。穀不得下者。小半夏湯主之。方見痰飲中

嘔吐而病在膈上。後思水者。解。急與之。思水者。猪苓散主之。

猪苓散方

猪苓　茯苓　白朮各等分

右三味。杵為散。飲服方寸匕。日三服。

嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥者。難治。四逆湯主之。

四逆湯方

附子一枚生用　乾姜一兩半　甘草二兩炙

右三味。以水三升。煑取一升二合。去滓。分溫。再服。强人可大附子一枚。乾姜三兩。

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。

小柴胡湯方

柴胡半斤　黃芩三兩　人參三兩

甘草三兩　半夏半斤　生姜三兩

大棗十二枚

右七味。以水一斗二升。煑取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

胃反嘔吐者。大半夏湯主之。千金云。治胃反不受食。食入即吐。外臺云。治嘔。心下痞鞕者。

大半夏湯方

半夏二升洗完用　人參三兩　白蜜一升

右三味。以水一斗二升。和蜜揚之。二百四十遍。煑取二升半。溫服一升。餘分再服。

食已即吐者。大黃甘草湯主之。外臺方。又治吐水。

大黃甘草湯方

大黃四兩　甘草一兩

右二味。以水三升。煑取一升。分溫再服。

胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之。

茯苓澤瀉湯方 外臺云治消渴脉絶胃反吐食之有小麥一升。

茯苓 半斤　澤瀉 四兩　甘草 二兩

桂枝 二兩　白朮 三兩　生姜 四兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服八合日三服。

吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主之兼主微風脉腎頭痛

文蛤湯方

文蛤 五兩　麻黃 三兩　甘草 三兩

生姜 三兩　石膏 五兩　杏仁 五十枚

大棗 十二枚

右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出即愈。

乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾姜散主之。

半夏乾姜散方

半夏　乾姜 等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之。

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中

憒憒然無奈者。生姜半夏湯主之。

生姜半夏湯方

半夏半斤　生姜汁一升

右二味。以水三升。煮半夏。取二升。內生姜汁。煮取一升半。小冷。分四服。日三夜一服。止。停後服。乾嘔噦若手足厥者。橘皮湯主之。

橘皮湯方

橘皮四兩　生姜半斤

右二味。以水七升。煮取三升。溫服一升。下咽即愈。

噦逆者。橘皮竹茹湯主之。

橘皮竹茹湯方

橘皮二升　竹茹二升　大棗三十枚

生姜半斤　甘草五兩　人參一兩

右六味。以水一斗。煮取三升。溫服一升。日三服。

夫六府氣絕於外者。手足寒。上氣脚縮。五藏氣絕於內者。利不禁。下甚者。手足不仁。〇下利。脉沈弦者。下重。脉大者。為未止。脉微弱數者。為欲自止。雖發熱。不死。〇下利。手足厥冷。無脉者。灸之不溫。若脉不還。反微喘者。死。少陰負趺陽者。為順也。〇下

利有微熱而渴脉弱者今自愈○下利脉數有微熱汗出今自愈設脉緊為未解○下利脉數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也○下利脉反弦發熱身汗者自愈○下利氣者當利其小便○下利寸脉反浮數尺中自濇者必清膿血○下利清穀不可攻其表汗出必脹滿○下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微熱所以然者其面戴陽下虛故也○下利後脉絶手足厥冷晬時脉還手足温者生脉不還者死○下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表温裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

四逆湯方 見上

桂枝湯方

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　甘草二兩炙

生姜三兩　大棗十二枚

右五味㕮咀以水七升微火煑取三升去滓適寒温服一升服已須臾啜稀粥一升以助藥力温覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水淋漓若一服汗出病差停後服

下利三部脉皆平按之心下堅者急下之宜大承

氣湯。○下利脉遲而滑者。實也。利未欲止。急下之宜大承氣湯。○下利脉反滑者。當有所去。下乃愈。宜大承氣湯。○下利已差。至其年月日時復發者。以病不盡故也。當下之。宜大承氣湯。

大承氣湯方 見痙病中

下利讝語者。有燥屎也。小承氣湯主之。

小承氣湯方

大黃四兩 厚朴二兩炙 枳實大者三枚炙

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。得利則止

下利便膿血者。桃花湯主之。

桃花湯方

赤石脂一斤一半剉 乾姜一兩

粳米一升

右三味。以水七升。煮米令熟。去滓。溫七合。內赤石脂末方寸七。日三服。若一服愈。餘勿服。

熱利重下者。白頭翁湯主之。

白頭翁湯方

白頭翁二兩 黃連三兩 黃柏三兩

秦皮三兩

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。温服一升。不愈。更服。

下利後。更煩。按之心下濡者。為虚煩也。梔子豉湯主之。

梔子豉湯方

梔子十四枚　香豉四合綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子得二升半。內豉煮取一升半。去滓。分二服。温進一服。得吐則止。

下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脉四逆湯主之。

通脉四逆湯方

附子大者一枚生用　乾姜三兩強人可四兩　甘草二兩炙

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分温再服。

下利肺痛。紫參湯主之。

紫參湯方

紫參半斤　甘草三兩

右二味。以水五升。先煮紫參取二升。內甘草。煮取一升半。分温三服。（疑非仲景方）

氣利。訶梨勒散主之。

訶梨勒散方

訶梨勒十枚煨

右一味為散粥飲和頓服疑非仲景方

附方

千金翼小承氣湯治大便不通噦數譫語方見上

外臺黃芩湯治乾嘔下利

黃芩三兩　人參三兩　乾姜三兩

桂枝一兩　大棗十二枚　半夏半升

右六味以水七升煑取三升溫分三服

瘡癰腸癰浸淫病脉證并治第十八

論一首　脉證三條　方五首

諸浮數脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發其癰○師曰諸癰腫欲知有膿無膿以手掩腫上熱者為有膿不熱者為無膿

腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脉數此為腹內有癰膿薏苡附子敗醬散主之

薏苡附子敗醬散方

薏苡仁十分　附子二分　敗醬五分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半頓

服小便當下

腸癰者少腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

大黃牡丹湯方

大黃四兩　牡丹一兩　桃仁五十枚

瓜子半升　芒消三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血

問曰寸口脉浮微而汗出發當亡血若汗出設不汗者云何答曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也

病金瘡王不留行散主之

王不留行十分八月八日採　蘗蘆細葉十分七月七日採

桑東南根白皮十分三月三日採　甘草十八分

川椒三分除目及閉口者汗　黃芩二分

乾姜二分　芍藥厚朴各二分

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令灰過各別杵篩合治之為散服方寸七小瘡即粉之大瘡但服之產後亦可服如風寒桑東根勿取

之前三物皆陰乾百日。

排膿散方

枳實十六枚 芍藥六分 桔梗二分

右三味。杵為散。取雞子黃一枚。以藥散與雞黃相等。揉和令相得。飲和服之。日一服。

排膿湯方

甘草二兩 桔梗三兩 生姜一兩

大棗十枚

右四味。以水三升。煮取一升。溫服五合。日再服。浸淫瘡從口流向四肢者可治。從四肢流來入口者不可治。

浸淫瘡黃連粉主之。方未見

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病脈證治第十九

論一首 脈證一條 方四首

師曰。病跌蹶。其人但能前不能却。刺腨入二寸。此太陽經傷也。病人常以手指臂腫動。此人身體瞤瞤者。藜蘆甘草湯主之。

藜蘆甘草湯方未見

轉筋之為病。其人臂脚直。脈上下行。微弦。轉筋入

腹者雞屎白散主之。

雞屎白散方

雞屎白

右一味為散取方寸匕以水六合和溫服。

陰狐疝氣者偏有小大時時上下蜘蛛散主之。

蜘蛛散方

蜘蛛十四枚 熬焦 桂枝半兩

右二味為散取八分一匕飲和服日再服蜜丸亦可。

問曰病腹痛有蟲其脉何以別之。○師曰腹中痛其脉當沈若弦反洪大故有蚘蟲。

蚘蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止甘草粉蜜湯主之。

甘草粉蜜湯方

甘草二兩 粉一兩 蜜四兩

右三味以水三升先煮甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差即止。

蚘厥者當吐蚘令病者靜而復時煩此為藏寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人常自吐蚘。

蚘厥者。烏梅丸主之。

烏梅丸方

烏梅三百枚　細辛六兩　乾姜十兩

黃連一斤　當歸四兩　附子六兩炮

川椒四兩去汗　桂枝六兩　人參六兩

黃蘗六兩

右十味。異擣篩。合治之。以苦酒漬烏梅一宿。去核。蒸之五升米下。飯熟。擣成泥。和藥令相得。內臼中。與蜜杵二千下。丸如梧子大。先食。飲服十丸。三服。稍加至二十丸。禁生冷滑臭等食。

音釋

鶩溏鶩音牧即後鴨溏也　髖枯官切髀也　眴胡絹切目搖也　漐音質汗出貌　腨音兗腓腸

金匱要畧方論卷下　仲景全書二十六

漢　長沙守　張機仲景述

晉　太醫令　王叔和　集

宋　尚書司封郎中充秘閣校理臣　林億詮次

明　虞山人　趙開美　校刻

婦人妊娠病脉證并治第二十

證三條　方八首

師曰。婦人得平脉。陰脉小弱。其人渴。不能食。無寒熱。名妊娠。桂枝湯主之。方見利中。於法六十日當有此證。設有醫治逆者。却一月。加吐下者。則絕之。

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥痼害〇妊娠六月動者前三月經水利時胎下血者後斷三月不血也所以血不止者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓丸主之

桂枝　茯苓　牡丹去心　桃仁去皮尖熬　芍藥各等分

右五味末之煉蜜和丸如兎屎大每日食前服一丸不知加至三丸

婦人懷娠六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏開故也當以附子湯温其藏方未見

師曰婦人有漏下者有半産後因續下血都不絶者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

芎歸膠艾湯方一方加乾姜一兩胡氏治婦人胞動無乾姜

芎藭二兩　阿膠二兩　甘草二兩

艾葉三兩　當歸三兩　芍藥四兩

乾地黄

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓

內膠令消盡温服一升日三服不差更作
婦人懷妊腹中疗痛當歸芍藥散主之
當歸芍藥散方
當歸 三兩　芍藥 一斤　茯苓 四兩
白朮 四兩　澤瀉 半斤　芎藭 半斤一作三兩
右六味杵為散取方寸匕酒和日三服
妊娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸主之
乾姜人參半夏丸方
乾姜 一兩　人參 一兩　半夏 二兩
右三味末之以生姜汁糊為丸如梧子大飲服
十丸日三服
妊娠小便難飲食如故歸母苦參丸主之
當歸貝母苦參丸方男子加滑石半兩
當歸　貝母　苦參 各四兩
右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至
十丸
妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩
葵子茯苓散主之
葵子茯苓散方
葵子 一斤　茯苓 三兩

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便利則愈

婦人妊娠宜常服當歸散主之

當歸散方

當歸 黃芩 芍藥 芎藭 各一斤 白朮半斤

右五味杵為散酒飲服方寸匕日再服妊娠常服即易產胎無苦疾產後百病悉主之

妊娠養胎白朮散主之

白朮散方見外臺

白朮 芎藭 蜀椒三分汗 牡蠣

右四味杵為散酒服一錢匕日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩吐痛不能食飲加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便微利則愈見玉函

論一首　證六條　方七首

問曰新產婦人有三病一者病痓二者病鬱冒三者大便難何謂也○師曰新產血虛多汗出喜中風故令病痓亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒其脉微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之（方見嘔吐中）

病解能食七八日更發熱者此為胃實大承氣湯主之（方見痙中）

產後腹中疠痛當歸生姜羊肉湯主之并治腹中寒疝虛勞不足

當歸生姜羊肉湯方（見寒疝中）

產後腹痛煩滿不得臥枳實芍藥散方

枳實（燒令黑勿太過）　芍藥等分

右二味杵為散服方寸七日三服并主癰膿以

麥粥下之。

師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散。假令不愈者。此為腹中有乾血着臍下。宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。

下瘀血湯方

大黃二兩　桃仁二十枚　蠐螬二十枚　熬去足

右三味。末之。煉蜜和為四丸。以酒一升。煎一丸取八合。頓服之。新血下如豚肝。

產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩躁發熱。切脉微實。再倍發熱。日晡時煩躁者。不食。食則譫語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。熱在裏。結在膀胱也。（方見痙病中）

產後風續之數十日不解。頭微痛。惡寒。時時有熱。心下悶。乾嘔。汗出。雖久陽旦證續在耳。可與陽旦湯。（即桂枝湯方。見下利中。）

產後中風發熱。面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。

竹葉湯方

竹葉一把　葛根三兩　防風

桔梗　桂枝　人參

甘草各一兩　附子一枚　炮　大棗十五枚

生姜 五兩

右十味。以水一斗。煮取二升半。分温三服。温覆使汗出。○頸項强用大附子一枚破之如豆大煎藥揚去沫嘔者加半夏半升洗婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之。

竹皮大丸方

生竹茹 二分　石膏 二分　桂枝 一分
甘草 七分　白薇 一分

右五味末之棗肉和丸彈子大。以飲服一丸。日三夜二服。有熱者倍白薇。煩喘者加柏實一分。

産後下利虛極。白頭翁加甘草阿膠湯主之。

白頭翁加甘草阿膠湯方

白頭翁　甘草　阿膠 各二兩
秦皮　黄連　蘗皮 各三兩

右六味。以水七升。煮取二升半。內膠。令消盡。分温三服。

附方

千金三物黄芩湯。治婦人在草蓐。自發露得風。四肢苦煩熱。頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛但煩者。此湯主之。

黃芩一兩　若參二兩　乾地黃四兩

右三味。以水八升。煮取二升。溫服一升。多吐下蟲。

千金內補當歸建中湯。治婦人產後虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦少腹中急。摩痛引腰背。不能食飲。產後一月日。得服四五劑為善。令人強壯宜。

當歸四兩　桂枝三兩　芍藥六兩

生姜三兩　甘草二兩　大棗十二枚

右六味。以水一斗。煮取三升。分溫三服。一日令盡。若大虛。加飴糖六兩。湯成內之。於火上煖令飴消。若去血過多。崩傷內衄不止。加地黃六兩。阿膠二兩。合八味。湯成內阿膠。若無當歸。以芎藭代之。若無生姜。以乾姜代之。

婦人雜病脉證并治第二十二

論一首　脉證合十四條　方十六首

婦人中風。七八日續來寒熱。發作有時。經水適斷。此為熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。方見嘔吐中

婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則讝語。如

見鬼狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身凉和胸脇滿如結胸狀讝語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之

陽明病下血讝語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之濈然汗出者愈

婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之

半夏厚朴湯方 千金作胃滿心下堅咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下

半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩

生姜五兩 乾蘇葉二兩

右五味以水七升煮取四升分温四服日三夜一服

婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之

甘草小麥大棗湯方

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚

右三味以水六升煮取三升温分三服亦補脾氣

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎

沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之
小青龍湯方 見肺癰中
瀉心湯方 見驚悸中
婦人之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛與藏相連或結熱中痛在關元脉數無瘡肌若魚鱗時着男子非止女身在下未多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣急痛膝脛疼煩奄忽眩冒狀如厥癲或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脉虛多寒三十六病千變萬端審脉陰陽虛實緊弦行其針藥治危得安其雖同病脉各異源子當辯記勿謂不然
問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也〇師曰此病屬帶下何以故曾經半産瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以温經湯主之
温經湯方

吳茱萸三兩　當歸二兩　芎藭二兩
芍藥二兩　人參二兩　桂枝二兩
阿膠二兩　生姜二兩　牡丹皮二兩去心
甘草二兩　半夏半升　麥門冬一升去心

右十二味以水一斗煮取三升分温三服〇亦主婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來過多及至期不來

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散主之

土瓜根方陰癩腫亦主之

土瓜根　芍藥　桂枝　蘆蟲各三兩

右四味杵為散酒服方寸七日三服

寸口脉弦而大弦則為減大則為乾減則為寒乾則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下旋覆花湯主之

旋覆花湯方

旋覆花三兩　葱十四莖　新絳少許

右三味以水三升煮取一升頓服之

婦人陷經漏下黑不解膠姜湯主之臣億等校諸方想是前妊娠中膠艾湯本無膠姜湯

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此為水與血俱結在血室也大黃甘遂湯主之

大黃甘遂湯方

大黃四兩　甘遂二兩　阿膠二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下婦人經水不利下抵當湯主之亦治男子隨胞滿急有瘀血者

抵當湯方

水蛭三十箇熬　蠐螬三十枚熬去翅足　桃仁二十箇去皮尖

大黃三兩酒浸

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物礬石丸主之

礬石丸方

礬石二分燒　杏仁一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者再內之

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主之

紅藍花酒方疑非仲景方

紅藍花 一兩

右一味。以酒一大升。煎減半。頓服一半。未止再服。

婦人腹中諸疾痛。當歸芍藥散主之。

當歸芍藥散方 見前妊娠中

婦人腹中痛。小建中湯主之。

小建中湯方 見前虛勞中

問曰。婦人病。飲食如故。煩熱不得臥。而反倚息者。何也。○師曰。此名轉胞。不得溺也。以胞系了戾故致此病。但利小便則愈。宜腎氣丸主之。

腎氣丸方

乾地黃 八兩　薯蕷 四兩　山茱萸 四兩

澤瀉 三兩　茯苓 三兩　牡丹皮 三兩

桂枝 一兩　附子 一兩 炮

右八味。末之。煉蜜和丸。梧子大。酒下十五丸。加至二十五丸。日再服。

蛇床子散方。溫陰中坐藥。

蛇床子仁

右一味。末之。以白粉少許。和令相得。如棗大。綿裹內之。自然溫。

少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之

狼牙湯方

狼牙 三兩

右一味以水四升煮取半升以綿纏筯如繭浸湯瀝陰中日四遍

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之

膏髮煎方 見黃疸中

小兒疳蟲蝕齒方 疑并仲景方

雄黃　蕪荑

右二味末之取臘日猪脂鎔以槐枝綿裹頭四五枚點藥烙之

雜療方第二十三

論一首　證一條　方二十三首

退五藏虛熱四時加減柴胡飲子方

冬三月加 柴胡 八分　白朮 八分　陳皮 五分

大腹檳郎 四枚并皮子用　生姜 五分　桔梗 七分

春三月加 枳實 減　白朮 共六味

夏三月加 生姜 三分　枳實 五分　甘草 三分 共八味

秋三月加陳皮二分共六味

右各㕮咀。分為三貼。一貼以水三升。煮取二升。分温三服。如人行四五里進一服。如四體壅。添茸草少許。每貼分作三小貼。每小貼以水一升。煮取七合。温服。再合滓為一服。重煮。都成四服。

疑非仲景方

長服訶梨勒丸方

疑非仲景方

訶梨勒煨　陳皮　厚朴　各三兩

右三味末之。煉蜜丸如梧子大。酒飲服二十丸。加至三十丸。

三物備急丸方

見千金。司空裴秀為散用亦可先和成汁。乃傾口中。令從齒間得入。至良。

大黃一兩　乾姜一兩　巴豆一兩去皮心熬外研如脂

右藥各須精新。先擣大黃乾姜為末。研巴豆內中。合治一千杵。用為散。蜜和丸亦佳。蜜器中貯之。莫令歇。○主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口禁。停尸卒死者。以緩水若酒服大豆許三四丸。或不下。捧頭起灌。令下咽。須臾當差。如未差。更與三丸。當腹中鳴。即吐下。便差。若口噤。亦須折齒灌之。

治傷寒令愈不復紫石寒食散方。見千金翼

紫石英　白石英　赤石脂
鍾乳碓鍊　括蔞根　防風
桔梗　文蛤　鬼臼各十分
太一餘粮十分燒　乾姜
附子炮去皮　桂枝去皮各四分

右十三味。杵為散。酒服方寸匕。

救卒死方

薤搗汁。灌鼻中。

又方

雄雞冠割取血管吹內鼻中。

猪脂如雞子大。苦酒一升。煮沸灌喉中

雞肝及血塗面上。以灰圍四旁。立起。

大豆二七粒。以雞子白并酒和。盡以吞之。

救卒死而壯熱者方

礬石半斤。以水一斗半。煮消。以漬脚。令沒踝

救卒死而目閉者方

騶牛臨面。搗薤汁灌耳中。吹皂莢末鼻中。立效。

救卒死而張口反折者方

灸手足兩爪後十四壯了。飲以五毒諸膏散。有巴豆者

救卒死而四肢不收。失便者方

馬屎一升。水三斗。煮取二斗以洗之。又取牛洞(稀糞也。)一升。温酒灌口中。灸心下一寸。臍上三寸。臍下四寸。各一百壯。差。

救小兒卒死而吐利。不知是何病。方。

狗屎一丸。綏取汁。以灌之。無濕者。水煮乾者。取汁。

尸厥脉動而無氣。氣不通。故靜而死也。治方。(脉證見上卷。)

菖蒲屑。內鼻兩孔中。吹之。令人以桂屑着舌下。

又方

剔取左角髮方寸。燒末。酒和。灌令入喉。立起

救卒死。客忤死。還魂湯主之方。(千金方云。主卒忤鬼擊飛尸。諸奄忽氣絶。無復覺。或已無脉。口噤。衂不開。去齒下湯。湯下口。不下者。分病人髮左右。捉揄肩引之。藥下。復增取一升。須臾立甦。)

麻黄三兩去節 杏仁七十箇去皮尖 甘草一兩炙

一方四兩 千金用桂心二兩

右三味。以水八升。煑取三升。去滓。分令咽之。通治諸感忤。

又方

韮根一把　烏梅二十枚　吳茱萸半升炒

右三味。以水一斗。煑之。以病人櫛。內中。三沸。櫛浮者生。沈者死。煑取三升。去滓。分飲之。

救自縊死。旦至暮。雖已冷。必可治。暮至旦。小難也。恐此當言陰氣盛故也。然夏時夜短於晝。又熱。猶應可治。又云。心下若微溫者。一日以上。猶可治之。方。

徐徐抱解。不得截繩。上下安被臥之。一人以脚踏其兩肩。手少挽其髮。常弦弦。勿縱之。一人以手按據胸上。數動之。一人摩捋臂脛。屈伸之。若已殭。但漸漸強屈之。并按其腹。如此一炊頃。氣從口出。呼吸眼開。而猶引按莫置。亦勿苦勞之。須臾可少桂湯及粥清。含與之。令濡喉。漸漸能嚥。及稍止。若向令兩人以管吹其兩耳。罙好。此法最善。無不活也。

凡中暍死。不可使得冷。得冷便死。療之方。

屈草帶。繞暍人臍。使三兩人溺其中。令溫。亦

可用熱泥和屈草亦可扣瓦椀底按及車缸以着暍人取令溺須得流去此謂道路窮卒無湯當令溺其中欲使多人溺取令温若湯便可與之不可泥及車缸恐此物冷暍既在夏月得熱泥土煖車缸亦可用也

救溺死方

取竈中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔即活

右療自縊溺暍之法並出自張仲景為之其意殊絶殆非常情所及本草所能關實救人之大術矣傷寒家數有暍病非此遇熱之暍見外臺肘後日

治馬墜及一切筋骨損方見肘後方

大黄一兩切浸湯成下　緋帛如手大燒灰

亂髮如雞子大燒灰用　久用炊單布一尺燒灰

敗蒲一握三寸　桃仁四十九枚去皮尖喫

甘草如中指節炙剉

右七味以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黄去滓分温三服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣被盖復斯須通利數行痛楚立差利及浴水赤勿怪即瘀血也

禽獸魚蟲禁忌并治第二十四

論辯二首　合九十法　方二十二首

凡飲食滋味。以養於生。食之有妨。反能為害。自非服藥煉液。焉能不飲食乎。切見時人。不閑調攝。疾疢競起。若不因食而生。苟全其生。須知切忌者矣。所食之味。有與病相宜。有與身為害。若得宜則益體。害則成疾。以此致危。例皆難療。凡煑藥飲汁以解毒者。雖云救急。不可熱飲。諸毒病得熱更甚。宜冷飲之。○肝病禁辛。心病禁鹹。脾病禁酸。肺病禁苦。腎病禁甘。春不食肝。夏不食心。秋不食肺。冬不食腎。四季不食脾。辯曰。春不食肝者。為肝氣王。脾氣敗。若食肝。則又補肝。脾氣敗尤甚。不可救。又肝王之時。不可以死氣入肝。恐傷魂也。若非王時。即虛。以肝補之。佳。余藏準此。

凡肝臟。自不可輕噉。自死者。彌甚。○凡心。皆為神識所舍。勿食之。使人來生復其報對矣。○凡肉及肝。落地不着塵土者。不可食之。○猪肉落水。浮者。不可食。○諸肉及魚。若狗不食。鳥不啄者。不可食。○諸肉不乾。火灸不動。見水自動者。不可食之。○肉中有如朱點者。不可食之。○六畜肉。熱血不斷

者不可食之。○父母及身本命肉食之。令人神魂不安。○食肥肉及熱羹不得飲冷水。○諸五臟及魚投地塵土不汚者不可食之。○穢飯餒肉臭魚食之皆傷人。○自死肉口閉者不可食之。○六畜自死皆疫死則有毒不可食之。○獸自死北首及伏地者食之殺人。○食生肉飽飲乳變成白蟲。一作丘蠱○疫死牛肉食之令病洞下亦致堅積宜利藥下之。○脯藏米甕中有毒及經夏食之發腎病。

治自死六畜肉中毒方。

黃蘗屑。搗服方寸匕。

治食鬱肉漏脯中毒方。鬱肉密器蓋之。隔宿者是也。漏脯茅屋漏下。沾着者是也。

燒犬屎。酒服方寸匕。每服人乳汁亦良。○飲生韭汁三升亦得。

治黍米中藏乾脯食之中毒方

大豆濃煑汁飲數升即解。亦治狸肉漏脯等毒。

治食生肉中毒方。

掘地深三尺。取其下土三升。以水五升。煑數沸。澄清汁。飲一升。即愈。

治六畜鳥獸肝中毒方。

水浸豆豉絞取汁服數升。愈。

馬脚無夜眼者不可食之。○食酸馬肉不飲酒則殺人。○馬肉不可熱食傷人心。○馬鞍下肉食之殺人。○白馬黑頭者不可食之。○白馬青蹄者不可食之。○馬肉犹肉共食飽醉臥大忌。○驢馬肉合猪肉食之成霍亂。○馬肝及毛不可妄食中毒害人。

治馬肝毒中人未死方。

雄鼠屎二七粒末之水和服。日再服。屎尖者是

又方

人垢取方寸七服之佳。

治食馬肉中毒欲死方。

香豉一兩　杏仁三兩

右二味蒸一食頃熟杵之服。日再服。

又方

黃蘆根汁飲之良。

疫死牛或目赤或黃食之大忌。○牛肉共猪肉食之必作十白蟲。○青牛腸不可合犬肉食之。○牛肺從三月至五月其中有蟲如馬尾割去勿食食

則損人〇牛羊猪肉皆不得以楮木桑木蒸炙食之令人腹內生蟲〇噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向後順者是也。

治噉蛇牛肉食之欲死方。

飲人乳汁一升立愈。

又方

以泔洗頭飲一升愈。

牛肚細切以水一斗煮取一升煖飲之大汗出者愈。

治食牛肉中毒方。

甘草煮汁飲之即解。

羊肉其有宿熱者不可食之〇羊肉不可共生魚酪食之害人〇羊蹄甲中有珠子白者名羊懸筋食之令人癲〇白羊黑頭食其腦作腸癰〇羊肝共生葅食之破人五藏〇猪肉共羊肝和食之令人心悶〇猪肉以生胡荽同食爛人臍〇猪脂不可合梅子食之〇猪肉和葵食之少氣〇鹿人不可和蒲白作羹食之發惡瘡〇麋脂及梅李子若妊婦食之令子青盲男子傷精〇麞肉不可合蝦及生菜梅李果食之皆病人〇痼疾人不可食熊

肉令終身不愈○白犬自死不出舌者食之害人○食狗鼠餘令人發瘻瘡

治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞下方

杏仁一升合皮熟研用

右一味以沸湯三升和取汁分三服利下肉片大驗

婦人妊娠不可食兎肉山羊肉及鱉雞鴨令子無聲音○兎肉不可合白雞肉食之令人面發黃○兎肉着乾姜食之成霍亂○凡鳥自死口不閉翅不合者不可食之○諸禽肉肝青者食之殺人○雞有六翮四距者不可食之○烏雞白首者不可食之○雞不可共葫蒜食之滯氣一云雞子○山雞不可合鳥獸肉食之○雉肉久食之令人瘦○鴨卵不可合鱉肉食之○婦人妊娠食雀肉令子淫亂無耻○雀肉不可合李子食之○燕肉勿食入水為蛟龍所噉

鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解之方

大豆煑汁及鹽汁服之解

魚頭正白如連珠至脊上食之殺人○魚頭中無

腮者不可食之殺人○魚無腸膽者不可食之三年陰不起女子絶生○魚頭似有角者不可食之○魚目合者不可食之○六甲日勿食鱗甲之物○魚不可合雞肉食之○魚不得合鸕鷀肉食之○鯉魚鮓不可合小豆藿食之其子不可合猪肝食之害人○鯉魚不可合犬肉食之○鯽魚不可合猴雉肉食之一云不可合猪肝食○鯷魚合鹿肉生食令人筋甲縮○青魚鮓不可合生葫荽及生葵并麥中食之○鰌鱔不可合白犬血食之○龜肉不可合酒果子食之○鱉目凹陷者及壓下有王字形者不可食之又其肉不得合雞鴨子食之○龜鼈肉不可合莧菜食之○鰕無鬚及腹下通黑煑之反白者不可食之○食膾飲乳酪令人腹中生蟲為瘕

鱠食之在心胷間不化吐復不出速下除之久成癥病治之方

橘皮一兩　大黄二兩　朴硝二兩

右三味以水一大升煑至小升頓服即消

食鱠多不消結為癥病治之方

馬鞭草

右一味搗汁飲之○或以姜葉汁飲之一升亦消○又可服吐藥吐之

食魚後食毒兩種煩亂治之方

橘皮濃煎汁服之即解

食鯸鮧魚中毒方

蘆根煑汁服之即解

蠏目相向足班目赤者不可食之

食蠏中毒治之方

紫蘇煑汁飲之三升○紫蘇子搗汁飲之亦良

又方

冬瓜汁飲二升食冬瓜亦可

凡蠏未遇霜多毒其熟者乃可食之○蜘蛛落食中有毒勿食之○凡蜂蠅蟲蟻等多集食上食之致瘻

果實菜穀禁忌并治第二十五

果子生食生瘡○果子落地經宿蟲蟻食之者人大忌食之○生米停留多日有損處食之傷人○桃子多食令人熱仍不得入水浴令人病淋瀝寒熱病○杏酪不熟傷人○梅多食壞人齒○李不

可多食。令人臚脹。○林檎不可多食。令人百脉弱。○橘柚多食。令人口爽。不知五味。○梨不可多食。令人寒中。金瘡産婦。亦不宜食。○櫻桃杏多食。傷筋骨。○安石榴不可多食。損人肺。○胡桃不可多食。令人動痰飲。○生棗多食。令人熱渴氣脹。寒熱羸瘦者。彌不可食。傷人。

食諸果中毒治之方

猪骨燒灰

右一味。末之。水服方寸匕。○亦治馬肝漏脯等毒。

赤色。及仰生者。勿食。○菌仰卷。及赤色者。不可食。

食諸菌中毒。悶亂欲死。治之方。

人糞汁。飲一升。　土漿。飲一二升。

大豆濃煑汁。飲之。○服諸吐利藥。並解。

食楓柱菌。而哭不止。治之以前方。

誤食野芋。煩毒欲死。治之以前方。其野芋根。山東人名魁芋。人種芋。三年不收。亦成野芋。並殺人。

蜀椒閉口者。有毒。誤食之。戟人咽喉。氣病欲絶。或吐下白沫。身體痺冷。急治之方。

肉桂煎汁飲之　飲冷水一二升

或食蒜　或飲地漿

或濃煮豉汁飲之並解

正月勿食生葱令人面生游風○二月勿食蓼傷人腎○三月勿食小蒜傷人志性○四月八月勿食胡荽傷人神○五月勿食韭令人乏氣力○五月五日勿食一切生菜發百病○六月七月勿食菜荽傷神氣○八月九月勿食姜傷人神○十月勿食椒損人心傷心脉○十一月十二月勿食薤令人多涕唾○四季勿食生葵令人飲食不化發

百病非但食中藥中皆不可用深宜慎之○時病差未健食生菜手足必腫○夜食生菜不利人○十月勿食被霜生菜令人面無光目澀心痛腰疼或發心瘧瘧發時手足十指爪皆青困委○葱韭初生芽者食之傷人心氣○飲白酒食生韭令人病增○生葱不可共蜜食之殺人獨顆蒜彌忌○棗合生葱食之令人病○生葱和雄雞雉白犬肉食之令人七竅經年流血○食糖蜜後四日內食生葱蒜令人心痛○夜食諸姜蒜葱等傷人心○蕪菁根多食令人氣脹○薤不可共牛肉作羹食

之成瘕病。韮亦然。○蓴多病。動痔疾。○野苣不可同蜜食之。作內痔。○白苣不可共酪同食。作䘌蟲。○黃瓜食之。發熱病。○葵心不可食。傷人。葉尤冷。黃背赤莖者。勿食之。○胡荽久食之。令人多忘。○病人不可食胡荽。及黃花菜。○芊不可多食。動病。○妊婦食姜。令子餘指。○蓼多食。發心痛。○蓼和生魚食之。令人奪氣。陰欬疼痛。○芥菜不可共兎肉食之。成惡邪病。○小蒜多食。傷人心力。

食躁式躁方

豉濃煑汁飲之。

鈎吻與芹菜相似。誤食之。殺人。解之方。肘後云。鈎吻菜莢食芹相似。

薺苨 八兩

右一味。水六升。煑取二升。分溫二服。鈎吻生地仿屋草。其莖有毛者。以此別之。

菜中有水莨菪。葉圓而光。有毒。誤食之。令人狂亂。狀如中風。或吐血。治之方。

甘草煑汁。服之。即解。

春秋二時。龍帶精入芹菜中。人偶食之。為病發時。手青腹滿。痛不可忍。名蛟龍病。治之方。

硬糖二三升

右一味。日兩度服之。吐出如蜥蜴三五枚。差。

食苦瓠中毒。治之方。

黎穰煑汁。數服之。解。

扁豆。寒熱者不可食之。○久食小豆。令人枯燥。○食大豆等。忌噉猪肉。○大麥久食。令人作癬。○白黍米。不可同飴蜜食。亦不可合葵食之。○莜麥麵多食。令人髮落。○鹽多食。傷人肺。○食冷物。氷人齒。○食熱物。勿飲冷水。○飲酒食生蒼耳。令人心痛。○夏月大醉汗流。不得冷水洗着身。及使扇。即成病。○飲酒。大忌灸腹背。令人腸結。○醉後勿飽食。發寒熱。○飲酒食猪肉。臥秫稻穰中。則發黃。○食飴多飲酒。大忌。○凡水及酒。照見人影動者。不可飲之。○醋合酪食之。令人血瘕。○食白米粥。勿食生蒼耳。成走疰。○食甜粥已。食鹽即吐。○犀角筯攪飲食。沫出及澆地墳起者。食之殺人。

飲食中毒。煩滿。治之方。

苦參三兩　苦酒一升半

右二味。煑三沸。三上三下。服之。吐食出。即差。或以水煑亦得

又方

犀角湯亦佳

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方。

鹽一升　水三升

右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差。

礬石生入腹破人心肝亦禁水〇商陸以水服殺人〇葶藶子傅頭瘡藥成入腦殺人〇水銀入人耳及六畜等皆死以金銀着耳邊水銀則吐若練無子者殺人。

凡諸毒多是假毒以投元知時宜煮甘草濃汁飲之通除諸毒藥。

音釋

疥古巧切　深莫分切深入也