

江苏验方草药选编

(上 集)

江苏省革命委员会卫生局编

江苏省革命委员会出版发行局



江苏验方草药选编

(上 集)

江苏省革命委员会卫生局编

*

江苏省革命委员会出版发行局出版

江苏省新华书店发行 江苏新华印刷厂印刷

1970年7月第1版 1970年7月第1次印刷

书号 14100·235 每册 0.63元

(内部发行)

救死扶傷，寧
革命的人，這是我

10月來

團結新老中兩各部分
醫藥衛生工作者，組成
鞏固統一戰綫，為開展
偉大的人民衛生工作
而奮鬥
毛澤東

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

提高警惕，保卫祖国。

备战、备荒、为人民。

毛主席语录

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

我们必须告诉群众，自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生的习惯作斗争。

前 言

伟大领袖毛主席亲自发动和领导的无产阶级文化大革命，彻底摧毁了以叛徒、内奸、工贼刘少奇为首的资产阶级司令部，粉碎了他们复辟资本主义的阴谋。在医疗卫生战线上，经过两个阶级，两条道路，两条路线的激烈斗争，狠批了刘少奇及其在卫生部门的代理人所推行的反革命修正主义卫生路线，毛主席的无产阶级革命路线更加深入人心，医疗卫生工作出现了一派生气勃勃的大好形势，一个发掘祖国医药学伟大宝库的群众运动，正在蓬勃兴起。

当前，民间单方、验方、中草药的推广和应用，就是毛主席的革命路线在医疗卫生战线上所取得的一个丰硕成果。它不但对巩固农村合作医疗发挥了很大作用，而且对落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针具有重大的意义。

为了使广大“赤脚医生”、基层革命医务人员较多地掌握一些有效的验方，进一步识别和采

用草药,更好地发挥作用,我们初步筛选、整理了一部分比较好的民间单方、验方,并在这些验方范围内选择部分药用植物加以介绍,合编成册,以供选用和参考。

中国医药学是一个伟大的宝库。伟大领袖毛主席早就指出,中西医应当团结合作,运用近代科学的知识和方法来整理和研究中医中药,创造中国统一的新医学新药学。验方和中草药,是这个宝库的一个组成部分。我们殷切地希望广大“赤脚医生”和革命的医务工作者,把毛主席的光辉思想同医疗卫生革命实践紧密结合起来,共同做好民间验方及中草药的发掘、整理、提高和交流、推广工作,更好地为广大的工农兵服务,为伟大的社会主义建设服务。

《选编》分上下两册出版。在整理编辑中可能存在不少缺点和错误,请予批评指正;并热烈欢迎提出宝贵的修改、补充意见,以提高我们今后工作的质量。

江苏省革命委员会卫生局

一九七〇年一月

几点说明

1. 验方在民间的运用,有时缺少明确的辩证施治,因此本书验方下不能逐一列“适应症”一项,仅在每一病名下统一概述本病的主要症状,以供参考。遇有辩证施治的验方,则在本方“说明”项中加以提示。

2. 验方的服用剂量,除儿科方及其它少数已写明儿童用量者外,其余均系成人量;如用于小儿、或年老体弱的患者,用量须酌减。草药的用量也都是写的成人量,用时须注意。

3. 本书的草药部分,其目的是为了帮助读者对部分草药的识别和采集。因为不是编写的草药专书,所以选择介绍的范围只以前面验方内用到的一些药用植物,同时在我省又有野生或栽培的为限。对一般普通熟悉的东西,如楝树、蓖麻、鸡冠花、浮萍草、白果树、芥菜、大蒜头等等,以及动物药、矿物药和加工制成品,均不作介绍。

4. 草药的功用,在民间用途比较广阔,书中

“临床应用”部分，只作重点介绍。

5. 草药在各地的俗名、土名较多，异物同名的现象也不少，有时容易引起混淆，有些土名，只局限于个别地方使用，均不一一收录。

6. 植物的科属和学名，附写于图下，仅供参考。

7. 草药部分的名称为药材名，凡与植物名称不一致的，即在植物形态项内注明原植物名称。

8. 凡以分、钱、两计写的重量，均系 16 两为 1 斤的旧制。

目 录

验 方 部 分

传染病

伤风感冒	1
流行性感冒	2
麻疹	2
水痘	4
白喉	5
百日咳	6
痄腮(流行性腮腺炎)	8
细菌性痢疾	9
疟疾	10

寄生虫病

钩虫病(粪毒、黄胖病)	12
虫积(肠蛔虫)	14
蛔厥(胆道蛔虫病)	14
阿米巴痢疾	15
血吸虫病	16
丝虫病(乳糜尿、象皮肿)	19

内科疾病

咳嗽(支气管炎)·····	20
哮喘(支气管哮喘)·····	21
肺痈(肺脓肿)·····	22
胃痛(慢性胃炎)·····	23
胃、十二指肠溃疡·····	25
胆囊炎、胆石症·····	26
肠痈(急性阑尾炎)·····	27
脱肛·····	28
水肿(急、慢性肾炎)·····	29
急性肾盂肾炎·····	32
石淋(膀胱结石)·····	33
小便不通(尿潴留)·····	34
痹症(风湿痛、关节炎)·····	35
偏正头痛·····	37
口眼歪斜(面神经麻痹)·····	38

妇产科疾病

月经不调·····	39
痛经·····	40
经闭·····	41
倒经·····	43
崩漏(功能性子宫出血、产后流血)·····	43

赤白带下·····	45
妊娠呕吐·····	47
先兆流产·····	48
产后腹痛·····	48
乳汁不下·····	49
阴道滴虫病·····	50

儿科疾病

小儿泄泻(小儿消化不良)·····	51
吐乳·····	53
疳积(小儿营养不良)·····	53
遗尿·····	54
惊风(小儿惊厥)·····	56

外科疾病

瘰癧(颈淋巴结核)·····	57
疔疮·····	58
搭背·····	60
流痰(骨结核)·····	62
附骨疽(化脓性骨髓炎)·····	64
乳痈(乳腺炎)·····	65
臁疮(下肢溃疡)·····	67
痔疮·····	68
跌打损伤(挫伤、扭伤)·····	70

外伤出血·····	71
冻疮·····	72
烫伤·····	73
毒蛇咬伤·····	75

皮肤科疾病

秃疮(发癣、黄癣)·····	77
癣疮(体癣)·····	79
湿疹·····	80
皮肤搔痒·····	81
缠腰火丹(带状疱疹)·····	82
丹毒·····	83
鹅掌风·····	83
手足皲裂·····	84
鸡眼·····	85
绣球风(阴囊瘙痒)·····	86

五官科疾病

目翳(化脓性角膜炎)·····	86
眼癣(睑缘炎)·····	87
夜盲症·····	88
脓耳(化脓性中耳炎)·····	89
鼻渊(副鼻窦炎)·····	91
慢性鼻炎·····	92

乳蛾(急性扁桃体炎).....	92
牙痛.....	93

草 药 部 分

大戟.....	96
大蓟.....	98
小蓟.....	100
小茴香.....	102
小旋花.....	104
飞帘.....	106
女贞子.....	108
山楂.....	110
山葡萄.....	112
土三七.....	114
土牛膝.....	116
土茯苓.....	118
土槿皮.....	120
马齿苋.....	122
马鞭草.....	124
丹参.....	126
毛茛.....	128
六月雪.....	130

天名精		132
天南星		134
天浆壳		136
木防己		138
凤尾草		140
车前草		142
乌柏叶		144
乌菰莓		146
王不留行		148
白芨		150
白菰		152
白毛藤		154
白头翁		156
石韦		158
石打穿		160
石芥薹		162
艾叶		164
瓜蒌		166
半夏		168
半边莲		170
半枝莲		172
平地木		174

龙须草	176
龙胆草	178
仙鹤草	180
百部	182
羊蹄	184
红藤	186
地榆	188
地锦草	190
西河柳	192
决明子	194
寻骨风	196
辛夷	198
牡荆	200
苍术	202
苍耳	204
芫花	206
芫荽	208
花椒	210
麦门冬	212
佛甲草	214
苦参	216
鸢尾	218

卷柏	220
贯众	222
虎杖	224
虎耳草	226
泽兰	228
泽漆	230
青蒿	232
青木香	234
金针菜	236
金荞麦	238
金银花	240
金樱子	242
板蓝根	244
河白草	246
鱼腥草	248
刺果甘草	250
香附	252
草乌	254
茜草	256
茵陈蒿	258
荔枝草	260
珍珠菜	262

枸杞子	264
核桃	266
桔梗	268
柴胡	270
臭椿	272
徐长卿	274
益母草	276
鬼针草	278
夏枯草	280
鸭跖草	282
菟丝子	284
海金沙	286
桑寄生	288
野菊	290
梔子	292
梗通草	294
蛇床子	296
菝葜	298
甜地丁	300
旋覆花	302
望江南	304
葛根	306

黑白丑	308
葶草	310
鹅不食草	312
紫苏	314
紫花地丁	316
辣蓼	318
蒲黄	320
蒲公英	322
墓头回	324
锦鸡儿	326
算盘珠	328
墨旱莲	330
薄荷	332
覆麦	334

附 录

植物常用名词术语解释	336
草药别名索引	353

传 染 病

伤 风 感 冒

初起时鼻咽部有发干、发痒和热的感觉，继则鼻塞、流清涕、打喷嚏、咽痒、咳嗽，同时还有怕风、轻度发热、头痛、四肢酸痛、食欲不振等全身症状。

1.处方 鲜生姜 1~2 钱 连须葱头 5~7 根

用法 上药煎汤顿服，每日 2 次。

说明 此方适用于感冒风寒，怕冷，无汗的患者。

2.处方 鲜马鞭草 1 两 5 钱 羌活 5 钱 青蒿 1 两

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服，连服 2~3 天。咽痛加鲜桔梗 5 钱。

说明 此方亦可用于治疗流行性感冒。

3.处方 小瓜蒂(菜瓜) 1~2 钱

用法 上药煎汤内服，重症可加薄荷 2 钱。服药后即睡，以汗出为验。

4.处方 紫苏叶20片 薄荷 2钱

用法 上药煎汤 2次,每次 1小碗,1日 2次分服。煎药时间不宜过长,沸后再煎 5~6分钟即可。

流行性感 冒

突然发寒、发热(体温迅速上升 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 持续 3~5日),头痛剧烈,全身疼痛,尤以四肢及背部疼痛更甚,面部、咽部和眼结合膜均可有明显充血,咽痛,干咳,有时鼻血。

5.处方 羌活 5钱 板蓝根 1两

用法 上药煎汤,1日 2次分服,连服 2~3日。

6.处方 大蒜头 2两 白糖 4两

用法 将大蒜捣烂,和糖煎取浓汁,每用 1匙,开水冲服,每日 2~3次,连服 2~3天。

说明 此方亦治百日咳。

麻 疹

本病常在冬末春初流行,患者多是 6个月~5周岁的小孩,凡未患过麻疹的均易感染,成人未患过麻疹的也可得病。麻疹初起很似严重的

感冒，证见怕冷、发热、咳嗽、喷嚏、鼻塞流涕、目赤、眼泪汪汪、倦怠思睡等症状。开始 2~3 天内，可在颊粘膜近白齿处有针头大小的、微白色、外围红晕的斑点（称费—科氏斑），在较强的阳光下容易察见，此为麻疹最早期的特征（便于和感冒鉴别诊断）；发热 3 天后出现红疹，疹点先从耳后、发际及颈部出现，渐及颜面胸腹四肢，凡手足心及鼻部俱见疹点，即为出透。出疹时体温升高，一般持续 3~5 天。皮疹出齐后，即自上而下顺序消退，体温下降，食欲好转，皮肤上有糠麸状脱屑，便进入了恢复期。

7. 处方 芫荽 西河柳各 3~4 两

用法 上药煎汤加酒 1 杯，温擦皮肤，令患儿出微汗，每日 2 次。注意避风勿使患儿着凉。

说明 本方用于麻疹透发不快或透发不出。

8. 处方 葛根 3 钱 紫苏叶 蝉衣各 1 钱 5 分

用法 上药加水煎沸约 3~4 分钟，1 日分数次温服。

说明 本方适用麻疹初期，可使麻疹顺利透发。

水 痘

本病大多在冬、春季流行，2~6 岁的儿童易患此症，1 岁和10岁以上则少见。初起时往往有发热、头痛、精神萎靡、食欲不振等全身症状。1~2 日后即于头面、躯干、四肢等处，先后出现红疹，略高于皮肤，再 1 日后，疹的中央有一小水泡，迅速扩大，大的如豌豆，小的如米粒，略呈圆形或椭圆形，内含液体，澄清如水，（亦有稍混浊的液体，但绝非脓液）故名水痘。根脚围有红晕。水痘的特点是：出痘程序先后不一，在起病 3~5 日内，皮疹陆续出现，此愈彼发；皮疹很痒，搔破后可产生继发感染。

9.处方 金银花 6 钱 生甘草 4 分

用法 上药煎汤，1 日 3 次分服，连服 3 天。

10.处方 蚕蛾绵茧 生明矾各适量

用法 将生明矾捣碎纳入茧内，放在炭火上煅烧，待矾汁尽后，取出研末，撒布患处。

说明 本方适用于疱疹抓破赤痒湿烂者。

白 喉

常见的白喉有咽白喉和喉白喉：咽白喉，初起怕冷，有低热或中等热，咽痛，头痛，数小时后，扁桃体上出现白点，迅速扩大变厚，形成灰白色的假膜，不易揩去，如强行除去，可引起出血。假膜可蔓延到悬雍垂（小舌）、软腭、咽后壁、鼻咽及喉部。严重的出现心跳加快、脉搏微弱、脸色苍白、四肢冰冷等全身中毒症状，有随时发生心力衰竭或虚脱而死亡的危险。喉白喉，比咽白喉更加严重，大多数由咽白喉蔓延而来，也有是原发于喉部的，因此咽部不见白膜。起病时往往首先发生声音嘶哑，以后有犬吠样咳嗽和呼吸困难，年龄越小，呼吸困难越重，而且逐渐加重，脸色由苍白变成青紫，以致昏迷，最后可死于窒息。

11. 处方 鲜土牛膝根 7~10 棵 人乳少许

用法 将牛膝根洗净捣烂，布包绞汁，加入少许人乳（总量不超过半酒杯）和匀，滴鼻，每日 5~7 次。或以鲜土牛膝根洗净捣汁，每次以半匙兑入等量温开水，给患者慢慢饮之，每日饮 10 余次。

说明 此方适用于白喉早期,咽部红肿疼痛,假膜初现或未现时。

12.处方 土蚕 10 只

用法 上药洗净捣烂取汁,开水冲服(周岁小儿每用 3 只左右),每日 3 次。

百 日 咳

本病为小儿常见的流行性传染病。开始类似伤风咳嗽,后来逐渐加重。咳嗽阵发性发作,每次咳嗽连续10余声甚至数十声,在咳嗽间隙中,常发出类似鸡鸣终了的吼声,往往要重复多次,直至咳出稠痰或呕吐时才能暂时停止。咳嗽时涕泪交流,两眼突出,脸红或发紫,身体弯缩一团,表情痛苦,体弱的儿童,可因缺氧而发生窒息或惊厥。痉咳多次后,则鼻血,咯血,面部及眼睑浮肿。

13.处方 蜈蚣 甘草各等分

用法 上药研细末,再混合研匀,1~3 岁小儿每次服 2~3 分,1 日 2~3 次,开水送服。可连服 2~3 天。

14.处方 鸡苦胆 1 个(猪、羊苦胆也可用)

用法 将胆刺破,少加白糖和服。1 岁以下,

3次服完；1~2岁，2天服完；3~5岁，每天服1个；5~7岁，每天服2个。

说明 如用猪胆或羊胆，用量按上述鸡胆汁实际数量服用，不以个数计算。

15.处方 麦芽糖鸡蛋大1块

用法 将糖放碗内，隔水燉化，分数次服。

又法 将麦芽糖放豆油灯上烧，烧到外层焦枯时剥下趁热吃，然后再烧再吃。

16.处方 鲜鹅不食草1斤 老枇杷叶50片
去毛

用法 上2味以水3斤，煎至1斤，再加适量冰糖即成。每次服2匙，1日2次，连服1周左右。

17.处方 百部 马兜铃各2钱 大蒜头3个

用法 上药切细加水适量，置饭锅上蒸，去渣服药汁，每日1剂。

说明 亦可用百部2钱、车前草4钱煎服。

18.处方 麻雀2只

用法 去净毛及肚内肠杂，清水煎汤，不放油盐。1次服完，一般须连服10日左右。

疔 腮（流行性腮腺炎）

患者首先发现耳下部肿大（一侧或双侧）疼痛，皮色不红，咀嚼食物时疼痛加重，一般不化脓。少数患者初起时先有发热、头痛、呕吐、食欲不振等前驱症状。

19.处方 蝌蚪半斤 冰片5分

用法 上药同放瓶内，用力振荡数分钟，等化为水液后，用纱布过滤去渣。即以此水涂搽患处，每日3~5次，连涂2~3天。

说明 蝌蚪即青蛙之幼虫，俗名虾蟆乌子。

20.处方 板蓝根2两

用法 上药煎汤2小碗，1日3次分服，连服2~3日。

21.处方 木芙蓉叶1两

用法 上药研成细末，用水或醋或麻油调敷患处，每日换药1次。

22.处方 雄黄末适量

用法 以纱布包雄黄末塞患者耳中（患在左腮塞左耳，患在右腮塞右耳。），隔夜除去。

23.处方 赤小豆2两面粉少许（防其太黏）

用法 将赤小豆研细末，然后加入面粉研匀，

再加清水调如糊状，敷患处。敷时外圈宜厚，里圈宜稍薄，中间宜稍留一空隙，1日1次，如感干稠不适，可少加白蜜以润之。

细菌性痢疾

初起怕冷，发热，随后腹痛，泻下不爽，里急后重；泻下物先是稀粪水，带有脓血和粘液，以后单纯泻下鲜红色胶冻样物；一日夜少则5~6次，多则几十次。

24.处方 鲜辣蓼 鲜地锦草各1两

用法 上药煎汤2小碗，1日2次分服，连服3~5日；如患者发热不退，加葛根5钱，青蒿1两。

25.处方 鲜马齿苋 鲜马鞭草各1两

用法 上药同煎汤2小碗，1日2次分服，连服3~5日。

26.处方 鲜马齿苋2两 大蒜头3~5枚
(捶) 红糖适量

用法 上药煎汤2小碗，1日2次分服。连服2~3日。

27.处方 大蒜头5钱 雄黄5分 淀粉适量

用法 上药同捣烂，捻成药丸 10~12 粒，每次服 4~6 粒，每日 2 次。

又法 上方去淀粉，捣烂后，加生理盐水 100 毫升，浸 24 小时，过滤，将所得浸渍液作灌肠用，每日灌 2 次，重者每日 3 次。成人每次灌 300 毫升，周岁内婴儿每次 50 毫升。

说明 小孩服丸剂有困难者用灌肠法。

28. 处方 鲜乌菰莓根 2~4 两

用法 上药除去外层红皮，捶烂，煎汤服，每日 2 次，连服 3 天。

29. 处方 苦瓜藤

用法 上药焙脆研末，少加砂糖，开水调服，每日 1 次，每次 1 钱 5 分~3 钱，可连服几次，无副作用。

说明 ①此方兼治混合型痢疾及肠炎腹泻。

②苦瓜通常作蔬菜食用。长圆形，瓜皮淡绿色，上面有小丘形瘤皮，成熟的瓜瓤鲜红色。

疟 疾

患者有定时的寒战，约半小时后，寒战停止，接着发热，体温高达 40℃ 左右，伴有头痛、面红、恶心、呕吐、全身酸痛、甚至说糊话等。发热

持续数小时后,汗出而体温下降。整个发作过程约 6~12 小时,一般每日发作 1 次,或隔日发作 1 次,也有隔 2 日发作 1 次的。长期不愈,可引起贫血及脾脏肿大。

30.处方 鲜地榆根 2~3 两

用法 上药洗净煎汤,于疟发前 2 小时服。

说明 此方对日日疟、间日疟都有效,特别对初起疟疾疗效较显。

31.处方 仙鹤草叶 适量

用法 将上药搓揉成团,在疟发前 2 小时塞入一侧鼻孔(左或右),如到时不发,或虽发已见减轻,即须取出,塞鼻时间过长,可能起泡。不愈,可如法再塞 1 次。

32.处方 鹅不食草 适量

用法 上药搓揉成团,在疟发前半小时至 1 小时塞入一侧鼻孔(左或右),塞后 2~3 小时取出,一般塞 1~2 次可愈,久疟须塞 3~5 次才有效。

33.处方 石荠苎鲜叶 适量

用法 上药搓揉成团,于疟发前 1 小时塞入一侧鼻孔(左或右),到时不发或虽发已见减轻,即须取出。

34.处方 鲜野菊花叶 适量

用法 上药揉烂，于疟发前1~2小时塞鼻，2小时后取出。

说明 野菊花叶要摘取茎枝上端的嫩叶。

寄 生 虫 病

钩虫病（粪毒、黄胖病）

本病是因为用含有钩虫卵的新粪施肥后，人的皮肤和施过新粪的泥土接触，粪中的丝状幼虫乘机侵入人体而发病。当丝状幼虫侵入皮肤时，局部（如足趾、脚背）便出现丘疹或小水泡，灼热、红肿、发生奇痒，俗称为粪毒。以后（一周后）当丝状幼虫经过血管和心脏进入肺部，便有干咳，甚者喘急痰中带血；当它由喉到咽，进入胃肠后，便在十二指肠内发育成虫。钩虫在肠内附着肠粘膜，既吸血，又使肠部出血，故贫血现象比较严重，如面色萎黄，手足指甲苍白，头晕，四肢无力，稍一劳动，即感心慌气喘，严重的可引起全身浮肿。当这些症状出现时，人们又称它为“懒黄病”。此外，常有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛，类似溃疡病。还有的患者有喜欢

吃生米、泥土、石灰……等特异的嗜好。

35.处方 黄豆 2 斤 皂矾 2 两

用法 先将黄豆炒熟，再将皂矾用适量的水溶化后，烹入炒熟的黄豆内再炒脆，贮入瓶内备用；每次嚼食 1 两，每日 3 次。

36.处方 苍术 6 两 皂矾 黑枣（煮熟去核皮）各 3 两

用法 上药研细末，和匀，以黑枣肉捣烂拌和为丸（如嫌干酌加枣汤），如桐子大。每服 3 钱，1 日 2 次，米汤送下。

说明 以上 2 方适用于钩虫病贫血。

37.处方 榧子 槟榔 红藤 各 1 两 贯众 5 钱

用法 上药水煎浓液，每日早晚饭前各服 1 次，分 2 天服完，服时加生大蒜 3 瓣随药生吃。

说明 本方适用于钩虫病体质尚未虚弱时，若已出现贫血现象，宜服第 35、36 方。

38.处方 南瓜叶 10 片 生石灰 5 钱

用法 上药同捣烂，冲入开水适量，冷后洗患处，每日 1 次。

39.处方 韭菜根 3 两 新大麦糠 1 斤

用法 先用新大麦糠煎水熏洗患处，再将韭

葉根搗爛外擦，連用 2~3 天。

說明 以上 2 方適用於糞毒。

虫 积（腸蛔虫）

本病一般無症狀，兒童常有消化不良，面黃肌瘦，臍腹部疼痛，痛勢常突然發作，突然停止。蛔虫過多時，可形成團塊，造成腸梗阻，發生劇烈腹痛與嘔吐。有時蛔虫能鑽入膽道、闌尾、耳咽管、支氣管等處引起各種病症。有蛔虫病的患者，除腹痛外，常有鼻中搔癢，睡中磨牙，唇內有白色粟米樣斑點，均可幫助蛔虫病的診斷。

40. 處方 苦楝樹根皮（刮去紅皮）2 兩

用法 上藥煎湯 2 小碗，1 日 2 次分服，連服 2~3 日。

41. 處方 苡米根半斤

用法 上藥煎湯服，每日 1~2 次，連服 3 日。1 星期後檢查，如仍有蛔虫卵，續服數次。

蛔 厥（膽道蛔虫病）

患者上腹中部或右上腹突然發生陣發性往上“頂”或“鑽”樣的疼痛，有時可向右肩背部放射，伴有嘔吐，或吐出蛔虫，或吐黃綠水。初時陣痛

的间隙期很短，每次疼痛时间从数分钟至数小时不等；可以一日数发，或数日一发；疼痛剧烈时，患者常在床上翻滚弯腰，呼号叫喊，满头大汗，四肢厥冷。痛止后常疲倦欲睡。

42.处方 黑白丑各5分 槟榔3钱 大黄5分

用法 上药共研细末，1日3次分服。

43.处方 好醋1~2两

用法 燉温作1次服

说明 此方有缓解疼痛的作用。

阿米巴痢疾

本病发作一般比较缓慢，开始时仅有倦怠和食欲不振，很少发热，随后即有右下腹部疼痛，腹泻，每日少则数次，多则10余次；大便质稀，有时呈水样，粪质较多，混有果酱色的血和粘液，有特殊的肉类腐败臭味。便时有轻度的里急后重。如不及时给予适当的治疗，可达数年之久，时发时愈，时轻时重，故俗称休息痢。但也有极少数属于暴发型的，起病快，恶寒发热重，便泻次数多，腹痛剧烈，一般病况与急性细菌性痢疾类似，容易引起肠出血及肠穿孔的危

险。

44.处方 鸦旦子 50~60 粒 桂元肉若干个

用法 将鸦旦子去壳,不能将肉打碎,选白色饱满者(若黄色或细小者不用),每次用 7 粒,以桂元肉包好吞服,早晚各一次,空腹服下。

说明 如无桂元肉,以豆腐衣包,或以胶囊装均可。

45.处方 白头翁 5 钱

用法 上药煎 2 次,再将 2 次药液合并浓煎至 2 小碗,2~3 次分服,1 日服完。

46.处方 干石榴皮 2 两

用法 加水 1 碗,煎至半碗,过滤去渣,再煎 10~15 分钟,成人每服 2 匙,1 日 3 次,饭前服。儿童酌减。

说明 急性者连服 6 天为一疗程,慢性者需连服 2 周为一疗程。

血 吸 虫 病

本病的病原体是日本血吸虫。血吸虫的中间宿主是钉螺。因此,当人们和有钉螺的河水接触后,尾蚴侵入人体,从皮肤经过血管进入内脏而发病。尾蚴进入皮肤后,起初局部出现小

红点，并感觉奇痒。约 20~60 天后，可出现寒战、发热（可达 39~40℃）、头痛、咳嗽、四肢酸痛、食欲减退、恶心、呕吐、腹胀、泄泻或便秘等症状；亦有出现荨麻疹者。从而使患者体力不足，形体消瘦。若体温下降后，患者仍然消化不良，轻微腹泻或有痢疾样腹泻等则已转入慢性期。此时肝脏肿大明显，脾脏也逐渐肿大。如不及时治疗，迁延至数年之后，则为晚期病变，除有长期腹泻外，左下腹有肿块；又由于肝脏的肿大而至硬化，可引起肚腹胀大，青筋暴露，形成肝硬化腹水。严重时更可引起曲张的肝门静脉和食管下端静脉的破裂，出现呕血和便血，此时病况恶化，可能有死亡的危险。

47.处方 槟榔 苍耳草（全草）各 1 两 5 钱

用法 上药研细末，和匀，以水泛为丸，如桐子大，每服 5 钱，每日 3 次，饭前服。

说明 本方适用于腹胀痛、便脓血、肝脾肿大、消化不良者。

48.处方 乌柏叶（或根皮）2 钱 5 分 丹参 郁金各 3 钱 甘草 1 钱 5 分

用法 上药煎汤，上下午分服，1 日 1 剂。

说明 ①此方可作为治疗血吸虫病的主方，

贯串于治疗的始终,如一般病情不严重,单用乌柏叶亦有效。有其它兼症者,宜配合兼症治疗方剂,以提高疗效。

②凡血吸虫病患者体弱不能使用锑剂者,可用此方治疗,疗效较好。

49.处方 南瓜子 1 斤

用法 上药炒研细末,每服 8 钱,1 日服 3 次,连服 1 周。

说明 ①以上为成人量,若儿童体重在 20 公斤以下者减半。

②此方适用于急性期。

50.处方 雄猪肚 1 个 大蒜头 4 两

用法 先洗净猪肚,然后将蒜头纳入肚内,放砂锅中煮熟,空腹服汤。猪肚和大蒜分次吃掉。

说明 此方治血吸虫病腹水,可以连服数次。

51.处方 鸡内金(不落水,不去内容物) 1 个

用法 上药水酒各半同煎,去渣澄清,空腹服,每天 1 次,连服 7 天。

52.处方 大田螺 1 只 连须葱白头 3 个
食盐 1 匙

用法 先将田螺去壳,再与葱白、食盐同捣如泥,涂敷脐上,盖以纱布,以胶布固定。

说明 本方适用于血吸虫病腹水期,有通小便、消腹水作用。

丝虫病（乳糜尿、象皮肿）

本病是由丝虫寄生在人体后引起的。成虫寄生在淋巴管和淋巴结内。它在急性期的主症是：局部淋巴结特别是腹股沟、腹部和腋下淋巴结红肿疼痛,并有发热畏寒等全身症状。当转入慢性阶段,其主症是：小便混浊如乳白色,有时可有血尿,临床上称为乳糜尿。在吃高脂肪饮食及劳累后症状可以加重。还有下肢（一侧或双侧）的皮下组织增厚,皮肤表面粗糙坚硬,临床上称为象皮腿。此外,上肢、女性的乳房和阴唇、男子的阴囊等皮下组织,也都有增厚的可能。

53.处方 飞帘 白糖各4两

用法 上药以水2大碗、煎2小时,1日2次分服,连服3~5日。

说明 此方也适用于血淋、小便热痛及妇女白带。

54.处方 鲜车前草1两 鲜六月雪2两

用法 上药煎汤 2 小碗，每服 1 小碗，每日 2 次，连服 2~3 日。

以上 2 方适用于乳糜尿。

55.处方 核桃树叶 10 大片 鸡蛋 3 只

用法 上 2 药同煮，蛋熟后剥去壳再煮 2 小时，以鸡蛋色黑有苦味为度。每日早、中、晚各食鸡蛋 1 枚。另以蓖麻叶、白果树叶适量煎水熏洗患肢，每日 1 次。

说明 ①本方服后有轻度头晕，余无不适。

②连服 1 个月为一疗程。

上方适用于象皮肿。

内 科 疾 病

咳 嗽（支气管炎）

本病有急性慢性之分，共同特点是咳嗽。

急性的初起象感冒，怕冷、发热，头痛，鼻塞，喉痒、咳嗽吐白粘痰，渐渐黄稠如脓样，有时胸痛。

慢性的主要是持久咳嗽，早晚为甚，痰可为粘液样或脓样。冷天易引起急性发作。

56.处方 莱菔子 2 两 白糖 1 两

用法 先将莱菔子放锅内略炒，研末，和入白糖，少加适量开水，做成丸，如白果大，以纱布一层包裹。每次取一丸含口中，慢慢和津液咽下，每日含咽 2~3 丸。

又法 以白萝卜打汁，少加白糖饮之，每次半盅，每日 1~2 次。

57.处方 五味子 1 两 明矾 3 钱

用法 上药研末和匀，每服 1 钱，以猪肺煮熟，蘸药末食之，每日 2 次。

说明 此方适用于久咳不愈无外感症状者。

58.处方 生姜自然汁约 1 碗

用法 夏天用新棉花絮 2 两，浸泡于生姜汁中，待棉花絮全部湿透，置烈日下晒干，备用。冬时即将此棉花絮缝于内衣的背部穿着（此法宜在冬季应用，约用 1~2 个冬季）。

说明 此方适用于老年慢性支气管炎。

哮喘（支气管哮喘）

多在夜间突然发病，气息短促，呼吸困难，喉中有痰鸣声，病人常被迫坐起，张口抬肩，胸闷难受，若痰多者，咳吐大量痰涎后症状可暂时减轻。本病愈后又容易复发，尤其在冬季更易发

作，顽固的可拖延多年不能除根。

59.处方 蜒蚰 20~30 条 白茯苓 1 两 5 钱
麻黄 1 两

用法 先将前 2 药同捣烂，焙干研末，再以麻黄煎浓汁，拌和药末为丸，晒干，每服 5 分，每日 3 次，连服 7~10 日。

60.处方 癩蛤蟆 1 只 白胡椒 15 粒

用法 将胡椒放蛤蟆口中，黄泥封裹，放火中煨存性，剥去黄泥，研末，分作 2 包，每晚睡前服 1 包，连服 7~8 天。儿童用量须酌减。

61.处方 瓜蒌 1 个 明矾枣子大 1 块

用法 上药同放瓦上煨存性，研末。另以煮熟的白萝卜片蘸食，每日 2~3 次，2~3 日服完。

肺 痛（肺脓肿）

初起发寒、发热、咳嗽、胸痛气急，病情逐渐加重，则咳吐粘液和脓痰，有腥臭味，有时痰中带血或咯血。咳吐脓痰后，症状可见轻减，但吐脓痰往往不会马上停止，并有低热、出汗等症状，体重一天天减轻，遂进入慢性期。

62.处方 鲜大蓟根半斤 猪肺 1 个 陈芥菜卤适量

用法 大蓟与猪肺同煮,不放盐,弃药吃肺喝汤,每隔3~4天吃1个,连续吃2~3个。初服时脓痰增多,至脓痰很少或不吐时,继服陈芥菜卤,每次半酒杯,冲开水半碗,饭前服,每日服3次,连续服芥菜卤2~3斤。

说明 忌烟、酒、鱼类、辣椒。

63.处方 金荞麦根 2两

用法 上药煎汤2小碗,1日2次分服,连服数天。

64.处方 谷树根 1斤

用法 上药洗净,切成1~2寸,以水4斤,煎至3斤,去渣,分3次1天服完。一般服3~5剂见效。

说明 忌食麻辣等刺激性食物及臭卤100天。

65.处方 鲜鱼腥草(全草) 3~5棵

用法 上药洗净,煎汤内服,服时冲入陈芥菜卤1盅,1日2次,连服10~15天。

胃 痛 (慢性胃炎)

本病常发生于饮食失调的人,或长期食用有刺激性的调味品,如多量的胡椒、辣椒、芥菜等

香料；或长期的饮烈酒、浓茶、咖啡、过度的吸烟等；亦有长期服对胃有刺激的药物，如阿斯匹林，都能引起胃炎病症。胃炎没有典型的症状，一般表现如长期消化不良，食欲减退，饭后上腹饱满、暖气、恶心，甚至呕吐，上腹部钝痛；亦有疼痛很象溃疡病的，但溃疡病的疼痛可为食物和硷剂所缓解。

66.处方 生香附 2 钱 小桔子(未成熟的桔子) 1 钱 5 分

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服，每日 1 剂。

说明 本方适用于胃脘胀满，攻撑作痛，暖气频繁者。

67.处方 青木香 干姜各等份

用法 上药研末，温开水冲服，每次 1~2 钱，每日 2~3 次。

说明 本方亦可加水煎服，适用于受寒后胃脘疼痛。

68.处方 徐长卿根 1 钱 5 分

用法 上药研末，分 3 次温开水冲服（1 日量）。

说明 本方适用于胃寒痛。

69.处方 高良姜 1 钱 制香附 2 钱

用法 上药同研细末，分 3 次温开水送服
(1 日量)。

说明 本方适用于胃寒痛。

胃、十二指肠溃疡

上腹部有较长期疼痛(隐痛、胀痛或灼痛)，常在秋冬季节发作；疼痛具有节律性，与饮食有关。胃溃疡多在食后 1/2~2 小时后发生，持续 1~2 小时消失；十二指肠溃疡多在食后 2~4 小时后发生，持续至下次饮食时才消失。其它伴有恶心、呕吐、暖气、泛酸等症状，重症常并发上消化道出血或穿孔。

70.处方 白芨 仙鹤草 甘草 鸡蛋壳 各等份

用法 上药同研极细粉末，每次 1 钱 5 分，食前开水调服，每日 3 次。

说明 ①此方对制酸、止痛有一定效果。

②鸡蛋壳如不易收集，可改用蚌壳。

71.处方 鲜徐长卿根 5 钱 生姜 1 两 红枣 7 枚

用法 上药煎汤，汤与枣同食，每日 3 次。

72.处方 望江南子 1 斤 红糖半斤

用法 上药焙黄，研细末，加糖拌匀，每日 3 次，每次 2 钱，饭前服。

73.处方 乌贼骨 青木香各等分

用法 上药研细末，水泛为丸。每服 1 钱 5 分，每日 2 次，痛剧可日服 3~4 次，开水送下。

说明 此方暂服治胃痛吐酸、暖气胸闷较效，多服久服，易使大便秘结。

胆囊炎、胆石症

发病时右季肋部（即软肋部）和上腹中部持续性疼痛，一般逐渐加重，也可初起时就很剧烈。严重时常伴有发热、恶心、呕吐。有胆石阻塞胆道时，多突然发生阵发性绞痛，向右肩胛区放射，胆囊部触痛明显，局部肌肉紧张，有时可摸到肿大的胆囊。胆石症多发生在慢性胆囊炎。

74.处方 明矾 1 两 郁金 2 两 鱼脑石 1 两 芒硝 1 两

用法 上药共研细末，每次 1 钱，开水冲服，每日 3 次，连续服 10~15 日。

75.处方 明矾 1 分 菜油 1 匙

用法 上药于每晚睡前一并吞下。可长期服

食，无副作用。

肠 痛（急性阑尾炎）

起病常在脐四周或上腹中部，突然发生持续性疼痛，同时伴有恶心呕吐。数小时后，疼痛向右下腹转移，通常固定在阑尾部位（即脐至右髂前上棘划一直线，外 3 分之 1 处）有触痛和反跳痛。患者早期的体温、脉搏变化不大，如阑尾化脓则右下腹壁肌出现紧张，右大腿弯曲不喜伸直，体温和脉搏亦稍有升高和加快。

76. 处方 大蒜头 8 个 芒硝 3 两 大黄粉 1 两

用法 先将大蒜头、芒硝同捣烂成糊状，然后在右下腹压痛处用醋涂擦一遍，再将上药敷于压痛处，高约 3 分，敷药周围以纱布条围成一圈，略加固定，2 小时后将敷药除去，用冷开水洗净局部，再将大黄粉用酸醋调成糊状，敷于原压痛处，次日用水洗去。一次不愈，可如法再敷一次。

说明 ①敷大蒜、芒硝后，约 15 分钟患处疼痛加剧，势如火灼，周身汗出，20 分钟后，腹部肠鸣，不断放屁，持续 30 分钟，火灼感逐渐消

失。

②敷药前先以酸醋涂擦 1 遍，有防止发泡作用，如敷药后仍起泡，可用消毒针轻轻挑破，流出黄水。

③此方亦适用于流痰、关节炎、及尿潴留。

77.处方 厚朴 3 钱 大黄 4 钱 蒲公英 1 两
红藤 2 两

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服，连服 2~3 天。

脱 肛

本病常见于老人、小儿、或妇女产后，临床表现为大便后肛门脱出，初期可自动缩入，以后每次都须用手将其推入肛门内。病者常有肛门部胀坠及排便未净的感觉。严重时，每遇咳嗽，打喷嚏都可能引起脱肛。

78.处方 五倍子 1 两

用法 先用瓦松、鸡冠花不拘多少，宽水煎汤，熏洗坐浴后，以五倍子末用麻油调涂患处。

又法 用五倍子 3 钱 明矾 7 钱，煎汤熏洗。

79.处方 甲鱼(鳖)头

用法 将上药炙灰研细末，用棉花蘸扑患处。

80. 处方 大蜘蛛 3 只 冰片 3 分

用法 将蜘蛛放瓦上焙(存性),研细末,再加冰片研匀,掺肛门上。

81. 处方 蝉衣 7 只 冰片 5 分

用法 将上药共研细末,以麻油调敷,每日 1 次。

82. 处方 生蒲黄 5 钱

用法 上药用熟猪油调成软膏,外涂患处,每日 2~3 次。

说明 本方适用于肛门脱出有炎性水肿者。

83. 处方 槐花 枳壳各 3 钱

用法 上药煎汤 2 小碗,分 2 次饭前 1 小时服,连服 2~3 剂。

84. 处方 木耳 5 钱 大肠头 1 具

用法 加水煮烂食之,可连服几次。

说明 有便溏、下痢的患者,不适用本方。

水 肿 (急、慢性肾炎)

水肿有急性和慢性两种,典型病例多发于儿童及青年。初起时眼睑浮肿,晨起更为明显,以后逐渐波及面部、阴囊、足部,甚至全身水肿,小便量少,有时呈棕褐色(血尿)。常伴有发热、食

欲不振、恶心、呕吐、头痛、腰痛等症状。多数患者血压增高，严重的可出现呼吸困难、神昏乱语、抽搐、昏迷等心力衰竭和脑部循环障碍的危象。

本病如在急性期治疗未能彻底，则转为慢性水肿。肿势和贫血现象以及血压升高等更为明显；此外可兼见眩晕、厌食、疲乏、消瘦、皮肤苍白、多尿、夜尿、衄血、气促等。晚期患者，常因肾功能衰竭而产生尿毒症。

85.处方 鲜荔枝草(全草)1两5钱~2两

用法 上药捣烂取汁冲服，儿童可加糖适量。亦可加鲜车前草1两代茶。

说明 在治疗期间应卧床休息，绝对忌盐。

86.处方 西瓜皮全皮晒干2两 鲜白茅根1两2钱(去心)

用法 上药煎汤分3次服，1日服完。

87.处方 鲜紫背浮萍5钱 鲜车前草1两 鲜生姜皮1钱

用法 上药煎汤2小碗，分2次服，每日1剂，连服2~3日。

88.处方 大戟根2钱

用法 上药洗净，在水中括去皮，晒干，烤脆，

醋淬 1 次，再烤干（如烤焦则失效），研细粉，放入 1 碗姜汤中，清晨空腹时服。

说明 ①服药后 3~4 小时即有腹泻，如次数多，吃 1 碗糯米粥后泻即停止。

②服药后忌盐。

89. 处方 鲜鸢尾根

用法 上药括去皮，切碎，每次取半酒杯（约 1 钱），用甜酒吞服，每日 1 次。

说明 ①服药后有腹泻现象，虚弱体质慎用。

②服药后忌盐。

90. 处方 鲜毛茛 5 棵 鲜车前草 3 棵

用法 上药同捣烂，取如蚕豆大两块，敷两手“内关”穴，起泡即去掉。可连敷 3 次，每次间隔时间以创口平复为准。

说明 饮食须忌盐 3 个月。

以上数方俱适用于水肿病在急性期。

91. 处方 赤豆 薏仁各 2 两 红枣 10 枚
若在冬季加花生米 2 两

用法 以上 3 味或 4 味煮粥，可分 2 次服食。服 5~7 天后，小便开始增多，渐渐退肿，仍须继续服用。

92. 处方 乌鱼（约 1 斤重）1 条 大蒜 7 个

用法 将乌鱼去鳞片、肠杂后，入大蒜于鱼腹，用白酒和水煮食。隔3~4日再服1次，连服3次。

93.处方 河白草根4钱 鸡内金(炙)1钱
松香4分

用法 将河白草根洗净晒干研粉，鸡金、松香分别研细，再混合研匀。上药为1日量，以冷开水调，分2次服下。病重者须连服半月，轻者服1星期。

说明 ①调服必须用冷开水，若用热水腥臭难服。

②在服药期间忌食鲜肉、鱼、蛋及海味。皮蛋可食，食盐不忌。

以上3方对慢性肾炎有一定疗效，可根据病情，选择使用。

急性肾盂肾炎

本病患者以妇女为多数。发病比较突然，初起时常有恶寒、发热(热度高的可达40℃)、出汗、头痛等症状；局部症状则为腰痛、尿频、尿急，甚则排尿刺痛不爽。因其在发病过程中容易影响肠胃，所以常会引起恶心、呕吐、腹胀、

便泄等症状。

94.处方 鸭跖草 白毛藤 车前草 金银花各1两 生甘草3钱

用法 上药煎汤2小碗，1日2次分服，每日1剂，连服3天。

95.处方 柴胡3钱 黄芩3钱 车前草 紫花地丁各1两

用法 上药煎汤，1日2次分服，每日1剂。

石 淋（膀胱结石）

多见于儿童和老年，女性极少。症状有轻有重，主要为排尿疼痛，并常向会阴或阴茎头部放射。典型症状为排尿突然中断，伴有剧烈疼痛，有时出现“终末性”血尿。排尿疼痛和血尿常在劳累后加重。

96.处方 鲜荔枝草（根或全草）1~2两 糯米粉适量

用法 荔枝草煎汤1碗，以半碗拌入糯米粉做成元宵，另半碗汤煮元宵，一起服下。

说明 根的药力较全草大。

97.处方 石韦 车前子各5钱 海金沙4钱

用法 上药(车前子、海金沙用布包)煎汤, 1日2次分服。

98. 处方 玉蜀黍须及根、叶 3~5 两

用法 上药煎汤内服, 每日1剂。

99. 处方 鲜葶草汁

用法 将葶草离地面1尺许处剪断, 以洁净玻璃瓶承之, 使其汁从断处流入瓶内。每服1~2小杯, 每日2次。

小便不通(尿潴留)

患者有强烈尿意, 但不能排出或仅排出点滴尿液。下腹胀痛不安。检查时, 发现患者下腹中部隆起, 膀胱充盈, 并有压痛。

100. 处方 灯心草1~2钱 陈葵花秸心1~2两

用法 上药同放瓦上焙成焦炭研末, 分3次, 开水冲服, 1日内服完。

101. 处方 鲜葱白 麦麸各等分

用法 先将葱白捣烂, 后与麦麸同炒热, 用布包好, 放下腹部乘热温熨, 冷则炒热再熨。

102. 处方 大田螺5只

用法 上药捣烂如泥, 敷脐下2寸处, 纱布固

定。

说明 本方适用于热性病或肾脏病引起的小便不通。

痹 症（风湿痛、关节炎）

肢体关节酸痛，或游走窜痛，或痛有定处，或痛如锥刺，或酸重麻木。痛处大多喜温怕凉，但也有局部红肿疼痛，喜凉怕热的。一般于感受潮湿、寒冷以及气候急剧变化时病势往往加剧，严重时关节肿大，反复发作，影响肢体、关节运动功能，甚至关节变形而失去行动能力。

103.处方 鲜庵菹子叶 10 片

用法 上药煎汤 1 碗，每日服 1 次，连服 10 日。服药后略感咽喉干燥，身有微汗。

又法 干庵菹子茎叶 8 两，白酒 2 斤浸泡 1 周，根据酒量大小，每日饮 2 次。

又法 鲜（或干）庵菹子全草，煎水熏洗患处，1 日 1 次。

104.处方 寻骨风根 4 两 白酒 1 斤

用法 上药洗净切片晒干，浸入酒内 3~5 天。根据酒量大小，每日饮 2~3 次。不能饮酒的，可用寻骨风根 5 钱~1 两煎汤内服。

105.处方 虎杖根 3~5 两 白酒 1 斤

用法 上药洗净切片晒干,浸入酒内 1 周,每晚睡觉前饮药酒 1 杯,量大可稍多饮,连服 1 个月。

106.处方 鲜茜草根 4 两 白酒 1 斤

用法 将茜草根洗净捣烂,浸入酒内 1 周,取酒燉温,空腹饮。第 1 次要饮到 8 成醉,然后睡觉复被取汗,每天饮 1 次。

说明 ①第 2 次服药后,疼痛可能加重,但到第 3 次服后即有所好转。

②服药后 7 天不能下水。

107.处方 乌菟莓 红花各 2 两 白酒 2 斤

用法 上药浸酒内 1 周。每日饮 2 次,每次 1~2 酒杯。

108.处方 菝葜根 地榆根各 2 两 青木香 3 两 白酒 2 斤

用法 上药放酒内浸泡 1 周。每晚饮 1~2 杯。

109.处方 锦鸡儿 3 两 羊蹄 1 两 青木香 5 钱 地鳖虫 2 钱 白酒 2 斤

用法 将前 4 药浸酒内 1 周,每服 1~2 杯。

110.处方 蜈蚣 5 分~1 钱 5 分 全蝎 5 分~1 钱

透骨草 乌贼骨各 3 钱

用法 上药煎汤，1 日 2 次分服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。

说明 加乌梢蛇 3 钱则疗效更好。

111. 处方 鲜毛茛(全草)适量 面粉 1 撮
醋 1 两

用法 先将毛茛捶烂，后加面粉和醋同捣敷痛的关节处，约 15~30 分钟，如时间过长，皮肤会起泡，最多敷 3~5 次。

偏 正 头 痛

本病系指反复发作性的头痛，往往因吹风受凉或精神刺激而发病。发作时或痛偏一侧，或满头皆痛，甚则痛连颈项。患者大多畏光怕烦，喜以头巾裹头和闭目静卧，痛剧时脸色苍白，恶心呕吐。

112. 处方 全蝎适量

用法 上药研末，以少许放在 1 小块胶布上，贴患侧太阳穴(满头痛贴两侧)，隔 3 天换药 1 次，痊愈为止。

113. 处方 制川乌 制草乌 生甘草各 1 钱
白芷 白僵蚕各 3 钱

用法 上药同研为细末，每服 1 钱，每日 3 次，连服 2~3 日。

说明 如缺少白僵蚕，亦无妨。

口眼歪斜（面神经麻痹）

患者多数于早晨洗面漱口时突然感觉一侧眼睑不能闭合，流泪，鼻唇沟浅平，前额皱纹消失，面肌松弛，口角低下，并向对侧歪斜，说话“漏风”，流口水，进食咀嚼时，食物常留滞于病侧齿颊内。

114. 处方 山葡萄根 大蓟根各 5 钱

用法 上药加醋适量同捣烂，敷患侧面颊部（口向右歪敷左颊，口向左歪敷右颊）。

115. 处方 煅石膏 1~2 钱 蜂蜜适量

用法 将煅石膏研成细粉，和入蜂蜜调成薄糊状，随调随用，用时以火柴棒蘸药点内、外眼角，每日点 3~4 次，直至病愈。

说明 ①嘴右歪点左眼，左歪点右眼。

②起病三、四十天者，点 1~2 星期即愈；30~40 天以外者，点治时间须较长。

妇产科疾病

月经不调

健康妇女的月经，一般 28 天左右来潮 1 次，每次 3~5 天干净，颜色鲜红，数量 50~100 毫升，这是月经正常的现象。若经期超前 7 天以上的称为月经先期；经期落后 7 天以上的叫做月经后期；或先或后没有定期，而前后差错也都在 7 天以上的叫做月经先后无定期，或称做经期紊乱；以上情况连续 2 月以上，兼有其它病态的，都可叫月经不调。

对月经不调的诊治，除了注意经期的改变外，还要注意月经色、质、量的改变，从而区别寒、热、虚、实的情况。

116. 处方 丹参 3 钱

用法 上药加水煎服，亦可研末以黄酒冲服，每日 1 次，行经期停药 10 天。

说明 本方适用于经行先后无定期。

117. 处方 香附 8 两

用法 上药研为细末，醋调为丸，晒干，空腹服，每次 3 钱，陈酒送下。

说明 本方适用于月经先后无定期，行而不多，伴有少腹胀痛，胸脘痞闷者。

118.处方 月季花 3 钱 红糖 2 两

用法 上药煎汤，去渣，加陈酒 1 小碗冲服。

说明 本方适用经行先后无定期。

痛 经

痛经是妇女常见的月经病。一般在经前 2~3 天，小腹胀痛，亦有经行时疼痛，亦有至月经干净后才停止疼痛。疼痛的程度不一，有的隐隐作痛，喜温喜按；有的疼痛剧烈，按之痛甚。经色紫黯，夹有血块，量少，经行不畅，同时还伴有腰腿酸痛等症状。

119.处方 鲜石打穿 2~4 两 红糖 适量

用法 月经前以上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服，连服 3~5 日。

120.处方 艾叶 醋制香附各 5 钱

用法 上药煎汤，煮沸后加好醋 1 小碗，再煎片刻，1~2 次温服（最好在月经前后服药）。

121.处方 香附 益母草各 1 两

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服。

122.处方 小茴香 2 钱 生姜 1~2 钱

用法 上药煎汤 2 小碗，早晚 2 次分服，连服 3~4 天。

说明 此方适用于寒气阻滞所引起的痛经。

123.处方 泽兰 3 钱 艾叶 2 钱 红糖 1 两

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服。

说明 此方适用于少腹绞痛有冷感，喜暖拒按，经来量少，色黯红有块者。

124.处方 红花 红糖各 2 钱

用法 上药煎汤，以陈酒冲服。

说明 此方适用于血瘀所引起的痛经。

125.处方 山楂炭 红糖各 1 两 向日葵子 5 钱

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服。

说明 本方适用于血瘀所引起的痛经。

126.处方 桔皮 香附各 3 钱 生姜 1 钱 5 分

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服。

说明 本方适用于气滞所引起的痛经。

经 闭

本病常见的有血虚经闭，血滞经闭。血虚经闭是由于血分不足，如水无源而不流，故病者

贫血症状比较显著，如面色萎黄或苍白无泽，头晕眼花，心跳气短等；血滞经闭的病者，血瘀症状比较多见，如面色青黄，胸胁或小腹部胀痛拒按，舌质黯红或有紫斑等。

127.处方 鲜益母草 3 斤(干者 2 斤)

用法 上药浓煎 2~3 次，去渣，用纱布过滤，加红糖 3 斤，浓缩成薄膏，贮磁缸中。每日 2 次，每次 3 钱，开水化服。

说明 如腹痛者加香附 2 两，血虚加当归 2 两，丹参 1 两。

128.处方 红花 1 钱 枸杞子 5 钱

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日分 2 次服，连续服之。

说明 本方适用于血虚经闭。

129.处方 麝香 2 钱

用法 上药研末，1 日 2 次分服，开水或陈酒送下。如大便燥结，可加桃仁 3~4 钱。

说明 本方适用于瘀血阻滞而引起的经闭。

130.处方 马鞭草根 1 两

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服，每日 1 剂。

说明 本方适用于血瘀阻滞引起的经闭。

倒 经

在月经来潮的前 1~2 天,或正值行经时出现吐血或衄血(甚或有眼耳出血的),连续 2~3 个月的叫倒经。有倒经病的妇女,月经的量一般较少,甚或没有月经。

131.处方 生栀子 3 钱 生藕节 5 钱 鲜卷柏 7 钱

用法 上药煎汤 2 小碗, 1 日 2 次分服。

132.处方 茜草根 王不留行各 3 钱

用法 上药煎汤内服,每日 1 剂,可连服 5 剂。

崩漏(功能性子宫出血、产后流血)

崩和漏都是子宫不规则的出血现象。凡月经过多,或因流产,或产后出血来势急、血量多者叫做崩;来势缓,但断断续续,或淋漓不断长达数周之久者叫做漏。也有先崩后漏,或先漏后崩,反复发作的。由于出血过多,患者常出现头晕、心悸、肢体乏力、面色苍白或萎黄等贫血现象。

133.处方 瞿麦根 1 两 红糖适量

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服，连服 3~5 日。

说明 此方适用于功能性子宫出血。

134.处方 香附子 5 钱 莲房 1 两

用法 上药共焙焦，研细末，每日早晚各服 2 钱。

说明 此方适用于产后出血过多。

135.处方 鲜苍耳全草 2 两 红糖少许

用法 上药煎汤 2 小碗，加入红糖，1 日 2 次分服，连服 3~5 天。

说明 此方亦适用于因刮宫、流产或产后出血淋漓不断的患者。服时避风，忌食猪肉。

136.处方 陈棕 晚蚕沙各半斤

用法 上药煨，存性，同研细末，每服 3~4 钱，1 日 3 次。

说明 ①单用蚕沙煨炭亦有效，每服 5 钱，1 日 3 次。

②如无蚕沙，单用陈棕炭亦可，每服 2~3 钱，1 日 3 次。

137.处方 贯众 5 钱

用法 上药加水煎服；亦可炒炭存性，研末服，每日 3 次，每次 2 钱，温开水送服。

138.处方 金樱子根 2 两 仙鹤草 1 两

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服。

139.处方 藕节 3~4 个 侧柏叶 5 钱~1 两 陈棕 1 两

用法 以上 3 药炒焦，煎汤，加红糖适量温服，每日 1 剂。

140.处方 地锦草 3 钱

用法 上药阴干研末，1 日 2 次分服，陈酒调下。

赤 白 带 下

阴道经常有白色或淡黄色粘液，连绵不断，或夹有块状、片状物，或腥臭难闻。患者每伴有面色㿠白，腰酸头晕，四肢不温，精神疲倦，饮食减少等症状。

141.处方 鲜凤尾草 3 棵 猪肉半斤

用法 上药用水同煮（不放姜、葱、酒，可少放一点盐），汤及肉 1 日吃完，连服 4 天。

142.处方 鲜山葡萄根 1~2 斤 红糖半斤

用法 将葡萄根洗净切碎，加水 1 面盆，浓煎成 3 碗，加入红糖，分 2 天服完。

143.处方 鸡冠花 2 两

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日分 2 次服，连服 5~7 日。

144. 处方 飞帘 7~8 棵 猪蹄子 1 只(约 1 斤)

用法 上药同煨汤服，连服数次。

145. 处方 大蓟根 2~3 两 白糖 3 两

用法 上药同煎汤，煎至根烂汤变红色时，去药渣喝汤，每日 1 次，连服 3~4 日。

146. 处方 生白果肉 7 个(去心)

用法 上药打烂，用沸透豆浆冲服，每日清晨 1 次。

147. 处方 白扁豆花 白鸡冠花各 3 钱

用法 上药煎汤内服，每日 1 剂。亦可用白扁豆略炒黄研末，每日清晨服 5 钱，米汤送下。

148. 处方 六月雪根半斤

用法 上药用鸡或瘦猪肉同煎，加黄酒 2~4 两，煎熟后去药渣，吃汤及肉。

149. 处方 墓头回 3 两

用法 上药研末，炼蜜为丸，每服 1 钱 5 分，每日 2 次。

150. 处方 臭椿树根皮 2 两 棉花子 5 钱

用法 上药煎汤，加砂糖适量服。

151.处方 海螵蛸 1 两 女贞子 5 钱

用法 上药同研细末，每服 2~3 钱，每日 3 次。

妊 娠 呕 吐

妊娠呕吐又名恶阻。主症是恶心、呕吐，食后即吐，甚者饮水亦吐，头晕体倦。因饮食不下，故使人形体消瘦，严重的可影响胎儿的发育。

152.处方 灶心土 1 两 半夏(制) 1 钱 生姜 3 片

用法 灶心土加水先煎，待澄清，取上层清液代水，煎半夏、生姜，频频饮之。

说明 无灶心土可用黄泥罐代之，用法将黄泥罐碎片置火中烧红，立即放在 1 碗清水中淬，连续几次，然后用此水煎药。

153.处方 糯米半斤 生姜 2 两

用法 先将生姜捣烂取汁，拌入米中，置锅中炒至糯米熟透爆裂取出，随意嚼吃。

154.处方 文旦壳 3 钱

用法 将文旦壳削去外层黄皮，切细晒干，加冰糖适量，用开水泡，代茶饮之。

先兆流产

妊娠早期，下腹部有阵发性坠痛的感觉，或有腰酸，或阴道出现少量流血（不超过平时月经量）。

155.处方 陈棕炭 1 两 鲜苧麻根 2 两

用法 上药同煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服，连服 2~3 日。

又法 以鲜苧麻根 2~3 两，洗净，与糯米煮粥食，连食 1~2 次。

156.处方 莲房

用法 上药炒炭存性研末，每日 2 次，每次服 3 钱。

说明 本方亦可用于妇女崩漏。

157.处方 菟丝子 桑寄生各 5 钱

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服。

158.处方 老南瓜蒂 3~5 个

用法 上药加水煎汤代茶。

产后腹痛

产后腹痛主要是产妇分娩后小腹疼痛，亦名“儿枕痛”。本病有虚、有实，虚者痛势隐隐，腹

部柔软，痛时喜按；实者病势比较厉害，按之疼痛更甚，大多由于产后瘀结不下，故疼痛拒按，甚或痛处有块。

159. 处方 鲜益母草 1 两（干用 5 钱）

用法 上药用瘦猪肉适量同煨汤，加白酒少许和服。

说明 本方适用于属虚的产后腹痛。

160. 处方 生蒲黄 五灵脂等分

用法 上药研末，每次 3 钱，每日 1~2 次，温开水调服。

说明 本方适用于产后瘀血内积，恶露不多，小腹剧痛，有坚硬块，按之痛甚者。

乳 汁 不 下

产后乳汁甚少或完全无乳，均称乳汁不下。有属气血虚弱者，乳房无胀痛感，面色比较萎黄，精力较差；有属肝气郁结者，乳房胀满而痛，甚或发热，精神郁闷。在治疗上虚者以补为主，肝气郁结者以通为主。

161. 处方 金针菜花 1 两 黄豆 4 两 猪蹄 2 只

用法 上药同煨汤服，连服 3 天。

162.处方 梗通2钱 丝瓜络 4 钱 猪蹄2只

用法 先将猪蹄煨浓汤,以汤煎药,去药渣 1
日 2 次分服。

163.处方 地锦草 1~2 两 鲜鲫鱼 1 条

用法 上药同煨汤服。

164.处方 木通 2 钱 王不留行 3 钱

用法 先用猪前蹄 2 只,煮浓汤,以汤代水煎
上药,1 日 2 次分服。

165.处方 老莴苣(结子的尤佳) 1 棵

用法 上药切细煎汤,1 日 2 次分服。

阴 道 滴 虫 病

本病阴道搔痒,白带增多,呈淡黄色泡沫状,
有腥臭气。如白带过多,长期不愈,可引起头
晕、腰酸、四肢乏力等症状。

166.处方 藁头回 1 两 黄柏 蛇床子 刺
果甘草各 3 钱

用法 上药煎汤熏洗阴道,每晚 1 次,连续
3~5 次。

167.处方 蛇床子 5 钱 花椒 2 钱 苦参
明矾各 3 钱

用法 上药宽水煎汤,乘热熏洗坐浴,每日

2~3次,连续6~7天。

168.处方 蛇床子 密陀僧各5钱 大枫子
枯矾各3钱

用法 上药同煎汤,洗涤阴道。

169.处方 蛇床子 苦参 黄柏各3钱

用法 上药宽水煎汤,乘热熏洗坐浴,每日
2~3次,连续6~7天。

170.处方 桃树嫩叶头适量(或加雄黄末
1钱)

用法 上药捣烂,绞取自然汁,以消毒脱脂棉
浸透,外加纱布一层,裹成条状,用线扎好,一端
留线,临睡时塞入阴道,次晨取出,连用3次。

儿 科 疾 病

小儿泄泻(小儿消化不良)

患儿有轻度腹泻,每昼夜约数次至十数次,粪
便多为蛋花样黄绿色,夹有少量粘液和白色乳
块,并有轻度呕吐、肠鸣和腹痛,不发热,或有低
热。

171.处方 鲜鬼针草1把

用法 上药煎取浓汁约半面盆,连渣熏洗足

部，每日 3~4 次，重症每日 5~6 次，连续熏洗 2~3 日。1~5 岁的患儿，熏洗脚心，6 岁以上者熏洗至脚面；病重者熏洗部位可适当提高。

172. 处方 鲜鸭跖草 2 两(干者 1 两)

用法 上药煎汤内服，每日 2 次，连服 2~3 日。

说明 此方适用于热性腹泻。

173. 处方 鲜芥菜花 3~5 钱

用法 上药煎汤服，每日 2 次，连服 2~3 日。

174. 处方 陈粳米 1 斤

用法 将米炒焦，1 斤分数次煮粥吃。

175. 处方 鸡内金 焦麦芽各 5 钱 红糖 3 钱

用法 先将前 2 味同研细末，加入红糖和匀，每次服 1~2 钱，1 日 2~3 次，饭前 1 小时服。

说明 如胃寒呕吐者，可用灶心土 1~2 两煎汤送服。

176. 处方 生姜 连根葱等分 东丹少许

用法 先将姜葱捣烂挤去汁，再将东丹拌入，以色红为度，敷贴脐部，以纱布包扎固定。

说明 本方适用于泄泻见青绿色粪便者。

吐 乳

吐乳，是指婴儿吮乳后，乳汁又复吐出，或吮乳时乳汁从口角溢出者。

此症的形成，有的是由于小儿脾胃薄弱；亦有的属于哺乳方法不当而引起的。若属后者，只要纠正哺乳方法即能自愈。

177. 处方 生姜 5 分～1 钱 灶心土 3 钱

用法 上药煎汤，频频喂服。

178. 处方 白蔻仁 砂仁各 7 粒 炙甘草 1 钱

用法 上药同研细末，以少许喂入口中，任其咽下，1 日多次。

疳 积（小儿营养不良）

本病大多由断乳后饮食不调，或由吐泻不止而引起的。主要表现为精神萎靡，形体日渐消瘦，经常吵闹，睡眠不好，饮食不香，或喜吃香东西。病情进一步发展时，患儿极度消瘦，皮肤干燥，肚腹膨胀，面色萎黄，两眼凹陷，额上有皱纹，头发枯黄稀少，面似老人貌，有时腹泻，有时又见大便秘结，也可发生浮肿。

179. 处方 鲜仙鹤草根 1~2 两 鸡蛋 3 枚

用法 将鸡蛋与仙鹤草根同煮,蛋熟后去壳,用刀在蛋上划痕数条,再放入同煮,以鸡蛋变为灰黑色为度,去渣,食蛋,按岁数计算,每岁每日食蛋 1 枚,但最多不要超过 3 枚,汤也可服,服时少加些砂糖。

180. 处方 螳螂

用法 以麻油或菜油熬滚,将螳螂放入炸脆,取出,糖拌食之;每次 3~5 只,可连食数次。

说明 此物香甜可口,小儿乐于服食,无不良反应。

181. 处方 鸡内金 3 钱 山楂 2 两

用法 上药同研细末,每次 5 分~1 钱,开水调服,每日 2 次。

182. 处方 蟾蜍 1 只

用法 上药去内脏,焙焦研末,每次 5 分~1 钱,加白糖适量,温开水冲服,每日 1~2 次。

遗 尿

遗尿是指睡中小便自遗,醒后方觉,故又称“尿床”。但一定要在 3~4 周岁以后,尚不能自主排尿,且每夜如此,方属遗尿病态。本病一般

到成年发育后,可以逐渐自愈,但亦有少数在发育期以后仍然不愈者。

183.处方 桑螵蛸(螳螂子)50个

用法 将上药稍蘸食油焙黄研末。5岁以内每次服4~5只,每日早晚各服1次,连服1周。

说明 如患病时间长的,剂量可以适当增加,并可结合针灸治疗。

184.处方 刺蝟皮2两 益智仁1两

用法 先将刺蝟皮烘脆,再与益智仁同研细末,水泛为丸如赤豆大,每服1~3钱,每日早晚各服1次。

185.处方 白果3~5个

用法 将白果用湿纸包裹,放在炉子上煨熟,于临睡前嚼食。

说明 白果有微毒,不宜过量。

186.处方 花生米4两

用法 先将花生煮汤,再用此汤煮糯米饭吃,同花生一起服亦可。

187.处方 石硫磺1两5钱 大葱根7枚

用法 上药同打烂,敷于脐部,油纸覆盖,纱布固定,每晚睡前敷1次,第2天早晨取下,4次为一疗程。

惊 风（小儿惊厥）

惊风分急慢两种。它是个症候，大多是由其它病发病后而引起的。

急惊风来势急暴，但在发作之前，常有发热，呕吐，烦躁不安，睡中惊惕，或摇头、弄舌等前驱症状；急惊风发作时，则神志昏迷，两目凝视，咬牙齟齿，甚则牙关紧闭，弓角反张，四肢抽搐。

慢惊风往往由于长期吐泻，失于及时治疗；或因发高热时服寒凉苦味药物太多，损伤了脾胃阳气而成。它的症状有抽风、昏迷和急惊类似（但没有急惊风那样剧烈），兼有神疲嗜睡，面色㿔白萎黄，体温低下，四肢厥冷，呼吸微弱，囟门凹陷等虚弱症象。

188.处方 望江南 2 钱

用法 上药煎汤内服，每日 3 次，连服 2~3 天。

说明 本方适用于急惊风。

189.处方 牡荆子 3~4 钱

用法 上药煎汤，分多次内服。

说明 本方适用于急惊风。

190.处方 鲜水菖蒲根适量

用法 上药捣烂取汁 2~3 小匙，加姜汁少许，分 2~3 次灌服。

说明 本方适用于急惊风。

191.处方 鲜仙人掌 3~5 钱

用法 将上药去毛洗净，捣烂取汁，开水冲，频频喂之。

说明 本方适用于急惊风。

外科疾病

瘰 疔（颈淋巴结核）

瘰疔（俗名老鼠疮）好发于颈部及耳后。初起如豆，一枚或数枚不等，不治可逐渐增多、增大，皮色不变，不痛不热，按之坚实，尚能活动。继则结核可与皮肤粘连，推之不动，渐觉疼痛，皮色转暗红，皮肤微热，倘按之有波动感则已经成脓。溃后脓水清稀，挟有败絮状物，不易收口，往往形成瘻管。

192.处方 鲜泽漆全草 5~10 斤

用法 先在砂锅内放些水煮沸，然后将泽漆分批放入煎熬，待出汁后捞去药渣，再放入未熬

的泽漆，如此陆续熬完后，浓缩成膏。用时将此膏摊在纱布上贴患处，每日换药1次。不论已溃未溃皆可用。

193. 处方 猪胆1个 醋4两

用法 上药同放砂锅内熬稠成膏，以纱布摊贴患处，已溃的先将脓水洗净，再以药膏涂敷，每日换药1次。

194. 处方 蜘蛛5只 全蝎2只 核桃壳1~2个

用法 将蜘蛛、全蝎放于核桃壳内，湿纸包裹；用线扎好，火煨存性，研细末，分3次，以黄酒送服，每日1次。

195. 处方 干葎草3~5钱

用法 上药煎汤服，每日2次。或研细末，每服1钱，每日3次，开水送服。

说明 此方对骨结核亦有效果。

疔 疮

本病初起，局部有粟米样小疱，坚硬肿痛，或不痛而发麻作痒，根脚较深，好发于颜面、手足等处。发病迅速而严重，随着患部肿痛的逐渐增剧而出现恶寒、发热、口渴等全身症状。5~7

天后如溃出脓栓(俗称疔头), 肿消痛减热退的是顺症; 患处顶陷黑色无脓而肿剧、热盛、烦躁、神昏的是“走黄”逆症。本病治疗愈早愈好, 但不能过早开刀。

196. 处方 冰片 雄黄各少许(研末) 飞帘 1 棵(捣汁) 甘草 5 钱 苍耳虫若干条

用法 先将甘草用开水泡汁约 1 两, 后与上药同放入菜油内浸泡, 1~2 天后即可应用。用时将浸在油内的苍耳虫取出 1 条, 以虫嘴对准疔头, 用布或纸固定, 一般 2~3 天内好转或痊愈。

说明 ①此方对各种疔疮, 不论已溃未溃均效。

②苍耳虫生长在苍耳草的茎节中, 在旧历秋分节后寒露节前一段时间内才能找到。

③苍耳虫浸泡在菜油内的时间越长越好。

197. 处方 鲜紫花地丁 4 两 鲜半夏 1 两

用法 上药同捣烂, 加蜜(或鸡蛋清)适量调和。先以冷盐开水洗净疮面, 将药涂敷, 每日换药 1 次。敷药后首先止痛, 肿块逐渐消散或出脓。如伴有发热者, 加用以下内服药: 蒲公英 1 两, 忍冬藤 1 两煎汤, 日服 2 次。

说明 ①上药如无鲜者，干的亦可，用量酌减，但制半夏无效，须用干生半夏。

②又方以鲜半边莲代鲜紫花地丁。

198.处方 鲜白毛藤叶 适量

用法 将叶揉烂加盐外敷。

说明 此方对未溃脓者疗效较好。

199.处方 蜒蚰 1~2 条 明矾 2 钱

用法 上药同捣烂敷患处，日换 2 次。

说明 此方在疔疮初起时效果较显，已经化脓的能消肿止痛。

200.处方 醋 1 酒杯

用法 先将醋燉热（不烫手），后将患指放入醋内浸泡 10 分钟，每日浸泡 8~10 次，一般 1~2 天可愈，已化脓的无效。

搭 背

本病为背部化脓性疾患，中年以上的人发病率较高。局部高肿，红热胀痛，逐渐向四周扩大，肿块上初起有 1 脓头，以后可多至数十个，形如蜂窝，组织坏死，创面大小不等。严重者伴有怕冷，发热，头痛，疲乏，食欲不振等全身症状。

201.处方 陈小粉（即小麦淀粉）

用法 上药放锅内文火炒至深黄色，(此时会翻泡)取出，隔纸摊地上冷1时左右，研为极细末备用。患处红肿者，以冷茶或冷开水调敷，如少加些大黄粉，则效果更好。患处漫肿而皮色不变者，以酸醋调敷，如少加些姜末则效果更好。未化脓者敷肿痛处，已化脓者敷四周，中间留1小孔，以便出脓。

202.处方 鲜佛甲草4两 面粉适量

用法 将鲜佛甲草捣烂绞取汁，加入面粉适量，调成糊状，涂敷患处，每日1次。如已化脓，中间留1小孔，以出毒气。

说明 ①此方亦适用于对口、乳痈、疔腮、流注等其它外科疾患。

②冬季无鲜草，在夏天收集，洗净捣烂，加凡士林及苯甲酸各适量，制成软膏备用。

203.处方 鲜荔枝草4两 鸡蛋清适量

用法 上药同捣烂敷患处(先将疮口洗净，然后敷药)轻症每日换药1次，重症每日换药2~3次。

说明 ①民间经验，先以红辣椒(剖开去种子)贴患处，不痛者是搭背，痛者不是。

②此方对搭背未溃者疗效较好。

204.处方 生天南星 五倍子各 5 钱 白蜜 2 两

用法 南星、五倍子同研细末，白蜜放锅内加热溶化，再将药末用冷开水少许调匀，倒入蜜中，略熬片刻，边熬边搅动，至药蜜充分融合后取起，冷后便成为软膏。用时按局部红肿面积的大小，以纱布摊贴患处。如已成溃疡，先以过锰酸钾溶液洗净疮口，然后再敷贴药膏。一般每日换药 1~2 次，以愈为度。

说明 本方对搭背已破溃者疗效较好。亦适用于深部脓疡。

205.处方 黄鳝 2 斤 白糖 1 斤

用法 将黄鳝洗去污泥，与白糖同放盆内，任其自行搅拌，取其粘液涂患处，每日 1~2 次。

说明 此方对已化脓(干烂)的最为有效，未成脓的亦效。

流 痰 (骨结核)

本病又名骨癆，因其发病部位不同，又有各种不同的“痰”的名称。多发于骨关节，如脊椎、环跳、肩、肘、腕、膝、踝等部。起病很慢，化脓亦迟。初起时症状不甚明显，仅觉患处隐隐酸痛，皮色

如常，后见活动障碍，或时有寒热，局部渐渐漫肿，时痛时止。如患处透红，按之微软，是脓已形成。溃破后脓水清稀，或有豆腐花样物质，久则疮口凹陷，周围皮肤紫暗，形成痿管，不易收口。

发于胸椎部者，脊骨外突，后期可引起大小便不利。其脓肿多出现于“肾俞”穴附近。

发于腰椎部者，脊骨突出不明显，腰部挺直如板状。其脓肿大多出现于腹部及大腿内侧。

发于环跳部者，患肢关节不能屈伸，两臀肌肉不对称，患肢先长后短，稍跛行，患处不痛，反而痛在膝部。其脓肿或出现于大腿外侧较远之处。

发于肘、膝部者，受累关节肿大，屈伸不利，臂腿肌肉渐渐萎缩。

206. 处方 鲜芫花根(去外层粗皮) 8分~1钱 大枣 4两

用法 将大枣煮烂，去皮及核，芫花根皮剪碎，2药同捣烂和匀，做好饼子，1次食完。服药后约15分钟左右开始腹泻，大便如黏痰状，或呈红色，有臭味，腹泻3~5次后，服米汤1碗，少加砂糖，腹泻即止，每1星期服药1次。一

般病症服 1~4 次即效，特殊严重病例须服 5~10 次。已经溃破者不需要其它治疗，脓液会逐渐减少，以至愈合。

207. 处方 活蚯蚓若干条（以选用韭菜地白颈者良） 石灰等量

用法 上药同捣如泥，敷于患处，外以纱布固定。

说明 初用药时，流脓较多，早晚换药，约 5~7 天，结痂生肌。

附骨疽（化脓性骨髓炎）

本病常见于 10 岁左右的儿童，成人体虚者亦患此病。好发的部位多在大腿的内外侧和内外踝骨部等处。初起怕冷、发热，患处发生酸痛，运动不利，痛剧有如锥刺。当局部病变发展到骨质破坏，脓液穿透骨膜，进入肌层时，患处即出现微红肿痛。以后脓肿从皮肤穿破排出脓液，全身症状逐渐消退；如溃后脓多而稠者，预后较佳，若脓水清稀而有臭味或有小块死骨片，形成瘻管则经久难愈。

208. 处方 白毛藤 1 把 小雄鸡（未啼者）1 只

用法 上药同煨，不放盐，食汤及鸡，可多次服。另以鸭嘴适量，瓦上煨炭研末，芫花根去表皮及心，单取中层白皮，搓成细条，蘸鸭嘴末塞进疮口，每日换药1次，可以日渐收口。

说明 此方适用于疮口久不收敛者。

209.处方 蜣螂虫7只 大麦2钱

用法 上药同捣烂敷患处，如系干者，可研细末，以水调如厚糊状，敷患处。

说明 本方适用于附骨疽溃后成漏，久不收口者。

210.处方 大蟾蜍1只 头发鸡蛋大1团

用法 上药用猪油4两，熬至药枯去渣，待冷成为油膏备用。用时，先以桑根皮4两，川乌3钱煎汤洗疮口，后以煨龙骨粉撒于疮口四周，再以油膏摊纸上，贴于疮口，1日1换。

乳 痛（乳腺炎）

本病轻症仅有乳房胀痛和压痛，无明显肿块；重者有高热，寒战，乳房肿硬焮红，有搏动性疼痛，腋下淋巴结肿大、乳汁流出不畅。若肿硬部中央变软，是成脓的现象。

211.处方 甜地丁 紫花地丁 蒲公英 蚤

休各等分

用法 上药同研细末，水泛为丸，每服3钱，每日3次，连服2天。

说明 本方亦适用于疔疮、痈疽。

212.处方 地锦草2两 鸡蛋2枚

用法 二物同煮，鸡蛋熟后去壳，再同煮1小时，吃蛋及汤。

说明 此方适用于早期轻症。

213.处方 鲜菖蒲根

用法 上药洗净切细约一酒杯，煎汤，以酒冲服。

说明 此方适用于乳痈初起，已化脓者无效。

214.处方 蒲公英2两 紫花地丁1两 全瓜蒌1两

用法 上药煎汤2小碗，1日2次分服，连服2~3天。

215.处方 算盘珠根1两5钱~2两

用法 上药煎汤，每日服1~2剂。

216.处方 鲜毛茛叶（或用鲜天名精叶或鲜芫花根）适量

用法 将药捶烂，以纱布包1层，患左乳塞右鼻孔，患右乳塞左鼻孔，每日1~2次，每次

15 分钟。

说明 ①塞鼻时间不宜过长，过长则鼻孔会起泡。

②此方适用于乳痈初起，已化脓者无效。

217. 处方 鲜半夏适量

用法 上药捣碎纱布包塞鼻，法同 216 方。

说明 ①如无鲜半夏，用干生半夏亦可，但效果稍差。

②塞鼻 1 次可达 2 天，无不良反应，如鼻孔发麻较重，待乳痛减轻时去掉。

218. 处方 木防己根 5 钱～1 两 鸡蛋 3 个

用法 防己根与鸡蛋同煮，蛋熟后去壳，放入再煮，俟药性渗入蛋内，吃蛋及汤。

臃 疮（下肢溃疡）

本病发生于下肢，好发部位在胫骨正面或两边，相当于踝骨上 3～4 寸的地方。局部先痒痛红肿，破皮后常流滋水，逐渐形成溃疡，日久则溃疡边缘的皮肤变为褐黑色，流出污浊的脓水，臭秽难闻。严重时疮口越烂越深，有的可看到胫骨，很难收口，所以俗名“老烂脚”。

219. 处方 旧橡胶

用法 上药放瓦上煨至颜色发白后，研为细粉，麻油调成软膏涂敷患处，每日换药1次，连续用之。

说明 ①本方亦适用于其它慢性溃疡。

②旧橡胶可利用旧橡胶鞋，但底部非纯净橡胶者不可用，并须除去其附着物。

220.处方 鲜马齿苋适量

用法 上药洗净捣烂敷于疮面上，每日换药1次，或将马齿苋以水煎汁，熬稠如膏状，涂搽患处。

221.处方 桐油 豆腐各适量

用法 先将桐油熬滚，再将豆腐放油中炸熟，取出捣成软膏状，外敷患处，每日换药1次，连续用之。

222.处方 鲜蚕豆叶适量

用法 上药洗净，捣烂敷患处，每日换药1次。

痔 疮

痔疮不论男女都有发病的可能，尤以青壮年为多见。生于肛门内的为内痔，生于肛门外的为外痔，内外兼见的称为混合痔。本病主要是

由于肛门直肠的痔静脉回流发生障碍所致，在局部可见一个或多个小肿块，称为痔核。

内痔初期痔核很小，不能脱出肛外，大便后有鲜血滴出，以后痔核渐大，大便时用力可脱出肛外，但大便后可自动缩回肛内；在后期因痔核经常脱出肛外，基部变长和松弛，即不易缩回肛内，必须以手将其推回或平卧后才能恢复。脱出的痔核有时会发生剧痛，水肿，发炎，甚至坏死。大便时经常出血，可造成贫血。

外痔初起小如樱核，大如牛奶子，按之质较硬，一般无红肿疼痛，也不出血，当发生血栓时，则产生剧痛、压痛和局部发紫，同时排便发生困难。

223.处方 活田螺 1 只 冰片少许

用法 以冰片研末，放在田螺内，然后取渗出的水涂搽患处。

224.处方 枳壳 1 两 荔枝草 2 两

用法 以河水 3 大碗，煎数沸，先熏后洗。 1 日 2~3 次。

说明 此方在痔疮有炎症时用之，能消肿止痛。

225.处方 五倍子大者 1 枚 干荔枝草适量

轻粉 3 钱 冰片 5 厘

用法 将五倍子敲 1 小孔，以荔枝草揉碎实其中，用纸塞孔，再用湿纸包裹，放火上煨 15 分钟左右取出，待冷去纸，研为细末，每 1 钱加轻粉 3 钱，冰片 5 厘，再研极细，用第 224 方洗后，即以此药干掺于痔上。

说明 此方能止痛消肿，并能除根；但必须与第 224 方配合使用。

跌打损伤（挫伤、扭伤）

挫伤：受伤的部位肿痛，皮肤颜色青紫，也有皮肤表面破损，有轻微的出血。

扭伤：多发生在四肢的关节部，受伤处疼痛，活动时更痛，或者因疼痛得厉害，关节内有瘀血，因而影响肢体的活动。一般在受伤后几小时内局部肿胀，严重时出现血肿（皮下瘀血）。

226. 处方 鲜土三七头 3~5 个

用法 上药捣烂敷患处，纱布包扎固定，每日换药 1 次。连敷 3 日。

227. 处方 白风仙花（带根全草） 土三七各等分

用法 上药同捣烂敷患处，纱布包扎固定，每

日换药 1 次,连续 3 日。

228.处方 马尾松叶

用法 上药捣烂取汁,每次以半小碗,加少许砂糖,冲开水服,服后即睡,复被取汗,每日 1 次,续服 1~2 次。

说明 本方主要用于止外伤性疼痛。

229.处方 鲜墨旱莲全草

用法 上药洗净捣汁内服,每次约 1 酒杯,每日 1 次,续服 1~2 次。

说明 本方主要用于压伤吐血。

230.处方 鲜螃蟹 1 只

用法 将上药捣烂取汁,用好醋、烧酒各半盅冲服。渣子用好醋调和外敷,效果更好。

外 伤 出 血

因刀伤或竹、木、玻璃、金属等物划破皮肉,血流不止。

231.处方 干天浆壳

用法 将天浆壳剥开,取种子上的白色绒毛,敷于创口上,外以纱布包扎。

又法 取鲜天浆壳洗净捣烂,外敷创口,并以纱布包扎。

232.处方 青庄鸟头部、胸脯部及尾尖部的细黄绒毛,收贮备用。

用法 将此毛敷于创口上即可止血。

233.处方 枳柴炭研末约1菜碗 雄黄约1小酒杯 冰片约1小匙 韭菜汁适量

用法 先将韭菜汁拌入炭末内,晒干研细,再加入冰片、雄黄,同研成极细粉。用时以药粉少许掺于创口,纱布包扎。

说明 此方优点是止血快,不化脓;缺点是创口愈合后会遗留黑色瘢痕。

234.处方 鲜小蓟叶

用法 上药洗净揉烂敷伤口上,即可止血。

235.处方 乌贼骨1块

用法 刷去药上灰尘,以小刀刮取粉末掺敷伤口上,纱布包扎。

236.处方 梧桐叶适量

用法 上药焙干研细末,掺伤口上,纱布包扎。

冻 疮

受冻的局部,先感痒痛,后起肿块,皮肤的颜色由暗红而渐转深紫。此时如出现紫血泡,则

患处将很快溃破，疼痛加剧，而且收口缓慢，往往待天气转暖时才结痂痊愈。

237.处方 红辣椒 5~7 只 酒脚适量

用量 上药加水适量煮沸，待温（不烫手）洗涤患处，每日 2 次，每次 10 ~ 15 分钟，已溃未溃均效。

说明 ①此方用于溃破的冻疮，洗涤时不感疼痛，愈后亦不复发。

②酒脚系米酒坛底层沉淀的米泔样渣滓。

238.处方 糯稻根 8 两 茄子茎 3 棵

用法 上药煎水洗涤患处，每日 1 次，每次 1~2 小时。连用 10 天，愈后一般不复发。

239.处方 螃蟹壳适量

用法 将螃蟹壳焙黄，研极细末掺于患处，每日 1 次。

说明 适用于冻疮已经溃破者。

烫 伤

伤处红肿、起泡，剧烈疼痛。

240.处方 地榆适量（也可酌加大黄末或龙胆草末）。

用法 上药炒炭研末，用麻油或甘油调成油

膏敷患处，轻症每日 2~3 次，重症每日 4~6 次。已起泡者，以消毒注射器抽去水后，再涂敷油膏。

说明 此方也适用于带状疱疹。

241. 处方 石灰 2 两 麻油 适量

用法 用水将石灰化开，充分搅和，待沉淀后，取石灰水半碗，加入适量麻油，以筷子搅拌均匀，即成淡黄色油膏，以毛笔或鸡毛蘸此膏涂敷患处，每日数次。

242. 处方 石碱

用法 先将石碱溶化成水（碱 1 斤，水 1 斤）备用。用时将浓碱水涂敷患处。

243. 处方 蚌肉 适量

用法 上药放瓦上焙成炭研末，用麻油调成糊状，涂患处，每日 2~3 次，愈后很少疤痕。

244. 处方 马尾松树皮（除去表层粗皮） 适量

用法 上药炒焦研末，加桐油调敷患处，治愈后疤痕不甚明显。

245. 处方 蚯蚓 7~10 条 白糖 适量

用法 先将蚯蚓用水漂去泥污，与白糖同放碗内，取其渗出的粘液，涂擦患处，每日 3~4 次。

246. 处方 熟鸡蛋黄 10 只 冰片（研末） 6 分

用法 先将蛋黄放入铜勺置火炉上熬，熬至蛋黄发黑有焦臭味时，即有蛋油流出，去渣取油，加入冰片末调匀，涂患处，每日 2~3 次。涂药的局部暴露，不须复盖，愈后很少有疤痕。

毒 蛇 咬 伤

毒蛇咬伤后，局部有烧灼样剧痛，肿胀发红，并很快向心脏方向发展，伤在上肢的，肿势可蔓延到颈项头面，伤在下肢的，肿势可蔓延到大腿。伴有发热、寒战、头昏、头痛、复视、眼睑下垂、关节酸痛、恶心、呕吐、腹泻等症状，严重时可能出现昏迷、声音嘶哑、呼吸急促、吞咽困难、四肢麻木、周身浮肿，往往可在短期内死亡。

蛇咬伤口一般有 2~4 个齿痕，并可发现有断牙留于伤口内，治疗前须先将毒牙清除。

247. 处方 鲜旋复花 乌桕树嫩叶 各一大把
鸡蛋清 2 只 红糖 1 撮

用法 先将前 2 药同捣烂，再与后 2 药和匀涂敷于肿痛最明显处。

说明 此系治土灰蛇咬伤外敷药。敷前须先将伤口切开，挤出毒血，如有毒牙在内，亦须注意除去。敷药时勿将伤口全部封住，使毒液能

从创口通畅地排出。

248.处方 鲜天南星叶 5~6 片 好酒 5 钱

用法 先用针在咬伤处挑出毒牙，如脚肿用针刺破脚丫，放出毒水，将天南星叶与酒放在碗内，同捣烂取汁，在肿处以上 3~5 寸部位，自上而下地涂擦，白天涂擦 10 余次，夜间涂擦 3~4 次，连擦 5~6 天。每隔 1~2 天用茶叶、苍耳草煎水，加盐 1 小勺，先熏后洗，注意不要烫伤皮肤。

249.处方 鲜苍耳草叶 10 片 雄黄 5 分

用法 上药同捣烂，敷咬伤处。

250.处方 鲜半枝莲 鲜半边莲各 1 把

用法 上药同捣烂敷咬伤处，每日 1 次，连敷 2~3 天。敷药前先将伤口洗净，如有毒牙即挑出，再用消毒针在咬伤肿处下方刺破，流出毒水。

251.处方 鲜佛甲草 1 撮

用法 先将伤口稍切开，挤出毒液，然后将药草捣烂，在伤口周围揉擦，最后敷于患处，敷的面积可稍大些。

252.处方 鲜半边莲 1 两 鲜半夏 5 钱 乌柏叶 1 大把

用法 先用乌柏树叶煎水浸洗疮口，用三棱

针扩创，后以半边莲适量揉成小团敷疮口上，再将半边莲、生半夏捣烂，用鸡蛋清调敷疮口周围。如肿的范围大，须单用半边莲捣敷肿胀部位。

说明 ①如肿痛剧烈，须用半边莲 1~2 两捣汁或煎汤服，每日 2~4 次。

②如肿胀不消，用三棱针刺“八邪”、“八风”等穴，出水消肿。

253. 处方 鲜小旋花 6 份 鲜珍珠草 2 份
鲜乌薺莓 鲜马齿苋各 1 份

用法 上药同捣烂外敷伤口周围，日换 1 次。敷药前先以米泔水洗净伤口，再以针刺出黄水。敷药后可用葵花叶盖上。肿势上端用绳扎紧。

254. 处方 鲜韭菜根 1 两 鲜车前草 2 两

用法 上药同捣烂，取自然汁，以开水 1 次冲服，每日 2~3 次。药渣敷于咬伤处。

皮 肤 科 疾 病

秃 疮（发癣、黄癣）

秃疮俗称“鬍鬚头”，一般分两种：

发癣（白癣）：头皮上有大小不等、数量不一

的片状斑，圆形或椭圆形，周围边缘清楚，斑上复盖一层灰白色的糠片状鳞屑，斑上的头发干燥无光，容易折断，自觉轻度搔痒，至青春期可自愈。

黄癣：在头发根处有米粒大的黄色脓疱，随后变成痂皮，中央凹陷，有鼠尿味，剥去痂皮，内呈淡红色，疮面不断扩张时，可蔓延到整个头部，融合而成大片的黄癣痂，如不及早治疗，除头的边缘可留下一圈头发外，其余头发都被侵蚀，整个头皮变为一大片光亮的萎缩性瘢痕，成为永久性斑秃。

255. 处方 蜈蚣 10 条（约 4 钱） 雄黄 4 钱
香油适量

用法 将蜈蚣焙黄，与雄黄同研细末，以香油调成软膏。用时先将患者头发剃光，以淘米水洗净患部，然后涂药，每日 1 次。

256. 处方 苦楝子 4 两 熟猪油（或植物油）半斤

用法 先将苦楝子炒黄，研成细末，再以熟猪油调成 50% 油膏。用时，将患部头发剃光，以 1% 明矾水洗净局部，揩干，然后以油膏涂敷患处约 1 分厚，每日 1 次，连续使用 3~4 周。

癬 疮 (体癬)

体癬俗名“铜钱癬”。多生于面、颈、前臂和手部的皮肤，初起为红色扁平丘疹，逐渐变为浅红色斑块，表面有少许灰白色鳞屑附着，在发展过程中，损害的中央渐次消退，四周向外扩展，形成环状，边缘清楚，略隆起，呈暗红色，并有小丘疹和小水泡，有时几个损害互相融合成多环形。如多年不愈，搔之全不觉痛者，称为“顽癬”。

257. 处方 土槿皮 1 块 好醋适量

用法 将土槿皮蘸醋在砂石上磨浓汁，涂搽患处，每日 2~3 次。

258. 处方 谷树汁

用法 先将刀在谷树皮上砍几刀，然后刮取流出的白色浆汁，涂擦患处，每日 2~3 次，连续涂擦 1~2 周。

259. 处方 蜈蚣 10 条 斑蝥 20 只 土槿皮 1 两

用法 上药共研末，放在瓶内，加入烧酒浸泡 1 星期，涂擦患处，每日 1 次，连用 20~30 天。

说明 ①此方适用于多年的顽癬。

②此方有毒，切忌入口。

湿 疹

本病可发生于身体的任何部位，以耳朵周围、肘弯、腿弯、肚脐、阴囊、肛门四周等处为多见，多对称分布。急性湿疹，初起皮肤潮红、作痒，很快出现血疹和水泡，抓破后形成糜烂面，有大量滋水渗出，奇痒并有灼热感，2~3周后结痂脱屑而愈。若反复发作，经久不愈的称为慢性湿疹。慢性湿疹的局部皮肤增厚，皮沟加深如织席状，表面粗糙不平，有鳞屑附在上面，也可发生轻度糜烂，有时可见细小裂坼，滋水很少，往往经年累月不愈。婴儿湿疹好发于两颊部，也可泛发于全身。

260.处方 鲜苦楝树皮 3 两

用法 上药用95%酒精500毫升，浸泡1~2日，涂擦患处，每日3~4次，连用4~5日。

261.处方 鲜苍耳草(全草)适量

用法 上药洗净捣烂取汁涂患处，每日1~2次，连续用之。

262.处方 金银花 1 两 防风 蝉衣各五钱

用法 上药煎水洗患处，每日1~2次。

263.处方 硫黄 8 分 樟脑 2 分 枯矾 3 钱

黄柏 1 钱 炉甘石 2 钱 冰片 2 分

用法 上药共研细末。如已破皮流水者即以此药粉直接外扑，未破者以蛋黄油或凡士林将药粉调成软膏涂敷。在敷药前用车前草或野菊花桔子煎水洗涤，揩干后敷药，每天 1 次，连用 7~10 天。

皮 肤 搔 痒

本病是一种原因不明的皮肤病。临床表现就是阵发性的搔痒，发则奇痒难忍，抓搔仍然不能煞痒，发时皮肤中略感烘热，皮肤没有病变的显示，其余均与健康人无异。

264. 处方 艾叶 防风各 2 两 雄黄 花椒各 3 钱

用法 用水 4 大碗煎沸后，再煮 3~4 分钟，倾入盆内，乘热先熏后洗，1 日 1 剂，洗 2 次。

说明 ①洗后不能洗澡。

②此方对慢性荨麻疹，泛发性神经性皮炎亦有效。

265. 处方 烟叶数片

用法 煮水洗患处，1 日 1 次，洗 2~3 天。

说明 如搔痒面积大，可以增加烟叶。

缠腰火丹（带状疱疹）

本病多发于腰部，局部皮肤先出现不规则的小红斑，有刺痛或灼热感，随即在红斑上发生密集成簇的小水疱，周围可见红晕；水疱沿所属皮肤感觉神经分布区出现，呈带状排列。数日后干燥结痂，整个病程约2~3星期，愈后很少复发。

266. 处方 鲜蒲公英 2~3 棵

用药 上药捣烂取汁，加黄蜡血调搽患处，每日2次。

267. 处方 蚯蚓泥（蚯蚓粪）半小碗 雄黄末 适量

用法 上药同捣匀（如蚯蚓泥已干，可少加冷开水）涂搽患处，每日1~2次。

说明 蚯蚓泥须找自韭菜地上的。

268. 处方 陈小粉（研末）适量

用法 已破皮的用水调敷患处，未破皮的用醋调敷。

269. 处方 鲜龙胆草 适量

用法 上药捣烂，敷于局部。每日换药1~2次，功能退热止痛。

丹 毒

本病多见于婴孩及儿童，它是一种急性炎症。炎症主要在皮肤层，发病部位不定，四肢、胸腹、颜面部均可发生。患处灼热疼痛，皮肤红肿（火红色），扩展很快；红肿处的特点是边缘稍凸起，与健康皮肤有明显的界限；在炎症区有时可出现含浆液的水泡。初起多突然有怕冷发热（体温可达40℃左右）、头痛、全身不适等症状。

270. 处方 活蚯蚓 6 条 白糖 1 两 5 钱

用法 将蚯蚓洗净泥，和白糖共捣如糊状调敷患处。

说明 此方亦能治疔腮。

271. 处方 白海蜃皮适量

用法 浸潮后，量丹毒面积大小，剪贴于患处。

鹅 掌 风

本病是一种慢性的比较顽固的皮肤病。患于两手掌与十指的掌侧面。初起皮上起紫白斑点，及小水泡，微有痒感，久则皮肤坚厚，干燥裂口，至冬寒时尤甚，有时裂口出血疼痛。久延不愈，

可使指甲变灰。

272.处方 嫩凤仙花茎叶 1斤 明矾 酸醋
各半斤 猪尿胞 1只

用法 将凤仙花茎叶、明矾同捣烂，然后将酸醋加入，同装猪尿胞内，患手伸入，把口扎好，浸24小时取出，一昼夜内勿接触水。

273.处方 生草乌 生川乌 明雄黄各5分
巴豆 蓖麻子各7枚均去壳

用法 先将前3味研细末，再与后2味捣烂如泥。晚上睡前，用温开水洗净患手，再以麻油适量调药如糊状，涂患部，戴上手套入睡，第二天洗净药物。涂药时勿沾及健康皮肤。

手 足 皸 裂

患处皮肤干燥粗糙而开裂，裂纹的长短、深浅不一，有时出血，患者自觉疼痛，经受磨擦压力时，疼痛更为剧烈。

274.处方 苦楝树果半斤

用法 上药捶碎，以水煎成浓汁，乘热洗皸裂处，每日1次。

275.处方 猪胰子 4两 高粱酒 3两

用法 将猪胰子捶烂，放大口瓶中，以酒浸泡

1周(瓶口须密封), 备用。每晚先以热水洗靴裂处数分钟, 揩干, 随即在酒瓶内挑取猪胰子 1 小块满涂患处, 并加以磨擦, 大的裂口, 须嵌塞少许猪胰子, 再以干毛巾包裹起来, 勿使吹风受凉, 连续使用数次。

276. 处方 新棉花(去籽) 1 小团 活虾(去壳) 适量

用法 上药同捣烂, 涂塞于裂口上, 用布裹好, 3 日后老皮慢慢退去, 裂口渐平。

鸡 眼

本病多发于脚底和趾缘部, 由于局部皮肤长期受压和摩擦使皮肤角质层增厚所致。主要表现为有一圆锥形的硬结, 形如鸡眼, 高出于皮肤面, 行走产生疼痛, 影响步履。

277. 处方 瘪桃干 1 两 好米醋 3 两

用法 以瘪桃干放米醋内煎沸, 待温, 洗鸡眼, 每次洗 15 分钟左右, 使药液渗透到内部, 1 日 2 次。

说明 原药汁可煎洗 2 天, 防止污染。

278. 处方 河豚鱼胆汁 适量

用法 先将鸡眼用温水泡软, 以利刀将老皮

去净，然后将河豚鱼胆汁，涂于清淨韧性的纸上，贴于鸡眼上，每2日换1次，贴2~3次，鸡眼可自动脱落。

绣球风（阴囊瘙痒）

初起时，阴囊表皮干燥，剧烈搔痒，喜用热水烫洗；以后可起红色丘疹，搔破后流滋水，局部灼热疼痛。痒与痛反复发作。

279. 处方 虾糠（即海白虾的壳）2两

用法 上药煎水乘热熏洗患处，每晚1次，连洗2~3次。

280. 处方 鲜蓖麻叶5两（或用龙胆草1~2两）

用法 上药煎水，熏洗患处，每日2次，连续用之。

五官科疾病

目翳（化脓性角膜炎）

本病多由砂眼及外伤所引起。开始时眼睛疼痛，流泪，怕光，看东西模糊，有轻重不等的充血。炎症恢复期，角膜上残留厚薄不等的点状

瘢痕，或如条状、片状，极薄者白色，通称云翳，厚者灰白或浓白色，称为斑翳或白斑，有时角膜上残留小凹。

281. 处方 毛茛根 7~8 棵 豆腐 1 块

用法 上药用水煮透，去毛茛根，吃豆腐，每 2 日吃 1 次，连吃 3~4 次。毛茛有毒，使用宜慎。

282. 处方 猪苦胆 1~2 个

用法 将猪胆（不洗）剖开，胆汁盛在铜勺内，在火上熬干，捻成菜子大的小丸，每次取 1 丸放在内眼角，闭目片刻听其自化，每日早晚各 1 次。

眼 癬（睑缘炎）

本病的发生多与身体虚弱、生活不卫生和眼部其他慢性炎症有关。患者眼睑常觉发痒，或痒痛，易于流泪，易疲劳，不易睁眼，夜间工作时特重；睑缘红肿充血，由于泪液濡湿下睑皮肤，可形成湿疹，睫毛根部及睑缘表面有很多白色上皮鳞屑，并有点状皮脂溢出。若皮脂集结于睫毛根部，呈黄色蜡样，可结成痂，甚者睫毛常被胶着成束。

283. 处方 鸡蛋 3 个 胆矾 3 分 梅片 5 厘

用法 鸡蛋 3 个煮熟，单取蛋黄放铜勺（铁勺亦可）内熬油，胆矾研极细末。用时将冰片和胆矾混合研匀，与鸡蛋油调成糊状，敷眼皮沿上，早晚各 1 次。

说明 此方可以止痒，重生眼睑毫毛，但用时宜细心，勿令药侵入目内，以免刺激疼痛。

284. 处方 蚕沙 1 钱 生甘草 2 分

用法 上药研成极细末，用凉开水调成糊状，涂搽患处。

285. 处方 桑叶 菊花各 3 钱 龙胆草 1 钱 5 分

用法 上 3 味以水煎数沸后，乘热熏目，俟温凉后，以之洗目。1 日 2 次。

夜 盲 症

本病是小儿常见的慢性营养障碍症。是由于维生素甲缺乏，或由于慢性的胃肠道疾病和肝胆疾病影响了对维生素甲的吸收而引起的。患本病的人，每到夜晚则视物模糊，甚至完全不能见物。患者的结膜和角膜，逐渐失去光泽，角膜两傍球结膜发生小的三角形泡沫状斑（毕脱氏斑）；内外侧球结膜感到干燥。此外皮肤干燥，

如鸡皮样的粗糙，尤以四肢外侧和肩部最为明显。

286.处方 雄鸡肝 1 具 生苍术 3 钱研细末

用法 雄鸡肝煮熟后，蘸苍术末，1 次食完，每日 1 次，连服 7 天为 1 疗程。

说明 若无雄鸡肝，猪肝、羊肝均可。

287.处方 猪肝 1 具大者半具 决明子 3 钱
夜明沙 3 钱

用法 将后二味共研细末。以竹刀将猪肝剖为几层，将药末匀放其中，用荷叶包裹数层，放火内烧，以肝熟为度。烧熟后去药吃肝，1 日 1 次，连服 3 天。服药时间以晚饭后较佳。

脓 耳（化脓性中耳炎）

本病主要症状为耳内疼痛，夜间痛得厉害，甚至同侧头部也痛。以后炎症化脓，鼓膜穿孔，脓液从耳内流出，疼痛减轻或消失；全身症状有怕冷、发热、全身不适等，在小儿尤为明显。如不及时治疗，则耳内长期或间歇性流脓，有腥臭味，成为慢性化脓性中耳炎。

288.处方 明矾适量

用法 用冷开水将明矾溶化成饱和溶液，过

滤后滴耳，每日 3~4 次，每次 2~3 滴。

289. 处方 鲜虎耳草叶 3~5 片（或用乌菱莓全草）

用法 上药洗净捣烂取汁，先用盐开水洗净耳内脓液，揩干，再以此滴耳，每日 1~2 次，每次数滴。

290. 处方 鲜麦冬适量

用法 上药洗净，捣烂取汁滴耳，每日 3 次，每次数滴。

291. 处方 核桃仁适量

用法 上药捣烂绞取油，先将耳内脓液洗净，拭干，然后将此油灌入耳内使满，15 分钟后，侧耳使油流出，每日 1~2 次。

说明 第一次用过的核桃油渣，第 2 第 3 次仍可绞出油液。

292. 处方 五倍子 1 钱 枯矾 冰片各 3 分

用法 先研五倍子净末 1 钱，然后加枯矾同研，最后加入冰片研匀密贮。用时先以淡盐开水将耳中脓液洗净，然后取上药少许吹耳中，每日 1~2 次。

鼻 渊（副鼻窦炎）

初起一侧或双侧鼻塞流涕，闻不到香臭味，头痛，发热，全身不适。如不及时治愈，会变成慢性副鼻窦炎，患者常感头昏头痛，长期鼻塞，不断流脓样浊涕，有腥臭味。

293.处方 经霜丝瓜藤

用法 上药放瓦上煨炭、研末，以酒少许调服，每次1钱5分，1日3次，连服5~7日。

294.处方 丝瓜藤近根处2两 白芷2钱

用法 将丝瓜藤煎汤，白芷研末，分作3份，以黄酒冲服药末，1日3次分服，连续用之。

295.处方 苍耳子2斤 辛夷6两 银花菊花 茜草各2两

用法 上药加水浓煎3次，将3次药汁混和过滤，浓缩，再加蜜糖8两。每服1大匙，热开水冲服，每日3次。

296.处方 藿香1斤 梔子2两

用法 上药研为细末，用猪胆汁调和为丸，晒干，每服3钱，开水送下，1日3次。

慢性鼻炎

慢性鼻炎，多数是急性鼻炎反复发作的结果。其症状主要是鼻塞和鼻涕增多，甚有脓性的鼻涕，嗅觉减退。

297. 处方 辛夷 鹅不食草各等分

用法 上药同研细末，每取少许，绵裹塞鼻，早晚各换药1次。两鼻孔可以交替塞。

298. 处方 苍耳子 辛夷各3钱

用法 上药煎汁滴鼻，也可在药汁中少加大蒜汁。

说明 此药汁不能久贮，若已变质，不可使用。

乳蛾（急性扁桃体炎）

本病以咽痛为主症，吞咽时咽痛更剧，检视可见一侧或两侧扁桃体红肿。如扁桃体上见淡黄色或白色脓点，或几个小脓点融合成一较大的苔膜（易擦去、不出血），则有化脓的可能。比较严重的患者，可伴有发热、怕冷、头痛、全身不适等症。颈淋巴结可能肿大，有压痛。

299. 处方 土牛膝根 大青叶各5钱

用法 上药煎水 1 小碗，每服半小碗，每日 2 次，连服 2~3 日。

300. 处方 鲜荔枝草 明矾各适量

用法 上药同捣烂，布包绞汁，每次 1 匙，以开水冲服，每日 2 次，连服 2~3 日。

301. 处方 鲜万年青叶 1 两

用法 将万年青叶洗净捣汁，开水冲服。连服 2~3 天。

302. 处方 鲜土牛膝根(或用全草) 1~2 棵
人乳适量

用法 先将土牛膝根洗净，捣汁，再与人乳混合均匀，每取少许滴入双侧鼻孔，滴入不多时，即有痰涎吐出。每隔 3~4 小时滴鼻 1 次。

说明 本方亦适用于其它的咽喉红肿疼痛，但对慢性扁桃体炎效果不大。

303. 处方 板蓝根 3 两 金银花 1 两

用法 上药煎汤 2 小碗，1 日 2 次分服。

以上 5 方俱适用于急性扁桃体炎。

牙 痛

本病多数由龋齿或牙齿折裂导致牙髓感染所引起。慢性的多为反复发作的自发性疼痛，急

性的多为阵发性的剧烈跳痛，有时向同侧头颞部放射。吃到冷、热、酸、甜等饮食时，容易激发齿痛。

304. 处方 鲜芥菜叶 1 片 红蚯蚓 1~3 条

用法 上药同捣烂，布包绞汁，滴患侧耳内，每次 2~3 滴，每隔 15 分钟滴 1 次。

305. 处方 陈葵花秸心适量

用法 上药烧灰擦牙痛处，1 小时后痛势渐减。

306. 处方 鲜毛茛

用法 上药捣烂，取如黄豆大一块，纱布包，放牙痛处，含半小时后吐出。

说明 此药有毒，切忌咽下。

307. 处方 蟾酥 硼砂各 2 钱 雄黄 甘草各 1 钱

用法 上药同研细末，酒调为丸，如小米大。用时取 1 粒以药棉裹塞患处。

说明 ①本方用于蛀牙痛。药有毒，切勿咽下。

②用少许米醋将丸药化开外敷，可治发背、疔疮。

308. 处方 食盐 明矾各等分

用法 上药以沸水溶化，待温，频频含漱，直至痛止。

草 药 部 分

大 戟

别名 龙虎草 天平一枝香 黄花大戟

植物形态 原植物为京大戟。多年生草本，体内含白色乳汁。根圆锥形，细长。茎直立，圆柱形，上部分枝，被白色短柔毛。叶互生，近无柄；叶片长圆形或披针形，全缘，边缘反卷。多歧聚伞花序顶生，花绿黄色。花期4~5月。（图1）

生长环境 生于山坡、树阴下及路旁。

采收加工 根部供药用。3~4月发芽时将根挖出，除去茎叶，洗净，晒干。

性味功能 苦辛，寒。有毒。泻水饮，利二便。

临床应用 煎服治水肿胀满，大小便不通，痰饮积聚，痈疽肿毒。每用5分~2钱，或入丸散。虚寒阴水患者及孕妇忌服。外用：煎水熏洗风毒脚肿。



图 1 京大戟(大戟科)

Euphorbia pekinensis Rupr.

大 蓟

别名 猫刺 千针草 将军草 野辣菜 铁刺杆草 大齐牙

植物形态 多年生或二年生草本。有少数肉质的圆锥根，茎基部有白色丝状毛。基部叶有叶柄，表面绿色，有稀疏的长毛，背面脉上也有长毛，边缘羽状分裂，有刺；中部的叶无柄，抱茎，边缘羽状深裂，有刺；上部叶渐小。头状花序，球形，生于茎枝顶端，花冠紫色。花期6~7月。（图2）

生长环境 生于荒地、路旁或田间。

采收加工 全草及根供药用。6~7月当花盛开时割取地上部分，晒干。根最好在8~10月间挖取，洗净晒干。

性味功能 甘，凉。凉血，止血，行瘀，消肿。

临床应用 全草：煎服治吐血，衄血，血尿，血淋，血崩，便血，肺脓肿，急性阑尾炎。干用3~5钱，鲜用1~2两。根：煎服治赤白带；外用：和山葡萄、地锦草捣敷痈肿疮疖。



图 2 大 蓟(菊科)

Cirsium japonicum DC.

小 薊

别名 刺儿菜 刺角菜 刺杆菜 刺杀草
七角菜

植物形态 多年生草本。具长匍匐根，主根明显，细柱形，深入土中，侧根须状。茎表面绿色或带紫色，有纵条纹。叶椭圆形或椭圆状披针形，无柄，表面绿色较深，背面较淡，两面都有稀密不等的白色蛛丝状毛，边缘不裂至齿裂，每齿裂有小刺1根。头状花序，生于茎枝顶端，花冠淡紫色。花期5~6月。（图3）

生长环境 生于荒地、路旁或田间。

采收加工 全草供药用。在开花前割取全草，晒干。

性味功能 甘，凉。破血行瘀，凉血止血。

临床应用 煎服治吐血，衄血，血尿，血淋，便血，崩漏。干用3~5钱，鲜用1~2两。外用：捣敷外伤出血，肿痛，疔疮。



图 3 小 薊(菊 科)

Cephalanoplos segetum (Bunge) Kitam.

小 茴 香

别名 土小茴 香丝菜 小刺萎

植物形态 原植物为茴香。多年生草本，有强烈香气，全体无毛但被有白粉。茎直立，上部多分枝，小枝开展。叶互生，根生叶有长柄，叶柄由下而上渐短，基部成鞘状抱茎；叶片数回羽状分裂，最终裂片呈线形或丝状。复伞形花序顶生，花小，黄色。果实长圆形，黄绿色，有纵棱。花期6~7月，果期10月。（图4）

生长环境 为栽培植物。

采收加工 果实供药用。8~10月果实成熟后采收。将全株割下，摊席上晒干，用木棒打下果实，簸除枝叶及杂质，复晒至足干。

性味功能 辛，温。理气，开胃，祛寒。

临床应用 煎服治脘腹胀满，吐泻，寒疝，腹痛，痛经。每用1~2钱。



图 4 小茴香(伞形科)

Foeniculum vulgare Mill.

小 旋 花

别名 扶母苗 兔耳草 辅秧

植物形态 原植物为打碗花。蔓生草本。叶戟形或为3裂，中裂大，侧裂较短，通常又作2浅裂，全缘或带波状，有长柄。花腋生，花冠漏斗状，淡红色。花期5~10月。（图5）

生长环境 为田间常见杂草。

采收加工 全草供药用。自春至秋随时可采。

性味功能 甘微苦，温。清热解毒。

临床应用 煎服补劳损，益精气，利小便。干用1钱5分~3钱。捣汁饮治丹毒热。外用：捣敷毒蛇咬伤。



图 5 打碗花(旋花科)
Calystegia hederacea Wall.

飞 帘

别名 大力王 方茎牛角刺

植物形态 二年生草本。有伸直或偏斜的主根。茎直立，有条棱，并附有绿色的翼，翼上有齿刺。下部的叶羽状深裂，裂片的边缘有刺毛；上部的叶渐小。头状花序2~3个，着生于茎枝顶端，花冠紫红色。花期5~7月。（图6）

生长环境 常生于荒地及路旁。

采收加工 带根全草入药。5~6月挖取全株，洗净，鲜用或晒干。

性味功能 苦，平。疏风祛湿，清热解毒。

临床应用 煎服治头风眩晕，伤风咳嗽，风湿关节疼痛，乳糜尿。干用3~5钱，鲜用2~3两。研末服治小儿疳痢。外用：捣敷痈肿热疮。



图 6 飞 帘(菊 科)

Carthusian *crispus* Linn.

女 贞 子

别名 冬青子 冬青树子

植物形态 原植物为女贞。常绿灌木或小乔木，高达10余米。叶对生，有短柄；叶片卵形或卵状披针形，全缘，两面无毛，革质。花白色，成顶生的圆锥花序。果实长椭圆形，熟时蓝黑色。花期6~7月，果期8~12月。（图7）

生长环境 大多栽培于园庭或野生于山地。

采收加工 果实及叶供药用。果实在11~12月间采收，采下的果实，隔水蒸熟晒干。叶全年可采。

性味功能 果实：苦甘，平。补肝肾，强腰膝。叶：微苦，平。除风散血，消肿定痛。

临床应用 果实：煎服治肝肾阴亏，耳聩目眩，腰膝酸软，带下。干用3~5钱，或入丸剂，亦可熬膏。叶：煎服治咳嗽吐血，头目昏痛。鲜用3~5钱。外用：与黄连熬膏点眼治风热赤眼；捣汁含治口舌生疮。



图 7 女 贞 (木犀科)
Ligustrum lucidum Ait.

山 楂

别名 山里红 楂果 野山楂

植物形态 落叶灌木。分枝密生，具细刺，幼枝有短毛。单叶互生，倒卵形，顶端3裂，边缘有缺刻及不整齐锯齿，下面有疏柔毛；托叶近卵形，有缺刻。花5~6朵簇生成伞房花序；花冠白色。果球形或梨形，红色或黄色。花期5~6月，果期8~10月。（图8）

生长环境 野生于向阳山坡。

采收加工 果实供药用。成熟时采收，晒干。

性味功能 酸甘，微温。消食积，散瘀血，透痘疹。

临床应用 煎服治肉积症瘕，泻痢，肠风，腰痛，疝气，痛经，产后腹痛，恶露不净，小儿乳食不化。每用3钱~1两。或入丸散。



图 8 山 楂(蔷薇科)

Crataegus cuneata Sieb. et Zucc.

山 葡 萄

别名 见肿消 野葡萄

植物形态 多年生草质藤本。根粗壮，圆柱形，外皮棕褐色。枝条较粗，嫩枝具柔毛，有卷须。叶互生，叶片广卵形，通常3浅裂，裂片边缘具较粗大的圆钝锯齿，表面暗绿色，无毛或具细毛，背面淡绿色，被柔毛。花序与叶对生或顶生，花小，绿色。花期6~7月。（图9）

生长环境 多生于山坡、林缘，攀缠于它物上。

采收加工 根及茎叶供药用。根在秋季或春季采挖，洗净泥土晒干。茎叶在生长期随时可采。

性味功能 甘，平。清热解毒，祛风消肿，散结。

临床应用 根：煎服治肺脓肿，急性阑尾炎，风湿关节痛，白带。鲜用2~3两（白带用0.5~1斤）。外用：捣敷痈肿疮疖，毒蛇咬伤，面神经麻痹，跌打损伤。茎叶：煎服治风疹块。鲜用1~2两。




图 9 山葡萄(葡萄科)

Ampelopsis brevipedunculata
(Maxim.) Trautv.

土 三 七

别名 菊三七 血三七 三七草 天青地红

植物形态 多年生草本。根肥大块状。茎带肉质，嫩时紫红色，成长后多分枝，表面光滑，有细浅棱。基生叶多数，丛生，全缘，有锯齿或作羽状分裂，表面深绿色，背面紫绿色；茎中部叶长椭圆形，羽状分裂，裂片边缘浅裂或有疏锯齿，两面近乎光滑，基部有假托叶 2 枚；茎上部叶渐小，披针形。头状花序多数，有细梗，花冠黄色。花期 9~10 月。（图 10）

生长环境 家种。

采收加工 根及全草供药用。5~9 月采收，鲜用或晒干。

性味功能 甘苦，温。散瘀，止血，定痛。

临床应用 根煎汤或研末服治吐血，衄血，产后瘀血腹痛。干用 3~5 钱，鲜用 1 两~1 两 5 钱。全草外用：捣敷跌打损伤，外伤出血，痈肿疮毒。



图10 土三七(菊科)

Gynura japonica (Thunb.) Juel.

土 牛 膝

别名 牛鞭郎草 野牛膝 喉白草 蛾子草
喉吮草 喉痹草

植物形态 多年生草本。根丛生细长，土黄色。茎直立方形，茎节膨大，形如牛的膝盖，节上有对生的分枝。叶对生，有柄，全缘。花序较长，顶生或腋生，花绿色，长大后下垂，苞片针状，顶端略向外弯，易粘附于人的衣服上。花期8~9月。（图11）

生长环境 生于田野、山坡、路旁、沟边或林下。

采收加工 根及全草供药用。2~4月或9~12月采收根部，去叶洗净晒干。茎叶生长期随时可采。

性味功能 苦，凉。散瘀破血，清热除湿。

临床应用 根：煎汤或捣汁服治扁桃体炎，咽喉红肿疼痛，小便不利，赤白痢疾，风湿关节疼痛，妇女瘀血腹痛，跌打损伤。鲜用1~2两。外用：捣敷毒蛇咬伤，煎浓汁冷敷烫伤。茎叶：捣敷痈肿疔疮。




图11 土牛膝(苋科)

Achyranthes bidentata Bl.

土 茯 苓

别名 鲜土苓 山遗粮 土革藓 冷饭团

植物形态 原植物为光叶菝葜。多年生攀援状灌木。地下根茎肥厚，块状扁圆，深入土中可达一米以上，外皮较硬，褐色，内面有粉性，白色。茎细长，光滑无刺，密被青褐色小斑点。叶片革质，长圆状披针形，叶面深绿色，背面常有白粉；托叶变为二条卷须。花序生于叶腋内，花小，花冠淡黄色。花期5~6月。（图12）

生长环境 野生于山坡或树林下。

采收加工 根茎供药用。全年可以采收，挖取根茎，埋入土中或放入缸中，上盖以砂土，为鲜土茯苓，随用随取。或洗净切片晒干。

性味功能 甘淡，平。解毒，除湿，利关节。

临床应用 煎服治梅毒淋病，白浊，瘰疬，慢性肝炎，血崩，白带。干用5钱~1两，鲜用1~2两。酒浸饮治风湿痛；研末敷疔疮、丹毒。



图12 光叶菝葜(百合科)

Smilax glabra Roxb.
var. *concolor* Wang et Tang

土 槿 皮

别名 荆树皮 土荆皮

植物形态 原植物为金钱松。落叶乔木。高20~40米，直径可达1米。树干挺直，枝条轮生，平展；树皮幼时淡褐色，老时赤褐色并块状开裂；枝条有长短枝的区别。叶线形，稍作镰状弯曲，长枝上的叶螺旋状着生，短枝上的叶簇生，每15~30片呈星状排列，黄绿色，质柔软，至秋后变成金黄色。（图13）

生长环境 栽培作行道树或栽种于庭园中，也有野生于山坡林缘及杂木林内的。

采收加工 根皮及近根树皮供药用。5月选近根30~60厘米处，打横截割半周，两侧纵剖剥至地下根部，将剥下的皮刮去外层，晒干平迭。

性味功能 辛，温。有毒。止痒杀虫。

临床应用 外用：浸酒涂癣疮。禁内服。




图13 金钱松(松科)
Pseudolarix kaempferi Gord.

马 齿 苋

别名 酱板头草 五方草 长命菜 九头狮子草 马子菜 猪长草 马苋

植物形态 一年生草本，全体肉质无毛。茎由基部四散分枝，平卧或倾斜生长，褐绿色或带淡红色。叶互生，也有对生的，肉质肥厚，上面深绿，下面淡绿色或暗淡红色。花黄色。花期7~8月。（图14）

生长环境 各地普遍野生，常见于田间、路旁、荒地。

采收加工 全草供药用。7~10月花期前后采收，放热水中烫、或蒸过后晒干。

性味功能 酸，寒。清热，解毒，散血，消肿，杀虫。

临床应用 煎服或捣汁饮，治菌痢及产后血痢，淋病，赤白带。干用5钱~1两，鲜用2~4两。外用：熬膏或研末涂敷痈肿、颈淋巴结核、丹毒、下肢溃疡、湿癣、秃疮；煎水洗痔疮；捣汁涂毒虫咬伤。




图14 马齿苋(马齿苋科)

Portulaca oleracea Linn.

马 鞭 草

别名 兔子草 铁马鞭

植物形态 多年生草本。基部木质，茎四棱形。叶对生，暗绿色，两面都有硬毛，基部的叶有柄，倒卵形至长圆形，边缘有粗齿和缺刻；茎生叶菱形无柄，深羽状分裂，或有齿，或渐小而成披针形。夏秋开花成穗状花序，小花排列紧密，花冠淡蓝紫色，在果实成熟时果穗可伸长至30厘米似马鞭状。花期6~8月。（图15）。

生长环境 生长于路边、田埂及丘陵荒野。

采收加工 带根全草供药用。开花结子后采收全草，晒干。

性味功能 苦，微寒。行血，活血，杀虫。

临床应用 煎服治伤风感冒，水肿胀满，痢疾，症瘕，经闭。干用3~5钱，鲜用1~2两。捣汁饮并捣敷治痈肿，疮毒；捣汁饮或塞鼻治疟疾。



图15 马鞭草(马鞭草科)

Verbena officinalis Linn.

丹 参

别名 紫丹参 红根 活血根 靠山红

植物形态 多年生直立草本，全体密生柔毛及腺毛。根细长圆柱形，外皮朱红色。茎方形，有槽。叶对生，奇数羽状复叶，小叶 5~7 片，椭圆形或卵形，边缘有圆锯齿。总状花序顶生，花冠淡紫色，唇形。花期 4~6 月。（图 16）

生长环境 野生于山坡草丛中。

采收加工 根部供药用。2~4 月或 10~12 月采收。挖出后剪去须根，洗净晒干。

性味功能 苦，凉。活血祛瘀，排脓，止痛。

临床应用 煎服治月经不调，经闭腹痛，症瘕积聚，骨节疼痛，烦热不眠，痈肿丹毒。干用 3~5 钱。或入丸散。外用：研末以羊油熬膏涂烫伤，能止痛生肌。



图16 丹 参(唇形科)

Salvia miltiorrhiza Bunge

毛 茛

别名 老虎脚爪草 老虎脚迹草 老虎脚底板 瞌睡果子草 时果叶子 毛药芹

植物形态 一年或多年生草本，全体被白色长毛。根须状。茎有槽。基生叶有柄，叶片近五角形，3深裂，两侧裂片又再2裂；茎生叶几乎没有叶柄，3深裂，裂片线状披针形。花黄色。花期4~8月。（图17）

生长环境 生于路旁湿地、水沟边及山坡阴湿处草丛中。

采收加工 全草及根供药用。4~10月均可采用。

〔附注〕 西氏毛茛，形态与毛茛相似，但为3出复叶，具有长柄，小叶片有短柄。亦可代毛茛用。

性味功能 辛，温。有毒。外用发泡，杀虫。

临床应用 叶捣烂塞鼻治乳腺炎；全草捣敷“内关”穴发泡治急性肾炎，捣烂含口中治牙痛；根和豆腐煮服消目翳。此药有毒，一般只作外用，如内服须在医生指导下进行。




图17 毛 茛(毛茛科)

Ranunculus japonicus Thunb.

六 月 雪

别名 满天星 节节草

植物形态 常绿矮小灌木，高可达一米。根细长，外皮黄白色。茎多分枝，小枝有微毛。叶对生，叶片卵圆形或长圆状卵形。开白色小花，通常几朵簇生于枝顶或叶腋。每一植株上花的数目较多，往往很多植株成群生长。花期6~8月（图18）。

生长环境 生于山坡、林下杂草中。

采收加工 茎叶供药用。5~10月均可采收，鲜用或晒干。

〔附注〕 白马骨外形与六月雪相似，茎叶也作六月雪用。

性味功能 辛，凉。祛风，清热，解毒。

临床应用 煎服治小儿惊风，偏头痛，咽痛，目赤肿痛，乳糜尿，白带。鲜用1~2两。和石打穿煎服，治面神经麻痹。



图18 六月雪(茜草科)

Serissa serissoides (DC.) Druce.

天 名 精

别名 癩蛤蟆草 皱面草

植物形态 多年生草本，有臭气。茎直立，上部多分枝，成二叉状。基生叶就地丛生，叶面多皱缩；茎生叶互生，下部叶稍有柄，阔椭圆形至长椭圆形，上部叶长椭圆形，无柄，逐渐变小。头状花序多数，着生于叶腋，近乎无梗，多向下垂，花黄色。果实具纵沟多条，顶端具有线形突起。花期 6~10 月。（图 19。）

生长环境 多生于山坡、荒地、路旁。

采收加工 全草供药用。8~10 月采收全草，晒干。（种子名鹤虱，亦供药用。）

性味功能 甘苦辛，寒。清热解毒，破血止血，杀虫。

临床应用 煎服治疟疾，小儿惊风，衄血，血淋，扁桃体炎，咽喉肿痛，蛀牙痛。干用 1 钱 5 分~3 钱，鲜用 5 钱~1 两。外用：捣烂塞鼻治急性乳腺炎、敷蛇虫咬伤。



图19 天名精(菊科)

Carpesium abrotanoides Linn.

天 南 星

别名 南星 独角莲 野芋头

植物形态 原植物为拟天南星。多年生草本。地下块茎扁球形，须根从上部生出，有膜质鳞叶。块茎上抽叶1片，有淡绿色或红色的柄；叶片掌状全裂，裂片通常排列于一侧，披针形。花茎直立，顶生肉穗状花序，外被大佛焰苞，苞片开展部分向前弯曲。浆果熟时鲜红色。花期5~6月。（图20）

生长环境 生阴湿地，通常在林下可见到。

采收加工 块茎及叶供药用。8~10月间采挖块茎，去掉叶柄残基及须根，用明矾水浸泡至白色，搓去外皮，晒干。叶生长期随时可采。

〔附注〕 东北天南星有小叶5片，块茎也供药用。

性味功能 苦辛，温，有毒。燥湿化痰，祛风定惊，消肿散结。

临床应用 制南星煎服治中风，风痰眩晕，惊痫，破伤风。干用8分~1钱5分。外用：生南星研末止外伤出血；和五倍子、白蜜熬膏治痈肿搭背。叶捣涂毒蛇咬伤。



图20 拟天南星(天南星科)

Arisaema ambiguum Engl.

天 浆 壳

别名 大萝藦子 鹤光瓢 鹤瓢棵 针线包 婆婆针线包

植物形态 原植物为萝藦。多年生缠绕草本，有白浆。叶对生，卵状心脏形，上面绿色，下面粉绿色，有长柄。花序腋生，花白色，带有紫红色斑。果实纺锤形，表面光滑或有小凸点。种子顶端具白色光亮绒毛。花期 8 月，果期 9 月。（图 21）

生长环境 野生于山坡、田野、路边草丛中。

采收加工 果实及种子的绒毛供药用。9~10 月果实成熟时采收，鲜用，或沿裂缝剥开将果壳及种子上的绒毛分别晒干。

性味功能 咸，平。清肺化痰，止血。

临床应用 干果壳煎服治肺风痰喘，每用 2~4 钱。鲜果捣烂或用干果内种子绒毛敷外伤出血。




图21 萝 藦(萝藦科)

Metaplexis japonica (Thunb.) Mak.

木 防 己

别名 青藤根 小葛藤 难尿个子 葛条

植物形态 缠绕藤本。小枝有细槽与柔毛。叶通常卵圆形或卵状长圆形，全缘或有3裂，中裂较长，两面都有柔毛。圆锥状花序腋生。花细小，绿色。花期7~8月。（图22）

生长环境 生於山坡或路旁，通常缠绕于它植物上。

采收加工 根部供药用。7~8月采收，洗净，晒干。

性味功能 苦辛，寒。祛风行水，泻下焦湿热。

临床应用 煎服治水肿，腹胀，湿热脚气，手足挛痛，癣疥疮肿。干用1钱5分~3钱。与鸡蛋同煮服治乳腺炎。



图22 木防己(防己科)

Cocculus trilobus (Thunb.) DC.

凤 尾 草

别名 井口边草 风尾蕨

植物形态 多年生草本。根茎粗壮，密生线状披针形的黑褐色鳞片。叶丛生，有长叶柄；叶片1~2回羽状分裂，羽片四对或更多，最先端的一张羽片延长成尾状，下部羽片常再分裂，叶柄的上段有叶状的翼存在。（图23）

生长环境 生于阴湿岩石下、墙壁、井边或溪涧旁石隙中。

采收加工 全草供药用。6~7月拔取全草，除去泥沙须根，充分晒干。

性味功能 淡，平。清湿热，利小便，止血，消肿，解毒。

临床应用 煎服治痢疾，小便淋痛，白带，咽喉肿痛，吐血，衄血，便血。鲜用1~2两。外用：捣敷肿痛，疔疮。



图23 凤尾草(水龙骨科)

Pteris multifida Poir.

车 前 草

别名 打官司草 牛舌头子 猪耳朵棵子
猪耳边子 牛舌草 牛耳朵棵

植物形态 多年生草本。根须状。叶由基部丛生，叶片广卵形，较肥厚，大都全缘，有主脉5~7条。花茎自叶丛中抽出，具浅槽。花小，排成穗状花序。果实成熟时上端横裂，种子细小，黑褐色。花期8~9月。（图24）

生长环境 生於园地、荒地或路旁。

采收加工 全草及种子供药用。8~9月间种子成熟时，割下果序，放匾内晒干，使种子脱落，收集种子。全植株生长期随时采收，鲜用或晒干。

性味功能 甘，寒。利水，清热。

临床应用 全草：煎服治急性肾炎，乳糜尿，小便不通，血尿，黄疸型肝炎，水肿，热痢，泄泻，淋浊，白带。鲜用2~3两。外用：叶与毛茛捣敷“内关”穴发泡，治急性肾炎。种子兼治目赤肿痛，有明目之功。



图24 车前草(车前科)

Plantago asiatica Linn.

乌 柏 叶

别名 柏油树叶 木君子叶 檉树叶

植物形态 原植物为乌柏。落叶乔木，高达15米，有乳汁。单叶互生，斜方形或斜方状卵形，全缘，上面光滑无毛，下面初时粉白，后渐成黄绿色，无毛，叶柄细长，先端有腺体1对。小花集成顶生穗状花序。花期6月。（图25）

生长环境 栽培或野生於丘陵、山地。

采收加工 叶及根皮供药用。生长期均可采收晒干（冬季用根）。

性味功能 苦，微温。清热解毒，通利二便，渗湿杀虫。

临床应用 煎服治大小便不通，血吸虫病。鲜用3~5钱。捣汁饮治疗肿。外用：研末敷或煎水洗湿疮，脚癣，蛇咬伤。




图25 乌 柏(大戟科)

Sapium sebiferum Roxb.

乌 菝 莓

别名 老鸦眼睛 乌龙草 五爪龙 五爪金龙草

植物形态 蔓生草本。茎有卷须。掌状复叶，有小叶 5 片，中间小叶片较大，两侧小叶片较小，成对着生於同一小叶柄上。花序腋生，花黄绿色。果实倒圆卵形，成熟时黑色。花期 6 月。
(图 26)

生长环境 野生于荒地、路旁、山坡、墙边。

采收加工 根及全草供药用。4~10 月均可采收，鲜用或晒干。

性味功能 辛酸，寒。清热凉血，消肿，解毒。

临床应用 煎服治肺病吐血，痢疾，黄疸型肝炎，血尿，小便不利。干用 2~3 钱，鲜用 5 钱~1 两。和红花浸酒服，治风湿关节痛。外用：捣汁滴耳，治化脓性中耳炎。捣烂敷痈肿。



图26 乌莖莓(葡萄科)

Cayratia japonica (Thunb.) Gagn.

王不留行

别名 灯盏窝种子 大麦牛

植物形态 原植物为麦蓝菜。一年生草本。茎直立，圆柱形，节处略膨大，上部呈二叉状分枝。叶对生，卵状披针形或线状披针形，全缘，不具柄。疏聚伞花序顶生；花淡红色。果实广卵形，种子多数，球形，黑色。花期4~5月，果熟期6月。（图27）

生长环境 生于山野路旁及荒地，尤以麦田中为多。

采收加工 种子供药用。种子成熟时割取全株，置席上晒干，用手将种子揉出，扬去杂质。

性味功能 苦，平。行血气，通经络，下乳，消肿。

临床应用 煎服治经闭，倒经，乳汁不通，难产，血淋。干用1钱5分~3钱。或入丸散。孕妇忌用。外用：研末敷外伤出血，捣敷或煎汤热熨乳痈肿痛。



图27 麦蓝菜(石竹科)

Vaccaria pyramidata Medic.

白 芨

别名 白鸟儿头

植物形态 多年生草本。块茎肥厚肉质，扁平有分叉，上生线状须根。叶3~6片，阔披针形，全缘，基部有管状鞘，环抱茎上。总状花序顶生，有花4~10朵，花冠玫瑰紫色。花期4~6月。（图28）

生长环境 生于山谷潮湿处，或蔽阴的草丛中。

采收加工 块茎供药用。8~10月采挖，将挖出的块茎洗净，除去须根，水浸一小时后，穿草鞋踩去外皮，放入开水锅中，不断搅动4~5分钟，取出晒5~6小时，再擦除残余黄皮，继续晒干，或用微火焙干。

性味功能 苦，平。补肺，止血，消肿，生肌。

临床应用 研末服治肺病咳血，衄血，胃、十二指肠溃疡。每用1钱~1钱5分。外用：与煅石膏研末，敷外伤出血；与川乌头末纱布包裹塞阴道治子宫下垂。



图28 白 芨(兰科)

Bletilla striata (Thunb.) Reichb. F.

白 藜

别名 见肿消 一窝娘 箭猪腰

植物形态 多年生攀援藤本。地下有多数较粗大的块根。地上茎多分枝，幼枝光滑有细条纹，带淡紫色。卷须与叶对生。掌状复叶，互生，小叶3~5片，小叶片羽状分裂或羽状缺刻，叶轴上有阔翅，羽状裂片和叶轴相交接处有节；叶柄带淡紫色。花序与叶对生，花序梗长能缠绕，花小，淡黄色。花期5~6月。（图29）

生长环境 生长于山坡、荒地、原野路边，攀援于灌木或杂草上。

采收加工 块根供药用。10~12月掘取，不使残损，整串提起，洗净泥沙，纵切成3~5毫米薄片，充分晒干。

性味功能 苦，平。泻火，散结，解毒，生肌，止痛。

临床应用 煎服治温疟，血痢，便血，赤白带，女子阴中肿痛，小儿惊痫。干用3~5钱。外用：捣敷或研末调敷痈肿，搭背，疔疮初起，烫伤。




图29 白 藟(葡萄科)

Ampelopsis japonica (Thunb.) Mak.

白 毛 藤

植物形态 原植物为苦茄。多年生草本。茎细长，攀缘它物上升或蔓延，基部有时木质化；嫩茎有细软毛。叶互生，通常茎上部的叶全缘，中下部的叶片近叶基处3深裂，中间的裂片最大，两侧的小，两面都具有疏密不等的细软毛。花梗常与叶对生，花冠紫色或白色。花期8~10月。（图30）

生长环境 多生于山坡、丘陵或路旁杂草中。

采收加工 全草供药用。8~9月采收全草，晒干。

〔附注〕 白英形态与苦茄相似，在部分地区也作白毛藤使用。

性味功能 甘苦，寒。祛风利湿、清热解毒。

临床应用 煎服治风湿关节疼痛，水肿，淋病，化脓性骨髓炎。干用3~5钱，鲜用1~2两。外用：捣敷丹毒、疔疮。



图30 苦 茄(茄科)

Solanum dulcamara Linn.

白 头 翁

别名 老人发根 老冠花根 大将军草根

植物形态 多年生草本，全体密被白色绒毛。叶根生，具有长柄；叶片为3小叶的复叶，每小叶又作3深裂，裂片倒卵形，先端作不规则2~3浅裂。花顶生，紫色。果实密集成头状，上端具有不脱落密被长白毛的花柱，形似老翁的头发。花期3~4月。(图31)

生长环境 野生于山坡、山谷及田野。

采收加工 根部供药用。3~4月或7~9月，将根挖出，除去茎叶，去净泥土，保留根头部的白绒毛，晒干。

性味功能 苦，寒。清热，凉血。

临床应用 煎服治热毒血痢，温疟，鼻衄，痔血。每用3~5钱。外用：鲜者捣敷外痔肿痛。




图31 白头翁(毛茛科)

Pulsatilla chinensis (Bge.) Reg.

石 韦

别名 小石韦 七星剑

植物形态 多年生草本。根茎长而横走，被复披针形鳞片，褐棕色，边缘不整齐。叶疏生于根茎上，叶柄具星状毛，基部有关节；叶片披针形至卵圆状椭圆形，全缘，革质，中脉及侧脉明显，叶上面疏有黑点，无毛或疏被星状毛，叶下面全部着生孢子囊群。孢子期4~11月。（图32）

生长环境 附生于岩石或树干上。

采收加工 全草供药用。全年可采收，洗净晒干。

性味功能 苦甘，微寒。利水通淋，清肺泄热。

临床应用 煎服治小便不通，淋痛，崩漏。每用2~5钱。炒研末酒调服治搭背。




图32 石 韦(水龙骨科)

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell

石 打 穿

别名 石见穿 月下红

植物形态 原植物为紫参。一年或多年生草本。根须状，黄褐色。茎直立或基部倾斜，全株生有短柔毛或长柔毛。上部是单叶，下部是复叶，复叶由3张小叶组成，叶片卵圆形，边缘有圆锯齿或全缘，两面都有短柔毛。开小紫花，唇形，轮生于花轴上。花期7~9月。（图33）

生长环境 生长于山坡林下或路边。

采收加工 全草供药用。8~9月开花时拔取全草鲜用或洗净泥土晒干。

性味功能 苦辛，平。散瘀破结。

临床应用 煎服治食道癌，黄疸型肝炎，血痢，吐血，衄血，经闭，痛经，颈淋巴结核。干用5钱~1两，鲜用2~3两。煎服或捣敷治急性乳腺炎。




图33 紫 参(唇形科)

Salvia chinensis Benth.

石 芥 藜

别名 紫花草

植物形态 一年生草本。茎方形，多分枝，生有向下的柔毛。叶对生，有叶柄，叶片卵形，边缘有尖锯齿，两面均有金黄色腺点。花序顶生于枝梢，花冠淡紫色或红色。花期9~10月。
(图 34)

生长环境 生长于山坡树丛下及沟边。

采收加工 全草供药用。5~10月采全草鲜用或晒干。

性味功能 辛，温。燥湿止痒，化瘀通经。

临床应用 煎服治夏月发痧，呕吐泄泻；痛经，月经不调。干用1钱5分~3钱，鲜用5钱~1两。外用：捣敷肿痛；煎水洗荨麻疹、湿疹、疥疮；捣烂塞鼻治疟疾。



图34 石芥薺(唇形科)

Mosla punctata (Thunb.) Maxim.

艾 叶

别名 香艾 蒿子叶 家蓬头

植物形态 原植物为家艾。多年生草本。茎直立，具有白色细软毛，上部有分枝。茎中部的叶卵状三角形或椭圆形，有柄，羽状分裂，裂片椭圆形至椭圆状披针形，边缘有不规则的锯齿；上面深绿色，有腺点和极稀的白色绒毛，下面被有灰白色的绒毛；茎顶部的叶全缘，椭圆形、披针形或线形。头状花序，细小，排列成总状花丛。花期7~10月。（图35）

生长环境 多为栽培，或野生于山坡路旁。

采收加工 叶供药用。5~7月采收晒干。如捣杵成绒即针灸用艾绒。

性味功能 苦辛，温。理气血，逐寒湿，温经止血安胎。

临床应用 煎服治心腹冷痛，寒泻，便血，月经不调，崩漏带下，宫冷不孕，先兆流产。干用1~3钱。外用：烧灰吹鼻治鼻衄；煎水熏鹅掌风。



图35 家 艾(菊科)

Artemisia argyi Levl. et Vant.

瓜 萎

别名 药瓜 野苦瓜

植物形态 原植物为栝楼。多年生攀缘草本。块根肥厚，圆柱形，外皮灰黄色。茎细长，多分枝，光滑无毛。叶腋生卷须，先端2分叉。叶互生，近圆形或心形，通常5~7掌状深裂，裂片边缘有疏锯齿或作缺刻状，有叶柄。花冠白色，花瓣5深裂，裂片边缘再分裂成丝状。果实卵圆形或椭圆形，熟时橙黄色。种子多数，扁平。花期7~8月，果期9~10月。（图36）

生长环境 生于向阳山坡、山脚、石缝、田野、路边草丛中。

采收加工 果实及种子供药用。果实于9~10月采收，切开，取出果肉和种子，将果壳洗净，晒干。种子取出后放草木灰中，2日后，搓净果肉，洗净晒干。（根名天花粉，亦供药用。）

性味功能 甘苦，寒。润肺化痰，滑肠散结。

临床应用 煎服治痰热咳嗽，便秘，乳腺炎。干用3~5钱，鲜用1~2两。



图36 栝 楼(葫芦科)

Trichosanthes kirilowii Maxim.

半 夏

别名 老黄嘴 老鸦头 老人头 地星

植物形态 多年生草本。地下块茎球形或扁球形，下部生多数须根。叶由根茎上生出，为3小叶的复叶，中间小叶较大，叶柄长，叶柄下部内侧面生一白色珠芽。肉穗花序外有佛焰苞，花序顶端附属物呈鼠尾状。花期4~5月。(图37)

生长环境 生长于林下或桑田、豆田、果园地中。

采收加工 块茎供药用。6~7月采收块茎，放入缸中浸泡，擦去外皮，用明矾水漂净晒干。

〔附注〕 掌叶半夏，叶片掌状分裂，块茎亦供药用。

性味功能 辛，温。生者有毒。燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。

临床应用 煎服治呕吐反胃，咳喘痰多，胸膈痞满，眩晕，妊娠呕吐。干用2~3钱。外用：生半夏捣敷痈疽；塞鼻治急性乳腺炎。生半夏忌内服。



图37 半 夏(天南星科)

Pineellia ternata (Thunb.) Breit.

半 边 莲

别名 蛇草 细米草 蛇啄草

植物形态 多年生草本。植株矮小，基部匍匐，节上易生根。叶互生，稀疏排列，叶片狭披针形至线形，近于无柄。花单生于叶腋，花柄纤弱；花冠淡红色或淡紫色，上部5裂，偏向一边。花期4~5月。（图38）

生长环境 生长在路边、山坡、田边、河边潮湿的地方。

采收加工 全草供药用。5~9月拔取全株，洗净泥土，鲜用或晒干。

性味功能 辛甘，平。行水，消肿，散瘀，平喘，解毒。

临床应用 煎服治腹水，哮喘，疟疾，急、慢性肾炎。干用2~3钱，鲜用1~2两。捣汁饮并捣敷治毒蛇咬伤，痈肿疮疮。



图38 半边莲(桔梗科)

Lobelia chinensis Lour.

半 枝 莲

别名 牙刷草

植物形态 原植物为并头草。多年生草本。根须状。茎直立，方形，无毛，节明显。叶对生于节上，叶片卵形至披针形，边缘有波状疏锯齿，两面均无毛；叶柄短或近于无柄。花序顶生，每轮有花2朵，集成偏侧总状花序，如牙刷状。花冠青紫色。花期5~6月。（图39）

生长环境 生长于田埂边、池塘边及路旁潮湿处。

采收加工 全草供药用。5~6月开花时拔取全株，洗净，晒干。

性味功能 苦，微寒。破血通经，解毒。

临床应用 煎服治痛经，经闭，白带。干用2~3钱，鲜用5钱~1两。外用：和半边莲捣敷毒蛇咬伤。



图39 并头草(唇形科)

Scutellaria rivularis Wall.

平 地 木

别名 千年不大 千年不烂心

植物形态 原植物为紫金牛。常绿小灌木。体矮小，基部常生出匍匐枝，延伸繁殖，匍匐枝上生须根。叶通常3~7片，集生茎端，叶片椭圆形，边缘有尖锯齿，叶面绿色有光泽。花序着生于茎枝顶端的叶腋内，花冠青白色。核果球形，熟时红色，经久不落。花期8~9月，果期9~11月。（图40）

生长环境 多生于阴湿林下。

采收加工 全株供药用。7~8月采收全株，晒干。

性味功能 酸涩微苦，平。活血，祛瘀，解毒。

临床应用 煎服治黄疸型肝炎，肺痿咳嗽、吐血，痢疾，风湿痛，跌打损伤。干用2~3钱，鲜用5钱~1两。外用：捣敷肿痛。



图40 紫金牛(紫金牛科)

Ardisia japonica (Thunb.) Bl.

龙 须 草

别名 席草 灯心草

植物形态 原植物为拟灯心草。多年生草本。有短而粗壮的根茎。茎丛生，绿色，圆柱形，茎上无叶，有凸起的条纹，基部叶鞘红褐色，呈叶片状。花序侧生于茎顶，较灯心草为稀疏。花期5~6月。（图41）

生长环境 生在潮湿地区及沼泽、水沟、水田边缘。

采收加工 全草及根供药用。5~10月采收，鲜用或晒干。

性味功能 淡，平。渗湿热，利尿通淋。

临床应用 根及全草煎服治淋浊，乳糜尿，小便不利，风湿关节痛，鼻出血。干用1钱5分~3钱，鲜用1~2两；煎服代茶饮治牙痛动摇欲脱。



图41 拟灯心草(灯心草科)

Juncus setchuensis Buch.

var. *effusoides* Buch.

龙胆草

别名 水龙胆 山龙胆

植物形态 原植物为龙胆。多年生草本。根细圆柱状，丛生，表面淡棕色，味极苦。茎不分枝。叶对生，卵圆形至披针形，无柄，基部抱茎，有主脉3条。花冠钟形，蓝紫色。花期9~10月。（图42）

生长环境 山脚下、山坡、山谷潮湿处。

采收加工 根供药用。3~4月或6~7月都可采收。挖取根部，洗净阴干后，再充分晒干。

性味功能 苦，寒。泻肝胆实火，除下焦湿热。

临床应用 煎服治惊痫狂躁，热痢下血，胁痛。干用2~3钱，鲜用5钱~1两。研末服治伤寒发汗后盗汗不止；与黄连同研末羊肝蘸食治雀盲夜间视物不见；与苦参、牛胆制丸服治黄疸。外用：捣烂敷带状疱疹；捣汁点眼治夏月目涩；含漱止咽喉肿痛。




图42 龙胆(龙胆科)

Gentiana scabra Bunge

仙 鹤 草

别名 脱力草 黄龙尾 白牙蒿

植物形态 原植物为龙牙草。多年生草本。根黄褐色。羽状复叶互生，小叶片大小不等，顶端的小叶较中部的为大；托叶两片，抱茎，叶及托叶两面都有长白毛。总状花序生于枝的顶端；花黄色，细小。花期8~9月。（图43）

生长环境 多生于山坡、丘陵及田边草丛中。

采收加工 全草供药用。6~9月割取地上部分或拔取全草晒干。

性味功能 苦涩，微温。收敛止血，补虚。

临床应用 煎服治咯血，吐血，牙龈出血，便血，赤白痢疾，崩漏，白带，小儿疳积。干用2~4钱，鲜用1~2两。研末服治消化道溃疡。外用：捣敷痈肿，外伤出血；塞鼻治疟疾。



图43 龙牙草(蔷薇科)

Agrimonia pilosa Ledeb.

百 部

别名 百部袋 一窝虎

植物形态 原植物为直立百部。多年生草本。块根肉质，纺锤形，数个至数十个簇生。茎直立，不分枝，全体平滑无毛。叶通常3~4片轮生，卵形至椭圆形，全缘，叶脉3~5条，基出，中间3脉明显，背面突起，两边2脉接近叶缘。花淡绿色，多数生在茎下部鳞片状的叶腋间。花期4~5月。（图44）

生长环境 野生于山坡或树林下草丛中。

采收加工 根部供药用。3~4月或9~11月采收。将根挖出后去根须及茎叶，洗净，置沸水中浸烫片刻后晒干。

性味功能 甘苦，微温。温润肺气，止咳，杀虫。

临床应用 煎服治寒嗽，暴咳，肺癆咳嗽，百日咳，蛔虫，蛲虫。每用2~3钱。炒焦浸酒饮治皮肤疥癣。外用：煎汤洗可治头、身虫虱。




图44 直立百部(百部科)

Stemona sessilifolia (Miq.) Fr. et Sav.

羊 蹄

别名 土大黄 牛舌头草

植物形态 多年生草本。地下根粗壮，黄色。茎直立，表面有条纹，节明显，有一层薄膜包围着。根生叶丛生，有长柄，叶片长椭圆形，基部圆形，边缘呈波状；茎生叶小，柄亦短。总状花序生于茎的顶端，花被淡绿色或紫绿色。花期4~5月。（图45）

生长环境 生于田边、路旁、山坡、林缘或湿地。

采收加工 根或全草供药用。全年可采收，晒干或鲜用。

性味功能 苦，寒。清热，通便，利水，杀虫。

临床应用 煎服治大便燥结，淋浊，黄疸，肠风。干用3~5钱，鲜用1两。浸酒服治痛痹。外用：研末醋调涂擦秃疮；捣汁，和明矾末或轻粉涂治癣疮；和猪油、食盐涂治疥疮；捣敷疔疮、肿毒。



图45 羊蹄(蓼科)

Rumex japonicus Meisn.

红 藤

别名 活血藤

植物形态 原植物为大血藤。落叶藤本。茎长可达10余米，圆形，有条纹，外皮红褐色。叶互生，3出复叶，中央1片小叶菱状倒卵形至椭圆形，两侧小叶片较中央小叶片为大，斜卵形，基部甚偏斜，全缘。花序生于叶腋，有细长的花梗，花黄色，有香气。花期3~4月。（图46）

生长环境 生于阴蔽潮湿的疏林中或溪边，常攀援于其它植物上。

采收加工 茎供药用。8~10月割取茎叶晒干，除去叶片，扎成把。

性味功能 苦，平。祛风通经络，利尿，杀虫。

临床应用 煎服治急性阑尾炎，风湿关节痛，麻风，淋病，蛔虫腹痛。干用3~5钱，鲜用1~2两。



图46 大血藤(大血藤科)
Sargentodoxa cuneata (Oliver)
Rehd. et Wils.

地 榆

别名 一枝箭 紫朵苗根 小紫草根 包头花根

植物形态 多年生草本。根粗壮，纺锤形或细长圆柱形，外皮暗棕色或红棕色。茎有棱沟，带紫红色。羽状复叶互生，基生叶有长柄，茎生叶近于无柄，基部两侧有托叶 1 对抱茎；小叶 5~19 片，大小不等，叶缘有尖圆锯齿。穗状花序圆柱状，密生紫色小花。花果期 6~9 月。（图 47）

生长环境 多生长于山地丘陵。

采收加工 根供药用。全年都可采收，一般以 4~9 月采挖较多。除去茎叶，将根洗净，整根或切成片段，晒干。

性味功能 苦酸，寒。凉血止血，清热解毒。

临床应用 煎服治肠风便血，血痢，血崩，疟疾。干用 3~5 钱，鲜用 1~2 两。和菝葜根浸酒服，治风湿关节疼痛。外用：研末麻油调敷治烫伤，带状疱疹。



图47 地 榆(蔷薇科)

Sanguisorba officinalis Linn.

地 锦 草

别名 铺地锦 红丝草 奶汁草

植物形态 一年生匍匐小草本。全草有白浆，秋季茎叶呈紫红色。根须状。茎纤细，平铺地面，绿色或带紫红色。叶对生，叶柄很短，叶片长圆形，绿色或带淡红色，先端钝圆，基部不等大。夏末秋初开淡红色小花。（图 48）

生长环境 多生于荒地、路边、田野、屋边及多石砾的山坡。

采收加工 全草供药用。5~9月均可采收，鲜用或洗净晒干。

性味功能 辛，平。凉血，止血，利湿，解毒。

临床应用 研末或煎服治血痢，血淋，血崩，黄疸型肝炎。干用2~4钱，鲜用5钱~1两。与鸡蛋煮服治乳痈；与猪蹄同煨食通奶汁；与猪肝蒸食治小儿疳积及结合膜炎。外用：捣敷痈疮疗毒，疥癣，跌打损伤，蛇虫咬伤。



图48 地锦草(大戟科)

Euphorbia humifusa Willd.

西 河 柳

别名 山川柳 观音柳

植物形态 原植物为柽柳。落叶灌木或小乔木，高可达5米。枝密生，绿色或带红色，细长，常下垂。叶互生，极小，鳞片状，卵状三角形，顶端渐尖，基部鞘状抱茎，无柄。总状花序，集为疏散的圆锥花序；花小，白色至粉红色。花期7~9月。（图49）

生长环境 苏北海滨盐硷沙滩地上有野生，苏南各地均为栽培。

采收加工 带叶细嫩枝条供药用。6~8月间采收阴干，在阴干过程中应经常翻晾，以保持绿色。

性味功能 甘咸，平。解表，透疹，利水。

临床应用 煎服治麻疹难透，风疹身痒（亦可煎水洗浴），风湿骨痛。鲜用5钱~1两。麻疹已透及体虚汗多者忌服。



图49 桤 柳(桤柳科)

Tamarix chinensis Lour.

决 明 子

别名 草决明 马蹄子 喉白草子

植物形态 原植物为决明。一年生灌木状草本。茎上部多分枝。偶数羽状复叶互生，叶柄较粗，上面有沟，叶轴上在两小叶间有线形腺体；小叶3对，膜质，倒卵形或长圆状倒卵形，上面近无毛，下面被柔毛；托叶线状锥形，早落。花成对腋生，上部花聚生，花冠鲜黄色。荚果线形，近四棱形。种子略呈菱方形，一端平截，另一端渐尖，种皮黄绿色至棕色，平滑有光泽。（图50）

生长环境 为栽培植物。

采收加工 种子供药用。9~11月摘取成熟荚果，晒干，打出种子，簸去荚壳，晒至足干。

性味功能 咸，平。清肝益肾，祛风明目，润肠通便。

临床应用 煎服治肝热头痛，大便燥结。每用2~3钱。作丸散服治青盲内障，夜盲。外用：研末茶调敷两太阳穴治目赤肿痛。




图50 决 明(豆科)

Cassia tora Linn.

寻 骨 风

别名 猫耳朵 毛香 黄木香

植物形态 原植物为绵毛马兜铃。多年生草本，全株密被白色绵毛。茎呈攀缘状。叶互生，叶片卵状心脏形，全缘，两面密被白绵毛。花朵单生于叶腋，下部具有一叶状苞片，花被弯曲呈烟斗形，内侧黄色，中央紫色。花期7~8月。
(图 51)

生长环境 野生于山坡或向阳旷野草丛中及田岸旁。

采收加工 根及全草供药用。开花前采挖全株，晒干。

性味功能 苦，平。祛风通络。

临床应用 根浸酒服，治风湿关节痛；煎服治腹痛，疝气，睾丸肿痛。干用2~3钱，鲜用1两~1两5钱。外用：叶捣烂塞鼻，治疟疾。




图51 绵毛马兜铃(马兜铃科)

Aristolochia mollissima Hance

辛 夷

别名 木笔 紫玉兰

植物形态 原植物为木兰。落叶灌木或小乔木，高3~5米。干皮灰白色；小枝紫褐色。顶生冬芽卵形，外被有光泽的灰绿色毛茸。叶互生，有短柄，叶片椭圆形或倒卵状椭圆形，全缘。花单生于小枝顶端，于叶前开放或花叶同时开放，花冠外面紫红色，内面白色。花期2~5月。（图52）

生长环境 栽培于庭园中。

采收加工 花蕾供药用。在早春花蕾未开放时采摘，晒干。

性味功能 辛，温。散肺胃风热，通窍。

临床应用 煎服或研末服治头痛，齿痛，副鼻窦炎，鼻塞流涕。每用2~3钱。外用：塞鼻治慢性鼻炎。




图52 木 兰(木兰科)

Magnolia liliflora Desr.

牡 荆

别名 黄荆条子 荆条棵

植物形态 落叶灌木。枝叶有香味；小枝方形，密披褐色细毛。掌状复叶对生，有长柄；小叶5片，枝上端间或小叶3片，披针形，两边具粗锯齿5~6枚或全缘而稍呈波状；幼叶背面密被细白毛。圆锥花序顶生或腋生，花小，淡黄紫色。果实黑褐色。花期5~7月，果期8~10月。（图53）

生长环境 野生于山坡、路边、杂木林中。

采收加工 果实、茎叶及荆沥均供药用。8~9月间采收成熟果实，晒干，扬去灰屑。茎、叶生长期随时可采。荆沥：以鲜粗荆条截尺许长，架在两砖上，中间以慢火烧，等沥汁出时，两头以器皿盛之。

性味功能 果实：苦，温。退骨间寒热，通利胃气。茎叶：苦，寒。涩肠，杀虫。荆沥：甘，平。除风热，化痰涎，通经络，行气血。

临床应用 果实：煎服治咳嗽哮喘，胃痛，疝气，急惊风，白带。每用2~3钱。研末开水加酒调服治停乳奶胀。茎叶：和冰糖煎服治久痢。外用：捣敷或煎水洗，治趾缝湿痒。沥：内服治中风口噤，痰迷惊痢，头风，久痢。每服1匙，每日1~2次。外用：点目中治火眼。




图53 牡荆(马鞭草科)

Vitex cannabifolia Sieb. et Zucc.

苍 术

别名 茅术 京苍术

植物形态 原植物为茅苍术。多年生草本。地下根茎粗肥，外皮褐色，上生须根。茎下部木质化，上部有分枝，圆形而有纵棱。叶互生，带革质，下部叶多在花前期凋落，中部叶椭圆形或椭圆状披针形，不分裂，或有3~5羽状分裂，边缘有细齿状锯齿，上部叶渐小，披针形，无柄。头状花序，生于茎顶，花冠白色，有时稍带红紫色。花期8~10月。(图54)

生长环境 野生于山坡、丘陵草丛中。

采收加工 根茎供药用。4~10月采收，挖取根茎，除去须根，晒干或烘干。

性味功能 辛苦，温。健脾燥湿，解郁辟秽。

临床应用 煎服或研末服治食欲不振，胸痞腹胀，呕吐泄泻，痢疾，疟疾，感冒。干用1钱5分~3钱，鲜用5钱~1两。研末为丸服治风寒湿痹，足痿，夜盲。



图54 茅苍术(菊科)

Atractylodes iancea (Thunb.) DC.

苍 耳

别名 苍耳草

植物形态 一年生草本。茎直立，绿色或稍带紫色，有短硬毛。叶互生，有长柄，叶片三角状卵形或三角形，边缘有不规则的锯齿或3浅裂，两面都有短毛。头状花序腋生或顶生。果实包在纺锤形的总苞内，总包坚硬，有细毛和钩刺。花期7~8月，果期9~10月。（图55）

生长环境 生于平原或丘陵低地、田间、路旁或荒地上。

采收加工 茎叶、根及果实供药用。鲜植株随时采用。9~10月果熟后剪取果穗，晒干，打下果实（苍耳子）。

性味功能 果实：甘，温。茎叶：苦辛，微寒。均有小毒。发汗，散风，胜湿，杀虫。

临床应用 果实：煎汤或研末服，治风寒头痛，风湿关节痛，副鼻窦炎。每用2~3钱。茎叶：研末服治头晕，风疹块，痔疮便血。每用5分~1钱。外用：熬膏涂痈疽，搭背，疔疮；煎水洗并捣敷治蛇虫咬伤。根煎服治小儿泄泻。




图55 苍 耳(菊科)

Xanthium stumarium Linn.

芫 花

别名 老鼠花 大米花 闹鱼花 奶头草

植物形态 落叶小灌木。根多分枝，外皮红棕色。茎柔韧，亦多分枝，表面略带褐色，嫩时有光亮的短毛。叶对生，有时互生，叶片椭圆形，全缘，下面有光亮的短毛。早春开淡紫色花，3~7朵簇生于叶腋，花被筒形，先端四裂，花后生叶。花期4~5月。(图 56)

生长环境 生路旁、丘陵、山坡及林间。

采收加工 花及根皮供药用。3~4月，花半开放时择晴天采收晒干。8~9月采根洗净晒干。鲜根3~10月均可采用。

性味功能 辛苦，温。有毒。逐水，涤痰，解毒。

临床应用 花：煎服消胸中痰饮，水肿，咽喉炎；与鸡蛋煮食治深部脓肿及多发性脓肿。干用5分~1钱5分，鲜用3钱~5钱。外用：研末敷痈肿。根皮：与枣肉打饼服，治化脓性骨髓炎；捣烂纱布裹塞鼻，消急性乳腺炎。凡体虚及孕妇忌用。



图56 芫 花(瑞香科)

Daphne genkwa Sieb. et Zucc.

芫 荽

别名 香菜 香荽

植物形态 原植物为胡荽。一年生草本，全体无毛，有强烈香气。茎直立，有条纹，中空。叶具柄；初生的根生叶为1~2回羽状分裂，小叶片广卵形，扇形半裂；茎上部和下部的叶为2~3回羽状分裂，小叶片狭线形，全缘。复伞形花序顶生；花白色或淡紫色。果实近球形，光滑。花期4~7月，果期7~9月。(图57)

生长环境 为栽培植物。

采收加工 茎叶及果实供药用。8~9月采收成熟果实(荽荽子)，晒干，簸净。茎叶鲜用，生长期随时可采。

性味功能 茎叶：辛，温。发汗透疹，消食，解毒。果实：辛酸，平。功能同茎叶。

临床应用 茎叶：煎服治麻疹透发不快，食物积滞。鲜用1~2两。或捣汁服。若麻疹不透并非风寒外束而属热毒壅滞者忌用。外用：水酒各半煎汤熏洗，能透发麻疹；捣敷蛇咬伤。果实：研末服治赤白痢疾，肠风下血。干用1钱5分~3钱。外用：煎水含漱治牙痛。



图57 胡 荽(伞形科)

Coriandrum sativum Linn.

花 椒

别名 大花椒

植物形态 灌木或小乔木，有香气。枝条扩展，小枝微有细毛或无毛，刺粗大。小叶 7~11 枚，卵圆形至卵状椭圆形，边缘有细锯齿，平滑无毛，具半透明油点，叶轴与小叶背面中脉有刺。短圆锥花序。果实暗红色，种子黑色。花期 6~7 月，果熟期 9~10 月。（图 58）

生长环境 为栽培植物，亦有野生于山坡岩缝或杂木林下。

采收加工 果实供药用。成熟后采收晒干。

性味功能 辛，温。有小毒。温中，除湿，止痛，杀虫，解鱼腥毒。

临床应用 煎服治积食停饮，心腹冷痛，呕吐，呃噫，风寒湿痹，泄泻，痢疾，疝痛，脚气。每用 5 分~1 钱 5 分。或入丸散。外用：醋煎含漱治虫牙痛；煎水熏洗绣球风、阴道滴虫及漆疮作痛。



图58 花 椒(芸香科)

Zanthoxylum simulans Hance

麦 门 冬

别名 麦冬 书带草 野韭菜根

植物形态 原植物为沿阶草。多年生常绿草本。根须状，根间的部分或先端膨大，成纺锤状的肉质小块根。叶线状丛生，先端尖或渐尖，基部逐渐狭窄，形成叶柄状，边缘膜质。花茎由叶丛中抽出，开淡紫色小花，排成总状花序。花期7月。（图59）

生长环境 生于山坡草丛中或林下阴湿地。

采收加工 肉质小块根供药用。以5~7月挖采较好，将挖出的块根除去须根，洗净晒干。

性味功能 甘微苦，寒。清热润肺，养胃生津。

临床应用 煎服治肺热干咳，虚劳烦热，吐血，咯血，衄血，热病津伤，口干燥渴，糖尿病，便秘。干用3~5钱，鲜用1两5钱~3两。外用：捣汁滴耳治化脓性中耳炎。



图59 沿阶草(百合科)

Ophiopogon japonicus Ker.- Gawl.

佛 甲 草

别名 地蜈蚣草

植物形态 原植物为垂盆草。多年生富肉质草本。茎纤细，丛生，倾卧地面，着地的部分节节生根。叶三片轮生，倒披针形至长圆形，先端尖，多肉质。花茎直立，顶端分枝，疏生多数黄色小花。花期 6 月。（图 60）

生长环境 生于山坡岩石上或阴湿处。

采收加工 全草供药用。6~7 月采收，水烫后晒干。鲜植株 4~10 月均可采用。

〔附注〕 珠芽佛甲草亦有同样效用。

性味功能 甘，寒。清热，消肿，解毒。

临床应用 煎汤或捣汁服治咽喉肿痛，黄疸型肝炎，痢疾。鲜用 1~2 两。外用：捣敷痈肿，疔疮，丹毒，烫伤，毒蛇咬伤。



图60 垂盆草(景天科)

Sedum sarmentosum Bge.

苦 参

别名 野槐树根 地参

植物形态 落叶灌木，高1~3米。根黄色，味苦。小枝绿色，幼时有柔毛。叶互生，奇数羽状复叶，小叶5~10对，卵状椭圆形至披针形，全缘或波状。总状花序生于茎顶，花冠蝶形，淡黄白色。荚果线形，成熟时不开裂，种子间有缢缩。花期5~7月。（图61）

生长环境 生于山坡及丘陵地。

采收加工 根供药用。4~7月挖取根部，除去细根，洗净晒干。

性味功能 苦，寒。清热，燥湿，杀虫。

临床应用 煎服或作丸散服治热毒血痢，肠风下血，黄疸，赤白带下，皮肤搔痒，疥癬恶疮，阴疮湿痒，瘰癧。每用2~3钱。外用：煎水洗痔疮，肛门红肿脱出；研末掺治齿龈出血；油调敷烫伤。



图61 苦 参(豆科)

Sophora flavescens Ait.

鸢尾

别名 蓝蝴蝶

植物形态 多年生的宿根草本。根茎匍匐多节，节间短，浅黄色。单叶互生，叶剑形，春初抽出，成2行排列。花茎与叶等高，花序总状，花青紫色。花期4~5月。（图62）

生长环境 大多栽培。

采收加工 根茎供药用。8~9月采收，除去茎叶，洗净，晒干。

性味功能 辛苦，寒。有毒。消积破瘀，行水解毒。

临床应用 煎服治食滞胀满，症瘕积聚，水肿。每用3分~1钱。体虚者慎用。外用：捣敷肿毒。



图62 鸢 尾(鸢尾科)

Iris tectorum Maxim.

卷 柏

别名 九死还魂草 岩头松 还阳草

植物形态 多年生草本。主茎短，下部着生多数须根。分枝多而密，呈放射状丛生，各枝常为2歧，干后拳卷，密被复瓦状叶，叶小，交互排列。孢子囊穗着生枝端。（图63）

生长环境 生于山坡岩石上。

采收加工 全草供药用。全年都可采收，但以6~7月采收较好，洗净，晒干。

性味功能 辛，平。生用破血，炒炭用止血。

临床应用 煎服：生用治经闭，倒经，症瘕，跌打损伤。鲜用3~7钱。炒炭用治吐血，便血，尿血，子宫出血。每用1钱5分~3钱。外用：鲜叶捣敷烫伤。




图63 卷 柏(卷柏科)

Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring

贯 众

别名 管仲

植物形态 多年生草本。地下茎短，倾斜至直立，密被大鳞片。叶丛生，为一回羽状复叶；叶柄密被鳞片；小叶 10~20 对，具短柄或无柄，边缘有锯齿。孢子囊群多数生于小叶背面。（图 64）

生长环境 野生于树林下湿地、溪沟边及石隙中。

采收加工 根茎供药用。9~10 月采收，将根茎除去须根及大部分叶柄后晒干。

性味功能 苦，凉。杀虫解毒，清热止血。

临床应用 煎服治虫积，温热斑疹，吐血，鼻血，便血，血痢，崩中，带下。每用 3~5 钱。或入丸散。



图64 贯 众(叉蕨科)

Cyrtomium fortunei J. Sm.

虎 杖

别名 斑根 紫金龙 活血丹

植物形态 多年生灌木状草本。根茎横卧地下，木质，外皮黄褐色。茎丛生，直立或倾斜，有分枝，表面光滑无毛，散生多数红色或带紫色的斑点。叶互生，阔卵形或近圆形，全缘或为不规则深波状起伏；托叶成短鞘，膜质，褐色，有时脱落。花序生于叶腋，花小，白色。花期 6~7 月。
(图 65)

生长环境 多生于山坡、山麓及溪谷两岸灌木丛中，也有生于沟边及路旁草丛中。

采收加工 根茎供药用。9~10 月挖 3 年以上的老根茎，洗净，切成薄片晒干。

性味功能 苦，微温。破瘀，祛风湿，通经络。

临床应用 研末酒冲服治经闭，产后瘀血不行，每服 1~2 钱；蜜丸服治痔疮便血；浸酒饮治风湿关节痛。小便不禁及孕妇忌用。外用：煎水浸洗跌打损伤。




图65 虎 杖(蓼科)

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

虎 耳 草

别名 金丝荷叶 石荷叶 金线吊芙蓉

植物形态 多年生常绿草本。须根很多。匍匐枝如丝状，赤紫色，枝端可生幼苗。叶丛生，圆形或肾形，肉质而厚，边缘有不规则的圆锯齿，叶片上面深绿色，密生长刚毛，沿叶脉处常有白色斑纹，下面带紫色，无毛，密布小圆点；叶柄长，密生长毛。（图 66）

生长环境 喜生於阴湿处及石隙间。

采收加工 全草供药用，以叶为主。四季均可采收。

性味功能 辛微苦，寒。有小毒。祛风，清热，解毒。

临床应用 煎服治风疹块，丹毒，肺热咳嗽吐血，肺脓肿。干用 1 钱 5 分～3 钱。外用：捣汁滴耳治化脓性中耳炎；煎水熏洗痔疮肿痛。




图66 虎耳草(虎耳草科)

Saxifraga stolonifera (L. f.) Meerb.

泽 兰

别名 地藕 桔子 金马兰 节节高 地瓜儿苗

植物形态 原植物为地笋。多年生草本。地下根茎横走，稍肥厚，白色。茎方形，节上有长硬毛。单叶对生，无柄或近于无柄，叶片披针形或线状披针形，边缘具三角状尖锯齿，上面有短柔毛，下面有腺点。花轮生於叶腋，花冠白色，钟形。花期 8~10 月。（图 67）

生长环境 生於山野低洼或潮湿地区。

采收加工 全草供药用。4~5 月开花时采收，洗净，晒干。

性味功能 苦辛，微温。活血，行水。

临床应用 煎服治经闭，经行腹痛，产后瘀滞腹痛，身面浮肿。干用 1 钱 5 分~3 钱。外用：捣敷疮肿及损伤瘀肿。




图67 地 笋(唇形科)

Lycopus lucidus Turcz. var. *hirtus* Regel.

泽 漆

别名 猫儿眼 五灯头草 乳浆草 五点草
五星草

植物形态 一年生或二年生草本。全草有白浆，全体光滑无毛，略带肉质。茎通常由基部分枝，稍倾斜，下部带紫红色。茎中、下部叶互生，倒卵形或匙形，先端微凹；顶端5叶轮生，其上有5个花枝，排成伞形，每枝再分3小枝，每小枝又分2~3小枝，多数小枝分叉之处轮生3叶，最后分出的小枝顶端着生黄绿色花序。花期4~5月。（图68）

生长环境 多生于荒地、路旁或田坎上。

采收加工 全草供药用。4~5月开花时拔取全草，晒干。

性味功能 苦，微寒。行水，消痰。

临床应用 煎服治水肿，痰饮咳喘，疟疾，脚气。干用1钱5分~3钱。或入丸散。外用：熬膏涂搽颈淋巴结核；捣烂开水泡汁含漱治牙痛；研末香油调搽癬疮。



图68 泽 漆(大戟科)

Euphorbia helioscopia Linn.

青 蒿

别名 黄香蒿 苦蒿 臭蒿

植物形态 原植物为黄花蒿。一年生草本，全体近于无毛，叶研碎后有气味。茎直立，有纵浅槽，幼时绿色，老时变为黄褐色，下部木质化，上部多分枝。叶互生，2~3回羽状深裂，小裂片狭窄如线，上面绿色，下面黄绿色，有柄；茎上部叶渐小，无柄。头状花序，球形，黄绿色。花期8~10月。（图69）

生长环境 多生于荒地路旁及山顶石缝中。

采收加工 全草供药用。9~10月开花结实时采收，割取地上部分，晒干。

性味功能 苦微辛，寒。清暑气，除蒸热。

临床应用 煎服治伤风感冒，骨蒸烦热，疟疾，黄疸型肝炎，痢疾。干用2~3钱，鲜用1~2两。外用：煎水洗疥疮瘙痒。



图69 黄花蒿(菊科)

Artemisia annua Linn.

青 木 香

别名 天仙藤根 野木香根 马兜铃根 三百两银药

植物形态 原植物为马兜铃。多年生缠绕草本，全体光滑无毛。单叶互生，叶片长椭圆状心脏形，全缘，叶基两侧突出呈圆耳形。7、8月间开花，花朵单生于叶腋，暗紫色。果实近圆形，10月成熟，熟时裂开。种子三角形，扁平，有翅，膜质。（图70）

生长环境 生长于山坡阴湿处、山谷、沟边及路旁。

采收加工 根供药用。全年都可采收，以5~10月为适宜，挖出后洗净晒干。（茎名天仙藤，果实名马兜铃，均供药用。）

性味功能 辛苦，寒。理气，止痛，解毒。

临床应用 煎汤或研末服，治胸腹胀痛，疝气。干用2~3钱，研末5分~1钱。浸酒服治风湿关节疼痛。外用：捣敷或磨汁涂痈肿热毒，疔疮。治毒蛇咬伤，可内服与外敷并用。



图70 马兜铃(马兜铃科)

Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.

金 针 菜

别名 黄花菜

植物形态 原植物为萱草。根丛生，黄色条状，根端肥大成纺锤形。叶片呈长线形，有棱脊，下部重迭，至上方渐次开展。花茎较叶为长，顶端二歧，有花6~12朵，呈橙红色或黄红色。花期6~7月。（图71）

采收加工 花及根供药用。花名金针菜，在花期采收晒干。根名萱草根，8~9月采收，洗净晒干。

性味功能 甘，凉。花：利湿热，宽胸膈。根：清热，利水，止血。

临床应用 花：煎服治小便赤涩，黄疸，胸膈烦热，夜少安寐，乳汁不下。干用2~3钱，鲜用5钱~1两。根：煎服治水肿，小便不通，鼻衄，便血。干用3~5钱。



图71 萱草(百合科)

Hemerocallis fulva Linn.

金 荞 麦

别名 铁脚将军草

植物形态 原植物为野荞麦。多年生草本。根茎较粗壮，外皮棕褐色，有多数须根。茎直立，绿色或紫红色，圆柱形，有沟槽。叶互生，叶片三角形，基部心脏形或戟形；托叶鞘状膜质。总状花序，生于叶腋或枝顶，花小，白色。果实三棱形。花期 9~10 月。（图 72）

生长环境 家种。

采收加工 根及根茎供药用。春季出芽前或秋季果熟后采收，鲜用或晒干。

性味功能 酸苦，平。清热解毒。

临床应用 煎服治肺脓肿，肺炎，喉风，扁桃体炎。鲜用 5 钱~1 两。外用：捣敷痈肿，疮毒，颈淋巴结核，蛇虫咬伤。




图72 野荞麦(蓼科)

Fagopyrum cymosum Meisn.

金 银 花

别名 双花 二宝花

植物形态 原植物为忍冬。多年生半常绿缠绕灌木。茎中空，多分枝，褐色，小枝密被短柔毛。叶对生，叶片卵圆形或长卵圆形，全缘。花成对生于叶腋，初开时为白色，后变黄色，有时带紫斑，很香。花期4~6月。（图73）

生长环境 生于山坡、林边，多缠绕树上，也有栽培于篱笆旁。

采收加工 花供药用。5~6月在晴天早晨露水刚干时，摘取未开放的花蕾，晾干，不可烈日曝晒，要常翻动，否则容易变黑。（茎叶名忍冬藤，亦供药用）。

性味功能 甘，寒。清热解毒。

临床应用 煎服治温病发热，热毒血痢，痈肿疮毒，痔疮，颈淋巴结核。干用3钱~1两。外用：煎水洗湿疹，乳头破裂。



图73 忍 冬(忍冬科)

Lonicera japonica Thunb.

金 樱 子

别名 糖罐子 野石榴 糖桔子 刺梨子

植物形态 常绿攀援灌木。茎红褐色密布细刺。复叶互生，具3小叶，托叶线状披针形；小叶有短柄，椭圆状卵形至卵状披针形，边缘具细锐锯齿。花白色，有香气，单生于新枝顶端。成熟果实桔红色，倒卵形，略似花瓶，外有刚毛。花期5~6月，果期9~10月。（图74）

生长环境 生长于向阳山坡草丛中或山坡路旁。

采收加工 果实及根供药用。10~12月果实成熟变红时采收，晒干，擦去表面针刺。根全年可采收，洗净晒干。

性味功能 果实：酸涩，平。固精涩肠，缩尿止泻。根：性味同果实。止血，杀虫。

临床应用 果实：煎服治滑精，遗尿，小便频数，脾虚泻痢，肺虚咳喘，自汗，盗汗，崩漏，带下。干用1钱5分~3钱。或入丸散，或熬膏。有实火邪热者忌服。根：煎服杀蛲虫，治子宫脱垂。根皮炒用，止便血，滑痢，崩漏，带下。




图74 金樱子(蔷薇科)

Rosa laevigata Michaux

板 蓝 根

别名 大青根

植物形态 原植物为菘蓝。二年生草本。主根深长。茎上部多分枝,光滑无毛,多少带白粉状。叶互生,根生叶长椭圆形,具柄;茎生叶披针形,无柄,半抱茎。圆锥花序,花黄色。花期5月。(图75)

生长环境 为栽培植物。

采收加工 根及叶供药用。根名板蓝根,10~11月挖取,洗净晒干。叶名大青叶,1年分5月中旬、6月下旬、8月3次收割,洗净晒干。

性味功能 苦,寒。清热,解毒,凉血,止血。

临床应用 根:煎服或打汁服治热毒发斑,丹毒,大头瘟,咽喉肿痛,疔腮,吐血,鼻血,急性黄疸型肝炎;与羌活同用治流感。干用3~5钱,鲜用1~3两。叶:功用与板蓝根同。



图75 菘 蓝(十字花科)

Isatis tinctoria Linn.

河 白 草

别名 刺犁头 杠板归

植物形态 原植物为贯叶蓼。攀援性草质藤本，全体无毛。茎绿色带红，有棱，棱上有倒生的钩状刺。叶互生，有长柄；叶片三角形，质柔嫩淡绿色，通常叶柄及下面叶脉上都有倒钩刺；托叶鞘呈叶状，圆形或卵形，包茎。短穗状花序，顶生或腋生，花小，白色或淡红紫色。花期 6~8 月。（图 76）

生长环境 生长于山沟、屋旁、路边草丛中。

采收加工 全草供药用。6~8 月间采收，晒干。

性味功能 酸苦，平。利水消肿，散瘀解毒。

临床应用 煎服治肾炎水肿，黄疸，痢疾，疟疾，淋病，喉痹，肺痈。干用 3~5 钱，鲜用 7 钱~1 两 5 钱。外用：捣敷丹毒，毒蛇咬伤，亦可煎水熏洗水肿。




图76 贯叶蓼(蓼科)

Polygonum perfoliatum Linn.

鱼腥草

别名 脚臭草

植物形态 原植物为蕺菜。多年生草本，全株有腥臭。3~4月生长的茎叶全为紫色，下部的茎匍匐，节上生须根，上部的茎直立。叶互生，有柄和托叶，叶片心脏形，全缘，下面带紫红色。穗状花序生于茎顶，总苞4片白色；小花密集成圆筒形。花期5~8月。（图77）

生长环境 生于阴湿地区，如山谷、溪沟边缘和林下。

采收加工 带根全草供药用。7~9月采收全草，晒干。

性味功能 辛，微寒。清热解毒，消肿。

临床应用 煎服或捣汁饮，治肺脓肿，咳吐脓血，急性阑尾炎。干用3~5钱，鲜用1~2两。外用：捣敷痈肿；和毛茛同捣敷脉搏处，治急性肾炎；煎水洗湿疹，疥疮。



图77 蕺菜(三白草科)

Houttuynia cordata Thunb.

刺 果 甘 草

别名 马狼桔 胡苍耳 马兰杆子

植物形态 多年生草本。基部木质化，茎、枝有棱，全体被鳞片状黄色腺体。叶为奇数羽状复叶，小叶4~6对，阔披针形或卵圆状矩形，中脉突出于叶片顶端，成为短尖。总状花序，较叶短。荚果褐色，表面有刺。花期6~7月。（图78）

生长环境 生长于苏北田边、河边、堤岸上的草丛中。

采收加工 根部供药用。全年可采收，挖起根部，洗净晒干。

临床应用 外用：煎水熏洗治阴道滴虫病。



图78 刺果甘草(豆科)

Glycyrrhiza pallidiflora Maxim.

香 附

别名 三棱草根 香附子 蓑衣草根 沙葶
芥

植物形态 原植物为莎草。多年生草本。根茎匍匐，并生有暗褐色膨大的块茎，有香气，块茎的节明显，上有紫棕色毛须。茎三棱形。叶线形，与茎等长，或比茎稍长。（图 79）

生长环境 生于田埂、田坎及田间，为田野间常见的杂草。

采收加工 块茎 供药用。4~9 月采收，以 8~9 月采挖的较好。将块茎洗净，用微火燎去须毛，晒干。

性味功能 辛苦甘，平。理气解郁，止痛调经。

临床应用 煎服治胸闷腹胀，停食，停痰。干用 2~3 钱，鲜用 5 钱~1 两。研末服治崩漏，月经不调，产后血晕，乳痈，痈肿，瘰癧，疝气，耳聋，中耳炎。



图79 莎 草(莎草科)

Cyperus rotundus Linn.

草 乌

别名 小脚乌

植物形态 原植物为乌头。多年生草本。地下有块根，主根倒圆锥形，表面棕黑色，多皱缩。茎直立，无毛。单叶互生，叶片掌状3深裂，每裂片又2~3深裂，下部的叶有柄，上部的叶近于无柄，质稍厚，表面有光泽。总状花序顶生或腋生，花冠鲜蓝色。花期9~10月。（图80）

生长环境 野生于山坡或路旁草丛中。

采收加工 根部供药用。6~8月采收。剪去茎叶和细根，洗净晒干。

性味功能 辛，热。有大毒。搜风，燥湿，祛寒，消痰，通络。

临床应用 煎服或研末服治风寒湿痹，中风瘫痪，心腹冷痰，肠腹疝痛，偏正头痛，破伤风。煎服每用5分~1钱5分。一般炮制后用，煎药时间宜长，生者禁内服。外用：醋磨涂痈肿恶疮。



图80 乌 头(毛茛科)
Aconitum chinense Paxt.

茜 草

别名 红茜根 铁血藤 活血草 四轮草

植物形态 多年生草本，茎蔓延攀援生长。根丛生，细长圆柱形，外皮黄赤色，断面红色或淡红色。茎有纵棱，棱上有倒生的刺。叶4片轮生，有长叶柄，叶片三角状卵形，全缘，有主脉3~5条，叶柄和叶背面的主脉上都有倒刺。9~10月开多数淡黄色小花。（图81）

生长环境 野生于山坡岩石旁或沟边草丛中。

采收加工 根供药用。4~5月可开始采收，但以9~12月采收的质量为好。将采挖的根洗净，晒干。

性味功能 苦，寒。行血止血，消炎，通经络。

临床应用 煎服治吐血，衄血，血尿，便血，血崩，经闭。干用3~5钱，鲜用1两5钱。浸酒服治风湿关节疼痛、跌打损伤。



图81 茜 草(茜草科)

Rubia cordifolia Linn.

茵 陈 蒿

别名 猴子毛 绵茵陈 绒蒿

植物形态 多年生草本。茎直立，幼枝有细软毛，老后脱落。幼枝上的叶有柄，2~3回羽状深裂，小裂片线形，灰绿色，两面密被绵白毛；成熟枝或花枝上的叶，无毛无柄，1~2回羽状分裂，裂片线状，黄绿色，基部抱茎。头状花序黄绿色，形小多数。花期9~11月。（图82）

生长环境 多生于山坡、路边、河岸沙砾地带。

采收加工 幼株供药用，以茎叶为主。3~4月采收幼株，晒干。

性味功能 苦微辛，寒。清湿热，利尿。

临床应用 煎服治黄疸型肝炎，身热小便不利。干用5钱~1两，鲜用2~3两。



图82 茵陈蒿(菊科)

Artemisia capillaris Thunb.

荔枝草

别名 蛤蟆草 癩枯草 沟香薷 雪见草
臃胀草

植物形态 二年生草本。有黄白色须根，头一年只有丛生的根生叶，长椭圆形，叶面有显著皱缩；第二年4月间抽茎，茎方形，有槽，多分枝。茎生叶对生，长卵圆形。花序从叶腋及顶端生出，小花多数，淡紫色，有特殊气味。花期4~5月。（图83）

生长环境 多生长于河边、荒地及路旁。

采收加工 第一年生全草供药用。3~4月未开花前采收全草，鲜用或洗净晒干。

性味功能 辛，凉。凉血，祛瘀，消肿，解毒。

临床应用 捣汁服治咽喉红肿疼痛，扁桃体炎；煎服治膀胱结石，急性肾炎，妇女崩漏。鲜用1~2两。外用：捣敷痈肿，搭背，毒蛇咬伤。



图83 荔枝草(唇形科)

Salvia plebeia R. Br.

珍珠菜

别名 红梗草

植物形态 一年生草本。茎直立。单叶互生，卵状椭圆形或阔披针形，边缘稍向下卷，两面具疏毛及黑色斑点。总状花序顶生，花白色。花期4月。（图84）

生长环境 野生在山坡、路旁及溪边草丛中。

采收加工 根或全草供药用。秋季采收，洗净晒干。

性味功能 辛，温。利水消肿，活血调经，解毒。

临床应用 煎服治水肿，跌打扭伤，月经不调，白带，小儿疳积。干用3~5钱。外用：煎水洗脚肿；捣敷蛇咬伤。



图84 珍珠菜(报春花科)

Lysimachia clethroides Duby.

枸 杞 子

别名 狗奶子 枸杞头子

植物形态 原植物为枸杞。落叶灌木。枝弧垂或匍匐，有短刺或无刺。叶互生，有短柄，叶片近倒卵形至卵状披针形，全缘。花簇生于叶腋，花冠紫色。浆果鲜红色，卵形或长卵形。花期 9 月，果熟期 10 月。（图 85）

生长环境 野生于路旁或山石缝中。

采收加工 果实及根皮供药用。果实名枸杞子，成熟后采收晒干。根皮名地骨皮，常年可采，将鲜根洗净，用刀割裂后剥下根皮，晒干。

性味功能 果实：甘，平。滋肾，润肺，补肝，明目。根皮：苦，寒。凉血，泻火，清肺，除骨蒸。

临床应用 果实：煎服治肝肾阴亏，腰膝酸软，头晕目眩，目昏多泪，虚劳咳嗽，消渴，遗精，血虚经闭。干用 2~4 钱。亦可熬膏，浸酒。根皮：煎服治咳血，烦热消渴，虚劳骨蒸多汗，口舌糜烂，小便出血。干用 3~8 钱。外用：煎水加食盐少许洗火眼；醋煎含漱治虫牙痛；煎水熏洗妇女阴肿或生疮。



图85 枸 杞(茄科)

Lycium chinense Miller

核 桃

别名 山核桃

植物形态 原植物为胡桃。落叶乔木，高达25米。树皮灰色，小枝光滑，具明显的叶痕和皮孔。奇数羽状复叶，小叶5~13片，椭圆形或椭圆状卵形，幼时有波状锯齿，长大后全缘。果实近球形，外果皮绿色，光滑，内果皮坚硬，具不规则的浅沟。花期5月，果期10月。（图86）

生长环境 多栽培于平原和丘陵地区。

采收加工 果实和叶供药用。10月果皮变黄时采收，采后堆积5~7天，把外果皮脱掉，晒干。叶5~10月均可采收。

性味功能 果肉：甘，微温。敛肺定喘，补肾涩精。

临床应用 果肉和他药为丸，治老年喘咳，腰痛足膝无力；炒研酒服，治功能性子宫出血。每用3~5钱。外用：捣取油滴耳治中耳炎。叶与鸡蛋煮食治象皮肿。



图86 胡 桃(胡桃科)

Juglans regia Linn.

桔 梗

别名 白药 大药 梗草 土人参

植物形态 多年生草本，全株光滑无毛。根肉质圆锥形，外皮淡黄褐色。茎直立，很少分枝。下面的叶3~4片轮生或两片对生，上面的叶对生或互生，叶片卵圆形至广披针形，边缘有尖锐的锯齿。花钟形，蓝紫色。花期8~9月。
(图 87)

生长环境 多生于丘陵、山坡草丛中。

采收加工 根供药用。春秋两季采收，以秋季为好，将挖出的根洗净，用竹片或碗片刮去外皮，晒干。

性味功能 苦辛，平。开肺，祛痰，止咳，排脓。

临床应用 煎汤或研末服，治感冒咳嗽，咽喉红肿疼痛，肺脓疡咳吐脓血，胸满胁痛，痢疾腹痛。干用2~5钱。



图87 桔 梗(桔梗科)

Platycodon grandiflorus A. DC.

柴 胡

别名 芽胡 小柴胡 扁叶胡 小药

植物形态 原植物为狭叶柴胡。多年生草本。根直生，圆锥形。茎上部有分枝，基部有许多棕色纤维状的叶柄残基。根生叶及茎下部叶有长柄，叶片线形或狭线形，背面有5~7条凸出的平行脉。复伞形花序有较多的小花序，花黄色。花期7~9月。（图88）

生长环境 生于山坡草丛中。

采收加工 全草供药用。3月中旬~4月上旬连根挖起，洗净泥土，晒干。

性味功能 苦，微寒。和解表里，疏肝理气。

临床应用 煎服治寒热往来，胸满胁痛，口苦耳聋，头晕呕吐，疟疾，下利脱肛，子宫脱垂，月经不调。每用8分~3钱。真阴亏损，肝阳上升者忌服。




图88 柴 胡(伞形科)

Bupleurum scorzoneraefolium Willd.

臭 椿

别名 风眼树

植物形态 落叶乔木，高 10~20 米。奇数羽状复叶，互生，小叶 13~25 片，有柄，卵状披针形，叶缘微波状，近基部具大锯齿，齿尖背面有腺体，表面无毛或被柔毛。花小，排成顶生圆锥花序。翅果长椭圆形，中央具扁形种子 1 粒。花期 6~7 月，果期 9 月。（图 89）

生长环境 生长于山坡杂木林中，亦有栽培于屋旁、路边。

采收加工 根皮及果实供药用。根皮名椿根皮，四季可采收，将根皮剥下，刮去外面黑皮，晒干。果实名风眼草，在成熟后采收，晒干。

性味功能 根皮：苦涩，寒。除热，燥湿，涩肠，杀虫。果实：苦，凉。活血祛风，利湿。

临床应用 根皮：煎服治久痢，久泻，肠风，便血，崩漏，带下，遗精，白浊，蛔虫。干用 2~4 钱，重剂可用至 2 两。果实：煎服治经闭劳热，风湿痹痛，便血，带、浊、遗精等。每用 8 分~1 钱。



图89 臭椿(黄楝树科)

Ailanthus altissima Swingle

徐 长 卿

别名 一枝香 独脚虎 牙蛙消

植物形态 多年生草本。根茎短而斜生，由根茎上生出多数须状根，土黄色，有香气。茎细而直，节间长，少分枝。叶对生，叶片线状披针形，全缘，边缘稍反卷，上面有短毛，下面无毛，主脉隆起。花序顶生及腋生，花冠淡黄绿色。花期7~8月。（图 90）

生长环境 野生于山坡、丘陵杂草中。

采收加工 根及全草供药用。多在秋季采收全草，晒干。

性味功能 辛，温。行气，消食，活血，祛风，解毒。

临床应用 根：煎服治痧症腹痛，胃气痛，小儿腹胀，风湿痛，月经不调，蛇虫咬伤。干用1~3钱，鲜用5钱~1两。苗：浸酒漱口治牙痛。



图90 徐长卿(萝藦科)

Pycnostelma paniculatum (Bunge) Schum.

益 母 草

别名 苦草 小暑草 田芝麻棵

植物形态 一年或二年生草本。茎方形，单一或有分枝，全株有倒生细毛。叶对生，根生叶圆形，5~9浅裂；茎生叶通常3全裂，两侧裂片常再1~2裂；上部叶羽状3深裂，裂片狭长圆形；最上部的叶不分裂，线形，近于无柄。花轮生于叶腋；花冠唇形，红紫色或淡红色。小坚果褐色三棱形。花期6~8月，果期7~9月。（图91）

生长环境 野生于路旁、荒地。

采收加工 全草供药用。6~7月间花初开时采收，晒干。果实名茺蔚子，在成熟后采收晒干。

性味功能 茎叶：苦微辛，微寒。祛瘀生新，活血调经。果实：辛甘，微温。活血调经，明目利水。

临床应用 茎叶：煎服治妇女月经不调及胎产诸疾。干用3~5钱，鲜用1~2两。捣汁饮治尿血。外用：捣敷痈肿疮毒。果实：煎服治月经不调，产后瘀血不行，目疾，水肿等。每用2~4钱。




图91 益母草(唇形科)

Leonurus heterophyllus Linn.

鬼 针 草

别名 鬼叉叉 鬼蒺藜

植物形态 一年生草本。茎有四棱。下部和中部叶对生，通常3深裂或羽状分裂，裂片边缘有锯齿；上部叶对生或互生，3裂或不裂，线状披针形。头状花序生于茎枝顶端，花冠黄色或白色。果实线形，略扁，具四棱，上部有针状物3~4根，上有小刺，能攀附于人、畜的衣、体上。（图92）

生长环境 多生于荒地、山坡、路边。

采收加工 全草供药用。7~8月开花前采收全草，晒干。

〔附注〕 婆婆针形态与鬼针草相似，通常也称为鬼针草，全草也可供药用。

性味功能 苦，平。清热，散瘀，消肿。

临床应用 煎服治疟疾，痢疾，黄疸型肝炎，急性阑尾炎，咽喉肿痛。干用5钱~1两。外用：煎水熏洗足部，治小儿腹泻。




图92 鬼针草(菊科)

Bidens pilosa Linn.

夏 枯 草

别名 棒头草 灯笼头

植物形态 多年生草本。有贴近地面生长的匍匐茎和方形的直立茎，通常淡红色，长有向上的细毛。叶对生，叶片两面都有毛；下部的叶有长柄，上部的叶柄渐渐变短。花穗圆筒形，花紫色。5~6月份开花，夏天地上部分枯死。
(图 93)

生长环境 生于路边、丘陵、山坡草丛中。

采收加工 全草供药用，以果穗为主。6~7月采摘果穗，春秋季节采全草，洗净晒干。

性味功能 苦辛，寒。清肝，散结。

临床应用 煎服或熬膏治瘰癧；与蒲公英酒煎服治急性乳腺炎；加冰糖、白蜜煎服治羊痫风，高血压。干用3~5钱，鲜用2~3两。研末服治血崩，赤白带下；与香附同研末服治目疼流泪羞明；鲜夏枯草捣汁饮治产后血晕。外用：捣敷外伤出血。



图93 夏枯草(唇形科)

Brunella vulgaris Linn.

鸭 跖 草

别名 萤火虫草 蓝花姑娘 蓝花草 鸭抓菜 淡竹叶

植物形态 一年生草本。全体近无毛，或在叶鞘边缘上有毛。茎下部匍匐，节上常生根。叶互生，披针形，全缘，基部下延成膜质的鞘。花蓝色，佛焰苞折合状，两边不相连。花期 8~9 月。
(图 94)

生长环境 生于阴湿地区或林下。

采收加工 全草供药用。在生长期随时可采鲜植株应用。或晒干。

性味功能 苦，大寒。利小便，清热解毒。

临床应用 煎汤治水肿，小便不利，小儿腹泻热痢，咽喉肿痛，疟疾，关节疼痛。干用 5 钱~1 两，鲜用 2~3 两。外用：捣敷痈肿、丹毒。



图94 鸭跖草(鸭跖草科)

Commelina communis Linn.

菟 丝 子

别名 萝丝种子 无根草子 金黄丝子 豆寄生子

植物形态 一年生寄生草本，全体无毛。茎蔓性，丝状，多分枝，橙黄色，随处生吸盘附着寄生。叶鳞片状，不显著。花簇生于茎侧，花冠短钟形，白色。果实卵圆形，内含种子2~4粒，类球形或卵形，略扁，淡黄色或淡褐色。花期8~9月，果熟期10~11月。（图95）

生长环境 常寄生于豆科、菊科、藜科的植物上。

采收加工 种子供药用。在种子成熟后采收果枝，晒干，用木棒轻打，簸去枝壳。

性味功能 辛甘，平。补肝肾，明目。

临床应用 煎服治肾虚精冷，腰膝酸痛，阳萎遗精，先兆流产，目暗，消渴，尿有余沥。每用3~5钱。或入丸散。



图95 菟丝子(旋花科)

Cuscuta chinensis Lam.

海 金 沙

别名 吐丝草

植物形态 多年生缠绕草本。地下茎细而匍匐，具有成节的毛。茎干草色，具有白色微毛。叶为2~3回羽状复叶，小叶卵状披针形，边缘有锯齿或不规则分裂，上部小叶无柄，下部的有长柄。孢子囊生于叶背面，两行，边缘着生。孢子囊多在秋季成熟。(图 96)

生长环境 野生于山坡草丛中，缠绕于其它植物上。

采收加工 孢子供药用。8~9月孢子成熟后割取茎叶，在避风处晒干，拍下孢子，筛去杂质。

性味功能 甘，寒。清热，利湿，通淋。

临床应用 煎服治热淋，膏淋，石淋，小便不通，湿热肿满。每用2~4钱。



图96 海金沙(海金沙科)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

桑 寄 生

别名 桑上寄生

植物形态 小灌木，寄生它树上。老枝无毛，有凸起皮孔，小枝略被暗灰色短毛。叶互生或近对生，有叶柄，光滑无毛，叶片革质，卵圆形或长方卵形，两面均无毛，或幼时有极短星状毛，叶脉稀疏而不显。聚伞花序腋生，花冠狭筒状，紫红色。花期 6~8 月。(图 97)

生长环境 寄生于桑、构、槐、榆、八角枫等树上。

采收加工 全株供药用。6~7 月采收，洗净晒干。

性味功能 苦，平。驱风湿，健筋骨，益血，安胎。

临床应用 煎服治腰痛背强，风湿痹痛，筋骨痿弱，崩漏，胎动腹痛，乳汁不下。每用 3~5 钱。



图97 桑寄生(桑寄生科)

Loranthus parasiticus (L.) Merr.

野 菊

别名 野菊花 野黄菊花 山黄菊 甘菊花

植物形态 多年生草本。茎基部通常呈匍匐状，上部多分枝，顶部的枝条常有白色短柔毛，全株有香气。单叶互生，叶片卵状椭圆形，羽状分裂，顶端裂片稍大，裂片边缘有尖锐锯齿，两面均有细柔毛；茎上部的叶片逐渐变小。头状花序，生于茎顶，花冠黄色。花期 9~10 月。（图 98）

生长环境 生于山野路边、丘陵荒地及丛林边缘。

采收加工 花、茎叶及根供药用。9~10 月开花时采摘花朵，晒干。茎叶 5~10 月均可采收。根随采随用。

性味功能 苦辛，寒。清热，明目，解毒。

临床应用 根：煎服或捣汁治头目昏眩，痈疽疔毒，淋巴结核，毒蛇咬伤。干用 2~4 钱，鲜用 1~2 两。根与枣木煎水洗带状疱疹；研末敷臃疮及蜈蚣咬伤。花及茎叶可治痈肿疔毒，鲜用 1~2 两。




图98 野 菊 (菊 科)

Chrysanthemum indicum Linn.

梔 子

别名 黄梔子 红梔 山梔

植物形态 常绿灌木，高 50~150 厘米。叶对生，革质，广披针形，有时呈卵状披针形，全缘，表面光滑；托叶通常连合包围小枝。花单生，白色，有浓香气。果实倒卵圆形，有棱 6 条。花期 7 月，果期 9~10 月。(图 99)

生长环境 野生于山地，或栽培于庭园。

采收加工 果实供药用。10~11 月果实成熟后择晴天采收，晒至足干。

性味功能 苦，寒。清热，泻火，凉血。

临床应用 煎服治热病虚烦不眠，黄疸，淋病，消渴，目赤，咽痛，吐血，鼻血，尿血，热毒疮疡。每用 2~4 钱。外用：研末水调敷治丹毒；鸡蛋清调涂烫伤；烧灰吹鼻治鼻出血。



图99 梔 子(茜草科)

Gardenia jasminoides Ellis.

梗 通 草

别名 合萌 梗通 野皂角杆 锯没子草

植物形态 原植物为田皂角。一年生草本。茎直立，圆柱形，无毛。偶数羽状复叶，互生；小叶8~35对，线状长圆形，全缘无毛，晚间闭合；托叶披针形，膜质。总状花序腋生，花黄色。荚果线形而扁。花期8~9月。（图100）

生长环境 多生于水田路旁湿地。

采收加工 茎供药用。7~9月间将全株拔起，除去枝叶及根和茎的顶端部分，剥去外皮晒干。

性味功能 甘淡，凉。利小便，下乳汁。

临床应用 煎服治小便不利，淋病，水肿，产妇乳汁不通。每用8分~1钱5分。




图100 田皂角(豆科)

Aeschynomene indica Linn.

蛇 床 子

别名 蛇狼草子 野葫萝卜子 吸床子

植物形态 原植物为蛇床。一年生草本。茎直立，圆筒状。根生叶有柄，基部阔而呈鞘状；叶片卵形，2~3回羽状分裂。复伞形花序，顶生或腋生，花白色。果实椭圆形，光滑。花期4~7月，果期6~8月。（图101）

生长环境 生长于路旁田野。

采收加工 果实供药用。7~8月间，果实成熟后将果穗摘下，微晒，用手揉搓，使壳脱离，扬去杂质，晒干。

性味功能 辛苦，温。温肾阳，祛风燥湿，杀虫。

临床应用 煎服或作丸剂治阳萎，带下，子宫寒冷不孕，风湿痹痛。每用1钱5分~3钱。阴虚有火忌用。外用：研末掺治湿疮，猪油调涂擦治癣疮；煎水熏洗阴道滴虫病；和乌梅煎水熏洗子宫脱垂。



图101 蛇 床(伞形科)

Cnidium monnieri (L.) Cuss.

菝 蓂

别名 金刚刺 筋骨柱子

植物形态 落叶攀援灌木。根茎坚硬，弯曲，凹凸不平。地上茎较硬，有疏刺。叶互生，革质，有光泽，叶片卵圆形或椭圆形，全缘，有主脉3~5条；叶柄中部有2条卷须，下半部呈鞘状，幼时合抱小枝，后逐渐张开。伞形花序，生于叶腋，小花黄绿色。浆果球形，熟时红色。花期5月。

(图102)

生长环境 多生于较湿的山坡向阳处、灌木丛中或疏林下。

采收加工 根茎供药用。在霜降后至次年清明前挖取根茎，洗净，趁新鲜时切成薄片，晒干。

性味功能 甘，温。祛风湿，利水。

临床应用 煎服治赤白痢疾，子宫出血，赤白带下。干用3~4钱，鲜用1~2两。浸酒饮治风湿关节疼痛；研末服治膀胱结石；煎水洗治冻疮。



图102 菝 葜(百合科)

Smilax japonica (Kunth) A. Gray

甜 地 丁

别名 猫耳朵草 奶青草

植物形态 原植物为米口袋。多年生草本，全体有柔毛。根圆锥形，茎极短。奇数羽状复叶，丛生，有长柄；小叶 11~21 片，椭圆形至广椭圆形，全缘，两面有白色长毛。花梗由叶丛中生出，开紫红色花，蝶形。花期 4 月。（图 103）

生长环境 野生于山坡、田埂、路旁。

采收加工 全草供药用。3~5 月采收全草，晒干。

性味功能 微甘，平。清热解毒。

临床应用 煎服治痈疽、疔疮及一切急性化脓性炎症。鲜用 1~2 两。或入丸剂。




图103 米口袋(豆科)

Gueldenstaedtia multiflora Bge.

旋 覆 花

别名 金沸草

植物形态 多年生草本，全体有毛。茎有纵棱，有时微带紫色。叶互生，无柄，茎下部的叶开花以后就凋落；中部叶片长椭圆形或卵状披针形，基部心形抱茎，全缘或有微小锯齿；上部叶较中部叶为小。头状花序生在茎的顶端，花黄色。花期7~10月。（图104）

生长环境 生长于溪沟旁、田坎、路边。

采收加工 花、叶、根均供药用，以花为主。7~10月花开放时摘取花序，晒干。

性味功能 咸，温。消痰，下气，软坚，行水。

临床应用 花及全草煎服治胸胁胀满，咳喘，呃逆，暖气，水肿。花干用2~3钱，全草酌加。外用：全草和乌柏树叶、鸡蛋清同捣敷毒蛇咬伤。



图104 旋覆花(菊科)

Inula britannica L.
var chinensis (Rupr.) Reg.

望 江 南

别名 羊角豆 黄豇豆 金豆角

植物形态 一年生草本，植物体近乎无毛。茎圆柱形，下部木质化，上部多分枝。偶数羽状复叶，互生，叶柄上面近基部有一个腺体，小叶4~8对，卵形或卵状披针形，全缘，边缘有细柔毛。花黄色，蝶形。果实扁圆柱形，有横隔膜，内有种子10~30个，种子扁平，近中央微凹。花期8~9月，果期10月。（图105）

生长环境 野生于荒野杂草丛中，也有栽培的。

采收加工 种子供药用。10~11月间采成熟果实，晒干。（全草亦可供药用）

性味功能 甘苦，凉。清肝明目，健胃利肠，解毒。

临床应用 煎服治小儿惊风，痢疾腹痛，慢性便秘，目赤肿痛。干用5钱~1两。研末服治消化性溃疡；陈酒冲服治乳腺癌。




图105 望江南(豆科)

Cassia occidentalis Linn.

葛 根

别名 粉葛根

植物形态 原植物为粉葛。多年生草质藤本，遍体具褐色粗毛。地下具有肥大纺锤状的块根，表面淡黄褐色，富含淀粉。茎粗壮，木质化，上部多分枝，攀缘于他树或铺于地上，嫩枝密生棕色长柔毛。3出复叶，互生，顶生小叶片菱状广卵形，侧生小叶斜广卵形，两边不对称。总状花序生于新枝叶腋，花冠紫红色。花期8~9月。

(图106)

生长环境 生于山坡、林边、路边。

采收加工 根、花、茎、叶均供药用，以根为主。10月至次年2月，掘取块根，洗净，纵剖成片条状，清水漂去黄浆，反复晒干。

性味功能 甘辛，平。解肌退热，生津止渴。

临床应用 根：煎服治温病发热，头痛项强，烦渴，泻痢，斑疹不透。干用3~5钱，鲜用2~3两。捣汁饮治吐血，衄血，便血。外用：叶捣敷外伤出血。




图106 粉 葛(豆科)

Pueraria pseudo-hirsuta Tang et Wang

黑 白 丑

别名 牵牛子 二丑

植物形态 原植物为牵牛。一年生缠绕草本。茎细长，有倒生短毛，常缠绕在它物上。叶互生，有长柄，叶片通常3裂，中间的裂片卵圆形，先端长而尖，两侧裂片斜卵形，叶基心脏形，两面都有稀短毛。花1~3朵，腋生，花冠喇叭状，蓝色或淡紫色。果实球形，成熟裂开，种子卵圆形，侧扁，光滑无毛，土黄色(白丑)或棕黑色(黑丑)。花期7~9月，果期8~10月。(图107)

生长环境 生丛林中、墙脚下、屋旁或路边。

采收加工 种子供药用。8~10月果实成熟尚未开裂时连茎割下，晒干，打下种子。

性味功能 苦辛，寒。有毒。逐痰消饮，利大小便，杀虫。

临床应用 煎服治水肿喘满，痰饮，食滞，便秘。干用1钱5分~3钱。和槟榔、大黄研末服治胆道蛔虫。



图107 牵 牛(旋花科)

Pharbitis nil Choisy

葎 草

别名 割人藤 拉拉藤

植物形态 多年生缠绕草本。枝和叶柄均具有倒生的刺。下部叶通常对生，上部叶互生，有长柄，叶片圆形，5~7掌状深裂，裂片卵状椭圆形，边缘具粗锯齿，两面均具粗糙刺毛，下面具小黄点。花单性，雌雄异株，花冠白色。花期8~9月。（图108）

生长环境 生长于荒野、路旁及瓦砾堆中，常成片蔓生。

采收加工 全草供药用。8~9月采收，洗净，晒干。

性味功能 甘苦，寒。清热消肿，利水通淋。

临床应用 煎服治肾及膀胱结石，瘰疬，小肠疝气。干用3~6钱，鲜用1~2两。亦可取汁服，每次1小杯。



图108 葎 草(桑科)

Humulus scandens (Loureiro) Merr.

鹅不食草

别名 球子草 野园荑

植物形态 原植物为石胡荽。一年生草本。茎纤细，丛生，基部匍匐，着土处易生须根。叶互生，叶片倒卵状椭圆形，上部边缘有3~5个锯齿，无柄。头状花序细小，生于叶腋，扁球形，花冠黄色。果实有4棱，绿色，圆球形。花期7~9月。（图109）

生长环境 生长于路旁、荒野阴湿地。

采收加工 全草供药用。7月开花后采收全草，晒干。

性味功能 辛，温。散风，利窍，明目。

临床应用 煎服治伤风感冒，寒痰喘促，副鼻窦炎。干用1钱5分~3钱，鲜用5钱~1两。外用：捣烂塞鼻治疟疾（亦可捣汁饮），鼻息肉，敷痔疮肿痛；研末嗅鼻治目翳，牙痛。




图109 石胡荽(菊科)

Centipeda minima (Linn.)

A. Brauner et Aschers.

紫 苏

别名 黑苏 红苏 红紫苏

植物形态 一年生草本。茎方形，有沟，紫色或绿紫色，基部稍木质。叶对生，卵形或卵圆形，叶缘有钝锯齿，叶片两面紫色或上绿下紫，均有稀毛，下面有油腺点。总状花序生于茎顶和叶腋，花冠唇形，红色或淡红色。果实卵圆形，灰棕色，种子黄白色，富含油质。（图 110）

生长环境 一般为家种，也有野生于山坡路旁。

采收加工 茎、叶及果实均供药用。6~8月割取茎叶、晒干；或鲜时将主干及嫩枝叶分开。9~10月间采收果实，同时割下老茎，刮去表面粗皮晒干。

性味功能 叶：辛，温。发表散寒，理气宽中。梗：辛甘，微温。顺气，消食，止痛，安胎。子：辛，温。下气消痰，润肺宽肠。

临床应用 叶：煎服治感冒风寒，恶寒发热，咳嗽气喘，腹胀满，胎气不安，解蟹毒。干用2~3钱。外用：捣敷疯犬咬伤，外伤出血。梗：煎服治气郁胸闷，脘腹胀痛。干用2~3钱。子：煎服治咳逆气喘，气滞便秘。每用1钱5分~3钱。




图110 紫 苏(唇形科)

Perilla frutescens (L.) Brcit.
var. *crispa* Decne.

紫花地丁

别名 地丁草 蓝花菜

植物形态 多年生草本。全株密被白色短毛。根白色。叶由根部丛生，有长叶柄，叶片长椭圆形或广披针形，先端钝，基部截形或稍呈心形，边缘具波状钝锯齿。花腋生，紫色，状如飞燕，花梗长。花期4~7月。（图111）

生长环境 生于山坡、田埂、沟边和野外草地。

采收加工 全草供药用。花期或果熟后采收，洗净晒干。

〔附注〕 1.白花地丁，形状与紫花地丁极相象，但花为白色。2.犁头草，花为紫色，但叶的形状如犁头。两种都可作紫花地丁用。

性味功能 苦，寒。清热，解毒，利湿，消肿。

临床应用 煎服治痈肿，乳腺炎，肺脓肿，肾盂肾炎，黄疸性肝炎。干用3~5钱，鲜用1~2两。外用：捣敷痈肿，疔疮，外伤出血，颈淋巴结核。



图111 紫花地丁(堇菜科)

Viola yedoensis Mak.

辣 蓼

植物形态 原植物为水蓼。一年生草本。主根常横生，支根成须状，黄褐色。茎基部稍斜卧，上部直立，深红色，有膨大的节，近地面处常生须根。叶互生，披针形或椭圆状披针形，两面都有小点和毛，主脉及叶缘上有小刺状毛；托叶鞘膜质，筒状，边缘有短毛。花序穗状向下垂，小花淡红色。花期 9~10 月。（图112）

生长环境 生于湿地及水边。

采收加工 全草供药用。5~10 月采取地上部分鲜用或洗净晒干。

性味功能 辛，温。清热解毒，消肿止痛。

临床应用 煎服治细菌性痢疾，急性肠炎，急性阑尾炎。鲜用 1 两。外用：捣敷蛇虫咬伤。



图112 水 蓼(蓼科)

Polygonum hydropiper Linn.

蒲 黄

别名 蒲草 鬼蜡烛

植物形态 原植物为水烛。多年生水生草本。匍匐茎生在泥土中，有很多须状根；茎直立出水面。叶狭长线形，下部鞘状。花序细长圆柱状，形如蜡烛；雄花生於花序上部，花被鳞片状或成毛茸，花粉黄色；雌花生于下部，绿褐色。雌雄花之间有2~15厘米不生花的柄隔开。花期6~7月。（图113）

生长环境 生於池沼边或浅水塘中。

采收加工 花粉供药用。花刚开放时，剪下花序顶部的雄花部分，晒干，碾碎，除去花茎等杂质。

性味功能 甘，平。凉血，活血，消瘀，止血。

临床应用 作散剂或煎服。生用：治经闭腹痛，产后瘀阻作痛，跌扑皮内出血，疮疖肿毒。炒黑用：止吐血，鼻血，牙龈出血，崩漏，便血，尿血，血痢。每用1钱5分~3钱。孕妇慎用。外用：研末掺治重舌，口疮，耳中出脓或出血，阴下湿痒。




图113 水 烛(香蒲科)

Typha angustifolia Linn.

蒲 公 英

别名 黄花地丁 婆补丁 黄花草 古古丁
黄花郎 白婆婆丁

植物形态 多年生草本，全草都含有白浆。根肥厚，圆锥形。叶由根部生出，没有叶柄，叶片倒卵状披针形，边缘有大小不等的缺刻。花序生於花梗顶端，黄色。果实上部丛生白毛，外形如伞。花期 4~5 月。（图 114）

生长环境 生於山野、田间、路旁。

采收加工 带根全草供药用。4~5 月或 9~10 月采收全草晒干。

性味功能 苦甘，寒。清热解毒，散结。

临床应用 煎服治急、慢性肝炎，胆囊炎，急性阑尾炎，热淋，小便不利。鲜用 2~3 两。外用：捣敷痈疮肿毒，急性乳腺炎，颈淋巴结核，疔疮，带状疱疹。



图114 蒲公英(菊科)

Taraxacum mongolicum Hand.-Mazt.

、 墓 头 回

别名 稀须菜

植物形态 原植物为苦蕒菜。一年生草本，无毛。茎直立，带紫红色。基部叶卵圆形、长圆形或披针形，边缘作波状齿裂、提琴状羽裂或羽状分裂，裂片复作细齿状，基部渐窄成柄；茎生叶长卵形，无柄，基部抱茎，边缘具大小深浅不等的齿裂，很少全缘。头状花序排列成伞房状，花黄色。花期4~6月。(图 115)

生长环境 生长于路旁田野。

采收加工 全草供药用。5~7月间连根拔起，除去须根，洗净，晒干。

性味功能 苦，微酸涩，微寒。清热，燥湿，止血，止带。

临床应用 煎服治崩、漏，赤白带下。干用3~5钱，鲜用1两。外用：煎水熏洗阴道滴虫病。



图115 苦蕒菜(菊科)

Ixeris denticulata (Houtt.) Steb.

锦 鸡 儿

别名 土黄耆

植物形态 落叶灌木，高达2米左右。枝条多丛生，茎皮上有黄色斑点，呈片状剥落；小枝细长，有棱角。偶数羽状复叶在短枝上簇生，托叶顶端渐尖，常硬化而成针刺；小叶两对，倒卵形，顶端一对常较下部一对为大。花单生于叶腋，花冠蝶形，黄色至深黄色，凋谢时变褐红色。花期4~5月。（图116）

生长环境 多野生于山坡疏林下和林缘路旁，也有生于荒地灌木丛中，或栽种于村庄附近作围篱用。

采收加工 根供药用。10月（霜降前后）挖取，洗净晒干。

性味功能 甘淡，平。活血，调经，健脾，止带。

临床应用 煎服治气虚白带，头晕腰酸，乳痈，跌扑损伤。干用3~5钱，鲜用2~3两。浸酒服治痹痛。



图116 锦鸡儿(豆科)

Caragana sinica (Buchoz) Rehd.

算 盘 珠

别名 算盘子 馒头果

植物形态 落叶小灌木，高可达1.5米。根较粗壮，外皮褐色。茎多分枝，小枝有细柔毛。叶互生，叶片通常椭圆形，背面有短柔毛；有些叶入秋变红色。5~6月开黄绿色小花，生于叶腋。果实扁圆形，表面有槽，顶部向内凹入，成熟后变红色，形状象算盘珠子。（图 117）

生长环境 生长于山坡丛林杂草中。

采收加工 根供药用。9~10月挖取根部，洗净晒干。

性味功能 苦，平。清热、利湿、活血、解毒。

临床应用 煎服治痢疾，疟疾，劳伤咳嗽，喉痛，牙痛，急性乳腺炎，颈淋巴结核，跌打损伤。鲜用1两5钱~2两。



图117 算盘珠(大戟科)

Glochidion puberum (L.) Hutch.

墨旱莲

别名 旱莲草 墨烟草 山凤仙草

植物形态 原植物为鳢肠。一年生草本。茎直立或匍匐状，全体被有粗糙的毛，着地的节上生有白色须根。叶对生，叶片披针形或椭圆状披针形，全缘或有细锯齿。头状花序生在茎枝的顶端和叶腋，花白色。花期8~9月。（图118）

生长环境 多生于湿地、溪沟边缘或路旁。

采收加工 全草供药用。秋季采收全草，晒干。

性味功能 甘酸，凉。补肾益阴，止血。

临床应用 煎服治吐血，咳血，便血，淋病，白带。干用3~5钱，鲜用1~2两。捣汁饮治衄血，尿血，须发早白。外用：捣敷跌打损伤，敷“寸口”穴发泡治疟疾。



图118 鳢 肠(菊科)

Eclipta prostrata Linn.

薄荷

别名 苏薄荷 土薄荷 野薄荷 仁丹草

植物形态 多年生芳香草本。有匍匐的根状茎，地上茎直立，方形，上有倒生的细毛和腺点。单叶，对生，叶片卵形、长圆形或披针形，边缘有细锯齿，两面都有黄色腺点。花细密轮生于叶腋，花冠淡红色或紫红色。花期8~10月。(图119)

生长环境 栽培植物，亦有野生于田坎、路边、沟边。

采收加工 全草供药用。6~9月割取地上部分晒干。鲜用生长期随用随取。

性味功能 辛，凉。发汗，散风热。

临床应用 煎服治外感发热，头痛，咽喉肿痛，脑漏，鼻流臭涕。干用5分~1钱5分。阴虚血燥，肝阳偏亢者忌用。外用：捣汁滴鼻治鼻衄；煎汁涂火毒生疮。




图119 薄 荷(唇形科)

Mentha arvensis Linn.

瞿 麦

别名 野麦 鬼麦 大石竹

植物形态 多年生草本。茎丛生，直立，圆而细长，节部稍膨大。叶对生，线形至线状披针形，全缘，基部成短鞘围抱节上。花粉红色，一朵或几朵生于茎的顶端；花瓣先端深裂成丝条状，基部有一圈紫红色的须状毛。花期8~9月。（图120）

生长环境 生于山坡、林下杂草中。

采收加工 带花全草供药用。7~9月花未开放或已开放时采收。割取地上部分，晒干，扎成小把。

性味功能 苦，寒。清热利水，破血通经。

临床应用 煎服治小便不通，水肿，淋病血尿，子宫出血，经闭。干用3~5钱，鲜用1~2两。



图120 瞿 麦(石竹科)

Dianthus superbus Linn.

附 录

植物常用名词术语解释

1. 一年生植物 在一年内开花结果后即行枯死的植物。大多为草本。

2. 二年生植物 在第一年仅生长根出叶，第二年才开花结果，然后枯死的植物。大多为草本。

3. 多年生植物 有两类：一是地上部分每年枯死而地下部分不死，第二年再抽新苗。二是整个植株每年开花结果后都不枯死，不断生长。

4. 乔木 多年生，木质多，具有高大粗直的主干，通常茎的上部才有分枝。如臭椿等。

5. 灌木 比乔木矮小，没有高大明显的主干，仅有丛生的枝干。如六月雪、梔子等。若近地面部分的茎为木质茎，而上部枝条为草质，每年枯死的，称为半灌木。如虎杖。

6. 藤本 具备特有的附着器官，缠绕或攀援于它物上。茎草质的称草质藤本。(见图122—1)

茎木质的称木质藤本。(参见图 46)

7.草本 植物体木质少,质较软,植株大多矮小,通常全株或地上部分冬季枯死。如大蓟、马齿苋等。

8.直根 主根明显,垂直向地心生长,旁边有少数支根的称直根。(见图 121—1, 参见图1)

9.块根 主根或支根肉质肥大,呈块状。(见图 121—2, 参见图 29)

10.圆锥根 主根肥大,肉质,上部较粗,下部渐细,呈圆锥状。(见图 121—3, 参见图 87)

11.须根或纤维状根 主根不发达,由茎的基部生出多数纤细的根,呈须状或纤维状。(见图 121—4)

12.直立茎 茎干直立于地上,垂直于地面生长。(参见图 19)

13.缠绕茎 茎枝直接围绕它物向上生长。(见图 122—1)

14.匍匐茎 茎柔软,匍匐地面生长,节上生不定根。(见图 122—2, 参见图 60)

15.攀援茎 茎上的某些枝或叶变态成为卷须或吸盘等附着物,用以缠绕或吸附周围物体而向上生长。(见图 122—3)

16.鳞茎 地下茎缩短呈扁圆盘状，称鳞茎盘，鳞茎盘上紧密着生多数鳞叶，鳞叶肥厚肉质，但包在鳞茎外面的薄而干燥。（见图 123—1）

17.球茎 地下茎缩短呈球状，有明显的节和节间，节上有膜质鳞叶，并具有顶芽。（见图 123—2）

18.根茎 斜生或横生在地面之下，有节和节间，并有鳞片状叶。（见图 123—3，参见图 65）

19.块茎 地下茎短而肥厚，呈块状，节和鳞叶往往不明显。（见图 123—4，参见图 28）

20.叶片 是叶的最重要部分，有各种形状。如：

(1)披针形 叶的长度约为宽度的 3~4 倍，中部以下最阔，渐上渐狭。（见图 124—1，参见图 112）

(2)倒披针形 叶的长度约为宽度的 3~4 倍，但中部以上最阔，渐下渐狭。（见图 124—2，参见图 60）

(3)椭圆形 叶的长度约为宽度的 1 倍，叶片的中央最宽阔，两端较狭。（见图 124—3，参见图 117）

(4)卵圆形 叶的长度约为宽度的1倍,叶片的中部以下最宽阔,上端渐狭。(见图124—4,参见图73)比卵圆形稍阔的称阔卵圆形。(参见图65)

(5)倒卵圆形 叶的长度约为宽度的1倍,叶片的中部以上最宽阔,下端渐狭。(见图124—5,参见图68)

(6)心形 叶片中部以下宽阔,基部中央凹入。(见图124—6,参见图77)

(7)圆形 叶片长度与宽度几乎相等,近浑圆。(见图124—7,参见图66)

(8)肾形 叶片的宽度超过长度,外形如肾状。(见图124—8)

(9)戟形 叶先端尖,基部两侧向外。(见图124—9,参见图72)

21.叶缘 指叶片的边缘。有各种形态。如:

(1)全缘 边缘平整,不具任何齿缺。(见图125—1,参见图11)

(2)锯齿 叶缘有尖锐的突起如锯齿,齿端向前。(见图125—2,参见图92)大锯齿上再分裂成小锯齿的称重锯齿。(见图125—3)

(3)圆锯齿 叶缘有钝圆的锯齿。(见图125

—4, 参见图 16)

(4) 齿牙状 叶缘有尖锐的突起, 齿端直而向上。(见图 125—5)

(5) 波状 叶缘起伏如波浪。浅的称浅波状, 深的称深波状。(见图 125—6, 参见图 102)

(6) 分裂 叶片边缘有裂口。深度小于叶片宽度 $\frac{1}{4}$ 的称浅裂(见图 125—7, 参见图 55)。深度大于叶片宽度 $\frac{1}{4}$ 的称深裂(见图 125—9, 参见图 17)。如裂到主脉, 形成几个小裂片的称全裂。(见图 125—10, 参见图 69)

(7) 缺刻 叶片边缘有大小不规则的凹凸, 不整齐。(见图 125—8, 参见图 29)

22. 叶脉 即叶片上的筋(输导组织)。在叶片中部较粗的称主脉, 主脉向两侧分出较细的叶脉称为侧脉, 侧脉的分枝称为细脉。

23. 托叶 通常生于叶柄基部, 有两片, 形态多种, 有叶状的, 如鱼腥草的托叶(参见图 77); 有鞘状的, 如金荞麦的托叶(参见图 72); 有卷须状的, 如菝葜的托叶(参见图 102)。

24. 丛生叶 多数叶片在茎枝上密集簇生(见图 126—1, 参见图 13)。

25. 轮生叶 茎枝每节生叶 3 片以上, 排列成轮状(见图 126—2, 参见图 81)。

26. 互生叶 茎枝每节只生叶 1 片, 螺旋状排列在茎枝上(见图 126—3, 参见图 104)。

27. 对生叶 茎枝每节生叶 2 片, 前后或左右相对排列(见图 126—4, 参见图 39)。

28. 复叶 在一个叶柄上生有几个或更多小叶片的称复叶。小叶 3 片, 集生于叶柄顶端的称 3 出复叶(见图 127—1, 参见图 37)。小叶 3 片以上, 集生在叶柄顶端, 展开如掌状的称掌状复叶(见图 127—2, 参见图 26)。小叶排列在叶轴的两侧, 形如羽毛状称羽状复叶, 如地榆(参见图 47)。小叶片为单数的称奇数羽状复叶(见图 127—4, 参见图 61)。小叶片为双数的称偶数羽状复叶(见图 127—3, 参见图 105)。叶轴分枝一次, 分枝上着生小叶片的称二回羽状复叶(见图 127—5)。

29. 花序 花排列在花枝上的形式, 种类很多。如:

(1) 总状花序 花梗长, 旁边着生许多有梗的小花, 小花梗等长(见图 128—1 1', 参见图 112)。

(2)圆锥花序 总状花序的小花梗再分枝,分枝顶端再生花,形成圆锥花序(见图 129—7 7', 参见图 7)。

(3)伞房花序 分枝如总状花序,但小花梗不等长,在下面的长,在上面的短,所有的花排在一个水平线上,形成伞房花序(见图 129—8 8', 参见图 8)。

(4)穗状花序 花梗较长,旁边着生许多无柄的小花(见图 128—2 2', 参见图 24)。

(5)柔荑花序 花梗下垂,其上着生小花(见图 128—3 3', 参见图 86)。

(6)肉穗花序 花梗多肉质肥厚,上生小花,肉穗花序基部常有一片大形的总苞,称为佛焰苞,有佛焰苞的花序称佛焰花序(见图 128—4 4', 参见图 37、20)。

(7)伞形花序 总花梗的顶端生出许多略等长的小花梗,花着生于小花梗上,排成伞状(见图 128—5 5', 参见图 102)。

(8)复伞形花序 伞形花序小花梗顶端不着生花而再生分枝,分枝顶端再生花形成复伞形花序(见图 129—10 10', 参见图 101)。

(9)头状花序 花梗特别短,变成扁盘形或半

球形，梗顶密生多数无梗小花，花序外面具有一层或多层苞片组成的总苞（见图 128—6 6'，参见图 114）。

(10)聚伞花序 花序轴顶端先开一花，花序轴不再继续生长，两侧生分枝，分枝顶端再生花，称聚伞花序，如花序轴四周生多数侧枝，每一侧枝上再生小聚伞花序称多歧聚伞花序（见图 129—9 9'，参见图 1）。

30.花冠 由花瓣组成，呈各种颜色，是花的最显著部分。

31.孢子 蕨类等植物用以繁殖的细胞，大都为细小的圆球形，如海金砂、石韦、贯众等均以孢子繁殖。产生孢子的器官称孢子囊。（参见图 96、32）




图121 根的形态

1.直根 2.块根 3.圆锥根 4.须根



图122 茎的形态(一)

1. 绕缠茎 2. 匍匐茎 3. 攀援茎




图123 茎的形态(二)

1.鳞茎 2.球茎 3.根茎 4.块茎




图124 叶片的形状

- 1.披针形 2.倒披针形 3.椭圆形 4.卵圆形
5.倒卵圆形 6.心形 7.圆形 8.肾形 9.戟形




图125 叶缘的形态

1.全缘 2.锯齿 3.重锯齿 4.圆锯齿 5.齿牙状
6.波状 7.浅裂 8.缺刻 9.深裂 10.全裂




图126 叶的排列

1. 丛生叶 2. 轮生叶 3. 互生叶 4. 对生叶




图127 复叶的种类

1.三出复叶 2.掌状复叶 3.偶数羽状复叶
4.奇数羽状复叶 5.二回羽状复叶




图128 花序的种类

- 1 1' 总状花序 2 2' 穗状花序 3 3' 柔荑花序
4 4' 肉穗花序 5 5' 伞形花序 6 6' 头状花序




图129 花序的种类

7 7'圆锥花序 8 8'伞房花序
 9 9'聚伞花序 10 10'复伞形花序

草药别名索引

【一~二划】

一支香	274
一支箭	188
一窝虎	182
一窝娘	152
二丑	308
二宝花	240
七角菜	100
七星剑	158
九头狮子草	122
九死还魂草	220

【三划】

大药	268
大力王	106
大石竹	334
大米花	206

大血藤	186
大麦牛	148
大青根	244
大青叶	244
大花椒	210
大齐牙	98
大萝藦子	136
大将军草根	156
三七草	114
三棱草根	252
三百两银药	234
小药	270
小石韦	158
小刺萎	102
小柴胡	270
小脚乌	254
小暑草	276
小葛藤	138
小紫草根	188
土人参	268
土小茴	102
土大黄	184

土草薺	118
土黃蓍	326
土薄荷	332
土荊皮	120
山梔	292
山川柳	192
山龍胆	178
山里紅	110
山黃菊	290
山核桃	266
山遺糧	118
山風仙草	330
馬苋	122
馬子菜	122
馬蹄子	194
馬狼桔	250
馬兜鈴	234
馬兜鈴根	234
馬蘭杆子	250
女貞	108
千針草	98
千年不大	174

千年不烂心	174
-------------	-----

【四 划】

木兰	198
木笔	198
木君子叶	144
毛香	196
毛药芹	128
双花	240
水烛	320
水蓼	318
水龙胆	178
五爪龙	146
五爪金龙草	146
五方草	122
五点草	230
五星草	230
五灯头草	230
天仙藤	234
天仙藤根	234
天花粉	166
天青地红	114

天平一枝香	96
月下红	160
见肿消	112、152
长命菜	122
书带草	212
凤尾蕨	140
凤眼草	272
凤眼树	272
乌柏	144
乌头	254
乌龙草	146
牛舌草	142
牛舌头子	142
牛舌头草	184
牛耳朵棵	142
牛鞭郎草	116
井口边草	140
牙蛙消	274
牙刷草	172
仁丹草	332
无根草子	284
方茎牛角刺	106

【五 划】

龙胆	178
龙牙草	180
龙虎草	96
白药	268
白英	154
白马骨	130
白牙蒿	180
白鸟儿头	150
白花地丁	316
白婆婆丁	322
石见穿	160
石胡荽	312
石荷叶	226
节节高	228
节节草	130
奶汁草	190
奶头草	206
奶青草	300
古古丁	322
四轮草	256

甘菊花	290
田皂角	294
田芝麻棵	276
包头花根	188
打碗花	104
打官司草	142
冬青子	108
冬青树子	108
东北天南星	134

【 六 划 】

地星	168
地笋	228
地参	216
地丁草	316
地骨皮	264
地瓜儿苗	228
地藕秸子	228
地蜈蚣草	214
西氏毛茛	128
光叶菝葜	118
红苏	314

红根	126
红梔	292
红丝草	190
红茜根	256
红梗草	262
红紫苏	314
血三七	114
决明	194
合萌	294
百部袋	182
米口袋	300
并头草	172
吐丝草	286
羊角豆	304
观音柳	192
灯心草	176
灯笼头	280
灯盏窝种子	148
老人头	168
老黄嘴	168
老鸦头	168
老鼠花	206

老人发根	156
老冠花根	156
老鸦眼睛	146
老虎脚爪草	128
老虎脚迹草	128
老虎脚底板	128

【 七 划 】

麦冬	212
麦蓝菜	148
芽胡	270
苏薄荷	332
苍耳子	204
苍耳草	204
芫荽子	208
吸床子	296
豆寄生子	284
忍冬	240
忍冬藤	240
杠板归	246
旱莲草	330
还阳草	220

沙荸荠	252
冷饭团	118
针线包	136
沟香薷	260
兔子草	124
兔耳草	104
闹鱼花	206
扶母苗	104
时果叶子	128
拟天南星	134
拟灯心草	176

【 八 划 】

苦草	276
苦茄	154
苦蒿	232
苦蕒菜	324
金马兰	228
金豆角	304
金刚刺	298
金沸草	302
金钱松	120

金丝荷叶	226
金黄丝子	284
金线吊芙蓉	226
拉拉藤	310
青藤根	138
沿阶草	212
乳浆草	230
细米草	170
直立百部	182
狗奶子	264
茅术	202
茅苍术	202
京大戟	96
京苍术	202
刺儿菜	100
刺杀草	100
刺角菜	100
刺杆菜	100
刺梨子	242
刺犁头	246
贯叶蓼	246
岩头松	220

垂盆草	214
-----------	-----

【 九 划 】

南星	134
药瓜	166
绒蒿	258
香艾	164
香菜	208
香薷	208
香丝菜	102
香附子	252
怪柳	192
枸杞	264
枸杞头子	264
胡桃	266
胡荽	208
胡苍耳	250
牵牛	308
牵牛子	308
独角莲	134
独脚虎	274
将军草	98

茴香	102
草决明	194
羌藟子	276
荆沥	200
荆条棵	200
荆树皮	120
扁叶胡	270
狭叶柴胡	270
活血丹	224
活血草	256
活血根	126
活血藤	186

【 十 划 】

席草	176
粉葛	306
粉葛根	306
家艾	164
家蓬头	164
臭蒿	232
栝楼	166
莎草	252

鬼麦	334
鬼叉叉	278
鬼蜡烛	320
鬼蒺藜	278
鸭抓菜	282
榿树叶	144
柏油树叶	144
铁马鞭	124
铁血藤	256
铁刺杆草	98
铁脚将军草	238
难尿个子	138
桑上寄生	288
皱面草	132

【 十一划 】

梗草	268
梗通	294
猫刺	98
猫儿眼	230
猫耳朵	196
猫耳朵草	300

萝藦	136
萝丝种子	284
萤火虫草	282
脱力草	180
蛇草	170
蛇床	296
蛇啄草	170
蛇狼草子	296
野麦	334
野山楂	110
野牛膝	116
野石榴	242
野芋头	134
野园荑	312
野苦瓜	166
野荞麦	238
野辣菜	98
野葡萄	112
野薄荷	332
野菊花	290
野黄菊花	290
野木香根	234

野韭菜根	212
野皂角杆	294
野槐树根	216
野葫芦卜子	296
菊三七	114
雪见草	260
脚臭草	248
淡竹叶	282
球子草	312
犁头草	316
猪长草	122
猪耳边子	142
猪耳朵棵子	142
绵茵陈	258
绵毛马兜铃	196
辅秧	104
黄木香	196
黄龙尾	180
黄花草	322
黄花菜	236
黄花郎	322
黄花蒿	232

黄香蒿	232
黄豇豆	304
黄梔子	292
黄花大戟	96
黄花地丁	322
黄荆条子	200
菘蓝	244
婆补丁	322
婆婆针	278
婆婆针线包	136

【 十二划 】

葛条	138
萱草	236
萱草根	236
斑根	224
黑苏	314
紫参	160
紫玉兰	198
紫丹参	126
紫花草	162
紫金牛	174

紫金龙	224
紫朵苗根	188
猴子毛	258
棒头草	280
割人藤	310
稀须菜	324
蛤蟆草	260
喉白草	116
喉咙草	116
喉痹草	116
喉白草子	194
掌叶半夏	168
筋骨柱子	298

【 十三~十四划 】

蒲草	320
蒿子叶	164
蛾子草	116
蓝花草	282
蓝花菜	316
蓝花姑娘	282
蓝蝴蝶	218

蕺衣草根	252
锯没子草	294
酱板头草	122
楂果	110
椿根皮	272
管仲	222
算盘子	328
馒头草	328
鲜土苓	118
满天星	130

【 十五划 】

蕺菜	248
鹤虱	132
鹤光瓢	136
鹤瓢棵	136
靠山红	126
墨烟草	330
铺地锦	190
箭猪腰	152
瞌睡果子草	128

【十六~二十一划】

糖罐子	242
糖桔子	242
膨胀草	260
癞蛤蟆草	132
癞枯草	260
鳢肠	330

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=江苏验方草药选编 （上集）

作者=江苏省革命委员会卫生局编

页数= 3 7 2

S S 号= 1 1 3 2 0 0 7 3

出版日期= 1 9 7 0 年 0 7 月第 1 版

书名
版权
前言
目录

 验方部分

传染病

 伤风感冒
 流行性感
 麻疹
 水痘
 白喉
 百日咳
 疳腮（流行性腮腺炎）
 细菌性痢疾
 疟疾

寄生虫病

 钩虫病（粪毒、黄胖病）
 虫积（肠蛔虫）
 蛔厥（胆道蛔虫病）
 阿米巴痢疾
 血吸虫病
 丝虫病（乳糜尿、象皮肿）

内科疾病

 咳嗽（支气管炎）
 哮喘（支气管哮喘）
 肺痛（肺脓肿）
 胃痛（慢性胃炎）
 胃、十二指肠溃疡
 胆囊炎、胆石症
 肠痛（急性阑尾炎）
 脱肛
 水肿（急、慢性肾炎）
 急性肾盂肾炎
 石淋（膀胱结石）
 小便不通（尿潴留）
 痹症（风湿痛、关节炎）
 偏正头痛
 口眼歪斜（面神经麻痹）

妇产科疾病

 月经不调
 痛经
 经闭
 倒经
 崩漏（功能性子宫出血、产后流血）
 赤白带下
 妊娠呕吐
 先兆流产
 产后腹痛
 乳汁不下
 阴道滴虫病

儿科疾病

 小儿泄泻（小儿消化不良）
 吐乳
 疳积（小儿营养不良）
 遗尿
 惊风（小儿惊厥）

外科疾病

瘰癧（颈淋巴结核）
疔疮
搭背
流痰（骨结核）
附骨疽（化脓性骨髓炎）
乳痈（乳腺炎）
臁疮（下肢溃疡）
痔疮
跌打损伤（挫伤、扭伤）
 外伤出血
 冻疮
 烫伤
 毒蛇咬伤

皮肤科疾病
 秃疮（发癣、黄癣）
 癣疮（体癣）
 湿疹
 皮肤搔痒
 缠腰火丹（带状疱疹）
 丹毒
 鹅掌风
 手足皲裂
 鸡眼
 绣球风（阴囊瘙痒）

五官科疾病
 目翳（化脓性角膜炎）
 眼癣（睑缘炎）
 夜盲症
 脓耳（化脓性中耳炎）
 鼻渊（副鼻窦炎）
 慢性鼻炎
 乳蛾（急性扁桃体炎）
 牙痛

 草药部分

大戟
大蓟
小蓟
小茴香
小旋花
飞帘
女贞子
山楂
山葡萄
土三七
土牛膝
土茯苓
土槿皮
马齿苋
马鞭草
丹参
毛茛
六月雪
天名精
天南星
天浆壳
木防己
凤尾草

车前草
乌柏叶
乌菰莓
王不留行
白芨
白菰
白毛藤
白头翁
石韦
石打穿
石芥薹
艾叶
瓜蒌
半夏
半边莲
半枝莲
平地木
龙须草
龙胆草
仙鹤草
百部
羊蹄
红藤
地榆
地锦草
西河柳
决明子
寻骨风
辛夷
牡荊
苍术
苍耳
芫花
芫蒌
花椒
麦门冬
佛甲草
苦参
鸢尾
卷柏
贯众
虎杖
虎耳草
泽兰
泽漆
青蒿
青木香
金针菜
金荞麦
金银花
金樱子
板蓝根
河白草
鱼腥草
刺果甘草
香附
草乌

茜草
茵陈蒿
荔枝草
珍珠菜
枸杞子
核桃
桔梗
柴胡
臭椿
徐长卿
益母草
鬼针草
夏枯草
鸭跖草
菟丝子
海金沙
桑寄生
野菊
栀子
梗通草
蛇床子
菝葜
甜地丁
旋覆花
望江南
葛根
黑白丑
葎草
鹅不食草
紫苏
紫花地丁
辣蓼
蒲黄
蒲公英
墓头回
锦鸡儿
算盘珠
墨旱莲
薄荷
瞿麦

附录
植物常用名词术语解释
草药别名索引