

編 者 的 話

为了繼續发掘祖国医学遺產，推广民間治疗經驗，更好地保障人民身体健康，为社会主义建設事业服务，我們繼《广西中医驗方选集》第一集出版之后，将各地所献的民間驗方、秘方、单方，又选編成第二集出版，以資交流。

本集收集常見疾病九十九种，共五百九十四个方剂。編輯体例、計量单位等与第一集同，不同的是在书后附有草藥植物学名索引，以便讀者查閱。每个方剂的来源，都是按献方同志当时所报的工作单位名称介紹的，因此，可能与目前实际情况有出入，請献方同志原諒。

由于我們缺乏經驗，水平有限，选編工作中的缺点和錯誤，尚希献方同志与讀者指正。

广西僮族自治区中医葯研究所

一九六二年三月

目 录

时 疫 門 (56 方)

时行感冒	类 (7 方)	(1)
痢疾	类 (24 方)	(3)
疟疾	类 (18 方)	(13)
疥癩	类 (1 方)	(20)
湿温	类 (5 方)	(21)
瘰癧	类 (1 方)	(25)

內 科 門 (225 方)

肺癆	类 (7 方)	(27)
咳嗽	类 (14 方)	(30)
吐血	类 (3 方)	(36)
肺痛	类 (5 方)	(38)
失音	类 (3 方)	(41)
黃疸	类 (22 方)	(42)
黃胖	类 (5 方)	(54)
肿胀	类 (12 方)	(57)
风湿	类 (12 方)	(63)
痿躄	类 (4 方)	(68)
拘攣	类 (1 方)	(70)
鶴膝風	类 (1 方)	(70)
腰痠	类 (4 方)	(71)
癱瘓	类 (9 方)	(73)
失眠	类 (4 方)	(78)
虛損	类 (2 方)	(80)

頭痛眩暈類(8方).....	(81)
中風中痰類(2方).....	(85)
呃逆類(1方).....	(86)
噎膈類(1方).....	(86)
反胃類(3方).....	(87)
吐瀉類(7方).....	(88)
腹瀉類(6方).....	(92)
胃腸痛類(28方).....	(95)
肋痛類(1方).....	(106)
痞塊類(3方).....	(107)
腸痛類(8方).....	(108)
消渴類(1方).....	(113)
淋病類(16方).....	(114)
遺精類(3方).....	(121)
疝病類(5方).....	(122)
陽痿類(3方).....	(124)
縮陽類(3方).....	(126)
大便不通類(1方).....	(127)
大便痢血類(4方).....	(128)
脫肛類(3方).....	(129)
癰瘤類(3方).....	(131)
夾色傷寒類(1方).....	(132)
解毒類(6方).....	(132)

婦科門 (82方)

調經類(12方).....	(135)
胎前類(15方).....	(140)
產后類(11方).....	(147)
崩帶類(34方).....	(152)

阴挺	类(6方)	(164)
瘰癧	类(2方)	(168)
阴痒	类(1方)	(169)
性交出血	类(1方)	(169)

儿 科 門 (49方)

麻疹	类(9方)	(171)
痘疮	类(1方)	(175)
鸪鹑咳	类(10方)	(175)
喉症	类(2方)	(180)
肺热咳嗽	类(5方)	(181)
哮喘	类(1方)	(184)
脐风	类(1方)	(184)
惊风	类(4方)	(185)
小儿麻痹	类(1方)	(186)
吐泻	类(1方)	(187)
腹泻	类(2方)	(188)
夜啼	类(1方)	(189)
遗尿	类(1方)	(190)
疝气	类(1方)	(190)
脱肛	类(2方)	(191)
白泡疮	类(1方)	(191)
疳积	类(6方)	(193)

外 科 門 (145方)

花柳病	类(3方)	(197)
破伤风	类(2方)	(198)
跌打损伤	类(16方)	(199)
接筋駁骨	类(13方)	(206)

炮 礮 类 (3 方)	(213)
止 血 类 (3 方)	(214)
異物刺入肉类 (2 方)	(215)
湯 火 伤 类 (9 方)	(216)
皮 癬 类 (1 方)	(220)
皮肤湿毒类 (4 方)	(221)
风 疹 类 (8 方)	(223)
油 蟻 类 (2 方)	(226)
疮 瘍 类 (20 方)	(227)
疔 毒 类 (5 方)	(235)
骨 疽 类 (2 方)	(238)
乳 痛 类 (8 方)	(239)
无名肿毒类 (2 方)	(242)
瘰 癧 类 (5 方)	(243)
痔 疮 类 (8 方)	(246)
潰 瘍 类 (3 方)	(250)
贅 疣 类 (1 方)	(251)
骨 哽 类 (7 方)	(252)
毒蛇咬伤类 (15 方)	(254)
狂犬咬伤类 (3 方)	(260)

五 官 門 (37 方)

眼 病 类 (13 方)	(263)
耳 病 类 (2 方)	(268)
鼻 病 类 (5 方)	(269)
口 腔 病 类 (9 方)	(271)
咽 喉 病 类 (8 方)	(274)
草藥植物学名索引	(278)

时行感冒类

治时行感冒方

一 方

主治：时行感冒（流行性感冒）寒热，头痛或身痛，鼻流涕或咳嗽。

处方：青蒿二十斤 薄荷十斤 甘草五斤

用法：将药切碎，用水一百斤，煮浓后，过滤去渣，浓缩为五十斤。成人每日六十至九十毫升，分三次服。

功用：疏表清热。

疗效：曾用本方治疗六百多人，效果很好。

来源：临桂县医药科学研究所

二 方

主治：时行感冒（流行性感冒）。

处方：黄皮果叶〔1〕一兩 桑叶一兩 茅根一兩

用法：用水三碗，煎取一碗半，一日分三次服。如患者并发肺炎，可加石膏二两同煎。

疗效：本方曾在那隆大队治疗十五例，效果很好，只服药一天便愈。

来源：崇左县那隆公社医院

三 方

主治：流感，头痛，恶寒发热，咳嗽，鼻塞，流涕。

处方：银花藤六钱 青蒿三钱 鬼灯笼〔2〕根四钱 土荆芥〔3〕三钱

〔1〕见草药植物学名索引，以下同。

淡竹叶三錢 芦根五錢 薄荷一錢 桑叶三錢 野葛〔4〕五錢

用法：用适量水煎取一碗半，一日分二次服。

疗效：陈××，患时行感冒，鼻塞流涕，微恶寒发热，四肢困倦，头晕，服药一剂而愈。

来源：陆川县卫生防疫站 苏廷芳

四 方

主治：流感，头痛，恶寒发热，口渴，四肢痠痛。

处方：葱花（连须）一两 生姜（切片）二两 豆豉一两 食盐适量

用法：用水一碗半煎取大半碗，热服，温复取微汗。

疗效：英山乡感冒流行时，用此方治愈多人。

来源：鹿寨县英山公社医院 饒松圃

五 方

主治：时行感冒，恶寒发热，头痛，身痛，咳嗽，流涕。

处方：葛根五錢 銀花三錢 連翹三錢 桔梗三錢 杏仁三錢 甘菊三錢 桑叶四錢 薄荷一錢五分 甘草一錢五分

用法：用水二碗，煎取一碗許，一日分二次服。

附注：热甚加石膏一两、紫雪丹五分。呕吐加竹茹三錢、藿香一錢五分、枳壳二錢。泄瀉加川連二錢、黃芩二錢。

功用：疏表清热。

疗效：感冒流行时，曾用本方治疗患者一千多例，收效很显著。

来源：南宁市 曹思秋

針灸預防时行感冒

主治：預防时行感冒（流行性感冒）。

取穴：足三里（雙）

手法：采用弱刺激法（即兴奋法），不留針。

疗效：曾用本方对二千多名健康者，作針灸預防，計經两次針足

三里后，效果很好。

来源：天等县天等診所 赵沛成

时行感冒針灸疗法

主治：时行感冒，恶寒，发热，头痛。

取穴：风府 风池 合谷 外关 曲池 大椎

手法：泻大椎发汗，泻合谷退热。

疗效：刘××，男，五十一岁，患流感，經針二次即愈。

来源：融安县长安民族医院 黃繼香

痢 疾 类

治 痢 疾 方

一 方

主治：发热或不发热，腹痛里急后重，大便頻数，下紅白胶冻样便。

处方：蜆草〔5〕一斤

用法：加水二千毫升，煮沸后文火煎成一千毫升，按年龄病情每日給八百至一千毫升，分多次当茶作飲料。

功用：清热解毒。

疗效：本方治疗痢疾效果很好，我院曾实验八例，在治疗中不服其他抗痢疾药物，其中有脱水者，可輸液或輸血。症状消失平均天数：发热約三天，腹痛两天半，里急后重两天，大便次数約四天正常，紅白粘液四天。服药后，无任何副作用。

附典型病例如下：

陈××，男，七个月。五天来腹泻发热，每日大便十次左

右，为紅白胶冻样大便，量少便难，尿少，口渴想飲，精神尚可，飲食欠佳，曾服中藥三天及合霉素一天未见好轉，急診入院。診斷：細菌性痢疾。反复服用合霉素及磺胺类等藥物治疗，并內服中藥，也曾肌注青霉素、鏈霉素，輸血輸液等，病情未见好轉，体溫波动在 36.8°C — 39.4°C 之間，大便日排6—11次，系紅色胶冻样便，化驗大便培养出福氏型痢疾杆菌。改用蜆草飲服，第七日，体溫降至正常范围，不再升起，大便肉眼看不见血液及粘液。服蜆草第八日大便培养阴性，塗片无血球，是日下午痊愈出院。

来源：玉林专区医院

二 方

主治：痢下脓血粘液，腹痛，里急后重，大便頻数。

处方：闊叶十大功劳(8)(又名木黃連)干茎一两二錢(可按年齡病情增減)

用法：切片用水二碗煎取一碗，一日分三次服。或用大量制成流浸膏(每1.5毫升含生藥一錢)，每日服三至四次，每次七毫升。

疗效：本方經治疗六十一例，全部痊愈。举例如下：黃××，女，三十七岁，住南宁有行街。畏寒发热，每天大便十七次，含脓血性粘液，腹痛，里急后重，作悶，呕吐两次，吐出物为胃內容物，有輕度头晕和疲倦。体溫 38°C ，大便培养福氏痢疾杆菌阳性，第一天服十大功劳三次，每次七毫升，不服任何抗痢藥物；第二天大便十次，仍有脓血粘液、腹痛、里急后重、汗出等症狀，仍服本剂三次，每次七毫升；第三天大便已无脓血粘液，一切临床症狀亦消失，大便复查細菌培养痢疾杆菌阴性。

来源：广西中医藥研究所 广西卫生防疫站 南宁市紅十字会医院 南宁市公費医疗門診部 南宁市第一联合医院

三 方

主 治: 痢下赤白，腹痛，里急后重，大便频数。

处 方: 生雷公筋〔7〕四斤 白矾五钱 生盐五钱

用 法: 先把雷公筋捣溶，加开水三千毫升，再入白矾、生盐，搅匀之后，待冷，澄清过滤，瓶貯待用。成人每日一百至二百毫升，分三次服，儿童酌减。

疗 效: 用本方經治一百五十例痢疾患者观察，疗效达98%。

来 源: 柳州市中医联合診所

四 方

主 治: 痢疾，腹痛，里急后重，便少而頻，排粘質或脓血便。

处 方: 老虎耳〔8〕（又名大虫耳、土狼毒、野芋头）根茎

用 法: 去外皮取白肉，切成薄片，放鍋內，按每一斤二两生药，加水三斤，猛火煎二至四小时，去渣过滤，再浓缩成三百毫升，相当于一百毫升含原生药六两，再入0.3%石炭酸防腐（一般可貯藏二至四个月，若是現制現用，可不加石炭酸防腐剂），密封备用。成人每天一百毫升，分三次服，每次量相当于原生药二两，两天为一疗程，小孩酌减。

疗 效: 曾用老虎耳液剂治疗痢疾四百多例，治愈率达99.3%。举例如下：（一）庞××，男，二十四岁。腹痛，大便困迫，有脓血，給服磺胺胍六克（分三次服），腹痛反加剧，日夜大便二十多次，口检溫 39.2°C，口渴。改用老虎耳煎液，一个疗程，服药第二次后，腹痛減輕，服药一天后，症状消失；（二）卢××，女，八十岁。患痢十多天，經治无效，排白色粘液夹杂脓血便，里急后重，日二十多次，每登廁未及而大便失禁，体弱，行动需人扶持，中度失水，不能进食（仅飲些米湯），身热，脉浮数而澀。給服老虎耳煎剂一天，病即減輕，能食稀粥半碗，再服两天而愈。

来 源: 博白县老虎头水库卫生室

五 方

主 治: 大便频数，里急后重，下粘液或脓血便。

处 方: 野芋头〔9〕二两 大米少许

用 法: 野芋头去皮切碎，和大米混合炒成黄色，加水三百毫升，浓煎成一百毫升，一日分三次服，连服三至六天。

疗 效: 曾用本方治一百多例，效果很好，一般用药后第二天症状普遍减轻，第六天全部痊愈。

来 源: 邕宁县水利工地医院

六 方

主 治: 大便频数，里急后重，粪呈脓血状（无论细菌痢、原虫痢均治）。

处 方: 三月梅〔10〕根一两 黄花母〔11〕二两

用 法: 上二味均用干的（生鲜的加倍），加水二百五十毫升，煎成一百毫升，一天两次分服。

疗 效: 郭××，女，二十七岁。因发热发冷、腹痛、大便水样并有脓血状已三天而入院，入院后每小时大便一次，里急后重，体温 39°C ，体检心肺阴性，腹部柔软，有轻度压痛，肠蠕动音亢进，有脱水状。大便检查：脓细胞（+++），红细胞（++）。入院输液五百毫升，内服本方每日一剂，次日体温正常，服第三剂后，大便恢复正常而出院。

来 源: 柳州专区医院 黄惕生

七 方

主 治: 痢疾，腹痛，里急后重，大便频数，下红白粘液便。

处 方: 马鞭草一斤 生六月霜〔12〕二斤

用法：加水二千五百毫升，煮取一千八百毫升，过滤后，每一千毫升加白矾一錢，瓶貯候用，用时，每日服一百至一百五十毫升，分三次服，每隔三小时服一次，小儿酌减。

疗效：我所曾用本方治疗五十例痢疾患者，疗效达95%以上。

来源：柳州市中医联合診所

八 方

主治：发热或不热，头痛或不痛，或恶心呕吐，腹痛，里急后重，大便紅白胶冻，日行十数次。

处方：五蕨湯：青蕨〔13〕二兩 黑蕨〔14〕二兩 柏枝蕨〔15〕一兩 凤尾蕨〔16〕一兩 半边蕨〔17〕一兩

用法：用水二斤煎成一斤，一日分三至四次服。

附注：地方习惯加銀器和药同煎，白痢多或虛弱者宜加蜜糖同服。

疗效：曾用本方治疗細菌性痢疾八十一例，效果良好。

禁忌：服药期間忌食油膩物。

来源：北流县医药研究院

九 方

主治：痢下赤白，日十多次或数十次，腹痛，里急后重。

处方：黄花草〔18〕叶 蜜糖各适量

用法：将叶捶烂，絞取自然汁半茶杯，加适量蜜糖，飯前开水冲服。如无鮮草，可用于草煎水冲蜜糖服。

疗效：陆××，女，七十一岁。患紅白痢六天，經医无效，大便一日二、三十次，里急后重，用本方服二次而愈。

来源：南宁市 黃煥輝

十 方

主治：下紅白胶冻，腹痛，里急后重。

处方：青蕨〔13〕 黑脚蕨〔19〕各一握

用法：搗烂冲开水服。

疗效：1949年家乡痢疾流行，当时李老翁用草药治愈多人，我患痢經其治愈，我母細驗药渣，系此两种草药，后用以治痢，愈病多例，遂作至宝灵丹，秘而不宣，后密授于我，我患痢数次，均以本方治愈。

来源：广西中医专科学校 賴安全

十一方

主治：一切紅白痢疾。

处方：番桃叶〔20〕 桉树叶〔21〕各等分

制法：加水煎成浓液，去渣，用布滤过，再高度浓缩，干燥后制成小片，每片約半克。

用法：每次服三、四片，每日三次。

疗效：廖××等三人患痢，服用本方，一、二天均痊愈。

来源：崇左县那隆公社 洗肇枝

十二方

主治：初起发烧，痢下赤白，里急后重，大便一日一、二十次，或三、四十次。

处方：黄麻根〔22〕一兩五錢 假莧菜〔23〕根一兩五錢 紅池木〔24〕根一兩五錢 火炭藤〔25〕一兩五錢

用法：取鮮药洗淨，用适量水浓煎取一碗，飯前一次服，每天一次。

疗效：本方用于临床，治愈五百例以上。举例如下：

上游公社洞心工区蓝××患痢，服此方一剂痊愈；秀兰洞村呂××的小孩患痢疾，服此方二剂痊愈；某工厂医院采用本方治疗五十七例，服药一、二剂痊愈的占90%，三剂痊愈的占10%，疗效很高。

来源：陆川县 呂肇麟

十三方

- 主治：**赤白痢下，或发热恶寒，大便浓血，有粘液，里急后重，腹痛，口渴。
- 处方：**天星蕒〔26〕 生茅根 灯盏菜〔27〕 青蕨〔13〕 黑墨草〔28〕 痴头婆〔29〕根 草菊子〔30〕各等量
- 用法：**用适量水煎成碗半，一日分二次服。
- 附注：**口渴甚者倍加天星蕒；便血多者倍加茅根；里急后重倍加痴头婆根。加白銀四毫同煎更好。
- 疗效：**楊××等五人患痢疾，均服本方而愈。
- 来源：**岑溪县东方红公社中心医院 刘统格

十四方

- 主治：**发热或不发热，大便频数，初则下水样便，繼則轉为紅白粘液，便前腹痛，里急后重。
- 处方：**发菜三錢
- 用法：**洗淨煮熟一次頓服，每日服一次（可加盐或糖調味）。
- 疗效：**（一）梁××，男，三十八岁。因腹泻、粪便带紅白粘液三天而入院。大便次数頻繁，伴有里急后重，便前腹絞痛，服本方，每日一次，服药当日下午，大便次数明显減少，里急后重減輕，大便仍有紅白粘液。繼續服药两天，第四天痊愈出院；（二）葛××，男，三十三岁。因突然发热腹泻半天入院。半天內大便十多次，粪質水样状，繼轉为紅白粘液，伴有便前腹絞痛，明显里急后重，粪便培养出福氏痢疾杆菌。入院后以磺胺类及大蒜液治疗，未見效。改用本方治疗三天，一切症状消失，大便正常而出院。
- 来源：**梧州市人民医院 卢世永

十五方

主治：初起发热，痢下赤白，里急后重。

处方：路边青〔31〕六两 凤尾蕨〔16〕四两 赤小豆五钱 番桃木〔29〕叶四张 约一钱 水浸石子七枚 銀器一只（不論手鐲、銀元均可與药同煎）

用法：用适量水煎取一碗，飯前作一次服。

疗效：曾用本方治疗五十二例，疗效很高，一般服药一至三剂痊愈。

来源：陆川县上游公社 俞桂华

十六方

主治：痢疾或腹泻。

处方：凤尾蕨〔16〕二钱 假紅蓝〔32〕 屈針草〔33〕 紅豆蔻 辣蓼草〔34〕 地桃花根〔35〕各三钱

用法：用适量水煎成一碗半，一日分三、四次服。小儿酌減。

疗效：用此方治愈痢疾多例，效果很好。

来源：馬山县林圩公社制药厂 何兆权

十七方

主治：腹痛下痢，大便紅色胶粘。

处方：紅鉄树〔36〕叶一两 瘦猪肉四兩

用法：加适量水煎，以肉熟为度，去渣，食肉和湯，每日服一剂。

疗效：曾使用此方治疗久痢患者八例，均获痊愈。如譚××，男，六岁。下痢腹痛，大便紅色胶粘，腥臭，身体虛弱，来院診治，給服本方一剂而愈。

禁忌：孕妇忌服本方。

来源：忻城县古蓬公社民办医院 白玉荣

編者按：本方治血痢、血淋均效。

十八方

- 主治：**腹痛，下赤白痢，里急后重。
- 处方：**地桃花〔35〕根三錢 車前草三錢 土牛膝〔37〕三錢
- 用法：**以水二碗，煎取一碗，加蜜糖少許調味，一日分二次早晚服。
- 附注：**本方加青蒿三錢兼治濕熱腹瀉。
- 療效：**曾以本方治療痢疾三十例，均愈。茲舉一例如下：藍××，女，十八歲。患紅白痢，每日下痢七、八次，腹痛，里急后重，來院診治，僅給服本方一劑即愈。
- 禁忌：**久痢虛弱者不宜用。
- 來源：**忻城县古蓬公社民辦醫院 白玉榮

十九方

- 主治：**紅痢，白痢，或紅白相兼者。
- 处方：**生大黃五錢 熟大黃五錢 北杏仁四錢 制草烏三錢 川烏三錢 枳實三錢 川木香三錢 茅山蒼朮四錢
- 用法：**上藥八味，分別為細末，混合為散，密封瓶內，每服二、三錢，開水送下。
- 療效：**唐××，男，二十九歲。患細菌性痢疾，曾服治痢方藥六、七天無效。後服此散一次，病去七八，二服痊愈。
- 來源：**崇左县銀团公社醫院 周文揚

二十方

- 主治：**赤白痢疾，腹痛，里急后重。
- 处方：**川連 黃芩 白芍 山楂 枳殼 厚朴 檳榔 甘草 紅花 廣木香 當歸 桃仁各一兩 青皮五錢
- 用法：**共為極細末備用。每天服二次，每次三錢，開水送服。

功用：清热解毒，行气调血，消积导滞。

疗效：在痢疾流行时，曾用本方治疗，疗效很高。

来源：陆川县红旗中医院 杜紹馨

二十一 方

主治：发热或不热，腹痛，里急后重，大便频数，粪便内含粘液脓血。

处方：金银花五钱 黄连二钱 木香一钱五分（后下） 神曲一钱

用法：水二碗，煮取一碗半，一日分三次服。

功用：解毒清湿热，消积化滞，治痢疾及热性泄泻。

疗效：曾用此方治疗痢疾（细菌性痢疾）六例，热性泄泻（急性肠炎）五例，效果良好。

来源：广西中医药研究所临床室 广西防疫站

二十二 方

主治：久痢，休息痢（阿米巴痢）。

处方：乌梅肉五钱 鸦胆子（去壳）三钱 银花炭三钱

用法：共研细末，面粉为丸如绿豆大，每服五分，日服二次，白糖水送服。

疗效：本方曾用以治疗多例久痢和休息痢，效果良好，如周××患痢疾数月不愈，用本方治疗即愈。

来源：岑溪县高益中心医院 周干斋

二十三 方

主治：久痢不止。

处方：椿树皮五钱

用法：用酒一碗煎取半碗，一日分两次服。

功用：清湿热，涩肠固下。

疗效：朴××之子，患痢疾，日久不愈，服本方后即愈。

禁 忌：母猪肉、生鸡肉、生冷等食物。

来 源：陆川县红旗医院制药厂 杜紹馨

二十四方

主 治：赤痢久不愈。

处 方：盐梅一个 黄連一錢 灶心土一兩

用 法：将上各药共为細末，用茶調和，或好醋調服，分三次服，每隔四小时服一次。

疗 效：自用本方十余年来，經治疗四十五例患者，均愈。如潘××，男，三十六岁。患痢疾，大便胶粘，肚痛，发热，每日下痢五、六次，里急后重，将近一月。来院診治，用本方治疗，三日痊愈。

来 源：忻城县古蓬公社周安民办医院 黄广昌

疟 疾 类

治 疟 疾 方

一 方

主 治：疟疾初起，寒热往来，热多寒少，每日发作有定时。

处 方：三月泡〔38〕根二兩 仙鶴草一兩 土柴胡〔39〕五錢

用 法：用水三碗，煎取一碗半，一日分三次服，每次服半碗，第一次在发作前二小时服，以后每隔四小时服一次。

疗 效：本方治疗疟疾，經使用二十多年，治愈病例很多，光在雷垌村一带，先后共治疗七十余例，均愈。如患者潘××，男，七十岁。患疟疾，日发一次，寒热往来有定时，热多寒少，呕吐，口渴，病已十多天，用本方治疗，連服两剂痊愈。

禁忌：久疟身体虚寒者不宜用。

来源：忻城县红渡公社卫生所 潘雅川

二 方

主治：各型疟疾均治。

处方：土常山〔40〕八钱 鬼羽箭五钱 陈皮一钱五分 金银花四两

用法：以水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

附注：服至第三剂须加青蒿三钱。

疗效：本方于1958年12月在郊区医院使用，治疗疟疾四十余例，间日疟、三日疟服药五天痊愈，恶性疟服药四天痊愈。

来源：南宁市 杭乃苓

三 方

主治：疟疾。

处方：川贝一兩 生半夏二兩 生姜汁五钱

用法：二味共研细末，每服一钱二，以生姜汁调服，疟发前一小时服，后隔四小时服一次，日服三次，连服两天。

疗效：本方治愈疟疾患者多人，疗效显著。如黄××，女，十七岁，住在妙公社更梓屯。患间日疟，缠绵二十多天，面黄贫血，食欲不振，服本方六次（两天）而愈。

来源：上思县在妙公社人民医院 黄兆祥

四 方

主治：三日疟。

处方：桂枝三钱 荆芥二钱 京子三钱 银胡五钱 常山四钱
乌梅三只 草果二只 香附三钱 尖槟三钱

用法：用水二碗，煎取一碗，于疟发前一时顿服。

功用：疏表、化痰、消滞、截疟。

疗效：丁××和王××，患三日疟，经治两三个月未愈，后用本

方，服四剂而愈。

来源：柳州市城中医疗站

五 方

主治：三日疟。

处方：常山二钱 草果一钱 茯苓二钱 防党四钱 白朮二钱 甘草一钱 知母二钱 当归二钱 赤芍二钱 熟地三钱 青皮一钱 法夏二钱 生姜一钱五分 大枣一钱五分

用法：用适量水煎取一碗半，分两次服，疟未发前两小时服一次，发过后服一次，每天服一剂。

疗效：周×之子和潘××，同患三日疟，均用本方治愈。

来源：马山县人委卫生科 蓝紫瑞

六 方

主治：疟疾，按时发作，头痛，口苦，欲呕，渴喜热饮，舌苔白滑。

处方：加味小柴胡汤：柴胡五钱 党参二钱 黄芩三钱 半夏三钱 川朴二钱 青皮二钱 草果一钱五分 甘草一钱五分 红枣三枚 生姜三片

用法：用水一碗半，煎取大半碗，于疟未发前三小时顿服。

疗效：本方先后共治愈疟疾患者多人，疗效很好。举例如下：
桥圩公社蒙垌工区周××之母，五十八岁。患疟疾，经诸医治疗不效，后用本方连服四天而痊愈。

来源：贵县八塘公社人民医院 陈文亭

七 方

主治：疟疾。

处方：常山四钱 草果三钱 毕拔三钱 苍朮三钱 管仲三钱 胡椒四钱 槟榔三钱

用法：上药共为细末，每用药粉三钱，盛入小布袋里，用鼻嗅之，每天嗅数次。

疗效：本方不用服药，不须打针，每天嗅数次即痊愈，本人医过十六人，均获痊愈。

来源：南宁市 谢光甫

八 方

主治：间日疟，冷多热少，或只冷不热，脉弦而虚者。

处方：北胡五钱 桂枝二钱 干姜一钱 花粉二钱 黄芩二钱
牡蛎三钱

用法：用适量水煎取大半碗，药渣再加水煎取大半碗，将两次药混合，一日分三次服，在疟发前两小时左右服第一次。

疗效：周××、朱××、蒙××等，同患此病，均用本方治愈。

来源：马山县人委卫生科 蓝紫瑞

九 方

主治：夜热早冷，热退无汗，热多寒少，口渴，按时而发的疟疾者。

处方：青蒿二两五钱 生地四钱 知母三钱 赤芍二钱 鳖甲六钱
丹皮三钱 地骨皮四钱

用法：用适量水煎，青蒿后下，煎取一碗半，分三次服。

疗效：本方疗效很好，有一妇女患疟，夜热早冷，曾服阿的平、注射奎宁无效，服本方二剂即愈。

来源：马山县周六公社医院 罗建邦

十 方

主治：往来寒热，久治不愈，发作时厥逆昏迷。

处方：真武汤：熟附三钱 白朮三钱 茯苓三钱 白芍三钱
生姜三钱

用法：水二碗煎取一碗，一日分二次服。

疗效：莫××，三十岁。患往来寒热，两月余未愈，每发时厥逆人事不知，先与补中益气汤，是夜厥逆更甚，翌日精神较好，改用真武汤祛寒以治本，一剂疟已不发，后用六君子汤善后。

来源：广西中医专科学校 林鸣皋

十一方

主治：久疟不愈。

处方：党参四钱 白朮三钱 当归四钱 陈皮二钱 黄芪五钱
升麻一钱 柴胡五钱 炙草三钱 龟板一兩 鳖甲一兩
山甲(地)二钱

用法：用水四碗，先煎三甲，煎至三碗，纳诸药，煎取一碗，一日分三次服。

功用：补中益气，养阴断疟。

疗效：本方系补中益气汤加三甲，先后治疗三例，患期二例数月以上，一例已一年多，经用中、西、草药等无效，用本方三至四剂痊愈。

来源：南宁市 杭乃苓

十二方

主治：久疟不愈。

处方：山甲(地)五钱 鳖甲五钱 木贼三钱 桂枝一钱五分
龙骨四钱 常山二钱 附子五分 归身二钱

用法：用水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

疗效：韦××妻，患三日疟，已经二年，屡治不愈，服此方二剂即愈。

来源：贵县八塘公社 高卓带

十三方

主治：久疟气虚，头微量，口涎多，食欲不振。

处方：六君加柴胡汤：党参四钱 白朮二钱 茯苓三钱 半夏三钱
陈皮三钱 炙草一钱五分 柴胡三钱 大枣三枚 生姜三片

用法：用水一碗半，煎取大半碗，顿服。

功用：化痰补气。

疗效：桥圩公社何平工区刘××媳妇，二十二岁。患疟疾二年，久治未愈，元气已虚，食欲不振，口涎多，头微量，用本方治疗，每天一剂，连服五天，病即痊愈。

来源：贵县八塘公社人民医院 陈文亭

十四方

主治：久疟不止，气血两亏，形体瘦弱，气力缺乏；属虚寒者。

处方：炙党 当归 炙芪 首乌各三钱 白朮 乌梅各二钱
鳖甲六钱 陈皮 柴胡 炙甘草各一钱五分 升麻五分
生姜三片 大枣二枚

用法：用适量水煎取浓液一碗，一日分三次服。

功用：补益气血，温中治疟。

疗效：本方曾治愈久疟病人很多，如罗××，患疟数月未愈，连服本方三剂即愈。

禁忌：忌食生冷酸腥之物。

来源：马山县周六中心医院 罗建邦

治疟母方

主治：疟母，左胁下硬肿如掌大（脾脏肿大），作痛，食减肌瘦，头晕目眩，舌苔黄厚，大小便不正常。

处方：（一）加味三物厚朴汤：厚朴一兩五钱 大黄八钱 枳实六钱
鳖甲四钱 半夏一兩 尖槟八钱 芒硝五钱

(二) 鳖甲煎丸 (照金匱要略方)

用法: 用水三碗, 煎至一碗半, 一日分二次服。先服加味三物厚朴湯二剂后, 硬块稍軟, 第三天改用鳖甲煎丸作煎剂, 連服三剂, 以后改服鳖甲煎丸, 每日二两, 分早午晚三次服。

疗效: 吳××, 男, 三十岁, 患疟母, 經治疗无效, 后經用本方治疗即愈。

来源: 柳州市联合診所 尹卓华

間日疟針灸疗法

主治: 間日疟。

取穴: 大椎 間使 后谿 肺俞 列缺

手法: 上穴均針, 中等刺激。

疗效: 陈××, 男, 二十九岁。患間日疟二个月, 針上穴二次即愈。

来源: 融安县长安鎮 欧 珊

疟疾針灸疗法

一 方

主治: 疟疾。

取穴: 大椎 膏肓 間使

手法: 中等刺激, 留針十五分鐘。

疗效: 經治五十多例, 每例不超过二次即愈。如陈××, 女, 七岁, 患疟一月, 每日发作, 針上穴一次即愈。

来源: 融安县龙妙民办医院 陈秀如

二 方

主治: 各型疟疾。

取穴: 大椎 陶道 內关 合谷 后谿

手 法：上穴均針，以中等刺激手法，留針十五分鐘，中間搗動約一、二次，在发作前一至二小时进行，每日施术一次，約針三至四穴。

疗 效：本院于1959年采用上法于临床观察十例疟疾患者，均获痊愈，茲举例如下：

卢××，男，三十岁。1959年4月20日入院。每日中午发冷发热，头痛，恶心，全身不适，体温 38.8°C ，血检間日疟原虫（+），过去曾有疟疾史。入院后，經确诊后，进行針刺，連續二日已无发作，隔日又針一次，以后連續驗血三次，血中已未发现原虫，于4月26日痊愈出院。

来 源：柳州专区人民医院內科

疳 腮 类

治 疳 腮 方

主 治：两腮或一腮紅肿灼热，胀痛，或全身发寒热，俗叫猪头风（流行性腮腺炎）。

处 方：馬勃二錢 金銀花一兩 連翹三錢 大青叶三錢 黃芩三錢
花粉三錢 知母三錢 大黃二錢 生地三錢

用 法：用水二碗煮取一碗，渣再加水一碗煮取半碗，头、二两煎混合，一日分二次服。

功 用：清热解毒。

疗 效：韦××，男，二十九岁。两腮紅肿灼热胀痛，发高热，診斷为流行性腮腺炎，服本方一剂，热退痛減，二剂肿消痊愈出院。

禁 忌：忌食辛辣发物。

来 源：广西中医药研究所 賈賈繁

湿 温 类

湿温（腸伤寒）方

一 方

主 治：发热，肢痠痛，腹胀，精神倦怠，舌苔黄厚腻，食欲减退，或咳嗽，或头痛，或耳重听，或神志不清，譫妄，或呕吐，或泄泻，或便秘，或皮疹，或面颊潮红，或肝脾肿。

处 方：蜆草〔5〕—斤

用 法：加水二千毫升，煮沸后，以文火煎成一千毫升，按年龄病情给与三百至一千毫升（或更多些），分多次当茶饮。

功 用：清热解毒。

疗 效：我院用本方实验治疗腸伤寒患者五例，治疗中除个别对症治疗外，都不服其他治伤寒药物，但一般仍给予維生素乙、丙及輸液支持。五例主要用蜆草液治疗，开始退热最快一天，最迟十一天。完全退热最快七天，最迟二十四天。神志清楚最快九天，最迟十二天。食欲好转最快四天，最迟十二天。嗜伊紅血球出現最快十二天，最迟二十二天。服药后，无副作用，治疗经过无复发及合并腸出血；或腸穿孔，当体温下降后，食欲即好转，效果尚为满意。

来 源：玉林专区人民医院

二 方

主 治：恶寒发热，或开始恶寒，后来只热不寒，汗出热不退，头暈胸悶，口渴，倦怠，不想吃，舌白或黄苔厚腻。

处 方：山芝麻〔41〕—兩五錢至二兩

用 法：水二碗半煎減半，一日分三次服，每隔四小时服一次。

功用: 清热解毒。

疗效: 韦××，男，五十一岁。患者十天来发冷发热，头晕，汗出多，口苦，不思饮食，耳重听，咳嗽轻，痰量少，有时带少许血丝，大便干，小便黄，在县里用中药治疗四天无效，遂来我院留医，体温 38°C — 39°C ，脉搏70—104/分，舌披黄色厚苔，颈软，前后胸散有数颗绿豆大充血粉红色丘疹，脾肿大于肋下3CM，边缘光滑无压痛，质软。血肥达氏阳性。给服本方十一天，自觉已不发热，精神转好，体温 36°C — 38°C 。本方加佩兰三钱、六一散六钱，再服两天，体温最高 37.4°C ，脾缩小至约1CM，一切恢复正常痊愈。

来源: 柳州专区人民医院

三 方

主治: 湿温，病势沉重，不省人事，神昏谵语，舌黑齿燥，语言蹇涩。

处方: 柱犀角二钱（另煲水冲服） 浮水莲叶半张 川连一钱 生地八钱
麦冬八钱 玄参一两 环草四钱 银花四钱 连翘三钱 丹皮三钱
甘草一钱五分 紫雪丹一瓶（五分另冲服）

用法: 用适量水煎内服。

附注: 痼血加地榆三钱、白芍四钱。肚痛加广木香一钱（后下）；
热盛者（体温三十九度半以上）加生石膏六钱（先煎）、
犀角一钱。服本方数日，舌上津回者可愈。

疗效: 本方为本人行医二十多年来治愈五百个肠热病的效方。

来源: 南宁市 黄道存

四 方

主治: 阳明大热不休，食欲减退，烦渴引饮，舌质深红，舌苔粗黄或黑涩，唇干齿燥，面容秽浊，便秘溺赤，下午发热、

躁狂，甚至神昏譫妄，摸床，皮肤发疹，脉洪滑数或沉弦等。西医診为“腸伤寒”（或腸热）高热稽留期之症。病势更进一步发展，大便由秘結轉为水泻不止，面色晦黄，病益纏綿沉重，时或出現脾肿、鼓腸、腹微痛拒按，大便下血等湿溫症象西医称为“腸伤寒”下痢和腸出血期之症，均治。

处 方：白虎湯：生石膏_碎四兩至半斤 知母一兩半至三兩 甘草五錢 粳米一兩半至三兩

用 法：用水約三百毫升，先煮石膏沸十五至二十分鐘后，入各藥，再加水約七百毫升，煮至米熟即得，取湯另器貯下（不宜煮过久或将約渣久浸湯中，致米出胶，粘稠不好飲），一日三次分服，每隔三小时服一次。本方的藥用量系按成年人定，儿童可酌減。一般症况，石膏四兩，如病势很快发展，燥渴如焚，需加重到六兩至半斤，余藥按比例增加，煮藥用水也酌量增加，服藥間隔時間不必拘，患者渴索飲时即与之飲，一天內一剂藥不足，可用至两剂，直至渴減苔潤，患者不索飲后，才按隔三、四小时給藥一次。

功 用：救阴津，破大热，解毒、止渴、除煩。性味甘凉平正，可放手坚定使用，如畏怯減少用量，則收不到应有的效果，致延长病程或抑制不住病势的发展。

疗 效：曾用本方治愈过正阳阳明大热症或病情发展以致下痢或便血的湿溫症，約有二百多例。在治程上如当本病热型阶梯上升期便用本方治疗，一般服藥后一、二天开始热退，約三、五天即愈；当高热稽留期尚未下痢前用本方施治，一般服藥后二至四天开始退热，約一星期至十天痊愈；如到了下痢或腸出血期才用本方治疗，則治程較长，一般須服藥后三天以上才稍見效，下痢或出血漸減少，其他症状开始減輕，須十至十六天或更长一些時間才能痊愈。即使病

情已发展到神昏詈妄，循衣摸床，舌苔干黑，唇焦翻缩齿露，大便下血等危重恶候，只要患者尚有作渴感觉给水识饮，能坚定用本方大剂连续服食，皆可救治。惟患者已出现舌质蓝褐色的（中医认为热毒弥漫，肾阴竭绝）及末期剧烈腹痛，肠已穿孔的，或症极险恶而无渴意，恶饮水、强之饮则呕吐的，用本方则已无效，预后皆不良。附病例如下：

（一）廖××，男，三十八岁。1937年春夏间患热病，西医诊断为“肠热”病。迭经中西医诊治无效，病益严重，形瘦面黄，神志昏懵，舌苔干黑，舌质微红，五天无大便，小便短黄。烦躁口渴，显为阳明腑实证。用石膏四两、知母一两半、粳米一两半、甘草三钱的白虎汤，加元参一两、胡麻仁五钱以增液润便，日夜各服完一剂。第二天，病情好转照前方日服一剂。第三天，脉静身凉，黑苔渐退，能食稀粥，大便仍未解。前方去元参、胡麻仁，加丽参四钱，尽一剂。第四天症状基本消失。照方减半药量，连服四天计服药八天痊愈。（二）罗××，男，三十八岁。于1948年9月间患热病，西医苏某诊断，为“肠伤寒”，医治旬未愈，体温一直在 39°C — 39.5°C 之间，无食欲，患者便秘溺黄，迷睡，入夜间作谵语。齿燥唇干，舌苔粗黑，舌质淡红，微现烦渴，从中医辨证论治观点看，显为阳明燥症。用石膏六两的白虎汤，加白皮洋参四钱，作汤分三次服。至夜，药服完，舌苔转润，全身复热，体温升回 38.8°C ，脉象亦现洪缓微数。翌早，病情略好转，照方减用三分之二药量，惟洋参量仍旧，每日服一剂，连服五天病愈。

来源：广西中医药研究所 黄汝绍

治湿温大便下血方

主治：湿温病大便下血（腸伤寒合并大量腸出血）。

处方：黑墨草〔28〕四兩

用法：用水三碗，煮成一碗，一日分二次服。

功用：凉血、止血，治血痢。

疗效：我院用民間草藥黑墨草，治疗两例腸伤寒合并大量腸出血，效果非常突出。茲簡介一例如下：

梁××，女，十二岁。因头晕心悶发冷发热，拉血样大便，于1959年3月21日入院。患者在当年2月間开始发冷发热，曾服中藥，吃过很多发冷丸，病情断續未愈，3月16日，突然感头晕，心里难过，微寒微热，食欲不振，19日拉血样大便，每天一次，一連四天，每次量約二百毫升以上，面部唇部皮肤蒼白青黃，舌苔黃色，四肢无力，口渴，小便一天三、四次。血肥达氏阳性。入院診斷：1.腸伤寒合并大量腸出血；2.繼发性貧血；3.营养不良。入院治疗，先后曾注射、服用西藥及中草藥飞天雷公无效，后服用黑墨草即愈。

来源：南宁专区人民医院 傅丽卿

痉 病 类

治 痉 病 方

主治：恶寒发热，呕吐，头痛，項背强（流行性脑脊髓膜炎）。

处方：敗醬草一兩 生地一兩 生石膏一兩 銀花一兩 連翹三錢
天冬四錢

用法：用水三碗，煎取一碗半，一日分二至三次服。

附注：小儿藥量酌情減少，随病症的变化或好轉加勾藤、元參、

天竺黃，減石膏、生地等（退熱后減后兩味）。

功用：清熱，養陰，解毒。

療效：本院以此方治療六例，效果很好。體溫恢復正常：最快半天，最慢五天，平均兩天半。症狀消失：最快兩天，最慢八天。腦脊液正常：最快兩天，最慢八天，平均五天。舉例如下：

鄧××，男，十三歲。因惡寒、發熱、頭痛、項背強、嘔吐已兩天才入院。檢驗：頸硬，疲困，唇周圍有大量水泡疹，體溫 38°C ，腦脊液潘氏反應(++)，大便鉤蟲卵(+)。診斷：1.流行性腦脊髓膜炎，2.鉤蟲感染。入院后給以上中藥治療，每天一服，次日已無嘔吐，但流鼻血少許，第四天一般情況良好，無刺激征，第五天一般症狀及脊髓液均正常。后給予驅蟲藥出院。

來源：柳州專區人民醫院

肺 癆 类

治 肺 癆 方

一 方

主 治: 肺癆（浸潤型肺結核）。

处 方: 白芨_{四份} 蛤蚧_{一份} 浮海石_{一份}

用 法: 共研細末，每日服三次，每次两克半，三个月为一疗程。

附 注: 在服用此方期間，如有临床症状，亦可輔用养阴清肺、止血清热、祛痰鎮咳等剂，无任何不良反应。

功 用: 补肺滋腎，止咳定喘，祛痰去瘀。

疗 效: 本方經治疗十五例，效果良好，其中二例已痊愈出院，六例均有显著进步，五例有进步，二例X光片病灶无进步，但症状大大好转。各例均經X光片証明及治疗前后各种检查对比，計十五例中十一例为浸潤型肺結核，均获得痊愈及显著进步，四例慢性纖維空洞型肺結核，仅获得进步而已。由此观之，此方治浸潤型肺結核效果很好，而对于慢性纖維空洞型肺結核，則效果尚差。

来 源: 广西干部疗养院

二 方

主 治: 肺癆（肺結核）。

处 方: 冬虫夏草_{三兩} 白芨_{三兩} 川貝_{三兩} 百部_{二兩}

用 法: 共研細末，炼蜜为丸如豆大，分十五天服完。

疗 效: 本方經治疗四例患者，男性二例，女性二例，經X光透視及临床观察检查，診斷三例为慢性纖維性空洞型肺結核，一例为浸潤型肺結核。四例病人住院前都曾用各种抗癆药

治疗，治疗期均三年以上，都未見好轉。后入我院治疗，住院期最长四年半，最短也一年。住院后也反复輸用或并用各种抗癆药，未見好轉，患者反复发热、咯血，血沉加速，消瘦，惡液質等。施以本方試驗治疗三个月后，經X綫胸部摄片，血、痰化驗及临床检查，对比治疗效果，証明本方疗效卓著。全部病人經治疗后，食欲都增進，咳嗽減少，血沉恢复正常，检查肺結核阴性。体重增加，精神良好。

来 源：玉林专区人民医院

三 方

主 治：肺病，咯血、吐血。

处 方：金边油葱〔42〕一塊（小的兩塊） 瘦猪肉六錢

用 法：同煲三十分鐘，服食湯水，渣滓不要，每日一服。

疗 效：王××，男，十八岁。患肺病吐血来診，初以犀角地黄湯无效，后改用本方治疗，二服血即止。

来 源：梧州市民办医院大南路門診部 周鴻昇

四 方

主 治：肺癆咳血或吐血、衄血，或因伤出血不止。

处 方：側柏叶四錢 新艾二錢 阿胶一錢五分 五倍子四分 茜根六分

用 法：用适量水煎一碗，一日分两次服。

附 注：服湯药止血后，依上药分量加十倍，共研細末，每日服三次，每次服一錢，用开水冲服。

疗 效：（一）莫以珍，男，三十岁。卢汉文，男，三十四岁。患肺癆咳血，屡治不效，服此方痊愈，后不复发；（二）黎××，女，十二岁。因被牛角撞伤前阴，出血不止，用此方服后即止；（三）李禎华，男，二十五岁。慣出鼻血，久不痊愈，后服此方，迄今两年，不見复发。

来、源：岑溪县东方红中心医院 莫燕卿

五 方

主 治：阴虚癆热，咳血气喘。

处 方：生赭石五钱 天冬五钱 炒牛子三钱 生地一两 元参五钱
鸡内金三钱 藕汁一两（或藕节一两亦可）

用 法：用适量水煎一碗，一日分二次服。

功 用：养阴，降逆，清虚热。

疗 效：曾用此方治愈十九例，举例如下：

彭××，男，四十六岁。患阴虚癆热，咳血气喘，夜不能卧，面白肌瘦，食欲不振，连服本方三剂，热退、喘平、血止，后服本地产的山药十余斤，恢复健康。

来 源：岑溪县英雄公社中心医院 黎瑞新

编者按：本方出自衷中参西录，阴虚型之肺结核咳嗽有效。

六 方

主 治：肺癆大出血。

处 方：（一）诃子肉一两（半煨半生） 括蒌子肉六钱 黑梔子四钱
青黛二钱 海石一两 十灰散一钱五分（冲服）

（二）诃子肉一两（半煨半生） 干地黄一两 当归炭五钱
牡丹皮五钱 青黛三钱 茜草根三钱 荆芥炭三钱 十灰散
一钱五分（冲服）

（三）熟地黄二两 麦冬七钱 牡丹皮五钱

用 法：水煎内服，先服（一）方，第二天服（二）方，第三天服（三）方，三方连服四剂，每日服一剂。

疗 效：曾用此三方治疗肺癆大出血多例，迭服此三方，第一天血减，第二天血止，第三天精神恢复，第六天即能正常工作，以后亦不见再发。

来 源：广西中医药研究所 王乃翰

七 方

主治：虛勞咳嗽，胸痛，盜汗，潮熱。

處方：柴胡二錢 地骨皮五錢 生地三錢 銀胡三錢 胡黃連三錢
麥冬三錢 鱉甲五錢 龜板一兩 知母三錢 牡蠣四錢
甘草一錢

用法：用適量水煎取一碗半，分三次服，每隔四小時服一次。

療效：黃××、譚××等，均經化驗是肺結核，常有盜汗及潮熱，服本方後盜汗及潮熱均止，其他症狀亦隨之而愈。

來源：馬山縣周六公社中心醫院 羅建邦

咳 喘 類

治 咳 嗽 方

一 方

主治：普通咳嗽，久咳，百日咳均治。

處方：枇杷葉五斤 棚龍根〔43〕五斤 桑葉三斤 甘草一斤
滿山香〔44〕一斤 貝母二兩（研粉）

用法：用適量水煎濃縮過濾，後入貝母粉為丸如蓮子大，瓶貯備用。成人每次用四至六丸，每日三次，開水送服。

療效：鍾××患咳嗽已有三個月，鍾××之父患咳嗽約有一年多均用本方治愈。

禁忌：忌食酸腥等物。

來源：馬山縣周六制藥廠 鍾 陸

二 方

主治：上呼吸道感染，引起咳嗽。

处 方：枇杷叶（去毛） 竹叶草（即淡竹叶） 茅根各五斤
用 法：上三味洗净切碎，放入锅中，加水四十斤，文火煮沸四小时，去渣滤过约得八斤，药渣再加水二十斤，复煮二小时，去渣滤过，约得四斤，前后滤液同入锅内浓缩至四斤，滤过，乘热加入糖精和苯甲酸各两克，搅匀，冷却后，瓶装密封待用。成人每日服三次，每次十毫升，小孩酌减。
疗 效：经治五百多人，效果甚佳，小儿尤为适用。
来 源：巴马县人民医院 谢怀申

三 方

主 治：咳嗽气喘。
处 方：川贝母八钱 硼砂四钱
用 法：共为细末，日服三次，每次三钱，开水送下。
功 用：消痰止咳。
疗 效：高××之母，咳嗽痰胶，舌黄，夜不得卧，用本方治疗而愈。
来 源：贵县八塘 高卓带

四 方

主 治：火郁在肺，咳嗽有痰。
处 方：桔梗三钱 生甘草一钱 浙贝母三钱 杏仁二钱 麦冬三钱
用 法：用水碗半，煮取一碗服。
附 注：喉痛加牛蒡子、射干各三钱。
功 用：清火，润肺，祛痰。
疗 效：本方曾用以治疗四十多例，均获效。
来 源：南宁市 繆大文

五 方

主 治：咳嗽，喘促，身体瘦弱。

处 方：白木耳一两

用 法：每次用一錢和冰糖燉服。

疗 效：广西中医专科学校王××之母，年六十岁。病喘咳已多年，经历服中西药无效。1957年就診，处以本方，药未服完而喘咳大止，繼續服完一两，病即痊愈。

来 源：广西中医专科学校 曾宜敬

編者按：肺燥、虛火、喘咳殊有良效，痰飲寒咳，恐非所宜。

治 肺 热 咳 嗽 方

主 治：肺炎，支气管炎，鼻腔、咽喉、扁桃体炎等皆治。

处 方：鮮生蜆草〔5〕六至十兩

用 法：上药洗净，以清水六百至一千毫升煮沸后，以文火浓缩到三百至五百毫升，使煎液成黑褐色，为二十四小时内服量，病輕者少飲（一天內不能少于六兩之生药），重者多飲，尤其是病情严重时，要多飲，有利无弊。

功 用：清热解毒。

疗 效：曾采用蜆草治疗十三例呼吸系感染者，据症状的不同，輔以注射强心剂、輸氧等外，一律以蜆草煎液內服为主要的治疗，此外为了減輕病人的痛苦，亦輔以对症疗法，如咳嗽多痰，給以鎮咳化痰剂，胸痛給以可待因等。十三例中大叶肺炎合併胸膜炎一例，急驟起病，发冷寒战，持續高热，咳嗽胸痛，咯锈色血痰，小儿支气管六例，急性支气管炎一例，均有发热咳嗽，其中四例入院时，均有程度不同的呼吸困难，发紺。上呼吸道感染（包括鼻炎、咽炎、扁桃体炎等）五例，均有发热、咳嗽，二例伴有腹瀉，全部都有咽部充血，扁桃体紅肿。用本方获痊愈出院。

来 源：玉林专区人民医院

治 痰 咳 方

- 主 治：**痰咳气喘，年久不愈，体弱无力，不能劳动。
- 处 方：**高良姜半斤（切碎） 黄糖二两
- 用 法：**用水一斤，煎至高良姜熟透（吃姜不见辣）温服。
- 疗 效：**苏××，五十多岁。患痰咳气喘，久治不愈，体弱无力，虽挑重仅十余斤的担子也气急难堪。病已十一年，多方医治无效。用此方治疗，服药后，气喘减轻，咳少痰稀，连续服药五、六天痊愈。
- 来 源：**宾阳县甘棠六律大队 苏伯光

治 咳 嗽 胸 痛 方

- 主 治：**咳嗽痰多，胸痛。
- 处 方：**鱼腥草[45]一两 鸭蛋一只
- 用 法：**先煎鱼腥草去渣，加鸭蛋用微火煮沸，顿服。
- 疗 效：**陈××，男，咳嗽，痰多，胸痛，发热，头痛，小便短赤，大便恶臭，经服其他中药无效，后服本方即愈。
- 来 源：**岑溪县筋竹 陈宇昭

治 咳 逆 胸 肺 痛 方

- 主 治：**咳嗽胸痛或胁痛，咳逆倚息，气短不得卧，或发寒热（湿性胸膜炎）。
- 处 方：**芦根汤：芦根四钱 薏仁三钱 丹皮三钱 甜葶藶三钱 川贝三钱 桑白皮三钱 车前三钱 丝瓜络四钱 大枣五钱
- 用 法：**清水三碗，煎取一碗半，一日分二次服。
- 功 用：**化痰、利水、清热、解毒。
- 疗 效：**曾用本方治疗一例心包积液患者获效后，转用于治疗四例胸膜腔积水的病人，也收到良好的效果，兹将病例介绍如下：（一）蒋××，男，二十二岁。在入院前两月开始发

冷发热，經常咳嗽胸痛，屢医无效而入院。检查：体温 38.5°C ，脉搏每分钟120次，呼吸迫促，鼻翼扇动，体形衰弱疲倦，右侧肋间隙全部隆起。X光透视，右侧肺尖透明度减弱，其余全部呈致密阴影，心脏全偏于左。胸膜试验穿刺，抽出淡黄色液体20毫升。患者过去有结核病史。诊断为结核性湿性肋膜炎。經用鏈霉素、雷米封及醋酸鉀等利尿剂治疗，除体温降低外，其余进展不大，再用X光检查，右胸积液如故。改用芦根湯治疗，每日一剂，患者当日尿量增加，自觉舒服，連服至第五剂后，X光复检，右胸积液完全消失；（二）丘××，女，六岁。发热，左胸痛，咳嗽已二十天，入院經X光透视检查，左肺門脉淋巴腺肥大，左肺第九肋以下呈致密阴影。诊断为左侧胸湿性肋膜炎，服用西药，历一周无效，改用芦根湯治疗，每日一剂，第三日X光检查，左胸膜积液已无，病者痊愈出院。

来 源：賀县八步中心医院

治 哮 喘 方

一 方

主 治：奶哮，一月一发或一月数发，发时，喘逆上气，呼吸困难。

处 方：百須根〔46〕（又名双飞蝴蝶）一兩（炙枯） 熟牡蠣一兩

用 法：共研末，开水冲服，成人每服三錢，小儿減半，每天服一次，連服六、七次。

附 注：服药后半小时許，有吐出痰涎的反应，平常人服則不吐，吐去痰涎病即愈。

疗 效：（一）王××，十六岁。患哮喘病已三年，以本方治愈，經二年多未見复发；（二）朱××，男，七岁。楊××，男，十三岁。均有奶哮病，用本方治愈。

禁 忌：忌食糖及猪油四十天。

来源：平南县六陈 甘敬渡

二 方

主治：肺有痰积，寒温失调，或外感风寒，其病即发，咳嗽喘急，呼吸迫促，甚则喘息不得卧，大汗出，时发时止。

处方：蔓陀罗花一钱 广陈皮一两 生半夏一两

用法：上三味共为细末，炼蜜为丸，每丸重五分，每天服三次，每次服一丸，每隔五小时服一次。

功用：行气，化痰，镇喘。

疗效：丘××、陈××，均患哮喘经年，百药无效，来院治疗，经多方施治，亦无显著效果，后服本方丸药，其病渐次而愈。

来源：广西中医院

三 方

主治：哮喘。

处方：黄花母〔11〕根二至三两（儿童酌减）

用法：用水三碗煮取碗半，加白糖一两，一日分二至三次服。

疗效：本方曾用以治疗哮喘病十二例，患期最短半年，最长十年以上，除一例无效（体质虚寒），两例好转外，九例均获痊愈。痊愈病例经观察四个月，均未见复发。

来源：容县中医药研究所

四 方

主治：哮喘，时止时发，发时咳嗽气喘，如水鸡声，不得卧。

处方：乌贼骨一斤（煨存性去壳） 轻粉二钱 白芷二钱 生沙糖五两

用法：上三味，共研细末，筛过，以生沙糖炼丸，每丸重一钱五分，每服二至三丸，早晚空腹服，开水送下。

疗效：梁××，男，五十二岁。患哮喘病已十多年，时止时发，乍寒乍热，咳嗽气喘，不能卧。每发必服药六、七日方能缓

解，不能根治。給本方丸藥，早晚各服一次，每次服二丸，服藥三天喘已大減，服至五天气喘全消，繼續服二十天停藥，后未見復發。

禁忌：服藥期間忌食烟、酒、肉類、麥面、瓜菜、生冷發物等。

來源：岑溪縣筋竹衛生所 陳錦禎

哮喘梅花針療法

主治：年久氣喘（慢性氣管炎）。

部位：脊椎兩側 胸鎖乳突肌 胸椎 前胸肋間

用法：梅花針刺脊椎兩側、胸鎖乳突肌，但須要重點刺激胸椎、前胸肋間。

療效：本門診部治療十二例，十例系針刺三次，二例系針刺八次，均收到近期療效。

來源：南寧市公費醫療門診部

吐血類

治吐血方

一 方

主治：咯血、吐血。

處方：茜根三錢 橘紅三錢 藕節二兩 訶子五錢 海石八錢 蘇木三錢 苦參三錢 炒山梔四錢 青黛一錢 麥冬四錢 甘草一錢

用法：用水三碗煎至碗半，一日分二次服。

功用：清熱，化痰，止血。

療效：陳××等三名患者，均用此方治愈。

來源：柳州市中醫診所 石杰生

二 方

主 治: 咯血、吐血、衄血、齿缝出血等症。

处 方: 百草霜三钱

用 法: 用适量水煎取一碗，澄清，一日分二次服。

功 用: 止血、化痰。

疗 效: 刘××，男，三十一岁。于1959年8月27日，經X光診斷浸潤型肺結核（有透明区），并咯血入院疗养。患者未入院前已咯血多日，自从8月15日开始血痰間有小咯血，持續不止，于8月28日上午10时連續咯血不止，到中午略有半痰盂，患者皮肤蒼白，訴有头昏，此后常有成口血液咯出，經服氯化鈉維生素K，注射仙鶴草素、高滲盐水等，咯血經久不止，于9月9日又发生大量咯血。連續給上方二剂，当日止血。再未复发。

来 源: 桂林专区人民医院疗养所

治 咳 嗽 吐 血 方

主 治: 咳嗽吐血，劳累过度，則病必发。

处 方: 金边菠蘿〔47〕叶一张

用 法: 上药切碎，用水三碗煎取碗半，一日分三次服，并另煎叶一张当茶飲，或同瘦猪肉煲服亦可。

疗 效: 本人曾患咳嗽吐血，已病三十年，每劳累过度，則病必发，輕則六、七天，重則十余天或一月多，經中西醫治疗，都沒有显著效果。1959年6月初，病又发作，咳嗽吐血，比往常厉害，一晚咳嗽紧张，乃大量吐血而昏厥，經医院用中西药治疗，咳嗽吐血仍未止。后服用本方，服后咳嗽吐血均頓減，当晚并另将药煎湯当茶飲，未及天明，咳嗽吐血均基本停止。

来 源: 貴县木梓公社大东大队 游光祥

肺 痛 类

治 肺 痛 方

一 方

- 主 治:** 肺痛，胸痛，咳嗽，吐腥臭脓痰。
- 处 方:** 大青藤[48]（茎根叶同用）一至二两
- 用 法:** 用水二碗，煎取一碗服，或同瘦猪肉二两煲服。
- 功 用:** 清热、解毒、排脓。
- 疗 效:** 本方治愈肺痛十多例。如梁××，女，三十岁。患胸痛咳嗽，后咳嗽吐脓痰如米粥，腥臭难闻，经以本方医治旬余而愈。
- 来 源:** 岑溪县太阳公社 李棣华 李伯奇

二 方

- 主 治:** 咳嗽胸痛，咯痰腥臭，或如脓血样，或发寒热。
- 处 方:** （一）黄連三錢 黃柏一兩 杭白菊二錢 山梔二兩 夏枯草 金銀花 玄參 苦菜[49]（草医叫土人參）各四兩
（二）当归 夏枯草 苦菜[49]（土人參）各四兩 金銀花二兩 穿山甲三兩 麦芽二兩五錢 白菊一錢 芦根二兩 麦冬五錢 山梔一兩 黃連一錢
（三）夏枯草一兩 苦菜[49]（土人參）金銀花各二兩 当归 枸杞各五錢 穿山甲 麦芽各一兩 白菊一錢
- 用 法:** （一）方用水浸过药面，煎四小时，煎得四百毫升，少服多餐，每两小时服一次，每次五十毫升，药渣复煎得二百毫升，照前服法。
（二）方与（一）方同。
（三）方煎得三百毫升，分三次服，药渣复煎得一百毫

升，一次服。

連服（一）方七剂后，續連服（二）方十五剂，以后繼連服（三）方至愈，均每天一剂。

附 注：（一）方服至第三剂，黃連減为二錢，至第四剂即減作一錢。玄參不能久服，如头晕玄參量減半。（二）方如头晕时当归減一两。服至四剂后穿山甲減为二两，当归減一两。

疗 效：刘××，男，五十三岁。咳嗽咯脓血臭痰，伴不規則发热十个月。于1958年11月8日入院。病起时恶寒发热，咳嗽咯痰，带臭味，呈脓血样，食欲很差，大便秘結。入院后X光检查：右上肺呈一大片浓厚致密阴影，中央有大小不等之不規則透明区，兩下肺許多小片状阴影。診斷为肺脓瘍。每日注射青霉素四十至八十万单位，共五十五天，仍有咳嗽咯臭脓痰。X光照片虽有輕度吸收，但較慢，并于用青霉素过程中，发现左肺阴影扩大。遂于1959年1月3日，加用青霉素日一百二十万单位肌注，症状无多大改善，病灶吸收也不明显。1月20日加用鏈霉素，每日一克肌注，用六克后，因用中藥而停止。1月27日开始用（一）方，七剂后咳嗽逐漸減少，咯痰大減，日量二十毫升，臭味消失，食欲大大增加，偶因头晕、恶心而停用（一）方。2月3日改用（二）方，連服七剂，症状繼續好轉，体重增加，中間因飲食中有蘿卜，发生过咳嗽增剧，改用（一）方两剂，咳嗽又減輕以至消失。又服（二）方八剂后，于2月19日改服（三）方至2月26日，共經三十一天治疗，临床症状基本消失，X光照片上明显吸收，食欲大大改善，体重明显增加，和抗菌素治疗期間之最高体重相比，增加达十四市斤。

禁 忌：忌食蘿卜、猪头肉、蒜等物。

来 源：广西人民医院

三 方

主 治：咳嗽脓痰，口气时出臭味。

处 方：桔梗五钱 玄参二钱 连翘二钱 茯苓二钱 浙贝二钱 黄芪三钱 白芨三钱 射干一钱五分 甘草一钱

用 法：用水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

功 用：化痰、排脓、除痰、止咳。

疗 效：欧××，男，五十二岁。咳嗽胸痛，咳出绿色脓痰，有臭气，服本方两剂好转，继续服两剂痊愈。

来 源：田东县 马金柱

四 方

主 治：肺痛，咳嗽胸痛，痰如脓液，时出臭气，肺痿亦治。

处 方：雪梨二个 川贝一钱 南杏一钱 冰糖二钱

用 法：将梨顶切去一小片，掘去心核，将后三味药研末纳入梨内，仍将梨顶小片盖密，用竹籤插固，入豆腐浆内煮熟，每早食梨二个。

功 用：清肺、化痰、止咳。

疗 效：季××，男，五十岁。久年咳嗽，历医不愈，咳嗽痰多，痰黄色带脓液样，有臭气，气喘，消化不良，服本方三剂，病即减轻，十剂而愈。

来 源：田东县 赖立矩

五 方

主 治：肺痛，时常咳嗽，痰多脓血，有臭气，肺痿亦治。

处 方：天冬三钱 麦冬二钱 生地三钱 知母二钱 川贝二钱
紫苑二钱 冬花二钱 薄荷二钱 菟丝二钱 甘草一钱
桔梗二钱 南杏二钱 白芨二钱 阿胶二钱

用 法：用水二碗煎取一碗，一日分二次，用鸡蛋一个破开以药汤

冲和，再加蜜糖一匙羹混和服（每个鸡蛋可分二次冲服）。

功用：滋阴、润肺、祛痰、化痰。

疗效：黄××，男，四十岁。患咳嗽两年多，医治无效。后到我处就医，咳嗽多痰，声嘶，痰色黄白如脓液，有腥臭气，用此方治，服一剂病即好转，数剂痊愈。

来源：田东县 赖立矩

失 音 类

治 失 音 方

主治：声音嘶哑，渐至失音，言语无声。

处方：人乳 正犀角各等量 洁淨白糖适量 洗米水（第一次的水）约一百五十毫升左右

用法：先将犀角用湿乳钵放进一点米水，用力研磨成溶液（约磨一小时），以人乳、米水混合，加白糖，摇匀，一日分三次服（每日早上配制，当日服完）。

疗效：黎××，女，二十三岁。1955年3月19日，先是感觉头晕眼花，旋即昏倒，全身抽搐，以致不省人事，当夜即送卫生院留医。检查所见：昏睡状态，牙关紧闭，四肢不时抽搐发硬，颈显强直，体温脉搏正常，血象无特殊变化，康氏反应阴性。卫生院进行治疗，经过七天后，各种症状逐渐消退，但声音嘶哑，渐至完全失音。以后继续治疗，曾大量给乙种维生素及长期给予镇静等，仍无好转。后用本方，只服药两次，说话就能出声了。第一次是人乳半杯与犀角一分（磨溶）混和，蒸过服，服后次日就能说出声音，次日，人乳犀角同样蒸服，说话已无嘶哑征象。

来源：隆林县卫生院

声音嘶哑针灸疗法

主治：声音嘶哑。

取穴：廉泉 天突 合谷 通里

手法：以兴奋手法入针，留针三至五分钟。

疗效：郑××，女，二十一岁。因演唱练习，嗓子嘶哑，仅针一次，当夜演唱，即能恢复声音。

来源：融安县长安民族医院 黄繼香

病后音哑针灸疗法

主治：高热病后音哑。

取穴：哑门 通里 照海 中渚

手法：第一次针哑门，第二次针哑门、通里、照海，第三次针哑门、通里、中渚。每日按次施术一次，三日为一疗程，用强刺激手法，留针五分钟。

疗效：莫××，男，十五岁。于1958年冬季来我院诊治。患者于1958年秋初，因患病发高烧，愈后不能言语，已有三个多月，经采用上法治疗，针刺第一、二次穴位后，患者即能说出话来，但语音不明，第三日继续针刺第三次穴位后，病者言语正常，痊愈出院。

来源：忻城县人民医院 莫好逸

黄 疸 类

治 黄 疸 方

一 方

主治：阳症黄疸（传染性肝炎），面目全身发黄色，腹胀实，肝

肿大，小便短赤，食欲减退。

处 方：无娘藤[50]二斤

用 法：晒干或焙干，研为细末，调以蜂蜜，压成片剂（每片约含药粉量三、四分），每日服三次，每次六至八片，开水送服，小儿酌减。

疗 效：（一）李××，男，成年，岑溪县人。于某年在百色患黄疸，面目全身橘黄色，小便短赤，食欲不振，右上腹部有压痛，经服茵陈五苓散、茵陈蒿汤、梔子柏皮汤等药无效，后用本方生草药一斤，水煎当茶饮，服药三天，症状消失，食欲增进，小便清长而愈。

（二）覃××，男，二十二岁。1959年6月11日，开始全身不适，体倦无力，不思食，下三次稀黄色水样便，右侧上腹部胀痛，右肋下走动时疼痛，卫生所诊断为急性传染性肝炎，治疗无效。于20日转我院治疗，给服本方药片，每日三次，每次六粒，至24日症状全部消失而愈。

来 源：百色中医院 李潜泽

二 方

主 治：皮肤面目发黄，右上腹痛，全身疲倦，食欲不振，尿色黄，或作呕，开始或发寒热（传染性肝炎）。

处 方：田基黄[51]一两至三两

用 法：晒干的田基黄，按病情轻重，每日用一两至三两煎水一百五十毫升左右，一次或分两次服。

功 用：去湿利尿，清热解毒消黄疸。

本方曾治疗三例，一般用药二至四天，临床症状减退，黄疸指数降低，肝功能亦很快趋于好转以至正常。

疗 效：罗××，男，二十五岁。发热，头痛，腰胀，右侧腹痛，皮肤及巩膜染黄，尿黄色，全身疲倦，食欲不振而入院。检查诊断为传染性肝炎。即采用田基黄治疗，四天后，复

檢，治療效果很好，患者十二天出院。

來 源：梧州市人民醫院 莫華龐 曾靜映

三 方

主 治：黃疸（傳染性肝炎），發熱，頭重或昏，腹痛，或上腹部壓痛，或有硬塊，皮膚眼目發黃，小便黃，食欲減退。

處 方：野芋頭〔9〕一斤五兩

用 法：洗淨去皮曬干，搗成粉，炒黑存性，過秤后，放進滲濾器內，再加入冷開水（以每斤粉三斤水計）浸一宿，然后将滲濾器的下孔打開，用盆盛取，待滲完之后，再放第二次冷開水浸過面，經四小時后，濾第二次，即將全部滲出的液體放鍋內，文火濃縮成糖漿樣，候冷加以防腐劑，瓶裝待用。成人每日服六十毫升，分三次服，小兒按年齡酌減。

療 效：本方曾用以治療傳染性肝炎十二例，均愈。舉例如下：

覃××，女，二十二歲，容縣人。發熱，食欲不振，全身不適，已有七天。1959年10月27日來院留醫。診斷為傳染性肝炎。曾用西藥治療，未見好轉。11月1日轉中醫治療。患者頭昏身微熱，微咳，巩膜及全身發黃，精神不好，全身不適，食欲不振，右肋下痛，大便溏，小便黃，舌苔黃膩，脈滑數。給以野芋頭浸膏六十毫升，每服二十毫升，隔四小時服一次，分三次服完。11月2日，覺精神略好，頭仍昏，黃色未退，舌苔黃膩，小便較多，脈滑數。連服野芋頭浸膏六天，11月8日，黃色減退，症狀好轉。野芋頭浸膏再服六天，11月14日，臨床症狀完全消失，停藥觀察三天，11月18日檢查肝脾已消，無壓痛，面色如常，食欲增進，精神好轉而出院。

來 源：桂平縣人民醫院 桂平縣中醫藥研究所

四 方

主 治：皮肤眼目发黄色，或发热，小便黄赤，右肋有肿块（肝肿大），或腹痛，食欲减退，精神不振，或恶心呕吐（传染性肝炎）。

处 方：新鲜黄牛粪_{適量}

用 法：将黄牛粪（不用水洗）用锅或瓦片以火炒至略带焦黑色，用纸包之，置于阴凉处一夜（去火毒），翌晨将干燥之黄牛粪末称好重量，于锅中一次加足清水后（约三百至六百毫升）慢火煎之，待水分蒸发至原加水量之半时，取下过滤，加入少许糖浆矫味即可服用。

附 注：每日剂量按干燥之黄牛粪末计算，五岁以下，十二至十五克，五岁以上，十五至二十克，一般服药七至十五天。

功 用：散热，解毒，利溲，疗黄疸。

疗 效：1956年秋冬两季用本方治疗二至十岁之间的患儿二十三例，效果显著，服本方后，疗效观察，黄疸消失天数最快三天，最迟十五天，平均为七天，在四天內消失者达96.4%。肝肿大缩小，最早三天，最迟四十天。茶褐色尿、厌食、呕吐等消失，最快三天，最迟五天，只有少数茶色尿到九天才消失。血清胆红质，黄疸指数及脑磷脂絮状试验等方面也能很快恢复正常。

来 源：广西人民医院

编者按：本方出自简便方：湿热黄疸，黄牛粪晒干为末面糊为丸，梧子大，每食前白汤下七十丸。

五 方

主 治：全身面目发黄，发热，小便黄。

处 方：西湖柳[52]（即清明柳，桂林土名）連枝帶叶_{兩長條} 葶藶
一至二斤

用法: 以荸薺一半同西湖柳煎水当茶喝，其余荸薺随时削皮生吃，并吃完同西湖柳煎熟的荸薺。

功用: 清热，退黄疸。

疗效: 有一小儿全身发黄，眼球亦黄，小便黄如黄梔汁，用荸薺如法服食即愈。后用以治疗两例患者，疗效良好。

来源: 桂林市中医院 唐道平

六 方

主治: 黄疸（传染性肝炎）。

处方: 枇杷叶二十斤

制法: 将枇杷叶切碎放入锅中加水四十斤，煮沸用慢火熬煮四小时，去叶取出滤过约得八斤许，放瓦盆内，复将渣加水二十斤，重煎二小时，取出过滤约得四斤。将两次滤液，同放锅中，慢火浓缩至四斤，取出滤过加糖精和苯甲酸各二克，搅拌均匀，俟冷却后，装入玻璃瓶中密封备用。

用法: 成人每日服三次，每次九十至一百二十毫升，小孩酌减。

疗效: 经治八例，疗效卓著，服药一至五日黄疸消失。

来源: 巴马县人民医院 谢怀中

七 方

主治: 全身面目俱黄，发热。

处方: 白頸蚯蚓五條 蜜糖二兩

用法: 将蚯蚓洗净装碗内，加入蜜糖，以一较小碗盖上，待蚯蚓化成水，用开水冲服。

功用: 清热，退黄疸。

疗效: 李××曾患此症，经治无效，后服用本方即愈。

来源: 桂林市中医院 李知行

八 方

主 治：黄疸（阳黄，传染性肝炎）。

处 方：茵陈蒿湯加味：茵陈五钱 大黃三钱 山枝四钱 郁金三钱
田基黃〔51〕五钱

用 法：用水二碗半，先煎茵陈、田基黃，然后加入各药煎取一碗，分二次服。

疗 效：以茵陈蒿湯加入草药田基黃为主，治疗传染性肝炎，1959年上半年共住院治疗数例，疗效好，疗程短，兹介绍一例于后：罗××，全身发黄，右肋胀痛，食欲不振，在我院内科室留医，經检查诊断为传染性肝炎。治疗五月，未見卓效，后邀我科会诊，使用上方治疗十八天，黄疸消退（黄疸指数由70单位減至4单位），凡登白試驗直接反应間接反应，由阳性变为阴性，精神正常，食欲增进，痊愈出院。

来 源：梧州市人民医院中医科

九 方

主 治：面目身黄，发热，小便短赤（阳黄）。

处 方：龙胆泻肝湯加茵陈：龙胆草三钱 柴胡二钱 木通四钱
泽泻三钱 生地五钱 車前三钱 山梔二钱 黃芩三钱
茵陈六钱 甘草一钱五分 归身三钱

用 法：用水二碗半煮取碗半，一日分二次服，每日一剂。症状较重者，可早晚各服一剂。

附 注：高热者去归身加重龙胆草、黃芩、柴胡，小便短少者加重木通、車前。

功 用：清热，利湿。

疗 效：曾治疗五十一例，三天痊愈者五例，七天痊愈者二十五例，十天痊愈者二十一例，无效者二例。

来 源：南宁市公費医疗門診部

十 方

主 治：黄疸，头痛，恶心，食欲不振，面目黄，右上腹部压痛，小便如茶样，发热（传染性肝炎）。

处 方：胆草五钱 黄芩六钱 银花五钱 茵陈四钱 木通五钱
山梔五钱 干葛七钱 丹皮二钱 郁金二钱

功 用：渗湿，清热。

疗 效：陈××，男，三周岁。患上病，用本方服三剂而愈。

来 源：柳州市联合诊所 謝紹先

十 一 方

主 治：遍身目珠发黄，小便黄，或身痛，或发热、咳嗽、流鼻水，或头晕头痛。

处 方：常山[53]（生药名狗屎树叶）二两 丹参[54]（生药名红羊咩青）二钱

用 法：煲猪肉服。

疗 效：李××妻，患黄疸，眼睛周身发黄，当时没有猪肉，只将药用水煎服，连服三剂痊愈。

来 源：马山县周六公社周六制药厂 鍾 陆

十 二 方

主 治：黄疸（传染性肝炎）。

处 方：茵陈二两 泽泻三钱

用 法：水三碗，煮取碗半，一日分二次服。

功 用：清湿热，利尿，治黄疸。

疗 效：曾用本方治疗传染性肝炎十二例，全数治愈。住院日数最少为十八日，最多为六十日，平均为三十二天半，出院时肝功能、症状、体征及化验均恢复正常。在治疗过程中，全数病例无任何副作用出现。

来 源：柳州市人民医院中医科 胡万乾

十 三 方

主 治：阳黄疸（急性传染性肝炎）。

处 方：茵陈二两 連翹一兩 枳壳二錢

用 法：水三碗，煮成碗半，一日分二次服。

附 注：心煩不寐加梔子、黃柏。尿短加滑石。大便秘加大黃。鼻衄加丹皮。胸肋脹悶加郁金。

功 用：消热，去湿。

疗 效：本方曾治疗一百多例，疗效很高。如岑溪粮食仓库周××发病二天，到我院留医，服药十二剂，痊愈出院。

来 源：岑溪县医院 黎柱修

十 四 方

主 治：面目全身現黃色，微热，口渴，腹微痛，大便溏泻，小便短黄。

处 方：綿陈四錢 銀花三錢 陈皮二錢 川朴三錢五分 滑石四錢
白朮三錢 山梔三錢 黃柏三錢 云苓三錢

用 法：水二碗，煮取一碗服，渣再煎服，日服一剂。

功 用：清热，利湿。

疗 效：刘××，男，十七岁。自1959年9月21日起，发热，身倦无力，腹痛，至10月4日来我科就診。症状：面目全身均現老黃色，小便短黄如菜汁，微热，口渴，大便溏泻，腹有微痛，脉象弦滑。检查：黄疸指数100单位，凡登白試驗直接間接反应，均为阳性，麝香草酚8单位。診斷为阳黄。經服本方二剂后，精神較好，黃色未退。四剂后黃色微減，小便黃色亦較淡。八剂后黃色已退50%，大便已不溏泻，思食。原方去白朮服两剂后，症状大为好轉，繼服前方十剂，一切恢复正常。

来源：柳州市人民医院 郭仁稀

十五方

主治：黄疸病，皮肤黄，肋下痛，尿黄，发热，眼睛黄。

处方：柴胡 黄芩各三钱 绵陈六钱 黄柏三钱 青皮一钱五分
胆草 淮通 山枝子各三钱 车前二钱 败酱草五钱

用法：用适量水煎取一碗半，分三次服，每日服三次，每次服半碗。

疗效：蓝××，男，二十多岁。全身黄疸，轻热，右肋下痛，小便黄，目黄。经用此方，给服二剂，病见减退，继服七剂，黄疸全部消失而愈。

来源：马山县周六中心医院 罗建邦

十六方

主治：全身面目俱黄，舌苔黄厚，烦渴，小便深黄。

处方：茵陈五钱 枝子二钱 胆草二钱 郁金 枳实各二钱
生军一钱五分 丹皮 甘草各二钱 败酱草五钱

用法：用适量水煎取一杯，作一次空腹服。每天服一剂，连服四天，小儿减半。

功用：清热利湿。

疗效：黄××，男，八岁。发热，口燥渴，烦躁，全身面目俱黄，舌苔黄厚，小便少，色深黄，兼有轻微抽搐。用上方减半，连服三天，诸症消失。

禁忌：忌食鱼腥油腻等物。

来源：马山县永州公社医院 黄子康

十七方

主治：面目皮肤黄，浮肿，尿赤色，身微热，气喘咳嗽，

处方：麻黄 杏仁各二钱 甘草二钱 连翘三钱 赤小豆四钱

桑白皮三錢 黃柏三錢 茵陳五錢

用法：用適量水煎取半碗，一日分二次服，連服三劑。

功用：清濕熱，退黃。

療效：陸××，男，成年人。全身、面目、肌肉發黃，身熱，浮腫，氣喘咳嗽，用上方，連服三劑，諸症消失。

禁忌：忌食鹽、酸和魚等。

來源：馬山縣永州公社 沈鴻儒

十八方

主治：濕熱黃疸，面目全身俱黃，小便黃，身熱或微汗。

處方：茵陳三錢 云苓三錢 白朮二錢 桂枝二錢 車前三錢
赤小豆四錢 甘草一錢五分 生姜三片

用法：以水三碗，煎取一碗半，日分三次服，每隔四小時服一次。

療效：本方經用於治療濕熱黃疸患者，共四十五例，均獲痊癒。如蒙××，男。患黃疸，面目俱發黃，汗出四肢冷，體內感熱，身痛，神昏懶語，小便黃，口微渴，不能起床，脈浮數。來院留醫治療，給服本方一劑，全身黃色稍退，能起床，服二劑後，黃退，精神稍振，服三劑後，諸症消失而癒。

來源：忻城縣古蓬民辦醫院 白玉榮

十九方

主治：面目色黃，小便黃，右腹痛，有硬塊，按之痛，頭昏，肢倦無力，食次不振（傳染性肝炎）。

處方：金不換〔55〕五錢 甘草二錢

用法：用水一碗，煎取半碗，作一次服。

療效：患者李××，女，十八歲。因身體經常不舒適，腹部經常痛，尤其是右肋下隱隱作痛，經檢查後，回家休養多月，病仍不癒，且逐日沉重，特來院留醫。檢查右腹部壓之更

痛，按之有硬块，双眼巩膜黄，面色亦稍黄，小便黄，头昏，四肢软无力，食欲不振，脉搏微弱。服药后，腹部痛减少。继续服五剂，腹部硬痛消失，巩膜黄已退，又继续服八剂后，精神恢复，善后调养而愈。

来源：崇左县东门公社医院

二十方

主治：常发热，身黄，右上腹有隐痛，大便不正常，睡眠不安，四肢无力，日渐消瘦（慢性肝炎）。

处方：东参[56]（又名鸡头薯）四钱 金不换[55]四钱 甘草二钱

用法：用水二斤煎取半斤，一日分三次服。

疗效：（一）姬××之子，男，七岁。经医院检查，证实为慢性肝炎，时常发热，肚痛，全身发黄，日渐消瘦，体重减轻，经治疗无效。转来本院治疗；用本方连服三天，发热消失，食欲增加，继续服十二天，痊愈出院；（二）梁××，女，二十二岁。腹鸣，肚痛，痢泻，饭量减少，面目发黄。给与本方连服九天，症状消失，精神好转，素来晚上不能安睡，服药后已能安眠，食欲增进，痊愈出院；（三）李××，男，三十岁。睡眠不安，身体日渐消瘦，腹部有热感，肝部有隐痛，平日四肢无力，常感觉冷，医院检查诊断为慢性肝炎。经治疗无效转来本院，检查肝部摸不到，但有压痛，食欲正常，大便有时不正常。连服本方三天，精神转佳，第四天加入麦芽三钱连服八天，症状消失，肝部力压已不痛，共服药四十五天，痊愈出院。

来源：崇左县东门公社医院

二十一方

主治：微寒发热，头重如裹，身肢倦疼，面目皮肤发黄色，小便黄赤，右肋下微有压痛。

处 方：黃芪四錢 黨參三錢 茯苓三錢 蒼朮三錢 半夏二錢
陳皮一錢 防風一錢五分 白芍三錢 澤瀉四錢 柴胡二錢
姜活一錢五分 獨活一錢五分 黃柏三錢 綿茵陳一錢五分
甘草一錢

用 法：用水三碗，煮取一碗半，一日分二次服。

功 用：補中升陽，清熱滲濕。

療 效：李××，男，二十四歲，南寧人。1954年患黃疸，初起微寒發熱，頭重如裹，身肢倦疼，曾服疏解藥數劑無效，繼服痧草藥多天，漸致面目皮膚發黃，小便黃赤，右肋下有輕度壓痛，大便溏軟色黃。脈微數，略浮而虛，苔白略厚，濕潤。濕熱邪盛，正氣已虛，以本方治之，服藥三劑，寒熱均退，諸症亦輕減，續服五劑，頭重身倦悉除，黃亦大退，小便清長，更進五劑痊癒。

來 源：廣西中醫院 張漢符

編者按：身體虛弱、濕邪偏盛之黃疸患者宜之。

二十二方

主 治：黃疸（傳染性肝炎），皮膚、面目俱黃（色鮮明者為陽黃，色晦暗者為陰黃）。

处 方：（一）陽黃方：茵陳一兩五錢 鮮車前草三兩 梔子四錢
黃柏四錢

（二）陰黃方：茵陳一兩 干姜二錢 熟附四錢 黨參五錢
白朮三錢 炙草三錢

用 法：用水三碗煮取一碗半，一日分二次服。

附 注：陽黃方加減法：大便結者加麻仁一兩；大便溏者去梔子加川連二錢；渴者加花粉七錢；煩躁者加麥冬五錢；兼有惡寒發熱脈浮數者加連翹四錢、黃芩五錢；小便不利者加竹葉三錢、甘草梢二錢。陰黃方加減法：濕盛者加蒼朮三錢、扁豆四錢；氣虛者黨參或改用人參；血虛者加歸身四

錢、首烏四錢；真陰虛者加熟地六錢、歸身五錢；食欲不振者加淮山五錢、砂仁一錢；大便秘，腹痞屬濕滯者，加白豆蔻二錢；小便頻數屬虛寒者加肉桂一錢、故紙四錢；嘔噦者加生薑二錢、半夏四錢。

功用：陽黃方：清熱利尿。陰黃方：溫中利濕。

療效：我院從1959年5月至1960年4月，共接診黃疸病一百多例，其中陽黃為多，陰黃罕見，採用此二方治療，均收良好效果，舉例如下：

（一）呂××，女，二十九歲，陸川人。1959年12月間，初起潮熱疲倦，繼現皮膚巩膜黃染，來院門診。當時患者全身面目及小便均黃色，腹脹不思食，舌苔黃膩，脈弦數，黃疸指數180單位。診斷為陽黃。用陽黃方，服藥十天后痊愈。

（二）郭××，男，三十四歲，蒼梧人。1959年7月間，初起胃納不佳，精神倦怠。當時在衛生所服中藥數天未好轉，遂來院留醫。檢查患者皮膚巩膜輕度黃染，小便黃，大便濇白，舌苔白膩，食欲不振，脈濡緩，黃疸指數46單位。診斷為陰黃。用陰黃方，大小便漸趨正常，苔漸薄，食欲好轉，但黃疸指數還沒有顯著下降，仍以陰黃方隨症酌予加減，計共服藥二十余劑，黃疸外觀消失，肝功能試驗正常，痊愈出院。

來源：玉林專區醫院內科

黃 胖 類

治 黃 胖 病 方

一 方

主治：身黃兼腫，微帶白色，狀如黃疸而眼目如故，心跳，耳

鳴，倦怠。

处 方：黃胖丸：白朮一兩 茵陳五錢 歸身五錢 川芎五錢 白芍五錢 牛膝一兩 紅棗一兩 黃芪五錢 青礬（煨）五錢

用 法：共為細末，面糊或煉蜜為丸如黃豆大。每早空腹服20至30丸，白酒或開水送下。

療 效：本方是我家祖傳三代秘方，在陸川縣米場、馬坡、玉林、仁東等地治愈很多人，在本地亦治愈二十例，多是服藥一劑而愈，只有一、二例須服二劑才愈，其中二例青年婦女，婚後四、五年沒有生育，用本方後，面色萎黃漸轉紅潤，且已受孕。

來 源：北流縣六麻公社醫院 龍德彪

二 方

主 治：遍身黃腫，耳鳴，心跳，四肢疲、軟無力（鉤蟲病）。

处 方：青礬（醋煨）一兩 大力王〔57〕二兩 蒼朮一兩 茵陳七錢 紅棗四兩

用 法：上藥研細末，以棗肉再加蜜煉為丸如綠豆大。一日分早晚兩次服，每次服二至三錢，米湯送下。

功 用：補血，殺蟲，健脾，去濕。

療 效：1955年至1956年間，用本方治愈石窩區黃胖病患者多人，經石窩民辦衛生所調查本方治愈五十多人，其中最嚴重者，也只服藥十餘天即痊愈。

來 源：北流縣石窩衛生所 黃心波

三 方

主 治：黃胖病（鉤蟲病）。

处 方：復方鉤蟲草丸：上荊芥〔58〕一斤 枯礬半斤 皂礬二斤 陳皮二兩 厚朴四兩

制 法：將上藥共研末，面糊為丸如黃豆大。

用法：輕症每次服一錢，每日服二次，連服七天。重症每次服二錢，每日服二次，連服七至二十天。

療效：蕭××，男，四十六歲。面腳部浮腫，心悸腳軟，服藥七天后，瀉出蛔蟲和鈎蟲，浮腫消失一半。繼續服此丸十天，浮腫消失，神色好轉，食欲大增。

來源：岑溪縣糯垌太陽公社

四 方

主治：黃胖病，心跳，耳鳴，面色萎黃，浮腫。

處方：茵陳六錢 蒼朮五錢 青礬三錢（煨） 紅棗一兩（去核）
牛膝三錢 元肉一兩 歸身一兩 北芪一兩 百草霜一兩

用法：共為細末，面糊為丸，早晚各服三錢，飯后用開水送下。

療效：曾治療一百多例，療效很高。舉例如下：

謝××，男。面萎黃，耳鳴，心跳，四肢無力，不能勞動，已有十多年，服一料面轉為紅色，三料痊癒。

來源：陸川縣人民醫院中醫科

五 方

主治：黃胖病，面色萎黃，心跳，耳鳴，浮腫（鈎蟲病）。

處方：青礬（煨）五錢 歸身三錢 黃柏三錢 茵陳七錢五分 肉桂一錢
生地四錢五分 雙朮三錢五分 烏棗去核五錢 古月二錢 百草霜二錢 若寒甚四肢厥冷加附子五錢

用法：共研為粉，用面糊為丸，早晚各服一次，每次三錢，飯后服，開水送下。

療效：經東風公社醫院臨床治愈古城工區王××，除具本病的全身症狀外，還臥床不能自起。又經縣內各公社醫院試用臨床治愈陳××等五十多例，均是服一至二服痊癒。

禁忌：愈后要戒食豆类一年。

來源：陸川縣東風公社 江濡光

肿 脹 类

治 水 肿 方

一 方

主 治：一般营养性水肿，面部及全身肌肉均呈黑黄色，四肢、腹部、面部、眼睑浮肿，兼伴有夜盲症。

处 方：紅毛松叶糖浆：老松叶十斤（即叶下垂的）

用 法：采鮮松叶十斤（叶根含有紅色之細毛的，要生采，切勿用其脫落地上的），加水三十斤，煮沸后，每隔二十分鐘拌一次，煮至五斤，将松叶捞出，用紗布滤淨，待其冷却澄清后，即將澄清松毛汁加入紅糖一斤四两、安息香三錢（防腐），再煎至三斤即成。每日服四次，每次服一两，服时用等量溫开水送下。

附 注：本品制成后，在未冷却前，切勿用盖盖，以免水蒸气回留在內，盛装容具需要干淨，最忌生水及盐水，不慎就易发酵变质。

疗 效：本方經用治愈水肿病十六例，其中有九例，某年秋季患病，經中西医治疗虽愈但不久复发，自从給服紅毛松叶糖浆愈后，均未見复发。服药时间，一般系三至十天即愈。另有三例伴有夜盲，亦同时痊愈。

禁 忌：服药期間不吃蘿卜、头菜、竹笋及各种酸性食物。

来 源：崇左县中东公社 倫 业

二 方

主 治：营养性水肿。

处 方：松树叶二十斤 車前（干）一斤

制 法: 將葯置鍋中，加清水四十斤，以文火煮沸四小時，去渣取出濾過，約得八斤盛于瓦盆中；復將葯渣加水二十斤重煎約兩小時，去渣濾過約得四斤。前後濾液一同放入鍋中，慢火濃縮至四斤，即取出濾過，加入糖精和苯甲酸各二克，俟冷卻後裝瓶密封待用。

用 法: 成人每日服三次，每次二十毫升，小孩酌減。

療 效: 經治三十二例，輕者一至五日，重者六至十日痊愈。

來 源: 巴馬縣人民醫院 謝懷中

三 方

主 治: 營養性浮腫。

處 方: 山蒼[59]（即過山香、豆豉姜）二兩

用 法: 以水四百至六百毫升，煎減半後，慢火濃縮成一百五十毫升，一日分三次服。

療 效: 曾治療浮腫病有效。

來 源: 隆林縣人委衛生科

四 方

主 治: 營養不良水腫，反復發作，經年不愈。

處 方: 木瓜一兩 土苡米一兩 茯苓一兩 牛膝 三錢 川芎 三錢
白朮五錢 當歸三錢

用 法: 水三碗，煮取一碗半，一日分二次服。

功 用: 健脾滲濕，益氣補血。

療 效: 曾××，患營養不良性水腫，反復發作，已一年多，經中西醫治療，均未得徹底痊愈。于1958年6月10日入區中醫院留醫，腹部水腫，兩足腫大光亮如柱，不能納履，亦不能步行，并有輕度疼痛。連服本方五劑，水腫顯著消失，已能行走，按患者肌肉已無水腫痕迹，繼以健脾利水之劑，巩固療效，調治多天，無復發出現，痊愈出院。

来 源：广西中医药研究所 李仲稻

五 方

主 治：全身水肿。

处 方：麻黄一钱五分 熟附片二钱 甘草七分

用 法：用水一碗半，煎取大半碗，一次服，隔六小时后，再将药渣加水一碗，煎成半碗，一次服。

功 用：温经，发汗，利水。

疗 效：丘××之女，患全身水肿，经治疗无效。后服本方一剂，水肿尽消，惟腹部尚有胀感，继用枳实一钱、白朮二钱，水煎服，三剂而痊愈。

来 源：北流县乡平卫生所 林汗州

编者按：此两方均出金匱水气篇，即麻黄附子甘草汤、枳实汤。

六 方

主 治：先由脚肿起，渐肿至腹，肚大，气喘。

处 方：吴茱萸三钱 橘皮二钱 防党八钱 熟附四钱 干姜五钱
细辛一钱 川椒四钱 肉桂三钱 白朮六钱 茯苓七钱

用 法：用水四碗，煎取二碗，药渣再加水二碗煮取一碗，将头二煎两次药汤混合再煎成二碗，纳细辛约煎数沸，取下，再纳肉桂，冷后，一日分三次冷服。

功 用：温中散寒，下水降逆，健胃通津。

疗 效：本方经治愈张××、黄××等多人，效果很好。

来 源：北流县七一公社 张仲留

编者按：本方出千金方，即五噎丸，献方人移治水肿，寒性者颇宜。

七 方

主 治：全身胸腹四肢浮肿，发热，身痛，口渴，小便短少。

处 方：茯苓 泽泻各四钱 大腹皮 槟榔 木通 赤小豆各三钱

川椒目 秦艽 川木瓜 車前子各二錢 甘草一錢五分
灯心草一錢

用法：用适量水煎取一茶杯，一日分二次服。

功用：利水消肿。

附注：如兼面目发黄，宜加茵陈四錢、枝子三錢。

疗效：覃××，男，四十四岁。病十多天，微热身痛，四肢浮肿，小便短少，口渴，服本方三剂，肿势大减，后用四君子湯善后。

禁忌：忌食魚、酸及盐。

来源：馬山县永州公社医院 黄子康

八 方

主治：全身水肿病。单腹水臌亦治。

处方：正川朴根一錢 青皮一錢 广木香一錢 商陆一錢 甘遂二錢
蒼朮二錢 白朮二錢 枳壳一錢 尖檳一錢 淮木通一錢
泽泻一錢

用法：上药共研細末，分庄五包，每日空腹服一包，开水送下，五日服完。

功用：健脾，消胀，行气，逐水。

疗效：吳××，男，十三岁。患水肿病，全身浮肿，睪丸亦肿大，經医治无效，后用上方，服药三包，病即消失。

禁忌：服药期間忌食盐及酸鹹食物。

来源：北流县英雄公社塘肚工区卫生所 黄传珉

治 单 腹 臌 方

一 方

主治：腹大如鼓，青筋怒张，四肢消瘦。

处方：黑豆三錢 白朮三錢 生軍五錢 川連三錢 巴豆去壳一錢五分

用法：共研細末，每次服五分，開水送下，初服每日服一次，連服兩日，第三日停藥，第四日服一次，第五、六日停藥，第七日服一次，第八日服八珍湯一劑，以後每服藥末兩天（每天服一次），又服八珍湯一劑，以愈為止，大約二十天可愈。

附注：每次服藥末后，約一小時許，腸鳴如雷，繼而泄瀉，俟瀉三、四次后，食冷粥一碗即止，不止再用甘草三錢或綠豆一兩，煲水服立止。

療效：楊××，患單腹脹，肚大如甕，青筋暴露，小便短，大便溏，食欲不振，每餐食粥碗半，臍尚未凸，用本方依法治療而愈。

禁忌：忌食魚腥、酸、辣、糯米、鹽，可以秋石代鹽，如无秋石，可用制鹽，制法：以生鹽入竹筒內，外用黃泥封固，以谷壳煨一晚，翌日取出，鹽轉黃色，用以調味則無忌。

來源：平南縣六陳 甘敬波

二 方

主治：單腹脹。

處方：遠志五錢 生姜自然汁適量

用法：將上藥和生姜汁炒至無水為度，但不宜過焦，加水六兩煎至二兩，分二次服完。第二劑以後，遠志減為三錢。另用車前子四錢，田螺四個（大的）去壳，共打爛外敷臍部。

療效：1959年和1960年共治療二十人均愈。舉例如下：

凡××，男，三十四歲。患腹部脹，胸部感脹悶，不能入睡，已五天，脈沉，大小便正常，給服本方一劑而愈。

來源：忻城縣周安民辦醫院 黃廣昌

治 單 腹 脹 方

主治：單腹脹（肝硬化單腹脹）。脾胃之氣虛弱，不能運化精

微，致水鼓聚而不散，日久气血凝滞腹内，肚腹隆胀，静脉曲张，中空似鼓。

处 方：四妙枳壳丸：枳壳四两 香附二两 檳榔一两 玄胡索一两
(微炒) 三稜二两 莪朮二两

制 法：将枳壳分为四份，一份用苍朮一两，加水同煮干后炒至黄色去苍朮；一份用莱菔子一两，加水同煮干后，炒至黄色去莱菔子；一份用小茴香一两，加水同煮干后，炒至黄色去小茴香；一份用干漆一两，加水同煮干后，炒至黄色去干漆。

三稜、莪朮二味，以童便一杯同浸一宿，次日用原巴豆三十粒去壳，加水同煮干后，炒至黄色去巴豆。

制就后，上六味共研细末，再以同枳壳煮炒之苍朮、莱菔子、小茴香、干漆煮浓汁，加好醋一碗，入面为糊，纳药末捣丸如梧桐子大。

用 法：早晚各服五十丸，渐加至七十丸，用清米汤送下。照上药量服完后，腹胀消失，继服人参营养汤七剂以巩固疗效。

附 注：人参营养汤：人参 陈皮 炙芪 桂心(焯) 当归(酒拌) 白朮 炙草各一钱 白芍(酒洗)一钱五分 熟地(酒拌) 五味子 茯苓各八分 远志五分 生姜三片 大枣二枚

功 用：宽中快膈，行气导滞，通痞消胀。

疗 效：本方系我父王献廷所传，曾经治愈多例。

来 源：广西中医药研究所 王乃翰

治 足 肿 方

主 治：两足浮肿，年多未愈。

处 方：加減茵陈蒿汤：茵陈六钱 梔子三钱 大葱四钱

用 法：水二碗，煎取一碗服。

功 用：清湿热，利水。

疗 效：卢××，二十二岁。足肿一年多，行动不便，不能劳动，

飲食如常，前經醫院治療無效，服本方十五劑痊癒。本方不但能治本病，治黃疸及其他膚黃心悸、行動心悸的也有效。

來源：廣西中醫專科學校 林鳴皋

風 濕 類

治風濕關節痛方

一 方

主治：風濕關節疼痛，并治鶴膝風。

處方：樟樹〔60〕皮（去外皮切碎晒干）三兩 黃梔子（水梔、山梔均可，打碎晒干）二兩 五加皮（土五加皮〔61〕亦可，又名三甲菜，用根皮，切碎晒干）二兩

用法：上三味共研細末，加生酒糟（未經出酒的）適量，和以三花酒使成膏狀，用菜葉包裹置炭火中煨熱，溫敷（須適當溫度，勿使灼傷皮膚）痛處，外加綑帶固定。每日換藥二次，敷至不痛為止。

附注：1.敷藥後，敷藥局部皮膚有發癢反應，反應越大，收效也越大。換藥時，以上面三種藥物的枝葉煎水洗癢處，可以止癢。

2.本方藥末以布包裹，蘸三花酒外搽。各種痛風及跌打腫痛亦效。

療效：祖母患風濕痛，二年多不能行動，後得本方治愈。此後，××公司工程師××患風濕病，一年不能起床；鄧××，女，三十五歲，患風濕痛，二年不能起床；鍾××，男，三十八歲，患風濕痛手脚抖戰，不能起床已一年多；均用本方治愈。後未見復發。

来源：鹿寨县雒容公社医院 骆盛才

二 方

主治：风湿关节痛（风湿性关节炎）。

处方：桂枝二钱 白芍三钱 知母四钱 防风三钱 麻黄二钱
白朮四钱 川朴二钱 甘草二钱 生姜三钱 薏仁二钱
红花二钱

用法：水四碗，煮取一碗半，一日分三次服。

功用：驱风湿，清邪热。

疗效：梁××，男，四十二岁，宾阳人。来诊，症状：头重痛，发热，四肢略肿，关节刺痛，口不甚渴，无汗食少，大便隔天一次，小便短少，脉象弦而带紧，舌边淡红，中心白薄。即开上方与服，连服三天而愈。

来源：南宁市 徐伯明

编者按：本方即金匱桂枝芍药知母汤，去附子加川朴、薏仁、红花。

三 方

主治：风湿，全身骨节疼痛，下肢尤甚，喜热畏冷，小便清长，大便稀溏，身体虚弱，脉沉缓无力。

处方：当归三钱 川芎二钱 桂枝三钱 桑寄生 防风各一钱五分
炙草二钱 熟地四钱 茯苓 秦艽各三钱 川仲三钱
黄芪六钱 细辛五分

用法：用适量水煎取二茶杯，分二次，早晚温服各一杯，连服三至四天，每天一剂。

功用：活血，祛风，去湿。

疗效：陆××，女，成年。体素弱，得病十多天，全身疼痛，脚腿尤甚，喜热畏冷，口淡，小便清长，大便微溏。用上方每天一剂，连服四天而愈。

来源：马山县永州公社医院 黄子康

四 方

主 治：关节疼痛，发热汗出。

处 方：当归二钱 生地三钱 北芪四钱 黄柏二钱 黄芩二钱
黄连二钱 桑枝三钱 勾藤二钱 防己二钱

用 法：水三碗，煎取碗半，一日分二次服。

功 用：滋阴，清火，活血，通络，排水毒。

疗 效：雷××，贵县人。患关节走痛甚剧，时发热汗出，多方治疗未愈，治以本方，一剂汗止痛减，续剂而愈。

来 源：广西中医药研究所 廖用周

五 方

主 治：历节风，关节痛。

处 方：独活三钱 川芎二钱 牛膝三钱 续断二钱 防风三钱
秦艽二钱 桂枝二钱 当归三钱 生地二钱 白芍二钱
杜仲二钱 黄芪三钱 甘草二钱

用 法：用水三碗，煎至一碗半，分二次服（或浸酒服亦可）。

功 用：疏风活血。

疗 效：伍××，男，四十四岁。患风湿病，游走疼痛，后固着膝关节处，肿痛强直，并散射背脊作痛。用此方治疗，三剂而愈，后用酒浸服一月，以巩固疗效，年来未复发。

来 源：柳州市 覃保霖

治手足肢节肿大方

主 治：湿毒凝滞，手足关节，逢节肿大，屈伸不利。

处 方：土茯苓五钱 薏苡仁一两 大枫子二钱（杵） 松节三钱
川草薢三钱 宽筋藤三钱 丹参三钱 川加皮三钱 勾藤四钱
蝉蜕二钱 杜仲三钱 草节二钱

用 法：用水三碗，煮取一碗半，一日分二次服。连服至愈为度。

功用：祛风，利湿，舒筋，活絡。

疗效：黃××，女，五十二岁。手足各处关节肿大，拘急，不能持碗执箸，医治数年不愈，后服本方六剂，諸症消失。

来源：南宁市 謝良毅

治 风 湿 方

一 方

主治：风湿疼痛，背部痛。

处方：黃柏皮六錢 灵仙二錢 銀花三錢 花粉三錢

用法：用适量水，將上药煎取大半碗，大人一日二次服完。小儿酌減。

疗效：馮××祖母，患风湿，十多天不能起床，也不能轉側，用此方治疗而愈。

来源：鹿寨县头排公社 馮庆桓

二 方

主治：风湿腰腿痛。

处方：牛膝五錢 鹿角霜二錢

用法：用水浓煎，日分二次服。

功用：散瘀活血，强筋骨。

疗效：余××，男，二十七岁。于1959年1月27日因腰及膝关节疼痛約二月余而入院。患者走路跛行。兩側腰肌有紅肿压痛，弯腰伸腰均感困难，兩膝关节亦有紅肿，运动不自如，疼痛甚剧，左肢大小腿外觀異常，但有疼痛。診斷为风湿性腰腿痛。入院后即給予本方治疗。每日一剂，效果甚佳，服十多剂后，腰部膝关节紅肿消失，腰部及下肢大小腿关节疼痛显著減輕，步行活动自如，精神、食欲均恢复正常，維尚有輕度酸痛。改用超短波照射及拔火罐均

未見效。仍繼續復服本方，前後計共服三十劑，于1959年5月13日痊愈出院。

来源：一八一医院 唐哲民

治 腿 痛 方

主治：湿热腿痛，坐臥不宁。

处方：苡仁一兩 海桐皮四錢 川草薢五錢 蚕沙四錢 桑枝一兩
甘草一錢五分 牛膝三錢 秦艽四錢 防己五錢

用法：水三碗，煎取一碗半，一日分二次服。

功用：祛风，利湿。

疗效：聶××腿痛甚剧，坐臥不宁，医者作风湿治疗无效。痛处虽无紅肿，但按之灼热，乃属湿热症，与本方两服而安。

来源：广西中医专科学校 庞仲越

治 痛 风 方

主治：痛风、头痛、肢节各处疼痛症。

处方：巴豆肉五分 三花酒二兩

用法：巴豆肉打溶浸泡酒中，用时以手指蘸巴豆酒捻痛处，每隔三天捻一次。

疗效：李××，患头痛，用本方捻一次即痊愈。巴豆有毒，本方忌入目，用后須用肥皂水洗淨手指。

来源：广西中医专科学校 叶綬卿

痹 症 針 灸 疗 法

主治：四肢无力，麻木不仁，关节屈伸不利，手不能握物，足不能举。

取穴：肩井 肩髃 尺泽 曲池 合谷 外关 风市 阴市
阴陵 委中 足三里 絕骨

手法：用中度刺激針尺泽、委中外，各穴均用灸法。

疗 效: 文×, 男, 四十一岁。由于剧烈运动出汗后, 腠里开张, 为风寒所乘, 滞留经络, 关节伸屈不利, 四肢软而无力, 麻木不仁, 手不能握物, 足不能举动, 取上穴位针灸二次痊愈。

来 源: 柳州市联合诊所 柯传灏

顏面麻痺針灸療法

主 治: 顏面麻痺(即口眼歪斜)。

取 穴: 絲竹空 童子髻 頰車 地倉 下关

手 法: 初針时用强刺激, 逐步改为輕刺激。

疗 效: 严××, 男, 二十三岁。患左脸麻木不仁, 嘴斜, 左眼不能閉, 飲食艰难, 已四天。經照上穴針六次即愈。

来 源: 融安县长安民族医院 黃繼香

痿 躄 类

治 痿 病 方

一 方

主 治: 痿病初期, 手足痿病无力, 关节弛緩不收, 不感疼痛。

处 方: 沙参三錢 玉竹三錢 生扁豆二錢 烏梅二錢五分 川瓜三錢
麦冬四錢 金釵石斛五錢

用 法: 水三碗, 煮取一碗半, 一日分二次服。

附 注: 有潮热盜汗者加鱉甲三錢、龙骨三錢。

功 用: 清热, 养阴。

疗 效: 本方曾治愈初期痿症三人。

来 源: 广西中医专科学校 蔣毓林

二 方

主 治：手足痿軟，不能举动。

处 方：石膏八錢 知母三錢 粳米三錢 甘草一錢五分 葛根五錢
淫羊藿一錢

用 法：水二碗，煎取一碗半，一日分二次服。

疗 效：刘××，男，三十岁。一日飲酒醉醒后，手足不能举动，面紅，唇赤，舌苔黃，脉洪大有力。投以本方，服药后四小时已能起立，再剂痊愈，本方对此症只治过一人，由于少见，介绍以供参考。

来 源：广西中医专科学校 韦来庠

编者按：此方清阳明之热以治痿，有热症热脉者可用。

三 方

主 治：足痿不能行。

处 方：絳复四物湯：紅花一錢五分 旋复花三錢 生地四錢 白芍三錢
川芎二錢 归身三錢 川牛膝三錢 虎潛丸三錢（药湯送服）

用 法：先用方梗寬筋藤煲猪肉食。上药七味用水二碗煎取一碗送服虎潛丸。

疗 效：陈××，血虛面白，唇白，足痿不能行，医治半年无效，以絳复四物湯去眞絳加紅花、牛膝送服虎潛丸，兼食寬筋藤煲猪肉，三剂痊愈。

来 源：广西中医专科学校 庞仲越

治走路过劳四肢瘫痪方

主 治：走路过劳，忽觉四肢无力，不能屈伸举动。

处 方：补中益气湯加味：生北芪五錢 归身三錢 党参三錢 白朮二錢
陈皮一錢五分 升麻五分 柴胡五分 熟附二錢 桂枝一錢五分
甘草一錢

用法: 水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

疗效: 姚××，男，三十岁。因坐自行车跑远路回来后，忽觉四肢无力，手足不能屈伸举动。用本方治疗，服药一剂，手足已能举动，三剂痊愈。本方经治三人，均有效验。

来源: 广西中医专科学校 黄达金

拘 攣 类

抽筋針灸療法

主治: 四肢抽筋。

取穴: 足三里 間使（取双穴）

手法: 强刺激五分鐘。

疗效: 韦××，女，二十三岁。突然四肢抽筋，言語自如，神志清楚，持續一小时，四肢要人按摩，亦不能止其抽搐，曾服各种草药无效，取上穴針一次即愈，半年未見复发。

来源: 融安县大良民办医院 刘 斌

鶴 膝 风 类

鶴膝风針灸療法

主治: 脚膝肿大疼痛，上下腿日漸消瘦，如鶴膝形。

取穴: 阳陵 阴陵 风市 阴市 足三里

手法: 以上每穴針二次，另用太乙艾条灸三壮后，患者肿消痛止，行动灵活，后加取穴：絕骨 肩髃 曲池 合谷 尺泽。以上各穴輪流針灸四次。

疗效: 李××，男，四十一岁。膝关节肿痛，步履艰难，經久未愈，后照上穴針灸数次而愈。

来源：融安县长安鎮 欧 珊

腰 痛 类

治 腰 痛 方

一 方

主治：肾虚腰痛，头晕，小便赤。

处方：党参五钱 北芪五钱 白朮三钱 白芍三钱 杜仲三钱 續断三钱
秦艽三钱 狗脊三钱 独活二钱五分 桑寄生二钱五分 甘草一钱
归身二钱五分

用法：用水四碗，煮取二碗，一日分三次温服。

功用：补肝肾，驱风湿，强腰背。

疗效：曾用本方治愈肾虚腰痛者多例。如苏××，小便发现赤血球的腰痛头晕症，一剂痛止，二剂痊愈（二剂去秦艽加归身）。

来源：南宁市卫生局 张 本

二 方

主治：肾亏腰痛。

处方：菟丝子五钱 五味子五钱 杜仲五钱 續断五钱 肉蓯蓉五钱
萸肉四钱 茯神三钱 沉香三钱（研末分二次冲服）

用法：水三碗，煮取一碗半，一日二次分服。

功用：补肾益神，强筋骨，除腰膝痠痛。

疗效：陈××，男，三十岁。自十八岁起，曾剧烈手淫，三年来经常腰痛，曾长期医治无效，后来病势增剧，早上起床腰部不能屈伸，脉弦细而数。按肾主骨，又主藏精，肾精亏损，因而致病，处以本方，一剂痛减半，再剂屈伸自如，疼痛消失。

来源：广西中医院 陈紹琮

三 方

主治：腰部胀痛，得热敷熨则舒服。

处方：白朮三錢 杜仲三錢 故紙三錢 胡桃肉六錢

用法：用水二碗，煎取一碗服。

功用：补肾，强壮，益精力，治肾虚腰痛。

疗效：本人在三十六岁时因睡竹席腰痛，第二次睡酸枝木贵妃床又痛，痛得特别厉害，睡坐不得，行动不能，苦不堪言，曾经名医数人均治不愈。后用青蛾丸药料，去青盐加白朮作汤服，一剂而安，再剂痊愈，此后凡遇此症，即用此方，无不应手奏效，几十年来，治愈患者很多。

来源：广西中医专科学校 庞仲越

四 方

主治：腰痛发热。

处方：車前二錢 黃芩二錢 荷葉一片 南沉末三分（冲服） 广木香一錢五分 白芍三錢 銀花三錢 連翹二錢 粉葛三錢 竹叶二錢 甘草五分

用法：水二碗，煮取一碗，一日分二次冲南沉末温服。

功用：清热，止痛。

疗效：林××，二十岁。患腰痛数月，各处治疗无效，服本方一剂立愈。

来源：南宁市 黃道存

癲 癇 類

治 癲 狂 方

一 方

主 治：神志失常，打人毀物，狂言亂語，不知羞恥，裸体外出。

處 方：（一）烏柏根湯：生烏柏〔62〕根第二層皮二兩 酸醋四兩

（二）控涎丹：甘遂二錢 大戟二錢 白芥子二錢（炒）

用 法：（一）將烏柏根皮搗成落狀，然後加醋拌勻約三十分鐘，過濾，將濾液加冷開水至二百毫升，並加糖適量矯味。用量：上藥為一劑，分二次服用，一般僅用一劑，必要時用數劑亦可。

（二）控涎丹三味，共研細末，面糊或蜜煉為丸，如梧桐子大，曬干，每日服三次，每次一至二錢，初劑宜大量，以後漸減少，服藥可用姜湯送下。

附 注：1.服烏柏根湯後，約二小時稍吐，腹微痛，大瀉，瀉後患者往往疲乏入睡，如瀉不止，可給冷粥一至二碗服下即止。

2.服控涎丹後，亦有輕微腹痛及吐瀉。

療 效：（一）詹××，男，三十三歲。患癲癇病已十四天，亂走亂叫，打人。於1952年6月15日來院就醫，檢查：面潮紅，目赤脈洪，健康狀況尚佳。當時患者拒服藥，故先用控涎丹，繼投烏柏根湯一劑，分二次服，服後大瀉，延續一夜不止，後給冷粥一碗吃後即止。此後改服控涎丹，一天二次，每次二錢，共服七天，後幾天用量較少，服約五天已好轉，七天后神志恢復正常。經後來了解五年來未有復發；（二）路××，女，十九歲。於1959年6月16日，受病二十天就醫。據了解因過度傷心而發病。檢查：面紅

目赤，脉洪。投控涎丹，每天三次，每次一錢，服至七天神志稍清，十四天痊愈。經了解未見复发。

禁忌：服此药忌甘草，孕妇禁用。

来源：恭城县人民医院 楊济士

二 方

主治：神志失常，狂走乱罵，歌哭无常。并治癰病。

处方：枫木叶〔191〕一兩 地桃花叶〔35〕二兩 車前草一兩

用法：上药共捣烂，用二次洗米水冲服。

疗效：（一）黃××，男，二十六岁。患癲狂病，乱跑乱闖，乱說乱唱，以本方治之，服药后，人漸安靜，治疗三天，神志清醒而愈；（二）簡××，三十二岁。患癰病，突然昏倒，不省人事，刹时甦醒如平人，数日一发，或一日数发，久治不愈。后用本方治愈。至今未見复发。

来源：广西中医藥研究所 李才魁

三 方

主治：神經錯乱，妄言乱語，不避亲疏，甚或逾垣上屋，棄衣乱走，歌哭无常，随便打人。

处方：礞石五錢 黃芩三錢 大黃一兩 黃丹一錢 白矾二錢
郁金一錢五分 生赭石八錢 生竹茹三錢 百合三錢 硃砂三錢
（另包）

用法：用水二碗，煎取一碗，分二次冲硃砂服。

功用：消痰，开郁，清热宁神。

疗效：林××，女，三十五岁。神經錯乱，癲狂失心，狂乱无常。服本方一剂后，即能安臥，惟自觉倦甚口干。原方減大黃作三錢，再服二剂則痊愈。

来源：岑溪县糯垌中心医院 甘均权

編者按：此方系礞石滾痰丸合白金丸加減而成。治癲狂，由于頑痰

入心郁而成者，洵有奇功，然必善于运用方可。

四 方

主治：神志失常，凶狂多怒，乱語罵人，不避亲疏。

处方：磁石四錢 礞石二錢 川貝一錢五分 生地 茯神各三錢
硃砂二錢 海石三錢 甘草一錢 黃連一錢五分 胆草三錢 胆
星一錢五分 青黛二錢 生鐵五錢

用法：用适量水煎取三茶杯，一天分三次服完。

功用：清心宁神，清热祛痰。

疗效：徐××等三人，患此病，均以上方治愈。

来源：馬山县周六公社中心医院 罗建邦

五 方

主治：癲狂。

处方：黄土磁硃散：磁石四兩 硃砂一兩五錢 神曲一兩

用法：将磁石、硃砂、神曲共为細末 每次服五錢，一日二次，
用黄土菖蒲水送下。

附注：黄土菖蒲水，挖地深三尺，取黃泥三斤，用白矾一两，青
水五斤和黃泥混合攪勻，澄清，取水二碗和石菖蒲一两同
煎成一碗。服藥后，迷睡一点鐘方醒，醒后，病即退七、
八，繼續再服即愈。

疗效：陆××，女，二十八岁。患癲狂，以鉄鏈鎖住，請我診視，
先用灯心火灸百会穴三壮，湧泉穴三壮，男左女右，并服
本方而愈。黎××、李××患癲狂，亦用本方治愈。以上
三人，均不見复发。

禁忌：忌百日房事。

来源：貴县 黎馥廷

六 方

主治：癲狂奔走，神志不清，語无倫次，打人，面紅目赤。

处 方：清醒散方：党参二錢 川連二錢 茯神五錢 丹参五錢
麦冬一兩 枣仁四錢 玄参一兩 大黃一兩

用 法：以淨水二碗，煎取一碗，日分二次服。

疗 效：本院以此方治疗癲狂病患者有四人，均愈，茲举一例如下：

吳××，男，十六岁，宜山人。1958年11月11日拾来本院留医治疗。患者于11月10日发高热不思食，乱說乱走，东张西望，整天站着不睡，几人看扶，强力抵抗，小便黄，大便三天未解，有恶心呕吐，检查：高热神志不清，狂躁不合作，腋下体温 39°C ，脉搏一百二十次，呼吸二十四次，听診心音亢进，瞳孔反射正常。經西医治疗已六天，症状无变化，后轉中医治疗，用本方連服四剂后，神智清醒一些，着其伸舌能合作，已能自行到廁所大便，体温、脉搏、呼吸均恢复正常。又連續照上方服四剂后，患者睡眠好，食欲正常，神智清醒，經中医治疗十二天，患者一切恢复正常，痊愈步行出院。

来 源：柳州专区人民医院

治 癇 病 方

一 方

主 治：忽而昏迷，忽而清醒，如手中持物，忽而昏迷失手物墮，物墮立即清醒，漸致忽然昏迷扑地，扑地后立即清醒。

处 方：香附四錢 杭芍四錢 丹皮三錢 枳壳二錢 青皮二錢 佛手二錢 天竺黃三錢 建菖蒲八錢 玉金二錢 升麻五分 茄南香三分（研末冲服）

用 法：水二碗，煎成一碗，一日分二次冲茄南香末服。

功用：解郁，除痰。

疗效：李××，患癇病，經中、西醫治疗无效后，至上海××醫院診斷为僧帽瓣故障动作功能不勻，但无見效葯物。我診斷为因怒氣肝郁，用本方治疗，每日进一剂，七日而愈。1958年又治两例，一为邹××，一为郑××，均用本方治愈。

来源：桂林市中醫院 王德輔

編者按：此癇病初病症如上述，倘失治，則逐漸变为癇病重症，口角流涎，忽然昏倒，經一时或数十分鐘始醒。

二 方

主治：癇病，卒然昏倒，不省人事，口角流涎，过后复甦如平人。

处方：川芎二錢 猪牙皂角 郁金 明矾各一兩 蜈蚣黃脚赤脚各一條

用法：上葯共研細末，蒸餅和丸如梧桐子大，每次十五丸，空腹清茶送下。

功用：驅風活血，逐頑痰，鎮癇。

疗效：卢××，女，六十五岁。每月发癇四至五次，发时，卒倒无知，口角流涎，过后复甦如常人，已历十余年，用本方治疗，服葯三个月痊愈，半年未見发作。

来源：广西中醫院 党紹从

癲狂針灸療法

主治：癲狂，乱言乱語，时哭时笑。

取穴：期門 內关 中脘

手法：采用抑制法，留針一小时。

疗效：韦××，男，二十一岁。突然癲狂，譫語，越窗投水，时哭时笑，力大非常，須二、三人才能护理，經過注射鎮靜剂不能抑制。用上穴与針，初針时須四人压住四肢，才能

下針，手术中逐漸清醒，而感疲倦，出針后言語自如，无上述症狀。一次后，并未复發。

来源：融安县龙妙民办医院 陈秀洳

失 眠 类

治 失 眠 方

一 方

主治：精神疲倦，夜梦心惊，头晕腰痛，彻夜不眠，飲食减少。

处方：加味地黄湯：熟地八錢 淮山藥四錢 萸肉四錢 茯苓四錢
茯神四錢 丹皮三錢 远志二錢 枣仁三錢 柏子仁三錢
天麻三錢 細辛一錢五分

用法：用水三碗，煎取一碗半，一日分二次服。

功用：滋腎阴，益肝，宁心神。

疗效：1958年在来宾、靖西两县，用本方治疗失眠症，治愈多人。精神疲倦，夜梦遺精，或心煩扰乱，彻夜不眠，或头晕腰痛，食欲减少，投以本方，多則十剂，少則数剂，均获痊愈。

来源：广西中医专科学校 秦极仁

編者按：茯苓、茯神功用相同，如无茯神，即用茯苓，功效也是一样。

二 方

主治：失眠經久不愈，头晕，心悸，腰痛，胃痛，每晚失眠，非服安眠药不能入睡。

处方：加減妙香散：糖泡白皮参三錢 沙参三錢 炙北芪八錢
淮山五錢 桔梗三錢 茯苓二錢 茯神三錢 志肉一錢五分
木香一錢五分（后下） 沉香一錢五分（后下） 熟地五錢 萸肉

五錢 玉竹 蓮子各四錢 芡實一兩 酸棗仁八錢 煅龍骨八錢
硃砂五分(沖服) 炙草二錢

用法: 以水三碗，煎取一碗，一日分二次服。

功用: 健脾滋腎，定志寧心，益氣安神，解郁舒肝。

療效: 林××，女，三十歲。1958年患慢性肝炎，經常見頭暈，心悸，腰痛，胃痛，食欲不振，氣短疲乏，嚴重失眠，每晚非服安眠藥不能入睡。過去長期服用中西藥及物理療法，均不見效，1959年1月，到區幹部療養院治療後，肝炎症狀稍見好轉，但每晚仍失眠。面色蒼白，唇色不鮮，舌質淡白多津，脈緩滑。從病者所表現的脈症診斷，乃屬真元不足，脾腎虛損，以致心腎不交，造成嚴重失眠，經年不愈，擬用本方，以遠志、棗仁、龍骨、茯神、硃砂定志寧心，參、芪、桔梗益氣安神，山藥、茯苓、蓮子、炙草健運脾土，熟地、萸肉、芡實、玉竹滋養腎陰，木香、沉香舒郁平肝，使心、脾、腎三經各得所安，而收全面治療之效。於6月3日開始服藥，三劑後，晚間已能安睡，精神食欲均見好轉，續服五劑，白天午睡亦能安眠兩小時，而頭暈、心悸、腰痛、胃痛等症狀亦已消失，於6月12日痊癒出院。

來源: 廣西中醫藥研究所 王乃翰

失眠針灸療法

一 方

主治: 失眠、頭痛、多夢。

取穴: 上星 攢竹 上關 太陽 神門 內關 足三里

手法: 全用興奮法。

療效: 蔣××，男，二十四歲。患神經衰弱，頭痛，失眠，食欲不振等，經用上穴輪針五次即愈。

来源：融安县长安民族医院 黄繼然

二 方

主治：神經衰弱，失眠。

取穴：內关（雙）

手法：上穴針刺，用强刺激手法，留針15分鐘，連針三天，每日施术一次，均于夜間临睡前施行。

疗效：我院采用上法治疗三例失眠症，經观察一周，睡眠情况良好。

（一）李××，女，十七岁。头痛，失眠已月余，經采用本法治疗后，患者熟睡整夜，次晨呼之才醒；（二）譚××，患慢性胃炎，經常午夜不能入睡，經針刺上穴后，約半小时而能入睡；（三）李××，男，二十岁。患传染性肝炎住院，整夜不能入睡，經針刺上穴后，睡眠很好。

来源：柳州专区人民医院

虛 損 类

治 虛 損 方

主治：头部时感不舒，或昏悶，或胀痛，漸而記憶力減退，漸致夜間多夢或失眠，或遺精，或阳痿，經年累月，久治不愈。

处方：加味左归飲：熟地五錢 山藥三錢 萸肉三錢 白茯苓二錢 枸杞五錢 肉蓯蓉四錢 細辛五分 川芎七分 甘草七分

用法：水二碗，煎成一碗，一日分二次服。

附注：气血太虛加參、芪、归、芍，失眠严重加枣仁、远志，遺精頻加芡实、蓮鬚、龙骨、牡蠣等。服藥一周头部自覺輕松，繼服至二周，一切好轉，續服至四、五周，各症均愈。症由逐漸得来，病亦逐漸而去，須耐性連續长服。

功用：益腎，補虛。

療效：陽朔一患者，因腦力勞動過度，初起頭部有時感覺似暈非暈或昏悶不舒，進而不能連續久閱書報，日久繼以失眠，遺精。久治無效。後以本方隨症加減，續服月余，諸症悉愈。

來源：平桂礦務局職工醫院 容孟三

治手顫耳聾方

主治：腎虧，手顫，耳聾。

處方：絲餅三錢 川杜仲三錢 續斷二錢 杞子三錢 狗脊三錢
北黃芪三錢 白朮三錢 熟地三錢 巴戟三錢 黨參三錢
炙草一錢五分

用法：淨水兩碗，煎取一碗，一日分二次溫服。

功用：補腎，益陰，強筋骨。

療效：本方為治腎虧之效方，老年腎虧者效尤顯著。1957年，盧××，七十一歲，腎虧手顫耳聾，服本方兩劑而愈。

來源：南寧市 黃道存

頭痛眩暈類

治偏頭痛方

一 方

主治：偏頭痛。

處方：天麻五錢 白芷四錢 川芎三錢 地龍三錢 祈蛇三錢

用法：用水一碗半，煎取大半碗，分二次服。

功用：祛風清熱止痛。

療效：張××，男，四十歲。患偏頭痛，僅服此藥一劑即愈。

來源：崇左縣銀團公社醫院 張玄強

二 方

主 治：偏头痛。

处 方：石决明二两 白菊花五钱 紫貝五钱 北細辛三分 紫石英六钱 白蒺藜三钱 茺蔚子二钱 嫩勾藤三钱 制首烏六钱 归身三钱 川芎一钱 杭菊六钱

用 法：用水三碗，煎取一碗半，分两次服。

功 用：清热，平肝，熄风，止痛。

疗 效：卢××，患偏头痛已十五年，服此方即愈。

来 源：崇左县銀团公社医院 张玄强

治 头 晕 痛 方

一 方

主 治：头晕，或胀，或痛。

处 方：假辣椒〔63〕根（即罗芙木根）二至三两

用 法：煎水作茶饮。

疗 效：本人于1958年7月間，患高血压头晕，汗出，經医院检查服西药无效，后服此药六天痊愈。黄××，患头晕胀痛二年，屡医无效，后經用此药治疗三天痊愈。

来 源：南宁市 黄煥輝

二 方

主 治：肝阳上升，两颧潮紅，午后头痛，眩暈，腰痠腿倦，小便或清或黄，脉洪大有力。

处 方：（一）白芍四钱 玄参五钱 牛膝一钱五分 川杜仲二钱 龟板四钱 鳖甲四钱 大黄一钱五分 青蒿四钱 石决明二钱 代赭石八钱

（二）当归二钱 黄芩三钱 枳实一钱五分 牛膝二钱 川杜仲

三錢 桑寄生三錢 勾藤 菊花各二錢 甘草一錢五分

用法：用適量水煎取一大茶杯，每晚臨臥一次溫服下。如服第一方後大便溏者，大黃可減一半，兩方互相間服，半月可愈。

功用：滋陰潛陽。

療效：林××，男，三十四歲。久病失精，兩顴潮紅，午後頭痛，眩暈，腰腿痠，精神疲倦，小便略黃等，經用上兩方間服，半月後而愈。

來源：馬山縣永州公社 黃子康

三 方

主治：婦女經期頭暈痛。

處方：歸身五錢 熟地四錢 白芍三錢 川芎三錢 天麻三錢 菊花二錢 蟲蛻一錢 荊芥五分 京子三錢

用法：用水二碗，煎取一碗，飯後一次服。

療效：本人曾用本方治療婦女患者十餘人，均服數劑而愈。

來源：廣西中醫專科學校 黃鴻琛

治 頭 暈 目 眩 方

一 方

主治：頭暈目眩，動則更甚。

處方：鹿角膠一兩 北芪八錢 沒藥三錢 萸肉四錢 熟地六錢 山藥六錢 白芍四錢

用法：上六味，用水三碗煮取一碗，鹿角膠另蒸溶和藥調勻，一日分二次服。

療效：江××，女，五十九歲。多年頭暈目眩，動則更甚，久治未愈，且有腹痛，白帶，苦悶異常。服本方一星期痊癒。

來源：廣西中醫院

二 方

主 治：飲水過多，胸滿嘔吐清水，頭暈目眩。

處 方：半夏四錢 生姜一兩 茯苓五錢 白朮一兩 澤瀉一兩

用 法：水二碗半，煎減半，一日分三次溫服。

功 用：利水，鎮嘔，療眩暈。

療 效：貴縣周××愛人，四十六歲。腕悶不思食，胸隔痞滿，嘔吐水液，頭暈目眩，不渴，小便短，診得脈搏濡緩，舌苔白膩。病起因于酷暑工作，喝水過多所致，以本方治療，一劑而愈。本方乃金匱要略小半夏加茯苓湯、澤瀉湯合劑，運用治療水飲之頭目眩暈，效果卓著。

來 源：廣西中醫專科學校 林沛湘

編者按：本方治胃中蓄水眩暈確效。

三 方

主 治：猝然病發，頭暈目眩或耳鳴，不能起床行動，動則劇烈嘔吐。

處 方：法夏三錢 陳皮二錢 天麻三錢 川芎一錢五分 茯苓五錢
南星一錢五分

用 法：水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

功 用：祛痰，熄風，療風眩。

療 效：一患者，女，四十歲。一日猝患頭眩暈，眩暈甚則嘔吐，到區人民醫院治療，患者自覺四周景物旋轉，臥床不能起動，起動則眩暈嘔吐更劇，舌苔白而淡薄，脈弱無力。以本方治療，次日復診病去七、八，已自能行動，再劑痊愈。我遇此病，均用本方治療，奏效甚速，但身體衰弱，病發緩慢者，本方功效不顯著。

來 源：廣西中醫專科學校 韋來庠

中 风 中 痰 类

治 中 风 瘫 痪 方

主 治：中风昏迷，手足冰冷，四肢麻痹，不能举动。

处 方：麻黄 附子 肉桂 炮姜 党参 黄芪 白朮 川木瓜
各三錢 細辛 独活 姜活 秦艽 川烏 川杜仲 牛膝
防风各二錢 当归五錢 甘草一錢五分

用 法：用适量水煎取一碗，分二次服。

功 用：溫經活血，通絡疏风。

疗 效：韦××、蓝××、莫××等同患此病，均以上方治疗痊愈。

禁 忌：孕妇忌服，由高血压而致的中风症不宜用。

来 源：馬山县友誼公社 莫元祥

舌 瘡 針 灸 疗 法

主 治：舌瘡不能語。

取 穴：哑門 廉泉

手 法：留針五分鐘。

疗 效：譚××，男，五十二岁。于1959年12月19日，突然头朝下垂，当时面色蒼白，呕吐，言語含糊，比手划脚，想說話說不出，但无昏迷症狀。次日入院留医，經服葯两日，舌本仍轉运失灵，語言不清，即針哑門、廉泉二穴，留針五分鐘，出針后，即能說話，次日自訴仍有頭痛，复針上星、百会、头維、列缺两次(每日一次)，痊愈出院。

来 源：柳州市人民医院 郭仁稀

呃 逆 类

治 呃 逆 方

主 治：呃逆不止，困苦难堪。

处 方：芥菜子五分 杵头米糠三钱

用 法：共研为细末，开水调服。

疗 效：林××患胃病，发热，口渴，腹胀满，呃逆不止，多方医治无效。后给本方与服，一天病即消失。

来 源：田东县和平公社医院

噎 膈 类

治 噎 膈 方

主 治：初起吞食如有物梗食道，渐渐吞咽困难，以致不下，只能饮米汤茶水及流质食物，因而营养缺乏，日渐消瘦，甚至唇红舌降无苔，大便十余日一次。

处 方：慈菇（以野生者为佳）半斤 蟹骨一两（煨研末） 蜂蜜四两

用 法：慈菇洗净切片，用净水两碗煎取一碗，去慈菇，纳蟹骨末及白蜜搅匀，再煎数沸取起，每次服两汤匙，日服三至五次，服完后如法再制，约服十余剂，吞咽如感觉自如，再服十余剂可痊愈。

疗 效：二十多年来，曾用本方治愈十余人。

来 源：广西中医专科学校 曾宜敬

反 胃 类

治 反 胃 方

一 方

主 治: 朝食暮吐，暮食朝吐，或食后一两小时后而吐，宿谷不化。

处 方: 川椒一斤(炒出汗爲度) 生姜半斤 老猪婆肚子一个

用 法: 第一次将川椒、生姜納入猪肚縫合，用文武火慢慢将猪肚燉烂，取出川椒晒干备用，服食生姜、猪肚及湯。第二次再用一个猪婆肚子，把前次晒干的川椒和新加生姜納入猪肚內，燉烂，仍把川椒取出晒干备用，照前服食姜、猪肚及湯，以后每天将燉过晒干备用的川椒早晚各服三錢。

疗 效: 本方經两代使用，多获奇效。

来 源: 广西中医专科学校 秦极仁

二 方

主 治: 反胃，朝食暮吐。

处 方: 黄芪三錢 白朮三錢 西党三錢 茯苓三錢 附子三錢 干姜二錢 肉桂一錢五分 砂仁三錢 法夏二錢五分 故紙三錢 益智三錢 甘草一錢五分

用 法: 清水三碗，煎取一碗半为头煎，渣再加水二碗，煎取一碗为二煎，头二煎药液混合，浓缩成一碗，一日分二次服。

功 用: 温胃滋养。

疗 效: 曾用本方治愈謝××

来 源: 广西师范学院 謝紹棠

三 方

主治：體質素虛，食少（每餐只食一、二匙羹稀粥）復吐，朝食暮吐，暮食朝吐，吐后呃逆不止，大便閉結。

處方：（一）干姜 甘草 代赭石各二錢 黨參 半夏各三錢 丁香一錢
（二）復花三錢 半夏 黨參各四錢 生姜 大棗各一錢 甘草
代赭石各二錢

用法：各方均用適量水煎取半碗，分二次服，先服第一方，后隔三小時繼服第二方。

功用：溫中，降逆，止吐。

療效：韋××，男，成年。體質弱，食少便結，朝食暮吐，吐后呃逆不止，用上方分別先后與服，連服五劑而愈。

禁忌：勿食生冷東西。

來源：馬山縣永州公社 洗鴻儒

吐 瀉 類

治 吐 瀉 方

一 方

主治：上吐下瀉，身略發熱，病系初發的。

處方：水瓜〔64〕（干）二錢

用法：將水瓜切碎，用水約十二兩，煎液至六兩，分二次服，隔二小時服一次。

療效：曾用本方治療多例，均獲愈。

來源：馬山縣人民醫院 黃日煊

二 方

主 治：上吐，下泻，腹痛，抽筋。

处 方：龙骨浆叶〔65〕（又名火浆头、羊拜换） 生蒜头各适量

用 法：龙骨浆叶炒焦黑研末，加入生蒜头（去衣）至能杵成丸为度，作丸如黄豆大，成人每次三粒，二十分鍾服一次，白矾炒煎水送服，泻未止，用老姜数片炒黑煎水送服即愈。

疗 效：鍾××妻。食晚飯时尙安好无事，两小时后，忽然疴呕，肚痛，抽筋，邀我診治，給丸药三粒服下即愈。

来 源：馬山县周六公社周六制药厂 鍾 陆

三 方

主 治：吐泻腹痛。

处 方：五月艾（生者用二兩炒） 樟木二层皮〔60〕二錢（炒） 砂仁二分
陈皮一錢五分 番捻叶〔66〕三張（炒） 槿粟〔67〕二兩（炒） 高
粱麦二兩（炒）

用 法：用适量水煎取一碗半，分两次服。

功 用：温中，鎮痛，健胃，止泻。

疗 效：本方曾治愈二百余人，效率很高。

来 源：岑溪县东方紅公社中心医院 陈道英

四 方

主 治：上吐下泻，肚痛抽筋，属受湿而起者（急性腸胃炎）。

处 方：淮木通三錢 川木瓜二錢五分 薏仁五錢 藿香叶二錢
漂蒼朮一錢五分 北柴胡三錢 閩泽泻二錢 川姜活一錢五分
普洱茶三錢 生葱头三根（連須） 建神曲二錢

用 法：水煎微温服，日三次至四次以知为度。亦可研末备用，每服三錢，一日三次，开水送服。

功 用：利湿，醒脾，健胃，止吐泻。

疗效：曾用本方治湿性吐泻者多例，均获良效。

来源：南宁市 张 本

五 方

主治：忽然上吐下泻，腹痛，甚则四肢厥冷，脉伏，目眶陷，两腿转筋，口渴、小便黄赤，身或微热，头目昏胀。

处方：藿香三钱 川姜活三钱 苍朮三钱 柴胡二钱 淮本通三钱
泽泻三钱 神曲二钱 细茶叶三钱 葱头二根

用法：清水四碗煎取二碗，分二次服，每隔二小时服一次，严重者一日连服两剂。

附注：本方疗效很高，若随症加減运用，奏效更大，如感冒暑邪，头目昏胀加香薷、扁豆；伤生冷食物腹痛甚，加砂仁、木香；吐不止，舌白灰暗寒多加草果；热多舌黄加川连、竹茹，俱用姜汁炒；抽筋加川木瓜；脾胃弱，体素虚，泄下不止，加淮山、土炒白朮、党参等；吐不止，服汤药不下，用伏龙肝研粉煎汤澄清后再煎药。

功用：健运，止吐泻。

疗效：梁氏，女，五十四岁，邕宁人。忽然上吐下泻，腹绞痛，一小时内吐泻数次，症甚危急，用本方一剂即见效。本方曾治多例，效果很好。

来源：广西中医专科学校 邓培梓 梁永礼

编者按：本方载驗方新編，謂出四川呂祖庙內碑刻神方，治霍乱（中医书所载和通俗所說的吐泻腹痛急性腸胃炎症的霍乱，非系弧菌传染病的霍乱）。

治 呕 吐 腹 痛 方

一 方

主治：呕吐腹痛，打呃反酸，吃什么呕什么（十二指肠梗阻）。

处 方：瓜蒌四錢 半夏三錢 黃連二錢 黃芩二錢 陳皮三錢 川朴三錢 枳實二錢 川軍二錢 芒硝二錢（后下）

用 法：水二碗，煮一碗，一日分二次服。

功 用：降逆清火止嘔，調氣潤腸通便。

疗 效：王××，男，二十七岁。腹痛嘔吐已二十余日，食后不适，打呃反酸，夜間十二时左右有疼痛，大便三日一次，后病情增剧，腹痛嘔吐厉害，吃什么吐什么。1959年2月25日入院。腹痛为持續性、陣发性加剧，嘔吐不能进食，全身发麻；有失水現象，腹平坦柔軟，劍突下有压痛。由中医治疗，服平胃散无效。轉西医內科治疗时，嘔吐腹痛厉害，失水日益加重，严重衰弱状态，嘔吐頻繁，內科診斷慢性胃炎急性发作，合并失水及鹹中毒，腸梗阻。內科輸血四百毫升及服藥未效，轉外科。X綫鋇餐檢：鋇餐經過半日之后，仍不通过十二脂腸。診斷：（一）十二脂腸下部梗阻；（二）粘膜肥厚性胃炎。治疗：十二指腸管放入胃，将久留胃內容物洗出，內服中藥本方，三剂見好，六剂痊愈。

来 源：柳州鐵路中心医院外科

二 方

主 治：嘔吐流涎，食少，胃痛。

处 方：防党四錢 白朮三錢 茯苓三錢 炙草一錢 丁香二錢 柿蒂四錢 吳茱萸三錢 大棗二只 生姜二錢 半夏二錢 川椒二錢

用 法：水三碗煮取一碗半，一日分二次服。

功 用：溫补脾胃，降逆止嘔。

疗 效：周××，女，五十五岁。头晕、胃痛，口淡，嘔吐流涎，胃納不佳，只能食粥半碗，在市医院治疗月余未愈。來門診求治，患者两手脉迟弱，舌潤淡白，面色青黃帶浮而不

肿。以本方治疗，一服头晕减轻，流涎减少，胃纳较好，连服四剂之后，头晕流涎已止，胃痛呕吐消失，食量大增，病愈。

来源：广西中医院 陈紹琮

腹 泻 类

治 腹 泻 方

一 方

主治：腹泻。

处方：洗手果（又名木患子、无患果，通常拿来洗衣服的）
分量不拘多少

用法：将洗手果取壳，火煨至油尽成为无烟红炭时，取出放碗或盆内密盖，使火熄灭成为焦炭，研为细末贮瓶内备用。用时开水冲服。

疗效：（一）大平镇南街黎××，某夜，突患吐泻，一小时内连泻六次，眼眶登即深陷，脸面瘦削，声调降低，气力虚弱，曾服十滴水、保和丸无效，服藿香正气散（改用煎法）吐止，但泻不止，后用洗手果炭三只份量与之一服泻即止。（二）中山街雷××，女，一岁多，患麻疹后泻水，日十余次，本院中西药均曾用过，治疗四天无效，乃用此药末五、六分，分作二包与之，才服一包已痊愈。

附注：1.第一例患者少吃青菜，用药后一星期无大便，我告以红薯叶作菜食，仅二餐（每餐约吃半斤），后大便如常。

2.此药并可治痢疾，几年来用此方治疗腹泻约数百人。

来源：崇左县银团公社医院 周文扬

编者按：此药的收敛性很强，多食可引起大便燥结。

二 方

主 治：腹瀉。

处 方：大蒜头一只

用 法：将大蒜头煨熟吃下。

疗 效：謝××，男，三十余岁。日泻十余次，曾用泻痢丹无效，后只食煨蒜头二枚，泻止。

来 源：崇左县银团公社医院 周文揚

三 方

主 治：湿热泄泻，大便水样黄色，日泻数次或十数次，发热腹痛，口渴，小便短黄。

处 方：青蒿三钱 車前草三钱

用 法：以淨水二碗，煎取一碗，分二次服。

疗 效：古蓬街莫××，男，六十岁。患腹瀉，日泻六、七次，大便水样，黄色，腹痛，身感微热，口微渴，用本方治疗，一剂病愈。曾用本方先后治疗腹瀉属于湿热者一百多例，均愈。

禁 忌：属于虚寒泄泻者忌用。

来 源：忻城县古蓬民办医院 白玉榮

四 方

主 治：腹瀉頻作，腹有微痛，舌微黄，泻下黄或如蛋花样稀便。

处 方：貫众一兩 川連三錢 黃芩四錢 金錢草〔68〕一兩 蚕沙五錢
鬼画符〔69〕一兩 茜根一兩 白芍四兩 甘草三錢

用 法：共研末，每服五錢，用开水冲服。

功 用：清腸热，疗热泻。

疗 效：本方曾治数十人，均效。

来 源：广西中医专科学校 梁 申

五 方

主 治：热郁，腹胀痛，泄泻。

处 方：鬼画符〔69〕一斤半 番桃木蕊〔20〕一斤 三月坡〔38〕（即三月泡）一斤半 涩藤叶〔70〕一斤半 牛脚木叶（即檸檬叶）半斤

用 法：用适量水煎取一千毫升，成人量每日四十毫升，早晚分二次服。

附 注：經临床实践，按上方使用，愈后百分之九十都有腹胀后遺症，后減去三月坡，加入坡油麻（即山芝麻）根十二两、火炭藤十二两，剂型由浓煎改为蒸煎，就可消除后遺症，疗效更著。

疗 效：曾于临床治愈五百多例，疗效很高。如广西医学院陆××，腹痛，腸鳴，呕吐，下痢稀水，服两次而愈。

来 源：陆川县人民医院 沈柏台

編者按：后遺症是因为收斂的藥多，而消炎清热、利尿的藥少，故有弊，所以加了較为消炎的山芝麻、火炭藤就能解腹胀，若加上利尿的竹壳菜更妙。

六 方

主 治：口淡，舌苔灰白，唇白，大便泄泻，稀白色不甚臭。

处 方：党参五錢 白朮三錢 干姜一錢五分 炙草一錢五分 熟附二錢 肉桂心五分 肉豆蔻二錢（去油） 丁香一錢 石榴皮一錢五分

用 法：水二碗，煎取一碗，分三次服，每隔三小时服一次，小儿可酌減藥量。

功 用：补虛，散寒，溫中，止痢。

疗 效：本方曾治愈二十多例，其中小儿黎××、陈××病势极为沉重，亦用本方救活。

来 源：广西中医专科学校 王鴻琛

胃 腸 痛 類

治 胃 痛 方

一 方

主 治：上腹部脹滿疼痛，或惡心、嘔吐，或嘈雜、吞酸，或大便黑色（消化性潰瘍胃酸過多）。

處 方：石決明（煨） 牡蠣（煨）各等分

用 法：上二味共研細末，每服一至二錢，日服三次，飯前服。

功 用：療瘍，止痛。

療 效：梁××，四十五歲。經常上腹部有不舒感，不以為意，病漸日增，上腹脹滿疼痛，嘈雜，吞酸，噯氣，每于食後一至二小時發作，大便黑色，疲倦乏力，舌苔白潤，脈象無異常。用本方治療十餘日，症狀完全消失，大便轉黃色。

來 源：廣西中醫專科學校 韋來庠

二 方

主 治：心窩部劇痛。

處 方：金鈴子三錢 延胡二錢

用 法：用水一碗，煮取半碗，頓服。

功 用：利氣，活血，止痛。

療 效：于臨床凡遇正心窩部疼痛，投以本方，無不奏效，如疼痛非心窩部，而為上腹部脹痛者，本方無效，茲舉例如下：
韋××，男，二十五歲。心窩部疼痛，已六、七日，經延醫治療無效，求治于予，患者正心窩部疼痛，并向兩側胸部及背部放散，狀甚困苦，舌苔微黃，脈略帶數，服本方一劑而愈。

来源：广西中医专科学校 韦来庠

三 方

主治：心胃气痛，并治热痢（急、慢性肠炎）。

处方：古羊藤根〔71〕

用法：晒干研末，每服一至四钱，开水送下，日服二次。

疗效：劳××，因食冻物引起胃肠剧痛，汗出肢冷，呕吐，痛苦异常，经服中药及针灸治疗，均不见效。抬至区中医院救治，给以古羊藤粉四钱服食，呕止痛定。

来源：广西中医药研究所 李才魁

四 方

主治：心腹诸痛，痛无定时，属寒性者。

处方：白盐久醃良姜（越久越好，二、三十年更好）五钱

用法：洗去盐，搥烂，以开水冲服，日服二剂。

功用：暖胃消食，祛寒止痛。

疗效：邓××，男，二十九岁。患心腹痛，经治数年未愈，后服此方，五日痊愈，至今数年，未见复发。

来源：岑溪县大跃进公社 邓进祥

五 方

主治：胃痛，恶心，呕吐带黄色苦味粘液（胃炎）。

处方：括囊实二钱 薤白三钱 半夏三钱 白朮三钱 茯苓五钱 枳实一钱五分 陈皮一钱五分 川朴一钱五分

用法：水二碗，煎成一碗，一日分二次服。

功用：祛痰，镇呕，行气，止痛。

疗效：蒋××，男，四十五岁。上腹部胀满不舒，食欲不振，恶心呕吐，吐出物为带黄色的稀粘液，量多味苦，虽早晨未经饮食，亦属如此，病已五天，舌苔白润，脉数。经用西药

治疗无效，用本方治疗，一剂病去六、七，再連服二剂全愈。于临床遇上述症状，使用本方效果很好，胃酸过多用之亦效。

来源：广西中医专科学校 韦来庠

六 方

主治：胃脘部痛，时发时止，年久未愈，每发时痛很厉害。

处方：加減甘露飲：即甘露飲去熟地加丹参八錢 砂仁二錢

用法：用水二碗半，煎減半，一日分二次服。

附注：甘露飲原方：生地、熟地、茵陈、黄芩、枳壳、杷叶、石斛、麦冬、天冬、甘草各等分。

功用：去瘀，活血，益胃阴，疗腹痛。

疗效：南宁津头村一患者，自述胃痛十年，曾經各医院医治无效，用本方治疗，一剂痛去大半，复診前方加三稜、莪朮各三錢而痊愈。

来源：广西中医专科学校 林鳴皋

七 方

主治：胃痛，食欲不振，睡眠不安，年久不愈。

处方：炙甘草二錢五分 炙北芪一兩 防党参五錢 柏子仁三錢 茯苓三錢 茯神五錢 川芎一錢五分 归身三錢 半夏麴四錢 远志一錢五分 肉桂心五分 北五味一錢 酸枣仁五錢（炒） 生姜三片 大枣二枚（去核）

用法：用水四碗，煮取碗半，一日分二次承液燉肉桂，冲硃砂少許服。

功用：补气血，宁心神，疗虛性疮瘍。

疗效：农××，男，三十二岁。患胃痛病已十余年，近并发肺癆，在区干部疗养院治疗，入院以来，經常胃痛，不能进食，晚上不能入睡，每晚都要經過針灸治疗，才能把胃痛

暫時鎮靜下來，並要經常服安眠藥，後經用大劑養心湯（即本方），七天胃痛即已停止，隨着食欲也轉好，體重增加，面色紅潤。

來源：廣西中醫藥研究所 王乃翰

八 方

主治：神經性胃痛，慢性胃潰瘍，胃酸過多。

處方：香附五錢 查炭四錢 吳萸二錢 丹參四錢 春砂仁三錢 延胡索四錢 金鈴子五錢 海螵蛸五錢 青皮三錢 烏藥四錢

用法：用水三碗，煮取一碗半，一日分二次服。

功用：平肝和胃，行氣鎮痛。

療效：黃××，男，三十二歲。胃病已五年，發作於飯後二小時，脘腹部疼痛，全身不適，嘔吐酸水。胃曾大量出血，吐血，經某醫院留醫十天，出血症狀已止，但胃痛及嘔吐未好，繼續治療，病仍如故。1960年2月6日來診，診斷胃酸過多，連服本方四劑，稍好轉。2月10日復診，脘痛、腰脹、嘔吐減輕，原方加川椒三錢，連服二劑，症狀消失。

來源：柳州市聯合診所 陳頌桓

九 方

主治：腹疼痛，大便呈黑色，久而不愈（胃潰瘍）。

處方：廣三七四錢 乳香六錢 沒藥六錢 白芨二錢 棕櫚子〔72〕四錢（炒焦）

用法：上藥共研細末，每服一錢，日服三次，空腹時服。

功用：散瘀，活血，止血，生肌，調氣，定痛。

療效：本方乃唐老中醫介紹驗方，經本人試用有效。

來源：南寧市 李正山

十 方

主治：腸鳴，腹痛，以手按之則痛減。

處方：麥冬二錢 半夏四錢 丹參三錢 粳米三錢 甘草二錢 大棗
四枚

用法：水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

功用：補中，益胃津，療腹痛。

療效：本校學生黃××，腹痛一年多，每以手按之則痛減，經服很多中西藥無效，投以本方一劑而痊愈。

來源：廣西中醫專科學校 林鳴皋

編者按：本方即金匱要略麥門冬湯，以丹參易人參。

十一 方

主治：胃脘痛，噯氣泛酸，或吐水，食欲不振，或大便秘結（消化性潰瘍）。

處方：黨參四錢 白朮三錢 茯苓五錢 甘草三錢 白芍三錢 白芨
三錢 烏賊骨三錢

用法：水三碗，煎成一碗半，一日分二次服。

附注：泛酸多加川連、吳干、益智仁各一錢。痛劇加木香、甘松各一錢，嘔血或大便有隱血加仙鶴草三錢，乳香、白柿霜各二錢。大便秘結加瓜蒌仁二錢，蜜糖五錢。

功用：補養脾胃，止痛，止血，療瘍。

療效：黃××，男，二十七歲。胃脘痛已數年，噯氣，泛酸，吐水，食欲不振，大便常秘結，面色蒼白，以本方治療而愈。

來源：南寧專區人民醫院 何耀民

十二 方

主治：胃痛，吐酸。

處方：白朮二兩 白朮五錢 干姜三錢 甘草五錢 雞內金一兩 牡

蠣(煨)一兩 瓦楞子一兩 麦芽一兩 厚朴八錢 砂仁五錢
赭石一兩

用法: 研細末水調为丸, 每服一至三錢, 日二次。

功用: 溫中健胃, 下气散結, 疗腹痛胃潰瘍。

疗效: 本方屢經試驗, 疗效很好, 一般治疗多在半月至二月痊愈, 輕者旬日即愈。

来源: 桂林市中医院 黎克忠

十三方

主治: 心胃痛牵引胸胁刺痛, 內有实热脉数有力者。

处方: 枝子五錢 錦車三錢 滑石七錢 金鈴子三錢 枳實四錢
广木香七分

用法: 用水二碗, 煎取一碗, 分二次服。

功用: 清热导滯, 止痛。

疗效: 蔣家老妇, 年六十八岁。患胃刺痛, 日夜叫哭, 曾延医, 治疗无效, 后服本方一剂痛減, 三剂痊愈。

来源: 岑溪县糯垌太阳公社 林开基

十四方

主治: 一切胃痛。

处方: 胃痛散: 人中黃二錢 瓦楞子二錢 海蛸二錢 川朴二錢
海石二錢 川棟子二錢 細辛二錢 樟木茹四錢 苏打粉三錢
广木香二錢 新砂仁三錢 麝香三分 台烏三錢

用法: 共为細末, 日服三次, 每次二錢, 开水送下。

疗效: 林××, 胃部絞痛, 痛苦不堪, 經用此散服用数次痊愈。

刘××患有多年胃痛病, 均服此散而获痊愈。

来源: 田东县和平公社医院

十五方

主治：食后胃即痛。

处方：牡蛎五钱 炙草三钱

用法：将上药末散，冲开水分二次服，煲水服亦可。

疗效：关××，患胃病数月，食饭后胃即痛，绵绵不休，一服病减，二服即愈。以后又治小几十多人，疗效很高。

来源：岑溪县东方红中心医院 黄传国

十六方

主治：胃痛病（胃溃疡）。

处方：当归四钱 白芍四钱 云苓三钱 白朮三钱 砂仁三钱 广木香三钱 麦芽三钱 枳壳三钱 陈皮三钱 半夏三钱半 木通二钱 文旦三钱 甘草一钱

用法：用适量水煎，不拘时服。

功用：健脾祛痰，行气止痛。

疗效：冯××等，均患胃病（溃疡）多年未愈，服本方数剂，乃告痊愈。

来源：崇左县银团公社医院 张玄强

十七方

主治：胃气疼痛。

处方：苍朮二钱 川朴一钱五分 陈皮一钱 甘草一钱 神曲一钱五分 麦芽一钱五分 山楂一钱五分 广木香一钱五分 砂仁一钱 姜枣为引

用法：用水二碗，煎取一碗，分两次一日服。

功用：健胃消滞，行气止痛。

疗效：用本方治愈二十多人，一般服二剂而愈。

来源：鹿寨县四排公社医院 韦树漠

十八方

主治：虛寒胃痛，腹痛少食，肌瘦或嘔吐。

處方：川椒 吳萸 草薢 半夏各三錢 良姜五錢 木香 砂仁
沉香各三錢（研細末分二次中服）

用法：將藥打碎，用水二碗煎取一碗，渣再加水二碗，煎取一碗，
將兩次煎液混合濃縮至一碗，分二次服完，隔四小時服一次。

功用：溫中，行氣，止痛。

療效：張××夫婦、黃××等人患胃痛，都在各醫院治療不愈，
用此方服至十三劑而愈。

禁忌：在服藥期間，忌食糖類、紅薯、甘蔗、竹筍、木耳。

來源：馬山縣人民醫院 黃日煊

十九方

主治：胃痛（胃潰瘍）。

處方：香附二錢 墨魚骨四錢 貝母二錢 乳香一錢五分 牡蠣二錢
元胡一錢五分

用法：末粉一日分三次，開水沖服。

功用：行氣，疏郁，止痛。

療效：黃××，男，二十歲，糯垌大竹人。患胃痛十多年，每見
大便黑色，經多次醫治無效。1959年10月服此方二十天后
痊癒。

來源：岑溪縣糯垌太陽公社 張九華

二十方

主治：心胃氣痛，溫熱胃痛，胃痙攣痛。

處方：紅叩半片 樟木〔60〕仁一片 龍胆皮〔73〕三片 香附四兩

用法：先將龍胆皮熬成膏，再將各藥共為細末，放入藥膏內，和

均为丸如蓮子大，晒干备用。成人每次服四至八丸，小儿每服二至四丸，每日三次，每隔四小时服一次，开水送下。

功用：行气止痛。

疗效：邓××，胃部剧痛，反复床中，服此药丸后二小时即愈。各大队保健站，拿去作治疗胃痛用，亦很有效。

来源：馬山县周六公社制药厂

治心胃气痛方

一 方

主治：心胸及心下疼痛不可忍。

处方：生薤头半斤

用法：生薤头榨取汁和酒二、三两服，如不能饮酒，和冷开水服亦可。

功用：散结，镇痛，疗胸痹。

疗效：曾治疗数人，效果均好。一妇女心胸及心下痛甚，嘱其先服薤汁后再处方，但服薤汁后痛已消失，无需处方而愈。

来源：广西中医专科学校 叶缦卿

二 方

主治：心气疼痛，如刀割，痛多在胸尖凹处，无噎气吞酸者。

处方：樟木树(60)白皮三两

用法：用适量水煎取一碗，分二次服，隔三小时服一次，小儿酌减。

功用：行气散寒，止痛。

疗效：黄××，患此病，用本方治疗，只服一次至二次，均获痊愈。本方治愈此种病例已有二十余人。

禁忌：忌食猪母肉、公鸡肉、鲤鱼一百二十天，否则有再发之可能。

来 源：馬山县人民医院 黃日煊

三 方

主 治：男妇老少心气腹痛。

处 方：加味手拈散：玄胡四錢 香附三錢 灵脂二錢 赤芍三錢 三稜三錢 菖蒲三錢 良姜二錢 沒藥二錢 川朴三錢 木香一錢五分 枳壳二錢

用 法：用水二碗煎取一碗，一日分二次服。

疗 效：梁××，气痛，黃××，女，心痛，楊××，心气痛，均用此方治愈。

来 源：貴县庆丰乡 何鶴云

治 腹 胀 方

主 治：大小便不通，腹胀，或中毒性消化不良，肚疴止后的腹胀。

处 方：麝香三分 梅片五分 葱头八只

用 法：先将麝香梅片置肚脐內，再把葱头槌溶（若有田螺肉同葱头槌更妙）敷上，用艾絨一团如脚拇趾大，放葱头上面，用火炙，觉痛即除去艾火，候冷再炙，如此炙四至五次，大小便即通，轉矢气腹胀亦消。

疗 效：本方曾治愈数例。

来 源：平南县人民医院 梁兴岐

治 蛔 虫 腹 痛 方

主 治：蛔虫腹痛。

处 方：四季石榴根〔74〕二层皮一兩 苦楝根〔75〕二层皮（要結子白皮的，不結子紅皮的不可用）一兩 川椒三錢 大黃五錢 使君子肉五錢 烏梅五錢

用 法：上药焙干共为細末，炼蜜为丸，每丸重五分，每次服六丸，日服三次，用溫开水送服。

疗 效：本方用以治疗蛔虫腹痛者四十八人，均愈。如龙富大队陈××，女，四十八岁。1959年9月，患腹痛四十多天，已二十多天不思进食，腹部左侧脐旁，有硬物大如拳，拒按，大便秘结，腹时阵痛，自诉过去大便常发现蛔虫，经西医治疗无效，给本方治疗十二天痊愈。

来 源：象州县象州人民医院 卢德生

胃 痛 针 灸 疗 法

主 治：胃痛（慢性胃炎）。

取 穴：足三里 建里 上脘 内关

手 法：中刺激，留针十至十五分钟，如剧痛时，加针内庭穴，重刺激。

疗 效：经用上穴治愈二十余例，疗效很高，举一例如下：

罗××，男，三十五岁。患慢性胃痛多年，每逢急性发作时，注射二安瓿阿托品方能止痛，前次急性发作时经用上穴针治一次即愈，四月来未见复发。

来 源：融安县龙妙民办医院 陈秀渊

腹 肌 挛 痛 针 灸 疗 法

主 治：腹肌痉挛疼痛。

取 穴：阿是穴 足三里 风市

手 法：强刺激留针十分钟。

疗 效：罗××，男，十七岁。突然右肋下肌肉痉挛疼痛，即送卫生所急诊。经用上穴，针右侧单穴，针十分钟，去针即愈。

来 源：融安县大良民办医院 袁超辉

腹痛按摩療法

- 主治：**腹痛不論寒熱虛實有效，虫痛无效。
- 取穴：**灵台（胸椎第六椎下）至阳（胸椎第七椎下）
- 手法：**用两手拇指尖挤压二穴，指头不移动按摩旋轉旋动，由輕到重推摩二至五分鐘即痛止。
- 疗效：**此法系广西日报登載，經我院实践有效，举例如下：
覃××，女，年六十四。患腹痛剧烈，欲吐不吐。曾服中西药无效，后即用此法治愈。
- 来源：**岑溪县大湫中心医院

肋 痛 类

治 右 肋 痛 方

- 主治：**右肋疼痛，手不可按。
- 处方：**薤白括蕢合四逆散加減：薤白六錢 蕢实四錢 枳实四錢 京夏三錢 柴胡四錢 赤芍三錢 桔梗四錢 乙金三錢 丹皮三錢 冬瓜仁三錢 桃仁三錢 薏仁八錢 敗酱一兩
- 用法：**用水三碗煎至一碗半，一日分三次服。
- 疗效：**郑××等两人均患肋痛，来院留医，用本方治疗十多天，均痊愈出院。
- 禁忌：**孕妇忌服。
- 来源：**貴县大圩乡 李德煜

痞 块 类

治 积 聚 方

主 治: 癥瘕、腹痛，流涎，消化不良，經年不愈者。
处 方: 仙人掌(76) 沙牛肉各四兩
用 法: 用适量水，煎取一碗，作一次服。
疗 效: 曾治好李××妻等两人，用此方各服二剂均愈。
禁 忌: 硬固生冷食物不宜食。
来 源: 馬山县周六公社 凌振达

治 左 腹 积 块 方

主 治: 左腹积块肿硬(脾脏肿大)。
处 方: 沙羌一兩(研末) 猪脾(俗称横利)一條
用 法: 上二味加少許酒醋蒸煮，乘热置地上，用盆盖住，待适溫将藥物和湯汁一起服食。
疗 效: 本人十九岁时，因患病数月后，脾脏肿大，經用本方治愈。
来 源: 北流县平政先峯公社收洞卫生院 饒冠英

治腹部积块(肝硬化)方

主 治: 腹部积块(肝硬化)。
处 方: (一)銀花五錢 沒藥二錢 乳香二錢 山甲(炮)三錢 皂角刺二錢
花粉三錢 貝母三錢 牛子三錢 連翹二錢 甘草节一錢五分
(二)姜黃三錢 枳壳二錢 川朴(姜汁制)五錢 蒼朮三錢 銀花四錢
(三)姜制川朴三錢 蒼朮三錢 陈皮三錢 川芎三錢 酒制大黃三錢 麦芽五錢 瞿麦五錢 沉香一錢五分 广木香一錢五分
(四)党参三錢 白朮三錢 淮山(炒)三錢 北芪三錢

云苓三錢 木通三錢 銀花五錢 姜制川朴三錢

用法：第一方用水二碗煮取一碗，一日分二次服，服后痛減，翌日即用第二方。第二方用水二碗煎取一碗，一日分二次服，次日服第三方。第三方九味藥物共研為末，分作兩日服，每日近黃昏時服一次，服藥停食晚飯，服完第三方后硬塊必消過半，大便必痔毒糞一次，翌日服第四方以培補脾土，如此輪流進服。

療效：本方曾治愈十余人，如韦××，初起右腹有硬塊，繼延至胃脘也脹硬，后則臍下硬大如碗，經用第一、二、三、四方輪流進服，治療一月而愈。

禁忌：在服藥期間，忌食油膩、葷腥、酸辣等物。

來源：貴縣蒙公公社 韦体仁

腸 痛 類

治腸痛（俗稱縮腳痛）方

一 方

主治：初起有陣發性腹痛，繼則持續性腹痛，疼痛多集結于右下腹，并多向荐骨、膀胱、大腿等处放散，病人右脚往往不能伸直，或在臍右與跨骨之間，多見腫塊，拒按。

處方：大黃牡丹皮湯當歸赤小豆散加減：大黃四錢（后下） 丹皮二錢 桃仁三錢 冬瓜仁六錢 生薏米六錢 歸身三錢 赤小豆芽三錢 五香丸一錢五分（不煎送服）

用法：上七味以水四百毫升，煮取約七十毫升，送下五香丸頓服。

附注：五香丸方：生香附（去毛）一斤、五靈脂一斤、黑丑二兩（一兩微火炒，一兩生用）、白丑二兩（一兩炒用，一兩生用），上藥研末和勻，醋煮米糊為丸如菜菔子大。

功用：通瘀，散血結，疗腸痛。

疗效：本方治疗数人，一剂病緩，三、四剂后，基本痊愈。

来源：广西中医专科学校 林沛湘

二 方

主治：右小腹肿硬，按之則痛，小便数似淋，时时汗出发热，而复恶寒，大便下脓血。

处方：桃仁三錢 大黃五錢 芒硝三錢（后下） 銀花五錢 甘草二錢
田三七一錢（研末送服）

用法：水二碗，煎取一碗半，一日分二次服。

功用：通瘀，散結，清热，解毒，疗腸痛。

疗效：本方曾治愈周××、廖××等数人。

来源：广西中医专科学校 梁益年

三 方

主治：慢性腸痛，身有微热，大便經常稀臭，腹部常痛，不能食硬飯，小腹右側牵引作痛，不任按摸，經久不愈，身体消瘦。

处方：乳香一錢 沒藥一錢 桃仁一錢 赤芍一錢 生軍一錢 丹皮二錢 白芷一錢 薏仁四錢 归尾二錢 連翹五錢 銀花四錢 生地一兩 田三七一錢（研末冲服）

用法：水二碗，煎至一碗半，一日分二次服。

功用：去瘀，活血，解毒，止痛。

疗效：本方曾治一中年男性者，初次連服三剂，停藥三天，再服三剂，疼痛減除，身体动作輕快，以后每天服用生地一两，連服一星期，并囑注意保养調理，經一年观察，未見有何痛症发生，体健如前。

来源：广西中医专科学校 邓培梓

四 方

- 主 治：**右小腹疼痛，有硬块，压之痛甚，右足直伸则痛剧为特征，大便秘结或间下脓血，体温较高（阑尾炎）。
- 处 方：**郁李仁一兩 川紅花二錢 山甲珠四錢 丹皮五錢 角刺四錢
薏仁二兩 冬瓜仁一兩 桃仁五錢 銀花二兩 菖蒲一錢五分
- 用 法：**煎浓汁，一日分四次服，每隔三小时服一次。
- 功 用：**散瘀结，清湿热，解毒，疗肠痛。
- 疗 效：**覃××，男，三十二岁，藤县人。右下腹有肿块如蛋大，压之痛甚，局部时有发热，右足直伸则痛尤甚，食少，大便秘结或间下脓血，体温较高，苔黄厚而腻，按诊右下腹有硬物触手，脉搏洪数。用本方治疗，连服两剂痊愈。
- 来 源：**广西中医专科学校 梁益年

五 方

- 主 治：**肠痛，小腹右侧胀痛，拒按，右腿伸时疼痛。
- 处 方：**錦黃五錢 丹皮五錢 黃芩五錢 枳实六錢 川朴五錢 茵陈六錢 連翹六錢 銀花七錢 芦根一兩
- 用 法：**用水二碗，煎取一碗，分二次温服。
- 功 用：**清热，散瘀，解毒。
- 疗 效：**张××，男，十一岁。患肠痛发热，腹右侧痛，拒按，右腿伸时尤痛，呕吐，大便两天未来，以本方治之而愈。
- 来 源：**柳州市联合诊所 謝紹先

六 方

- 主 治：**肠痛，小腹右侧隐隐作痛，甚则红肿疼痛，拒按，右脚缩，伸则痛剧，大便闭结或稀黄，或有寒热。
- 处 方：**瓜蒌仁三錢 大黃二錢 木鱉子（去壳）二錢 丹皮二錢 山甲珠一錢（研末冲服） 甘草二錢 花粉三錢 白芍三錢

用法：用水三碗，煎至一碗，一天分兩次服。
功用：清熱，解毒，散瘀，止痛。
療效：經用此方治療七人，五人痊癒，二人好轉。
來源：鹿寨縣 譚儒廷

七 方

主治：腸痛（闌尾炎）。
處方：三黃解毒湯：黃連八錢 黃芩八錢 黃柏八錢 梔子六錢 銀花一兩 川芎六錢 當歸二錢 連翹六錢 大黃四錢
用法：用適量水煎取一碗，分四次服，每隔四小時服一次。
功用：清熱，解毒，消癰。
療效：（一）蔣××，男，二十四歲。入院前十日忽發全腹痛，腹瀉惡心，一日後在右下腹部，呈持續性的鈍痛，伴有陣發性加重，大便閉，五日後有一腫塊，不能走路，發熱，不能飲食，入院前曾服中藥及注射針藥，病況日漸嚴重。1959年8月9日入院，檢查：體溫 39°C ，脈搏一分鐘90次，有黃白舌苔，右腹高於左腹，呼吸受限制，右側腹部摸到界限不明顯腫塊約手掌大，緊張過敏，不能深觸診，右後腰亦有劇烈壓痛，腸音有陣過水音，不能走動。診斷闌尾炎穿孔性局限性膿腫。當日即每四小時肌注十萬單位青霉素，補充體液，次日上午四時開始使用三黃解毒湯每四小時服一次，至下午四時體溫即由 39°C 下降到 37.8°C ，腹痛減輕，11日腫塊柔軟可摸，解了三次大便，稀而帶黃黑色。14日腫塊消退，可以下床走路，大便內排一團白色物，飲食大振，腹部已柔軟，無壓痛，無腹痛，大小便正常；（二）劉××，男，三十歲。於1959年9月18日下午十時突然腹痛，到十二時局限于右下腹部，呈持續性鈍痛，陣發性發作，不能伸直腰走路，惡心嘔吐，大小便想解而難解，尿後微痛，於19日急診入院。檢查：麥氏點壓

痛，反跳痛，郎氏征阳性，閉孔肌試驗阳性。診斷：慢性闌尾炎急性发作。服三黃解毒湯一剂，并針灸兩側闌尾穴及足三里穴溫針一小时，当即止痛，次日行动正常，痊愈出院。为了繼續观察及防止再发，出院后連服三黃解毒湯二剂，繼續在門診部針灸闌尾穴，連續二天痊愈。

来源：資源县医药卫生科学研究所

編者按：本方系三黃解毒湯加味。

治腸痛及小腹部血結方

主治：右小腹或左小腹部痛，小便如常者为血結。腸痛腹皮緊急，时汗出，发热而惡寒，或小便似淋或大便下膿血，右下腹部硬結压痛，右腿伸直痛更剧者皆治。

处方：加減桃仁承气湯：芒硝三錢（后下） 大黃三錢（酒洗后下）桃仁五錢 归尾四兩 丹皮四錢 大田七一錢五分（研末冲服）

用法：水二碗，煎一碗頓服。

附注：如病情十分严重，芒硝須減輕药量或不用，盖芒硝推蕩力峻，在腸將穿孔时，恐为推蕩力所穿，应注意病情酌用。

功用：下瘀，活血，散血結，疗腸痛。

疗效：（一）陆××，男，三十七岁。1958年3月2日初診。腹痛已二天，检查右腹闌尾部略紧张，細按微有热感，有压痛，行动时有隱痛或刺痛，脉搏每分鐘七十四跳，带有紧象。断为瘀未成，处以本方，药后泻下一次，痛減。翌日复診，行动已不覺痛，按之仅有微痛，腹皮已不紧张，亦无热感，因仅泻下一次，乃照原方加大黃共成五錢，药后泻下三次，症状完全消失。三診，繼服原方半剂并飲生薏仁湯三天，休息四天已能工作，不再发；（二）伍××，男，四十岁。1958年7月初診，腹痛已七天，初起大便秘，略带膿血，服白头翁湯、承气湯等，腹痛不減。检查右腹闌尾部之上方有压痛点，腹皮略急，坐臥均覺隱痛，动作

則刺痛，脈搏每分鐘八十一跳，略有洪數之象，體溫 38°C ，斷為腸痛。處本方芒硝減至一錢，加生薏仁、銀花各一兩，服一劑，大下膿血一次，下右腹仍陣痛二十分鐘始止而愈；（三）馬××，男，二十六歲。1958年7月5日初診，自訴左下腹近髂窩部痛已三十五天，初服中藥二十一天無效，繼入醫院留醫十四天亦無效，而且日趨嚴重。檢查左下腹部有痛點，拒按，但摸不到血塊，運動腰足則劇痛，左脈關尺略沉弦，斷為小腹血結。處以本方加紅花二錢，一服痛略減。復診仍照上方加大黃至五錢，服后瀉下三次，痛減半。三診仍照上方加田七至二錢，乳香、沒藥各一錢，服后瀉下二次，痛去十之八九，只行動有隱痛，按之痛亦不甚。四診，照三診方減大黃為三錢，服后瀉下二次，痛已消失。五診，病已痊愈，囑其日服田七末一錢，連服二天，以防復發。

來 源：廣西中醫專科學校 何文梓

消 渴 類

治 消 渴 方

主 治：消渴（糖尿病），煩渴，尿多，體重減輕，食欲異常亢進，尿有糖味。

處 方：生地黄二至三兩 川連五分至一錢

用 法：水三碗，煮取一碗半，一日分三次服。

附 注：服本方后，待煩躁渴水減少，舌面濕潤，加黃芪三至五錢，服至各臨床症狀消失。

療 效：（一）韋××，男，二十四歲。煩渴多尿已兩個月，兩腳軟無力，近兩周來煩渴，飢餓難忍，小便次數頻繁，體重急速減輕。檢查：皮膚蒼黃干燥，舌干色絳，消瘦肋間凹，

脉弦。尿檢驗：糖（+++）。診斷为糖尿病。除作飲食控制外，用生地黄三两、川連一錢，煎剂日分三次服，三天后，患者飢餓減輕，煩渴消除，尿量基本減少，即照原方加黃芪三至五錢，繼續服至臨床症狀消失；（二）何××，女，二十七岁。八个月前起病，起病初时觉舌干口渴，脚軟无力，近来身体急速消瘦，食量却增加并有腹痛，尿次数多，量又多，月經七个月沒有来潮。检查：皮肤蒼白干燥，肋間凹，舌色絳苔黃厚干燥，脉弦数。尿檢驗：糖（+++）。診斷为糖尿病。除作飲食控制外，服用生地黄二至三两、川連五分至一錢，日服三次，第三天煩渴減少，食量已趨正常，舌面之干燥黃苔退，并有津液，照原方加黃芪五錢，繼續服至各臨床症狀基本消失。

来 源：南宁专区人民医院 林 琪

淋 病 类

治 小 便 不 通 方

一 方

主 治：小便淋瀝短瀉或点滴不通。

处 方：新鮮路边青(31)一斤 蜜糖一兩

用 法：把路边青搥烂絞取自然汁半碗，和蜜糖混合，以开水冲服。

功 用：清热，利尿。

疗 效：党××，患小便不通，点滴不来，医药无效，以本方治疗，服药后，半小时小便即通。

来 源：北流县高峯公社金江卫生院 陆志生

二 方

- 主治：**小便不通，口渴或不渴，腹胀。
- 处方：**升麻八钱 知母五钱 黄柏五钱 肉桂七分（另焗冲服）
- 用法：**水二碗，煎取一碗顿服。
- 功用：**滋阴，清热，升阳，化气，通小便。
- 疗效：**梁××小便不通，医治三天点滴不通，第四天病情甚急，口渴腹胀，痛苦异常，服本方后，约三十分鐘，即下小便半桶而愈。
- 来源：**北流县陈智工区 罗 初
- 编者按：**此即东垣滋肾丸加升麻。

三 方

- 主治：**小便澀，滴澀不通，舌色紅，尺脉浮数者。
- 处方：**牛膝三钱 滑石六钱 甘草一钱
- 用法：**用水二碗，煎取一碗，作一次服。
- 功用：**清热，利尿。
- 疗效：**张××，小便澀，点滴不通，服本方即通暢而愈。
- 来源：**北流县 陈福才

四 方

- 主治：**小便不通，小腹肿胀。
- 处方：**（一）内服方：紫苏子二两
（二）外敷方：生田螺十个
- 用法：**内服方：将紫苏子槌溶用开水冲服。
外敷方：将田螺連壳槌溶敷于丹田和丹田对面腰椎部位两处。
- 疗效：**龙××、陈××等八天小便不通，有时只滴几点，坐立不安，小腹急胀，用此二方，服、敷后小便即通，胀亦消失。

来源: 昭平县东风公社 罗大新

编者按: 此方田螺加些白盐或少许梅片混槌，敷于脐部亦可。

治 沙 淋 方

主治: 小便赤色，便时尿管刺痛，淋瀝短澇，点滴难出。

处方: 竹节藤蘢(77)四兩 (小儿減半) 白糖二兩

用法: 用水四碗和竹节藤蘢煎取一碗，冲白糖溫服。

疗效: 許××小便痛澇难出，医治未愈，后經用本方治疗，服药后两小时，痛止尿通而愈。

来源: 北流县新丰罗村卫生院 黎青惠

治 石 淋 方

主治: 石淋，小便澇澇不通，尿管刺痛。

处方: 六一散二兩 紅瓜子肉四兩 白沙糖三兩

用法: 先将紅瓜子肉搗溶，然后与六一散、白沙糖拌勻，以开水冲服。

功用: 清热，利尿，滑下淋病砂石。

疗效: 本方治愈石淋一例，仅服一次而愈。

来源: 广西中医药研究所 王乃翰

治 血 淋 方

一 方

主治: 小便困难，尿频，血尿，腰或膀胱或尿管痛。

处方: 雷砵嘴(78) (又名飞天雷公、瓢羹菜、蓼箕篤) 莖葉鮮者四兩
干者二兩

用法: 加水五百毫升，煎开半小时后，一日一次或分二次服。

疗效: 本方对各种尿血患者均能治愈。在临床上我們檢查原因不明的尿血患者，服本方也能治愈。并追踪观察半年未見复

发。举例如下：

(一) 陈××，女，三十二岁。于1958年8月19日入院，已一星期，痾尿时混有血液，日有二至三次，初为鲜红色，渐变深红色，曾服中药略有好转，第四次服药后不但无效，反而小便全部是血液，并有血块，膀胱胀痛，烦躁，每解出血液后，前述症状减轻，无外伤史，有经痛史，十七岁结婚，小产三次，足月顺产三胎。入院检查：神智清醒，急性病容，面苍白，呈贫血状，营养欠佳，体质消瘦，发育正常，体温、呼吸、脉搏均正常。小便检查：蛋白(++)，红细胞(+++)，白血球(++)。膀胱镜检查发现膀胱粘膜弥漫性出血点，血管模糊不清，输尿管口不能分解。入院后输液、输血，次日下午，开始给服本方，连服二日后，解小便为青绿色，胀痛减轻。继续服本方，解小便二次，仍带红色，无痛，精神较好。第四日小便检查：蛋白(++)，红细胞(+++)，白血球(+++)。第五日小便检查：蛋白(+)，红细胞(++)。第六日小便检查未发现红细胞、白血球、蛋白。第七日复查小便亦无红白血球及白蛋白，睡眠食欲均好，先后服本方三日，第十一日痊愈出院；(二) 尹××，男，三十六岁。于某年1月6日入院，5日上午痾血尿十多次，痾时尿道有痛，易解，无放射性痛，无尿路中断现象，入院日中午仍解血尿数次，食欲欠佳。无血尿史。体温38.8°C。入院检查诊断为膀胱炎。入院当晚即给服本方，半夜小便转清色，1月10日下午停药，前后共服五天，1月11日痊愈出院。

来源：南宁市工人医院 杨洪彦

二 方

主治：小便下血，大便痾血亦治。

处方：红马鞭草[79]一两(鲜、干均可)

用法：用水二碗，煎取一碗，一日分二次溫服。
療效：鍾××，小便下血，歷二十天經治療未愈，後服此方即愈。
來源：北流縣北京公社醫院 陳一維

三 方

主治：小便出血，便時尿管疼痛發脹，小便困難。
處方：淡豆豉一兩
用法：將淡豆豉浸于四兩開水內，待出濃汁，一次服，日服一劑，連服三劑。
療效：本方治療八人，均獲痊癒，舉例如下：
李××，男，二十二歲。患血淋，初起小便如米泔汁，繼而小便困難疼痛，有血出，經服本方二劑痊癒。
來源：象州縣妙皇公社中心醫院 胡 文
編者按：本方出危氏得效方。

治小便渾濁（乳糜尿）方

主治：小便渾濁，盜汗，頭昏腰痛，面色萎黃。
處方：冬葵子三錢 銀花三錢 骨皮三錢 知母三錢 石膏三錢
土茯苓三錢 黃柏二錢（炒） 柏葉五錢 杭芍三錢 建菖蒲八錢
用法：水二碗煮取一碗，一日分二次服，每日一劑，連進二、三劑，待濕去後，原方加生地五錢、元參三錢，再續服五、六劑。
功用：祛濕，清熱，滋陰，利尿。
療效：周××，女，二十六歲；謝××，女，兩例小便均有渾濁物含混如脂膏，內含大量紅血球，經西醫診斷為乳糜尿，腎臟淋巴液滲出，頭昏，腰痛，盜汗，面色萎黃，於1958年11月來我院，以本方如法治療，十天而愈。
來源：桂林市中醫院 王德輔

治 白 浊 方

一 方

- 主 治:** 小便色白渾浊，便时刺痛难堪。
- 处 方:** 乳香 沒药 六一散 車前子各等分
- 用 法:** 上药共研細末，每服二錢（可按病情加減），寒者用三花酒烘热冲服，热性者用二次淘米水和酒各半冲服。
- 功 用:** 利尿，止痛。
- 疗 效:** 曾用本方治疗数例，效果良好。
- 来 源:** 广西中医专科学校 张国輝

二 方

- 主 治:** 小便白浊，便时尿管刺痛。
- 处 方:** 馬齿苋^[84]一握 二次淘米水一碗
- 用 法:** 把馬齿苋杵烂絞取自然汁，混合二次淘米水頓服。
- 功 用:** 清热，解毒，除湿。
- 疗 效:** 庞××，男。患白浊，投本方二剂而愈。
- 来 源:** 北流县东风公社达和卫生所 李拔禎

三 方

- 主 治:** 白浊属虛寒者。
- 处 方:** 仙茅一兩
- 用 法:** 以生盐一錢，开水适量浸漬仙茅一昼夜，取出蒸五十至六十分鐘，晒干。如此浸蒸晒三至四次，研成粉末，每服三錢，日服三次，开水送服。
- 疗 效:** 解放前曾用本方治疗十五例，均获效，重症二星期愈，輕症一星期愈。
- 来 源:** 象州县妙皇公社中心医院 胡 文

治 遺 尿 方

主 治：遺尿或小便失禁。

处 方：黃芪六錢 桂枝二錢 生姜二錢 甘草一錢 大 枣三枚
桑寄生六錢 益智仁三錢

用 法：水兩碗煎取一碗，作一次溫服，日二服，兒童酌減。

疗 效：（一）黃××，女，二十四歲。月經停止三月，素有遺尿症，自妊娠後遺尿病加劇，每晚二、三次不等，當時妊娠反應已過，除脈象有些滑數外，余無異狀，投本方一劑遺尿停止，連服一星期痊癒；（二）韋××，男，五十歲。身體素弱，每當工作後或睡眠醒時小便自行流出，經中西醫治療多年無效。患者面色蒼白，飲食減少，脈虛無力，服用本方一劑而病減，七劑痊癒。此後每用本方治小兒遺尿，均獲顯著效果。

来 源：廣西中醫專科學校 韋來庠

遺 尿 針 灸 疗 法

主 治：遺尿。

取 穴：復溜 腎俞 關元

手 法：補復溜，其餘二穴中等刺激，關元加灸五壯。

疗 效：用上穴針灸曾治愈多例。如黃××，女，二十歲。每夜必遺尿一次，已有四年之久，經用上穴針灸二次而愈。

来 源：融安縣龍妙民辦醫院 陳秀洳

遺 尿 艾 灸 疗 法

主 治：無論天時冷熱，每晚經常遺尿。

取 穴：關元 三陰交 大敦 膀胱俞 腎俞 足三里

灸 法：上穴用隔姜灸，灸至局部皮膚紅潤為度，每日灸一次，連灸四次。

疗效：李××，男，七岁。每晚遗尿数次，无论天时冷热，经常如此，采用上穴灸治，每日一次，连灸四次，遗尿症状基本消失，观察半年未有遗尿症状出现。

来源：柳州市人民医院 郭仁稀

遺 精 类

治 遺 精 方

一 方

主治：久患遗精，面青唇白，精神不足，夜卧多梦。

处方：牛甘果木〔80〕的枝节虫（藏枝节内面的蛆虫）十五个 猪肉二两

用法：上二味共煲水，连虫、肉、汤均饮食。

疗效：梁××，男，三十五岁，邕宁人。面青白，头晕眼花，四肢痿软，胃口不振，腰胀痛，遗精。由1958年4月4日服药七天，病即痊愈，身体恢复健壮。

来源：南宁市 何福生

二 方

主治：遗精，滑精，面黄体瘦，四肢无力。

处方：益智仁一百粒 砂仁二钱

用法：共研细末，酒糊为丸如黄豆大，早晚每服一钱，开水送下。

疗效：本方曾治疗三十余人，效果显著，举例如下：

梁××，男，四十岁，谢圩大路村人。1930年梦遗，滑精，面色萎黄，身体瘦弱，四肢无力。服本方三剂而愈。

来源：横县金星公社医院武留分院 苏焕南

编者按：本方出胡氏济阴方，治漏胎下血，益智仁半两、缩砂仁一

两，为末，每服三錢，空心白湯下，日二服。献方人将二药分量变易借治遺精。惟肾气虛寒不摄者宜用，阴虛阳亢者不宜用。

三 方

- 主治：**无梦遺精，久而不止，形体瘦弱。
- 处方：**鸡内金四兩炒焦黑 淮山藥一兩 潞党参一兩
- 用法：**上三味共研細末，每次服二至三錢，加白糖一錢开水冲服，日服二次。
- 疗效：**本方治疗很多病例，效果显著。
- 禁忌：**忌食生冷辛辣和有刺激性的东西。
- 来源：**广西中医专科学校 梁 申

疝 病 类

治 疝 气 方

一 方

- 主治：**阴囊肿大，疼痛，寒热，小便数而少，小腹有时胀痛。
- 处方：**熟地三兩 杞子一兩五錢 川棟子二兩
- 用法：**上三味水煎浓汁，一日分四次服。每隔四小时服一次。
- 功用：**滋阴，調气，鎮痛。
- 疗效：**陈××，男，五十六岁，藤县人。阴囊肿大如碗，胀气而疼痛，压之更痛，小便頻数而量少，小腹时有胀痛，憎寒壮热，面色赤黯，舌苔淡白而厚，脉象数大。服本方一剂病減，两剂痊愈。
- 来源：**广西中医专科学校 梁永礼

二 方

主 治：睪丸肿痛，阴囊气胀。

处 方：八角一兩（炒） 小茴一兩（炒） 青皮一兩（炒） 荔枝核一兩
（炒） 防己五錢

用 法：共研細末，每服二至三錢，水酒各半冲服。

功 用：散寒結湿气，治疝痛。

疗 效：本方系祖传驗方，曾治愈数例。

禁 忌：小便难、阴茎痛者，本方不可用。

来 源：平南县城廂 张鑑棠

三 方

主 治：阴囊胀大而痛，皮色明亮，面肢微肿。

处 方：干冬瓜皮二兩（生的加倍） 生荔枝壳一兩

用 法：用水二碗，煎取一碗，分二次服。

疗 效：陈××，患此症，經久治不愈，后以此方治疗，两剂而愈。

禁 忌：忌食酸物。

来 源：貴县木梓公社 雷鳴球

四 方

主 治：疝气病。

处 方：橙皮五錢 木通五錢 桂枝二錢 大黃一錢五分 川棟子四錢
檳榔一錢五分 小茴三錢

用 法：用水二碗，煎取一碗，一次頓服。

疗 效：蔣××，男，四十岁，糯垌太阳公社人。左边睪丸炎肿，
牵引小腹，难以行动。用本方一剂痛減，二剂痊愈。本方
先后治愈睪丸炎肿者十余人。

来 源：岑溪县糯垌中心医院 甘均权

五 方

主 治：小腸疝痛。

处 方：烏藥五錢 小茴三錢 青皮三錢 川棟二錢 廣木香三錢 良姜二錢 檳榔三錢

用 法：用水一碗半，煎取大半碗，臨臥前一次服。

功 用：散寒結，清疝氣。

疗 效：本方曾治愈数人，以本鎮車縫社謝××為最典型，謝去冬患小腸疝氣痛甚，牽及臍腹，舉丸下墜，得熱稍止，服藥一劑而愈。

来 源：崇左縣銀團公社醫院 張玄強

阳 痿 类

治 阳 痿 方

一 方

主 治：陽物不舉。

处 方：英雄酒：楓木果四十枚 狗鞭十條（焙干）

用 法：上二味以三花酒一斤半，浸七天後可用，每天早上服一匙羹。

疗 效：寧××，男，三十多歲。患陽痿，多方治療無效，後以本方浸酒照服，服至一斤，陽物已能稍舉，繼服一斤而愈。

来 源：田東縣火箭公社醫院 賴立矩

二 方

主 治：陽痿，陽物不舉，不能性交。

处 方：千口一杯飲：黨參 熟地 枸杞 各五錢 沙苑蒺藜 淫洋

覆母 丁香各三錢 远志(去心) 沉香各一錢 荔枝肉七个

用法: 用好烧酒二斤, 浸三日, 后, 蒸三炷香久, 取起置冷水中, 拔出火气, 过三十一日飲之。日二次, 每次飲一酒杯, 分早晚作千口飲下。

疗效: 宋××, 男, 三十八岁。因早婚, 房事过度, 三年阳痿不举, 不能进行房事, 后来更加严重, 1954年来求治, 用千口一杯飲, 服七天后, 阴茎已能举起, 服至十四日, 阴茎恢复正常, 依方再服一剂, 阳痿痊愈。几年来运用本方治愈阳痿十余人。

来源: 岑溪县樟垌中心医院 甘均权

编者按: 所謂千口飲下, 即分多次飲下, 并不拘泥于飲一千口。

三 方

主治: 阳事不举, 久年无嗣。

处方: 絲餅三錢 北芪四錢 海狗腎三錢 麻雀十只(去腸雜焙干)
蛤蚧二條 当归五錢 露蜂房三錢 于朮四錢 杞子四錢 海
龙二錢 吉林参二錢 海馬二錢 續斷三錢 大枣十枚 阳起
石二錢(煨) 炙草三錢

用法: 共浸三花酒六市斤, 十五日可服, 每日飲一两。蜜丸亦可, 每日服四錢。

功用: 补肾、益精, 壮阳事。

疗效: 本方曾治愈年老阳痿多例, 1952年又治一患者, 病愈竟获一男。

来源: 南宁市 黃道存

縮 陽 類

治 縮 陽 縮 陰 方

主 治：男子縮陽：腹痛，陽物縮入。女人縮陰：頭目眩暈，神志失常，兩乳縮入。

處 方：外用方：胡椒五錢（研末）三花酒五錢

內服方：茯神五錢 陽起石三錢（煨） 故紙三錢 熟附三錢
智仁三錢 邊桂心三錢

用 法：外用方：酒調胡椒末成糊，縮陽敷肚臍，縮陰敷背心（相當于靈台穴）。

內服方：水二碗煎取一碗，另泡桂心出味，沖和頓服。

功 用：祛寒，溫腎，壯陽。

療 效：甘××妻，女，四十三歲，縮陰。黎××，男，四十五歲，何××，四十二歲，縮陽。均照法外敷，內服痊癒。

來 源：岑溪縣紅風公社中心医院 譚鎮文

縮 陽 艾 灸 療 法

主 治：縮陽，腹痛，陽物縮入腹中。

取 穴：三陰交 陰交

灸 法：用艾條先灸三陰交雙穴四至五分鐘，後灸陰交一至二分鐘。

療 效：妙皇公社妙皇街張××之子，男，六歲，身體很壯健。某日，忽大叫腹痛，片時，陽物自縮入腹，只剩龟头部分。經我院診治，當即以艾條灸三陰交兩穴，約五分鐘腹痛即止，再灸陰交一分鐘，陽物自出而癒，今患兒已十一歲，沒有復發。

來 源：岑溪縣紅風公社中心医院 譚鎮文

縮 陽 驗 方

- 主 治：**命門火衰或房勞過度竭耗真陽的男子，突然發生腹拘攣，陽具攣縮陷沒，俗稱“縮陽”；如婦女則雙乳攣縮陷沒，俗稱“縮陰”；均可用本方救急。
- 處 方：**純淨硫磺末三錢 三花酒（如一时无三花酒，其他酒類也可，酒味淡的則多用一些）二兩
- 用 法：**將酒燙熱，沖硫磺末頓服。
- 功 用：**硫磺太熱，坊間本草有“硫磺原為火之精”的說法，加以酒的性烈興奮為佐，故能迅速鼓舞元陽而起“縮陽”或“縮陰”急症。
- 療 效：**本方系故鄉某老農告我的，在二十多年醫療實踐中，却真的遇到這種病例，茲簡介如下：
- 本人三十多年前，在學校讀書時，同學××，男，十九歲，已婚。在課室听课中，突然跌倒，面色晦黯，神氣非常疲憊，神志尚醒，但欲言不能出，陽具經縮至快要陷沒，僅看見龟头與肚皮平即縮陽。我頓憶起老農告給我的方子，急買藥照法與服。服後約十五分鐘，患者能說出話，面色也由晦黯稍轉潮紅，陽具也伸出來了。未服藥前按其脈是沉遲的，且四肢比常人冷一些，顯系寒症，因而繼給予溫補腎陽藥兩劑，精神遂復常。
- 來 源：**廣西中醫藥研究所 黃汝紹

大 便 不 通 類

治 大 便 不 通 方

- 主 治：**因食雜物大便秘結不通。
- 處 方：**羊不揆汁（色白如乳）三大滴（約重點五毫升）

用法：以开水二百五十毫升冲服。

疗效：潘××，男，四十岁。患呕吐不止。服炒粟二升，吐止后，大便不通，腹胀剧痛，經当地中医治疗五天无效，来我院留医，初用硫酸五十克无效，后用大剂大承气湯亦无效，繼以甘油灌腸三次也无效，再用扩张器扩张肛門，用鉗子挖出硬粪十余粒，最后使用此方，服后二十五分鐘大便即通，腹胀痛亦愈。本方曾用以治疗五十六人，均获卓效。

来源：岑溪县大湓中心医院 黎民任

编者按：羊不挨即龙骨浆，又名羊拜埃，詳草藥植物学名索引〔65〕。

大 便 痢 血 类

治 大 便 痢 血 方

一 方

主治：大便痢血。

处方：柏枝木強三兩

用法：用适量水煲猪肉，取水一碗半，分两次服，連服三剂应效。

疗效：本方曾經治疗六十四例疗效很好。

来源：蒼梧县新地公社殿村卫生所 莫永然

二 方

主治：时时下血，多在粪前，血清而色鮮，四射如濺。

处方：旱蓮草三兩 狗肝菜〔31〕（即路边青）二兩 車前草一兩 白糖适量

用法：上三味共搗烂，加白糖和勻，以二次洗米水冲服。

疗效：黄××，男，三十五岁。患腸风下血，发高热，腹痛，大便下血甚多，經注射止血剂无效，后用本方治疗，服藥一天后，下血大为减少，服藥二天，下血已止，腹痛解除，体

溫亦恢復正常，調養十日，健康恢復。

來源：廣西中醫藥研究所 李才魁

三 方

主治：先血後便。

處方：黃芩 枳殼 赤小豆芽 當歸 銀花各二錢 甘草一錢

用法：用適量水煎取一茶杯，作一次溫服。

功用：清熱解毒。

療效：農××，男，三十歲。患此病已有數月，服上方四劑痊癒。

禁忌：酸腥生冷食物。

來源：全州縣永州公社中心醫院 陳善記

四 方

主治：先便後血。

處方：川連二錢 當歸四錢

用法：用適量水煎取一茶杯，作一次溫服。

功用：清熱養陰。

療效：農××，男，三十三歲。患此病已數月，服上方三劑痊癒。

禁忌：酸腥生冷食物。

來源：全州縣永州公社中心醫院 陳善記

脫 肛 類

治 脫 肛 方

一 方

主治：習慣性脫肛，或脫肛年久不愈。

處方：蘆竹筍〔81〕四兩 豬大腸（即豬七寸直腸）一條

用法：用水三斤煎取一飯碗左右，連豬腸一日分三次服食，兒童可分五、六次服食，并用1/1000灰錳養水洗滌患部，洗后用紅蓖麻叶以火烤軟熟后，將肛門托入。

療效：裴××，男，成人。久患脫肛，脫出直腸且已潰爛，久治無效，用本方連服三天即愈。

來源：龍州縣霞秀醫院 周水華

二 方

主治：脫肛、子宮脫垂亦效。

處方：杜仲湯：杜仲一斤(切碎)

用法：加水浸過藥頂，煎三小時，取出頭煎藥液，將藥渣再加水煎三小時，取出二煎藥液，去渣，合頭二煎藥液，濃縮即成。治脫肛，每日服三次，每次十毫升。治子宮脫出，每日服三次，每次五十毫升。

療效：脫肛三例，服藥三天，完全治愈，子宮脫垂一例，服藥一天，子宮即見收縮。

來源：崇左縣邕白公社醫院

三 方

主治：久痢脫肛。

處方：升麻一錢五分 炙黃芪五錢 當歸三錢 廣皮一錢五分
五倍子二錢 炙草一錢五分 炙防黨四錢 白朮三錢 柴胡五分
生薑三片 大棗二枚 地榆三錢 烏梅一錢五分

用法：用適量水煎取三茶杯，一日分三次服。小兒酌減。

功用：升陽益氣。

療效：覃氏小兒，患痢疾數月，脫肛不收，服此方一劑，病即好轉，連服數劑，痢止肛收而愈。

禁忌：忌食硬固、生冷、酸腥的食物。

來源：馬山縣周六公社中心醫院 羅建邦

瘰 癧 類

治 大 頸 方

一 方

主 治：頸部肿胀膨大，但不感疼痛，呼吸粗壯（甲状腺肥大）。

处 方：海带四錢 海藻二錢 海螵蛸二錢 海蛤壳二錢 昆布三錢

用 法：用适量水煎浓液，每次含一口徐徐嚥下，約一、二分鐘服一口，使药气常在頸部，一星期服一剂。

功 用：化痰、散結、消癭。

疗 效：韦××、苏××等七人，同患此病，均用此方治愈。患一年內的，服四至五剂可愈，二年內的服八至十剂則愈，超过两年以上的，尚未治过。

禁 忌：不得与甘草同服。

来 源：馬山县古零公社中医院 黄云紅

二 方

主 治：大頸病（甲状腺肿大）。

处 方：夏枯草五錢 浙貝三錢 牡蠣一兩 海螵蛸五錢 赤芍三錢
檳榔三錢 青皮二錢 海藻五錢 昆布五錢 桔梗三錢 枳壳三錢
黃葯子五兩

用 法：共研細末，另以黃葯子二兩煎浓汁作丸，每丸重二錢，每日服二次，每次一丸，飯后服。

疗 效：本方得力全在黃葯子一味，抗战时，此药得自河池县老医李某传授，經浙江大学代為鑑定药名后，随在柳、桂实际运用多驗，解放后，专用此药煲猪肉，亦同样治愈平西乡和卫生系統同志多人。

来 源: 南宁市 张 本

治 血 瘤 方

主 治: 血瘤, 初起如粟米大, 紅如硃砂, 二、三个月大如指头。

处 方: 竺黄一錢 輕粉五分 皂角一錢 北辛一錢 巴豆五分 丁香五分
香附五分(炒)

用 法: 上药共研末, 浸酒六两, 早晚各涂患处一次。

疗 效: 林××小儿, 患血瘤, 用本方涂两个月, 血瘤消失, 皮肤
恢复原状。

来 源: 馬山县周六公社周六制药厂 鍾 陆

夹 色 伤 寒 类

治 夹 色 伤 寒 方

主 治: 夹色伤寒(房事适遇感冒), 头痛腰痛, 身骨痛, 眼紅发
热。

处 方: 南蛇藤蕊(82) 狗耳花根(83) 馬齿莧(84)各一兩

用 法: 用水放过药面煎至三十分鐘, 分二次溫服。

疗 效: 梁××, 行房第二日患头痛, 腰痛, 身骨痛, 眼紅发热,
以上药治之, 即日下午痊愈。

来 源: 馬山县紅旗公社医院 謝琼仪

解 毒 类

治 食 人 言 中 毒 方

主 治: 食人言(信石)中毒。

处 方: 綠豆一兩打碎

用法：用适量水煎取一碗一次服完。
疗效：潘××誤食人言中毒，用本方治愈。
来源：馬山县古零制药厂 銀世开

治木薯中毒方

一 方

主治：食木薯中毒，昏迷不語，牙关紧閉。
处方：老笋果水
用法：用老笋果水灌服。
疗效：本方曾治疗七十多例，均愈，疗效很好。如招××等三人食木薯中毒，昏迷不省人事，給老笋果水灌一次，即吐出而愈。
来源：象州县象州公社医院 周振文
编者按：本方以吐出而获效，未知不吐可中和毒素否。

二 方

主治：木薯中毒，不省人事，牙关紧閉。
处方：1.豹牙狼叫(85)打糊，冲开水服，服后即吐出。
2.蘿卜不拘多少，煎水服，服后即醒。
3.鸡肉不拘多少，煮湯服，服后数分鐘即醒。
疗效：上三方任用一方皆有效；曾治疗一百多例均愈。
来源：象州县象州人民医院 仇明仁

三 方

主治：木薯中毒。
处方：活魚條数不拘
用法：用适量水煲(不放油盐)取水一碗，作一次服，服后半小时即吐。

疗 效: 曾治木薯中毒数例，服药后半小时呕吐苏醒。

来 源: 崇左县那隆人民公社 黄秋景

四 方

主 治: 木薯中毒。

处 方: 白明矾 胆矾各二至三钱

用 法: 共研成末，冲开水一大碗，一次服完，昏迷者或设法灌服，使吐出毒物或用鸡毛探入喉中诱吐。

疗 效: 谭××吃木薯中毒，肚腹疼痛，服本方后即吐出痊愈。同时有服火柴头及服断肠草中毒的，也可用本方治愈。

来 源: 马山县林圩中心医院 韦 彦

治 食 物 中 毒 方

主 治: 六六六粉、癞虾蟆、木薯、竹木耳等中毒。

处 方: 甘草二两 金银花一两

用 法: 用适量水煎取三茶杯，日三次，每次一杯。

功 用: 和中解毒。

疗 效: 误食沾污有六六六粉的食物或木薯、竹木耳中毒者，用本方治疗均见效，效果良好。

来 源: 马山县古零中医院 梁国材

調 經 類

調 經 方

一 方

主 治：月經不調，超前落后，或經來前后腹痛，經色不正，有余或不足。

处 方：大熟地二錢 酒當歸三錢 炒白芍二錢 酒川芎二錢五分 丹參三錢 羌蔚子二錢 制香附三錢 白朮二錢 益母草三錢

用 法：用水三碗煎取一碗半，一日分二次服。

功 用：理血，調經。

附 注：血熱加丹皮二錢，血寒加桂心二錢，經行腹痛拒按加延胡三錢，經行腹痛喜按或血少色淡加人參二錢。

疗 效：本方曾治療三十多例，療效均很好。

来 源：南宁市 繆大文

二 方

主 治：婦女經不對期及經來前后腹痛。

处 方：調經種子丸：丹參一錢五分 遠志一錢五分 歸片一錢五分 阿膠一錢五分 白芍二錢 元胡一錢五分 香附三錢 砂仁一錢 祈艾一錢五分 坤草一錢五分 木香一錢 云苓二錢五分 白朮一錢五分 防黨三錢 炙草一錢五分 北芪二錢

用 法：將上藥研細末，煉蜜為丸。每個重一錢，每日服二次，每次二丸淡鹽湯送下。

疗 效：本方曾治愈月經不調、經來肚痛、子嗣困難者十余人，如陸××妻、梁××妻、李××妻等，用本方治療，均獲經調而有生育。

禁忌：忌食生冷酸类食物。

来源：贵县木梓蓮塘村 李榜佳

三 方

主治：妇女月經后期，經水如芥菜水，小腹隱痛，头晕眼花，吐清涎，口淡无味，食欲不振，面无精采，脉迟細。

处方：金匱溫經湯：吳茱萸三錢 归身 白芍 川芎 人参 桂枝 阿胶 丹皮 生姜 炙草各二錢 半夏三錢 麦冬三錢

用法：用水二碗，煎成一碗，一日分二次服。

疗效：用本方治疗月經后期百余例，均获显著效果。

来源：广西中医专科学校 梁 申

治 閉 經 方

一 方

主治：妇女月經不通，面黃肌瘦，腰痛腹痛。

处方：晚蚕沙一兩 丹参一兩

用法：上药用瓦鍋分別炒黃（不可炒焦），共研細末，每早空腹用溫酒冲服二錢。

功用：化痰，活血，通經。

疗效：梁××之妻，閉經数月，用本方治疗，只服药三次，經水即来，通后月經正常。

来源：北流县天麻卫生所 龙德彪

编者按：即蚕沙酒加丹参，治經閉确有效，在不虛不实之間使用为宜，若血枯、血虛須补血。

二 方

主治：月經不通，脚冷，腹痛，腰胀，四肢倦怠，子宮位置时有拘急状，脉沉細，舌苔淡白。

处 方：桂枝三錢 茯苓三錢 丹皮三錢 桃仁四錢 王不留行四錢
白芍三錢 川芎四錢

用 法：用水二碗，煎取一碗，加双酒一两冲服。

功 用：去瘀，生新，通經，疗癥病。

疗 效：黃××，二十六岁，藤县人。月經过期不通，小腹急痛，腰胀，四肢倦怠，脚冷，脉沉細，苔淡白。以本方治疗，每天一剂，連服三天，經痛病愈，再以溫补善后，健康如常。

来 源：广西中医专科学校 梁益年

編者按：本方乃金匱桂枝茯苓丸加王不留行，川芎、白芍改用赤芍更佳。

三 方

主 治：閉經（官能性閉經）。

处 方：归尾五錢 白芍四錢 枳实三錢

用 法：用水二碗，煮取一碗，晚上临睡时頓服。

功 用：活血，通經。

疗 效：本門診部治疗五十例，服二剂月經来潮者九例，服三剂来潮者十二例，服五剂来潮者二十例，无效者九例。

来 源：南宁市公費医疗門診部

四 方

主 治：年壯妇女閉經。

处 方：鸡蛋二只 归身五錢

用 法：先将鸡蛋煮熟去壳，用針刺十余个孔，再用水三碗和归身同煎取碗半，飲水食蛋。

功 用：活血，通經。

疗 效：本方曾治过歐××、梁××及黃××等經閉均愈。

禁 忌：忌食腥、酸、寒凉毒物。

来源：貴县 梁 处

五 方

主治：月經久不通，食少面黃，食欲不振。

处方：凌霄花四錢 阿胶珠四錢

用法：用水一碗，先煎凌霄花成半碗，去渣，納阿胶珠微火使溶，冲适量酒（随人酒量）服。

功用：活血通經。

疗效：黃××，女，二十五岁。經閉年余，服此方三剂而通。此方曾用以治疗七例，均获效。

来源：岑溪县卫星公社 黎志修

六 方

主治：月經閉塞不通，头晕，眼花，四肢酸軟，食欲不振。

处方：胭脂花根〔86〕（类似紅薯根）二兩 猪肉一兩

用法：胭脂花根燉猪肉吃，另用其枝叶水煎当茶飲。

疗效：本方于1959年曾用以治疗三例，均痊愈。举例如下：

黃××，女，成人。閉經一年半，經常头晕，眼花，四肢酸軟，食欲不振。使用本方治疗，服用四次，月經开始复潮而愈。

来源：隆林县人民医院 庞三瑛

治 逆 經 方

主治：妇女月信不行，經逆、鼻衄。

处方：加減麦門冬湯：麦冬六錢 防党四錢 京夏三錢 粳米三錢
炙草二錢 泽兰三錢 牛膝三錢 大枣三枚

用法：用水二碗，煎至一碗，空腹于临臥时作一次服。

功用：清心，降逆，通經。

疗效：蔣××、覃××，二人体頗健，月信不行，經逆鼻衄，日

干，脉弦数，均以上方治疗而愈。

来源：贵县大圩乡 周京甫

治 不 孕 方

主治：妇女月經不調，不能受孕。

处方：甜茶根〔87〕（干的）三兩

用法：于月經淨后，将上药与白毛烏肉鸡肉（如无白毛烏肉鸡肉，以白毛鸡肉代之亦可，但效果較緩慢，需多服一、二剂），不拘多少，加水适量，同煲至鸡肉稍烂为度，去药渣多次服药湯和鸡肉，于第一次月經淨后服，如仍不孕者，于下月月經淨后再服一剂。

疗效：十多年来用此方治疗四十余例不孕患者，仅给药服一、二剂，均能受孕。兹举例如下：

（一）陈××，已婚七年未孕，于1949年給服本方一剂后即能受孕，現已生育一男三女；（二）吳××，原生一个小孩，隔五年不孕，于1958年給服本方一剂，育一女。

来源：融安县大乐公社江河大队 陈月兰

經 痛 針 灸 疗 法

主治：經痛。

取穴：三阴交 地机 血海 中极 气海

手法：用强刺激手法，每穴針二次即見效。

疗效：黃××，女，四十岁。月經超前，色褐，經前腹痛腰痛，經針二次，下月月經期正常，腹痛腰痛等消失。

来源：融安县长安民族医院 黃繼香

胎 前 类

治 妊 娠 恶 阻 方

一 方

主 治: 妊娠期間，覺頭重目眩，四肢倦怠沉重，多欲臥床，晨吐，或食入即吐，甚至見食即吐，常始于妊娠第六周前后，一日反复数次，呕吐多为食物。

处 方: 伏龙肝（灶心土要燒雜草柴的，煤灶的不可用）三至五錢

用 法: 每天分二次冲开水服。

功 用: 溫中，和胃，止吐。

疗 效: （一）袁××妻，三十二岁。妊娠呕吐，已二十多天，吃水也吐，十多天不思飲食，大便秘，小便少，人消瘦，用本方一服即生效，三服痊愈；（二）萧××，女，二十三岁。妊娠呕吐不适已一月，飲水也吐，經西药治疗注射未愈，入院服本方一服即見效，三服痊愈。

来 源: 柳州铁路中心医院产科 吳素彬

二 方

主 治: 妊娠二至四月間，恶心，呕吐，食不下，择食，头晕。

处 方: 干姜三錢 半夏六錢 人參三錢

用 法: 适量水煎服，初时一天一剂，稍有进步，后隔日一剂，如服药呕吐，一剂分三次服，第一、二次可能会呕出，两剂后多不会呕了。

附 注: 藥物分量随症加減，有热者以生姜易干姜，加川連、厚朴。胃虛者加白朮、砂仁。寒而呕逆者加吳萸，重用干姜。血虛加归身，腹痛加白芍，积滯加神曲。

功用：溫中補虛，降逆止嘔。

療效：我科對妊娠惡阻，運用此方治療四十二例，大部分七天內症狀消失，均獲良好效果，在愈後觀察，並无一例有復發現象，舉例如下：

（一）梁××，女，二十三歲。因流感住院留醫，經治五天流感已愈，惟嘔加劇，不能進食，頭眩痛，轉用中醫治療。中西醫會診認為妊娠惡阻，胃有熱邪，肝火上逆，處方人參二錢、半夏六錢、生姜八錢、川連三錢、厚朴二錢，服二劑嘔吐止，三劑痊癒出院；（二）楊××，女，二十一歲。月經不來已有三個月，曾到婦科檢查妊娠三個月。現覺胸悶，食欲不振，頭暈嘔吐，舌苔本色，脈搏正常。診斷為妊娠惡阻。處方：黨參五錢、生姜二錢、半夏五錢、砂仁錢半，服藥一劑後嘔吐停止而愈；（三）邵××，女，二十一歲。停經三個月許，初起感頭暈，胸悶，每日惡心嘔吐清涎少許，食欲不振已有一個多月，經服藥無效，繼則劇烈嘔水或食物，皮膚乾燥，兩眼下陷，行路步浮，頭暈欲倒，由其夫扶來候診時，已嘔吐數次。脈細緊，舌苔白膩，面蒼白，神氣衰弱。經婦科檢查妊娠約三個月。斷為妊娠惡阻。處方：黨參五錢、半夏四錢、白朮三錢、干姜二錢、春砂二錢、歸身五錢、吳干一錢，服藥一劑嘔吐已減，連服三劑嘔吐停止，已能進食，後調理經半月，即告康復。

來源：桂平縣人民醫院中醫科

編者按：本方即金匱干姜人參半夏丸作湯服。

三 方

主治：妊娠兩個月左右嘔吐。

處方：茯苓五錢 法半夏三錢 生姜一錢

用法：水二碗，煎成一碗，一日分二、三次服，藥入口即吐者，

分數次徐徐嚥服。

功用：降逆，止嘔。

療效：我科治療十例，服一、二劑即愈，如李××，女，二十二歲。患者受胎已兩個月，有頭暈，心悶，作嘔，口淡，手足酥麻。入院後即服此方（并針足三里、內關），服藥當天即已止嘔，自訴身體舒適許多，第二天繼續服藥，除有少許頭暈外；其他症狀均消失，第三天病癒出院。

來源：梧州市紅十字會醫院婦產科

編者按：本方即金匱要略小半夏加茯苓湯

四 方

主治：妊娠嘔吐不止。

處方：參芩湯：防黨四錢 甜瓜蒂三錢

用法：用水一碗，煎取半碗，作一次服。

附注：服後十分鐘嘔吐次數增加，待病者連吐六、七次後，即用姜汁一匙，給病者服下，嘔吐即止，二小時後，稍食稀粥，三日內飲食不宜過飽。

療效：盧××，女，二十五歲。妊娠嘔吐，經服上藥一次痊癒。

來源：柳州市聯合診所

編者按：本方以痰飲盛者較宜，否則慎用。

治 妊 娠 浮 腫 方

主治：孕婦全身浮腫，行動困難（子腫）。

處方：辣椒蕓二兩 豬小腸五兩

用法：水三碗，煮取一碗半，一日分二次服。

療效：覃××，妊娠手足面目浮腫，行動不便，醫藥無效，以本方治愈。

來源：北流縣高峯公社水垌工區衛生站 黃德修

治 乳 泣 方

一 方

- 主 治：**妊娠乳汁流出不止。
- 处 方：**鲜茄子花三朵
- 用 法：**上药打烂，调醋搽乳房。
- 疗 效：**王××妻，二十四岁。妊娠已八个月，乳汁自流不止，经中西药治疗不愈，仅用本方一剂，搽药十分钟后，乳汁即止。
- 来 源：**象州县妙皇公社中心医院 胡 文

二 方

- 主 治：**孕妇未产，乳汁先行。
- 处 方：**桂枝龙牡汤：桂枝一钱五分 白芍三钱 龙骨三钱 牡蛎三钱
甘草二钱 大枣二枚 生姜三片
- 用 法：**水二碗，煮取一碗，一日分二次服。
- 功 用：**补虚，敛涩，调营卫。
- 疗 效：**曾治乳泣多例，效果很好。
- 来 源：**广西中医专科学校 原培清

治 小 产 方

一 方

- 主 治：**妊娠三、四月后，习惯小产。
- 处 方：**桑寄生五钱 当归四钱 白朮三钱 川芎二钱 阿胶三钱 续断三钱
砂仁一钱五分 香附一钱五分 陈皮一钱五分 甘草一钱五分
- 用 法：**上九味，以水三碗煮取碗半，去渣，纳阿胶，微火烊尽，

一日分二次服。慣在孕后三、四、五月墜者，自受胎兩月后服起，每旬服一劑。慣在孕后六、七月墜者，自受胎四月后服起，服至正產為止。

功用：補土，益血，固胎。

療效：馮××，女，二十八歲，容縣人。習慣性小產，每妊娠至七月必墜，屢治無效，曾經小產四次，××年妊娠又將屆七月，胎有壓下之勢，診視，體質肥胖，顏色正常，惟脈象帶革，已顯半產之征。用本方連服三劑，胎復正常，后每旬服一劑，服至正產為止，后果獲正產，母子安全。后用本方施治三十餘人，均獲奇效。

來源：廣西中醫藥研究所 李庆云

二 方

主治：習慣半產脈沉細者。

處方：加味膠艾湯： 歸身三錢 熟地八錢 白芍五錢 炙草二錢
艾葉三錢 川芎二錢 阿膠三錢(后下) 北芪五錢 川仲三錢

用法：水二碗，煎取一碗，分兩次飯后加酒沖服。

療效：楊××之妻，妊娠半產，已成習慣。用膠艾湯加黃芪、川仲，囑每月服一、二劑，照服果獲正產。

來源：貴縣解放鄉 覃紹銘

治 難 產 方

一 方

主治：難產。

處方：當歸二兩 川芎一兩 益母草四兩 牛膝三錢 升麻三分 伏
龍肝一兩

用法：用適量水煎取一碗；一日分三次溫服。

療效：加雅屯黃××女難產，以此方治療，服藥后不久即產下。

来 源：馬山县金釵公社医院 潘海波

二 方

主 治：难产。

处 方：（一）内服方：扁菜（韭菜）一兩 門神紙 利市紙（貼在門壁的越舊越好）各二錢

（二）外敷方：紅蓖麻叶 倒勾草〔88〕 狗尾藤〔89〕各一兩

用 法：內服藥用適量水煎一次服。外敷藥共搗爛，先在足母趾刺一針，見血為度，然後將藥敷上。

疗 效：方××妻，懷雙胎，臨產時，第一個胎兒平安產出，但第二個嬰兒隔了二天還產不出，接生員束手無策，後用本方不到三個鐘頭，第二個胎兒就平安產出，母子無恙。

来 源：崇左县左州公社 黃大深

三 方

主 治：难产或子死腹中。

处 方：粽粑叶根〔90〕一握 酒適量

用 法：將藥搗爛，用適量水煎取半碗或一碗，并用適量酒沖藥湯服。

疗 效：韦××妻等人難產或子死腹中，均以上方治而產出。

来 源：馬山县紅旗公社中醫院 韦續业

人 工 流 产 方

处 方：牙皂七分 天花粉七分 云麝香二分 葱白汁適量

用 法：先將牙皂、花粉二味研為細末，葱白汁和勻為丸，外滾麝香，用綢布包住，再用絲綫扎口，留綫二尺，將丸外余綢布剪去即妥。用時先將藥丸用針刺通，放進宮口半里半外處為當，一般放藥一天左右取出即可。

疗 效：（一）蔣××，女，二十三歲。受孕四個多月，來婦科門

診要求人工流产。該孕婦前曾正常分娩二胎，住院后施放中藥人工流产丸，放藥无副作用，一般和平常一样，沒有任何感觉。第二天出院照常工作。到放藥后第十天有点腰胀肚痛，下腹不舒，阴道少許流血，发作不到二小时，胎儿及胎盘順利产出，产后流血不多，三天照常上班；（二）唐××，女，年二十二。受孕五十天来我科检查，要求做人工流产，住院第二天施放中藥人工流产丸后，无任何感觉和副作用。該孕婦当天出院，照常上班，直到第三天感到下腹部有点胀，阴道有少許流血，和正常月經血一样，直到流血后的第三天，順利的将胎儿及胎盘完整产出，产后一般都很正常，沒有住院，休息三天后照常上班。

来 源：全州县人民医院妇产科

难产針灸療法

主 治：妇女难产。

取 穴：关元 石門 至阴（两穴同时針刺）內庭 合谷 三阴交

手 法：兴奋。

疗 效：郑××，女，三十七岁。已产六胎，第二胎即患子宮下垂，至今已二十年。发育正常，营养中等，妊娠已八个月，于1958年3月30日上午即破水，但当时尚未感觉任何不适，当天仍参加劳动，至夜回来，即觉腹痛腰胀，臥床分娩，第二天早上即叫接生員前往接生，当时子宮全开，已能看見儿头，但由于早期破水，且患子宮下垂，子宮收縮松懈，因而陣縮力很不規律，所以延至31日下午十二时仍不能产出，后叫我院保健員刘同志 前往診治，检查结果，胎位正常，使用縫衣針速刺上列穴位，經過半小时后，陣縮規律而且輕密，随而胎儿产下，母子平安。

来 源：崇左县山圩公社医院

針灸麻醉人工流产及刮宮

取 穴：上合谷雙 足三里雙 梁丘雙

手 法：上穴均針，用强刺激手法，留針进行手术，在手术过程中不时捻动，术后出針。

疗 效：本院曾采用本疗法代替麻醉，进行五例人工流产后不全流产刮宮，在手术过程中，受术者均不感痛苦，茲举二例：
（一）曾××，女，二十五岁。用中葯引产后，不全流产刮宮，术前及术时取上穴針刺麻醉，术时及术后，患者未感任何痛苦，术后即能进食；（二）容××，女，二十八岁。人工流产刮宮，术前术时取穴作針刺麻醉，术后无任何痛苦，第二天出院。

来 源：柳州专区人民医院妇产科

产 后 类

治 产 后 腹 痛 方

一 方

主 治：产后腹痛，兼治血崩。

处 方：挖不尽根（又名酸藤）〔91〕三兩

用 法：将生葯根切片，用小雄鷄肉同煮湯一碗，冲酒服。

疗 效：韦××之妻患血崩，又××，产后腹痛，均用此方治愈。

来 源：鹿寨县 馮庆桓

二 方

主 治：产后瘀血积滞在中、下焦，腹痛，胁痛，或腰膂間刺痛。

处 方：当归三錢 生地三錢 桃仁三錢 紅花一錢 枳壳一錢 赤芍

三錢 柴胡二錢 桔梗二錢 甘草一錢 川芎二錢 牛膝二錢

用法：用適量水煎取半碗，作一次服，病不甚嚴重的，可分為早晚空腹時各服一次。

功用：活血散瘀。

療效：本方出王清任醫林改錯一書，先後以之治愈韋××妻等多人，產後瘀痛。

來源：馬山人委衛生科 藍紫瑞

治產後瘀血發狂方

主治：產後二、三天，身發高熱，譫語發狂，口渴，舌質紅紫干燥，惡露淨盡，脈數有力。

處方：益母草三錢 丹參三錢 歸身四錢 益元散五錢 桃仁二錢 生藕汁一杯（沖服） 童便一杯（沖服）

用法：水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

療效：××之妻，產後二、三天，患高熱，譫語，口渴，診所醫師以白虎湯加減治療，并注射西林針，病不退。次日晚上譫語加劇，咒罵不避親疏，四周亂走，身熱，口渴，舌質紅紫干燥，兩目對人疾視。問其夫知病者惡露已淨，斷為產後瘀血未清為患。處本方預服，翌晨八時病者神智已清醒，口尚略渴，舌質紫色退清，脈略數，仍照原方再服，病者已安靜，暫停服藥，數天后再進調治藥一、二劑而愈。

來源：廣西中醫專科學校 覃文德

治產後敗血方

主治：產後惡露不行，敗血上攻，發熱頭痛，失眠，譫語。

處方：五靈脂五錢 蒲黃三錢 丹參八錢 荊芥三錢（炒） 益母草三錢 川芎二錢 當歸四錢 澤蘭三錢 正血珀末一錢（沖服） 延胡三錢 童便一茶杯（沖服）

用法：水三碗，煮取一碗半，一日分二次服。

功用：活血，逐瘀。

疗效：楊××，女，三十二岁。小产后，精神不适，間有发热头痛，睡难入寐，寐則囁語，脉弦紧。系恶露不行，敗血上攻所致，以本方治疗，連服三剂，諸症減輕，原方加桃仁三錢，当归、川芎加倍，繼服三剂痊愈。

来源：广西中医葯研究所 林位乾

治 胎 盆 不 下 方

一 方

主治：胎盆不下。

处方：鮮鸡蛋一只

用法：将鸡蛋两头各打穿一孔，一小一大，倒出蛋清頓服，約数分鐘見效。

疗效：本方曾治愈十多人，效果很好。

来源：崇左县左州公社医院 黃大志

二 方

主治：产后胎衣不下。

处方：鮮荷叶一張

用法：用水一碗半，煮取大半碗服。

疗效：桂平黃××妻，产后三天胎衣不下，服葯未效，至第四日，发现小部分胎衣下达产戶，无法取出，繼又自縮入，至第五天胎衣仍未下。用鮮荷叶一張煎服，胎衣脫然而下。

来源：广西中医葯研究所 林位乾

編者按：救急方：治胎衣不下，荷叶炒香为末，每服二錢，沸湯或童子小便調下，或燒灰煎汁皆可。

治产后关节痛方

一 方

主治：产后关节剧痛，卧床不能轉側。

处方：防风二錢 黃芪五錢 桂枝三錢 白芍三錢 大棗四枚 当归四錢

用法：水二碗，煮取半碗服，渣再用水一碗半，煮取半碗服，二次一日服完。

功用：补营卫，行气血，疗血痺、风痹。

疗效：甘××，女，二十八岁。产后遍体关节剧痛，卧床不能轉側，日夜呼号。在中医院門診治疗，处以黃芪五物湯加減（即本方），三剂好轉，五剂能行，八剂痊愈。

来源：广西中医院 党紹从

二 方

主治：产后全身关节疼痛。

处方：桂枝三錢 白芍四錢 生姜三錢 紅棗三錢 当归五錢 黃芪四錢

用法：水二碗，煮取一碗，一日分二次服。

疗效：黃××，女，三十二岁。产后一月多，全身关节疼痛，尤其髌关节及膝关节为甚。服本方四剂，关节疼痛基本好轉，繼以当归五錢、黃芪（炙）四錢，二服痊愈。

来源：隆林县人民医院 江汉光

治产后身痒方

主治：产后身痒，周身如蚁咬。

处方：柴胡一錢五分 当归三个（切碎） 熟地四錢 炙芪一錢五分 白芍二錢 炙草一錢 桃仁一錢 炮姜一錢

用法：上八味用双蒸酒一斤，以炭火熬成四两飲之。

功用：养血行瘀，宣暢祛邪。

疗效：此方治愈患者很多。如謝××，产后得周身如蚊咬之症，多方治疗无效，服本方一剂，病症大減，繼剂痊愈。

来源：广西中医院 伍紹岐

編者按：本方当归重量約三至五錢。

治 无 乳 方

主治：妇女产后无乳或乳少。

处方：生北芪一兩 归身八錢 白芷五錢 另猪前蹄一對

用法：先用水三碗煎猪蹄全熟，去蹄，吹淨浮油，然后将此湯和药同煎成一大碗，去渣，空腹溫服，服后，臥片刻即有乳。

附注：1.新产无乳，不用猪蹄，只用水酒各半煎服。2.体壯者加好紅花二錢。3.一服未效，可再服。

疗效：（一）曾××，新产已数日，无乳哺子，处本方加紅花二錢，用酒水各半煎服，一剂即有乳；（二）××妻，四十岁，每次产子，当时必无乳，有亦很少，一服猪蹄方，其乳即多。

来源：貴县万石新圩乡 譚灿南

治产后大便难方

主治：产后血虛津乏，能食，大便难。

处方：济川煎加減：熟地一兩 淡苳蓉六錢 天冬三錢 当归四錢
党参五錢 陈皮一錢五分 枳实一錢五分（炒） 牛膝二錢

用法：水两碗，煎取一碗，一日分二次服。

功用：补血增液，生津助气。

疗效：陈××，女，三十八岁，貴县人。产后虽能食，但大便欲解不解，十多天未解。舌色前半紅嫩，口微干，头汗出，

心煩不寐，脉細略數。服本方一劑，便通病愈。

来 源：广西中医葯研究所 梁友南

崩 帶 類

治 崩 漏 方

一 方

主 治：血崩不止。

处 方：旱蓮草一兩 田七（研細末）一錢

用 法：水二碗，煎取一碗，作一次或日分二次，送服田七末。

疗 效：蔡××，女，二十二岁。血崩不止，經用胶艾四物湯及十灰散等治疗无效，后用本方治愈。

来 源：岑溪县大滙中心医院 陈克言

二 方

主 治：妇女血崩。

处 方：生苦艾叶（即益母草）一至二兩

用 法：捣溶絞取自然汁服，或口嚼烂吞服其汁。

功 用：溫气血，逐寒湿，調經，止崩漏。

疗 效：我母，曾因血崩，用之奇效。

来 源：广西中医专科学校 謝崇源

三 方

主 治：妇女血山崩。

处 方：松笔一握 烧酒适量

用 法：将松笔槌烂冲酒服，如不能飲酒者，冲滾开水加些酒服亦可。

療效：本方系我外祖母張氏驗方，經治愈張××

來源：北流縣 陳盛福

四 方

主治：婦女血山崩。

處方：滿堂紅（即雞冠花） 蒲黃炭各五錢

用法：水二碗，煮取一碗，加適量酒沖服。

功用：和營，止血。

療效：李××，患血崩，經用本方治愈。

來源：北流縣 萬興六

五 方

主治：婦女血崩。

處方：蓮蓬壳三個

用法：將蓮蓬壳燒焦研末，用熱酒作一次沖服。

療效：韋××等，或血崩，或小產後流血不止，均用此方治愈。

來源：鹿寨縣 梁炳權

六 方

主治：婦女血崩，咯血亦治。

處方：潔淨沙紙三張（大張沙紙更好）

用法：將沙紙三張燒成炭存性，研細末候用。每日二次，每次二錢，用酒或開水沖頓服。

療效：彭××，患血崩，當時曾用膠艾四物湯治療，但血不止，當晚十一時左右，不能行。使人來醫院要求出診，囑其回去將潔淨沙紙三大張燒成炭為末沖開水頓服，血即停止，次日能步行到醫院門診。

來源：崇左縣第二人民醫院 熊 濤

七 方

主 治：妇女血崩。

处 方：干木耳(普通食用的木耳)一两 粽巴叶[90]的根(生的)一两

用 法：将上药烧炭存性，研为细末，用开水冲服。每次服三至五钱，隔两小时服一次。

疗 效：覃××等十余人患血崩，均用本方治愈。

来 源：马山县人民医院 黄日煊

八 方

主 治：妇女血山崩(子宫出血)。

处 方：生鸡血一付 百草霜一钱

用 法：鸡血和百草霜拌匀，放锅内炒焦黑，水煎，澄清温服，一次服完。

功 用：补血止血。

疗 效：萧××、朱××，二人血山崩，均用本方治愈。

来 源：北流县英雄公社蟠龙工区卫生所 梁家成

九 方

主 治：妇女血山崩，或小产血不止。

处 方：鸡肝脏一付(临时从活鸡腹取的) 米酒四两

用 法：生鸡一只乘活剖腹取出肝脏，去胆捣溶和酒煲滚温饮，一次服完，不能饮酒者，可将酒酌减。

疗 效：郑××，1950年冬，小产流血不止。曾××，1951年7月血山崩，流血甚多，势甚危急，均以本方治愈。

来 源：北流县塘岸医药研究所 罗家葵

十 方

主 治：血崩不止。

处 方：百草霜一至二兩

用 法：將百草霜研末，沖開水一碗，俟澄清取水一次服。

疗 效：韦××妻，五十四岁。从田间工作回家，突然血崩，腹剧痛，呻吟不絕。与百草霜一两，研末沖開水，以消毒紗布滤过飲之，十五分鐘后血即停止。

来 源：岑溪县太阳公社 张九华

十 一 方

主 治：血崩。

处 方：党参五錢 百草霜一兩

用 法：用水將党参浓煎，沖百草霜頓服。

功 用：补气，止血。

疗 效：赵××妻，三十八岁。1957年血崩，經用止血营养剂治疗数日无效，后服本方而愈。

来 源：岑溪县太阳公社 甘均权

十 二 方

主 治：妇女血崩。

处 方：炒蒲黄三錢 炮干姜三錢 百草霜三錢

用 法：用适量水煎取二茶杯，分二次服。

功 用：止血。

疗 效：蓝××、黄××等人患血崩，均用本方治愈。

来 源：馬山县古零公社 銀世开

十 三 方

主 治：妇女血崩，流血不止。

处 方：棕根炭一兩 木耳炭一兩 阿胶四錢 白芍四錢 地榆炭四錢
生地四錢 当归四錢 蒲黄炭三錢 烏賊骨二錢

用 法：用适量水煎取一碗，分三次服，每隔四小时服一次。

功用：育阴，止崩。

疗效：某妇女，忽患血崩三天不止，已昏迷不醒，服用此方，一剂崩止，第二剂加入补药即转危为安。

来源：马山县周六公社中心医院 罗建邦

十四方

主治：妇女血崩。

处方：木耳二两 归身四两 老棕四两（煨研末）

用法：先煎木耳、归身成汤后，冲棕炭末服。

功用：活血，止血。

疗效：有妇女三人先后患血崩症，均以本方治愈。

来源：北流县六麻卫生所 龙德彪

十五方

主治：妇女血崩不止。

处方：北芪五钱 防党五钱 归身四钱 陈皮二钱 艾叶三钱
炙草二钱 柴胡二钱 升麻二钱 白朮四钱 姜炭二钱
阿胶珠三钱

用法：上药除阿胶珠外，用水三碗煮取一碗半，去渣，纳阿胶珠溶化后，分二次服，每隔二小时服一次。

功用：升补，止血。

疗效：一妇女血崩不止，自晨至午，气息言语低微，势甚危急，用本方治疗，一剂获效。

来源：广西中医专科学校 叶缦卿

十六方

主治：妇女血崩，连续不绝，眩暈腰痛，神气虚怯者。

处方：黄芪二钱 党参五钱 升麻一钱五分 白朮三钱 炙草一钱五分
炮姜四钱 大枣三钱 陈皮二钱 龟板四钱 竹茹三钱 阿胶

三錢 艾叶三錢

- 用法：**用适量水煎取半碗，分二次服，一日一剂。連服三天。
- 附注：**上病如兼大便下血者，加补骨脂三錢、益母草三錢同煎。
- 疗效：**朱××，女，产后三十天，血流不止，兼大便下血，用上方加补骨脂、益母草，連服三天痊愈。
- 禁忌：**忌食糯米、魚腥、酸、冷等味。
- 来源：**馬山县永州公社 洗鴻儒

十七方

- 主治：**妇女血崩，兼見寒热往来，眩暈腹痛等症狀。
- 处方：**柴胡二錢 薄荷一錢五分 当归三錢 白芍三錢 白朮二錢 茯苓二錢 炙草一錢五分 田七一錢五分 丹皮一錢五分 炒山枝二錢 阿胶三錢 地榆三錢 黑姜二錢
- 用法：**用适量水煎取半碗，去渣，加入阿胶微火溶化，分作二次服，每天一剂，連服三天。
- 疗效：**黃××，女，成年人。妊娠漏血，繼則小产，流血不止，肚痛，寒热往来，起床不得。服西药六天不愈，后改用本方，服两剂而愈。
- 禁忌：**忌食酸、腥、辣等味。
- 来源：**馬山县永州公社 洗鴻儒

十八方

- 主治：**妇女崩漏。
- 处方：**地榆一兩 米醋四兩
- 用法：**先煎地榆，湯成冲米醋服。
- 功用：**收斂，止血。
- 疗效：**經龙工区潘四奶，患血山崩，以本方治愈。
- 来源：**北流县經龙工区 黎信利
- 編者按：**本方出圣惠方，治妇女漏下，赤白不止，黃瘦，地榆三

两，米醋一斤，煮十余沸，去渣，食前稍热服一合。余无言編著金匱要略新义：地榆一两，苦酒半斤，置砂鍋中，慢火煎，耗至一半，分四次服，一日服完，余氏采用治愈唐家湾錢××妻，年近四旬，患漏經已十二年。

十九方

主治：妇女血崩，淋漓不断，或小产流血不止。
处方：归身一兩 川芎五錢 益母草一兩
用法：用酒煎，去益母草，連渣服食，一日分三次服。
功用：和血，活血，止崩中漏下。
疗效：曾用本方治愈郑××等三人小产流血不止。
来源：北流县香塘医院 苏美章
编者按：本方即佛手散加益母草。

二十方

主治：血崩或經痛，淋漓不止。
处方：川芎三錢 当归五錢 炒白芍五錢 防风二錢 厚朴二錢 荆芥炭三錢 山楂炭四錢 黑梔(醋炒)三錢 炒蒲黃一錢五分 阿胶三錢 艾叶三錢
用法：用水二碗，煎取一碗，作一次服。
疗效：李××、黃××，均用此方治愈。
来源：柳州市中医診所 石杰生

二十一方

主治：妇女行經，变成崩漏，淋漓不止而属虛弱者。
处方：熟地一兩 当归五錢 白芍(酒炒)三錢 川芎(酒炒)三錢 白朮五錢 萸肉三錢 黑芥穗三錢 續斷一錢 甘草一錢
用法：用适量水浓煎取一碗，分二次早晚服。
附注：本方病輕者服五剂以上可愈，重者須服十剂以上才得痊

愈。但服二、三剂后須加党参五錢同煎服，以促收效。

功用：滋阴，止漏。

疗效：譚××經行不止，變成崩漏，身体消瘦，呈現慢性貧血，不思飲食，全身无力，头暈眼眩，面色萎黃等症，投以此方，連服數剂而愈。

来源：馬山县人委卫生科 藍紫瑞

二十二方

主治：初起漏下，漸成大崩，面色蒼白，或兼四肢末端微冷，脉微弱。

处方：蜜炙北芪二兩 蜜炙防党一兩五錢 当归六錢 蜜炙甘草三錢
血余炭一撮（白布包煎）

用法：水八百毫升煮取二百毫升，頓服，一日服兩剂。

功用：补血，补气，止血固脫。

疗效：本方系先人傳授，經多次臨床實用，疗效卓著。

来源：广西中医专科学校 林沛湘

二十三方

主治：妇女經来，崩漏不止，面无血色，唇口淡白，心悸不宁，精神不振，脉迟緩細弱。

处方：白朮四錢 炙芪五錢 茯神三錢 防党五錢 远志二錢 木香一錢五分（后下） 炙草三錢 枣仁三錢 元肉三錢 归身四錢 阿胶三錢 艾叶二錢 棕炭一錢五分

用法：水三碗，煮取一碗半，一日分三次服。

功用：补血，止血。

疗效：梁××妻，四十岁。突患血崩，大下不止，面无血色，唇口淡白，心悸，神倦，脉迟緩細弱。以本方治疗，服药后，下血已止，再将原方去胶、艾、棕炭連服三、四剂而愈。

来源：广西中医专科学校 覃文德

編者按：本方即濟生方歸脾湯加阿膠、艾葉、棕炭。

血崩針刺療法

主治：子宮出血（血崩）。
取穴：三陰交（雙） 關元
手法：用興奮法，留針三至五分針。
療效：本法經治療六例，均針刺一至二次即生效。
來源：天等縣天等診所 趙沛成

子宮出血針灸療法

主治：子宮出血。
取穴：三陰交（雙）
手法：抑制。
療效：曾××，女，入院時，陰部流血已十多天，過去每月月經來潮，都是很久才清淨，這次最嚴重，經用中藥治療十餘天均不能止血。入院後，曾用各種止血劑也未見效，後改用針灸療法，僅針二次，血流減少，四次血流停止，症狀消失。
來源：崇左縣第二人民醫院

血崩艾灸療法

主治：婦女血崩。
取穴：隱白 大敦 三陰交 血海
灸法：用艾條雀啄灸法。
療效：曾用本法治療十四例血崩患者，均愈，茲舉例如下：黎××，女，二十四歲。產後血崩不止，昏迷不省人事，面色青白，脈沉細而遲。取上穴共灸十分鐘，血止而清醒。
來源：象州縣妙皇公社中心醫院 胡文

治 白 帶 方

一 方

主 治：婦女白帶，小便渾濁，阴道脹痛，流出腥臭粘液，體倦消瘦。

處 方：紅薏麻蘆一兩 假土薏米[92]（又名串珠子）一兩

用 法：上藥加瘦豬肉或豬骨頭用水適量煎服，每隔三天服一劑，連服七至九劑。

療 效：解放前曾用本方治療白帶患者三十九例，均愈。1956年，王××，女，三十六歲。患白帶，經服本方七劑而愈，至今數年未見復發。

來 源：蒙州縣妙皇公社中心醫院 胡 文

二 方

主 治：婦女白帶。

處 方：杉木汁五分 陳皮二錢 豬大腸約一尺

用 法：將陳皮燒炭（存性）為末，入杉木汁為丸放入大腸內，將大腸蒸熟服，若無大腸，用酒沖服，每日照以上分量二次服完。連服兩星期即愈。

療 效：覃××，女，曾患此病，以上方服十多天即愈。

來 源：馬山縣林圩制藥廠 何兆權

三 方

主 治：婦女阴道時流粘液，狀如鼻涕，色白或黃，或稀或稠，面色無光，腰腿痠痛，頭昏眼花，氣短少。

處 方：傅青主女科易黃湯：山藥一兩 芡實一兩 黃柏二錢（鹽水炒）
車前子一錢（酒炒） 白果十枚（去壳）

用 法：用水三碗，煮取一碗，渣加水二碗煮取一碗，一日分二

次服。

功用：利湿，补督任脉，治带下，黄带尤效。

疗效：（一）王××，女，二十八岁。黄白带下，白多黄少，食欲不振，服本方十剂痊愈；（二）张××，女，三十岁。白带时流，兼有怔忡，本方加枣仁，九剂痊愈；（三）邓××，女，二十九岁。患带下，眼花，本方加杞子，连服十天而愈；（四）梁××，女，二十四岁。时时带下，常失眠，本方加枣仁，服药七剂病即愈；（五）梁××，女，三十二岁。带下不思食，本方加山楂，八服病愈；（六）叶××，女，二十三岁。经后腹痛白带，本方加芍药，服药六剂，腹痛带下均止；（七）王××，女，二十六岁。带下继续不已，本方加椿皮，八服而愈；（八）张××，女，二十八岁。带下清稀，身体虚弱，本方加北芪，服药十剂，带止身健；（九）余××，女，三十岁。带如米泔汁，气虚体倦，本方加党参，九服而止；（十）李××，女，二十四岁。患白带，时多时少，淋漓不止，治疗数月未愈，本方加海螵蛸，六服痊愈。

来源：广西中医院 党绍从

四 方

主治：妇女流白带。

处方：川太 土薏米各五钱 黄柏 泽泻 朱苓各三钱 茯苓四钱
苍朮 台乌各二钱 乌贼骨一钱

用法：用适量水煎取一碗，一天分三次服完。

功用：清湿热，止带下。

疗效：谢××等，患白带已一年多，曾到医院治疗，效果不著，后服上方五剂而愈。

来源：马山县周六中心医院 罗建邦

五 方

主 治：妇女赤白带下。

处 方：貫众四兩 酸醋一斤

用 法：用醋同貫众煎透，取出晒干，研末，炼蜜为丸如豆大，每日服二次，每次五錢，米湯送下，飯前服。

功 用：清湿热，止带下。

疗 效：吳××妻、薛××妻，均患带下，都用本方治愈。

来 源：北流县新菜工区卫生院 玉琼德

編者按：本方出妇人良方，即独圣湯制丸。

六 方

主 治：妇女赤白带下，月經不調，經前后腹痛。

处 方：丁貴草[93]五錢 北芪八錢 防党六錢 川杜仲八錢 故紙八錢
苏尾魚一條（約六至八兩重，去腸臟）

用 法：用水三碗，双酒二兩，共煎至一碗半，分两次服，早晚空腹服。

疗 效：吳××，女，二十七岁。周××，女，二十九岁。徐××，女，二十八岁。徐××，女，二十三岁。四人同患带下，月經不調，均用本方治愈。

禁 忌：服藥期間，忌食生冷寒凉等物，忌房事三十天。

来 源：貴县八塘公社横岭 楊树容

七 方

主 治：赤白带下无度，精血亏损，肌肉消瘦。

处 方：加味四物湯： 川芎三錢 当归四錢 白朮三錢 白芍三錢
熟地四錢 鸡冠花子二錢 蓮米三錢 扁豆三錢 炙草一錢

用 法：用水二碗，煎取一碗，早晚分两次空腹服。

功 用：益阴，健脾胃，除湿滞。

疗效：何××，女，已婚。因湿郁于任脉，渗入膀胱，以致津液变为赤白而下。治宜益阴补脾养胃以除湿滞，并忌食厚味，本方连服三个月而病除。

来源：贵县大圩区东沅乡 何敏求

八 方

主治：妇女黑带，小便痛，口渴，黄瘦，烦躁。

处方：黄连 生大黄 王不留行 赤苓 刘寄奴各三钱 车前子三钱
白朮五钱 知母二钱

用法：用适量水煎取一碗，分二次服，一日量。

功用：清热利湿，解毒散瘀。

疗效：池××妻患此病，瘦弱，食少。服上方四剂而愈。

禁忌：服药期间，忌酒及炙炒食物，孕妇忌服本方。

来源：马山县人委卫生科 蓝紫瑞

阴 挺 类

治 阴 挺 方

一 方

主治：妇女产后阴挺（子宫下垂）。

处方：金菜茹[94]（即萱草根）二两 鸡一只（约一斤）

用法：将鸡杀死去肠杂，洗净，把药放鸡肚蒸熟，连鸡药尽食之，每日食一次，连食二、三次。

疗效：那密屯徐××、坡担屯李××等数人，因产后子宫下垂，均用此方治愈。

来源：马山县石塘公社制药厂 黄之寿

二 方

主 治: 阴挺，不論新久及脫出程度如何皆治。

处 方: 連壳絲瓜絡一兩

用 法: 將連壳絲瓜絡燒存性，趁熱研成細末，盛于杯中，速沖三花酒四兩，密蓋勿令泄氣，約十至十五分鐘后，分二次早晚服，每日服一劑。

疗 效: 本方系宜山县怀远搬运社宋秀英祖傳秘方。她本人患子宮脫垂已十多年，曾至柳州××醫院手術治療愈而復發，乃將本方試用，僅服三劑而愈。我站經用于臨床治療子宮脫垂患者六例，觀察效果極顯著，其中子宮脫出程度，一度者三例，二度者三例，脫出年限：二十七年一例，十九年一例，十年一例，三年二例，八個月二例。一般服藥三至五日即發生療效，脫出子宮能自然縮上，連服幾日后，行路及參加勞動均不脫出。在服藥期間，我站還配合用益母草、枳壳各五錢，煎水熏洗患處，每天一次，如無分泌物者可不用熏洗劑。

来 源: 宜山县第一人民医院 宜山县妇幼保健站

三 方

主 治: 子宮下垂。

处 方: 蝦子窩二兩

用 法: 用蝦子窩五錢，煎好約一茶杯水一次溫服，每天服二次，另用蝦子窩五錢煎水約一碗，外洗子宮下垂部位，每天早晚各洗一次。

疗 效: 本方為祖傳驗方，曾治療一百余例，不論新舊子宮下垂均獲痊癒。如：林××，女，三十歲。患子宮下垂已半年，曾到平樂醫院住院治療四十天未愈。于1959年4月經用上方治療，內服外洗兩天痊癒。

来 源: 鹿寨县头排医院 邱国汉

四 方

主 治：子宮下垂。

处 方：鷄頭茹湯：鷄頭茹〔95〕五錢 千斤拔〔96〕三錢 黃花草〔18〕三錢
假從蒿〔97〕三錢 匙羹藤〔98〕三錢 檳榔二錢 豬七寸一條（直腸）

用 法：將上藥混合搗碎，灌入豬七寸內，用綫扎好兩頭，適量水煲至爛，連水一次服完。

附 注：如找不到黃花草、假從蒿，可以用紅蓖麻葉代替。

疗 效：黃××，女，六十歲。子宮下垂十四年，初時子宮脫出陰戶約有一寸，後脫出更甚，同時硬化（脫出陰戶約四寸左右），且常有血流出。于1957年12月，用海桐皮四兩煎水洗滌，每天三次，連洗三天，脫出部分變軟，但沒有絲毫收縮，後改服鷄頭茹湯煲豬七寸三次，外脫部分全部縮入，再繼續服用三次，完全治癒。

来 源：崇左縣山圩公社醫院

五 方

主 治：子宮脫垂，不論久暫。

处 方：紅蓖麻葉六兩 三花酒適量 食鹽適量

用 法：把紅蓖麻葉搥溶加適量酒和鹽同炒，炒時不要炒太熱，炒至燙手為度。晚上或白天將藥敷在頭頂上（百會穴），用干布包好，連續敷包三晚或三日，收縮後即將藥除去。敷藥前，先用肥皂水將子宮脫出部洗淨，以免敷藥後子宮收縮，將病菌帶入陰道，引起其他疾病。

疗 效：東門公社採用本方治療子宮脫垂六十七人，療效很高。

来 源：東門公社舊城接生員 全德美母親

六 方

主 治：子宮脫垂。

处 方: (一)内服方: 加味补中益氣湯: 黃芪 党参 当归
陈皮各三錢 白朮 柴胡 升麻 杜仲 續斷 桑寄生各二錢
龙骨 牡蠣各二錢 姜枣为引

(二)外熏方: 蜂房 艾茸

(三)巩固疗效方: 党参 当归 白朮 薏仁各三錢 甘草
升麻 五味 桔梗 牡蠣 广皮各二錢 黃芪 沙参各五錢

用 法: 内服方: 用水二碗, 煎取一碗半, 分两次服。

外熏方: 先将蜂房研成粉末, 再加少量艾茸即 $\frac{2}{3}$ 蜂房末
 $\frac{1}{3}$ 艾茸, 用沙紙一条, 約一尺长, 三寸闊, 将蜂房艾茸
放紙上卷成如蚊香样大, 将两端空紙粘好备用。

另用硬紙卷成一个喇叭形圓筒, 大口罩脫垂处, 然后将药条
点燃, 由硬紙筒小口进入直接熏子宮, 熏后做膝胸臥势十
五分鐘, 一日熏两次, 每次三十分鐘, 繼續五至八天(即
服药五至八剂, 熏十至十六次), 如收縮后的子宮位置稳
定, 又給患者服巩固疗效药二、三剂。

疗 效: 黎××, 二十五岁。1959年2月入院。自訴: 八年前足月
順产一胎(第一胎), 因产后参加体力劳动过早, 随着子宮脫
出, 經中西医治疗无效。检查稍貧血, 除了宮頸肥大为第三
度脫出, 有輕度糜烂外, 其他均正常。入院第二日, 开始服补
中益氣湯, 及用蜂房艾茸局部熏治脫出子宮, 每日两次, 每
次三十分鐘, 熏后即刻做膝胸臥位, 約十五分鐘, 这样治疗
三天后, 子宮自动縮回。后繼續治疗三至四天, 完全恢复。

禁 忌: 在服药熏药期間及愈后二十多天內不可做重体力劳动。

来 源: 賀县八步中心人民医院

癥 瘕 类

治 癥 病 方

一 方

主 治：妇女癥病，月經不調，小腹結块，疼痛。

处 方：当归五錢 白芍八錢 茯苓一兩 白朮五錢 柴胡二錢 丹皮三錢 梔子三錢 首烏五錢 海螵蛸一兩 刺蒺藜八錢 香附四錢 甘草三錢

用 法：水三碗，煮取一碗，一日分二次服。

功 用：活血，散瘀，解郁。

疗 效：陈××，女，二十六岁，住南宁。1951年3月，曾經人工流产一次，以后月經每次量多，至1952年冬，下腹疼痛，按之如有凝結物，后逐渐显著而成硬块，經某医院妇科检查，确診为子宫瘤，服葯无效，特来我院求診。診斷：肝郁血凝，子宫癥病，用本方治疗，服葯三剂，疼痛輕減，五剂硬块略消，共服葯二十剂，硬块消失，經医院检查，認為子宫瘤全部消失痊愈。

来 源：广西中医院 张汉符

二 方

主 治：妇女癥瘕，月經不調或閉經，小腹有硬块、疼痛、或腹肿胀。

处 方：桂枝三錢 桃仁三錢 丹皮三錢 芍药三錢 云苓三錢

用 法：适量水煎一次服。

疗 效：貴县城关区旺岭屯梁××妻，四十多岁。瘀阻成癥，肌肉消瘦，腹大，小腹胀滿，月經量少。在卫生保健所治疗无

效，到貴县中心联合診所治疗，認為妊娠漏血，經多方治疗，病亦如故。患者于1955年冬来我診所治疗，处以本方，服藥两点鐘后，腹痛腸鳴，即時大下瘀血，腹脹即除，腫大亦消，后以补益气血之剂調理，漸复健康。

来 源：广西中医院 溫国仁

編者按：本方即金匱桂枝茯苓丸。

阴 痒 类

治阴痒（滴虫病）方

主 治：妇女阴戶痒。

处 方：蛇床子40% 川連17% 冰片2% 二二三（即滴滴涕）1%
白蜜40%

用 法：先将前四味共为細末，后将白蜜熬十分鐘，然后放上藥末拌勻，制成长卵形丸，每丸重約一錢。每晚睡时用一丸納入阴道，以一星期为一疗程。

疗 效：用本方曾治愈十五例，茲举一例如下：

张××，女，三十六岁。患此症已有十二年，經多方治疗无效，用本方治疗一星期即愈。

来 源：融安县龙妙民办医院

性交出血类

治性交出血方

主 治：每遇性交，阴戶出血。

处 方：引精止血湯：白朮一兩（土炒） 熟地一兩（九蒸） 人參五錢
萸肉五錢（蒸） 茯苓 荆芥穗 車前（炒）各三錢 黑姜一錢

黃柏五分

用法：用水三碗，煮取一碗，一日分二次服。

療效：曾用本方治療三人皆愈。舉例如下：

甘××，女，二十八歲，容縣人。每遇房事出血，于1954年春來就診。診之，脈尺弱而瀉，瀉屬血滯，乃月經未淨，陽精遽冲，集成敗血，隨動即出。據陳修國婦科雜病記載，治婦人交合出血，引精止血湯治之，嚥服十劑，後追查痊愈，未見復發，1957年產一子。

來源：廣西中醫藥研究所 李慶云

麻 疹 类

治 麻 疹 肺 热 方

一 方

主 治：麻疹，胸高气喘，鼻翼扇动（麻疹合并肺炎）。

处 方：新鲜牛粪一斤 生石膏粉二两 凉水一斤

用 法：将新鲜牛粪放于瓦片上，用文火焙至枯黄色，置于地上去火毒，待冷后，与石膏粉混合，另外取凉水一盅（鲜井水最好约八百毫升），将混和的牛粪石膏粉与凉水搅匀，候其澄清，取上面清水服用。一至两岁每次服五十毫升，三至五岁每次服一百毫升，每日服五次。

疗 效：本方乃平乐县人民医院岑权高祖传秘方，并经岑权高临床治愈麻疹合并肺炎患儿很多，举例如下：

刘××，男，一岁又六个月。麻后咳嗽气紧，鼻扇，声哑，口渴，唇枯燥，服药五百毫升，症状消失痊愈。

来 源：平乐县人民医院

二 方

主 治：高热不退，咳嗽气喘，呼吸困难，鼻翼扇动（麻疹合并肺炎）。

处 方：黄芩三钱 芦根三钱 桑白三钱 瓜蒌子三钱 葶苈子一钱
莱菔子三钱 麦冬二钱 百部三钱 知母三钱 杏仁一钱五分
麻黄二钱 石膏三钱 甘草二钱

用 法：用水两碗，煎取半碗，一次顿服，日服两剂，六小时服一次，小儿分三次服，三小时服一次。

疗 效：曾用本方治疗麻疹合并肺炎十八例，均愈，兹举一例如下：

廖××，男，一岁又六个月。患麻疹合并肺炎。于1959年元月16日到所急診。症状：麻收后，热不退、咳嗽、气喘、神昏，呼吸困难，听診心跳頻数，肺有干囉音，体温40.2°C，用上方治愈。

来 源：柳州市联合診所 袁其謀

三 方

主 治：疹点紅赤，或顆粒不分，片片相連，面紅耳赤，唇干，舌紅，煩渴引飲，咳嗽頻頻，气粗而喘，呼吸迫促，鼻翼扇动，煩躁不得平臥，发高热（麻疹合并肺炎）。

处 方：薄荷二錢 杏仁二錢 石膏一兩 甘草一錢 細辛二分 桑白皮五錢 川貝母二錢

用 法：用水二碗，煮取一碗，分四次服，每隔三小时服一次。

附 注：本方脱胎于仲景麻杏石甘湯，麻黃虽为宣肺解表药，嫌其辛溫故易以薄荷，渴者則不用薄荷而易以葛根三錢。若躁渴引飲，咳嗽不甚者，則去薄荷、細辛、川貝母，加葛根、知母，吻合仲景白虎湯的意义。桑皮、貝母为肺經专药，故加入之。而細辛一味，較为突出，鼻扇之极，在所必用，此为肺閉已甚，必藉大辛大窜之細辛引諸药急通肺窍，始能挽垂危于俄頃。

功 用：降火，清热，解毒。

疗 效：曾用本方治疗十七例，麻疹合并肺炎患者效果很好。治愈率达94.1%。本方去薄荷加葛根治疗一例痊愈。本方去薄荷、細辛、貝母，加葛根、知母治疗二例均痊愈。

来 源：广西中医药研究所 陈景义

治麻疹后肺热方

主 治：麻疹后引起肺热（病毒性肺炎）高烧，呼吸急迫，咳嗽，气粗，鼻干，昏睡，四肢厥冷，脉浮紧，喘逆时膈动，煩

躁不安，小便短赤。

处 方：生石膏八錢 桑白皮四錢 黃芩二錢 杏仁一錢五分 麦冬一錢五分 甘草一錢 正川貝一錢（研末冲药湯服）

用 法：用水二碗，煮取一碗，一日分二次服。

功 用：清热，祛痰，潤肺，定喘。

疗 效：曾用本方治疗三十八例，服药后第一天症状大减，繼續服药二、三天，症状完全消失，安然入睡，三十八例全部治愈。

来 源：天等县天等診所 赵沛成

治麻疹逆症方

主 治：麻疹刚出即沒，或疹色黯滞。

处 方：生地三錢 紫草三錢 紅花錢半 归尾錢半 玄胡三錢 芥穗二錢 連翹三錢 蝉衣十个 夏枯草三錢 甘草二錢

用 法：用水二碗，煎取一碗，一日分三次服。

功 用：活血，解毒，透疹。

疗 效：徐××，女，十二岁。患疹出而卒然收沒，疹色黯滞，神色昏迷，服本方一剂，疹色轉紅，再服二剂而愈。

来 源：岑溪县糯垌太阳公社 林开基

治麻疹后痢疾方

主 治：麻疹后痢疾。

处 方：洗手果（无患子）核三兩

用 法：煨成炭研末，投入一千毫升开水瓶中搖匀，即可待用，一日服二至三次，一个月至一岁每次二至三毫升；二至五岁每次三至五毫升；六岁以上每次五至十毫升。

疗 效：1959年在龙州县治疗十九个麻疹后痢疾小孩，仅各服一天药便告痊愈，效果很好。

来 源：龙州县中医研究所 陆巨洋

治麻后眼疾方

主治：麻后眼生白膜。

处方：海螵蛸一兩 夜明砂五錢 使君肉五錢 辰砂一錢 珍珠四分

用法：上药共为细末，每晨服五分，以米汤或开水冲服。

疗效：唐××，住谷埠下街。麻后眼起白膜，用本方治愈。

来源：柳州市柳南医疗站

编者按：麻后肝热未清，目多眵泪，最忌火烟、饭气熏眼，犯之，则往往目痛二、三天就会上膜，治当清肝退膜。

治麻后眼赤痛方

主治：麻疹收后眼红，流泪，眼珠疼痛。

处方：蒺藜六錢 防风五錢 桑白五錢 甘草五錢 蝉蜕三錢 白芍五錢 枯草四錢 黄芩五錢

用法：用水三碗，煎至一碗半，分三次服。

功用：疏风，清热散瘀，止痛。

疗效：周××，男，五岁。疹后目赤流泪，眼珠痛，用本方治疗，连服两剂而愈。

来源：柳州市联合诊所 谢绍先

编者按：以赤芍易白芍更妙。

治麻后声音嘶哑方

主治：麻疹后声音嘶哑。

处方：大玄参五錢

用法：用适量水煎浓汁半碗，冲鸡蛋黄一个温服，一日两次。

疗效：经用本方治愈患者二十四例，其中有一例配合其他药治愈，现举典型二例如下：李××，男，三岁。因患麻疹后声音嘶哑，曾服其他方药未效，后来用玄参鸡蛋黄方，每天服二次，连服三天，声音恢复宏亮。

来 源：临桂县 黄振廷

痘 疮 类

治 痘 疮 湿 烂 方

主 治：小儿种牛痘反应发痒，因抓破而致痘疮溃烂。

处 方：三六散：黄柏二钱 黄芩二钱 黄连二钱 滑石六钱
甘草一钱

用 法：共研细末过密筛，以花生油调涂患处。

功 用：清热，解毒，燥湿，止痒。

疗 效：本方是家传痘疮溃烂秘方。昭平黄姚卫生所普种牛痘时，
巩桥乡小孩多为牛痘反应发痒因抓破溃烂，卫生所用药无
效，后以本方涂治，均获痊愈。

来 源：广西中医专科学校 叶缙卿

鸪 鹑 咳 类

治鸪鹑咳（百日咳）方

一 方

主 治：咳嗽连声不绝，咳时面红耳赤，涕泪俱出，咳至痰出乃
止，状甚困苦。

处 方：牙皂一两 白矾五钱

用 法：研极细末，米糊丸如绿豆大，五岁以下服六粒，五岁以上
服十粒，白开水送下，连服十余天。

功 用：搜风痰，除咳嗽。

疗 效：本方曾治疗杨××两子女等二十多人，疗效很高。

来源：贵县工人医院 张孔修

二 方

主治：百日咳，連声頓咳不止，咳至面紅耳赤，涕泪交流，及痰出乃止。甚有咳出血者。

处方：磨盘子根〔99〕三錢 枇杷叶三錢 五爪龙根〔100〕（即金櫻根）四錢 土桔梗〔101〕三錢

用法：用适量水煎分服，不拘次数。

附注：咳血者加扁柏叶四錢。

疗效：1959年4月上旬，合群社百悟屯小孩患百日咳，用本方治疗十三例均愈。

来源：馬山县紅旗公社医院 罗日华

三 方

主治：百日咳，連声頓咳不絕，咳时面紅耳赤，涕泪交流，状甚困苦，咳至痰出乃止。

处方：麻黄一錢五分 北杏一錢 生石膏五錢 甘草一錢 胆星一錢 細辛一錢 赭石三錢 川貝一錢 百部三錢 海石二錢

用法：共为細末，按小孩年龄每个月服一分，每天服一次。一岁以上小孩每次服量不超过一錢。

附注：服药后，有恶心呕吐反应，但不严重，无须处理，吐出大量痰后，疗效更速，如无反应，效較慢。本方适宜风寒痰盛之百日咳，风燥百日咳不宜。

功用：疏肺，降逆，祛风，除痰，定咳。

疗效：曾用本方治愈数十人，举例如下：

关××，女，三岁。初患伤风咳久不愈，儿童医院鑑定認為百日咳。咳嗽連声不停，咳时面赤，涕泪齐流，胸背痛，痰胶而白，咳后有回声，咳甚則呕，呕后乃止，服本方药粉三日痊愈。

来源：广西中医药研究所 郑启明

四 方

主治：咳嗽阵挛咳，咳时面红耳赤，呼吸急促，咳后呕吐，有鸡叫状尾音，夜间尤甚，或眼球充血，或眼睑及面部浮肿。

处方：生石膏四两 川贝四两 硃砂三两 广木香二两 月石一两
代赭石一两

用法：共研细末，每日服量，一个月至五个月二至三公分；六至十二个月三至五公分；一岁至二岁五至六公分；二至三岁六至八公分；三至四岁八至十公分。上量在治疗初期每日三次分服，俟阵挛咳症状好转，可改为每日二次分服。白糖水送下。

功用：清肺，除痰，行气，降逆。

疗效：任××患阵挛咳，呼吸急促，面红耳赤，咳后呕吐，有鸡鸣状尾音，病已十四天，夜较严重，不能睡眠。诊断为百日咳。阵咳期，以本方治疗，第三天阵挛咳减少十分之七。继续服药。第五天面部及眼睑浮肿已消退，呕吐及阵挛咳完全消失。改为每日服药二次，经过两周治疗痊愈。过二星期后追查无复发。

来源：柳州市红十字会门诊部

五 方

主治：咳嗽连声不绝，尤如鸡鸣，咳时面红气喘，弯腰曲背，状甚困苦，食欲不振，口渴潮热，面部浮肿，唇裂口燥，间有咳出血丝者。

处方：百部五钱 天冬三钱 萸皮二钱 橘红一钱五分 杷叶三钱
(蜜炙)

用法：用水二碗，煮取一碗，分四次服，每隔三小时服一次。

功用：润肺，祛痰，止咳。

療效：韋××，男，四歲。患鸛鷺咳，服本方二劑而愈。

來源：廣西中醫專科學校 梁益年

六 方

主治：連聲頓咳，面紅耳赤，涕淚交流，狀甚困苦。

處方：礞石一錢五分 桑螵蛸一錢 胆星八分 杏仁一錢五分 扁蓄
二錢

用法：水一碗，煎取半碗，一日分五次服。

功用：除痰止咳。

療效：本方曾治愈永新大隊梁敬甫等一百餘人。

來源：貴縣新塘公社中醫 梁祝山

七 方

主治：百日咳，初期如感冒，但夜咳多，轉入中期則連聲頓咳，咳則連續數十聲，涕淚俱出，咳至吐出稀白粘痰或嘔吐才止，狀甚困苦，甚則眼臉浮腫，頸靜脈怒張。

處方：生地四錢 白芍二錢 丹皮一錢五分 浮海石五錢至一兩（按病情輕重增減）

用法：水二碗，煮取一碗，一日分二次服。

功用：滋陰，清熱，祛痰止咳。

療效：本方重用浮海石治百日咳，療效很高。曾治愈多例。

來源：廣西中醫專科學校 趙紹僑

八 方

主治：咳嗽連聲不止，每咳數十聲，狀甚困苦，咳必至痰出乃止。

處方：止嗽散麻杏甘石湯合方：桔梗一錢五分 百部一錢五分 荊芥
一錢五分 紫苑一錢五分 白前一錢五分 陳皮一錢 麻黃一錢
杏仁三錢 生石膏五錢 甘草一錢

用法：水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

功用：潤肺，清熱，除痰止咳。

療效：李姓小孩三歲，病如上述，治療十日無效，後用本方治療痊癒。1956年冬附近地區流行百日咳，多數病例均以本方治愈。

來源：廣西中醫專科學校 黃達金

九 方

主治：發熱陣咳，咳如鷄聲，并可作為預防。

處方：百部三錢 白前二錢 桑葉二錢 陳皮一錢 前胡一錢五分 桔梗三錢 枇杷葉（去毛）一張 甘草一錢

用法：以水浸過藥面，煎至半碗，日分三次服，服時加糖少許調味亦可。

功用：潤肺，除痰，止咳。

療效：1959年象州龍富大隊，有一百多人患百日咳，用本方治療一星期均愈。龍富大隊韋××的女孩，三歲。患百日咳一个多月，陣咳，日輕夜重，眼臉浮腫，服本方一星期痊癒。

來源：象州縣象州人民醫院 盧德生

十 方

主治：百日咳。

處方：百部四錢 白芨四錢 金銀花藤一兩

用法：將上藥切碎加水五百毫升，煎至一百毫升，加入黃糖適量調味。一歲以下每次內服十至十五毫升，二至三歲每次服二十至二十五毫升，三至五歲，每次服二十五毫升，五歲以上每次服三十毫升，每日均服一次。

療效：1958年10月忻城縣加福鄉有百日咳流行，用本方治療一百多例。

來源：忻城縣科學工作委員會

喉 症 类

治 白 喉 方

一 方

主 治：发热，咳嗽，喉痛起白膜，呼吸吞嚥均感困难，并治急性扁桃腺炎、口腔炎。

处 方：傍培菰 [102] (又名桑培菰、釣鞭坡) 四至五兩 扁魚胆叶 [103] (又名則魚胆、胆草，与节节花极相似) 三錢

用 法：将傍培菰洗净后，用臼舂烂，先以米五兩，冷开水一碗洗米，取洗第二次的米水浸，約浸十余分鐘，使药液变黄色后，即可使用。如果将药用煲或用热水浸則无效。用时，将药液用干净鴨毛或消毒棉球蘸扫喉部，外搽由甲状軟骨搽起，后搽顎下及两侧腮腺周围，每隔五分鐘搽一次。內服法：十五岁以下儿童，每隔十分鐘飲一湯匙。在病程未超过二十四小时，单用傍培菰浸液疗效是很好的，如果病程未超过四十八至六十小时，全身症状严重，局部的假膜扩大，而且轉为黄色，体温 38°C 以上，則須加入扁魚胆叶三錢，搗烂同浸，照例內服及搽口腔內白膜处和外部。药物生用和晒干研粉，用冷开水浸服使用，同样有效。

疗 效：本方曾用以治疗白喉四十二例，絕大部分体温达 38°C 以上，嗓子疼痛，流涎，咳嗽，嚥下困难，口臭，恶心。五例較严重的，全身发烧，呼吸困难，喉响，声音嘶哑，检查时咽腔充血，白膜大块存在，严重的白膜变黄色，不易拭脱。部分病例曾經過塗片或培养，白喉杆菌为阳性。計用此药治疗，一般在用药三天內，体温恢复正常，临床症状消失，細菌培养轉为阴性。举例如下：賢××，男，

两岁。发热第一天，体温 38.5°C ，咽喉微肿，吸乳困难，全身时冷时热，偶有呕吐，微咳嗽。心音亢进，肺部无变化，检查咽门充血，已被有白膜，不易拭脱，经单独用傍培强治疗一昼夜，体温正常，白膜脱落百分之五十，服至第二天，全部症状消失，饮食正常，表情愉快，连续服用三天塗片检查转为阴性痊愈。

来源：岑溪县筋竹卫生所 邓国清

二 方

主治：白喉，恶寒发热，咽喉肿痛，初起白膜，呼吸吞嚥均感困难，甚至腐烂、声音嘶哑，痰声漉漉。

处方：洗手果（又名无患果，群众以往用来洗衣服）核。

用法：洗手果核烧灰存性，研细末，用竹管沾药末吹入患处，日四次，每次药末约一分许。

疗效：莫××，男，六岁。患白喉病，初起恶寒发热，继则喉头发炎，悬雍垂后，咽腭弓发红肿大，喉间呈现白膜，自觉咽痛，声音嘶哑，痰声漉漉，以此药吹喉头，每次约吹药末一分多，共吹八次，次日症状消失，基本痊愈。

来源：临桂县医药科学研究所

肺 热 咳 嗽 类

肺 热 咳 喘 方

一 方

主治：小儿身热，咳嗽喘促，呼吸困难，鼻翼扇动，甚至身热如灼，手足冻冷，气喘鼻扇，两目直视（肺炎）。

处方：金包铁毒蛇（或喷鸡蛇）胆两个 陈皮一钱五分 甘草一钱

麝香五厘 生姜自然汁少許

用法：陈皮、甘草、麝香共研为細末，加入蛇胆汁和生姜汁拌勻，晒干，密封备用，輕症每服五厘，重症一、二分，用开水送下，服二次即愈。

功用：驅風，退热，通窍，除痰。

疗效：陈××之子等，患馬脾风，身灼热，气喘鼻扇，手足冷，目直視。均用本方药末五分，分二次服，服药半小时后，汗出，大小便齐来，症状消失而愈。

来源：北流县北京公社蘿村工区蘿村兽医站。梁善琨

二 方

主治：小儿肺热（肺炎）喘咳。

处方：生石膏三錢 浮海石二錢 冬桑叶二錢 杏仁三錢 麦冬三錢
枇杷叶二錢 瓜蒌仁二錢 旋复花二錢 天竺黄一錢 天花粉二錢 浙貝母二錢 甘草一錢

用法：用水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

功用：清热，除痰，潤肺。

疗效：本方系本人治小儿肺炎的驗方，二十年来治愈肺炎病儿很多。

来源：南宁市 黃道存

三 方

主治：咳嗽喉中有痰声，气喘，鼻翼扇动，身微热汗出（肺炎）。

处方：麻黄七分 杏仁一錢 生石膏二錢 甘草五分 桑白一錢 桔梗一錢 地骨皮一錢五分 天竺黄一錢五分 枇杷叶五分

用法：水一碗，煎取半碗，一日分二次服。

功用：清热，祛痰，疗喘咳。

疗效：陈××之孙，五岁，容县人。患麻疹收后咳喘增剧，鼻翼

扇动，服本方喘咳减退，惟唇焦燥。再与天冬、麦冬、知母、川贝各一钱，甘草五分、桔梗七分、百合钱半，服后而愈。

来源：广西中医专科学校 覃文德

四 方

主治：高热，气喘，咳嗽，鼻翼扇动，喉有痰声，颜面皮肤发紺（肺炎）。

处方：牛子一钱五分 桑叶二钱 牛黄三分 花粉二钱 甘草五分 浙贝一钱五分 菊花一钱五分 连翘一钱五分（后下） 薄荷五分（后下） 芦根二钱 杏仁一钱五分 勾藤二钱 旋复花一钱五分（后下）

用法：用水一碗半，除牛黄及后下药外，煎至一碗，纳后下药煎数沸，分三次冲牛黄一分同服，每隔三小时服一次。

功用：清热，祛痰，疗喘咳。

疗效：李××，男，两岁，容县人。病已两天，初起微热咳嗽，有恶寒状，次日病势严重。病儿气喘极甚，两侧鼻翼扇动，喉有痰声，颜面皮肤发紺，两目上视，神志不清，身体强直，小便失禁，腋下检温， 39.5°C ，舌苔淡黄，脉数有力。投以本方一剂神志清醒，喘平热退，再剂痊愈。

来源：广西中医专科学校 韦来痒

五 方

主治：咳嗽气喘发热。

处方：麻黄五分 杏仁五分 生石膏一两 葶藶子五分 款冬花一钱 法夏五分 苏子一钱 桑白皮一钱 黄芩五分 甘草一钱

用法：用水一碗半，煎取半碗一次服。

疗效：韦青舅，女，二十岁。因发热咳嗽腹泻入院治疗。腋温 39°C ，呼吸浅表，鼻翼扇动，听诊肺双侧，闻支气管笛

音及湿性音，肝脾未能触及，初步诊断为支气管肺炎。經注射二十万单位青霉素，后又服合霉素胶丸，第二天体温下降，腹泻已止。但呼吸仍表浅，鼻翼扇动，肺部症状仍然存在，繼續給予前药一天，第三天病情如故。因改用中药三蛇胆、麻杏石甘湯、安宫牛黄丸等治疗，病不但无好转，反更喘息严重，呈胸式呼吸。后給予本方一剂，服药后三小时左右，喘息停止，病者已能入睡，再服两剂，痊愈出院。

来源：崇左县山圩公社医院

哮喘类

治小儿哮喘方

- 主治：小儿哮喘（即支气管喘息）。
处方：花椒根〔104〕（生）五两
用法：用水一碗，煎取一茶杯，一日三次分服。
疗效：韦××之子和王××之女，同患哮喘，用此药服二剂而愈。
来源：融安县板杭 黄胜德

脐风类

治脐风方

- 主治：小儿脐风，不吮乳，牙关紧闭，腹胀。
处方：蝉退一两 胆南星二钱 天麻二钱 全虫七个 僵蚕（炒）七条
硃砂五分（冲服） 黄酒二两
用法：黄酒二两和水一碗，煎取半碗，分五次冲硃砂服。
疗效：曾用本方治愈三人。

来 源：鹿寨县英山医院 梁炳权

惊 风 类

治 小 儿 惊 风 方

一 方

主 治：发高热，卒然抽搐，牙关紧闭，角弓反张，目直视，昏不知人。

处 方：金退一钱 川足一钱 勾藤二钱 竺黄一钱五分 硃砂五分（研末冲服） 黄芩一钱五分 知母一钱五分 麦冬二钱 生地三钱 茯苓一钱五分

用 法：用水一碗，煎取一茶盅，一日分二次服。

功 用：清热，化痰，熄风，镇惊。

疗 效：蒋××，男，五岁。患急惊风，手足抽搐，牙关紧闭，目直视，昏不知人，体温40℃。注射青霉素，并内服磺胺类等，热度持续不退，症状如故。后用本方，服二剂而愈。

来 源：融安县龙妙民办医院

二 方

主 治：小儿惊风，惊跳，抽搐，不省人事。

处 方：燕子屎二斤半 車前草二斤 金縷藤〔105〕三斤

用 法：先将燕子屎炒干，車前草焙干共为末，另将金縷藤打碎加水煎熬成膏，加入药末杵匀为丸，如黄豆大，一至三岁，每服一至三丸，三岁至五岁每次服三至四丸，五岁以上酌加药量。日服三次，开水送服。

疗 效：武平乡鍾××、廖天屯林××等，先后患惊风发热，两目

直視，手足抽搐，牙关緊閉，均以此藥丸治愈。

来源：馬山县周六中心医院制藥厂 鍾 陆

三 方

主治：小儿惊风症。

处方：螳螂二只（燒炭存性） 人乳一小杯

用法：螳螂炭为末，冲入人乳拌勻，一日分二次服。

疗效：古零黃××、銀××、黃××等人之子先后患惊风症，两目直視，手足抽搐，牙关緊閉，以本方治疗，均得痊愈。

来源：馬山县古零公社 銀世开

四 方

主治：小儿惊风，不省人事，四肢抽搐，两目直視，喉中痰响。

处方：白矾二錢 陈皮二錢

用法：水煎灌服。

功用：利气，行痰。

疗效：安山富坤，唐××之姪、祝××之子患惊风，四肢抽搐，目直視，喉間痰湧，均以本方治愈。本方前后治愈二十余例，疗效很高。

来源：岑溪县英雄公社 龙仲英

小 儿 麻 痹 类

治小儿麻痹后遺症方

主治：小儿麻痺病，突发高热，煩躁，嗜睡，愈后一足或双足不能举步；患足下肢肌肉逐漸萎縮，胸掌外翻，不能站立。

处方：黃毛鸡〔106〕（全草）一至二兩 紅軟藤〔107〕（莖藤） 土黃芪〔108〕（又名千斤拔，用根部） 楓木〔191〕根 穿石

藤〔109〕（用其藤）各五錢至一兩 羊蹄一對（如无羊蹄不用亦可）

用法：藥物份量按小兒年齡增減，用水同煎至羊蹄爛，分數次服湯并食羊蹄，每日或隔日一劑，連服三、四劑。

療效：劉××，女，二歲又二個月。于1957年5月，突患高熱，煩躁嗜睡共五天，經注射青霉素及一般解熱藥后，第六天熱退，并欲下地玩耍，发现小孩左足不能舉步。检查患足關節正常，不紅不腫，触之亦不痛，患側膝反射消失，臍反射遲鈍。即用維生素B₁、維生素B₁₂等治療無效。6月間帶到南寧廣西醫學院檢查，確診為脊髓灰白質炎后遺症。后用針灸治療一個多月，又內服中藥并用草藥洗熏一個多月，均不見效。當時小孩患側下肢肌肉已顯著萎縮，腳掌外翻，放手站立僅能維持半分鐘。直到1959年3月用本方治療。經服藥一劑后，发现不僅能放手站立較久，且能移動數步。服第二劑后能自走十數步，第三劑后能自走數十步，以后因買不到羊蹄，繼續不用羊蹄僅以草藥五味水煎服二劑；現在除足掌外翻及足肌肉萎縮未復原外，已能行走自如。

來源：崇左縣扶南公社醫院

吐 瀉 類

治小兒吐瀉方

主治：小兒吐瀉，腹痛，驚搐，屬寒性者。

處方：丁香 黑姜 附子 肉桂各一錢 灶心上十一兩

用法：先將灶心土放碗內搗溶，用水沖攪勻，待水澄清后，取水煎藥燉肉桂，分二次溫服。

療效：新漢黃××、楊圩唐××等十五人患此症，均以本方治愈。

禁忌：服藥期間忌食生冷食物。熱性吐瀉不可用。

來源：馬山县古零公社中医院 覃文林

腹 瀉 類

治 小 兒 泄 瀉 方

一 方

主治：發熱或不熱，腹痛，腸鳴，大便泄瀉，次數多（單純性消化不良及腸炎）。

處方：桉葉散：桉樹葉〔21〕（老嫩均可）適量

用法：取新鮮桉樹葉，洗淨，炒干，研細末，過篩去殘渣，瓶貯備用，一至三歲每服0.1至0.3克，三至十歲每服0.3至0.5克，十至十八歲每服0.5至1.0克，十八至五十歲每服1.0克，日服三至四次，仍可根據病情、年齡、體重酌情增減。以開水送服。

療效：我院用本方治療小兒單純性消化不良一百多人，痊癒八十六人，減輕九人，無效十一人，有效率89%，腸炎有效率86%。

王××妻，女，二十歲。來診，自訴頭痛，一日拉三至四次黃白色稀便，腹痛，腸鳴，不吐。腹中部有輕度壓痛。診斷為急性腸炎。內服桉葉散四克，每隔四小時服一克，第二天即愈。

來源：柳州鐵路中心医院

二 方

主治：小兒熱瀉。

處方：（一）葛根黃芩黃連湯加枳殼木通，葛根二錢 黃芩一錢

黃連一錢 枳壳一錢五分 木通一錢五分 甘草一錢

(二) 黃連一錢五分 山楂一錢 枳壳一錢五分 神曲一錢
甘草一錢 木通一錢五分

用法: 用適量水煎取一茶盅，一日分兩次服，如有口渴加花粉，小便不利加車前，病情好轉后，改用第二方。

功用: 清胃腸熱。

療效: 田××，男，七個月。起初大便稀黃，一日數次，下午有發熱，嘔吐，已三天，曾在門診作一般治療無效。于1957年10月3日入院，患兒發育正常，營養優良，入院后，體溫持續在 37°C — 38°C 之間，泄瀉，嘔吐，煩躁不安，脫水。入院后三日，曾經使用過臍胺、氯霉素、鏈霉素，注射和口服。但病情未見改善，并病勢日趨嚴重。以后改服本方，服后當日下午體溫降至正常，病情好轉，腹瀉停止，排氣，鼓腸消失而漸愈。

來源: 恭城縣人民醫院 黃永隆

夜 啼 類

治小兒夜啼不眠方

主治: 小兒夜啼不眠。

處方: 川連五分 薄荷三分 虫蛻五分（去頭足） 灯草十條

用法: 用水二杯煎取一杯，一日分二至三次服。

療效: 趙氏小兒，每晚哭吵不眠，服本方后，當晚即能安睡至天亮。本方曾治愈數十例。

來源: 田東縣和平公社醫院

遺 尿 類

治 小 兒 遺 尿 方

主 治：小兒遺尿。

處 方：炒桑螵蛸二錢 芡實三錢 益智仁二錢 故紙二錢 萸肉三錢
淮山三錢

用 法：用水一碗半，煎減半，一日分二次服，連服三劑。

功 用：溫腎，補虛，治遺溺。

療 效：本人在區人民醫院本部及第三門診部工作時，對遺尿患兒均給服本方，一劑知，二劑愈，介紹試用，均稱效果很好。

來 源：南寧市 駱一機

疳 氣 類

治 小 兒 疳 氣 方

主 治：小兒疳氣痛。

處 方：奶汁藤〔110〕一兩 豬骨四兩

用 法：用適量水煲透，酌量連服一至三劑。

療 效：梁××，男，兩歲。患疳氣一年，經服上藥二劑而愈。
甘××，男，十二歲。患疳氣已六年，亦用本方治愈。

來 源：岑溪縣大陽公社 梁榮清

脫 肛 類

治 小 兒 脫 肛 方

一 方

主 治：小兒脫肛。

處 方：白頸蚯蚓四條 白糖適量

用 法：將蚯蚓洗淨搗碎，和白糖以開水沖服。

療 效：用本方治愈患兒多例，均服二、三次即愈。

來 源：平南縣城廂公社 蒙達瑜

二 方

主 治：肛門脫出一寸多，年久不愈。

處 方：加減甘露飲：柴胡 生地 麥冬 天冬 杷叶 黃芩 枳
壳 石解 茵陳 升麻 甘草各二錢

用 法：水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

療 效：津頭鄉一小孩，四歲。脫肛已兩年歷治無效。1958年冬就診，以本方治療，服藥一劑後，已縮入十分之六，繼服一劑痊愈。

來 源：廣西中醫專科學校 林鳴皋

白 泡 瘡 類

治 嬰 兒 白-泡 瘡 方

主 治：嬰兒出生第一日或數日後，在面部、頸部或軀幹部，發生針頭大或綠豆大形如痘瘡（沒有臍）的白泡瘡，西醫叫做

初生儿脓疱疹。

处 方：大蒜液

用 法：取饱满的老大蒜瓣，去皮，用擀钵擀成糊状，将大蒜糊用清洁纱布包裹，直接用重力反复压榨使蒜液全部流出，貯于有色玻璃瓶內，密封备用。同时，先把所有的脓疱疹，用消毒针头刺破，已经破了的和只有紅点而没有形成水泡的，用大蒜液遍塗患部，每日塗一至三次。

附 注：脓疱疹症状，初生一天或数天后的嬰兒，于顏面部、頸部或軀干发生針头大或綠豆大甚至直径达一厘米以上大的內含澄清液体的疱疹。这种液体很快变为混浊，呈黄白色，形状很象豆疮，但没有脐，較大的疱疹，多不等待到内容物混浊即自行破潰，破潰后自行痊愈或繼續流水。疱疹发生很快，在很短的时间內便能遍布全身，因破潰互相溶合，結果为干湿相同的大块結痂，患儿多伴有輕度发热，食欲不振，煩躁不安。

疗 效：用本方治疗多例，效果很好。举例如下：

（一）陈××，出生七天，全身遍长脓疱疹，大部潰破出水，曾服金霉素无效，用本方治疗五天基本治愈，再繼續治疗三天痊愈。

（二）高××，出生二十一天，全身皮肤有脓疱疹，胸臀部最多，塗大蒜液三次完全治愈。

（三）陈××，出生五十天，全身长滿脓疱疹，几无健康皮肤，塗大蒜液七次，全部治愈。

（四）黃××，出生二十天，全身密布脓疱疹，破潰，脫皮，流水，塗大蒜液七次，共七日完全治愈。

来 源：梧州市人民医院妇产科

疳 积 类

治 疳 积 方

一 方

主 治：常有发热吐泻，大便杂水泡，腹膨胀。

处 方：馬牙硝一錢五分 雄黃一錢五分 薄荷一錢 枯矾五分 水仙子二錢 使君子二錢 滑石一錢 硃砂五分 骨碎补二錢 猴子骨二錢（炒） 海螵蛸三錢（根） 鸡内金一錢

用 法：共研成极細末，每天服二次，每次服一錢，用猪肝或天星魚蒸食，如无者用米湯送下亦可。

疗 效：李××之女，三岁。常发热吐泻，大便下清谷或如豆汁或下虫，大便必杂水泡，腹部略有胀实，体瘦，用本方治疗而愈。

来 源：广西中医专科学校 林沛湘

二 方

主 治：小儿身体黄瘦，消化不良，属夜尿。

处 方：枯矾五分 蓮子三錢 硃砂二分 麦芽一錢 海螵蛸一錢 党参一錢 訶子二只 白茯苓一錢 百草霜一錢 谷精一錢 山查一錢 苏子一錢 草决明一錢 建曲一錢 水仙子三錢 使君子肉一錢 扁豆一錢

用 法：上药十七味，共研細末，每次用药末一錢蒸鸡肝服，每日服一次。

功 用：健脾，除虫，去积。

疗 效：賴××，女，五岁。患疳积，消化不良，身体消瘦，形如骨立，已不能行，經治年多不愈。后服本方药散一剂，病

即消失，已能步行。

来源：田东县火箭公社医院 賴立矩

三 方

主治：小儿疳积，面萎黄，肌肉消瘦，大便稀溏，甚臭，食欲不振，晚上烦躁不安，或寒热往来。

处方：胡連二錢 芦薈二錢 君子肉二錢 雷丸二錢 蛤蚧四十只
青菊五錢 水仙子二錢 淮山二錢 白芍三錢 猪肝二錢

用法：先取黄泥一两与水搅成泥浆，澄清去上面清水，置于日光下晒至能搓成团为度，遂把黄泥裹住蛤蚧、芦薈放入火堆内煨成炭。次把猪肝用新瓦焙干，再与前药共研成粉。

功用：健脾、消积、杀虫、清热、去翳。

疗效：經东风公社医院临床治疗三百多例。如：罗××的小孩，肌肉消瘦，食欲不振，晚上潮热。服本方药散半料痊愈。

来源：陆川县东风公社 叶宗輝

治疳积眼上膜方

主治：小儿疳积，不思飲食，头重不举，眼起膜，畏光，或时寒时热，或大便烂，消化不良。

处方：土柴胡〔111〕三錢 独脚馬騮〔112〕一兩 羊角菜〔113〕一兩五錢
烏蠅叶〔114〕一兩 地桃花〔35〕一兩 粘米一兩 田基黃〔51〕一兩

用法：将各药共焙干研末，每日服三次，每次用一錢蒸鯉魚吃（鯉魚肉約一两），每隔四小时吃一次，这是一岁小孩用量，如較大的小孩，可酌加分量。

疗效：鍾××之子，患如上病，服本方三剂而愈。

禁忌：服药期間忌吃硬固、生冷之物。

来源：馬山县周六公社 鍾 陆

治小儿虫积方

主治：虫积腹痛。

处方：使君子肉三钱（打烂） 檳榔一钱五分 大黃一钱五分（后下）
生甘草一钱

用法：用水二碗，煎成一碗，一日二次分早晚空腹服。

功用：杀虫，除积。

疗效：曾用本方治疗患者多例，均一剂即能驅虫外出。

来源：南宁市 繆大文

治小儿肝积（肝脏硬化）方

主治：小儿肝积。

处方：蟾蜍（去頭、皮及腸雜）

用法：每次用一个煮粥，一日二次分服，連用三至五次即愈。

疗效：张××，男，十一岁。患肝积，經民族医院診斷为肝硬化，曾用中西药治疗无效，后服此药三次即愈。

来源：融安县龙妙民办医院 陈秀洳

花柳病类

治梅毒方

主治：梅毒。

处方：黑鉛_{四兩}

用法：研成細末，日服二次，每次一錢，冲酒服。

疗效：馬××，男，四十岁，平南县人。患梅毒（先天性梅毒），筋骨如割筋刮骨样疼痛，走路困难，不能工作，曾先后到过广州、柳州医院治疗无效。后用本方，服藥两天遍身发出紅色斑疹，第三天疼痛减少，連服两个星期痊愈。

来源：来宾县中医研究所

编者按：鉛有毒，服用时最好在医生指导下使用。

治芒果橫痃方

主治：鼠溪部生肿块，形如长蛤，漫肿坚硬，痛牵舉丸，上及小腹；多为梅毒所致。

处方：猪牙皂角子_{二錢五分}

用法：研成細末，以适量双酒煮沸冲燂，盖密，約三至五分鐘，溫飲其酒，渣溫敷患处。服藥后，复被睡覺，使有微汗。

附注：服藥后呕吐一、二次，泄痢二、三次，病即消失。初起三至六天内，尚未化脓者有效，脓成者无效。

疗效：本方曾用以治疗芒果十八人，均获效。举例如下：

李××，男，四十八岁。腿夹縫折紋中，生一硬块，形如长蛤，漫肿坚硬，痛牵舉丸，上及小腹，用本方治愈。

来源：广西中医院 张汉符

治 芒 果 方

- 主 治：**鼠溪部淋巴管处硬肿如芒果大，疼痛，已潰或未潰皆治。
- 处 方：**蝸牛逆蛋（視患部大小而定）
- 用 法：**未潰者，將藥搗爛搽于患处；已潰者，將藥焙干，加入梅片、枯矾各二分，共研細末，調茶油搽患处，每日搽三次。
- 疗 效：**一般治疗二至三天愈，重者六至七天愈。曾用本方治疗五人均愈，謝××，男，四十岁。于1940年患芒果，初硬肿疼痛难受，繼即潰烂流黄水，用本方两剂痊愈。
- 来 源：**象州县妙皇公社中心医院 胡 文

破 伤 风 类

治 破 伤 风 方

一 方

- 主 治：**外伤出血，感受风邪，发热恶寒，牙关紧闭，目直视，四肢抽搐，角弓反张，神志昏迷。
- 处 方：**蝉蛻四兩（不去頭足） 常山一錢五分 勾藤一兩 絲瓜絡一兩
- 用 法：**水三碗，煎取一碗，一日分二次服。
- 功 用：**驅風，除痰，鎮痙。
- 疗 效：**本方系先父秘传，治疗多例效果良好。举例如下：
陈××，貴县人。因騎單車跌伤，二十日后，致成破伤风病，口角流涎，言語不清，症极严重。用本方連服数剂，病即痊愈。
- 来 源：**广西中医药研究所 廖用周

二 方

主 治: 外伤出血，感受风邪，发热恶寒，牙关紧闭，目直视，四肢抽搐，神志昏迷。

处 方: 当归五钱 白芍 防风 白芷 虫蛻各三钱 川芎 天麻各二钱 熟地四钱 蒿本一钱五分 细辛五分

用 法: 用适量水煎取二茶杯，分二次服，连服几天。

疗 效: 韦××，女，四十二岁。右脚面被石头碰伤，继则四肢抽搐，痉挛，用此方连服五天即愈。

禁 忌: 忌食鱼腥、酸、辣等味。

来 源: 马山县永州公社古桥队 洗鸿儒

跌打损伤类

治跌打损伤方

一 方

主 治: 跌打损伤疼痛。

处 方: 常山叶（又名大王叶）一兩

用 法: 将药槌烂或口嚼烂敷患处。

疗 效: 温××小孩，被牛触伤睾丸，流血不止，用本方治愈。

来 源: 鹿寨县 韦树汉

二 方

主 治: 跌打损伤。

处 方: 无敌手〔115〕一兩 三妹根〔116〕八兩 了哥王〔117〕八兩

泽兰根八兩 屈头鸡〔118〕八兩 五加皮八兩 骨碎补八兩

荆芥六兩 铁凉伞〔119〕八兩 花椒子四兩 松香二兩

石南藤八兩 桂枝三兩 威靈仙二兩

用法：將上藥共研成細末，每次服五分至一錢或煉蜜為丸，每丸重一錢，每次一丸用開水送下。

功用：消腫，止痛，散瘀。

療效：李××跌傷，黃××跌斷骨頭，均服此方十多天而愈。

禁忌：妊婦忌服。

來源：鹿寨縣 馮庚桓

三 方

主治：跌打損傷或骨折。

處方：早稻禾蕓適量

用法：將禾蕓搗爛加好酒，搓勻用大張的樹葉包好，放入紅火灰煨熱後，微溫敷患處。

療效：歐××，男，十五歲。因上樹跌折左手，桡骨突出，用本方二料敷愈。

來源：岑溪縣上游公社 范慶南

四 方

主治：跌打損傷。

處方：生軍四錢 花粉四錢 梔子六錢 紅花二錢五分

用法：將上藥焙干，共研成細末，加以灰面等量攪勻，再沖雞蛋白以濕透為度敷于患處，隔日換一次，三劑可痊愈。

功用：散瘀，消腫，止痛。

療效：本方是祖傳秘方，凡跌打損傷用之有效，治愈數百例。

來源：融安縣雅瑤 李常芳

治 跌 打 外 傷 方

主治：跌打外傷腫痛

處方：雪上一枝蒿〔120〕-兩(研細末) 麻黃五錢 細辛五錢 樟腦五錢

用法：共浸三花酒一斤，搽伤处，一小时半搽一次，連搽数日可愈。

附注：雪上一枝蒿产自云南、貴州，称为强盜药。

功用：去瘀，消肿，止痛。

疗效：本方已治愈数百例，效果良好。

来源：南宁市 李以均

治 跌 打 方

主治：跌打周身疼痛，伸展困难，挫伤撞伤局部充血瘀肿疼痛，或已不痛而瘀积紫黑未退者。

处方：紅花三錢 归尾四錢 血竭三錢 牛膝二錢 乳香三錢
沒药三錢 苏木四錢 川烏三錢 白芷一錢五分 木通一錢

用法：水三碗，煎取碗半，一日分二次按伤处酒量适当冲酒服。

附注：痛在上部加川芎；痛在下部加重牛膝；渾身疼痛加姜活、防风、独活；大便不通尙疼痛者加大黄去酒；便通者去大黄照用酒。

功用：活血，散瘀，止痛。

疗效：李××担重跌伤，当时尙能勉强支持回家，历二、三小时后渾身疼痛不已，伸展困难，不得睡。检查全身不見伤口，伤者叫痛不休，即与本方照服，翌日疼痛已大減，繼續服一剂即愈。

禁忌：孕妇忌服。

来源：广西中医专科学校 潘祺立

治 跌 打 肿 痛 方

主治：跌打肿痛。

处方：松木叶适量 童便适量

用法：松木叶搥烂同童便煮热，用布包住，乘热熨搽患处，搽至药温度皮肤能忍受时，則将药温敷患处，每日二次。

疗效：本方治愈多人。本人两次跌伤，均用本方治愈，一次是在初中时，打球跌倒，手腕脱节，昏倒不醒，伤处肿痛；一次从高处跳下，脚跟受伤，脚眼肿痛，均用本方治愈。

来源：广西中医专科学校 莫若林

编者按：本方亦具行血散瘀消肿之效，乡间农民常用以治脚痒冻疮红肿疼痛；用以治牛冬蹄（即天冷时牛脚牛蹄发肿不能行走），均用本方熨洗即愈。

治跌打瘀黑疼痛方

主治：跌打瘀黑疼痛。

处方：黑心姜〔121〕适量

用法：上药槌烂，用酒炒热搽伤处，搽后将药温敷伤处。

疗效：本方曾治一童子跌伤臀部，伤处瘀黑肿痛，不能行动，用药搽后，敷药一宿，翌晨肿痛全消，行动自如。

来源：广西中医专科学校 赖安全

治跌打积瘀方

主治：跌打内伤，瘀积刺痛。

处方：地毯草〔122〕适量

用法：洗净晒干，研成细末，面糊为丸如龙眼核大，每服一至二丸，热酒送，服后将伤处按摩几次，即瘀散痛止。

功用：散瘀，止痛。

疗效：本方经治疗多人，效果良好。

禁忌：孕妇忌服。

来源：天等县天等公社 农勤荣

治损伤腰痛方

主治：损伤积瘀腰痛。

处方：丝瓜根（煨炭）一至三钱

用法：研成末用好酒煮服。

疗效：本方治损伤积瘀腰痛，效果尚好，曾治愈多例。

来源：广西中医专科学校

治跌打失气不能言語方

主治：从高处跌下或撞伤，出大汗，疼痛，失气不能言語。

处方：火秧勒叶〔123〕七、八張 葱头一兩五錢 老姜一兩

用法：水煎加三花酒冲服。

疗效：本人在高小讀書时与同学玩耍，撞着課桌，疼痛难忍，即失气不能言語，服本方而愈。本人舅父，上山挑柴，从数丈高山跌下，失去知觉，汗出如珠不絕，亦用本方治愈。本方治疗跌打内伤疼痛多例，效果很好。

来源：广西中医专科学校 张国輝

治 瘀 积 方

主治：瘀积不散久結成块，常发疼痛，患处时有冷点。

处方：莪朮五錢（醋炒） 三稜五錢 青皮五錢 干姜五兩（炒） 良姜五錢 香附五錢 桃仁五錢 全归五錢 赤芍一兩 干漆一兩（炒至烟盡） 蜈蚣十只（焙干）

用法：上药共研成末，醋糊为丸如龙眼核大，每早服二丸，开水送下。

功用：行气，活血，破瘀，消积。

疗效：李××，男，五十岁，果德感桑人。患血块年久不愈，服本方三剂，健康恢复。

来源：田东县 賴立矩

治 瘀 积 胸 痛 方

主治：跌打伤或劳动过度，以致經絡瘀积；胸膈部隱痛，或有压痛。

处 方：当归三钱 生地三钱 桃仁四钱 红花三钱 枳壳二钱 赤芍二钱 柴胡一钱 桔梗一钱五分 甘草一钱 川芎一钱五分，牛膝三钱

用 法：水三碗，煎取碗半，一日分二次服。

功 用：活血，散瘀。

疗 效：本方系王清任血府逐瘀汤，贵县震塘乡李××，男，三十岁。身体消瘦，面色无华，胸间隐痛年余，有轻度压痛感，无撞伤打伤史，食欲不振，脉沉细濡，舌有瘀色，大小便无异常。诊为血瘀脉络，用本方三十剂痊愈。

附 注：此病：身弱，色晦，脉沉细濡等状症，一般很难放胆使用本方，但舌有瘀色，则可放手使用，盖瘀积非只跌打损伤所致，凡气滞血亏，热郁劳积，以致血液运行障碍均能成瘀积，辨证当以舌有瘀色为准。

禁 忌：孕妇忌服。

来 源：广西中医专科学校 林沛湘

治 跌 打 内 伤 方

主 治：跌打内伤积瘀肿痛。

处 方：内服方：田七一钱（研成末冲服） 血竭四钱 红花二钱 归尾三钱 乳香四钱 没药四钱 橘红四钱 桃仁四钱 泽兰四钱 独活四钱

外敷方：乳香 大黄 香附 古文钱 马钱子 丁香 木鳖子各等分

用 法：内服方用水三碗煎取碗半，分二次加酒适量冲服，外敷方共研成末酒煮热温敷患处。

功 用：活血，散瘀，疏风，止痛。

疗 效：曾治从楼上跌下伤者一例，腹部积瘀实硬，痛楚非常，小便不通，用此二方内服外敷即愈。

来 源：广西中医专科学校 潘祺立

治关节扭伤方

主治：四肢关节扭伤，积瘀，肿痛。

处方：外敷方：明乳香 黄枝子各等分、

内服方：乳香 沒药 苏木 降香 桑皮 防风 当归
白芷各三钱

用法：外敷方：制成粉末，加入适量酒糟（或三花酒代替亦可）使成软膏状，蒸热涂于美人蕉叶上敷伤处，用绷带固定，每日换药一次。

内服方：用净水二碗煎取一碗，分二次冲酒服，妇人及小孩可不用酒，光服药水。

疗效：本院于1959年用本方治疗二例扭伤患者均愈。秦××，男，二十五岁。跑步时不慎扭伤右踝关节，当时足内翻着地，立即感到右足部疼痛剧烈，不能行动，肿胀麻木，于当日下午入院。检查：患者一般情况尚好，右踝关节肿胀压痛，无瘀血斑，内收踝关节剧痛，外展时疼痛较轻，未发现畸形变位，但不能行动，并用内服，外敷二方，两天痊愈出院。

禁忌：孕妇忌服。

来源：柳州专区人民医院外科 馮 勤

针灸治疗因外伤引起尿闭

主治：跌伤尿闭。

取穴：膀胱俞 肾俞 腰俞 关元 足三里 三阴交

手法：兴奋。

疗效：甘××，男，四十五岁。因跌伤腰椎右侧，有伤口深两公分，受伤后大小便不通，經水利卫生室治疗无效。入院后，經過一般治疗大便已通，但小便仍不通，每日导尿二至三次，病人痛苦非常，曾用西药治疗十多天无效，后改

用針刺以上穴位，針第二次尿通，至第四次尿閉消失。

来 源：崇左县第二人民医院

接 筋 駁 骨 类

接 筋 方

一 方

主 治：外伤筋断。

处 方：扫把藤〔124〕（又名海金砂） 凤尾草 苦艾 松树木蕈二层皮（要生在地下的）

用 法：先将上药槌烂，然后用温开水将伤口洗净，再将药敷上，一、二日或数日换一次，如伤口已腐臭，可于换药前用温水洗净一次。

疗 效：何××，女，三十岁。上山割草，不慎将自己的左脚前小十字韧带全部割断，经用上药治疗，十八天痊愈。现行走自如，照常劳动，毫无影响。

来 源：荔浦县人民医院 余坤甫

二 方

主 治：外伤筋折。

处 方：大红边蚂蝗三條 吊须榕树根〔125〕三錢 象皮一錢（或用橡皮树〔126〕二层皮） 黄糖一兩 生地五錢

用 法：共捣烂，敷伤处包扎好。

疗 效：治愈例数很多，疗效很高。如：吕××被薯藤绞伤手指大筋。用本方治愈。

来 源：陆川县上游公社医院正骨科 李玉廷

接 筋 駁 骨 方

主 治：筋断骨折。

处 方：盜儼草〔127〕一兩 落地生根〔128〕一兩 伤骨藤〔129〕五錢

用 法：上药三味采取全株生药，共捣烂后，即用青树叶包好，放在火灰煨暖敷用，按伤口部位具体情况，将药敷于距离伤口五寸的部位（上下不拘）如伤在胫骨，药即敷在膝头距离伤处上部约五寸的地方；例如伤在膝头下药敷在伤处下部，也要距离五寸。其余部位类推。

附 注：这药只可作外敷，不可内服，如伤处筋缩时，可用山杜仲四錢、金縷藤一两，共煲水洗之，不可内服。

疗 效：蓝××被木压伤脚部，黄××坐单车跌伤，韦××手伤筋断，譚××豪骨折脱臼，黄××脚眼脱臼。均用本方治愈。

禁 忌：在敷药期间，忌服杜仲、生姜两味。

来 源：馬山县加方制药厂 刘开汉

駁 骨 方

一 方

主 治：骨格折断。

处 方：黄芽木〔130〕叶 骨碎补 大接骨〔131〕 小接骨〔132〕

梔子叶 白背根〔133〕 三叉虎〔134〕 常山木叶〔40〕 路边

青叶〔31〕 四根木叶〔135〕 鉄地娘〔136〕 四季葱〔137〕各等分

用 法：将药晒干共研成细末备用，先行手术正复，以药粉调三花酒蒸热敷伤处，以杉木皮或苦楝木皮挾固，每日换药一次，至愈为止。

功 用：接筋駁骨，散瘀消肿，止血止痛。

疗 效：本方經二十多年临床經驗，治愈病例很多。如黄××，女，十三岁。从树上跌下，右手断二截，关节脱臼，断骨

穿出皮外，流血不止，先用白芨粉止血，用本方治疗一个多月痊愈。

来源：横县 黄扬清

二 方

主治：骨折。

处方：山柿子〔138〕五钱 红花柴〔139〕三钱 豆骨消〔140〕三钱 木贼一钱

用法：将上药捣烂用酒（约四两）炒热敷伤处（敷药前须将骨折整复），用夹板固定，每天换药一次。

附注：1.若骨折并有创伤出血者，先用刀伤止血方（血见愁二钱、刘寄奴二钱、马连安二钱、鸭脚连一钱、假沙树叶一钱，共捣烂敷患处）止血后，才用接骨方。

2.若伴有红肿疼痛较甚者，先用止痛消肿方（大阳伞二钱、小阳伞三钱、红丝线一钱、血见愁二钱、香附子二钱、韭菜头一钱、雷公根二钱、乌心姜一钱、水泽兰二钱、榕树须一钱）共捣烂用酒炒热敷伤处，并取药汁一小杯内服。肿消后，再用接骨方。

疗效：本方系祖传秘方，临床观察均甚满意。

来源：来宾县 华超玉

三 方

主治：骨折（未破皮者）。

处方：外敷方：

（一）五加皮四两 榕树须〔125〕二两 生酒糟八两 小雄鸡一只（约重十五两）

（二）生杉木炭四两 黄糖四两

内服方：然铜三钱（醋淬） 广木香四钱 牛膝二钱 刘寄奴三钱 骨碎补三钱 续断三钱

用法: 外敷方(一)方: 将药捣烂, 再把活小鸡去毛杂入药内混合杵如泥, 先将骨折正复, 敷于伤处, 用杉木皮或桐树皮挟好, 以绑带绑好固定, 抬高伤肢, 使血液回流, 敷药后在二至四小时内, 听伤部有骨响声音, 待响声停止后, 是骨折已接合, 即去掉敷药(敷药过久骨合处起贅)。用65%酒精洗净, 再敷(二)方药。(二)方用法: 杉木炭研成细末。把黄糖放锅内溶化, 入炭末调成软膏, 摊白布上敷伤处, 仍用夹板固定, 两天换药一次, 轻者两次, 重者四次可愈。内服方用水二碗煎取一碗, 冲酒顿服。

功用: 活血, 散瘀, 接骨。

疗效: 本方治愈骨折, 疗效很高。馬××, 男, 十八岁。被压断左手腕骨, 桡骨亦挫伤, 用本方治疗, 四星期后即能参加劳动。

来源: 天峨县 阮登文

四 方

主治: 骨折, 骨断。

处方: 毛七公〔141〕六分 踏钱根叶〔142〕六钱 榕树叶〔125〕四钱 大假金瓜叶〔143〕四钱

用法: 将药捣烂, 用甜酒蒸热, 敷伤处, 两日换药一次。

疗效: 某装卸工人, 手指折断两只, 经挟正后, 用此方治疗七日即痊愈。

来源: 南宁市 谢光甫

五 方

主治: 骨折。

处方: 青面白背〔144〕(又名石风、白背风)

用法: 生药捣烂, 干药研成粉末, 骨断皮未破的, 用酒炒药微热, 包扎患处。每天用热酒湿润敷药, 三天换药一次, 七

天可好。如骨断皮破，先用此药叶子铺烂敷盖伤口，然后再敷上面的驳骨药。

疗效：韦××，被石头打破手掌，手指骨折，用本方治愈。

来源：鹿寨县 冯庆桓

六 方

主治：手脚骨折挫伤。

处方：五加皮三兩 碎补三兩 蟹骨五錢 薄荷二兩 千里馬〔145〕五錢 油杵三錢 鸡蛋三个

用法：共研成末，加三花酒炒热后，先把骨折复正然后敷药，每天换药一次。

疗效：经用本方治愈多例。

来源：鹿寨县 黄治琼

七 方

主治：纯全离性骨折。

处方：六劲续骨丹：自然铜（煅透）一兩 土鳖（去头足）五錢 水蛭（瓦焙醋淬）淨五錢 地龙（酒浸瓦焙）淨五錢 土狗（瓦焙）十只 龙骨（放瓦上微焙）淨五錢 苏木粉五錢 真降香粉五錢 川烏粉五錢 松节粉三錢 制乳香三錢 制沒药三錢 广木香（日晒研粉）三錢 白芍二錢 血竭粉三錢 麝香粉一錢

用法：上十六味共研成细末，每服一至二錢（不得超过三錢）按伤势轻重和患者大小、强弱而定，用酒送下。

附注：药物须按制药法煅、焙、晒、炒精制，密封保存，勿使泄气。服药后，伤处有跳动和骨响声，勿惧，此是药力到的反应。

功用：去瘀生新，消肿止痛，续筋驳骨。

疗效：黄××，男，二十七岁。左手中指，被机器飞轮转动碾伤，中指中节脱臼，其指根骨尖向掌骨外穿出三分，指根

兩側及掌骨碎裂，凹凸不平，血流。為開放性複雜外傷骨折，用手法整復，將穿出肌外之骨尖剪去，鉗出碎骨，以三動止血血竭散（血竭二錢 兒茶四錢 制乳香二錢 制沒藥二錢 雄黃三錢 西紅花三錢 田三七一兩 麝香二分五厘 梅片二分五厘 西牛黃五分 硃砂二錢五分 琥珀二錢 熊胆五分 各分別研末，然後和合研成細末，以瓷瓶密貯備用）外敷，紗布包紮，夾板固定，內服六動續骨丹，一日用三錢，分三次服，兩周後痊癒。本方經四十餘年臨床使用，主治以筒骨（兩關節之中部）為多，對顯現純離性骨折療效很高。

禁忌：孕婦忌服。

來源：柳州市聯合診所 李 哲

八 方

主治：半離性骨折，骨裂，骨碎。

處方：五動尋傷丸：龍骨（瓦焙）淨五錢 水蛭（瓦焙醋淬）淨五錢 地龍（酒浸瓦焙）淨五錢 土鱉（瓦焙）淨五錢 土狗（瓦焙）十五個 乳香（精制去油）淨五錢 沒藥（精制去油）淨五錢 降香（日曬研）五錢 自然銅（醋煨透）五錢 蘇木（日曬研）五錢 血竭五錢 川烏（焙透）五錢 松節五錢 桃膠適量

用法：上十三味精制研細末，以桃膠調和共作六十五丸，每服一至三丸（普通均服三丸），開水送服，服丸藥後，經過五分鐘時間，飲酒一大杯以助藥力。

附注：藥物須按制藥法煨、焙、曬、炒、淬嚴格精制，密封保存，勿使泄氣。專作骨科用，非骨折裂勿用。服藥後，藥自循經走動响声，勿驚。

功用：去瘀生新，消腫止痛，續筋駁骨。

療效：伍××，男，三十七歲。被担物木條击傷胸部左腋下第七肋，肌肉微腫，呼吸按摩均感劇痛，經醫院治療二十多天

无效，改用本方治疗，患者服三次药后，病愈照常工作。

禁忌：孕妇忌服。

来源：柳州市联合诊所 李 哲

治骨折及关节筋腱损伤方

主治：骨折及关节筋腱损伤。

处方：新鲜盗偷草[127]（藤和叶）二至四两

用法：上药捣成糊状，用树叶或芭蕉叶包裹，入火煨热，去包叶，将药敷于骨折处上端或下端，用纱布或绷带绑定，每日换药二次。敷药前先备与骨格等长夹板八片，中四片须用甘蔗，整复后，将夹板与甘蔗夹板间隔贴于患肢，用绷带固定两端，骨折处或伤口，不敷药及任何处理（可加盖软布以避尘蝇）。

附注：敷药二至四小时，患者觉骨折处有吸收感，肿胀，疼痛即消退，如有伤口则有黄色液体渗出，两周自然愈合；若肿胀不易消，或有筋缩发生时，则以山土杜仲四两、无娘藤[50]、红花各一两切碎，用水煎沸洗患肢，渣热敷肿胀处，有消肿和舒筋腱作用。

疗效：本方系草药医师刘开汉祖传秘方，用本方治疗，疗效很好。蓝××，右胫腓骨开放性骨折；黄××，因骑自行车跌倒，左上肢闭合性骨折；均用本方治愈。

来源：马山县人民医院

接指（趾）骨方

主治：砍断手指。

处方：红毛七[146]三两 鹰不扑皮[147]（去木心） 苧麻茹三两

用法：共研成细末，先将断指复正后，周围涂些茶油（如血流不止，可用百草霜止血），然后把药敷上封好。

疗效：谢××，男，四十二岁。三十三岁时劈断脚趾底部，只有

一些皮肉粘連，經用本藥敷貼三次即愈。現傷處已無痕迹，能正常活動。

來源：陸川縣幸福公社 謝文獻

炮 礮 類

治 槍 炮 傷 方

一 方

主治：槍彈傷。

處方：石蘭〔148〕 青魚胆草〔149〕 石面桃〔150〕 礪砂

用法：將上藥適量洗淨共搗爛（根葉均用）敷于傷口，第一、二次藥可每日換一次，如第一、二包藥無異物出，可加些麻葉與上藥共搗爛合敷即出，異物拔出後可二日換藥一次，如果炮礮已由背面穿出，則必須藥敷兩面傷口。

療效：韋××，男，十九歲。上山打獵，失火被獵槍打中腿部，有二十多顆鐵砂打入腿部約六寸深。用此方治療結果，僅敷藥三次，即將鐵砂全部拔出，肌肉逐漸由內生出，二十二天即全部復原，行動自如。

來源：荔浦縣人民醫院 黃直甫

二 方

主治：槍炮打傷，腫痛，流血及子彈不出。

處方：鮮花椒葉〔104〕半斤

用法：將上藥搗爛敷傷處，如腫，另用花椒枝葉煎水洗傷腫處，每天換洗敷藥三至四次。若槍彈入肉不出，須用花椒根搗爛，浸以冷開水，用棍拂拌令出白泡沫，以鴨毛將泡沫刮入碗內，于傷處上部从上至下塗沫。傷口用花椒葉五錢、

紅蓖麻叶一两、沙姜一錢共搗烂敷之，每天換藥一次，塗藥水泡沫数次，以拔出異物。

療效：呂××，男，二十五岁，容县人。子弹从右脚底貫通足面，脚肿至大腿，用本方三剂而愈。

来源：象州县妙皇公社中心医院 胡 文

三 方

主治：炮碼伤，玻璃刺伤，燙火伤。

处方：玉麒麟〔151〕适量

用法：取玉麒麟生叶加盐少許，搗烂外敷患处，用量視患处大小而定。

附注：玉麒麟是一种人工栽培的特效良藥，因其状若麒麟故名。

療效：（一）林×，男，四十岁。于1945年打日本鬼时，右手被子弹击伤，食指骨折，手背被彈片打烂，面部及胸部亦中有彈片，伤势甚重，經医二十余日无效，伤部化脓出黃水，后用本方治疗十多天痊愈；（二）黃××，十四岁。被玻璃碎片刺伤脚底，发炎肿痛难忍，曾經医院治疗（注射青霉素，服消炎片）无效。后用本方敷治，不到二十分鐘，痛即止，敷藥三天痊愈。

来源：平乐县科学技术委员会

止 血 类

止 血 方

一 方

主治：外伤出血。

处方：七星劍叶〔152〕适量

用法：晒干研成末，敷伤处。

疗效：使用本方二十年，治愈患者多例，疗效很高。对止痛效果也很好。如跌打肿痛，可用双酒煮热搽伤处。

来源：南宁市 温澄波

二 方

主治：一切刀伤出血（大血管出血不在内）。

处方：烏梅适量

用法：瓦上煨存性（烟尽为度），研成細末，用瓶密封备用，用时撒在伤口上。

疗效：用本方治疗数例，效果很好。

来源：凌乐县人民医院 萧益初

三 方

主治：外伤出血。

处方：五 梧子一兩 乳香一兩 沒藥一兩 降香一兩 嫩松香一兩
白芨五錢

用法：共研成細末，敷伤处，包扎好。

功用：止血，止痛，生肌，埋口。

疗效：本方即我家常备之刀伤止血散，治愈多例，收效很好。

来源：南宁市 曹思秋

異 物 刺 入 肉 类

治異物刺入肉不出方

主治：無論銅、鉄、瓦砾、玻璃碎、竹木刺等刺入肉，均能拔出。

处方：牛膝三錢 山奈（沙姜）三錢 蓖麻子三錢 酸薤头五錢

用法：上四味共搗烂外敷伤处。

疗 效：本方治愈病例很多，效果很好，举例如下：譚××，男，二十三岁。1958年10月間在煉鋼工作中，被鋼碎片射入右大腿下段兩側，深約二寸許，傷口約一分寬，內部疼痛難忍，拒按。經送醫院檢查，傷處不宜開刀，乃用本方敷治。敷藥三天后，鋼碎片拔出，痛脹已完全消失，痊愈。

来 源：柳州市中醫院

治竹木刺入眼不出方

主 治：竹木刺入眼不出，紅腫疼痛。

处 方：牛膝 鵝不食草各等分

用 法：上二味，杵如泥，敷患眼。

疗 效：林××，男，二十五岁，桂平县人。入山伐木造林，被竹刺刺入眼不出，致眼疼痛紅腫。用本方治疗，仅数小时后竹刺即出，繼續敷藥而愈。

来 源：广西中医药研究所 林位乾

湯 火 伤 类

治 湯 火 伤 方

一 方

主 治：湯火伤。

处 方：山棟子〔153〕

用 法：取山棟子搗碎用缸浸取胶水备用，用时將胶水塗伤处。

疗 效：梁××，男，四十岁。腹部以下被石灰燙伤脫皮，不能行动，用本方治疗，两星期痊愈。本方經治疗各种湯火伤数百例，效果均良好。

来 源：鹿寨县头排 卢玉輝

二 方

主 治：水火燙傷。

处 方：救必应〔154〕三錢 万灵胶（香胶）二錢

用 法：將上藥共研成細末，用涼開水調成膠狀，每日塗患處數次。

疗 效：逢容屯豬場工人，被熱粥燙傷兩膝至腳底，燙傷甚重，用本方治愈。

来 源：鹿寨縣 黃三才

三 方

主 治：湯火傷。

处 方：九龍燈根（又名山苦瓜，葉似苦瓜葉，地下塊根似木薯，即白蕓）適量

用 法：用上藥塊根用洗米水磨成糊狀塗傷處，每日塗數次。

疗 效：本方曾治湯火傷者三十餘例，均獲愈，愈後無疤痕。舉例如下：

陳××，男，五十一歲。被滾粥燙傷右下腹至小腿部位，起泡發熱疼痛，經中西醫治療無效，后用本方治愈。

来 源：象州縣象州公社醫院 周振文

編者按：治湯火灼爛，用白蕓末敷之。

四 方

主 治：火燒傷，開水燙傷，蒸氣傷，紅腫起泡，皮爛肉脫。

处 方：燈龍草〔155〕二兩 黑獸草〔156〕二兩 薄荷二兩 山查二兩
黃柏二兩

用 法：將上藥共研成細末，用米泔水或茶油或酒調和，日搽患部幾次。

疗 效：張××和黃××，因跌落湯鍋，兩腿皮肉燙糜爛，均用本方治愈。

来 源：鹿寨县 黄治琼

五 方

主 治：火伤。

处 方：五眼果(157)树皮一斤

用 法：将五眼果树皮一斤，加水二斤，煎成浓药液，滤去渣备用。将药液涂患处，每天二至三次，涂后将沙纸盖遮患处。

疗 效：梁××，不慎被火烧着蓑衣，解脱不及，连身上衣服都被烧了，身体给火烧伤，烧伤面积约占人体30%，臀部伤及二度，面部等烧伤也近二度。经西医治疗六天无好转，后用本方治疗，经十三天时间痊愈。

来 源：崇左县那江水利工地 翟义存

六 方

主 治：汤火伤。

处 方：金樱藟适量 生大黄 生牡蛎各等分

用 法：金樱藟洗净，去外皮，槌烂，将生大黄、生牡蛎二味共研细末。同时将槌烂金樱藟皮浸于凉开水中，用木棒搅拌成白泡沫，取白泡沫涂患处，后用大黄牡蛎粉撒布于上，每日两次。

疗 效：用本方治愈患者数例，如石龙运江谢××的儿子，出生后仅三个月，被火烧伤，全身均被烧灼，发泡溃烂流水，内服清热解毒剂，外用本方，一星期后痊愈。

来 源：象州县人民医院 卢德生

七 方

主 治：汤火伤，伤处疼痛。

处 方：（一）镇痛方：生大芋（分量视伤处大小而定）

（二）外涂方：红连草(158)（又名天葵）一兩 油葱(159)二錢

延胡二錢 生蒲黃五錢 生地榆五錢 广木香五錢 米三花
酒三兩

(三)晚上塗方: 赤石脂半斤 熟石膏半斤 寒水石半斤

(四)日間洗方: 包布木叶一斤 尿桶公树叶〔160〕一斤

(五)內服方: 硃砂二錢(另包) 田七一錢五分 冰糖二兩 丹
竹叶卷心〔161〕一兩五錢

用法: (一)方用法: 將藥去外皮搗爛, 敷患處。

(二)方用法: 將藥共研成細末與酒調勻塗患處。

(三)方用法: 將藥共研成細末與雞蛋清調勻塗。

(四)方用法: 適量水煎, 溫洗患處。

(五)方用法: 適量水煎取一碗與硃砂沖服。

附注: 第二方藥宜用太陽晒干研成末, 忌用火炒。

凡湯火傷使用本方時, 必須按照上述制法, 才能奏效, 第五方是預防和解除火毒攻心用的, 傷后一、二天可服。

療效: 獻方人于1958年內, 用本方治愈陸城鎮呂××的小孩燙傷腹部四肢; 上游公社四良區劉××小孩燙傷足部, 療效良好。

來源: 陸川縣上游公社 曾伯炎

八 方

主治: 湯火傷。

處方: 大黃 香油(或生油)

用法: 用大黃研成末(視傷口大小而定用量)與香油拌勻成膏, 初受傷時, 先以好酒(最好95%酒精)頻塗患部, 繼續用大黃軟膏每日塗兩三次。如積藥太厚或已干枯, 可以油洗去后再塗; 如傷者謔語(火毒攻心)則用蜜糖沖開水頻服。

療效: 經用本方治療八例湯火傷患者, 均全部獲愈。

來源: 崇左縣第二人民醫院 莫仲儒

治 燙 傷 方

主 治：燙傷。

处 方：桉樹葉〔21〕

用 法：桉樹葉十五公分，洗淨煎湯至一百公撮，用消毒紗布在桉樹葉溶液中浸透後敷傷處，經常加桉樹葉溶液於紗布上保持濕度，勿使紗布乾燥。

疗 效：用本方治療燙傷五例，面積大小不等，均為第二度燙傷，療效良好。

来 源：柳州鐵路醫院南寧衛生所

皮 癬 類

治 頑 癬 方

主 治：皮膚癬久患不愈。

处 方：苦參四兩 獨活二兩 防風二兩 枳殼二兩 玄參二兩 黃連二兩 黃芩一兩 梔子一兩 菊花一兩

用 法：上九味共研成末，煉蜜為丸如梧子大，食前開水送服二十丸。

疗 效：皮膚癬病，多從外治，頑固者甚難根治。用本方曾治數例。如唐××，四十歲，男。患癬多年，除頭面外，遍身滿布，痕癢苦悶。服本方兩付而愈，經數月觀察，未見復發；甘××，男，三十四歲。頭上生癬，搔之成瘡，已歷半年，屢醫無效，後服本方丸藥一月後痊癒。

来 源：廣西中醫院 黨紹從

皮肤湿毒类

治皮肤湿毒方

主治：皮肤湿烂痕痒(湿疹)，妇女阴道痕痒(阴道滴虫病)亦治。

处方：野芋头[9](又名扑薯头、狼毒)八两 茶油五两

用法：野芋头切薄片，用茶油炸至焦黄，去野芋头，将油搽患处，干则再搽。

疗效：(一)刘××，男，十岁。患湿疹，自足至大腿，几乎无完肤，痕痒难受，搽野芋头油十余天痊愈；(二)黄××，女。阴道痕痒，常流黄白粘液，已患数月，用药棉蘸野芋头油塞入阴道，翌日痕痒已减大半，继续如法施治，五天病愈。

来源：广西中医院

治皮肤潰瘍方

主治：皮肤潰烂久治不愈。

处方：蜂蜜适量

用法：先用10%蜂蜜洗滌伤面后，用純蜂蜜敷患处，一日換藥一次。

疗效：譚××，男，三十八岁。右足踝关节潰瘍已四年，內側潰瘍面約5.5×4公分，外側潰瘍面1×1公分，足背2×0.5公分，下腿三分之一全部色素沉着，时覺痛痒，潰瘍面暗紅色不整齐，很多黃色及綠色分泌物。用10%蜂蜜洗滌伤面后，以純蜂蜜塗患处，用紗布包好，数日后分泌物显著减少，伤面漸轉紅色(不鮮紅)，伤面平整，自中間結淡黃色痂皮，痂皮脫落后現出正常皮肤，在敷蜂蜜过程中，无內服及注射任何藥物，治疗三十二天痊愈。

来源：梧州市工人医院 崔宝珍

治 香 港 脚 方

主治：香港脚，一到夏天脚趾缝起小颗水泡，痕痒非常，抓破则流出黄水，腥臭难闻。

处方：鱼肉（不拘什么鱼去净骨）适量

用法：晚上洗澡后，将鱼肉捶烂敷患处二十至三十分钟后去掉，每晚敷药一次，连续敷数日。

疗效：本人患香港脚，每年夏天病发，诸方治疗无效。后用本方如法敷药数日即愈。

来源：荔浦县商业局·黄定国

治 皮 肤 病 方

主治：皮肤瘙痒。红肿疼痛或溃烂流黄水脓血，或生灰白斑点，或如虫行，或干燥如松树皮或鱼鳞、蛇皮拆裂脱落，或麻冷疼痛，或两手举动困难，手指僵直而握物不灵活；及耳流脓水，耳淫，耳痘，耳聩，瘰癧，风疹湿疹，疥癣汗斑，小儿头疮、白泡疮等均治。

处方：南蛇九斤 僵蚕七两 虫蛻二两 水銀一两 酒精（95%）十斤

用法：把南蛇、僵蚕、虫蛻三味用酒精浸三十天，然后把水銀用紅薯叶搗死（搗至不見腥），加入药酒中即可用。用时蘸擦患处，每日一次，轻轻擦即可，不可过量。

功用：除风湿，消肿杀虫，止痒止痛，去腐生新。

疗效：（一）郑××，女，四十二岁，博白县人。患皮肤斑白已六年，于手背及足蹠背各有一大片皮肤呈白色，干枯，不痛不痒，患部皮肤感觉迟钝；（二）李××，男，三十五岁。患阴肿瘙痒六年，肿如碗大，有隐痛，皮肤厚濇如虾蟆状，两腿阴廉部搔破出血，阴肿渗出粘液腥臭，其痒异常；（三）林海雁，男，一岁。遍头满生疮节，大小不一，抓

破后流出脓水黄汁，气味腥臭，頸背部皮肤如茧样，瘙痒不止，腹部有白斑，均用本方治愈，疗效良好。

来源：玉林专区中医院

风 疹 类

治 风 疹 方

一 方

主治：皮肤出疹，起丘块状，痕痒（蕁麻疹）。

处方：連翹 銀花 綿陳 各二錢 菊花 黃芩 枳殼 各一錢五分
牛子二錢 虫蛻一錢五分 赤芍 白芍 苦參 枯草 各二錢
防風一錢

用法：用適量水煎取一碗，一日分兩次服。

功用：疏風，清血份熱。

療效：韋××，女，五歲。周身發疹而痒，夜間煩躁不能眠。用本方連服三劑即愈。

来源：桂林市中醫院 廖惠生

二 方

主治：癰疹（蕁麻疹），皮膚發出紅點或片塊，瘙痒，頑固久病者。

处方：加味滋燥養營湯： 生地一兩 熟地一兩 黃芩四錢（酒炒）
當歸四錢 白芍三錢（酒炒） 秦艽三錢 防風二錢 僵蚕三錢
蟬蛻一錢五分 忍冬五錢

用法：水三碗，煎取一碗半，一日分二次服。

功用：滋燥養營，疏風解毒。

療效：本方治療頑固癰疹，效果很好，曾治愈多例。其中一例經多方治療無效。后用本方治療，服用十劑，即已根治，停

藥后數月，未見復發。

來源：廣西中醫藥研究所 王乃翰

三 方

主治：蕁麻疹，皮膚起疹塊，紅腫，瘙癢難忍。

處方：升麻一錢 大黃三錢 殭蚕二錢 蟬衣一錢 蜂糖一兩 玉樞丹五分 黃酒一兩（如無黃酒，仍有效）

用法：藥四味用淨水二碗，煎取一碗沖蜂糖，玉樞丹，黃酒日分二次服。

療效：用本方治療蕁麻疹患者十多例，效果非常顯著，大部分病例仅服藥一劑即愈，少數病例服藥二劑痊愈，均無復發。如謝××，男，十六歲，宜山人。患蕁麻疹已四天，其顏面生紅疙瘩疹，發腫瘙癢難忍，舌白質紅，脈浮數而弦，給服本方一劑（當時無蜂糖改用糖漿十毫升），疹不痒，第二日再服一劑即痊愈。

來源：柳州專區人民醫院

四 方

主治：皮膚風團（蕁麻疹），每于天氣寒時復發，滿身一團團丘疹，瘙癢苦悶異常。重症常伴有發寒熱，或食欲減退，甚至煩躁譫語。頑固者則反復發作，纏綿數月半年未愈。

處方：黃芪五錢 當歸二錢 苦參八錢 連翹三錢 梔子四錢 浮萍四錢 淡竹葉三錢 生地四錢 蟬蛻六只 甘草一錢半

用法：用水三碗煎減半，一日三次分服。如初起的加防風二錢，已多天的不須加，兒童藥量酌減。如能采楓木葉（楓木菌更佳）煮水外洗佐治，收效更快。

功用：健長、疏風、清熱、涼血。

療效：曾用本方施治風團病例一百多，療效很滿意，一般一至三劑即愈。

来源：广西中医药研究所 黄汝绍

五 方

主治：风疹（荨麻疹），皮肤起疹块，痕痒难忍。

处方：麻黄一钱五分 蝉蜕一钱五分 黄连八分 甘草八分 杏仁三钱
石膏一两

用法：用水碗半煎取大半碗，渣加水一碗煎取半碗，和匀，一日分二次服。

附注：大便不利加大黄，大便溏薄加苍朮。

疗效：曾用本方治愈数例，如崔××，男。暴发寒战高热，气喘烦闷，头面肢节密布疹块，浑身瘙痒难忍，历半月不愈，用本方四剂痊愈。

禁忌：治疗期间忌食鱼腥、虾、蟹等。

来源：广西中医院 党绍从

风疹针灸疗法

一 方

主治：风疹。

取穴：血海 曲池 合谷。

手法：中等刺激，留针十分钟。

疗效：用上穴经治三例，一次即愈。杨××，男，四十四岁。每遇冷风或下冷水即全身起疙瘩疹子，瘙痒，麻木。经针一次即愈，至今未见复发。

来源：融安县龙妙民办医院 陈秀洳

二 方

主治：荨麻疹。

取穴：足三里 合谷 曲池 中腕

手 法：上穴均針，用抑制手法進針，留針二十至三十分鐘。
療 效：用本方治療蕁麻疹三例均愈，如周××，女，十九歲。初次患蕁麻疹，甚痒，坐立不安，影響學習和睡眠。取上穴針刺，留針三十分鐘，疹退即愈。
來 源：柳州專區人民醫院外科 鍾文斌

面部瘙癢針灸療法

主 治：面部瘙癢。
取 穴：合谷 血海 迎香
手 法：上穴均針，用強刺激手法，留針二十分鐘。
療 效：曾用治十二例，針四次即愈。賈××，男，五十歲。面部患瘙癢二年，多方治療無效，自疑為癲瘋，經檢查後并無癲瘋桿菌，經用上穴針四次而愈。
來 源：融安縣長安民族醫院 黃繼杰

油 蟊 類

治 油 蟊 方

一 方

主 治：陰囊濕痒。
處 方：白糖適量
用 法：以白糖作成飽和溶液，蘸塗患處。
療 效：曾治愈多例，均塗藥一晚即愈。
來 源：廣西中醫專科學校 黎耀彬

二 方

主 治：陰囊奇痒。

处 方：枯矾二錢 儿茶一錢五分 雄黃二錢 冰片一錢 輕粉五分 青黛一錢

用 法：先将儿茶炒枯，再和其他五味共研成細末，用玻璃瓶密封备用。用时先洗淨患处，如湿則干敷，干痒則用香油調敷。

功 用：燥湿杀虫。

疗 效：曾用本方治愈数例，效果良好。

禁 忌：忌吃葱、蒜、魚、虾、公鸡肉、母猪肉等物。

来 源：馬山县古零公社中医院 黃云江

疮 瘍 类

治 疮 瘍 方

一 方

主 治：疮瘍紅肿疼痛。

处 方：桉树叶〔21〕一斤

用 法：用水三斤熬成一斤，浓缩十五倍即成流膏，加凡士林配成20%浓度外敷患处。

疗 效：我所曾用本方治愈多例，一般敷药二、三次即愈。

来 源：凭祥卫生所

二 方

主 治：痈瘍（局部蜂窝組織炎）。

处 方：三黄湯加味：黃連 黃芩 黃柏 紫草 梔子各三兩 銀花連翹各五錢

用 法：用水五百毫升煎取二百毫升，成人每天分二至四次服，每次服五十毫升，儿童九岁以下，每天一百毫升分四次服。二岁以上每天六十毫升，分四次服。

功用：清热解毒。

疗效：曾用本方治愈数例。如唐××，男，三十八岁。十二天前在左小腿中三分之一处内侧生花生米大瘤肿，渐渐增大，潮红肿大有压痛，治疗七天痊愈。

来源：桂林市工人医院。

三 方

主治：小孩或成人一般疮瘤，无论脓成或未成均治。

处方：铁篱笆〔162〕叶适量

用法：铁篱笆叶洗净晒干，研成细末，用时加少许红糖以冷开水调成糊状敷患处。

疗效：曾用本方治疗疮瘤三十多例，疗效均好，早期疮瘤敷二次，炎症即可消失，晚期敷一两次即可穿头自动排脓，再敷一二次即可痊愈。很多患者反映，敷药立即清凉止痛。

来源：南宁专区人民医院 曾毅

四 方

主治：儿童患疮瘤，此愈彼发，缠绵难愈。

处方：法夏三钱 花粉三钱 白芨二钱 山甲珠一钱 银花三钱 贝母二钱 皂刺一钱 知母三钱 乳香二钱

用法：水二碗煎取一碗，一日分三次服，每隔四小时服一次。或酒水各半煎服。

功用：清热，解毒，消痛、疮。

疗效：用本方治疗数例，均获良效。

来源：广西中医专科学校 叶缦卿

编者按：本方即外科正宗内消散，能使痛疔疮瘤内消，毒气内化。

治 疮 瘤 膏 药 方

主治：疮瘤无论已溃或未溃均治。

处 方：麻油三斤 男子头发兩團 馬前子一兩 蜈蚣二十條 全蠍三十只 蟬退二錢 蛇蛻九條 赤芍一兩 生地一兩 沒藥一兩 乳香一兩 白芷一兩 紅花一兩 當歸一兩 黃柏一兩

制 法：上藥用麻油浸泡然後煮，煮好後過濾再煮，後加入黃丹二斤攪勻成膏，冷卻備用。

用 法：將膏藥攤于布上或油紙上貼患處。

療 效：本方系蔡任洪醫師秘方經我院使用效果很高。如蒙××，男，三十四歲，荔浦人。右側後頸生小瘡，腫痛，硬塊如二分幣大，紅腫灼熱疼痛，頸活動受限；病已二天。敷貼本膏後，當晚疼痛減輕，能安睡，次日換藥紅腫範圍縮小，頸部活動已無障礙，第三天紅腫消去大半，疼痛極微，第四天已無疼痛，共貼膏藥三貼，現僅遺有約小綠豆大硬結未吸收完。

來 源：桂林市人民醫院

治 兒 童 頭 疮 方

主 治：小兒夏令頭上生疮。

处 方：紫花地丁三錢 銀花二錢 連翹二錢 荊芥二錢 生地二錢 紫草根二錢 牛子二錢 甘草一錢 升麻一錢 杭菊一錢

用 法：水二碗煮取一碗，一日分二次溫服，連服三劑。

功 用：清熱，解毒。

療 效：小兒夏令頭上生疮，服本方兩劑即消，三劑痊癒。療效均很高。

來 源：廣西中醫專科學校 駱一樵

治 疮 瘍 脓 肿 方

一 方

主 治：各種疮瘍脓肿。

处 方：桐油石膏軟膏：桐油四兩 生石膏一斤（研成細末）

用 法：將桐油煮沸，倒于石膏粉內，攪勻，冷卻即成軟膏。根據患處面積大小，將軟膏攤于棉墊上，敷于患處，每日換藥一次。

功 用：解毒，消腫，排膿，止痛。

疗 效：用本方治愈數例，療效良好。如袁××，女，二十四歲。患乳腺炎，經注射西林油，內服磺胺類藥物無效，后用桐油石膏軟膏敷二日痊愈。

来 源：臨桂縣醫藥科學研究所。

編者按：本方與第一集瘡瘍類治深部膿瘍方（222頁）組成藥物相同，但制法有異。

二 方

主 治：痛腫潰爛（化膿性痛腫）。

处 方：灶里新鮮草木灰二份 熱開水二十份

用 法：將開水和草木灰混合攪勻，澄清後，連續過濾二次，即可使用。用灰水濕棉墊，冷敷于患處，經常保持濕潤，每天換棉墊一次。

疗 效：本方治療化膿性痛腫十五例，效果良好。如李××，男，五十五歲。背部患痛腫，已十五天，面積約20×15公分，組織潰爛坏死，周圍紅腫，多處流膿，有惡臭，經其他藥物治療未見好轉。以後使用灰水治療，敷藥第一天，即見炎症消失，第二天即見肉芽新生，膿液顯著減少，連續五天，基本痊愈。

来 源：臨桂縣醫藥科學研究所

治 創 口 發 毒 方

主 治：皮膚創傷或湯火傷發毒化膿（綠膿桿菌感染）。

处 方：地榆四兩

用法：水三碗煎成碗半，一日分二次服。

附注：增加用量每日半斤（我們曾用如此大量于髂凹脓肿，均无不良反应）。

功用：解热，凉血，疗創瘍脓肿。

疗效：用本方治疗数例，效果良好。潘××，二十二岁。左下腿被車輾伤，自膝至踝全部皮肤撕裂，向下翻轉，創面粘滿污泥。当时沒有适当处理，12小时后入院，輸血后扩創，仍将皮肤縫合，五天后皮肤全部坏死，給予剪除，形成大創面。每日注射大剂量青霉素，局部用攸銷液湿敷，仍未能控制病势发展，創面有綠脓出現，病情加剧，脓液甚多，透过多层敷料，不規則发热。血培养有綠脓杆菌。后用本方治疗，連服十一天綠脓消失，体温下降至正常，漸次痊愈。

来源：柳州专区医院

治 創 伤 潰 瘍 方

主治：一切癰肿創伤潰瘍。

处方：生肌散：血竭17.2% 梅片0.8% 乳香41% 沒药41%

用法：上四味共研成末，先用5%桉树叶液或其他消毒洗滌水，將創面洗淨，然后将生肌散撒上适量，用紗布盖好，胶布綁定。

功用：消毒，去腐，生肌，埋口。

疗效：曾用本方治疗患者二十例，約二至三日即可愈合，疗效良好。如李××，男，二十五岁。患多发性癰肿，破潰后在疮面撒上生肌散，用消毒紗布盖好，胶布綁定，換药二次，第三天痊愈。

来源：柳州鐵路局桂北鐵路医院

治 蜂 窩 疮 方

- 主 治：**蜂窩疮，多生項背部，疮孔数十个，状如蜂窩。
- 处 方：**百草霜二兩 发灰二兩 硫磺一兩
- 用 法：**上三味，共研成末，調母猪油敷患处，每天換药一次。
- 功 用：**散瘀，疗惡疮。
- 疗 效：**陈××，男，四十五岁，凌乐人。背部患一大疮，疮口数十个，状如蜂窩，腥臭流脓。以本方治疗，七天痊愈。
- 来 源：**广西中医药研究所 李才魁

治 脓 瘻 方

- 主 治：**伤口久不愈，結成瘻管，时流脓水。
- 处 方：**泽兰五錢 白芨三錢 白芷二錢 阿胶五錢
- 用 法：**上三味用水二碗煮取一碗，去渣，納阿胶，微火溶化，一日分二次服。
- 疗 效：**黄××；男，三十二岁，隆林县人。因急性闌尾炎，手术后伤口愈合，但遺留一个瘻管，經久未愈。用本方治疗，服药四剂，伤口肉芽生长旺盛，繼服二剂，伤口愈合痊愈。
- 来 源：**隆林县人民医院中医科

治 白 泡 疮 方

- 主 治：**头面生小点白泡疮，痕痒，搔破脓水流出到处蔓延。
- 处 方：**蛇針草〔163〕一握 糯米浆適量
- 用 法：**蛇針草搗烂和糯米浆攪匀，以薄布包裹蘸塗患处。
- 疗 效：**何××，男，三岁。头生白泡疮，流脓潰痒，日久不愈，用本方治疗，数次即愈。
- 来 源：**广西中医药研究所 李才魁

治 黃 水 疮 方

主 治：黃水疮（濕疹），頭面生黃色水泡疮，痛癢，潰后流黃膿水，到處蔓延。

處 方：地榆粉90% 川連粉10% 麻油適量

用 法：調勻塗患處。

功 用：清熱解毒，去腐生肌，干水止痛。

療 效：袁××，男，二十八歲。面部發生紅癢丘疱疹，以后逐漸蔓延擴大到頸部，部分腐爛，流黃水及結黃色痂皮，痛癢難當，經治療未見效，局部腐爛滲液更甚，範圍亦較擴大。改用本方后，當日滲出液即大減，約一星期后丘疱疹及腐爛面完全消退，僅皮膚仍稍潮紅，以后繼續用藥，至皮膚色正常，痊愈。

來 源：梧州市紅十字會醫院外科

治 毒 疮 方

主 治：頭部太陽穴，生連串的疮，連到面部，色黃。狀如串珠，或生在身上。

處 方：鹿耳苓〔164〕 蒼耳子各一兩

用 法：將二味焙干研成細末，冷開水調勻，將藥搽患處，每日三次。

療 效：用本方治療十多例，效果良好。均用藥搽一至二日即愈。

來 源：馬山縣紅旗制藥廠 譚綬臣

陰 疽 艾 灸 療 法

主 治：陰疽腫毒或痛或不痛，漫腫無頭，皮色不變者。

用 法：用艾絨隔蒜灸法，于患處灸數十壯，以大痛為度。

療 效：江××，男，四十三歲。自肩至腰，腫大如包袱，漫腫無頭，皮色不變，已有半年之久，服藥無效。后用黃泥水染

粗紙貼腫處，看其先干之處是頭，于其上以蒜片敷之，燃艾絨頻灸，連續灸三次共百余壯。翌晨腹响作痛，大解秽毒盈盆，背部漫腫全消，其疾若失。

来源：貴县大圩乡 梁乃康

治 蛇 头 指 方

一 方

主治：指头发热紅腫疼痛。

处方：生南星二錢 生半夏二錢 雄黃一錢 黃柏一錢 冰片三分

用法：上五味共研成細末，灌入連汁猪胆囊中，拌勻，套于患指上，扎好，二至三天不需換藥。

疗效：本方治疗蛇头指患者二十例均愈，一般套藥三天即愈。

来源：象州县象州人民医院 卢德生

二 方

主治：蛇头疮。

处方：藍花四方棍〔165〕二兩（生草藥，又名水龙胆、韓信草）

用法：將生藥槌爛敷患處。

疗效：曾用本方治愈數例，效果良好。

来源：貴县思怀乡 甘上陸

治 蛇 头 疮 針 刺 法

主治：蛇头疮又名噤毒，发在指趾末端，初起即局部腫硬，疼痛剧烈，往往伴有发冷发热，精神萎靡，食思減退等症狀，數天后，由深部向外穿破流脓，該部肌肉隨即坏死潰爛，指趾骨脫落。

刺法：在通过病灶的經絡上，約距病灶五分至一寸半上方的压痛点上，經消毒后，用針刺入皮內，然后以小块胶布綁定則

可，直至病愈方能拔針。

附 注：一般下針后數十分鐘即能止痛，過二、三天則消散。此法治療越早則療效越高，魚肚疮、黃豆甲也用此治法，療效亦好。

療 效：韦××，男，二十歲。右手拇指端于睡時突然發痛，第二天即腫大帶硬，疼痛非常，寒熱并作，經診斷為蛇頭疮。在患指背面第二指骨皮膚的壓痛點上，置皮內針一支，用膠布綁定，約十分鐘后疼痛開始逐漸緩解，第二天下午已全部消腫止痛，將針拔出即愈。

來 源：廣西中醫專科學校 陳業佐

治 蛇 頭 疮 灸 法

主 治：蛇頭疮發于手指端，初起觸之自覺牽引性內痛，按之硬實而痛甚，其壓痛點呈紅色或淡白色。若失治繼則刺痛難忍，經數日或十數天即潰爛流膿，指節脫落。

灸 法：初起有點痛時，即在此痛點上用艾絨隔姜片灸之，由痛灸至不痛為止。

療 效：曾用此法治療兩例，效果很好。

來 源：廣西中醫專科學校 謝平熙

疔 毒 類

治 疔 疮 方

一 方

主 治：疔疮，各種毒疮亦治。

處 方：生火炭苗〔166〕一兩 食鹽一錢

用 法：將藥和食鹽搗爛后，把疮刺破，使微出血，然后将藥敷疮

的周圍。

療效：本方系劉六橋先生傳授，曾治愈數例。

禁忌：在治療期間，禁食辣椒、酸類。

來源：馬山縣人民醫院 黃日煊

二 方

主治：疔瘡（蜂窩組織炎毛囊炎癰瘡）。

處方：內服方：化疔內消散：皂刺 銀花 知母 貝母 花粉
山甲 白芨 乳香 赤芍 半夏 紫河車 甘草各二錢

外用方：東毒金箍散：白蘇 白芷 大黃各四錢 黃柏
綠豆各二錢 輕粉五分

用法：內服方：水二碗加酒兩半至二兩同煎取一碗，頓服，每日
一服。

外用方：共研成末，用醋調搽患處。

功用：拔毒，化痰，消腫，止痛。

療效：×××，女，二十歲。上唇左側近鼻孔前，有疼痛感，初
起黃豆大丘疹，根部稍腫，經用磺胺類藥治療腫痛反增
劇，且頭痛不得眠，后改用中藥化疔內消散內服，外搽東
毒金箍散，用藥時局部立即感到涼快，當晚頭痛消失，局
部疼痛大減，只有微痛已無其他不適感覺，能安睡。兩日
后腫已消，繼續用藥二日痊愈。

來源：梧州市 張大琥

治馬口疔方

主治：疔生唇部，初起小如粟米，繼則堅硬紅腫疼痛，甚則發熱
惡寒。

處方：水芹菜適量 生鹽少許

用法：上二味共搗爛，用芭蕉葉包裹，煨熱溫敷患處。

療效：鄭××，患馬口疔，發冷發熱，面青唇腫，飲食難下，用

本方如法治疗，三天痊愈。

来源：广西中医药研究所 李才魁

治 紅 絲 疔 方

主治：紅絲疔（初起形如小疮，渐发紅絲，扩延甚速。生于手者紅絲至心，生于足者紅絲至臍，生于头面者紅絲至喉，皆属危险）并治漆毒、丹毒、无名疔毒，及心气痛。

处方：定心草〔167〕（茎、根、叶均可）数株

用法：用冷开水洗净，嚼服，外搽紅絲（由紅絲尽头处搽向疮口，勿倒搽）及敷患处。

疗效：曾用本方治愈数例，效果良好。

来源：广西中医药研究所 李才魁

治紅絲疔（淋巴管炎）刺法

主治：四肢皮肤生小疔或小创伤化脓，初感微痒，繼則紅肿疼痛，由患处沿上出现紅絲一条，向肘窝、腋窝或膈窝、腹股沟等部扩展，紅絲经过处略有压痛，和微有硬实之索状物感觉，有时伴有寒热症状。

刺法：在紅絲发展尽头点經消毒后，用針輕挑皮肤数下，讓浅淡血液渗出少許（即使淋巴液渗出少許）即可。

疗效：曾用本方治愈八例，疗效很好。学生×××，手部患紅絲疔（淋巴管炎），紅絲已发展至腋下起淋巴結，注射青霉素及服消炎片三天无效。后用本法治疗，在腋下紅絲尽头处，經酒精消毒后，用注射針头輕挑皮肤数下，讓淋巴液渗出少許，三小时后紅絲开始消退，一天后全部消退，患部亦即此而愈。

来源：象州县人民医院 蔣繼榮

编者按：本法民間常用，效果很好，亦有用灯草火爆灸紅絲发展尽头点者，爆灸后紅絲不久消退，效果也好。

骨 疽 类

治 骨 疽 方

主 治：骨疽（骨結核）。

处 方：蜈蚣一兩 全蠍一兩 蟪虫一兩 黃連五錢 乳香五錢 沒藥五錢
麝香一錢 牛黃五分

用 法：各研成細末和勻，煉蜜成丸如小豆大，瓶裝密封勿泄氣，
每日服三次，每次一錢，空腹開水送下。

功 用：活血散瘀，辟穢祛毒，去腐生肌，止痛。

疗 效：曾用本方治愈數例，效果很好。彭××，女，二十二歲。
月經不正常，身體消瘦有時咳嗽，于左下腹部近鼠蹊部突起，有輕度壓痛，腰部脊柱第四至五椎突起，且向左右側彎曲有顯明壓痛，左下肢不能完全伸直，且有疼痛。X光：
1.第五腰椎及荐骨第一節明顯骨質性破壞其中有小片狀密度增加陰影。2.兩肺紋理稍多，面上云絮狀陰影。診斷：
腰椎結核浸潤型肺結核。先由西醫外科治療八十多天無效，后用本方丸藥，配合陽和湯內服治療八個多月，體重增加，月經正常，X光檢查第五骨椎骨質恢復正常，痊愈。

来 源：梧州市人民醫院 區全生

治 脫 骨 疽 方

主 治：脫骨疽（血栓閉塞性脈管炎），多生足趾，生手指者亦有，初起如粟，黃泡一點，皮色紫黯，猶如煮熟紅棗，黑氣浸漫，黑色不退，痛極，夜間痛尤甚。

处 方：四妙勇安湯：元參三兩 當歸二兩 金銀花三兩 甘草一兩

用 法：用水一斤煎取半斤，渣再加水十兩，煎取四兩，兩次藥液混合煎開，一日分三次服。

功用：活血行血，清热解毒。

疗效：×××，女，二十二岁。两手十指呈现焦黑坏死，指甲萎缩已半年，夜间疼痛甚剧。用本方每日一剂，连服二十天后，指头恢复原来色泽，黑焦坏死现象已不复存在，疼痛亦完全消失。

来源：梧州市红十字会医院外科

乳 痛 类

治 乳 痛 方

一 方

主治：乳房肿胀疼痛或溃瘍流脓。

处方：独树蚊蝇翼〔168〕适量

用法：槌烂用白布包裹，挂帐门口或放患者衣袋内，敷患处或煲水洗亦可。

疗效：本方对乳痛、乳癌均治，经多年临床使用，疗效很高，曾治愈数例，轻症三天，重症七天即愈。

来源：平南县同和 吴国珍

二 方

主治：妇女乳痛。

处方：鬼点火〔169〕（地骨皮）三钱 六月雪三钱 地胆头〔170〕三钱 鸡蛋一个

用法：先将鸡蛋打开去壳与药混合，用水两碗，煮取大半碗，分两次服，一天一剂，连服三天。

疗效：黄××等数人患乳痛，均用本方治愈。

来源：鹿寨县 韦石保

三 方

主治：妇女乳房紅肿疼痛或发寒热。
处方：龙船花叶〔171〕四兩 葱头一兩 豆豉一兩
用法：水煎冲酒一杯，溫洗患处。
疗效：曾用本方治愈数例，效果良好。
来源：广西中医药研究所 李才魁

四 方

主治：乳房紅肿疼痛，有硬块或伴有恶寒发热，尙未成脓者
处方：橙果兩只
用法：用竹签插入橙果內作柄，放入鍋，用水煮滾，将橙取出，輪熨患部（勿燙伤皮肤），每日熨两次三次，每次二十分鐘。
疗效：謝××，女，二十四岁。产后右乳紅肿結硬，微恶寒发热，痛及腰肢，用此方如法治疗，一般第一日痛即止，翌日肿消，三日痊愈。
来源：南宁市 杜沛英

五 方

主治：乳痛。
处方：小仙鶴草〔172〕三錢 洗米水適量
用法：先将药搗烂，加入洗米水和勻。左乳痛将药敷于右手关脉处，右乳痛敷于左手关脉处，用布包好。
疗效：曾用本方治愈数例，一般敷此药后痛即止，换药再敷肿消即愈。
禁忌：忌內服。
来源：馬山县紅旗中心医院 罗日华

六 方

主治：妇女乳房或乳头发生板硬，肿痛，灼热，微恶寒发热，胸悶肿滿等。

处 方：黄柏三錢 黄芩二錢 干姜二錢 甘草二錢 蒲公英一兩

用 法：上五味共研成末，用冷酸醋攪勻成糊敷患处，每天換藥三次。

疗 效：本方治乳痛多人，不論初起及已成膿者，均有效，效果很好。

来 源：广西中医专科学校 梁益年

七 方

主 治：乳部紅肿灼热疼痛，身热陣寒，舌絳，脉数。

处 方：（一）外敷方：黄連 黄芩 黄柏 牛子 連翹 归尾各三錢
紅花二錢 麝香少許

（二）內服方：綠豆一兩 白糖少許

用 法：外敷方：上藥七味共研成末，加入麝香乳勻，以冷开水攪成糊狀厚敷患处（有乳汁者先擠盡乳汁，然後敷藥），藥干即換。

內服方：綠豆煎湯加少許白糖，當茶冷飲（飲湯不宜過飽）。

功 用：清熱解毒，活血散瘀。

疗 效：本方先後共治愈六十多例，療效很好。茲舉例如下：陳××，女，三十五歲。患乳痛，左乳右上方近乳頭處紅腫熱痛，約一寸大，伴有身熱（三十八度），陣寒，舌質紅苔微黃，脉数有力，大小便黃。用外治方敷治一日痛減熱退，二日痛已甚微伴有痒感，三日痊愈。

来 源：广西中医专科学校 曾乃奇

八 方

主 治：乳痈失治，潰瘍流膿。

处 方：儿茶一錢五分 乳香一錢 沒藥一錢 梅片三錢 白芷一錢五分
熟石膏四錢 龙骨一錢五分

用 法：上七味共研成末，茶油調和塗患处，或用藥末撒患处亦可。

功 用：去腐，止痛，生肌收斂。

疗 效：北流县北京公社韦××，患乳痈，失治潰爛，久不收口，
用本方一服即愈。

禁 忌：忌食魚腥、发物、油膩及房事。

来 源：北流县北京公社医药研究所 庞英中

无 名 肿 毒 类

治 无 名 肿 毒 方

一 方

主 治：无名肿毒，紅，肿，热痛。

处 方：鵝不食草 朝天秒〔173〕 半边蓮〔174〕 瓜子菜〔175〕
各等分

用 法：上四味用生药，每味量視患处大小用五錢至一两，用时取
生药加少許酒搗爛，敷患处，每天換药一次。

疗 效：吳××，男，三十岁，源头圩人。左侧耳前颌下肿硬发
热，疼痛难以张口，茶飯难进。用本方治疗即愈。

来 源：平乐县科学技术委员会

二 方

主 治：无名肿毒。

- 处 方：**四眼草(176) (又名土薄荷，叶子有点白毛，有臭香气，四方梗，形似紫苏，为唇形科植物) 一握
- 用 法：**上药捣烂，用酸醋浸，隔汤蒸热，熏洗患处。
- 疗 效：**本方曾用以治愈无名肿毒三十余例。如覃××，男，三十二岁。右脚下腿胫骨面稍觉痕痒，用手扒后，即发热红肿疼痛，肿至膝部，不能行走，用本方治疗，一剂即愈。
- 来 源：**象州县象州公社医院 周振文

瘰 癧 类

治 瘰 癧 方

一 方

- 主 治：**瘰癧。
- 处 方：**外用方：地苦胆(177) 一兩 韭菜花二兩 黄花菜(94)三兩
双酒三兩
內用方：地苦胆一兩
- 用 法：**外用方将药捣烂调双酒炒热贴患处，每隔两天换药一次，連換三次。內服方，地苦胆用水三碗煎取碗半，分三次服，每天服一次。
- 疗 效：**本方系祖传秘方，曾用本方治愈数例，效果很好。
- 禁 忌：**忌食雄鸡、牛肉、大蒜。
- 来 源：**天峨县人板公社公昌大队 李玉祿

二 方

- 主 治：**頸項瘰癧。
- 处 方：**小白蜡叶 [178] 十六斤
- 用 法：**先将上药洗净，用水三十斤，熬出浓液过滤，再浓缩至兩

斤，开成膏药敷贴患处，一天换一次。

疗效：罗××，患瘰癧，用本方治愈。

来源：鹿寨县 周起松

三 方

主治：痰核。

处方：入地蜘蛛根〔179〕（分量按核大小酌用）

用法：将药根捣烂，加黄糖少许和匀，敷患处，一日换二次。

附注：蜘蛛根系生草药，叶似萝卜形，叶边开齿，各地坡岭有产。

疗效：李××，女。在左边腮下生一瘰，用本方，仅外敷四天即愈。

来源：柳州市联合诊所

拔 取 瘰 癧 方

主治：瘰癧（颈部淋巴腺结核）。

处方：升痒丹：明矾一兩 火硝一兩 食盐五錢 白降丹一兩 水銀一兩 皂矾一兩

制法：将上药研成细末，然后加水银再研至水银溶解为度，把药粉全部放入罐内，用一个光滑瓷碗盖好，用蜡泥密封，勿使泄气。升丹时用木炭把罐的周围堆好燃烧，约三小时左右，看见罐上有绿色烟冒出即成。然后把碗上丹药刮下来，研细末，再用饭混合做成丹锭晒干备用。

用法：将丹锭研成粉，放在随便一种膏药上面贴于患处。

疗效：本方治疗颈淋巴结核十三例，疗效良好。举例如下：秦××，女，三十四岁。因患淋巴结核，久治无效，曾用此丹放膏药上贴患部，一星期左右，淋巴结核拔出，以后换上生肌药膏，连续紧贴二十天痊愈。

来源：临桂县医药科学研究所

編者按：瘰癧初起，此方不適用。

瘰癧灸療法

主治：頸部瘰癧（頸淋巴結核）無論已潰或未潰均治。

穴位：用麻線一根，長約三尺。用線由尺澤穴貼肉直量到中指尖中冲穴處為止（男左女右的手），另加四個同身寸長，然後截斷，將這條線的長度再由背下的尾髓骨沿脊貼肉向上量，在尽头處即是穴位，亦即中穴，向左右橫開一寸八分，即是左穴、右穴。

灸法：在測定的中、左、右三個穴位上，同時放上艾絨，粗約小指頭大，高約五分，同時點燃，灸到劇烈疼痛時再移開，繼續放艾絨灸第二壯。前三天每日灸二壯，至第四、第五、第六後三天每日灸三壯，六天為一療程，休息六天再進行第二個療程，總共只須三個療程即能痊癒。

療效：本療法曾治愈淋巴結核病多例，效果很好。（一）謝××，女，二十七歲。患淋巴結核多年，曾住醫院進行手術切除，長期服過大量雷米封和對胺柳酸均無效，並且淋巴核穿孔流出臭黃水，後用艾灸療法，三療程，穿孔的淋巴核全部結疤，逐步痊癒；（二）莫××，女，八歲。患淋巴結核已二年，沒有穿孔，經常發熱腫痛，經第一療程後，症狀消退，連接三個療程，淋巴結核消失。

來源：臨桂縣醫藥科學研究所

痔 疮 类

治 痔 疮 方

一 方

主 治: 痔初起时，于肛门边突出瘰肉，状如鼠奶，且痛且痒者。

处 方: 千里光(180) (又名黄花草、紫背娘)叶一握

用 法: 将药捣烂，用粗纸包裹，用清水浸湿，再用热灰煨热，乘热敷患处(不要烫伤皮肤)，药冷后再换热药，反复换敷，敷至痛痒均止为度，如此施行数日，即渐痊愈。

附 注: 如敷药不愈，可用大蒜针针刺，其法用粗针一顆，大蒜一个，先将针用桐油灯火烧红，锥入大蒜内，然后再针刺肛门上的痔核或周围肿起处，如此轮流遍刺至出黄水后，再用千里光叶如上法敷治即愈。

如痔核日久不愈，血出淋漓，大便时肛门脱出，可用田螺两个，用针挑去螺唇，以冰片一分放入田螺内，用田螺吐出的水搽，肛门即缩入，以后仍用千里光叶如法敷治数次即愈。

疗 效: 本方曾经临床观察多例，治愈后一、二年再发者极少数，绝大多数是能根治的。

来 源: 临桂县医药科学研究所

二 方

主 治: 大便艰难，出血，有时脱肛。

处 方: 苦参一兩 夏枯草一兩 川棟子二錢

用 法: 用水煎服，并当茶饮。

疗 效: 李××，男，三十多岁。患内痔，刺痛难忍，大便艰难，

至肛門已發紅腫，起紅色如米粒樣，疼痛時，服本方三劑，稍為好轉，後以此藥當茶飲，服十多劑即愈。

來源：田東縣 賴立矩

三 方

主治：外痔。

處方：內服方：生地五錢 槐花四錢 銀花三錢 苦參四錢 黃芩三錢
甘草三錢

外洗方：五倍子二兩（打碎）

用法：內服方：用水兩碗，煎取大半碗，日分兩次服完。

外洗方：用適量水煎每日熏洗兩次。

療效：本方曾治愈數例，效果良好。

來源：鹿寨縣 饒松圃

四 方

主治：外痔，形如銅扣，根小頂大。

處方：煨信石一錢 硃砂五分 烏梅（煨存性）一錢

制法：用瓦片一塊，放信石于瓦上，用火煨之使紅，然後再焙干烏梅，共為細末，備用。

用法：以口水調拌藥粉塗于瘡頂。

附注：塗藥後過了三、四天，患處即漸漸流出臭水，水盡即消。

療效：本人患外痔用此方治愈，并治愈黎屯韦武周等人。

來源：馬山縣石塘公社中心醫院 韦成英

五 方

主治：外痔，直腸口及肛門邊緣痔核累累。

處方：苦參一兩半 黃柏八錢 荊芥五錢 白芷二錢

用法：用水三碗煎成碗半，去渣，分二次乘熱燙洗患處，每天早上及晚上臨臥前各洗一次（如有單味提煉的流膏劑，臨用

时倒适量与热开水混和烫洗，不但使用方便，且疗效比煎剂较优，献方人过去经治病例，多数用中医院提炼的流膏剂）。

功用：疏风，去湿热毒。

疗效：多年来曾用本方治外痔共三十多例，除个别病例热特盛的兼内服“槐花、黄连、地榆、甘草”四味煎汤一、两剂佐治外，一般单用上方外洗治疗。施治后症况立即缓解，一般连洗三至五天告愈，痔核消散，很少复发，仅个别较顽固的，须连续洗至十多天即愈。举例如下：

献方人于1946年秋患外痔，肛門周緣結有大小痔核大顆，大的如大豆大，小的如綠豆大，硬实疼痒，累累贅贅，壅阻至肛門狹小，解大便或坐立行动一經压迫摩擦，則痛加剧，如遇結实粪便，必脫肛把痔核尽翻出肛門外，才能排出粪便，同时流下滴滴鮮血，更苦不堪。

用本方外治热药湯用布块蘸药慢慢烫洗患处，舒适異常，痛苦頓覺松減。才治一天，痔核已显呈消退，連洗五天，完全消散告愈。至1955年秋，因飲酒及食燥热食物过多，复发，初萌时再用本方洗治，两天便愈，至今未复发。

来源：广西中医藥研究所 黃汝紹

治痔疮出血方

主治：內痔、腸风、痔漏出血。

处方：茄子一兩（干的灰白色茄子）

用法：把干茄子火煨成炭，研成細末，每次內服一錢，用白开水送下。

疗效：曾用本方治愈多例。

禁忌：忌食魚腥、生姜、羊肉、狗肉等食物。

来源：馬山县金釵公社 潘海波

治痔漏方

一 方

主、治：痔漏經年累月不愈，肛門周圍痕痒，潰爛流腥臭黃水，嚴重者不欲食。

处 方：鮮空心菜〔181〕一兩 生鹽五分

用 法：將上藥共搗爛（藥量以患部大小增減），于夜間先用開水加入生鹽少許，待溫洗淨患處，然後將藥敷上扎好。輕者一次愈，重者二至三次愈。

疗 效：曾用本方治療十六例，均痊愈，療效很好。羅××，男，六十五歲。患痔漏，治療經年未愈，肛門周圍潰爛，延及兩邊臀部，有多處漏，流出腥臭膿水，僅敷本方三劑而愈。

来 源：象州縣妙皇公社民辦醫院 胡 文

二 方

主 治：肛門前側近前陰處，痕痒疼痛，發熱，腫脹，搔之則感辣痛。

处 方：內服方：鮮上生地〔182〕一兩（干的五錢）

外洗方：松毛（松樹葉）不拘多少

外塗方：土生地粉一兩

用 法：內服方：將上生地用水一碗，煎取半碗，一日分二次服。

外洗方：將松毛用水煎，熏洗患處，一日洗一次。

外塗方：上生地粉用好酒浸過藥面，塗搽患處，每日塗三至四次。

附 注：如患者症非嚴重，無須用內服方。

疗 效：本方曾用以治療痔漏患者十四例，均愈，一般用藥四至七天即愈。潘××，男，五十六歲。患痔漏十年，多方治療無效，後只用本方外洗及外塗八天痊愈，至今兩年多未見

复发。

来源：象州县象州公社医院 周振文

潰瘍類

治疮瘍潰烂流脓水方

主治：皮肤疮瘍，潰烂流脓水，經久不愈。

处方：祛风敗毒散：防风五錢 白芷五錢 川芎三錢 細辛二錢

用法：上四味共研成細末，用浓茶調勻，以鴨翎蘸藥塗于患处，随干随塗，若藥粉积厚，用溫水洗去，繼續塗藥，塗至結痂为止。

功用：祛风，敗毒。

疗效：1922年，北流梁某小儿，三岁，自周岁时，由两足底起小泡数粒，色皎白，潰后流水，延遍两足底潰烂，久治无效，余認為胎毒下注，发出变为潰瘍，但破久受风，非祛风消毒必不能愈。随借用古方軟脚散治疗，数日后喜来报告，用藥散半剂即愈，余以为偶然倖中不以为意。后凡遇小儿大人患皮肉疮瘍，無論在头面手足等处均用本方治之，屢試輒效，愈人甚多，故改名祛风敗毒散以彰其用。

来源：广西中医藥研究所 李庆云

治疮瘍烂肉久不埋口方

主治：疮瘍潰烂久不收口，常流脓血稀液，腥臭难聞。

处方：干鴨蛋清（將鴨蛋清塗于瓦上晒干）五錢 三七三錢 血竭四錢
冰片一錢 麝香一分 乳香四錢 沒藥四錢 王不留行八錢
儿茶四錢 輕粉一錢五分

用法：共研成細末，用香油和藥末調塗患处，干后复塗，每晚以苦登茶煎液湯洗一次。

功用：解毒，去腐，生肌，埋口。

疗效：梁××，女，右足小腿比目肌部位，潰烂久不愈，經常流出夹脓夹血的稀薄液体，有腥臭气味，多年治疗无效，后用本方治愈。

来源：广西中医专科学校 梁益年

治 下 肢 潰 瘍 方

主治：下肢潰瘍久治不愈。

处方：絲瓜叶粉十份 孩儿茶一份 冰片少许

用法：将上药研成細末，先用絲瓜叶煲水洗患处，后将药粉撒患处。

疗效：卢××，女，二十四岁。患两下肢潰瘍，流出腥臭黄水，历时半年不愈，用本方治疗二剂即愈。

来源：大苗山融水鎮联合診所 莫 昆

贅 疣 类

治 贅 疣 方

主治：皮肤贅疣。

处方：鴉胆子适量 酒适量

用法：鴉胆子研成粉末，投入适量酒或开水中浸泡四至五小时后，用棉杆蘸浸液塗在划破了的贅疣顆頂（連渣帶酒塗上，最好換上敷料），待四、五天後，疣即逐漸漲大而致萎縮，六、七天後成痂脫落痊愈。

疗效：本方共治愈四例。三例塗药两次即告痊愈，一例由配药浓度太稀，塗三次才基本痊愈。

来源：灌阳县 唐祖礼

骨 哽 类

治 骨 哽 喉 方

一 方

主 治: 骨头卡喉，吞不下，吐不出，呼吸困难，言語不出。

处 方: 灯笼果〔183〕叶二兩

用 法: 将新鮮灯笼果叶搗烂和洗米水一碗混合絞取汁服。

附 注: 灯笼果是当地土名，生于原野山脚，是一种小灌木，高五、六尺，叶复生，大小及性質很象龙眼果叶，仅顏色較浅，叶背灰白色无毛。据天等县人委卫生科鑑定名为鉄扫把（天等县卫生科編中医驗方秘方集錦初稿）。

疗 效: （一）张××，女，二十岁，大平街人。因吃兔肉不慎給骨卡在喉嚨，呼吸困难，不能說話，面色蒼白，病情严重。后来服灯笼果叶汁后，自覺輕松，骨块漸下，呼吸較緩，已能說話，不到两个鐘头，骨头吞下，痊愈；（二）李××，男，二十五岁。为魚骨卡喉，来門診急救，当时痛，吞嚥困难，服灯笼果叶汁一剂，分两次服，經两三小时即愈。

来 源: 天等县人民医院

二 方

主 治: 諸骨哽喉。

处 方: 苦石蓮子树根〔184〕

用 法: 上药切片，含于口中，徐徐吞嚥口水。

疗 效: 本方曾用以治疗二十例骨哽患者，效果均好，一般含服半天即愈。如：（一）覃××，男，四十岁。被鴨骨哽喉，吞嚥困难，不能說話，用本方含药数小时即愈；（二）覃

××，男，十六岁。被牛骨哽喉，吞嚥困难，含药一次即愈。

来源：象州县象州公社医院 周振文

三 方

主治：鱼、鸡、鸭骨等哽喉。

处方：欖核（烧灰）五分 蜜糖一两

用法：以欖核灰调蜜糖吞服，骨即落。

疗效：曾用本方治疗三例骨哽喉患者，均获痊愈。

来源：南宁市 谢光甫

四 方

主治：凡因食带有骨、刺食物，被骨刺哽阻于咽喉，吞之不下，吐之不出，轻者令人不适，重者喉部疼痛，不能饮食，吞涎亦痛。

处方：威灵仙一两 草果二钱 砂仁二钱 白糖二两

用法：上三味，用水四百毫升煎至三百毫升，后加白糖煎沸至白糖溶解和匀即得，待药液温暖，徐徐咽之，小孩用水酌减。

疗效：本方曾治愈骨哽喉七例，其中鱼骨哽喉五例；鹹鱼骨哽喉一例；猪骨哽喉一例；哽喉时间三小时至三天不等，仅服药一剂而愈，一例服药未完一剂，骨即吞下胃中，治疗时间不超过半小时，症状即消失。

来源：融安县长安民族医院

编者按：本草綱目載有威灵仙醋浸丸嚥，同砂仁煎服治諸骨哽，又縮砂密浓煎服或加甘草治金、銀、銅、鉄哽。

五 方

主治：鸡骨哽喉。

处方：八角粉二钱

用法：用新白布縫一小袋子，裝入藥粉，將該藥袋含于口中，徐徐嚥下藥液即愈。

療效：張××，男，四十九歲。被鷄骨哽喉，用此藥治之即愈。

來源：馬山县金釵醫院 潘海波

六 方

主治：豬骨哽喉。

處方：真象骨約一錢

用法：用冷開水少許置碗內，磨象骨于水中，略成濁色，分作三次口服，徐徐嚥下即愈。

療效：曾用本方治愈數例。

來源：馬山县古零中醫院 黃云江

七 方

主治：魚骨哽喉。

處方：橄欖核五錢

用法：碾成細末，用適量水煎成濃液含在口內慢慢嚥下。

療效：覃××被魚骨哽喉，用本方治療即愈。

來源：馬山县古零中醫院 覃文林

毒蛇咬傷類

治蛇咬傷方

一 方

主治：毒蛇咬傷。

處方：落地金牛〔185〕一錢 三花酒一兩

用法：先將傷口刺破血出，再把藥與酒混合後，由上往下擦，于

了又搽，如能吃些更好。如伤口破烂，加小叶田基黃同捶烂（不用酒）敷伤口周围，留出伤口不敷，以出毒气。

疗 效：曾用本方治愈数例。

来 源：鹿寨县 譚儒廷

二 方

主 治：諸般毒蛇咬伤。

处 方：路边菊根〔186〕一兩 烏柏树〔62〕叶一兩

用 法：将药捶烂，先剃光額門头发，微刺出血，把药敷上包好，三天內不可去药。

疗 效：曾用本方治愈数例。

来 源：鹿寨县 覃华康

三 方

主 治：毒蛇咬伤。

处 方：細半边蓮一兩 田基黃〔51〕一兩 了刁竹〔187〕八錢 紅烏柏木〔188〕一兩

用 法：上药共捶烂用水酒煎服，渣搽肿处，由上搽下，搽后敷伤口周围。

疗 效：蒙××被毒蛇咬伤左手，紅肿至胸部，伤口腐烂，奄奄欲毙，曾用本方治愈。

来 源：貴县附城公社卫生所 蒙惠安

四 方

主 治：毒蛇咬伤。

处 方：（一）外敷方：大排錢树〔189〕 小排錢树〔190〕 大黃根皮各等量

（二）內服方：山豆根二兩 甘草一兩

用 法：外敷用的药，取生药捣烂后，先用小刀消毒后刺患者百会

穴，使微出血，然后将药敷刺处，使毒液从伤处流出。一面用内服方用适量水煎取浓汤服下。

疗效：曾用本方治愈被毒蛇咬伤数十例。

来源：马山县周六公社周六制药厂

五 方

主治：毒蛇咬伤。

处方：(一)方：火柴头十枝

(二)方：蛇头乌柏木(叶三角形如蛇头的乌柏木)不拘多少

用法：用火柴划着火一枝一枝烧灼被咬伤处，如不能及时烧灼，已到创口肿痛难堪时，可用(二)方煎水洗患处，由上洗下，即肿痛止。

附注：凡被毒蛇咬伤创口，火柴头烧灼没有疼痛感的，不必畏惧。

疗效：本人曾三次被毒蛇咬伤(捉蛇)，均用火柴头烧灼痊愈。

来源：百色县人民医院 梁子镇

六 方

主治：毒蛇咬伤。

处方：乌柏木叶(62) 枫木叶(191) 各三、四两

用法：上二味共捣烂，用第二次洗米(糯米更好)水冲服，渣敷伤处，留出伤口不敷以出毒气。

疗效：骆××，凌乐县人。被吹风蛇咬伤左脚母趾，毒气散漫，第二天脚肿腹胀，呼吸困难，状甚严重。用本方治疗，一剂毒去肿消，继续用药，即告痊愈。

来源：广西中医药研究所 李才魁

七 方

主治：毒蛇咬伤。

处方：山梔子二两半 五灵脂 北辛 雄黄 川连 白芷 半边

運各二兩（如无半边蓮可用黃柏代替，功效亦同）

用法：先將上藥焙干，研成細末，裝入玻璃瓶備用，用時以75%酒精三十毫升開藥粉三克攪勻，將藥液從傷口周圍腫處搽起，腫到什麼地方搽到什麼地方，留出傷口勿塗藥，日搽四次。

療效：本方乃是家傳秘方，療效很好，一般經搽藥後二小時即能止痛，治療兩天症狀全部即消失，本人行醫二十多年曾用本方來治愈毒蛇咬傷數例。蔡××，男，二十歲，河池縣人。因被黑斑蛇咬傷右腳，患肢紅腫，蔓延至全小腿，在右側小腿下外側三分之一處，創口潮紅腫脹，自覺痛辣，用本方調治一小時後痛止，兩天症狀消失痊愈。

來源：河池縣人民醫院 梁智雄

八 方

主治：毒蛇咬傷，傷口已閉，毒氣攻心，時吐粘液，吞物難下，胸滿悶，腰硬脚脹，全身倦怠，頭暈，傷口不大腫而辣痛灼熱。

處方：五靈脂三錢 麻黃六錢 細辛三錢 山甲珠四錢 川烏三錢
威靈仙三錢 川貝三錢 金退三錢 吳萸三錢 青蒿三錢 白芷六錢

用法：用水二碗煎取一碗，分三次沖酒服，每二小時服一次。亦可用雙酒一斤半浸藥備用，服時以醉為度，否則效力不強，傷口閉者，須刺破（要經消毒）使毒排出。

療效：鄒××，夜間去看田水，被銀包鐵毒蛇咬傷右手虎口，回家後，時吐粘涎，吞物難下，胸滿腰硬，頭暈，身倦，傷處辣痛灼熱。翌日中午，患者心窩部異常脹急，指肤已黑，傷口已閉，傷處灼熱辣痛而不大腫，斷為銀包鐵毒蛇咬傷（若屬金包鐵毒蛇咬傷，傷處當即腫大，此為主要鑑別點）。先將傷口刺破，使毒易出，用本方治療，並將藥渣

捶烂搽伤处。服药一剂后，病势大减，继服二剂痊愈。本方不但对银包铁毒蛇咬伤有效，而金包铁、饭匙头、水耗蛇、青竹蛇等咬伤亦效。

来源：广西中医专科学校 梁益年

九 方

主治：各种毒蛇咬伤，兼治无名肿毒。

处方：九子莲〔192〕（即独叶半夏） 青木香〔193〕（即天然草） 七叶一枝花〔194〕各等量

用法：上药三味共研末密藏备用。如被毒蛇咬伤，即取药末约二钱，重者先用醋冲内服，以免毒气攻心，然后拌酒自上而下搽之，勿着伤口，待搽至伤口流出黄水，即获痊愈，轻者不用内服亦可。

疗效：本方为沙子公社中医李坤之秘方，经其使用三十多年，治毒蛇咬伤效果极好。特别是天然草又名一点血、万丈龙、盘龙根，单独使用也有效，举例如下：蓝××，男，二十岁。被毒蛇咬伤左下肢外踝上方，未得及时治疗，很快往上肿大，先经中医给予服药未效，后用本方，先给天然草约二钱令其服下，继则用口嚼溶天然草，从上而下用力搽，约十分钟，伤口即流出黄水，再服药一次，痊愈。

来源：平乐县科学技术委员会

十 方

主治：吹风蛇、过山风蛇咬伤。

处方：大金刚苗〔195〕一握（生的）

用法：将上药捣烂，用酸醋半斤浸拌匀，饮醋留渣，以渣搽伤口周围，留口不搽，每日搽一至二次。

疗效：曾用本方治愈十多例蛇伤患者，举例如下：

梁××被吹风蛇咬伤右手桡骨头内侧，红肿至肩关节，呼

痛不已，用本方一剂，当日即肿消痛减，继续服数剂即愈。
来源：大苗山融水镇联合诊所 余 昆

十一方

主治：金包铁、银包铁蛇咬伤，疼痛不肿。
处方：无患子树皮半斤
用法：上药煎水适量，饮一半，以一半洗伤处。
疗效：柳城县东泉圩××被银包铁蛇咬伤右足背，疼痛无肿，用本方一剂而愈。
来源：大苗山融水镇联合诊所 余 昆

十二方

主治：青蛇咬伤。
处方：盐夫木根〔196〕三两 盐夫木叶适量
用法：将根用酒煎好吃下，木叶捶烂敷头顶（百会穴）。
疗效：曾用本方治愈三十多例。
来源：鹿寨县 黄三才

十三方

主治：青竹蛇咬伤。
处方：金錢吊葫芦〔197〕（又名山苦瓜）一个
用法：将药磨酒，由上搽下，不要搽伤口。
疗效：本方曾治蛇咬伤，效果很好。
来源：鹿寨县 覃华康

十四方

主治：金角带毒蛇咬伤。
处方：鲜七星剑（又名顶天辣）叶一钱五分
用法：令伤者嚼烂，取烧酒二钱，将药汁连酒饮下，药渣搽伤处

上端。

疗 效：罗××，被一种叫金角带的毒蛇咬着脚眼上边，剧痛无法行走，經治无效，当时伤者面肉紧张唇呈紫黑色，全身紧硬不能动，已奄奄一息。将七星剑叶令伤者嚼烂，取烧酒二錢，一面将药汁連酒飲下一面将药渣搽伤处上端，所搽到之处，即觉不痛，伤口有黄水流出，并有小气泡噴出，部分肿状消失，次日已能下床行动，后再用一些鸡樨叶、四边蜈蚣两种草药洗一下，十天左右已痊愈。

来 源：苍梧县卫生科

治 蛇 伤 虎 咬 方

主 治：毒蛇咬伤，老虎咬伤。

处 方：龙虎丹：生虎骨 生蛇骨

用 法：上药各研成末，分别瓶貯备用。毒蛇咬伤（无论什么蛇），用虎骨粉开酒搽伤口周围，老虎咬伤用蛇骨粉开酒搽伤口周围。

疗 效：曾用本方治疗毒蛇咬伤三十例。老虎咬伤或抓伤三例，均获愈。如欧××，男，四十岁。夜晚走路被毒蛇咬伤小腿，肿痛难忍，即用虎骨粉开酒搽伤口周围，立即止痛，肿势随搽随消。

来 源：岑溪县上游公社种药大队 范庆南

狂 犬 咬 伤 类

治 狂 犬 病 方

一 · 方

主 治：狂犬咬伤及伤后病发。

处 方：土蜂子（即螟蛉幼虫）五个（平时取就焙干备用） 龙爪刺〔198〕
一钱五分 小白合〔199〕一钱五分 半边莲〔174〕一钱五分 防风
一钱三分 甘草一钱三分

用 法：上药（干药）水煎内服，每日一剂，分二至三次服，服至
毒去尽为度。

疗 效：本方曾治愈患者不下百例。举一例如下：

潘××，男，三十二岁。被狂犬咬伤脚部，当时伤口肿痛，经中西医治愈后，经两个多月病发，怕风，恐惧，神志不清，口吐白粘，狂躁乱叫，牙关紧，用药一剂，牙关即轻松，二剂人已安静。服至第四剂痊愈。

来 源：龙胜县人民医院 秦瑞云

二 方

主 治：被狂犬咬伤，伤处溃烂或肿胀疼痛，或伤口愈合后，出现四肢痿软无力，怕风，怕水，或闻锣鼓声而发作狂犬病症状者。

处 方：新鲜鸡仔木根〔200〕一至二两

用 法：用水碗半煎取一碗，分三次服，每隔四小时服一次。隔日服一剂，连服三剂。以后每周服一剂，连服三至五周。令患者于服药后的第二天早上，解小便于石板或三合土上，如发现血丝者，为毒未尽，可继续服二至三周，仍如上法观察，如无血丝者，为毒已尽，可不再服药。

如伤处溃烂，或有昏倒不省人事，谵语等症状出现，须用鸡仔木叶一至二两捣烂敷伤处，留口不敷以泄毒气；如伤处化脓流黄水，须用鸡仔木茎及叶煎水洗伤处，内服鸡仔木茎，口服一剂，隔日再服一剂，以后每周服一剂。

附 注：本方于受伤后二十多天症状发作者，用本方有效。但伤后闻锣鼓声发作者，超过三天则难救治，症状重笃时咬牙甚者难治。伤处未经本方外敷，其伤口自然愈合，经一个月

或四十天后，有症狀出現者，給藥內服，同時用針消毒後挑破傷口愈合處，令出些血液及黃水以泄毒氣即可，無須再敷藥。

療效：本方系祖傳秘方，用本方治愈狂犬病十五人，一般輕症二至三天愈，重症五至七天愈。昏迷，譫語或流涎沫者，經敷服藥後，二至三小時即醒。如韋××被狂犬咬傷，當日上午八時被咬，十一時即感腹痛、頭暈，下午七時不能飲食。至晚上十時，給與本方外敷、內服，藥後至深夜三時，人已清醒，思飲食，經治療三星期痊愈。

來源：象州縣妙皇公社中心醫院 胡 文

三 方

主治：狂犬病。

處方：桃仁錢半（去皮尖） 生軍錢半 地龜虫七只（去頭足） 白蜜五錢

用法：用水酒各半（適量），煎取一小碗，沖白蜜作一次服，服後以大便下惡物為驗，連服至大便無惡物，停止服藥。

功用：祛瘀散血除毒。

療效：覃××，1952年被瘋狗咬傷，用本方治愈，至今無復發。

來源：岑溪縣糯垌太陽公社 李棣華

眼 病 类

治 眼 紅 腫 脹 方

一 方

主 治：眼紅腫脹。

处 方：皮硝五錢 薄荷冰一錢 川連二錢 猪胆二个

用 法：上三味共研成細末，放入瓶內，再放猪胆汁加三花酒少許混合，密封瓶口，一星期后即可用。用时以消毒棉花蘸藥水点眼，一天几次。

功 用：清热，消肿，止痛。

疗 效：李××等五人患眼病，均用此方治愈。

来 源：鹿寨县 梁炳权

二 方

主 治：目赤腫脹，目眥微痒，畏光。

处 方：生地適量 梅片少許（用量為生地的十分之一）

用 法：將上藥共搗如泥，敷患眼上，敷藥時間較長時，揭去露冷，再搗再敷，以紅退為止。

疗 效：1945年，高路矿区工人，終日接触桐油灯火烟氣，有十二人患目疾；症狀均同，兩目紅腫，目眥微痒，畏光，不欲視物，脉弦數，舌苔邊黃。治以平肝清熱劑，療效不大。用本方敷治，敷藥一、二天，十二人均獲痊癒。

来 源：广西中医藥研究所 李庆云

三 方

主 治：眼睛紅腫，紅筋微痛，時有流淚。

处 方：生地二钱 龙衣（火煨）三分
用 法：同猪肝煮熟，吃二、三次即愈。
功 用：凉血明目。
疗 效：曾用本方治愈数十人。苏××患此病，用本方治愈。
来 源：马山县金叙公社医院 潘海波

四 方

主 治：眼发红，刺痛，怕光，流泪，或眼睑浮肿（急性结膜炎）。
处 方：草决明四钱 梔子三钱 连翘三钱 赤芍三钱 甘菊三钱
生地四钱 桑白二钱 淡竹叶五分
用 法：水二碗煎取一碗，日分二次服。
功 用：清热，抑肝，滋阴降火。
疗 效：本方经长期临床应用，疗效很高，举例如下：
梁××，女，二十岁。双目发红，刺痛，流泪，畏光已三天，眼睑轻度浮肿，不易张开，近日发红，刺痛更甚。检
诊，舌色红带黄苔，脉弦数。治疗：服本方一剂，四小时
后开始退红，痛亦渐减，翌晨眼红已退大半，疼痛停止，
能张目看东西，流泪减少，连服三剂痊愈。
来 源：南宁专区人民医院 林 淇

治眼红痛起胬肉方

一 方

主 治：两眼红痛，起胬肉。
处 方：玄参四钱 泽泻三钱 柴胡三钱 防风三钱 菊花二钱
香附二钱 蒲公英五钱
用 法：水二碗煎取一碗，日分二次服。
疗 效：南宁市郊津头村黄××，十岁。左眼红痛，并起胬肉，服
本方五剂而愈。过数日右眼又红痛，仍服本方三剂而愈。

本方治赤眼，屢有著效。

来源：广西中医专科学校 林鳴皋

二 方

主治：赤眼或胬肉攀睛。

处方：加味葛根湯：葛根四錢 桂枝一錢 麻黃一錢五分 白芍二錢
大黃二錢 連翹三錢 夏枯草二錢 大棗三只

用法：水二碗先煎葛根、麻黃，煎开后去上沫，再放其他藥煎成一碗服。

附注：如熱較盛者，可減輕麻、桂。

疗效：一赤眼患者，用本方，服藥一劑而愈。

来源：广西中医专科学校 林鳴皋

治目赤生翳方

一 方

主治：眼生翳膜（角膜生翳）。

处方：蛇蛻五分 桑螵蛸七个 海螵蛸一錢五分（去硬壳） 麝香五厘
白丁香十二粒 大海片五分

用法：先把蛇蛻、桑螵蛸煨成炭，再把他藥混合研極細末每天用灯草蘸藥粉点几次。

功用：去風熱，消翳明目。

疗效：本方曾治愈六人，治愈時間，快的两三天即愈，慢的一星期而愈。

来源：鹿寨县 张鵬启

二 方

主治：目生白翳，遮蓋瞳人，畏光，視物不清。

处方：川椒 烏梅 北味 胆矾各等分 新綉花針十口

用法：用新瓦鍋一只，將上藥并針同放鍋內，以水二碗煎取一碗，先熏后洗。

療效：本人左目曾生白膜，漸次遮蓋瞳人，視物為二，用本方熏洗數次而愈。后介紹鄉中患者使用，收效亦佳，輕症熏洗二、三次，重症熏洗四、五次即愈。

來源：平南縣 李修鈞

三 方

主治：腎虧眼病，眼白紅而不腫痛，瞳孔邊微有翳膜，視物不明。

處方：熟地六錢 山茱萸三錢 淮山藥四錢 丹皮一錢五分 茯苓三錢 澤瀉三錢 杞子四錢 菊花三錢 沙苑蒺藜三錢

用法：水二碗煎取一碗，日分二次服。

功用：滋腎，益肝，明目。

療效：蕭××，男，五十一歲，昭平縣人。腎虧目病，如上述主治症狀，服本方八、九劑痊癒。

來源：廣西中醫專科學校 王鴻琛

治 看 書 眼 痛 方

主治：每看書報，眼如針刺，無眵淚，不紅腫，兩目外視如好眼樣。

處方：炙甘草三錢 大棗一兩 浮小麥一兩五錢 蕤仁肉八錢 熟女貞子六錢

用法：水三碗煎取一碗半，日分二次服。

功用：滋益肝腎，養陰明目。

療效：（一）鄒××，男，四十歲。患左目不能看書報，每看書報，未至一分鐘，則目珠痛如針刺，若閉目稍息，則痛自止，復看則復痛，無眵淚，無紅腫，外視目睛如常，左顏面時覺麻痺，脈虛弦。經中西醫治療數月無效，本方五劑

后。可看书报延至五分鐘，連續用本方以生地、淮山、桑椹、百合、杭菊、杞子、菊精等药加減服二十多剂，痊愈；
（二）邓××，男，二十五岁。左眼突然失明，据西医診斷为玻璃体出血。診察患眼，无眵泪，不紅肿，目睛如常，服本方十二剂复明。

来 源：广西中医专科学校 林沛湘

治翳膜遮睛失明方

主 治：肝肾阴虛，两目翳膜遮睛，完全失明。

处 方：山蛤四兩 冬瓜四兩 杞子五錢 盐油适量

用 法：以适量水煲烂，作菜送飯食。

疗 效：我的女儿，周岁时，眼睛干涩羞明。在眼痛期間，全无眵泪，亦不紅肿，經中西医治疗，不但无效且两目上膜，失明已經半月，用本方治五、六日后翳膜全消，复明，至今十余年来未見复发。本方曾治愈眼睛干涩畏光，不紅肿发热的眼病多例。

来 源：广西中医专科学校 林沛湘

治 眼 弦 烂 方

主 治：眼弦烂痒。

处 方：牛甘果叶〔80〕四兩 白矾三錢

用 法：用水煲沸洗患处。

疗 效：黄××，眼弦烂痒多年，一向治疗未效，用本方治疗痊愈。

来 源：崇左县銀团公社医院 张玄强

眼赤生翳針灸疗法

主 治：眼赤生翳（眼結膜充血）。

取 穴：合谷 曲池 睛明 瞳子髎

手法：前二穴作强刺激，后二穴中等刺激，留针二小时（第一次针），以后留十至十五分钟。

疗效：黄××，女，三十六岁。两目结膜充血，直贯瞳人变白翳，第一次针时留针二小时，出针后其白翳已变红色，次日复诊，症状消失大半，针二次即愈。

来源：融安县龙妙民办医院 陈秀湘

耳 病 类

治 耳 流 脓 方

主治：耳流脓腥臭久不愈（中耳炎）。

处方：芭蕉树汁

用法：把榨取芭蕉树自然汁液，用滴管吸汁，滴于患耳，每日滴二至三次。

疗效：曾用本方治疗中耳炎患者四例，均痊愈。黄××患中耳炎已十多年，1959年来院治疗，用本方治疗三天痊愈。

来源：忻城县人民医院

耳 内 痛 针 灸 疗 法

主治：耳内痛（神经性耳内痛）。

取穴：合谷 翳风

手法：中刺激留针十至二十分钟。

疗效：治疗五例，一次即愈。如张××，男，二十三岁。右耳内痛，吞嚥，说话等俱影响更甚痛。已经四日后，用上穴进针五分钟，痛即消失而愈。

来源：融安县龙妙民办医院 陈秀湘

鼻 病 类

治 鼻 衄 方

一 方

主 治：鼻衄。

处 方：樟木（細叶樟木）叶蕊一兩 百草霜一兩

用 法：將藥搗溶，沖開水服下。

功 用：調氣止血。

疗 效：本方曾治愈二十余例。举二例如下：（一）严××，男，二十岁。鼻流血三天不止，面色青黄，不省人事。用此方服下一小时后，血即止；（二）徐××，男，二十二岁。鼻衄不止，亦用此方治愈。

来 源：岑溪县三堡上游公社 卢丽明 邱可鉤

二 方

主 治：身热头痛，鼻孔衄血。

处 方：生地八錢 茅根五錢 白芍四錢 丹皮三錢 川連一錢
甘草一錢五分

用 法：水二碗煎取一碗服。

疗 效：（一）黄××，女，六十岁，昭平县人。患鼻衄，身热头痛，服本方一剂而愈；（二）何××，男，二十岁，昭平县人。身热头痛，鼻孔衄血，服本方三剂痊愈。

来 源：广西中医专科学校 王鴻琛

三 方

主 治：鼻孔流血不止。

处 方：艾叶二钱 柏子仁一钱五分 萸肉二钱 莲子三钱 淮山二钱
丹皮一钱五分 生地三钱 鲜荷叶一钱

用 法：用水二碗，煎取一碗，一日分二次服。

疗 效：占蓬公社莫××，男，二十五岁。鼻流血不止，余无其他
症状，仅服本方一剂即止。

来 源：忻城县占蓬公社周安民办医院 黄广昌

四 方

主 治：鼻衄。

处 方：烟屎（旱烟筒管内烟屎）

用 法：以小棉纸一张或两张，将烟屎塗于纸上，如左鼻孔出血，
贴于右乳头处，右鼻孔出血，贴于左乳头处，两鼻孔均出
血，则贴两乳头，贴后约五至十分钟即止血。

疗 效：1959年在水利工地，曾用本方治疗三十六例，均愈。如
覃××，男，二十七岁。右鼻孔出血，血流不止，用冷水
敷前额，血仍不止，用纸塞鼻孔，血即从口流出，面色青
白，全身倦怠，用本方治疗，顷刻血止。

来 源：象州县公社医院 周振文

治 鼻 息 肉 方

主 治：鼻生息肉。

处 方：藕节

用 法：将藕节洗净，用火烘干，研为细末，用竹管将药末吹入鼻
内，每日吹一次，每次三至五分。

疗 效：献方人自患鼻息肉半年，经宾阳县人民医院及上林医院检
查属实，用本方治疗六天痊愈。

来 源：上林县医院 莫必强

口 腔 病 类

治 口 疮 方

- 主 治：**口腔糜烂，耳中红肿流脓水。
- 处 方：**红背沙草〔201〕二两 青药一两（如缺可改用五倍子代之）
黄糖五钱 地稔〔202〕八钱
- 用 法：**用酸醋一斤与上药同煎，约煎二十分钟后过滤去渣。用消毒棉花蘸液洗患处。
- 疗 效：**此系祖传秘方，曾治愈五百多例。如上游公社官田工区周××等数十人，均患口腔糜烂，经用药汤洗二、三次痊愈。
- 来 源：**陆川县上游公社 吕苑清

治 唇 舌 生 疮 方

- 主 治：**唇舌生疮，口涎滑粘，饮食时疼痛更甚。
- 处 方：**黄柏粉二两（用草鱼胆汁二两浸透晒干） 人中白一两（水飞）
硃砂五钱 胆矾五钱 青黛五钱 梅片二钱 硼砂（煨）五钱
儿茶五钱
- 用 法：**共研细末，每日用一钱擦患处。
- 疗 效：**上药用本方药末擦三、四天即渐次而愈，曾治愈百余例。
- 来 源：**广西中医专科学校 梁 申

治 口 舌 糜 烂 方

- 主 治：**口舌糜烂、口角糜烂（因缺乏维生素B族引起之舌炎、口腔炎及口角炎）。
- 处 方：**熟地四钱 生地 归身 天冬 麦冬 白芍 知母各三钱
- 用 法：**用水二碗煎取一碗，一日分二次服。
- 功 用：**滋阴降火。

療效：（一）莫××，女，六十二岁。間歇性口唇粘膜及舌背舌緣潰爛已數年，自覺疼痛，影响進食，仅能吃稀飯，每次發作治療需七至十天始愈。口干，大便經常干結，三至五天一次，小便无異常，用本方治療，第一劑止痛，第四劑即漸愈；（二）黎××，男，二十七岁。喉干，咽痛，兩口角破裂，仅服一劑右口角即愈合，用至第四劑左口角亦愈；（三）黃××，女，二十岁。兩口角破裂，咽干，咳嗽有痰，服用西藥后咽干咳嗽減少，加服本方四劑即愈。

來源：广西人民医院

治牙齦肿痛方

一 方

主治：牙齦肿痛。
處方：兩背針根白皮〔203〕適量
用法：用開水洗淨，放在牙齦肿痛處含住。
療效：含藥經兩三分鐘即能止痛，治療多例，效果很好。
來源：广西中医专科学校 蒙柱瑞

二 方

主治：胃熱上攻，齒齦肿痛。
處方：清胃散加減：升麻一錢 連翹四錢 當歸三錢 生地四錢
丹皮四錢 石膏四錢 玄參四錢 石斛四錢 梔子三錢
用法：水二碗煎取一碗服，渣再煎服，一日量。
功用：清胃熱，涼血滋陰解熱毒。
療效：陳××，男，三十二岁，貴县人。患牙齦肿痛，晚上痛尤甚，不能咀嚼，只能食粥，經中西醫治無效。病者面赤唇紅，脈弦數有力，口渇，氣粗，舌絳。獻方人以本方治療，三劑即愈。

来 源: 广西中医院 陈紹琮

三 方

主 治: 牙肉紅肿疼痛。

处 方: 石膏八錢 生地五錢 牛膝三錢 麦冬三錢 知母三錢 元参三錢 丹皮一錢五分 薄荷四分

用 法: 用水二碗煎取一碗，加生盐一小撮頓服。

功 用: 滋阴降胃火，凉血。

疗 效: 曾用本方治愈患者十余人。

来 源: 广西中医专科学校 王鴻琛

編者按: 本方即景岳玉女煎加元参、丹皮、薄荷。

治 齿 衄 方

主 治: 齿衄（敗血症牙齿大出血）。

处 方: 金耳环〔204〕叶少許

用 法: 捶烂直接填塞出血点。

疗 效: 李××，男，二十岁，本县六巷公社人。于1959年3月26日入院。牙齿出血已經一天半。入院检查：左下第一、二白齿末期齦齿，齿齦肿胀輕度潮紅充血，呈滲性流血，顏面蒼白，口唇及指甲发紺，耳鳴，头晕眼花，皮肤干燥，尿少口渴，煩躁，体温 38.5°C 。診斷为敗血病牙齿出血。采用中西医合并治疗，27日体温迅速上升至 41.3°C ，神志呈半昏迷，牙齦繼續流血不止。入院后两三天，大量注射青霉素及鏈霉素，輸液，并注射及口服各种止血剂，局部填塞止血，仍未奏效，病情非常严重。29日晚轉給草医李爱芝治疗，只用少許金耳环叶，捶烂直接填塞出血点，約十五分鐘后血流即显著減少，繼續放第二次药，血流即止。4月3日病愈出院至今已半年多，未見复发。

来 源: 大瑶山瑶族自治县人民医院

治牙縫出血方

主治：牙齦无紅肿疼痛，只牙縫出血不止。

处方：熟地八錢 淮山四錢 萸肉四錢 丹皮四錢 茯苓四錢 澤瀉三錢 山梔三錢

用法：用清水二碗煎取一碗，一日分二次服。

疗效：本方經治愈患者五人。

来源：广西中医专科学校 王鴻琛

牙痛針灸療法

主治：牙痛（神經性牙痛）。

取穴：絲竹空 耳門 下关 頰車 合谷 承漿 解谿

手法：中刺激，針十五分鐘。

疗效：黃××，女，二十五岁。右側牙痛數日，口服和注射鎮痛剂无效，施針一次即愈。

来源：融安县长安民族医院 黃繼廷

咽喉病类

治喉痛方

主治：发热，咽喉肿痛，飲食困难（急性扁桃腺炎）。

处方：射干五錢 浙貝三錢 桔梗五錢 黃柏一錢 連翹三錢 石斛三錢 忍冬五錢 甘草三錢

用法：水二碗半煎取一碗半，一日分三次服。

功用：清热，解毒，祛痰。

疗效：本方是祖傳驗方，对咽喉肿痛，舌痛，牙痛，属实热者疗效很高，治愈病例很多，举两例如下：

（一）廖××，女，二十岁。发热已二天，有时微冷，喉

疼痛，飲食困難。服本方一劑熱退，連服三劑喉痛消失，第四天臨床症狀基本消失；（二）黃××，男，二十八歲。喉痛三天，發熱咳嗽有痰，用西藥治療未愈。用本方加杏仁、杷葉，服一劑，熱退咳減去杏仁、杷葉，照原方服三劑，各臨床症狀消失。

來源：南寧專區人民醫院 林 洪

治 乳 鵝 方

一 方

主治：乳鵝（急性扁桃腺炎）在喉頭兩側或一側，腫痛發紅，吞嚥困難或寒熱頭痛，全身不適。

處方：牛蒡子三兩 薄荷一兩五錢 甘草二兩

用法：上藥共研細末，煉蜜為丸，共成六十粒，每日三次，每次二粒，置口中含服或含化後，用開水送服。

功用：疏風，清熱，解毒。

療效：（一）×××，女，二十五歲。於1959年6月5日入院。發冷發熱，咽痛，吞嚥困難，飲水也困難已五日，曾經注射青霉素數針無效，在門診時，因有嘔吐抽筋現象而住院治療，患者軟弱無力，面紅，體溫 38.5°C ，檢查咽壁明顯潮紅充血，雙扁桃中度腫大，腺口有白點存在，但易于拭去，咽後壁濾泡亦見紅腫，診斷為急性扁桃腺炎。給服本方藥丸，每日三次，每次二粒含服，第二日症狀大減，體溫下降，能吃流汁飲食，咽部紅腫已明顯減退。繼續治療至第三天，症狀完全消失；（二）×××，男，三十二歲。於1959年5月7日來門診。主訴：喉劇痛吞嚥困難，水亦難吞，并有發熱頭痛，周身不適。檢查：雙扁桃腺紅腫厉害，腺口有小膿點，診斷為急性扁桃腺炎（雙）。給服本方藥丸六粒，一日分三次含服，5月8日復診，已有

明显好转。再给药一日，即已痊愈。

来源：柳州市人民医院 龔立人

二 方

主治：双单蛾喉。

处方：生桐油三钱

用法：用竹管盛桐油一次吹入喉内。药入喉后，油及粘痰即吐出，喉塞即通而愈。

疗效：此药曾治我爱人蓝美娇，及本屯罗景桂等数人，疗效很好。

来源：马山县永州医院 农恩荣

治 喉 毒 方

一 方

主治：突然喉头灼热疼痛，涎沫特多，咽下困难，颈外亦肿大。

处方：（一）内服方：锦军五钱 甘草三钱

（二）外用方：西瓜霜一钱五分 月石二钱 硃砂六分 僵蚕五分 冰片五分 元明粉四钱 人中白二钱 青黛三钱 锦军二钱

用法：内服方：用水一碗煎沸后，一次徐徐呷下。

外用方：将药共研成细末，不断吹入患处，使吐出粘液。

疗效：全××，男，三十八岁，平南县人。患此病用本方治愈。

来源：广西中医专科学校 梁益年

三 方

主治：如上方症状。

处方：银花四钱 连翘三钱 甘草一钱

用法：用水煎浓汁，一日分五次服，每隔三小时服一次。

疗效：李××，三岁。喉头灼热疼痛肿大，咽下困难，服本方一

剂，病減，翌日再服半剂而愈。

来 源：广西中医专科学校 梁益年

喉痛針灸疗法

主 治：咽喉两侧，紅腫疼痛（急性扁桃腺炎）。

取 穴：頰車 合谷

手 法：上穴均針，用抑制手法，进行針后留針二十分鐘。

疗 效：本門診部曾治疗三十五例，痊愈四十五例，好轉七例，无效三例。

来 源：南宁市公費医疗門診部

咽喉病針灸疗法

主 治：急性喉头肿痛，发热，口不能张，嚥吞困难。

取 穴：少商（雙）- 合谷（雙） 內关（雙）

手 法：先于少商放血，后針刺合谷，用强刺激法，留針三十分鐘。第二天只針內关穴，用抑制手法，留針四十分鐘，每十分鐘捻針一次，并加电針疗法十分鐘。

疗 效：治疗六例不同程度的急性喉痛，第一天針后，痛減，能开口說話，食飯，第二天針內关后，患者疼痛消失很快，六例均痊愈。

来 源：天等县天等診所 赵沛成

咽肿痛針灸疗法

主 治：咽喉肿痛吞水不下。

取 穴：勞宮（雙） 合谷（雙） 天突 內关（雙）

手 法：上穴針后，留針五分鐘。

疗 效：馬山县龙塘乡宿宜屯潘××，男。患咽喉肿痛，吞水不下，取針上穴即愈。

来 源：馬山县金双医学院 潘海波

草藥植物学名索引

〔1〕黄皮果叶：芸香科植物。学名：Clausena lansium (Lour) Skeels

〔2〕鬼灯笼：茄科植物。学名：Physalis minima L.

〔3〕土荆芥：唇形科植物。学名：Mosla chinensis Max

〔4〕野葛：豆科植物。学名：Pueraria pseudo-hirsuta Tang et Wang

〔5〕蜆草：大戟科植物。学名：Acalypha australis L.

〔6〕闊叶十大功劳：又名小木黄连，小蘗科植物。学名：Mahonia bealei Carr

〔7〕雷公筋：繖形科植物。学名：Centella asiatica (L.) urb.

〔8〕老虎耳：又名大虫耳、土狼毒、野芋头，天南星科植物。学名：Alocasia cucullata (Lour.) Schott

〔9〕野芋头：又名朴薯头，天南星科植物。学名：Alocasia odora (Roxb.) C. Koch

〔10〕三月梅：又名蛇泡果，又名三月苺、三月泡，蔷薇科植物。学名：Rubus parvifolius L.

〔11〕黄花母：錦葵科植物，有大叶小叶两种。大叶的学名：Sida cordifolia L. 小叶的学名：Sida acuta Burm.

〔12〕六月霜：菊科植物。学名：Eupatorium chinense L.

〔13〕青蕨：又名五爪凤尾草，凤尾蕨科植物。学名：Pteris ensiformis Burm.

〔14〕黑蕨：鉄綫蕨科植物。学名：Adiantum capillus-veneris L.

〔15〕柏枝蕨（科属学名待查）。

- [16] 凤尾蕨：凤尾蕨科植物。学名： *Pteris multifida* Poir
- [17] 半边蕨：凤尾蕨科植物。学名： *Pterissemi pinnata* L.
- [18] 黄花草：又名蛇头王、土細辛（玉林名）、一枝黄花，菊科植物。学名： *Solidago Virgo-aurea* L.
- [19] 黑脚蕨：即黑蕨，科属学名詳[14]。
- [20] 番桃叶：又名番石榴、番榕（南宁名），桃金娘科植物。学名： *Psidium guajava* L
- [21] 桉树叶：桃金娘科植物。学名： *Eucalyptus robusta* Sm.
- [22] 黄麻根：椴树科植物。学名： *Corchorus capsularis* L.
- [23] 假莧菜：又名筋莧菜，莧科植物。学名： *Amaranthus spinosus* L.
- [24] 紅池木：又名紅漆木，漆树科植物。学名： *Rhus* sp.
- [25] 火炭藤：蓼科植物。学名： *Polygonum chinense* L.
- [26] 天星蕒：冬青科植物。学名： *Ilex aculeolata* Nakai.
- [27] 灯盡菜：即雷公根，又名雷公筋。科属学名詳[7]。
- [28] 黑墨草：又名旱蓮草、鰾腸，菊科植物。学名： *Eclipta alba* (L.) Hassk.
- [29] 痴头婆：又名地桃花，錦葵科植物。学名： *Urena lobata* L.
- [30] 草菊子：又名草谷子，禾本科植物。学名： *Chrysopogon aciculatus* (Retz.) Trin.
- [31] 路边青：又名狗肝菜，爵床科植物。学名： *Dicliptera chinensis* (L.) Nees
- [32] 假紅藍：又名狗肝菜，即路边青。科属学名詳[31]。
- [33] 屈針草：又名老虎鬚，禾本科植物。学名： *Setaria nervosa* (Rottl.) Stapf.
- [34] 辣蓼草：蓼科植物。学名： *Polygonum flaccidum* Meisn.

[35]地桃花：即痴头婆，科属学名詳[29]。

[36]紅鉄树：龙舌兰科植物。学名：(*ordyline fruticosa* (L.) A. Cheval.

[37]土牛膝：又名倒律草、倒鉤草，苋科植物。学名： *Achyranthes aspera* L.

[38]三月泡，即三月梅，科属学名詳[10]。

[39]土柴胡：又名黃荆柴，馬鞭草科植物。学名： *Vitex cannabifolia* Sieb. et Zucc.

[40]土常山：又名华灰木，山矾科植物。学名： *Symplocos chinensis* (Lour) Druce

[41]山芝麻：梧桐科植物。学名： *Helicteres angustifolia* L.

[42]金边油葱：百合科植物。学名： *Aloe vera* L. var. *chinensis*. (Haw.) Bènger

[43]棚龙根(科属学名待查)。

[44]滿山香：菊科植物。学名未定。

[45]魚腥草：即蕺菜，三白草科植物。学名： *Houttuynia cordata* Thunb

[46]百須根，又名双飞蝴蝶，蘿藦科植物。学名： *Tylophora yunnanensis* Schlecht.

[47]金边波蘿：龙舌兰科植物。学名： *Sansevieria trifasciata* Prain var. *laurentii* N. E. Br.

[48]大青藤：桑科植物。学名未定。

[49]苦菜：又名土人參(科属学名待查)。

[50]无娘藤：又名黃藤、寄生树上无根藤，樟科植物。学名： *Cassytha filiformis* L.

[51]田基黃：金絲桃科植物。学名： *Hypericum japonicum* Thb.

[52]西湖柳：樺柳科植物。学名： *Tamarix chinensis* Lour.

〔53〕常山：又名狗屎树，即土常山。科属学名詳〔40〕。

〔54〕丹参：又名紅羊咩青、鬼点火，唇形科植物。学名：*Salvia miltiorrhiza* Bunge

〔55〕金不换：远志科植物。学名：*Polygala japonica* Houtt.

〔56〕东参：又名鸡头薯，豆科植物。学名：*Eriosema chinense* Vogel

〔57〕大力王：又名过山香（桂南名），菊科植物。学名未定。

〔58〕土荆芥：又名鉤虫草，藜科植物。学名：*Chenopodium ambrosioides* L.

〔59〕山蒼：即过山香，又名豆豉姜，樟科植物。学名：*Litsea cubeba* (Lour.) Pers.

〔60〕樟树皮：樟科植物。学名：*Cinnamomum camphora* (L.) Ness et Ebern.

〔61〕土五加皮：又名三甲菜、五指牛奶，桑科植物。学名：*Ficus hirta* Vahl Var *palmatiloba* (Merr.) Chun

〔62〕烏柏根：大戟科植物。学名：*Sapium sebiferum* Roxb.

〔63〕假辣椒：又名魚胆木，夹竹桃科植物。学名：*Rauwolfia verticillata* (Lour) Baill.

〔64〕水瓜：葫芦科植物。学名：*Luffa cylindrica* Roem.

〔65〕龙骨浆叶，又名火浆头、羊拜挨、火秧筋（南宁名），大戟科植物。学名：*Euphorbia antiquorum* L.

〔66〕番捻叶：即番石榴，科属学名詳〔20〕。

〔67〕糙粟：又名鵝脚粟，禾本科植物。学名：*Eleusine coracana* (L.) Gaertn.

〔68〕金錢草：又名假花生，豆科植物。学名：*Desmodium styracifolium* (Osbeck) Merr.

〔69〕鬼画符：又名黑面神（桂西名）、紫木兰（武鳴名），大戟科植物。学名：*Breynia fruticosa* (L.) Hook. f.

〔70〕涩藤叶：又名涩沙藤，錫叶藤科植物。学名：*Tetracera*

scandens (L.) Merr.

[71] 古羊藤，又名毛秀才（南宁名），蘿藦科植物。学名：*Streptocaulon griffithii* Hook. f.

[72] 棕欖子：棕欖科植物。学名：*Trachycarpus excelsus* Wendl.

[73] 龙胆皮：又名熊胆皮，冬青科植物。学名：*Ilex rotunda* Thunb.

[74] 四季石榴根：安石榴科植物。学名：*Punica granatum* L.

[75] 苦楝根：楝树科植物。学名：*Melia azedarach* L.

[76] 仙人掌：仙人掌科植物。学名：*Opuntia ficus-indica* Mill

[77] 竹节藤莖：又名竹节草，鴨跖草科植物。学名：*Commelina nudiflora* L.

[78] 雷砵嘴：又名飞天雷、瓢羹菜，防己科植物。学名：*Stephania longa* Lour.

[79] 紅馬鞭草：馬鞭草科植物。学名：*Verbena officinalis* L.

[80] 牛甘果木：大戟科植物。学名：*Phyllanthus emblica* L.

[81] 簕竹笋：竹科植物。学名：*Bambusa stenostachya* Hack.

[82] 南蛇藤：又名蚺蛇藤、南蛇引、石蓮莖苗（桂南名），苏木科植物。学名：*Caesalpinia minax* Hance

[83] 狗耳花根（科属学名待查）。

[84] 馬齿莧：馬齿莧科植物。学名：*Portulaca oleracea* L.

[85] 豹牙狼叶：又名猷山紅、金香爐，野牡丹科植物。学名：*Melastoma normale* Don

[86] 胭脂花根：紫茉莉科植物。学名：*Mirabilis jalapa* L.

[87] 甜菜根：又名鸡脚艾、刘寄奴（南宁名），菊科植物。学名：*Artemisia lactiflora* Wall.

- [88]倒勾草：即土牛膝，科属学名詳[87]。
- [89]狗尾藤（科属学名待查）。
- [90]粽巴叶根：禾本科植物。学名： *Thysanolaena maxima* (Roxb.) Kuntze.
- [91]挖不尽根：又名酸屯。紫金牛科植物。学名： *Embelia laeta* (L.) Mez.
- [92]假土薷米，又名串珠子，禾本科植物。学名： *Coix la-chrgma-jobi* L.
- [93]丁貴草：豆科植物。学名： *Zornia diphylla* pers.
- [94]金菜：即萱草花，又名黄花菜，百合科植物。学名： *He-morocallis flava* L.
- [95]鸡头茹：豆科植物。学名： *Eriosema Chinense* Vogel
- [96]千斤拔：豆科植物。学名： *Moghania prostrata* Wang et. Tang
- [97]假从蒿：又名野筒蒿，菊科植物。学名： *Erigeron linifolius* Willd.
- [98]匙羹藤：即雷砵嘴，又名瓢羹菜，科属学名詳[77]。
- [99]磨盘子根：锦葵科植物。学名： *Abutilon indicum* (L.) Sweet.
- [100]五爪龙根：即金樱根，蔷薇科植物。学名： *Rosa laevigata* Michx.
- [101]土桔梗：即甜桔梗（科属学名待查）。
- [102]傍培强：又名桑培强、鈎鞭坡（科属学名待查）。
- [103]扁魚胆叶：又名則魚、胆草（与节节紅花极相似），茜草科植物。学名：未定。
- [104]花椒根：芸香科植物。学名： *Zanthoxylum avicennae* (Lam) DC.
- [105]金錢藤：即无娘藤，科属学名詳[50]。

[106]黃鷄毛：又名木茵陳、土茵陳、紅鷄毛、鷄骨香、陸久草（科屬學名待查）。

[107]紅軟藤：又名藤菜、胭脂苳，落葵科植物。學名：*Basella rubra* L.

[108]土黃芪：又名千斤拔。科屬學名詳[96]。

[109]穿石藤：馬兜鈴科植物。學名：*Aristolochia* sp.

[110]奶汁藤：夾竹桃科植物。學名：*Ecdysanthera utilis* Hay et kaw.

[111]土柴胡：又名黃荊柴[39]。

[112]獨腳馬騮：又名馬騮卵、鳳凰蛋，骨碎補科植物。學名：*Nephrolepis Cordifolia* presl.

[113]羊角豆：豆科植物。學名：*Cassia occidentalis* L.

[114]烏蠅叶：又名蒼蠅草、奶干菜，豆科植物。學名：*Kummerowia striata* (Tnunb.) sahindl.

[115]無敵手：蕁麻科植物。學名：*Urtica thunbergiana* S. et Z.

[116]三妹根：又名三妹針，小蘗科植物。學名：*Berberis sargetiana* Schneid.

[117]了哥王：又名地谷、地巴麻、雀兒麻，瑞香科植物。學名：*Wikstroemia indica* C. A. Mey

[118]屈頭鷄：田代薯科植物。學名：*Schizocapsa plantaginea* Hce.

[119]鐵涼傘：紫金牛科植物。學名：*Ardisia bicolor* Walker

[120]雪上一枝蒿：毛茛科植物。學名：*Aconitum* sp.

[121]黑心姜：又名藍姜、綠姜、賊老姜、風姜，薑荷科植物。學名：*Zingiber zerumbet* (L.) Smith

[122]地毯草：土馬棕科植物。學名：*Polytrichum commune* L.

[123]火秧勒叶：即龍骨漿叶，科屬學名詳[65]。

〔124〕扫把藤：又名海金砂，海金砂科植物。学名： *Lygodium Japonicum* Sw.

〔125〕吊鬚榕树：桑科植物。学名： *Ficus retusa* L.

〔126〕象皮树：夹竹桃科植物。学名： *Alstonia sq.*

〔127〕盜儉草：爵床科植物。学名： *Justicia leptostacha* Hemsl.

〔128〕落地生根：景天科植物。学名： *Kalanchoe pinnata* pers.

〔129〕伤骨藤：又名毛茛、五馬巡地（昭平）、六歲草（北流）、百步还魂（百色），三白草科植物。学名： *Gymnotheca chinensis* Decne.

〔130〕薑芽木叶：又名黄龙脱壳，桑科植物。学名： *Cudrania cochinchinensis* Kudo et Masum.

〔131〕大接骨：又名大駁骨，爵床科植物。学名： *Adhatoda Vasia* Nees

〔132〕小接骨：又名小駁骨，爵床科植物。学名： *Justicia gendarussa* Burman. f.

〔133〕白背叶根：又名羊耳白背叶根、大力王、过山香（桂南名），菊科植物。学名： *Inula cappa* (Han.) Dc.

〔134〕三叉虎：芸香科植物。学名： *Evodia leota* (Spr.) Merr.

〔135〕四眼木（科属学名待查）。

〔136〕铁地娘：又名草鞋根、地胆头，菊科植物。学名： *Elephantopus scaber* L.

〔137〕四季葱：石蒜科植物。学名： *Allium fistulosum* L.

〔138〕山柿子：柿科植物。学名： *Diospyros chunii* Metcalf.

〔139〕紅花柴：豆科植物（学名未定）。

〔140〕豆骨消：又名透骨消，唇形科植物。学名： *Lamium amplexicaule* L.

- (141)毛七公：又名錢串木、紙錢木（桂南名），大戟科植物。
学名：Glochidion eriocarpum hamp
- (142)踏錢根叶：又名紙錢根、疊錢草根，豆科植物。学名：
Phyllodium sp.
- (143)大假金瓜叶：又名大金瓜草叶（科属学名待查）。
- (144)青面白背：又名石风、白背风、白吊粟，大戟科植物。
学名：Mallotys apelta Muell. -Arg.
- (145)千里馬（科属学名待查）。
- (146)紅毛七（科属学名待查）。
- (147)鷹不扑：又名紅椶木，五加科植物。学名：Aralia
armata (Wall.) Seem.
- (148)石兰（科属学名待查）。
- (149)青魚胆草（科属学名待查）。
- (150)石面桃：又名石仙桃，蘿藦科植物。学名：Dischidia
chinensis Champ.
- (151)玉麒麟：苏鉄科植物。学名：Cycas revoluta Thunb.
- (152)七星剑叶：唇形科植物。学名：Mosla Fordii Max.
- (153)山楝子：楝科植物。学名：Melia azedarach L.
- (154)救必应：又名狗屎木皮、熊胆木（扶南名），冬青科植
物。学名：Ilex rotunda Thumb.
- (155)灯笼草：番荔枝科植物。学名：Desoms cochinchinen-
sis Lour.
- (156)黑獸草：即黑墨草，科属学名詳[28]。
- (157)五眼果：漆树科植物。学名：Choerspondias axillai-
aris (Roxb) Burt et Hill.
- (158)紅蓮草：又名天葵，秋海棠科植物。学名：Begonia sp.
- (159)油葱：百合科植物。学名：Aloe vera L. Var. chin-
ensis (haw.) Berger
- (160)屎桶公树叶：含羞草科植物。学名：Pithecolobium

.clypearia Bth.

[161]丹竹：竹科植物。学名：*Bambusa Chungii* McClure

[162]鉄篱笆：鼠李科植物。学名：*Paliurus ramosissimus* (Lour.) Poir.

[163]蛇針草（科属学名待查）。

[164]鹿耳苓：又名陆續消（南宁名），菊科植物。学名：*Laggera alata* Sch.-Bip.

[165]蓝花四方棍：又名水龙胆、韓信草，玄参科植物。学名：*Torenia crustacea* Champ et Schl.

[166]火炭苗：蓼科植物。学名：*Polygonum chinense* L.

[167]定心草：馬兜鈴科植物。学名：*Aristolochia* sp.

[168]独树蚊蝇翼：又名蛇利草（科属学名待查）。

[169]鬼点火：又名地骨皮，馬鞭草科植物。学名：*Clerodendron cyrtophyllum* Turcz.

[170]地胆头：即鉄地娘，又名草鞋根，科属学名詳[133]。

[171]龙船花（科属学名待查）。

[172]小仙鶴草：薔薇科植物。学名：*Agrimonia viscidula* Bge.

[173]朝天秒：又名隔山消，大风子科植物。学名：*Xylosma longifolium* Clos

[174]半边蓮：山梗菜科植物。学名：*Lobelia chinensis* Lour.

[175]瓜子菜：即馬齿莧，科属学名詳[83]。

[176]四眼草：又名土薄荷（叶有点白毛，有臭香气，四方梗，形似紫苏），唇形科植物（学名待查）。

[177]地苦胆（科属学名待查）。

[178]小白蜡叶：木犀科植物。学名：*Fraxinus chinensis* Roxb.

[179]入地蜘蛛根：又名馬蹄香，菊科植物。学名：*Senecio*

ligularia Hk. f.

(180)千里光：又名黄花草、紫背娘，菊科植物。学名：
Senecio scandens Buch-Ham

(181)空心菜：旋花科植物。学名：*Ipomoea aquatica* Forsk.

(182)土生地：菊科植物。学名：*Gynura divaricata* (L)
DC.

(183)灯笼果叶：茄科植物。学名：*Physalis* sp.

(184)苦石蓮子树根（科属学名待查）。

(185)落地金牛：芸香科植物。学名：*Toddalia asiatica* Lam.

(186)路边菊：菊科植物。学名：*Aster indicus* L.

(187)了刁竹：又名徐长卿，蘿藦科植物。学名：*Pycnoste-
lma* (chinense Bunge.

(188)紅烏柏木：大戟科植物。学名：*Sapium discolor*
Muel-Asg.

(189)大排錢树：豆科植物。学名：*Phyllodium pulchellum*
Desv.

(190)小排錢树：豆科植物。学名：*Phyllodium elegans*
Desv.

(191)枫木叶：金縷梅科植物。学名：*Liquidambar formo-
sana* Hce.

(192)九子蓮：又名独叶半夏，天南星科植物（学名未定）。

(193)青木香：又名天然草（科属学名待查）。

(194)七叶一枝花：延齡草科植物。学名：*Paris polyphylla*
Sm.

(195)大金刚苗：菝葜科植物。学名：*Smilax china* L.

(196)盐夫木根：漆树科植物。学名：*Rhus chinensis* Mill.

(197)金縷吊葫芦，又名山苦瓜，葫芦科植物。学名：*Melo-
thria heterophylla* (Lour.) Con.

(198)龙爪刺：又名鷹爪兰、鸡爪兰，番荔枝科植物。学名：

Artabotrys uncinatus (Lam.) Merr.

[199]小白合：又名小百合：百合科植物。学名：*Lilium* sp.

[200]鸡仔木：又名接骨草（綱目）、陆英、蒴藋、走馬胎（南宁名），忍冬科植物。学名：*Sambucus Javanica* Bl.

[201]紅背沙草：禾本科植物。学名：*Cynodon dactylon* (L.) Pers.

[202]地稔：野牡丹科植物。学名：*Melastoma dodecandrum* Lour.

[203]两背針：又名两面針，入地金牛，出山虎（桂南名），十八鑽（桂林名），芸香科植物。学名：*Zanthoxylum nitidum* (Lam.) DC.

[204]金耳环：馬兜鈴科植物。学名：*Asarum* sp.

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 广西中医验方选集 第二集

作者 = 广西僮族自治区中医药研究所编

页数 = 2 8 9

S S 号 = 1 0 3 8 8 0 6 0

出版日期 = 1 9 6 3 年 0 7 月第 1 版