C101/1815
V.1

保泰彙編

保赤彙編序

天地之大德曰生生莫迫于赤子故王政之保息圖之饋養先焉夫其春秋巡省救所疾苦雖不言醫醫在其中扁鵲入咸陽見秦人重小兒乃爲小兒醫隨俗變遷故國工無專技小兒稚陽天全利害易應明者心消息之今之君子勤勤于仁術者又何多也積善有慶垂裕後昆以錫麟寶訓爲第一法宜調護造于未形以達生篇爲第二乳保乃育兒之本以產寶爲第三福幼編附焉啞科臆斷貽害滋多以保嬰易知錄爲第四脈微難見雖靈樞素問不具其說以小兒藥證直訣爲第五知識初萌首端志趣閑邪存

誠芳蠲可師以呂氏童蒙訓終焉人生強弱之賦根乎元氣也有壯而折夭而壽者元氣之贏固爲之病在標雖急易治病在本雖緩難圖醫者意意者理窮其理究其變縱古無此方而我治之輒效出身利用原不拘拘于陳編庸醫學淺飲其劑初不加劇久之纏綿消耗而不起一若病果難療委之數者絕不自咎因循誤之誤之至于再至于三而求之猶不止垂縷之命試于淺學之手僥倖于偶中中者幾何兒之慴慴不能自達其寒熱虛實醫之智識乃與兒同爲可痛也嗚呼豈獨兒醫爲然哉夫以空疏得售其術則必以學爲多事古今不學而能惟饑而食寒而衣耳願人學以待時不可急時名而不學更不可以不名于時而妄行其學學以爲己推而及物愛之必有以教之使無慙天地生成之德是故二三君子彙刻其書屬序于予而予引申其意如此也光緒戊寅涂月平湖朱之榛

錫麟寶訓四卷
達生編二卷
產寶一卷 附續編延壽戒期 千金要方 種子說 保身
福幼編一卷
保嬰易知錄二卷
錢氏小兒藥證直訣三卷 閻附方一卷
童蒙訓三卷

錫麟寶訓敘

甲寅之歲余手錄戒淫摘要一書將以付梓客有爲余告者曰古來戒淫書夥矣子猶闡發其說以垂炯戒至種子一事當世絕少善書何不取古人戒言懿行刊刻布施爲艱於子嗣者勸耶余因博采諸書彙成一冊題曰錫麟寶訓夫麟仁物也人以仁德感之天乃以仁物錫之故種子之方必先種德譬之嘉穀不種何穫其勢然也若夫有子不肖敗行辱身破家蕩產此皆由先世不知積功累仁所致是不特無子者宜積德以綿延先澤即有子者亦宜積德以垂裕後昆讀麟趾一詩可以悟錫類之故矣或曰是皆有

數在不可强求然果能積德於冥漠之中天心亦自
可轉移矣命何難自我作哉語有之種蘭得香種粟
得糧有志之士可以知所從事焉咸豐四年歲次甲
寅小春月朔日雙榆村人金玉相識

保赤彙編一

金玉相勉夫輯

種子格言

種子訣曰萬物莫不有根本試驗諸草木必栽培其根本始能枝葉茂盛花實繁衍此物理也惟人亦然父母者人之本也子與孫猶枝葉花實也枝葉花實之所以茂盛繁衍者皆根本栽培之力厚也非孝無本子孫而不孝是傷其本矣傷其本枝從而亡

冒起宗曰求子之道第一在戒淫行蓋淫爲萬惡首天之降罰最酷每見人家有多娶婢妾生子竟終身無子者有生子已經長成忽又天死者亦有生子不

肖破家喪身卒至無嗣者皆以淫惡過重故爾殃及子孫誠知血食非輕易弗早觀淫報

種子說曰人生具此生理仁者天地之心而人之所以生也生理流溢決當有嗣古來求嗣者貴者用其貴富者用其富有言者用其言處處寬人容人愛人救人時時以好生爲心雖年過商瞿無不有子得生生之道也天地爲萬物父母人民者天地之子孫也以愛人利物爲心必能以救人生命爲事是爲天地救子孫也爲天地救子孫而天地不以子孫報之無是理也故積仁未有無子孫者也今有殘忍爲心陰賊爲行好殺爲快淫於色刻於財狷而隘清而刻好

潔而絕物其人往往乏嗣少生生之意也春夏之氣多長養故萬物生秋冬之氣多肅殺故萬物凋凡近於肅殺之氣者皆不利於子嗣是以求子之方有二凡近於殘忍諸病即改易性情洗滌腸肺以求之凡近於斂財緊刻諸病即分散家貲濟人利物以求之二方異名蔽之曰仁而已矣心未誠仁未深而遽期有報無是事也處處存實心在在含生意將化育之功在於方寸又豈僅沾沾於子嗣之有無哉

又曰人謂子爲種其義可思譬若力田須有穀種蓋仁者人之所以爲心與其所以生也昔人擬仁爲穀種而以心爲良田以仁存心譬下美種自穫嘉穀存

仁而雜以害仁者猶種穀於長林豐草間其天折而鮮穫固也若殘忍刻薄絕無仁心此其死心幷若石田矣故仁爲人種

朱在菴曰種子之法一如種物果下美種天必如其種以生之且必十倍其種以償之彼不知有秋之利者見人投種則怪曰奈何以可食之物棄之於淤泥不知福田之利者亦然及其收穫則爭羨之苟惜於下種曷可冀乎

種子訣曰種子之法有二一曰盡人力在清心寡欲四字寡欲則精壯氣實結胎有基但腎水主智若勞心焦思則腎傷矣艱於嗣者半爲少年過欲傷腎所致猶復多遘妾婢廣服丹藥致熱藥內傷臟腑漁色外役精神甚至損身深可痛惜一曰同天意在積德存仁四字博愛之謂仁即不忍人之心也時行方便廣積陰功生機自然充溢猶天地氣候閉藏一遇陽春靡不生育蓋仁心如瓜果之仁若無核中之仁雖種腴壤何能生發袁了凡立命篇乃絕妙種子方求子者須心體力行

畜德錄曰世人無不急於生子不知少欲之人恒多子且易育氣固而精凝也多欲之人恒艱子且易天氣洩而精薄也今人縱淫無度眞陽枯槁安能成胎即僥倖生子亦不能育或殤於痘或傷於驚痘者熱

毒驚者熱風毒者父母之眞精不足風者父母之眞氣不固夫艱於子嗣亦有數不可強者然果能受持功過格誠意祈求善端充積自有明驗今人中年無嗣不思積德求子固屬大過若僅燒香祈禱甚爲無益更或多置婢妾適增罪愆耳

黃月槎曰方書每載種子一門誠綿延宗祀之苦衷今編中獨缺此種竊謂子孫繁衍皆由祖宗積德已身行善上天錫以嗣息使獲多男之慶得遂燕翼之謀所關非淺豈可强求每見富貴之家年未四十借名無子藉號體虛廣蓄姬妾偏覓奇方金石雜投辛溫並進以爲毓麟有望誰知腎火熾而情欲肆情欲

肆而精液漓神衰形喪終歎無兒兼之年壽不永中道棄捐而與寡慾多男之說不大謬哉上天好生挽回甚速奉勸鄰嗣君子深體天心廣行陰騭出言釀天地之和居心存忠厚之意肅房幃而勿求美色淡嗜慾而毋斲乃躬或敦宗睦本或濟急扶危或流傳善書或創興義學或矜恤孤嫠或施棺助葬或饋藥送衣或有力而獨爲或無力而勸募一切善事次第力行自然螽斯載咏麟趾呈祥也況夫人而求子原爲家業無人可付宗祧無人可守耳如有家業而乏子嗣財已無主不思修爲專圖朘刻繼嗣覬奪搆訟多端身未寒而家已破仍飽他人之腹徒增一己之

愚愚孰甚焉何如以無主之財而作有益之事乎伏願求子者勿恃藥餌堅守仁心身其康强子孫其逢吉矣

陳良謨曰凡子嗣之有無賢不肖似有定數然轉移禍福又在於人益數定者天命感應者天心天以生物爲心人苟念念濟人利物初無所爲而爲則精誠之極自可以上格天心是以古今陰德感應之事昭然不誣蓋天心既格數卽隨之而轉譬如國家之刑賞法制一定不移苟人臣眞能以忠誠感動君心則既謫而召還臨刑而施赦俄頃間喜怒頓殊何不可挽回哉

終

金玉勉相夫輯

積德

昔司馬溫公嘗曰積金以貽子孫子孫未必能守積書以貽子孫子孫未必能讀不如積德於冥冥之中以爲子孫長久之計夫君子修德行善豈眞有邀福之心然有感必應天道固然自來門祚熾昌莫非祖父功德所致爰輯積德一卷以廣流傳俾爲子孫計者知所觀法云爾

朱柏廬曰積德之事人皆謂惟富貴然後其力可爲抑知富貴者積德之報必待富貴而後積德則富貴何日可得積德之事何日可爲惟於不富不貴之時能力行善此其事爲尤難其功爲尤倍也蓋德亦是天性中所備無事外求積德亦隨在可爲不必有待

假如人見蟻子入水飛蟲投網便可救之又如人見乞人哀叫輒與之錢或與之殘羹剩飯此救之與之之心不待人教之也即此便是德即此日漸做去便是積今人於錢財田產即去經營日積而於自己所完備之德不思積之又大敗之不可解也今亦須論積之之序首從親戚始宗族鄰里中有貧乏孤苦者量力周給嘗見人廣行施與而不肯以一絲一粟援手窮親斯亦倒行而逆施矣次及於交與與凡窮阨之人朋友有通財之義固不必言其窮阨之人雖與我素無往來要知本吾一體生則賑給死則埋骨惟力是視以全我惻隱之心次及於物類今人多好放生究竟末務有不須費財者如任奔走効口舌解人厄急人病周旋人患難不過勞己之力更何容吝又有不費財并不勞力者如隱人之過成人之善又如啟蟄不殺方長不折步步是德步步可積但存一積德之心則無往而不積矣不存一積德之心則無往而爲德矣要知吾輩今日不富不貴無力無財可以行大善事積大陰德正賴此惻隱之心就日用常行之中所見所聞之事日積月累成就一箇好人不求知於世亦不責報於天若又不爲是眞當面錯過也不富不貴時不肯爲吾又未知即富即貴之果肯爲否也

李昌齡曰世間萬物久聚必散自然之理也夫金穀寶貨雖萬乘之貴且爲養天下而散苟不爲此必若鹿臺鉅橋不能久聚世之愚者常聚金穀寶貨自謂可使子孫世世不散眞可怪笑及夫散也不以水火去則盜賊去兵革獄訟去不肖子孫去此事自古皆然非止今日是故鄧通之銅山不能有萬日石崇之金谷何常傳百年金谷寶貨不可久聚如此予欲積善之家常以其餘者廣施惠於親戚朋友故舊鄰里之不足者小民之貧困者人有疾苦患難者天既福之以富而又與以爲善之資使之益種後福何其幸也切弗負邦苟能如是而散之則將復聚於吾之子孫益陰功陰德厚矣

王士晉曰書曰以親九族睦族聖王且爾況凡眾人乎末俗或以富貴驕或以智力抗或以頑潑欺凌雖能爭勝一時已皆自作罪孽嘗謂睦族有四務曰矜幼弱曰恤孤寡曰周窘急曰解紛競幼者稚年弱者鮮勢人所易欺則矜之一有矜憫之心自隨處爲之効力矣鰥寡孤獨王政所先況乎同族得於耳聞目擊則恤之貧者恤以善言富者恤以財穀衣食窘急生計無聊則周之量已量彼可爲則爲不可望其報不必使人知吾盡吾心焉人有忿則爭競得一人勸之氣遂平遇一人助之氣愈激然當局而迷者多矣居間解之族人之責也此之謂四務引伸觸類爲義

田爲義倉爲義學爲義塚教養宗族使生死無失所皆豪傑所當爲也

范文正嘗謂子弟曰我宗族甚衆於我固有親疏然我祖宗視之則均是子孫且自祖宗來積德百年始發於我若獨享富貴不恤宗族他日何以見祖宗於地下今何顏入家廟乎非篤於親親之誼者不能道此故生平嘗買良田百畝爲義莊族之貧乏者每人日給米一升歲給絹一疋嫁娶喪葬皆有周給子純仁增廣義莊人咸謂克承父志云

關中張氏曰世間孤寡之人最堪憐憫仁人用心宜加矜恤強悍或凌則爲伸大義以攻之可也宗族或欺則爲稱仁厚以動之可也貧困則周濟之可也患難則保護之可也愁苦則寬慰之可也籌則代之可也失則教之可也過則原之可也利則公之可也費則免之可也不忍之心出自眞誠直足格上帝於九天感鬼神於三界豈曰小惠云哉

兗州王克明誠心恤寡族中有寡居者明卽聚族人爲之謀曰守節聽其自然而日用飲食須爲之計久遠各捐貲湊成若干代謀利息按月饋送又年節間勸子姪輩先往拜叩曰所以慰其苦而堅其志也姻里朋友中有守節者亦周濟玉成之緣此寡居數家無一失所者

胡振安曰陰功有萬而救人爲第一倘值水旱奇荒百萬生靈嗷嗷就斃仁人君子當此苟可自全性命即當傾財救濟而一人之力有限須約實有善心者廣爲勸募設法賑給庶幾轉溝壑爲衽席此在大家殷戶首當倡率者也

史搢臣曰歲逢水旱流離載道仁人君子諒皆垂憫然非空空歎息也或曰俟其有而與之何時是有何不分一二口食一二文錢亦可救饑度命若謂善門難開恐其不繼即密持錢米於流民往來之地隨緣給之老幼殘疾者救得一人是一人施得一日是一日囊罄則止何憂不繼哉

魏時舉立心仁愛重義好施博集羣書不樂仕進家多田產積穀有餘值歲歉穀價騰貴因發倉廩出糶價惟取時之半以周人急常語人曰歲凶之半價即豐時之全價雖少取之不爲損也

董公朴參江藩時子士毅爲舉人家食遣僕候公公問舉人家居何爲僕對曰里中比年大祲餓殍塞途舉人日募工掩殍骼幾千計矣公惻然又問曰舉人故窶甚募工費何能辦曰每一殍計工費穀若干皆貸於族叔某也公曰是義當爲者因還書勉之云凡義所當爲者闇然默而行之更勿以彰示人若微有取名意則淺陋甚矣

高忠憲曰古語云世間第一好事莫如救難憐貧而濟人又不在大費己財但以方便存心慈祥爲行平居酒席省得一二品餽遺省得一二器少置衣服一二套省去長物一二件切切爲貧人算計存些盈餘以濟人急難去無用可成大用行一善可抵萬善此積德中大功課也

殿元河南劉理順少年鄉薦久不第家貧樂道讀書神廟聞哭聲甚哀問之乃一人出外七載不歸其母年老貧甚欲賣媳以圖兩活得遠商十二金晚即隨商去姑媳不忍相別耳劉聞之急呼其僕曰汝可將我家中銀十二兩來僕曰家中乏用止有納糧銀數

餘兩劉曰汝第與我因作一書內稱其子之語言離家七年已獲利五百餘金十日後便歸先寄銀十二兩等語覓人送至其家姑媳將銀及書以告遠商商知其子尚在且即歸遂取銀退婦而去踰十日其子果歸所得之銀與所行之事悉符前書母以問子子駭甚但曰此神憐我也每日合家拜謝天地而已

呂原明曰昔京師有某以金銀實二筐付託於其友數年而死其友往語其子子曰我父平日未嘗一言此且無契券之驗殆長者之誤也其友曰我躬受之爾父豈待契券與汝汝必與聞哉兩人相推無敢當其友遂持以白官時包孝肅尹京兆究其實斷還其

子今人良心滅絕見利紛爭聞兩人之風其亦可以少愧矣乎

張知常在上庠日偶他出有同舍生發篋盜其金十兩學師集同舍檢得之公不認曰非吾金也（錢財事小名節事大使張若認將置同舍生於何地耶）同舍生且慚且感夜袖金還公公憐其貧復以半與之（見既不認還又均分何忠厚乃爾）

丁清惠公置產必詳訪來歷遇有兄弟交爭或鄰舅相爭及子盜父業主占奴業者必正色以倫理諭之從容解紛使其相安賴以和好者甚眾每置一業必謂家人曰為人占不得一分便宜況棄產得產苦樂大不相同須曲體之三年以後有求加者必應其請

曰范文正三買田宅吾愧不能效法前賢又何忍有求弗應有同族以田售客曰得同宗業恐滋後累公曰祖宗一脈創使不得其產亦應周急吾正欲借此以伸厚誼又何傷哉一進士門生好以刻薄謀產公貽書訓之曰產業將貽之子孫須得之光明待之寬厚斯可垂之久遠若以產業為冤業非惟為子孫作馬牛直為子孫作蛇蝎耳（凡置產者宜一自省戒之戒之又以扇寫古詩云一派青山景色幽前人田地後人收後人收得休歡喜還有收人在後頭進士慚服

陸平泉好行方便至老不衰待佃戶尤加厚每誡其子孫及其僮僕曰農夫歷盡四時艱苦方得有此秋

鄧鄧鄧

史搢臣曰凡人負欠錢財決非甘心不肖須要原情不必凌虐太甚言語說盡身分做盡當看兒孫面上稍稍寬容每見貧者欠人貲財衣物一時無償赴愬求寬既惡其巧心善辨靦面無言又嫌其默訥柔姦總之欠字壓人頭不知何法可合人意俗云人人說我無行止你到無錢便得知故有錢財被人欠負當諒其無計設法而寬貸之不當因其輾轉推諉而逼迫之也昔梅衡湘公爲固安令有中宦饋公豚蹄乞爲追負公意蹄召中宦飲并召負債者至前呵之負債者訴以貧公斥曰貴人債敢以貧辭乎今日必償少遲死杖下矣負者泣而去中宦意似惻然公復呼來蹙額曰吾固知汝貧然無如何也亟賣爾妻與子持錢來雖然吾爲汝父母何忍使汝骨肉驟離姑寬一日歸與妻子訣別此生不得相見矣公言時不覺墮淚負者聞言愈泣中宦亦泣辭不願償爲之毀券嗟嗟世之倚富壓貧者特未念其賣妻鬻子一段光景耳誠念及此有不惻然動乎

袁君載曰人抵奴僕婢女就役於人者天資多愚蠢作事多乖誤爲家長者於使令之際有不如意宜曲爲諒之寬以處之多其教誨省其嗔怒如此則婢僕可以免罪主者胸中亦覺省事有時或不得已而責之亦只宜畧加箠楚切勿毒打致傷忠厚且恐事生

不測至於家中子弟不許擅打僕隸婦女不許擅打婢妾有事當令告之家長婢僕既欲其出力任事不可不察其飢寒憫其勞苦臥宿去處亦當留意冬時風寒夏月蚊暑亦須爲之檢點庶幾仁人之用心也史摭臣曰錢財不可不惜然亦不可苛刻我能寬一分則人受一分之惠矣如小本生理及挑負奔馳者惟仗工夫氣力養家活口尤當倍加優恤在我釐毫之寬所去有限彼得一釐一文所喜無窮每見刻薄之人取之盡錙銖剝削半生害生一旦反至傾家蕩產又見寬厚之人終日受人侵削反能飽食煖衣終身無禍者比比然也人欲自算莫若觀人清夜將所見所知者屈指而計刻薄之後人與寬厚之後人較量之孰亨孰否孰富孰貧便見天之報施不爽矣

又曰經營二字當看得大如耕農織婦行商坐賈無一非經之營之也必要平心公道斯貿易場中雖未有積功累仁之事而自無欺心昧理之事（即此亦是功德）如蓄米而望米價貴蓄布而望布價增則其心不平如大入而小出造假以混眞則其道不公不平不公皆出於利心太重究之豐嗇有數未必即如其意空起刻薄心腸即或獲利致富天道福善禍淫未必親亨其利世有商賈成家而子孫不亨厚福者良由此也

張安國舍人知撫州日有賣假藥者出榜戒約曰陶

隱居孫眞人因本草千金方濟物利生多積陰德名在列仙自此以來行醫貨藥誠心救人獲福者甚衆不論方冊所載只如近時此驗尤多有只賣一眞藥便家資鉅萬或自身安榮享高壽或子孫及第又曾見貨賣假藥者其初積得些少家業自謂得計不知冥冥之中自家合得祿料都被減尅或身有橫禍或子孫非理破蕩者蓋緣賣藥之人多是疾病急切將錢告求賣藥之家孝子順孫只望一服見效卽被假藥誤賺非惟無益反致損身人命最重無辜被禍其痛何窮

薛西原好施人有疾親爲檢方合藥嘗解綿衣以衣寒者或曰焉得人人而濟之西原曰但不負此心耳嘗云天地間福澤若不存些憂勤惕厲的心腸聚他不來若不做些濟人利物的事消他不去（至理名言千古不易）

唐翼修曰嚴君平賣卜與子言依於孝與臣言依於忠與弟言依於悌終日利物而無利物之名士君子有志於惠澤及人者不可不識此妙理

史搢臣曰可以一言而解人之紛一出而救人之厄此亦不必過爲退避也但因以爲功則市道矣又曰排難解紛是實行門中第一義能和人骨肉見人搆難時一語解釋其福無量

胡振安曰凡人爭訟多起於一時意氣解之則大事

化小小事化無消禍於無形兩家均受其福所以遇爭訟之事必當委曲調停俾釋忿相好庶幾爲天地培養和氣昔袁仲誠少業儒鄰有異母弟以家財不公欲訟其兄仲誠以手足之情諭之不可解遂持己財與之而訟以息其兄不知而仲誠亦不言此眞可謂陰德也

昔人云凡人在顚沛患難之中善用一言解救上資祖考下蔭兒孫又云推人與扶人都是一般手慳人與讚人都是一般口甯使扶人手莫開慳人口若能依此言前程永固久

眞經註曰見人學好多方贊成見人差錯多方提醒見人豐顯則談其致福之由見人苦難則原其所處之不幸斯長者之道也若忌成樂敗何與人事徒自壞心術耳

最樂編曰或曰陰德易從而修之曰凡可修者不以富貴貧賤拘但於水火盜賊饑寒疾苦刑獄逼迫逆旅狼狽險阻艱難至於飛潛動植力可到處種種方便雖一言一語之間必期有益一動一止之際必欲無傷如此存心則陰德無量而福報如之矣

袁君載曰飛禽走獸之與人形性雖殊而貪生惡死其情則與人同故凡養親祀先敬賓大禮所在不得已而烹宰則可若徒爲口腹斷宜節省況人一生之

食卽一生之祿祿盡則死矣是以君子淡泊明志非惟愛物之命且惜自己之福

勸世文曰天下物命殺之未有不恨者惟牛犬有功被殺爲恨中之恨天下物命殺之未有不痛者惟螃蜊蛤蜊螺蜥鱔魚從滾湯中煮爛而後死當其死不遽死求一刀而不可得爲痛中之痛天下物命殺之未有不慘者惟田雞臨死抱頭鰻鱺全身寸斷團魚腳踏其背棒觸其口至死銜棒爲慘中之慘至於連繭煮蠶帶殼煮龜皆是衆生極恨極痛極慘事今人若能永戒其功德甯可思議乎

程明道窗前草茂覆砌或勸之芟明道曰不可欲常見造化生意又置盆池畜小魚數尾時時觀之或問其故曰欲觀萬物自得意

周茂叔窗前草不除去人問之曰與自家生意一般可見草木雖是無知若無故而斬伐不幾自傷其生意乎

司馬溫公曰草妨步則薙之木礙冠則芟之其他任其自然相與同生天地間亦各欲遂其生耳

宋葛繁爲鎭江太守力行善事一士人往謁請教繁曰吾始者日行一利人事嗣後或二或三或數四或十餘今四十餘年未常少廢問何爲利人事繁指席間踏子曰此物置之不正則觸人足予爲正之若人

饑與飯渴與杯水幾微言語動作有可以利益於人者隨念隨時隨事上至卿相下至乞丐皆可行之惟在於恒久而已

唐翼修曰士君子處心行事須以利人爲主利人原不在大小但以吾力量所能到處行方便之事即是惠澤及人如路上一磚一石有礙於足去之即是善事惟在久久勤行耳豈宜謂小善不足爲

保赤彙編三

金玉相勉夫輯

懲惡

姚氏家訓曰大抵創業者皆期子孫之繁盛然其本在一仁字梅杏果之實皆曰仁仁者生生之意也蠹蝕其肉風透其外能生乎哉人生內生淫慾外肆奸邪即蟲之蝕風之透也能生乎哉

昔有客論世間百物皆有影惟人心無影文忠公曰子孫即其心之影子孫昌善之影也子孫不昌惡之影也天道福善禍淫理無作惡之家反報子孫之昌熾者

張楊園曰做人最忌是陰惡處心倘陰刻作事多陰謀未有不殃及子孫者語云有陰惡者必有奇禍可畏矣哉

王陽明曰今人爲子孫計或至謀人之業奪人之產日夜營營無所不至昔人謂爲子孫作馬牛然身沒未寒而業已屬之他人譬家羣起而報復子孫反受其殃是殆爲子孫作蛇蠍也

韓山子曰人每臨終時憂子孫異日貧苦不思子孫貧苦從何而來乃從祖父積惡中來平日專事苛刻討便宜凡損人利已之事靡所不爲是日日殺子孫也平時殺子孫至臨終則憂子孫自我殺之復自我憂之不惑之甚哉

陳幾亭曰諺稱富人爲財主言其主持錢帛也然能守能散方名財主若死守弗散是名財奴夫散非妄費之謂也亦謂約已濟人當捨處雖多弗吝竊見近世富人一生坐享安樂又欲爲子孫計長久明明有用財之處慳吝不用一旦身亡只供子孫酒色賭蕩之資語云鄙嗇之極必生奢男濟貧乏一毛不拔供浪費一擲千金豈虛語哉

冒起宗曰予每見權貴之門及暴富之室不肖子孫驕奢淫蕩或身未死而產已暗鬻他家或肉未寒而人已裂據其室前人一銖一寸而積之後人如泥如

沙而棄之而彼不肖者又大半皆聰明人也此何以故蓋由當日逞威挾智逼勒牢籠以成巨室始而耗人繼爲人耗諺云來得不明去得正好正此謂也

眞經註云貪刻之後每生蠹敗蓋氣類所感自然而然譬如嘉葩惡木各有其種生平作惡多端而妄冀其不生敗家子呆蠢漢是猶種惡木而望其生嘉葩也其可得乎

又云男女至盜淫而不肖已極然盜淫之性稟自何人試思乃父奪人錢財淫人妻女費盡機謀壞盡心術淫盜之性種於前則淫盜之萌發於後理勢必然非獨天之惡貪淫而厚其罰也

補過

于鐵樵曰人不能無過然能改過自新卽能轉禍爲福蓋天愛悔過之人有加倍於尋常少過者何以知之尋常少過者庸碌無爲隨緣安分不過以命所應得還之而已若勇猛改悔之人大抵智識高明才力剛健一旦撥轉念頭作事必多警策如雨後新晴天氣倍加澄朗有人於此旣耽酒色復冒風寒戕賊其身無所不至迨病根旣深畏死心切徧請名醫酌用汗吐下之藥猛加蕩滌然後補以參蓍輔以杞菊精神日旺筋力日强丰采煥發較勝於未病之先蓋經過一番瞑眩件件調攝得宜故比少年無病者更覺

可恃改悔得福者何異於此惟全不求醫仍然縱酒漁色衝風冒寒吾知其不治矣夫聖人之言百試百驗之神方也恐懼懺悔汗吐下之良藥也功過格常服之參蒼杞菊也對症投方斟酌在我但不可投一劑而遽求奏效耳

袁了凡曰人欲獲福而辭禍未論行善先須改過蓋改過乃出死入生之關也一息尚存彌天之惡猶可改悔故過不論久近惟以改爲貴昔遽伯玉行年五十而猶知四十九年之非吾輩身爲凡流過惡蝟集而同思往事常不見有過者心粗而氣浮也然人之過惡深重者亦有效驗或心神昏塞轉頭即忘或無事而常煩惱或見君子而赧然消沮或聞正論而不樂或施惠人而若吝或夜夢顛倒甚則妄言失志皆作孽之相也苟一類此即須奮發舍舊圖新幸勿長惡殃及子孫

施愚山曰人生大小過不可勝數少壯時第一在淫而其淪肌浹髓至老彌甚者莫如貨財一節貪心所使機械百生而總不出於損人利己一語是非惡人爲然庸鄙之流自利之心勝輒不能無犯焉苟速速改悔去其自利之私則作善降祥其後嗣未有不昌熾者矣

袁了凡先生嘗於慈雲寺中遇一老者孔某精邵子

皇極數引之歸試其數纖悉皆驗因爲先生卜終身休咎言數該無子先生知其預定遂澹然無求逾年訪雲谷禪師於棲霞山靜坐三晝夜不起妄想師問其故先生曰余爲孔公算定一生皆有定數無可妄想師笑曰人生安得無數但爲凡人行數極善之人數固拘他不得極惡之人數亦拘他不得先生曰然則數可逃乎曰命由我作福自己求詩書所載的爲明訓因問孔公所算若何先生以實告師曰汝自揣應生子否先生曰不應也大凡地之穢者多生物水之清者常無魚余好潔和氣能育萬物余善怒愛爲生生之本忍爲不育之根余矜惜名節常不能捨己

救人又多言耗氣喜飲燥精好徹夜長坐而不知葆元毓神皆宜無子師曰我觀世間享千金之產者定是千金人物享百金之產者定是百金人物應餓死者定是餓死人物天不過因材而篤幾曾加纖毫意思即如生子有百世之德者定有百世子孫保之有十世之德者定有十世子孫保之有二世三世之德者定有二世三世子孫保之其斬焉無後者德至薄也汝今既知非將向來不生子之相盡情改刷務要積德行仁從前種種譬如昨日死從後種種譬如今日生此義理再生之身也太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活孔公算汝乏嗣此天作之孽也猶可得

而違今汝力行善事廣積陰功此已作之福也安得而不受亭乎易曰君子趨吉避凶若言天命有常吉何可趨凶何可避開章第一義便說積善之家必有餘慶汝信得及否先生信其言拜而受教遂起求子之願誓行善事三千條師即出功過格相示令所行之事逐日登記善則記數惡則退除先生由是戰兢惕厲在暗室屋漏常恐得罪天地鬼神一切善事見無不爲嘗訂空格一冊名曰治心篇日置案頭所行纖悉必記夜則設桌於庭效趙越道焚香告帝其夫人不能書每行一善事用鵝毛管印一紅圈於歷日之上四年三千之數已滿辛巳生子天啟後改名儼

登天啟乙丑進士

雲南進士須澄本幼聰穎弱冠遊庠長襲父業作幕才學過人久困棘闈年過五旬無子已置三妾生而不育又值家變迭興聞覺夢道人善請呂祖仙乩齋沐往叩呂祖降壇示曰須子自負多才豈知多才多誤乎須跪泣求訓又示曰道有萬端總歸一善走向善去便是生路而千萬吉祥集之矣走向不善去便是死路而千萬凶災集之矣人負慧性奇才是極幸又極不幸如聖賢稟天縱之資其聰明才力俱用在積功累仁上德如何大福亦如何大豈非極幸若奸宄以不凡之質而聰明才力俱用在機械利慾中惡

如何深禍亦如何深豈非極不幸乎須子有出羣之才吾爲爾喜又爲爾悲爾知之乎須復跪求示又批云爾年已半百終日訑訑自得馳騁其才皆誤用之才適足上戕宗祖下賊兒孫者也吾是以悲之也爾自今以後果能轉舟之帆返馬之轡改塗易轍所用之才皆恰當之才適所以報答宗祖培植兒孫者也吾是以喜之也須復禱云弟子深悟前非痛加洗滌自今束筆家居不復爲幕將家財廣行善事以期晚蓋未識可稍逭否呂祖又示曰種種善事誠貴力行然爾之行善正當作幕正當執筆而行善愈易行善愈大何也天下之最便於行善者莫如官吏生殺惟

我威福惟我利害惟我倘存心行善則積德累功易如反掌亦且功德之大倍於他途也然爲官爲吏無論才短才長勢必資幕賓以運籌而決斷故官吏無權而幕賓最有權千詞萬狀積於幕案爲幕賓者一一得剖其曲直司其予奪區其禍福定其死生吾見往來鑒察神祇每於帷幕之前後左右環視如電見判詞恰當則笑顏點首以錄功見判詞背謬則怒目切齒以記罪甚有自恃無私好執偏見又或徇情貪利舞弊作奸種種顛倒以抑沈冤於莫雪者鬼神且不暇登簿而急奏天曹彰報尤速得禍尤烈故作幕一途最易損陰德亦最便積陰德也不肖者認此爲

罟利肥家之藪則日持快心之筆不啻日持殺身之刀賢者假此爲濟人利物之途則揮三寸之管直可造數世之福須子欲補過遷善即從作幕執筆一途求之毋泥成法毋設成心惟惻然體天地好生之心以爲心念此訟獄之紛其間出於狡猾虛飾者固亦有之而迫於懦受强凌愚被汚陷覆盆莫解者十居其九是全賴閱詞者虛心以採其隱微平心以論其曲直設身處地以詳其疾苦痛癢關切以救其顚連勿泥律中之義常施法外之仁須子惟牢記吾言即以萬萬千千之善盡寄於濡毫搆語之中則福基大啟蕃祉頻膺矣判畢須望空叩謝即日洗心滌

慮痛改前非雖在幕中常若帝天之鑒不敢妄判一詞行之三年鄉會聯登妻妾俱育共有五子長登第次翰林餘以名宿顯孫支林立皆嗣書香

齊旺金華人五旬無子有茅山道人善相謂之曰汝惡氣隱於天庭必有虧心處旺曰少年嘗淫人妻女道人愕然曰犯此宜斬兒孫矣淫惡最難懺悔非有大善不能回天汝今只管積善不妨頻相旺謝之始而依人爲善樂輸無已閱一年道人相之曰未也因而倡衆爲善首捐過半閱一年道人相之曰未也又復獨力行善不肯讓人家貲已罄矣閱一年道人相之曰異哉陰騭文已見何憂無嗣未幾生一子旺享

壽七十猶及抱孫

張甯晚年無子禱於家廟曰甯有何罪孽至斬先人血食傍一妾曰擔誤我輩卽陰隲耳甯悚然醒悟察不願留者卽日遣嫁幷行一切善事次年卽舉一子周才美爲子娶婦而能命主家政以斗斛秤各二論以入多出少之法婦不悅求去曰翁所爲逆天理妾他日生子定不肖破家人謂是妾所生恐被玷累才美悟乃曰及今改之何如婦問用此幾年矣曰二十年婦曰必欲妾留當入少出多反用二十年者乃可翁許之後生子登第

錫麟寶訓摘要卷四　保赤彙編四

金玉相勉夫輯

蒙養附

易曰蒙以養正聖功也養之若何孝弟以葆其性謹愼以存其心勤儉以課其業而已近世此道不明凡古人所以昭示後學者概置不道而獨以記誦詞章爲剽竊名利之計甚非所以培養人才綿延世澤之意也爰採先正格言編成蒙養一卷附於篇末以爲育麟者勸

朱文公童訓

凡子弟須要早起夜眠凡喧鬨爭競之處不可近無

益之事不可爲謂如賭博籠養打棍踢毬放風禽等事凡相揖必折腰凡對父母長上朋友必稱名凡稱呼長上不可以字必云某丈凡遇長上必作揖凡飲食於長上之前必輕嚼緩嚥不可聞飲食之聲凡飲食之物勿爭較多少美惡凡侍長者之側必正立拱手有所問則必誠實對言不可妄凡開門揭簾須徐徐輕手不可令震驚響凡衆坐必斂身勿廣占坐席凡侍長者出行必居路之右凡如厠下必浣手凡夜行必以燈燭無燭則止凡待婢僕必端嚴勿得與之嬉笑凡執器皿必端嚴惟恐有失凡危險不可近凡道路遇長者必疾趨而揖凡夜臥必用枕勿以寢衣覆首凡飲食舉匙必置箸舉箸必置匙

范竹溪理學備考

凡人子行步要安詳穩重不許跳躍奔趨說話要從容高朗不要含糊促迫作揖要深圓不可淺遽侍立要莊靜不可跛欹起拜身手相隨不可失節衣履要留心愛惜不可汚壞瞻視要安閒不可流亂在坐要端重不可箕岸但有違犯輕則跪重則責愼勿姑息古云教子嬰孩信夫

史搢臣願體集

父母教子當於稍有知識時見生動之物卽昆蟲草木必教勿傷以養其仁尊長親朋必教恭敬以養其

禮然諾不爽言笑不苟以養其信稍有不合即正言厲色以諭之不必暴戾鞭撲以傷於忍子弟少年不當以世事分讀書但令以讀書通世務切勿順其所欲須要訓之謙恭鮮衣美食當爲之禁淫朋匪友勿令之親則志趨自然樸實近理其相貌不論好醜終日讀書靜坐便有一種文雅可親即一嘲一笑亦覺有致若恣肆失學行同市井列之文墨之地但覺面目可憎即自己亦覺置身無地矣

王朗川訑謀

養子弟如養芝蘭既積學以培之更須積善以潤之人之教子飲食衣服之愛不可不均長幼尊卑之分不可不嚴賢否是非之迹不可不辨示以均則長無爭財之患責以嚴則長無悖逆之患教以分別則長無匪類之患

吾之一身尚有少不同壯壯不同老吾身之後焉有子能肖父孫能肖祖所可盡者惟留好樣與兒孫耳胡安國子弟或出宴集雖夜深不寢以候其歸驗其醉否且問所集何客所論何事有益無益以是爲常林退齋臨終子孫長跪請訓先生別無他言若等只要學喫虧從古英雄只爲不能喫虧害了多少事

李建章新增願體集

語云有好子孫方是福無多田地不爲貧好與不好

只爭个教與不教世上那个生來就是賢人都是教訓成的每見人家祖父愛子孫定要好食與他喫好衣與他穿獨不思喫慣穿慣了好的便不知樽節賣田賣地都從這裏來又見人家祖父疼子孫儘他要的把來與他儘他惱的替他打罵出氣獨不思順從他慣了必至自縱自由闖禍生事那時節雖悔也遲了從此一想子孫如何可以不教但教訓有个方法未教他作家先教他做人教他做好人先教他存好心明倫理顧廉恥習勤儉守法度方是教訓

人家子弟知識稍開課誦之餘一切家計出入人情世故須爲講究即如飲食使其知稼穡辛勤衣服使其知機杼工苦并田莊望歲時豐稔經營慨物力艱難漸漸說至創業守成防危慮患多方譬喻此等言語較之詩書易於入耳使其平日了然胸中及長庶幾稍知把捉矣

王文成學規

凡教童子惟當以孝弟忠信禮義廉恥爲專務其栽培涵養之方則宜誘之歌詩以發其志意導之習禮以肅其威儀諷之讀書以開其知覺今人往往以歌詩習禮爲不切時務烏知古人立教之意哉大抵童子之情樂嬉遊而憚拘檢如草木之始萌芽舒暢之則條達摧撓之則衰痿今教童子必使其趨向鼓舞

中心喜悅則其進自不能已譬之時雨春風沾被草木莫不萌動自然日長月化若冰霜剝落則生意蕭索日就苦槁矣故凡誘之歌詩者非但發其志意而已亦所以洩其跳號呼嘯於詠歌宣其幽抑結滯於音節也導之習禮者非但肅其威儀而已亦所以周旋揖讓而動盪其血脈拜起屈伸而固束其筋骸也諷之讀書者非但開其知覺而已亦所以沈潛反覆而存其心抑揚諷誦以宣其志也凡此皆順導其志意調理其性情潛消其鄙吝默化其粗頑日使之漸於禮義而不苦其難入於中和而不知其故是蓋先王立教之微意也若近世之訓蒙稚者日惟督以句讀課倣責其檢束而不知導之以禮求其聰明而不知養之以善鞭撻繩縛若待拘囚彼視學舍如囚獄而不肯入視師長如寇讐而不欲見規避掩覆以遂其嬉遊設詐飾詭以肆其頑鄙偷薄庸劣日趨下流是蓋驅之於惡而求其爲善也何可得乎凡訓蒙須識此意

每日清晨諸生參揖畢教者以次遍詢諸生在家所以愛親敬長之心得無懈忽未能眞切否溫凊定省之儀得無虧缺未能實踐否往來街衢步趨禮節得無放蕩未能謹飭否一應言行心術得無欺妄非僻未能忠信篤敬否諸童子務要各以實對有則改之

無則加勉教者復隨時就事曲加誨諭開發然後各退案肄業

午後教之習禮或拜跪應對之節或揖讓升降之儀須令澄心肅慮審其儀節度其容止毋忽而惰毋沮而詐毋徑而野從容而不失之迂緩修謹而不失之拘局久則體貌習熟德性堅定矣

凡授書不在徒多但貴精熟量資稟能二百字者止可授以一百字常使其精神力量有餘無厭苦之患而有自得之美諷誦之餘務要專心一志口誦心維字字句句紬繹反覆抑揚其音節寬虛其心意久則義理浹洽聰明日開矣

孫簡肅家規

生子胎教具載古語及能言能行能食時便當防其放逸言常教其毋誑行常教其後長食常教其毋噉絮衣常教其習布素愼擇嚴正童子師檢約以灑掃應對進退儀節及十五成童時情竇初開利欲易動立志爲先孔子十五志於學學者格致誠正蓋自初學至於聖人只是成就此志而已

生子質敏才俊可憂勿喜便思豫加防檢陶習謙厚禁絕浮誇傲誕者與之遊處庶可成遠大之器

義門鄭氏家規

每旦家長中坐男女分坐左右令未冠子弟朗誦男

女訓戒之詞男訓曰人家之盛衰皆係於積善積惡而已何謂積善居家則孝弟處事則仁慈凡所以濟人者皆是也何謂積惡恃己之勢以自強尅人之財以自富凡所以欺心者皆是也女訓曰家之和與不和皆係乎婦之賢否何爲賢事舅姑必孝順奉丈夫以恭敬待娣姒以溫和接子孫以慈愛如此之類是也何謂不賢淫狎妬忌恃強凌弱搖鼓是非縱意徇私如此之類是也

朔望家長率衆參謁祠堂畢令子弟一人唱之聽聽聽凡爲子者必孝其親爲妻者必敬其夫爲兄者必愛其弟爲弟者必恭其兄聽聽聽毋徇私以妨大義毋怠惰以荒厥事毋縱奢侈以干天刑毋用婦言以間和氣毋爲橫非以擾門庭毋耽麴蘗以亂厥性有一於此既殞爾德復絕爾允瞻茲祖訓實係廢興言之再三爾宜深戒聽聽聽復令子姪敬誦孝弟故實一遍

陸文定家訓

子弟務惇孝友篤倫常毋忘貧賤而慕奢華毋長驕慢而失禮節毋私燕昵而忘檢飭毋事掊克以取怨尤益節儉所以惜福恬靜所以遺安

孝敬人倫之常然父子兄弟間或不能盡分致乖違責備爲子弟者盍亦反思我今日爲人之子日後當

爲人之父兄之視我猶我之視弟也我不能以子弟之禮善事父兄而責子弟以事父兄之禮事我爲父兄者亦思我爲子弟所以事父兄者何如而責之子弟如此則父子兄弟各盡其道而愛敬之心不容自已矣語不云乎前人標榜後人則倣

張太史務家箴

士大夫當爲子孫造福不當爲子孫求福謹家規崇儉樸訓耕讀積陰德此造福也廣田宅結姻援爭什一鬻功名此求福也造福者澹而長求福者濃而短

蔡梁村示子弟帖

吾家子弟最宜常勗以立大規模具大識見不可沾沾焉貪目前安卑近朱子云天下事壞於懶與私最切今之弊懶則不肯勤勵學殖荒而志氣亦墮私則自至親間尚分畛域有利心尚望其有器識有所建立哉

世俗秀才株守時文一冊指望得第夢夢一生全不計及異日施設若何結局若何者此鄙陋之尤最所當戒即學古而止以爲作文章用講學而不能躬行亦甚可恥也

衡門錄曰凡子弟所當痛戒者不一而以不聽父兄師長之言及昵比淫朋爲最若戒是二者自能尋向上去餘皆不待戒矣

自警編曰父子間不可溺小慈自少律以嚴繩以法則長無不肖之悔

彭東甯童訓十章

書生站立要端然兩腳齊收似並蓮莫一腳前一腳後將身跛倚向人前右訓立坐時又手肅容儀端拱安然似塑泥莫把一身偏左右謾將兩手弄東西橫肱並坐殊非禮獨處閒居亦整衣熟記魯論朱子註坐如尸也是吾師右訓坐行時無事莫匆匆休與顛狂柳絮同怕有崎嶇須穩重恐遭傾跌失儀容但遇親鄰深作揖若逢尊長後相從凡人皆可爲堯舜只在徐行舉步中右訓行說話從今切勿輕輕言動輒取人嗔

尊長問時從實對友朋相與見情眞打謊哄人輕薄子至誠應物聖賢人愼毋妄語溫公輩分付兒曹要景行右訓言飲食隨時飽便休不宜揀擇與貪求若隨尊長毋先舉便是同行務遜酬魚肉吃殘須勿反飲湯流啜甚堪羞遺羹讓果垂青史飲食之人乃下流右訓飲食父母深恩等昊天兒當孝順報生全早晨先起問安否晚夕還來看坐眠懷果便知思顧養望雲心每在親邊有時打罵並嗔怒只是和顏與笑言右訓事親師教深恩並父親尊師重道始能成百工技藝猶知本莫作忘恩負義人右訓事師兄友弟兮弟敬兄天然倫序自分明席間務讓兄居左路上應該弟後行酒食

須先供長者貨財切勿起爭心諄諄誨汝無他意原是同胞共乳人右訓朋友之交道若何少年爲弟長爲哥同行共席須謙讓立志存心互切摩終日羣居談道義青春可惜莫蹉跎休論富貴與貧賤同氣相求受益多右訓處友讀書端的要專心義禮求明辨字音諷誦務宜多遍數晨昏須是細推尋聖賢經傳同天地善行嘉言無古今誠向此中求受用一生勝積萬籯金右訓讀書

達生編小引

胎產非患也而難產則爲人患人患不殄則歸之於天天何尤乎亦惟求之人事而已此編專爲難產而設儻能熟看謹行皆可先生如達於是人患弭而天德協矣然知之而不言非也聞之而不傳亦非也好生者見之宜爲廣布有力者重刻通行無力者手鈔普送口授於人隨分所至未必非吾儒同胞同與之一事也此編揣摩印證委係無疑凡重刻手鈔時不必改動尤不必增入方藥以相矛盾耳

康熙乙未天中節亟齋居士記於南昌郡署之西堂



C101/1815
v.2

達生編大意

胎產一事自產寶諸書以後代有發明其係臨
臨產及產後調理之法率皆至精至密似無遺
義但或專精方藥而未及其所以然或略一及
之而未竟其旨儻非究心有素之人未易明而
用之也倉卒之間殊難得力茲特倡明天德自
然之說不厭煩絮重複以期於暢使平日可以
預防臨時可以應急從此天下後世產母嬰兒
同登壽域豈不快哉然亦不過遵古人之意而
條達之非創爲異說也

一此編只是反覆以言其理至於方藥殊未之及

偶載一二皆取先賢古方極平極穩者蓋極平常之事須用極平常之藥一切矜奇炫異之方概置不錄且保護得法雖平常之藥亦無所用之矣儻必欲用則他刻自有原不相妨

一凡胎前臨產產後調護之法一一備載不厭煩複蓋原係家居日用閨房瑣屑之事一有不到皆足致病與其服藥於病後曷若致謹於平時

一此編言語俚俗未免見笑大方但原爲婦人而設識字者固不必言不識字者令人誦之皆可通曉然須平時講令心中明白臨時自有主張不但產母宜知一應老幼男婦皆當知之與其

看戲文聽說書不如此等有益也

一此編雖共所當知而富貴之家尤宜熟講蓋閨人平時嬌養口厭肥甘身安逸樂體氣脆薄且性情矯傲不聽人言到此時纔一知覺即不能耐點著燈火上呼下應房中擠簇多人內外嚷成一片穩婆絡繹各要爭功脈未離經胎未轉下即便坐草及致不順奇方珍藥紛紛亂投以致母子兩誤者多矣豈不惜哉但能留意此編自可平安清吉

一開卷即載臨產者何蓋臨產倉卒不及細檢因以切要者載之首篇俾得開門見山人人熟習

專意持行自可無誤若平時講說原不妨從保胎順序看之也

一試痛一篇尤爲緊要蓋知試痛之誤方知正生之易正與臨產一篇互相表裏最宜細看仍采先賢格言之足相發明者數條載之聊以徵予言之不謬

一語云勿以善小而不爲此編固小之小者然誠有見於胎產爲生人之始隨時隨地體驗而成且身經目擊口授耳聞千試不爽忘其猥陋出以語人漏萬之譏固所不免世之君子原其心焉可矣

亟齋居士述

○原生

天地之大德曰生生之德無往不在要之莫大於生人夫胎產固生人之始也是以名之曰生生也者天地自然之理如目視而耳聽手持而足行至平至易不待勉強而無難者也然今之世往往以難產聞者得無以人事之失而損其天耶夫天豈以生道殺人哉必不然矣因思人爲至靈何有於物物之生也莫或難之故草木之甲以時鼓之出以日豈復有導之者哉自然而然不待勉強於人何獨不然有童子

骨哽於喉百方不出舉室徬徨一嫗視之曰無異也令靜臥飼以粟糜三日自出而無所苦可以知其理矣骨哽者人事也尚可以天勝之而況天道之常與自然之極者乎事本易也而自難之事本常也而或異之無惑乎其然矣繼持此理消息行之百試之下無一失者而多不用藥由此做唇焦舌以告同人頗蒙相信數年以來一邑之間產難者蓋寡矣獨惜一隅不能遍及茲漫述成帙剞劂布之夫豈能有補於生之外哉惟願順承天休而毋以人事撓之以各遂其生而已

○臨產

六字眞言　一日睡宜仰　二日忍痛勿曲腰　三日慢臨盆勿亂動手

初覺腹疼先自家拿穩主意要曉得此是人生必然之理極容易之事不必驚慌但看疼一陣不了又疼一連五七陣漸疼漸緊此是要生方可與人說知以便伺候若疼得慢則是試疼只管安眠穩食不可亂動此處極要著意留心乃是第一關頭不可忽略若認作正產胡亂臨盆則錯到底矣

此時第一要忍疼爲主不問是試疼是正產忍住疼照常吃飯睡覺疼得極熟自然易生且試疼與正生亦要疼久看其緊慢方辨得淸千萬不可輕易

臨盆坐草揉腰擦肚至囑至囑再站時宜穩站坐時宜正坐不可將身左右擺扭須知此處要自家作主他人替不得與自家性命相關與別人毫無干涉

到此時必要養神惜力爲主能上牀安睡閉目養神最好若不能睡暫時起來或扶人緩行或扶桌站立片時疼若稍緩又上牀睡總以睡爲第一妙法但宜仰睡使腹中寬舒小兒易於轉動且大人睡下小兒亦是睡下轉身更不費力益大人宜惜力小兒亦宜惜力以待臨時用之切記切記

無論遲早切不可輕易臨盆用力切不可聽穩婆說孩兒頭已在此以致臨盆早了誤盡大事此乃天地自然之理若當其時小兒自會鑽出何須著急因恐小兒力薄其轉身時用力已盡及到產門不能得出或亦有之宜稍用力一陣助之則脫然而下益此時瓜熟蒂落氣血兩分渾身骨節一時俱開水到渠成不假勉強及至生下即產母亦不知其所以然矣

或曰大便時亦須用力如何生產不用力不知大便呆物必須人力小兒自會轉動必要待其自轉不但不必用力正切忌用力益小兒端坐腹中及至生時垂頭轉身向下腹中窄狹他人有力難助要

聽其自家慢慢轉身到產門頭向下腳向上倒懸而出若小兒未曾轉身用力一逼則腳先出以爲詫異且贈之美名曰腳踏蓮花生或轉身未定時用力一逼則橫臥腹中一手先出又名之曰討鹽生即或轉身向下略不條直用力略早亦或左或右偏頂腿骨而不得出不知此等弊病皆是時候未到妄自用力之故奉勸世人萬萬不可用力然亦非全不用力但當用力只有一盞茶時耳其餘皆不可亂動者也即如大便未到其時縱用力亦不得出而況於人乎

或問何以知此一盞茶時而用力乎曰此時自是不同若小兒果然逼到產門則渾身骨節疏解胸前陷下腰腹重墜異常大小便一齊俱急目中金花爆濺眞其時矣當於此時臨盆用力一陣母子分張何難之有

或曰小兒會鑽出之說到底未敢盡信不知古人曾言及否曰古人立言不過撮其大要安能事事而悉言之只要後人能體會耳觀瓜熟蒂落四字即知小兒自會鑽出觀搤苗助長四字即知將試痛認作正生之弊矣夫哺雞日足自能啄殼而出豈有催生之神藥穩婆之妙手乎古人謂有遲至三四年而後生者此是不肯鑽出耳既自不肯鑽出

誰能强之自要鑽出誰能禦之

或曰早一時斷乎不可動矣不知遲了一時可不妨否曰不妨若果當其時必無不出之理然或偶有不出者則是小兒力盡不能得出宜令上牀安睡使小兒在腹中亦安睡歇力少刻自然生矣

或曰儻或兒到產門而大人睡下豈不有礙曰更好蓋小兒向下時而大人坐立則小兒倒懸矣豈能久待今大人睡下兒亦睡下有何妨礙又曰儻或悶壞奈何曰他十箇月不悶今乃悶乎

或曰忍疼過久或亦不妙曰最妙從不聞婦人私產而難產者或謂有神護佑非也總因胎起於私怕人知覺只得極力忍疼疼到沒奈何時自脫然而出其理甚明有何疑處

或曰不宜用力已聞教矣不知先誤用力已致橫生倒產有法治之否曰急令安睡用大劑加味川芎湯服之將手足緩緩托入再睡一夜自然生矣又曰托之不入奈何曰若肯睡再無托不入之理若到此時仍不許他睡又或動手動腳亂吃方藥吾末如之何矣

或問盤腸生是何緣故曰是用力之過蓋因產母平日氣虛及到臨時用力努掙渾身氣血下注以致腸隨兒下一次如此下次路熟又復如此若能等

待瓜熟蒂落之時何得有此怪異

或問有一痛便生令人措手不及者此又何也曰此乃正理何足爲異蓋胎氣已足母子兩分兒自要出雖欲留之而不可得人人皆是如此皆各有此一時只要忍耐得住等待此一時耳

或曰穩婆不必用乎曰既有此輩亦不能不用但要我用他不可他用我全憑自家作主不可聽命於彼耳大約此等人多愚蠢不明道理一進門來不問遲早不問生熟便令坐草用力一定說孩兒頭已在此或令揉腰擦肚或手入產門探摸多致損傷總以見他功勞不肯安靜更有一等狡惡之婦借此居奇射利禍不忍言矣按吳越之間謂之穩婆江淮閒謂之收生婆徽甯閒謂之接生婆按收接二字之義因其年老慣熟令之接兒落地收兒上牀耳原非要他動手動腳也每見富貴之家預將穩婆留在家中及到臨時稍不快利前門後戶接到無數紛紛攘攘吵成一片所謂天下本無事庸人自擾之

或問臨時有經驗之藥亦可用否曰不用從前奇方莫過鼠腎兎腦丸今時盛行莫過回生丹非謂其不效而不用也總用不著耳既不用力又不動手又有睡法佐之他自會生何消用藥縱有不順睡

爲上策

或問服藥有益無損否曰安得無損鼠兎二丸大耗氣而兼損血回生丹大破血而兼損氣蓋鼠兎例用香竄之藥產時百脈解散氣血虛虧服此散氣藥兒已出而香未消其損多矣且令毛竅開張招風入內禍不可言回生丹以大黃紅花爲君其餘亦多消導之品血已耗而又大破之多致產後發熱等病遺患無窮都只爲產後失調誰復歸咎於藥按此數方古今稱爲神靈奇寶者尚然如此其他可知送藥者本是善念但知其利不知其害耳

或問總無可用之藥乎曰有只須加味芎歸湯佛手散二方用之不盡矣蓋胎時全要血足血一足如舟之得水何患不行惟恐產母血少又或胞漿早破以致乾澀耳今二方皆大用芎歸使宿血頓去新血驟生藥味易得隨地皆有且使身體壯健產後無病眞正有益無損此皆先賢洞明陰陽之理製此神丹以利濟天下後世奈世人貴耳賤目以爲平常而不用必求奇怪之藥而後用之只要奇怪不論損益豈不可歎

或問依此言世間總無難產者耶曰偶亦有之或因母太虛胎養不足氣血不完或母病傷寒之後熱毒傷胎又或夫婦同房太多以致慾火傷胎平日

過食椒薑煎炒熱物火毒傷胎以及跌撲損傷皆致難產多令胎死腹中除此之外無難產者矣或又有嚴寒天氣滴水成氷之候貧家房中火氣微薄以致血寒而凍亦令不出然此亦因臨盆太早去衣久坐之故耳若令擁被安臥待時而產豈有此患

凡生產艱難或天寒孩兒生下不哭或已死者急用衣物包裹再用香油紙撚將臍帶慢慢燒斷煖氣入腹漸漸作聲而活儻或先剪斷臍帶則死矣或問臨產時飲食如何曰此時心內憂疑腹中疼痛甚至精神疲倦口中失味全要好飲食調理但不宜過於肥膩耳儻不能食只將雞鴨湯肉湯之類吹去油澄清頻頻飲之亦能壯助精神人以食爲命豈可一日闕乎

○宜忌

臨產時宜老成安靜二三人伺候不必多一切親族婦女俱婉言謝卻勿令入房　夏月更不宜多人在房熱氣擁盛能令產母煩躁發暈其害非小房中宜輕行輕語不宜多話令其得睡爲妙

第一要勸其放心安靜忍痛歇息切忌在房中大驚小怪交頭接耳咨嗟歎息皆能令其憂疑擾亂以致誤事

房中宜安靜如常不得當面求神許願叫天叫地
穩婆只宜一人入房且令在旁靜坐勿得混鬧
飲食宜頻頻少與或雞鴨肚肺等清湯更妙
房中冬設火盆夏月多貯井水以收熱氣仍頻換之

○試痛

或問試痛何故曰兒到七八箇月手足五官全備已能動彈或母腹中有火或起居不時令兒不安以此大動而痛此等十胎而五不足爲奇只宜照常穩食安眠一二日自然安靜或痛之不止用安胎藥一二服自止此後近則數日遠則月餘甚至再過三四箇月纔產人多不知輕易臨盆終日坐立不令睡倒或抱腰擦肚或用手拖或用藥打生生將兒取出母則九死一生兒則十胎九殀慘不可言世間難產皆此故也蓋胎養不足氣血不全如剖卵出雛裂繭出蛹甯可活乎只說小兒難養誰復根究到此

又有受寒及傷食腹痛不可不知

或問何以知其試痛曰只看痛法一陣緊一陣者正生也一陣慢一陣或作緊作慢皆試痛也

或問傷食受寒何以辨之曰傷食者當臍而痛手按之更痛或臍傍有些硬處寒痛多在臍下綿綿而痛不增不減得熱物而稍緩是也

或曰試痛亦有或未必多日甚多曰何以見之曰以

今之難產者多也

或問將試痛認作正生其害如此儻將正生認作試痛以致過時不亦有害乎曰無害果當其時小兒自會鑽出縱或過時不過落在褲中生在牀上而已有何大害而如此諄諄乎

○驗案

前太僕卿霍山張公侅華繼室年輕體壯孕必八箇月而產產必數日百苦而下生女必週而夭再孕再產再夭皆同予謂後當生宜相間明年又八箇月坐草三日不下忽憶予言飛輿相召中途逢驅車者云迎其父母作永訣計比至已夜分矣診之脈未離經人餘殘喘穩婆在旁問之曰兒頭已抵產門不得出耳予急令安臥且戒勿擾與安胎藥明晨主人出笑而不言問之曰好了予曰昨言兒頭已抵產門今若何曰不見了大笑而別後此百二十日計十二足月生男謂予爲父今八歲矣始知前此皆生生取出以體壯年輕倖保母命耳

在張宅日邑庠程以學邀至其家有寵人坐草二日而不生亦與安胎藥越十六日生女

太學戴時濟與予比隣契好先是其弟婦一產三男母子俱殞一猶在腹今又婢孕其腹膨脖頗患之比產先令安臥與加味芎歸湯每隔半日而產積

日半三子俱生

陳氏妻生九日夜不下一息尚存聞余有兎腦丸踵門求藥余問之亦曰頭逼產門不得出諭令安臥再來取藥强而後去繼與加味芎歸湯明日生下母子兩全　按此皆產母用力逼令橫在腹中耳豈有人倒懸十日而尚得生者乎

昔一婦產兒手出不得入穩婆礪刃以須余見而惻然急令安臥與大劑芎歸湯徐徐托之手入明早生下母子皆安右臂紫黑數月而後消

達生編上終

保赤彙編六

亟齋居士述

○保胎

保胎以絕慾爲第一義其次亦宜節慾蓋慾寡則心清胎氣甯謐不特胎安且易生易育少病而多壽保胎又宜小勞爲妙試看鄉閒農婦僕婢下人墮胎甚少以勞故也蓋勞則氣血流通筋骨堅固胎在腹中習以爲常以後雖有些微閃挫不至壞事儻安逸不動則筋骨柔脆氣血不行略有閃挫隨至墮落然非胎後方勞正謂平日不宜安逸耳若平日安逸及孕後方勞適足損胎何筋骨堅强之有

耶夫敬姜百乘之家也老而猶績尊常富貴年少力强正宜勤事豈可暇逸以自病乎

孕已知覺卽宜用布一幅六七寸闊長視人肥瘦約纏兩道橫束腰閒直至臨盆之時纔解去若是試疼仍不宜解此有二妙胎未長成得此則腰膂有力略有閃挫不致動胎其一常令腹中窄狹及到解開則腹中一寬轉身容易此法吾鄉頗有知者特爲廣之

有孕後睡時須要兩邊換睡不可儘在一邊要使小兒左右便利手足慣熟則產時中道而出不難矣

○飲食

保胎藥餌諸書皆載不必再陳但飲食一道殊未之及茲略言之飲食宜淡泊不宜肥濃宜輕清不宜重濁宜甘平不宜辛熱青蔬白飯亦能養人卽在貧家頗爲不乏但富貴之人平日肥甘厭足抑令崇儉勢所不堪酌乎其中臚列如左

宜食諸物　豬肚多用　肺　雞　鴨　鯽魚　淡鰲　海參　白菜　菠薐　筍少用　麻油　腐皮二味多用　蓮子　熟藕　山藥　芡實

諸味總宜潔治多用清湯吹去浮油飲之最佳俱宜白煮忌用油煎　此多爲膏粱之人言之耳若藜藿之腹正宜得肥甘而潤之何淡泊之

有但六七箇月後腐皮麻油二物最宜多用不妨日日食之麻油解毒腐皮滑胎且清且補貧富皆宜允爲上品積食一二百張則先生如達矣或以麻油拌食更妙但麻油不宜蒸熟

忌食諸物 椒薑煎炒 野味異味 豬肝 犬驢騾馬 自死肉 豬血 蠏 腳魚 蝦蟆 鱔魚 勿多飲酒 勿輕服藥

又孕婦禁忌 一切宰殺凶惡之事不宜看 修造興工動土不宜看 鼈兎俱不宜看

○小產

小產者謂胎已墮下之後一切調理並如產後法便產須知云小產不可輕視其將養須過於正產十倍可也

薛立齋先生云小產重於大產蓋大產如瓜熟自落小產如生采破其皮肉斷其根蒂也但人往往輕忽死者多矣

小產後數日忽然渾身大熱面紅眼赤口大渴欲飲涼水晝夜不息此血虛之症宜用當歸補血湯以補其血若認作傷寒而用石膏芩連等寒涼之藥則必死矣方見後

○產後

產後調理諸書論之詳矣茲不復贅但取一二緊要及所未言者存之以備采擇

產後上牀宜高枕靠墊勿令睡下膝宜監起勿伸直隨飲熱童便一盞只令閉目靜養勿令熟睡恐倦極熟睡血氣上壅因而眩暈然不宜高聲急叫以致驚恐

四壁宜遮風不問有痛無痛俱用熱童便和熱酒各半每次一杯一日三五次三日而止酒亦不宜多若無大病只是如此不必服藥

產後宜用鐵秤錘或溪中白石子燒紅入醋令醋氣入鼻以免血暈且收斂神氣又能解穢每日三四次亦三日止

或有惡血衝心血暈昏悶不省人事者用韭菜一把切碎放有嘴壺餅內以熱醋一大碗灌入密紮口扶起病人以壺嘴向鼻遠遠熏之

生男生女夫命所招蓋百世禋祀以夫家爲主與婦人何干儻或連胎生女此亦人事之常不可在傍咨嗟歎息令其氣苦曾見有不明公姑愚蠢夫壻將婦抱怨每每致病傷生可笑可恨凡此只宜寬慰爲主又有將女溺死者忍心害理後嗣不昌

產後各處風俗不同或用紅沙糖或用山查或用吳茱萸或用胡椒煎水飲之總莫妙於熱酒對童便

或腹痛之甚用生化湯一服無不愈者

產後飲食各處不同徽俗纔上牀即與肥雞乾飯吳俗率與鼈粥甚至有彌月而後茹葷者皆不通可笑蓋徽俗終年食粥產後胃弱驟與雞飯殊不相宜然其患猶小吳中終年食飯至產後腸胃空虛正宜滋味調養以生氣血轉令食鼈食粥習俗移人牢不可破說亦不信子意必有以此傷生者習焉而不察耳及至虛弱發熱咳嗽此大虛也血脫益氣急宜大劑參芪驟補猶可挽回卻又謂之產勞且與滋陰降火以至於死而不悟良可歎也

或問必如何調理而後可曰粥時吃粥飯時吃飯三日內只用雞湯吹油澄清飲之未可食雞十日內不可食豬肉一月內不可食豬油以其壅塞經絡令血氣不通耳其餘有何忌乎

或問食物必要去油取其清耶曰然不但要清且更要淡蓋清淡之味本乎天能生精神濁則否矣

或曰何以驗之曰產婦宜飲淡酒宜食淡味若飲醇酒食鹹味皆令燒乾無乳此清濁之驗也但不得如吳俗食鼈粥矯枉過直耳

○胎死腹中

死胎只宜佛手散服之自下或不下再用平胃散一服加朴硝二三錢能令化下極易耳古人立法各

有精義且經屢驗不吾欺也勿用奇方怪藥以傷母命

或問何以知其胎死曰面赤舌青母活子死面青舌赤子活母亡面舌俱青子母俱死況死胎墜脹瘀痛亦與常產不同

○胞衣不下

或問胞衣不下何故曰總是臨盆早之故當產之時骨節開張壯者數日而合弱者彌月方合今不待其開而強出之故胎出而骨眼隨閉以致胞出不及耳

又曰聞此乃極惡之症可以損命有諸曰不妨不必服藥亦不必驚慌若胞衣不出急用粗蔴線將臍帶繫住又將臍帶雙折再繫一道以微物墜住再將臍帶剪斷過三五日自痿縮乾小而下累用有驗只要與產母說知放心不必驚恐不可聽穩婆妄用手取多有因此而傷生者愼之愼之

○乳少

乳少者血虛之故如產母去血過多又或胎前有病以及貧儉之家僕婢下人產後失於調養血脈枯槁或年至四十血氣漸衰皆能無乳但服通脈湯自有乳若亂用川山甲王不留行等物往往不效即或勉強打通乳汁清薄令兒不壽且損傷氣血

產後多病不久便乾反爲不美

○格言

大全方曰婦人懷孕有七八箇月生者有一年二年乃至四年而後生者不可不知

楊子建十產論可謂詳悉之極予之所論多本於此但惜稍亢匆猝視之安能得其要乎謹錄傷胎一篇亦足以盡之矣

今有未產一月以前忽然臍腹疼痛有如欲產仍卻無事是名試月非正產也但未有正產之候切不可令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋兒身未順收生之婦卻教產母虛亂用力兒身纔方轉動卻被產母用力一逼使兒錯路或橫或倒不能正生皆緣產母用力未當之所致凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗助長無益而有害矣此名傷產

薛院使云欲產之時覺腹內轉動即當正身仰睡待兒轉身向下時時作痛試捏產母手中指節或本節跳動方與臨盆即產矣

大旨云大凡生產自有時候未見時候切不可强服催生藥

又云切不可坐草及令穩婆亂動手
朱丹溪先生云催生只用佛手散最穩當又效捷
又云產後以大補氣血爲主雖有他症以末治之

○方藥

加味芎歸湯　百試百驗萬叫萬靈眞神方也
當歸一兩　川芎七錢　龜板手大一片　婦人頭髮如雞蛋大瓦上焙存性　水二碗煎一碗服如人行五里即生　死胎亦下

薛云交骨不開者陰氣虛也用此方如神
又云上舍某之妻產門不開兩日未生服此方一劑即時而產上舍傳此方用之無不效驗

佛手散　治六七箇月後因事跌磕傷胎或子死腹中疼痛不已口噤昏悶或心腹飽滿血上衝心者服之生胎即安死胎即下又治橫生倒產及產後腹疼發熱頭疼逐敗血生新血能除諸疾

當歸五錢　川芎三錢　水七分酒三分同煎七分
如橫生倒產子死腹中者加黑馬料豆一合炒焦乘熱淬入水中加童便一半煎服少刻再服

平胃散加朴硝方　治胎死腹中

蒼朮米泔炒　厚朴薑汁炒　陳皮各二錢　甘草炙五分　酒水各一鍾煎耗其半投朴硝末三錢再煎三五沸去渣溫服其胎即化爲穢水出矣若倉卒間取藥未便

只用朴硝三錢以温童便調下亦效凡猫犬胎死腹中不能下而叫號者亦以此灌之立效一方用水煎保產神效方 未產能安臨產能催偶傷胎氣腰疼腹痛甚至見紅不止勢欲小產危急之際一服即愈再服全安臨產時交骨不開橫生逆下或子死腹中命在垂危服之奇效

全當歸酒洗一錢五分 川芎一錢三分 厚朴薑汁炒七分 菟絲子酒泡一錢去心淨一錢 川貝煎好方和入五分 枳殼麩皮炒六分 羌活六分 荆芥穗入分 黄芪蜜炙入分 靳艾醋炒五分 甘草炙五分 白芍酒炒一錢二分冬用一錢

生薑二片水二鍾煎八分渣水一鍾煎六分產前空心預服二劑臨產隨時熱服此乃仙授奇方慎勿以庸醫加減其分兩

達生湯 懷孕九月後服服多尤妙

全當歸酒浸一錢五分 川芎六分 益母草不犯鐵器一錢 車前子炒研五分 冬葵子炒研一錢 白术米泔浸炒一錢 大腹皮滾水洗數次四分 滕酒浸一宿六分 枳殼麩皮炒五分 甘草炙三分 廣木香忌火研末俟諸藥煎熟時和入三分 生薑一片水二鍾煎八分食後温服

如腹痛加白芷 沈香各五分同煎服

生化湯 治產後兒枕痛及惡露不行腹疼等症

全當歸酒洗八錢 川芎三錢 薑炭五分令四分 甘草炙五分 桃仁十粒去皮尖研碎 孕將臨月照方預備二劑俟腹一痛即用水二鍾先煎一劑渣另貯再煎一劑其渣同

前渣併煎共汁三鍾和一處臍頓熱加黃酒六七匙於產後未進飲食之前即行服下逐瘀生新永免產症或三兩日內精神倦疲或腹中作痛再連服二三劑即愈更治產後一切危症無不立安此方與達生湯均係張孟深先生產婦救苦良方不論大小產皆可用奇效　產後諸症總以生化湯爲君餘則不過隨症加減而已若惡露已行腹痛已止減去桃仁再多服數劑不妨如口渴加麥冬五味寒痛加肉桂砂仁傷肉食加山查傷飯食加麥芽傷果品加麪裹煨熟草果數分食傷酸梅加吳茱萸三五分傷菱肉加生龜板傷梨及西瓜加肉桂之類

安胎方

黃芪蜜炙　杜仲薑汁炒　茯苓各一錢　黃芩一錢五分　白朮生用五分　阿膠珠一錢　甘草三分　續斷八分　胸中脹滿加紫蘇陳皮各八分　下紅加艾葉地榆各一錢　阿膠多用引用糯米百粒酒一杯水二杯煎服　腹痛用急火煎安胎銀苧酒　治孕娠胎動欲墮腹痛不可忍及胎漏下血

苧根二兩紋銀五兩黃酒一碗　如無苧之處用茅草根五兩加水煎之

紫酒　治孕娠腰痛酸軟

黑料豆炒焦二合 白酒一大碗煎至七分空心服
當歸補血湯 大補陰血併退血症發熱如神
黃芪蜜炙一兩 當歸三錢 水二碗煎一碗一服立愈分兩不可加減

華陀愈風散 治婦人產後中風口噤手足抽掣及角弓反張或產後血暈不省人事四肢强直或心頭倒築吐瀉欲死
荆芥穗除梗不用焙乾研末每服三錢童便調服口噤則挑牙灌之齒噤則不研末只將荆芥以童便煎放微温灌入鼻中其效如神

通脈湯 治乳少或無乳

黃芪生用一兩 當歸五錢 白芷五錢 七孔豬蹶一對煮湯吹去浮油煎藥一大碗服之覆面睡即有乳或未通再一服無不通矣 新產無乳者不用豬蹶只用水一半酒一半煎服體壯者加好紅花三五分以消惡露

又附方

女寶丹 調經種子如神又能安胎保孕
當歸六兩生地六兩酒洗白芍藥三兩酒炒川芎三兩酒炒天生白朮六兩土炒條芩四兩酒炒陳皮三兩炒香附四兩童便鹽水酒醋四製阿膠三兩酒溶砂仁三兩炒 已上如法製度爲末月將益母草二斤半煎膏和煉蜜及阿膠爲丸丸

如桐子大。每服五錢。空心白湯送下。月事後期來者去條芩。加薑炭一兩。艾二兩。肥者加製半夏三兩。白茯苓四兩。有白帶者再加白薇四兩。氣虛甚者加人參三兩。茯苓四兩。山藥四兩。如安胎用白蜜丸。不用益母膏。如腰痛加山藥杜仲各三兩。

所以載丸　治屢次小產。極爲神效。

黨參八兩酒洗　川杜仲四兩　桑寄生六兩　天生白术八兩炒　雲茯苓六兩

用南棗一斤。煮去皮核。濃汁和前藥末爲丸。早晚每服三四錢。開水送下。

達生編下終

產寶序

人之所以生氣血而已血之所以生氣而已氣火也血水也貯水於釜厝火而烹之其蒸蒸然浮動者水也其所以然者非水也氣也火之用也故治血必先理氣氣行血行氣滯血滯行則生滯則死見血之滯而攻之使下是猶見水之滯而激之使行也今之業產科者操此術以殺人蓋不知其幾矣嘉慶癸酉余室人衛氏產後患瘀滯醫曰是非逐以莪朮荆三棱不可一劑而神昏譫語則云藥輕不勝病益以大劑而氣上逆暴脫矣余是時初未知醫以爲證故不治但有悼痛厥後稍稍習岐黃家言得浦江倪氏所著

產寶讀之遇戚鄰中有患此者照是書於生化湯中加生芪一二兩恆獲十全他證按方取治靡不愈然後知前此爲醫所誤凡栽朮荆三棱之屬破血而因以蝕氣氣蝕則血無以生雖神奇亦化爲臭腐而生化湯於行血中理氣增以生芪氣壯而血以行以生故能奏效若此也余既悼逝者之不可復作閔醫之庸頃承乏平度聽斷之暇因取是書略加刪潤鏤板傳布俾業產科者有所據依毋徒以破血蝕氣之藥殺人也嗟乎是豈獨產後然哉四明高鼓峰論治血證以固元湯先回其氣湯中重用參芪而今世麤工惟知用寒涼直折重遏其心肺之陽馴致生生之氣

絕而不可復救豈不悲哉坿著弁言爲世之治血而不知理氣者告焉倪氏名枝維字佩玉號鳳賓雍正六年成是書向無刊本余友趙文學魏寄眭寫本弃之篋衍二十五年矣生平所見治產諸書未有出此上者洵可寶也道光壬寅春仲海昌許槤序於平度州署之行吾素齋

產寶目錄
產後總論
生化湯
胞衣不下
塊痛
血崩血暈
生化奪命湯
滋榮益氣湯
延胡索散
手足厥冷
生脈散
類傷寒

生化湯量加法
養正通幽湯

類中風
滋榮活絡湯

類癎
人參養胃湯
參朮膏

妄言妄見
生化安神湯
生化補元湯

氣短
生化益氣湯

發喘
咳嗽

自汗
調胃參芪湯

盜汗
牡蠣散

大便不通

小便不通
益氣生脈湯

嘔吐不納穀
安胃行血湯
加減六和湯
補中調胃湯

傷食

膨脹
養生化滯湯
泄瀉
訶皮生化湯
參苓生化湯
加味生化湯
痢疾
香連生化湯
煩悶
產後調護法

產寶

保赤彙編七

浦江倪枝維原本

海昌許　楗訂正

產後總論

凡病皆起於氣血之衰脾胃之弱而產後爲尤甚是以丹溪論產必當大補氣血爲先雖有他症以末治之此言已盡醫產大旨若能擴充立方則治產思過半矣夫產後症變百出不可以常病之藥一概論治如有氣勿專疎散有食勿專消導熱不可妄用芩連寒不可多用桂附至若虛中外感見三陽表症之多似可汗也在產後而用麻黃則重竭其陽見三陰裏

症之多似可下也在產後而用承氣則重亡其陰耳
聾脇痛乃腎虛惡露之停休用柴胡讝語汗出乃元
弱似邪之症毋同胃實厥由陽氣之衰難分寒熱非
大補不能回陽而起弱症由陰血之虧毋論剛柔非
滋榮不能舒筋而活絡又如乍寒乍熱發作有期症
類瘧也若以瘧治遷延難愈神不守舍言語無倫病
似邪也若同邪論危殆可虞去血多而大便燥結蓯
蓉加於生化非潤腸承氣之能通患汗多而小便短
澀生脈倍用參芪必生津助液之可利加參生化頻
服救產後之危六和調胃並行甦絕穀之厄頹產脫
肛多是氣虛下陷宜補中益氣之方拳攣口噤乃是
血燥類風當加參生化之劑產戶入風而痛甚宜服
羌活養榮湯玉門傷冷而不閉洗用茱萸硫合蛇兔（吳茱萸硫黃蛇牀子兔絲子各五錢煎湯熏洗）怔忡驚悸生化加以遠志似邪
恍惚安神佐以歸脾因氣而滿悶虛煩生化加木香
爲佐因食而噯酸惡食六君加神麯爲良蘇木稜蓬
最能破血用之必殆青皮枳實大能耗氣服之非宜
凡一應破血耗氣之品汗吐宣下之劑只可施於少
壯豈宜用於產危大抵生產之後先問惡露如何塊
痛未除不可遽加參朮腹中痛止補中益氣爲良至
若亡陽脫汗氣虛喘促頻灌生化加參是從權也亡
陰大熱血崩昏厥速煎生化原方乃救急也凡此治

法先爲提綱庶使開卷了然不至茫無頭緒則未必無小補云

生化湯

川芎一錢二分　當歸五錢　乾薑炙黑五分　甘草炙三分　桃仁去皮尖研十一粒

右藥用水一盞陳酒半盞煎作一盞稍熱服

生化者因藥性功用而立名也夫產後宿血當消新血當生若專消則新血不生專生則宿血反滯考諸藥性川芎當歸桃仁三品善治宿血專生新血佐以黑薑甘草引三品入於肝脾生血理氣莫善於此所謂行中有補化中有生實產後聖藥也凡懷孕至八九月預備二三劑至胞衣破時速煎一劑俟兒分身即速服之不問正產半產雖少壯產婦平安無恙者亦宜服二三劑則惡自消而新自生第須初產一二時辰之內未進飲食之先相繼煎服以惡露在下焦故服多而頻使惡易化而新易生庶免血暈之患若胎前素弱及產後勞倦又當多服二劑以防昏倦若照常每日一服豈能救將危絕之氣血乎至虛人見危症及熱疾墮胎或勞甚身熱頭痛服藥四五劑雖覺稍安塊痛未除仍當服之

胞衣不下

有由產母纔送兒出無力送衣者有歷時既久或乘

冷氣則血道凝澁而衣不下者有胎前素弱至血枯而衣停者凡此當急進生化湯一二劑兼服益母膏次服鹿角灰則血旺腹和而衣自下世每以濟坤丹又名回生丹專攻血塊落胞胎雖見速效而其元氣未免受傷愼之愼之（製益母膏法端午後小暑前取鮮益母草用銅鍋熬膏儲甕餅內勿令泄氣臨用以生化湯調服神效）

凡兒下而衣不下產婦不可睡倒必須先斷臍帶用草鞋墜之如寒月扶產婦至牀倚人坐蓋被以火籠置被中再以綿衣烘熱替換煖腹胞下後防虛必須連服生化湯二三劑不可厭藥之頻自有大效

塊痛

產後腹有血塊是胎前餘血之所積也夫婦人以經脈爲主二七而天癸至三旬一見以象月盈則虧行之有常名之曰經有孕則經不行其餘血注於胞中以護元一月曰始胚二月曰始膏三月成形而名胎方受母血之蔭胎形尚小食母血故有留餘併前兩月之血積於胞中久而成塊至產時隨兒當下亦有因產婦送兒勞倦調護欠溫以致塊痛不散者愼勿輕用攻血峻藥宜飲薑艾酒多服生化湯加以熱衣煖腹自然漸散俗師有用紅花生地以行之蘇木牛膝以攻之鮮有不至危亡者

小腹有塊作痛名曰兒枕世多專先消散然後議補

或消補兼施更爲夾雜殊不知舊血須當消化新血尤當滋生若專主攻舊新亦不能生矣

產後血氣暴虛理當大補當惡露未淨用補須知無滯血攻塊不致損元氣行中兼補方是萬全世以四物湯理產誤人多矣地黃性寒滯血芍藥酸寒伐肝治產者察之

產後七日內未曾服生化湯塊痛未除仍以生化湯治之

暑月產後內服生化湯以除塊痛外用熱衣煖腹方能消惡止痛若失於蓋煖亦難取效

產後一二日內塊痛未止忽脫暈汗多而厥口氣漸冷即於生化湯中加用人參黃芪以扶危急日夜頻服三四劑必效

產後七日內因食冷物血塊凝結痛甚宜於生化湯內加肉桂五七分

產後三四日內服生化湯三四劑塊痛未減得按探而稍安者虛也可加參二三錢

產後三日內血塊痛人參當緩如遇危症從權加參救急可也病勢一轉則當減參只服本方自能取效

血崩血暈

血崩宜審血色之紅紫形色之虛實如血紫有塊宜去其敗血若留之反作痛不可以崩論如鮮紅之血

大來乃是心因驚傷不能生血肝因怒傷不能藏血脾因勞傷不能統血當以崩治之宜於生化湯中加荆芥穗五分連服幾劑則行中有補而血安矣若形脫氣促或有汗暈厥牙關緊閉昏亂將絕先用韭菜數十莖細切放酒壺內以滾醋一碗泡入將大口塞住以小口對鼻孔熏之速煎生化奪命湯灌救如氣欲絕藥不能入即將鵝毛管插口內用酒杯盛三四分灌之如灌下腹漸溫煖連服數劑可活再用綿衣烘熱替換揉腹方無他患如產後半月崩來又宜滋榮益氣湯以升舉之世醫治崩每以椶灰止之此治末之法即有偶效禍不旋踵慎之

生化奪命湯

川芎二錢　當歸四錢　乾薑炙黑五分　甘草炙三分

桃仁去皮尖研十一粒　肉桂三分服二劑去此味

右藥加黑棗一枚用水一盞半煎七分稍熱服

汗多加人參二錢生黃芪二錢兩手脈伏或右手脈絕加麥冬一錢五味子十粒如灌藥得甦其塊痛未除當減去參芪只服生化湯除塊定痛若塊痛已除仍加參芪口渴加麥冬腹瀉加茯苓有痰加竹瀝一匙薑汁半匙若胃中久不納食聞藥氣即嘔先用人參一二錢煎湯調飯鍋焦末服之以通胃氣此等危症一日內須服二三劑方保無虞

滋榮益氣湯

川芎一錢　當歸二錢　人參二錢　黃芪生用二錢
生地二錢　於朮二錢　麥冬一錢　陳皮五分
升麻四分　防風三分　白芷四分　甘草炙四分
荆芥穗四分

右藥加黑棗一枚用水一盞半煎七分稍熱服汗多加麻黃根五分浮小麥一撮大便不通加肉蓯蓉二錢氣不舒展加木香一錢有痰加竹瀝一匙薑汁半匙咳嗽加苦杏仁二錢驚悸加炒酸棗仁一錢柏子仁一錢傷食加神麯一錢炒麥芽一錢傷肉食加炒山查一錢砂仁八分

眼黑頭眩昏迷不省人事即是血暈其因有三一因勞倦甚而氣竭神昏二因血大脫而氣欲絕三因痰火乘虛泛上而神不清患此三者急服生化湯以行塊定痛化瞀生新斯血遂生而氣轉清頻服數劑治其昏亂氣血即定矣外用韭醋熏鼻之法治之切勿認爲惡血上沖昏迷心竅以致輕用散血之劑亦勿認爲痰火而用消耗之品庶無貽患

血暈形色俱脫服生化奪命湯倍加人參萬勿疑爲太補以致遷延不救如痰火乘虛泛上而暈於生化湯中加橘紅四分甚虛亦加人參二錢肥人多痰加竹瀝一匙薑汁半匙

暈症切勿用蘇木破血等藥若血塊痛甚以生化湯調益母膏或送鹿角灰或送延胡索散俱效

延胡索散

延胡索一錢 肉桂六分

右藥用生化湯調服

兒已產下燒鐵稱錘令紅投醋盆中使產婦聞醋氣可免血暈之患

手足厥冷

產時用力過多勞倦傷脾孤臟不能自主故手足逆冷而厥氣上行經云陽氣衰於下則爲寒厥是也非大補不能回陽豈是芎歸數錢照常一日一服而能扶將絕之氣血耶必於生化湯中倍加人參一晝夜服二三劑使藥氣接續不斷則氣血旺而精神復厥症自止矣若服藥而口渴另用生脈散以代茶助津以救臟燥也或四肢逆冷瀉痢有類傷寒陰症仍服生化湯倍加人參酌加附子四五分生黃芪二錢則可回陽止逆經云厥氣上行滿脈去形謂逆氣上行滿於經絡則神氣漸散矣大抵手足厥冷由於氣血竝竭神將離而機欲息僅此呼吸一綫之留設非大劑參芪斷難倚仗此數十年經驗之論非敢憑虛臆造以誤人也

生脈散

人參一錢　麥冬一錢　五味子十粒
右藥用水七分盞煎四分熱服

類傷寒

產後發熱惡寒頭痛勿認爲太陽症寒熱往來胸滿脇痛勿認爲少陽症凡此皆因氣血兩虛陰陽不和有類外感而實非外感也即或偶冒風寒亦當以末治之夫以脫血之後而有發熱惡寒頭疼脇痛等症設投以散劑重發其汗則病未消而元氣已消其害可勝言哉仲景云亡血家愼勿發汗丹溪云產後萬不可表斯言盡之矣況生化湯有芎藭二味亦寓發散之義就本方照後量加之法速服數劑諸症自除

生化湯量加法

感冒風寒加防風四分不應加連鬚葱頭兩箇嘔吐加藿香三分生薑二錢汗多氣短加人參二錢汗出微喘亦加人參二錢煩渴加麥冬一錢五味子十粒有痰加橘紅四分傷食加神麯一錢傷肉食加山查一錢砂仁末六分

潮熱自汗譫語便閉勿認爲陽明症口燥舌乾咽痛勿認爲少陰症夫產後潮熱自汗譫語悉屬陽虛與陽明症之熱邪入腑迥異口燥舌乾咽痛多由血竭與少陰症之熱邪爍腎懸殊至於便閉並非熱邪結聚胃中致有燥屎豈可妄議攻下蓋產後勞倦傷脾

運化爲難兼之精液內竭十九患此並宜服養正通幽湯以潤之保無他患

養正通幽湯

川芎二錢　當歸六錢　甘草炙五分　人參一錢
黃芪生二錢　陳皮一錢去皮尖研　桃仁十一粒　黑芝麻炒研二錢
肉蓯蓉酒洗一錢

右藥用水二盞煎七分稍熱服

汗多加麻黃根五分口燥加麥冬一錢腹滿咽乾便結加枳殼六分汗多譫語便實加茯神二錢炒酸棗仁一錢柏子仁一錢生白朮二錢

類中風

氣血暴竭肢體無以濡養忽然牙關緊閉筋脈拘攣兩手搐搦有類中風或虛火上泛有痰切勿誤用治風消痰之劑以重其虛當以滋榮活絡湯治之

滋榮活絡湯

川芎二錢　當歸三錢　甘草炙五分　人參一錢
黃芪生二錢　麥冬一錢　茯苓二錢　天麻一錢
荆芥四錢　防風五分　橘紅五分

右藥用水二盞煎七分稍熱服

汗多加麻黃根五分驚悸加炒酸棗仁二錢大便不通加肉蓯蓉二錢有痰加薑製半夏一錢竹瀝一匙薑汁半匙傷食加神麴一錢

類瘧

產後半月內外寒熱往來其發有期有類瘧症此由氣血兩竭陽虛寒作而陰虛發熱也惟調其氣補其血則寒熱自除愼勿用柴胡以發表芩連梔柏以退熱多致危殆不救當以人參養胃湯參朮膏日夜間服

人參養胃湯

人參一錢　黃芪生二錢　白朮生二錢　當歸二錢
半夏薑製一錢　茯苓一錢五分　藿香五分
烏梅一枚

右藥用水一盞半煎七分熱服

參朮膏

人參五錢　白朮生八兩

右藥用沙鍋盛水煎三次取汁熬膏每日早晚以一小鍾開水調服

妄言妄見

心藏神肝藏魂心有血而神存肝得血而能視產後氣血暴虛神魂無所依倚以致言語無倫而目多妄見萬萬弗認爲鬼邪信用符水往往不救如塊痛未除先服安神湯塊痛已除急須服補元湯以培養氣血自獲全效此一定法也

生化安神湯

川芎二錢　當歸四錢　乾薑炙黑五分　甘草炙三分
茯神二錢　棗仁炒一錢　桃仁去皮尖研十一粒
右藥加黑棗二枚用水二盞煎七分熱服

生化補元湯

川芎一錢　當歸三錢　乾薑炙黑四分　甘草炙四分
人參二錢　黃芪生二錢　於朮生二錢　茯神二錢
棗仁炒一錢　橘紅三分　桃仁去皮尖研七粒
右藥加蓮子十粒黑棗二枚用水二盞煎七分食遠熱服
汗多加麻黃根五分有痰加竹瀝一匙薑汁半匙
大便不通加肉蓯蓉二錢

氣短

似喘非喘氣不相續有兼痰兼熱之分亦或頭痛發熱惡寒有似外感切勿作外感治以生化益氣湯主之

生化益氣湯

川芎一錢　當歸二錢　乾薑炙黑三分　人參二錢
黃芪生二錢　棗仁炒二錢　甘草炙四分　麻黃根五分
桃仁去皮尖研九粒　浮小麥二錢
右藥用水一盞半煎七分熱服
有痰加竹瀝一匙薑汁半匙咳嗽加苦杏仁十一粒薑製半夏八分口渴加麥冬一錢五味子七粒

發喘

發喘乃產後第一危症。蓋肺受脾稟。此時血亡氣脫。肺不能運氣生脈以順呼吸。而喘作矣。若不速治多致不救。如氣血猶未大竭。塊痛未除。補劑稍緩先服生化湯一二劑。以行塊定痛。然後加參若血崩喘甚形色大脫。則危極矣。難論塊痛。宜從權於生化湯內加人參四錢。以救危急。須於一二時辰之內連進二劑。俟其稍定。即服生化益氣湯。除去黑薑麻黃根二味。間有得生者。

生化益氣湯 方見前

咳嗽

產後七日內。偶感風寒。鼻塞咳嗽聲重者。於生化湯中加杏仁。蘇子。陳皮。以順氣化痰。切勿發表。兼忌涼藥。

自汗

經云。搖體勞苦。汗出於脾。驚而奪精。汗出於心。有所恐懼。汗出於肝。產後因勞傷脾。因驚傷心。因恐傷肝。每多心慌自汗之症。惟塊痛未除。參朮未可遽用。於生化湯中加炒棗仁二錢。設心慌無主。濈濈汗出。形色又脫。此是汗多亡陽。又當從權於生化湯中。倍用人參。以救危急。服後汗仍不止。以調胃參芪湯治之。冀可活十之四五。

調胃參芪湯

人參三錢　黃芪生二錢　當歸二錢　桂枝四分
防風三分　麻黃根五分

右藥加黑棗一枚用水一盞半煎七分食遠熱服口渴加麥冬一錢五分五味子九粒有痰加橘紅四分虛脫手足冷加熟附子五分黑薑四分牡蠣一錢

盜汗

睡中汗出覺則止此爲盜汗屬陰虛然不可偏用陰藥宜兼服參芪俾氣旺則能生陰效如影響生化湯調牡蠣散服

牡蠣散

牡蠣煅二錢　人參二錢　黃芪生二錢　當歸三錢
熟地三錢　麻黃根一錢　小麥麩皮炒黃二錢

右藥研末和勻每服三錢

大便不通

產後血少腸燥傳化爲難大便恒多祕結經云藏得血而能液當補血爲主加以益氣之品服養正通幽湯數劑而安設妄用下利峻藥愈通愈祕卒至不救愼之

養正通幽湯方見類傷寒

小便不通

產後脾胃氣虛不能通調水道下輸膀胱往往小便短澀切忌分利當補以提之益氣生脈湯極驗

益氣生脈湯

人參二錢　黃芪生二錢　五味子九粒　麥冬二錢
當歸三錢　茯苓一錢　升麻四分　葛根一錢
甘草炙四分

右藥用水一盞半煎七分熱服

嘔吐不納穀

嘔者聲與物俱出吐者有物無聲此由脾胃虛弱或寒氣所客或飲食所傷以致氣逆而食不得下在七日內塊痛未除宜服安胃行血湯塊痛已除而嘔不止穀氣不納服加減六和湯服前二方胃和嘔止服補中調胃湯惟嘔吐而見呃逆者是謂土敗木賊大率難治

安胃行血湯

川芎二錢　當歸四錢　乾薑炙黑五分　人參一錢
砂仁四分　藿香四分　桃仁去皮尖研十四粒　甘草炙三分

加減六和湯

川芎一錢五分　當歸三錢　乾薑炙黑四分　人參一錢
茯苓二錢　陳皮五分　扁豆炒二錢　山藥炒三錢
藿香三分　白豆蔻四分嘔止減去

補中調胃湯

人參二錢 於朮生二錢 當歸二錢 乾薑炙黑四分
陳皮八分 茯苓一錢 扁豆炒二錢 山藥炒二錢
甘草炙四分

傷食

傷食必於補氣血藥中審所傷何物以消導藥佐之如傷穀食宜神麯穀芽傷肉食宜麥芽山查傷果食腹內痛甚宜吳茱萸砂仁世醫每遇此症專消無補反傷胃氣不應又誤認爲原傷食物未消倍加寬胸耗氣之品甚至絕穀數日以垂危者此際已無藥可用惟煎獨參湯二三錢調飯鍋焦末漸漸與之或可十救四五

膨脹

產婦素弱臨產又勞中氣不足胸膈窒滯胃雖納穀傳化艱難醫者誤認傷食而擅用消導之劑或因氣鬱而專事疎散或因大便祕結而妄議攻下此膨脹所由來也治法當大補氣血爲主所謂塞因塞用其效甚捷先服獨參湯調飯鍋焦末以通胃氣次服養生化滯湯則脾運而脹消矣

養生化滯湯

川芎二錢 當歸三錢 人參一錢 於朮生二錢
陳皮八分 香附製五分 茯苓二錢 甘草炙三分
大腹皮四錢 桃仁去皮尖研十一粒

右藥用水一盞半加黃酒一小鍾煎七分熱服大便祕結加肉蓯蓉二錢誤服大黃加生黃芪四錢倍用人參服甚人參可加至四五錢丹溪先生治產後膨脹參芪服至半斤已上大便方通腫脹方退

泄瀉

產後泄瀉悉屬脾虛亦有因寒因食之殊惟熱瀉甚少治法與雜症諸瀉不同誠以惡露未消難以遽補元氣暴瀉難以議消太溫恐新血流崩驟寒慮血凝變症大抵產後患此先宜服生化湯加茯苓一錢五分俟二三劑後塊痛已除方能補脾消食溫中隨症施治產畢即瀉服訶皮生化湯胎前久瀉至產後不止服參苓生化湯從權以濟其危塊痛已除服加味生化湯因寒因食分別調治惟審係實在熱瀉去黑薑肉果二味切勿加以涼藥免致血寒貽患不可不慎

訶皮生化湯

川芎二錢　當歸三錢　訶子皮八分乾薑炙黑五分
茯苓一錢五分　肉果霜五分　蓮子十粒去皮尖研
甘草炙五分　桃仁十四粒

兩服後不止加人參一錢五分口渴加麥冬一錢五味子九粒入參一錢

參苓生化湯

川芎二錢 當歸三錢 訶子皮八分 人參一錢 乾薑炙黑五分 肉果霜五分 茯苓一錢五分 山藥炒二錢 甘草炙五分 蓮子九粒 糯米炒黃三錢

塊痛未除。去肉果。塊痛已除。加生於朮二錢。陳皮三分。

加味生化湯

川芎一錢五分 當歸炒二錢 乾薑炙黑四分 人參二錢 於朮生二錢 茯苓一錢五分 陳皮五分 澤瀉八分 肉果霜五分 甘草炙五分 蓮子九粒

因寒作瀉。倍用黑薑。腹痛泄水。飲食不化。加砂仁八分。炒山查二錢。炒麥芽二錢。久瀉不止。加升麻一錢。

痢疾

七日內外。患赤白痢。後重便膿。最爲難治。夫痢以通利爲主。然產後而欲推蕩穢惡。慮元氣之虛弱。欲滋補氣血。恐積滯之留連。余於此症。斟酌數四。只有服生化湯去黑薑加木香四分方能並行不悖。服二三劑不應。接服香連生化湯應手可愈。惟產婦體氣素厚。已及一月。可用推蕩之法。若體氣素弱。雖產月餘。難議攻下。如檳榔枳實厚樸大黃之屬。用之產後。鮮有不成敗症者。可不謹歟。

香連生化湯

川芎一錢五分　當歸三錢　赤芍酒炒一錢　茯苓一錢
木香三分　黃連薑汁炒　廿草炙四分　枳殼五分
陳皮三分

右藥用水一盞煎五分空心服

煩悶

煩爲虛煩悶爲滿悶虛煩者血液耗散心神不守宜猛進獨參湯滿悶者胸膈鬱滯惡露攻心宜生化湯用水磨木香二分沖服虛甚加參此二症設誤用枳殼香附烏藥峻烈之品則元氣蝕損而病轉加劇

產後調護法

產畢須閉目稍坐然後上牀以被褥靠之暑月以席捲數枕靠之若自己把持不住令老練女人靠之不可即時睡倒常以手從心至臍隨意按摩俾惡露下行房中安放醋盆以燒紅烈炭煤之以防血暈

腹上用小衣烘熱替換溫之雖暑月不可僅蓋單被毋令腹寒而血塊作痛

冬末春初天氣嚴寒宜閉密產室緊塞隙孔四圍置火常令暖氣和融以免他患但不宜熏香走泄眞氣

纔產不宜食物即服生化湯二三劑飢甚先服白米湯一盞次食白粥十日內食物宜淡切忌飲冷半月後方可食雞子亦須打開煮之以防脾虛難化滿月

食豬羊肉。亦須撙節。酒雖活血。然氣性慓悍。亦不宜多。

七日內。不宜梳洗。尤忌濯足。惟恐招風受溼。疾病蠭起。晝夜令人陪侍。毋致虛驚。變症百出。

言語宜愼。勿以多言耗散元氣。勿以愛憎輒生惱悶。以中氣餒弱二者均能致病。

保產無憂散

川厚樸七分薑汁炒　全當歸一錢五分酒炒　川羌活五分

菟絲子一錢揀淨酒泡　荊芥穗三分炒　白芍一錢二分

生黃芪八分　川貝母一錢研末冲服　川芎一錢五分

麩炒枳殼六分　生甘草五分

右藥加生薑三片。用水二盞。煎七分服。

此方覺有孕娠。於四箇月以前。每月服一劑。五六箇月內。每月服二劑。七箇月以後。每月服三劑。胎動不安。臨產腹痛。即再煎服。既可安胎。又能催生。

催生佛手散

全當歸一兩龜板手大一片醋炙研川芎七錢
血餘蛋大一團焙存性
右藥加黃酒一鍾。用水二盞。濃煎。童便沖服。

難產屢試神驗良方

熟地黃一兩 黃耆蜜炙一兩 當歸身四錢 白茯神三錢
西黨參四錢 淨龜板醋炙四錢 川芎藭一錢
白芍藥酒炒一錢 枸杞子四錢

產久不下連服此方四五帖但用頭汁不用次汁必須多服少則未效

產本無難瓜熟蒂落自能順下達生編言之詳矣然產以氣血爲主氣足則易於送胎出門血足則易於滑胎落地若忍痛久則傷氣而氣不足下水多則傷血而血不足氣血不足產何能下譬如舟行淺水而水手方筋疲力盡則舟何以濟松製此

方大補氣血於臨產危急時無論產婦平素氣質強弱胞衣已破未破急以此方連進四五頭劑（不必服二汁以力薄也）則痛可立減而胎自順下或竟熟睡片時產下如不覺者或因試痛誤認產痛（試痛本屬氣血兩虛服藥後竟不痛不產帖然無恙者蓋以此藥助其氣血氣血驟得接濟如操舟淺水有生力水手推挽又得上流之水一湧而下則舟行如駛矣若誤認試痛爲產痛以致手探氣屏無故損傷尤宜補益氣血以還其本元自安於無事矣或疑產婦先感外邪補之則恐邪固不知痛甚且久則腠理齊開邪從表解矣產水迸下邪從下解矣到此時候有虛無實一定之理切勿遲疑也或又謂虛則用參臨產要談補藥恐重濁有礙且不足濟事也不知人參固佳姑弗論貧家無力即有力用參而參之質輕清譬如和風甘雨至旱槁之苗就枯之質必須大雨時行方能深透若涵濡沾潤非惟勢不及待亦恐力將不繼也況虛危須補如飢寒求濟臨產之急是飢寒垂斃於頃刻者予之以財何如給之以衣食之速即活命耶古人立方同一補法用參者什之一不用參者什之九倘用此方而有力加參則更妙然近時之參未盡佳而此方之妙亦斷不讓於用參耳（松試驗已久萬無一失蒙

高明大人先生推誠採用竝獲奇效俯賜嘉獎用敢刊刷分送以冀廣濟竝非偏見炫奇妄誤人命竝懇輾轉傳佈則一得之愚施之無既幸甚幸甚

產不能下每有用催生丹及一切下胎諸藥又有外用藏香并一切香竄之物熏觸催生者此眞生擒活剝與蠢惡穩婆妄用刀割鉤摘無異其當時之禍與日後之患有不可勝言者竝宜切戒切忌并告

附千金要方

凡人生多疾病者。是風日之子。生而早死者。是晦日之子。在胎而傷者。是朔日之子。生而母子俱死者。是雷霆霹靂之子。能行步有知而死。是下旬之子。兵血死者。是月水盡之子。又是月蝕日之子。能胎不成者。是弦望之子。命不長者。是大醉之子。不癡必狂者。是大勞之子。生而不成者。是平曉之子。意多恐悸者。是日出辰之子。好爲盜賊貪欲者。是禺中巳之子。性行不良者。是日中午之子。命不能全者。是日映未之子。好詐及妄者。是晡時申之子。不音耳聾者。是人定之子。天地閉氣不通其子死。

夜半合陰陽生子上壽賢明夜半後合會生子中壽聰明智慧雞鳴合會生子下陰尅父母此天地之常理也

附種子說

生子者生道也生道謂何曰仁仁者天地之心而人之所以生也天生人人復生生於不已由斯道也故人或艱於嗣遠即於斯道求之古來求子者貴者用其貴富者用其富有言者用其言處處寬人容人愛人救人無不以好生爲心非敢謂遽有子也然而得生之道矣即以報言天地者人之大父母也人民者天地之子孫也救人生命是爲天地救子孫爲天地救子孫而天地不以子孫報之無是理也故積仁未有無子孫者也今有殘忍爲心陰賊爲計好殺爲快淫於色刻於財狷而隘清而刻好潔而絕物此等

人往往無子。少生生之意也。春夏之氣多長養。故萬物生焉。秋冬之氣多肅殺。故萬物凋焉。凡近於肅殺之氣者。皆無子之兆也。是以求子之方有二焉。凡近於殘忍諸病。卽改易性情。洗滌肺腸。袁了凡之求子者得焉。凡近於斂財緊刻。卽分散家資。濟人利物。吳頤山之求子者得焉。二方異名。三字貫之。曰仁而已矣。生意而已矣。心未誠仁未深而遽期有報。無是事也。處處存實心。在在含生意。未有無子者也。（見疚心氏科名必覽）

孫潔齋曰。種子之方。前已詳其二矣。尙有其二。則寡慾與不淫是也。昔人有艱於子息。醫者教以節慾靜攝。勿勞心神。心靜則精不搖。神完則氣不走。每妻經淨。乃一交媾。否則各榻。如是半年。妻果有娠。娠後卽異榻。足月之後。果生男子。後來天花只三五粒。彼求子而不知節慾。甚至廣畜婢妾。先已自搖其精。自耗其氣矣。烏得有娠理可信也。昔賈仁五十無子。夢至一府第。曰生育祠。仁因叩求子嗣主者。曰汝曾奸良人妻。欲求子嗣何可得也。仁哀懇曰。愚民無知。乞容贖罪。神曰。汝既知改。更勸十人不淫。方可贖罪。再能勸化多人。則有子矣。仁醒痛自改悔。廣勸世人。多感而化者。後舉二子。

一呆氏曰。人謂子爲種。其義可思也。譬若力田。須有

穀種昔人擬仁爲穀種而以心爲良田蓋仁者人之所以爲心與其所以生也以仁存心譬下美種自穫嘉穀存仁而雜以害仁者猶種穀於長林豐草間其夭折而鮮穫固也殘忍刻薄絕無仁心此其死心併若石田矣故仁爲人種

畜德錄曰世人無不欲急於生子亦知生子之道眞精交媾氣清精濃鎔液成胎故少慾之人恒多子且易育氣固而精凝也多慾之人恒少子且易夭氣泄而精薄也譬之釀酒斗米下斗水則酒釅且耐久其質全也斗米倍下水則淡三倍四倍則酒非酒水非水矣其眞元少也今人夜夜交淫遍御妾婢精氣妄泄邪火上升邪火愈熾眞陽愈枯安能成胎即僥倖生子亦不能育或傷於痘或傷於驚痘者熱毒驚者熱風毒者父母之眞精不足風者父母之眞氣不固也過此二關稍通人道便有火症虛損怔忡五勞七傷等症皆由邪火熾而眞陽虛已慾逞而元精竭也

附保身延壽戒期

娶婦必期偕老。生子必望長成。乃有人伉儷極篤。而中道死亡。產育艱難。而半途夭折者。祇因肆情縱欲。暗犯禁忌而不自知也。道經云。男女交媾最有避忌。若犯所忌。天奪其算。神降之殃。生子醜貌怪相。性行不良。殘疾夭札。實有明驗。故君子不獨外色鋤之務盡。卽房幃之內。琴瑟之歡。俱有克治之道焉。茲將正色戒期錄出。惜命者遵之。

正月初一 天臘五帝校生人祿命犯者削祿奪紀凡五臘日同 初三 萬神都會犯者奪紀後諸神聖誕日期同 初九 天帝上元天官下降犯者廿一 十五 奪紀凡三元日同 廿七 北斗下降犯者奪紀每月如此 廿八 人神在陰犯者惡疾每月如此 三十 竈君奏事

犯者滅壽一年月小戒廿九每月如此

二月初一犯者奪紀初三文帝誕十五犯者奪紀十八每月如此初三文帝誕十五犯者奪紀十八每月如此十八至聖先師孔子誕觀音廿七廿八三十俱同諱辰犯者削祿十九觀音誕廿七廿八三十俱同前

三月初一同前初三牛鬼神出世初九犯者產惡胎十五廿七同前廿八東嶽帝誕三十同前

四月初一初三同前初四萬神善化佛誕又善惡犯者失音初八童子降犯者血死十四呂祖誕十五廿七廿八三十同前

五月初一初三同前初五地臘初六初七十五十六十七廿五廿六廿七以上九日名九毒日犯者得病損壽若十五日子時犯者主三年內夫婦雙亡十六爲天地造化萬物之辰犯者大凶十三關聖帝君降神廿八三十同前

六月初一初三十五同前十九觀音得道廿三關聖帝君誕廿四雷祖誕廿七廿八三十同前

七月初一初三同前初七道德誕初十陰毒日十五中元地臘官校籍廿七廿八三十同前

八月初一初三同前十五太陰朝元廿七至聖先師孔子誕廿八三十同前

九月初一初三同前初九斗母誕十五廿七廿八三十同前

十月初一民歲臘初三同前初五諸神下會考察初犯者遭凶初六天曹西天王降十五下元水官校籍廿七廿八三十同前

十一月初一初三同前十一太乙天尊誕十五同前十七佛誕廿七廿八三十同前

十二月初一初三同前初八臘王侯十五同前廿四司命上奏善惡
廿五上帝下界考察諸神考察犯者得病損壽廿七廿八同前除夕諸神考察犯者奪紀
每歲四立二分二至四離四絕社日三伏日庚申甲子日祭祀前齋戒日祖父母父母誕日忌日夫婦誕
日本命日疾風暴雨雷電晦暝日月薄蝕犯者受禍得病減壽
酷暑嚴寒犯之得重疾過醉醉後入房五臟反覆空腹犯之傷元神遠行
行房百里者病大怒傷肝犯之百日百里行房者死鬱怒犯之必病胎前傷胎產後內犯之婦病
天癸來時犯之男女俱損病後犯之一夕變症勿兩度勿蓄縮不泄窗隙有風宜避停鐙行房宜戒

謹按禮記月令日夜分雷乃發聲先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災可知禁忌自古有之日長至則日止聲色毋或進日短至則日去聲色禁嗜慾蓋冬夏二至陰陽相爭之時最難保護前後數日皆宜絕慾至於高山大川之上日月星辰之下神廟寺觀之內井竈尸柩之旁凡一切非其地非其時皆宜嚴戒○此本剛繁就簡止擇最重者錄之蓋禁忌太繁奉行恐怠也奉勸惜命者另以小紙將日期錄出貼於壁上每逢禁忌必謹遵之

C101/1815
v.3

凡例

一此編專以溫補見長凡小兒既成慢驚必於後開條目內有數處相合者即放心照方服藥勿謂此書與古方清熱散風之藥不同仍泥用古方以自誤也

一近代所賣之抱龍牛黃等丸皆清熱化痰之藥急驚最爲對症若慢驚之甚者下喉即死

一急驚與慢驚全屬相反急驚之症小兒氣體壯實前數日發燒致口鼻中氣熱大便結小便臊忽而驚風大作喉中多有熱痰用抱龍牛黃等丸下咽

即醒再用清熱消導之藥一劑而安本欲附方於此恐治慢驚者先用治急驚之方則爲害匪小是以姑述其由而方不敘入慢驚總是病後氣血不足虛極生風非脾腎雙補薑桂同進如何能愈

一薑桂附子乃編內藥方中之用神減去則無效肉桂好者難得薄桂淘桂但有油者皆可用之所以本草備要云肉桂有油俱佳

一慢驚之輕者理中地黃湯內多用薑桂亦可治愈若虛寒至極非用附子不可但附子性熱人多畏之本草附子下亦注明治慢驚字樣可見溫補二字委係治慢驚祕訣

一此編新立二方以治慢驚明言慢驚屬虛寒溫補即所以治慢驚急驚屬實熱清熱即所以治急驚二症有寒熱之殊用藥有雲泥之異古人每有一方治二病未究其致病之根源

一近代醫家皆云慢驚一症先須驅風化痰鎮驚往往用金銀器物煮水仍煎發散消導之藥愈治愈危未聞治愈一人良可歎也

一海內醫書未可枚舉諸子雖各執一見議論紛陳然失之於此者仍得之於彼惟慢驚一症自古及今相承錯謬殊堪扼腕是以此編專辨慢驚一症與各書不同節次試驗有效

一此編乃獨得之奇實發古人不傳之祕凡小兒久病不愈諸病之後均能轉爲慢驚眞得之最易而醫之最難世之人但知清熱散風不知溫補氣血間有一二高明者見及慢驚是虛寒症欲開溫補藥方又因不合古書恐招訕謗是以慢驚竟爲幼科第一危險之症

武進莊一夔在田

治慢驚風心得神方

慢驚之症緣小兒吐瀉得之爲最多或瘧久痢久或痘後疹後或因風寒飲食積滯過用攻伐傷脾或秉賦本虛或誤服涼藥或因急驚而用藥攻降太甚或失於調理皆可致此症也其症神昏氣喘或大熱不退眼開驚搐或乍寒乍熱或三陽晦暗或面色淡白青黃或大小便清白或口唇雖開裂出血而口中氣冷或瀉利冷汗或完穀不化或四肢冰冷並至腹中氣響喉內痰鳴角弓反張目光昏暗此虛症也亦危

症也俗名謂之天弔風虛風慢驚風慢脾風皆此症也若再用寒涼再行消導或用膽星抱龍以除痰或用天麻全蝎以驅風或用知柏芩連以清火或用巴豆大黃以去積殺人如反掌實可畏也若治風而風無可治治驚而驚亦無可治此實因脾腎虛寒孤陽外越元氣無根陰寒至極風之所由動也治宜先用辛熱再加溫補益補土所以敵木治本卽所以治標凡小兒一經吐瀉交作卽是最危之症若其屢作不止無論症後疹後病後不拘何因皆當卽用參朮以救胃氣薑桂參地等藥以救腎氣不惟傷食當急救之卽傷寒傷暑亦當急救之益其先雖有寒暑實邪

一經吐瀉業已全除脾胃空虛倉廩空乏若不急救恐虛痰上湧命在頃刻矣庸醫見之皆誤指爲熱爲食投以清火去積涼藥立時告變爲之奈何與之失之寒涼斷難生活不若失之溫補猶可救療此語發明吐瀉驚風之理最爲明透後之君子願無忽諸今將慢驚辨症臚列於後

一慢驚吐瀉脾胃虛寒也

一慢驚身冷陽氣抑遏不出也服涼藥之後往往致此

一慢驚鼻孔煽動眞陰失守虛火燥肺也

一慢驚面色靑黃及白氣血兩虛也

一慢驚口鼻中氣冷中寒也

一慢驚大小便皆清白腎與大腸全無火也
一慢驚昏睡露睛神氣不足也
一慢驚手足抽掣血不行於四肢也
一慢驚角弓反張血虛筋急也
一慢驚乍熱乍涼陰血虛少陰陽錯亂也
一慢驚汗出如洗陽虛而表不固也
一慢驚手足瘈瘲血不足以養筋也
一慢驚顖門下陷虛至極也
一慢驚身雖發熱口唇焦裂出血卻不喜飲冷茶水進以寒涼愈增危篤以及所吐之乳所瀉之物皆不甚消化脾胃無火可知唇之焦黑乃眞陰之不足也明矣

大凡因發熱不退及吐瀉而成者總屬陰虛陽越必成慢驚并非感冒風寒發熱可比故不宜發散急宜培元救本加薑桂以引火歸源必先用辛熱沖開寒痰再進溫補方爲得法經驗二方列後

逐寒蕩驚湯　此方藥性溫煖專治小兒氣體本虛或久病不愈或痘後疹後或誤服寒涼泄瀉嘔吐轉爲慢驚清熱散風愈治愈危速宜服此能開寒痰寬胸膈止嘔吐蕩驚邪所謂回元氣於無何有之鄉一二劑後嘔吐漸止即其驗也認明但係虛寒即宜服之不必疑畏也

胡椒一錢　炮薑一錢　肉桂一錢　丁香十粒
右四味研爲細末以竈心土三兩煮水澄極清煎藥大半茶杯頻灌之接服後方定獲奇效
加味理中地黃湯　此方助氣補血卻病回陽專治小兒精神已虧氣血大壞形狀狼狽瘦弱至極皆可挽回之如法濃煎頻頻與服參天救本之功有難以盡述者（後附醫按內云無肉桂用桂枝四錢則桂枝亦可代肉桂也）
熟地五錢　當歸二錢　萸肉一錢　枸杞二錢
白朮三錢　炮薑一錢　黨參二錢　炙草一錢
棗仁二錢炒研　肉桂一錢　故紙二錢　炙芪二錢
加生薑三片紅棗三枚胡桃二箇打碎爲引仍用竈心土二兩煮水煎藥取濃汁一茶杯加附子五分煮水攪入諒兒大小分數次灌之如咳嗽不止者加蓯殼一錢金櫻子一錢如大熱不退加白芍一錢泄瀉不止加丁香六分只服一劑即去附子止用丁香七粒隔二三日只用附子二三分蓋因附子太熱中病即宜去之也如用附子太多則小便閉塞不出如不用附子則沈寒臟腑固結不開如不用丁香則泄瀉不止若小兒虛寒至極附子又不妨用至一二錢此所謂神而明之存乎其人用者審之此方乃救陰固本之要藥治小兒慢驚稱爲神劑若小兒吐

瀉不至已甚或微見驚搐胃中尚可受藥喫乳便利者竝不必服逐寒蕩驚湯只服此藥一劑而風定神清矣如小兒尚未成驚不過昏睡發熱不退或時熱時止或日間安靜夜間發熱以及午後發熱等症總屬陰虛均宜服之若新病壯實之小兒眼紅口渴者乃實火之症方可暫行清解但果係實火必大便閉結氣壯聲洪且喜多飲冷茶水若吐瀉交作則非實火可知矣此方補造化陰陽所不足實回生起死有神功倘大虛之後服一劑無效必須大劑多服爲妙

保嬰易知錄序

余續宜麟策成復采羣書而愼取之集鞠養之說一十有五爲上卷初生之疾六十有七爲下卷題曰保嬰易知錄或曰誠求保赤不學易能以鞠養之宜詔之閨閫是固無難領會也古稱兒醫曰啞科最難調理況乎胎疾尤費揣摩欲使人盡能醫談何容易余謂不然小兒出腹精之至和之至直養何難揆其致病或母氣之偏或姑息之過非如雜證多歧四診難決今爲之著其病因明其證候一披條領可無過差豈誠求者獨不能消息于其間乎惟胎疾既驟且危倘村居僻遠或城關嚴阻求醫遲至至已束手無策

易若示以可遵之成法速行投治爲愈耶然而病至而爲之治不若致謹于未發者之爲豫也論列鞠養雖淺近瑣屑尤當先致意焉若能進推宜麟策之旨求諸朕兆之先則胎氣清純完固疾何由生上工治未病其斯謂至治歟方蠲大製藥屏奇珍或不出乎垣籬之內指顧可得卽求諸市購之匪難亦取其易而已矣

嘉慶十七年仲春陽湖吳甯瀾溶堂氏述

保嬰易知錄目錄

上卷 鞠養類

拭口法　洗兒法
斷臍法　灸臍法
裹臍法　藏衣法
挑口法　剃頭法
乳兒法　哺兒法
眠兒法　襁褓法
提抱法　雜護法
愼疾法

下卷 胎疾類

初生不啼　初生無皮
不乳　目不開
吐不止　不小便
不大便　大小便不通
肛門內合　噤口
撮口　臍風
臍濕　臍瘡
臍突　臍血
天釣　內釣
盤腸氣痛　胎驚搐
胎癇　胎寒
胎熱　胎黃
胎肥　胎怯
赤遊風　夜啼
鵝口　懸癰
重腭　重齦
牙關蟲　吐舌
弄舌　重舌
木舌　膜舌
含腮　疳腮
螳螂子　爛眼
赤眼　血眼

血淚　鼻塞
鼻乾　鼻涕
鼻齆　膚裂血出
肚皮青黑　遍身腫泡
體如水晶　遍身如鱗
腎縮入腹　陰囊腫墜
大小便出血　手拳不展
脚拳不展 足指向後附　胎毒
胎瘡　胎癬
紅絲瘡　猴疳瘡
胎瘤　背瘡

溼尻瘡　大治方 附

保嬰易知錄上

保赤彙編八

陽湖吳甯瀾溶堂

鞠養類

拭口法

慈幼編云保嬰諸書皆云嬰兒在胎口含熱物蓋胎毒也生下啼聲未出急用軟帛或棉裹指拭盡貴在神速遲則咽下伏之于心遇天行時氣久熱不除乃乘于心心主血脉得熱而散流溢于胃胃主肌肉發出于外成瘡疹之毒世之小兒無可免者不知病源在此又云分娩之時口含血塊啼聲一出隨卽咽下而毒伏于命門因致他日發爲驚風

痘疹等證此二說皆非確論故張景岳辨之曰嬰兒通體無非氣血所結何以毒遽如是即使咽之亦必從便而出何以獨留爲害無足憑也斯言足破千古疑案惟是形體初成固當爲之清楚于未啼時用軟帛裹指挖去口中之血視兒强弱用拭口法滌除口中毒穢以清臟腑誠爲初誕之要法也

王璆選方云以甘草中指壹節許炙碎以水貳蜆殼煎壹蜆殼以棉染點兒口中吐出惡汁爲佳若服壹蜆殼不吐不須更服不問嬰兒虛實寒熱皆須服之

薛氏曰用甘草法後次用黃連法硃蜜法

集驗方云初生小兒惡汁留胸膈壅塞易生蘊熱用黃連數塊槌碎棉裹如妳頭狀湯內泡浸成黃汁點兒口中惡汁自下乳食便美後以硃蜜法間與之

葛氏肘後方云好硃砂壹大豆許研細水飛煉赤蜜和成膏每用壹豆大乳汁化下時時滴口中三日內止用叁粒臨時更看形色若面色多青白啼聲不響者即不須服

千金方云牛黃半分飛硃砂末叁分將濃甘草湯和蜜拌勻旋抹口中極能辟痰除熱安神然必母氣多熱小兒肥盛者可用清弱者不宜用也

寶鑑云兒紅潤色赤啼聲響快者用禾粉叁分漸漸令兒吮之良久有胎糞下便佳此法惟父母有霉毒遺害者可用否則非宜

聖惠方云用甘草法後用韭根汁塗兒唇上乾又塗數次

張景岳曰用甘草法後隨用胡桃肉去皮嚼極爛以稀絹或薄紗包如小棗納兒口中使吮其汁非獨和中且能養臟最佳法也

又曰若母氣素寒小兒清弱者只以淡薑湯拭口最能去胃寒通神明並可免吐瀉之患此法最妙人所未知拭後用核桃法

醫宗金鑑云淡豆豉煎濃汁與兒三五口其毒自開

繆仲淳廣筆記云以甘草叁錢淡豆豉叁錢入沸湯壹碗隔水煮乾至壹貳小盃以棉爲乳蘸藥汁入兒口吮之以盡爲度腹內有聲去胎糞數次方飲乳月內永無驚風諸病

集效方云小兒落地時用橄欖壹箇燒研硃砂末伍分和勻嚼生脂麻壹口涎唾和勻絹包如棗核大安兒口中咂之此藥取下腸胃穢毒令兒少痰及出痘稀少

證治準繩云本兒落下臍帶瓦上焙燥爲末臍帶若有伍分重入硃砂、黃連、甘草各貳分伍釐和勻蜜

拌或用生地當歸煎濃湯調如糊做四五次塗乳母乳頭上俟兒吞之必使一日夜吞盡次日大便遺下穢汙濁垢之物皆惡毒也日後不但痘稀可免變黑歸腎之患竟有不出者亦無顧門不合之疾須候臍帶落下即便製服在六七日間爲妙其硃砂必須研極細末以甘草湯飛過此方眞保生最上一乘良法一以解毒一以補腎蓋臍帶乃有生之河車係于母之命門兩腎之所主以腎補腎故耳

又云嬰兒初生至滿月內時時取猪乳滴口中可免驚癇痘疹之患甚效猪兒飲母乳便提後脚離乳急拎之即得

張景岳曰古法拭口多用黃連者不知黃連大苦大寒小兒以胃氣爲主安得初生即可以苦劣之氣相犯致損胃氣則他日變嘔變瀉由此而起矣大非所宜又陳文中曰小兒初生便服硃砂輕粉黃連本欲下胎毒不知此皆傷脾之藥輕粉下痰損心硃砂下涎損神兒實者服之軟弱者服之易傷反致變生諸病此皆見理之談不可不知今臚列古法俾用者消息兒體之强弱以選擇可也

洗兒法

產家要訣曰三日洗兒曰洗三其來舊矣爲其革汚

穢也然以綿裹之兒又復解開入湯易致感冒驚風等患故北方生兒多不洗浴但以舊絮拭淨或大小便處畧以水揩抹之最爲得法凡遇天氣嚴寒而兒體脆弱不妨遲以十日半月擇吉浴之爲妙若畢竟要浴出胎便洗尙爲穩當三日不必再洗可矣

保生要方云兒初生候浴水未得且以舊棉絮裹置大人懷中煖之浴後仍當如此雖暑月薄絮亦當漸漸去之兒乍離母腹最畏涼氣豫煎沸湯以甑貯之臨時調和冷熱洗之不犯生水則不生瘡瘡

醫宗金鑑云臨浴時須擇無風密處湯須不冷不熱適可而止不可久在水中冬月恐其受寒夏日恐其傷濕

活幼心法云凡一週之內謂之芽兒切忌頻浴以致濕熱之氣鬱聚不散身生赤遊丹毒如胭脂塗染腫而壯熱毒一入腹則肚脹哽氣以致殺兒更有洗後失護爲風邪所傷身生白遊腫而壯熱憎寒鼻塞痰嗽故芽兒切忌多浴

證治準繩云浴訖以粉摩之或以光粉蚌粉撲身然後包裹能辟邪收濕散氣

又云浴兒不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍瘡等證尤不可用水打濕臍帶

大生要旨云兒初生兩乳必有餅子須時常揉撮捏去乳汁以散爲度否則腫硬成毒如初生洗浴時即將兩乳頭各捻數把即無此患

馮氏錦囊云浴湯煮以金、銀、丹砂、虎頭骨則除驚癇客忤煮以麥門冬、荆芥、銅、鐵、鉛、錫則安心神除惡氣證治準繩云以桑、槐、榆、桃、柳各取嫩枝叁寸長者貳叁拾節煎湯入猪膽汁貳叁枚浴之或以桃、梅、李、楮根葉煎湯浴之均令兒不生瘡疥簡要濟衆方云以益母草半觔剉細煎滾温温浴之能除百病

選擇經云寅卯酉日吉壬午丁未癸巳日凶不能上

三日勿犯下三日

斷臍法

造道集云初生兒宜洗淨則燥血不留于摺路之間可令皮膚光澤然後翦臍臍乃初生命蒂也翦之宜長用粗線縛緊翦不長多生臍風縛不緊陰間虛腫

產家要訣云兒出胎洗畢斷臍帶須將汁令盡否則寒濕入腹或作臍風又須于近臍陸寸處以線緊紮以帛包裹以口咬斷蓋紮緊則兒血不貫于胞底自然痿縮勿脹而易下即或延緩數日亦無大礙口咬則斷臍不犯乎刀翦自無冷氣內侵可

免腹中弔痛之虞如或天時寒沍坐草艱難子母勞傷元氣者用火燻臍法見下卷初生不啼方內千金論云須令至兒足趺上為度造道集云翦之宜長尺有二寸

千金論云臍帶中多有蟲急剔撥去不爾入臍成疾寶鑑論云斷臍若用翦刀先于懷中令煖

灸臍法

繆仲淳廣筆記曰兒初生不可翦臍帶留胞寸許翦連臍帶上如法紮緊即將軟帛貼臍帶根縛住待三朝用麪和水成薄餅置兒腹穿臍帶于麪上將陳艾火灸臍帶近臍處或三炷或五七炷灸須下帳避風灸畢仍將臍帶包紮好聽其自脫七日方脫者元氣足也必效方云此法試之甚良可用之無慮

裹臍法

千金論云治白練令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等合之裹臍調其緩急急則令兒吐哯不可輕解倘兒怒啼不已或衣中有刺或臍燥刺腹更當裹臍冬時須閉戶下帳燃火令温煖即夏日亦須無風密室仍以温粉敷之

大生要旨云裹臍須將臍帶盤作一團用枯礬末摻于帶上帶雖長多摻枯礬末暑月亦不為害以棉

紙封蓋軟絹裹束日日須要照看勿令兒尿浸濕小兒初生最重裹臍稍有不愼爲風寒濕所乘致成臍風噤口撮口等惡證一臘見之便不可治矣可忽乎哉

藏衣法

崔氏曰兒胞衣須用清水洗之弗染諸垢次以清酒淨之乃納錢一文于衣內盛于新瓶內以陳石灰實之青帛裹瓶口密密緊蓋且置隱處待三日後然後依月吉地向陽高燥處入地三尺埋之瓶上土厚牢築令兒長壽智慧若藏衣不謹爲猪狗所食令兒顛狂蟲蟻所食令兒患惡瘡大鳥食之令兒兵死若近廟社令兒見鬼近深水汚池令兒溺死近墳竈旁令兒驚惕近井旁者令兒聾盲棄道路街巷者令兒絕嗣當門戶者令兒聲不出耳聾著水流下者令兒青盲棄于火裏者令兒爛瘡著林木頭者令兒自絞死如此等忌蓋亦銅山西崩洛鐘東應一氣感通之理愼勿視爲迂遠而忽之

論藏衣方位云須于天德月空處埋之天德方正月丁方二月坤方三月壬方四月辛方五月乾方六月甲方七月癸方八月艮方九月丙方十月乙方十一月巽方十二月庚方月空方位單月在丙壬雙月在甲庚再擇時憲書吉日與兒本命無沖無

剋者用之可也

挑口法

嬰兒至要云小兒出胎氣血收斂則口內上腭齒根喉舌皆淨若氣血不斂胎毒上攻無不先見於口內者或有泡生於上腭懸癒之前初起白色繼則赤色最爲惡候急以指爪摘去其頭或以鍼刺之潰去惡血速以帛拭淨毋令下嚥此爲第一要著次看齒根上有白泡如牛粒米狀急以銀鍼挑去再看齒根上有黃筋兩條以葦刀輕輕割斷以洩惡血或舌上白屑堆聚以手指纏亂髮拭淨若舌根有膜裹舌如蘆籜盛水狀者以鍼破之洩其氣如舌下有膜如石榴子樣或如蟲形急以鍼刺之其鍼向兩旁挑破不可用正鍼深刺傷其本路以上各證刮淨刺潰之後以甘草湯絞淨再用桑樹皮白汁或陳京墨或白殭蠶研末頻頻塗之或選用拭口諸解毒法可保無虞倘父母姑息爲兒護疼不爲刺刮毒無洩路速則變成臍風噤口撮口等惡證百無一生遲則致成內釣盤腸驚搐之險挽救莫及矣或謂小兒口病挑動則有病必挑非此不可最爲費事殊不知挑口一法能洩胎毒而無傷元氣較服峻厲之藥萬分穩妥安可輕視

剃頭法

醫宗金鑑云兒滿月剃頭須向密室温煖處剃之爲其氣血未盈寒風易入剃頭後須用杏仁叁枚研細入薄荷叁葉再同研將麻油滴叁肆點合膩粉拌勻擦頭上能避風邪免生瘡癤熱毒等證

乳兒法

育嬰家秘云兒初誕用拭口解毒法腹響胎糞必下落地一週時方可與乳若產母乳汁未行必擇乳婦壯年體强乳汁濃白者徐徐乳之產母乳汁既行必先揉去宿乳此乳不可乳兒蓋積滯之氣恐損兒也

又云凡兒吮乳初則乳汁漸行其來尚緩而少久則如泉湧急而且多急取出之恐兒氣弱吞咽不及錯喉噴吐傷胃氣也按乳湧則以二指捺在乳頭兩邊來自緩矣

千金論云凡乳兒不可過飽飽則溢而成嘔吐大飽以空乳吮之即消若乳來多猛取出授後再乳切須乳時先揑去宿熱乳然後乳之如乳母欲臥寐當以臂枕之令乳與兒頭平母欲睡著時即奪其乳恐其不知飽足致成嘔吐且恐睡熟悶兒口鼻致死父母交合之間兒臥于側或驚起不可乳兒蓋氣亂未定必能殺兒也

巢氏云小兒啼未定氣不調母不可與以乳飲蓋恐乳不得下停滯胸膈則爲嘔吐也

大生要旨云月內小兒不可聞啼卽抱一啼便乳須令啼哭則胎中所受熱毒從此而散胎中驚風從此而解則期月之間無重舌木舌口噤胎熱之疾保生要法云小兒初生若多睡勿强與乳自然長而少病

顱顖經云夜間兒乳母起身坐抱兒餧之勿側臥乳兒後抱兒使其身直恐軟弱傾側致乳溢出也不獨皆令兒病

又云每清早睡醒欲飲乳皆須揑去宿乳

又云乳汁弗投地蟲蟻食之令乳無汁可沃東壁上佳

又云夏不去熱乳令兒嘔吐冬不去寒乳令兒瀉痢

聶氏曰夏中熱盛乳母浴後或值兒啼不可與乳使兒成胃毒秋成赤白痢浴後必須定息良久揑去熱乳然後乳之

朱丹溪曰乳子之母尤宜節謹飲食下咽乳汁便通情慾中動乳脉必應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不止則瀉不瘡則熱或爲口糜或爲驚搐或爲夜啼或爲腹痛病之初來其溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患于未形也

保嬰家秘云乳兒之母當淡滋味一切酒麵肥甘熱物瓜果生冷寒物皆當禁之又須愼七情調六氣

以養太和蓋母强則子强母病則子病母寒則子寒母熱則子熱故保嬰者必先保身

孫兆曰喜乳令兒上氣顛狂亦令兒生痰喘急或生驚

千金翼云怒乳令兒疝氣扁鵲云女子則腹脹

華陀云乳中虛冷兒得母寒故令兒下利而啼千金翼云令兒咳嗽

千金翼云熱乳令兒面黃不食嘔吐張氏云熱乳傷損肺氣令兒龜背

寶鑑云氣乳令兒面黃白乳哺減少夜啼喝乳又云病乳令兒黃瘦骨蒸盜汗嗽嘔夜哭及生諸疾

靈秘云壅乳令兒成疾涎涎壅生驚寶鑑云壅乳成乳癖又吐逆生痰

寶鑑云魁乳令兒臟冷腹急而瀉胸背皆熱夜啼肌瘦一如積塊

千金翼云醉乳令兒熱腹急痛扁鵲云醉淫隨乳兒恍惚多驚

寶鑑云乳母淫佚情亂令兒吐瀉身熱啼叫如鴉不治

倉公曰當風乳兒風冷入肺則令咳嗽

心鑑云夜露下飲兒冷氣入咽不散多成嘔逆

眞訣云大勞大飢之後不俟氣息稍和即以傷乳與

兒令兒成痂

朱丹溪曰乳母致病事起于默人多玩忽醫所不知故乳母稟受之厚薄性情之緩急骨肉之堅脆德行之善惡令兒相肖大有關係不可不慎也

醫藥源流云調攝小兒之法病家能知之者千不得一蓋小兒純陽之體最宜清冷今人非太煖即太飽而其尤害者則在于有病之後而數與之乳乳之爲物得熱則堅紉如棉絮況兒有病則食乳甚稀乳久不食則愈充滿吮則迅疾湧出較平日之下咽更多前乳未清新乳復充塡積胃口化爲頑痰頑痰相結諸脉皆閉而死矣譬如常人平日食飯幾何當病危之時其食與平時不減安有不死者哉然屬病家云乳不可食則羣相詬曰乳猶水也食之何害況兒虛如此全賴乳養若復禁乳則餓死矣不惟不肯信反將醫者詬罵其餘之不當食而食與當食而反不與之食種種失宜不可枚舉此小兒之所以難治也

蘭臺軌範云兒病即宜少與乳食若似驚風即宜斷乳如欲食與米飲壹勺必欲食乳須先將乳擠空然後以空乳令吮否則乳下喉中即成頑痰雖神丹無效俟少安漸與乳可也

蘭閨口議云乳之性見酒則凝試將牛乳一碗加陳

酒一小盃攪和蒸一沸乳凝如腐物性然也飲乳之兒父母愛之戲以酒滴兒口中往往漸成乳癖驚癇痃積等證可不愼哉

育嬰家秘曰養子之道當擇乳母必取無病婦人肌肉豐肥性情平和者爲之則其乳汁濃厚甘美瑩白温和于子有益如病寒者乳寒病熱者乳熱病瘡者乳毒貪口腹者則味不純喜淫慾者則氣不清何益于子故宜遠之

活幼心法云小兒三週後必當斷乳否則脾多濕滯納穀不旺易生痰壅洩瀉等證致兒柔脆難養

哺兒法

葛氏肘後方云小兒三日應開腹助穀神壯胃氣用粟米煮爛研如乳汁與大豆許愼不可與雜藥也

千金論云兒哺早不勝穀氣令頭面體生瘡愈而復發又尪弱難養三十日後雖哺不多若不嗜食强與之不消復生病哺乳不進腹有疾癖節哺數日自愈

保生碎事云乳者妳也哺者食也乳後不得與食哺後不得與乳乳食相併難以剋化大則成癖小則成積痃氣自此始矣

慈幼外編云或曰小兒無傷乳法即乳滿而溢亦無大害惟與食併則乳裹食不化遂成痰癖是傷食

非傷乳也故小兒以乳爲主三歲後方可食饘粥五歲後方可食葷腥則一生永無脾胃之疾矣

大生要旨云小兒半歲以前只與乳喫六箇月後方與稀粥週歲以前切不可喫葷併忌生冷之物待一二歲腸胃稍厚畧與葷喫養子眞訣云喫熱莫喫冷喫軟莫喫硬喫少莫喫多自然無恙故凡粘膩乾硬酸醎辛辣一切魚肉水果濕麵燒炙煨炒煎煿俱是發熱難化之物皆宜禁絕小兒無知見物卽愛豈能知節節之者父母也父母不知禁忌畏其啼哭無所不與積成痼疾追悔莫及雖曰愛之其實害之語云惜兒須惜食又云若要小兒安常帶三分飢與寒皆至言也

保產輯要云生兒缺乳不得不喂以穀食母細嚼以手喂之不可以口對口喂之致生疳疾腹脹

景岳全書云小兒飲食有任意偏愛者無不致病所謂爽口味多終作疾也極宜愼之嘗見王隱君曰予幼時酷嗜甘飴忽一日見飴中有蚯蚓伸頭而出自此不敢食飴至長始知長者爲之此可爲節戒之妙法

錢乙云兒多因愛惜太過三兩歲猶未飲食致脾胃虛弱一生多病半年後煎陳米稀粥粥面時時與之十月以後漸與稀粥爛飯以助中氣但不與乳

併自然無病易養

馮氏錦囊云凡兒切忌食肉否則脾胃受傷若再甘甜麵食不禁則令疳蟲痢積若食腰子心血腦髓之類則令走馬疳候若食葱韭薤蒜則令心氣鬱結水穀不通三焦虛熱神情昏昧若食飛禽瓦雀則生瘡疥癤癬燥渴煩悶若食蝲蛄螺蚌蜆鰻鼈蝦蟹等類則令腸胃不禁或泄或痢至于雞肉過食則生蚘蟲尤宜切忌

眠兒法

瑣碎錄云小兒同母睡時切忌鼻風口氣吹兒顖門恐成風疾

慈幼編云凡兒小有停滯於臥後用手順摩其腹自胸至臍下輕輕摩至百數能順氣消食

馮氏錦囊云眠兒以甘菊花瓣實枕以其能清頭目也

活嬰方云臥兒紉舊布多層襯兒受尿輪流洗曬最妙有用布袋盛稻柴灰以收濕者若甫離竈突火毒未出兒中之必生丹毒驚癇等惡證必須將灰篩淨預貯數日然後用之庶乎無礙

察微錄云臥兒冬用木桶夏用竹筐必須直身向明而臥倘背明向暗則兒眼仰看亮光易致目精上竄臥旁切近之處不可有悅目引看之物致兒側

視目精左竄右竄兒帽前亦不可用五彩之飾亦恐惹兒仰視也

襁褓法

千金論云衣兒用父故衣女用母故衣改作用故絮弗用新棉切不可過厚恐令兒壯熱生瘡發癇皆自此始琢玉篇云富貴之家不宜爲兒新製綾羅華麗之服當知爲兒惜福

大生要旨云初生小兒未剃胎頭不與戴帽則自幼至長難于傷風永無鼻塞拖涕之疾

巢氏病源云小兒始生肌膚未實宜單衣不宜煖衣煖則筋骨緩弱易發瘡瘍宜舊絮不宜新棉恐汗出表虛易受寒邪宜見地氣尤宜見風日不見地氣風日則肌膚柔軟易得損傷嘗見富貴之家重茵疊被日在懷抱中雖數歲亦未能行而田舍小兒終日暴露或飢或寒絕無他病譬如草木生于深山大澤中容易合抱至園圃奇材異卉縱加培植多有秀而不實者豈貴賤之理有異哉

馮氏錦囊云凡寒則加衣熱則除棉過寒則氣滯而血凝過熱則汗出而腠理洩以致風邪易入疾病乃生更忌解脫當風然無風日煖又當抱出遊戲又不可置之地間令著地受寒蓋五臟俞穴皆係于背肺臟尤嬌風寒一感毫毛畢直皮膚閉而爲

病咳嗽喘嘔壯熱憎寒故兒最要背煖肚者脾胃處也胃爲水穀之海脾爲健運之司冷則物不腐化致多腸鳴腹痛嘔吐泄瀉故兒更要肚煖足係陽明胃脉所絡故曰寒從下起故兒更要足煖頭者六陽所會也況腦爲髓海涼則堅凝熱則流泄或顱顬腫起頭縫開解目疾頭瘡故頭宜涼心屬離火若外有容熱則內動心火表裏合熱輕則口乾舌燥腮紅面赤重則啼叫驚掣多躁渴煩故心胸宜涼

小兒精要云初生小兒不得用油膩手繃裹春忌覆頂裹足夏忌飲冷食氷冬忌火炙衣被

證治準繩云嬰兒又當習薄衣之法當從秋初習之不可以春夏率減其衣則令兒中風寒所以從秋初習之者以漸稍加如此則必耐寒冬月但當著夾衣及衲衣之類極寒則漸加以舊棉若棉衣既厚更與火烘則寒未外侵而熱先入裏非徒無益而反害之

丹溪曰小兒過用棉絹溫煖之服以致陽氣不舒因多發熱即至長年下體勿令過煖蓋十六歲以前氣血方盛如日方升惟陰常不足耳下體主陰得寒涼則陰易長過溫煖則陰暗消故曲禮曰童子不衣裘裳

錢乙曰小兒衣裳被褥日曬日收不宜在外過夜古書云天上有飛星惡鳥不可干犯小兒染著屍氣生無辜疳如遇失收當用醋炭熏過方可衣之若誤著兒啼叫不絕須即換下所著衣服亦用醋炭烘之太陽照之更妙

提抱法

大生要旨云兒初生形骸雖具筋骨甚柔氣質未實猶木之柔條軟梗可使或曲或直或俯或仰也故百日之內不可竪抱竪抱則易于惹驚且必頭傾項軟有天柱倒側之虞半歲前不可獨坐獨坐則風邪入背脊骨受傷有龜背傴僂之疾

張潛曰兒生六十日後則瞳子成而能笑認人切忌生人懷抱及見非常百日則任脉成自能反覆一百八十日則尻骨成母當令兒學坐二百四十日則掌骨成母當扶教匍匐三百日則髕骨成母當扶教兒立週歲之後則膝骨成母當扶教兒行皆育兒一定之法若日捧懷抱不見風日不著地氣以致筋骨緩弱數歲不行一少失護疾病乃生此皆保育太過之失

育嬰家秘云小兒專愛一人懷抱見他人則避之此神怯弱也抱之則喜放之行坐則哭者此氣血虛也

雜護法

慈幼編云凡小兒初有知識不可令小厮婦女領出外頑耍易致驚嚇且言語戲笑便有一種下流習氣即蹉跌受驚亦不使知誤事不小切不可離大人左右至乳母須時加覺察睡臥早起皆宜親看不可託人每見乳母作弊外人盡知主母不覺兒受夭枉者多矣

馮氏錦囊云凡戲謔之物不令恣樂刀劒凶具無使摸捉莫近猿猴近則傷意莫抱鵝雀抱恐傷眼男方學語勿令揮霍會坐勿久令腰似折行莫令早筋骨柔軟雷鳴擊鼓莫爲掩耳睡臥須節須令早起飲食休過衣勿重襲常食蔬羹休啗美味甘肥酸冷薑蒜瓜果油膩生茄切勿過食夜莫停燈晝莫說鬼睡莫當風坐莫近水笑極與和哭極與喜笑哭之後即與乳

大全云大人與小兒嬉戲捏其腮頰則令小人淌口水

育嬰家秘云小兒神氣衰弱勿見非常之物或見未識之人或聞雞鳴犬吠或見牛馬禽獸嬉戲驚嚇或聞人之叫呼雷霆銃爆之聲未有不驚動者也易成客忤驚癇之病蓋心藏神驚則傷神腎藏志恐則失志大人皆然小兒爲甚凡小兒嬉戲不可

妄指他物作蟲作蛇以嚇止之小兒啼哭不可令人裝扮欺詐以致其啼使神志昏亂心小膽怯成客忤也

又云小兒玩弄嬉戲常在目前之物不可强奪去之則令生怒但勿令弄刀劒銅錢近水火入廟堂見鬼神耳

田氏曰小兒過煖生熱熱極生風提抱生瘡餵飼生癖最宜愼之

養子眞訣云乳子須調護看承莫縱弛乳多終損胃食舊郎傷脾衾厚非爲益衣單正所宜無風頻見日寒暑順天時

生生編云小兒不可就瓢及瓶中飲水否則令兒言語多訥

馮氏錦囊云凡母抱兒切勿哭泣淚入兒眼令兒眼枯

育嬰家秘云小兒能言必教之以正言如鄙俚之言勿語也能食則教之恭敬如褻慢之習勿作也能坐能行則扶持之勿使傾跌也宗族鄉黨之人則教以親疎尊卑長幼之分勿使諜嫚也言語問答教以誠實勿使欺妄也賓客往來教以拜揖迎送勿使退避也衣服器用五穀六畜之類遇物則教之使其知之也或教以數目或教以方隅或教以

歲月時日之類如此則不但無疾而知識亦早矣

慎疾法

錢氏曰小兒氣血未充而一生盛衰之基全在幼時培養之得失故飲食宜調寒温宜適若在期內斷然生不得病須知小孩身體微弱臟腑柔脆豈堪先以疾害損其生機繼以藥困復遭屠毒精神暗耗戕賊早歲能保長生乎

疾呼錄云小兒無病切忌服藥否則遇疾無效

張景岳曰小兒偶因寒熱不調柔弱肌腠最易感冒發熱不必用藥但于熟睡之時夏以單被冬以棉被蒙頭鬆蓋勿壅其鼻但以稍煖爲度使其鼻息出入皆此煖氣少頃則微汗津津務令上下稍透則表裏通達而熱自退矣若寒天衣被冷冽汗不易得則輕摟著身赤體相貼而上覆其面則無有不汗出者此至妙之法百發百中者也若寒邪甚者兩三微汗之無有不愈此法行于寅卯之時則汗易出而效尤速

張潢曰乳母須每日三時摸兒項後風池若壯熱者即須熨之使微汗而愈諺云戒養小兒謹護風池風池在頸項筋兩轅之邊

保嬰撮要云幼科有挈掐法乃按摩之變也小兒未週歲難以藥餌治誠宜之然可以治外邪而不能

治內病也可以治小病及氣實者如大病氣虛者用之無益也爲父母者宜知之

指南云小兒諸病如發熱無汗煩躁神昏譫語之頃或戰汗大汗將止之時或嘔吐泄瀉之後或痙厥漸甦或便久閉而適然大便或灌藥之後斯時正元氣與病邪交戰之際若能養得元氣一分卽退一分病邪此際小兒必有昏昏欲睡懶于言語氣怯神弱身不轉動之狀此正當養其元神冀其邪退正復乃病家父母偏于此際張惶驚恐因其不語而呼之喚之因其鼾睡而頻叫醒之因其不動而搖之拍之或因微有昏譫而必詳詰之或急欲以湯飲進之或屢問其痛癢之處嘵嘵不已使其無片刻安甯如此必變輕爲重變重爲死矣更有豪富之家延醫多人問候者多人房中聚集者多人或互談病情病狀夜則多燃燈燭以照之或對之哭泣不已或信巫不信醫祈禱叠興舉家紛擾此非愛之實以殺之也

活幼芻言云小兒有疾口不能言脈無可診名曰啞科醫者不可不究其病源而主家亦須詳審而明言之愚者拱默而令醫師切脈以試其知病否是以兒命爲鵲也孫眞人云未診先問最爲有準蘇東坡云圖愈疾不欲困醫徐氏曰小兒致疾之

由有婢媪明知而不敢言者當委曲善詢之若加以聲色是滅其口也旨哉斯言

醫學源流論種痘云種痘之法此仙傳也有九善焉凡物欲其聚惟痘不欲其聚痘未出而強之出則毒不聚一也凡物欲其多痘欲其少強之出必少二也凡物欲其大痘欲其小強之出必小三也不感時痘之戾氣四也擇天地温和之日五也擇小兒無他病之時六也其痘苗皆取種出無毒之善種七也凡痘必漿成十分而後毒不陷種痘之漿五分以上即無害八也凡痘必十二朝成靨并有延至一月者種痘則九朝已回九也其有種而死者深用悔恨不知種而死者則自出斷無不死之理不必悔也至于種出危險之痘或生痘毒此則醫家不能用藥之故種痘之人更能畧知治痘之法則尤爲十全矣

種痘訣云夫痘者胎毒也根于先天發于時氣內外合邪兩難分解吉少凶多天生天殺無可如何自有種痘之法去險履平避危就安有參贊化育之功焉以苗引毒同氣氤氳蓋發于小兒安甯無病之時外無客邪鼓動血氣內無積滯壅閉經絡可免癢塌悶亂之虞且正氣內守稍干禁忌尚無妨礙脫痂絶無瘢痕口鼻亦無殘廢誠神功也亦仁

術也其法有水種旱種衣種漿種之異惟水種最屬平穩其法擇上等痘痂和水研細新棉濕裹分男左女右納兒鼻孔時時看守倘小兒用手拈出或被噴出急將苗塞鼻內不可稍緩恐洩苗氣下苗後以六個時辰爲度然後取出如天氣尚寒多留數刻若時令已煖少留數刻要在臨時斟酌苗順亦順醫者之邀苗最爲第一要著而尤貴得時則種春季爲上秋冬兩季次之夏季斷不可種即可種之時亦有不可種者如春應溫而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反溫是皆天時不正之厲氣小兒調理未遑敢言種痘乎又值

正痘初行疫邪方熾之時尤當避其銳氣必當俟大勢稍平時氣就和再爲議種方保萬全若既種之後忽爾寒暄此則所遇不齊偶爾變氣出于意外是在保護者之謹之又謹以保無虞種痘之期下苗後大約七日始發熱發熱三日而見點見點三日而出齊出齊三日而灌漿漿足三日而回水結痂而大功成矣或因苗氣透洩或因兒體壯實艱于傳進胎毒深邃不能引出竟不發者有之當逾十一日爲度然後細察天時之順兒體之實再爲補種亦可然補種究非全策不可孟浪也即初次下苗亦當細審凡小兒氣血冲和臟腑均平內

無痰熱食積所傷外無六淫之氣相侵者方可如法種之若病後之兒及顏色太嬌骨幹太弱肌理太疎者皆未可輕試種痘以七日爲期五臟傳遍始發熱者常也卽遲至九日十一日而發者亦無足怪若發熱于五日以前此時苗氣尚未傳到毒何由而發耶必因種後適逢天行時氣小兒感染而成乃自出之正痘非苗氣引出之種痘是又不可不知或順或逆豈可過責醫家乎至于保護之法不可因種痘而忽之倘兒之父母行事疎忽不知調攝不守禁忌不信醫藥過于溺愛驕縱者能無意外之變歟

調攝法云出痘以調攝爲第一義自始至終不可稍忽要不過避風寒愼飲食而已天氣嚴寒覆蓋宜温煖勿使受寒恐被寒氣所觸則痘不得出亦不可重茵疊被使熱氣壅滯致痘不宣發天氣温煖覆蓋宜適中恐客熱與毒相併致增煩熱亦不可輕易著單露體使寒氣外侵阻遏生發之氣此寒熱所以貴得其平也人之氣血必藉飲食生化痘之始終全賴乎此若飲食虧少氣血何所資助乎但不可過甚若過飲則飲停不化津液若過食則食滯必生痰熱所以吮乳之兒不多乳不缺乳能食之兒勿餐辛熱炙煿勿啖黏硬生冷勿恣意茶

湯勿使飲涼漿食不過飽亦不過飢此飲食所以貴得其平也至于寒熱飲食之外凡舉止動作既不可任意驕縱亦不可過于拂逆惟在調攝之人耐其性情自見苗以至落痂之後兢兢業業善爲保護始保萬全

禁忌訣云出痘之家房中最宜潔淨切忌沖犯最喜明亮不可幽暗擇老成耐事之人屢經過小兒出痘者令其調護不離左右一切禁忌俱當遵守勿詈罵怒呼勿言語驚慌勿對梳頭勿對搔癢勿對飲食勿對嗜酒勿對歌樂凡房內淫液氣婦人經候氣腋下狐臭氣行遠勞汗氣溝渠糞穢氣諸瘡腥臭氣砒硫蚊煙氣誤燒頭髮氣吹滅燈燭氣誤燒魚骨氣葱蒜韭薤氣煎炒油煙氣醉酒葷腥氣冰麝窻烈氣均須避之或燒辟邪丹或乾紅棗黃熟香以解之若蒼朮之氣則太峻也其無可解者父母不忌房室犯之兒痘必變輕爲重更當屬左右之人倘值迅雷烈風暴雨之變及鑼鈸金器之聲大宜安定不使兒驚其幃帳宜謹蓋覆宜密切勿暴動生風再令人謹守其門不許生人往來不許僧道師巫孝服之人入室至于痘兒勿令洗面恐生水損眼眼鼻勿動其痂則無眼吊鼻齆之患行坐勿令太早免致腰酸腳痛之虞能食者與鮮

魚白鴈之屬切不可與生冷瓜柿梨橘韭蒜醋醬糍粽雞鵝椒薑辛辣等物雞子害目不可食百日之內若飲酒食糟雖少必成赤鼻以上禁忌一切謹守則吉稍有疎忽每至敗事

可種訣云小兒面部紅潤精彩明亮透達印堂山根年壽眼下口角無青暗之色○兩眼黑白分明瞻視平正愈看愈有神氣精光○顖不陷不填○頭不解顱○鼻孔不小○氣清不濁聲音清亮○天柱骨正頸不歪斜○骨肉相稱又宜緊束肥不見肉瘦不露骨○小便遠而長腎囊小微帶紫黑色如荔枝殼○身無瘡癬疳疥○項無結核○腹無積聚○形氣充實○精神強健○臟腑調順脈息和平以上皆可種

不可種訣云小兒面色青白或黧黑痿黃無喜色無精彩○兩目黑多白少白暗帶青色視瞻歪斜暗昧無神○顖陷顖填○解顱○顖不合○五軟○五鞕○龜胸○龜背○鶴膝○鼻孔小○氣濁○聲音不亮不長肉不束骨鬆如發麪樣○身體瘦無胭肉○身有瘡癬疳疥○腹有疳積○項有結核○病後元氣未復○素有驚癇之症○失乳之後○氣血不足○脾胃虛弱精神倦怠脈不和平以上皆不可種

疹家精義云疹之與痘原非一種雖痘之變態多端而疹之收斂稍易然疹之甚者其勢凶危亦不減于痘最爲可畏蓋疹亦胎毒蘊于脾肺故發于皮毛肌肉之間一時傳染大小相似則未有不由于天行厲氣而發者此其源雖內發而證多屬表總由君相二火燔灼太陰而脾肺受之故其爲證初熱一日至次日雞鳴時其熱即止止存五心微熱漸見咳嗽鼻流清涕或腹中作痛飲食漸減到申酉之間其熱復來如此者四日用手滿按髮際處甚熱其面上熱稍減二三分咳嗽連聲面燥腮赤眼中多淚噴嚏頻發或忽然鼻中出血至五日其熱不分晝夜六日早時其疹出在兩頰下細細紅點至午時兩手背並腰下及渾身密密俱有紅點輕者三日重者或五日或七日普遍煙發其鼻中清涕不流噴嚏亦不行兩頰顏色漸淡此出疹之期也凡疹初熱疑似之間切不可輕易用藥總有他證必待五日腮下見疹方可藥之其調攝之法亦與痘等切勿忽視雖云疹喜清涼而惡溫痘喜溫煖而惡涼然疹子初出之時亦須和煖則易透發蓋疹子只怕不能得出若出盡則毒便解故發疹紅影出于肌膚切戒風寒生冷如一犯之則皮膚閉密毒氣壅滯遂變渾身青紫而毒反內攻煩

躁腹痛氣喘悶亂諸證欲出不出危亡立至較痘尤凶尤速也出疹有五六日不飲食此胃爲邪氣所侵亦爲邪氣所養故不食亦不妨疹已出盡即思飲食不可與麪食雖粥飲亦須自少漸加總宜食淡不可縱口凡辛辣厚味助火酸收之物咸須禁食如酸醋胡椒猪肉核桃梅杏櫻桃梨柿荸薺之類若誤犯之則伏匿焦紫喘脹聲瘖而難救矣即疹出盡後兩月之內若誤食雞魚則終身皮膚粟起如雞皮之狀或遇天行出疹之時又令重出誤食猪肉則每歲凡遇出疹之月多有下痢誤食鹽酸致令咳嗽則每歲出疹之月必多咳嗽誤食

五辛之屬則不時多生驚熱誤食沙糖多發疳蝕誤食酒糟必成赤鼻必須一一謹守庶無終身之患疹之名目不一在江蘇曰痧子在浙江曰瘖子在江西湖廣曰麻在山陝曰膚瘡曰糠瘡曰赤瘡在直隸曰疹子名雖不同其證則一但疹在痘前者痘後必復出惟痘後出者方爲結局耳凡疹後餘火刑肺微微咳嗽必須醫治延之變症堪虞

吳氏曰急驚之證搐搦反張頭搖目竄唇動牙咬肚熱痰潮神昏便秘是也當其搦搐反張之時切忌把其手足扳其身軀若强力持之致風氣流入經絡以致俯仰拘牽雖生已成殘廢當其動作之際

置一竹簟鋪之平地使兒臥其上任其搐搦風力行遍經絡勢極自止也醒後易于頻發宜慎防之景岳全書云初生小兒以手捻其頭摸其頤頷不作聲者爲無病縱有病以手指探其口雖發聲而從容啞指者其病輕若卽發聲不啞指者面色或青紅兼紫者此落地受寒甚也其病重若牙關緊閉不納乳或硬而不軟其病極重也

巢氏云小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全自生之後卽長骨脈五臟六腑之神智也變者易也自已生三日後三十二日一變亦曰一蒸卽覺性情有異于前者何也長生臟腑智意故也先儒又謂小兒純陽三十二日一變六十四日一蒸每逢變蒸則心熱意懶偶觸風寒則發熱等證作矣甚則驚風立至蓋此時尤宜謹愼感冒變蒸每挾外邪而易起外邪或因變蒸而易乘薛立齋曰變者上氣蒸者發熱也輕則體熱虛驚耳冷微汗唇生白泡三日可愈重則寒熱脈亂腹痛啼叫不能乳令食卽吐呪五日可愈此證小兒所不免者雖勿藥可也若不熱不驚畧無證候而暗變者蓋受胎氣壯實故也張景岳曰蒸變古無其說創于西晉王叔和繼于隋唐繁于今日但余嘗見兒有保護得宜至長無病豈此子獨不蒸變乎又何以

前月病爲蒸變而此月不病何一孩而先後不同乎又有暗變之說更渺茫不足信總之小兒或發熱或吐泄凡屬違和不由外感必因內傷不過將息失宜之故但宜謹于平時不可惑于蒸變之說而忘致病之由也

金鑑云小兒足脛冷腹虛脹糞色青吐乳食眼珠青面青白少神聲音弱脈沉微者內已虛寒忌投涼藥若足脛熱兩腮紅大便閉小便黃赤口渴痰稠氣粗聲壯脈緊數者乃爲熱證忌投溫熱藥（按小兒門乳前用螺螄柒個雄黃少許搗極爛塗顖門穴以紙封蓋任其自落可保至長不生瘡癤）

保嬰易知錄上終

C101/1815
V.4

陽湖吳甫瀾溶堂

胎疾類

初生不啼

或氣閉不通或難產勞傷胎氣或天時寒冷所致謂之夢生

心鑑云切不可斷臍以綿衣包兒離胞寸許用苧麻紮緊臍帶將紙條蘸麻油點火於臍帶上緩緩薰燒俟煖氣入臍氣回能啼方可斷也

又云將陳蘄艾灸臍帶上煖氣透腹即生

尊生書云用煖臍法氣已入腹取壹貓用青布裹

頭目令一伶俐婦人拏住貓頭向兒耳邊以口咬破貓耳貓大叫一聲兒卽醒矣

外臺秘要云由於難產少氣也取臍帶向身却捋之令氣入腹仍以本生父母眞氣度之

事急方有因口噤不能出聲者急看兒口內上膀齦離舌上下如法刺之刮之令淨（詳見上卷挑口法）

三因方云以葱白細鞭背上卽啼此法似不如葱湯洗其腹就以熟葱熨其背也

大生要旨云有因肛門爲脂膜所塞閉住兒氣故不能出聲者以金銀玉簪脚輕輕透破脂膜卽能出聲以油紙撚套住免其再合參看肛門內各條

初生無皮

胎中熱毒也其症有三審因而治之

清涼膏治父母霉毒遺害兒上半身或下半身赤爛甚至皆黑者或非因霉毒由胎中蘊熱所致者敷之皆效石灰肆兩未經水濕成塊者用水泡之沒指半許露一宿面有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多寡對小磨香油亦如之順攪成膏爲度用鵝翎搽之

鵝黃散生黃柏熟石膏各等分研細末加珍珠粉尤效濕則乾摻乾則用猪膽汁調敷

米粉撲法治月分不足遍身浸漬紅嫩而光亦有面白肢冷不燬赤者早稻白米研細粉時時撲之

生肌散人參、黃芪、珍珠粉、各等分時時撲之

伏龍肝散以伏龍肝研細末雞子白調搽之

本草方治毋處高樓不沾地氣所致者車轆上土研細撲之或用淨黃土和黃柏敷之或掘土坑臥宿即生皮

醫通方夏月臥兒水芭蕉葉上

不乳

兒初生即不吮乳細看兒口中照挑口法治之再議與藥

愼齋方治牙關不開不吮乳者其噤在齒根也兩星炙研片腦少許二味和勻指染薑汁栢葉汁和藥擦牙根即開如不效用秘方吹鼻法

聖惠方治能吮乳而不能咽者其噤在咽中也水銀米粒大與之咽下即愈按此方不可輕用

又方葛蔓燒灰壹字和乳點之即瘥

即得方治兒腹中胎糞未下腹滿氣促嘔吐不乳汞粉伍分研細蜜少許溫水調化徐徐與之按此方不可輕用

青蒿丸見大治方內

良方。小兒熱毒內閉。數日不乳。用活蚌剖開取水。
參葉茶匙服之。（取蚌水法見重腸）
陳文中方。治兒母過食寒涼。胎受其氣。令兒吐乳多啼。面色青白。丁香拾枚。陳皮去白壹錢。乳汁壹盞。石器煎一二十沸。細細與服。
目不開
胎中熱毒。蘊于兒脾。眼胞屬脾。其脈絡緊束。故不能開也。
心鑑方。熊膽、黃連、各少許。滾湯淬洗。一日七八次。（如無熊膽將黑羊膽青魚膽代）
又方。川芎、薄荷、樸硝、各壹錢。為細末。以少許吹鼻中。
幼幼新書。甘草壹截。以猪膽汁炙透。研為末。每用米泔水調少許灌之。
生地黃湯。乾地黃、赤芍、當歸、瓜蔞根、各壹錢。川芎、甘草、各伍分。燈心叁拾寸。煎湯與兒服之。
又方。治目不開。或出血。蒼朮貳錢。入猪膽汁中漬煮。將藥氣熏眼。後更嚼汁與服。
丹溪方。以燈心、黃連、秦皮、木賊、紅棗、各伍錢。水壹盞。煎澄清。頻洗而開。
吐不止
初生吐不止。古法指謂穢惡下咽。用鎮墜之品。恐非

臟腑柔嫩者所宜受病之源非一當審其因以治之
大全方治咽穢腹滿而痛者莪朮少許鹽豆豉大
以人乳壹合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大
服之甚效
醫藥入門黃連枳殼赤茯苓等分爲末乳汁調灌
之又方木瓜生薑煎湯灌之
湯氏方治觸冒風邪鼻塞多啼者全葱白叁枚紫
蘇莖壹錢生薑壹大片人乳兩合煎沸去滓飲
之
黃連二陳湯治胎前受熱面黃赤手足温口吐黃
涎酸黏者製半夏陳皮茯苓各等分甘草黃連
各叁分加生薑水煎服
聖惠方田中地龍糞壹兩研末空心以米湯下之
三服效加木香叁錢大黃伍錢尤效（按木香酌減大黃尤宜愼）
陳文中方治胎前受寒面清白四肢冷口吐清稀
白沫者（方見不乳）
得效方治乳積吐用大麥芽伍錢生薑壹片人乳
煎沸飲之
燒針丸治吐乳痰壅者用黃丹研末小棗和丸如
芡實大鍼發于燈上燒過研細末乳汁調服一
方加硃砂枯礬等分

不小便
胎受熱毒之氣流於下也內服外敷小便自通若生而臍腹腫脹臍四旁有青黑色及撮口者不治
豆豉膏豆豉壹勺田螺拾玖箇葱壹大束同搗爛用水芭蕉汁調敷臍上或將陳大麥芒壹掬煎湯飲（按麥芒須濾淨）
蒜螺敷法兼治水腫臌脹大田螺肆箇大蒜伍箇車前子貳叁錢麝香少許前三味同研後入麝香再研爲餅每用壹箇貼臍中將膏藥護之半日許服白馬通壹大盃立通（按馬尿曰通）
又方白鳳仙連根帶葉熬水乘熱浸洗外腎兩胯

立通
單方葱連鬚壹大束搗爛加麝香少許分作貳包更換熨臍下
加味導赤散細生地黃叁錢細木通壹錢生甘草叁分黃連叁分飛滑石貳錢赤茯苓貳錢淡竹葉念張燈心伍拾寸水煎服之（按分兩宜酌減）
愼齋全書兼治不乳葱白切肆片乳汁半盃瓦器內同煎沸分肆服飲之
又方地龍數條去泥和蜜研敷陰莖上內用蠶退紙燒灰入硃砂、龍腦、麝香、各壹分共研細末用麥冬燈心湯食前調服（按分兩宜酌減）

全幼心鑑車前子搗汁入蜜少許灌之（耳水車缺內鮮車前子尤效）

又方雄黃牛尿滴毛數拾根煎湯壹盃飲之

藥性論安鹽少許於臍中以艾灸之

雷公方（見臍突）

不大便

兒生三四日不大便者名曰鎖肚乃胎中受辛熱之毒氣滯不通也其兒必面赤腹脹不乳多啼急用口咂法再議與藥

口咂法令婦人以温水漱口咂兒前後心手足心並臍共七處每處咂三次以得見紅色爲度

熨臍法用連根葱壹莖生薑壹塊淡豆豉貳拾粒鹽壹小匙同研爛揑作餅子貼臍中烘熱熨之用絹紮定良久氣透自通

田氏方先以硬葱紅入肛門內如不下用硃砂水飛南星炮巴豆霜各等分共爲糊丸黍米大薄荷煎湯灌下叁丸

心鑑方枳殼煨去穰叁錢甘草稍壹錢以水煎服必效方治大小便不通腹脹欲死急用白頭蚯蚓搗爛敷腹上空臍孔不敷半時許取白馬屎和水絞取汁灌之立通

青蒿丸（見大方內治）

備驗方 見臍風

大小便不通

胎中熱毒之甚也急用前口咂五心臍下法若延至七日不治

外臺秘要猪苓壹兩以水少許煮雞屎白壹錢調服亦治小便不通

經驗方眞麻油壹兩皮硝少許同煎滾冷定徐徐灌之

又方輕粉叁分蜜少許温水化開時與少許亦治大便不通

立效方大黃酒浸郁李仁去皮研各壹錢滑石末壹兩揚和丸黍米大曰服伍丸開水下亦治大便不通

青蒿丸

紫霜丸 俱見大治方內

以上三症諸方參看擇用

肛門內合

其症有二或因熱毒太盛壅結肛門穀道有孔者急服黑白散外以手輕輕拍之或爲脂膜遮瞞無隙可通者先以鉛刀或金玉簪刺破脂膜急以油紙燃插入隔之不令再合或納蘇合丸導之

黑白散

蘇合丸 俱見大治方內

預防口噤撮口臍風三症及治之宜急論

小兒初生三急症曰口噤曰撮口曰臍風皆惡候也症雖有三病源則一此症發於一臘之內者方書雖有治療之法究竟百無一生其致病之由總在於臍臍者在兩腎之間與命門相通乃人之根蒂也衝任胃脈皆起於臍下任脈自中而上至于人中與腎脈合衝脈二道夾任脈而上散於舌下與脾脈合胃脈二道又夾任脈而上入於齦中上下往來如環無端小兒初生三脈方具而臍爲三脈之門戶干係尤重所以斷臍之時不可不愼或剪臍帶太短或結縛不固致外風侵於臍中或用鐵器斷臍爲冷氣所侵或浴時牽動水濕灌入生瘡客氣乘虛而入內傷於腎腎傳肝肝傳心心傳脾脾傳肺肺蘊蓄其毒發爲臍風等症面赤啼哭者心病也手足微搐者肝病也唇青口撮痰涎壅塞者脾病也牙關緊閉者腎病也啼聲不出者肺病也五症之中畧見一二症者病猶可治悉見萬無活理若能預防於未發之時急治於將發之際尚可挽回萬一凡小兒墮地視其臍帶軟者無病如臍帶硬直者即有臍風也或浴後綳裹停當即嘖噫連連者或臍下發出青筋或赤筋一道上行者或大便熱者一有見端即爲將發之候急抱兒向明處視其口中或上腭有泡或齒根有白點或有黃

筋或舌上白屑堆聚或舌下膜如榴子急遵挑口法（詳見上卷）刺之刮之拭之塗之再視兒臍下逆上之筋必生兩岔於岔行盡頭處安艾灸叁壯以截上攻之路更灸中脘叁壯（中脘穴在臍上三寸以兒左手中指屈曲節盡處爲度）再灸然谷穴叁壯（穴在內踝前起大骨下陷中）鍼入叁分不宜見血或再於承漿穴（在下唇稜下）頰車穴（在耳下頰骨後）各灸叁壯以洩其毒發之標此皆古人預防急治之良法也若不知早爲之計病變已重而藥之鮮克有濟矣爲兒父母者可不愼之於始哉

噤口

其候舌上生瘡如黍米狀啼聲漸小口吐白沫牙關緊急吮乳不得由胎熱內蘊風寒外襲故也見于七日及一月之內曰噤口見於百晬之內百二十日之後者曰噤風風噤其實一也

秘方擦牙散生南星貳錢去皮臍龍腦少許研爲極細末用指蘸合生薑汁放於牙根上擦之如不開者將藥調如稀糊含在不病人口中用通心筆管插入小兒鼻孔用氣將藥極力吹入其關立時卽開此法有通仙之妙不可不知

本草綱目方天南星壹枚煨熟紙裹斜包翦一孔透氣於口中牙關自開

搐鼻法鬱金藜蘆瓜蒂各等分爲末搐鼻中

聖惠方直殭蠶貳條去絲嘴畧炒爲末蜜調敷唇中

辰砂全蠍散辰砂伍分飛全蠍貳枚去毒龍腦麝香硼砂各壹分爲細末唾調搽唇裏及齒上

聖濟總錄取白牛糞塗口中

外臺秘要取東行牛口中涎沫塗口中及頤上

聖惠方牛口中齩草絞汁灌之

又方大蜘蛛壹枚去足炙焦研末入猪乳壹合和勻分作三服徐徐灌之

聖濟總錄牛黃壹字許爲末淡竹瀝調灌之更以猪乳滴之尤妙

千金方雞屎白如棗大綿裹以水壹合煮分二服

一方酒研灌之

又方雀屎水丸麻子大飲下貳丸

又方以猪乳飲之

撮口

口撮如囊也不乳啼低舌强唇青面黃赤色氣高痰盛乃心脾之熱受自胎中也若兼二便秘結手足抽搐厥冷者不治

五通膏生地黃老生薑慈白菜菔子活田螺肉各等分共搗爛敷臍四圍一指厚抱住久之屁洩而愈兼治臍風禁口

聖惠方小兒撮口看舌上有瘡如粟米大以指甲刮破取蜈蚣搗汁敷之如無生者乾者亦可用仍以厚衣包裹納母懷中取大汗出而愈兼治臍風

辰砂殭蠶散辰砂水飛伍分殭蠶壹錢去絲嘴炒蛇脫皮壹錢炒麝香伍分共爲末蜜調敷口中

備驗方蟬蛻貳拾枚去頭足全蜈蚣柒枚去毒爲細末入輕粉少許和研乳汁調服兼治噤口

聖惠方取蠶魚研末每以少許塗乳令兒吮之

又方兼治臍風撮口取鼠負蟲搗汁灌之按綱目曰濕生蟲俗名地雞地鼉形也者像

本草綱目治撮口用蝎牛伍枚卽負殼蟲也去殼研汁塗口中兼治臍風

愼齋全書治撮口用全蜈蚣壹箇酒塗炙爲末加入麝少許金銀花湯調服半匙兼治臍風

子母秘錄用夜合花枝煎濃汁拭口中并洗之

普濟方以初生豆芽研爛絞汁和乳灌少許

永類鈐方生川烏尖叁枚全足蜈蚣半條酒浸炙入麝香少許共爲末以少許吹鼻取噦仍以薄荷湯灌壹字兼治臍風

金匱玉函用生甘草貳錢伍分水壹盞煎陸分温服令吐痰涎後以乳汁點兒口中

簡便方艾葉燒灰填臍中以帛縛定隔蒜灸之候

口中有艾氣可愈兼治臍風撮口

錢氏方治撮口出白沫以艾灸口之上下肆壯鄒魚燒研酒調少許灌之仍捎兒手足

又方先灸兒兩乳中叁壯後以黑驢乳壹合以東引槐枝拾根叁寸長火煨一頭出水拭淨浸乳中取乳滴兒口中

醫通方急於顬門灸柒壯灸之不哭弔睛吐沫者不治

臍風

臍者小兒之命蒂也穴近三陰喜温惡涼喜乾惡濕如斷臍不知慎重爲水濕風冷之氣所傷致兒七日之內腹脹臍突啼不吮乳四肢柔直痰壅氣塞或面青吐沫若兼口噤撮口抽搐不止者神丹莫療也

頭治方小兒臍風噤口撮口等症其毒先現口中用刮口法畢以黃連半錢豆豉貳拾肆粒甘草叁寸葱白頭叁寸用童子小便煎綿蘸拭口中驅風散治兒腹脹臍腫啼不吮乳此臍風將發之候也急以此方治之用蘇葉防風陳皮薑炒厚樸麩炒枳殼煨木香殭蠶去絲嘴酒炒鈎藤鈎甘草各等分加生薑水煎服

稀涎散治臍風已成用此方以吐風痰蝎尾銅青各半錢硃砂壹錢臘粉壹字麝香少許共爲末

每服壹字茶清調下。

盪臍法麝香伍分置臍上浮萍草不拘多少用熱水蘸半熟蓋麝香上又用鹽半勺炒熱分兩袋盪於臍上冷更換壹袋如此一頓飯久即愈。

尊生書蜈蚣壹條蠍稍肆尾殭蠶柒箇瞿麥伍分研細末吹入鼻內候噴嚏啼哭爲可醫隨用薄荷湯調末服。

聖惠方用天漿子壹枚。按此蟲多生石榴樹上其背毛整人俗呼刺毛殭蠶壹枚炒膩粉少許研勻以薄荷自然汁灌之取下毒物名曰白龍膏。

辰砂膏辰砂叁錢牙硝硼砂各壹錢伍分全蠍壹錢珍珠壹錢麝香叁分元明粉壹錢伍分共爲細末蜜研膏塗乳頭上令兒吮之。兼治噤口撮口驚搐

備驗方巴豆壹粒不去油研爛透明雄黃壹錢研末和勻每用叁釐新汲井水調服下喉覺胸腹中有響聲大便下痰即愈。兼治鎖肛

鄧華峰雜興方用壁虎後半截焙爲末男用女乳女用男乳調勻入稀雞屎少許摻舌根及牙關仍以手蘸摩兒胸腹取汗出甚妙

青蒿蟲丸

紫霜丸俱見大治方內

以上治臍風噤口撮口各方通治三症者

居多互參採用可也三症必先用挑口法已然後藥之

臍濕

或因包裹不愼或因浴水入臍或因尿濕侵臍以致臍腫浸漬不乾曰臍濕不治恐成臍瘡臍風

摻臍散枯礬龍骨煅各貳錢麝香少許共爲末乾摻臍中

又方紅綿灰黃牛糞灰乾胭脂龍骨髮灰各伍分共爲細末濕乾摻乾清油調敷

又方當歸頭絳帛或舊錦燒灰胡粉各壹錢共爲細末入麝香少許同研乾摻臍中

葉墨散黃栢釜下墨亂髮灰各等分共爲細末每用少許敷之

胡粉散胡粉乾薑燒灰白石脂燒存性各等分共爲細末時時敷臍中

顱顬經燒絳蝎敷之

聖惠方枯礬敷之

又方屋爛草爲末摻之

活嬰方以甑帶燒灰敷之

姚和仲方用桂心炙熱熨之

千金方用猪頰骨髓拾貳條杏仁半兩研敷

聖濟總錄螻蛄甘草等分炙研爲末敷之

子母秘錄蜂房燒末敷之
活嬰方取螬蟲研末敷之
外臺秘要龍骨煅研末敷之
備驗方棉繭亂髮燒灰擦之

臍瘡

臍濕成瘡甚則赤腫濃血曰臍瘡宜速療之庶不致寒濕內攻也

心鑑方本兒落下臍帶錦帛裹燒研壹錢入當歸頭末壹錢麝香少許敷臍中治臍濕尤效
聖惠方臍瘡出濃血海螵蛸胭脂爲末香油調敷之

又方伏龍肝末敷之
準繩方枯礬龍骨煅各半錢研末敷之
千金方馬苋燒研敷之
子母秘錄臍瘡不合者黃柏末敷之
又方臍爛成風以杏仁去皮研敷之
外臺秘要蝦蟇燒灰加牡蠣煅等分敷之日三次
又方兒臍不合取車轄油脂燒灰敷之
活嬰方用棉子燒灰敷之
肘後方乾蝦蟇燒灰枯礬各等分共爲末敷之
金黃散川黃連胡粉龍骨煅各壹錢共爲細末敷之

異功散龍骨煅薄荷葉蛇牀子各貳錢輕粉伍分共爲末摻臍中

龍骨散龍骨輕粉各半錢黃連壹錢共研細摻之

愼齋方人參末黃牛糞灰乾胭脂各等分爲末摻濕乾摻瘡乾香油調敷

臍突

臍突一症謂斷臍不如法裹臍不致愼而使之然者非也此由母驚悸鬱結或恣食熱毒之物兒受其氣腹中蘊熱無所發洩頻頻伸引呃呃作聲努氣衝臍所以臍突腫赤虛大可畏此症忌敷寒藥恐寒凝熱毒反爲害也若由啼哭太過中氣努出者十居七八不必治漸自收

二豆散赤小豆不去皮豆豉天南星去皮臍白斂各壹錢共爲末用伍分水芭蕉汁調敷臍四旁日二次

慈貼法先以荆芥湯洗之再以慈葉火上微炙放地下出火氣以指甲刮薄搭放突處即消

聖惠方胡椒木鼈子仁各等分爲末和杵丸如菜豆大每服貳叁拾丸荆芥湯下

雷公方白茯苓車前子各壹錢陳皮通草各貳錢生甘草梢貳分水煎服兼治小便不通

臍血

兒初生多啼叫致臍出血者
準繩方白石脂炒研細末乾摻之不可剌揭俟其自落
天釣
胎熱蘊於心脾加以外夾風邪內熱不得發越而成其症壯熱痰壅驚悸抽搐眼睛上翻淚出不流症似驚風但目多仰視爲辨
直指方治目久不下眼見白睛角弓反張聲不出者用大蜈蚣壹條竹刀批開記定左右去頭足酥炙又以麝香壹錢研末包定每用左邊者吹左鼻右邊者吹右鼻各少許不可過多若眼未下再吹些須眼下乃止
聖濟總錄烏頭生用去皮臍芸薹子各貳錢共爲末每用壹錢新汲水調敷兒頂上
衛生簡易方用金牛兒（即蟬脫也）以漿水煮一日曬乾爲末每日用壹字冷水調下
聖惠方用壁魚兒（即蠹魚也）乾者拾箇濕者伍箇用乳汁和研灌之
又方取家桑東行根研汁服
又方全蠍叁箇硃砂如叁菉豆大和飯爲丸酒化服
牛黃散牛黃貳分硃砂叁分麝香半分天竺黃壹

錢蠍梢伍分鉤藤鉤壹錢其爲細末新汲水下鉤藤飲鉤藤鉤叁錢全蠍伍分犀角伍分羚羊角亦可天麻伍分生甘草貳分水煎服

內鉤

內鉤者肝臟有病外受寒冷所致其胸膈反張糞青潮搐腰曲腹痛口吐痰沫多啼多汗咬乳目瞪有類驚癎但目有紅絲血點爲異

乳香膏乳香伍分沉香壹錢爲細末將鮮石菖蒲鉤藤鉤煎湯下

心鑑方用硃砂壹錢乳香煨蒜各壹錢爲末研丸如黍米大薄荷湯下貳丸

木香丸木香乳香沒藥茴香各伍分炒鉤藤鉤貳錢全蠍壹錢先將乳香沒藥研勻後入諸藥末和畢取大蒜少許研細和丸桐子大曬乾每服兩丸鉤藤湯下

盤腸氣痛

其症腰曲腹痛腸鳴失氣口閉足冷下利糞青乾啼無淚額上有汗其致病之由或因寒邪團結於小腸或因妊婦憂愁思鬱心氣蘊結總屬寒結氣滯也

洗肚法全蔥壹大束煎湯洗其腹就以熱蔥熨其臍腹間

熨臍方見不大便

直指方用蘿蔔子炒黃研末乳香湯服半錢
又方用乳香沒藥等分爲末以木香磨水煎沸調服壹錢
保幼大全莪朮半兩用阿魏壹錢化水浸一日夜焙研每服壹字紫蘇湯下
川楝子散木香小茴香鹽炒去鹽各壹錢川楝子貳錢用巴豆貳粒同炒去巴豆不用共研末酒調服
白豆蔻散白豆蔻砂仁青皮陳皮炙甘草香附酒炒蓬莪朮各等分蠐螬尾量加薑壹片水煎服
此症有兼大便不通者參用大小便方

諸方治之

胎驚搐

母娠時調攝乖常醉酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外夾風邪有傷於胎子受母氣以致月內壯熱翻眼握拳噤口咬牙身腰強直嘔吐驚啼腮縮顱開或頰赤或面青等候當以疎風利驚化痰調氣主之百日內抽搐不止者謂之眞搐不治其假者因外傷風冷所致口中氣出熱也可發散而愈

噫驚散生半夏末壹錢皂角末半錢吹入鼻中少許卽甦一方加薄荷細辛等分名通關散吹之不醒者不治

貼顖法麝香壹分蠍尾伍分蜈蚣伍分去足炙牛黃叁分青黛叁分薄荷葉叁分右除牛黃先揭蠍尾等五味各取淨末入牛黃研細煮紅棗肉和成膏塗貼顖上四邊畧出一指以手烘煖頻頻熨之

斗門方硃砂新汲水塗五心最驗

鄧華峰雜興芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顖門塗四肢留手足心勿塗

經驗方全蠍壹箇以薄荷肆葉裹定火上炙焦同研爲末入硃砂麝香少許分作肆服麥門冬煎湯調下

太乙散天漿子去殼微炒牛膽製南星白附子炮天麻防風茯苓各貳錢全蠍硃砂各壹錢麝香少許共爲末每服半錢乳汁化下一方加人參壹錢

蚯蚓膏陳京墨貳錢硃砂叁錢麝香壹錢共爲末用蚯蚓頭上白漿和藥成丸重柒釐每服壹丸用金銀器燒紅淬入乳內將乳調藥服之

聖惠方五月內柳樹上蟬去翅足炙叁分赤芍藥叁分黃芩貳分水貳盞煎壹盞溫服三四次

直指方兼治胎癇琥珀防風各壹錢硃砂伍分爲末猪乳調壹字入口中

鎮驚散 硃砂研細入牛黃少許猪乳調稀抹兒口中

備驗方 治胎搐 因外感風冷所成者用葱頭柒枚生薑壹片擂細攤紙上合置掌中令熱急貼顖門以熱手熨之鼻利搐止

大青膏 治胎搐 因傷風得之口中氣熱呵欠煩悶手足動搖者天麻末壹分生白附子末壹錢半蠍尾去毒生末烏梢蛇肉酒浸焙研各伍分青黛壹錢硃砂天竺黃末各叁分蜜和成膏月中兒服菉豆大薄荷湯下

紫霜丸 治傷食後發搐身温多涎多睡不思乳食

見大方 治

保命丹 見急驚

辰砂膏 見瞤風

加味導赤散 見不小便

抱龍丸 見大方 治

牛黃散 見天釣

青蒿丸 見大方 治

胎癇

此症眼直目牽口噤流涎腹膨搐搦背項反張腰脊强勁形如死狀或一二時始醒小兒之惡候也受母氣之偏者不治爲風邪所束者可醫

仁齋法癇症方萌耳後高骨開當有青紋紛紛如線見之則爲爪破須令血出啼叫先得氣通爲妙

羌活膏用羌活、獨活、各伍錢、天麻、全蠍、白殭蠶、各貳錢伍分烏蛇肉伍錢酒浸一宿焙麝香叁分人參去蘆貳錢隨宜用其揭羅爲細末煉蜜和膏每服皂子大荆芥湯化下

天南星煎天南星微炮、白附子、白花蛇酒浸去皮骨炙黃各壹兩已上揭羅爲細末用好酒兩大盞慢火熬不住手攪以酒盡爲度次用硃砂水飛伍錢臘粉貳錢伍分牛黃、麝香、龍腦、各半錢研細入膏內和如皂子大每服壹粒竹瀝化下

按準繩此方有乾蝎天麻各五錢

聖濟錄大石榴壹枚去頂剜空入全蠍伍枚黃泥固濟煅存性取中焦者爲末每服半錢防風湯下

直指方琥珀、硃砂、各少許全蠍壹枚爲末麥冬湯調下壹字

聖惠方棘枝上雀甕研其開蟲出取汁灌之

聖星丹見後癇症

胎寒

母受寒邪或過食生冷致兒口冷腹痛多啼腸鳴下

利寒慄時發握拳曲足因胎中受寒所致也

白芍藥湯白芍藥壹錢澤瀉捌分甘草肆分薄桂叁分薑水煎虛加人參木香發驚加鉤藤鉤肘後方治晝夜多啼以當歸末壹小豆許以乳汁灌之日夜三四度

和濟方治胎寒腹痛薑黃壹錢沒藥乳香研去油各貳錢爲末蜜丸芥子大每服壹貳丸鉤藤湯下

聖惠方治腹痛汗出用衣中白魚貳拾枚絹包於兒腹上回轉摩之以愈爲度

胎熱

母多驚恐或食熱毒之物生後旬日之間兒多虛痰氣急喘滿眼閉目赤目胞浮腫神困呵欠吸吸作聲遍身壯熱小便赤大便閉時驚煩總因胎中受熱所致也

衛生要訣以葱涎入香油內抹小兒五心頂背等處善解毒涼肌

又方以秋梨拾箇取汁熬熱飲之

聖惠方瓜蔞根末乳汁調服半錢

全幼心鑑黑豆貳錢生甘草壹錢燈心柒寸淡竹葉叁片水煎服

錢乙方眞牛黃壹豆大入蜜調膏乳汁化開時時

滴兒口中形色不實者勿多服亦治胎黃

育嬰家秘黃連炙甘草各等分爲末入硃砂少許和勻生蜜調成劑每取豆許納兒口令咽下

地黃膏山梔仁菉豆粉各壹兩伍錢甘草陸錢共爲末聽用以生地黃壹兩伍錢杵爛和蜜壹兩伍錢盛薄瓦器內在銅銚中隔水煮成膏與稀糊相似候冷入前藥末同在擂鉢中再研勻丸如芥子大每服壹丸麥門冬湯化服

青蒿丸見大方內治胎黃

小兒生下遍身面目皆黃狀如金色壯熱大便難通小便如梔汁乳食不思啼哭不止此胎黃之候皆因母受濕熱而傳於胎也

子母秘錄韭根搗汁日滴鼻中取黃水爲效

肘後方杜赤豆秫米雞屎白各貳分搗篩爲末分三服黃汁當出

普濟方青瓜蔞焙研每服壹錢水半盞煎柒分臥時服五更瀉下黃物立愈

正元廣和方秦艽貳錢人乳半鍾水壹盞煎半盞去滓温服按秦艽宜酌減

錢乙方見胎熱

蘇頌圖經土瓜根生搗汁叁合與服

總微論。胡黃連、川黃連、各伍錢爲末。用黃瓜壹箇。去瓤留蓋。入藥在內合定。麵裹煨熟。去麵搗丸菉豆大。量兒强弱與之。溫水下

地黃湯 生地黃、赤芍藥、天花粉、赤茯苓、川芎、當歸、猪苓、澤瀉、生甘草、茵陳、各等分。水煎。子母俱服之。

胎肥胎怯

兒生下。肌肉厚。遍身血紅色。彌月後漸漸羸瘦。目白睛粉紅色。五心煩熱。大便難。時時生涎。此胎肥症也。兒生下面無精光。肌肉薄。大便白。水時時嘔氣多噦。目無神采。此胎怯也。古法兩症皆用浴體法。以疏通腠理。

浴體法。天麻貳錢。蠍尾去毒。硃砂。各伍分。烏蛇肉酒浸焙乾爲末。白礬。各叁錢。麝香壹字。青黛叁錢。共研勻。每用叁錢。水叁碗。桃枝壹握。并葉伍柒枝同煎至十沸。溫熱浴之。勿浴背。

赤遊風

此症或受胎中熱毒。或生後過於溫煖。以致熱毒外發。皮膚赤熱而腫。色若塗丹。遊走不定。行於遍身。故曰赤遊風。發於頭面四肢而內歸心腹者不治。

證治準繩十二件單方。水苔、生地黃、生菘菜、（卽白菜也）蒴藿、（卽烏頭苗也）愼火草、（卽景天也）浮萍、豆豉、大黃、梔子、

黃芩硝石豆葉以上十二味。得一味和水搗貼之即瘥

簡易備驗方。治十種丹瘤。一治從頂頭起腫。先用葱白研取自然汁塗之。二從頭上紅腫痛。用赤小豆末雞子清調抹。三從面起赤腫用竈心土雞子清調搽。四從背起赤點用桑白皮研末羊脂調搽。五從兩臂黃色用柳木燒灰水調敷。六從兩脇虛腫用生鐵屑和猪糞調敷。七從臍上起黃腫用檳榔爲末米醋調敷。八從兩脚赤腫用乳香末羊脂調敷。九從兩脚有赤白點用猪槽下土麻油調敷。十從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調敷。

千金方。取屋塵和臘猪油敷之。

又方。用唾和胡粉。從外至內敷之。

又方。取煅鐵屎研末猪脂和敷之。

又方。用大豆煮汁塗之。

又方。治丹毒從兩股走及陰頭。用李根燒爲末。以田中流水和塗之。

又方。水煎棘根洗之。

又方。治丹毒從髀起流下陰頭赤腫出血。用鯽魚肉伍合。赤小豆貳合。擣勻入水和敷之。

衛生簡易方。取向陽燕窩土爲末。雞子白和敷。

陳氏本草燒鐵淬水飲壹合

子母秘錄用藍靛敷之

楊氏產乳方治丹毒從兩股兩脇起用景天草搗如泥入眞珠末塗之乾卽易

全幼心鑑菉豆伍錢大黃貳錢爲末用薄荷汁入蜜調敷

又方丹瘤初發急以截風散截之白芷寒水石爲末生葱汁調敷

譚氏方胡荽汁塗之

廣利方用馬蒐搗塗

簡要方以生菜菔汁塗之亦可灌服數匙更以菜菔渣絹包烘煖熨之

又方以水芭蕉根搗汁塗之

刪繁方以蟑蟟蟲搗塗之

奇方用竈馬卽俗呼樟木蟲在竈內尋出活的去頭以白漿擦上不過數次卽愈

本草綱目猪肉切片貼之

修眞秘旨用蔴麻子伍箇去皮研入麪壹匙水調塗之

外科精義以木鼈子仁研如泥醋調敷之一日三五次

神功散用黃栢生草烏各等分爲末以啾口水調

敷頻以漱口水潤之

砭血法口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者將筋頭劈開夾住以線縛定兩指輕撮筋梢令磁鋒對聚血處再用筋壹根頻擊刺出毒血砭後毒甚者以神功散敷之毒輕者砭後不可用恐皮膚既破草烏能作痛也如患在頭者不用砭法祇宜臥鍼倒挑患處出毒血則愈百日內者忌砭血以其肌肉難任也

夜啼

其症有二一曰脾寒一曰心熱心熱如面色青白手腹俱冷不欲吮乳曲腰不伸者脾寒也面赤唇紅身腹俱熱小便不利煩躁多啼者心熱也分別治之

本草綱目燈花貳叁顆燈心湯調抹乳上令兒吮之

簡易方用燈草灰辰砂末少許塗乳令兒吮之

又方燈花柒枚硼砂壹字辰砂少許蜜調塗兒唇上

全幼心鑑蟬蛻拾玖箇去前截用後截爲末分四服鉤藤湯下或薄荷湯下之

塗乳方眞牛黃飛過辰砂極細末各半分塗兒舌上

聖惠方以乳香壹錢燈花柒枚爲末每服半字乳

汁下。

又方。以猪矢燒灰。淋汁浴兒。并以少許服之。

聖濟總錄。劉寄奴貳錢。地龍炒壹條。甘草壹寸。水煎服。

導赤散 見弄舌

生生編。用青黛量兒大小研服之。

又方。用黑牽牛末壹錢。水調敷臍下。以上治心熱方

總驗方。竈心土貳兩研。雞子壹枚和水調勻。塗兒五心及頂門。

普濟方。以伏龍肝貳錢。硃砂壹錢。麝香少許。蜜丸菉豆大。每服伍丸。桃符湯下。

又方。硫黃貳錢半。鉛丹貳兩。研勻。瓶固煅過。埋地中七日取出。飯丸黍米大。每服貳丸。冷水下。此方不可輕用

本草綱目。取梳頭垢少許服之。以上治脾寒方

楊氏方。用淡豆豉、竈中土、蚯蚓糞入醋杵搗和丸如雞卵大。摩兒頂心顖門及手足心并臍上下各七次。擘開有毛棄之。

聖濟總錄。以馬蹄末敷乳上飲之。

姚和仲方。取虎眼壹隻。爲散。以竹瀝調少許與喫。以上通治寒熱方

集簡方。取燒尸場上土。置枕邊。

聖惠方取明鏡挂牀腳下毋令人知
拾遺方用井口邊草私著席下勿令母知
生生編用本兒初穿毛衫放瓶內自不哭也
日華本草取雞窠中草安席下勿令母知
本草綱目取猪頸下毛絳囊盛繫兒背上
食療本草取牛屎壹塊安席下勿令母知
經驗方摺父之褲與兒作枕
又方雞屎塗兒臍中男雄女雌
又方硃書田字於兒臍下
又方硃書甲寅二字貼牀頭
又方五倍子爲末津唾調塡臍內書小兒父名貼之

又方仙人杖取叁尺安兒睡處勿使人知此杖即笋欲成時立死者
又法用紙寫天蒼蒼地皇皇我家有箇夜啼郎來往君子念一遍小兒睡到大天光書此貼此總不要四眼見須貼在大路旁人易見之處
又法用柴頭壹箇長肆伍寸削平一面硃砂寫云撥火杖撥火杖差來捉神將捉著夜啼鬼打死不要放急急如律令以上壓勝法

鵞口

初生口內白屑滿舌拭去復生重則滿口白斑時吐

白沫。咽閒疊疊腫起。難乳夜啼。心脾二經胎熱上攻所致。

洗法。急以毛青布裹指頭蘸薄荷汁。或甘草、黃連、各壹錢煎汁。或新汲水、拭淨白屑。如不脫。選方治之。

集效方。天南星醋調。敷腳心。乾則潤之。兼治重腰重齦。

又方。吳茱萸末。米醋調敷腳心。

聖惠方。以白苾末。乳汁調塗足心。

四寶丹。用雄黃叁錢。硼砂壹錢。甘草壹錢。氷片貳分半。研末摻之。或用蜜水調敷之。

青液散。青黛、樸硝、各壹錢。龍腦壹字。硼砂少許。共研細末。鵝翎挑少許。掃舌上。

大全方。用黃丹研細。竹瀝調塗口中。其白點即落。一日塗三四次。再用辰砂益元散。滑石陸錢。甘草壹錢。辰砂少許。燈心湯調下。

又方。用鷰糞泡湯。拭洗口內。

子母秘錄。用桑白皮汁。和胡粉敷之。

活幼新書。用雞脞黃皮燒末。和水服之。

姚和仲方。以馬牙硝擦舌上。日五度。

普濟方。白枯礬壹錢。硃砂貳分。爲末。以少許敷之。日三次。

又方用赤小豆末米醋和塗之
聖惠方甑帶燒灰敷舌下兼治重舌
集簡方以坯子胞脂乳汁調塗之男用女乳女用男乳
千金方柘根伍觔剉水伍升煮叁升去渣煎取伍合頻塗之無柘根弓材亦可兼治重舌
正傳方白楊樹枝燒取瀝塗之
簡易備驗方白殭蠶炒黃爲末蜜和敷之
永類鈐方鵝口瘡自內生出者可治自外生入者不可治用食草白鵝下清糞濾汁入沙糖少許搽之或用雄鵝糞眠倒者燒灰入麝香少許搽之

懸癰
初生小兒上腭腫起或如蘆薹盛水之狀或如紫李墜下抵舌名曰懸癰胎中熱毒也急宜刺破癰頭令泄去青黃赤汁再生再刺刺破後以鹽湯洗淨用藥摻之
一字散用硃砂硼砂各伍分龍腦樸硝各壹字共研末蜜調搽口內
大全方食鹽煅研枯礬各等分研細水調以筯頭蘸點患處
重腭

上腭層疊腫硬者急宜長鍼刺之甚則上腭成瘡如黃粟口中腥臭皆脾經蘊熱也

必效方先以蚌水布蘸絞淨以一字散方見懸癰搽之取蚌水法將蚌洗淨打碎用濕棉布濾清水用之不可用疎夏布恐布孔疎蚌中螞蝗蟲濾在水中也此方通治口舌咽喉諸熱症甚效

天南星散以天南星生去皮臍研細末用醋調塗男左女右腳心厚皮紙貼如乾再用醋潤之

聖惠方用蛇脫灰醋調敷之

集效方敷法見鷲口

重齦

初生兒貼著齒齦有物脹起者是也由脾胃蘊熱所致急以鍼刺去腫處惡血以鹽湯洗之再生再刺治參懸癰重腭法

錢氏方人中白煅研末擦之

備驗方桑樹上用斧斫二三下少時其漿流出取搽腫處

集要方白芷壹錢硃砂伍分研末擦齦上

集效方敷法見鷲口

牙關蟲

初生兒哭乳不穩壯熱色赤鼻孔黃急看牙關如有蟲似蝸牛又似黃頭白蚌螺如法治之即瘥

證治準繩方。用竹瀝半合。和少許牛黃服瘥。
又方用猪肉拭口其蟲卽去。

吐舌

吐舌者伸長而收緩也面赤煩啼口渴尿赤因心經有熱也

導赤散木通伍分。生地黃伍錢。黃連參分。甘草梢伍分黑山梔壹錢伍分。淡竹葉壹錢。燈心伍拾寸煎服

大全方以牛黃少許塗舌上卽止或點氷片少許亦效

愼齋全書方見弄舌

弄舌

舌如蛇餂左右上下伸縮動搖謂之弄舌因心脾有熱以致唇焦舌乾煩啼便穢也

愼齋全書用川黃連煎湯細細與服輕者燈心湯亦可並治吐舌

瀉黃散用藿香葉、山梔子、熟石膏、防風、生甘草、燈心、竹葉湯煎或兼導赤散見吐散各半服

重舌

心脾蘊熱則氣血俱盛腫附舌根其狀如舌下又有一小舌故曰重舌也當以鍼刺之出血然後與藥用線鍼刺患上向旁挑之不可深刺正中主筋之上也

聖惠方元精石貳兩牛黃硃砂氷片各壹分共研末以鍼刺舌上去血鹽湯洗摻末敷之

又方伏龍肝末牛蒡子汁調塗之

又方皂角刺灰入樸硝或腦子少許洗口摻入舌下涎出自消

又方桑根白皮取入土者搗汁飲之

千金方取釜下土和苦酒塗之

又方黃栢浸苦竹瀝點之兼治木舌

又方衣魚燒灰敷舌上

又方取三家屠肉切指大摩舌上兒立啼

子母秘錄木蘭皮卽木蘭樹皮也壹尺廣肆寸削去粗皮入醋壹升漬汁嗽之

又方蜣螂蟲末唾和敷舌上

簡易濟衆方以亂髮燒灰半錢敷舌上

普濟方以竹瀝同芒硝點舌上

木草綱目半夏和醋煎洗之木舌同治

聖惠方

千金方俱見鵝口

木舌

舌尖腫大塞滿口中硬不能轉動故名木舌也由心脾積熱上沖而成急刺之出血若舌胎堅硬藥味不得入者用竹刀輕輕刮去舌胎拭淨然後用藥此證

不可用手按之按則舌根乃損長成言語不正

吹鼻法舌腫滿口或吐出在外難以納藥者用獨蠶牙皂俱製過爲末用少許吹鼻中口自開頑痰自出用筋繞綿綿蘸甘草湯潤其舌然後用藥敷之

大生要旨用草蘇子肉搗爛以棉紙取油將紙摺成條點火吹滅以煙薰之即消若舌下有如蝼蛄或如臥蠶者急於腫處砭去血仍用釜底灰以鹽醋調敷或井水亦可脫去再敷

寒氷散用生石膏氷片少許共研末敷舌上如出血石膏炒焦用

直指方以蜀葵花壹錢黃丹伍分共爲末敷之

本草綱目以半夏貳拾枚水煮過再炮片時乘熱以酒壹升浸之密封良久熱漱冷即吐之

千金方舌長大塞口取鯉魚肉切片貼舌上

又方蛇脫燒灰乳和服少許

局方用蒲黃末頻刷舌上自消

大全方蜜炙黃連白殭蠶各等分共研末摻舌上

又方生薑切片蘸硼砂擦之

又方冬青葉煎濃汁浸之

又方百草霜海鹽各等分研末井華水調下

必效方皂礬不拘多少新瓦上火煅變紅色放地

上候冷研細末擦舌上

千金方點法見重舌

膜舌

初生小兒有白膜裹舌或遍舌根急以指甲刺破出血否則其兒必啞

姚和仲方刮破舌膜令出血即以燒白礬半菜豆許敷之若血出不止燒髮灰摻之或同猪脂塗之

含腮

小兒初生時腮內如米豆大一小瘡次日漸大蝕破腮頰故名含腮若不早治破透難療

二金散用雞內金鬱金各等分研細末先用鹽湯洗淨吹之

疙腮

兒初生兩腮腫硬有核或在一邊名曰疙腮因妊恣食厚味或鬱怒不解以致鬱熱在內兒受之以成此證不治恐成腮癰

敷疙腮法桑柴灰少許入雄雞冠血叁肆滴加鹽滷壹匙和勻頻搽患處

又方皂角貳兩去核天南星貳錢生用糯米壹合爲細末薑汁調敷

又方芙蓉葉不拘多少搗敷之以帛紮定一日一

換。

神驗方。以赤小豆爲細末。新汲水調敷赤腫處。乾則再敷。

大全方。大黃末加薑汁少許敷之。空頂透氣。

又方。霜後絲瓜煅存性。猪膽汁調敷。

又方。黃柏、鉛粉、各等分。研勻。涼水調敷。

又方。染坊靛花頻敷之。

又方。胰皂同沙糖搗敷。紙蓋留頂出氣。

又方。猪膽汁入生薑汁少許和勻。磨陳京墨敷之。

又方。扁柏葉搗汁調蚯蚓泥搽上。

又方。用百合壹兩。大貝母、山芝蘇根去皮、元明粉、各壹錢。銀硃柒分。白麵少許。同搗敷。

螳螂子

大生要旨曰。邇年來吳越間。新產月內小兒。有口噤不乳。啼聲難出。兩腮腫硬。名謂螳螂子。熟諳穩婆。將利刃於口內兩腮剖開。撿出堅光惡肉。形頗肖桑螵蛸。傷處據云搽以胎骨珍珠散。兒便能乳而愈。若割治少遲時刻。則腫延喉鼻。不可救矣。亦有不諳割壞者。余實目睹。考之方書。從無此說。詢之幼科專家。亦盡茫然。舍刀法竟無方藥。不知病始何時。割自何人。因病可傷生。爲害甚速。附識於此。以俟知者。徐靈胎曰。自古無螳螂子之病。凡小兒蒸變之候。每有口內

微腫惡乳之時名曰妬乳不治自愈或不能坐視以藥塗口亦易愈近日濱海妖婦造割螳螂子之法以騙人取利強者幸愈弱者多死受其害者甚多也蓋小兒兩頰頤內有內外皮兩層中空處有脂膜一塊人人皆然割去之法妖婦以此惑人人見果有螳螂子者遂相信不疑死而不悔深可憐憫今爲之大聲疾呼愼勿被其愚而受其害也徐氏此說實爲近理閱外科全生集已有治法依方施治無不效者烏用割爲愼之戒之

搽口方青黛壹錢元明粉叁錢硼砂壹錢薄荷伍分冰片壹分共研細末和勻擦兩頤內日用四五次立愈

全生集用生地黃伍錢大黃壹錢陳酒浸取出共搗爛塗兒足心男左女右用絹縛好乾卽易愈乃止

爛眼

胎中蘊熱生後毒熱上攻於目以致痛癢難睜胞邊赤爛此名爛眼

簡易備驗方小紅棗貳箇去核入明礬裝滿濕紙包裹火煨候礬化去紙同黃連壹錢水壹鍾煎半鍾去渣澄清將薄綿紙浮藥水上取紙上清水洗每洗一次必易一紙

又方杏仁叁粒去皮尖搗爛加銅綠黃豆大壹塊爲末和勻將新青絹包此一味用井水壹酒盞浸片時待水有綠色不時洗眼至一二日後自愈須先用皮硝煎水洗過再用此方洗之

衛生要訣用猪膽汁和鹽點之

又方桑葉紙卷燒煙薰鼻

生地黃湯爛眼赤眼血眼皆宜服此方見目不開

赤眼

兒初生赤眼此胎熱也或因洗浴不潔穢汁浸眼皆中至長不痊名胎赤眼

心鑑方胡黃連末茶調敷手足心

眞金散黃連黃柏當歸赤芍杏仁用乳汁浸一宿曬乾爲極細末用生地黃汁調點之更用荆芥煎湯温洗

普濟方羊肝切薄片井水浸貼

又方小兒吐出蛔蟲貳條磁盖盛之紙封口埋濕地五日取出化爲水磁瓶收貯每日用銅筋點之

聖濟方銅綠壹分蜜半兩於蚌殼相和每夜臥時水洗眼炙熱點之能斷根

古今錄驗方淡竹瀝點之或入人乳效

小品方人乳浸黃柏點之

濟急仙方。杏仁壓油壹合。食鹽壹錢。入石器中。以柳枝壹握緊束。研至色黑。以熟艾壹團。安碗內燒烘之。令氣透火盡即成。每點少許入兩眥甚妙。

木事方。大黃、白礬、各等分爲末。同冷水調作餅子。貼眼立效。

血眼

初生艱難。血浸瞼睫。遂濺滲其睛。以致瞳人不見。或上下弦爛。

全幼心鑑。杏仁貳枚。去皮尖。嚼乳汁叁伍匙。入膩粉少許。蒸熟絹包頻點。重者加黃連、樸硝、大全方。治兒百日內乳嗽不愈。以致血脈貫瞳兩眶紫黑。或眼白珠紅赤如血。亦名血眼。當用生地黑豆共研成膏。掩於眼上。則眶黑自消。血隨淚出自愈。

血淚

小兒雙目流血。乃胎火胎熱所致。宜涼肝導赤。兼以鯽魚煨湯喂之自效。

涼肝導赤湯。生地黃叁錢。丹皮貳錢。澤瀉、赤茯苓、炒山梔、人中黃、赤芍、木通各壹錢。燈心念寸爲引。水煎服。

活幼新書。兒目濇不開。或出血者。方見目不開

鼻塞鼻乾鼻涕鼻齆

小兒初生忽然鼻塞不能吮乳開口呼吸者或因乳母夜睡鼻息吹兒顖門或因風寒外入停滯鼻閒則成鼻塞或火升熱鬱則成鼻乾或津液不收則多涕濃涕結聚則成鼻齆

葱薑貼法葱頭柒枚生薑壹片共搗爛攤紙上置掌中合荷温貼於顖門其邪即解揭去後仍用絹緞寸餘塗以麵糊仍貼顖門永無傷風之患

通關散香附子、川芎、荆芥穗、細辛葉、猪牙皂角、殭蠶各等分入葱白搗成膏用紅綿攤貼顖門

葱涎膏全葱研爛將猪牙皂角爲末和勻成膏貼顖門、

得效方天南星炮爲末水調貼顖門手熨之

聖惠方零陵香壹兩羊髓叁兩銚內慢火熬成膏去滓日摩背上三四次

外臺秘要醍醐叁合木香、零陵香、各肆分湯煎成膏以塗顖上并塞鼻中

大全方通草北細辛、各等分研末以綿裹藥如棗核大納入鼻中一日二次以上治鼻塞

普濟方治鼻乾用黄米粉、生礬各壹兩每以壹錢調貼顖上日二次

又方治鼻流濃涕兼治鼻乾枯礬、血餘灰、等分爲

末青魚膽汁拌爲餅陰乾研細吹鼻中

簡易備驗方治鼻齆瓜蒂藜蘆各壹分皂角半分麝香少許爲細末頻吹之

聖惠方治鼻齆有熱者龍腦半錢瓜蒂拾肆箇赤小豆叁拾粒黃連叁大莖去鬚共研末吹鼻中

膚裂血出

或受胎熱或過溫煖內熱外洩也

尊生書以唾津磨鐵繡敷之卽止

肚皮青黑

小兒百晬內忽然肚皮青黑乃氣血失養風寒乘之危惡之候也百晬外亦有此證

簡易備驗方以好燒酒和胡粉敷之（胡粉卽婦人搽面之鉛粉也）

保幼大全大青爲末納口中以無灰酒送下

灸法灸臍左右上下各半寸并鳩尾骨壹寸凡五處各叁壯

遍身腫泡

小兒初生遍身發泡如魚脬光如水晶破則成水流滲又生者胎毒也

急救方蜜陀僧研末摻壓之內服蘇合丸（見大治方）

體如水晶

初生小兒胸腹忽然如水晶色臟腑皆見俗名蝦蟇

瘟

大生要旨熨法取大蝦蟇陸隻將四腳紮起以蝦蟇肚皮在水晶色處撫摩多次置兒臍上再用第貳隻如前法更換陸隻其病即痊蝦蟇眼皮內有蟾酥須防其迸出射人以絹遮其眼額用畢將蝦蟇放野池邊不可害其生也

遍體如鱗

芽兒皮膚如蛇皮鱗甲之狀由於氣血否澁亦曰胎垢又曰蛇體

保幼大全用白殭蠶去絲嘴爲末煎湯浴之一如蛇脫

腎縮入腹

一臘之內腎縮入腹乃初生受寒所致

聖惠方用吳茱萸、硫黃各半兩同大蒜研塗其腹仍以蛇牀子煙薰之

陰囊腫墜

初生陰囊光腫墜下不收有皮潰而核欲墜者

小品必效方用紫蘇爲末患處濕則乾摻之乾則香油調塗之神效

大小便出血

兒生一臘大小便出血乃胎中受母蘊熱之氣所致

全幼心鑑生地黃汁伍柒匙無灰酒半匙蜜半匙

和服。

簡易備驗方。生蒲黃、油頭髮燒灰、各壹錢爲末。或生地黃汁或米飲調服。

又方。治大便出血。鼈頭壹枚。炙令黃黑爲末。米飲下。

又方。治小便出血。小甘草壹錢。炙黑研末。生地黃汁調服之。

手拳不展

小兒所受肝氣怯弱。致筋脈攣縮。兩手伸展無力也。薏苡丹用薏苡仁湯浸去皮研細。當歸酒洗焙。秦艽、防風、棗仁炒、羌活、各等分。共爲細末。如龍眼大。每服壹粒。以荆芥湯入麝香少許化下。

衛生要訣用性急子（卽鳳仙子也）爲末。酒煎洗一日。次日以當歸鉤藤水煎洗。如法互易。

又方。用鳥雀爪燒灰。酒調搽手心。

腳拳不展（附足指向後）

兒在胞胎母臟腑有積冷。或爲風邪所乘。生後血氣未榮。故腳指拳縮不展。或因母娠時。因病不能行步。日惟盤坐。子母一氣相通。形隨氣化。故亦如是。

必效方。海桐皮、當歸、人參、牛膝酒炒、牡丹皮、熟地黃、補骨脂、獨活、各等分。共爲末。和勻。每服壹錢。用葱白叁寸。薑壹片。煎湯調服。

衛生要訣用牛膝叁勿黃酒拾伍勿煎叁炷香日以酒洗足

又方用轎夫鞾底燒灰每日酒調服之

大生要旨治足指向後用軟綿捲如棍子紮兒膝後灣內再用木瓜湯常常洗熨之日久筋長舒展則自能伸也

胎毒

胎毒者非尋常瘡癬比也父母楊梅蘊毒所遺或房術熱藥所感中於先天有生之初身現紅點或因熱湯洗浴烘薰衣物外熱觸動內毒暴發忽然頭面腹背手足等處斑爛膿血最難救治若早治得宜可保十之三四切勿惟從外治致毒內攻卒成不救也

外科正宗治小兒受父母霉毒赤剝斑爛以土茯苓熬濃汁調人中黃末每日數次共服錢許為妙用後用幼科良方外搽法治之宜早遲則遍身皆瘡百不一治矣

清涼膏見初生無皮

陳遠公治法小兒初生或半歲或一二歲胎受惡毒身發大瘡內治用金銀花貳兩生甘草天花粉黃蘗錦地羅各叁錢人參貳錢水煎服貳劑外治用蝸牛生甘草兒茶樟腦黃丹水粉枯礬各叁錢冰片輕粉各壹錢地龍糞伍錢麝香叁

分共爲細末麻油調敷輕者單用煎方重者內外合治無不可救也按煎方分兩宜酌減

幼科良方內用眞西黃叁分硃砂水飛雄黃各柒分乳香去油沒藥去油各伍分麝香壹分山慈姑壹錢共爲末蜜丸重叁分金銀花湯每日調服壹丸取愈外用搽方白蘆甘石煅過淬入黃連汁內叁次童便內肆次壹兩赤石脂煅壹兩紫甘蔗皮燒灰存性兒茶各伍錢黃柏將猪膽汁塗炙柒次柒錢眞萊豆粉炒叁錢氷片伍分共研細用麻油入雞蛋黃壹枚煎黑去滓候冷調搽取愈

大全方以鼈甲煅存性研細麻油調敷

又方兒茶伍錢焙研犍猪膽汁調勻煎滾冷定將瘡用甘草湯洗淨敷之

秘方鮮半邊蓮搗汁掃上以渣煎湯洗之

又方以慎火草搗汁搽之

胎瘡

小兒胎瘡因娠婦飲食之毒七情之火兒受其氣發而爲瘡或靨或片頭面腹背四肢發無定所雖較胎毒爲輕然乳母必當戒發物當忌慾後乳子不然非易言愈也

湯氏方春用柳條荊芥夏用棗葉槐枝秋冬用苦

參煎湯洗胎瘡癬

尊生書乳母服藥方苦參貳錢羌活捌分甘草肆分連翹防風荆芥牛蒡子金銀花各壹錢共和水煎服十劑

簡易備驗方生甘草金銀花各壹兩眞牛黃壹錢爲末每服貳叁分乳汁調下

得效方黃芩黃連白礬俱生用雄黃各伍錢松香貳錢爲末養甚加銅綠貳錢乾摻患處或用香油調敷之疥瘡宜加枯礬叁錢

尊生書不拘何處以桐油調胡粉塗之

又方用大黃捌兩甘草肆兩當歸貳兩樸硝貳兩共研濃汁以青布作小衫二件藥汁煮收入陰乾早晚換服再煮以愈爲度

經驗良方治胎瘡滿頭用水邊烏桕樹根曬研入雄黃末少許香油調搽

外臺秘要以葵根燒末敷之

必效方松香貳兩蛤粉伍錢青黛貳錢半爲末用桕燭油調敷或乾摻之或加輕粉枯礬各叁錢

胎癬

胎中受毒落草受風致生妳癬或起眉端或生頭頂延至遍身早治易愈

保幼大全用葉本煎湯浴之并以浣衣又方以殭

蠶不拘多少去嘴研末。煎湯浴之。

直指方。以猪脂和輕粉抹之。

千金方。蛇牀子杵末。和猪脂塗之。

聖惠方。先以葱鹽湯洗淨。用桑木蛀屑。燒存性。入輕粉等分。香油和敷之。

外臺秘要。用蟾酥燒灰。猪脂和敷。

儒門事親。用白膠香、黃柏、輕粉、等分爲末。羊骨髓和敷。

奇方纂類。先用粗碗一隻。以厚綿紙糊口。刺眼一二十。將細米糠壹合。高堆在紙上。中開一窩。將炭火種放在內。燃著糠。候燒勿至紙。卽去糠。取碗內煙油。用麻絲刮破癬搽之。

文蛤散。治搔癢不絕者。用文蛤肆兩。輕粉伍錢。點紅川椒貳兩。先將文蛤打碎。入鍋內炒黃色。次下川椒同炒黑色。煙起爲度。入磁器封口存性。次日入輕粉研爲細末。香油調搽。

烏雲膏。用松香貳兩。硫黃壹兩。研勻。香油拌如糊。攤毛青布上。半指厚。捲緊成條。用線密紮。再用香油泡一日。取出刮去浮油。以火點著一頭。朝下。用碗接之。布灰陸續剪去。將滴下油浸冷水中一宿。出火毒搽之。

紅絲瘡

紅絲瘡者。雖非丹胎。其毒實同。多生於兩手中指上。男左女右。則尤甚也。其狀但一水泡。清澄光瑩。如小雞頭大。其底下濈濈然數十小鍼孔。不癢不痛。都無妨礙。邊旁有一絲脈。如紅絲隱隱在皮裏。其行甚速。循臂而上。過肘則危。至心則死。人多不知此病。芽兒患此害命。父母尚以爲死於急驚。豈不冤哉。有此症者。急以鍼迎頭挑斷出血。病者知痛則可救。若挑至骨亦無生血者不治。

救急良方。挑破出血後。或控耳塞封之。或嚼白梅封之。或用葱白搗爛敷之。加綿紙覆之。或嚼浮萍草敷之。絲即不行而愈。

聖惠方。急就其泡上灼艾數十壯。仍於絲上數處挑斷。得生血乃生。

猴疳瘡

猴疳者。狀如圓癬。色紅。從臀而起。漸及遍身。四圍皮脫。中露赤肉。若猴之狀。乃胎中毒邪。畜於腎臟而發。不急治必死。此證切忌洗浴。只用軟綿帛蘸甘草湯揩淨用藥。

醫通方。大川連、生甘草、各陸分。乳香、沒藥、並炙、雄黃水飛、各肆分。青黛研淨。硃砂水飛、各分半。西牛黃壹分。各爲細末。和勻。每服壹分。伍釐。蜜調燈心湯下。日三服。夜二服。外用淨青黛貳錢。黃

柏微炒閉口連翹炒黑、人中白、火煅醋淬、各壹錢、土貝母去心炒褐色伍錢、共爲末和勻臨用入西牛黃冰片各伍分麻油調敷神效（按用蟹殼瓦上炙黑橄欖核燒存性等分研末加冰片少許將甘草湯拭淨雞子清調塗屢試神效）

二粉散菉豆粉壹兩標硃壹錢冰片叁分輕粉壹分伍釐共爲細末將金汁調鵝毛蘸敷上如無金汁雪水亦可或用燈心甘草湯亦可

胎瘤

兒初生頭上胸乳間腫起大如饅頭小如梅李此胎中蘊熱更兼血淤凝滯而成須候小兒滿月以外方可用鍼刺破放出赤豆汁或膿汁其腫即消若滿月後生者必待膿鼓熟透再鍼內服五福化毒丹（方見大治背瘡）

小兒初生背上有大孔瘡一二箇其內有膜完護臟腑者得生如無膜露見臟腑者即死無救如有膜者以補中益氣湯與產母服之兒自能長完

補中益氣湯用人參、黃芪、各捌分白朮、甘草、陳皮、各伍分升麻、柴胡、各叁分當歸伍分水煎服

溼尻瘡

初生小兒手足頤下頰肢窩腿丫內濕熱之氣蘊積溼爛成瘡此乃乳母看顧不周所致不可用他藥只用伏龍肝一味不拘多少研細乾摻以紙隔之

大治方

青蒿丸。治小兒百病。白露節前。取青蒿莖內青蟲染條。飛淨硃砂壹錢。輕粉伍分。研不見星。同蟲研極爛。丸如黍米大。每服染丸百眸以外。服拾肆丸。將人乳研開塗兒口中。與乳過下。

紫霜丸。代赭石壹兩。火煅醋淬三五次。研細末。赤石脂壹兩。杏仁陸拾粒。去皮尖。研巴豆叁拾粒。去油膜。共爲末。飯丸如麻子大。日服三丸。開水下。

黑白散。黑丑。白丑。俱半生半炒。大黃、檳榔、陳皮、各伍錢。甘草叁錢。元明粉貳錢。除檳榔不見火。餘五味焙研細。合檳榔末。元明粉、和勻。每服伍分。蜜湯調服。

蘇合香丸。蘇合香油伍錢。入安息香內。安息香壹兩。另爲末。用無灰酒半觔。熬膏。白檀香、青木香、丁香、沉香、薰陸、搽香、附子、訶子、煨取肉、烏犀尖鎊、硃砂、各壹兩。薰蕙香、片腦、各伍錢。麝香、柒錢半。共爲末。入安息香膏。煉蜜和劑。如芡實大。用開水下。

琥珀抱龍丸。眞琥珀、天竺黃、檀香細剉、人參、白茯苓、各壹兩。粉草叁兩。去節枳殼、枳實麵炒、各壹兩。硃砂伍錢。飛陳膽星壹兩。山藥壹觔。金箔百

片。研極細。新汲水爲丸。硃砂爲衣。梧子大。每服壹丸。薄荷湯下。

保嬰易知錄下終

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

Vol. 5《小兒藥證真訣》卷上

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at http://rbsc.princeton.edu/policies/forms-citation.

Citation Information

Vol. 5《小兒藥證真訣》卷上

Contact Information

Download Information

Date Rendered: 2019-01-06 04:06:40 AM UTC
Available Online at: https://figgy.princeton.edu/catalog/f5f16130-f81c-4fae-92bb-36e16ccf6554

C101/1815
v.5

小兒藥證眞訣原序

醫之爲藝誠難矣而治小兒爲尤難自六歲以下黃帝不載其說始有顱顬經以占壽夭死生之候則小兒之病雖黃帝猶難之其難一也脈法難曰八至爲和平十至爲有病然小兒脈微難見醫爲持脈又多驚啼而不得其審其難二也脈既難憑必資外證而其骨氣未成形聲未正悲啼喜笑變態不常其難三也問而知之醫之上也而小兒多未能言言亦未足取信其難四也臟腑柔弱易虛易實易寒易熱又所用多犀珠龍麝醫苟難辨何以已疾其難五也種種隱奧其難固多余嘗致思于此又目見庸醫妄施方

藥而救之者十常四五良可哀也蓋小兒治法散在諸書又多出于近世臆說汗漫難據求其要妙豈易得哉太醫丞錢乙字仲陽汶上人其治小兒該括古今又多自得著名于時其法簡易精審如指諸掌先子治平中登第調須城尉識之余方六歲時病驚瘁癇瘛瘲至危殆皆仲陽拯之良愈是時仲陽年尚少不肯輕傳其書余家所傳者纔十餘方耳大觀初余簽仕汝海而仲陽老矣于親舊間始得說[redacted]數十條後六年又得雜方蓋晚年所得益妙比于京師復見別本然旋著旋傳皆雜亂初無紀律互有得失[redacted]得參校焉其先後則次之重複則削之訛謬則正之語則易之上卷脈證治法中卷記嘗所治病下卷諸方而書以全于是古今治小兒之法不可以加矣余念博愛者仁者之用心幼幼者聖人之遺訓此惠可不廣耶將傳之好事者使幼者免橫夭之苦老者無哭子之悲此余之志也因以明仲陽之術于無窮宣教郎大梁閻季忠序

小兒藥證直訣目錄

卷上○脉證治法

小兒脉法　變蒸
五臟所主　五臟病
肝外生感風　肝熱
肺熱　肺盛復有風冷
肺虛熱　肺臟怯
心熱　心實
腎虛　面上證
目內證　肝病勝肺
肺病勝肝　肝有風

肝有熱　肝有風甚
驚癇發搐　早晨發搐
日午發搐　日晚發搐
夜間發搐　傷風後發搐
傷食後發搐　百日內發搐
急驚　慢驚
五癇　瘡疹候
傷風　傷風手足冷
傷風自利　傷風腹脹
傷風兼臟　傷風下後餘熱
傷寒瘡疹同異

初生三日內吐瀉壯熱
初生三日已上吐瀉身溫涼
初生下吐　傷風吐瀉身溫
傷風吐瀉身熱　傷風吐瀉身涼
風溫等熱相似　腎怯失音相似
黃相似　夏秋吐瀉
吐乳　虛羸
咳嗽　諸疳
胃氣不和　胃冷虛
積痛　蟲痛虛實腹痛附
蟲與癇相似　氣不和

食不消　腹中有癖
虛實腹脹腫附　喜汗
盜汗　夜啼
驚啼　弄舌
丹瘤　解顱
太陽虛汗　胃怯汗
胃啼　胎肥
胎怯　胎熱
急欲乳不能食　龜背龜胷
腫病　五臟相勝輕重
雜病證　不治證

卷中
記嘗所治病二十三證
卷下
大青膏　涼驚圓
粉紅圓又名温驚圓　瀉青圓
地黃圓　瀉白散
阿膠散又名補肺散　導赤散
益黃散　瀉黃散
白朮散　塗頤法
浴體法　甘桔湯
安神圓　當歸圓

瀉心湯　生犀散
白餅子 又名玉餅子　利驚圓
括蔞湯　五色圓
調中圓　塌氣圓
木香圓　胡黃連圓
蘭香散　白粉散
消積散　安蟲散
紫霜圓　止汗散
香蒜圓　花火膏
白玉散　牛黃膏
牛黃圓　玉露散 又名甘露散

百祥圓 一名南陽圓　牛李膏 一名必勝膏
宣風散　麝香圓
大惺惺圓　小惺惺圓
銀砂圓　蛇黃圓
三聖圓　小青圓
小紅圓　小黃圓
鐵粉圓　銀液圓
鎮心圓　金箔圓
辰砂圓　翦刀股圓
麝蟾圓　軟金丹
桃枝圓　蟬花散

鈎籐飲子　抱龍圓
豆卷散　龍腦散
治虛風方　又方
褊銀圓　牛黃膏
五福化毒丹　羌活膏
郁李仁圓　犀角圓
異功散　藿香散
如聖圓　白附子香連圓
豆蔻香連圓　小香連圓
二聖圓　沒石子圓
當歸散　溫白圓
豆蔻散　溫中圓
胡黃連麝香圓　大胡黃連圓
榆仁圓　大蘆薈圓
龍骨散　橘連圓
龍粉圓　香銀圓
金華散　安蟲圓
蕪荑散　膽礬圓
眞珠圓　消堅圓
百部圓　紫草散
秦艽散　地骨皮散
人參生犀散　三黃圓

治頤開不合　黃耆散
虎林散　捻頭散
羊肝散　蟬蛻散
烏藥散　二氣散
葶藶圓　麻黃湯
生犀磨汁　大黃圓
史君子圓　青金丹
燒青圓　敗毒散
附方目錄
閻孝忠
治小兒急慢驚

治小兒吐瀉
金液丹治小兒吐瀉虛極
驚風或洩瀉等
治小兒急驚方搐
治急慢驚
治小兒實熱疎轉
治小兒驚風痰熱
治小兒瘡疹傷食相似
治小兒瘡疹
治小兒脾胃虛弱
小兒治法

藥方

升麻葛根湯　消毒散

惺惺散　胡荽酒

黃蘗膏　又方藍根散

四聖散　又方

治瘡疹倒撅黑陷　又方

治伏熱在心或誤服熱藥

甘露飲子　白虎湯

調肝散　治瘡疹入眼

治瘡疹入眼成翳　又方

治口瘡　治癮耳

治畜熱　治蟲齧心痛

治脾胃虛寒吐瀉冷痰

治外腎腫硬成疝　鉤籐膏

魏香散　地黃散

治熱痢下血　菖蒲圓

雞頭圓　羚羊角圓

全蝎散　和中散

紫蘇子散　赤石脂散

蘗墨散　至寶丹

紫雪　理中圓

五苓散　附子理中圓

金液丹　又方

青州白圓子　小柴胡湯

錢氏小兒藥證直訣上　保赤彙編十

閻孝忠集

脈證治法

小兒脈法

脈亂不治　氣不和弦急　傷食沉緩　虛驚促急

風浮　冷沉細

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全自生之後即長有脈五臟六腑之神智也變者易也（巢源云上多變又生變蒸者自內而長自下而上又身熱故以氣生之日後三十二日一變變每畢即情性有異于前

何者長生腑臟智意故也何謂三十二日長骨添精神八有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日計三百二十段爲一遍亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入齦中作三十二齒而齒牙有不及三十二數者由變不足其常也或二十八日即至長二十八齒已下倣此但不過三十二之數也凡一周遍乃發虛熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而未壯也故初三十二日一變生腎生志六十四日再變生膀胱其發耳與骭冷腎與膀胱俱主于水水數一故先變生之九十六日三變生心

喜一百二十八日四變生小腸其發汗出而微驚心爲火火數二一百六十日五變生肝哭一百九十二日六變生膽其發目不開而赤肝主木木數三二百二十四日七變生肺聲二百五十八日八變生大腸其發膚熱而汗或不汗肺屬金金數四二百八十八日九變生脾智三百二十日十變生胃其發不食腸痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨于十變後六十四日長其經脈手足並受血故能持物足立能行也經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微下不可餘治是以小兒須變蒸蛻齒者如

花之易苗所謂不及三十二齒由變之不及齒當與變日相合也年壯而視齒方明

五臟所主

心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則臥而悸動不安

肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛則咬牙多欠氣熱則外生氣溫則內生氣

脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風

肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虛則噦氣長出氣

腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷

更當別虛實證假如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目直大叫哭項急頓悶者難治蓋肺久病則虛冷肝強實而反勝肺也視病之新久虛實虛則補母實則瀉子

五臟病

肝病哭叫目直呵欠頓悶項急

心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水

脾病困睡洩瀉不思飲食

肺病悶亂噦氣長出氣短喘急

腎病無精光畏明體骨重

肝外生感風

呵欠頓悶口中氣熱當發散大青膏主之若能食飲水不止當大黃圓微下之餘不可下

肝熱

手尋衣領及亂捻物瀉青圓主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之

肺熱

手掐眉目鼻面甘桔湯主之

肺盛復有風冷

胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散大青膏主之肺只傷寒則不胸滿

肺虛熱

脣深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散

肺臟怯

脣白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣麤喘促哽氣者難治肺虛損故也

脾肺病久則虛而脣白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主脣白白而澤者吉白如枯骨者死

心熱

視其睡口中氣温或合面睡及上窻咬牙皆心熱也導赤散主之

心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合

面臥

心實

心氣實則氣上下行澁合臥則氣不得通故喜仰臥則氣得上下通也瀉心湯主之

腎虛

兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顱即解顱開也面色皎白此皆難養縱長不過八八之數若態色慾多不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也腎氣不足則下竅蓋骨重惟欲墜於下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃圓主之

面上證

左顴爲肝　右顴爲肺　額上爲心

鼻爲脾　頦爲腎　赤者熱也隨證治之

目內證

赤者心熱導赤散主之

淡紅者心虛熱生犀散主之

青者肝熱瀉青圓主之淺淡者補之

黃者脾熱瀉黃散主之

無精光者腎虛地黃圓主之

肝病勝肺

肝病秋見一作日晡肝强勝肺肺怯不能勝肝當補脾肺治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青

圓主之

肺病勝肝

肺病春見（一作早辰）肺勝肝當補腎肝治肺臟肝怯者受病也補肝腎地黃圓治肺瀉白散主之

肝有風

目連劄不搐得心熱則搐治肝瀉青圓治心導赤散主之

肝有熱

目直視不搐得心熱則搐治肝瀉青圓治心導赤散主之

肝有風甚

身反折強直不搐心不受熱也當補腎治肝補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

凡病或新或久皆引肝風風動而止于頭目目屬肝風入于目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄也若熱入于目牽其筋脈兩眥俱緊不能轉視故目直也若得心熱則搐以其子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青圓治心導赤散主之

驚癇發搐

男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證

早辰發搐

因潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動搖口內生熱涎項頸急此肝旺當補腎治肝也補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

日午發搐

因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搖此心旺也當補肝治心治心導赤散涼驚圓補肝地黃圓主之

日晚發搐

因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝補脾益黃散治肝瀉青圓治心導赤散主之

夜間發搐

因潮熱亥子丑時不甚搐而臥不穩身體温壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不納津液當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚圓主之

傷風後發搐

傷風後得之口中氣出熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏主之小兒生本怯者多此病也

傷食後發搐

傷食後得之身體温多唾多睡或吐不思飲食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神圓

百日內發搐

眞者不過三兩次必死假者發頻不爲重眞者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治之可發散大青膏主之及用塗顖浴體法

急驚

因聞大聲或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚圓主之

小兒急驚者本因熱生于心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚圓主之以除其痰熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒客痰熱于心胃因聞聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不因聞聲及驚亦自發搐

慢驚

因病後或吐瀉脾胃虛損偏身冷口鼻氣出亦冷手足時瘈瘲昏睡睡露睛此無陽也括蔞湯主之

凡急慢驚陰陽異證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別誤小兒甚多又小兒傷于風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼藥治之又不能已謂之本傷風醫亂攻之因脾氣卽虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡露睛身

温風在脾胃故大便不聚而爲瀉當去脾間風風退則利止宣風散主之後用史君子圓補其胃亦有諸吐利久不差者脾虛生風而成慢驚

五癇

凡治五癇皆隨臟治之每臟各有一獸並五色圓治小病也

犬癇反折上竄犬叫肝也

羊癇目瞪吐舌羊叫心也

牛癇目直視腹滿牛叫脾也

雞癇驚跳反折手縱雞叫肺也

豬癇如尸吐沫豬叫腎也

五癇重者死病後甚者亦死

瘡疹候

面燥腮赤目疱亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴手足稍冷夜臥驚悸多睡並瘡疹證此天行之病也惟用温涼藥治之不可妄下及妄攻發受風冷五臟各有一證

肝臟水疱　肺臟膿疱　心臟斑

脾臟疹　歸腎變黑

惟斑疹病後或發癇餘瘡難發癇矣木勝脾木歸心故也若涼驚用涼驚圓温驚用粉紅圓

小兒在胎十月食五臟血穢生下則其毒當出故瘡

疹之狀皆五臟之液肝主淚肺主涕心主血脾爲裏血其瘡出有五名肝爲水疱以淚出如水其色青小肺爲膿疱以涕稠濁色白而大心爲斑主心血色赤而小次于水疱脾爲疹小次斑瘡其主裏血故色赤黃淺也涕淚出多故膿疱水疱皆大血營于內所出不多故斑疹皆小也病疱者淚涕俱少譬胞中容水水去則瘦故也

始發潮熱三日以上熱運入皮膚即發瘡疹而不甚多者熱留膚腠之間故也潮熱隨臟出如早食潮熱不已爲水疱之類也

瘡疹始出之時五臟證見惟腎無候但見平證耳尻涼耳涼是也尻耳俱屬于腎其居北方主冷也若瘡黑陷而耳尻反熱者爲逆也若用百祥圓牛李膏各三服不愈者死病也

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫陷昏睡汗出不止煩燥熱渴腹脹啼喘大小便不通者困也凡瘡疹當乳母愼口不可令飢及受風冷必歸腎而變黑難治也

有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥圓下之不黑者愼勿下更看時月輕重大抵

瘡疹屬陽出則爲順故春夏病爲順秋冬病爲逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑陷秋斑子冬疹子亦不順也雖重病猶十活四五黑者無問何時十難救一其候或寒戰噤牙或身黃腫紫宜急以百祥圓下之復惡寒不已身冷出汗耳尻反熱者死病也何以然腎氣大旺脾虛不能治故也下後身熱氣溫欲飲水者可治以脾生勝腎寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下妄下則內虛多歸于腎若能食而痂頭焦起或未焦而喘實者可下之身熱煩渴腹滿而喘大小便澁面赤悶亂大吐此當利小便不差者宣風散下之若五七日痂不焦是內發熱氣蒸于皮中故瘡不得焦痂也宜宣風散導之用生犀磨汁解之使熱不生必著痂矣

瘡疹由內相勝也惟斑疹能作搐疹爲脾所生脾虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動于心神心喜爲熱神氣不安因搐成癇斑子爲心所生心生熱熱則生風風屬于肝二臟相搏風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母括蔞湯主之

瘡黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆何以然且瘡黑屬腎脾氣本強或舊服補脾藥脾氣得實腎雖用事脾可制之今瘡入腹爲膿血及連痂皮得出是脾強腎退卽病出而安也米穀及瀉乳不化

者是脾虛不能制腎故自洩也此必難治

傷風

昏睡口中氣熱呵欠頓悶當發散與大青膏解不散有下證當下大黃圓主之大飲水不止而善食者可微下餘不可下也

傷風手足冷

脾臟怯也當和脾後發散和脾益黃散發散大青膏主之

傷風自利

脾臟虛怯也當補脾益黃散發散大青膏主之未差調中圓主之有下證大黃圓下之後服溫驚圓

傷風腹脹

脾臟虛也當補脾必不喘後發散仍補脾也去脹塌氣圓主之發散大青膏主之

傷風兼臟

兼心則驚悸

兼肺則悶亂喘急哽氣長出氣噦

兼腎則畏明

各隨補母臟虛見故也

傷風下後餘熱

以藥下之太過胃中虛熱飲水無力也當生胃中津液多服白朮散

傷寒瘡疹同異

傷寒男體重面黃女面赤喘急悶寒各口中氣熱呵欠頓悶項急也瘡疹則腮赤燥多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷寒當發散之治瘡行溫平有大熱者解毒餘見前說

初生三日內吐瀉壯熱

不思乳食大便乳食不消或白色是傷食當下之後和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

初生三日已上至十日吐瀉身溫涼

不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有兼見證　肺睡露睛喘氣　心驚悸飲水　脾困倦饒睡　肝呵欠頓悶　腎不語畏明當瀉見兒兼臟補脾益黃散主之此二證多病于秋夏也

生下吐

初生下拭掠兒口中穢惡不盡嚥入喉中故吐木瓜圓主之凡初生急須拭掠口中令淨若啼聲一發則嚥下多生諸病

傷風吐瀉身溫

乍涼乍熱睡多氣麤大便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽更有五臟兼見證當煎入臟君臣化大青膏後服益黃散如先曾下或無下證愼不可下也此乃脾

肺受寒不能入脾也

傷風吐瀉身熱

多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此爲胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之

傷風吐瀉身涼

吐沫瀉青白色悶亂不渴哽氣長出氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益黃散發散大青膏主之此二證多病于春冬也

風溫潮熱壯熱相似

潮熱者時間發熱過時卽退來日依時發熱此欲發驚也壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也風熱者身熱而口中氣熱有風證溫壯者但溫而不熱也

腎怯失音相似

病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能嚥藥此非失音爲腎怯不能上接于陽故也當補腎地黃圓主之失音乃猝病耳

黃相似

身皮目皆黃者黃病也身痛髀背強大小便澀一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色看物皆黃渴者難治此黃疸也二證多病于大病後別有一證不因病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食

土渴者脾疸也又有自生而身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯胃不和也

夏秋吐瀉

五月二十五日已後吐瀉身肚熱此熱也小兒臟腑十分中九分熱也或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色玉露散主之

六月十五日已後吐瀉身温似熱臟腑六分熱四分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃散食後多服玉露散

七月七日已後吐瀉身温涼三分熱七分冷也不能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不渴食前多服益黃散食後少服玉露散

八月十五日已後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾噦瀉青褐水補脾益黃散主之不可下也

吐乳

吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下

虛羸

脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣也有冷者時時下利唇口青白有熱者温肚身熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香圓主之夏月不可服如有證則少服之熱者胡

黃連圓主之冬月不可服如有證則少服之

咳嗽

夫嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者其病必實非久病也其證面赤痰盛身熱法當以葶藶圓下之若久者不可下也十一月十二月嗽者乃傷風嗽也風從背脊第三椎肺俞穴入也當以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水涎熱咽喉不利者宜兼甘桔湯治之若五七日間其證身熱痰盛唾黏者以褊銀圓下之有肺盛者咳而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱以瀉白散瀉之若傷風咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦葶藶圓主之後用化痰藥有肺虛者咳而哽氣時時長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先實脾後以褊銀圓微下之涎退即補肺補肺如上法有嗽而吐水或青綠水者以百祥圓下之有嗽而吐痰涎乳食者以白餅子下之有嗽而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者肺亡津液阿膠散補之咳而痰實不甚喘而面赤時飲水者可褊銀圓下之治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意增損

諸疳

疳在內目腫腹脹利色無常或洟青白漸瘦弱此冷證也

疳在外鼻下赤爛自操鼻頭上有瘡不著痂漸遶耳生瘡治鼻瘡爛蘭香散諸瘡白粉散主之

肝疳白膜遮睛當補肝地黃圓主之

心疳面黃頰赤身壯熱當補心安神圓主之

脾疳體黃腹大食泥土當補脾益黃散主之

腎疳極瘦身有瘡疥當補腎地黃圓主之

筋疳瀉血而瘦當補肝地黃圓主之

肺疳氣喘口鼻生瘡當補脾肺益黃散主之

骨疳喜臥冷地當補腎地黃圓主之

諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香圓熱則胡黃連圓主之

疳皆脾胃病亡津液之所作也因大病或吐瀉後以藥吐下致脾胃虛弱亡津液且小兒病疳皆愚醫之所壞假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝為心母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之利既多矣不能禁約而津液內亡即成疳也又有病癖其疾發作寒熱飲水脅下有形硬痛治癖之法當漸消磨醫反以巴豆硇砂輩下之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸令疳瘦

又有病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過致脾胃津液少即使引飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變諸端因亦成疳

又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液燥損亦能成疳

又有肥疳即脾疳也身瘦黃皮乾而有瘡疥其候不一種種異端今略舉綱紀目瀝或生白膜脣赤身黃乾或黑喜臥冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水利色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬢作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也

大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者爲肥熱疳久病者爲瘦冷疳冷者木香圓熱者黃連圓主之冷熱之疳尤宜如聖圓故小兒之臟腑柔弱不可痛擊大下必亡津液而成疳凡有可下量其大小虛實而下之則不至爲疳也初病津液少者當生胃中津液白朮散主之唯多則妙餘見下

胃氣不和

面皃白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之若下利者調中圓主之

胃冷虛

積痛

口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積宜消積圓甚者當白餅子下之後和胃

蟲痛虛實腹痛附

面皎白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安蟲散主之小兒本怯者多此病

積痛食痛虛痛大同小異惟蟲痛者當口淡而沫自出治之隨其證

蟲與癇相似

小兒本怯故胃虛冷則蟲動而心痛與癇略相似但目不斜手不搐也安蟲散主之

氣不和

口頻撮當調氣益黃散主之

食不消

脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

腹中有癖

不食但飲乳是也當漸用白餅子下之

小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱相類不早治必成癖以其有癖則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲水過多卽蕩滌腸胃亡失津液脾胃不能傳化水穀其脈沈細益不食脾

胃虛衰四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成疳矣餘見疳門

虛實腹脹 腫附

腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂滿喘可下之用紫霜圓白餅子不喘者虛也不可下若誤下則脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛甚卽目胞腮腫也色黃者屬脾也治之用塌氣圓漸消之未愈漸加圓數不可以丁香木香橘皮荳蔻大溫散藥治之何以然脾虛氣未出腹脹而不喘可以散藥治之使上下分消其氣則愈也若虛氣已出附肺而行卽脾胃內弱每生虛氣入于四肢面目矣小兒易爲虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱多生疳病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺之氣上行于四肢若水狀腎氣浸浮于肺卽大喘也此當服塌氣圓病愈後面未紅者虛衰未復故也

治腹脹者譬如行兵戰寇于林寇未出林以兵攻之必可獲寇若出林不可急攻攻必有失當以意漸收之卽順也

治虛腹脹先服塌氣圓不愈腹中有食積結糞小便黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之益脾初虛而後結有積所治宜先補脾後下之下後又補脾

卽愈也補肺恐生虛喘

喜汗

厚衣臥而額汗出也止汗散主之

盜汗

睡而自汗出肌肉虛也止汗散主之遍身汗香瓜圓主之

夜啼

脾臟冷而痛也當與溫中藥及以法禳之花火膏主之

驚啼

邪熱乘心也當安心安神圓主之

弄舌

脾臟微熱令舌絡微緊時時舒舌治之勿用冷藥及下之當少與瀉黃散漸服之亦或飲水醫疑爲熱必冷藥下之者非也飲水者脾胃虛津液少也又加面黃肌瘦五心煩熱卽爲疳瘦宜胡黃連圓輩大病未已用藥弄舌者凶

丹瘤

熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤如丹當以白玉散塗之

解顱

生下而顖不合腎氣不成也長必少笑更有目白睛

多眙白色瘦者多愁少喜也餘見腎虛

太陽虛汗

上至頭下至項不過胸也不須治之

胃怯汗

上至項下至臍此胃虛當補胃益黃散主之

胃啼

小兒筋骨血脈未成多哭者至小所有也

胎肥

生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸肌瘦目白睛粉紅色五心熱大便難時時生涎浴體法主之

胎怯

生下面色無精光肌肉薄大便白水身無血色時時噯氣多嗽目無精彩當浴體法主之

胎熱

生下有血氣時叫哭身壯熱如淡茶色目赤小便赤黃糞稠急食乳浴法主之更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

急欲乳不能食

因客風熱入兒臍流入心脾經即舌厚脣燥口不能乘乳當涼心脾

寵背寵胸

肺熱脹滿攻于胸膈即成寵胸又乳母多食五辛亦

成也

兒生下客風入脊逐于骨髓即成龜背治之以龜尿點節骨取尿之法當蓮葉安龜在上後用鏡照之自尿出以物盛之

腫病

腎熱傳於膀胱胱熱盛逆於脾胃脾胃虛而不能制腎水反剋土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也若大喘者重也何以然腎大勝而剋退脾土上勝心火心又勝肺肺爲心剋故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍浸於肺故令大喘此皆難治

五臟相勝輕重

肝臟病見秋木旺肝强勝肺也宜補肺瀉肝輕者肝病退重者脣白而死

肺病見春金旺肺勝肝當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當搐爲肝怯當目淡青色也

心病見冬火旺心强勝腎當補腎治心輕者病退重者下竇不語腎虛怯也

腎病見夏水勝火腎勝心也當治腎輕者病退重者悸動當搐也

脾病見四旁皆倣此治之順者易治逆者難治脾怯當面目赤黃五臟相反隨證治之

雜病證

目赤兼青者欲發搐
目直而青身反折强直者生驚
咬牙甚者發驚
口中吐沫水者後必蟲痛
昏睡善嚏悸者將發瘡疹
吐瀉昏睡露睛者胃虛熱
吐瀉昏睡不露睛者胃實熱
吐瀉乳不化傷食也下之
吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷
吐稠涎及血皆肺熱久則虛
瀉黃紅赤黑皆熱赤亦毒
瀉青白穀不化胃冷
身熱不飲水者熱在外　身熱飲水者熱在內
口噤不止則失音遲聲亦同
長大不行行則腳細　齒久不生生則不固
髮久不生生則不黑　血虛怯爲冷所乘則脣青
尿深黃色久則尿血
小便不通久則脹滿當利小便
洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛
吐涎痰熱者下之　吐涎痰冷者溫之
先發膿疱後發斑子者逆

先發膿疱後發疹子者順
先發水疱後發疹子者逆
先發膿疱後發水疱多者順少者逆
先水疱後斑子多者逆少者順
先疹子後斑子者順
凡瘡疹只出一般者善
胎實面紅目黑睛多者多喜笑
胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭
凡病先虛或下之合下者先實其母然後下之假令肺虛而痰實此可下先當益脾後方瀉肺也
大喜後食乳食多成驚癇
大哭後食乳食多成吐瀉
心痛吐蟲者蟲痛　心痛不吐水者冷心痛
吐水不心痛者胃冷
病重面有五色不常不澤者死
呵欠面赤者風熱　呵欠面青者驚風
呵欠面黃者脾虛驚　呵欠多睡者內熱
呵欠氣熱者傷風
熱證疎利或解化後無虛證勿溫補熱必隨生
不治證
目赤脈貫瞳人　胸腫及陷　鼻乾黑　魚口氣急
吐蟲不定　瀉不定精神好　大渴不定止之又渴

吹鼻不嚏　病重口乾不睡　時氣脣上青黑點
頰深赤如塗臙脂　鼻開張　喘急不定

錢氏小兒藥證直訣上

C 101/1815
v. 6

李寺丞子三歲病搐自卯至巳數醫不治後召錢氏視之搐目右視大叫哭李曰何以搐右錢曰逆也李曰何以逆曰男爲陽而本發左女爲陰而本發右若男目左視發搐時無聲右視有聲女發時右視無聲左視有聲所以然者左肝右肺肝木肺金男目右視肺勝肝也金來刑木二臟相戰故有聲也治之瀉其強而補其弱心實者亦當瀉之肺虛不可瀉肺虛之候悶亂哽氣長出氣此病男反女故男易治於女也假令女發搐目左視肺之勝肝又病在秋卽肺兼旺位肝不能任故哭叫當大瀉

其肺然後治心續肝所以俱言目反直視乃肝主目也凡搐者風熱相搏于內風屬肝故引見之於目也錢用瀉肺湯瀉之二日不悶亂當知肺病退後下地黃圓補腎三服後用瀉青圓涼驚圓各二服凡用瀉心肝藥五日方愈不妄治也又言肺虛不大瀉者何也曰設令男目右視木反剋金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當補其肺愼勿瀉也

廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂其父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使病錢曰八使過來日午間卽無苦也次日午前八使果作急搐召錢治之三日而愈蓋預見目直視而顯赤必肝心俱熱更坐石机子乃欲冷此熱甚也肌膚素肥盛脉又急促故必驚搐所言語時者自寅至午皆心肝所用事時治之瀉心肝補腎自安矣

李司戶孫病生百日發搐三五次請眾醫治作天釣或作胎驚癇皆無應者後錢用大青膏如小豆許作一服發之復與塗顖法封之及浴法三日而愈何以然嬰兒初生肌骨嫩怯被風傷之子不能任故發搐頻發者輕也何者客風在內每遇不任卽搐搐稀者是內藏發病不可救也搐頻者宜散風

冷故用大青膏不可多服蓋兒至小易虛易實多卽生熱止一服而已更當封浴無不效者

東都王氏子吐瀉諸醫藥下之至虛變慢驚其候睡露睛手足瘈瘲而身冷錢曰此慢驚也與蚘蠱湯其子胃氣實卽開目而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥利之醫留八正散等數服不利而身復冷令錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷王曰已身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小便卽死久卽脾胃俱虛當身冷而閉目幸胎氣實而難衰也錢用益黃散史君子圓四服令微飲食至日午果能飲食所以然者謂利大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語諸醫作失音治之錢曰旣失音開目而能飲食又牙不緊而口不緊也諸醫不能曉錢以地黃圓補腎所以然者用清藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊也

東都藥鋪杜氏有子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃外風寒搐入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃葦發散後用涼藥壓之卽愈時醫以鐵粉圓半夏圓褊銀圓諸法下之其肺卽虛而嗽甚至春三月間尙未愈召錢氏視之其候面靑而光嗽而喘促哽氣又時長出

氣錢曰痰困拾以搦玖所以然者面青而光肝氣旺也春三月者肝之位也肺衰之時也嗽者肺之病肺之病蓋自十一月至三月久卽虛痿又曾下之脾肺子母也復爲肝所勝此爲逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也錢急與瀉青圓瀉後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又補肺而嗽如前錢又瀉肝瀉肝未已又加肺虛唇白如練錢曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛熱肺病不得其時而肝勝之今三瀉肝而肺病不退三補肺而肺證猶虛此不久生故言死也此證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死

京東轉運使李公有孫八歲病嗽而胸滿短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各貳服治之三日加喘錢曰此肺氣不足復有寒邪卽使喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也醫曰退熱退涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也醫有慙色錢治愈

東都張氏孫九歲病肺熱他醫以犀珠龍麝生牛黃治之一月不愈其證嗽喘悶亂飲水不止全不能食錢氏用史君子圓益黃散張曰本有熱何以又

行溫藥他醫用涼藥攻之一月尙無效錢曰涼藥久則寒不能食小兒虛不能食當補脾候飲食如故卽瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉其肺遂愈十分張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

睦親宮十太尉病瘡疹眾醫治之王曰疹未出屬何臟腑一醫言胃大熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏曰若言胃熱何以乍涼乍熱若言母腹中有毒發屬何臟也醫曰在脾胃錢曰既在脾胃何以驚悸醫無對錢曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母穢液入兒五臟食至十月滿胃脘中至生之時口有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汁壓之云下膿糞及涎穢也此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒入而成瘡疹未出五臟皆見病症內壹臟受穢多者乃出瘡疹初欲病時先呼欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷痺面頤燥赤嗽嗽時噓此五臟證具也呵欠頓悶肝也時發驚悸心也乍涼乍熱手足冷脾也面目頤頰赤嗽噓肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一證則肝水疱肺膿疱心斑脾疹惟腎不食毒穢而無諸證瘡黑者屬腎由不愼風冷而不飽內虛也又用抱龍圓數

服愈其別無他候故未發出則見五臟證已出則歸一臟也

四大王宮五太尉因墜鞦韆發驚搐醫以發熱藥治之不愈錢氏曰本急驚後生大熱當先退其熱以大黃圓玉露散惺惺圓加以牛黃龍麝解之不愈至三日肌膚尚熱錢曰更二日不愈必發斑瘡蓋熱不能出也他醫初用藥發散發散入表表熱即斑生本初驚時當用利驚藥下之今發散乃逆也後二日果斑出以必勝膏治之七日愈

睦親宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留抱龍圓三服李以藥下之其疹稠密錢見大驚曰若非轉下則爲逆病王言李以用藥下之錢曰瘡疹始出未有他證不可下也但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也如瘡疹三日不出或出不快即微發之微發不出即加藥不出即大發之如大發後不多及脉平無證者即瘡本稀不可更發也有大熱者當利小便小熱者當解毒若出快勿發勿下故止用抱龍圓治之瘡痂若起能食者大黃圓下一二行即止今先下一日瘡疹未能出盡而稠密甚則難治此悞也縱得安其病有三一者疥二者癍三者目赤李不能治經三日黑陷復召錢氏曰幸不發寒而病未困也遂用百祥圓治之以

牛李膏爲助若黑者歸腎也腎王勝脾土不尅水故脾虛寒戰則難治所用百祥圓者以瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也何以不瀉腎曰腎主虛不受瀉若二服不效卽加寒而死

皇都徐氏子三歲病潮熱每日西則發搐身微熱而目微邪反露睛四肢冷而喘大便微黃錢與李醫同治錢問李曰病何搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作何目斜露睛曰搐則目斜何肢冷曰冷厥必內熱曰何喘曰搐之甚也曰何以治之曰噫驚圓鼻中灌之必搐止錢又問曰既謂風病溫壯搐引目斜露睛內熱肢冷及搐甚而喘併以何

藥治之李曰皆此藥也錢曰不然搐者肝實也故令搐曰西身微熱者肺潮用事肺主身溫且熱者爲肺虛所以目微斜露睛者肝肺相勝也肢冷者脾虛也肺若虛甚用益黃散阿膠散得脾虛證退後以瀉青圓導赤散涼驚圓治之後九日平愈

朱監簿子五歲夜發熱曉卽如故眾醫有作傷寒者有作熱治者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉圓下涎其病益甚至五日大引飲錢氏曰不可下之乃取白朮散末煎一兩汁三升使任其意取足服朱生曰飲多不作瀉否錢曰無生水下能作瀉縱瀉不足怪也但不可下耳朱生曰

先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神裏皆此藥也至晚服盡錢看之曰更可服三升又煎白术散三升服盡得稍愈第三日又服白术散三升其子不渴無涎又投阿膠散二服而愈

朱監簿子三歲忽發熱醫曰此心熱顯赤而唇紅煩燥引飲遂用牛黃圓三服以一物瀉心湯下之來日不愈反加無力而能食又便利黃沫錢曰心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病也錢先用白术散生胃中津後以生犀散治之朱曰大便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止此虛熱也朱曰醫用瀉心湯何如錢曰瀉心湯者黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久眾醫至曰實熱錢曰虛熱若寒熱何以瀉心湯下之不安而又加面黃頰赤五心煩燥不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃沫錢笑曰便黃沫者服瀉心湯多故也錢後與胡黃連圓治愈

張氏三子病歲大者汗偏身次者上至頂下至胸小者但額有汗眾醫以麥煎散治之不效錢曰大者與香瓜圓次者與益黃散小者與石膏湯各五日而愈

廣親宅四大王宮五太尉病吐瀉不止水穀不化眾醫用補藥言用薑汁調服之六月中服溫藥一日

而加喘吐不定錢曰當用涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服併服之眾醫皆言吐瀉多而米穀不化當補脾何以用涼藥王信眾醫又用丁香散三服錢後至曰不可服此三日外必腹滿身熱飲水吐逆三日外一如所言所以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃卽大吐瀉他醫又行溫藥卽上焦亦熱故喘而引飲三日當死眾醫不能治復召錢至宮中見有熱證以白虎湯三服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服四日用石膏湯一服旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以朱砂

爲衣與五圓竹葉湯化下熱退而安

馬承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢曰目中黑睛少而白睛多面色皎白神怯也黑睛少腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱酒慾若不保養不過壯年面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛此但以消積圓磨之爲微有食也如傷食甚則可下不下則成癖也實食在內乃可下之下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

廣親宮七太尉七歲吐瀉是時七月其證全不食而昏睡睡覺而悶亂哽氣乾噦大便或有或無不渴衆醫作驚治之疑睡故也錢曰先補脾後退熱與史君子圓補脾退熱石膏湯次日又以水銀硫黃二物下之生薑水調下一字錢曰凡吐瀉五月內九分下而一分補八月內十分補而無一分下此者是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之即死當即補脾若以史君子圓即緩錢又留溫胃益脾藥止之醫者李生曰何食而哽錢曰脾虛而不能食津少即哽逆曰何瀉青褐水曰腸胃至虛冷極故也錢治而愈

黃承務子二歲病瀉衆醫止之十餘日其證便青白乳物不消身涼加哽氣昏睡醫謂病困篤錢氏先以益脾散三服補肺散三服三日身溫而不哽氣後以白餅子微下之與益脾散二服利止何以然利本脾虛傷食初不與大下揩置十日上實下虛脾氣弱引肺亦虛補脾肺病退即溫不哽氣是也有所傷食仍下之也何不先下後補曰便青爲下臟冷先下必大虛先實脾肺下之則不虛而後更補之也

睦親宮中十大王瘡疹云瘡疹始終出未有他證不可下但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也如

瘡疹三日不出或出不快即微發之如瘡發後不多出即加藥加藥不出即大發之如發後不多及脉平無證即瘡本稀不可更發也有大熱者當利小便小熱者當解毒若不快勿發勿下攻止用抱龍圓治之瘡疹若起能食者大黃圓下一二行即止有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥圓下之不黑者甚勿下身熱煩燥腹滿而喘大小便澁面赤悶亂大吐此當利小便不瘥者宣風散下之也若五七日痂不焦是內發熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痂也宜宣風散導之用生犀角磨汁解之使熱不生必著痂矣

辛氏女子五歲病蟲痛諸醫以巴豆乾漆硇砂之屬治之不效至五日外多哭而俛仰睡卧不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢脣白吐沫至六日胸高而卧轉不安召錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則爲逆矣至次日辛見錢曰夜來三更果瀉錢于瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有丸藥錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則蟲動而今反目青此肝乘脾又更加瀉知其氣極虛也而丸藥隨糞下即脾胃已脫兼形病不相應故知死病

後五日昏篤七日而死

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血前醫以桔更湯及防己圓治之不愈涎上攻吐喘不止請錢氏下褊銀圓一大服復以補肺湯補肺散治之或問段氏子咯血肺虛何以下之錢曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎止而吐愈爲順治也若先補其肺爲逆耳此所謂識病之輕重先後爲治也

鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽臟熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多驚又與青金膏一服又瀉三行加口乾身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至曰已成虛羸先用前白朮散時時服之後服香朮圓十三日愈

曹宣德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飲水及乳眾醫以爲潮熱用牛黃圓麝香圓不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢曰當下白餅子後補脾乃以消積圓磨之此乃癖也後果愈何以故不食但飲水者食伏於管內不能消致令發寒服止渴藥吐

者以藥衝故也下之卽愈

大青膏 治小兒熱盛生風欲爲驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之

天麻末壹錢 白附子末生壹錢伍分

青黛研壹錢 蝎尾去毒生末

烏稍蛇肉酒浸焙乾取末各壹錢

硃砂研 天竺黃研

右同再研細生蜜和成膏每服半皁子大至一皁子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服之

涼驚圓 治驚痓

草龍膽　防風　青黛各叁錢　鉤藤貳錢
黃連伍錢　牛黃　麝香　龍腦各壹字
麪糊圓粟米大每服叁伍圓金銀花湯下
粉紅圓又名溫驚圓
天南星臘月釀牛膽中百日陰乾取末肆兩別研如釀者只對炒熟用
硃砂壹錢伍分研　天竺黃壹兩研　龍腦半字別研
坯子胭脂壹錢研乃染胭脂
右用牛膽汁和圓雞頭大每服一圓小者半圓沙糖溫水化下
瀉青圓方　治肝熱搐搦脈洪實
當歸去蘆頭切焙稱　龍腦焙稱　川芎
山梔子仁　川大黃溼紙裹煨　羌活
防風去蘆頭切焙稱
右件等分爲末鍊蜜和圓雞頭大每服半圓至壹圓煎竹葉湯同沙糖溫水化下
地黃圓　治腎怯失音頗開不合神不足目中白睛多面色皎白等方
熟地黃　山萸肉　乾山藥各肆錢
澤瀉　牡丹皮　白茯苓去皮各叁錢
右爲末煉蜜圓如梧子大空心溫水化下叁圓
瀉白散又名瀉肺散　治小兒肺盛氣急喘嗽
地骨皮　桑白皮炒各壹兩　甘草炙壹錢

右剉散入粳米壹撮水貳小盞煎七分食前服

阿膠散 又名補肺散 治小兒肺虛氣粗喘促

阿膠壹兩伍錢（麩炒） 黍粘子（炒香） 甘草（炙各貳錢伍分）

馬兜鈴伍錢焙 杏仁（柒箇去皮尖炒） 糯米壹兩炒

右爲末每服壹貳錢水壹盞煎至六分食後溫服

導赤散 治小兒心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合面睡

生地黃 甘草生 木通（各等分）

右同爲末每服叁錢水壹盞入竹葉同煎至五分食後溫服一本不用甘草用黃芩

益黃散 又名補脾散 治脾胃虛弱及治脾疳腹大身瘦

陳皮去白壹兩 丁香貳錢一方（用木香） 訶子炮去核

青皮去白 甘草（炙各伍錢）

右爲末三歲兒壹錢半水半盞煎三分食前服

瀉黃散 又名瀉脾散 治脾熱弄舌

藿香葉柒錢 山梔子仁壹錢 石膏伍錢

甘草叁兩 防風四兩去蘆切焙

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服壹錢至貳錢水壹盞煎至五分溫服清汁無時

白朮散 治脾胃久虛嘔吐泄瀉頻作不止精液苦

竭煩渴躁但欲飲水乳食不進羸瘦困劣因而失治變成驚癎不論陰陽虛實並宜服

人參貳錢伍分　白茯苓伍錢　白朮伍錢炒
藿香葉伍錢　木香貳錢　甘草壹錢
葛根伍錢渴者加至壹兩

右咬咀每服叁錢水煎熱甚發渴去木香

塗顖法

麝香壹字　蝎尾去毒爲末半錢一作半字　薄荷葉半字
蜈蚣末　牛黃末　青黛末各壹字

右同研用熟棗肉劑爲膏新綿上塗勻貼顖上四方可出一指許火上炙手頻熨百日內外小兒可用此

浴體法　治胎肥胎熱胎怯

天麻末貳錢　全蝎去毒爲末　硃砂各伍錢
烏蛇肉酒浸焙乾　白礬各貳錢　麝香壹錢
青黛叁錢

右同研勻每用叁錢水叁碗桃枝壹握葉伍柒枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

甘桔湯　治小兒肺熱手掐眉目鼻面

桔梗貳兩　甘草壹兩

右爲麤末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓食後溫服加荆芥防風名如聖湯熱甚加羌活黃芩升

麻

安神圓　治面黃頰赤身壯熱補心　一治心虛肝熱神思恍惚

馬牙硝伍錢　白茯苓伍錢　麥門冬伍錢
乾山藥伍錢　龍齒壹字研　寒水石伍錢研
硃砂壹兩研　甘草伍錢

右末之煉蜜爲圓雞頭大每服半圓沙糖水化下無時

當歸湯　治小兒夜啼者臟寒而腹痛也面青手冷不吮乳者是也

當歸　白芍藥　人參各壹分

甘草炙半分　桔梗　陳皮不去白各壹分

右爲細末水煎半錢時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃圓人參湯下

瀉心湯　治小兒心氣實則氣上下行澁合臥則氣不得通故喜仰臥則氣上下通

黃連壹兩去鬚

右爲末每服伍分臨臥取溫水化下

生犀散　治目淡紅心虛熱

生犀貳錢劉末　地骨皮自採佳　赤芍藥
柴胡根　乾葛劉各壹兩　甘草炙伍錢

右爲麤末每服壹貳錢水壹盞煎至柒分溫服食後

白餅子 又名玉餅子 治壯熱

滑石末壹錢 輕粉伍錢 半夏末壹錢

南星末壹錢 巴豆念肆箇去皮膜用水壹升煮乾研細

右三味搗羅爲末入巴豆粉次入輕粉又研勻却入餘者藥末如法令勻糯米粉圓如菉豆大量小兒虛實用藥三歲以下每服三圓至五圓空心紫蘇湯下忌熱物若三五歲兒壯實者不以此加至貳圓以利爲度

利驚圓 治小兒急驚風

青黛 輕粉各壹錢 牽牛末伍錢

天竺黃貳錢

右爲末白麪糊圓如小豆大貳拾圓薄荷湯下一法煉蜜圓如芡實大壹粒化下

括蔞湯 治慢驚

括蔞根貳錢 白甘遂壹錢

右用慢火炒焦黃色研勻每服壹字煎麝香薄荷湯調下無時凡藥性雖冷炒焦用之乃溫也

五色圓 治五癇

硃砂伍錢研 水銀壹兩 雄黃壹兩

鉛叁兩同水銀煮眞珠末壹兩研

右煉蜜圓如麻子大每服叁肆圓金銀薄荷湯下

調中圓

人參 去蘆 白朮 乾薑 炮各叁兩 甘草 炙減半

右爲細末圓如菉豆大每服半圓至貳叁拾圓食前溫水送下

塌氣圓 治虛脹如腹大者加雞肫子名褐圓子

胡椒 壹兩 蝎尾 去毒伍錢

右爲細末麪圓粟米大每服伍柒圓至壹貳拾圓陳米飲下無時一方有木香壹錢

木香圓 治小兒疳瘦腹大

木香 青黛 另研 檳榔

荳蔻 去皮各壹分 麝香 另研壹錢五分 續隨子 去皮壹兩

蝦蟆 叁箇燒存性

右爲細末蜜圓菉豆大每服叁五圓至壹貳拾圓薄荷湯下食前

胡黃連圓 治肥熱疳

川黃連 伍錢 胡黃連 伍錢 硃砂 壹錢另研

右以上貳物爲細末入硃砂末都塡入猪膽內用淡漿水煮以杖于銚子上用線釣之勿着底候一炊久取出研入蘆薈麝香各壹分飯和圓如麻子大每服伍柒圓至貳叁拾圓米飲下食後

蘭香散 治疳氣鼻下赤爛

蘭香葉 茉名燒灰 貳錢 銅青 伍分 輕粉 貳字

右爲細末令勻看瘡大小乾貼之

白粉散 治諸疳瘡

海螵蛸 叁分 白芨 叁分 輕粉 壹分

右爲末先用漿水洗拭乾貼

消積圓 治大便酸臭

丁香 玖箇 縮砂仁 貳拾箇 烏梅肉 叁箇

巴豆 貳箇去皮油心膜

右爲細末麪糊圓黍米大叁歲已上叁五圓已下叁貳圓溫水下無時

安蟲散 治小兒蟲痛

胡粉 炒黃 檳榔 川練子 去皮核

鶴虱 炒各貳兩 曰礬 鐵器煮壹 乾漆 炒烟盡貳分

雄黃 壹分 巴豆霜 壹分

右爲細末每服壹字大者半錢溫米飲調下痛時服

紫霜圓 治消積聚

代赭石 煆醋淬七次 赤石脂 各壹錢 杏仁 伍拾粒去皮尖

巴豆 叁拾粒去皮膜心出油

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲圓如粟米大壹歲服伍圓米飲湯下壹貳百日內兒叁圓乳汁下更宜

量其虛實加減微利爲度此藥兼治驚痰諸症雖下不致虛人

止汗散　治六陽虛汗上至頂不過胷也不須治之喜汗厚衣臥而額汗出也止汗散止之

右用故蒲扇灰如無扇只將故蒲燒灰研細每服壹貳錢温酒調下無時

香瓜圓　治偏身汗出

大黄瓜黄色者壹箇去穰　川大黄湮紙裹煨至紙焦　胡黄連

柴胡去蘆　鼈甲醋炙黄　蘆薈

青皮　黄柏

右除黄瓜外同爲細末將黄瓜割去頭填入諸藥

置滿却蓋口用杖子插定漫火內煨熟麪糊圓如菉豆大每服叁貳圓食後冷漿水或新水下大者伍柒圓至拾圓

花火膏　治夜啼

燈花壹棵

右塗乳上令兒吮之

白玉散　治熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤如丹是方用之

白土貳錢伍分　寒水石伍錢　又云滑石

右爲末用米醋或新水調塗

牛黄膏　治驚熱

雄黃小栗大用獨莖蘿蔔根 甘草末
水并醋共大盞煮盡
甜硝各叁錢 硃砂半錢匕 龍腦壹字匕
寒水石研細伍錢匕
右同研勻蜜和爲劑食後薄荷湯溫化下半皁子大

牛黃圓 治小兒疳積
雄黃研水飛 天竺黃各貳錢 牽牛末壹錢
右同再研麪糊爲圓粟米大每服叁圓至伍圓食後薄荷湯下兼治疳消積積常服尤佳大者加圓數

玉露散又名甘露散 治傷熱吐瀉黃瘦
寒水石軟而微青黑中有細紋者是 石膏堅白而牆壁手不可折者是好各半兩
甘草生壹錢
右同爲細末每服壹字或半錢壹錢食後溫湯調下

百祥圓一名南陽圓 治瘡疹倒壓黑陷
用紅芽大戟不以多少蔭乾漿水軟法骨日中曝乾復內汁中煮汁盡焙乾爲末水圓如粟米大每服壹貳拾圓研赤脂麻湯下吐利同無時

牛李膏一名必勝膏 治同前方
牛李子
右杵汁石器內熬膏每服皁子大煎杏膠湯化下

宣風散 治小兒慢驚

檳榔兩箇　陳皮　甘草各半兩

牽牛肆兩半生半熟

右爲細末叁貳歲兒蜜湯調下伍分已上壹錢食前服

麝香圓　治小兒慢驚疳等病

草龍膽　胡黃連各半兩　木香

蟬殼去劍爲末乾秤　蘆薈去砂秤　熊膽

青黛各壹錢　輕粉　腦麝

牛黃各壹錢並別研　瓜蒂貳拾壹箇爲末

右猪膽圓如桐子及菉豆大驚疳臟腑或秘或瀉清米飲或溫水下小圓伍柒粒至壹貳拾粒疳眼猪肝湯下疳渴嘔猪湯下亦得猪肉湯下亦得驚風發搐眼上薄荷湯化下壹圓更水研壹圓滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼蟲痛苦練子或白蕪荑湯送下百日內小兒大小便不通水研封臍中蟲候加乾漆好麝香各少許并入生油壹兩點溫水化下大凡病急則研碎緩則浸化小兒虛極慢驚者勿服尤治急驚痰熱

大惺惺圓　治驚疳百病及諸壞病不可具述

辰砂研　青礞石　金牙石各壹錢半

雄黃壹錢　蟾灰貳錢　牛黃

龍腦各壹字別研　麝香半錢別研　蛇黃叁錢醋淬伍次別研

右研勻細水煮蒸餅爲圓硃砂爲衣如菉豆大百日兒每服壹圓壹歲兒貳圓薄荷溫湯化下食後

小惺惺圓　解毒治急驚風癇潮熱及疾虛煩藥毒上攻躁渴

膩月取東行母猪糞燒灰存性　辰砂水研飛　腦麝各貳錢　牛黃壹錢各別研　蛇黃西山者燒赤醋淬叁次水研飛乾用半兩

右以東流水作麪糊圓桐子大硃砂爲衣每服貳叁歲兩圓鍮匙研破溫水化下小兒纔生便宜服壹圓除胎中百疾食後

銀砂圓　治涎盛膈熱實痰嗽驚風積潮熱

水銀結砂子叁辰砂研貳錢　蝎尾去毒爲末　鵬砂粉霜各研輕粉　郁李仁去皮焙秤爲末白牽牛鐵粉　好臘茶各叁錢

右同爲細末熬梨汁爲膏圓如菉豆大龍腦水化下壹圓至叁圓亦名梨汁餅子及治大人風涎並食後

蛇黃圓　治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃眞者叁箇火鍛醋淬　鬱金柒分壹處爲末　麝香壹字

右爲末飯圓桐子大每服壹貳圓煎金銀磨刀水化下

三聖圓　化痰涎寬膈消乳癖化驚風食癇諸痞小兒壹歲以內常服極妙

○小青圓

青黛壹錢　牽牛末叁錢　膩粉壹錢

並研勻麪糊圓黍米大

○小紅圓

天南星末壹兩　硃砂半兩研　巴豆壹錢取霜生

並研勻薑汁麪糊圓黍米大

○小黃圓

半夏生末壹分　巴豆霜壹字匕　黃蘗末壹字匕

並研勻薑汁麪糊圓黍米大　已上百日者各壹圓壹歲者各貳圓隨乳下

鐵粉圓　治涎盛潮搐吐逆

水銀砂子貳分　硃砂　鐵粉各壹分

輕粉貳分　天南星炮製去皮臍取末壹分

右同研水銀星盡爲度薑汁麪糊圓粟米大煎生薑湯下拾圓至拾伍圓貳叁拾圓無時

銀液圓　治驚熱膈實嘔吐上盛涎熱

水銀半兩　天南星貳錢炮　白附子壹錢炮

右爲末用石腦油爲膏每服壹皁子大薄荷湯下

鎮心圓　治小兒驚癇心熱

硃砂　龍齒　牛黃各壹錢　鐵粉　琥珀

人參 茯苓 防風各貳錢 全蝎柒箇焙

右末煉蜜圓如桐子大每服壹圓薄荷湯下

金箔圓 治急驚涎盛

金箔貳拾片 天南星剉炒 白附子炮 防風去蘆鬚焙 半夏湯浸七次切焙乾稱各半兩 雄黃 辰砂各壹分 生犀末半分 牛黃 腦麝各半分已上六物研

右爲細末薑汁麪糊圓麻子大每服叁伍圓至壹貳拾圓人參湯下如治慢驚去龍腦服無時

辰砂圓 治驚風涎盛潮作及胃熱吐逆不止

辰砂別研 水銀砂子各壹分 天麻 牛黃伍分 腦麝別研伍分 生犀末

白殭蠶酒炒 蟬殼去足 乾蝎去毒炒

麻黃去節 天南星湯浸柒次焙切乾稱各壹分

右同爲末再研勻熟蜜圓如菉豆大硃砂爲衣每服壹貳圓或伍柒圓食後服之薄荷湯送下

剪刀股圓 治一切驚風久經宣利虛而生驚者

硃砂 天竺黃各研 白殭蠶去頭足炒 蝎去毒炒 乾蟾去四足并腸洗炙焦黃爲末 蟬殼去劍 五靈脂去黃者爲末各壹分 牛黃 龍腦并研各壹字 麝香研伍分 蛇黃伍錢燒赤醋淬叁伍次放水研飛

右藥末共貳兩肆錢東流水煮白麪糊圓桐子大

每服壹圓剪刀環頭研食後薄荷湯化下如治慢驚卽去龍腦

麝蟾圓　治驚涎潮搐

大乾蟾 秤貳錢灰各另研　鐵粉 叁錢　硃砂

青礞石末　雄黃末　蛇黃 燒取末各貳錢匕

龍腦壹字匕　麝香壹錢匕

右件研勻水浸蒸餅爲圓如桐子大硃砂爲衣薄荷水下半圓至壹圓無時

軟金丹　治驚熱痰盛壅嗽膈實

天竺黃　輕粉 各貳兩　青黛壹錢

黑牽牛 取頭末半夏 用生薑叁錢搗成麴焙乾再爲細末各叁分

右同研勻熟蜜劑爲膏薄荷水化下半皁子大至壹皁子大量兒度多少用之食後

桃枝圓　疎取積熱及結胸又名桃符

巴豆霜　川大黃　黃蘗末各壹錢

輕粉　硇砂 各伍分

右爲細末麪糊圓粟米煎桃枝湯下壹晬兒伍柒圓伍柒歲貳叁拾圓桃符湯下亦得未晬兒叁貳圓臨臥

蟬花散　治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛

蟬花和殼 白殭蠶直者酒炒熟　甘草炙各壹錢

延胡索半分

右爲末壹歲壹字四五歲半錢蟬殼湯下食後

鉤藤引子　治吐利脾胃虛風慢驚

鉤藤叁分　蟬殼　防風去蘆頭切
人參去蘆頭切　麻黃去節稱　白殭蠶炒黃
天麻　蝎尾去毒炒各半兩　甘草炙
川芎各壹分　麝香壹分別研入

右同爲細末每服貳錢水壹盞煎至陸分溫服量多少與之寒多加附子末半錢無時

抱龍圓　治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時兩服之

天竺黃壹兩　雄黃水飛壹錢　辰砂
麝香各別研半兩　天南星肆兩臘月釀牛膽中陰乾百日如無只將生者去皮臍剉炒乾用

右爲細末煮甘草水和圓阜子大溫水化下服之百日小兒每圓分作叁肆服五歲壹貳圓大人叁伍圓亦治室女白帶伏暑用鹽少許嚼壹貳圓新水送下臘月中雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸天南星三日候透軟煮叁伍沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末捌兩以甘草貳兩半拍破用水貳碗浸壹宿慢火煮至半碗去滓旋旋灑入天南星末慢研之令甘草水盡入餘藥

豆卷散　治小兒慢驚多用性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱症有病愈而致熱症者有反爲急驚者甚多當問病者幾日因何得之曾以何藥療之可解毒之藥無不效宜此方

大豆黃卷 水浸黑豆生芽是也曬乾　板藍根

貫衆　甘草炙各壹兩

右四物同爲細末每服半錢至壹錢水煎去滓服甚者叁錢漿水內入油數點煎又治吐蟲服無時

龍腦散　治急慢驚風

大黃蒸　半夏湯洗薄切用薑汁浸一宿焙乾炒　甘草

金星石　禹餘糧　不灰木

青蛤粉　銀星石　寒水石

右各等分同爲細末研入龍腦壹字再研勻新水調壹字至伍分量兒大小與之通解諸毒本舊方也仲陽添入甘松叁兩枝藿香葉末壹錢金芽石壹分減大黃一半治藥毒吐血神妙

虛風方　治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風因成慢驚

大天南星 壹箇重捌玖錢已上者良

右用地坑子一箇深叁寸許用炭火伍觔燒通赤入好酒半盞在內然後入天南星卻用炭火叁兩條蓋卻坑子候南星微裂取出刺碎再炒勻熟不

可稍生候冷爲細末每服伍分或壹字量兒大小濃煎生薑防風湯食前調下無時

虛風又方

半夏壹錢湯洗柒次薑汁浸半日曬乾　梓州厚朴壹兩細剉

石件米泔叁升同浸壹百刻水盡爲度如百刻水未盡加火熬乾去厚朴只將半夏研爲細末每服半字壹字薄荷湯調下無時

褊銀圓　治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘粗

巴豆去皮油心膜研細　水銀各半兩　黑鉛貳錢半水硃結砂子

麝香伍分另研　好墨捌錢研

右將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和圓如菉豆大捏褊壹歲壹圓貳叁歲貳叁圓伍歲以上伍陸圓煎薄荷湯放冷送下不得化破更量虛實增減並食後

又牛黃膏　治熱及傷風疳熱

雄黃研　甘草末　川甜硝各壹分

寒水石生飛研壹兩　腦子壹錢　菉豆粉半兩

右研勻鍊蜜和成膏薄荷水化下半皁大食後

五福化毒丹　治瘡疹餘毒上攻口齒躁煩亦咽乾口舌生瘡及治蘊熱積毒熱驚惕狂躁

生熟地黃焙秤各伍兩　元參　天門冬去心

麥門冬去心焙秤各叁兩　甘草炙　甜硝各貳兩

青黛壹兩半

右上八味爲細末後研入硝黛鍊蜜圓如雞豆大每服半圓或壹圓食後水化下

羌活膏　治脾胃虛肝氣熱盛生風或取轉過或吐瀉後爲慢驚亦治傷寒

羌活去蘆頭　川芎　人參去蘆頭　赤茯苓去皮　白附子炮各半兩　天麻壹兩　白殭蠶酒浸炒　乾蝎去毒炒　白花蛇酒浸取肉焙乾各壹分　川附子炮去皮臍　防風去蘆頭切焙　麻黃去節秤各叁錢　荳蔻肉　雞舌香即母丁香　藿香葉　木香各貳錢　輕粉壹錢　珍珠

麝香　牛黃各壹錢　龍腦半字　雄黃　辰砂各壹分已上十味各別研入

右同爲細末熟蜜和劑旋圓大豆大每服壹貳圓食前薄荷湯或麥冬湯溫化下實熱驚急勿服性溫故也服無時

郁李仁圓　治褓褓小兒大小便不通驚熱痰實欲得溏動者

郁李仁去皮　川大黃去粗皮取實者對酒浸半日控乾炒爲末各壹兩　滑石半兩研細

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石圓如黍米大量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

犀角圓　治風熱痰實面赤大小便秘澀三焦邪熱
腑臟蘊毒疎導極穩方
生犀角末壹分　人參去蘆頭切　枳實去瓤炙
檳榔半兩　黃連壹兩
大黃貳兩酒浸切片以巴豆去皮壹百箇貼在大黃
上紙裹飯上蒸三次切炒令黃焦去巴豆不用
右爲細末鍊蜜和圓如麻子大每服壹貳拾圓臨
臥熟水下未動加圓亦治大人孕婦不損
異功散　温中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷
病先與數服以助其氣
人參切去頂　茯苓去皮　白朮
陳皮剉　甘草各等分
右爲細末每服貳錢水壹盞生薑伍片棗兩箇同
煎至柒分食前温服量多少與之
藿香散　治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉過度
者
麥門冬去心焙　半夏麴　甘草炙各半兩
藿香葉壹兩
右爲末每服伍分至壹錢水壹盞半煎柒分食前
温服
如聖圓　治冷熱疳瀉
胡黃連　白蕪荑去扇炒　川黃連各貳兩
史君子壹兩去殼秤　麝香別研伍分　乾蝦蟆伍枚剉酒熬膏

右爲末用膏圓如麻子大每服人參湯下貳叁歲者伍柒圓以上者拾圓至拾伍圓無時

白附子香連圓　治腸胃氣虛暴傷乳哺冷熱相雜瀉痢赤白裹急後重腹痛搐撮晝夜頻併乳食減少

黃連　木香各壹分　白附子大貳箇

右爲末粟米飯圓菉豆大或黍米大每服拾圓至貳叁拾圓食前淸米飲下日夜各肆伍服

豆蔻香連圓　治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切痛可用如聖

黃連炒叁分　肉豆蔻　南木香各壹分

右爲細末粟米飯圓米粒大每服米飲湯下拾圓至貳叁拾圓日夜各肆伍服食前

小香連圓　治冷熱腹痛水穀利滑腸方

木香　訶子肉各壹分　黃連半兩炒

右爲細末飯和圓菉豆大米飲下拾圓至叁伍拾圓頻服之食前

二聖圓　治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦成疳

川黃連去鬚　黃蘗去粗皮各壹兩

右爲細末將藥末入猪膽內湯煮熟圓如菉豆大每服貳叁拾圓米飲下量兒大小加減頻服無時

沒石子圓　治泄瀉白濁及疳痢滑腸腹痛者方

木香　黃連 各壹分　沒石子 壹箇
萱蔻仁　訶子肉 叁箇
右爲細末飯和圓麻子大米飲下量兒大小加減食前

當歸散　治變蒸有寒無熱
當歸 貳錢　木香　官桂
甘草 炙　人參 各壹錢
右㕮咀每服貳錢水柒分盞薑叁片棗壹枚去核同煎服

溫白圓　治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病後成慢驚身冷瘈瘲
天麻 生半兩　白殭蠶 炮　白附子 生
乾蝎 去毒　天南星 剉湯浸柒次焙各壹分
右同爲末湯浸寒食麪和圓如菉豆大圓了仍與寒食麪內養柒日取出每服伍柒圓至叁貳拾圓空心煎生薑米飲漸加圓數多與服

萱蔻散　治吐瀉煩渴腹脹小便少
萱蔻　丁香 各半分　舶上硫黃 壹分
桂府白滑石 叁分
右爲細末每服壹字至半錢米飲下無時

溫中圓　治小兒胃寒瀉白腹痛腸鳴吐酸水不思食及霍亂吐瀉

人參 切去頂 甘草 剉焙 白朮 各壹兩爲末
右薑汁麪和圓菉豆大米飲下壹貳拾圓無時
胡黃連麝香圓 治疳氣羸瘦白蟲作方
胡黃連 白蕪荑 去扇各壹兩 木香
黃連 各半分 辰砂 另研壹分 麝香 剉研壹錢
右爲細末麪糊圓菉豆大米飲下伍柒圓至拾圓
叁伍歲已上者可拾伍圓貳拾圓無時
大胡黃圓 治一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生米
不思飲食多睡嗞哇臟腑或秘或瀉肌膚黃瘦毛
焦髮黃飲水五心煩熱能殺蟲消進飲食治瘡癬
常服不瀉痢方

胡黃連 黃連 苦楝子 各壹兩
白蕪荑 去扇半兩 蘆薈 另研 乾蟾頭 燒存性另研各壹分
麝香 壹錢另研 青黛 壹兩半 另研
右先將前四味爲細末猪膽汁和爲劑每壹胡桃
大入巴豆仁用油單一重裹之蒸熟去巴豆用米
壹升許蒸米熟爲度入後四味爲圓如難圓少入
麪糊圓麻子大每服拾圓拾伍圓淸米飲下食後
臨臥日進叁兩服
榆仁圓 治疳熱瘦悴有蟲久服充肥
榆仁 去皮 黃連 去頭各壹兩
右爲細末用猪膽柒箇破開取汁與貳藥同和入

碗內飯上蒸九日每日壹次候日數足研麝香伍分湯浸一宿蒸餅同和成劑圓如菜豆大每服伍柒圓至壹貳拾圓米飲下無時

大蘆薈圓 治疳殺蟲和胃止瀉

蘆薈研 木香 青橘皮

胡黃連 黃連 白蕪荑去扇秤

雷丸 鶴虱微炒各半兩 麝香貳錢另研

右爲細末粟米飲圓菜豆大米飲下貳拾圓無時

龍骨散 治疳口瘡走馬疳

砒霜 蟾酥各壹字 粉霜伍分

龍骨壹錢 定粉壹錢伍分 龍腦半字

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同研每用少許傅之

橘連圓 治疳瘦久服消食和氣長肌肉

陳橘皮壹兩 黃連壹兩伍錢去鬚米泔浸壹日

右爲細末研入麝香伍分用猪膽柒箇分藥入在膽內漿水煮候臨熟以針微劄破以熟爲度取出以粟米粥和圓菜豆大每服拾圓至貳叁拾圓米飲下量兒大小與之無時

龍粉圓 治疳渴

草龍膽 定粉 烏梅肉焙秤

黃連各貳分

右爲細末煉蜜圓如麻子大米飲下壹貳拾圓無時

香銀圓 治吐

丁香 乾葛 各壹兩 半夏 湯浸拾次切焙

水銀 各半兩

右上叁味同爲細末將水銀與藥同研勻生薑汁圓如麻子大每服壹貳圓至伍柒圓煎金銀湯下無時

金華散 治乾濕瘡癬

黃丹 煅壹兩 輕粉 壹錢 黃檗

黃連 各半兩 麝香 少許

右爲末先洗次乾摻之如乾癬瘡用臘月猪脂和傳如無用麻油亦可加黃芩大黃

安蟲圓 治上中二焦虛或胃寒蟲動及痛又名苦楝圓方

乾漆 叁分杵碎炒烟盡 雄黃 巴豆霜 壹錢

右爲細末麪糊圓黍米大量兒大小與服取東行石榴根煎湯下痛者煎苦楝根湯下或蕪荑湯下伍柒圓至叁貳拾圓發時服

蕪荑散 治胃寒蟲痛

白蕪荑 去扇秤 乾漆 炒各等分

右爲細末每服壹字五分或壹錢米飲調下發時

服右方杜壬養生必用方同杜亦治胃寒蟲上

膽礬圓　治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

膽礬眞者壹錢爲末　綠礬眞者貳兩大棗拾肆箇去核好醋壹升

已上四物同煎熬令棗爛和後藥

史君子貳兩去殼　枳實去瓤炒叁兩　黃連訶黎勒去核各壹兩並爲粗末　巴豆貳柒枚去皮破之

已上五物同炒令黑約三分乾入後藥

夜明砂壹兩　蝦蟆灰存性壹兩　苦楝根皮末半兩

已上叁物再同炒候乾同前四物杵羅爲末卻同前膏和入臼中杵千下如未成更旋入熟棗肉亦不可多恐服之難化太稠卽入溫水可圓卽圓如菉豆大每服貳叁拾圓米飲溫水下不拘時

眞珠圓　取小兒虛中一切積聚驚涎宿食乳癖治大小便澁滯療腹脹行滯氣

木香　白丁香眞者　丁香末

巴豆仁拾肆箇水浸一宿研極膩各伍分留少許爲衣　輕粉末貳分　白滑石末貳分

右爲末研勻濕紙裹燒粟米飯圓麻子大壹歲壹圓八九歲已上至十五歲服捌圓炮阜子煎湯放冷下挾風熱難動者先服涼藥壹服乳癖者減圓數隔日臨臥壹服

消堅圓　消乳癖及下交妳又治痰熱膈實取積

硇砂末　巴豆霜　輕粉各壹錢
水銀砂子兩半子大細墨少許　黃明膠末伍錢
右同研勻入麪糊圓如麻子大倒流水下壹歲壹
圓食後

百部圓　治肺寒壅嗽微有痰
百部叁兩炒　麻黃去節　杏仁肆拾箇去皮尖微炒煮叁伍沸
右爲末煉蜜圓如芡實大熱水化下加松子仁肉
伍拾粒糖圓之合化大妙

紫草散　發斑疹
鉤藤鉤子　紫草茸各等分
右爲細末每服壹字或伍分壹錢温酒調下無時

秦艽散　治潮熱減食蒸瘦方
秦艽去蘆頭切焙　甘草炙各壹兩　乾薄荷半兩勿焙
右爲麤末每服壹貳錢水壹中盞煎至捌分食後
温服

地骨皮散　治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱方
地骨皮自採佳　知母　銀州柴胡去蘆
甘草炙　半夏湯洗柒次切焙　人參切去頂焙
赤茯苓各等分
右爲細末每服貳錢薑伍片水壹盞煎至捌分食
後温服量大小加減

人參生犀散　解小兒時氣寒壅欬嗽痰逆喘滿心

忪驚悸臟腑或秘或泄調胃進食又主一切風熱
服尋常涼藥即瀉而減食者
人參切去蘆叁錢 前胡去蘆柒錢 甘草炙黃貳錢
桔梗 杏仁去皮尖略曝乾爲末秤各伍錢
右將前四味爲末後入杏仁再粗羅羅過每服貳
錢水壹盞煎至捌分去滓温服食後
三黃圓 治諸熱
黃芩半兩去心 大黃去皮濕紙裹煨 黃連去鬚各壹錢
右同爲細末麪糊圓菉豆大或麻子大每服伍柒
圓至拾伍圓貳拾圓食後米飲送下
治頤開不合鼻塞不通方
天南星大者微炮去皮爲細末淡醋調塗緋帛上
貼頤上火炙手頻熨之
黃芪散 治虛熱盜汗
牡蠣煅 黃芪 生地黃各等分
右爲末煎服無時
虎杖散 治實熱盜汗
右用虎杖剉水煎服量多少與之無時
捻頭散 治小便不通方
延胡索 川苦楝各等分
右同爲細末每服伍分或壹錢捻頭湯調下量多
少與之如無捻頭湯即湯中滴油數點食前

羊肝散　治瘡疹入眼成翳

右用蟬蛻末水煎羊子肝湯調服貳叁錢凡痘瘡纔欲着痂即用酥或面油不住潤之可揭即揭去若不潤及遲揭瘡硬即隱成瘢痕

蟬蛻散　治斑瘡入眼半年已內者壹月取效

蟬蛻去土取末貳兩　猪懸蹄甲壹兩罐子內鹽泥固濟燒存性

右二味研入羚羊角細末壹分拌勻每服壹字百日外兒伍分叁歲以上壹貳錢温水或新水調下日三四夜一二食後服一年以外難治

烏藥散　治乳母冷熱不和及心腹時痛或水瀉或乳不好

天台烏藥　香附子破用白者　高良薑

赤芍藥

右各等分爲末每服壹錢水壹盞同煎陸分温服如心腹疼痛入酒煎水瀉米飲調下無時

二氣散　治冷熱驚吐反胃一切吐利諸治不效者

硫黃半兩研　水銀貳錢半研不見星

右每服壹字至伍分生薑水調下或同炒結砂爲圓

葶藶圓　治乳食衝肺咳嗽面赤痰喘

甜葶藶隔紙炒　黑牽牛炒　漢防已

杏仁炒去皮尖各壹錢

右爲末入杏仁泥取蒸陳棗肉和搗爲圓如麻子大每服伍圓至柒圓生薑湯送下

麻黃湯　治傷風發熱無汗咳嗽喘急

麻黃去節叁錢水煮去肉　桂貳錢

甘草炙壹錢　杏仁柒箇去皮尖麩炒黃研膏

每服壹錢水煎服以汗出爲度自汗者不宜服

生犀磨汁　治瘡疹不快吐血衄血

生犀磨汁

大黃圓　治諸熱

大黃　黃芩各壹兩

右爲末煉蜜圓如菉豆大每服伍圓至拾圓温蜜水下量兒加減

史君子圓　治臟腑虛滑及疳瘦下利腹脇脹滿不思乳食常服安蟲補胃消疳肥肌

厚朴去粗皮薑汁塗炙　甘草炙　訶子肉半生半煨

青黛各半兩如是兼驚及帶熱瀉入此味如只變疳不調不用此味　陳皮去白壹分

史君子去殼壹兩麪裹煨熟去麪不用

右爲末煉蜜圓如小雞豆大每服壹圓米飲化下百日已上一歲已下服半圓乳汁化下

青金丹　疎風利痰

蘆薈　牙硝　青黛各壹錢

史君子叁枚　硼砂　輕粉各伍分

蝎梢 拾肆箇

右末磨香墨拌圓麻子大每叁圓薄荷湯下

燒青圓 治乳癖

輕粉 粉霜 硇砂 各壹錢

白麪貳錢 元精石壹分 白丁香壹字

定粉壹錢 龍腦拾字

右同一處研令極細滴水和爲壹餅以文武火燒熟勿焦再爲末研如粉麪滴水和圓如黃米每服柒圓漿水化下叁歲以下服伍圓量兒大小加減服之此古方也

敗毒散 治傷風瘟疫風濕頭目昏暗四肢作痛增寒壯熱項强睛疼或惡寒咳嗽鼻塞聲重

柴胡洗去蘆 前胡 川芎

枳殼炒 羌活 獨活

茯苓 桔梗炒 人參 各壹兩

甘草半兩

右爲末每服貳錢生薑薄荷煎加地骨皮天麻或咬咀加蟬蜕防風治驚熱可加芍藥乾葛黃芩無汗加麻黃

小兒藥證直訣下

C101/1815
v.7

附方　　閻孝忠

余家幼稚多疾率用錢氏方訣取效如神因復研究諸法有得于心如驚疳等錢仲陽之未悉者今見於下并以仲陽傳附卷末

小兒急慢驚古書無之惟曰陰陽癇所謂急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之類是也陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可悞也急驚由有熱熱即生風又或因驚而發則目上目瞤涎潮搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱藥壹貳服

直訣中麝香圓鎮心圓抱龍圓候驚勢已定須臾
辰砂圓及至寶丹紫雪之類候驚勢已定須臾
以藥下其痰勢直訣中利驚圓軟金丹桃枝
圓之類或用大黃朴硝等藥利下
痰熱心神安甯即愈慢驚得於大病之餘吐瀉之
後或候取轉致脾胃虛損風邪乘之凡小兒吐瀉
驚宜不止必成慢
速治似搐而不甚搐此名似睡而精神慢四肢與
癖癡
口中氣皆冷睡露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此證
已危蓋脾胃虛損故也

凡小兒吐瀉當温補之余每用理中圓以温其中以
五苓散導其逆五苓散最治小兒吐連與數服兼用異功散
等温藥調理之往往便愈若已虛損當速生其胃
氣宜與附子理中圓研金液丹末煎生薑米飲調

灌之惟多服乃效服至貳參兩無害候胃氣已生手足漸
暖陰退陽回然猶痰癡即減金液丹壹貳分增青
州白圓子壹貳分同研如上服以意詳之漸減金
液丹加白圓子兼用異功散羌活膏温白圓鉤藤
飲子之類調理至安依此治之仍頻與粥雖至危
者往往死中得生拾救捌玖

金液丹治小兒吐瀉虛極最妙沈存中良方論金液
丹云親見小兒吐利劇氣已絕服之復活者數人
眞不妄也須多服方驗

驚風或洩瀉等諸病煩渴者皆津液內耗也不問陰
陽宜煎錢氏白朮散使滿意取足飲之彌多彌好

凡小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方搐但扶持不可擒捉蓋風氣方盛恐流入筋脉或致手足拘攣

治急慢驚世人多用壹藥有性温性涼不可泛用宜審別之又治慢驚藥宜去龍腦縱須合用必以温藥爲佐或少用之

凡小兒實熱疎轉後如無虛證不可妄温補熱必隨生

治小兒驚風痰熱堅癖能不用水銀輕粉甚便如不得已用之僅去疾即止蓋腸胃易傷亦損口齒

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致悞也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐食宜以藥下之

小兒耳冷骹冷手足乍冷乍熱面赤時嗽噫驚悸此瘡疹欲發也未能辨認間服升麻葛根湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡荽酒黃蘗膏暑月煩躁食後與白虎湯玉露散熱盛與紫雪咽痛或生瘡與甘桔湯甘露飲子餘依錢氏說大人同

小兒多因愛惜過當往往參兩歲未與飲食致脾胃虛弱平生多病自半年以後宜煎陳米稀粥取粥面時時與之拾月以後漸與稠粥爛飯以助中氣

自然易養少病惟忌生冷油膩甜物等

小兒治法大槩與大人同惟劑料小耳如升麻葛根湯惺惺散等雖人皆知之倉卒亦難檢今並載于下錢氏已有方者今不復錄

升麻葛根湯治傷寒温疫風熱壯熱頭痛肢體痛瘡疹已發未發並宜服之

乾葛（細劉）　升麻　芍藥　甘草（劉炙各等分）

右同爲麤末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞量大小與之温服無時

惺惺散治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和

桔梗（細辛去葉）　人參（切去頂焙）　甘草（劉炒）　白朮　白茯苓（去皮）　括蔞根（各壹兩）

右同爲細末每服貳錢水壹盞入薄荷伍葉煎至柒分温服不拘時如要和氣入生薑伍片同煎壹法用防風壹分用川芎壹分

消毒散治瘡疹未出或已出未能匀遍又治一切瘡涼膈去痰治咽痛

牛蒡子（貳兩炒）　甘草（半兩劉炒）　荆芥穗（壹分）

右同爲麤末每服叁錢水壹盞半煎至壹盞温服不拘時

黃蘗膏治瘡疹已出用此塗面次用胡荽酒

黃蘗去麁皮壹兩　甘草肆兩　新菜豆壹兩半

右同爲細末生油調從耳前至眼輪並厚塗之日參兩次如早用瘡不上面縱有亦少

胡荽酒

胡荽細切肆兩以好酒貳盞煎壹兩沸入胡荽再煎少時用物合定放冷

右每吸壹兩口微噴從頂至足勻遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽卽能辟去汗氣瘡疹出快瘡疹忌外人及穢觸之物雖不可受風冷然亦不可擁遏常令衣服得中并虛涼處坐臥

治瘡疹出不快及倒撅四聖散

紫草茸　木通剉　甘草剉炒

枳殼麩炒去穰秤　黃耆切焙等分

右同爲麁末每服壹錢水壹中盞煎捌分温服無時

又方藍根散

板藍根壹兩　甘草參分剉炒

右同爲細末每服半錢或壹錢取雄雞冠血參兩點同温酒少許食後同調下貳方無證勿服

治瘡疹倒撅黑陷

人牙燒存性研入麝香少許

右每服參錢温酒少許調下無時

又方

小豬兒尾尖取血叁伍點研入生龍腦少許

右新水調下食後

治伏熱在心昏聵不省或悞服熱藥搐熱冒昧不知人及瘡疹倒攝黑陷

生梅花腦子研半字或壹字

右取新殺豬心壹箇取心中血同研作大圓用新汲水少許化下未省再服如瘡疹陷伏者温酒化下

甘露飲子治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發並可服又治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搖

生乾地黃焙秤　熟乾地黃焙秤　天門冬

麥門冬各去心焙秤　枇杷葉去毛　黃芩去心

石斛去苗　枳殼麩炒去穰　甘草剉炒

山茵陳葉

右各等分爲麤末每服貳錢水壹盞煎至捌分食後温服牙齒動搖牙齦腫熱含嗽澡并服

白虎湯解暑毒煩躁身熱痰盛頭痛口燥大渴

知母壹兩半焙乾秤　甘草半兩剉炒　石膏肆兩

白粳米捌錢

右同爲麤末每服叁錢水壹盞煎至捌分食後温冷隨意服氣虛人加人參少許同煎

瘡疹太盛宜服此調肝散令不入眼

生犀 刉取末 壹分　龍膽草 半錢　黃耆 半兩 切
大黃 去皮 貳錢　石膏 半兩　桑白皮 自採 焙乾
鉤藤鉤子　麻黃 去節 各 壹分　括蔞 去皮
甘草 炙 各等分

右爲麤末每服貳錢水壹盞煎半盞食後時時温服少許

治瘡疹入眼

馬勃 半兩　阜角子 拾肆箇　蛇皮 半兩

右入小鑵子內鹽泥固濟燒存性研細温酒調下壹貳錢食後服

又方治瘡疹入眼成翳

括蔞根 半兩　蛇皮 貳錢

右同爲細末用羊子肝壹箇批開入藥末貳錢麻纏定米泔煮熟頻與食之未能食肝令乳母多食

又方

蟬殼末

右用水煎羊子肝湯調服貳叁錢

凡痘瘡才欲著痂即用酥或面油不住潤之可揭即揭去若不潤及遲揭瘡痂硬即隱成瘢痕

治口瘡

天南星去皮只取中心如龍眼大爲細末

右用醋調塗腳心

治癰耳

白礬火飛壹錢　麝香壹字

坯子烟脂染烟脂也壹錢

右同研勻每用少許先用綿裹杖子揾淨摻之

治蓄熱在中身熱狂躁昏迷不食

豆豉半兩　大梔子仁炒黑擣破

右共用水叁盞煎至貳盞看多少服之無時或吐或不吐立效

治蟲咬心痛欲絕

五靈脂末貳錢匕　白礬火飛柒錢匕

右同研每服壹貳錢水壹盞煎伍分温服無時當吐出蟲

治脾胃虛寒吐瀉等病及治冷痰

齊州半夏湯浸柒次切焙壹兩　陳粟米叁分陳粳米亦得

右㕮咀每服叁錢水壹大盞半生薑拾片同煎至捌分食前温熱服

治外腎腫硬成疝

乾蚯蚓爲細末

右用唾調塗常避風冷濕地

小兒腹中極痛乾嘔後偃名盤腸內弔鉤藤膏

沒藥研　好乳香水中坐乳鉢研細秤

木香　薑黃各肆錢　麝子仁拾貳箇

右先將下參味同爲細末次研入上貳味煉蜜和成劑收之每壹歲兒可服半皁子大餘以意加減煎鉤藤湯化下無時次用魏香散

魏香散

蓬莪朮半兩　眞阿魏壹錢

右先用温水化阿魏浸蓬莪朮壹晝夜焙乾爲細末每服壹字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

地黃散治心肝壅熱目赤腫痛生赤脉或白膜遍睛四邊散漫者猶易治若暴遮黑睛多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

生乾地黃切焙秤　熟乾地黃切焙秤　當歸去蘆頭切焙秤各壹分　黃連去鬚壹錢　木通壹錢半　元參半錢　甘草壹錢半剉炒　防風去蘆頭焙　羌活　生犀末　蟬殼去土　木賊　穀精草　白蒺藜去尖　沙苑蒺藜各壹錢　大黃去皮取實者剉略炒壹錢

右爲細末每服壹字或半錢量大小加減煎羊肝湯食後調下日參夜壹忌口將息亦治大人治熱痢下血

黃蘗去皮半兩　赤芍藥肆錢

右同爲細末飯和圓麻子大每服壹貳拾圓食前

米飲下大者加圓數

治心氣不足伍陸歲不能言菖蒲圓

石菖蒲貳錢　丹參貳錢　人參切去頂焙半兩
赤石脂叁錢　天門冬去心焙秤焙秤　麥門冬去心焙秤各壹兩

右同爲細末煉蜜圓菜豆大或麻子大温水下伍柒圓至壹貳拾圓不計時日叁肆服久服取效又有病後腎虛不語者宜兼服錢氏地黃圓

雞頭圓治諸病後不語

雄雞頭壹箇炙　鳴蟬叁箇炙　大黃壹兩取實處濕紙裹煨熟
甘草壹兩剉炒　木通半兩　當歸去蘆頭切焙叁分
黃耆切焙　川芎　遠志去心

麥門冬去心焙各叁分　人參切去頂焙半兩

右同爲細末煉蜜圓小豆大平旦米飲下伍圓空心日叁肆服兒大者加之久服取效雞蟬貳物宜求死者用之不可旋殺孫眞人所謂殺生求生去生更遠不可不知也

治腎虛或病後筋骨弱伍陸歲不能行宜補益肝腎

羚羊角圓

羚羊角尖細而節密者是剉取末　生乾地黃焙秤
虎脛骨敲破塗酥炙黃　酸棗仁去皮秤炒　白茯苓各半兩
桂去皮取有味處不見火　防風去蘆頭切焙　當歸同上
黃耆切焙各壹分

右同爲細末煉蜜和成劑每服壹皁子大兒大者加之食前温水化下日叁肆服取效

治驚風中風口眼喎斜語不正手足偏廢不舉全蝎散

全蝎去毒炒 殭蠶直者炒 甘草炙 赤芍藥 桂枝不見火 麻黃去節 川芎 黃芩去心各叁錢 天麻陸錢 大天南星湯浸漿次去皮臍切焙叁錢

右爲麄末每服叁錢水壹盞半薑柒片煎柒分温服無時量大小與之日叁肆服忌羊肉

和中散和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

人參切去頂焙 白茯苓 白朮 甘草劉炒 乾葛劉 黃耆切焙 白褊豆炒 藿香葉各等分

右爲細末每服叁錢水壹盞乾棗貳箇去核薑伍片煎捌分食前温服

紫蘇子散治效逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣或呵氣未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

紫蘇子 訶子去核秤 蘿蔔子 杏仁去皮尖麩炒 木香 人參切去鬚各叁兩 青橘皮 甘草劉炒各壹兩半

右爲細末每服壹錢水壹小盞入生薑叁片煎至

伍分去滓不計時候温服量大小加減

赤石脂散治癇後軀氣下推出肛門不入

眞赤石脂揀去土 伏龍肝各等分

右爲細末每用半錢傅腸頭上頻用

蘗墨散治斷臍後爲水濕所傷或褓袍濕氣傷於臍中或解脫風冷所乘故令小兒四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜速療之

黃蘗炒 釜下墨 亂髮燒各等分

右爲細末每用少許傅之

至寶丹治諸癇急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並宜服之

生烏犀屑 生玳瑁屑 琥珀研

朱砂細研水飛 雄黃已上各壹兩研細水飛

金箔伍拾片壹半爲衣 銀箔伍拾片研 龍腦壹分研

麝香壹分 牛黃半兩研

安悉香壹兩半爲末以無灰酒飛過濾淨去砂石約取壹兩慢火熬成膏

右生犀玳瑁搗羅爲細末研入餘藥令勻將安悉香膏以重湯煮凝成和搜爲劑如乾卽入少熟蜜盛不津器中旋圓如桐子大貳歲兒服兩圓人參湯化下大小以意加減又治大人卒中不語中惡氣絕中諸物毒中熱暗風產後血運死胎不下並用童子小便壹合生薑自然汁叁伍滴同温過化

下伍圓立效

紫雲治驚癇百病煩熱涎厥及傷寒胃熱發斑一切熱毒喉痺腫痛又治瘡疹毒氣上攻咽喉水漿不下

黃金拾兩　寒水石　磁石

滑石　石膏各肆兩搥錢並搗碎

已上用水伍升煮至肆升去滓入下項藥

元參壹兩陸錢搗碎　木香搗碎　羚羊角屑

犀角屑　沈香各半兩搗碎　升麻壹兩陸錢搗碎

丁香壹錢搗碎　甘草搥錢炙剉

已上搥味入前藥汁中再煮取壹升伍合去滓入下項藥

硝石參兩壹錢芒硝亦得　朴硝壹斤精者

已上貳味入前汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有柒合投在木盆中半日欲凝入下項藥

朱砂參錢飛研　麝香當門子壹錢壹字研

已上貳味入前藥中攪勻寒之兩日

右件成紫色霜雪每服壹字至半錢冷水調下大小以意加減咽喉危急病捻少許乾嚥立效又治大人腳氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫毒厲卒死温瘧五尸五疰大能解諸藥毒

每服壹錢至貳錢冷水調下並食後服

理中圓治吐利不渴米穀不化手足厥冷

人參去蘆劉 白朮劉 乾薑炮 甘草炙劉各壹兩

右爲末煉蜜和圓雞黃大每服壹圓水壹大盞化開煎及柒分連滓放温服小兒分爲叁服大小以意加減食前

五苓散治霍亂吐瀉躁渴飲水小便不利

澤瀉貳兩半劉 木豬苓去皮劉壹兩半 官桂去皮壹兩

白茯苓壹兩半劉 白朮壹兩半劉

右爲細末每服壹錢温湯調下渴躁新水調服大小以意加減不以時候

附子理中圓治脾胃寒弱風冷相乘心痛霍亂吐利轉筋

人參去蘆劉 白朮劉 乾薑炮 甘草炙劉 黑附子炮去皮臍各壹兩

右爲細末煉蜜和壹兩作拾圓每服壹圓水壹中盞化開煎及柒分稍熱服食前小兒分作叁兩服大小以意加減

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥逆精神昏塞多睡露睛口鼻氣涼欲成慢驚風者又治大人陽虛陰盛身冷脉微自汗吐利小便不禁

舶上硫黃拾兩先飛煉去砂石秤研爲細末用砂合子盛令捌分滿水和赤石脂封

縫鹽泥固濟瞧乾露地先埋壹水罐子盛水滿坐合子在上又以泥固濟訖常以參斤火養參日參夜足加頂火壹煆成候冷取藥

右以柳木搥乳鉢內研爲細末每服貳錢生薑米飲調下大小以意加減多服取效大人藥末壹兩蒸餅壹兩水浸去水脉和圓桐子大瞧乾每服伍拾圓至百圓米飲下並空心連併服

又方 范文正宅

硫黃不以多少淡黃通明者爲上飛煉去砂石研爲細末用有蓋砂罐子壹箇取水中出宇草或益母草搗淤土成泥更入紙筋同搗固濟罐子貴不破瞧乾盛硫黃末在內可不滿兩指於露地深畫十字放罐子在中心使底下通透四面用炭約肆伍斤勻火簇不蓋罐子頂時時搗覷候化爲汁速去四面火用濕土埋壹宿次日取出於北蔭下不見日氣處撅壹坑子約壹貳尺將罐子去蓋倒埋壹宿次日取出和罐入湯內煮伍拾沸漉出取藥

右以柳木搥乳鉢內研如粉麪相似小兒因吐瀉之後變成慢驚風者每服壹貳錢生薑米飲調下併服取效大人陰證傷寒脉微欲絕以水浸無鹽蒸餅和圓桐子大瞧乾每服伍拾圓或百圓米飲下並空心服

青州白圓子治小兒驚風大人諸風

半夏柒兩生　天南星參兩生

白附子貳兩生　川烏頭半兩生去皮臍

右搗羅爲細末以生絹袋盛用井花水擺未出者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋擺盡爲度

放磁盆中日曝夜露至曉棄水別用井花水攪又曝至來日早再換新水攪如此春伍日夏叁日秋柒日冬拾日（壹法肆時只浸壹宿）去水曝乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清圓菉豆大每服叁伍圓薄荷湯下大人每服貳拾圓生薑湯下癱瘓風温酒下並不以時候服

小柴胡湯治傷寒温熱病身熱惡風頭痛項强四肢煩疼往來寒熱嘔噦痰實中暑瘧病並宜服

柴胡（去蘆捌錢） 半夏（湯洗切焙貳錢半） 黄芩（去心） 人參（去蘆） 甘草（炙剉各叁錢）

右爲麤末每叁錢水壹盞半生薑伍片棗壹枚擘破同煎及捌分濾去滓放温分作叁兩服大小以意加減並不以時候日叁夜貳

錢仲陽傳

河閒劉跂撰

錢乙字仲陽上世錢塘人與吳越王有屬俶納土曾祖贇隨以北因家于鄆父顯善鍼醫然嗜酒喜游一旦匿姓名東游海上不復返乙時三歲母前亡父同產姑嫁醫呂氏哀其孤收養爲子稍長讀書從呂君問醫呂將歿乃告以家世乙號泣請往跡父凡五六返乃得所在又積數歲乃迎以歸是時乙年三十餘鄉人驚嘆感慨爲泣下多賦詩詠其事後七年父以壽終喪葬如禮其事呂君猶事父呂君歿無嗣爲之收葬行服嫁其孤女歲時祭享皆與親等乙始以顯

顯方著山東元豐中長公主女有疾召使視之有功奏授翰林醫學賜緋明年皇子儀國公病瘈瘲國醫未能治長公主朝因言錢乙起草野有異能立召入進黃土湯而愈神宗皇帝召見褒諭且問黃土所以愈疾狀乙對曰以土勝水木得其平則風自止且諸醫所治垂愈小臣適當其愈天子悅其對擢太醫丞賜紫衣金魚自是戚里貴室隸士庶之家願致之無虛日其論醫諸老宿莫能持難俄以病免哲宗皇帝復召宿直禁中久之復辭疾賜告遂不復起乙本有羸疾性簡易嗜酒疾屢攻自以意治之輒愈最後得病憊甚乃嘆曰此所謂周痺也周痺入臟者死吾其已夫已而曰吾能移之使病在末因自製藥日夜飲之人莫見其方居亡何左手足攣不能用乃喜曰可矣又使所親登東山視菟絲所生秉火燭其下火滅處劚之果得茯苓其大如斗因以法啗之閱月而盡繇此雖偏廢而氣骨堅悍如無疾者退居里舍杜門不冠履坐臥一榻上時時閱史書雜說客至酌酒劇談意欲之適則使二僕夫輿之出沒閭巷人或邀致之不肯往也病者日造門或扶攜襁負纍纍滿前近自鄰井遠或百數十里皆授之藥致謝而去初長公主女病泄痢將殆乙方醉曰當發疹而愈駙馬都尉以爲不然怒責之不對而退明日疹果出尉喜以詩

謝之廣親宗室子病診之曰此可無藥而愈顧其幼曰此兒旦夕暴病驚人後三日過午無恙其家恚曰幼何疾醫貪利動人乃如此明日果發癇甚急復召乙治之三日愈問何以無疾而知曰火急直視心與肝俱受邪過午者心與肝所用時當更也宗室王子病嘔泄醫以藥溫之加喘乙曰病本中熱脾且傷奈何以剛劑燥之將不得前後溲與石膏湯王與醫皆不信謝罷乙曰毋庸復召我後二日果來召適有故不時往王疑且怒使人十數輩趣之至曰固石膏湯證也竟如言而效有士病嗽面青而光其氣喘哽乙曰肝乘肺此逆候若秋得之可治今春不可治其家

祈哀強之與藥明日曰吾藥再瀉肝而不少卻三補肺而益虛又加脣白法當三日死然安穀者過期不安穀者不及期今尚能粥居五日而絕有娠婦得疾醫言胎且墮乙曰娠者五臟傳養率六旬乃更能候其月偏補之何必墮已而子母皆得全又乳婦因大恐而病病雖愈目張不得瞑人不能曉以問乙乙曰煮郁李酒飲之使醉則愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽衝不下惟郁李去結隨酒入膽結去膽下目則能瞑矣如言而效一日過所善翁聞兒嘵愕曰何等兒聲翁曰吾家孿生二男子乙曰謹視之過百日乃可保翁不懌居月餘皆斃乙爲方博達不名

一師所治種種皆通非但小兒醫也于書無不闚他人靳靳守古獨度越縱舍卒與法合尤邃本草多識物理辨正闕誤人或得異藥或持疑事問之必爲言出生本末物色名貌退而考之皆中末年攣痺浸劇其嗜酒喜寒食皆不肯禁自診知不可爲召親戚訣別易衣待盡享年八十二終于家所著書有傷寒論指徵五卷嬰孺論百篇一子早世二孫今現爲醫劉跂曰乙非獨其醫可稱也其篤行似儒其奇節似俠術盛行而身隱約又類夫有道者歟謂余言曩學六元五運夜宿東平王家巔觀氣象至逾月不寐今老且死事誠有不在書者肯以三十日暇從我當相授余笑謝弗能是後遂不復言嗚呼斯人也如欲復得之難哉没後余聞其所治驗尤衆東州人人能言之掇其章章者著之篇異時史家序方術之士其將有攷焉



C101/1815
v.8

童蒙訓上

保赤彙編

呂氏本中居仁

學問當以孝經論語中庸大學孟子爲本熟味詳究然後通求之詩書易春秋必有得也既自做得主張則諸子百家長處皆爲吾用矣

孔子已前異端未作雖政有污隆而教無他說故詩書所載但說治亂大概至孔子後邪說竝起故聖人與弟子講學皆深切顯明論語大學中庸皆可考也其後孟子又能發明推廣之

大程先生名顥字伯淳以進士得官正獻公爲中丞薦之朝用爲御史論新法不合罷去泰陵卽位以宗

正丞召未受命卒於家其門人共謚爲明道先生先生嘗以董仲舒正其義不謀其利明其道不計其功爲合於聖人仲舒之學度越諸子者以此故門人以先生學之所就以明道見其志焉

小程先生名頤字正叔舉進士殿試不中不復再試元祐初正獻公與司馬溫公同薦遂得召用侍講禁中旋又罷去遂不復用紹聖中貶涪州元符還洛大觀閒卒於家學者謂之廣平先生後居伊陽又謂之伊川先生二程先生自小刻勵推明道要以聖學爲己任學者靡然從之當時謂之二程

二程始從周茂叔先生爲窮理之學後更自光大茂叔名敦頤有太極說傳於世其辭雖約然用志高遠可見也正獻公在侍從時聞其名力薦之自常調除轉運判官茂叔以啟謝正獻公云在薄宦有四方之遊於高賢無一日之雅

張戩天祺與弟載子厚關中人關中謂之二張篤行不苟爲一時師表二程之表叔也子厚推明聖學亦多資於二程者呂大臨與叔兄弟後來蘇昞等皆從之學學者稱子厚爲橫渠先生天祺之爲御史用正獻公薦也

二程與橫渠從學者既盛當時亦名其學爲張程云

榮陽公年二十一一本作十九時正獻公使入太學在胡

先生席下與伊川先生鄰齋伊川長滎陽公纔數歲公察其議論大異首以師禮事之其後楊應之國寶邢和叔恕左司公待制皆師尊之自後學者遂眾實自滎陽公發之也

關中始有申顏者特立獨行人皆敬之出行市肆人皆爲之起從而化之者眾其後二張更大發明學問淵源

伊川先生嘗至關中關中學者皆從之遊致恭盡禮伊川歎洛中學者弗及也

伊川先生嘗識楊學士應之於江南常稱其偉度高識絕人遠甚楊學士是時猶未師伊川也

安定胡先生之主湖州學也天下之人謂之湖學學者最盛先生使學者各治一事如邊事河事之類各居一齋日夕講究其後從學者多爲時用益先生教人務有實效不爲虛言也是時孫公莘老名覺顧公子敦名臨最爲高弟

正獻公之在侍從也專以薦賢爲務如孫莘老覺李公擇常王正仲存顧子敦臨程伯淳顥張天祺戩等皆爲一時顯人

正獻公既薦常秩後差改節嘗對伯淳有悔薦之意伯淳曰願侍郎甯百受人欺不可使好賢之心少替公敬納焉

滎陽公嘗說楊十七學士應之樂善少比聞一善言必書而記之滎陽公嘗書於壁云惟天子爲能備物惟聖人爲能備德應之遽取筆錄記之

楊應之勁挺不屈自爲布衣以至官於朝未嘗有求於人亦未嘗假人以言色也篤信好學至死不變滎陽公嘗贈之以詩云獨抱遺經唐處士差强人意漢將軍應之元祐開用范丞相堯夫薦館職不就試除太學博士出爲成都轉運判官有屬官與之辨論應之嘉其直即薦之朝其自成都召爲校書郎有遠房舅在蜀中官滿貧不能歸應之盡以成都所得數百千遺之其自立如此

邵堯夫先生受學於李挺之之才李之才受學於穆修伯長穆伯長受學於陳摶希夷其所傳先天之學具見於易圖與皇極經世故程伯淳作堯夫墓誌云推其源流遠有端緒震東方也巽南方也離南方之卦之類此入用之位如天地定位乾南而坤北山澤雷風水火相對即先天之位先生既沒其學不傳人能知其名而不知其用也嘗欲傳其學於伊川伊川不肯一日與伊川同坐聞雷聲問伊川曰雷從何方起伊川云從起處起蓋不領其意先生既沒元祐間謚康節

邵康節以十二萬四千五百年爲一會自開闢至堯

時正當十二萬年之中數故先生名雍字堯夫名雍取黎民於變時雍也其居洛陽亦取天地之中字堯夫取當堯時中數也四千五百年數未詳

邵康節居衛州之共城後居洛陽有商州太守趙郎中者康節與之有舊嘗往從之時章惇子厚作令商州趙厚遇之一日趙請康節與章同會章豪俊自許議論縱橫不知敬康節也語次因及洛中牡丹之盛趙守因謂章曰先生洛人也知花爲甚詳康節因言洛人以見根榦而知花之高下者知花之上也見枝葉而知高下者知花之次也見菩蕾而知高下者知花之下也如長官所說乃知花之下也章默然慚服

趙因謂章先生學問淵源世之師表公不惜從之學則日有進益矣章因從先生遊欲傳數學先生謂章須十年不仕宦乃可學蓋不之許也

虔州人李潛君行先生篤行自守不交當世年五十餘監泗州僧伽塔人弗知也右丞范公彝叟爲發運使始深知之力薦於朝除太學博士校書郎紹聖中力求去知靳州遂請老君行之學專以經書論語孟子爲正舍此皆不取如七世之廟可以觀德則專守七廟其他言廟數不同者皆無取也昊天有成命郊祀天地也則是合祭天地無疑也其言南北郊其言圜丘郊祫異禮皆不取也其學簡而易明以行己爲

本不爲空言東萊公與叔父舜從皆與之遊
君行先生嘗言學者當以經書論語孟子如秤相似
以秤量衆說其輕重等者正也其不等者不正也
田腴誠伯篤實士東萊公與叔父舜從之交遊也嘗
從橫渠學後從君行遊誠伯每三年治一經學問通
貫當時無及之者深不取佛學建中靖國間用會子
開內翰薦除太學正崇甯初罷去誠伯叔父明之亦
老儒也然專讀經書不讀子史以爲非聖人之言不
足治也誠伯以爲不然曰博學而詳說之將以反說
約也如不遍覽非博學詳說一謂
徐積仲車先生山陽人小許牓登科初從安定胡先

生學潛心力行不復仕進其學以至誠爲本積思六
經而喜爲文辭老而不衰先生自言初見安定先生
退頭容少偏安定忽厲聲云頭容直某因自思不獨
頭容直心亦要直也自此不敢有邪心後因具公裳
以見貴官又自思云兒貴官尙必用公裳豈有朝夕
見母而不具公裳者乎遂晨夕具公裳揖母先生事
母至孝山陽人化之
先生嘗爲文訓厲學者云仲車先生一日升堂訓諸
生曰諸君欲爲君子而使勞己之力費己之財如此
而不爲君子猶可也不勞己之力不費己之財諸君
何不爲君子鄉人賤之父母惡之如此而不爲君子

猶可也父母欲之鄉人榮之諸君何不爲君子又曰言其所善行其所善思其所善如此而不爲君子未之有也言其不善行其不善思其不善如此而不爲小人未之有也

元符三年榮陽公自和州謫居起知單州道過山陽因出過市橋橋壞墮水而不傷焉仲車先生年幾七十矣作我敬詩贈公云我敬呂公以其德齒敬之愛之何時已已美哉呂公文在其中見乎外者古人之風惟賢有德神相其社何以祝公勿藥有喜詩後批云前日之事橋梁腐敗人乘蹉跌而公晏然無傷固有神明陰相其德願爲本朝自重生民自重

熙甯初榮陽公監陳留稅務時汪輔之居陳留恃才傲物獨敬重公橫渠先生問之語人云於蠻貊之邦行矣於呂原明見之

正獻公嘗稱榮陽公於張文潛云此子不欺闇室

榮陽公之監陳留稅也章樞密質夫粲知縣事雅敬愛公一日因語次暴陵折公公不爲動質夫笑曰公誠厚德可服某適來相試耳

元祐中榮陽公在經筵除司諫姚舍人輝中書當制詞云道學至於無心立行至於無愧心若止水退然淵靜當時謂之實錄建中靖國元年豐相之稷遷禮部尚書薦榮陽公自代詞云心與道潛（一作志以道甯湛然

淵靜所居則躁一作里人化聞風則薄夫敦

滎陽公入太學時二十一歲矣胡先生實主學與黃右丞安中履邢尚書和叔恕同齋舍時安中二十六歲爲齋長和叔十九歲安中方精專讀書早晨經書每授五百遍飯後史書可誦者百遍夜讀子書每授三百遍每讀書危坐不動句句分明和叔時雖少當世時務無不通曉當世人材無不徧知

滎陽公教學者讀書須要字字分明仍每句最下一字尤要令聲重則記牢

正獻公簡重清靜出於天性冬月不附火夏月不用扇聲色華耀視之漠然也范公內翰淳夫祖禹實公之壻性酷似公後滎陽公長壻趙仲長演嚴重有法亦實似公焉

正獻公教子既有法而申國魯夫人簡肅公諱宗道之女閨門之內舉動皆有法則滎陽公年十歲夫人命對正獻公則不得坐命之坐則坐不問不得對諸子出入不得入酒肆茶肆每諸婦侍立諸女少者則從婦傍

正獻公年三十餘通判潁州歐陽文忠公知州事焦伯强千之方從歐陽公學正獻公請伯强處書室命滎陽公從學焉其後正獻公罷歸京師請伯强同行歐陽公有送行詩所謂有能掇之行可謂仁者勇者

也伯强性耿介不苟危坐終日不妄笑語每諸生有不至則召之坐面切責之不少假借滎陽公幼時申公與夫人嚴毅如此就師傅而得伯强其後有成非偶然也滎陽公嘗言中人以下內無賢父兄外無嚴師友而能有成者未之有也

正獻公年三十餘通判潁州已有重名范文正公以資政殿學士知青州過潁來復謁公呼公謂之曰太博近朱者赤近墨者黑歐陽永叔在此太博宜頻近筆研申國夫人在廳事後聞其語嘗舉以教滎陽公爲前輩規勸懇切出於至誠類如此也

滎陽公嘗言世人喜言無好人三字者可謂自賊者也包孝肅公尹京時民有自言有以白金百兩寄我者死矣子其子不肯受願召其子予之尹召其子其子辭曰亾父未嘗以白金委人也兩人相讓久之公因言觀此事而言無好人者亦可以少愧矣人皆可以爲堯舜蓋觀於此而知之

滎陽公張夫人待制諱盈之之女也自少每事有法亦魯肅簡公外孫也張公性嚴毅不屈全類肅簡肅簡深愛之家事一委張公夫人張公幼女最鍾愛然居常至微細事教之必有法度如飲食之類飯羹許更益魚肉不更進也時張公已爲待制河北都轉運使矣及夫人嫁呂氏夫人之母申國夫人姊也一日

來視女見舍後有鍋釜之類大不樂謂申國夫人曰豈可使小兒輩私作飲食壞家法邪其嚴如此

叔父舜從既與東萊公從當世賢士大夫遊嘗訓子弟曰某幸得從賢士大夫遊過相推重然某自省所爲才免禽獸之行而已未能便合人之理也何得士大夫過相與邪因思前輩自警修省如此

正獻公交遊本中不能盡知之其顯者范蜀公司馬溫公王荆公劉原甫也滎陽公交遊則二程二張孫莘老李公擇王正仲顧子敦楊應之范醇夫黃安中邢和叔王聖美也東萊公交遊則李君行田明之田誠伯吳坦求陳端誠田承君陳瑩中張才叔龔彥和及彥和之弟大壯也

張橫渠詩云若要居仁宅先須入禮門溫公作橫渠哀辭曰教人學雖博要以禮爲先伊川先生云子厚以禮教學者最善先有所據守然則橫渠之教以禮爲本也後程門高弟張繹思叔作伊川祭文云在昔諸儒各行其志或得於數或觀於禮學者趨之世濟其美獨吾先生淡乎無味得道之眞死其乃已或得於數蓋指康節或觀於禮謂橫渠也

明道作邵康節墓誌云昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告子思子思所以授孟子者爾其餘門人各以己之所宜者爲學雖同尊聖人所因而

入者門戶則眾矣況後此千餘歲師道不立學者莫知所從來獨先生之學爲有傳也先生得之於李挺之挺之得之於穆伯長推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事概可見矣而先生醇一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂門戶雖眾各有所因而入者歟語成德者昔難其居若先生之道就所至而論之可謂安且成矣觀此誌文明道所以處康節者無餘蘊矣

李公擇尚書嘗與崇陽公諸賢講論行己須先誠實只如書帖言語之類不情繆敬盡須削去如未嘗瞻仰而言瞻仰未嘗懷渴而言懷渴須盡去之以立其

誠

伊川嘗言今僧家讀一卷經便要一卷經中道理受用儒者讀書卻只閒讀了都無用處

顧公子敦內翰嘗語東萊公云學者須習不動心事緒之來每自試久之閒果能不動則必自知曰我不動矣由此觀之前輩所以自立非徒然也

陳瑩中右司嘗言學者須常自試以觀己之力量進否易曰或躍在淵自試也此聖學也紹聖中顧公子敦被謫過京師東萊公與叔父往見之子敦再三講論行己如何云守至正以俟天命觀時變以養學術劉公待制器之嘗爲本中言少時就洛中師事司馬

公從之者二年臨別問公所以爲學之道公曰本於至誠器之因效顏子之問孔子曰請問其目公曰從不妄語始器之自此專守此言不敢失墜後任磁州司法吳守禮爲河北轉運使嚴明守法官吏畏之吳與器之尊人有舊相待頗異衆器之不以爲喜一日有人告磁州司戶贓污於轉運使者吳親至磁州欲案其事召器之至驛舍堂中器之心不喜曰常時相待少異我已自不喜況今召我至堂中人得無疑我乎吳因問司戶贓污如何器之對曰不知吳因不悅曰與公有契所以相問何不以誠告明日吳閱視倉庫召司戶者謂曰人訴爾有贓本欲來案爾今劉司法言爾無之姑去且謹視倉庫俟北京回倉庫不如法必案無疑也於是衆方知器之長者然器之心常不自快曰司戶實有贓而我不以誠告吾其違司馬公教乎後因讀楊子云君子避礙通諸理然後意方釋然言不必信如此而後可

器之嘗爲予言當官處事須權輕重務合道理毋使偏重可也夫是之謂中因言元祐閒嘗謁見馮當世宣徽當世言熙甯初與陳暘叔呂寶臣同任樞密暘叔聰明少比遇事之來迎刃而解而呂寶臣尤善稱停事每事之來必稱停輕重令必得所而後已也事經寶臣處畫者人情事理無不允當器之因極言稱

停二字最吾輩當今所宜致力二字不可不詳思熟講也寶臣蓋惠穆公也

楊應之學士言後生學問聰明强記不足畏惟思索尋究者爲可畏耳

伊川先生言人有三不幸少年登高科一不幸席父兄之勢爲美官二不幸有高才能文章三不幸也

近世故家惟晁氏因以道申戒子弟（一作能以道戒子弟）皆有法度羣居相處呼外姓尊長必曰某姓第幾叔若兄諸姑尊姑之夫必曰某姓姑夫某姓尊姑夫未嘗敢呼字也其言父黨交遊必曰某姓幾丈亦未嘗敢呼字也當時故家舊族皆不能若是

頃見陳瑩中與關止叔沼與滎陽公書問其言前輩與公之交遊必平闕書云某公某官如稱器之則曰待制劉公之類其與己同等則必斥姓名示不敢尊也如曰游酢謝良佐云此皆可以爲後生法

張才叔庭堅專務以直道進退不求苟得君子創業垂統爲可繼也若夫成功則天也才叔之學蓋主於此

張思叔因讀孟子志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元慨然有得蓋能守此則無不可爲之事

後生學問且須理會曲禮少儀儀禮等學灑掃應對進退之事及先理會爾雅訓詁等文字然後可以語

上下學而上達自此脫然有得自然度越諸子也不如此則是躐等犯分陵節終不能咸孰先傳焉孰後倦焉不可不察也

呂與叔嘗作詩曰文如元凱徒成癖賦若相如止類俳惟有孔門無一事只傳顏氏得心齋

橫渠讀詩詩云置心平易始得詩楊文中立云知此詩則可以讀三百篇矣

韓公持國維開居潁昌伊川先生常自洛中往訪之時范右丞彝叟純禮亦居潁昌持國嘗戲作詩示二公云閉門讀易程夫子清坐焚香范使君顧我未能忘世味絲尊紅妓對西曛

龔殿院彥和叟清介自立少有重名元祐間僉判瀛州與弟大壯同行大壯尤特立不羣會子宣帥瀛欲見不可得一日徑過彥和邀其弟出不可辭也遂出相見即爲置酒從容終日乃去因題詩壁間其兩句云自慚太守非何武得向河間見兩龔近日貴人如會子宣之能下士亦難及也紹聖中彥和爲監察御史未能去大壯力勸其兄早求罷彥和遂去大壯不幸早卒雖彥和之弟實畏友也

李君行先生自虔州入京至泗州其子弟請先往君行問其故曰科場近欲先至京師貫開封戶籍取應君行不許曰汝虔州人而貫開封戶籍欲求事君而

先欺君可乎甯緩數年不可行也

正獻公幼時未嘗博戲人或問其故公曰取之傷廉與之傷義

滎陽公嘗言孫莘老李公擇之爲友友也

滎陽公嘗言呂吉甫嘗稱李公擇有樂正子之好善滎陽公嘗言所在有鄉先生處則一方人自別蓋漸染使之然也人豈可以不擇鄉就士哉

侯叔獻者少有聲名熙甯初屢來求見正獻公滎陽公因爲公言叔獻可比趙清獻正獻深不以爲然云趙清獻自守一世方成就如此（一作方做到此地位）後生有多少事豈可便比前輩既而叔獻果建水事求進

姜潛至之仁宗朝老儒先生也不喜人作詩云招悔吝損心氣

明道先生嘗至禪寺方飯見趨進揖遜之盛歎曰三代威儀盡在是矣

正獻公爲樞密副使年六十餘矣嘗問太僕寺丞吳公傳正安詩已之所宜修傳正曰毋敝精神於蹇淺滎陽公以爲傳正之對不中正獻之病正獻清淨不作爲患於太簡也本中後思得正獻問傳正時年六十餘矣位爲執政當時人士皆師尊之傳正公所奬進年纔三十餘而公見之猶相與講究望其切磋後來所無也滎陽公獨論其問荅當否而不言下問爲

正獻公之難葢前輩風俗純一習與性成不以是爲難能也

正獻公每時節必問諸生有何進益

滎陽公嘗言少時與叔祖同見歐陽文忠公至客次與叔祖商議見歐陽公敘契分求納拜之語及見歐陽公既敘契分卽端立受拜如當子姪之禮公退而謂叔祖曰觀歐陽公禮數乃知吾輩不如前輩遠矣

童蒙訓上終

保赤彙編十四

呂氏本中居仁

本中嘗問滎陽公曰兄弟之生相去或數日或月十日其爲尊卑也微矣而聖人直如是分別長幼何也公曰不特聖人直重先後之序如天之四時分豪頃刻皆有次序此是物理自然不可易也

滎陽公爲人處事皆有久長之計求方便之道只如病中風人口不能言手不能書而養疾者乃問所欲病者既不能荅適足增苦故公嘗教人每事作一牌子如飲食衣裳寒熱之類及常所服藥常所作事（常所服藥如理中圓之類常所作事如梳頭洗手之類）及作某親等書病者取牌子以示

人則可減大半之苦凡公爲人處事每如是也

王尚書敏仲古每事必爲人求方便之道如河朔舊日北使經由州郡每北使將至民閒假貸供張之具至煩擾敏仲奉使卽言之朝乞令河朔人使經由處皆支官錢置什物儲之別庫專待人使自此河朔無復假貸之擾矣王公臨事每如此也

滎陽公與諸父自少官守處未嘗干人舉薦以爲後生之戒仲父舜從守官會稽人或譏其不求知者仲父對詞甚好云勤於職事其他不敢不愼乃所以求知也

本中往年每侍前輩先生長者論當世邪正善惡是

是非非無不精盡至於前輩行事得失文字工拙及漢唐先儒解釋經義或有未至後生敢略議及之者必作色痛裁抑之曰先儒得失前輩是非豈後生所知揚十七學士應之兄弟晁丈以道規矩最嚴故凡後生嘗親近此諸老者皆有敦厚之風無浮薄之過前輩士大夫專以風節爲己任其於褒貶取予甚嚴故其所立實有過人者近年以來風節不立士大夫節操一日不如一日夏侯旌節夫京師人年長本中以倍本中猶及與之交崇甯初召任諸州教授學制既肪卽日尋醫去後任西京幕官罷任當改官以舉將一人安惇也不肖用卒不改官浮湛京師至死不

屈唐丈名恕字處厚崇甯初任荆南知縣新法既行卽致仕不出者幾三十年范丈正平子夷忠宣公之子忠宣公當國子夷是時官當入遠不肎用父恩例卒授遠地後爲祥符尉當紹聖初與中貴人爭打量地界與辨曲直不屈得罪去劉丈跋斯立蹈[redacted]皆丞相莘老子登高科以文學知名仕州縣自處約甚人不知其爲宰相子也汪革信民政和閒諸公熟聞其名除國子博士欲漸用之竟辭不受謝逸無逸臨川人州郡欲以入行薦堅卻之凡此諸公皆卓然自立一時不愧古人爾來流俗不復以此爲貴矣

韓魏公留守北京有幕官每夜必出遊宴同官皆欲諫之慮公不聽一日相約至日晚見公議急事乞召幕官久之不至衆方欲白公所以公佯驚曰某忘記早來某官嘗曰某早出見一親識矣其寬大容人之過如此又嘗久使一使臣求去參選公不遣如是數年使臣怨公不遣則白公某參選方是作官久留公門止是奴僕耳公笑屏人謂曰汝亦嘗記某年月日私竊官銀數十兩置懷袖中否獨吾知之他人不知也吾所以不遣汝者正恐汝當官不自愼必敗官爾使臣愧謝公之寬宏大度服人如此

崇甯初本中始問楊中立先生於關止叔止叔稱楊先生學有自得有力量嘗言常人所以畏死者以世

人皆畏死習以成風遂畏死耳如習俗皆不畏死則亦不畏死也凡如此皆講學未明知之未至而然

東萊公嘗言凡衆人日夕所說之話如趙丈仲長諸公都無此話也衆人所作之事如楊公應之李公君行諸公都不做衆人做底事也

李公公擇每令子婦諸女侍側爲說孟子大義

唐充之廣仁每稱前輩說後生不能忍詬不足以爲人聞人密論不能容受而輕泄之者不足以爲人

陳公瑩中閩人也而專主北人以北人而後可以有爲南人輕險易變必不可以有爲

待制叔祖都不說夢云既妄也何用說爲

明道先生嘗語楊丈中立云某作縣處凡坐起等處竝貼視民如傷四字要時觀省又言某常愧此四字明道先生言人心不同各如其面所不同者皆私心也至於公則不然

陳公瑩中言人之爲惡雖至於謀反大逆若有一念悔心使臨刑之際說我悔也便須赦他便須用他

滎陽公嘗言後生初學且須理會氣象氣象好時百事是當氣象者辭令容止輕重疾徐足以見之矣不唯君子小人於此焉分亦貴賤壽夭之所由定也

滎陽公嘗言朝廷獎用言者固是美意然聽言之際亦不可不審若事事聽從不加考覈則是信讒用諂

非納善言也如歐陽叔弼最爲靜默自正獻當國常患不來而劉器之乃攻叔弼以爲奔競權門器之號當世賢者猶差誤如此況他人乎以此知聽言之道不可不審也

崇甯初滎陽公謫居符離趙公仲長諱演公之長壻也時時自汝陰來省公公之外弟楊公諱瓌寶亦以上書謫監符離酒稅楊公事公如親兄趙公事公如嚴父兩人日夕在公側公疾病趙公執藥牀下屏氣問疾未嘗不移時也公命之去然後去楊公慷慨獨立於當世未嘗少屈趙公謹厚篤實動法古人兩人皆一時之英也饒德操節黎介然確汪信民革時皆在符離每公疾病少閒則必來見公而退從楊公趙公及公之子孫遊焉亦一時之盛也趙公每與公子弟及外賓客語但稱滎陽公曰公其尊之如此楊公與他人語稱滎陽公但曰內兄或曰侍講未嘗敢字稱也蓋滎陽公中表惟楊氏兄弟盡事親事長之道可爲後生法

滎陽公爲郡處令公帑多蓄鰕魚諸乾物及筍乾蕈乾以待賓客以減雞鴨等生命也

徐仲車先生畜犬孳生至數十不可與人人或問之云不忍使其母子相離

孫丈元忠學士朴正獻公所薦館職也嘗爲本中言

某嘗對侍講譏笑程正叔一日侍講責某云正叔有多少好事公都不說只揀他疑似處非笑他何也某因釋然心服後不敢復深議正叔今世之士如孫丈之服義亦少有也侍講謂榮陽公也

榮陽公嘗言少年爲學唯檢書最有益才撿便記得精便理會得子細

又嘗言讀書編類語言相似者事做一處便見優劣是非

榮陽公嘗說攻其惡無攻人之惡蓋自攻其己惡日夜且自點檢絲毫不盡不慊於心矣豈有工夫點檢他人邪

或問榮陽公爲小人所詈辱當何以處之公曰上焉者知人與己本一何者爲詈何者爲辱自無忿怒心也下焉者且自思曰我是何等人彼是何等人若是苔他卻與此人等也如此自處忿心必自消也

榮陽公嘗說王介甫解經皆隨文生義更無含蓄學者讀之更無可以消詳處更無可以致思量處

田誠伯嘗力闢釋氏輪迴之說曰君子職當爲善

童蒙訓中終

童蒙訓下　保赤彙編十五

呂氏本中居仁

滎陽公嘗言孝子事親須事事躬親不可委之使令也嘗說穀梁言天子親耕以供粢盛王后親蠶以供祭服國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以己所自親者也此說最盡事親之道又說爲人子者視於無形聽於無聲心未嘗頃刻離親也事親如天頃刻離親則有時而違天天不可得而違也范文正公愛養士類無所不至然有亂法敗眾者亦未嘗假借嘗帥陝西日有士子怒一廳妓以甕瓦殺其面溼之以墨妓訴之官公即追士子致之法杖之

曰爾既壞人一生卻當壞爾一生也人無不服公處事之當

滎陽公嘗大書治人事天莫若嗇於所坐壁上修養家以此爲養生要術然事事保愼常令有餘持身保家安邦之道不越於此不止養生也老子之論亦當於理矣

焦伯强千之先生嘗稱東漢一節至顏子滎陽公不以爲然列子稱狐父之盜食爰旌目爰旌目義不食其食兩手據地而歐之不出喀喀然遂伏而死狐父之人則盜矣而食非盜也以人之盜因謂食爲盜而不敢食是失名實者也

易曰君子以儉德避難不可榮以祿大抵居困否之世惟貧與賤則可以免苟居權寵擁富厚鮮有不及者季札謂晏平仲子速納邑與政無邑無政乃免於難晏子因陳桓子以納政與邑是以免欒高之難大抵春秋之世以無邑與政爲可以免齊與晏子邶殿其鄙六十卒不受也曰慶氏之邑足欲故亡吾邑不足欲也益之以邶殿乃足欲足欲亡無日矣與子雅邑辭多受少與子尾邑受而稍致之公以爲忠而有寵衛與公孫免餘邑六十辭曰甯子唯多邑故死臣懼死之速及也公固與之受其半鄭子張有疾歸邑於公而使黜官薄祭盡歸其餘邑曰吾聞之生於亂

世貴而能貧民無求焉可以後亡敬其事君與二三子生在敬戒不在富也此皆古人辭尊居卑辭富居貧處亂世自全之道可以爲萬世貪冒不厭以致破家亡國者之至戒也

榮陽公嘗言子產有數事失君子氣象者如言民不可逞度不可改又曰子甯以他規我如此之類全無君子氣象又言張良說漢祖詐秦卒大不類子房平日所爲

外高祖侍郎晉陽王公諱子融嘗編集京師世家家法善者以遺子孫

前輩嘗有編類國朝以來名臣行狀墓誌取其行事之善者別錄出之以自警戒亦樂取諸人以爲善之義也

京師曹氏諸貴族卑幼不見尊長三日必拜

元符末叔祖待制公坐元祐黨人貶道州未至先遣人賃屋兩間時公亦挈家往既至屋窄陋甚更益一間以公狀申郡守不敢往見是時上皇卽位已議褒用矣韓原伯川先貶道州公以俱在謫籍不敢相見既原伯與公俱復官內徙原伯先受命往見公亦不敢與相見以爲未受復官命也前輩愼事如此其亦能遠禍矣然且不免則亦命也

蘇子由崇甯初居潁昌時方以元祐黨籍爲罪深居

自守不復與人相見逍遙自處終日默坐如是者幾十年以至於沒亦人所難能也

崇甯間張公芸叟既貶復歸閉門自守不交人物時時獨遊山寺芒鞋道服跨一羸馬所至從容飲食一甌淡麵更無他物人皆服其清德後生取法焉

崇甯間饒德操節黎介然確汪信民革同寓衡州論文會課時時作詩亦有略詆及時事者滎陽公聞之深不以爲然時公疾病方愈爲作麥熟繰絲等曲詩歌詠當世以諷止饒黎諸公諸公得詩慚懼遽詣公謝且皆和公詩如公之意自此不復有前作矣

張琪同美京畿人久遊太學諸生多稱之擢第後守官衛州陳公瑩中爲郡愿厚待琪禮遇獨異眾人琪深感公恩意然亦不能曉獨異之意崇甯間琪官衡州諸公貴人數欲招致之琪感陳公見待終不肯進蓋琪之爲人賢而差弱陳公所以異待之者欲以堅其意也琪終能自守前輩成就人委曲如此教亦多術矣

劉器之論當時人物多云弱實中世人之病大抵承平之久人皆偷安畏死辟事因循苟且而致然耳

紹聖崇甯間諸公遷貶相繼然往往自處不甚介意龔彥和支貶化州徒步徑往以扇乞錢不以爲難也張才叔庭堅貶象州所居屋才一間上漏下溼屋中

閒以箔隔之家人處箔內才叔躡屐端坐於箔外日看佛書了無厭色凡此諸公皆平昔絕無富貴念故遇事自然如此如使世念不忘富貴之心尚在遇事艱難縱欲堅忍亦必有不懌之容勉強之色矣鄒志完侍郎嘗稱才叔云是天地間和氣薰蒸所成欲往相近先覺和氣襲人也

豐公相之稷清節自守一意直道更無他說而未嘗絕物張才說葢師法之相之元祐閒與滎陽公同在經筵有女之喪滎陽公問之曰以公定力如此必無過戚相之云正爲未能如此

李君行先生紹聖中致仕歸虔州元符庚辰歲諸公既還朝廷君行驛召賜對嘗句宗子學比國子司業葢有陰沮之恐在要地者伊川先生嘗問從學者李君行何以復出從學者對曰李司業承朝廷美意不得不出然且歸矣君行既至京師即引疾得歸

伊川先生嘗有門弟子日赴歌會過差先生聞之大不樂以爲如此絕人理去禽獸無幾爾（一本作幾希）正獻公作相時每月以上尊分遺親舊楊十七學士應之公之甥也月送兩壺楊學士得酒即送酒家易常酒數壺欲飲酒即取之東萊公以爲楊學士英氣偉度必不以脣舌閒霑玩上尊滋味爲美也得酒貴多不問美惡過人遠矣

李君行先生之長子格篤行博學克肖其父而長於四六表章早歲登科紹聖中知江甯府上元縣滎陽公知太平州李以啟事賀公其略有云知府侍講蘊命世之雄才賦經邦之遠器令聞令望起韋平舊相之家嘉謀嘉猷翊舜禹重熙之代危誠獨立直己不回從容進退之儀挺達始終之節李尋以病不起學士大夫惜之

國語公父文伯之母告季康子君子能勞後世有繼又謂其子聖王之處民也擇瘠土而處之勞其民而用之故長王天下又曰民勞則思思則善心生逸則淫淫則忘善忘善則惡心生沃土之民不才淫也瘠土之民莫不嚮義勞也左傳亦言民生在勤勤則不匱以此知勤勞者立身爲善之本不勤不勞萬事不舉今夫細民能勤勞者必無凍餒之患雖不親人人亦任之常嫺惰者必有飢寒之憂雖欲親人人不用也公父文伯之母與左傳所記皆故家遺俗相傳之語其必自聖人出也然則後生處身居業其可不以勤勞爲先而嫺惰自弃其身哉

元祐末李君行先生與楊應之學士同在京師安靜自守諸公以其不坿己不甚肯進用趙公君錫無愧爲中丞當薦御史問滎陽公所當薦者公以應之爲對無愧亦不能用更舉楊畏子安爲御史楊畏後反

攻無愧紹聖初應之病卒蘇子由罷知汝州李君行先生往見之與之論當世事子由恨知君行之晚當時議者謂楊李二公如在言路必不肯委靡自已縱無所益亦必極言而去也

司馬溫公既辭宥密之命名冠一時士無賢不肖皆所歸重而兩程先生孫莘老李公擇諸公尤推重正獻已而二公同居洛中熙甯末正獻起知河陽明道以詩送行曰曉日都門颸旆旌晚風鐃吹入三城知公再爲蒼生起不是尋常刺史行又與溫公同餞正獻復有詩與溫公云二龍閒臥洛波清此日都門獨餞行願得賢人均出處始知深意在蒼生蓋以二公出處無異且恐溫公以不出爲高也及正獻公自河陽乞在京宮祠神廟大喜召還遂登樞府人或問二程以二公出處爲有優劣二程先生曰正不如此呂公世臣也不得不歸見上司馬公爭臣也不得不退處蓋自熙甯初正人端士相繼屏伏上意常不樂以爲諸賢不肖爲我用故正獻求在京宮祠以明不然上意始大喜

元祐閒伊川先生既歸洛中寄范公淳父書云丞相久留左右所助一意正道者實在原明爾（原明榮陽公字也）伊川嘗言楊應之在交游中英氣偉度過絕於人未見其比可望以託吾道者應之樂善尚德而議論不

苟以富文忠公處事猶不免有心如孫威敏操行不能端一石守道行多詭激特以兩人坿己乃薦威敏代己薦守道可任臺諫又如劉原父文學絕人而喜訕韓富亦加擯抑凡此之類未免有心況常人乎雖然豪髮之失生於心術其流之弊有不可勝言者豈不要賢師友以正救其微邪此應之之論也

太宗眞宗朝睢陽有戚先生者名同文字同文有至行鄉人皆化之睢陽初建學同文實主之范文正與嵇內翰穎之父皆嘗師事焉戚綸其後也所居門前有大井每至上元夜卽坐井傍恐游人墜井守之至夜深則掩井而後歸寢嘗有人盜其所衣衫者同文適見之諭盜第將去然自此愼勿復然壞汝行止悔無及也盜慚謝而去同文竟以衫子之南康學中至今有戚先生祠堂范文正公初從戚先生學志趣特異初在學中未知己實范氏子人或告之歸問其母信然曰吾旣范氏子難受朱氏資給因力辭之貧甚日糴粟米一升煮熟放冷以刀畫四段爲一日食有道人憐之授以燒金法幷以金一兩遺之又留金一兩謂之曰俟吾子來予之明年道人之子來取金文正取道人所授金法幷金二兩皆封完未嘗動也併以遺之其勵行如此後登科封贈朱氏父然後歸姓師友淵源必有所自未有無因而然如周茂叔先生

官守南安軍爲守所不禮兩程之父太中公自虔州
差攝南安倅與茂叔相善力庇護之其後兩程皆師
事茂叔陝西侯無可先生二程之舅賢豪獨立與申
顏先生爲友申先生死侯先生傾家所有予之
關止叔嘗言伊川門弟子且是信得及師說
陳瑩中嘗作責沈文送其姪孫幾叟云予元豐乙丑
夏爲禮部貢院點檢官適與校書郎范公滔夫同舍
公嘗論顏子之不遷不貳唯伯滔能之予問公曰伯
滔誰也公默然久之曰不知有伯滔邪予謝曰生長
東南實未知也時予年二十九矣自是以來常以寡
陋自愧得其傳者如楊中立先生亦未之識也云云

所謂責沈者葉公沈諸梁也葉公問孔子於子路子
路不對葉公當世賢者魯有仲尼而不知宜乎子路
之不對也瑩中以謂世有伯滔而己不知宜自責者
也今世之人聞己所不知其不慍而發謗罵者幾希
矣況能自責日夜以爲愧乎瑩中之所以超絕今古
特立獨行而不顧非偶然也瑩中爲都司上曾子宣
論日錄書云自今觀之成哀之世使大臣之門有負
恩之士則漢之宗社未至危亾然則爲大臣者不欺
其君盡忠之士亦安忍負其門哉如此等語皆足以
立懦夫之志矣其後上呂吉甫書列子有言世以生
人爲行人則死人爲歸人矣行而不知歸失家者也

此禦寇未了之語生死無時而不一四大無時而不
離何待死乃爲歸乎其生也心歸其死也形化歸而
待化復何俟於言哉其精識遠見殆過古人此蓋誘
吉甫使之爲善老子所謂常善救人者也

高郵守晁仲約有大賊過城下欲攻城守醵民金與
賊賊乃去范文正公富鄭公同在政府鄭公建議守
不能死守乃以金與賊失節當誅范公以爲守能醵
金卻賊爲有功縱不欲賞安可誅邪既退富公慍曰
方今患法不舉方欲舉法而多方沮之何以整衆范
公密告云祖宗以來未嘗輕殺臣下此盛德之事柰
何輕壞之且吾與公在此同僚之間同心者幾人雖
上意亦未定也而輕導人主以殺戮臣下他日手滑
誰吾輩亦未敢自保也富公曰聞高郵人欲食守肉
范公曰高郵守既能爲民卻賊民感戴之不暇豈有
欲食守肉之理仁廟卒從范公議明日富公稱疾不
出仁廟問宰執富弼何以不出范曰必是爲爭高郵
事上曰富弼非卿門人邪范曰富弼雖與臣相知然
弼爲人守義不回心不安者不可從也此正是弼好
處上曰此卻是卿好處後范富俱罷政富以事召至
京師譖之者甚衆或以爲富公有不臣之意至京師
不得見者累日富公甚恐懼且悔建議高郵之非歎
曰范六丈眞聖人與吾淺見不同

滎陽公嘗榜文中子數語於家中壁上云子之室酒不絕注云用有節禮不缺也

周恭叔行已嘗言見呂與叔博士說必有事焉而勿正心勿忘勿助長也浩然之氣充塞天地雖難得而言非虛無也必有事焉但正其名而取之則失之矣又不可忘之也忘之者不芸苗者也正其名而取之者非苗者也

伊川先生嘗言成王不當賜魯以天子禮樂使周公在必不受也故曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣後世儒者以爲周公能爲人臣所不能爲之功故賜人臣不得用之禮樂此尤傷教害義也爲人臣如周公

始可故曰不以舜之所以事堯事君不敬其君者也范正平子夷堯夫丞相之子賢者也能世其家嘗言其家家學不卑小官居一官便思盡心治一官之事只此便是學聖人也若以爲州縣之職徒勞人爾非所以學聖人也

周恭叔又說先生教人爲學當自格物始格物者窮理之謂也欲窮理直須思始得思之有悟處始可不然所學者恐有限也恭叔又言陰陽不測之謂神橫渠先生云兩在故不測仁者見之謂之仁知者見之謂之知然則聖人之道仁知者皆不能測也一陰一陽之謂道仁且知夫子所以既聖也乾坤之於易猶陰陽之於道

仁知之於聖也故曰乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

李君行先生說武王數紂之罪曰郊社不修宗廟不享歷觀諸書皆以郊對社蓋郊者所以祭天社者所以祭地也南郊北郊五帝之類皆出於周禮聖人書中不見也嚴父配天之禮蓋始自周公若自古有之則孔子何得言則周公其人也列爵爲五分土爲三蓋至周始定若夏商以前俱如此則書爲妄也因言吾徒學聖人者當自用意看易詩書春秋論語孟子孝經而已中心既有所主則散看諸書方圓輕重之來必爲規矩權衡所正也又言史書尚可最是莊老讀時大段害道

萬物皆備於我矣反身而誠富有之大業至誠無息日新之盛德也

田腴誠伯嘗說他用心多使氣勝心每心有所不善者常使氣勝之且云自知如此未得爲善也

誠伯又言讀書須是盡去某人說某人說之心然後經可窮矣

李君行先生學問以去利欲爲本利欲去則誠心存矣

李君行先生說年二十餘時見安退處士劉師正解

春秋文字甚愛之從他觀其文他亦不惜也後於楚州聚學他一日見訪問曰李君在此何欲荅曰爲大人令去應舉令及第後歸今次以朞服礙卻欲且就此處修學以俟後次應舉也劉曰不然夫不可得而久者在父母之左右也君行於是便歸鄉然則劉師正者君行之師歟又云嘗語君行今之人所以爲學者某卻不會如此爲學

徐仲車先生少年時爲母置膳先過一賣肉家中心欲買他肉遂先於市中買他物而別路於歸途爲順且亦有賣肉者因自念言心中已許買他家肉若捨而之他能不欺心乎遂迂道買肉而歸且云已之行信自此始也又言少年時逐日以衫帽揖母一日當見貴官乃用幞頭襴衫因自念言天下之尊無踰父母今反不若見貴官自明日以幞頭襴衫往揖母焉家人之見者無不笑之既久亦不笑也且云已之行敬自此始也

徐仲車見門人多於空中書一正字且云於安定處得此一字亦用不盡

徐仲車說以信解誠不能盡誠至誠無息信豈能盡之乎

伊川先生嘗說楊子雲云聖人之言遠如天賢人之言近如地是不然也當爲他易數字曰聖人之言其

遠如天其近如地其遠者須謂之遠其近者須謂之近也

范舜叔說今太學長貳博士居此住者皆利於養資考求外進也爲之學生者皆利於歲月而應舉也上下以利相聚其能長育人才乎此於本亦已錯了更不須言也

田誠伯說仲弓問子桑伯子子曰可也簡仲弓未以爲言也乃曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎居簡而行簡無乃太簡乎子曰雍之言然仲弓未以聖人之言爲然而問之而聖人以仲弓之言爲然也學聖人者如仲弓可也且云見君行如此說

誠伯說公羊不知聖人之意也故其立言多傷教害義至如母以子貴子以母貴及人臣無將將而誅此二者尤甚至令西漢時尊崇了傳及誅大臣以爲將謀惡者蓋用公羊之說也其爲天下後世害甚矣

李朴先之說臨離洛時請教於先生先生言當養浩然之氣語先之云觀張子厚所作西銘能養浩然之氣者也

先之說以舉業育人才不知要作何使用

誠伯說近世學者恐無有如橫渠先生者也正叔其次也又云向日因看正蒙書似有箇所得處又云每見與叔中庸解便想見其爲人由是觀之誠伯師橫

渠也

劉元承元禮嘗師事伊川說紀侯大去其國大者紀侯之名也齊師未入境而已去之則罪不在齊侯也故不書齊侯焉又見伊川先生說仲尼曰惜乎出境乃免須終身不反始可免罪

宿州高朝奉說他師事伊川先生嘗見先生說義者宜也知者知此者也禮者節文此者也皆訓詁得盡惟仁字古今人訓詁不盡或以謂仁者愛也愛雖仁之一端然喜怒哀懼愛惡欲情也非性也故孟子云仁者人也

樂文仲說眉浩學士事亦好常見人寫字不端正必須勸戒之或人問之曰每事無不端正則心自在矣

陳正端誠說王輔嗣王介甫有大段不通處須要說應故也田明之說易所以尤多過者須要說無應故也易中自說上下敵應剛柔相應之類甚多豈得謂之無應但不可執定耳

又說邵堯夫先生說孟子雖不說易然精於易者也且云能說可以仕則仕可以止則止及禹稷顏子易地則皆然非精於易豈及此乎

李君行說他每日常多只讀易書詩春秋孝經閒讀孟子田明之說他嘗只讀易論語孟子老子楊子如莊子未暇讀也

吳叔楊紹聖中嘗說世人多欲勝於學故無所不爲唯陳瑩中學勝於欲故有所不爲且云瑩中今諸公非不知他但不可得而用也又說字說詩字從言從寺詩者法度之言也說詩者不以文害辭不以辭害志惟詩不可拘以法度若必以寺爲法度則侍者法度之人峙者法度之山痔者法度之病也古之置字者詩也峙也侍也痔也蓋以其聲相近取耳

又說今之學者必要一其說是不知聖人之意也无妄之往何之矣言无妄之世往無所之也无妄之往得志言无妄而往則可以得志也其言无妄之往則一其所以爲无妄之往則異也

任淵夫說莊子儻忽混沌之說郭象只以爲者敗之解之則解經者何用多言

范子夷說其祖作外任官時與京中人書居京愼勿竊論曲直不同任言官時取小名受大禍因言吾徒相見正當論行己立身之事耳又說仲尼聖人也才作陪臣顏子大賢也簞食瓢飲後之人不及孔子顏子遠矣而常歎仕宦不達何愚之甚若能以自己官爵比方孔顏僥倖甚矣又說凡人爲事須是由衷方可若矯飾爲之恐不免有變時任誠而已雖時有失亦不覆藏使人不知但改之而已

李君行田明之俱說讀書須是不要看別人解者聖

人之言易曉看傳解則愈惑矣田誠伯說不然須是先看古人解說但不當有所執擇其善者從之若都不看不知用多少工夫方可到先儒見處也

陳端誠說易須是說到可行處始可

陳瑩中說書曰惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱蓋堯授舜舜授禹禹授啟三聖一賢相繼未始失道也至太康失邦故上推陶唐而云今失厥道自堯至太康百二十年矣

又說大舜有大焉善與人同舍己從人樂取於人以爲善自耕稼陶漁以至於爲帝無非取於人者取諸人以爲善是與人爲善者也故君子莫大乎與人爲善夫能如是故能養其大體而爲大人故能格君心之非而使天下利見故能言動以爲法則後之人急急然唯欲己爲是也恐其畔已以利誘之以害驅之天下終不以爲然而自以爲過天下何愚之甚

又說安而行之聖人也自非聖人皆利而行之者也何也欲遷善遠罪是利於善也欲忠於君是利於忠也欲孝於父是利於孝也其餘皆然今之學者不能見其近者小者而妄意談其大者遠者故終汗漫而無成也

陳瑩中說學者非獨爲己而已也將以爲人也自王介甫解經止尚高論故使學者棄民絕物管仲晏嬰

霸者之佐一也桓公殺公子糾管仲不能死有三歸反坫官事不攝可謂違禮之極矣崔杼弑其君晏子從容於其門成禮而後去可謂有節矣然孔子之稱晏子則曰善與人交久而敬之而已及稱管仲則曰如其仁如其仁豈不以管仲功及天下所濟者廣而晏子獨善其身而已哉

又說陰陽災異之說雖儒者不可泥此亦不可全廢王介甫不用此若爲政依介甫之意是不畏天者也

己上皆紹聖中語

前邵倅吳朝奉說近世士大夫太不以節操爲事因說與他立節非一朝一夕所能爲蓋在平日之所養也他甚然之時李自明在坐云此事閒時說時甚易在於臨事時要執得定耳因言昔人有自諫官以言事被責時兼判國子監乃與諸生往賀焉蓋嘉祐以前以言事被責爲榮也既見顏色慘沮殆不能說話昔人尚如此他人未易能也吳因言自小讀書用得工夫不正當立節非素養不能學得不正則所養亦非也

陳瑩中又說學者非止讀誦語言摸綴文詞而已將以求吾之放心也故大畜之卦曰君子以多識前言往行以畜其德所謂識者識其是非也識其邪正也夫如是故能畜其德所以言天在山中者前言往行

無有紀極故取天之象焉

瑩中說今有人曰仕宦顯達者使天下謂之賢人則不可使天下謂之不賢人則可矣使天下謂之賢人是自取其善而歸過於其君也使天下謂之不賢是自取其惡而歸美於其君也曰是則不然此乃李斯分謗之說也不能盡受其惡名使惡名不及於君是李斯而已何況天下謂之不賢未必不爲其君之累也

又說范子思所知所守過於其兄范氏家學便有使處

又說孔子以柔文剛故內有聖德而外與人同也孟子以剛文剛故自信其道而不爲人屈也衆人以剛文柔故色厲而內荏也卻說與他楊子之書唯是說到孟子之書如自得之發於面平旦之氣養浩然之氣之類皆自得處孔子則幷自得處亦無

又說學者非特習於誦數發於文章而已將以學古人之所爲也自荆公之學興此道壞矣

又說凡欲解經必先反諸其身而安措之天下而可行然後爲之說焉縱未能盡聖人之心亦庶幾矣若不如是雖辭辯通暢亦未免乎鑿也今有語人曰冬日飲水夏日飲湯何也冬日陰在外陽在內陽在內則內熱故令人思水夏日陽在外陰在內陰在內則

內寒故令人思湯雖甚辯者不能破其說也然反諸其身而不安也措之天下而不可行也嗚呼學者能如是用心豈曰小補之哉

莊子曰道之眞以治身其緒餘土苴以治天下國家曰是不然禮記曰誠者非獨成己也將以成物也我之所得者不能盡推於人非聖人之道也但行之一身有先後耳孟子曰窮則獨善其身達則兼善天下方其窮也獨善一身之道乃兼善天下之道及其達也兼善天下之道乃獨善一身之道也施於一身而非有餘也施於天下而非不足也是之謂聖人之道學聖人者不能以孔子孟子爲心而專以莊周爲我之書爲說烏在其學聖人也

瑩中說爲學日益爲道日損尋常人便說作兩事失之遠矣蓋語學則益道則損二卦未常偏廢也所損者懲忿窒慾所益者見善則遷有過則改也若用此說方始可行不然則虛語也又云胡先生在邇英講損益卦專以損上益下損下益上爲說

童蒙訓下終

紹定己丑郡守眉山李壘得此本於詳刑使者東萊呂公祖烈因鋟木於玉山堂以惠後學

昉兒時侍鄉長老嘗從旁竊觀所謂呂氏童蒙訓者其閒格言至論粗可記者一二稍長務鑽厲舉子業而親舊几案上亦不復有此書矣世道之升降於此可占也客授金華太守邱公先生語次及之且曰昔先公每以訓子姪某初在傅日誦習焉將求善本刻之學宮或太史祠中使流布於世昉因從臾成之曰書出於呂氏刻於祠堂宜也會公有民曹之命迺出錢五萬以從初約呂兄弟伯喬年家所藏本最爲精密前此長沙郡龍谿學者皆嘗鋟木而謁外特甚邱公所誦習者未知何所從得也初舍人呂公以正獻長孫逮事元祐遺老與諸名勝遊淵源所漸者遠渡江轉徙流落之餘中原文獻與之俱南因卽疇昔所聞見者輯爲是編倉部既手寫而藏之弟伯又是正而刊之庶幾可以傳矣書之所載自立身行己讀書取友撫世疇物仕州縣立朝廷綱條本末皆有稽據大要欲學者反躬抑志循序務本切近篤實不累於虛驕不騖於高遠由成己以志成物豈特施之童蒙而已哉雖推之天下國家可也弟伯屬記始末因輒坿所聞於其後是亦邱公之志焉爾公名壽雋字眞長文定公之嫡長子云嘉定乙亥中秋日四明樓昉

謹書