# 華佗內照圖

二冊

華佗内照圖

二冊

華佗内照圖

二冊

富士川本
カ
114

カ
114

三十一ノ四ヒ

# 筮宥丸照圓

乾

184087
大正7. 3. 31

京都帝國大學圖書



# 新刻華佗內照圖序

魏 華元化 佗 著
明 胡文煥 德甫 校正

富士川游寄贈

夫醫者非今而置之藥者自曠然天地有也昂萬物而皆有之只緣劫石變融人物變化神龍有騰設之象日月有謫蝕之災所以四生易質而陶形聖賢示之而隱顯故遞世相習遥遠依行時人爲之相

師彼祖師之傳訓啟我今日成習
彼言達費者非翰墨而載之未悞
者亦難為詳悉耳又恐非從文以
述其源方脉曷深究尋頗極用之
圖記遠望近思聊序六章明伸
管見



新刻華佗內照圖

目錄

○第一明畫圖之象
○第二明當臟之病
○第三明五臟相入
○第四明臟腑相入
○第五明臟腑應藥
○第六明臟腑成敗

目錄畢

# 新刻華佗內照圖卷之一

魏 李元化 佗 著
明 胡文煥 德甫 校正

○第一明畫一圖之象

凡欲知五臟之病先須識脉若能知脉虛實即知病源知病源即不錯療可藥即藥可針即針可灸即灸隨病設法如弩應拯病有輕重上中下也針灸之道及以行藥達彼老少壯年肥瘦枯槁應此施行無病不愈也

脈手人一動閒以太息盖六千七百五十息脈再動一吸脈再動時吸定息
為強也六千七百五十息是陽時為陰吸
七百五十周于身漏水下百刻九万人千五度行二千五百息是陰時為
昼夜二萬三千五百息
二焦經手少陽起於小指次指
之端脈貝之氣始自中焦注手少陽三焦經下膈屬上焦出缺盆
循胸中以貫穿五藏繫舌本上出於面目系目眥下加頄後入耳中
出走耳前過客主人前上額角交巔上入絡腦還出別下項循肩
髃貫臑入肘中下臂貫腕出小指次指之端
心主手厥陰心包絡起於胸中出屬心包絡下膈歷絡三焦
循胸出脇下腋三寸天池上抵腋下三寸天泉循臂
内上臂二頭下肘中循臂行兩筋之間入掌中循中指出其端
手少陽之別名曰外關繞環心包絡
手厥陰之別從掌中大陵出循臂乗間上行出內關外
三里以上合手少陽
手厥陰心主之正從心系上挾咽繫目系
手少陰心之正從心系却上肺下出腋下循臑内後廉行太陰心
主之前入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端
手少陰之別名曰通里下纔入掌内循小指之
手太陽小腸之正從手外側循臂上踝直上循臂骨下
廉出肘内側兩筋之間入小指之端
手太陽之別名曰支正上腕外廉循臂貫肘上繞肘後廉
手太陽之脈從肩解循臑出肘内側兩筋之間循臂
下廉出腕中循小指外側
手太陽之別從腕後分走手心合掌内
手太陽之別名曰支正上腕外廉循臂貫肘上繞肘後廉
手太陽之脈從肩解循臑出肘内側兩筋之間循臂
下廉出腕中循小指外側
手太陽之別從腕後分走手心合掌内



候脈一寸至則氣口而已則寒在古人間流一上合鶴鳴三焦心包
百病一加一減一呼一吸脈行六寸一時漏水百刻一日夜行二萬三千五百息
脈行五十度周于身漏水下

# 十二經脉圖






經脉氣血

厥陰多血少氣　肝

太陰多氣少血　肺脾

陽明多氣多血　大腸胃

經脉流行

十二月經之養始於肝故婦人之妊今十月自肝經始肝木也

一月足厥陰經　肝配膽

二月膽足少陽經　木生火

三月胞絡手厥陰經　胞絡配三焦

少陰多血少氣　心腎

少陽多血多氣　三焦膽

太陽多血少氣　小腸膀胱

四月、三焦手少陰經　火生土
五月、脾足太陰經　脾配胃
六月、胃足陽明經　土生金
七月、肺手太陰經　肺配大腸
八月、大腸手陽明經　金生水
九月、腎足少陰經　腎配膀胱
十月、膀胱足太陽經　水生木

自厥陰之至於太陽、自一月積之至於十月、五行相生之義、天地相合之數、舉在於是、然手少陰心大陽小腸之經無所表裏者、以君主之官為



而已

四時經脉病

逆春気則少陽不生肝気内変　少陽膽経
逆夏気則太陽不長心気内動　太陽小腸経
逆秋気則太陰不收肺気焦滿　太陰肺経
逆冬気則少陰不藏腎気獨沉　少陰腎経

竊以女子不月血諦之病也原其本則心気不得下通不治其血而通其心可也勞極驚悸暴憂思慮者過傷之病也本於心気之不足使心気内和順四時之気則精神気血莫得而逆也

凡婦人妊娠至八月不忌飲酒叫怒及房室産時必慘心神昏亂也

陰陽海二圖

内丹要訣云

坎卦 ☵ 外一畫ノ内ノ明ナリ

離卦 ☲ 外一明カニ内一昏シ

任督二脉ハ為一身陰陽之海五気真元此為機會而勸交二穴ハ在唇内齒ノ上縫ニ為任督二脉之會一身之要也人孚知之至人漱煉惟服此藥仙經云一物含五彩永作仙人祿言其備五行之英華總二脉之交會自古真人秘此一穴訣任於口不傳文字仙經曰若人恒腰空手心閉目握固證神咬齒漱煉口中玉液滿口嚥之令人耳聰目明延年益壽也

陰海

任脉



任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脉之海也

任者妊也此人生養於之故曰任脉之中極之長強之上此奇經之一脉也



陽海

督脉

督脉者起於下極之腧並於脊裏上至風府入腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之海也督之言都也是人陽脉之都綱也人脉比於水故云陽之海此奇

經之一脉也

腎虛論 兼補法

夫腎藏天一以水爲事心意内治則精全而溢少思慮外誘房室太甚則固者搖矣是以男子精気消而走矣蓋由腎気虛損不能禁固精気自溢或因夢寐而泄也然當服補腎固元之劑亦不可心事用熟藥治法曰陽劑剛強則天癸竭而榮涸矣謂是也大法速宜灸気海腎腧關元穴佗云療五勞羸瘦七傷虛乏脅中瘀血乳癰外臺明堂人年三十已上若不灸三十里令気上衝目可灸三壯鍼入五分婦人乳癰腫痛不忍欲死者三十里穴下針其扁立止



人身




正面

天地相去八萬四千
人心去腎八寸四分

出於靈寶秘法



人身




背面

喉嚨巳下言六藏為手足三陰咽門巳下言六腑為手足三陽蓋諸藏屬陰為裏諸腑屬陽為表臟者藏也藏諸神而精神流通也腑者庫府主出納水穀糟粕轉輸之謂也

○喉嚨

自喉嚨巳下六藏喉應天氣乃肺之系也以肺屬金乾為天乾金也故天気通於肺而肺應天上連會厭會厭者五藏音聲之門戸肺屬金音聲應金石也九墟云喉嚨端息之道其中空長可以通気息楊玄操云喉嚨與咽並行其實兩異而人多惑之蓋喉中為息道咽中下水穀其喉嚨下接肺兩葉之間與今所繪者同若吳簡序宋景所畫希範喉中三竅者非果喉中有三竅則水穀與気各從一竅而俱下肺下無竅何由傳導水穀入於下焦

○肺手太陰經

黄帝書云肺為諸藏之上蓋藏真高於肺以行榮衛陰陽也肺之形似人肩二布葉中有二十四空行列以分布諸藏請謁之気而為気管乃相輔之官也在喉嚨気系之下

○心手少陰経

黄帝書云心形如未敷蓮花中有九孔以通天真之気神之宇也其藏真通於心心藏乎血脉之気而為一身之君以肺為上蓋故心在肺之下

○心包手厥陰経

心包脉起於胸中出属心包下膈歴絡三焦云手心主太陵為心之原即心包穴也明真極経云十二原以太陵為心主則心包也類纂曰手厥陰心包之経所謂一陰也一名手心主其経與手少陽三焦為表裏今以臓象校之在心下横膈膜之上竪斜膈膜之下與横膈膜相粘其處黄脂漫包者心也其藏脂之外有細筋膜如絲與心肺相連者此包絡也

○脾足太陰経

黄帝書云脾形似馬蹄内包胃脘象土形也経絡之気交帰於中以営運真霊之気意之舎也又云脾為陰臓位處中膲主穀四藏故呼吸以受穀気以其上有心肺下有腎肝故曰在中而藏真濡於脾脾藏乎肌肉之気也為諫議大夫又曰倉廩之官

○肝足厥陰経

黄帝書云肝有二布葉一小葉如木甲折之象谷
有支絡血脉昼中以宣發陽和之気魂之官也故
臓真散於肝肝藏筋膜之気也為將軍之官其治
在左然以今之臓象校則肝在右脇右腎之前並
胃而胃與小腸之右外
○腎足少陰経
黄帝書云腎藏有二形如豇豆相並而曲附於脊
筋其外有脂裹裏自外黒玉藏乎精故臓真下於
腎腎藏乎骨髄之気腎者作強之官伎巧出焉其
位下連於脇今以見圖藏象校之則在腸下脊

脊脂膜中有系二道上則系心下則連二腎之系
相通已六臓也
○咽門
自咽門已下六腑咽應地気為胃之系也以胃屈
受坤為地坤土也故應地咽之下者胃脘水穀之
道凡咽門承受水穀自胃脘而入於胃中咽噎也
言可厭物也又謂之嗌言厄要之處黄帝書曰地
気通於嗌嗌咽也以今藏象咽在喉之後合右書
為是於歐本一則邪
○胃足陽明経

黄帝書云胃者倉廩之官布穀四藏故五藏皆稟
気於胃胃者五藏之本故食気入胃散精於肝謌
気於筋食氣入胃謌気帰心謌精於脉脉気流経
経気帰肺肺朝百脉輸精於皮毛毛脉合精気行
於腑腑精神明留於四藏気歸權衡以平気口成
寸以次死生又飲入於胃遊溢精気上輸於脾脾
氣散精上帰於肺通調水道下輸膀胱水精四布
五経並行合於四腑腑五藏陰陽揆度以為常也此
水穀氣味奉生之理也

○膽足少陽経

黄帝書云膽者中正之官決断出焉而為請謀之
府小腸手太陽経黄帝書云小腸者受盛之官化
物出焉凡胃中腐熟水穀其滓穢自胃之下口傳
入於小腸上口名小腸下口泌別而水入膀胱上
口其滓穢傳入大腸上口與今所繪臟象同

○大腸手陽明経

一名回腸以其回曲而受小腸之穀因以名之也
乃肺之府也黄帝書曰大腸者傳道之官變化出

又曰肛門言其處似車缸形故曰肛門即廣腸也一名直腸一名魄門黃帝書曰膲腸者廣腸也一名魄門名洞腸受大腸之穀而導出焉故魄門亦為五藏使水穀不得久藏乎

○膀胱足太陽經

又名胞胞鞄也鞄虛空也以虛承水液焉而為諸液之府類纂曰膀胱者胞之室也黃帝書云膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣位當孤府故膀胱不利為癃不約為遺溺又水泉不止膀胱不藏得守者生失守者死

○三膲手少陽經

扁鵲曰膲原也為水穀之道路氣之終始也上膲者在心下下膲在胃上口主內而不出其始在膻中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是也中膲者在胃中脘不上不下主腐熟水穀下焦者在臍下當膀胱上口主分別清濁而不內以傳導也故上膲主出陽氣溫於皮膚分肉之間若霧露之漑焉中焦主變化水穀之味出於血以榮五藏六腑及身躰也又下焦主通利瀆使以時傳下焉故曰主內而不內凡藏府俱五者手心主非藏三膲非腑也以


藏府俱六ノ者ヲ合スルヿ手ノ心ト主及三焦ニ也又云藏惟有レ五ツ腑獨リ有レ六ツ者、何ソヤ也所ニ以ノ腑有レ六ツ者、謂ヒ三焦ノ也有ニ原気之所ニ別ル焉主ニ持スル諸気ヲ有ル名而無ニ形其ノ経屬ス手ノ少陽ニ此ノ外腑ナリ也故ニ言フ腑有リ六ツ焉黄帝書ニ曰上腑ハ如レ霧中腑ハ如レ漚下腑ハ如レ瀆而為ニ決瀆之官水道出ツ焉九墟ニ云中腑ハ並ニ胃口ニ出ツ上腑之後ニ此ノ所ノ受ル気ハ別ニ糟粕ヲ承ケ受シテ津液ヲ化シテ其ノ精微ヲ上ニ注ク於肺ニ脈乃チ化シテ而為リ血ト以テ栄ス生身ノ故ニ得ル独リ行ル於経隧ニ命テ曰ク栄気ト故ニ曰ク中焦ハ如レ漚也仲景カ曰下腑ハ不レ約セ請ヒ漏重下ニ大便難ク腸膜築痛ス故ニ三腑ハ者寄ル於胸膈ニ

## 肺側



肺已下右側可見心系系於脊髓下通於腎其心之系有二一則直與肺相通一則自心入於肺兩大葉之間曲折向後並脊膂細絡相連貫通脊髓而與腎系相通其下則見於第四圖中其系從肺兩大葉穿向後附脊膂正當七節之間黃帝所謂七節之傍中有小心也


## 心氣




五藏系通於心心通五藏系與五藏之系相連輸其血気滲灌骨髄故五藏有病先干於心其別者自肺兩葉之中向後通脊肺自肺而之於腎腎自腎而之於膀胱膀胱與膀胱膜絡並行而之於搜溝處也肺之系者上通喉嚨其中與心一系相通肺之系者自膈正中微近左脇屈胃之上並胃脘絡及胃脘相連貫膈與心肺相通膈膜相綴也肝之系者自膈下着右脇助上貫膈入肺中與膈膜相連也腎之系者膝脊而下行其上則與心一系通為一



## 氣海膈膜



黄帝曰膻中者臣使之官喜樂安焉膻中在両乳之間為気之海也以気布陰陽気和志逆則喜樂由生又云膈肓之上者気海之原乃貪之主故気海為人之父母膈肓謂心肺之間也其膈膜自心肺之下與脊脇腰周回相著如幕不漏以遮蔽渇気不上熏於心肺也




黄帝曰云脾之藏其腑胃也脾與胃膈相連而脾處二胃之上又云胃之大絡名曰虚里貫膈絡肺宗

於左乳之下其動應衣宗氣也故胃爲之市水穀之所歸五味所入如市之雜也太素云胃者大倉也

胃之五竅閭里門戸也咽喉胃大腸小腸膀胱脬五竅

膲之有大絡其系自腸下正中微著左脇於胃之上與胃包絡相附其胃之包在膲之上與胃相並絡周回遍布上下有二系上者貫膈入肺中與肺系相並而在肺系之後其上昂咽間也

咽下胃脘也胃脘之下昂胃之上口也其處謂之賁門者也水穀自此而入胃以受穀気傳之於肺肺在膈上因曰賁門其門膈膜相連如閒糸漫脂相包也若胃中水穀糜爛則自幽門而傳入於小腸故言大倉之下口爲幽門其位隠因名曰幽門






帝曰大腸小腸會爲闌門闌門言分闌遮約處水穀從其泌別也其水入則滲灌入於膀胱上口而爲溲使若穀之滓糟則自闌門而傳導於大腸故曰下焦者在膀胱上口主分別清濁也

○命門

臟各有一腎獨有兩尤者為腎屬水右者為命門屬火亦稍北方之蟲則有龜有蛇龜陰物也蛇微陽也所謂陽生於子火實藏之命門者原気之係男子以藏精女子以係胞其気與腎通脉絡云左手尺中為腎右手尺中為神門脉又曰右腎為命門其腑則包門子戶女子胞者地気之所主也藏於陰而象於地名曰奇恒之府今視藏象則所謂男子藏子精女子繫胞者其原始自心之下系貫七節之傍者其系曲屈下行接兩腎之系下尾閭附腸腸之右通二腰之間若與膀胱下口共漫溺處相並而宿乃是精氣所泄之道也若女子則子戶胞門亦自腸腸之右膀胱下口相並而受胎故気精血脉腑皆五藏之眞以是當知精血來有自兵


○大小腸膀胱系

甲乙經凡手少陰心之經絡小腸手太陽小腸之經屬小腸手太陰肺之經下絡大腸手陽明大腸之經屬大腸足少陰之經絡膀胱足太陽經屬膀胱其大小腸之系則自膈之下與脊膂連心腎膀

胱相系脂膜筋絡散布包裹然各分紋理羅絡大小腸與膀胱其細脉之中氣血津液流走之道

○髓

黃帝書云諸髓皆屬於腦又云腎生髓髓生肝九竅虛云人有四海腦爲髓之海足太陽經入絡於腦故五穀之精津和合而爲骨者內滲入於骨孔補益於腦髓今視臟象其骨中髓上至於腦下至於尾骶其兩傍附肋骨每節兩向腎有細絡一道內連腹中與心肺系及五臟相通




心系六節

七節之旁中有小心腎脉系七節腎系十四推

人之一身五藏六府百骸九竅脈絡盡皆貫通節
々續無間斷今盡其大畧以使觀覽

腦者髓之海諸髓皆屬於腦故上至頭腦下至尾
髓則腎主之

膻中名気海在両乳之間為気之海也気所昼夜
能分布陽陽気者生源乃命之主故為人父母不
可損也

膈膜在心肺之下與脊胸脇周回相着如幕不漏
以遮隔濁氣使不上薫於心肺

蘭門神闕津液入腸脱泻纖流入大腸

臓喻山腑喻道牧陳陽之道合五藏之気與黄帝
論気之行着於分肉之間勇怯故偏鬱治病忌神明之失
守論脈辨性気之緩急欲療病人先察其源五藏
未虚六府未竭気血未亂精神未散服藥心治然
用芳草石藥必察緩急之着外證得神者昌失神者
亡外證面塵色脱也脈診得訛細而微難治也

黄帝曰醫家之用功者以專持毒藥不察病之淺
深而不問其情則精神不進志意不治故病不可
愈内経所以閉戸塞牖數問其情夫用平和之藥
若善不能助其効不得已而用大毒之藥亦可也

右手　左手




脾胃膀胱並屬陽道非但三焦及大腸小腸五藏之源気治行於陽凡焦者有名無形尺至下焦小腸至足陽明關至中焦及脛背脊一寸上寸至上焦頭皮及毛盡手陽明



○陰陽脉類

浮　按之不足軽擧有餘滿指浮上曰浮浮而有力為風熱無力而浮為血虛浮滑為飲宿食浮滑為痰

沈　溜弱弦微為陰

大　浮取之大而無力為血虛気不能相入也經曰大為病進

數　一息六一至為煩滿為脾熱浮數表有熱沈數裏有熱

動　其狀如大豆厥々揺動尋之有擧之無為痛為驚為虛労

滑　往來流利如盤走珠為血實氣壅之候為嘔吐為痰飲為食婦人為經閉和滑為孕

沉　輕手不見重手乃得為陰逆陽鬱之候為寒為氣沉細為少氣沉遲為痼冷沉而數內熱沉而遲內寒沉而有力為癥瘕積聚之候

濇　虛細而遲如雨露之波為氣多血少之候為血瘀痛為傷精女人有孕為胎痛血少孕為墮血



弱　沉細而軟為精氣不足為元氣虛耗老得之順也得之逆

弦　應手端直如弓弦為血氣收斂為勞倦為血虛為痛為泄利浮而微者陽不足身躰惡寒沉而細若有若無為氣血俱虛之候為虛弱微者陰不足藏寒下利

微

○五臟平脉

心脉浮大而散　肺脉浮濇而短

肝脉弦而長　脾脉緩而大

腎脉沉而軟滑

○四時平脉

○春弦　夏洪（一云数一日釣）　秋毛（一云濇一云浮）　冬石（一云沉）

○第二明當臓之病

○從心起

其液汗　心風嗜臥　心風成癲痫

其聲言　心気痛甚　心気成伏梁

其味苦　心熱狂走　心熱成狂走

其臭焦　心冷死矣　心冷成疼



眞心痛手足冷

其色赤　心虚寸陽芤　心虚成恐懼

心虚驚　心虚寸陽芤

右上五般之病除虚不灸餘四種並灸心俞第五推捐去一寸五分量病軽重上至二一百下至三壯一七壯若從起處灸之差餘並倣此也

○從肝起

其液泣　肝風筋脉痿痛　肝風関浮數

肝風癆癎勁筋急

其聲呼　肝気左脇痛　肝気関緊弦

肝気風癖気左脇妨

其味酸 肝熱骨筋疼 肝熱關洪盛
其臭臊 肝熱成腈目赤而骨筋煩 肝冷關沉細
肝冷不食茎吐水 肝冷有疼飲悪風
其色青 肝虚多恐懼無力 肝虚關芤濡
肝虚恐懼無力

右上五般病當灸肝俞從大推下行至第九推
夾推相去一寸五分候不瘥脈或從餘藏來當
灸餘藏還置本處若歩病若重或輕量事而制之除
虚不灸也





○從肺起

其候咳 肺風皮膚生瘡 肺風寸浮數
肺風鼻塞痛 肺氣寸緊數
其聲哭 肺氣成上氣噎
肺氣上喘氣腫
其味辛 肺熱成痰嗽病 肺熱寸洪滑
肺熱頭面生疱瘡
其臭腥 肺冷成面黒悲 肺冷寸沉細
肺冷右脇生癖気
其色白 肺虚饒涕皮痒 肺虚寸芤濡

肺虚臭中肉結生ス
右五般ノ病ヒ除テ虚ヲ不ル多セ餘病多スヲ灸ヲ從ニ大ノ推下行至テレ
第三ノ推ニ夾テ推ヲ捐去一寸五分若レ從餘藏來候ヒ當
藏脉ヲ量テ差少輕重ヲ劑スヲ之
○從レ脾起ル
其ノ液ハ涎レ　脾風旋重　脾風関浮數
脾風癍綴右邊多重レ
其ノ聲歌　脾気腎妨ク　脾気関綴實
脾気ハ腎痛久ノ成ル癭病ト
其ノ味ハ甜レ　脾熱ハ餓瞞　脾熱ハ関洪數



脾熱ハ賊レ黄ヲ爲ス消ト
其ノ臭ハ香レ　脾冷ハ吐レ水ヲ　脾冷ハ関細濇
脾冷レハ風入腸胃ニ疼飲脹滿ヲ
其ノ色黄　脾虚来リ矣ヒス　脾虚関浮芤
脾虚スレハ心熱嗜ニ飢吧ス
右上ノ諸病除テ虚ヲ不ル多セ餘並ニ須ク多スニ第十一ノ脽ノ兩邊
相ノ去四寸半季ノ脇盆ル處即是隨テ病ノ輕重ニ而灸スヲ之
若レ從レ餘藏來ラハ當ニ候テ脉ヲ而多スヲ之量テ不ル妨ケ藥ノ治ヲ
○從レ腎起ル
其ノ液ハ唾　腎風旋ハヤ　腎風ハ尺浮數

腎風痰乘急
其聲呻 腎氣腸脊疼 腎氣尺浮緊
腎氣脊疼煩
其味鹹 腎熱骨煩痛 腎熱尺洪數
腎熱陰毒腫行
其臭腐 腎冷脚腰疼 腎冷尺沉細
腎冷腰冷痺
其色黑 腎虛頭足痰 腎虛尺浮弱
腎虛多成耳聾
石上諸病除虛不灸餘病並灸腎俞二穴推下行



至第十四椎兩邊相去四寸是內腎又夾此脊相去七寸八分斜下是外腎俞並量脫俞也量不妨藥治之恐不審細仍爲圖記之後人背面

○第三明五臟相合

○肝病入心
肝風入心 爲癇爲癎項筋急頭痛舌縮肚熱
肝氣入心 爲痿癖氣痛甚難忍左脇下痛
肝熱入心 項筋急目赤舌乾步聘嗜驚恐

肝冷入心 爲吐酸水飲食不下手足冷如鐵石心痛
肝虚入心 嗜驚悪罵躁暴不欲聞人語意則
叫呼
○右此五般之病除虚不灸餘並灸之常候之脉
從何生灸之帰不錯也兼須服藥大段灸之當
候之魚尻同上心病入心上子不合傳母之
逆也病帰難差
○肺病入心
肺風入心 嗽嗽唾血身體戦掉頭々不安皮膚
搔痒瘡疥
肺気入心 胸中疼痛気短不安胸脇痛悶不
已
肺熱入心 嗽逆吐血皮膚生瘡喘息麁短面赤
肺冷入心 目中多淚悲思不已面青黒色不
常
肺虚入心 悲啼思慕嗜驚怖皮膚白色
右此五般病狀除虚不灸量病輕重觀其差歩
斟酌之不妨藥服餌
○心病入肺

心風入肺 皮膚生瘡自唇自癲反花疹癩肉中生結子

心氣入肺 胸背熱悶胃前及背上熱結子

心熱入肺 皮膚熱蒸手足煩悶胸中及口生瘡

心冷入肺 鶏皮皁面無血色胜弱怯懼無色

心虛入肺 啼泣悲哀目中冷淚梟塞口乾悲恚不安

右五般病除虛不灸其餘並灸當候其脉量老少考藥性臨取制之

○腎病入心 急痛怫鬱而死輕則眼旋目前生花

腎氣入心 為痃癖氣動而攻衝為氣病面黃

腎熱入心 為狂顛之病輕則骨煩名曰陽毒時行

腎冷入心 手足冷如鐵是名真心痛甚則死

腎虛入心 四躰乏力喜汗守定足無力困悶骨節

右此五般病灸候其血除虛不灸量老少衰弱斟酌可施行之

○心病入腎

心風入腎 脚心熱吸吸欲無力手足骨節痠痛頭

心氣入腎 連腰痠疼兼腰脫及腰脚痛不可忍

心熱入レ腎困不レ知二痛處一心意躁煩恐不レ耐レ痛
心冷入レ腎手足冷如レ鐵痛甚レハ則死名二眞心痛一
心虛入レ腎背吸々耳聾目脊健忘嗜テ旋無レ力
右上諸病餘並多灸レ之除テ虛不レ灸服藥量テ差少レ裹
弱斟酌候二本命一
○脾病入レ心
脾風入レ心嗜テ吐レ頭重眼前昏々往々ニ見レ黄花一
脾気入レ心背膊妨心中悶冬妨滿不レ飲レ食兩脇
脾熱入レ心鼽嘶涕レ目黄疸身熱惡レ心吐レ膿悶ス
脾冷入レ心脾中痰飲時々吐レ水味一腹脹ニ不レ欲レ食一
飲
脾虛入レ心食了旋飢心中經々ニ多々熱來嗜テ欠臥ス
右上諸病陳テ虛ヲ不レ灸餘並任レ久ス量テ老少裏弱ヲ斟
酌之不レ妨藥治ス
○心病入レ脾
心風入レ脾生ニ熱結一在二肉中一極則成レ瘡瘍癩病
心気入レ脾胃脾呻痛自膈上ニ心難レ忍則死ス
心熱入レ脾皮膚熱痛重極テ消渇消中消腎ス
心冷入レ脾飲食不レ消背膊妨レ冒胃中細気アリ

心虛入脾好嗜臥四肢昏々不知痛處血力右上諸病除虛不灸餘並灸量差步裏弱陷時制之不妨藥治

○腎病入脾

腎風入脾手足戰掉四肢不安習々昏困無力腎氣入脾腰脚背疼及脊兩脇妨痛甚滿氣腎熱入脾饒聰困重不知痛處面浮腫也腎冷入脾腰背疼及痺脚氣疼自蟲蛸蟲腎虛入脾腰脚無力虛吸々欲臥困悶頑痺右件諸虛不灸餘並任灸但忽腎俞脾俞

○肝病入脾

肝風入脾肉中生結子瘰癧疱疥瘡及花等肝氣入脾左右脇下妨痛甚則爲顆塊痛矣肝熱入脾背脊上熱腫成熱癰極則成膿肝冷入脾好吐酸水不欲喫菜及水亦不欲也肝虛入脾喜大息未欠召嗟噴煩悶穩也右諸病除虛不灸量老步裏弱以意消息脾病入肝無異

○腎病入肺

腎風入肺頭旋鼻塞鼻孔疼頭重脚痠

腎気入肺　胸脊疼如得槌嗽逆無力
腎熱入肺　皮膚熱痛嗽逆戦掉久不差
腎冷入肺　悲泣涕哭面無血色力微少
腎虚入肺　耳聾塞口乾痰膝無力
右五般病除虚不多餘並灸之量其老少衰弱
軽重制之

○肺病入肝
肺風入肝　嗜臥丁蒼反花結節一聚生悪瘡
肺気入肝　百脈脹口鼻青色行卧不得
肺熱入肝　骨節煩悶生結核後為瘡也
肺冷入肝　鼻自多水穴流鼽不絶肉帯青色
肺虚入肝　常驚悸狀似怯人筋中疼痛也
右上諸病除虚不多餘並灸仍薬服勿使不愼
白當候其虚灸勿使簾心量病軽重而制之腎病
入肺無異若也

○脾病入肺
脾風入肺　咳嗽生瘡在胸及頭面疥癩等瘡
脾気入肺　成噎病膈気上噦瘦病背膊中妨
脾熱入肺　悪膿多患膿血病癩是也
脾冷入肺　反胃呕吐胃痛徹心饑吐稀食

脾虚入肺　皮膚白色搔痒欠嘔等是也
右件諸病候其血量病輕重除虚不灸従各四
肢當灸本腧　相入之

○第四明藏腑相入

○脾病入胃
脾風入胃　胃中熱悪心契飯無味鼻中覺香気
脾気入胃　胃中妨悶噦食即脹滿勿食白麺発
呕吐悟水

脾熱入胃　噦水多心熱面黄久不差成二消
之病
脾冷入胃　胃好吐酸水不欲食心中痛久而成
反胃吐也
脾虚入胃　胃好呵意恥々心悶欲食不喜食来
欠多
右上諸病除虚不灸餘並灸四肢須灸脾俞差
但依病當量之
分是也

○腎病入膀胱

腎風入膀胱小便無度頭旋悉心眼昏脚痠疼
腎氣入膀胱膀胱夫膀及背脊兩脇妨痛極成
結氣
腎熱入膀胱小便難赤目睛疼皮膚寒頭痛
腎冷入膀胱遺瀉氣腰痛白濁蛔帶下
腎虛入膀胱令人無力房事不興腸轉耳鳴
右上諸病當灸腎俞及膀胱俞在第十九椎兩
邊一寸五分量老少裏弱兼治之臨時而制之
○心病入小腸
心風入小腸腸鳴作聲或時激痛小便秘澁頭
項痛
心氣入小腸令人腹下疠痛赤白痢下秘澁難
通
心熱入小腸令人渴血熱悶煩痛腸中如湯不
安
心冷入小腸令人渴水穀不化腹中疠痛不堪
忍
心虛入小腸令人神魂狂亂忌見恍惚多語胸
攪
右上諸病當灸小腸俞第十八椎兩面一寸五

分并灸心腧第五雖余治之無妨量老少衰弱
臨時制之胃中之病亦相透得病因種々不同
難盡述

○肺病入大腸

肺胤入大腸　腸中宛轉不欲聞食食即吐清冷
水

肺気入大腸　腸中痛不已成妨凶作皃脹滿不
食

肺熱入大腸　令人糞色黄糜無度而不堪近

肺冷入大腸　令人腸中水穀不化名為痢泻



肺虚入大腸　令人面色白胞内枯瘦鶏皮有鱗
右上諸病當灸大腸俞夾第十六椎兩邊一寸
五分亦須服藥

○肝病入膽

肝胤入膽　常吐黄水爪甲及面並帯青色項痛

肝気入膽　膽脹滿亢脇下痛并膊脇中痛者也

肝熱入膽　目赤痛嗜驚叫呼面色悪罵無度

肝冷入膽　不欲食菜如吐酸水亢脇中第五肋
申妨悶


肝虚入膽　嗜怕懼不安饒涙哭泣面色青

右上諸病當灸膻中夫第十胸兩面一寸五分老少表弱斟酌之病有風気相和冷熱相和風冷相和熱気相擊皆因虚而得也風熱展轉通入臓府相薫成久而不醫遂重雖差軽則易差蓋病有沉重而難痊者善治之謂之良醫治而変重共命謂之小手此為工不識病源不知治之大體而非人之禽也鍼有一月之功灸有終身之効藥通於腑丹石通骨大而言之芙治六腑之病灸治五臓之病五臓主皮筋骨筋六腑主運送傳化藥治針灸有專功臨時施行勿有滞柱違者思之

華佗内照圖卷之上終

# 蚕飼共聯圖

富士川本
力
114



184037
大正7. 3. 31

京都帝國大學圖書之章

新刻華佗内照圖巻之下

魏 華元化 佗 著
明 胡文煥 德甫 校正

富士川游寄贈

○第五 明ニ臓腑ノ應藥ノ一

古ノ人處ニ方ヲ立ルニ法ヲ本ト自不レ同藥不レ執レ方ニ旋ニ為ニ加減ヲ量ニ老少虚實ニ對ニ酌ス服ヲ之ヲ巡レ不レ痊ニ除カ一

○心ノ風ニ服ス疎ノ冷ノ藥ヲ藥性ノ炮ノ灸ノ劑ノ衣度ノ各ノ開具ノ在リ後ニ

地骨皮　龍骨
兎絲子　牛黄

大地黄　蒞蓉　狗脊　草蘚
天門冬　遠志　葛蒲　鍾乳粉
為細末酒糊梧子大三十丸温酒下食後
右以上臨時候脉知病本末方通用之量老少
裏弱軽重而制之修合炮製表請細詳審之此藥
任服無疎
○肝風宜服使藥
京三稜　鱉甲　郁李　陳橘皮
呉茱萸　防葵　罗椒　青木香
人大黄　蓽茇　草撥　訶梨勒

為細末煉蜜丸梧子大二三十丸熟水下食後
○肝熱宜服以冷藥
石決明　秦皮　薯蕷　百合
大地黄　黄芩　黄連　蒌蒿
天門冬　桔梗　苟藥　芒硝
為細末煉蜜丸梧子大二三十丸温茶下食後
○肝冷宜服熱藥
大腹檳榔　桂心　橘皮　柴胡
肉豆蔻　訶梨勒　鱉甲　草撥
呉茱萸　薑屑

為細末煉蜜丸梧子大三十丸飲湯下空心服

○肝虛宜服溫補藥

吳茱萸　芍藥　枳穀　黃耆

五加皮　人參　芎藭　遠志

赤茯苓　五味子

為細末生薑去滓溫服不拘時候

右上諸藥並量病輕重製之餘准上肝氣不叙耳

○肺胤宜服疎冷藥

桔梗　款冬花　升麻　黃芩

栝子　麦門冬　芍藥　萎蕤

百合　茯苓　括樓　薯蕷

黃耆

為細末生姜煮去滓溫服食遠

○肺気宜服疎藥

知母　茯苓　人參

蒿本　黃耆　百合

葶藶　防已　杏仁　丹參

猪牙皂莢　大棗　貝母

為細末煉蜜丸梧子大二十九熟水下食遠

○肺熱宜服瘧藥

麥根皮　薯蕷　犀角　通草　百合
黄連　梔子　茯神　桔梗　杏仁
麦門冬　秦艽　歎冬花
為細末煮去滓温服食遠

○肺冷宜服孚藥

山茱萸　黄耆　人參　茯神　芒硝
五味子　挍柳　柴胡　澤瀉　射干
溪防巳　百合
為細末煮去滓温服食遠



為粗末生薑煮去滓温服食遠

○肺虚宜服温冷藥

歎冬花　貝母　升麻　百合
麥門冬　桔梗　黄連　大黄
五味子　五加皮　地骨皮　茯苓
人參　蔊菜　蒺藜
為細末煉蜜丸梧子大三十九熟水下食遠

右上諸藥俗取候吐處其方隨取消息

○脾胃宜服瘧藥

仙靈皮　前胡　橘紅　人參

薑屑　升麻　黄芩　犀角
五粒松　桂心　羚羊角
為細末熟水酒各半調服食前
○脾気宜服使藥
前胡　大黄　鼈甲　荆三稜
枳穀　橘皮　桔梗　呉茱萸
蒼朮　蜀椒　梔子ノ大二三十九　生薑湯下食前
為細末煉蜜丸梧子ノ大違服
○脾熟宜服疎冷藥

升麻　黄芩　桔梗　通草
百合　茵蔯　麦門冬
歎冬花　秦艽　栗根白皮
為粗末水煎去滓温服食前
○脾冷宜服疎熱藥

呉茱萸　薑屑　附子　桂心
赤芍藥　白朮　乾姜　蒼朮
大黄　澤瀉　橘皮　防葵
為細末酒糊丸梧子ノ大二十九米湯下食前
右上諸末施病剤薬性方分随取剤之

○腎風宜服熟菜

黄耆　茵蔯　石南　石斛
地骨皮　附子　鹿茸　草蘚
兎絲子　戎鹽　桂心　薑屑
爲細末煉蜜加酒和丸梧子大每三十丸温
酒下食前

○腎気宜服酸熟藥

吳茱萸　桂心　戎鹽　鹿茸
禹餘粮　蓯蓉　磁石　石鹽
鍾乳粉　硝石少許　夜明砂

爲細末酒糊丸梧子大二十九鹽湯下食前

○腎熱宜服辛冷菜

梔子　大黄　石膏　硝石
茸ウ　麻黄　黄連　栝樓
麥門冬　菊菜　滑石

爲粗末水煎去滓微熱服食遠

○腎冷宜服毒熱藥

附子　乾薑　午膝　杜仲
天雄　草蘚　磁石　草蓯
吳茱萸　黄耆　鹿茸　骨碎補

為細末煮糊丸梧子大二十丸淡酒下空心

○腎虛宜服熟補藥

天雄　鹿茸　蓯蓉　茸妙
兎絲子　芎藭　當帰　枳穀
苟藥　草薢　茱萸
右為細末水酒煮糊丸梧子大三十丸益湯下

右件諸茱以意應五藏六府風冷熱気虛損量病應藥修合炮製精細詳審旋為加減用之如神夫良醫處治用藥変應臨時無以為定病與茱令得彼我之気随其宜剤之無施不可方等分差忒臨剤之但



諳藥性兼識病源而不錯也凡藥有列土採取皆有時節用有新陳炒搗錬合和服一切知之名為良医也又識會陰陽之躰行算本命王相生氣禍害絶命福徳天醫病之浅深量而剤也是良醫之病與藥也

○論茱性味無毒合炮炙剤衣度

○大地黄　酒浸洗焙乾　○陳皮　去白晒乾
○白朮　切碎水拌浸一宿　○遠志　去心晒乾
○厚朴　去麁皮剉用生姜製衣焙乾　○乾薑　炮剉衣
○甘草　炙黄色或生　○杜仲　去麁皮剉生姜汁拌炒乾

○骨碎補 去毛剉用酒拌蒸二月晒乾
○天門冬
○鱉甲 去裙醋灸黃色
○訶梨勒 灰中煨去核酒浸蒸乾
○肉豆蔻 用酒浸一宿焙乾
○枳穀 麩炒去穰
○猪牙皂角 去皮塗酥炙焦黃色
○僊靈皮 用羊脂拌炙脂盡為度
○鹿茸 凡用去毛酒浸一宿用酥塗漫火炙
○大黃 去皮煨或蒸
○狗脊 剉炒去毛鬚
○石決明 研細製
○麥門冬 二味用湯泡酒拌心晒乾
○拆柳 平生端立者勿令見火
○大腹皮 用大豆汁與酒和洗剉焙
○杏仁 麩炒去皮尖
○萵蘆
○石斛 去根剉酒浸一宿晒乾焙
○陳麻黃 去根節
○栝樓 去皮炒黃



○茯苓
○黃連 去鬚蜜拌炒
○龍骨 粉吞酒煮焙乾
○草龍膽 去蘆剉用草水浸一宿晒乾
○前胡
○秦艽
○梔子
○紫菀 去土蘆
○羚羊肉 鑄
○犀角 鑄
○貝母
○當歸 破血頭取用尾止痛用
○龍齒 研細水飛過晒乾
○茯神 去皮并心
○荊三稜 入用須炮熟
○柴胡
○蒿本
○薤蓉
○人參 不去芦令入吐
○黃耆 去黑心擘碎塗蜜炙

○黄芩 去腐心
○石膏
○山茱萸
○地膚子
○禹餘粮
七遍各研細水漉過
○論藥性有毒炮製衣者用
○附子 生用則発敷熟則峻補
○川烏頭 大熱大毒與附子同製
○午膝 去芦
○兎絲子 令酒浸一日晒乾
○桑白皮
○夜明砂 微炒
○磁烏石 二味用炭火炒過未酷醋
○天雄 大熱大毒
○半夏 辛平有毒研末以姜汁和作餅
○呉茱萸 熱少毒湯浸七次焙乾
○川椒 小熱小毒去子微炒出汗
○礜砂 辛温有毒用少許
○午黄 平小毒主小兒風熱
其餘諸藥性皆平温微寒而無毒不在製度之數也

○湯液煎造

病人擇醫治心擇藥煎製衣度令親信恭誠至意煎藥銚器除油垢腥穢必用新淨甕水為上若水大小斟酌以漫火煎熬分數用紗絹濾去滓取清汁服之無不效也

○古人服藥治法日

在レ上ニ不レ厥ハ頻而少キヲ
少ク服スルトキハ則滋栄レ於上ヲ
在レ下ニ不レ厥ハ頻而多キヲ
多ク服スルトキハ則竣ク補ス於下ヲ

○服レ藥ヲ有レ法

病ヒ在ルレ心ニ上ニ者ハ先キニ食ヲ而後ニ藥ヲ病ヒ在ルレ四肢ニ者ハ後ニ食ヲ病ヒ在ルレ心ニ下ニ者ハ先キニ藥ヲ而後ニ食ヲ須ク服スレ藥ヲ於旦ニ病ヒ在ルレ骨髄ニ者ハ須ク服スレ藥ヲ於夜ニ

○第六明ス二蔵府ノ成敗ヲ一

○五蔵ノ死

心ノ絶スレハ一日ニシテ死ス

何ヲ以テ知レ之ヲ面青ノ但、伏レ視而不レ見ヘ泣ヲ如シテ水ノ不レ止ニ

肝絶スレハ八日ニシテ死ス

何ヲ以テ知レ之ヲ但、口張リ気ヲ而短ク

肺絶スレハ三日ニシテ死ス

鼻色黒シ

脾絶スレハ十二日ニシテ死ス

何ヲ以テ知レ之ヲ腸蒲ノ泄瀉不レ覚ヘ

腎絶スレハ四日ニシテ死ス

足腫レ

何ヲ以テ知レ之ヲ歯長ク而黒ク目中黄

腰中欲レ折レント自汗流水ノ如シ

○五體ノ敗

骨絶スレハ五日ニシテ死

何ヲ以テ知レ之ヲ脊痛ミ腰中重ク不レ覚ヘ

肉絕ハ六日ニ死ス

筋絕ハ九日ニ死ス

血絕ハ三日ニ死ス

腸絕ハ六日ニ死ス

○五證ノ死

翻覆スルノミ耳

何ヲ以テ知ハヽ舌腫レ溺血大便赤ク然リ也

何ヲ以テ知ハヽ手足爪甲青ク吁呼シテ罵リ而不休ニ

何ヲ以テ知ハヽ口鼻張リ気但出テ而不ル入ラ

短キ者ハ死ス

何ヲ以テ知ハヽ髮直ク如ク麻ノ乾キ曲ル身不ル得ル者ハ死ス

肉及ヒ足乎ニ腫レ一證

面腫レ奄々タルヽ肝敗不ル堪ヘ治ニ一月ニ死ス

眼枯陷スル二證

手骨并ニ欵盆骨蒲ツ心敗一月ニ死ス

壹ヒ散鼻張ル二證

唇反リ無キ理肺敗不ル治セ五月ニ死ス

唇讒歯露ル四證

膞腫レ滿ツル者ノハ脾敗不ル治セ十一二月ニ死ス

気喘語違キ五證

陰陽腫レ不ル起ハ腎敗三月ニ死ス

○五色ノ死

面赤目青ハ死ス　面黄目黒キハ死ス
面白ク目黒キハ死ス　面黒ク目青キハ死ス

○五聲ノ死

気聲絶ヘ脹加キハ鐵ノ脾絶ル死ス
妄語錯亂ハ神去ル心絶ノ死ス
語聲散ルハ魄去ル身無ハ肺死ス
語聲高キハ魄去ル身無ハ肝死ス
長呻吟スハ志去ル身無ハ腎死ス

○五體ノ死

頭重ク呿吐スルハ一體ノ死　足重ク心腫レハ二體ノ死
手足ノ甲青キハ三體ノ死　脚ノ爪甲黒キハ四體ノ死
脉ノ大サ如キハ斗ノ五體ノ死

○五竭

髪直ナル如クナルハ血竭　足ノ爪甲青キハ筋竭
歯燥テ如クナルハ熟小豆ノ骨竭　魄張リ気促ルハ気竭
耳ノ魄唇焦レ黒キハ肉竭

○五傷ノ死

五傷ノ脉ハ不レ療ヒ
房事無度ハ傷ル腎ヲ　傷レハ腎ヲ二尺ノ凪如シ屋ノ漏ノ解索
雀啄弾石ノ

食飽醉臥傷脾

言無多寡傷心

欬嗽飲冷傷肺

用力無度傷肝

○五不稱血

脉大而息細死

小兒如大人脉死

傷脾右関如鰕遊鶏足跡

傷心左寸脉如断索啄

屋漏

傷肺右寸脉如暴雨之状

如彈石之状

傷肝左関如繫弦之状

大人脉如小兒脉死

息大而脉小死



熱病而脉沉死

○五視死

病人目上看人者死

病人目直視者死

病人無晴光者死

病人目斜者死

病人目下看人者死

○凡辨生死之法色聲心脉一反常者即死矣

○夫人稟五氣者吐納之氣是也以陰陽氣造化之内而運者昂手足是也興動吹變須會逆順若逆則五気相反若順則五気相生然以五氣之中則主五藏之内稟五気非但人身兼禽獣草

木悉同レ於此ニ茅性ヲ方街ム徴ス如レ然カノ然ル知ルモノ之鮮レ
以テ圖レテ之ヲ於象ニ合スル物會ノ之刻ニ心思惟察レ深ク理ヲ於虔
之内ヲ察セヨ五運ヲ一焉

運氣ノ篇要五運ハ以テ爲レ尊トシ故ニ爲レ君ト而ノ南ヲ面スルヲ之
南政ト

## 五運之始



丹天之気経於牛女戊之分戊與癸位丹火気也故癸爲火運

鄞天之気経於心尾己分己與甲位鄞土気也故己爲土運

蒼天之気経於危室柳鬼危室壬位柳鬼丁位蒼木気也故丁壬爲木運

素天之気経於亢氐昴畢亢氐昴畢庚位素金気也故乙庚爲金運

玄天之気経於張翼婁胃張翼婁胃辛位玄水気也故丙辛爲水運



# 六氣之紀




右五運六氣調上手之圖

甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾鄉庚屬大腸
辛是肺壬是膀胱癸腎




又

歲之本位月明天三順數前三見在泉三前四便是初之氣二三四五六排連

五運

甲己歲土運。
乙庚歲金運。
丁壬歲木運。
丙辛歲水運。
戊癸歲火運。



○十干

甲丙戊庚壬五者皆陽干
乙辛己丁癸五者皆陰干

○十二支

申子辰寅午戌六者皆陽支
己酉丑亥卯未六者皆陰支

陽支配陽干二陽用事其氣常盛故運行為太過有餘
陰支配陰干二陰用事其氣常衰故運行為不及

○六氣

厥陰風木。少陰君火。
太陰濕土。少陽相火。
陽明燥金。太陽寒水。

土運甲歲　水運丙歲　火運戊歲
金運庚歲　木運壬歲

○不及不足

土運己歲　水運辛歲　火運癸歲
金運乙歲　木運丁歲

○歲會謂運與歲相會（スルヲ）

木運臨卯（ニ）　丁卯是也（ナリ）　水運臨子（ニ）
戊午是也（ナリ）　土運臨四季（ニ）　甲辰甲戌
己丑己未是也（ナリ）　金運臨酉（ニ）
乙酉是也（ナリ）　丙子是也（ナリ）



## 每歲司天在泉主客氣之圖



○每歲天之六氣爲客
司天爲三之後二氣爲初之後一氣爲二之
前一氣爲四之前二氣爲五之後在泉爲
六之
○每歲地之六氣爲主
厥陰初　少陰二　少陽三　太陰四
陽明五　太陽終　子午之集以少陰位昼司天
丑未之集以太陰位昼上餘倣此轉
○每歲交六氣之期
○每氣司六十日零八十七刻半

○三十六年爲一合其一合爲一運即三百九
十六年也自大定戊申交入火運

○新添長葛烏講師益之晋陽郭教授之才三先生経験婦人産育各方并小兒各方

○増減地黄丸　治婦人月経不調以致久而無子是衝任伏熱也

當帰全三兩　熟地黄半斤　黄連浄一兩
三味共酒浸一宿焙乾為細末煉蜜為丸如梧子大毎服五十丸至二百丸空心温酒下経多者

○調経湯　治婦人経水不調或産後腰腹腰脊疼痛不忍或陥経脱者

廣茂煨熟錢半　延胡索　苦練子各二錢五分炒
川芎　當帰全　苟藥各二錢半
熟地黄半兩　挍梔一錢
右為麁末毎服半兩水一茶鍾煎取七分去滓温服

○使君子散　治婦人月経断絶不行者

甜瓜蔓陰乾使君子各半兩　茸草末一錢
右為細末毎服三錢温酒一盞調下空心

○通経丸　治婦人月信凝結久而不通漸瘦成勞

川大黄去皮剉一兩用醯醋少半煮大黄盈以文武火焙乾

右為細末醞醋丸如梧子大都作一服煎紅花湯下如經過多以木香湯送下然虛實加減服

○廣茂湯　治婦人月經不調雖有已其色或青或黯裹色諸病欲死者

木香　廣茂　濕紙裹火煨切各一兩　半炒
皮尖双仁不用　胡桃二兩湯浸去皮　桃仁一兩半麩炒去

右末香廣茂二味先為細末令勻拌胡桃穰桃仁二物同研為膏加泥煽貯磁器內每服取膏一匙起溫酒一小盞投末三錢調服空心日進二服取効甚多

○生地黃湯　治婦人月經不調熱閉斷絕往來寒熱發熱昏悶四支怠惰不美飲食

揀人參　白朮藥　桔梗
黃耆綿　甘草炒　黃連酒浸洗晒乾各二錢
當歸三錢　升麻四錢　柴胡　子芩炒
黃柏炒各半錢　生地黃　熟地黃　紅花五分
五味子四十個　桂去皮二錢

右㕮咀每服一兩水一茶鍾半浸三時煎取一鍾去滓溫服食前

○驗胎散　治婦人經絡往滯三箇月間

正川芎 二兩
右為細末濃煮艾湯一盞半調一匙頭服之
腹內微動者是有胎也

○妊娠安胎之法

○安胎丸 治妊娠婦人經水遶來素不堅固遂有殞墮覺有孕時可使服之而不致損妊婦可以常服

子芩 去心皮 二兩 自來 七錢半 砂仁 炒去穰 二錢半
右為細末燒飯為丸如梧子大每服三十五十丸空心溫米湯下

○琥珀湯 治妊娠或因事築磕或胎先腹中墜露已下疼痛難忍口噤欲絕若胎不損則痛止子母俱安若胎已損立使追下神効

當歸全 三兩 川芎 二兩
右為粗末每服半兩水酒各一盞煎至一盞二分去滓溫服食前

○黃龍湯 治妊娠頭痛不飲食腸下痛悪逆產後傷風熱入血室寒熱如瘧經水遶來病後勞復餘熱不解

柴胡 二兩 子芩 人參 芎 甘竹 灸各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片棗一枚煎取七分去滓温服若腹痛去子芩加芍藥三分

○人參散　治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少燥煩壅熱口舌乾燥煩渴

人參一兩半　青竹茹一兩　麥門冬去心五錢

子芩一錢半　地骨皮一錢　甘草

右水一升煎至六合去滓分三服無時

○當歸散　治妊娠忽暴下血數升胎躁不靜

生地黄一兩　當歸乾榆白皮各五錢



葵子一兩

右為粗末每服五七錢生姜五片水二大盞煎取八分去滓食前温服

○保安散　治妊娠自有所傷胎動疼不忍及血崩出不止○帶皮縮砂一兩炒黑色去皮為末每服二錢清温酒調下竟腰中熱則胎安也

○立聖散　治妊娠下血不止○鷄肝細剉酒一升煎其食之大効

○赤茯苓湯　治妊娠小便不利及水腫洒洒惡寒動轉食前服之日進三服

○萬應丸　治妊娠胎動不安及產後小便痛不忍者

知母　去皮炒一兩　右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心一盞化開食前服之

○產後并難產

治婦人臨產之時當先脫尋常所著衣覆于竈口而令產婦（甲）下床（乙）上令傍人（丙）扶（丁）腰（戊）引痛（己）眼中生花（庚）此（辛）是兒轉方（壬）可服葵根湯一服（癸）切勿太早（子）服之須（丑）待其時（寅）傍人不可近迫（卯）太小倉（辰）卒恐有所傷（巳）欲產時抱腰之人不可頻



斜則兒浸頭（午）自然易產直（未）待兒出訖（申）一切之人及（酉）母莫（戌）問是男是女穩婆救得不可（亥）語諸他人及女（子）眷欲（丑）產時先（寅）取新汲水半盞（卯）兒始（辰）落地便（巳）頓飲之（午）血不上（未）搶也產後大忌（申）食熱湯（酉）令（戌）母見血穢（亥）勿（子）服熱煖藥及熱麵等（丑）物飲食方（寅）酌酙進（卯）之而可（辰）矣（巳）

○葵根湯　治滑胎易產妊娠胆（午）痛胎（未）動太早（申）產（酉）耶未（戌）至（亥）產艱難（子）

葵根　瞿麥　榆根白皮　去赤皮剉焙

午時去滓酒浸一宿 大麻仁 別研 二錢半
焙乾 二錢半
右爲粗末每服五錢水一茶鍾半煎取一鍾去滓溫服不拘時候

○阿膠散 治橫倒生手足先宂
黃明膠一兩炙 滑石末一兩 細藏者 葵子二合
當歸二錢五分
右爲粗末水二盞半煎至七分去滓分作二服

○獨勝方 治產腸先出
子四十九粒研爛塗產母頂上自然收上也

○又方 若久風吹腸乾其腸不能上者
以磨刀水少許溫油盤腸煎好磁鳥石湯一盃令產母溫服自然收上也

○又方 產門子衕乾澁必致難產務要產婦惜力或心中熱悶取白蜜一匙新汲水一盞調下如神

○又方 若未順產○取生鷄子一箇去皮吞之待兒欲生頭面端正逼近產門然後上草令人抱腰也

○又方 經日不生者○用秤鎚或鐵杵或斧頭皆令燒赤用醋淬三次請酒二升盛在木器

中ニ投ノ至リ三ツ次ニ毎服一盃ス自然ニ易頃カリ

○紅花湯　治ス婦人産後悪物衝キ心ヲ四支冰冷シ
腎青ク腹脹飲食不レ下ラ発シ迷者ヲ急ニ服ヨヲ

紅花一錢　紅藍子一両　右為レ粗キ末ト毎服五
錢水二盞用テ婦人ノ油頭釵児二隻ヲ同ク煮テ至リ一盞ニ
去テ滓ヲ温服ス大小便倶ニ利シテ血自ラ下ル也

○芎藭丸　治ス産後或ハ腸胎去ラ血過多或ハ血ノ山ノ如ク
崩レ或ハ金瘡去血過多昏運ノ不レ省ニ人事ヲ心煩運悶シ
挙レ頭ヲ目暗ク欲スレバ倒ント者ヲ

芎藭　当帰尾　各一両　右為レ粗キ末ト毎服五



錢水一盞半煎ジ取リ一盞去レ滓ヲ稍熱ヲ服ス無レ取

○梅師方　治ス婦人子戸痛ミ不レ忍ニ者ヲ

肥牛膝　去レ苗ヲ五両　右剉ミ酒三升ヲ煮テ取リ一升半ヲ去レ滓ヲ分テ為レ三服ト大ニ効カリ

○枳穀丸　治ス産後大小渋滞スルヲ

枳穀麩炒一両　大黄一両　木香三錢　砂仁炒黄一両

右為細末ト煉蜜ニ和シ丸ニ梧子ノ大ニ毎服三五十丸食後温水ニ送下ス如レ飲食不レ化セ血ヲ得レ服スルヲ也

○凉血湯　治ス婦人血ノ如ク崩レテ不レ止ラ腎水陰虚シ不能レ鎮ス守ル包絡相火ヲ故ニ血走テ而崩スル也

生地黄　當帰尾　各五分　黄連　黄柏
知母　蒿本　川芎　升麻　各二分
川羌活　紫胡　防風　各三分　甘ヶ
細辛　荊芥　蔓荊子　紅花　各一分

右㕮咀、和レ調ス二空心一温服之

○犀角飲子　治二産後亡液虚損一取二自汗一
槖困倦、唇口乾燥一
犀角　自来　麥門冬　去心各半両
紫胡一両　枳殻　去穣麸炒　地骨皮　生地黄

當帰　棟実
黄耆七銭　右為二粗末一毎服五銭水一盞半入
浮麥七十粒生薑三片煎取七分去レ滓温服

○通気湯　治二婦人乳癰爽痛不レ忍者一
川山甲一両　炒　川木通　剉一両　自然銅　五銭　火焼通赤
入醋内三次　右為二細末一毎服二銭熱酒調下

○又方　治二乳癰腫痛諸藥不レ能レ止レ痛者一
里一穴鍼入五分其痛立止如レ神也三里穴在
膝下三寸脛骨外廉兩筋間一挙レ足取レ之

○加減補中湯　治二産後傷レ血動レ気腰中疼痛一

小腹拘急ス呎有テ自汗不レ思ニ飲食ヲ
熟地黄 一兩 當帰 二兩 白芍藥 二兩
甘草 炙咀 每服 五錢 水一丁
桂三錢去皮
盞半生姜三片煎取リ一盞去滓食前温服ス
○縮砂仁湯 治ス產前後血崩不レ止臍下急痛ス
黄耆 五錢 白朮 四錢 川練子 三錢炒
子苓 五錢 川芎 三錢 黄連 三錢
右藥 三錢 生地黄 縮砂仁 各五錢
右每服 五錢水一茶鍾煎至リ七分ニ去リ滓ヲ温服ス
○增損紫胡湯 治ス崩血不レ止及ヒ產後經過多



身體如レ氷ノ自汗出ツ浴スルカ如ク熱口乾ヲ先ツ止ム自汗ヲ次ニ止ム
物湯ノ内ニ加ニ白虎湯ヲ汗止次ニ止ニ其熱ヲ以テ小柴胡湯ノ
内ニ加ニ四物湯各ノ五錢水一十大茶鍾生薑二片煎
取リ七分ヲ去レ滓ヲ稍熱食遠ニ服スヘシ之ヲ
○遇傒散 治ス產後諸般ノ悪証或ハ赤白三色相
兼裏急後重臍腹絞痛目夜無度口噤テ不レ食ハ不
問ニ大人小兒虚弱老幼ヲ並ニ宜レ服スヘシ之ヲ
御米穀 擇淨炒 當帰尾 茸草 各二兩
石榴皮 赤芍茱 地楡 各二錢半
右為レ粗末ト每服三錢水一盞半煎至リ一盞去リ滓ヲ

温服空心小兒旋加減服之

○小兒諸證名方

○三稜煎丸　治小兒食飲過多痞悶疼痛宿食不化久而成癖此藥專能破婦人血積血癖

右將大黄為末於銀石器或砂石窑中以好醋熬可以與丸如麻子大三

遺令平用綫火煮至二十三十丸食遠温水下虚

或蒸豆大服十丸至二十丸如梧子大每服四十丸

實加減大人加倍

○丹砂丸　治小兒五痫八痢

好朱砂研　青黛各分一丁香　肉豆蔻一枚

雞舌香二錢研　設石子一枚大煅　蝦蟇一箇大足酥塗炙

右為細末糊丸如梁豆大每服三十或五十丸

空心温漿湯下

○又方　專治小兒癖気久而不差者○中脘一穴在大横外直臍季肋端側臥屈上足伸下足舉臂取之右中脘音門二處各灸七壯臍後

脊中灸二七壯取中脘穴從鬲俞下取病兒四所是灸之無不効也

○天麻散　治小兒急慢驚風其効如神又治大人中風涎

禹講師經驗

盛半身不隨語言雞不省人事
半夏 五分 白茯苓 二錢半 甘草 灸
生薑 自末各二錢 石作一劑用水一盞
入磁器內煮令小乾將數末藥焙乾爲細末每
服一錢半棗子湯半盞調下無灰大人小
三錢

○五液散 治小兒吐逆吐瀉亂不安燥煩
不得睡及胵脹小便赤澁煩渴悶亂或傷寒瘧
病皆効

桂府滑石 四兩 燒過 藿香葉 五錢 丁香 一錢

右爲細末每服一錢清水半盞調下或冷
又大小霍亂吐瀉水穀不入胸膈痞悶
○無價散 專治小兒寒熱喘急不止欲死者

辰砂 二戔半 牙硝 一戔 微煮切 輕粉 五分

右爲細末每服一錢用溫水少許上滴小油一
點抄藥在上沉下去却將水灌之立効如神
○經驗方 治疫疱瘡後眼內生翳膜者

白菊花 蒺藜去根各五錢

右爲細末每服抄一大盞乾柿一個生栗米洒
一盞煮米洒盡將柿去核食之一日可食三枚

病淺者二十日遠者一月必効
○豬尾膏 治齁齁子倒擫黑陷
小豬尾刺血三點入生腦子少許令研新水調
服立効
○鎮肝丸 治小兒急慢驚風目直視擲搐昏
乱不省人事是肝驚風熱也
天竺黄 研 生地黄 竹葉 當歸
川芎 草龍胆 山梔子 大黄
羌活 防風 各一兩
右爲末煉蜜和丸如鷄頭子大每服二丸砂糖
水化開服之無灰木人三五九 先服鎮肝丸次服天麻散
○治初生小兒腦風撮口諸藥不効者
取煞谷二穴在足內踝前起大骨下陷中可灸
三壯針入三分不宜見血立効大人小兒口噤
牙關不開者諸藥不下生天南星細末一錢腦
子少許相和研勻用指頭蘸生姜汁蘸藥末於
左右大牙外相邊擦之立開

新刻華陀內照圖卷之下 終

余嘗負笈遊于朝鮮偶獲此書而歸韞櫝袠年閱玩之本邦未嘗有此書兵盞華陀東漢之神医而刳腹滌穢治人許多然而音襲亡眞書少卑錐中臟經行於今其中有可疑者故於此圖

亦不能無疑然如此書臟象明
白而治濕萸紉則華陀之真書
不論而可知也惟恨缺文多丌
脾藥方亡焉耳如其附續名方
者雖全非乎陀之方然而藥味
專明非莫助於治濕者也吾友

杏洞軒令余壽梨以公乎四方
因相共校讎焉欲見者撫其金
而勿尤尾石也曾寶永辛卯仲
春陽日通玄門人對州醫生曺
柙安真於東武旅館跋

寶永八稔辛卯春二月吉旦

江戸大傳馬三町目　志村孫七

江戸日本橋通壹町目　井屋五郎右衛門

開板

◎内照屋蔵