00073465

水經注

00073465

00073465

4° L. Biol. M 52 (2)

校定脉經序

臣等承

詔典校古醫經方書所校讎中脉經一部乃王叔和之所撰集也叔和西晉高平人性度沈靖尤好著述博通經方精意診處洞識脩養之道其行事具唐甘伯宗名醫傳中臣等觀其書叙陰陽表裏辨候分人迎氣口訣神門條十二經二十四氣奇經八脉三部九以舉五藏六腑三焦四時之病若網在綱有條而不紊使人占外以知内視死而別生爲至詳悉感可按用其文約其事詳者獨何哉蓋其爲書一本黄帝内經間有踈略未盡處而又輔以扁鵲仲景元化之法自餘奇怪異端不經之説一切不取不如是何以歷

Bayerische Staatsbibliothek München

00073465

數千百年而傳用無毫髮之失乎又其大較以謂脉理精微其體難辨兼有數候俱見異病同脉之惑專之指下不可以書盡隱伏而乃廣述形證虛實訂明聲色王相以此參伍決死生之分故得十全無一失之繆爲果不疑然而自晉室東渡南北限隔天下多事於養生之書實未皇暇雖好事之家僅有傳者而承疑習非將喪道眞非夫聖人曷爲聱正其文玩神禹叙極之德士上體大舜好生之德推錫福之良心鑒慎疾之深意

00073465

臣億等言臣聞診候之深意出乎古書俾從新定臣等各殫所學博求衆本據經爲斷甚取非私大抵世之傳授不一其別有三有以隋巢元方時行病源爲第十卷而撮諸篇之文別增篇目者推有以第五分上下卷者考其時而繆自破其本文而義無取稽是三者均之未覩厥眞各秘其所藏爾今則考以素問九墟靈樞太素難經甲乙仲景之書并千金方及諸異說脉之篇以校之除去重複補其脫漏其篇第亦頗爲改易使以類相從仍舊爲一十卷摠九十七篇施之於人俾披卷者足以占外以知內視死而別生無待飲上池之水矣國子博士臣高保衡尚書屯田郎中臣孫奇光祿卿直秘閣臣林億等謹上

00073465

脉經序

晉太醫令王叔和撰

脉理精微其體難辨絃緊浮芤展轉相類在心易了指下難明謂沈爲伏則方治永乖以緩爲遲則危殆立至況有數候俱見異病同脉者乎夫醫貴妙猶或加思仲景明審亦以求驗故傷寒有承氣之戒嘔發有半夏之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述奥而不售遂令末學昧於原本斥茲偏見各逞已能致微痾成膏肓之變滯固絶脉起之望良有以也今撰集歧伯以來逮于華佗經論要決合爲十卷百六十色證候靡不該備其王阮傳載吳葛

00073465

呂張所傳異同咸悉載録誠能留心研窮究其微賾
則可以比蹤古賢代無夭横矣

00073465

脉經卷第一

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

脉形狀指下秘決第一

平脉早晏法第二

分別三關境界脉候所主第三

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

平脉視人大小長短男女逆順法第五

持脉輕重法第六

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

辨腑藏病脉陰陽大法第八

辨脉陰陽大法第九

00073465

從橫逆順伏匿脉第十一

辨災怪恐怖雜脉第十二

遲疾短長雜脉第十三

平人得病所起脉第十四

診病將差難已脉第十五

脉形狀指下秘決第一 二十四種

浮脉舉之有餘按之不足 浮手於下

浮脉舉之有餘按之中央空兩邊實 一曰浮而大 一曰浮無兩傍有

乾脉浮大而軟按之中央空兩邊實 一曰浮

滑脉往來前却流利展轉替然與數相似 一曰浮

洪脉極大在指下 一曰漉

滑脉往來前却流利展轉替然與數相似 一曰浮

數脉去來促急 一息六至 一曰數者進

力一曰漉如欲脫

00073465

數脉去來促急

促脉來去數時一止復來

弦脉舉之無有按之如弓弦狀一曰如張弓弦按之不移又曰浮緊爲弦

緊脉數如切繩狀一曰如轉索之無常

沈脉舉之有餘一曰重按之不足舉之無有一曰手下栽動一曰按之著骨乃得

伏脉極重指按之著骨乃得一曰重按之不足舉之無有一曰關上沈不出名曰伏

革脉有似沈伏實似弦千金翼以革爲牢

實脉大而長微強按之隱指幅幅然一曰浮皆按之如欲盡

微脉極細而軟或欲絶若有若無一曰小也一曰手下快一曰浮而薄一曰按之不得

濇脉細而遲往來難且散或一止復來一曰浮而短一曰短而止或曰散也

細脉小大於微常有但細耳一曰按之無有舉之有餘一曰細小而軟一曰按之細乃有

軟脉極軟而浮細按之欲絶指下一曰按之如有如無舉之乃有一曰軟一作濡曰濡者如帛衣在水中輕手相得

虛脉遲大而軟按之不足隱指豁豁然空
散脉大而散者氣實血虛有表無裏
緩脉去來亦遲小駛於遲一陰一陽
遲脉呼吸三至去來極遲一陰一陽
結脉往來緩時一止復來按之來緩時一止更來
代脉來數中止不能自還因而復動脉結者生代者死
動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖而有力
浮與芤相類浮與芤皆大而軟浮與陽同等
滑與數相類滑與數皆動則汗出陰陽俱動則發熱形冷惡寒數脉
沈與伏相類沈與伏皆陰脉見於關上名曰伏陽下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動
弦與緊相類弦與緊皆傷寒論云陰陽相博名曰動
革與實相類千金翼云革與實相類
微與濇相類

00073465

軟與弱相類

平脉早晏法第二

黃帝問曰夫診脉常以平旦何也岐伯對曰平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調均內經作調勻氣血未亂故乃可診過此非也千金同素問太素云有過之脉切脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脉候所主第三

從魚際至高骨其骨自高卻行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陰三陽陰生於尺寸主射上焦出頭

及皮毛竟手陽明主射中焦腹及胷尺主射下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脉獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脉之大會手太陰之動脉也人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度為一周晝時也夜時也故五十度而復會於手太陰寸口也即五藏六腑之所終始故法取於寸口

脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之大會要也從關至

00073466

尺是尺内陰之所治也故分寸爲尺分尺爲寸寸尺至魚際是寸口也然尺寸何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過關有格者陽乘有覆有溢有陰陽相乘之脉也脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有格者法曰太過者陽之動也脉當見一寸九分而浮過關有格者陰乘之動也脉當見一寸九分而沈過關之後者法曰不及遂上魚爲溢爲外關内格此陰乘之脉也陽乘之脉故曰覆溢是眞藏之脉也人得寸内九分尺寸終始一寸九分故曰尺寸也

平脉視人大小長短男女逆順法第五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速

大小長短皆如其人形性者則吉反之者則爲逆也

脈三部大都欲等只如小人細人婦人脈小軟小兒四五歲脈呼吸八至細數者吉反之者則爲逆也

而脈實人苦而脈虛性急而脈緩性緩而脈細人羸而脈大此皆爲逆逆則難治凡婦人脈常欲濡弱順則易治肥人脈沈瘦人脈浮者小毛之間者肺氣所行故言肺部也

持脈輕重大小法第六

脈有輕重何謂也然初持脈如三菽之重與皮毛相得者肺部也菽作皮

如六菽之重與血脈相得者心部也心主肺如三豆之重與肌肉相得者脾部也脾主肉故次心如九菽之重與筋平者肝部也肝主筋又在下故次之在豆之重如十二菽之重與骨髓之

一作鳩尾下五分

按之至骨舉之來疾者腎部也

兩手六脉法讚云肝心出左脾肺出右腎與命門俱出尺部所主五藏六腑陰陽逆順第七

魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左人順男右爲氣口

右大順女關前一分人命之主左爲人迎

神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈諸經損減

各隨其部察按陰陽誰與先後千金云三陽誰先誰後陰三陽病

治官陽病治府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太

陽爲表裏以小腸合爲府合於上焦名曰神庭在龜

00073465

肝部在左手關上是也足厥陰經也與足
裏以膽合爲府合於中焦名曰胞門 少陽作在大倉左
右三寸
腎部在左手關後尺中是也足少陰經也與足太陽
爲表裏以膀胱合爲府合於下焦在關元左
肺部在右手關前寸口是也手太陰經也與手陽明
爲表裏以大腸合爲府合於上焦名呼吸之府在雲門
脾部在右手關上是也足太陰經也與足陽明爲表
裏以胃合爲府合於中焦脾胃之間名曰意舍在章門在季
脇前一寸半
腎部在右手關後尺中是也足少陰經也與足太陽
爲表裏以膀胱合爲府合於下焦在關元右左屬腎

右尺子户名曰三焦

辨藏腑病脉陰陽大法第八

脉何以知藏腑之病也然數者腑也遲者藏也數即有熱遲即生寒諸陽爲熱諸陰爲寒故別之

脉者陽故行遲其脉數藏者陰故病則數陰行疾病則遲

病也

脉來浮大者此爲肺脉也脉來沈滑如石輕手得之腎脉也脉來如弓弦者肝脉也脉來洪去遲心脉也脉來當見而不見爲病有病有深淺但當知如何受邪

辨脉陰陽大法第九

脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脉在中浮者陽也沈者陰也故曰陰陽也

00073465

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也
者肺也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也按之
奕舉指來實者腎也脾者中州故其脈在中
謂也然浮之實大故曰陰盛陽虛陰陽俱盛陽虛何
小浮之實大故曰陰盛陽虛沈之損小沈之實大故曰陰盛陽虛是陰陽虛實之意也
見寸口浮而實大今輕手浮之而實大更損減而小故言陰陽俱動也
言陽虛重手按之而沈更實大故言陰陽俱實也

經言脈有一陰一陽一陰二陽一陰三陽如此言之寸口有六脈俱動
陰一陽二陰一陽三陰如此者非有六脈俱動也謂浮沈長短滑
耶然經言如此者千金翼云遲緩
濇也浮者陽也長者陽也沈者陰也濇者
陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脈來沈而滑

陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脉來沈滑而長也一陰一陽者謂脉來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脉來長而沈濇也一陽一陰者謂脉來浮也各以其經所在名病之逆順也凡脉大爲陽浮爲陽數爲陽動爲陽沈爲陰濇爲陰弱爲陰絃爲陰短爲陰微爲陰陰是爲三陰三陽也陽病見陰脉者順也陰病見陽脉者反也主生瘡陰數加微必惡寒而煩撓不得眠也陰附陽則狂陽附陰則癲得陽則厥無陽則厥無陰則不能呼屬腑得陰屬藏無陽則厥無陰則嘔陽微則發汗陰微則自下陽數口

00073465

陰微則不能吸呼吸不足胃中短氣依此陰陽以察病也

寸口脈浮大而疾者名曰陽中之陽苦煩滿身熱頭痛腹中熱

寸口脈沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉

尺脈沈細者名曰陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉

立陰氣衰小便餘瀝陰干濕癢陽病苦兩脛酸疼不能久

尺脈滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然

尺脈牢而長關上無有此爲陰干陽其人苦兩脛重少腹引睾痛

00073465

少腹引臀痛
寸口脈壯大尺中無有此爲陽干陰其人苦要臀背痛
陰中傷足脛寒夫風傷陽陰寒傷陰陽病順陰病逆
陽陽病易治陰病難治在腸胃之間以藥和之若在
經脉之間鍼灸療病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脉虛有病虛有脉實有病實
有診之虛實脉之虛實者脉來和緩去亦和緩此脉之虛
病之虛實者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者
爲實緩者爲虛急者爲實診之虛實者癢者爲虛痛
者爲實外痛內快爲外實內痛外快爲內實外
虛故曰虛實也
問曰何謂虛實精氣奪則虛何謂

00073465

重實所謂重實者大熱病氣熱脉滿是謂重實
問曰經絡俱實如何何以治之故曰經絡皆實是寸
脉急而尺緩也當俱治之故曰逆始五藏骨肉滑利可以長久
滑則順濇則逆夫虛
從橫逆順伏匿脉第十一
問曰脉有相乘有橫有逆有從仲景從字作縱字何謂也師曰從火行乘木木行
乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘木水行乘火名曰順何謂
也師曰水行乘火金行乘木名曰從火行乘水木行乘金火行乘木名曰逆
陰也脉雖時沈澀而短此陽中伏陰脉居陰部反見陽脉者爲陽乘

00073465

陰也脉離時沈澀而短此陽中伏陰脉君陽
陰脉者爲陰乘陽也脉雖時浮滑而長此爲陰中伏
陽也重陰者癲重陽者狂脫陰者目盲

辨災怪恐怖雜脉第十二

問曰脉有殘賊何謂師曰脉有絃有緊有濇有滑有
浮有沈此六脉爲殘賊能與諸經作病
問曰嘗爲人所難緊脉何所從而來師曰假令亡汗
若吐肺中寒故令緊假令欬者坐飲冷水故令緊假
令下利者以胃中虛冷故令緊也
問曰翕奄沈名曰滑何謂師曰沈爲純陰翕爲正陽
陰陽和合故脉滑也
問曰脉有災怪何謂師曰假令人病脉得太陽脉與
病形證相應因爲作湯比還送湯之時病者因反大

00073465

吐若干痢 仲景病字作利
見此證令反變異故是名爲災怪因問言我前來脉時不
問曰人病恐怖其狀何等類師曰其脉自浮而弱面形
痢苔曰或有先服藥令發作故爲災怪也
其面白脫色
問曰人媿者其脉何類師曰其脉自濇而虛
乍白乍赤
問曰人不飲其脉自濇而虛唇口乾燥也
言遲者風也搖頭坐而下一膝著地欠者無病也脉之因
坐而伏者短氣也行遲者其裏痛也
如懷卵者必心痛師持脉病人欠者必腰痛其裏實護腹
伸者無病也 呻也
假令向壁臥聞師到不驚起而

三 二云反 卷三 二云 脉病 一云 脉之因三上 脉之因三上 脉之因三上

伸者無病也 者病也 假令病人目眄視一云反面仰視者三言三止脉之咽唾此爲詐病假令脉自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈

遲疾短長雜脉法第十三

黃帝問曰余聞胃氣手少陽三焦四時五行脉法夫人言脉有三陰三陽知病存亡脉外以知內尺寸大小願聞之岐伯曰寸口之中外別浮沈前後左右虛實死生之要皆見寸口之中脉從前來者爲實邪從後所不勝來者爲微邪自病一得作者爲正邪急者病正在心藏氣也脉來滑躁者病有熱也

脉來滑者爲病食也脉來滑躁者病有熱也

00073465

脉來澀者爲病寒濕也脉逆順入遲爲内虛外實初持脉來遲去疾此爲出頭也初持之道不與衆謀師曰夫呼者脉之頭也初持脉來疾去遲此爲出疾爲内實外虛也

脉數則在府遲則在藏脉長而弦病在肝扁鵲云病在肝出於肝一作而脉小血少病在心扁鵲云脉大而洪病出於心脉下堅上虛病在脾胃扁鵲云病在脾胃出於脾胃脉滑浮病在肺扁鵲云脉滑而緊病出於肺一作而微濇脉濇者少血多氣脉大者多血少氣脉大而堅者血氣俱實脉小者血氣俱虛又云脉來大而緊者病在内又云洪數滑疾爲熱脉來細而微濇遲緊爲寒脉來細滑疾爲熱濇遲沈細爲寒脉

00073465

盛滿緊者病在外弱而濇謂之久寒病脉滑浮而緊者謂之新病有熱下其人外熱風走刺有飲難治脉沈而緊焦有寒小便數時苦絞痛下利重脉浮緊且滑直者外熱內冷不得頭發熱癰腫脉細小緊寒爲痼痕積重而中散者因寒食成脉洪大緊急病速進在中寒聚腹中刺痛脉沈重而急病速進在外苦頭發熱癰腫脉沈重而直前絶者病血在腸間脉沈重前不至寸口徘徊絶者病在肌肉癥脉氣癥陽在胷中脉右轉出不至寸口者內有(一云病浸淫痛)脉沈重者累累如貫珠不去脉累累中止不至寸口輭者結熱在小腸膜中伏留不去

00073465

脉直前左右彈者病在血脉中脉血也脉
彈者病在筋骨中小後大即胃滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐
小後大即胃滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐
不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦夫脉者
上盛則氣高下盛則氣下盛則氣脹代則氣少大則煩心大則病進
濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危數則煩心氣少大素細作滑
其去如弦絃絶者死短而急者病在上長而緩者病在
下沈而絃急者病在内浮而洪大者病在外脉實者
表沈爲在裏

平人得病所起第十四

00073465

何以知春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋得病無腎脉冬得病無脾脉四季之月得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋得病無腎脉冬得病無脾脉四季之當以秋冬時發得病假令肝病者西行若食雞肉得之以庚辛日也家有腥死女子見之以明要為災不者若感金銀物得之

假令脾病東行若食雉兎肉及諸木果實得之不者當以春時發得病假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以甲乙日也

假令肺病南行若食馬肉及薑鹿肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也

假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當

00073465

以長夏時發得病以戊巳日也

假令得王脉當於縣官家得之

假令得相脉當於嫁娶家得之

假令得胎脉當於產乳家得之

假令得囚脉當於囚徒家得之

假令得休脉其人素有宿病不治自愈

假令得死脉當於死喪家感傷得之

何以知人夏月得病諸陽入陰也

何以知人露卧得病陽中有陰也

有陰脉來疾去疾此相爲水氣之毒浮之無陽微細之不可知也但物得之

何以知人食飲中毒浮之無陽微細之不可知也但物得之

問曰診病將差難已脉第十五

尺大小遲疾浮沈同等雖有寒熱不解者此脉陰陽平復當自愈人亦病其寸尺之脉與人迎及浮沈等者病難已

新安吳勉學校刻宋板

脉經卷第二

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

平三關陰陽二十四氣脉第一

平人迎神門氣口前後脉第二

平三關病候并治宜第三

平三關病脉第四

八脉經爲病不在十二經以繫此卷之末

平三關陰陽二十四氣脉第一

平奇經八脉第二

左手關前寸口陽絶者無小腸脉也苦腹癰小腹中有疝瘕王月本王字作一五即太陵穴即冷上搶心刺手心主經治陰在掌後橫理中

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急痛一作小腸有熱小便赤黃刺手太陽經治陽一作陽者非手少太

00073465

陽在手小指外側本節陷中（即後谿也）

左手關前寸口陰絶者無心脉也苦心下毒痛掌中熱時善嘔口中傷爛剌手太陽經治陽

左手關前寸口陰實者心實也苦心下有水氣憂恚發之剌手心主經治陰

左手關上陽絶者無膽脉也苦膝疼口中苦眯目善畏如見鬼狀多驚少力剌足厥陰經治陰陰在足大指間（即行間也）或剌三毛中

左手關上陽實者膽實也苦腹中實不安身軀習習左手關上陰絶者無肝脉也苦瘇遺溺難言舌下有

指當指次云小指臨泣穴也

第二寸

邪氣善吐刺足少陽經治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足

厥陰經治陰

左手關後尺中陽絶者無膀胱脉也苦逆冷婦人月

使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經

治陰絶者無腎脉也苦足下熱兩髀裏

左手關後尺中陽實者膀胱脉實也苦逆冷脅下有邪

氣相引痛刺足太陽經治陽在足小指外側本節後

陷中即大谿穴也

急精氣竭少勞倦所致刺足太陽經治陽

左手關後尺中陰絶者無腎脉也苦足下熱兩髀裏

左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眺

左手關上陰絶者無肝脉也苦足厥

00073465

疏耳聾悵悵善鳴刺足少陰經治陰

右手關前寸口陽絶者無大腸脉也苦少氣心下有水氣立秋節即效刺手太陰經治陰

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐刺所刺無休息時刺手陽明經治陽

刀所刺無休息時刺手陽明經治陽在手腕中即陽谿穴也

右手關前寸口陰絶者無肺脉也苦短氣欬逆喉中塞噫逆刺手陽明經治陽

右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胷中滿彭彭與肩相引刺手太陰經治陰

右手關上陽絶者無胃脉也苦吞酸頭痛胃中有冷足太陰經治陰在足大指本節後一寸即公孫穴也

刺足陽明經治陽在足跗上陽實者胃實也苦胃中伏伏一作幅幅不思食

物得食不能消刺足陽明經治陽在足上動脉即衝陽穴也

右手關上陽實者胃實也苦腸鳴

右手關上陰絶者無胃脉也苦少氣下利腹滿身重

四肢不欲動善嘔無胃脉也苦少氣下利腹滿身重

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便

難刺足太陰經治陽絶者無子戸脉也苦足逆寒絶産

右手關上陰絶者無子戸脉也苦足逆寒絶産

帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛

刺足太陽經治陽

痛夢入水見鬼善厭寐黒色物來掩人上刺足太陽

右手關後尺中陰絶者無腎脉也苦足逆冷上捨肖

經治陽

00073465

右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰脊痛內寒熱刺足少陰經治陰陰

平人迎神門氣口前後脈第二

心實

左手寸口人迎前脈陰實者手厥陰經也亦病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹刺三里

心虛

左手寸口人迎前脈陰虛者手厥陰經也亦病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒狀恍惚

左手寸口人迎前脈陽實者手太陽經也亦病苦身熱汗出

小腸實

00073465

左手寸口人迎以前脉陽實者手太陽經也病
熱熱來去汗出一作汗不出而煩心中滿身重口中生瘡
左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病
際偏頭痛耳頰痛
心小腸俱實
左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與太陽
經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥
以胃氣不轉水穀實也
心小腸俱虛
左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與太陽
經俱虛也病苦寒少氣洞泄苦寒四肢寒腸澼

肝實

00073465

左手關上脉陰實者是厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自忿忿如怒狀

肝虛

左手關上脉陰虛者足厥陰經也病苦脅下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛

膽實

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛洒洒惡寒脇痛

膽虛

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥寒足指不能搖膝坐不能起僵仆目黃失精眡眡

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也
病苦胃脹嘔逆食不消
肝膽俱虛
左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也
病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚
腎實
左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦膀
胱脹閉少腹與腰脊相引痛
左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦舌
燥咽腫心煩嗌乾肩脇時痛喘欬汗出小腹脹滿腰
背彊急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四
肢黑耳聾聲

00073465

腎虛

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也中悶下重足腫不可以按地

膀胱實

滿腰中痛不可俛仰勞也

膀胱虛

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦遺

中筋急腹中痛引腰脊不可屈伸轉筋惡風偏枯腰

痛外踝後痛

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽

00073465

左手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛引背寒時時少腹滿自反側

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛引背寒時時少腹滿自反側

腎膀胱俱虛

經俱實也病苦脊強反折戴眼氣上搶心者痛不能

大腸實

右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀

肺實

右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也病苦氣不足以息溢溢乾不潮津液

肺虛

00073465

右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腹滿善喘欬面赤身熱喉咽一本作喉中如核狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦脊中喘腸鳴虛渴脣口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂攣捲脣吻不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或

右手關上脈陰虛者是太陰經也病苦泄注腹滿氣
脹滿煩擾不得卧
右手關上脈陰實者是太陰經也病苦足寒脛熱順
逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴
右手關上脈陽實者是陽明經也病苦腹中堅痛而
熱苦金作病汗不出如溫瘧屢
腋下腫痛頭痛
胃虛
脾實
脾虛
胃實

右手關上脉陽虛者是陽明經也病苦歷寒不得卧
惡寒洒洒目急腹中痛虛鳴外臺作耳虛鳴時寒時熱嗌口
乾面目浮腫

脾胃俱實

右手關上脉陰陽俱實者是太陰與陽明經俱實也
病苦腹脹腹堅搶脅下痛胃氣不轉大便難時反泄
利腹中痛上衝肺肝動五藏立喘鳴多驚身熱汗不
出喉痺痺精少

脾胃俱虛

右手關上脉陰陽俱虛者是太陰與陽明經俱虛也
病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已

腎實

右手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦腰
身熱憑憑痛脊脇相引痛足逆熱煩
腎實
右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦是
可以按地少腹脹滿上搶胷脅痛引臍下輕行不
脛小弱惡風寒脉代絶時不至足寒上重下
右手尺
腎虛
右手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦胞
脹不得小便頭眩痛煩滿脊背足痛
膀胱實
胞不得小便頭眩痛煩滿脊背足
膀胱虛
右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌
肉振動脚中筋急宜聾忽忽不聞惡風颼颼作聲

右手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽俱虛

經俱實也病苦癲疾頭重與目相引痛厥欲起走反眼大風多汗

腎膀胱俱虛

右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽俱虛也病苦心痛若下重不自收篡反出時時苦洞泄寒中泄腎心痛俱痛

腎膀胱俱實

經俱實也病苦癲疾頭重與目相引痛厥欲起走反眼大風多汗

一說云腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱脫右腎合三焦

寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風

平三關病候并治宜第三

脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風

池風府

汗向火炙身摩治風膏覆令汗出

針眉衝顳顬摩治傷寒膏

寸口脉緊若頭痛骨肉疼是傷寒宜服麻黄湯發汗

汗出脉微若寒爲血竭宜服五味子湯摩茱萸膏令

寸口脉數即爲吐以有熱在胃管熏肖中宜服藥吐

之及針胃管服除熱湯若是傷寒七八日至十日熱

在中煩滿渴者宜服知毋湯

寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥

薄熨之摩以風膏灸諸治風穴

寸口脉滑陽實肖中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽

巨闕漏之

寸口脉絃心下愊幅微頭痛
圓針期門瀉之
寸口脉弱陽氣虛自汗出而
散適飲食消息勿極勞針胃管補之
寸口脉澁是胃氣不足宜服
食針三里補之 三作聖一胃管
寸口脉乾吐血微乾者劒血
皮湯黃土湯灸臍中
寸口脉伏肖中逆氣噎塞不通是胃中冷氣上衝心
肖宜服前胡湯大三建圓針巨闕上管灸臍中
寸口脉沈肖中引痛肖中有水氣宜服澤漆湯針
巨闕瀉之

寸口脉緊陽氣損病宜服乾地黃湯

寸口脉濡陽氣弱自汗出是虛損病宜服桂蠣散并粉甘太衝補之

署預圓内補散牡蠣散并粉甘太衝補之

寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸氷宜服附子湯

生薑湯茱萸圓調和飲食以煖之

寸口脉實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛即生寒在脾

胃食不消化有熱即宜服竹葉湯葛根湯有寒宜服

茱萸圓生薑湯

寸口脉細發熱吸吐宜服黄芩湯白薇圓赤可紫菀

橘皮桔梗湯炙中府

寸口脉洪大胷脇滿宜服生薑湯白薇圓赤可紫菀

湯下之針上管期門章門

寸口脉洪大胷脇滿宜服生薑湯白薇圓赤可紫菀

右上部寸口十七條

00073465

關脉浮腹滿不欲食浮爲虛滿宜服平胃圓茯苓湯

生薑煎前胡湯針胃管先瀉後補之

關脉緊心下苦滿急痛脉緊者爲實宜服茱萸當歸湯又大黃湯兩治之良針巳關下管瀉之

當歸湯又加大黃二兩佳

千金云服茱萸

關脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子針巳關下管瀉之

圓針巨闕補之

關脉數胃中有客熱宜服知母圓除熱湯針且關上管瀉之

關脉緩其人不欲食此胃氣不調脾氣不足宜服平胃圓以氣滿故不欲食食即胃圓補脾湯針章門補之

胃圓補脾湯針章門補之

關脉滑胃中有熱滑爲熱實以氣滿故不欲食食即

00073465

吐法宜服紫菀湯下之大平胃散合四
順飲食自調

脈朴消麻黃湯平胃圓

關脉絃胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故爾宜服茱萸湯温調飲食針胃管補之

關脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱爲虛熱作病其說云有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針胃管補之

關脉濇血氣逆冷脉濇爲血虛以中焦有微熱宜服乾地黃湯内補散針足太衝上補之

關脉乳大便去血數斗者以膈輸傷故也宜服生地黃并生竹皮湯灸膈輸若重下去血者針關元甚者

關脉滑胃中有熱滑爲熱實以氣滿故不欲食食即吐宜服紫菀湯下之大平胃散合四順飲食自調

脈朴消麻黃湯平胃圓針胃管瀉之 千金云宜

00073465

關脉伏中焦有水氣溏泄宜服水銀圓針關元利小便溏泄便止

關脉沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇茯苓圓附子湯針胃管補之

關脉濡苦虛泠氣脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女婁針關元補之

關脉遲胃中寒塞盛熱即腹滿響響宜服桂枝圓茱萸湯針胃管補之

關脉牢脾胃氣實痛宜服梔子湯茱萸烏頭圓針胃管瀉之

關脉細脾胃虛腹滿宜服生薑茱萸蜀椒湯白薇圓針灸三管

00073465

尺脉浮下熱風小便難宜服麻黄湯滑石散針橫骨瀉之

尺脉緊臍下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補之

尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯

順曳有湯 四 針氣海

尺脉數惡寒臍下熱痛小便赤黄宜服雞子湯白魚

散針橫骨瀉之

尺脉緩脚弱下腫小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥

散針橫骨瀉之

00073465

尺脉滑血氣實婦人經脉不利男子衄血宜
煎大黃湯下去經血針關元瀉之
尺脉絃小腹疼小便及脚中拘急宜服建中湯
湯針氣海瀉之
尺脉弱陽氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃湯
芩湯針關元補之
尺脉濇足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足大
衝補之
尺脉乾下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯灸
尺脉伏小腹痛癥疝水穀不化宜服太平胃圓桔梗
圓針關元補之 桔梗圓一結腸圓

00073465

八脉沈腰背痛宜服腎氣圓針京門補之

尺脉濡苦小便難 千金云肺虛下焦風寒宜服瞿麥湯白薇散針關元補之

尺脉遲下焦有寒宜服桂枝當歸湯加大黃一兩

尺脉實小腹痛小便不禁宜服桂枝當歸湯加大黃一兩以利大便針關元補之止小便

尺脉牢腹滿陰中急宜服葶藶子茱萸圓針丹田關元中極

右下部尺脉十六條

平奇經八脉病第四

脉有奇經八脉者何謂也然有陽維陰維有陽蹻陰蹻有衝有督有任有帶之脉是凡此八脉者皆不拘於

00073465

經故曰奇經八脉也經有十五凡二十七
氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖設溝渠溢滿霖霪沛妄行當
利水道以備不虞天雨降下溝渠溢滿諸經不能復
此之時聖人不能復圖也此絡脉流溢諸經不能復
拘也

奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何繫也然陽
維者起於諸陽之會陰維者起於諸陰之交陽維陰
維者維絡于身溢畜不能環流灌諸經者也陽蹻
者起於跟中循外踝而上行入風池陰蹻者亦起於
跟中循內踝而上行至咽喉交貫衝脉衝脉者起於
闌元循腹裏直上至咽喉中 並一云衝脉者起於氣衝
而散也 督脉者起於下極之輸並於脊裏循背上至陽明之經絡上行

風府衝脉者陰脉之海也督脉者起於胞門子戶中至兩
者起於胞門子戶中至兩夾臍上行至脅中一云於中極之下以
上毛際循腹裏上關元至喉咽帶脉者起於季脇季脇
此八者皆不繫於十二經故曰奇經八脉者也奇經
之爲病何如然陽維維於陰陽陰維維於陰陽陰陽不能
相維悵然失志容容難經作溶溶難經作悵然者其
病苦心痛陽維爲病苦寒陰維爲病苦熱陰維維爲
脉緩緩即令身不能自收持也
病逆氣而裏急陽蹻爲病陰蹻爲病苦結男子
陽緩而陽急陰蹻陰急陰蹻脉從內踝上行至咽喉陽蹻脉從外踝上行至目
當從外踝以上病即其脉急其當內踝以上急即其脉緩
彊而厥督脉在背脉急故令彊也衝之爲病其
脉在內踝以上病即其脉急其當內踝以上急即其脉緩
病逆氣而裏急督脉從關元至咽故令逆氣而裏急
任之爲病其內其

爲七疝女子爲痕聚任脉起於胞門子戶故
病苦腹滿腰容容其病結爲七疝痕聚
則其脉緩故令腰容容也難經作容溶
診得陽維脉浮者經入脉之會陽盛實苦眉息
寒

診得陰維脉沈大而實者苦胷中痛脅下支滿心痛
診得陰維如貫珠者男子兩乳脅實腰中痛女子陰中
痛如有瘡狀
診得帶脉左右違於臍腹腰脊痛衝陰股也
兩手脉浮之俱有陰陰陽陽皆實盛者此
爲衝督之脉也衝督之脉者十二經之道路也衝督
用事則十二經不復朝於寸口其人皆苦恍惚狂癡

不者必當由緣有兩心也兩手陽浮而

不者必當由豫有兩心也兩手陽脈浮而不可知俱有陰脈亦復細綿此爲陰陽蹻病緩也此家曾有病鬼魅風死苦少陽陽蹻之脈尺寸俱浮直上直下此爲督脈腰背強痛不得俛仰大人癲病小人風癇疾

脈來中央浮直上直下痛者督脈也動苦腰背膝寒天頂上三圓正當頂上

人癲小兒癇也多頂上三圓正當頂上

天寸脈俱牢一作苦直上直下此爲衝脈也動苦少腹痛上搶心有痕血絶孕遺矢溺脊支滿煩也橫寸口邊丸丸脈來中央堅實徑至關者衝脈也動苦少腹中有寒疝此爲任脈苦腹中有氣如指上搶心不得俛仰拘急

00073465

脉来緊細實長至關者任脉也動苦少腹繞臍下引横骨陰中切痛取濟下三寸

明新安吳勉學翻刻宋板

脈經卷第二

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

肝脈形象木 肝於五行象木

肝大也其相冬三月與水王冬水相

肝脈狀

肝脈來濇而長如循刀刃責責然如按琴瑟弦

肝脈病

肝病頭目四肢滿悒悒太息胸脇痛轉筋筋急目不明

肝脈死

肝脈來如鉤如物之觸手新張甚者死

肝脈生

肝脈來濡而弱如蛇之行者生

肝脈王

肝王四季夏六月其相冬三月與足少陽爲表裏

肝脈時

春三月廢夏三月微陰

肝脈法

肝脈弦

肝脈主病

肝主病善怒善驚善恐善忘

肝脈與證候相應

肝病胸滿口苦舌乾善怒吐逆食則嘔厥頭痛面青目赤

肝脈與證候不相應

肝病喜悲喜哭喜笑不止

肝脈與時節相應

春脈弦

肝脈與時節不相應

春脈浮大而散

肝脈與證候相應

肝病胸滿口苦舌乾善怒吐逆食則嘔厥頭痛面青目赤

肝脈與證候不相應

肝病喜悲喜哭喜笑不止

肝脈與時節相應

春脈弦

肝脈與時節不相應

春脈浮大而散

肝脈與足少陽爲表裏

肝膽合爲府膽淨之府

肝脈與證候相應

其經足厥陰少陽膽脈也藏陰而府陽故爲表裏

肝脈與證候不相應

其脈絃肝脈弦之

肝脈與時節相應

春三月廢夏三月微陰

肝脈與時節不相應

春三月甲乙

00073465

王時平旦日出並木也其困日戌巳困時食時日昳並金也其神魂肝藏者所魂其主肝之所候目肝氣並出也其味酸其宜苦苦火味也其聲呼其色青其臭臊肝令其臭臊所膻俞在脊第十推募在日月肝募在期門期門在第十四肋端下一寸五分其液泣泣出也其變握其榮爭其病語其味其類草木其畏風其應春其音角其數八其穀麥其果李其菜韭其蟲毛其時春其日甲乙其方東其氣來耎其脈弦肝氣養於筋故其脈弦弱寬而虛春少陽氣温和萬物生長故其脈弱寬而虛耎馬故脈爲弦筋肝氣養於筋故其脈弦肝者東方木與膻爲藏府相合膻者木也膻者木之數也少陽膻中之微少陽之氣温和萬物始生其氣來耎耎者弱也故言少陽之氣温和萬物始生其氣來耎耎者弱也故言少陽之氣温和萬物始生其氣來耎耎者弱也故言

黃帝問曰春脉如弦何如而弦岐伯曰春
方木也萬物之所以始生也萬物之所以
滑端直以長故曰弦反此者病黃帝曰何
病岐伯曰其氣來實而強此謂太過病在
外其氣來不及此謂不及病在中黃帝曰
善

右四時經

帝曰春脉如弦何如而弦何如而病何如
病皆何如岐伯曰太過則令人善忘忽忽
而微節至此謂不及病在中黃帝曰春脉
太過不及其病皆何如岐伯曰太過則令
人善忘忽忽眩冒而癲疾不及則令人胸
痛引背下則兩脇滿黃

迎隨者利故名曰通（通少陽始尚未
上不可下下之而泄利也）春以胃氣為本不
才禁故言寬（寬虛而通利也）而生胃亦養五藏故肝
王萬物稟土也不可犯者胃氣為本也）

右四時經

00073465

肝脈來濡弱招招如揭竿末梢曰平 巢源云揭竿末梢之絃如按琴瑟

揭長竿曰平 按琴瑟

春以胃氣爲本肝脈來急而益勁如新張弓弦曰肝平 巢源云肝脈來盈實而滑如循長竿

春以胃氣爲本肝脈至中外急而緊如循刀刃責然 巢源云責然猶漬漬然

真肝病肝脈來急而緊如新張弓弦曰肝平 巢源云肝脈來急而緊如新張弓弦

琵絃急多胃少曰肝平 巢源云肝平絃多胃少

春胃微絃曰平絃多胃少曰肝也 巢源云肝也絃多胃少

胃而毛曰秋病毛折乃死

肝藏血血舍魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精

肝藏血血舍魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不敢正當人 不精其精不敢正當人

不敢舉毛悴色天死干秋

脇骨不舉毛悴色天死干秋

春肝木王其脈絃細而長名曰平脈也反得浮濇而短 千金云微澁而短

春肝木王其脈絃細而長名曰平脈也反得浮濇而短 千金云微澁而短是陰縮而筋攣兩肺之乘肝金之刻木爲賊邪大逆 一作陰縮

十死不治（一本云日數至二十三忌庚辛）反得洪大而散者（千金云浮大而洪）是心之乘肝子之扶母為實邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘肝母之歸子為虛邪雖病即差肝脉來濯濯如倚竿如琴瑟之絃再至曰離經病四至脫精五至死氣在脅下若覆杯緩甚為水瘕痺大甚為內癰善嘔微急為肥氣在脅下若覆杯緩甚為水瘕痺大甚為內癰善嘔微緩為水瘕痺大為腹小甚為多飲微小為消癉濇甚為淋溺濇甚為淡飲微濇為痺攣筋

足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本故脉弗營

00073465

則筋縮急筋縮急則引舌與卵故脣青舌卷卵縮則
筋先死庚篤辛死金勝木也
肝死藏浮之脉弱按之中如索不來或曲如蛇行者死
右素問鍼經張仲景不載

心小腸部第二

心象火與小腸合爲府小腸爲盛之府受也其經手少陰
與手太陽爲表裏手太陽小腸脉也其脉洪心大脉形也其相春
三月木王火相王夏三月廢季夏六月因秋三月金王火囚王死死
冬三月水王火死其王時禹中日中其困日庚
辛困時晡晡時日入其死日壬癸亥夜半其藏
神心之所藏者神也其主言由心出其色赤其臭焦其液汗其味苦其宜甘
故主言甘脾

00073455

味也鹹歸腎也其惡鹹鹹味在心下一寸小腸俞在背第十八椎募在臍旁

右新撰

心者南方火曲故名鉤心主血其色赤火行王之時太陽用事故草茂盛枝葉布舒皆下垂心之鉤也心脈洪大而長洪則榮衛氣實實則氣無從出故以發汗故名曰長洪相得即引水漿既灌經絡津液皮膚以肌膚以枝葉太陽洪大皆是

脈洪者榮衛氣實實則榮者血也萌當為明字之誤耳血大也榮明衛實當滇發

腠理密密則

勤津通其液也長洪相得即引水漿既灌經絡津液皮膚熱

陽氣盛故其人引水漿潤灌木須雨澤以長夏人春木生名曰陽春始陽夏火為其母陽少陽到夏

毋軀幸得戊已用牢根株太陽氣上出

洪盛名曰太土為火子火

汗見於頭五月枯蘇胞中空虛腎反下之此爲重虛也月當爲內蘇當爲乾枯燥也由來遠矣遂以傳焉人頭者以實其表是以五內漿上出爲汗汗先從頭流於身軀以實其表乾枯燥則胞中空虛津液少也胞者膀胱脫津液之府也愚醫不猜故下之令重虛也反

脈浮有表無裏陽無所依使其汗而反下之損於陰氣陽爲表陰爲裏表陰爲裏經言陽爲陰之使陰爲陽守陰故表陰爲裏也治之不但傷其毋言下之故陰陽離別不能復相朝使陽盛脈浮宜發汗推而行脈浮以虛須而行脈浮似月內字誤耳內字似月夏時飲水中肝

右四時經

黃帝問曰夏脈如鉤何如而鉤岐伯曰夏脈心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反此者病黃帝曰何如而反岐伯曰其氣來盛去亦盛此謂太過病在中黃帝曰夏脈太過與不及其病皆何如岐伯

太過則令人煩而盡通爲熱浮緊不及則令人煩

00073465

曰太過則令人身熱而膚痛爲浸淫不及則令人煩心上見欬唾下爲氣泄帝曰善

心脉來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣爲本

心脉來喘喘甲乙作累累連屬其中微曲曰心病心脉來前曲後居如操帶鉤曰心死

真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然其色赤黑索澤毛折乃死

夏胃微鈎鈎曰平鈎多胃少曰心病但鈎無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病

心藏脉脉舍神心傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色夭死于冬

夏心火王其脉洪千金作浮大而散名曰平脉反得

00073465

沈濡而滑者是腎之乘心水之
死不治一本云日月年數至二忌壬癸反得大而緩者是脾之乘心
之乘心母之肺之乘心金之陵火爲賊邪大逆十
濇而短者是肺之乘心金之陵火爲微邪雖病即差
心脉來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病
四至脫精五至死六至命盡手少陰脉
心脉急甚爲癡癎微急爲心痛引背食不下緩甚爲
狂笑微緩爲伏梁在心下上下行時唾血大甚爲喉
癉滑甚爲善渴微滑爲心疝引背善淚出小甚爲微小爲消
微濇爲血溢維厥耳鳴巔疾手少陰氣絶則脉不通

00073465

少陰者心脉也心主不流則髮色不澤故其面黑如漆柴者血先死壬篤
心死藏浮之脉實如豆麻擊手按之益躁疾者死
癸死水勝火也

右素問鍼經張仲景

脾胃部第三

脾象土與胃合爲表裏陽明胃脉其脉緩脾之脉也其經足太陰脾之脉也與
足陽明爲表裏胃爲水穀之府
火王土相王季夏六月廢秋三月囚冬三月死木相夏三月並木時也其神意其主味其
王日戊巳王時食時日昳困日壬癸困時夜半人定夜半平旦日出其
養肉其候口其聲歌其色黃其臭香其液涎其味甘

00073465

脾者土也敦而福敦者厚也萬物衆色不同
故名曰得福者廣其德爲萬物懸根於
息皆蒙土恩懸根於蔓其葉在巔蜎蜚蠕動
咬蚊蠉喘
故令太陰脈緩而遲尺寸不同
時而以各行皆不羣
脾主調和五味
其宜辛其惡酸脾俞在背第十一椎募在太倉
右新撰
黃微弱水穀不化脾爲土行於李夏土性敦厚
萬物當此之時卓木備具枝葉茂盛種類衆多
或青或赤白黑色不同矣
故名曰得福者廣其德爲萬物衆色不同脾土
生養萬物當此之時脾則同稟諸藏故脾主水
穀其氣血
胃者尺遲也
寸緩也
酸鹹苦辛大一作太
沙一作涉
文作妙
而生五行其
胃俞在背第十二椎募在章門季肋端是
其

00073465

行隨其四支使其氣周匝榮也諸藏府以養皮毛皆不羣行至一處也故言以禀四藏受味於肌肉之中五行人身躰乃復各

温土熱則涼冬陽氣在下土中清涼脾氣亦然

名之曰金懷挾抱之不離其身金乃畏火恐熱來熏

遂棄其母逃歸水中水自金子而藏火神閉門塞戸

内外不通此謂冬時也陽火故在中爲火氣行金性畏火故恐熏之金歸水中而避

土亡其子其氣衰微水爲洋溢浸漬爲池

皮膚面目浮腫歸於四肢此土爲脾之衰土弱而水強故水得陵之而行

愚醫見水直往下之虚脾空胃水遂居之肺爲

喘浮脾胃已病直扶養其氣水道通利愚醫不曉而遂更陵之上侵腎中肺

得水而浮故言喘浮

肝反畏肺故下沈没肺金肝木比爲相刻肝

必復刻脾脾土之邪乃復各

四藏之珠

00073465

故畏之沈沒於下下有荆棘恐傷其身避在一邊以爲水流之路也土本刻木之頻脾爲土畏木是以避在下一邊避木也木今沒在下水而今微弱故木得流行又心衰則火不能生脾土脾爲荆棘

黃帝曰四時之序逆順之變異也然脾脉獨何主歧伯曰脾者土也孤藏以灌四傍者也曰然則脾善惡可得見乎曰善者不可得見惡者可見曰惡者何如曰脾者土也孤藏以灌四傍者也曰然則脾善惡可得見乎曰善者不可得見惡者可見曰惡者何如曰其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不舉其不及則令人九竅壅塞不通名曰重強

右四時經

脾脉來而和柔相離如雞足之遠如鳥之喙如屋之漏如水之流名曰平長夏以胃氣為本脾脉來實而盈數如雞舉足曰脾病作色青黃不澤毛折乃死

脾脉來堅而搏如循長竿曰脾病脾脉來緩而大如水之流如雨之注如人之自安曰脾病脾脉來懸絕如屋之漏如水之下如人之將死曰脾病脾脉來緩而小如魚之遊在水中若有若無曰脾病脾脉來緩而細如蛛絲者其至也微曰脾病脾脉來濡弱而代曰脾病但代無胃曰

00073465

死濡弱有石曰冬病石甚曰今病
脾藏榮榮舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢
不舉毛悴色夭死于春
六月季夏建未之間土之位脾王之時其脉大
阿阿而緩名曰平脉反得絃緜而長者是肝之乘脾
木之刻土爲賊邪大逆十死不治反得浮而短者是肺之乘脾子之扶母爲實邪雖病自愈反
得洪大而金作浮是心之乘脾母之歸子爲虛邪雖病易治反得沈濡而滑者腎之千金作微
土爲微邪雖病即差
脾脉萇萇而弱千金萇萇作長長來踈去數再至曰平三至
曰離經病四至脫精五至死六至命盡足太陰脉也

脾脉急甚爲癇中滿食飲入而還出後
沃沫緩甚爲痿厥微緩爲風痿四肢不用
無病大甚爲擊仆微大爲痞氣裏大膿血在腸胃之
外小甚爲寒熱微小爲消癉滑甚爲顛微滑爲蟲
毒蚘腸鳴熱濇甚爲腸顛微濇爲內潰多下膿血也
足太陰氣絕則脉不營其口唇
脉不營則肌肉濡肌肉濡則唇口
脣反者肉先死甲篤乙死木勝土也
脾死藏浮之中如覆杯按之
搖者死狀如一云熱熱
炙肉
堅作

肺大腸部第四

右素問鍼經張仲景

00073465

肺象金與大腸合爲府大腸導之爲傳道也其經手太陰肺之脈也其脈浮大形如毛浮肺脈也手太陰肺與手陽明爲表裏手陽明大腸脈也其王夏十八日金相火死王土其王日庚辛王時晡時日入其氣屬金其味辛其宜鹹其惡苦肺俞在背第十三椎傍各一寸半大腸俞在中府下三寸旁開各一寸半

相季夏六月王土其王日戊己王時日中其氣屬土其味甘其宜酸其惡辛脾俞在背第十一椎傍各一寸半

月死夏三月廢冬三月囚春三月休其王日甲乙困時平旦日出其氣屬木其味酸其宜甘其惡咸肝俞在背第九椎傍各一寸半

其臭腥其液涕其聲哭其養皮毛其候皺其色白

三椎 第三椎也

六椎募在天樞 俠臍傍各二寸

募在中府 下三寸旁開各一寸半

右新撰

肺者西方金萬物之所終 金性剛故王西方萬物是以皆終於秋也

宿葉落柯萎枝條其杭然獨在其脈爲微浮毛衛 割斷萬

00073465

氣遲蕤蕤名雀落但有枝條札然獨在其間微如毛也**榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛**脈遲榮爲陰在陽位故一呼應數而在上也**藏其氣反遲是肺脈數散如毛以**

邪所中陰陽交氣感激故爲風寒不易到不比時定中**則緊捲則惡寒緊則爲懍懍相薄故名曰瘧弱出**捲者其人拘捲也緊者脈緊也此寒之時脈緊其人則寒**則發熱浮乃來**言瘧發皆隨弱者寒止而脈更微浮浮止則脈弱則其人發熱也**發**中風邪之時也**藏有遠近脈有遲疾周有度數**藏謂呼則其氣出吸則氣入是爲遠近也脾肺腎也心肺近呼爲陽其脈浮腎肝在隔上疾腎肝遲度數各二**行有漏刻**藏謂十五度爲一周以應漏下百刻也**遲在上傷毛采數在下傷下焦中**

陽當陷而不陷陰當昇而不昇爲脈遲榮爲陰在陽位故一呼應數而在上也**藏其氣反遲是肺脈數散如毛以**

榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛落之貌也言草木宿葉得秋節此時陽氣則遲落之條札然獨在

00073465

焦有惡則見有善則匿秋則陽氣在上隨節變故言傷下數當數遲陰氣之也毛采也人之皮毛肺氣所行下也其脈應遲今皮毛數故言傷下焦在上膈下焦在中焦脾也其脈不見衰乃見惡則見也陽氣下陷陰氣則温言陽氣之時脈常自節人血脈和平一時可長留竟一時代各順交養脈諸陽反在下陰反在顛故名曰長而且留

右四時經

黃帝問曰秋脈如浮何如而浮反此者病黃帝曰何如岐伯對曰秋脈肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣輕虛而浮其氣來急去散故曰浮反此者病黃帝曰何如岐伯曰其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中黃帝曰秋脈太過與不及其病何如岐伯曰太過則令人氣逆而背

00073465

瘖温温（内經作慍温温）然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

肺脈來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣爲本（春平脈）肺脈來不上不下如循雞羽曰肺病（巢源不字）肺脈來如物之浮如風吹毛曰肺死（難經云厭厭聶聶如循榆莢曰平脈蓋按之益大曰秋平脈）

肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色天死千金浮而微（千金作浮）濇而短曰平脈反得洪大而散者（千金大而洪作浮）

00073465

是心之乘肺火之刻金爲賊邪大逆十死不治
月年數至四忌丙丁反得沈濡而滑者是腎之乘肺子之扶母
爲實邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘肺母之
歸子爲虛邪雖病易治反得絃細而長者是肝之乘
肺木之陵金爲微邪雖病即差
風吹鳥背上毛再至曰平三至曰離經病四至脫精
五至死六至命盡手太陰脉也
肺脉急甚爲癲疾微急爲肺寒熱怠墮欬唾血引腰
背肩胛苦鼠息肉不可止大甚爲陽厥肝微緩爲痿偏風
胛背起腰內小甚爲消癉滑甚爲肺癉引漏風作
上氣微滑爲上下出血濇甚爲嘔血微濇爲鼠瘻在

00073465

頸支掖之間下不勝其土其能喜酸
手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣絕則皮毛焦則津液去津液去則皮節傷
弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷 皮節傷者則爪枯毛折者則氣絕 爪一作瓜 皮字一作毛 氣字一作毛
皮節傷者則爪枯毛折者則氣絕
先死丙篤丁死火勝其土其能喜酸
肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死

右素問金匱玉版論第四

腎象木與膀胱爲府 膀胱液之府 府一作腑
腎脈沈 沈一作大 腎脈大而沈形肥也
其經足少陰 足一作少 少陰腎脉也
其相 秋金王水相

右素問陰陽類論第五

丁困時禺中日中其死日戌巳時食時昧其神志腎之所藏者志也其主黑其臭腐其液唾其味鹹其宜酸其惡甘腎俞在第十四椎募在京門膀胱俞在第十九椎募在中極下一寸在廉下五寸前脩者也

右新撰

腎者北方水萬物之所藏之也萬物春生夏長秋收冬藏陰陽氣上升陽氣中出陰氣上昇化爲霜雪霜猛獸伏蟄蟲蟄藏蟲蟄藏陽氣下降於七中百蟲伏蟄不言冬則北方用事在四藏之後冬則北方用事在四藏之下故王三時

（尤瀛會注徧集不可不刊之書）

00073465

沈爲陰在裏不可發汗發則譫
故冬伏沈温養於藏亦此爲
其汗此爲逆治病逆則裏實而表虚
非其法也猶
土兄於冰霜必
逆治者死此之
謂也死不疑
陰氣下下之者傷脾土弱即水氣妄行
也下之既損於
水而今反傷之
故令水得盈
溢而妄行以防
陽氣而脾胃復傷土
陽氣在下
諸藏慎不可
魚出水蛾入湯
水蛾之中立死
殺人如魚出
陽氣也重
陽位也
重客在裏
重客者猶
貌重發其汗
當所故言客
從外入與
熱逆也氣
息喘
無持客熱令口爛瘡
無以湯者
陽遂厥陰不往從
朴須而行發其
厥者逆也謂陽
氣逆而不復
陰脉且解血散不通正
陰脉解散
血不得通
陽氣
陽氣在下
温養也
其脉沉

00073465

陽錯逆可不慎也客熱狂入內爲結胃陰陽錯亂外氣遂弱清溲痢通脾主水穀其氣留結胃中不息清者厠也

反清溲者是謂下痢至厠也

右四時經

黃帝問曰冬脉如營何如而營冬脉如弦伯對曰冬脉如弦如引葛帝曰何以合藏故其氣來沈以搏甲乙作濡比方水也萬物之所以合藏故其氣來沈以搏黃帝曰何如而營岐伯曰故曰營反此者病在外其氣過病在外其氣來過病在中黃帝曰冬脉太過與不及奈何岐伯曰太過則令人解㑊脉來喘喘連連如鉤按之而堅曰腎平冬以胃氣爲本病在中黃帝曰冬脉太過與不及奈何岐伯曰太過則令人解㑊脉來喘喘連連如鉤按之而堅曰腎平冬以胃氣爲本病在中黃帝曰冬脉太過與不及奈何岐伯曰太過則令人解㑊脉來喘喘連連如鉤按之而堅曰腎平冬以胃氣爲本病在中黃帝曰冬脉太過與不及奈何岐伯曰太過則令人解㑊脉來喘喘連連如鉤按之而堅曰腎平冬以胃氣爲本病在中黃帝曰冬脉太過與不及奈何岐伯曰太過則令人解㑊脉來喘喘連連如鉤按之而堅曰腎平冬以胃氣爲本病在中黃帝曰冬脉太過與不及奈何岐伯曰太過則令人解㑊脉來喘喘連連如鉤按之而堅曰腎平冬以胃氣爲本病在中黃帝曰冬脉太過與不及奈何岐伯曰太過則令人解㑊脉來喘喘連連如鉤按之而堅曰腎平冬以胃氣

為本腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎
奪索辟辟如彈石辟辟然色黃黑不澤
真腎脉至搏而絕如以指彈石辟辟然色黃黑不澤
毛折乃死

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石
而有鉤曰夏病鉤甚曰今病
凡人以水穀爲本故人絕水穀則死脉無胃氣亦至
所謂無胃氣者但得真藏脉不得胃氣也所謂脉弱
腎藏精精舍志志傷則善忘其
前言腰脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色夭死于季夏
冬腎水王其脉沈濡而滑曰平脉反得大而緩者是

00073465

脾之乘腎土之刻水爲賊邪大逆十死不治

數至一息或七八至 反得弦細而長者是肝之乘腎子之扶母爲實邪雖疾自愈反得浮千金作微濇而短者是肺之乘腎子之歸子爲虛邪雖病易治反得洪大而散者是腎火之陵水爲微邪雖病即差腎脉洪大而是心之乘腎土之侮水爲賊邪大逆十死不治

沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足少陰脉也

腎脉急甚爲骨痿癲疾微急爲奔豚沉厥奪精

得前後緩甚爲洞下洞下者食不化入咽還出大甚爲折脊微緩爲洞下洞下者水起臍下以至小腹腫垂垂然上至胃管死不治小甚爲消癉滑甚爲骨痿坐不能起目無所見視大癉微濇爲骨痿坐不能起目無所見視

00073465

脉經卷第三

見黑花漘甚爲大癰微漘爲不月水沈痔者也故骨不濡則肉不能著骨骨枯少陰者冬脉也骨肉不相親則肉濡而却肉濡而却故齒長而垢澤者骨先死戊篤已死土勝水也腎死藏浮之堅按之亂如轉圓盆下入尺中者死

脉經 卷三 三

自然無事而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺

禍兮福之所倚福兮禍之所伏孰知其極其無正正復爲奇善復爲妖人之迷其日固久是以聖人方而不割廉而不劌直而不肆光而不耀

治人事天莫若嗇夫唯嗇是謂早服早服是謂重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固柢長生久視之道

治大國若烹小鮮以道莅天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸焉

00073465

脉經卷第四

朝散奏奉光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

辨三部九候脉第二

平雜病脉第二

診五藏六腑氣絶證候第三

診四時相反脉第四

診損至脉第五

診脉動止投數疎數死期年月第六

診百病死生決第七

診虛實決死生第八

辨三部九候脉證第一

經言所謂三部九候者每部中有天地

00073465

人也上部主候從肩以上至頭中部主候從胸以下至足浮洗牢結遲滑濇各自異名分理察之勿怠觀變所以別三部九候知病之所起審而明之針灸亦然也故先候脉寸中一寸中於九作浮在皮膚沈細在裏昭昭天道可得長久上部之候牢結沈滑有積氣在膀胱微細而弱卽引裏急頭痛欬嗽逆氣上下心膈上有熱者口乾渴燥病從寸口邪入上者名曰解脉來至狀如琴絃苦少腹痛女子經月不利孔竅生瘡男子病痔左右脇下有瘡上部不通者苦少腹痛腸鳴寸口虛弱者傷氣氣不足大如桃李實苦渾也寸口直上者逆虛也如浮虛者泄利也中部脉結者腹中積聚若在

00073465

膀胱兩脅下有熱脉浮而大風從胃管入水脹乾嘔心下澹澹如有
即心痛胃脹支滿膈上積脅橫出上者脅氣在膀胱病即著右橫關入
膈中不通喉中咽難刺關元入少陰下部脉者其脉
來至浮大者脾也與風集合時上頭痛引腰背小滑
者厥也足下熱煩滿逆上搶心上至喉中狀如惡肉
脾傷也病少腹下在膝諸骨節間寒清不可屈伸脉
急如絃者筋急足攣結者四肢重從尺邪入陽明者
寒熱也大風邪入少陰女子漏白下赤男子溺血陰
人有三百六十目三部者寸關尺也尺
萎不起引少腹痛

00073465

脈爲陰陰脈常沈而遲寸關爲陽陽脈俱浮而
出爲動入爲息故陽脈六息七息十五投此其常也二十八脈相逐上下一脈
七息十三投陰脈
知疾所苦尺勝治上寸勝治下寸尺俱平治中央臍
以上陽也法於天臍以下陰也法於地臍爲中陽
爲天足爲地有表無裏邪之所止得鬼病何謂表裏
寸尺爲表關爲裏兩頭有脈關中絕不至也尺脈上
不至關爲陰絕寸脈下不至關爲陽絕陰絕而陽微
死不治三部脈或至或不至冷氣在胃中故令
通也上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部
無脈下部有脈雖困無所苦所以然者譬如人有
尺樹之有根雖枝葉枯凋根本將自生木有根
自有氣故知不死也寸口脈平而死者可也然
諸十

白有氣故知不死也寸口脈平而死者何也
二經脈者皆係於生氣之原所謂生氣
十二經之根本也謂腎間動氣也此五藏六
故氣者人根本也根絶則莖枯矣寸口脈平而死者
生氣獨絶於內也（一名守邪之神腎間動氣
大肖中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病三
部九候皆相失者死上下左右之脈相應如參春者
病甚上下左右相失不可數者死中部之候雖獨調
與衆藏相失者死中部之候雖獨調
即死矣此腎氣先絶於內其人便死其脈不待
歟病也）
岐伯曰形盛脈細少氣不足以息者死形瘦脈

黃帝曰冬陰夏陽奈何岐伯曰冬陰故以夜半死盛陽主冬冬故以夜半死盛躁喘數者爲陽主夏絶者爲陰主夏故以日中死是故寒熱著平旦死熱中及熱病者日中死病風者以日夕死病水者以夜半死形肉以脫九候雖乍疎乍遲乍疾者以日乘四季死形肉以脫九候雖乍疎乍遲乍疾者以夜半死其脉乍數乍調猶死七診雖見九候皆順者不死所言不死者風氣之病及經月之病似七診之病而非也故言不死若有七診之病其脉候亦敗者死矣必發噦噫嘔噫必審問其所始病與今之所方病而后各切循其脉視其經絡浮沈以上下逆順循之其脉疾者不病其脉遲兩手脉結上下逆順循之其脉緩結三里者豆起弱反在關濡反在顛微在其上濡反在下數即陽氣不

00073465

反在關濡反在顛微在其中部者濡結中部者緩結上部者弦
足沾熱汗出濇即無血厥而且寒黃帝問曰余每欲
視色持脉獨何調其尺以言其病從外知內爲之奈何
岐伯對曰審其尺之緩急小大滑澁肉之堅脆而病
形變定矣調之何如對曰尺之皮膚減而少脉大
緩者尺之皮膚亦緩急脉急者尺之皮膚亦急脉
者尺之皮膚亦大脉濇滑者尺之皮膚亦滑脉濇者
之皮膚亦濇凡此六變有微有甚故善調脉者
于寸善調脉者不待于色能參合行之可爲上工尺
膚滑以淖澤者風也尺內弱解体安卧脫肉者寒熱
也尺膚濇者風痺也尺膚麤如枯魚之鱗者水淡飲
也尺膚熱甚脉盛躁者病溫也其脉盛而滑者汗且

00073465

出尺膚寒甚甚脉小（一作忽）者泄少氣尺膚炬然（炬然乙作熱）
亦寒熱也尺炬然熱人迎大者掌奪血尺緊之而熱者
小甚則少氣色白有加者立死肘所獨熱者尪前熱肘後獨熱者肩背熱肘後尪
以下三四寸腸中有蟲手所獨熱者腰以上熱臂中
獨熱者腰腹熱掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒
魚上白肉有青血脉者胃中有寒
諸浮諸沈諸滑諸濇諸弦諸緊若在寸口關以上病
若在關上胃以下病若在尺中腎以下病
寸口脉滑而遲不沈不浮不長不短爲無病左右同法
寸口大過與不及寸口之脉中手促上擊者曰肩背痛

長者曰足脛痛

寸口脉浮而盛者病在外

寸口脉沈而堅者病在中

寸口脉沈而弱者曰寒熱（一作氣）

寸口脉沈而髮必墮落（又作中）

寸口脉沈而緊苦心下有寒時痛有積聚及疝瘕少腹痛

寸口脉沈而短氣

寸口脉沈肖中短氣

寸口脉沈而喘者寒熱

寸口脉但實者心勞

脉緊而長過寸口者注病

寸口脉緊或浮腸上有寒肺下有水氣

脉緊上寸口者中風風頭痛亦如之（千金翼云亦為傷寒頭痛）

00073465

脉弦上寸口者宿食降者頭痛

脉來過寸入尺氣喘息

脉出魚際逆氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰

寸口脉澌澌如羹上肥陽氣入兩手俱絶者不可治

寸口脉偏絶則臂偏不遂其人兩手俱絶者亦死

兩手前部陽絶者苦心下寒毒喙中熱

關上脉浮而大風在胃中張口肩息心下澹澹食欲嘔

關上脉浮積熱在胃中嘔吐蚘蟲心健忘

關上脉滑而大小不勻（十金必吐）

一二日復欲發動其人欲多飲飲即注利（注ニ）如利止者是爲病方欲進不出

生不止者死

關上脉緊而大而實按之不盛有力爲中焦實有

關上脉滑者蚘動

關上脉緊而滑者蚘動

關上脉澁而堅大而實按之不減有力爲中焦實有伏結在脾肺氣塞實熱在胃中

關上脉膻中大而尺寸細者其人必心腹冷積癥瘕結聚欲熱飲食長

關上脉時來時去乍大乍小乍疎乍數者胃中寒熱羸劣不欲飲食如瘧狀

尺脉浮者客陽在下焦

尺脉細微漉泄下冷利

尺脉弱寸彊胃絡脉傷

尺脉虛小者足脛寒痿痺脚疼

尺脉澁下血不利多汗 素問云尺澁脉滑之多汗

尺脉滑而疾爲血虛

00073465

尺脉沈而滑者寸白蟲

尺脉細而急者筋攣痺不能行

尺脉麤常熱者謂之熱中腰膀疼小便赤熱

尺脉偏滑疾面赤如醉外熱則病

平雜病脉第二

滑爲實爲下 又爲氣 一作勞

沈爲水爲實 又爲鬼疰

遲則爲寒濇則少血緩則爲虛洪則爲氣 一作熱

疰脉自弦弦數爲疰 一作浮緊則爲風

其人澁澁惡寒 一作爲風症

位爲痛痺 一作偏弦爲飲雙弦則脅下拘急而痛

00073465

其人澑澑惡寒脫血
脉大寒熱在中
伏者霍亂
安臥脉盛謂之脫血
凡亡汗肺中寒飲冷水欬嗽下痢胃中虛冷此等其
脉並緊
浮而大者風
浮而大者中風頭重鼻塞
浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉
滑而浮散者攤緩風
滑者鬼疰
澑而緊痺散

00073465

浮洪大長者風眩癇疾
大堅疾者癲病
弦而鉤脇下如刀刺狀如輩尸至困不死
緊而急者遁尸
洪大者傷寒熱病
浮洪大者傷寒秋冬春成病
浮而滑者宿食
浮滑而疾者食不消脾不磨
短疾而滑酒病
浮而細滑傷飲
遲而澁中寒有癥結
駛而緊積聚有擊痛

弦急亦主寒小腹偏又為心痛一作

00073465

弦急而瘕小腹痛又爲癖痛

遲而滑者脹

盛而緊曰脹

弦小者寒癖

沈而弦者懸飲內痛

弦數有寒飲冬夏難治

緊而滑者吐逆

小弱而濇胃反

遲而緩者有寒

微而緊者有寒

沈而遲腹藏有冷病

微弱者有寒少氣

00073465

實緊胃中有寒苦不能食時利者難治一作時時嘔稍留難治

滑數心下結熱盛

滑疾胃中有熱

緩而滑曰熱中

沈一作浮而急病傷寒暴發虛熱

浮而絶者氣

辟太而滑中有短氣

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也

沈而數中水冬不治自愈

短而數心痛有瘀血一作有

弦而緊胸痛藏傷有瘀血寒

沈而滑爲下重亦爲背膂痛

脉來細而滑按之能虛因急痛
病在內
微浮秋吉冬成病不可勞
微數雖甚不成病
浮滑疾緊者以合百病久易愈
陽邪來見浮洪
陰邪來見沈細
水穀來見堅實
脉來乍大乍小乍長乍短者為祟
脉來洪大嫋嫋者社祟
脉來沈沈澤澤四肢不仁而重主祟
脉與肌肉相得久持之至者可下之

弦小緊者可下之緊而數寒熱俱發必下乃愈

弦遲者宜温藥

緊數者可發其汗

診五藏六腑氣絶證候第三

病人肝絶八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人汗一日出泣作如水不止一日二日死

病人膽絶七日死何以知之眉冬爲之傾

病人筋絶九日死何以知之手足爪甲青呼罵不休一日八日死

病人心絶一日死何以知之肩息回視立死一日目亭亭一日死

病人腸小一云腸絶六日死何以知之髮直如乾麻不得

屎化白汗不止
病人脾絶十二日死何以知之口冷足腫腹熱臚脹
泄利不覺出無時度一日五度
病人胃絶五日死何以知之口冷足腫脊痛舌中重不可反覆
病人肉絶六日死何以知之耳乾舌皆腫溺血大便
赤泄一曰足腫九日死
病人肺絶三日死何以知之口張但氣出而不還一日
鼻口虛張短氣
病人大腸絶不治何以知之泄利無度利絶則死
病人腎絶四日死何以知之齒爲暴枯面爲正黑目
中黃色舊中欲折白汗出如流水一日人中平七日中死

病人骨絶齒黄落十日死

諸浮脉無根者皆死已上五藏六腑爲根也

診四時相反脉證第四

春三月木王肝脉治當先至心脉次之此爲四時王相順脉也到六月土王脾脉當先至而反不至反得腎脉此爲腎反脾是謂腎反肝三十日死期五月忌丙丁

脉次之心脉當先至而反不至反得腎脉此爲腎反脾是謂腎反肝期五月六月忌丙丁

先至而反不至反得腎脉此爲腎反脾是謂腎反肝三十日死期五月忌丙丁

夏三月火王心脉當先至肺脉次之腎脉當先至而反不至反得肝脉此爲肝反腎是謂肝反心二歲死期七月八月忌庚辛

夏三月火王心脉當先至肺脉次之腎脉當先至而反不至反得肝脉此爲肝反腎是謂肝反心二歲死期七月八月忌庚辛

夏三月火王心脉當先至肺脉次之腎脉當先至而反不至反得肝脉此爲肝反腎是謂肝反心二歲死期七月八月忌庚辛

秋三月金王肺脉當先至腎脉次之肝脉當先至而反不至反得心脉此爲心反肝是謂心反肺三歲死期正月二月忌甲乙

秋三月金王肺脉當先至腎脉次之肝脉當先至而反不至反得心脉此爲心反肝是謂心反肺三歲死期正月二月忌甲乙

秋三月金王肺脉當先至腎脉次之肝脉當先至而反不至反得心脉此爲心反肝是謂心反肺三歲死期正月二月忌甲乙

冬三月水王腎脉當先至肝脉次之心脉當先至而反不至反得脾脉此爲脾反腎是謂脾反肝春肝脉當先至而反不至

00073465

脈有損至何謂也然至之脉
離經四至曰奪精五至曰死
也何謂損一呼一至二呼一
一至曰死四呼一至曰命絶
上損脉從上下此損之脉也
毛皮聚而毛落三損損於肌
五藏六府也三焦四損損於
膚四損損損於筋緩不能自
收持五損損於骨骨痿

診損至脉第五

云此中不論肺金之氣疎略
又推五行亦頗顛倒待求
未論并別録也

臣億等按千金

肝反心二歲死至腎脉先至是謂腎反心夏心脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反心也期六月忌戊已

00073465

不能起於牀反此者至於收病也從上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死從上下者益其氣損其心者調其榮衛損法柰何然損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒温損其肝者緩其中損其腎者益其精氣此治損之法也

脉有一呼再至一吸再至一呼三至一吸三至一呼四至一吸四至一呼五至一吸五至一呼六至一吸六至一呼再至一吸一至再呼一至再吸一至再呼三至一吸三至一呼再至脉來如此何以別知其病也然脉來一吸再至脉來如此何以別知其病也然脉來一呼四至一吸四至病適欲甚脉洪大者苦頭痛目眩前小後大即胷滿短氣一呼四至一吸四至病適欲甚脉洪大者苦煩滿沈

細者腹中痛滑者傷熱濇者中霧露一呼五至其人當困小者爲難治一呼四至病適欲甚脉洪大者苦煩滿沈細即夜加浮大即晝加不小不大雖困可治其有大小者爲難治一呼四至一吸亦四至病適欲甚脉洪大者苦煩滿沈細即夜加浮大即晝加不小不大雖十死脉也沈細夜死浮大晝死一呼一至一吸亦六至病適欲甚脉洪大者苦煩滿沈細即夜加浮大即晝加不小不大雖名曰損人雖能行猶當一作犹未着牀所以然者血氣皆至名曰無魂無魂者當死也人雖能行名曰行尸

扁鵲曰脉一出一入曰平再出一入少陰三出一入太陰四出一入少陽三出一入陽明四出一厥陰再入一出少陽三入一出陽明四入一出太陽脉出者爲陽入者爲陰故人一呼脉再動氣行三寸一吸而脉亦再動氣行三寸一呼一吸爲一息氣行六寸人十三呼吸定息脉五動一呼一吸爲一息氣行六寸人十三呼吸定息脉五

十動氣行六尺二十息脉百動爲一備之氣以應四時天有三百六十五日人有三百六十五節晝夜漏下水百刻一備之氣脉行丈二尺一日一夜行於十二辰氣行晝則周遍於身與天道相合故曰平平者無病也一陰一陽是也脉再動爲一至再至而緊即奪氣一刻百三十五息十刻千三百五十息百刻萬三千五百息二刻爲一度一度氣行一周身晝夜五十度脉三至者離經一呼而脉三動氣行四寸半人備之氣脉百四十動氣行一丈八尺一周於身氣過一息脉七動氣行九寸十息脉七十動氣行九尺一百八十度故曰離經離經者病而緊則奪血脉四至則奪精一陰一陽是也三至

寸人一息脉九動氣行尺二寸人十息脉九十動氣行一丈二尺四寸
行一丈二尺一備之氣脉百八十動氣行二丈四尺
一周於身氣過三百六十度再遍於身不及五節一
時之氣而重至諸脉浮濇者五藏無精難治一陰三
陽是也四至而脉緊則奪形脉五至者死一呼脉五
動氣行尺三寸當行五寸一息脉十一動氣行二丈
寸當行七寸十息脉百一十動氣行二丈六尺當行
十寸半人一息脉十一動氣行二丈八尺當行丈
一備之氣脉二百二十動氣行三丈二尺當行丈
三寸人一息脉十二動氣行三丈四尺當行丈三
於身三百六十五節氣行過五百四十度再周於身
過百七十度一節之氣而至此氣浮濇經行血氣竭
盡不守於中五藏痿瘏精神散亡脉五至而緊則死
三陰二作三陽是也雖五猶未如之何也脉一損一

00073465

乘者人一呼而脉一動人一息而脉再動氣
十息脉二十動氣行三寸人一備之氣脉四十動氣行三尺
六尺不及周身百八十節氣短不能周遍於身若少
氣身體懈墮矣脉再損者人一息而脉三動氣行一
寸五分人十息脉十動氣行尺五寸一備之氣脉二
十動氣行三尺不及周身二百節氣血盡經中不
能及故曰離經血去不在其處小大便皆血也脉三
損者人一息復一動氣行尺呼而脉一動十息脉七動氣行
五寸當行一尺五分一備之氣脉十四動氣行三尺
二寸不及周身二百九十六節故曰爭氣行血留不
能相與俱微氣閉實則胃滿藏枯而爭於中外脉四損者再息而脉一動人十息
小血凝於中死矣脉四損者人十息

脈五動氣行七寸半一備之氣脈十動氣行尺五寸不及周身一十五節故曰亡血亡血度身羸疲皮裹骨故氣血俱盡五藏失神其死明矣脈五損者人再息復一呼而脈一動人十息脈四動氣行六寸一備之氣脈八動氣行尺二寸不及周身三百二十四節故曰絕絕者氣急不卞牀口氣寒脈俱絕死矣歧伯曰脈失四時者爲至啓至啓者爲損至之脈也損之爲言少陰主骨爲重此志損也飲食衰減肌肉消者是意損也身安臥臥不便利耳目不明是魂損也呼吸不相通五色不華是魄損也四肢皆見脈爲亂是神損也大損三十歲中損二十歲下損十歲損各以春夏秋冬平人人長脈短者

00073465

三十歲人短脉長者是中損二十歲手足皆細是下損十歲失精氣者一歲而損男子左脉長是爲陽損半歲女子右脉短左脉長是爲陰損夏脉當得心脉反得腎脉當得肺之脉損秋脉當得肝脉反得脾肺之脉冬脉當得腎脉反得肝心之脉損冬脉當得肺脉反得脾肺之脉損春脉當得脾脉反得肝脉不絶前後去爲絶掌上相擊堅如彈石爲上脉虛盡下脉堅如彈石爲有胃氣上脉盡下脉消者皆生是損脉也胃氣上下脉比皆盡者死不絶不消者皆生是損脉也大飲食暴多是意之至也語言妄見手足相指引是魂之至也脉微小不相應呼吸

00073465

五動一止立冬死

一動一止立冬死 一經云立冬死

死止夏至死 一經云立夏死

死八動一止十日死 一經云立夏死

一動一止十動一止立夏死 一經云立春死

五動一止立冬死 一經云立冬死

一動一止立秋死 一經云立秋死

十四十五動一止立冬死 一經云立夏死

止一歲死若立秋死二十動一止二歲死 一經云一歲死

脉一動一止二日死 一經云一日死

診脉動止投數疎數死期年月第六

氣者生十得其半也黃帝曰善

至也是神之至也龍葱華色是魄之至也時微小不

相應病各得

00073465

三歲死三十五動一止四歲死

五十動一止五歲死不滿五十動一止五歲死

脈來五十投而不止者五藏皆受氣即無病

氣畢陰陽數同榮衛出入經脈通流晝夜百刻五德相生

脈來四十投而一止者一藏無氣卻後四歲死

而死

脈來三十投而一止者二藏無氣卻後三歲死

脈來二十投而一止者三藏無氣卻後二歲死

脈來十投而一止者四藏無氣卻後五日而死

清明日死遠不出穀雨死矣

脈來五動而一止者五藏無氣卻後一日死

脈一來而久住者宿病在心主中治

千金方云五行

脈來十投而一止者四藏無氣中死得節不動出

00073465

脉一來而久住者宿病在心主中治
脉二來而久住者宿病在肝枝中治
脉三來而久住者病在脾下中治
脉四來而久住者病在腎閒中治
脉五來而久住者病在肺支中治
五脉病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

診百病死生決第七

診傷寒熱盛脉浮大者生沈小者死
傷寒已得汗脉沈小者生浮大者死
温病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治

00073465

温病穰穰大熱其脉細小者死
温病下利腹中痛甚者死不治
温病汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅
生虚緩者死
温病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾
者八日死四五日頭痛腹痛而吐脉來細微小便
死八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脉
來牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死
熱病七八日脉不軟一作端不散數一作者當瘖後三
日温汗不出者死
熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌

焦乾黑者死
熱病未得汗脉盛疾得汗脉靜疾不得汗者難差

00073465

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者死
熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治
熱病已得汗脉大熱不去者亦死 大一作專
熱病已得汗脉未去脉微躁者慎不得刺治必下利
熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺刺不汗出
診人被風不仁痿躄其脉虛者生堅急疾者死
診癲病虛則可治實則死
癲疾脉實堅者生脉沈細小者死
癲疾脉搏大滑者久久自已其脉沈小急實不可治
小堅急亦不可療

久一作卒 視一作視

00073465

診人心腹積聚其脈堅彊急者生虛弱者死又實彊者生沈者死其脈大腹大脹四肢逆冷其人脈形長者死腹脹滿便血脈大時絕極下血脈小疾者死心腹痛痛不得息脈細小遲者生堅大疾者死

腸澼便血身熱則死寒則生

腸澼下白沫脈沈則生浮則死

腸澼下膿血脈懸絕則死滑大者生懸濇者死以藏期之

腸澼下膿血脈小細安靜者生數疾且大有熱者死

腸澼筋攣其脈沈小流連者生數疾且大有熱者死

洩注脈緩時小遲結者生浮大數微小遲者生緊急者死

洩注脉緩時小結者生浮大數者死
匱蝕陰疝其脉虛小者生緊急者死
欬嗽脉沈緊者死浮直者生浮軟者生小沈伏匿者死
欬嗽羸瘦脉形堅大者死
欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦而洩不一本云脫形熱不去者死
欬而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絶者死
吐血衄血脉滑小弱者生實大者死
汗出若衄其脉小滑者生大躁者死
唾血脉緊彊者死滑者生
上氣脉數者死謂其形損故也
上氣喘息低昂其脉滑手足温者生脉澁四肢寒者死

上氣面浮腫肩息其脈大不可治加利必死
上氣注液其脈虛寧寧伏匿者死
寒氣上攻脈實而順滑者生實而逆澁則死
痼癉脈實大病久可治脈懸小堅急病久不可治
消渴脈數大者生細小浮短者死
消渴脈洪大者可治微細虛小者死
水病脈浮大軟者生沈細虛小者死
水病脹閉其脈實者生虛者死
水病腹大如鼓脈沈數細者生浮大疾快者死
卒中惡吐血數升脈沈數細者生緊大而緩者死
卒中惡腹大四肢滿脈六而緩者生緊大而浮者死

上脈滿實何如曰實而滑則生逆則死大堅尺滿而不足寒也

是者順則生逆則死何謂順則順者手足温也謂逆者手足寒也

一作又甚

太素云寒氣暴矣其形不應如

卒中惡腹大四肢滿脉六而緩者生緊細而微者亦生

病瘡腰脊彊急瘈瘲者皆不可治

寒熱瘈瘲其脉代絶者死

金瘡出血脉虚細者生數實大者死

金瘡血出太多其脉虚細者生浮大者死

斫瘡出血小者生浮大者死

斫刺俱有病多少血出不自止斷者其脉止脉來大者十日死

者七日死滑細者生

從高顛仆内有血腹脹滿其脉堅彊者生小弱者死

人爲百藥所中傷脉浮澁而疾者生微細者死洪大而遲者生

00073465

人病甚而脈不調者難差
人病甚而脈洪者易差
人內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不得安靜者死
脈實滿手足寒頭熱春秋生冬夏死
老人脈微陽氣虛而代奇（一作寄）月而亡
弱陽彊脈至而代奇（一作寄）月而亡
尺脈濇而堅為血實氣虛也其證發病腹痛逆滿氣上（一作急）如久成結瘕得病以冬死
行此為婦人胞中絶傷有惡血久不去
尺脈細而微者血氣俱不足細而來有力者是穀氣不充病得節輒動棗葉生而死此病秋時得之

左手寸口脈偏動乍大乍小不至

左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至關至尺三部之位處處動搖各異不同其人病仲夏得之右手寸口脉偏沈伏乍小乍不至關至尺部脉三十動一止有頃更還二十動一止有頃更還相因不與息數相應其人雖食穀猶不充病得節輒動秦葉生而死此病秋時得之右手尺部脉偏沈伏乍小乍不至關至寸口脉浮大即太過上出魚際沈伏即下不至關中往來無常時時復來者榆葉枯落落而死花一作葉此脉桃花落而死花一作葉

作至立春而死葉一作英

00073465

診三部脈病證第八

三部脈調而和者生

三部脈廢者死

三部脈虛實決死生

三部脈虛其人長病得之死虛而濇長病亦死

滑亦死虛而緩亦死虛而弦急癲病亦死

三部脈實而大長病得之死實而滑長病得之生

病得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲癎可治

三部脈彊盛非稱其人病便死

三部脈羸非稱其人（一作脈）得之死

三部脈麤長病得之死卒病得之生

三部脈大而數長病得之生細而數亦生微而緊亦生

三部脈細而軟長病得之死

00073465

三部脉大而數長病得之生
三部脉微而伏長病得之死
三部脉軟濡作長病得之不治自愈治之死卒病得之生
三部脉浮而結長病得之死
數長病風得之生卒病得之死
三部脉芤長病得之生卒病得之死
三部脉弦而數長病得之生卒病得之死
三部脉革長病得之死卒病得之生
三部脉堅而數如銀釵股蠱毒病必死數而軟蠱毒
三部脉漐漐如羹上肥長病得之死卒病得之死卒病得之生
三部脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生

三部脈如霹靂長病得之死三十日死

三部脈如弓弦長病得之死

三部脈累累如貫珠長病得之死

三部脈如水淹然流長病不治自愈治之反死一云如水流者長病七十日死如水流者長病不治自愈云十日死

三部脈如屋漏長病十日死千金云四十日死

三部脈如雀啄長病七日死

三部脈如釜中湯沸朝得暮死夜半得日中死日中

得夜半死

三部脈急切腹間病又婉轉腹痛針上下差

明　新安　吳勉學　翻刻宋板

脉經卷第五

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

張仲景論脉第一

扁鵲陰陽脉法第二

扁鵲華佗察聲色要訣第四

扁鵲診諸病及逆死脉要訣第五

張仲景論脉第一

脉有三部陰陽相乘榮衛氣血在人體躬行金作人動作在

呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作

一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯

或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱

師曰明

願爲緩陳令得分明

流行不失衡銓賢沈心洪肺浮肝弦此自經常不失

珠分出入昇降漏刻周旋水下二刻臣億等詳水下二刻疑檢舊本如此

脉一周身旋復寸口虛實見焉

風則浮虛寒則緊弦沈潛水濇支飲急弦動弦爲痛

數洪熱煩設有不應知變所緣變化相乘陰陽相干

太過可怪不及亦然邪不空見終必有奸審察表裏

三焦別分知邪所舍消息診看料度腑藏獨見若神

爲子條記傳與賢人

扁鵲陰陽脉法第二

扁鵲陰陽脉法第二

脉平旦曰太陽中曰陽明晡時曰少陽日中曰太陰夜半曰少陽之脉乍小乍大乍長乍短動摇六分王十一月甲子夜半正月二月甲子王太陽之脉洪大以長其來浮於筋上動摇九分三月四月甲子王陽明之脉浮大以短動摇三分大前小後狀如科斗其至跳五月六月甲子王少陰之脉緊細動摇六分王五月甲子日中七月入月甲子王太陰之脉緊細以長乘於筋上動摇九分九月十月甲子王

厥陰之脉沈短以緊動搖三分十一月十二月甲子王
引腰腹痛
少陽之脉大以緩者可治刺足厥陰入五分已上病遲脉寒少
頭痛脇下滿嘔可治擾即死一作偃可偃即死刺兩季肋端
足陽明之脉洪大以浮其來滑而跳大前細後狀如科
斗動搖至三分已上病眩頭痛腹滿痛嘔可治擾即
死刺臍上四寸臍下三寸各六分
從二月至八月至正月陽脉在表從八月至正月陽脉在裏
附陽脉弱至即驚實則痫瘛細而沈不痫
瘛即陽脉強附陰脉弱至即驚實則痫瘛細而沈不痫

澼即脉代乍至乍不至大而沈即欬欬即上氣
甚則有息有息有息甚則口舌血出血出甚即鼻血出
變出寸口陰陽表裏以玄相乘如風有道陰脉乘陽
也寸口中前後溢者行風寸口中外實內不滿者三
風四温寸口者勞風勞風者大病亦發駃行
發奧風者上下微微扶骨是其診也表緩腹內急者
奧風也徧徧雷實夾者飄風從陰趨陽者風邪
一來速鬼邪也陰緩陽急者表有風來入藏
者風已抱陽入腹上逯逯下宛宛不能至陽流飲也
微反陽澹滯漿也陰扶骨絶者從寸口前頗趣於陰汗
水也來調四布者欲病水也陰脉不偷陽脉傷復少

00073465

津寸口中後大前兌至陽而實者僻食小過陽一分
者七日僻二分者十日僻三分者十五日僻四分者
二十日僻四分中伏不過者半歲僻欬欬不已胃陰
一分飲餔餌僻也外勾者久僻也內卷者十日僻外
數如沈病暑食粥一作微有內緊而弦者汁核并浮而
脉倚陽緊細以微瓜菜皮也若倚如緊薤藏菜也臍
臍無數生肉僻也附陽者灸肉僻也小倚生浮緊而
故生麥豆也

扁鵲脉法第三

扁鵲曰人一息脉二至謂平脉體形無苦人一息脉
三至謂病脉一息脉四至謂痺者脫脉氣其眼睛青者
死人一息脉五至以上死不可治也都一作發十作

三至謂病脉一息四至謂痺者
死人一息脉五至以上死不可治也都聲一作
來動取極五至病有六七至也扁鵲曰平和之氣不
緩不急不滑不濇不存不亡不長不促不短不長不倪不仰不
從不橫此謂平脉腎一作緊受如此一作剛身無苦也扁
鵲曰脉氣弦急病在肝少食多厭裏急多言頭眩自
痛腹滿筋攣癲疾上氣少腹積堅時時唾血咽喉中
乾相病之法視色聽聲觀病之所在候脉要訣豈不
微乎脉浮如數無熱者風也若浮如數而有熱者氣
也脉洪大者又兩乳房動脉復有數加有寒熱此傷寒
病也若羸長病如脉浮溢寸口結者易治也又療無
差不欲者易治也又療無熱劇者易差難治也又療無熱劇者易

病人五藏已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫謊言明不守聲嘶者死

病人陰陽俱絕劑手衣撮空妄言者死

病人妄語錯亂及不能語者不治熱病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者不死青如草滋死

病人面黃目赤者不死赤如衃血死

病人面黃目白者不死白如枯骨死

病人面目俱黑者不死黑如炲死

病人面黑目青者亦不死

病人面黑目青者不死
病人面青目白者不死
病人面黑目白者不死
病人面赤目青者六日死
病人面黑目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經膽氣妄泄目則爲青雖有天救不可復生
病人面黃目青者十日死憂恚思慮心氣内索面色反好急求棺槨
病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索
病人面黑目白者八日死腎氣内傷病因留積
病人面青目黃者五日死病人著牀心痛煩氣腑竭
病人内傷百日復愈能起傍徨因坐於地其立倚牀能治

病人面無精光若土色不受飲食者四日死
病人目無精光及牙齒黑色者不治
病人耳目鼻口有黑色起入口者必死
病人黑色出於額上髮際下五日中
在五日中
病人耳目及顴頰赤者死在五日中
病人黑氣出天中下至年上顴上者死
病人及健人黑色若白色起入目及鼻口死在三日中
病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死
病人面黑唇青者死
病人面青唇黑者死

病人面黑唇青脣黑者死

病人面青脣黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人目回回直視肩息者一日死

病人頭目久痛卒視無所見者死

病人陰結陽絶精脫恍惚者死

病人陰陽絶竭目眶陷者死

病人眉系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死

病人口張者三日死

病人脣青人中反人中滿者死

病人脣口忽乾者不治

病人脣腫齒焦者有死

病人陰陽俱竭其齒如熟小豆甘脉駃者死

病人齒忽變黑者必死

病人舌卷卵縮者死

病人汗出不流舌卷黑者死

病人髮直者十五日死

病人髮如乾麻善怒者死

病人髮與眉衝起者死

病人爪甲青者死

病人爪甲白者不活

病人手足爪甲下肉黑者八日死

病人卒腫其面蓋浮腫者死

病人榮衛竭絕面浮腫者黑者死

病人卒腫其面蒼黑者死
病人手掌腫無文者死
病人陰囊莖俱腫者死
病人脾腫反出者死
病人脈絕口張足腫五月死
病人足跌腫嘔吐頭重者死
病人腫滕大如斗者十月死
病人遺尿不覺者死
病人尸臭者不可治
肝病黑肺之日庚辛死
心病目黑腎之日壬癸死
脾病肩青肝之日甲乙死

00073465

肺病欲嗽如著壁之目丙丁死
腎病面腫脣黃脾之目戊己死
青欲飲如帛裹朱不欲如藍
赤欲飲如豬肝不欲如赭
白欲飲如鵝羽不欲如鹽
黑欲飲如羅裹雄黃不欲如炭
黃欲飲如重漆不欲如黃土
目色赤者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃
色不可名者病肖中
診目病赤脈從上下者太陽病也從下上者陽明病
也從外入內者少陽病也
形寒熱瘧瘧目中有赤脈從上下至瞳子見一脈一

歲死見一脈半一歲死見二歲半死見一脈一歲死

歲死見一脉半一歲半死見三脉二歲死

二歲半死見三脉三歲死

診齲齒痛按其陽明之脉來有過者獨熱在右右熱

在左左熱在上上熱在下下熱

黑多青皆見者寒熱身痛面色微黃齒垢黃赤脉小而濇者不嗜食

黃黃赤疸也安卧少黃赤脉濇者不嗜食

扁鵲診諸反逆死脉要訣第五

扁鵲曰夫相死脉之氣如羣鳥之聚一馬之馳糸水

交馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之

脉病人不病脉來如屋漏雀啄者死屋漏者其來既絶而止時時復

00073465

七不來是人一息半時不復增減者亦名曰代何謂結脈下後者死脈有表無裏者死經名曰結去即死何謂結脈脈有表無裏者死經名曰結去即死近也脈五來一止也脈

脈如轉豆者死脈如鬼頭刀者死脈如懸薄卷索者死脈忽去忽來者死脈涌涌不去者死脈忽去忽來者死脈在指

翔沒

脈如屋漏雀啄者死脈如雀啄復頻來者脈也又經言得病七八日脈

困病人脈如蝦之游如魚之翔者死

不知所在久乃復起起輒遲而沒去速者是也魚者似魚不行而但掉尾動頭而身搖而久住者是也

彈石者碎碎數而隨散亂無復次緒也

脈如彈人手也

急也解索者蒋蒋尋復退動

而不相連屬也甚數而疾絕止

如

00073465

經言形脈與病相反者死奈何然病若頭痛脈
反短濇者死
病若腹痛脈反浮大而長者死
此之謂也

00073465

病若腹滿而喘脉反滑利而沈者死
病若四肢厥逆脉反浮大而濇者死
病若耳聾脉反浮大而短者死
病若目眩眩脉反浮大而緩者死
左有病而右痛右有病而左痛上有病而下痛此爲逆逆者死不可治脉來微細而絶者人病當死
人病脉不病者生脉病人不病者死
人病尸厥呼之不應脉絶者死
肥人脉細小如絲欲絶者死
羸人得躁脉者死

人身初盛而脉來滑者死

人身澁而脉來往澁者死
人身滑而脉來往滑者死
人身小而脉來往大者死
人身大而脉來往小者死
人身長而脉來往短者死
人身短而脉來往長者死
尺脉不應寸時如馳半日死 千金云尺脉上應寸口太遲者半日死
肝脾俱至則穀不化肝多即死
肺肝俱至則癰疽四肢重肺多即死
心肺俱至則痺消渴懈怠心多即死
腎心俱至則難以言九竅不通四肢不舉腎多即死
脾腎俱至則五藏敗壞脾多即死

肝心俱至則熱甚痺汗不出妄見邪
肝腎俱至則疝痕少腹痛婦人月使不來肝
肺滿皆實則爲腫肺之雍喘而兩胠滿肝
卧則驚不得小便腎雍脚下至少腹滿脛有
筋攣肝脉驚暴有所驚駭脉不至若瘖不治自已
腎脉小急肝脉小急心脉小急不鼓皆爲癈腎肝并沈爲
石水并浮爲風水并虛爲死并小弦欲驚腎肝并滿腎滿
脾脉大急沈肝脉大急沈皆爲疝心肺脉滑急爲心疝脉
搏爲肺疝脾脉外鼓沈爲腸澼脉搏沈爲腸澼易治腎脉小緩爲
肝病汗下亦下血二藏同病者可治其脉小沈濇者死心
澼其身熱者死熱見七日死胃脉沈鼓濇外鼓沈

00073465

華而脈至如省客省客者脈死脈至如散葉是肝氣予虛也木葉落而死脈至如火新然是心精之予奪也草乾而死脈至如懸去棗

素問作葉 葉閥莢

脈至如橫格是膽氣予不足也禾熟而落而死脈

見九十日死脈至如數一息十至以上是爲經氣予不足也微

合數作暴

脈至如數使人暴驚三四日自已脈至如喘名曰氣厥氣厥者不知與人言

素問作num 王冰作乙

爲熱熱脈至如喘名曰氣厥氣厥者不知與人言

轉可治三十日起其順者痞

心澼脈小緊急皆臑偏枯男子發左女子發右不痞舌

澼其身熱者死熱見七日死胃脈沈鼓濇胃外鼓大

至如弦縷是胞精子不足也病善言下霜而死
可治脈至如交漆交漆者左右傍至也微見四十日
死（文甲乙作棘）脈至如涌泉浮鼓肌中是大陽氣予不足也
少氣味韭英而死脈至如委土（素問作頹土）之狀按之不
得是肌氣予不足也五色先見黑白黃（一作鞠）一作發死脈
至如懸癰懸癰者浮揣切之益大是十二俞之予不足也
氷凝而死脈至如偃刀偃刀者浮之小急也按之堅
大急而滑不直手不足也棗棘熟寒熱獨并於腎也如此其人不得坐
立春而死脈至如丸滑不直手者按之不可得
也是大腸氣予不足也棗棘生而死脈至如春者令
人善恐不欲坐卧行立常聽是小腸氣予不足也季
秋而死

明

新安吳勉學校刻宋板

問曰秋當以春二月中脉一病人其脉反沈師記言到秋死秋當死其病反愈到七月復病因往脉之言至冬死

秋當死其病反愈到七月復病因往脉之言至冬死

復記言至冬死

問曰二月中得沈脉何以故處之至秋死

月之時其脉自當濡弱而弦得沈脉見

浮即死故知到秋當死也師曰二月之時脉當死也七月之時脉復得沈何以

處之至冬當死師曰沈脉屬腎肾氣藏脉也非時妄見

經言王相因死冬脉本王脉不再見故知至冬當死

也然後至冬復病王以冬至日死故知爲誹華佗

倣此

三曰相即門 具如華嚴
四曰相入門 具如華嚴
五曰秘密門 十佛普賢各各
自在 不可思議 是名
六曰微細門 一塵含
十方 一切塵亦爾 是名
七曰十世隔法異成門 過去
現在未來 各有三世 是名
八曰諸藏純雜具德門 一切
諸法 各有十義 是名
九曰一多相容不同門 一即
多 多即一 是名
十曰諸法相即自在門 一
中有一切 一切中有
一 是名
十一曰唯心迴轉善成門 一
切諸法 唯心所現 是名
十二曰託事顯法生解門 一
切諸法 各有所表 是名
十三曰以法成人門 一切
諸法 各有所表 是名
十四曰主伴圓明具德門 一
切諸法 各有主伴 是名
十五曰帝網無盡門 一
切諸法 各有無盡 是名
十六曰十佛普賢境界門 一
切諸法 各有十佛 是名
十七曰重重無盡門 一
切諸法 各有無盡 是名
十八曰托法進修成行門 一
切諸法 各有所表 是名
十九曰普賢境界具德門 一
切諸法 各有普賢 是名
二十曰十世隔法異成門 過去
現在未來 各有三世 是名
二十一曰諸藏純雜具德門 一
切諸法 各有十義 是名
二十二曰一多相容不同門 一
即多 多即一 是名
二十三曰諸法相即自在門 一
中有一切 一切中有
一 是名
二十四曰唯心迴轉善成門 一
切諸法 唯心所現 是名
二十五曰託事顯法生解門 一
切諸法 各有所表 是名
二十六曰以法成人門 一
切諸法 各有所表 是名
二十七曰主伴圓明具德門 一
切諸法 各有主伴 是名
二十八曰帝網無盡門 一
切諸法 各有無盡 是名
二十九曰十佛普賢境界門 一
切諸法 各有十佛 是名
三十曰重重無盡門 一
切諸法 各有無盡 是名
三十一曰托法進修成行門 一
切諸法 各有所表 是名
三十二曰普賢境界具德門 一
切諸法 各有普賢 是名

00073465

脉經卷第六

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

肝病證第一

膽病證第二

心病證第三

小腸病證第四

脾病證第五

胃病證第六

肺病證第七

大腸病證第八

腎病證第九

膀胱病證第十

肝氣虛則恐實則怒肝氣虛則夢見園苑生草得其時則夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝病則夢山林樹木肝平旦慧下晡甚夜半靜

肝足厥陰經病證第一

肝病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之腎少腹腰脊痛腫脛痞十日不已死冬日入夏早食肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人喘逆若卒而溢易一作

三焦病證第十二

三焦者入胃出肌皮膚腸胃之外也

入肌皮腸胃之外也

肝脈沈之而急浮之亦然苦脇下痛有氣支滿引少腹而痛痛時小便難苦目眩頭痛腰背痛足痿為逆寒時痊女人月使不來時亡時有得之少時有所墜墮青脉之至也長而左右彈診曰有積氣在心下支肺名曰肝痺得之寒濕與血同法腰痛足清頭痛肝中風者頭目瞤兩脇痛行常偏仰令人嗜甘如阻婦狀肝中寒者其人洗惡寒翕翕發熱面翕翕然赤熱熱熱燥善大息肖中痛不得轉側時盜汗欬食反吐其汁（大又作舌本）肝主肖中喘怒罵不得轉側時盜汗欬食反吐其汁有熱竄室凡有所墜墮血留內若有所大怒氣上而不能下

積於左脇下則傷肝肝傷者其人脫肉又卧張時時手足青目瞑瞳人痛此為肝干藏傷所致也肝脹者脇下滿而痛引少腹肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通

肺乘肝即為癰心乘肝必吐利

肝著者其病人常欲蹈其胷上欲有所覆杯有頭足如龜鼈狀久久不愈發欲逆咳瘧連歲月不已以季夏戊巳日得之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受因留結為積故知肥氣以季夏得之

肝病其色青手足拘急脇下堅滿或時痛或引小腹

00073465

肝病其色青手足拘急脇下牡
長此爲可治宜服防風竹瀝湯泰艽散春當
夏刺行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺
皆瀉之又當灸期門百壯背第九椎五十壯
肝病者必兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目
所見耳無所聞善忘如人將捕之若欲治之當
足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取
邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內脈善瘈節時
之行間以引脇下補三里以温胃中取血脈以散
取耳間青脈已去其瘈足厥陰之脈起於大指聚毛之
際上循足跌上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之
後上膕內廉循股入陰毛中環陰器抵少腹挾胃屬肝

絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨
上出額與督脉會於巔其支者從目系下頰裏環脣
内其支者復從
不可以俛仰丈夫秡亦婦人少腹
色是主肝所生病者胃肖滿嘔
者則十口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎
足厥陰之別名曰蠱蟲溝去内踝上五寸別走少陽其
挺長熱虛則暴癢取之所別肝病肖滿脇脹善恚怒
其脉當弦長而急今反短濇其色當青而反白身體滑
叫呼身體有熱而復惡寒四肢不舉面目
是金之刻木爲

00073465

是金之刻木爲大逆十死不治

膽足少陽經病證第二十

膽病者善太息口苦嘔宿汁心下痞鞕脇下者灸之其寒熱刺陽陵泉善嘔有苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也

心中澹澹善悲恐如人將捕之則口苦胃氣逆嘔苦汁故曰嘔膽病者善太息口苦嘔宿汁心下痞鞕脇下者灸之其寒熱刺陽陵泉善嘔有苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也

膽病者脇下痛口苦太息

厥氣客於膽則夢鬬訟

足少陽之脉起於目兌皆上抵頭角下耳後循頸行手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕上臂出肩上却交手少陽之後入耳中出走耳前至兌皆後其支者從耳後入耳中出走耳前至兌皆後其支者別

00073465

允皆下大迎合手少陽於頰（一本云別迎手少陽於鎮）允皆上下加頰車下頸合缺盆以下循胸裏出氣街遶毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胷中過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絶骨之端下出外踝之前循足跗上出小指次指之間其支者跌上出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息心脇痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛角額痛目允皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾癭汗出振寒瘧胷中脇肋髀膝外至所絶骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸口則人迎與寸口也

00073465

虛者則人迎大一倍於寸口

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢物得其時則夢燔灼心氣盛則夢客於心則夢丘山煙火

心手少陰經病證第三

病在心目中悲夜半甚平旦靜

病先發於心者心痛一日之肺喘欬三日之肝脇痛支滿五日之脾閉塞不通身體重三日不已死冬夜半夏日中

心脈搏堅而長當病舌卷不能言其耎而散者當病消渴自已

心脈沈之不端長浮之不緊浮苦心下聚氣而痛食不

下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之憂思
赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名
曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之
心脉急名曰心疝少腹當有形其以心爲
爲之使故少腹當有形
邪哭使魂魄不安者血氣少也
氣虛者其人即畏一作合目欲眠夢遠行而精神離
散魂魄妄行陰氣衰者即爲癲陽氣衰者即爲狂五
藏者魂魄之舍精神之所依託也魂魄飛揚者其
而微其藏不足則魂魄不安魂屬於肝肺氣衰者即
主津液即爲泣出肺氣衰者即爲泣出肝氣衰者

00073465

生津液即爲津氣衰者即爲泣病氣衰者

動則不安肝主善怒其聲呼

心中風者會會發熱不能起心中飢而欲食則嘔

心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛

愁憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒心悲乃愈

人勞倦即頭面赤而下重心中痛徹背自發煩熱當

臍挑手其脉弦此爲心藏傷所致也

心脹者煩心短氣臥不安

心水者其人身體重一作而少氣不得臥煩而躁其

陰大腫

腎乘心必瘖

真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

00073465

心腹痛懊憹發作腫聚往來上下行痛有休作心腹
中熱苦渴涎出者是蚘咬也以手聚而堅持之久得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針腸中有蟲蚘咬皆不可取以小針心之積名曰伏梁起於臍上
上至心大如臂久久不愈病煩心心痛以秋王之得之何也腎病傳心心當傳肺肺適以秋王者不受邪心復欲還腎腎不肯受因留結爲積故知伏梁以秋得之

心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思
愁慮面赤身熱其脉實大而數此爲可治春當刺中
衝夏刺勞宮季夏刺太陵皆補之秋刺間使冬刺曲
澤皆瀉之 此是心包手厥陰經 又當灸巨闕五十壯背俞五

雜百病

心病者胷內痛脇支滿兩脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛虛則胷腹大脇下與腰背相引而痛取其經手少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者其變病刺郄中血者

邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調之其輸

黃帝曰手少陰之脉獨無輸何也岐伯曰脉脉也心者五藏六府之大主也心爲帝王精神之所舍其藏堅固邪不能客客之則傷心心傷則神去神去則身死矣故諸邪在於心之包者皆在心之包絡包絡者心主之脉也故少陰無輸焉少陰無輸焉獨取其經於掌後兌骨

澤皆瀉之此是手心包絡經脉又當胷脇支滿兩脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛取其經

00073465

之端也

手心主之脉起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黃善笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱盛者則寸口脉小於人迎虛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋間循經以上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則煩為煩心取之兩筋間

心病煩悶少氣大熱熱止溢心嘔吐厥逆狂語汗出如珠身體厥冷其脉當浮今反沈濡而滑其色當赤而反黑者此是水之刻火為大逆十死不治

小腸手太陽經病證第四

小腸病者少腹痛時窘之復耳前熱及手小指次指之間熱若此脉陷者此其候也

若寒甚獨有上熱及腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散之刺太陰以去之按其所過之經以調之

於肯取厥陰以下之原故取之肯結於厥 一作齊 取巨虛下廉以去之按其所過之

小腸有寒其人下重便膿血有熱必痔
小腸有宿食常暮發熱明日復止
小腸脹者小腹膨而痛
厥氣客於小腸則夢乘邑街衢
手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝
中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外
後廉出肩甲交肩上入缺盆絡心循咽
下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目兌
目却入耳中其支者別頰上頗抵鼻至目內眥斜絡
於顴是動則病嗌痛頷腫不可以顧肩似拔
後廉痛盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反

00073465

脾氣虛則四肢不用五藏不安實則腹脹泄瀉而
小便不利虛則夢歌樂體重手足不舉厥氣客於脾則夢丘陵
大澤壞屋風雨
盛則夢飲食不足得其時則夢築垣蓋屋脾氣
病在脾曰呿慧平旦甚日中持下晡靜
病先發於脾閉塞不通身痛體重一日之胃而腹脹
小便閉十日不已死冬人定夏晏食
脾脉搏堅而長其色黃當病心氣其實而散色不澤
者當病足骭腫若水狀

00073465

在反跌寸即跌爲寸疝黃月嗜脾
脉沈之而濡浮之而虛苦腹脹煩滿胃中有熱不
食食而不化使不來來而復出當風使大便難四肢苦痺時不仁得
女子同法得之疾使四肢汗出當風
口脉弦而滑則爲痛滑則爲實痛即爲急實即
陽脉浮而澁浮即胃氣微澁即胃氣衰微澁相搏
踊痛踊相搏即胃肋搶急
呼吸不得此爲脾家失度
陽脉微而澁微即無胃氣澁即傷脾寒在於膈而
脉俱緊即爲入其氣不出無表有裏心下痞堅
下之寒積不消胃微脾傷胃氣不通爲閉塞之病

在肖膊上虛下實穀氣不通爲秘塞之病
寸口脉緩而遲緩則爲陽甚遲則爲陰榮衛俱和剛柔相得三焦相承其氣必強
趺陽脉滑而緊滑即胃氣實緊即脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此爲胃氣有餘腹滿而不能食心下如飢此爲胃氣虛也得食而滿者此爲脾家不治
脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞤瞤而短氣也
凡有所擊仕若醉飽入房汗出當風則傷脾傷則
卅氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止

反下之寒積不消胃微脾傷却不氣不行食已自噫寒

00073465

名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑病人鼻下平者胃病也微赤者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治唇黑者胃先病微燥而渴者可治脣反出者此為脾先落一云絡一云故作先衣故

脾脹者善噦四肢急體重不能自收大四肢苦重津液不生但欲少氣小便難

脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但欲少氣小便難

趺陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而反不渴

凡人病脉以解而反暮微煩者見病者差安而強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

000073465

與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損
脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤久久
胠不收黃瘅食飲不爲肌膚以冬壬癸日得之
肝病傳脾脾病傳腎腎適以冬壬壬者不受邪脾復
欲還肝肝不肯受因留結爲積故知痞氣以冬得之
脾病其色黃飲食不消腹苦脹滿體重節痛大便不
利其脉微緩而長此爲可治宜服平胃圓瀉脾圓茱
萸圓附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺
大都季夏刺公孫秋刺商丘皆補之又當刺
十壯背第十一
椎百壯

脾病者必身重苦飢足痿不收素問作善肌肉痿足不仅行善痿
陽明少陰血者陽明少陰不食不化取其經足太陰

00073465

邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足陰氣有餘則寒中腸腹痛陰陽俱有餘
若俱不足則有寒有熱皆調其三里
足太陰之脉起於大指之端循大指内側白肉際過核
骨後上内踝前廉上踹内循脛骨後交出厥陰之前
上循膝股内前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本
散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌
本強食則嘔胃管痛腹脹善噫得後與氣則快
然而衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能
動搖食不下煩心心下急痛寒瘧溏瘕泄水閉黄疸
好卧不能食食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快
盛者則寸口大三倍於人迎虚者則寸口反小於人迎

000073465

足太陰之別名曰大三倍於人迎虛者則寸口反小
者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腹中切痛虛則
鼓脹取之所別

胃足陽明經病證第六

胃病者腹脹胃管當心而痛上支兩脇膈咽不通飲
食不下取三里
飲食不下膈塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之
在下管則散而去之
胃脉搏堅而長其色赤當病折髀其夾而散者當病

良痺髀痛

胃中有癖食冷物者痛不能食食熱即能食胃脹者腹滿胃管痛鼻聞焦臭妨於食食大便難

診得胃脉病形何如曰胃實則脹虛則洩

病先發於胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脛不通身之膀胱背脹煩痛小便閉五日上之脾閉塞不通身體重（靈臣云上之心）六日不已死冬夜半後夏日晡（六日一作三日）

脉浮而芤浮則爲陽芤則爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絶

趺陽脉浮者胃氣虛也趺陽脉浮大者此胃實而有胃氣也

芤故知芤而有胃氣者脉浮而微按之

陽脈數者胃中有熱即消穀引食趺陽脈濇者胃中有寒水穀不化趺陽脈麤麤而浮者其病難治趺陽脈虛則遺遺溺實則失氣

動作頭痛重熱氣朝者屬胃

厥氣客於胃則夢飲食

足陽明之脈起於鼻交頞中旁約太陽之脈下循鼻

外入上齒中還出挾口環脣下交承漿却循頤後下

廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱

其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃

支者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀關

抵伏菟下入膝臏中下循脛外廉下足跗入中指內

間其支者下膝三寸而別以下入中指外廉
別跗上入大指間出其端是動脈
伸數欠顏黑病至惡人與火聞木音則惕然而驚心
動欲獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁
響腹脹是爲骭厥是主血（血一作胃）所生病者狂癡（一作癔）
溫淫汗出鼽衄口口口嗌乾喘熱其有餘於胃則消穀善飢溺色
痛循膺乳衝股伏菟骭外廉足跗上皆痛中指不用
氣盛則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者則
人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

肺手太陰經病證第七

肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝胸憑仰息肺氣虛

則虛見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰肺
氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客于肺則夢飛揚見金鐵
之器奇物
病在肺下晡慧目中甚夜半靜
病先發於肺喘欬三日之肝脇痛支滿一日之脾閉
塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日
入夏日出
肺脉搏堅而長當病唾血其人濡而散者當病漏汗
至今不復散發
肺脉沈之而數浮之而喘洗洗寒熱腹滿腸中熱
小便赤肓背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風
白脉之至也喘而下實驚有積氣在胷中

喘而虛名曰肺癉寒熱得之因醉而使內也
肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹
形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆
而上行肺傷者其人勞倦則欬嗽唾血其脉細緊浮數
皆吐血此爲躁擾喜怒得之肺氣擁所致
肺脹者虛而滿喘欬逆倚息目如脫狀其脉浮
肺水者其人身體重而小便時大便鴨溏肝乘
肺必作虛
脉耎而弱弱反在關耎反在顛浮反在上弱反在下
浮則血不足必弱爲虛浮弱自別浮則爲
出弱則爲入浮則爲出不入此爲有表無裏陽出
入不出此爲無

出弱見寸沈入不出此爲無表有裏陽出極汗齊腰而還此爲無表有裏故名曰厥陽在當汗出不汗出跌陽脉浮緩少陽微緊緊微爲血虛緊爲微寒此爲鼠乳其病屬肺

肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不愈病洒洒寒熱氣逆喘欬發肺癰心病傳肺肺當傳肝肝適以春甲乙日得之何也欲還心心不肯受因留結爲積故知息賁以春得之肺病其色白身體但寒無熱時時欬其脉微遲爲可治宜服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺太淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸膻中百壯背第三椎二十五壯

肺病者必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰服腨
踹脹足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其
手太陰足陽明之外厥陰內少陰之外厥陰內少陰血者
邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣喘汗出欬動肩背
取之膺中外輸背第三椎之傍以手痛按之快然乃
刺之取之膺中以越之
手太陰之脉起於中膲下絡大腸還循胃口上膈屬
肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下
肘中後循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚
指之端其支者從腕後直次指內廉出其端是動則
病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞀
是爲臂厥肺所生病者欬上氣喘喝煩心胸滿

臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛寒少氣不足以息溺色
小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色
變卒遺失無度盛者則寸口大三倍於人迎虛者則
寸口反小於人迎也
手太陰之別名曰列缺起於腕一云上分間別走陽
明其別者並太陰之經直入掌中散入於魚際其實
則手兌掌起虛則欠欬小便遺數取之去腕一寸半
肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脉當短澀今
反浮大其色當白而反赤者有此是火之刻金爲大逆
十死不治

大腸手陽明經病證第八

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒則泄

當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉腸中雷
鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛
上廉三里
大腸有寒鶩溏有熱便腸垢
大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀
大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化
厥氣客於大腸則夢田野
手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉出
合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外
廉循臑外前廉上出髃骨之會上入柱骨之會
上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆直入
上頸貫頰入下齒縫中還出俠口交人中左之右右

之左上攸鼻孔是動則病齒痛頗腫是主津所生病者目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

腎足少陰經病證第九

腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑腎氣虛則夢見舟船溺人得其時則夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵沒居水中病在腎夜半慧日乘四季其下晡靜病先發於腎少腹腰脊痛脛痠三月之心心痛三日之小腸脫背胳筋巳死冬大食夏晏晡

腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其卒然而散者當病少血

腎脉小而沈之大而堅浮之大而緊苦手足骨腫厥而不興腰脊痛少腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之浴水中身未乾而合房內及勞倦發之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎痺

凡有所用力舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎

痺得之沐浴清水而臥

腎脉微者腹滿引背央央然腰髀痛

腎水病者其人腹大臍腫腰重痛不得溺陰下濕如牛

腎著之病從腰以下冷腰重如帶五千錢

黑脉之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎

浴水中身未乾而合房內及勞倦發之

不興腰脊痛少腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之

腎脉小而沈之大而堅浮之大而緊苦手足骨腫厥而不興腰脊痛少腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之

當病少血

腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其卒然而散者

腎著之病其人身體重腰中冷如水形狀如水形狀如坐水中
水形狀如坐水中反不渴小便自利食飲如故是其證也病屬下
膲從身勞汗出衣裏冷濕故發於少腹上至心下如豚奔走之
腎之病其人身體重腰中冷如水狀反不渴小便自利食飲如故是其證也病屬下
膲從身勞汗出衣裏冷濕故發於少腹上至心下如豚奔走之
狀上下無時久久得之不愈病喘逆骨痿少氣以夏丙丁
日得之何也脾病傳腎腎當傳心心適以夏王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受因留結爲積故知奔
豚以夏得之水流夜疾何以故師曰土休故流疾而有聲人亦應之人夜卧則脾不動搖脉爲之數疾也
腎病其人精氣虛弱吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時時失精飲食減少膝以下清其脉沈滑而遲此爲可
治宜服內補散建中湯腎氣丸薯蕷丸等當刺涌泉

秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏刺然谷季夏刺大溪
皆寫之又當灸京門五十壯背第十四椎百壯
腎病者必腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風虛即
陽痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少陰太
邪在腎則骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛
便難肩背頸項強痛時眩取之涌泉崑崙視有血
者盡取之
大經空虛發蹶少陰之脉起於小指之下斜趣足心出然骨之下
循內踝之後別入跟中以上腨內出膕內廉上股
內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入
肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中是

00073465

刺其病飢而不欲食面黑如炭色一作黯色欬唾則有血
唉嗚而喘坐而不得臥無所見心懸若飢狀氣
主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心
心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而
痛灸則強食而生害一作肉緩帶被髮大杖重負屨而
盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人
迎也
足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走大陽其別
者並經上走於心包下貫腰脊其病氣逆則煩悶實
則閉痙虛則腰痛取之所別跗上結痛氣衝於心甘
肾病手足逆冷面赤目

沈細而滑令反浮大其色當黑而反黃此是土之刻

水為大逆十死不治

膀胱病第十

膀胱病者少腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得肩上熱若脉陷足小指外側反脛踝後皆熱若脉陷者取委中

膀胱脹者少腹滿而氣癃病先發於膀胱脹者背胳筋痛小便閉五日之小腸脹一日之脾閉塞不通身腰脊痛脛痠一日之腎收腹痛體重二日不已死冬雞鳴反下晡一日夕一云

厥氣客於膀胱則夢遊行

足太陽之脉起於目內眥上額交巔上其支者從巔

至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊
內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中
下會於後陰下貫臀入腘中其支者從膊內左右別
下貫臗一作肺過髀樞循髀外後廉過下合腘中以下貫
腨內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝
頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲腘如
結腨如裂是爲踝厥是主筋所生病者痓瘧狂顛疾
頭腦項痛目黃淚出衄項背腰尻腘腨脛脚皆痛小
指不用盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反
小於寸口也

三焦手少陽經病證第十二

三焦病者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則

爲水留則爲脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間赤見於脉取委陽

少腹病腫不得小便邪在三焦膲上及胃管取三里

結脉與厥陰小絡結而血者腫上視其三焦膲脹者氣滿於皮膚殼殼然而堅不疼熱在上焦膲因欬爲肺痿熱在中焦膲因堅熱在下焦膲因溺血

手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈循屬三焦膲其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下額至頗其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目兑皆是動則病耳聾煇

人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

煩腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用盛者則

煇煇喘嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目允背痛

明新安吳勉學翻刻宋板

Bayerische
Staatsbibliothek
München

00073465

00073465

00073465

脉经 卷二

下

00073465

00073465

00073465

00073465

4° L. Sin. M 5222

脉經卷第七

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

病不可發汗證第一

病可發汗證第二

病發汗以後證第三

病不可吐證第四

病可吐證第五

病可下證第六

病不可下證第七

病發汗吐下以後證第八

病可溫證第九

病不可灸證第十

Bayerische Staatsbibliothek München

00073465

病可灸證第十一

病不可刺證第十二

病可刺證第十三

病不可水證第十四

病可水證第十五

病不可火證第十六

病可火證第十七

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八

重實重虛陰陽相附生死證第十九

熱病生死期日證第二十

熱病十逆死日證第二十一

熱病五藏氣絕死日證第二十二

少陰病脈細沈數病爲在裏不可發汗
脈浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脈遲
者不可發汗何以知然此爲榮氣不足血微少故也

病不可發汗證第二十三

熱病脈死日證第二十四

熱病損脈死日證第二十四

動氣在左不可發汗發汗則額上陷脈緊急而痓汗
動氣在右不可發汗發汗則胸上陷而渴心苦煩飲即吐水
躁煩溢則無血陽氣不足溢則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠
微則則陽氣不足一作濡而微弱溢則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠
脈濡而弱反在關濡反在上頭痛溢正反在下微反在上頭痛
少陰病脈微不可發其汗無陽故也
者不可發其汗何以知然此爲榮氣不足血微少故也
脈浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脈遲

00073465

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在
動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大
疼目運惡寒食即反吐穀不得前一云不消化穀
咽中閉塞不可發汗發汗則手足逆冷
欲得蹉卧不能自温
諸脉數動微弱並不可發汗發汗則大便難腹中乾
一云小便難胞中乾胃燥而煩其形相象根本
異源

脉濡而弱弱反在關濡反在上實下虛意欲得温微反在下
弦爲陽運微爲陰寒上實下虛弦反在上微反在下
不可發汗發汗則寒慄不能自還欬者則劇數吐涎
沫咽中必乾小便不利心中飢煩踡時而發其形似

瘧有寒無熱虛而悸則聲亂咽嗌悶悚故而發汗蹉而胸滿心痛作

膜中復堅

厥不可發汗發汗則聲亂咽嗌悶悚故而發汗蹉而胸滿心痛作

諸逆發汗微者難愈劇者言亂晴眩者死若發汗已復下之不

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒自可一日再三發其脈微

其人不嘔清便續自可復發熱而惡寒少

此爲陰陽俱虛不可復發汗也

太陽病發熱惡寒多寒少脈微弱者無陽也不可

復發發其汗咽乾燥者不可發汗

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

汗家不可攻其表汗出必額陷脈上促急而緊直視

而不能眴不得眠

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼可與禹餘粮圓

淋家不可發汗發汗必便血

瘡家雖身疼痛不可發汗發汗必痓（一作痙下同）

冬時發其汗必吐下利清穀不可攻其表汗出必胀滿

下利清穀不可攻其表汗出必逆冷

欬而小便利若失小便不可攻其表汗出則生瘡

汗出多極發其汗亦堅

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必發

汗出而厥者必發熱前厥者後必厥應下之而反發其

厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反汗

吐者必發熱前厥者後必厥

口傷爛赤病人脉數數爲有熱當消穀引食反

脉則爲數數爲客陽不

能消穀胃中虛冷故令吐也

傷寒四五日其脈沈煩而喘滿脈沈者病在裏反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則謵謵語

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出又自嘔者

下之益煩心懊憹如飢發汗則致痙身強難以屈伸

熏之則發黃不得小便久則致痙

太陽病發其汗因致痙

傷寒脈弦細頭痛而反發熱此屬少陽少陽不可發

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下

其汗

痞堅者不可發其汗

太陽病欬而下利謵語者被火氣劫故也小便必

少陰病欬而下利謵語者此火氣劫故也小便必

難以治强責少陰汗也

少陰病但厥無汗而强發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出一本作耳目者是爲下厥上竭爲難治

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脉異經病雖俱傷於風自有痼疾則不得同法其人素傷於風熱相薄則發風温四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗之復發

風因復傷於熱風熱相薄則發風温四肢不收頭痛言獨語内煩躁擾不得卧善驚目亂無精治之

身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗之復發

其汗如此者醫酌殺之也

温濕温病苦兩脛逆冷腹滿又肾頭目痛苦妄言治在

足太陰不可發汗
身青面色變名曰重暍如此者死醫殺之也有二首
大法春夏宜發汗病可發汗秋冬不可發汗
凡發汗欲令手足皆周至熱一時間益佳但不欲
如水流離若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不
得重發汗也
凡服桂湯藥發汗中病便止不必盡劑也
凡云可發汗而無湯者亦可用要以汗出為解
然不如湯隨證良
太陽病外證未解其脉浮弱當以汗解宜桂枝湯證
太陽病脉浮而數者可發其汗屬桂枝湯

000073465

陽明病脉遲汗出多微惡寒表未解可發其汗屬
桂枝湯證

太陽病脉浮大問病者言但堅耳設利者爲虛大逆堅
爲實汗出而解何以故脉浮當以汗解
寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者
發熱脉浮解之當以汗出愈

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽
明也榮行脉中爲陰主內衛行脉外爲陽主外榮氣和榮氣和而外不解此
病常自汗出此爲榮氣和而外復發
和其汗衛氣不和

病常自汗出此爲榮氣和而外復發
明脉浮虛者當發其汗屬桂枝湯證

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽
發熱脉浮解之當以汗出愈

傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者
爲實汗出而解何以故脉浮當以汗解

太陽病脉浮大問病者言但堅耳設利者爲虛大逆堅
桂枝湯證

也先其時發汗即愈屬桂枝湯證

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黄湯

太陽病不解熱結膀胱胱其人如狂血必自下下者即愈其外未解者尚未可攻當先解其外屬桂枝湯證

太陽病下之微出喘者表未解故也屬桂枝加厚朴杏子湯證

傷寒脉浮緊不發其汗因衄屬麻黄湯證

陽明病脉浮無汗其人必喘發其汗屬桂枝湯證

太陰病脉浮者可發其汗屬桂枝湯證

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解表候續在此當發其汗服湯微除發煩目瞑劇者必

00073465

衄血衄乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯證

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其大便反青一作清者小便此爲不在裏故在表也當發其汗頭痛者屬桂枝湯證

脈浮者病在表可發其汗屬桂枝湯證

下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱自發濡弱者汗自出惡風惡寒屬桂枝湯證

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔屬桂枝湯證

風屬桂枝湯證

太陽病發熱汗出此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪

太陽病下之氣上撞可與桂枝湯不撞不可與之
太陽病初服桂枝湯而反煩不解者法當先刺風池
風府却與桂枝湯則愈
燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貴豚氣從少
腹上撞心者灸其核上一壯與桂枝湯
太陽病項背強几几反汗出惡風屬桂枝加葛根湯
太陽病項背強几几無汗惡風屬葛根湯
太陽與陽明合病喘而胸滿者屬葛根加半夏湯
太陽與陽明合病不下利但嘔屬葛根湯
太陽與陽明合病自利不喘嘔者屬葛根湯證
太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促者表未
解喘而汗出屬葛根黃連湯
太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗

00073465

而喘屬麻黃黃湯證
太陽與陽明合病喘而胸滿不可下也屬麻黃黃湯證
太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也
躁頭痛屬大青龍湯脉微弱汗出惡風不可服之服
傷寒脉浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者
大青龍湯發之
傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利
或噎或小便不利少腹滿或微喘屬小青龍湯
者此寒去為欲解屬小青龍湯
陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久
按之氣不通 一作按 鼻乾不得汗嗜臥身及目悉

按之氣不通（一作按之不痛）鼠乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不溜加噦不治

太陽病十日以去脉浮細嗜卧此為外解設胷滿脇痛與小柴胡湯脉浮者屬麻黃湯證

中風往來寒熱傷寒五六日以後胷脇苦滿嘿嘿不欲飲食煩心喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞堅或胷脇滿微結小便不利或不渴外有微熱或咳或悸或小便不利或不渴身有微熱或欲嘔

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脇下滿手足温而

渴屬小柴胡湯證

00073465

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結
外證未去者屬柴胡桂枝湯
少陰病得之二三日無證故微發
三日麻黃附子甘草湯微發
脉浮小便不利微熱消渴與五苓散利小便發汗
病發汗以後不徹因
二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因
轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷不可
下下之為逆如此者可小發其汗設面色緣緣正赤
者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹不足
言陽氣怫鬱不得越當汗而不汗其人躁煩不知痛
處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人煩躁不
汗出而不徹故也更發其汗即愈何以知其

00073465

未持脉時病人手自冒心師因教試令欬而不即
欬者此必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故
發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘
發汗後水藥不得入口為逆若更發其汗病已差其人微煩
陽明病本自汗出醫復重發其汗液胃中乾燥故令其堅
不了了此大便已行若本日三四行今日再行者必知
大便雖堅以亡津液當還入胃中故知
必當大便也
發汗多又復發其汗此為亡陽皆譫語脉短者死脉

自利者不死

傷寒發其汗身目爲黃所以然者寒濕相搏在裏不解故也

病人有寒復發其汗胃中冷必吐蚘

太陽病發其汗遂漏而不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸

服桂枝湯大汗出若脉但洪大與桂枝湯若其形如瘧一日再三發汗出便解屬桂枝二麻黃一

傷寒脉浮自汗出小便數煩微惡寒而脚卽攣急反與桂枝欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以復其陽厥不和諺語可與承氣

00073465

甘草湯與之其脚即伸而胃氣不和譫語可與承氣湯必復發其汗復加燒針者屬四逆湯

傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可復發其汗屬桂枝湯

發汗後身體疼痛其脉沈遲屬桂枝加芍藥生薑人參湯

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可以麻黃杏子甘草石膏湯

發汗過多以後其人叉手自冒心心下悸而欲得按之屬桂枝甘草湯

發汗後其人臍下悸欲作賁豚屬茯苓桂枝甘草大棗湯

發汗後腹脹滿屬厚朴生薑半夏甘草人參湯

發其汗不解而反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯

太陽病發汗若大汗出胃中燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

發汗已脉浮而數復煩渴者屬五苓散

傷寒汗出而渴屬五苓散證不渴屬茯苓甘草湯

太陽病發其汗汗出不解其人發熱心下悸頭眩身瞤而動振振欲擗地屬眞武湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴而利屬生薑瀉心湯

傷寒發熱汗出不解後心中痞堅嘔而下利屬大柴胡湯

太陽病三日發其汗不解蒸蒸發熱者屬於胃也屬
承氣湯
大便四日以上者宜此湯
四逆湯
發汗多亡陽譫語者不可下與此湯
衛氣不和先發汗出反惡寒者此湯主之
病不可吐證第四
太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒發熱關
上脉細而數此醫吐之過也若得病一日二日吐
腹中飢口不能食三日四日吐之不喜糜粥欲食冷
食朝食暮吐此醫吐之所致也但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲

00073465

近衣此爲吐之內煩也

少陰病飲食入則吐心中温温欲吐復不能吐始得

之手足寒脉弦遲胸中實不可下若膈上有寒飲

乾嘔者不可吐當温之

諸四逆厥者不可吐之虛家亦然

病可吐證第五

大法春宜吐

凡服湯吐中病便止不必盡劑也

病如桂枝證其頭不痛項不強寸口脉微浮胸中痞

堅氣上撞咽喉不得息此爲胸有寒當吐之

病胸上諸實胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而

反有物濁唾下利則止十餘行其脉反遲寸口微滑此可

吐之吐之利即止
少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐當遂吐之
病者手足厥冷脉乍緊邪結在肖中心下滿而煩飢
能食病在肖中當吐之
病不可下下之當吐而下之證第六
脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濁反在下
微則陽氣不足濁則無血陽氣反微中風汗出而反
濁則煩濁則無血而且寒陽微不可下下之則心下
悸
動氣在右不可下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩
痞堅
躁煩濁則無血陽微不可下下之則心下
微
脉濡而弱弱反在關濡反在下

動氣在左不可下之則腹裏拘急食不下動氣友
劇身雖有熱卧反欲蹈
泄欲水自灌
動氣在上不可下之則掌握熱煩身浮冷熱汗自
穀心下痞堅
咽中閉塞不可下之則上輕下重水漿不下卧則
欲蹈身體急痛復
諸外實不可下之則發微熱亡脉則厥當臍握熱
諸虛不可下之則渴引水者易愈惡水者劇
脉濡而弱弱反在上微反在下
弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得温微弦爲虛

00073465

虛者不可下微則利不休肖中如蟲蝕狀為蚘蟲齧齒粥入則出小便不利而小便為蚘蟲齧齒粥入則出小便不利而
喘息為難頸背相牽臍則不仁極寒反汗出軀冷若
冰眼睛不慧語言不休穀氣多入則為除中口雖欲
言舌不得前

脉濡而弱反在關濡反在巔浮反在上數反在下
浮則為陽虛數則為無血浮則生熱浮則
為虛自汗而惡寒數則為痛而振振而寒慄微弱在關肖
下為急喘汗不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相
搏其形如瘧醫反下之令脉急喘汗不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相
下為赤痢少腹甚堅小便血也
脉濡而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛中風發

00073465

熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫以爲大熱解
肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒
起而頭眩客熱在皮膚悵悵快不得眠不知胃氣冷
寒在關元枝巧無所施汲水灌其身客熱應時罷慄
慄而振寒重被而覆之汗出而厥冒巔微難寒氣因
便爲微逆身冷而得安手足厥冒巔不得安手足爲
倒不得安手足爲微逆身冷而內煩遲欲從後救安
可復追還

脉浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤陽獨
下陰部小便難胞中虛冷反小便利而大汗出法當
家當微冷反更實津液四射榮竭血盡干煩不眠血
薄肉消而成暴液醫復以毒藥攻其胃此爲重虛客

陽去有期必下如汚泥而死

少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱

必煩利不止

於藏故邪氣浮之與皮毛相得脉數者不可下下之

脉數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却結

數脉不時則生惡瘡病者則飢數仲景前字作法

飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脉反浮其數改當遲緩脉因

堅氣噫而除今噫而除何以言之脾

脉本緩今數脉先微脉反但浮其人必便堅氣噫

數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其

跌陽脉遲而緩胃氣如經跌陽脉浮而數浮則傷胃

陽去有期必下如汚泥而死

00073465

澁者復不可下之

脉浮大應發其汗醫反下之此爲大逆

脉浮而大心下反堅有熱屬陽明欲自汗出不惡寒若太陽證不罷不可下

凄數大便堅則汗多即熱愈汗少則難脉遲尚未可攻

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因

轉屬陽明欲自汗出不惡寒若太陽證不罷不可下

下之爲逆

結胸證其脉浮大不可下下之即死

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下之

太陽與少陽併病心下痞堅頸項強而眩勿下之

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

病欲吐者不可下之

太陽病有外證未解不可下下之爲逆

太陽病有外證未解不可下下之爲逆
病發於陽而反下之熱入因作結胸發於陰而反下之因作痞痞脉浮大者屬陽也按之反澁者屬陰也浮大爲陽多有熱下之則堅而緊反入裏因作痞
夫病作痞痞脉浮大者屬陽也按之反澁者屬陰也浮大爲陽多有熱下之則堅而緊反入裏因作痞
之因作痞痞脉浮大者屬陽也按之反澁者屬陰也浮大爲陽多有熱下之則堅而緊反入裏因作痞
本虛攻其熱必噦噦之必清穀而腹滿
無陽陰強而堅下之益甚腹滿而吐食不下下之益甚腹滿時自痛
太陰之爲病腹滿而吐食不下下之益甚腹滿時自痛
肖下結堅
厥陰之爲病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食甚
者則欲吐下之不肯止
少陰病其人飲食入則吐心中温温欲吐復不能吐
始得之手足寒脉弦遲此肖中實不可下也

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下下之亡血死

傷寒發熱但頭痛微汗出發其汗則不識人重之則譫語喘不得小便心腹滿下之則短氣而腹滿小便難頭痛背強加溫針則發狂必衄

傷寒其脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者脉初來大漸漸小更來漸大是其候也惡寒甚者急醫復發之咽中則傷出喉中痛熱多者目赤睛不慧醫復發之咽閉寒多清穀熱多便膿血重之則發黃尻熨之則咽燥小便利者可救難者必危殆

重便膿血頭痛目黃鼻衄不可制貪水者下之咽中生瘡假令手足溫者下之目閉貪水者下其脉

胎漏藏結無陽證寒而不熱傷寒論云不熱者寒

堅乃可攻之

但頭堅後溏未成其堅攻之必溏當須小便利定

與承氣湯一升不大便六七日小便少者雖不

四日雖能食以承氣湯少與微和之令小安至六日

得病二三日脉弱無太陽柴胡證而煩躁心下堅至

其人反靜舌上

上胎者下之若下之早則戰慄陰陽俱虛惡水

者厥其聲嚶咽喉塞發其汗則則血復發

必便膿血頭痛目閉貪水者下之其脉

重下之咽中生瘡假令手足温者

00073465

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之
陽明病潮熱微堅者亦可與承氣湯不堅不可與若不大便七日恐有燥屎欲知之法可少與小承氣湯和之若轉失氣者此爲有燥屎乃可攻之若不轉失氣者慎不可攻之攻之必腹滿能食欲飲水者即噦其後發熱者必復堅以小承氣湯和之若不轉失氣者慎不可攻之
陽明病身合色赤者不可攻也必發熱色黃者小便不利也
陽明病當心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者死
止者愈

不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜

不可攻之當須自欲大便宜以導
根及猪膽汁皆可以導
下利其脉浮大此爲虛以強下之故也設脉
爾腸鳴屬當歸四逆湯
病可下證第七
大法秋宜下
凡可下者以湯勝圓散中病便止不必盡三服
陽明病發熱汗多者急下之屬大柴胡湯
少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之屬承氣湯
少陰病六七日腹滿不大便者急下之屬承氣湯證
少陰病下利清水色青者心下必痛口乾燥者可下
之屬大柴胡湯承氣湯證

00073465

下利三部脉皆平按其心下堅者可下之屬承氣湯證
陽明與少陽合病而利脉不負者爲順負者爲失也互
相刻賊爲負
滑而數者有宿食當下之屬大柴胡承氣湯證
傷寒後脉沈沈爲内實（玉函云脉沈實）
柴胡湯證
傷寒六七日目中不了了晴不和無表裏證大便
微熱者此爲實急下之屬大柴胡承氣湯證
太陽病未解其脉陰陽俱停必先振汗出解但陽微
者先汗之而解但陰微者先下之而解屬大柴胡湯

承氣湯證

脉雙弦遲心下堅大而緊者陽中有陰可下之屬

承氣湯證

結胸者項亦強如柔痙狀下之即和

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之屬大陽病發熱而脉微沈反不結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

太陽病六七日表證續在其脉反沈結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

柴胡湯證

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之屬大陽病六七日表證續在其脉反沈結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

發狂

太陽病六七日表證續在其脉反沈結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

柴胡湯證

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之屬大陽病六七日表證續在其脉反沈結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

太陽病身黃其脉沈結少腹堅小便不利者下血

柴胡湯證

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之屬大陽病六七日表證續在其脉反沈結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

太陽病身黃其脉沈結少腹堅小便不利者下血

便自利其人如狂者血證諦屬抵當湯證

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此爲血

太陽病六七日表證續在其脉反沈結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

太陽病身黃其脉沈結少腹堅小便不利者下血

便自利其人如狂者血證諦屬抵當湯證

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此爲血

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃但頭汗出

太陽病六七日表證續在其脉反沈結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

太陽病身黃其脉沈結少腹堅小便不利者下血

便自利其人如狂者血證諦屬抵當湯證

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此爲血

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃但頭汗出

當下之屬抵當圓證

太陽病六七日表證續在其脉反沈結胸其人發狂此熱在下焦以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯證

太陽病身黃其脉沈結少腹堅小便不利者下血

便自利其人如狂者血證諦屬抵當湯證

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此爲血

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃但頭汗出

陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃但頭汗出

00073465

其身無有齊頸而還小便不利渴引水漿不
在裏身必發黃屬茵蔯蒿湯
陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本此爲瘀熱
故令喜忘雖堅大便必黑屬抵當湯證汗出而譫語
者有燥屎在胃中此風也過經乃可下之若早
語言亂以表虛裏實故也下之則愈屬大柴胡湯承
氣湯證
病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發者屬陽明
脉實者當下之屬大柴胡湯承氣湯證
牧若能食者但堅耳屬承氣湯證
太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人執水執汗出

有時頭痛心下痞堅滿引脇下痛則嘔氣干

出不惡寒此爲未入陰但陽尚未盡解也設入陰必發熱心下痞堅滿引脇下痛嘔則短氣汗

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外未解尚未可攻當先解外外解小腹急結者乃可攻之屬桃人承氣湯

傷寒七八日身黃如橘小便不利少腹微滿屬茵蔯蒿湯證

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱屬大柴胡湯證

但結胸無大熱此爲水結在胸脇頭微汗出與大陷胸丸

肾湯

堅與大陷肾湯

傷寒六七日結胸熱實其脉沈緊心下痛按之如石

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人

00073465

陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅者
則譫語屬承氣湯證
陽明病不吐下而心煩者可與承氣湯
陽明病其脉遲雖汗出而不惡寒其體一本作人必重短
氣腹滿而喘有潮熱外爲解可攻其裏若
手足濈然汗出者此大便已堅屬承氣湯其熱不潮
未可與承氣湯若腹滿大而不大便者屬小承氣湯
微和胃氣勿令至大下

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足濈濈汗出大便
虛爲難治不可更與承氣湯
陽明病脉遲汗出而不惡寒表證罷但發潮熱手足濈濈汗出大便
雖鞕而反微澀者此爲裏

二陽併病太陽證罷但發潮熱譫語者下之愈屬承氣湯證

難而遽欲小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能

卧者有燥屎也屬承氣湯證

病發汗吐下以後證第八

師曰病人脉微而澁者此爲醫所病也大發其汗又

數大下之其人（仲景作欲）著複衣冬月盛寒而與亡血病當惡寒而發熱無休止時夏

月盛熱而與（仲景作欲）著複衣冬月盛寒而與（仲景作欲）裸其

體所以然者陽微即惡寒陰弱即發熱故（仲景作醫）發其

汗使陽氣微又大下之令陰氣勝冷故與（仲景作欲）著複

表胃中虛冷以裸陽氣內微不能勝冷故與（仲景作欲）著複

衣十一月之時大下之令陰氣內竭不能煩熱以陰氣在裏胃中煩熱以陰氣內竭不能

00073465

勝熱故與（仲景作欲）裸其體又陰脈遲澁故知亡血

太陽病三日已發其汗吐下溫針而不解此爲壞病桂枝復不中與也觀其脈證知犯何逆隨證而治之

桂枝復不中與也觀其脈證知犯何逆隨證而治之脉浮數法當汗出而愈而下之則身體重心悸不可發其汗當自汗出而解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏兼實津液和即自汗出愈

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者必自愈

大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便利必自愈

下以後復發其汗必振寒又其脉微細所以然者內外俱虛故也

00073455

外俱虛故也

太陽病先下而不愈因復發汗表裏俱虛其人因冒冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足温醫

然後下之

不能多 多一作食 其人胸下重本渴飲水而嘔柴胡湯復不

難與柴胡湯後必

中與也食穀者歲

太陽病三三日終不能卧但欲起者心下必結其脈

微弱者此本寒也而反下之利止者必結胸未止者

四五日復重下之此挾熱利也

太陽病下之其脈促不結胸者此爲欲解也

必結胸其脈緊者必咽痛其脈弦者必兩脇拘急其

00073465

脉細而數者頭痛未止其脉沈而滑者挾熱利也其脉浮而滑者必下血太陽少陽併病而頭項強痛或眩冒時如結胸心下堅欲嘔其脉沈而緊者必下利不復止水漿不肯下其人必心煩

脉浮緊而下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

傷寒吐下發汗虛煩脉甚微八九日心下痞堅脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也

陽明病脉遲食難用飽飽即發煩頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下之其腹滿如故耳所以然者脉遲故也

太陽病十餘日反二三下之後發熱而汗出復惡寒不

00073455

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此爲醫下之也傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也吐下發汗後其人脈平而小煩者以新虛不勝穀氣故也

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則此表裏俱虛陰陽則陰獨復加火針困而煩面色青黃膚瞤如此者爲難治今色微黃手足温者易愈

痛小便不利屬桂枝去桂加茯苓朮湯

服桂枝湯下之頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微

太陽病先發其汗不解而下之其脉浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脉則愈屬桂枝湯下以後復發其汗則譫語不渴而無表證其脉沈微身無大熱屬乾薑附子湯傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞胷起即頭眩其脉沈緊發汗即動經身爲振搖屬茯苓桂枝朮甘草湯發汗吐下以後不解煩躁屬茯苓四逆湯傷寒發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹屬梔子豉湯若少氣梔子甘草湯若嘔梔子生薑湯若胷滿者梔子厚朴湯

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而凶胷中痛大便

00073455

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者與承氣湯不爾者不可與欲嘔胸中痛微溏此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胸湯

傷寒五六日其人已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解屬柴胡桂枝乾薑湯

傷寒汗出若吐下後心下痞堅噫氣不除者屬旋

復代赭湯

00073465

大下以後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可以
麻黃杏子甘草石膏湯
傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不
可攻其痞當先解表表解乃攻其痞解表屬桂枝湯
攻痞屬大黃黃連瀉心湯
傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時
惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升屬白虎湯
傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日
晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼神之狀若劇者發
濈者死微者但發熱譫語屬承氣湯若下者勿復服
三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺
溺發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷自汗屬

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺溺發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷白汗屬

白虎湯證

陽明病其脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反偏惡熱其身體重發其汗即躁心憒憒而反譫語加溫針必怵惕又煩躁不得眠下之即胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者屬梔子湯證

陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出屬梔子湯證

人腹微滿頭堅後溏者不可攻其

湯證

太陽病吐下發汗後微煩小便數大便因堅者可與小

00073465

承氣湯和之則愈
大汗若大下而厥冷者屬四逆湯證
太陽病下之其脉促胷滿者屬桂枝去芍藥加附子湯
傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者未欲解也屬梔子湯證
傷寒下後煩而腹滿卧起不安屬梔子厚朴湯
傷寒醫以圓藥大下之後煩屬梔子乾薑湯
裏身體疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救
表宜桂枝湯
太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴胡證

00073455

鬱鬱微煩者爲未解與大柴胡湯下之則愈

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本當柴胡湯下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後屬柴胡加芒消湯

傷寒十三日過經而譫語內有熱也當以湯下之小便利者大便當堅而反利其脈調和者知醫以丸藥下之非其治也自利者其脈當微厥今反和者此爲內實屬承氣湯證

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側屬柴胡加龍骨牡蠣湯

00073465

火逆下之因燒針煩躁屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯

太陽病脉浮而數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒其表未解動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則遲遲頭痛即醫反下之動數變則爲氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因堅則爲結胸屬大陷胸湯若不結胸但頭汗出餘無有齊頸而還小便不利身必發黃

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在復蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而堅痛者此爲結胸屬大陷胸湯若但滿而不痛者此爲不中與也屬半夏瀉心湯

本以下之故心下痞與之瀉心湯其痞不解其人渴而

不中與也屬半夏瀉心湯

本以下之故心其痞不解其人渴而口燥小便不利者屬五苓散一方言忍之一日乃愈

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔煩不能得安醫見心下痞爲病不盡復重下之其痞益甚此非結故使之堅屬甘草瀉心湯

傷寒服湯藥而下利不止心中痞堅服瀉心湯已後以佗藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者不治今利其小便

太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止心下痞硬表裏不解者桂枝人參湯

00073465

傷寒吐後腹滿者與承氣湯
病者無表裏證發熱七八日脈
令下已脉數不解合熱則消穀喜飢至六七日
便者有瘀血屬抵當湯若脉數不解而不止必
便膿血
太陽病醫反下之因腹滿時痛爲屬太陰屬桂枝加
芍藥湯
大實痛屬桂枝加大黃湯
傷寒六七日其人大下後脉沈遲手足厥逆下
不至候咽不利垂膿血泄利不止爲難治屬麻黃部脉
麻湯
傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更遂吐
入即出屬乾薑黃芩黃連人參湯

逆吐一本作更下

大法冬宜服溫藥及汞
師曰病發熱頭痛脉反沈若不差身體更痛
其裏宜溫藥四逆湯

病可溫證第九

下利腹滿身體疼痛先温其裏宜四逆湯

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當温之宜四逆湯

少陰病其人飲食入則吐心中温温欲吐復不能吐
始得之手足寒脉弦遲若膈上有寒飲乾嘔者不可
吐當温之宜四逆湯

吐下發陰病脉沈者急當温之宜四逆湯

下利脉遲緊爲痛未欲止當温之得汗者滿而便腸垢
下利其脉浮大此爲虚以強下之故也設脉浮革因
爾腸鳴當温之宜當歸四逆湯
少陰病下利脉微澁者即嘔汗出必數更衣反少當
温之宜四逆湯
傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急當救
裏宜温之以四逆湯

病不可灸證第十

微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虚逐實
血散脉中火氣雖微内攻有力焦骨傷筋血難復也
脉浮發熱無從去因火而盛病從
腰以下必當重而痺此爲火逆若欲自解當先

乃有汗隨汗而解何以知之脉浮故知汗出脉浮
必唾血 病可灸證第十一
脉浮熱甚而灸之此爲實實以虛治因火而動咽燥
燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發貴脉氣從
少腹上撞者灸其核上一壯一云本作各一壯與桂枝加桂湯
少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之
灸其少陰七壯
少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死脉不至者
灸厥陰七壯
溫其上灸之一云可灸五壯
諸下利皆可灸足太都五壯一云可灸七壯商丘陰陵泉皆三壯

00073465

下利手足厥無脉灸之不温反微喘者死
陽者為順也
傷寒六七日其脉微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還
者死
傷寒脉促手足厥逆可灸之
病不可刺已刺無怒大一作已新
已刺無煩無内
大怒氣無刺大一作已新
大醉無刺
已刺無飽
大渴無刺
已刺無渴
大飢無刺
已刺無飢
大驚無刺
已刺無驚
大勞無刺
已刺無勞
大飽無刺
已刺無飽
無刺大驚
已刺無飢
無刺大飢
已刺無渴
無刺大渴
已刺無煩
無刺大煩
已刺無内
無刺大怒
已刺無怒
無刺病不可刺
已刺無煩躁灸其厥陰厥不還
無刺傷寒六七日其脉微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還
無刺傷寒脉促手足厥逆可灸之
無刺陽者為順也
無刺陰者為順也
無刺陰陽皆爭者勿刺也其可刺者急取之不汗則
無刺大渴無刺渾渾之脉身熱

甚陰陽皆爭者勿刺也其可刺者急取之不汗則澁所謂未生先治也無刺病與脉相逆者上工刺其次刺未盛其次刺已衰粗工逆此謂之伐形出九卷

病可刺證第十三

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再經者當針足陽明使經不傳則愈

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府乃與桂枝湯則愈

傷寒腹滿而譫語寸口脉浮而緊者此爲肝乘脾名縱當刺期門

傷寒發熱盡盡惡寒其人大渴欲飲酢漿者其腹必清而利其病欲解此爲肝乘肺名曰橫

00073465

當刺期門

陽明病下血而譫語此爲熱入血室但頭汗出者則愈

刺期門隨其實而瀉之濈然汗出者則愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脉遲身涼胸脇下滿如結胸狀其人譫語此爲熱入血室無虛實而取之平病云熱入血室當刺期門隨其虛實而取之

犯胃氣及上三焦與此相反豈謂藥不謂針耶

室當刺期門隨其氣及上三焦與少陽併病頭痛頸項強而眩時如結胸狀譫語者此謂藥不止當刺肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語譫語則脉弦譫語五日不止當刺期門

太陽與少陽併病頭痛頸項強而眩時如結胸狀譫語者此謂藥不止當刺肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語譫語則脉弦譫語五日不止當刺期門

痞堅當刺大杼第一間肺輸肝輸慎不可發汗發汗則譫語譫語則脉弦譫語五日不止當刺期門

少陰病下利便膿血者可刺

婦人傷寒懷身腹滿不得小便從腰以下重如有

水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺寫
人傷寒懷身腹滿不得小便加從腰以下重如有
婦
勞宮及關元小便利則愈
傷寒脈浮而緊浮者風也緊者寒也風寒俱入三分補之
針汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也
問曰病有汗出而煩滿不解者何對曰病有熱者風也有熱而煩滿者厥也
曰風厥云何答曰風厥陽主氣故先受邪少陰與之爲表裏刺之飲之湯
得熱則上從之則厥治之表裏取之諸陽五十九刺以
熱病三日氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以
寫其熱而出其汗實其陰以補其不足所謂五十九
刺者兩手外內側各三凡十二痏五指間各一凡八
痏足亦如是頭入髮一寸傍三分各三凡六痏更入

髮三寸邊各五凡十痏耳前後口下項中各一凡六
痏顛上一
熱病先虛膚痛窒鼻充面取之皮以第一針五十九苛
菌爲病嘿嘿不得臥鼻乾不得索之皮於肺不得索之火火心也
熱病嗌乾多飲善驚臥不能安取之膚肉以第六針
五十九苛
熱病而肖脇痛手足躁取之筋間以第四針於脾不得索之木木肝也
熱病數驚瘛瘲而狂取之脉以第四針急寫有餘者
作筋辟目浸索筋於肝不得索之金金肺也
癲疾毛髮去索血脉一作於心不得索之水水腎也
熱病而身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四針五
十九苛病食超齒牙齒耳清索骨於腎無一本作不得索之

土土脾也

熱病先身濇傍教太素作倚煩悶乾寒汗出乾寒汗出乾
熱病頭痛攝攝一作顳顬翻目脉緊善衄厥乾脣嗌取之以第
三針視有餘不足實寒熱病體重腸中熱取之以第四針於其輸及下諸指
間索氣於胃絡得氣也
熱病脇痛急肖脇支滿取之滿泉與太陰陽明一云前陵泉
以第四針針嗌裏
熱病而汗且出反脉順可汗者取之魚際太淵大都
太白寫之則熱去補之則汗出汗出太甚者取踝上
横文以止之

熱病七日八日脈口動喘而眩者急刺之汗且自出
淺刺手大指間
熱病先胃脇痛手足躁刺足少陽補手太陰瀉
五十九刺
熱病先手臂痛刺手陽明太陰而汗出止
熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止
熱病先身重骨痛耳聾目瞑刺足少陰病甚爲五十
一云刺少陽
九刺
熱病先眩冒而渴刺足少陰少陽
熱病始足脛者先取足陽明而汗出
病不可水漬必喘以水灌之亦喘
發汗後飲水多者必喘以水潠之

傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹滿不能食欲飲水者即噦

中不轉失氣者此為但頭堅後溏不可攻之攻之必

下利其脉浮大此為虛以強下之故也設脉浮革因

陽明病若胃中虛冷其人不能食飲水即噦

病在陽當以汗解而反以水噀之若灌之其熱却不

得去益煩皮上粟起意欲飲水反不渴宜文蛤散若

不差與五苓散若寒實結胸無

肯湯自散亦可身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水
噀之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令
汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法
寸口脈浮大醫反下之此為大逆浮即無血尺中
出水得寒氣相搏即為腸鳴醫乃不知而反飲水令
寸口脈濡而弱濡即惡寒弱即發熱濡弱相搏藏氣
衰微肾中苦煩此非結熱而反薄居水漬布令銚貼
之陽氣遂微諸府無所依陰脈擬聚結在心下而不
救聚寒心下當柰何也

病可水證第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈太陽病寸口緩閉上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此爲醫下也若不下其人復不更衣十日無所苦也欲飲水者但與之當以法救渴宜五苓散

寸口脉洪而大數而滑洪大則榮氣長滑數則胃氣實榮長則陽盛憎鬱不得出身胃實則堅澁難太便則乾燥三焦閉塞津液不通醫發其汗陽盛下之胃燥熱盛大便遂損小便不利榮衛相搏心煩發熱兩眼如火鼻乾面赤舌燥齒黃焦故大渴過經

00073465

成壞病針藥所不能制與水灌枯槁陽氣微散身寒温衣覆汗出表裏通然其病即除形脉多不同此愈霍亂而頭痛發熱多欲飲水屬五苓散身體疼痛熱多欲飲水屬五苓散嘔吐而病在膈上後必思水者多與猪苓散飲之水亦得也

病不可火證第十六

人陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流洟失其常度兩陽相熏灼其身發黃但頭汗出齊頸而還便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出齊頸而還腹滿而微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞

歲手足躁擾捻衣摸床小便利者其人可治

歲手足躁擾循衣摸床小便利者其人可治
太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因而煩面色青黃膚瞤如此者為難治今色微黃手足温者愈

傷寒加温針必驚

陽脉浮陰脉弱則血虛血虛則筋傷其脉沈者榮氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也榮衛俱微加燒針血留不行更發熱而躁煩也

傷寒脉浮而醫以火迫劫之亡陽驚狂臥起不安屬桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

問曰得病十五六日身體黃下利狂欲走師脉之言當下清血如豚肝乃愈後如師言何以知之師曰

00073465

寸口脉陽浮陰濡弱陽浮則爲風陰濡弱爲少血浮
虛受風少血發熱頭眩胷加重與強頭眩胷客熱因火而發惡寒洒淅項
令汗出惡寒遂其陽氣從鼻出血而復下之胃氣
爲黃小便微難短氣佛欝蒸肌膚
泄利遂不止熱瘀在膀胱爲結成積聚狀如豚肝當
下未下心亂迷憒狂走赴水不能自制畜血若去目
明心了此皆醫所爲無他禍患微輕得愈極者不治
傷寒其脉不弦緊而弱者必渴被火必譫言弱者發
熱脉浮解之當汗出愈
太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必有
清血
陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃
陽明病其脉浮浮緊胸中乾口苦腹滿而喘發熱汗出而

不反少反難太竭汗燥必發譫語加温針必林惕又煩躁不得眠也少便必
反多陰病欬而下利譫語是爲強責少陰陽病二日而愈
其足頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也
汗從腰以下不得汗其人欲小便反不得小便反不得
下惡風大便堅者小便當數而反不數及多便已
病可火攻第十七

枳實貝母尉之

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第六

問曰温病汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗亦能食而病名爲何對曰名曰陰陽交者死人所以汗出者是邪生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗能食而不復邪却而精勝精勝則當能食食而不復氣也今汗出而脈躁疾者精氣交爭於骨肉而得汗出者是邪却而精勝精勝則當能食食而不復邪却而精無俾也汗而熱留者是邪生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗出而脈躁盛者死此令汗出輒復熱熱者邪勝也不能夫汗出者精氣也今汗出而脈不與汗相應此不勝其病也狂言者是失志失志者死有三死不見一生雖愈必死

而脈已得汗而脈靜者生也熱病已得汗而脈躁盛此陽脈之極也死其得汗

熱病脈靜者生也而脈尚躁盛而不得汗者此陽脈之極也死

熱病已得汗而脈尚躁盛而不得汗者生也已得汗而脈尚躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死

熱病已得汗而脈靜者生也

熱病煩已而汗出而脈當靜

熱病陰陽交者死復得汗脈靜者生

太陽病脈反躁盛者是陰陽交寸口脈兩衝尚躁盛

熱病脈躁煩身躁太陰寸口脈尚躁盛

是陰陽交死得汗脈靜者生

熱病陽進陰退頭獨汗出死陰進陽退腰以下至足

汗出亦死陰陽俱進汗出已熱如故亦死陰陽俱退汗出已寒慄不止鼻已氣冷亦死

少陰病惡寒而蜷時時自煩欲去衣被者可治

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰病虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

少陰病吐利躁逆者死

少陰病六七日息高者死

少陰病脉微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日不煩而躁者死

少陰病惡寒而蜷時時自煩欲去衣被者可治

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰病虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

少陰病吐利躁逆者死

少陰病六七日息高者死

少陰病脉微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日不煩而躁者死

雖熱治熱病一治一作活

熱病所謂并陰者熱病已得汗因得泄是謂并陰故不汗出若衄是謂并陽故治陽并陰陽并陽陰右熱病并陰陽部

脉尚躁盛大熱汗出不治

脉尚躁盛大熱汗出

少陰病下利止惡寒而踡時時自煩欲去其衣被者可治

暴出者死微細者生 右少陰部

傷寒六七日其脉微手足厥逆煩躁灸其厥陰厥不還 一本作乾嘔 服湯藥其脉

傷寒脉不能卧者死

傷寒發熱下利厥逆躁不止者死

傷寒發熱而利至厥不止者死

傷寒厥逆六七日不利便發熱而利者生其人汗出

利不止者死但有陰無陽故也

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下之

亡血死

傷寒發熱而厥七日下利者爲難治 右厥逆部

00073465

熱病不知所痛不能自收口乾陽熱甚陰頗有集者
熱在髓死不治
熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲不止腹
大而脹尚不厭飲目無精光死不治
脾傷即中風陰陽氣別離陰不從陽故以言分候其死生
傷寒亓利日十餘行其人脉反實者死謂其人形損故也
病者脇下素有痞而下在臍傍痛引少腹入陰俠陰
筋此爲藏結死
夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲鄭聲者重語是也直視譫語
喘滿者死若亓利者亦死
結胸證悉具而躁者死
吐舌下卷者死唾如膠者難解舌頭四邊徐有津液

吐舌下卷者死舌頭四邊徐有津液
此爲欲解病者至經上脣有色脉自和爲欲解色急
者未解右陰陽竭盡部

重實重虛

問曰何謂虛實對曰邪氣盛則實精氣奪則虛重實
者肉大熱病氣熱脉滿是謂重實問曰經絡俱實何
如對曰經絡皆實是寸脉急而尺緩也皆當俱治故
曰滑則順濇則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨
肉滑利可以長久寒氣暴上脉滿實實而濇逆則死
生逆則死所謂重虛對曰脉虛氣虛尺虛是謂重虛也所
問曰何謂重虛手足寒也

00073465

謂氣虛者言無常也尺虛者行步匡然也脉虛者不象陰也如此者滑則生濇則死氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非其時則死餘藏皆如此也

脉實滿手足寒頭熱者春秋則生當其時則死餘藏氣不足經氣有餘脉熱者死絡氣逆

濇濇而身有熱者死絡氣不足經氣有餘脉熱而尺寒秋冬為逆春夏為順經虛絡滿者尺熱滿而寒濇

春夏死秋冬生絡滿經虛灸陰刺陽經滿絡虛刺陰灸陽問曰秋冬無極陽春夏無極陰春夏無極陽何謂也對曰無極陽者春夏無虛陽明陽明虛則死重實

冬無無數虛太陰太陰虛則狂無極陰者秋冬無虛少陰少陰虛則死重虛

腰以下寒陽氣上爭還心腹滿者腰以下足熱腰以上寒陰氣下爭還得汗者陰陽生相附部

00073465

腰以下寒陽氣上爭還得汗者生（布陰陽相附部）

熱病生二十

太陽之脈色榮顴骨熱病也榮未夭曰今且死期日證第一

時自已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病氣

內連腎少陽之脈色榮頰前熱病也榮未夭曰今且

得汗待時自已與少陰脈爭見者死期不過三日

熱病七八日脈微小病者溲血口中乾一日半而死

脈代者一日死

熱病七八日脈不躁喘不數後三日中有汗三日不

汗四日死未曾汗勿膚刺（膚一作庸）

熱病三四日脈不喘其動均者身雖煩熱令自得汗

生傳曰始府入藏終陰復還陽故得汗

熱病七八日脈不喘其動均者生微熱在陽不入陰
今自汗也
熱病七八日脈不喘動數均者病當瘖期三日不得
汗四日死
熱病身面盡黃而腫心熱口乾舌卷焦黃黑身麻臭
伏毒傷肺中脘者死
熱病瘈瘲狂言不得汗瘈瘲不止伏毒傷肝中膽者死
熱病汗不出出不至足嘔膽汁嘔吐血善驚不得臥伏毒
在肝腑足少陽者死

熱病十一

熱病腸鳴腹滿脹身熱者不得大小便脈濇小疾一逆見死
熱病大劒不止胸腹中痛脈浮大而洪不已二逆見死

熱病腸鳴腹滿四肢清泄注脉浮大而洪不已二逆見死
熱病嘔且便血奪形肉身熱甚脉絶動疾四逆而短氣三逆見死
熱病身熱甚脉小疾奪形肉五逆見死
熱病腹大而脹四肢清奪形肉短氣六逆見死
熱病腹大時時小絶喘汗出而喘尸厥二旬内死
熱病腹脹便血脉大時時小絶喘汗出而喘尸厥二旬内死
視不見人七逆見一旬死
熱病身熱甚脉轉小欬而便血目眶陷妄言乾舌焦手循衣
縫口乾躁擾不得臥入逆見一時死
熱病痴癡癎狂走不能食腹滿引腰臍背嘔血九
逆見一時死
熱病嘔血喘欬煩滿身黄其腹鼓脹泄不止脉絶十

00073465

熱病脈五至一日死時一大至半日死忽忽悶亂者死

熱病脈六至半日死忽急疾大至有頃死

熱病脈損目死證第二十四

熱病脈損者平人四至病人脈

熱病脈四至三日死脈四至者平人一至病人脈四

熱病至脈死日證第二十三

熱病脈四至二日死脈四至者平人二至病人脈四

熱病脈損三日死所謂四損者平人四至病人脈

熱病脈四至二日死脈四至者平人二至病人脈四

熱病至脈死日證第二十三

熱病至脈死日證第二十三

熱病脈四至三日死脈四至者平人二至病人脈四

熱病脈損三日死所謂四損者平人四至病人脈

熱病脈六至半日死忽急疾大至有頃死

熱病脈損目死證第二十四

熱病脈五至一日死時一大至半日死忽忽悶亂者死

一至名曰四損
熱病脉五損一日死所謂五損者平人五至病人脉
一至名曰五損
熱病脉六損一時死所謂六損者絶不至或久乃至死
一至名曰六損若絶不至或進退胃王叔和集仲景評脉要論
治傷寒形證所宜

明 新安 吳勉學 重刻 宋板

脉經卷第七

脉經卷第八

朝散大夫守光祿卿直秘閣判尚藥局極院上護軍臣林億等類次

平卒尸厥脉證第一

平痓濕暍脉證第二

平陽毒陰毒百合狐惑脉證第三

平霍亂轉筋脉證第四

平中風歷節脉證第五

平血痺虛勞脉證第六

平消渴小便利淋脉證第七

平水氣黃汗氣分脉證第八

平黃疸寒熱瘧脉證第九

平肖瘕痃心痛短氣貫豚脉證第十

平腹滿寒疝宿食脉證第十二

平五藏積聚脉證第十三

平驚悸叔吐下血胸滿瘀血脉證第十四

平嘔噦下痢脉證第十五

平肺痿肺癰咳逆上氣喘鼽衄脉證第十六

平癰腫腸癰金瘡侵淫脉證第十七

平卒厥脉證第一

寸口沈大而滑滑則爲氣實氣相搏名剛痓

入於藏即死入於腑即愈此爲卒厥不知人唇青身冷爲入藏即死如身温和汗自出爲入腑而復自愈

太陽病發熱無汗而反惡寒者名剛痓

太陽病發熱汗出而不惡寒名柔痓

痓脉證第二

痓 一作痙

太陽病發熱無汗而反惡寒者名剛痙

太陽病發熱汗出而不惡寒者名柔痙一云惡寒尽

太陽病發熱脉沈而細者爲痙

太陽病發其汗因致痙論云太多發其汗因致痙

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤

獨頭動搖者爲痙論云獨頭面搖卒口噤背反張者痙病也

太陽病無汗而小便反少氣上衝胷口噤不得語欲

作剛痙葛根湯主之

剛痙爲病胷滿脚攣急其人必齘齒

可與大承氣湯

痙病發其汗已其脉洽洽如蛇暴腹脹大者爲欲解

脉如故反伏弦者必痙一云痙脉

痙脉來按之築築而弦直上下行

痙家其脉伏堅直上下
夫風病下之則痙復發其汗必拘急
太陽病其證備身體強几几然脉沈遲此爲痙栝樓
桂枝湯主之
痙病有灸瘡難療
瘡家雖身疼痛不可發其汗汗出則痙
太陽病關節疼煩脉沈而緩者爲中濕 論云中濕之候其
人小便不利大便快但當利其小便
反
病者一身盡疼 論云頻發熱日晡即劇此爲風濕汗出
發熱亦疼 論云此病傷於汗出當風或久傷取冷所致
但頭汗出而背強欲得被覆向火
身色熏黃也

若下之早則噦或胷滿小便不利舌上如胎狀或但頭汗出而
丹田有熱胷上有寒渴欲飲而不能飲則口燥煩
濕家下之額上汗出微喘小便不利云不利者死若下利云不利者亦死
不止者亦死
問曰風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨
不止師云此可發汗而其病不愈者何也荅曰發汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈若治風則風濕俱去也
汗出者發其汗微微似欲出汗者治風則風濕俱去也
濕家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗爲宜慎
不可以火攻之
風濕脉浮身重汗出惡風者防己湯主之
病人喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無

病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中即愈 論云濕家病身疼痛

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔發熱面黃而煩頭痛鼻塞而煩不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之若其人大便鞕小便自利者去桂枝附子湯主之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴白虎湯主之

太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮膚中所致也一名風溫其脉陰陽俱浮自汗出身重多睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被發汗者必額上陷脉急直身痛口噤不能言若被火者微發黃色劇則如驚痓時瘛疭若火熏之一逆尚引日再逆促命期

太陽中暍發熱而惡寒身重而疼但欲寐脉弱汗出惡風者白虎加人參湯主之

太陽中暍汗出而渴五苓散主之

太陽中暍小便已洒洒然毛耸手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥名曰風痓

太陽中暍發汗已身灼熱名曰風痓

太陽中暍發汗身不解其人仍發煩熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗者此名痓病

太陽病發汗過多因致痓病

太陽病發汗太多因致痓病

太陽病發汗太多亡陽惡風心悸而眩肉瞤筋惕者桂枝加附子湯主之

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者與之則愈若脈浮小便已洒洒然毛耑手足逆冷小有勞身熱口燥煩

00073465

也或傷寒初病
以上至十日變成陰毒甘草湯主之
百合之爲病其狀常默默欲得出行而復不能行意欲得食復不能食或有
人欲得出行而復不能卧或
美時或有不用聞飲食臭時
三日苦小便赤黃身形如
病各隨證治之見於陰者以陽法救之見陽攻之百合病見於陰者以陽法救
陽者以陰法救之見陽攻之百合病見於陰者以陽法救之
難治見陰攻陽乃復下之此亦爲逆其病
狐惑爲病其氣如傷寒默默欲眠目不得
安觸於咳爲惑觸於陰爲狐惑之病並不欲飲食
聞食臭其面目赤作白作黑其毒觸於上者則聲

（見於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗此爲逆也治千金方云見在陰而攻其陰則陽不得解也復下之此爲逆也）

聞食臭其面目作赤作白作黑其毒蝕於上部者咽乾鍾於下部苦參湯淹洗之蝕於肛者雄黃熏之（喝一作頭）

其人脉數無熱微煩默默欲臥汗出初得三四日目赤如鳩眼得之七八日目四眥黃黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之

病人或從口吸上蝕其咽或從下腫蝕其肛陰陽俱蝕上爲惑蝕下爲惑蝕狐狐惑病者猪苓散主之

平霍亂病脉證第四

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此爲霍亂

問曰病者發熱頭痛身體疼惡寒而復吐利此當屬何病師曰當爲霍亂霍亂吐止而復發熱也傷寒其

00073465

脉微澁本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必吐利

轉筋爲病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之

平中風歷節脉證第五

夫風之爲病當半身不遂或但臂不遂者此爲痺脉微而數中風使然

頭痛脉滑者中風風脉虛弱也

寸口脉浮而緊緊則爲寒浮相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經則重不勝邪入於腑則不識人邪入

於絡而即難言吐於誕

於藏舌即難言口吐於涎
寸口脉遲而緩遲則爲寒緩則爲虛榮緩則衛遲則爲中風邪氣入中則胃滿而短氣
趺陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出
少陰脉浮而弱弱則血不足浮則爲風風血相搏則
疼痛如刺掣
盛人脉濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲
酒汗出當風所致也
寸口脉沈而弱沈則主筋弱則主骨弱則腎弱則
爲肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節也
味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鹹則傷骨骨傷則痿

不仁邪在於經則重不勝邪入於腑則不識人物入

名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便爲歷節也病歷節疼痛不可屈伸烏頭湯主之

諸肢節疼痛身體疿癗脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐桂枝芍藥知母湯主之

平血痺虛勞脉證第六

問曰血痺從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之形狀如風狀(一作風所吹)如蟲行皮中小聚外證身體不仁如風狀黃(一作風)但以脉自微濇在寸口關上微尺中小緊外證身體不

仁如
夫欲
寒精
人年
男子
男子
侠嬰
男子
男子
男子
時時
男子
永平

五十六十其
勞之爲病其
平人脉大爲
脉浮大手足
能行少陰虛
痺侠背行苦
鳴馬刀
者皆爲勞得
之
平人脉虛弱
面色薄者主
脉虛沈弦無
目瞑此人喜
脉微弱而澁
脉細微者喜
汗出也
卒喘悸其脉
浮者裏虛也
急小便不利
面色白

血痺虛勞風狀黃老目桂五物湯主之
治病當先知其證何趣乃當攻之耳
脉浮爲勞極虛亦爲勞
足煖春夏劇秋冬差陰

00073465

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩痛一月眩云
虛乳遲爲清穀亡血失精
脉得諸乳動微緊男子失精女子夢交通桂枝加龍
骨牡蠣湯主之
脉沈小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿
甚則洞泄食不消化也
脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒乳則爲虛
寒虛相搏此名爲革婦人則半産漏下男子則亡血
失精

平消渴小便利淋脉證第七

師曰厥陰之爲病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不
欲食食即吐下之不肯止

脉浮而遲浮則爲虛遲則爲勞虛則

00073465

寸口脈浮而遲浮則爲虛遲則爲勞虛則衛氣不足
食食即吐下之不肯止
遲則榮氣竭趺陽脈浮而數浮則爲氣數則消穀而
聚爲水（要略作緊）
水作大堅）氣盛則溲數溲數則緊（要略作堅緊數相搏則
爲消渴

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣虛不
師曰熱在下焦（一作結）亦令人淋閉不通淋之
爲病小便如粟狀少腹弦急痛引臍中寸口脈細而
數數則爲熱細則爲寒數爲熱熱強吐趺陽脈數胃中有
淋則消穀引食大便必堅小便則數少陰脈數婦人
陰中生瘡男子則氣淋
熱家不可發汗發汗則必便血
平水氣黃汗氣分脈證第八

00073465

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水
其脉自浮外證附腫按之沒指不惡風皮水其脉亦浮
渴當發其汗正水其脉沈遲外證自喘石水其脉自
沈外證腹滿不喘黃汗其脉沈遲身體發熱
肢頭面腫久不愈必致癰膿
脉浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏風強則爲
癮疹身體爲癢癢爲泄風久爲痼痺癮氣強則爲水難
以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此
爲風水不惡風者小便通利上膲有寒其口多涎此
有口脉沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水

視人之目裏上微擁如新臥起狀其頸脉動時時欬
按其手足上腘而不起者風水太陽病脉浮而緊法
當骨節疼痛而反不疼身體反重而酸其人不渴汗
出即愈此爲風水惡寒者此爲極虛發汗得之渴而
不惡寒者此爲表未解也若脉浮緊而復發汗身重
而疼尺中亟不可得之渴而能食反聚痛暮躁不眠此爲黃汗痛在骨節欬而喘
不渴者此爲脾脹其形如腫發汗即愈然諸病此者
渴而下利小便數者皆不可發汗

風水其脉浮浮爲在表其人能食頭痛汗出表無佗
病病者言但下重故從腰以上爲和腰以下當腫及
陰難以屈伸防已茯苓湯主之云風水脉浮身重汗出
風水惡風者防已茯苓湯主之
腫脉浮不渴續自汗出而無大熱

問曰脉沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水

者越婢湯主之
師曰裏水假如小便自利亡津液故令
病水假令小便不利故令
皮水之一云皮水其脉沈頭面浮腫小便自利亡津液故令渴也越婢加朮湯
防已茯苓湯主之
皮水之爲病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者
跌陽脉緊本自有寒疝腹中痛醫反下之則胃滿短氣
跌陽脉當伏今反數本自有熱消穀一作消渴小便數今
之下之則胃滿短氣
陽脉浮而數浮脉熱遲脉潛相搏名曰沈跌
寸口脉浮而遲浮脉熱潛熱遲脉止熱止相搏名曰伏沈伏

腸脉浮而數脉止相搏名曰水矣

走皮膚則爲水矣

寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒水走腸間

不沾流走在腸間

少陰脉緊而沈緊則爲痛沈則爲水小便難師曰

脉得諸沈者當責有水身體腫重水病脉出者死

夫水病人目下有卧蠶面目鮮澤脉伏其人消渴病

水腹大小便不利其脉沈絶者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利其脉沈絶者有水可下之不利腹滿陰腫者何也

荅曰此法當病水若小便自當愈

水之爲病其脉沈小屬少陰浮者爲風無水虛脹者

爲氣水發其汗即已沈者與附子麻黄湯浮者與杏

00073465

子湯

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其脈沉
肝水者其腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津液
微生小便續通
肺水者其身腫小便難時時鴨溏
脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難
腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上
汗其足逆冷面皮一云大便反堅痩
師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發
汗乃愈
師曰寸口脈沉而遲沉則爲寒水遲則爲寒水相搏
跌陽脈伏水穀不化脾氣衰則經絡騰溏胃氣衰則身腫
少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水

跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則身腫
少陽脉卑少陰脉細男子則小便不利婦人則經水
不通經爲血血不利則爲水名曰血分水一云分
問曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利師脉
之不言水反言脉何類師曰寸尸脉沈而緊沈爲水
緊爲寒沈緊相搏結在関元如時當微年盛不覺陽
衰之後榮衛相干陽損陰虛結寒微動緊氣上衝咽
咽塞噎胸下急痛醫以爲留飲而大下之氣擊不去
其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不
利水穀不化面目手足浮腫復如前肾胸苦痛象若奔豚其
如小差食飲過度腫復如前肾胸苦痛象若奔豚其
水揚溢則浮於喘逆當先攻擊衝氣令止乃治於於

00073465

止其喘自差先治新病病當在後

黃汗之病身體洪腫一作發熱汗出而渴不渴一作狀如風水汗沾衣色正黃如蘗汁其脉自沈

問曰黃汗之病從何得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之黃老者為藥桂枝苦酒湯主之

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮卧盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱

者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞤瞤則筋肉中痛又從腰以上必汗出下無汗腰冀弛痛如狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此為黃汗桂枝加黃

若自渴小便不利不足跌陽脉微而

十口脉遲而濇則為寒濇為血不足跌陽脉微而

若自渴小便不利者湯主之

00073465

者湯主之

寸口脉遲而澁遲則爲寒澁爲血不足趺陽脉微而遲微則爲氣氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿脇鳴相逐氣轉雷鳴脇肷榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼陽前通則惡寒陰前通則脚下不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其間二氣分散實則失氣虛則遺溺名曰氣分心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳實朮湯主之

藥加麻黃細辛附子湯主之

心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍

平黃疸寒熱瘧脉證第九

凡黃候其寸口脉近掌無脉鼻冷並不可治脉沈

00073465

腹滿舌痿黃躁不得睡屬黃家
師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以發
其汗兩熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱
而黃肚熱熱在裏當下之
師曰黃疸之病當以十八日爲期治之十日以上爲
差反劇爲難治疸而渴者其疸難治疸而
又曰疸而渴者其小便不利故令脉浮當以汗解之
於陰部其人必振寒而發熱也
師曰諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之
黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當
下之宜大黃黃蘗梔子苦消湯

下之宜大黃黃連瀉心湯

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之

夫病酒黃疸必小便不利其候似淋心中熱足下熱是其證也

心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸

酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沈弦者先下之

酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈

酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜薤狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之

寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節

00073465

疼痛當煩不煩而極汗出時
少陰脉微微則傷精陰氣寒冷少陰不足却
飽則煩滿滿則發熱客熱消穀發已復飢
微則傷精穀強則瘦名曰穀寒熱
難此欲作穀疸胜食難用飽則發煩頭眩
陽明病脉遲者食難用飽飽則發煩頭眩者必小便
師曰寸口脉浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風
四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行
跌陽脉緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食即
蒲也尺脉浮爲腎跌陽脉緊爲傷脾風寒相搏食
穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰
被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸

額上黑微汗出手足中熱薄暮則發膀胱急小便自

被其寒熱流勝脫身體盡黃名曰穀疸
額上黑微汗出手足中熱薄暮則發勝脫急小便自
利名曰女勞疸腹如水狀不治
黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞之勝脫急
少腹滿身盡黃額上黑足下黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難
治消石礬石散主之
水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難
夫瘧脉自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者
可下之弦遲者可温藥若脉緊數者可發汗針灸之
浮大者吐之
瘧病結爲癥瘕名曰瘧毋驚甲煎圓主之
瘧但見熱者温瘧也其脉平身無寒但熱骨節疼煩
時嘔朝發暮解暮發朝解名曰温瘧白虎加桂枝湯

00073465

主之

瘧多寒者牡瘧也蜀漆散主之

平肾痺心痛短氣貴豚脉證第十

師曰夫脉當取太過與不及脉有陽微陰弦則肾痺所以肾痺心痛者以其脉陰陽俱虛知在上膲虛也今陽極虛陰弦故也

肾痺之病喘息欬唾肾背痛短氣寸口脉沈而遲關上小緊數者栝樓薤白白酒湯主之

平人無寒熱短氣不足以息者實也

貴豚病者從少腹起上衝咽咳發作時欲死復止皆從驚得其氣上衝肾腹痛及往來寒熱貴豚湯主之

師曰病有貴豚有吐膿有驚悸有火邪此四部病皆

從驚得之

00073465

從驚發得之

平腹滿寒疝宿食脈緊者必下部閉塞大便難

趺陽脈微弦法當腹滿不滿者必下部閉塞大便難

兩胠(云脚)疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之

病者腹滿按之不痛爲虛痛者爲實可下之舌黃未下者下之黃自去

溫藥

趺陽脈緊而浮緊則爲痛浮則爲虛虛則腸鳴緊則

堅滿

脈雙弦而遲者必心下堅脈大而緊者陽中有陰也

可下之

病腹中滿痛爲實當下之

師曰病有黃脈有吐膿有驚悸有證第十一

00073465

腹滿不減減不足言當下之

病腹滿發熱數十日脉浮而數飲食如故厚朴三物

湯主之

腹滿痛厚朴七物湯主之

寸口脉遲而澁遲爲寒澁爲無血

而痛

寸口脉遲而緩遲則爲寒緩則爲氣氣寒相搏轉絞

夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏

中寒其人下利以裏虛也欲嚏不能此人肚中寒一作痛

夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣

必衝不衝者心下則痞

寸口脉弦者則脇下不必而痛其人面青善嚏

寸口脉浮而滑浮則爲風滑則爲痰頭中痛跌陽脉緩而遲緩則爲寒遲

00073465

寸口脉浮而滑頭中痛跌陽脉緩而遲緩則爲寒遲則爲虛虛寒相搏則欲食温假令食冷則咽中痛

寸口脉微尺中緊而復下之也緊則爲寒微則爲虛虛寒相搏則欲食温假令食冷則咽中痛

不足故知發汗而復下之也緊而澁緊則爲寒微則爲虛虛寒相搏則欲食温假令食冷則咽中痛

本寒氣何爲發汗復下之耶尚在中央知寒尚在此

夫脉浮而緊乃弦狀如弓弦按之不移脉數弦者當

下其寒脇下偏痛其脉緊弦此寒也以温藥下之宜

大黄附子湯

寸口脉弦而緊弦則衛氣不行則惡寒緊

則不欲食弦緊相搏則爲寒疝

跌陽脉浮而遲浮則爲風虛遲則爲寒疝繞臍

痛若發則白汗出手足厥寒其脉沈弦者大烏頭湯

00073465

主之

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮大按之反澁尺中亦微而澁故知有宿食

寸口脉緊如轉索左右無常者有宿食

寸口脉緊即頭痛風寒或腹中有實也有宿食當下之

脉滑而數者有宿食當下之

下利不欲食者有宿食當下之

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛此有燥屎也所以然者本有宿食故也

宿食在上管當吐之

平五藏積聚脉證第十二

問曰病有積有聚有撃氣撃一作繫一作段下同何謂也師曰積者

藏病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移爲

藏病也終不移聚者腑病也發作有時展轉可治繫氣者脇下痛按之則愈復發已愈不得復發今病復發即爲繫氣也

諸積大法脈來細而附骨者乃積也（一作細結）寸口積在肖中微出寸口積在喉中闕上積在臍傍上關上積在心下微下關積在少腹尺積在氣街脈出在左積在左脈出在右積在右積在中央各以其部處之

診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛少氣善忘目瞑瞑皮膚寒秋差夏劇主皮中時痛如蟲緣之狀甚者如針刺時癢其色白

診得心積脈沈而乳上下無常處病肖滿悸腹中熱

00073465

面赤嗌乾心煩掌中熱甚即唾血主身瘈
夏羌冬劇其色赤
診得脾積脉浮大而長飢則減飽則見臍起於外腹滿嘔泄腸鳴四肢
減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢
重足脛腫厥不能卧是主肌肉損其色黃
診得肝積脉弦而細兩脇下痛邪走心下足脛與穀爭
痛引少腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤喜轉筋瓜
甲枯黑春日狄劇其色青
診得腎積脉沈而急苦脊與腰相引痛飢則見飽則
減少腹裏急口乾咽腫傷爛目眩眩骨中寒主髓厥
善忘其色黑
寸口脉沈而橫者脇下及腹中有橫積痛其
申急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕脉弦緊而數細

寸口脉沈而
中急痛腰背
者癥也夫寒
寸弦緊在胃
大者在上頭小者在下
有積在臍左若上下也
又脉癥法左手脉橫癥在左右手脉橫癥在右
又法橫脉見左積在左偏得洪實而滑
亦爲積積弦緊亦爲積寒痃爲疝痛內有積不見脉
難治見一脉一證相應爲易治諸不相應爲不治
左手脉大右手脉小上病在右脇下病在左脇下病在右足右手
脉大左手脉小上病在右脇下病在右足左手
脉弦而伏者腹中有癥不可轉也必死不治

00073465

脈來細而沈時直者身有癰腫若腹中有伏梁
脈來小沈而實者胃中有積聚不下食食即吐
平驚悸衄吐下血胸滿瘀血脈證第十三
寸口脈動而弱動則爲驚弱則卫氣不足
跌陽脈微而浮浮則胃氣虛微則不能食此恐懼之
脈憂迫所作也驚生病者其脈止而復來其人目睛
不轉不能呼氣
寸口脈緊跌陽脈浮胃氣則虛
寸口脈緊跌陽脈緊寒之實也寒在上膲必悸何以言之寒水
寸口脈緊寒者必滿而嘔噫胃氣
相搏二氣相爭是以悸
脈得諸澁濡弱爲亡血
寸口脈大弦則爲減大則爲乾減爲寒乾則爲寒

寸口脉弦而大弦則為減大則為乳減則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血

亡血

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

問曰病衄連目不止其脉何類師曰脉浮尺目睛暈黃衄必未止暈黃去目睛慧了知衄今止

師曰從春至夏發衄者太陽從秋至冬發衄者陽明

寸口脉微而弱尺脉澁而弱澁為無血其人必厥微嘔尤厥當眩不眩而反頭痛痛為實下虛上實必衄也

太陽脉大而浮必衄吐血

病人面無血色無寒熱脉沈弦者衄也

衄家不可發其汗出必額上促急而緊直視而不
脈浮弱手按之絶者下血煩欬者必吐血
能眴不得眠
寸口脈微而弱氣血俱虛男子則下血
嘔吐汗出者爲可
趺陽脈微而弱春以胃氣爲本吐利者爲可不者此
爲有水氣其腹必滿小便則難
病人身熱脉小絶者吐血若下
脉遲者肖上有寒悸氣喜唾
脉有陰陽趺陽少陰脉皆微其人不吐下必亡血
男子盛大其脉陰陽俱盛大者當小便不利
血而失精設言林陰脉微趺陽亦微獨少陰浮大必便

00073455

血而失精設言淋者當小便不利
跌陽脉弦必腸痔下血
病人肾滿唇癡舌青口燥其人但欲漱水不欲嚥無
寒熱脉微大來遲腹不滿其人言我滿爲有痰血當
汗出不出內結亦爲痰血病者如熱狀煩滿口乾燥
而渴其脉反無熱此爲陰伏是大痰血也當下之
下血先見血後見便此近血也先見便後見血此遠
血也

平嘔吐噦下利脉證第十四

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治
跌陽脉浮者胃氣虛寒氣在上焦憂氣在下二氣並爭
但出不入其人即嘔而不得食恐怖而死寬緩即差

00073465

夫嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈
先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心下此
屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲也
問曰病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者何也
師曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數爲客熱不
能消穀胃中虛冷故吐也
陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦爲下之故
寸緊尺澁其人當滿不能食而吐止者此爲胃反故
不能食設言未止者
寸口脉緊而芤緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏脉爲
陰結而遲其人則吐
氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於
脉弦者虛也胃氣

上醫反下之令脈反弦故名曰虛
趺陽脈微而澀則下利澀微則吐逆穀不得入也
寸口脈微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則無肉肉中冷趺陽脈浮而澀浮則爲虛澀則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而澀(正)其病難治
夫吐家脈來形狀如新卧起病人欲吐者不可下之
嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓

歲而腹滿視其前後知何部不利利之即愈
夫六腑氣絕於手足寒在於

00073465

內者下利不禁下甚者手足不仁

下利脉沈弦者下重其脉大者爲未止脉微弱數者爲欲自止雖發熱不死

脉滑按之虛絶者其人必下利

下利有微熱其人渴脉弱者今自愈

下利脉數若微發熱汗出者自愈設脉復緊爲未解

下利寸脉反浮數尺中自澁其人必清膿血

下利手足厥無脉灸之不溫若脉不還反微喘者死

少陰負趺陽者爲順也

以有熱故也

下利後脉絶手足厥冷晝夜不還脉還手足溫者生脉不

還者死

下利脉反弦發熱身汗者自愈

下利氣者當利其小便

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿其藏寒者當下之

下利清穀必鬱冒汗出而解其人微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利腹脹滿身體疼痛先温其裏乃攻其表温其裏宜四逆湯攻其表宜桂枝湯

下利脉遲而滑者實也利未欲止當下之

下利脉反滑者當有所去下乃愈

下利差至其年月日時復發此為病不盡當復下之

下利而譫語者為有燥屎也宜下之

00073465

師曰問曰病有寒夫寒者陽鳴當温之

平肺痿肺癰欬逆上氣淡飲脉證第十五

下利而腹痛滿爲寒實當下之

下利而腹中堅者當下之

下利後更煩按其心下濡者爲虛煩也

下利後脉三部皆平按其心下堅者可下之

下利脉浮大者虛也以強下之故也設脉浮革因爾

下渴胃中寒實而下利不止者死

下利脉遲者爲

下痿黃躑而不渴者痿黃躑而不渴胃中寒實而下利不止者死

下利脉遲者爲

下利後心下堅痛者可下之

下利後心下堅痛

下利脉浮革因爾

問曰脉有浮革因爾而腹痛滿爲寒實當下之

問曰病有寒者痿黃躑而不渴胃中寒實而下利不止者死

問曰寒者不可風寒下者不可

問曰但當温之脉沈緊下之亦然脉大浮弦下之當已後心下堅痛

問曰脉大浮弦而數者欬逆上氣淡飲脉證

問曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從

師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從何得之

師曰熱在上膲者因欬爲肺痿肺痿之病從何得之

00073465

欬而口中自有津液舌上胎滑此爲浮寒非肺痿也

水者自愈自張口者短氣也

唾甘草乾薑湯以温其藏師曰肺中冷必眩多涎

以然者以上虛不能制下也此爲肺中冷必眩多涎

肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所

甚則脈浮弱

肺痿之病從上而得之

脳悩但坐發汗故

燥小便反難此爲肺痿傷於津液故得之

厠踊入而不出陰脈不澁身體反冷其内反煩多唾唇

寸口脈不出而下利重亡津液故得之

問曰寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者何也
師曰寸口脈數此爲肺痿之病若口中辟辟燥欬則肖肺癰
痛脈反滑數此爲肺癰當有膿血吐之
欬唾膿血脈數虛者爲肺痿脈數實者爲肺癰
則死後竟吐膿死其脈何類
師曰寸口脈微而數微則汗出數則惡寒風中於衛呼
則爲風數數則爲熱微則汗出惡寒風中於衛呼
氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風
舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時
時振寒熱之所過血爲凝滯蓄積膿吐如米粥始
萌可救膿成則死
欬而脈

久吐膿如粳米粥者爲肺癰咳嗽口乾不渴
酸辛咽乾苦唾腥臭胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久
肺癰胸滿脈數咽乾桔梗湯主之
脈數缺盆中痛若欬唾膿血者此爲肺癰
寸口脈浮而緩浮則爲風緩則生濕風濕相搏一身面目悉腫
浮緩胃氣如經此爲肺癰
寸口脈沉而緊沉則爲水緊則爲寒寒水相搏故振寒而欬
寸口脈數而緊數則爲熱緊則爲寒熱相搏故振寒發熱
問曰病咳逆倚息不得臥何以然師曰此爲肺癰胸滿脈緊寒
問曰病咳逆倚息不得臥何以然師曰此爲肺癰胸滿振寒脈
此爲肺癰腫病醫反不知而以瘀傷寒治之應不愈也何
以知有膿當以夜半後三時吐之膿從口出不從鼻出
以知有膿膿之所在何以別之師曰假令膿在
肺中者爲肺癰其人脈數欬唾有膿血設膿未成其
肺癰欬逆上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之
肺癰欬而上氣煩滿胸中脹其人脈數欬唾有膿血設膿未成其
脈自浮數浮則爲風數則爲熱風熱相搏名曰風溫風溫爲病
肺癰欬而上氣其脈數欬唾有膿血設膿爲已成也
肺癰欬而上氣煩滿胸中脹其人脈數欬唾有膿血設膿未成其
肺中者爲肺癰其人脈數欬唾有膿血設膿未成其
脈自浮數浮則爲風數則爲熱風熱相搏名曰風溫風溫爲病
肺癰欬而上氣其脈數欬唾有膿血設膿爲已成也
夫病咳逆脈數而緊緊去但數膿爲已成也
夫病咳逆脈數而緊緊去但數膿爲已成也欬而上氣其脈數欬有熱不得臥者死上氣
面浮腫肩息其脈浮大不治又加利尤甚上氣躁而

00073465

喘者屬肺脹欲作風水發汗則愈
水氣也要畧千臺沈作浮
金外

夫酒客欬者必致吐血此坐極飲過度所致也

欬家其脈弦爲有水十棗湯下之欬而上氣肺脹其人喘不能臥加大戟甘遂芫花主之一云三日

不欬者非虛也此當相人強弱而無熱乃可吐之欬家其脈弦欲行吐藥當時發熱脈浮弱而無熱乃可吐之其脈弱者可治實大數欬者不可發汗久欬數歲其脈弱者可治實大數欬者必苦冒其人本有支飲在胷中

脈沈者不可治屬飲家

故也治屬飲家

問曰夫飲有四何謂也師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲欲飲水流行歸腸間瀝瀝有聲謂之痰飲欲飲水
一云留飲

問曰夫飲有四何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲欲飲水

痩水走腸間瀝瀝有聲謂之
欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢
不汗出身體疼重謂之溢飲飲逆倚息短氣不得卧其
形如腫謂之支飲
留飲者脇下痛引缺盆欬嗽轉甚一云輒已
肩中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脉沈者
有留飲
夫心下有留飲其人背寒冷大如手
病者脉伏其人欲反快雖利心下續堅滿
此爲留飲欲去故也自遂半夏湯主之
病淡飲飲者當以溫藥和之
心下有淡飲當汗出而
脇支滿目眩苓桂草一作草遂一湯主之

病溢飲者當發其汗小青龍湯主之
支飲亦喘而不能臥加短氣其脉平也
膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沈緊
得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之
心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之
嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也
小半夏湯主之
夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日或一
歲可與十棗湯
目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲
一作目眩
夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多心下水停甚

00073465

夫病人飲水多必暴喘滿凡飲水
者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆
不弦但喜喘短氣病人一臂不隨時作復轉移在一臂其脈虛者爲微勞榮衛氣不
足脈偏弦者飲也肺飲
不利故也
心下有飲在上膲其脈沈細非風也
久久自差一云冬自差
腹滿口苦乾燥此腸間有水氣也防已椒目葶藶大
黃圓主之
假令瘦人臍下悸吐涎沫而癲眩者水也五苓散主之
先渴却嘔爲水停心下此屬飲家半夏加茯苓湯主之
水在心心下堅築短氣惡水不欲飲飲水在肺吐涎沫
欲飲水水在脾少氣身重水在肝脇下支滿嘿而痛

水在腎心下腫腸癰金瘡侵淫脈證第十六

脈數身無熱內有癰也 一云腹無積聚身躰作一本无熱脈數此慧故附子敗醬湯主之

諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發癰腫

其癰

平癰腫

脈微而遲必發熱弱而數爲振寒當發癰腫

脈浮而數身體無熱其形嘿嘿但一作胃中微躁煩不

知痛之所在此人當發癰腫

脈滑而數數則爲熱滑則爲實滑則主榮數則主衛

榮衛相逢則結爲癰熱之所過以手掩腫上熱者爲

有膿不熱者爲無膿欲知有膿與無膿以鍼刺之膿

師曰諸癰腫腸癰金瘡侵淫脈證第十六

脈數身無熱內有癰也 一云腹無積聚身躰作一本无熱脈數此慧故附子敗醬湯主之

諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發

其癰

平癰腫

脈微而遲必發熱弱而數爲振寒當發癰腫

脈浮而數身體無熱其形嘿嘿但一作胃中微躁煩不

知痛之所在此人當發癰腫

脈滑而數數則爲熱滑則爲實滑則主榮數則主衛

榮衛相逢則結爲癰熱之所過以手掩腫上熱者爲

有膿不熱者爲無膿欲知有膿與無膿以鍼刺之膿

師曰諸癰腫腸癰金瘡侵淫脈證第十六

脈數身無熱內有癰也 一云腹無積聚身躰作一本无熱脈數此慧故附子敗醬湯主之

諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發

其癰

平癰腫

脈微而遲必發熱弱而數爲振寒當發癰腫

脈浮而數身體無熱其形嘿嘿但一作胃中微躁煩不

知痛之所在此人當發癰腫

脈滑而數數則爲熱滑則爲實滑則主榮數則主衛

榮衛相逢則結爲癰熱之所過以手掩腫上熱者爲

00073455

有膿不熱者爲無膿

問曰宮羽林婦人病醫脉之何以知婦人腸中有膿爲下之則愈師曰寸口脉滑而數滑則爲實實則爲榮滑則爲衛衛數則爲熱血爲濁敗少腹痞堅小便或澁或時汗出或復惡寒脉遲緊聚爲瘀血下則愈（一作支急按之濡如腫狀腸癰者少腹腫按之則痛小便數如淋時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之脉不可下也大黃牡丹湯主之洪數者膿已成而澁法當亡血若汗出設不汗者云何荅曰若身有瘡被刀器所傷亡血故也問曰寸口脉微而澁法當亡血治從四肢流來入口

侵淫瘡從口起流向四肢者可

第一節 總論

十四味清心蓮子飲治心經有熱小便赤澁或口舌生瘡或心煩作渴或夢遺白濁或小便淋瀝或茎中作痛或尿如血色

黃芩 麥門冬去心 車前子 茯苓 甘草炙 地骨皮 石蓮肉 燈心 赤芍藥 白茯苓 黃連 人參 白扁豆 蓮子

水煎服

導赤散治心經有熱口舌生瘡或心煩作渴或小便赤澁或茎中作痛或尿如血色

生地黃 木通 甘草生 竹葉

水煎服

瀉心湯治心經有熱口舌生瘡或心煩作渴或小便赤澁或茎中作痛或尿如血色或夢遺白濁或吐血衄血

大黃酒浸 黃連 黃芩

水煎服

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

平妊娠分別男女將產諸證第一

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證第二

平產後諸病攣鬱目中風發熱煩嘔下利無子亡血諸證第三

平帶下絶產居經證第四

平攣鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病諸證第五

平咽中如有炙腐喜悲熱入血室腹滿諸證第六

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證第七

平婦人病生死證第八

平小兒雜病諸證第九

平妊娠分別男女將產諸證第一

00073465

脈平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脈動甚者娠子也少陰心脈也心主血脈又腎名胞門腎脈也尺中之部脈沈浮正等按之無絕者有娠也娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重以手按之散不滑者五月也脈重手按之不散但疾不滑者胎已三月也脈滑疾重以手按之散者胎已三

娠四月欲知男女法左疾爲男右疾爲女俱疾爲生二子

又法得太陰脈爲男得太陽脈爲女太陰脈沈太陽脈浮

又法左手沈實爲男右手浮大爲女左右手俱沈實爲男左右手俱浮大爲女左手沈實爲男右手浮大爲女左右手俱沈實爲生二男左右手俱浮大爲生二女

00073465

猥生二男左右手俱浮大猥生三女
又法尺脉左偏大爲男右偏大爲女左右俱浮大産二女
子大者如實狀
又法左右尺俱浮爲産二男不爾則女生也
尺俱沈爲産二女不爾則男作女生也
又法遣姙娠人面南行還復呼之左廻首者是男右廻首者是女也
又法看上圖時夫從後急呼之左廻首是男右廻首是女也
又法婦人姙娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女也
婦人懷娠離經其脉浮設腹痛引腰脊爲今欲生也

00073465

但離經者不病也
又法婦人欲生其脉離經者夜半覺日中則生也

平妊娠

婦人懷胎一月二月足厥陰脉養三月手心主脉養四月手少陽脉養五月足太陰脉養六月足陽明脉養七月手太陰脉養八月足太陽脉養九月足少陰脉養十月手陽明脉養諸陰陽各養三十日活兒手太陽少陰不養者下主月水上爲乳汁活兒養母

婦人懷娠者不可灸刺其經必墮胎

有必墮胎

脉浮汗出者必閉其脉數者必發癰膿五月六月脉

00073465

數者必向壞脉緊
浮者必水壞爲腫
問曰有一婦人年
利不欲食脉復浮
故此虛家法當微
法當有娠到立秋
者是火火是木之
廢陰氣生秋節氣
師曰乳後三月有
軀有兒者護之恐
中虛冷故令見利
婦人懷娠六月脉

脉浮汗出者必閉其脉數者必胞漏必發癰膿五月
脉遲者必腹滿而喘脉
持下有娠何以
爲熱熱
合
痛惡寒

00073465

寒者小腹如扇之狀所以然者子藏開故也當以附子湯温其藏

婦人姙娠七月脉實大牢強者生沈細者死

婦人姙娠八月脉實大牢強弦緊者生沈細者死

婦人懷軀六月七月暴卞斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也

師曰寸口脉洪而大洪則爲氣濇濇則爲血氣濇則動丹田其形即温濇濇在於下胎冷若氷陽氣胎活陰氣必終欲別陰陽其下必殭假令陽終畜然若杯

問曰婦人姙娠病師脉之何以知此婦人雙胎其一軀其脉何類何以知之

師曰寸口脉衛氣和平調榮氣緩舒陽易施陰化遲盛有

師曰寸口脉微氣平調榮氣緩舒陽施陰化精盛有餘陰陽俱盛故成雙軀今少陰微緊血即濁疑經養不周胎則偏天少腹冷滿膀胱疼痛腰重起難此爲血理若不早去害母失胎

師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不長欲知生死令人摸之如覆杯者則男如反肘頭尖者女也

師曰婦人有漏下者有中生後因續下血都不絶者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛爲胞漏膠艾湯

婦人妊娠經斷三月而得漏下血四十日不止胎欲動在於臍上此而妊娠六月動者前三月經水利

00073465

時胎也下血者後斷三月衄也所以下血不止者其癥不去故也當下其癥宜桂枝茯苓圓

問曰婦人病經水斷一二月而反經來今脉反微澁何也師曰此前月中若當下利故令妨經利止月經當自下此非軀也

婦人經自斷而有軀其脉反弦恐其後必大下不成軀也

婦人懷軀七月而不可知時時衄血而轉筋者此爲軀也衄時嘘而動者非軀也脉來近去遠故曰反以爲有軀而反斷此爲有陽無陰故也

婦人經月下但爲微少師脉之反言有軀其後審然

00073465

其脉何類何以別之師曰寸口脉陰陽俱平微為榮衛調和按之滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反洒淅不欲食飲頭痛心煩陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見嘔噦嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙妊二胎今陽不足故令激經也

婦人妊娠小便難飲如故當歸貝母苦參圓主之

婦人妊娠有水氣身重小便不利洒洒惡寒起即頭眩葵子茯苓散主之

婦人妊娠宜服當歸散即易產無疾苦

師曰有一婦人來診脉一作自道經斷不來師言一月為胞不二月為血三月為

婦人經月下但微心師脉之反言有胞其

如雞乳子熱者爲當留入月幾日來假令以七日所來主復來者因言且須後月復來經
日當與温經湯設與夫人言實有人家俱來者當奈何師曰當爲
問曰婦人年二十六月經水斷一月血爲有軀其人沈而濇因
師曰有一婦人來診自道經斷三月爲血積瘕即去師曰
合藥治之
是宜當護之今經微弱恐復不安設言當奈何師曰當
問曰婦人年三十六月經水斷一月血爲有軀其人沈而濇因
日當與温經湯設與夫人言實有
寸脈之脈反
者爲有軀其
濁中熱即禄欲令
試取雞一毛
拔去覆子不
得有軀婦
濁今夫人有軀
少腹寒手掌
反逆奈何得
閉

00073465

人因言當奈何師曰當與溫經設與夫家俱寒多久不作軀
有軀蹶父母家俱來者當言寒多久不作軀
師曰有一婦人寒來診因言陰陽俱和調陽氣反以爲有軀偏反血幽
短但出不入去近來遠故曰反以爲有軀偏反血幽
斷來幾日假令審實者因言急當治恐經復下設令
宮中人若寡婦無夫曾夜夢交寐交通邪氣感懷久作
癥瘕痕急當治下服二湯設復不愈因言髮湯漸
胎而反不下此何等意邪可使且將視赤鳥長陰氣
師曰若宮里張氏不差復來相問臣億等詳此一赤字疑
校以下闕疑
餘皆倣此
熱名爲軀桂枝主之法六十日當有娠設有醫治逆
者却一月加吐下者則絕之方在傷寒中
師曰脉婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒

婦人脈平而虛者有乳子法也平而微者實奪續法也而反大兒及乳小兒此自其常不能令甚虛竭病與亡血虛但坐乳而反甚其脈微濇其人不必眩冒而短氣也

師曰婦人好裝衣來診而得脈濇因問曾乳子下利乃當得此脈耳曾半生漏下者可設不者經斷三月六月設乳子漏下可爲奄續斷小兒勿乳須利止復來相問脈之

師曰寸口脈微遲爲寒在上膲但當令尺反虛復爲強下之如此發腎滿而痛者必吐血少腹痛腰脊痛者必下血師曰寸只脈微而弱吐耳今尺反虛復爲寒在下膲但當吐汗出者可不者跌陽脈微而弱氣血俱虛若下血利者可不者此爲水氣其腹必

00073465

氣血俱虛若下之
弱春以胃氣爲本吐利者可不者跌陽脉微而
滿小便則難
婦人常嘔吐而胃反若常喘一作多唾其經忽斷設來者
必少
師曰有一婦人年六十所經水常自下設來
少腹堅滿者爲難治
師曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰
曾更下利若汗出小便利者可何以故師曰亡其津
液故令經水少設經下反多於前者當所苦困當言
恐大便難身無復汗也
師曰寸口脉而遲沈則爲水遲則爲寒寒水相搏
跌陽脉伏水穀不化胛氣衰則脹滿胃氣衰則身體

00073465

腫少陽脉甲少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通經爲血血不利則爲水名曰血分一作水分

師曰寸口脉沈而數數則爲陽脉微而弦微則無胃氣弦則不實入則爲陰結跌陽脉微而滑沈則爲實沈滑相得息少陰脉沈而滑沈則爲入出沈則爲在裏滑則爲實沈滑相搏血結胞門其藏不瀉經絡不通名曰血分

問曰病有血分何謂也師曰經水前斷後病水名曰血分此病爲難治

血分此病爲難治

問曰病有水分何以故去水其經自當下

水分此病易治何謂也師曰先病水後經水斷名曰顛遲在上緊在下遲則爲寒各曰渾陽濁則濕各曰霧緊則陰氣慄脉反濡脉濡而弱弱反在關濡反在顛遲在上緊在下遲則

00073465

弱濡則中濕弱則中寒寒濕相持名曰痺腰脊骨節
苦煩肌爲不仁此當爲痺而反懷軀邊歸經體重以
下脚爲腑腫而反懷軀邊歸經體重以息小便不通
息小便不通緊脉爲嘔血氣無餘此爲水懷分榮衛垂
亡此爲非軀

平產後諸病鬱冒中風發熱痓嘔下利證第三

問曰新産婦人有三病一者病痙亦作痓二者病鬱冒三者大便難何謂也師曰新産亡血虛多故令病痙鬱冒師曰亡血復汗寒多故鬱冒師曰亡津液胃燥故大便難産婦鬱冒者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛

00073465

下厥孤陽上出故但頭汗出
陰血虛陽氣獨盛故當汗出
嘔不能食也小柴胡湯主之
發熱者此爲胃熱氣實承氣湯主之方在傷寒中
婦人產得風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有
熱心下堅乾嘔汗出雖久陽且證續在可與陽旦方
在傷寒中桂枝是也

婦人產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之
婦人產後腹中疙痛可與當歸羊肉湯
師曰產婦腹痛煩滿不得卧法當枳實芍藥湯主之
假令不愈者此爲腹中有乾血著臍下與下瘀血湯
婦人產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡

不大便四五日趺陽脉微實此有燥屎也

00073465

婦人産後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便四五日趺陽脉微實倍其人發熱日晡所煩躁者不能食至譫語利之則愈宜承氣湯以熱在裏結在膀胱也方在傷寒中

婦人産中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大圓主之方又加阿膠

婦人熱利重下新産虛極自頭翁加甘草湯主之金匱

平帶下絶産無子亡血居經證第四

師曰婦人帶下六極之病脉浮則爲腸鳴腹滿緊則爲陰中癢痛則生瘡弦則陰疼數則生瘡

産屬胞門未産屬龍門未嫁女屬玉門

問曰龍門三曰玉門已問曰未出門女有三病何謂也師曰一病者經水初

婦人帶下脈浮惡寒扁下者不治

下陰中熱或有風或有扁者或有以寒水洗之三病者或見丹下驚怖得病屬帶下劇易當師曰婦人帶下九實中事假令得鼠乳之病劇有期當庚辛爲期餘皆倣此問曰有一婦人年五十所病但苦背痛時腹中痛少食多厭喜瞋脈其脈陽微關尺小緊形脈不相應願知所說師曰當問病者飲食何如假令病者言我不欲飲食聞穀氣臭者病爲在上膲假令病者言我少多爲欲食不食病爲在中膲假令病者言我自飲食如故病爲在下膲帶下當以帶下治之

婦人帶下脈浮惡寒扁下者不治利少腹滿痛經一月再見土瓜根散主之

散主之

婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

師曰有一婦人年十五所來診言恐怖師曰今經反斷其母言此女年四時經水自下今非耶若親者當相爲說之婦人因荅爲是夫人親女非耶師曰所以問者無他夫人年十四時亦以經水下所以斷此爲避年少得之此爲無子年大者勿怪後當自下

婦人少腹冷惡寒久年少者得之此爲無子中年得此爲絕產

師曰脉微弱而澁年少得此爲無子中年得此爲絕產

師曰少陰脉浮而緊緊則疝痕腹中痛半產隨傷

浮則亡血絕產惡寒

師曰肥人脉細胞有寒故令少子其色黃者肾上有寒

婦人少腹硬音裒力切罪轉痛而復自解發作無常經
反斷膀胱中結堅急痛下引陰中氣衝者久必兩脇
拘急

問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮則
少腹裏急痛腹滿手掌熱屑口乾燥何也師曰此病
屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹中不去何以
知之其證屑口乾燥故知之當與溫經湯

問曰婦人病下利不止暮者何也師曰但當止
利經自當下勿惟所以利不止而血斷者但下利
亡津液故經斷利止津液復經當自下

婦人血下咽乾而渴其經必斷此榮不足本自有
微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其

表裏俱虛故令欝冒也

問曰婦人病如癲疾欝冒一日二十餘發師脉之反言帶下皆如癲疾欝冒其脉何以別之師言其脉何類何以別之師曰寸口脉濡而緊緊濡則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽氣微緊則榮衛和邪氣舍於榮衛疾作候一起年少時經水來以合房室移時過度精感命門開經下血虛百脉皆張中極感陽動微風激成寒因虛舍榮衛冷積於丹田發動上衝奔在肖隔津液掩口入涎唾涌溢出眩冒狀如厥氣粗醫名為癲炙之因大劇問曰婦人病苦氣上衝肖眩冒吐涎沫髀裏熱師脉之不名帶下其脉何類何以別之師曰寸口脉沈而微沈則衛氣伏微則榮氣絶陽伏則為疹陰絶

00073465

則亡血病當小便不利津液閉塞今反小便通微汗出沈癰爲寒欬逆嘔沫其肺成痿津液竭少腹經絡因寒爲血厥手足苦痺氣從丹田起上至肩脇沈寒怫鬱於上焦中窒塞氣歷陽部面翕如醉形體似肥此乃浮虛醫及下之長針復重虛榮衛久發眩也

問曰五崩何等類師曰白崩者形如漸赤崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如腐肉不因言夫人年幾何夫人年七七四十九經水當斷反至今不止以故致此虛也

師曰有一婦人來脈反得微濇法當吐若下利而言如血不血也

經必復下

師曰寸口脉微而濇微則衛氣不足濇則血氣無餘衛不足其息短血不足其形燥血不足其形逆榮衛俱虛言語謬誤趺陽脉浮而濇濇則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣濇則失液少陰脉微微而遲微則無精遲則陰中寒濇則失血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可不者此爲居經三月一來

問曰婦人妊娠三月師脉之言此婦人非軀今月經當下其脉何以別之師曰寸口脉衛浮而大榮反而弱浮大則氣強反弱則少血孤陽獨呼吸二氣不停衛降榮竭陰爲積寒陽爲聚熱陽盛不

00073465

潤經絡不足陰虛陽往實作故令少血時發洒淅咽燥
汗出或溲稠數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故知
非軀畜煩滿血則瀉名曰
居經
問曰婦人年五十所一朝而清血二三日不止何以
治之師曰此婦人前絶生經水不下今反清血此爲
居經不須治當自止經水下常五日止者五日愈
婦人月經一月再來者經來其脉欲自如常而反微
不利不汗出者其經二月必來
平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證第五
問曰婦人有經水不利腹中諸病何故爲裏虛而發其汗爲表汗則鬱冒不知人何
也師曰經水下故爲裏虛而發其汗則鬱冒虛此爲

寸口脉弦而大弦則爲減大則爲虛減則爲寒虛相搏脉則爲革婦人則半産漏下

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之

婦人經水不利抵當湯主之

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物礬石圓主之

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

婦人腹中痛小建中湯主之方在傷寒中 一云治腹中虛悸煩熱 一云治腹中痛

婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之

婦人咽中如有炙臠狀半夏厚朴湯主之 利梁中湯主之

婦人藏燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘草小

麥湯主之

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日續有寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方在傷寒中

婦人傷寒發熱經水適來晝日了了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而寫之濈然汗出者則愈

婦人中風七八日續有寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語此爲熱入血室當刺期門隨其虛實而取之

婦人中風七八日續有寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小

婦人心腹滿小便微難而不渴生
如敦敦狀現而細而熱
微生後疑者此爲水與血并結在
平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下
婦人陰寒溫中坐藥蛇床子散主之
婦人著坐藥強下其經月脈爲痛足跟難以踐地心
中狀如懸
問曰有一婦人病飲食如故頻熱不得臥而反倚息
者何也師曰此人
了戾故致此病但利小便則愈宜服腎氣丸以中有
故肌盛頭舉身滿今反羸瘦頭舉
茯苓故也方在虛勞中
師曰脉緊法當身軀疼痛設不痛者當射云何
因當射言若腸中痛腹中鳴欬者因失便婦人得此

00073465

脉者法當陰吹而弱浮則爲虛弱則無血浮則短氣師曰寸口脉浮而弱浮則有熱而自汗出趺陽脉浮而濇浮則氣滿濇則有寒喜噫吞酸其氣而下少腹則寒少陰脉弱而微微則少血弱則生風微弱相搏陰中惡寒胃氣下泄吹而正喧

師曰胃氣下泄吹而正喧此穀氣之實也膏髮導之

少陰脉滑而數者陰中則生瘡

少陰脉數則氣淋陰中生瘡

婦人陰中蝕瘡爛狠牙湯洗之

婦人藏腫如瓜陰中疼引臀痛者杏仁湯主之

平婦人病生死證第八

診婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲者生

診婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大堅實數者死

診婦人新生乳子脉沈小滑者生實大堅弦急者死

診婦人新生乳子因得熱病其脉懸小四肢温者生

寒清者死

診婦人生産風中風傷寒熱病喘鳴而有息脉實大

浮緩者生小急者死

診婦人生産之後寸口脉緊疾不調者死沈微附骨

不絶者生

少陰脉浮弦者白腸必挺核

00073465

金瘡在陰處出血不絕陰脉不能至陽者死接陽而復出者生

平小兒雜病證第九

小兒脉呼吸八至者平九至者傷十至者困診小兒脉法多少雀鬬要以三部九候參之沈者乳不消弦急者客忤氣小兒是其日數應變蒸之時身熱而脉亂無苦也欲食食輒吐哯者脉亂無苦也小兒脉沈而數者骨間有熱欲以腹按冷清也小兒大便赤青瓣飧洩脉小手足温易已

小兒病困汗出如珠著身不流者死

小兒病其頭毛髮上逆者必死

00073465

脉經卷第九

明新安吳勉學翻刻宋板

小兒病困汗出如珠著身不流者死

小兒病其頭毛皆上逆者必死耳間青脉起者癈痛與頭相抵卧不舉其口脣乾皮反白中氣出冷足其掌中冷皆死至十日不可復治

淨土晨鐘　卷十三　圖像

西方三聖

蓮華化生

極樂國土

九品蓮臺

極樂依正莊嚴

極樂世界

阿彌陀佛

00073465

脉經卷第十

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等奉

言肺者人之五藏華蓋也上以應天解理萬寸口之中陰陽交會中

有五部前後左右各有所主上下中央分爲九道浮

行精氣法五行四時知五味上下中央分爲九道浮

沈結散知邪所在其道柰何岐伯曰脉大而弱

實血虛也脉大而長者病在下候浮直上下交通者

陽脉也堅在腎急在肝實在肺前如外者足陽明也後如內者足

中央直中者手心主也中央直後者

前者手少陰也中央直前者

手太陰也前如內者足

也後如內者足少陰也中部

00073465

左右彈者帶脉也後部左右彈者陰也
厥陰者陰維也從少陰之太陽者陽絡也
者陰絡也來小時大者陽維也
前如外者足太陽也動苦頭項腰痛浮爲風濇爲寒
熱緊爲宿食
前如外者是太陽也動苦目眩頭頸項腰背強痛也
男子陰下濕女子月水不利少陰之腹痛引命門陰中痛
子藏閉浮爲風濇爲寒血滑爲勞熱緊爲宿食鍼入
九分却至六分
中央如外者足陽明也動苦頭面赤熱浮痛面赤微滑苦大便
不利腸鳴不能食足脛痺
中央如外者足陽明也動苦頭面赤熱浮痛面赤微滑苦
大便不利喜氣欲嘔骨者爲針陽鳴不能食足脛痺

00073465

大便不利喜氣滿滑者爲飲濇爲嗜臥腸鳴不能食

中央如外者足陽明也動苦腰痛足不能行痺鍼入九分卻至六分

後如外者足少陽也動苦腰背胛脇股肢節痛

足如三陽脉

右足

前如内者足厥陰也動苦少腹痛月經不利子藏閉

前如内者足厥陰也動苦少腹痛與腰相連大便不

利陰中寒子門痺絶

内少腹急男子疝氣兩丸上入淋也鍼入六分卻至

三分

中央如内者足太陰也動苦胃中痛食不下欬唾有

00073465

血足脛寒少氣身重從腰上狀如居水中

中央如內者足太陰也動苦腹滿上管有寒食不化煩

病以飲食得之沈濇者苦身重四肢不動血泄利黃鉞

滿不能卧足脛痛苦寒時欬入六分却

至三分

後如內者足少陰也動苦少陰也動苦腹痛與心相引背痛淋

從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小陰也動苦腹痛與心相引背痛淋

從高墮下傷於尻內便血裏急月水來上搶心脊

滿拘急股裏急也鍼入六分却至三分

前部左右彈者陽蹻也動苦腰背痛微濇爲風癇取

陰脉

陽蹻

前部左右彈者陽蹻也動苦腰痛癲癇惡風偏枯僵仆羊鳴痺痺瘖皮膚身體豐瘈一作淫瘖直取陽蹻在外踝上三寸直絕骨是

中部左右彈者帶脉也動苦少腹痛引命門女子月水不來絕繼復下止陰辟寒令人無子男子苦少腹

後部左右彈者陰蹻也動苦癲癇寒熱皮膚瘈瘲一作淫瘖直取陰蹻在內踝下相連陰中痛男子陰疝女子漏下不止

右陽蹻

中央直前者手少陰也動苦心痛微堅腹脇急實堅

00073465

者爲感忤純虛者爲下利腸鳴滑者爲有娠女子陰
中癢痛痛出玉門上一分前
中央直中者手心痛面赤食
怒微浮者苦悲傷恍惚不樂
怖如人捕之狀也時寒熱有
中央直後者手太陰也動苦
風緊濇者胷中有積熱時欬
從少陰斜至太陽是陽維也動苦肌肉痺痛
從少陰斜至太陽維也動苦顛僵什年嗚手足
在外踝絕骨下二寸
相引甚者夫音不能言癲疾直戝客主人下兩陽維脉

從少陽斜至厥陰是陰維也動苦癲癎僵仆
從少陽斜至厥陰是陰維也動苦僵仆失音肌肉淫
瘧痺汗出惡風
脉來暫大暫小是陰絡也一作結動苦肉痺應時自發身
洗洗也
脉來暫小暫大者是陽絡也一作結動苦皮膚痛下部不
仁汗出而寒也
肺脉之來也如循榆葉曰平如風吹毛曰病狀如連
珠者死期丙丁日禹中曰中如風吹毛曰病前曲後
心脉之來也如反筆莞大曰平如連珠曰病如雞踐
居如帶鉤者死期壬癸日人定夜半
肝脉之來也搏而勁弱曰平如張新弓絃曰病如雞踐

00073465

地者死期庚辛日晡時日入
脾脉之來也阿如緩曰平旦日出
腎脉之來也微細以長曰平來如彈石曰病去如解
之啄如水之漏者死期甲乙日平
索者死期戊已日食時日昳黃昏雞鳴
寸口中脉躁竟尺關中無脉應陽干陰也動苦腰背
腹痛陰中若傷足寒刺足太陽少陰直絕骨入九分
灸大陰五壯
尺中脉堅實竟尺寸口無脉應陰干陽也動苦兩脛
腰重少腹痛癲疾刺足太陰蹠上三寸直絕骨是也
灸太陽陽蹻在足外蹠上三寸鍼入五分又
寸口脉緊直至魚際下小按之如持維干

病腸鳴足痺痛酸腹滿不能食得之寒濕刺陽維在外踝上三寸間也入五分此脉出魚（一作際）腹痛腰體酸癲疾刺腎俞入七分又刺陰維入五分尺寸俱沈但有關上脉苦寒心下痛

寸口脉沈著骨反仰其手得之此腎脉也動苦少腹相引痛以下至足脛重可灸胃管七壯

有寒脊脊苦痛陰中痛不欲近丈夫也此陰逆刺期門入六分又刺腎俞入五分可灸胃管七壯

初持寸口中脉如細堅狀久按之大而深動苦腰腹相引痛以下至足脛重也不能食刺腎俞入四分至五分亦可灸胃管七壯

尺寸俱沈但有關上脉苦寒心下痛

尺寸俱沈關上脉苦寒心下痛

00073465

尺寸俱數有熱俱退有寒
尺寸俱微厥血氣不足其人心
寸口俱濡弱發熱惡寒汗出
關上沈肖中痛引背一云短氣
尺中沈心痛上吞酸
關上沈引背痛
寸口伏肖中有逆氣
尺中伏水穀不消
關上伏有水氣泄溏
寸口弦胃中拘急
尺中弦胃中有寒心下拘急

寸口緊頭痛逆氣
關上緊心下痛
尺中緊臍下少腹痛
寸口濇無陽少氣
關上濇無血厥冷
尺中濇無陰厥冷
寸口微無陽外寒
關上微中實一作胃虛能食故裏急
尺中微無陰厥冷腹中拘急
寸口滑胃滿逆
關上滑中實逆
尺中滑下利少氣

00073465

寸口數即吐有熱
關上數胃中有熱
尺中數惡寒小便赤黃
寸口實即生熱虛即生寒
關上實即痛虛即脹滿
尺中實即小便難少腹牢痛虛即閉溺
寸口芤吐血微芤衄血
關上芤胃中虛
尺中芤下血微芤小便血
寸口浮其人中風發熱頭痛
關上浮腹痛心下滿
尺中浮小便難
寸口遲上焦有寒

00073455

寸口遲上焦有寒
關上遲弱無胃氣有熱
尺中遲下焦有寒背痛
寸口濡陽弱自汗出
關上濡下重
尺中濡少血發熱惡寒
寸弱陽氣少
少關元關
尺弱少血

明 新安 吳勉學 校刻 宋板

Bayerische Staatsbibliothek München

0007346

00073465

十日戴上前輩

00073465

徐佛風慶
曰承注同三國魏略吳人名
後作者二字并二序之
序賢者二字并二序之
序賢者二字并二序之

00073465