



Vol. 2 (卷中上)

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according the guidelines described at <http://rbcs.princeton.edu/policies/forms-citation>.

Citation Information

Vol. 2 (卷中上)

Contact Information


Download Information

Date Rendered: 2019-09-10 11:47:04 PM UTC

Available Online at: <http://arks.princeton.edu/ark:/88435/1v53k234s>

TC83/1848

v. 2



扁鵲心書卷中

古神醫盧人扁鵲傳

宋太醫真定竇材重集

大清錢塘胡珏參論

傷寒

傷寒六脉浮緊，呻吟不絕，足指溫者，陽也。忌服涼藥，恐變爲陰，害人性命。至六日發煩躁，乃陰。陽換氣欲作汗也。服當歸、茯苓散，汗出而愈。

六脉緊大，或弦細，不呻吟，多睡，耳聾，足指冷，肢節痛，發黃，身生赤黑，靨時發，噫氣皆陰也。灸關元三百壯。

服金液丹薑附湯過十日半月出汗而愈若不早灸

反與涼藥者死

辨別陰陽不止于此然熟體此二條則治傷寒證誤謬亦少其灸法雖不能偏行若貧家無力而遇難起之病不能備參藥勉告以灸能活命倘肯依從未必非仁術之一端予每

見時疫盛行之際鄉販死者比戶心切憐之倘盡心力并合丹藥以濟之不特已身蒙福子孫亦必昌大

若吐逆而心下痞灸中脘五十壯若微微發顫者欲

作汗服薑附湯而愈若少年壯實之人傷寒至五六

日發狂踰垣上屋胃中有積熱也服大通散輕者知

母散亦愈

傷寒四經見證

傷寒祇有四經無少陽厥陰二經夫寒之中人如太

陽主皮毛故寒邪先客此經陽明主胃凡形寒飲冷

則傷之太陰主脾凡飲食失節過食寒物則傷之少

陰主腎寒水喜歸本經也故傷寒止有四經若少陽

厥陰主肝膽如憂思喜怒方得傷之寒病最少如耳

聾囊縮者少陰也寒熱口苦乃陽病也此四證俱不

宜用寒涼藥也

言無少陽厥陰二經非通論也時醫見寒熱口苦耳聾脇痛乾嘔吐逆不

辨陰陽不審虛實動云少陽首尾小柴胡和解以爲

穩妥不知虛陽提越內陰愈甚變爲躁擾不安胸膈

痞悶口渴謔妄脈體弦急更云內熱已深輕則瀉心

白虎重則陷胸承氣不至冰脫不已至若厥陰慄陰

人多不識誤死者多矣

太陽見證

太陽寒水內屬膀胱故脉來浮緊外證頭疼發熱腰脊強惟服平胃散至六七日出汗而愈蓋胃氣不虛傳徧經絡自愈也仲景以爲陽證乃與涼藥隨經而解反攻出他病甚者變爲陰證六脉沉細發厥而死急灸關元乃可復生如本經至六七日發戰者欲作解而陽氣少也服薑附湯出汗而愈仲景固機活法論中救誤者甚多何嘗能誤人哉其誤人者乃後人誤用仲景法而誤之耳于仲景何尤

陽明見證

陽明燥金內屬于胃六脉浮緊而長外證目痛發熱手足溫呻吟不絕服當歸柴胡湯平胃散仲景反言

熱深厥亦深此誤也若果發昏厥兩目枯陷不能昇者急灸中脘五十壯漸漸省人事手足溫者生否則死仲景厥陰證中有厥熱多寡之論不過驗邪正之進退察陰陽之消長示人爲治之活法無偏無倚何誤之有

太陰見證

太陰濕土內屬于脾其脉弦緊外證不呻吟四支不痛身不甚熱時自汗自利手足冷多痰唾服保元丹薑附湯十日後汗出而愈此證溫治若早愈亦甚速稍不審察害人亦易又一證發黃生紫班咽乾燥噫氣者此名陰燥陰黃服鍾乳粉十日後汗出而愈庸醫或誤認陽證涼之卽

死

少陰見證

少陰君火內屬于腎其脉弦大外證肢節不痛不呻
吟但好睡足指冷耳聾口乾多痰唾身生赤黑靨時
發噫氣身重如山煩躁不止急灸關元三百壯內服
保元丹薑附湯過十日汗出而愈若作陽證誤服涼
藥以致發昏譫語循衣摸牀吐血脉細乃真氣虛腎
水欲涸也仲景反曰急下之以救腎水此誤也真氣
既虛反用涼藥以攻其裏是促其死也急灸關元三
百壯可保無虞

少陰本熱標寒而又不中見太陽本熱之證固不易治况標陰為病千頭萬

緒變態百出令人接應不暇然只在初時體察真切
用灸用溫亦非難事良由初着一錯貽誤到底害人
不少至若無本熱而又無中見之太陽一派陰寒必
死無疑或速灸關元重投丹附亦在于覺之早庶望
其生○少陰誤治而變諸敗逆證誠為費手先生之
論崑崙形藏故尚溫補仲景之論惟言氣化故至承
制然論中用溫者多下者不過數條而已况標本氣
化今古難明非神于仲景之法者不能倘于急下證
而誤溫殺人反掌之急溫證而誤下
冤沉海底嗟嗟醫之為道誠難矣

傷風傷寒

脉浮為風脉緊為寒仲景分為兩塗故有麻黃桂枝

之說此誤也然傷寒乃太陽本氣受傷不可大汗但

服薑附湯自愈不必穿鑿他求以為精也

浮風緊寒解肌發表定法難磨仲景不可訾也至若緊而動急或微或沉神志稍失其常形氣不能振作則先生之

法斷不可緩。傷風輕淺之證，初起咽喉疼痛，鼻中
火出，此風邪外傷毛腠，抑遏陽氣，故現此耳。醫者不
明誤用寒涼，馴致重大。

挾食冷物

脉沉爲胃氣寒，緊爲冷氣盛，滑則食不消，其證頭痛，
發熱，嘔吐，心下痞，時或腹痛，服丁香丸來復丹，若冷
物不消，薑澄茄散，胃虛者平胃散，理中丸。

中濕

三四月間，人感潮濕之氣，名曰濕病。或六七月大雨
時行，恣飲冰冷物，亦名中濕。則令人寒熱自汗，陽
則脉緊，肢節痛，足指溫，服朮附湯。陰則脉沉而緊，肢

節不痛，身涼自利，足指冷，服薑附湯，不可發汗。汗則
必發煩躁，虛汗不止，或發黃腫。若服涼藥，則泄瀉而
死。先生于此證雖分陰陽，而用附子則一。今人于六
七月之交，不辨是寒是濕，或陰或陽，動輒云暑濕
用寒涼，及至發腫瀉泄，而猶云暑毒未清，又行攻下，不至醫殺不止，實可痛心。

陰毒

或腎虛人，或房事後，或胃發冷氣，卽腹痛煩躁甚者，
囊縮昏悶而死，急灸關元一百壯，內服薑附湯，保元
丹可救一二。若遲則氣脫，雖灸亦無益矣。審證的確，
不可因循，致歸絕路。

老人傷寒

切忌發汗及吐下。蓋元氣盛則邪不能為害。傳徧經絡自愈。仲景不敢補。反攻邪氣。致正氣受傷。誤人多矣。凡遇此證。只用薑附湯。多服自然解散。元虛而受攻傷正何

必老人仲景醫之聖者寧不知此

陰陽換氣

凡傷寒陽證欲作汗。陰證已加灸。真元欲復。與邪氣分爭。必發寒戰。鼻衄昏迷。牙關微緊。四肢微厥。乃陰陽換氣也。一二時辰。自然腋下汗出而愈。陰陽換氣即今之所謂戰汗。須預告病家。令其不必驚駭。否則闔室蒼惶。讖言蜂起。彼時一劑誤投。遂有生死之判。

傷寒譫語

凡傷寒譫語屬少陰。仲景屬陽明誤也。陽明內熱必發狂。今止譫語。故為少陰。仲景皆指神虛未嘗不屬少陰也急灸關元三百壯。若灸後仍不止者死。

傷寒衄血

凡鼻衄不過一二盞者。氣欲和也。不汗而愈。若衄至升斗者。乃真氣脫也。針關元入三寸。留二十呼。血立止。再灸關元二百壯。服金液丹。不然恐成虛勞。中滿。當解當清當溫當補審證施治庶幾無誤

勞復

傷寒瘥後。飲食起居勞動。則復發熱。其候頭痛身熱。

煩躁或腹疼脉浮而緊此勞復也服平胃散分氣丸汗出而愈若連服三四次不除者此元氣大虛故也灸中脘五十壯勞復證仲景數方用須斟酌第一須審邪氣之有無辨寒熱之多寡以施治則無誤矣

汗後大便下赤水或膿血

此乃胃中積熱未除或服丹附而致宜服黃連當歸芍藥湯下膿者如聖餅化積而愈經云熱雖甚不死若陰氣盛則殺人于頃刻戒之熱藥之過一涼可解又積熱易解而易治沉陰難愈而難明臨證之工大宜體認

汗後發噫

由于脾腎虛弱冷氣上奔也服薑附湯來復丹此證發呢若噫證無死人之理觀後二案可見

治驗

一人傷寒至八日脉大而緊發黃生紫斑噫氣足指冷至脚面此太陰證也最重難治爲灸命關五十壯關元二百壯服金液丹鍾乳粉四日汗出而愈

一人患傷寒至六日脉弦緊身發黃自汗亦太陰證也先服金液丹點命關穴病人不肯灸傷寒惟太陰少陰二證死人最速若不早灸雖服藥無効

不信至九日瀉血而死

不聽良言往往至此及至證變而下血俗醫猶謂疏

黃熱迫痛為排擠反用寒涼以下石至死衆口嗽

何恤人言

一人病傷寒至六日微發黃一醫與茵陳湯次日

更深黃色徧身如梔子此太陰證誤服涼藥而致

肝木侮脾余為灸命關五十壯服金液丹而愈

發黃雖有陰陽之異然脾家陰濕而為陰黃者多不可不知

一人患傷寒初起即厥逆脉一息八九至諸醫以

為必死余曰乃陰毒也與薑附湯一盞至半夜汗

出而愈若以脉數為熱下涼藥必死無疑

俗醫視此必以

為痲證禁服官料藥尚行焯刺縱飲冷水不致冰脫不已

肺傷寒

肺傷寒一證方書多不載誤人甚多與少陰證同但

不出汗而愈每發于正二臘月間亦頭疼肢節痛發

熱惡寒咳嗽脉緊與傷寒畧同但多咳嗽耳不宜汗

服薑附湯三日而愈若素虛之人邪氣深入則昏睡

譫語足指冷脉浮紫乃死證也急灸關元三百壯可

生不灸必死服涼藥亦死蓋非藥可療也

肺傷寒之證今人多

認為重傷風非溫平誤事即寒涼殺人于于此證畧有分曉然不免因人檢點苟遇知已用之無疑應酬通治不過薑甘桂辛而已設藥用薑附往往遭人謗毀

治驗

一人患肺傷寒，頭痛，發熱，惡寒，咳嗽，肢節疼，脉沉緊，服華蓋散，黃芪建中湯，晷解至五日，昏睡，譫語，四肢微厥，乃腎氣虛也，灸關元百壯，服薑附湯，始汗出愈。此證與雍正六年自春徂夏時氣大同，時俗皆禁服藥，則有誤，不知非藥誤人，乃庸人不明此理，妄投涼藥之誤耳。苟具隻眼焉得有誤。

疽瘡

有腰疽、背疽、腦疽、腿疽，雖因處以立名，而其根則同。方書多用苦寒敗毒之藥，多致剝削元氣，變為陰疽，侵肌蝕骨，潰爛而亡。不知內經云：脾腎氣虛，寒氣客

于經絡，血氣不通，着而成疾。若真氣不甚虛，邪氣不得內陷，則成癰。蓋癰者，壅也。血氣壅滯，故大而高起。屬陽易治，若真氣虛甚，則毒邪內攻，附貼筋骨，則成疽。蓋疽者，阻也。邪氣深而內爛，阻人筋骨，屬陰難治。其始發也，必憎寒壯熱，急服救生湯五錢，再服全好。甚者，即于痛處灸三五壯。陰疽即三五壯，亦不為過。如痛者，屬陽易治，若不痛，乃疽瘡也。急服保元丹以固腎氣，若用涼轉藥，則陽變為陰，或不進飲食而死。急灸關元

可生。近世瘍醫祇記一十三味方，不問邪之深淺，感之重輕，頂之起不起，色之紅不紅，不辨五美不審七惡，藥用此方，更加涼解，即見純陰冷毒，而猶云半陰半陽，總以發散解毒為良法，及至寒涼冰伏，尚

云毒盛內攻或見神情躁擾終認火熱未清小證變大淺證變深若遇大證未有不受其害者世謂外科拉折腿醫亦不盡然人之無良亦或有之其餘實由學問未精識證不確陰陽錯亂虛實混淆變證之來全然不曉有似故意害人其實非本心也

治驗

一人病腦疽六日危篤不進飲食余曰年高腎虛邪氣滯經也令服救生湯卽刻減半夜間再進一服全安

一人忽患徧身拘急來日陰囊連莖腫大如斗六脈沉緊余曰此陰疽也幸未服解毒涼藥若服之則莖與睪丸必皆爛去而死急令服救生湯五錢

又一服全安

一老婦腦後作痛憎寒拘急余曰此欲發腦疽也急服救生湯三服全愈

余治一婦新產深居密室頭面徧體生札馬疔外科與清火敗毒藥二劑立時消去其家甚喜次日胸中氣悶渴燥不已神氣異常至晚腹痛泄瀉身熱體倦嘔惡不食瘍醫云暑毒內攻更與連梔涼劑煎訖將進適余至診其脈空散無根一息七八至乃裏虛毒陷也卽以異功加薑附飲之次日瀉止神清食粥不嘔又一劑而札麻疔仍復發出亦不如前之痛苦矣夫札馬疔小疾耳涼解一誤尚變脫陷况大毒乎記此以爲瘍醫寒涼之戒精方脈者亦不可不明此理

凡一切癰疽發背疔瘡乳癰癰毒無非寒邪滯經只以救生湯服之重者減半輕者全安百發百中

喉痺

此病由肺腎氣虛風寒客之令人頤頰粗腫咽喉閉塞湯藥不下死在須臾者急灌黃藥子散吐出惡涎而愈此病輕者治肺服薑附湯灸天突穴五十壯亦好重者服鍾乳粉灸關元穴亦服薑附湯

治驗

一人患喉痺痰氣上攻咽喉閉塞灸天突穴五十壯即可進粥服薑附湯一劑即愈此治肺也

一人患喉痺頤頰粗腫粥藥不下四肢逆冷六脉沉細急灸關元穴二百壯四肢方暖六脉漸生但

咽喉尚腫仍令服黃藥子散吐出稠痰一合乃愈此治腎也

一人患喉痺六脉細余爲灸關元二百壯六脉漸生一醫曰此乃熱證復以火攻是抱薪救火也遂進涼藥一劑六脉復沉咽中更腫醫計窮用尖刀于腫處刺之出血一升而愈蓋此證忌用涼藥痰見寒則凝故用刀出其肺血而腫亦隨消也先生治肺

治腎之法千古卓見况咽喉之證風火爲患十有二三肺腎虛寒十有八九喉科不明此理一味寒涼即有外邪亦致冰伏若元本虧損未有不閉悶致死者所以咽喉妙法第一開豁痰涎痰涎既湧自然通快然後審輕重以施治薑附灼艾誠爲治本之法但人多畏之而不肯用耳然當危急時亦

不可避忌強為救治亦可得

生也至于刺法亦須知之

雍正四年咽喉證甚行友人之子沈禮庭亦患喉

痺次日即爛子診其兩寸無力兩尺空散乃陰虛

火動以七味丸作湯與服一劑證雖未減而痛勢

少緩鄰家強其延喉科視之彼醫笑予動輒用熱

藥不知此乃陽明熱甚證火性急速故一動輒而

即腐潰豈可用溫補劑耶乃投白虎二劑服未半

而神氣改常語溫補亂甚至顛倒不眠其家惶急

復延予予診其脈亂而八九至予曰果病陽明燥

火石膏實為良劑今係無根之熱而妄用白虎使

胃絡陷下而不能上通故心神失守以歸脾湯加

桂飲之甫一劑而神恬脈靜矣噫彼喉科一無學

虛勞

此病由七情六慾損傷脾腎早尚易治遲則難愈必
用火灸方得回生若用溫平藥及黃芪建中鱉甲飲

之類皆無益于病反傷元氣其證始則困倦少食額

上時時汗出或自盜汗口乾咳嗽四肢常冷漸至咳

吐鮮血或咯血多痰蓋腎脈上貫肝膈入肺中腎既

虛損不能上榮于肺故有是病治法當同陰證治之

先于關元灸二百壯以固腎氣後服保命延壽丹或

鍾乳粉服三五兩其病減半一月全安若服知柏地

黃當歸之屬重傷脾腎是促其死也切忌房事然此

病須早灸遲則無益丹藥亦不受矣服之反發熱煩

乃真脫故也若童男女得此病乃胎秉怯弱宜終身

在家若出嫁犯房事再發必死

治驗

一人病咳嗽盜汗發熱困倦減食四肢逆冷六脉
弦緊乃腎氣虛也先灸關元五百壯服保命延壽
丹二十丸鍾乳粉二錢間日服金液丹百丸一月
全安

一人病咳嗽證脉與上條同但病人怕灸止服延
壽丹五十粒金液丹百粒鍾乳粉二兩五日減可
十日脉沉緩乃真氣復也仍服前藥一月全安蓋
此病早治不灸亦可遲必加灸否則難治
一幼女病咳嗽發熱咯血減食先灸臍下百壯服

延壽丹黃芪建中湯而愈戒其不可出嫁犯房事
必死過四年而適人前病復作余曰此女胎稟素
弱只宜固守終老不信余言破損天真元氣將脫
不可救矣強余丹藥服之竟死

一人額上時時汗出乃腎氣虛也不治則成癆瘵
先灸臍下百壯服金液丹而愈

一人夜多虛汗亦腎氣虛也服全真丹黃芪建中
湯而痊

一婦人產後虛汗不止乃脾腎虛也服金液丹全
真丹當歸建中湯而愈凡童男女秉氣虛多汗者

亦同此治

一人每日四五遍出汗灸關元穴亦不止乃房事

後飲冷傷脾氣復灸左命關百壯而愈

一婦人傷寒瘥後轉成虛勞乃前醫下冷藥損其

元氣故也病人發熱咳嗽吐血少食爲灸關元二

百壯服金液保命四神鍾乳粉一月全愈

脾腎者先後天之本與元也虛勞之病雖有五藏
之殊其原皆由于脾腎受病而脾腎之治殊難見
效不知腎之元于生陽脾之本于焦火溫溫不息
元本日生五藏無偏真水流津液四布神精內守烟
焰不生哉奈何世人不過習用寒涼不敗不已間
有知脾腎之當保者不過玉竹沙參生脉六味溫
平之劑而已知先生之法者有幾人哉但恨起石

無真鍾乳多偽合丹救濟亦屬徒然惟有艾火庶
可求全人又不肯耐疼忍痛應名數熱動違庸俗
愈者所以千而無一桂附十中亦具起一二其終不
明知難起之疾勉投桂附十中亦具起一二其終不
愈者不免多口之來予亦無庸置辨彼蒼者天諒
能默鑒予救世之衷也因畧舉治愈數人附記于
後以爲吾黨型式俾知溫補之可以活人而不爲
流俗所惑不因譏毀縮手也
友人沈蔭昌兄因患伏兔疰膿血過多有傷元本
變爲虛勞服滋陰劑過多喘急吐血飲食少進予
診之脉弦急有七八至而面色純青喘咳氣急臥難
着席身熱汗出涎沫不中收虛脫之證已悉見矣又
貧乏無力用參乃予建中重投芪桂一服而喘定
安眠涎沫與血俱減大半第病久而脾腎過傷胃
氣難復投桂附加參錢許月餘喘促吐沫嘔血不食
王在庭之室病虛勞十餘載喘促吐沫嘔血不食
形體骨立諸醫束手延予診視見其平日之方皆
滋陰潤肺溫平之劑予曰以如是之病而乃用如
是之藥自然日趨鬼起焉望生機獨不思仲景云
咳者則劇數吐涎沫以脾虛也又昔賢云腎家生

陽不能上交于肺則喘又云脾虛而肺失生化之
原則喘今脾腎敗脫用藥如此焉望其生乃重投
參茸薑附等二劑而喘定緣泄瀉更甚再加黃蘗
十餘劑而病減十七又灸關元因畏痛只灸五十
壯迄今十餘年而形體大健矣
一中年婦夜熱咳嗽本小疾耳為張李二醫合用
滋陰退熱藥月餘致面青脉急喘促吐血嘔沫日
數升飲食不進二醫束手覆而不治予為重用參
附十餘劑而安此非其本原受
虧乃藥誤所致故收功易也

中風

此病皆因房事六慾七情所傷真氣虛為風邪所乘
客于五藏之俞則為中風偏枯等證若中脾胃之俞
則右手足不用中心肝之俞則左手足不用大抵能
任用但少力麻痺者為輕能舉而不能使用者稍輕全

不能舉動者最重邪氣入藏則廢九竅甚者卒中而
死入府則壞四支或有可愈者治法先灸關元五百
壯五日便安次服保元丹一二斤以壯元氣再服八
仙丹八風湯則終身不發若不灸臍下不服丹藥雖
愈不過三五年再作必死然此證最忌汗吐下損其
元氣必死大凡風脉浮而遲緩者生急疾者重一息
八九至者死中風之證古方雖有中藏中府中經
脈之別然其要不過閉證與脫證而已
閉證雖屬實而虛者不少或可用開證與脫證而
氣之劑關竅一開痰氣稍順急當審其形藏察其氣
血而調治之更視其兼證之有無虛實之孰勝或補
或瀉再佐以先生之法庶幾為效速而無痿廢難起
之患矣至若脫證惟一于虛重劑參附或可保全然
不若先生之丹艾為萬全也予見近時醫家脫證已

肩背心書 卷中
具三四而猶云有風有痰雖用參附而必佐以秦芫
天麻膽星竹瀝冰陷疎散是誠不知緩急者也烏足
與論醫道哉

治驗

一人病半身不遂先灸關元五百壯一日二服八
仙丹五日一服換骨丹其夜覺患處汗出來日病
減四分一月全愈再服延壽丹半斤保元丹一斤
五十年病不作千金等方不灸關元不服丹藥惟
以尋常藥治之雖愈難久
一人患左半身不遂六脉沉細無力余曰此必服
峻利之藥損其真氣故脉沉細病者云前月服捉

虎丹吐涎二升此後稍輕但未全愈耳余嘆曰中
風本因元氣虛損今服吐劑反傷元氣目下雖減
不數日再作不復救矣不十日果大反復求治于
余雖服丹藥竟不能起

癘風

此證皆因暑月仰臥濕地或房勞後入水冒風而中
其氣令人兩目壅腫雲頭斑起或肉中如針刺或麻
痺不仁腫則如癰疽潰爛筋骨而死若中肺俞心俞
名曰肺癘易治若中脾肝腎俞名曰脾肝腎癘難治
世傳醫法皆無効驗黃帝正法先灸肺俞二穴各五

十壯次灸心俞次脾俞次肝俞次腎俞如此周而復始全愈爲度內服胡麻散換骨丹各一料然平人止灸亦愈若爛見筋骨者難治經云脈風成爲癰蓋風風邪留于脈中淹纏不去而癰風成矣其間有傷營傷衛之別傷營者營氣熱肺其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰傷衛者風氣與太陽俱入行于肌肉散于分肉之間與衛氣相犯其道不利故使肌肉臃腫而有癰○此證感天地毒癰濁惡之氣或大醉房勞或山嵐瘴氣而成毒在氣分則上齊見更須分五血分則下體先見氣血俱受則上下齊見更須分五則之毒肺則皮生白屑眉毛先落肝則面發紫泡腎則脚底先痛或穿脾則遍身如癰心則雙目受損此五藏之毒病之重者也又當知五死之證皮死麻木不仁肉死割刺不痛血死潰爛口癰筋死指甲脫落骨死鼻柱崩壞此五藏之傷病之至重者難治若至音啞目盲更無及矣

治驗

一人面上黑腫左耳下起雲紫如盤蛇肌肉中如刀刺手足不知痛詢其所以因同僚邀遊醉臥三日覺左臂黑腫如蛇形服風藥漸減今又發余曰非風也乃濕氣客五藏之俞穴前服風藥乃風勝濕故當暫好然毒根未去令灸腎俞二穴各百壯服換骨丹一料全愈面色光潤如故

一人徧身赤腫如錐刺余曰汝病易治令灸心俞肺俞四穴各一百壯服胡麻散二料而愈但手足微不隨復灸前穴五十壯又服胡麻散二料全愈

一人病癘證鬚眉盡落面目赤腫手足悉成瘡痍令灸肺俞心俞四穴各十壯服換骨丹一料二月全愈鬚眉更生

風狂

此病由于心血不足又七情六慾損傷包絡或風邪客之故發風狂言語無倫持刀上屋治法先灌睡聖散灸巨闕二三十壯又灸心俞二穴各五壯內服鎮心丹定志丸此證有陽明脈盛而爲熱狂者清涼可愈此證有暴折而難決爲怒狂者奪其食則已治之以生鐵落飲二證皆狂之實者也然虛證常多不可誤治設一差訛害人反掌有心血不足而病者有腎水虧損而病者有神志俱不足而病者有因驚恐而病者有因妄想而病者是皆虛證體察而

治斯無悖矣

治驗

一人得風狂已五年時發時止百法不効余爲灌睡聖散三錢先灸巨闕五十壯醒時再服又灸心俞五十壯服鎮心丹一料余曰病患已久須大發一回方愈後果大發一日全好

一婦人產後得此證亦如前灸服薑附湯而愈

口眼喎斜

此因賊風入舍于陽明之經其脈挾口環唇遇風氣則經脈牽急又風入手太陽經亦有此證治法當灸

地倉穴二十壯艾炷如小麥粒大左喎灸左右喎灸

右後服八風散三五七散一月全安

此證非中風兼證之口眼喎斜乃身無他苦而單現此者是賊風之客也然有筋脉之異傷筋則痛傷脉則無痛稍有差別治法相同

破傷風

凡瘡口或金刃破處宜先貼膏藥以禦風不然致風氣入內則成破傷風此證最急須早治遲則不救若初得此時風客太陽經令人牙關緊急四肢反張項背強直急服金華散連進二三服汗出即愈若救遲則危篤額上自汗速灸關元三百壯可保若真氣脫雖灸無用矣

此證所患甚微爲害甚大雖一毛孔之傷有關性命之急一人因拔髭一莖忽

熱腫起不食有友人詢余余曰此破傷風也速灸如妙瘍醫認作髭片治以寒涼不數日發瘥而死

洗頭風

凡人沐頭後或犯房事或當風取涼致賊風客入太陽經或風府穴令人卒仆口牙皆緊四支反張急服薑附湯甚者灸石門穴三十壯

此證若無房事之傷焉至于此慎之慎之

牙槽風

凡牙齒以刀針挑之致牙根空露爲風邪所乘令人齒齲急者潰爛於頃刻急服薑附湯甚者灸石門穴

腎主牙齒乃骨之餘破傷宜露風邪直襲腎經致潰爛于俄頃含薑附而用寒涼爲變可勝道哉

水腫

此證由脾胃素弱爲飲食冷物所傷或因病服攻剋涼藥損傷脾氣致不能通行水道故流入四肢百骸令人徧身浮腫小便反澀大便反泄此病最重世醫皆用利水消腫之藥乃速其斃也治法先灸命關二百壯服延壽丹金液丹或草神丹甚者薑附湯五日病減小便長大便實或潤能飲食爲効惟喫白粥一月後喫餅麪無妨須常服金液丹來復丹永瘥若曾服芫花大戟通利之藥損其元氣或元氣已脫則不可治雖灸亦無用矣若灸後瘡中出水或雖服丹藥而小便不通皆真元已脫不可治也脉弦大者易

治沉細者難痊

治驗

一人病四肢皆腫氣促食則脹悶止喫稀粥余令日服金液丹百粒至四日覺大便滑再二日乃令喫麪食亦不妨蓋治之早也

一婦人病而脚皆腫飲食減少世醫皆作血虛治之不效余曰非血病乃脾胃虛也今日服延壽丹十粒全真丹五十粒至十日覺大便滑病愈

俞翰林母七旬餘平日患咳嗽痰紅常服滋陰涼潤之劑秋月忽患水腫喘急難臥日漸腫脹飲食少進進則氣急欲死諸醫用藥無效乃延予治六脉弦大而急按之益勁而空予曰此三焦火氣虛

德不能歸根而浮于外水隨氣奔致玄郭郭而溢
皮腠必須重溫以化否則不救彼云吾素內熱不
服溫補片薑入口痰即帶紅先生所論故是第恐
熱藥不相宜也予曰有是病服是藥成見難執且
六脈緊大陽已無根無根即脫矣此皆平日久服
寒涼所致若再捨溫補不用恐無生理請辭彼云
但不迫動血證敢不從命予以附桂薑黃十味入
參三錢不三劑而愈痰喘不給憂愁成病變為水腫喘
又二劑而全愈痰喘不給憂愁成病變為水腫喘
一婦因子遠出囊食不給憂愁成病變為水腫喘
急粥飲不入者月餘矣友人見予談及此婦乃謂
予曰肯做一好事否予曰既云好事焉敢違命遂
偕往診見其六脈欲絕臍突腰圓喘難着席脾腎
之敗不可為矣因處十味方命服四劑喘微定而
腫漸消覺思飲食復診其脈微有起色又四劑而
腫消食進矣嗟嗟若棄而不治雖不由我而死而
實我殺之也
友人亦大快

膨脹

此病之源與水腫同皆因脾氣虛衰而致或因他病
攻損胃氣致難運化而腫大如鼓也病本易治皆由
方書多用利藥病人又喜于速效以致輕者變重重
者變危甚致害人黃帝正法先灸命關百壯固住脾
氣灸至五十壯便覺小便長氣下降再灸關元三百
壯以保腎氣五日内便安服金液丹草神丹減後止
許喫白粥或羊肉汁泡蒸餅食之瘥後常服全真丹
來復丹凡膨脹脉弦緊易治沉細難痊此病若帶四

于早尚可奏功若單腹脹而更青筋浮露者難治苟
能看破一切視世事如浮雲置此身于度外方保無
虞次則慎起居節飲食遠房帷戒情性重溫急補
十中可救二三先生之丹艾用之得宜其庶幾乎

治驗

一人因飲冷酒，喫生菜，成泄瀉，服寒涼藥，反傷脾氣，致腹脹，命灸關元三百壯，當日小便長，有下氣。又服保元丹半斤，十日即愈，再服全真丹，永不發矣。

暴注

凡人腹下有水聲，當即服丹藥，不然變脾泄，害人最速。暴注之病，由暑月食生冷太過，損其脾氣，故暴注下泄，不早治，三五日瀉脫元氣。方書多作尋常治之，河間又以爲火，用涼藥，每害人性命。治法當服金液

丹、草神丹、霹靂湯、薑附湯，皆可。若危篤者，灸命關二

百壯，可保。若灸遲，則腸開洞泄而死。

脾泄之病，世人輕忽，時醫亦邈

視之而不知傷人最速。鹽商薛汝良午間注泄，晡時即厥冷，不禁及余診示，已黃昏矣。兩手脉皆絕，予曰病已失守，不可爲矣。速灸關元，重投參附，竟不能救。先生之論誠非謬也。

治驗

一人患暴注，因憂思傷脾也。服金液丹、霹靂湯，不効。蓋傷之深耳。灸命關二百壯，小便始長。服草神丹而愈。

休息痢

痢因暑月食冷，及濕熱太過，損傷脾胃而致。若傷氣

則成白痢服如聖餅全真丹金液丹亦可若傷血則成赤痢服阿膠丸黃芩芍藥湯初起腹痛者亦服如聖餅下積血而愈此其輕者也若下五色魚腦延綿日久飲食不進者此休息痢也最重不早治十日半月害人性命治法先灸命關二百壯服草神丹霹靂湯三日便愈過服寒涼下藥必死病至休息無已者非處治之差即調理之誤或飲食之過所以止作頻仍延綿不已然欲使其竟止亦頗費手有肺氣虛陷者有腎陰不足者有脾腎兩虧者有經脈內陷者有三焦失運者有濕熱傷穢不清者有固澁太早者有孤陰注下者有暑毒未清者有脾者有生陽不足者有風邪陷入者一一體察得其病情有陰積腸蠱者有風邪陷入者一一體察得其病情審治的當自能應手取効

治驗

一人病休息痢已半年元氣將脫六脉將絕十分危篤余爲灸命關三百壯關元三百壯六脉已平痢已止兩脇刺痛再服草神丹霹靂湯方愈一月後大便二日一次矣

一人病休息痢余令灸命關二百壯病愈二日變注下一時五七次令服霹靂湯二服立止後四肢浮腫乃脾虛欲成水脹也又灸關元二百壯服金液丹十兩一月而愈

內傷

由飲食失節損其脾氣輕則頭暈發熱四肢無力不思飲食脉沉而緊服來復全真及平胃散重者六脉浮緊頭痛發熱吐逆心下痞服藳澄茄散來復全真而愈若被庸醫轉下涼藥重損脾氣變生他病成虛勞臃脹泄瀉等證急灸中脘五十壯關元百壯可保全生若服涼藥速死

內傷之證飲食其一端也又有勞倦鬱怒憂悲思慮喜樂驚恐惡怒奇愁皆由七情不以次入直傷五藏更有由房室跌撲而成內傷者臨證之工不可不察

霍亂

霍亂由于外感風寒內傷生冷致陰陽交錯變成吐瀉初起服珍珠散二錢即愈或金液丹百粒亦愈如

寒氣入腹搏于筋脉致筋抽轉即以瓦片燒熱紙裏烙筋轉處立愈若吐瀉後胃氣大損六脉沉細四肢厥冷乃真陽欲脫灸中脘五十壯關元三百壯六脉

復生不灸則死也

霍亂之證三焦失運中土受傷一

頃劇不寧大法溫其三焦調其吐利頻作揮霍撩亂厥冷無脉非重用溫補不可否則轉筋入腹而死近世時醫不云中暑即言痰發禁則轉筋入腹而死近其廉英針其曲澤以大泄其血不知脾胃受傷中焦之榮血已竭而復大泄之譬如下井而投以石也此種醫人不顧人命真狼心虎腹人耶存救人之心者當須體察

暑月傷食泄瀉

凡暑月飲食生冷太過傷人六府傷胃則注下暴泄

傷脾則滑泄米穀不化傷大腸則瀉白腸中痛皆宜服金液丹霽靈湯三日而愈不愈則成脾泄急灸神闕百壯神闕恐是命關之誤難經雖言五泄不傳治法凡一應泄瀉皆依此法治之

治驗

一女人因泄瀉發狂言六脉緊數乃胃中積熱也詢其丈夫因喫胡椒生薑太多以致泄瀉五日後發狂言令服黃芩知母湯而愈平日恣啖炙煇喜食椒薑胃中積熱者有此一證臨證自明然亦希遇更有瀉脫津液致舌胎乾燥發熱神昏譫妄不寧者此脾腎大虛法當溫補若用寒涼虛脫立見

