

C83/29/2
V.1


金匱要略

醫

集

鏡

卷之五



醫藥鏡合序

竊聞澤物之謂仁辨物之謂智
二者相分若莛與楹然欲行澤
物之事必先施辨物之材故日
月照臨品彙昭蘇水火澄灼古




利用龜先見天下信從卽
是以推從來爲君之道爲相之
術與夫釋迦李耳之教百工伎
藝之微莫不本此瑩然豁考以
爲之準是以聖王之格致臣

之熙亮固無論矣卽譚浮屠者
以般若爲慈航師道德者以神
明爲慈母曲材小數如庖丁飛
衛造父輪扁之流所以度越庸
衆者自非聰穎絕倫曷克臻此


平通斯理者可與言醫今夫世
俗之醫口誦神農之言耳傳金
匱之秘以爲扁鵲倉公當不過
是然執書而不求學執學而不
求心猶行筌蹄之中不見陵谷

猶瞽者之嚮道俛俛焉不知所
之欲期于效伯不得一矣惟醫
之良者準諸我心之明因地以
爲功隨時以致用其推行之妙
若鼓鑄萬
師宣二氣其料度




之應若目辨蒼素手數奇偶其
裁制之神若陳師鞠旅偏廣精
嚴協律審音宮商合部若茲者
以心鑑醫不以醫鑒心聲色氣
脈鏡在心而不在醫以心鑒藥

不以藥鑑心燥濕溫涼鏡在心
而不在藥世俗之醫胡足語此
蔣子儀用博物士也志存利濟
研討素書洞其精奧得醫鏡于
太史王宇泰而懸諸國門嗣是



之後復綜本草之源流彙爲藥
鏡付諸剖氏其條分縷晰皎若
列眉嗟夫醫之不可無藥醫藥
之不可無鏡猶軒岐之不可無
宇泰宇泰之不可無蔣子也芟
煩揭要去疑存信鏡之時義大
矣哉通其義于君則睿照之下
可以壽民通其義于相則瞻言
百里可以治國推之浮屠卽摩
尼珠也推之道德卽清淨師也



其披卻導窾庖丁之解牛也炳
微燭隱飛衛之貫蝨也五味五
穀施之各當造父之御車二十
四蹄不亂也宜砭宜毒攻之輒
驗輪扁之斲輪得心應手而難

喻也豈非軒岐之心得宇泰而
彰宇泰之心得蔣子而著乎洵
能以大智行其大仁也於是乎
序

康熙三年歲次甲辰孟冬朔日

梅里錢繼登撰



陳敬掉藥方


蘗五日陳二 麻黃石共三

共合十兩藥 勝似小靈丹

醫鏡凡例

一字泰先生發明醫理著述行世式從已久門下
訂疑問難益多其徒但理學淵微卷帙浩森學
者苦無津梁先生手示此編指其大要令一披
覽而曉然於辨症用藥真如鏡遂以醫鏡
名編

一醫莫先於辨症凡陰陽寒熱虛實與夫內因外
因之別相去一絲千里苟審之未當湯藥誤投
殺人最速先生論列症形瞭若指掌學者詳究




之。庶無舛錯疑似之害。

一治須明於宣藥。古人比之用兵。示其難其慎之意。是編惟傷寒一科。姑存古方。餘皆酌其宜。而列以爲君爲佐。見多寡緩急。各有攸當。且總其凡曰例。槩其宜曰類。要在變通活法。不拘成案。神而明之。存乎人之知機也。

一先生詳於辨症用藥。而脉且畧焉。蓋因諸集備載。此不復贅。各條下間論及之。亦其槩耳。如傷寒一門。自有脉要指法。其中奧理。不可具述。勿以傳經所言。遂該其全也。

一先生矢心利濟。知無不言。間有丹方經驗者。卽于藥例後。一一開示。更有藥非對症。反致傷害者。必明其禁忌。學者其識之。

一大小內外。古人視爲一道。蓋以科雖各別。總不外乎六氣所感。七情所傷。與夫十二經絡所繫屬也。後世懼傳而不精。未免以人命嘗試。始有端門。先生資性敏達。學力淵深。此道一悟百了。故於雜門瘡瘍。嬾人小兒。無不著論立方。確有



所見其爲後學筏度。功豈小補云。

一是編原本。余得之茂苑張玄暎。玄暎得之字泰先生。授受蓋不輕矣。往余與玄暎讀書。余峯。擲管之餘。漫加輯訂。爰付梨棗。懸諸國門。凡我同人。寶茲囊秘。

蔣儀用識

醫鏡目錄

卷一

內科

傷寒

附痧疹

瘟疫

腳氣

傷風

內傷

中濕

附痲症

中風

附癰症

癰風


瘡疾

中暑

附中焦

卷二

內科



痢疾

洩瀉

秘結

脾胃

蟲症

黃疸 附黃腫

臌脹 附水腫

三消

噎膈

嘔吐 附霍亂 吐酸 吞酸

霍亂

頭痛 附頭眩

心痛

腹痛

腰脇痛

股痛 附脊痛

卷三

內科

麻木

痞塊

疝氣

諸氣

諸血

癆瘵 附遺精 盜汗 骨蒸

咳嗽 附痰症

雜門


眼疾

喉痺

齒痛

口舌

瘡瘍



瘰癧 兼內外

疥毒

癰瘡

廣瘡

內疔外疔

泡瘡

疥癬

濕陰瘡

卷四

婦人

經閉

月事不調

血暈

血癖

血風

崩淋

帶下

熱入血室

胎前諸症

臨產諸症

產後諸症

小兒

胎熱胎寒

臍風撮口

重舌驚口

丹毒

中惡天吊


客忤

夜啼

傷風傷寒

咳嗽

瘡疾



痢疾

吐瀉

驚風

疳症

痘疹

目錄

醫鏡卷之一


金沙王肯堂宇泰父著

茂苑張暎垣玄暎父叅

武水蔣儀儀用父較


傷寒

傷寒爲諸病之魁。死生係于數日之內。苟識病不真。用藥一錯。則變異立見。古人有七日不服藥之說。非謂傷寒不可服藥。謂藥之不可輕試也。故見之未審。寧不用藥。豈可妄投之。以速其死耶。治傷寒者。必先



辨之形症而後可也。如初發于一二日間。便覺頭項痛。脊強而發熱惡寒。乃足太陽膀胱經受病也。而診之則尺寸俱浮焉。以其脉上連風府故頭項痛。又下至尾間。故腰脊強。以寒邪在表而不得泄。故發熱惡寒也。而太陽症可辨矣。太陰病已。以次而傳經。必傳于胃。發于二三日之間。便覺目疼鼻乾。不得眠。日晡潮熱。不惡寒而反惡熱。乃足陽明胃經受病也。而診之則尺寸俱長焉。以其脉絡于目。故目疼。又挾于鼻。故鼻乾。不得眠。以邪在肌肉之中。故不惡寒而惡熱也。而陽明症可辨矣。陽明病已。以次而

經必傳于膽。發于三四日間。便覺胸脇痛。而耳聾。往來寒熱。乃足少陽膽經受病也。而診之則尺寸俱弦焉。以其脉循于脇。故胸脇痛。又絡于耳。故耳聾。以邪在半表半裏。故往來寒熱也。而少陽症可辨矣。少陽病已。以次而傳經。必傳于脾。發于四五日間。便覺腹滿。而噤乾。身無大熱。自利不渴。乃足大陰脾經受病也。而診之則尺寸俱沉細焉。以其脉布于胃。故腹滿。又絡于噤。故噤乾。以邪入于裏。故身無大熱。自利不



渴也。而太陰症可辨矣。太陰病已。以次而傳經。必傳于腎。發于五六日間。便覺口燥舌乾。而渴。身不熱。乃足少陰腎經受病也。而診之則尺寸俱沉焉。以脉貫脊而絡于肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴也。以邪入于陰分。故身不熱也。而少陰症可辨矣。少陰病已。以次而傳經。必傳于肝。發于六七日間。便覺煩滿。而囊縮。身冷如冰。乃足厥陰肝經受病也。而診之則尺寸俱微緩焉。以其脉循陰器。絡于肝。故煩滿而囊縮。以邪入陰分。既深且固。故身冷如冰也。而厥陰症可辨矣。

太陽陽明傷寒表症也。宜汗之。少陽傷寒半表半裏症也。宜和解之。太陰傷寒邪入于裏也。宜下之。少陰傷寒入裏尤深也。亦宜下之。若手足厥冷。自汗亡陽者。又宜溫之。而不可輕下也。至于厥陰傷寒。則寒氣固結。非大熱之劑不能除。而承氣湯之類。不可用也。觀于此。則六經之形症已明。而用藥可以不錯也。陽症易治。陰症難治。而少陰厥陰爲尤難也。況于感傷寒。而可以措手乎。所謂兩感者何也。假如一日太陽受之。卽與少陰俱病。則頭痛口乾。煩滿而渴。二

日陽明受之。卽與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。詰語。三日少陽受之。卽與厥陰俱病。則耳聾囊縮。而厥逆若水漿不入。不知人者。六日死。兩感所以不可治者。以其一臟一腑。同受其邪。表症裏症。一齊而發。兩邪相迫。陰陽俱病。救其表則裏益急。救其裏則表益劇。猶外寇方獮。而內又反。旣不能安其內。又無以攘其外。必致兩敗而俱傷。豈能兩全而無害。此兩感之所以不救也。然其間亦有輕重之差焉。表重于裏者。宜先救表。而後及于裏。裏重于表者。宜先救其裏。而後及于表。此又求一生于萬死之中。而不忍坐視。故不得已而施其治也。其不兩感于寒。更不傳經者。至七八日間。六經之邪漸退。十二日。則精神清爽而自愈矣。然傷寒傳經亦有不同。未可視以爲一定不易之序。有始于太陽。以次傳入陰經。而終于厥陰者。或太陽不傳陽明少陽。而卽傳少陰者。或不繇陽經。而直入陰經者。或始終只在一經而不傳者。或二陽三陽同受。而爲合病者。或太陽陽明先後受。而爲併病者。種種不一。審而治之可也。然真正傷寒。與感冒者。

寒及似傷寒而非傷寒者。何以辨之。蓋寒者。冬月嚴凝肅殺之氣也。故自霜降以後。春分以前。皆屬冬令。必此時感寒而卽發者。爲正傷寒。至春分後發者。名曰溫病。冬傷于寒。春亦不病。至夏而後發者。名曰熱病。夫溫熱二病。旣皆得之冬月所傷之寒。宜亦以傷寒名也。而反曰溫病熱病者。何耶。蓋所傷之寒。雖在于冬。而諒其所傷者。必不甚重。故不卽發而延于春夏也。春氣溫。夏氣熱。則時令之氣已甚。而冬月之氣無權。所傷之寒。反從春夏而變爲溫熱。故以溫熱名也。其有不因冬傷于寒。而春自傷于風。夏自傷于暑者。則自有傷風傷暑之別。而又不可以溫熱並論矣。或有感于天行時氣而沿相同者。謂之溫疫。或足膝等處。忽然紅腫。發熱頭疼者。謂之腳氣。皆似傷寒而非傷寒也。其餘傷中之雜症頗多。不能枚舉。要皆諸病門中所有者。但雜症一兼寒熱。卽謂傷寒雜症。醫者以意求之。則不言而自喻矣。

藥例

太陽症。頭項痛。腰脊強。發熱無汗。宜以麻黃湯爲主。

治而汗之。

麻黃

一兩五錢

桂枝

一兩

甘草

五錢

杏仁

五十枚

每劑用五錢。水煎服。取汗出爲度。無汗再服。春分後忌之。

陽明症目疼鼻乾不眠發熱乾嘔有汗宜以桂枝湯爲主治。

赤芍

桂枝

各六錢

甘草

四錢

每服五錢。加姜三片。棗二枚。煎服。須臾啜稀粥以助藥力。若小便數及飲酒人不宜用。恐其不喜甘。

而中滿作嘔也。春分後忌之。

少陽症胸脇痛而耳聾往來潮熱宜以小柴胡湯爲

主治。

柴胡

一兩

半夏

八錢

黃芩

甘草

炙

人參

各七錢半

右作五服。每加姜三片。棗二枚。煎服。此方乃少陽症藥。故治瘧疾者亦用之。但人參一味亦宜斟酌。若邪氣未退不可輕用也。

少陽症身熱不大便不惡寒邪在半表半裏宜以大柴胡湯爲主治而和解之。

醫方

柴胡

二兩

黃芩

七錢半

芍藥

三錢

半夏

六錢半

枳實

四枚

大黃

五錢

右作三服。每加姜棗煎服。

太陽陽明症不惡寒反惡熱大便秘詰語嘔噦宜以調胃承氣湯爲主治而下之。

大黃

一兩

酒浸

甘草

五分

芒硝

九分

每服五錢水一碗先煎大黃甘草至七分去渣入硝煎一沸溫服。

陽明症六七日不大便腹脹滿無表症汗後不惡寒潮熱狂言而喘宜以小承氣湯爲主治而下之。

大黃

一兩

厚朴

五錢

枳實

六枚

右作一劑水煎溫服以利爲度。

太陰症自利不渴脉沉身痛宜以四逆湯爲主治。

甘草

一兩

乾姜

七分

附子

半個

黃連

五錢

右作一劑水煎溫服弱人用大附子加乾姜三錢。

本方乾姜加至一兩名通脉四逆湯治厥逆下利。

脉不至每服五錢加葱白九莖嘔加生姜咽痛加


桔梗利止脉不出加人參本方去附子黃連加入

醫方

傷寒

卷一

七



參白朮。名理中湯。專治自利不渴。寒多而嘔。腹痛。鴨瀉。虻厥等症。治病之效。雖不可誣。而用藥之時。亦宜斟酌。大補大熱之劑。必審其真而後用也。

少陰症。舌乾口燥。及胃實。詰語五六日不大便。腹痛。煩渴。宜以大承氣湯主治而下之。

大黃

五錢

厚朴

一兩

枳實

五個

芒硝

五錢

水二鍾半。先煎厚朴枳實至一鍾。入大黃煎至七分。去渣。入硝煎一沸。溫服。以利為度。不可過服。

少陰症。惡寒。手足拘急。或心中悸而煩。脉微細者。宜以小建中湯主治而溫之。

桂枝

甘草

各二兩

芍藥

三兩

作三服。每加姜三片。棗四枚。去粗。入飴糖一合。微

火待飴糖化。溫服。嘔者不用飴糖。恐其發吐也。

厥陰症。舌卷。囊縮而惡寒。宜以桂附湯主治之。

桂枝

一兩

附子

三錢

青皮


甘草

柴胡

各四錢

作三服。每加姜三大片。

兩感傷寒。雖不治之症。然所稟有虛實。所感有淺深。若所稟者實。而所感者淺。間亦可生。治之而愈者有。



矣。未有不治而生者也。宜以大羌活湯主治而雙解之。

羌活 二錢五分 獨活 防已 黃芩 黃連 白朮

川芎 各二錢 細辛 五分 生地 知母 各二錢

作一劑水煎服。

分後感冒傷寒。宜以九味羌活湯爲主治。代桂枝

麻黃湯。

羌活 二錢 防風 一錢五分 蒼朮 一錢 甘草 三分 白芷

川芎 一錢 生地黃 一錢 黃芩 一錢 細辛 三分

作一服加姜三片。葱一莖。水煎。熱服。覆熱取汗。原
有汗去蒼朮。加白朮。渴加知母。石膏。

此方通治六經傷寒。無有不驗。乃四時傷寒之聖
藥也。何以言之。蓋羌活治太陽肢節痛。大無不通。

小無不入。乃撥亂反正之主也。防風治一身盡痛。
聽君將命令而行。隨所使引而至。蒼朮雄壯上行。

之氣。能除濕氣。下安太陰。使邪氣不傳脾經。甘草
緩裏急。和諸藥。白芷治陽明頭痛在額。川芎治厥

陰頭痛在腦。生地治少陰心熱在內。黃芩治太陰

肺熱在胸。細辛治少陰腎經苦頭痛。此方乃易老所製。凡見表症。悉宜服之。不犯三陰禁忌。實解利之神方也。

小結胸症。胸膈迷悶。乃邪熱結于上焦而生痰也。宜小陷胸湯。

半夏 六錢

黃連 三錢

瓜蒌 一個連皮取四分之二

作一服。水二鍾。先煮瓜蒌至一鍾半。下餘藥煎至一鍾。溫服。如未效。再服。得口出黃涎即愈。

大結胸症。胸前脹滿煩悶。不進飲食。乃渴多飲水。有停飲在上故也。宜大陷胸湯。

大黃 一兩五錢

芒硝 一兩一錢五分

甘遂 二錢五分

作二服。水二鍾。煎大黃至一鍾。去粗。入硝煎一沸。次入甘遂末。溫服。得快利止後服。

附痧疹

痧疹之症。惡寒發熱。頭疼腹滿。惡心嘔吐。遍身如紅雲推出。俗名痧子。卽傷寒發斑也。發斑雖是熱症。然不可驟用涼藥。恐遏絕邪氣于內。而不得出。多有不救者。宜解毒發散爲主。

如羌活防風白芷紫蘇以發散。大劑生甘草以解
毒。加蔥姜煎服。喉痛。加玄參桔梗。嘔血。加地榆側
柏葉犀角生地。腹滿。加枳殼陳皮蒼朮厚朴。班有
紫色熱極也。加黃連連翹赤芍。惡心。加藿香木香。
班不出者。單用帶根葱頭。搗取汁一盞。入酒漿一
盞。調和服之。能飲者。再飲一二盞。其班即發出。至
妙。此症嘔血者重。以邪氣逆上也。聲啞者危。無
聲者死。以班毒入肺中故也。

附瘟疫

瘟疫之症。乃天行時氣。發熱詭語。衆人病一般者是
也。有大頭瘟蝦蟆瘟之異。並用十神湯爲主治。

川芎 甘草 麻黃 紫蘇 升麻 白芷

陳皮 香附 芍藥 乾葛

各四錢

一兩四錢

每服五錢。或一兩。姜三片。水煎熱服。以汗出爲度。
未效再服。

瘟疫秘方

人中黃 羌活 蒼朮 煎服立愈


五錢

錢

錢

各三錢

大頭天行病。濕氣在高巔之上。宜用此方。



黃芩

酒炒

大黃

酒蒸

羌活

各二錢或三錢

煎服。

蝦蟆瘟。遍身如蝦蟆之皮。皆屬風熱。宜疎風散熱之劑治之。

羌活

防風

荊芥

黃芩

甘草

各二錢

煎服

又用側柏葉自然汁。調蚯蚓糞傳之。或丁香尖南星醋磨敷。

附脚氣

脚氣之症。惡寒發熱。有類傷寒。但發時足膝之間先紅腫作疼。而後發寒熱。乃濕熱留于肌肉之中故也。急宜治之。若不早治。其氣上行至心。即死矣。

蒼朮

黃柏

赤茯苓

牛膝

木通

木灰

甘草

黃連


烏藥

防風

右各二錢。量輕重投之。水煎空心服。其紅腫處用朴硝大黃寒水石牙皂爲末。鷄子清調傳。甚妙。或用人中黃爲末。芭蕉汁調傳亦妙。

附傷風

傷風之症。乃風邪客于腠理。洒淅惡寒。噴嚏呵欠。頭痛發熱。類于傷寒。但見風即怕其寒亦不太甚。以此



爲辨耳。

川芎 紫蘇 羌活 防風 蒼朮 香附

其艸

右各二錢。加葱白十莖。姜三片。煎服。以被覆之。微汗爲度。若以爲小疾而不治之。風入于肺。必成咳嗽。卽費調理矣。凡感風邪。忌用茯苓。以其味淡。善于滲泄。表症服之。則引邪入陰經。而邪無繇發矣。

內傷

傷寒家以外感風寒爲外傷。內傷飲食爲內傷。固然內傷而專指飲食言者。其言猶未盡也。飲食所傷。固可以爲內傷。或傷于血。或傷于氣。或傷于精。皆非外得也。獨不可以言內傷乎。內傷之病。各有症辨。惟飲食所傷。亦身發大熱。類于傷寒。但不惡寒而獨惡熱。頭不甚疼。骨節不痛。而中脘飽悶。見食卽惡。與傷寒大同小異。故傷寒家有內傷外傷之辨。辨以此耳。至若好勇鬪狠。奔走負重。恃壯使力。蹊跌輕生。必傷

此印
停余

傷氣

傷色

傷

于血。血積于上。則胸脇痛。血積于中。則中脘痛。血積于下。則小腹痛。傷重則行其血。傷不重則活其血。血既行則養其血而已。或忿恨冲心。暴怒頓發。爭言鬪舌。叫號罵詈。必傷于氣。氣積不散。則兩脇脹滿。胸膈悶塞。甚至發爲噎症。飲食不進。而病斯劇矣。宜大劑伐肝化氣之藥治之。或恃強壯。不惜氣力。縱情于女色。耗亡其真精。則小腹氣併。其冷如水。其堅如石。痛連陰器。小便秘而不通。切不可誤以爲霍亂。妄投鹽水。要當以活血爲主劑。又不可誤以爲霍亂。妄投鹽水。要當以活血爲主。

藥例

而調氣次之。待其痛止。氣和。方可漸加帶補之劑也。

內傷于食。視其所傷者何物。各以主治之藥消之。

如傷于魚肉。則用山楂。蓬朮。三稜之藥。甚至有用

阿魏。礪砂。巴豆。霜者。如傷于米食。則用麥芽。神麴。

枳實。陳皮。檳榔。艸菓之類。如傷于麪食。則用萊菔。

子。爲君佐以蒼朮。厚朴。陳皮。香附之類。如傷于生

冷。則于消食劑中。加官桂。乾姜。木香之類。凡消食

之劑。必兼用白朮。并艸。則脾氣有助。而運化速矣。

此等
內傷
如胸
前痛
則用
紅花
赤麴
降真
香丹
皮之
類而
以
桔梗
引經
以枳
殼開
氣如
兩脇
痛則
用蘇
木紅
花
當歸
桃仁
之類
而以
青皮
柴胡
引經
以木
香調
氣
如中
脘痛
則以
當歸
爲君
佐以
紅花
蘇木
三稜
蓬
朮之
類而
以芍
藥耳
艸引
經厚
朴大
腹皮
寬腹
脹
如小
腹痛
則以
桃仁
爲君
佐以
當歸
稍紅
花山
查
蘇木
蓬朮
之類
而以
青皮
官桂
引經
檳榔
破氣
痛
甚者
加玄
胡索
乳香
沒藥
凡血
併不
行劑
內加
川
山甲
射香
水同
煎送
下大
黃九
二三
錢此
惟傷
重者
可用
也

內傷

內傷于血視其所傷者何處分上中下而治之

如胸前痛則用紅花赤麴降真香丹皮之類而以

桔梗引經以枳殼開氣如兩脇痛則用蘇木紅花

當歸桃仁之類而以青皮柴胡引經以木香調氣

如中脘痛則以當歸爲君佐以紅花蘇木三稜蓬

朮之類而以芍藥耳艸引經厚朴大腹皮寬腹脹

如小腹痛則以桃仁爲君佐以當歸稍紅花山查

蘇木蓬朮之類而以青皮官桂引經檳榔破氣痛

甚者加玄胡索乳香沒藥凡血併不行劑內加川

山甲射香水同煎送下大黃九二三錢此惟傷

重者可用也

內傷于氣宜以伐肝破氣之藥治之

用醋炒青皮爲君醋炒芍藥便浸香附烏藥枳殼

木香官桂之類爲佐水酒同煎服之

內傷于精宜以養血調氣之藥治之

用紅花爲君桃仁丹皮當歸生地牛膝赤麴之類

爲佐少加耳艸稍炒鹽一撮酒煎入童便熱服痛

連陰器者必有血滯于莖中礙其道路甚至小便


不通宜頭髮燒灰爲末童便酒調下四五錢爲妙
凡此特其大畧耳若夫斟酌損益非言所能示也
一切內傷之症有似于傷寒者遂以爲傷寒而誤用
發表之藥如麻黃升麻之類則內氣升發勢不可遏
有食吐食有血吐血吐而不已面赤咽乾火皆奔上
汗出不休陽亡氣耗當此之時無藥可救其死必矣
慎之慎之若外傷誤服內傷之藥亦有大害不可輕
投若內傷既重或溺水涉深則寒氣入內血與食併
而不運必死無疑雖有良藥竟何益乎

中風

夫人似乎無恙而卒然中風者豈一朝一夕之故哉
其受病久矣蓋肉必先腐也而後蟲生之土必先潰
也而後水決之亦必先枯也而後風摧之夫物且然
而況于人乎經曰邪之所奏其氣必虛風豈能中乎
人亦人之自受乎風耳使其內氣充足精神完固則
榮衛調和腠理緘密雖有風將安入乎惟其不戒暴
怒不節淫慾或饑不暇于食或寒不暇于衣或嗜酒
而好色或勤勞而忘身或當風而沐浴或大汗而行


房。或畏熱而露臥。或冒雨而奔馳。以致真元耗亡。氣血消盡。大經細絡。積虛彌年。平時無甚痛苦。而不知榮衛皆空。徒存軀殼。正猶無心之木。將折未折。無土之牆。欲頽未頽。其勢已不可支。而方且自謂無恙。迷昧而不知戒焉。一旦爲賊風所襲。如劇寇操刃直入無人之境。勢若破竹。不移時而皆潰。則盃酒談笑之間。舉步轉移之頃。卒然顛仆。頓爲廢人。不亦重可駭哉。由是觀之。雖由外風之中。實因內氣之虛也。然人之一身。表裏上下。未必皆虛。惟積虛之處。氣多不貫。

而勢有偏輕。故一爲風所入。而肢體于是乎廢矣。若以臟腑言之。則又各有形症焉。中臟多滯九竅。故有唇緩失音。鼻塞耳聾。眼瞢便秘之症。中腑多着四肢。故有半身不遂。手足不隨。左癱右瘓之形。又有中血脉者。則外無六經之形症。內無便溺之阻滯。惟口眼喎邪。或左或右而已矣。而手足動靜。起居食息。固無恙也。或肢不能舉。口不能言。而更無別症者。乃中經也。比之中臟腑爲輕。比之中血脉猶重耳。然因其病而藥之。則中臟者宜下。中腑者宜汗。中經者宜補血。



以養筋。中血脉者宜養血以通氣。此皆可治之症也。而亦有難易于其間。中臟爲難。而中腑次之。中經又次之。中血脉又次之。其或初中于血脉。藥之而愈。苟不守禁忌。必復中。而中必在經。或初中于經。藥之而愈。苟不守禁忌。必復中。而中必在腑。或初中于腑。藥之而愈。苟不守禁忌。必復中。而中必在臟。中一次則虛一次。虛一次則重一次。故中腑雖可治也。繇先中血脉于經。而後及于腑。則難治矣。中臟本難治也。繇先中于腑。而後及于臟。則不治矣。若中腑而兼中臟。與傷寒兩感者何異。豈有可生耶。凡中風口開者爲

心絕。手散者爲脾絕。眼合者爲肝絕。遺尿者爲腎絕。聲如鼾睡者爲肺絕。汗出如油者爲無氣。肉脫筋痛者爲無血。髮直指而頭上竄。面赤如粧。而汗綴如珠者。皆所不治之症也。其有一中卽死者。又何爲如此之急耶。蓋人之五臟以心爲君。心也者。所以主宰乎一身者也。五臟之中。惟心最難死。故人死氣絕。一身盡冷。而心頭獨熱者。以其難死故也。中臟之人。不卽死者。以四臟之氣雖絕。而心猶未病也。一中其心。則



杯酒未乾。片言未盡。而魂魄先亡矣。縱有起死回生之藥。亦何所施乎。大法中風諸症。總屬風疾。初中之時。不論在表在裏。必先以攻痰祛風爲主。待其甦醒。然後審其經絡。分其氣血而治之。不可因其內氣之虛。而驟用補劑。蓋一中之間。道路已爲風痰阻絕。雖欲補之。孰從而補之。若其病的係大虛。口眼不喎。邪手足不偏廢。便溺不阻澁。但汗出不休。眩暈不定。四肢軟弱。氣息短促。方可用獨參湯。而猶必佐以去白陳皮。加以姜汁竹瀝。始可服也。若無監制。一時或可以愈疾。而痰邪不洩。終當爲患。他日或發癰疽。必無藥可治者。切宜慎之。卽腦麝牛黃等藥。初中時亦不宜驟用。恐引風氣入于骨髓。又不可用大戟芫花甘遂。以洩大腸之經。大抵於行痰祛風劑中。日淺則加以順氣。日久則惟活血爲要耳。

藥例

初中風不省人事。乃風痰壅盛。迷其胸膈也。

宜以天花粉。荆芥。各二三兩。水煎。加姜汁竹瀝。磨枳實沉香。各一錢。或二錢。灌之。若牙關緊。卽以姜

製南星同射香少許。擦之自開。灌此藥。直待其醒。再進此藥。然後以他藥進之。

中腑爲在表。法當汗之。

宜以麻黃爲君。羌活防風荆芥甘草之類爲佐。以發其表。南星半夏瓜蒌仁之類。以逐其痰。陳皮枳殼紫蘇梗之類。以順其氣。加姜汁竹瀝服之。

中臟爲在裏。法當下之。

宜以大黃爲君。枳實厚朴甘草爲佐。以通其秘。猪牙皂角穿山甲木通菖蒲之類。以開其竅。瓜蒌仁杏仁蘇子防風荆芥之類。以逐其風痰。加姜汁竹瀝服之。

中經者。以補血養筋爲主。

宜以四物爲君。佐以木瓜薏仁威靈仙。而補血養筋。兼以羌活獨活防風細辛甘草。而疎其風。南星半夏茯苓黃芩。而治其痰。加姜汁竹瀝服之。

中血脈者。以養血通氣爲主。

宜以四物爲君。佐以紅花而養其血。兼以枳殼烏藥香附陳皮。而通其氣。加姜汁竹瀝服之。

目眼喎斜。外攻之法。以皂角五兩。去皮子爲末。以陳醋和之。左喎。塗右手心。右喎。塗左手心。以煖水盥安向手心。須臾便止。卽洗去藥。并抽掣中指。左邊半身不遂。屬血虛與死血。宜于四物湯中。加紅花桃仁煎之。以姜汁竹瀝調服。

右邊半身不遂。屬氣虛與濕痰。宜于四君子湯中。加半夏南星陳皮枳殼煎之。以姜汁竹瀝調服。

左癱右瘓。四肢不舉。風痺等疾。

麻黃一斤 白芷 桑皮 蒼朮 甘松 浮萍各二

兩 川芎 三兩 苦參 三兩

水煎成膏。調酒中服之。服一日。停一日。如此數日。手足自然輕快。又治小兒驚風。


中風痰壅。昏不知人。口眼喎斜。半身不遂。

附子去皮 南星各一兩 木香半兩

每五錢。生姜九片。煎服。

附癰症

癰症一發。卽顛仆。眼直。口吐痰沫。或作羊鳴。不省人事。此乃因驚恐而得之。



礞石 硝煨

硃砂

天竺黃

麝香

南星

三十一

半夏

天麻

蛇含石

醋煨

等分爲末。以姜汁竹瀝和于蜜中煉熟。丸如龍眼大。童便磨下半丸立止。服三五丸全愈。

若治癰症。卽于此方中加銀粉。

卽黑鉛錫化投水銀和作一處傾冷

地上取起研細是也。

附癰風

癰風手足皮膚迸裂麻木不仁。甚至四肢踈攣眉脫

鼻倒。乃惡風沿入臟腑。血肉皆死。肉生細蟲食人

脂膏故也。蓋繇人受乖厲之氣而成。亦有瘡腫後

不守禁忌。酗酒厚味。熱極生風。是虛爲本。血熱爲

標。治法必先殺其蟲。瀉其火。然後生血涼血。祛風

導滯。降陽升陰則可。

第一是死人身。上蛆最妙。炒乾爲末。好酒送下。諸

蟲皆消。肌膚自潤。如其不可得。宜多取毒蛇打死

晒乾。切片磨作粉。和糯米蒸熟。作酒飲之。能起死

回生。


或用白花蛇全蝎大風子益母艸胡麻猪牙皂角



防風荆芥羌活獨活白芷當歸川芎穿山甲僵蚕
等分爲末。蜜丸如龍眼大。每服一九。一日三九。好
酒磨下。仍隨量飲。以醉爲度。

中濕

濕者。天地鬱蒸之氣也。方其升騰于土氣猶籠結而
未開。雖寒天值之。亦覺溫煖。此濕氣之熱者也。及其
布濩于下。氣將流演而舒散。雖暄月值之。亦覺其清
涼。此濕氣之寒者也。濕氣之熱者。多中于氣虛之人。
則發爲濕熱之症。頭面如裹。而四肢浮腫。身體重着。
而轉側不便者。是也。濕氣之寒者。多中于血虛之人。
則變爲寒濕之症。四肢酸疼。而關節不利。筋脉拘攣。
而行履重滯者。是也。其有不因鬱蒸之氣而得者。必



其冒雨而行。涉水而走。或露臥以取涼。或汗衣而不解。漸漬于肌肉之中。滲于骨髓之內。流溢于脾胃之間。牢纏于腰腎之處。則肌肉冷而骨髓疼。脾胃薄而腰腎痛。挾于風痰。則生麻而不仁。兼乎死血。則成木而不覺。動乎火邪。則腫痛而難忍。隨其所感。而病斯痼焉。醫者審其濕之或寒。或熱。人之或虛。或壯。病之或上。或下。感之或淺。或深。因其病而藥之。亦庶乎其近之矣。

藥例

頭面如裹。乃濕熱蒸于上也。

此宜以蒼朮黃芩爲主。佐以升麻防風薄荷甘艸。加葱姜酒煎。溫服之。微汗出。卽愈矣。

四肢浮腫。平素原無脾胃之症者。乃濕熱滯于肌肉也。

宜以蒼朮羌活爲主藥。佐以防風防已腹皮烏藥黃芩甘艸。加姜葱酒煎。溫服之。微汗出。卽愈矣。身體重着。轉側不便者。乃濕熱滲入而將深也。

宜以蒼朮白朮爲主藥。佐以靈仙烏藥枳殼羌活

防風南星半夏加生姜酒煎服之微汗出卽愈
凡此三症皆因濕熱不散故宜微汗雖病人氣虛
亦宜先治其濕而不宜先補其氣先補其氣則膝
理皆密濕無繇而散矣必待浮腫能消重着能脫
而後參芪之類可服也


四肢酸疼關節不利乃寒濕入骨節也

宜以虎骨當歸爲主藥佐以蒼朮白朮官桂烏頭
茯苓防已木通牛膝桑條靈仙之類水煎加車前
子艸汁服之小便利則愈矣

筋脉拘攣行履重滯乃寒濕滲于血脉也血得寒濕
則阻滯而不流脉得寒濕則牽制而作痛

宜以四物爲主藥以養其血佐以茯苓澤瀉木瓜
牛膝防已白朮茸艸薏仁以去其濕少加附子官
桂以溫其經則愈矣

凡此二症皆因寒濕所中惟血虛者得之夫濕病
宜燥而反不用燥劑爲主藥者以燥劑太過能乾
其血故也血一乾而病終不可愈矣故寧以養血
爲主治而佐以利濕溫經之藥使寒得熱而除濕



得熱而散也。大法濕在上以升麻引經。濕在下以茯苓引經。濕在中以白朮并艸引經。濕在遍身以羌活烏藥引經。濕在兩臂以桑枝引經。濕在兩股以牛膝引經。濕熱與寒濕皆以此爲準。此其大畧也。

寒濕疼痛宜外治之法以膏藥貼之。

生姜汁半碗。米醋一盞。廣膠四兩。熬成膏。入肉桂。花椒。牙皂。川烏。草烏末。各五六錢。射香一錢。攪和攤于紵絲上。先以生姜擦患處。烘熱貼上。甚效。又有湯洗法。見股痛門。

骨節疼痛。

白朮

一兩土炒

酒三盞煎一盞頓服。如不能飲酒以水

代之。服後畧飲幾杯。以助藥力。

腰脚疼痛。

黑牽牛

大黃

各二兩

白朮

一兩

爲末。滴水爲丸。如桐

子大。每服三四十丸。食前生姜湯下。如要利加至百丸。

濕傷腎經。腰重冷痛。小便自利。

附子泡去皮 白朮各一兩 杜仲半兩

每服五錢水一盞姜七片空心服

脾濕太過四肢腫痛腹脹喘逆氣不宣通小便赤澀

葶藶四兩 防已一兩 赤茯苓一兩 木香半兩

右爲末棗肉爲丸如桐子大每服三十九食前桑

皮湯送下

風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微腫

羌活 附子 白朮 甘草等分

每服四錢水二盞姜五片溫服不拘時

諸濕腰痛四肢腫滿及酒傷胸脇刺痛口乾目黃

甘草一兩 當歸 陳皮各五錢 爲末每三錢酒調下

附痿症

四肢軟弱身體重滯經年不能下牀而飲食如故不痛不酸有似乎濕而實非濕乃肺經受熱其葉焦垂不能統攝一身之氣故成痿也

宜用四君子以補其氣桔梗引入肺經黃芩山梔以清肺熱瓜蒌子麥門冬五味子以潤肺焦通脫木以通肺竅少加升麻以提肺氣則可以收全功




矣。

中暑

暑者。夏月炎蒸之氣也。丙丁當權。祝融用事。威焰酷烈。鑠石流金。柔脆之軀。不堪燔炙。而中暑之病。有不免矣。夫暑卽爲熱。熱卽爲暑。初無異也。而昔人有中暑中熱之分。豈暑之外。又別有所熱耶。蓋暑與熱。本無所異。而人感之。則有異焉。今夫富貴之人。避暑于涼亭水閣之中。脩竹遶欄。而成蔭。清泉漱玉。而生寒。餽水簾以收涼。揮羽扇以驅熱。浮瓜沉李。以消其渴。鮮菱脆藕。以解其煩。自謂可以無暑矣。而不知虛之

所在。邪必乘之。而暑之所中。繇其內氣之不充也。蓋富貴必生驕奢。驕奢必生活慾。粉黛爭妍于枕簟。嬌羞含笑于簾幃。凡可以快心遂意者。罔不畢致。則戕命之斧斤。日進于前。而追魂之鬼使。日隨于後。雖藉肥甘之奉。形體不見其虧。而不勝活慾之私。元氣已消其半。積虛彌久。肌理必疎。坐談之頃。卒然爲暑風所傷。邪氣直入。霎時昏瞶。精神俱失。迷不知人。甚至有角弓反張。此昔人所謂靜而得之。爲中暑者是也。貧窮勞苦之人。無日夜之安息。戴星而出。乘月而歸。憐念妻孥。奔走衣食。饑不及飯。渴不及飲。竭力于畝。畝而汗血成漿。驅馳于道途。而咽喉似炙。赤日方爲魃。而清風不來。熱地已成爐。而寒泉難覓。精神瘦而欲絕。筋力困而不支。卒然傾仆。不省人事。四肢不動。氣息短促。此昔人所謂動而得之。爲中暑者是也。中暑中熱之分。特因動靜而名之耳。豈真謂暑熱有不同耶。治此症者。當視其所處之貧富。所爲之勞逸。所稟之虛實。所感之輕重。而斟酌以藥之。斯得之矣。

藥例



中暑昏瞶不知人者急以香薷飲灌之即甦。

宜以香薷爲君。厚朴扁荳黃連甘草爲佐。加姜煎之待其甦後。猶宜服此藥。氣虛加四君。血虛加四物。有痰加二陳。渴加五味。門冬。乾葛。天花。有熱加柴胡黃芩。頭痛加川芎。小便不利。加水通淡竹葉。中暑身熱。小便赤澀。胃脘積熱。宜用益元散。又名六一散。滑石六兩。甘草一兩。爲細末。每服三錢。加蜜少許。熱湯冷水任下。如欲發汗。以葱白荳豉煎湯調服。伏暑引飲。脾胃不利。

半夏

醋炙 一斤

甘草生 各半

茯苓

各半 斤

爲末。姜糊爲丸。如桐子大。每服五十丸。熱湯下。

伏暑發熱。嘔吐惡心。

黃連

一斤。好酒三斤。煮乾爲末。麴糊爲丸。每服三十


丸。熱水下。

中暑。不得以冷物逼之。得冷即死。

用新胡麻一升。炒黑。碾爲末。新汲水調下三錢。

中暑在路。發昏不省人事。

急以地漿灌之。則醒。切勿以冷水與飲。飲之即死。



若輕者。以新汲水滴入鼻孔。以扇搨之。

中熱。顛仆不醒。


急以蚯蚓糞填臍中。令小兒撒尿其上。自醒。然後扶在陰涼處。將一味天花粉煎湯。頻頻飲之。或用香薷飲。渴加茯苓麥冬五味。虛加人參。小便澀加車前木通。胃氣不和加姜棗。

冒暑煩渴。飲水過多。心腹脹滿。小便赤少。


用肉桂赤茯苓各五兩。爲末。蜜丸。每兩作十丸。每服一九。細嚼。白湯冷水任下。

瘧疾

瘧者。殘虐之意。從病從虐。故名曰瘧。是病也多發于秋。以夏傷于暑。故至秋而發也。有先寒後熱。先熱後寒。單寒無熱。單熱無寒。大寒大熱。微寒微熱之異。分而言之。先寒後熱者。先得于寒。先熱後寒者。先得于熱。單寒無熱者。外感必重。單熱無寒者。內病必多。大寒大熱者。邪必深。微寒微熱者。邪必淺。又有久寒久熱。經幾月而不愈者。必其不守禁忌。兼以元氣虛弱。故也。合而言之。不專于外傷寒邪。亦平日飲食不節。



及七情六慾所傷。兼之以脾裊痰而不散。與內之飲食。外之暑氣。相結交固。流聚于少陽之分。少陽位人身之半。爲陰陽往來必繇之路。又在半表半裏之間。陰血流過其處。激而生寒。陽氣行過其處。激而發熱。或陰陽交會。則寒熱交作。久而不愈。則結成瘧母。藏于脇下。脇下者。少陽之分也。治此病者。以引經藥引。至少陽之分。而以消食化痰。疎風調氣之劑。量其輕重而投之。無不應矣。然同一瘧也。有一日一發。有間日一發。有三日一發者。何也。蓋病之所繇來者。有遠近也。冬傷于寒。不卽病。直至明年之秋而後發者。則三日一發之瘧也。春傷于濕。不卽病。至秋而後發者。則間日一發之瘧也。夏傷于暑。不卽病。至秋而後發者。則一日一發之瘧也。三日一發。受病幾一年。間日一發。受病幾半年。一日一發。受病幾三月。每以得病之遠近。爲所發之日期也。醫者以心度之。見其三日一發。則知其得之于寒。當以辛溫之藥散之。見其間日一發。則知其得之于溫。當以涼藥清之。見其一日一發。則知其得之于暑。當以清暑之藥治之。然必見



其症有相合者。方可投也。如無汗要有汗。散邪爲主。有汗要無汗。正氣爲先。然散邪正氣而病不退者。須分利陰陽治之。至于有食則消食。有痰則化痰。有風則散風。有寒則攻寒。有熱則驅熱。有氣則開氣。新病則去其病。久病則補其元。精而明之。則在乎其人也。

藥例

清熱如柴胡黃芩芍藥連喬山梔生甘艸之類。

治寒如乾姜桂枝麻黃之類。

定寒熱如羌活防風柴胡芍藥炙甘艸之類。

消暑如香薷黃連扁豆厚朴甘艸之類。

消食如枳實黃連檳榔艸菓三稜蓬朮神麴麥芽山

查之類。


治痰如橘紅半夏貝母天花粉枳殼黃芩桑皮桔梗
甘艸之類。

喘如杏仁蘇子馬兜苓之類。痰甚加姜汁竹瀝之類。

散風如防風荆芥紫蘇葱白生姜之類。頭痛加川芎

白芷。遍身骨節疼加羌活。無汗加蒼朮。

化氣如青皮香附烏藥枳殼木香砂仁之類。



補虛必分氣血。氣虛以人參爲君。白朮炙甘草大棗之類爲佐。大劑芍藥以定寒熱。禁用茯苓黃芪。以茯苓能引邪入陰經而不得出也。黃芪補表太過。邪不能去也。血虛以當歸爲君。川芎熟地炙甘草大棗爲佐。大劑芍藥以定寒熱。津液少加門冬花粉之類。


久病新病皆用柴胡。但久病用少。新病用多。以瘧乃少陽經之病居多。而柴胡又少陽經之引藥。且治寒熱有功也。

瘧母在脇下。非煎劑所能愈。乃痰與食併結不化而成也。

宜以生鱉甲醋炙爲君。浮石白芥子半夏之類以治痰。蓬朮檳榔枳實山查艸菓之類以治食。青皮香附木香之類以開氣。白朮陳皮之類以助脾。共爲末。以醋或酒爲丸。人參柴胡湯下。

瘧久不住。或三四日一發。


葶山檳榔烏梅肉各四錢。炙甘草二錢。酒水各一鍾。隔夜煎。露一宿。次早溫服。微吐卽效。




或用掌山一兩。剉碎。以好酒浸一宿。瓦器內煮乾。
爲末。每服二錢。水一盞。煎至半盞。去渣停冷。五更
初服之。不吐不瀉效。


或用知母貝母掌山檳榔等分。水酒各一盞。煎至
一盞。綿覆一宿。五更面東服之。卽效。不可令婦人
煎。



瘡疾發于春夏冬三時者。非其時而有其氣。乃似瘡
而非瘡也。或一日兩發。或一日三發。其寒熱無定
時。皆不可以瘡治之。必其陰血不足。兼感外邪。





C83/2912
V.2





金沙王肯堂字泰父著

茂苑張暎垣玄暎父叅

武水蔣儀儀用父較

痢疾

痢者卽下利之病也。從病從利故名曰痢。然其爲病。豈一朝一夕之故哉。其所繇來者漸矣。蓋因平日飲食不節。油膩生冷。恣嗜無忌。或饑飽不時。或冷熱不擇。停蓄于中。久而不化。又或外感暑濕。內傷七情。行

房于既飽之餘。努力于過飽之後。所積之物。煨煉稠粘。有赤有白。有赤白相雜。與純黃色之異。不見其糞。而惟見其積者。爲藉氣血而變成也。傷于血。則變爲赤。傷于氣。則變爲白。氣血俱傷。則赤白相雜。若赤白兼黃。則脾家亦傷而純于赤白者。亦未必非傷脾所致也。使無赤白。而其色純黃。則專傷脾土。而氣與血猶未甚動焉。至若下利如黑塵之色。及屋漏水者。皆不治之症。或大孔如竹筒。唇如硃紅。皆死候也。而噤口者亦多死。以其無胃氣。而邪熱獨結于上也。大法初起當先推蕩。而後調理。病久則帶補兼收。切不可驟用瀉藥。初痢一瀉。積聚不去。多致死亡。又不可因久痢之人。氣虛不攝。妄投黃芪升麻之類。下痢若服黃芪。卽發臌脹。若服升麻。則小便與積皆升至上焦。此速死之道也。但傷血則調血。傷氣則調氣。傷脾則養脾。當寒而寒。當溫而溫。當燥而燥。當清而清。因病用藥。其可以執一乎。

藥例

初痢裡急後重者濕多也。必先于燥濕。

宜以蒼朮防風爲主。佐以黃連檳榔木香之類。便之快利

初痢腹痛甚者。食積多也。必先于消食積。

宜以大黃爲主。佐以厚朴枳實檳榔蓬朮甘草之類。待其利後。方以當歸白朮茯苓芍藥之類。以調理之。

下痢純黃。必先消食養脾。

宜以蒼朮厚朴茯苓爲主。佐以白朮枳實陳皮檳榔蓬朮山查神曲甘草之類。

赤痢。必先于清血。

宜以當歸爲主。佐以黃連山查麥芽桃仁甘草之類。

白痢。必先于調氣。

宜以木香爲主。佐以陳皮厚朴白朮茯苓神曲麥芽芍藥甘草之類。

赤白相雜。必先調氣養血。

宜以當歸木香爲主。佐以桃仁山查麥芽陳皮白朮黃連甘草之類。

血痢久不愈者。帶補兼收。

宜以當歸芍藥川芎地黃爲主。佐以白朮地榆烏梅五味甘草之類及黃連。

白痢久不愈者帶補兼溫。

宜以白朮人參茯苓甘草爲主。佐以肉蓯肉桂訶子烏梅大棗煨姜之類。

赤白相雜久不愈者帶補氣血兼澀。

宜以當歸白朮芍藥人參爲主。佐以肉蓯烏梅炙甘草粟殼大棗之類。

久痢不愈至九十月間者大補兼溫。


宜以大劑人參白朮爲主。佐以炒黑乾姜烏梅肉蓯肉桂炙甘草大棗之類。

下痢純血不稠粘者乃傷血也。必消導其血。

宜以當歸桃仁紅花山查爲主。佐以蘇木赤曲牛膝生地黃赤芍甘草之類。此病在大人多難愈。在小兒則惟以食積治之。

休息痢經年累月不愈。或愈後不時復發者。是也。此爲氣血皆虛脾胃甚弱。不可不大補。

宜以當歸地黃人參白朮爲主。佐以川芎芍藥茯苓



苓炙甘草肉桂烏梅肉巢之類。不用煎劑。卽以此爲末。用大棗煮熟。去皮核。搗成膏。加生姜汁。拌和爲丸。空心米湯送下二百丸。爲掌服之藥。方可收功。

噤口痢。絕不飲食。食卽隨吐。蓋爲邪熱在上焦。脾土不能爲主。故患此病者多死。若治得其道。亦或有可生者。宜用白芍木香黑姜等劑。


宜以乾山藥細茶爲主。佐以人參石連黃連石菖蒲茯苓之類。水煎。加生姜汁。徐徐呷之。任其吐出。仍與飲之。又吐又飲。終至不吐卽可生矣。再與二三服。卽愈。以後不必再服。胸次一開。自然思食。何噤口之有。故宜用石菖蒲。

疫痢。增寒壯熱。下痢臭穢。衆人病一般者是也。必先解表發散。

宜以大劑蒼朮爲主。佐以羌活防風人中黃芍藥黃芩黃連之類。加葱白生姜服之。

泄瀉


泄者如水之泄也。勢猶紆徐。瀉者如水之瀉也。勢已直下。微有不同。而爲病則一。故總名之曰泄瀉。要其致病之繇。皆因內傷飲食。外感寒濕。脾土受傷。不能運化。以致陰陽不分。偏滲大腸。而病斯作矣。然亦有先感怒氣。而後傷飲食者。有先傷飲食。而後感怒氣者。有適值飲食之時。而忽暴怒者。有憂鬱內結。而含悲以食者。有飲食後。卽入水洗浴者。有飲食未久。復飲食者。凡此皆足以成此病。善調攝者。不饑不食。不



渴不飲。喜怒有節。不使太過。何致有泄瀉之患哉。大抵泄瀉與下利。皆脾家之疾。而受病之新久不同。故勢有輕重。而治之亦有難易也。然果何以知之。蓋宿食停于中。得濕熱而始變。則有赤白諸般之色。而爲下利。此受病已久。故有積而無糞也。飲食過飽。挾寒濕而不盡化。則大便通利。無裏急後重之苦。而爲泄瀉。此受病未久。故有糞而無積也。此瀉與痢之別也。如是用藥者。其可以槩施乎。然諸痢多熱。而寒者少。諸瀉多寒。而熱者少。或有之。惟完穀不化。屬于客熱。在脾。火性急速。不及傳化而自出也。然亦有脾寒不能運。而完穀不化者。此其掌也。治此病者。當視小便之赤白。察其脉之洪數沉遲而已。小便赤。脉洪數。則爲熱。小便清。脉沉遲。則爲寒。醫者不可以不辨也。

藥例

暴泄者。皆因生冷油膩。恣食無節。或飲酒無忌。適觸寒邪。故成暴泄。其瀉出者。皆是水。乃陰陽不分。偏滲大腸。而小便必短濇。治者以利小便爲先。小便利。則大便止矣。



用一味車前子炒爲末以米湯送下四五錢或六七錢其瀉立止然後以白朮爲君蒼朮厚朴茯苓陳皮神麴山查麥芽炙甘草爲佐加姜棗煎服寒瀉者腹中假假作痛痛久而後下者是也宜以溫脾爲先。

用肉桂爲君白朮乾姜陳皮茯苓炙甘草爲佐加大棗煎服。

熱瀉者肚腹

常熱而痛

口乾舌燥小便赤澀所下之糞皆


深黃色是穢不可近者是也宜以清熱爲先。

用生芍藥爲君白朮茯苓黃連生甘草山查麥芽神麴爲佐。

食瀉者腹中絞痛痛一陣下一陣卽稍寬少頃又痛又下者是也宜以通利爲先。

用大黃爲君枳實厚朴甘草爲佐服此藥後猶未愈者宜以白朮枳實山查麥芽神麴陳皮甘草煎服。

氣食兼併而瀉者兩脇中脘皆痛腹中噎悶瀉亦不甚通利者是也宜以行氣消食爲先。



用青皮木香香附砂仁之類。以行氣。檳榔神菓山查麥芽神麴之類。以消食。先服一二劑。後以蒼朮白朮茯苓陳皮厚朴甘艸之類。以調理之。

宿食不消作瀉者。飽悶作痛。或時噉酸臭之氣。大便秘澀。滑不甚通快者。是也。專以消宿食爲主。不必治其瀉。審其所傷之物。而以所治之藥消之。

如傷肉食。宜以山查爲君。佐以三稜蓬朮枳實黃連之類。

如傷米食。宜以麥芽爲君。佐以神麴陳皮蒼朮厚朴蓬朮三稜枳實黃連之類。

如傷麴食。宜以萊菔子爲君。佐以枳實黃連麥芽神麴檳榔草菓之類。

如傷生冷。宜以肉桂爲君。佐以乾姜檳榔草菓萊菔子陳皮枳實之類。

如傷油膩。宜以蒼朮爲君。佐以滑石茯苓陳皮厚朴炙甘草白朮神麴之類。

如傷酒。宜于消食藥中。加消酒之藥。如葛粉藜蘆粉天花粉黃芩山梔之類。傷火酒。用酒麴。傷濁酒。

用酒藥必各從其類。

直腸自下者名曰洞瀉。

大劑白朮爲君佐以五味訶子肉蓯牡蠣栗殼之類。

每朝登廁澹滑者名曰脾泄。

大劑白朮爲君佐以煨姜大棗茯苓炙甘草之類。
久瀉腰痛者名曰腎泄。

大劑杜仲爲君佐以白朮茯苓人參肉蓯訶子五味之類。

一說宜溫腎爲先而故帑茴香亦可服。

泄瀉兩脇痛者名曰肝泄此得之于惱怒。

大劑芍藥爲君佐以白朮茯苓蒼朮厚朴青皮甘草之類。禁用姜橘以其補肝也。

當泄瀉時又閉而不下及所下者多白沫而有聲乃風泄也。

宜以防風爲君佐以蒼朮厚朴陳皮甘草白朮茯苓之類。


完穀不化者其病多危蓋因純寒純熱而無胃氣以

運化也。不必用消食之劑。但以白朮爲君。審其熱。加姜炒黃連。山梔連翹之類。入大棗糯米煎服。審其寒。加肉桂肉蓯乾姜煨熟附子甘艸之類。入大棗糯米煎服。

凡瀉本屬濕。多因飲酒不節。致傷脾胃而作。治者當分利小水爲上。而補脾燥濕消食次之。須知初瀉補脾。久瀉補氣。又有久瀉腸胃虛滑者。宜以升提收瀉之藥爲主治。此大法也。

秘結

秘者。氣之秘也。結者。糞之結也。氣秘則攻擊于腸胃。而瘀塞于魂門。欲下不下。雖努力以伸之。而難于通暢。甚至有肛下者。糞結則乾澁堅硬。多轉失氣。而小腹結痛。欲下不下。甚至有肛門燥烈而瀝血者。秘而不結。雖不通利。而不甚艱難。結而不秘。雖不滋潤。而不甚費力。惟秘結兼至。難中之難也。少壯之人多患秘。以其氣有餘。而不及轉運也。衰老之人多患結。以其血不足。而大腸乾燥也。又有所謂風秘者。嘗欲轉



失氣而氣終不洩。肛門壅塞。努力伸之。則有聲如裂帛。而糞又不下者。是也。其根始于傷風咳嗽。咳嗽將愈。而此病即發。以肺與大腸相為表裏。風入于肺。而傳病于大腸故也。脉經曰。尺脉見浮風入肺。大腸乾澀。秘難通。非此之謂乎。大法秘者調其氣。結者潤其血。而秘之得于風者。即于調氣潤血藥中。加去風之劑。則得之矣。

藥例

氣秘不通。以調氣為先。

宜以木香為君。枳殼檳榔青皮陳皮蘇梗之類為佐。長流水煎。加玄明粉三四錢。量大小虛實用之。
玄明粉乃朴硝所成也。其法以提淨朴硝入礬火煨成汁。傾在淨地上。待冷。每硝十兩。加井水二兩。為細末。即成粉矣。

糞結不下者。以潤血為先。

宜以當歸為君。知母麥冬桃仁麻仁蘇子為佐。長流水煎。加蜜數匙。結甚。加蜜一兩。熟猪脂半兩。調和服之。

秘結兼至者。以調氣潤血為先。

宜以木香當歸爲君。枳殼桃仁知母麥門蘇梗麻仁之類爲佐。長流水煎。加玄明粉生蜜服之。

風秘者。以去風爲先。

宜以防風爲君。荆芥紫蘇葱白之類爲佐。加木香當歸枳殼桃仁之類。長流水煎。加玄明粉生蜜服之。

老人黑瘦血枯不通者。以生血爲先。

宜于四物湯中。倍加當歸生地。兼以麻仁麥冬之類。長流水煎。加生蜜服之。

內熱秘結者。以清熱爲先。

宜以黃芩爲君。石膏山梔黃柏麥冬桃仁爲佐。長流水煎。加玄明粉服之。熱結甚者。以大黃爲君。厚朴枳實桃仁葶艸之類爲佐。煎服。大忌巴豆。蓋巴豆大熱。服之。雖一時通快。不久復病。于此而又通之。則必至于亡陰。而不可救矣。

後重不下者。以抑火爲先。

宜以黃連爲君。木香檳榔大黃當歸爲佐。煎服之。或用黑牽牛炒熟。每一斤。取頭末四兩。爲細末。和

生蜜搗如泥。九如桐子。每服三錢。白滾湯下。善飲者。好酒送下。


統治一切秘結。

用桃仁去皮。蘇子淘淨。各五錢。搗爛。入水一碗。再研和。以布絞去渣。調生蜜一兩服之。

或用生蜜一大杯。滾湯一碗。調和。加玄明粉三錢服之。卽時通快。不損脾胃。此聖藥也。

若人胃強脾弱。約束津液。不得四布。但輸膀胱。而小便數。大便難者。用脾約丸。

若人陰血枯槁。內火熾烈。肺受火邪。土受木傷。脾肺失傳。而大便秘。小便數者。用潤腸丸。



脾胃

五臟之有脾胃。猶五行之有土也。天一生水。得土之五而成六。地二生火。得土之五而成七。天三生木。得土之五而成八。地四生金。得土之五而成九。天五生土。復得土之五而成十。五行無土。不能成五行。五臟無脾胃。不能資五臟。脾胃者。五臟之本也。心肝肺腎。不能容飲食。能容之者。脾與胃也。飲食入于脾胃。而精氣行焉。味之醢者。先入于腎。所謂水得土而成水也。味之苦者。先入于心。所謂火得土而成火也。味之

酸者先入于肝。所謂木得土而成木也。味之辛者先入于肺。所謂金得土而成金也。味之甘者本宮受之。而實所以調和五臟。所謂土得土而復成也。夫然後腎水掌足。心火寧靜。肝木條達。肺金清潤。而周身脉絡無不貫通。病無自而作矣。故善保身者。惟養脾胃而已。不節勞則傷脾。而四肢于是乎倦怠。不節食則傷胃。而中脘于是痞塞。濕土之氣鬱而不發。則臃脹黃疸之疾成。濕土之氣潰而下注。則痢疾泄瀉之病作。而脾胃之症。此其極矣。不但已也。脾胃一傷。則五臟皆無生氣。繇是為腰痛。為煩懣。為勝。為脹滿。而腎

始病矣。為恍惚。為怔忡。為煩躁。而心始病矣。為吞酸。為吐酸。為脇脹。為多怒。而肝始病矣。為咳嗽。為喘急。為呃逆。而肺始病矣。五臟之病。亦有自為病者。未可皆歸罪于脾胃也。而病之始于脾胃者居多焉。人可。以不調理脾胃乎。要而言之。飲食勞倦。皆宜有節。而二者之間。又以節飲食為主要。蓋胃居脾下。飲食之所聚也。而尅化之權。則在于脾。脾覆乎胃。運闔闢之機。無一時而不動。胃火上升。脾火下降。氣掌溫煖。是

以飲食易消。若嗜味而過飽。則充塞胃口。上碍于脾。脾雖欲動。不能動矣。其能以尅化乎。此所以調理脾胃。又莫先于飲食之節也。

藥例

大抵肥白之人多濕。一有脾胃之症。必濕滯于肉也。宜大劑蒼朮爲君。白朮半夏爲佐。以燥之。而又兼以茯苓澤瀉猪苓木通之類。以利其濕。使從小便而出可也。

黑瘦之人多血少。一有脾胃之症。必脾虛不能裹血。以致之也。宜用意消息之。若口乾唇燥。肌膚少潤。而又飲食不能消化。必兼血藥。如四物湯之類。配四君子湯。加姜棗。而四君子中以白朮爲君。乃爲得宜。若無血少之症。亦不必用血藥。要在活法。

胃弱不知滋味。飲食厭倦者。宜鼓動其胃氣。必以芬芳藥開之。如藿香木香檀香之類。君以人參白朮。佐以枳實陳皮砂仁甘艸之類。枕邊寧置烏梅。二三個。酸氣入鼻。最能開胃。此捷法也。

脾虛作瀉。氣不收攝者。宜大補其脾。畧加收瀝之劑。

宜人參白朮爲君。茯苓蓮肉薏仁之類爲佐。而以訶子肉菓五味烏梅之類。則收澀之劑也。

婦人脾胃不和。胸膈痞滿。


宜以白朮爲君。枳實陳皮爲佐。每藥一斤。配便浸香附一斤。作丸服之。

老人脾胃不和。大便乾澀。

宜以鷄腿朮爲君。枳實陳皮爲佐。每藥一斤。配歸身一斤。少加甘草。作丸服之。


此治脾胃之劑。

宜以白朮爲君。茯苓陳皮枳實甘草爲佐。挾寒加官桂。挾熱加黃連。挾痰加半夏。挾濕加蒼朮。血不足加歸地。氣不足加參芪。有食加神麴。麥芽萊菔。予之類。有蟲加檳榔。川楝。針砂。使君子之類。有氣加木香。香附。青皮之類。要在斟酌用之。不可執泥。其餘泄瀉下痢。臌脹黃疸之症。雖皆屬於脾胃。然自有本條開陳。此不復贅。




蟲症

蟲。動物也。艸木水土之中。宜有之。何爲而有于人之腸胃中乎。蓋蟲者。亦得天地之氣以成形者也。而形不自成。必假物而後成。如艸腐而生螢。雀死而成蛤。魚肉爛而生蛆。皆藉有形之物。感陰陽之氣。而後形體成焉。人身小天地。而人之氣。卽天地之氣也。然則蟲之生于腸胃中者。亦豈無所假而成哉。飲食入胃。不能消化。如魚鮮肉醢。生麪硬飯之類。停積于中。濕熱相感。稠粘膠固。資熱血以相裹。得生氣以陶鎔。則



不動之物。悉能成動之形。頭尾皆具。而渾然一蟲類矣。其始也。因飲食而變。其既也。賴飲食以養。絞擾蟠結。食人精氣。飲人膏血。壞人臟腑。殛人壽命。蟲之爲害。可勝言哉。大凡難化之物。皆能生蟲。不但如酢醢麪飯之類而已。若誤吞頭髮羽毛。尤爲易生者也。不特此也。雖無質之物。亦能生焉。如濃茶濁酒。本無質者。而所澄之脚。最能成病。故有茶癖酒積之症。久之亦變爲蟲。成于茶者。寧思食茶。成于酒者。必酷嗜酒。一日不遂所欲。則一日不能暫安。此其症也。又有所

謂癆蟲者。又何所自而生耶。蓋癆蟲卽尸蟲也。癆疾之人。多瘀血。瘀血不消。得火煅煉。遂成細蟲。其色多赤。無翼而能飛。或隱或見。其來也不測。皆血之所化也。以其爲血所化。故比諸蟲。則甚靈焉。血統于肝。而肝則藏魂。故此蟲者。魂之所依也。病人旣死。魂隨蟲出。好覓同氣。同氣之親。不幸而染之。則成傳尸癆焉。此又蟲之最可畏者也。然蟲病人恒有之。醫者何以灼知其真。而藥之耶。必有形症可見也。蟲病之人。面黃肌瘦。唇白毛枯。容顏不澤。臉多白印。時覺惡心。口




吐清水。或心腹絞痛。飲食不爲肌膚。或頭髮猙獰。酒
漸惡寒。或額面生瘡。濕癢沿連。皆其症也。知此則可
以用藥矣。若夫癆蟲之形症。必其人之父兄伯叔。先
患癆症而死。而其人復有是症。乃可以決之耳。又豈
與諸形症同哉。

藥例

口中吐蛔者。乃胃火上升。蛔不能安。故隨火而起也。
宜先以烏梅黃連安之。使其降下。然後以殺蟲之
劑投之。可也。然殺蟲之劑。切不可用花椒。花椒雖
能殺蟲。而其味本辣。若于吐蟲之時。而驟用之。必
跳躍而起。寧不絞壞心胸乎。醫者不可不知也。縱
使欲用。必先去其核。溫湯浸浮。令其口閉。空朝以
好酒送下。亦治法也。此不惟可以治蟲。而患寒症
者。亦能治之。

大便去蟲者。當任其自出。若去蟲太甚者。不可專治
其蟲也。

宜以白朮等藥安其脾。佐以檳榔川棟。使君子之
類。以除其根。斯攻補兼施之道也。



蟲病腹滿作痛必下之


用黑牽牛一斤。取頭末四兩。用生大黃四兩。再研極細。蜜水爲丸。如桐子大。饑時好酒送下三四錢。大下諸蟲。然後以人參白朮陳皮茯苓炙甘草大棗補之。

蟲食下部。肛門痒甚。乃大腸受熱。生化細蟲爲害也。雖服丸散煎劑。道路甚遠。不能奏功。必當其處取之方可。

用猪胆一大塊。切作圓縷一條。長可五六寸。煮熟。四圍刺作眼如簪脚大者。三四百孔。蘸糖塞進肛門。其痒益甚。少頃痒止。其蟲已入肝中。徐徐取出。另換新者塞之。如此數次。卽愈。亦治婦人陰戶有蟲。痒不可忍。者甚驗。不可視以爲迂也。

好食茶者。謂之茶蟲。酷思酒者。謂之酒蟲。欲飲油者。謂之油蟲。至于小兒多好食生米壁泥。皆蟲所使也。

皆當以殺蟲之藥。如鉛灰雷丸檳榔川棟使君子之類。爲丸。卽以所好之物送下。直至蟲處而殺之。



一法不必服藥。但使病人禁食所好之物。苦苦忍之。忍至四五日。其蟲不得所食。則饑而上升以求食。口中覺饒甚。將病人綁縛椀上。令其覆臥。然後以所好之物。近其口邊引之。香氣入喉。必湧躍而出矣。


疳蟲爲病。面黃骨立。肚腹膨脹。小兒多有之。

宜用大蝦蟇幾隻。將砂仁入其腹中。令滿。以線繫其足。倒掛當風處。陰乾。炙脆爲末。同人參白朮枳實懷榔。使君子黃連針砂麥芽山查陳皮之類。共研細爲丸。如米糲大。或爲散子。糖拌服之。大有奇效。

凡治蟲病。當于每月上旬服藥。乃能奏功。若非月上旬。多有未效。蓋諸蟲每月上旬。頭皆向上。故服藥運至其口中而殺之。此亦但論治蟲之日期耳。不可執以爲一定之法。若病勢已急。豈能待其月上旬耶。凡蟲方已見癆瘵門。此不復贅。

黃疸

黃疸之病。皆濕熱所成。濕氣不能發泄。則鬱蒸而生熱。熱氣不得宣暢。則固結而生濕。濕得熱而益深。熱因濕而愈熾。二者相助而相成。愈久而愈甚者也。然求其濕熱之所繇生。未有不繇于大醉大飽。及醉飽後貪睡久臥。與努力行房而得者。或醉飽後入水洗浴。寒氣斂束。密其腠理。汗不得出。以致濕熱相感。而成此病焉。外不得汗。內不得瀉。薰蒸濡染。流入皮膚。上達面目。下至足趺。中及手臂。前腹後背。皆如塗金。



小便赤如姜黃。猶之罨麴醬。因濕熱而成其色也。大法上半身黃甚。則宜發汗。下半身黃甚。則宜利小便。以分消其濕。而佐以退熱之劑。然又必觀其所傷之物而消化之。非徒治其濕熱而已。此不易之論。若久而不愈。還宜救脾與血也。欲知其不治之症。何以斷之。曰黃疸變黑如烟塵者死。小便如膏者死。腹脹者死。飲食太少者死。渴者難治。不渴者易治。若眼漸白。小便長者。病將退也。

藥例


黃疸因中酒而成者

宜大劑葛根爲主。佐以天花粉。山梔。茯苓。甘草。梢木。通車前子之類。以利小便。使濕從下行。蓋酒本無質之物。只宜利小便而已。

因食傷而成者。審其所傷者何物。

如肉食則山查。阿魏。穀食則麥芽。神麴。麩食則萊菔子。陳皮。宿食則枳實。黃連。暴食則檳榔。艸菓之類。佐以利小便之劑。

因女色而成者。名曰女勞疸。亦未有不繇于醉飽者。



若不醉不飽。雖行房亦未必成黃色。治此病者。以活血爲主。生血次之。如桃仁紅花丹皮赤曲之類。兼以四物湯。佐以消食消酒之劑。并利其小便而已。

因傷食既久。服消食藥不效者。勿以不效而遂止之。宜多服幾貼。浮動其根。待腹中絞痛。卽以大黃三錢。厚朴二錢。官桂一錢。甘草五六分。下之。

得病後全無汗者。乃腠理縝密。濕不能散也。宜以發汗爲主。如蒼朮白朮葱白紫蘇羌活之類。如又無汗。再加桂枝麻黃甘草。或單用浮萍艸煎湯。時時飲之。亦能取汗。若有食則消其食。有酒則消其酒。當消息之。不可專于發汗。若身壯熱而無汗。則用麻黃。勿用桂枝。

身面皆黃。又發熱者。熱多于濕也。

宜以茵陳爲君。山梔黃連甘草爲佐。或發汗。或利小便。隨症治之。若服寒涼之劑。而熱不退。宜加幾味。如人參連翹芍藥麥冬服之。恐生虛熱也。若純用寒涼之劑。脾不能堪。多有發單脹者。慎之慎之。

但于劑中加生姜幾片。則藥有監制。而功可奏矣。
凡黃疸之病。其原必起于脾虛不能運化。轉輸不
及。濁氣拂鬱而然。是脾虛爲本。濕熱爲標。又有傷
寒熱病。陽明內實。不得發越。亦令發黃。治法不可
一例而施也。

統治黃疸。久不愈者。

用桃樹根東行者一束。洗淨切碎。煎二三碗。令病
人空朝服之。約人行二十里許。卽欲大便。下盡黃
水。卽愈矣。然不可謂全妥。又必調理脾胃。庶不生
他症也。


附黃腫

人有病黃腫者。不可誤以爲黃疸。蓋黃疸者。遍身如
金。眼目皆黃。而面無腫狀。黃腫之黃。則其色帶白。而
眼目如故。雖同出脾胃。而病形不同。醫者當審而治
之。黃疸之起。繇于濕熱蒸染。而黃腫之症。則濕熱未
甚。而多蟲與食積之爲害也。或偶吞硬食過多。碍其
脾家道路。經久不消。脾家失運化之權。濁氣上騰。故
面部黃而且浮。手足皆無血色。其有蟲者。必吐黃水。

毛髮直指皮膚不澤。且好食生米茶葉之類。是也。若腫及四肢者難治。腫及腹者不治。飲食減甚者不治。以其無胃氣也。


藥例

審其病果蟲多于食。則以殺蟲藥爲主。食多于蟲。則以消食藥爲主。蟲食相半。則均治之。治蟲如使君子。檳榔。鉛灰。雷丸。川棟之類。治食如枳實。黃連。阿魏。山查。蓬朮。艸菓之類。治蟲治食。必帶補脾胃。兼去其濕熱。如白朮。蒼朮。茯苓。澤瀉之類。量病加減。作丸藥。而劑中又不可無針砂。有針砂則其功易奏。此皆王道之藥也。若欲收霸功。則巴霜。硃砂。礞石之類爲末。以粽角搗爲丸。其功尤速也。如其不然。則但以消食殺蟲之劑。先服幾貼。浮動其根。然後以承氣湯下之。亦妙。




臃脹 水腫

臃脹之所以得名者。以其肚腹脹緊。彈之有聲。有似乎鼓。故名曰臃脹。然果何自而致此哉。蓋臃脹之作。有得于食者。有得于氣者。有得于氣食兼併者。有先得于色。而後傷于食者。有先得于食。而後傷于色者。傷于食。則食不消。而胃氣已窒。傷于氣。則肝經受病。而痞塞不通。傷于氣食。則肝益有餘。脾益不足。以有餘之肝木。尅不足之脾土。則氣愈結。而食愈不化。繇是膨脹緊急。而病日益深矣。先得于食。而後傷于色。



則脾先受病而腎繼之。中脘先脹而後及于小腹。先得于色而後傷于食。則腎先病而脾繼之。小腹先脹而後及乎中脘。若氣與食色三者皆備。則一齊而發。中脘小腹兩脇盡脹。此病之尤重者也。臌脹不愈而眼下忽如臥蠶狀者。必發水腫。然水從何而得耶。蓋人之一身。血與肉而已矣。食入于胃。則游溢精氣。可以生肉。飲入于胃。則灌溉百脉。可以生血。飲卽水也。飲旣生血。則血之所成。成于水也。自出母胎。以至成童。自成童以至壯盛。其所飲旣多。則其所生亦多。水卽未成之血。血卽已成之水也。使其善于調攝。不爲氣與食色所傷。則血不受病。何水腫之有。惟夫外傷于氣。內傷于食。與色。則內氣交結。而血滯不流。又中挾脾濕。下連腎水。水土混淆。滲于皮肉。則一身之血。復變爲水。與脾腎二經之邪。統而爲一。且旁達于四肢。充滿于上下。其狀如匏。其冷如水。其堅如石。而病斯極矣。欲知其死生。何以斷之。曰臌脹之病。臍滿者重。臍突者死。飲食太少者死。水腫之病。手足心平滿者死。面黑者死。此斷死生之大訣也。大法治臌脹者。



以實脾去濕寬膨利水爲主。治水腫者以行水爲主而後補之。

藥例


傷于食者以消食爲主。而佐以扶脾利水去濕寬膨之劑。如檳榔艸菓枳實陳皮萊菔子山楂麥芽之類以消食。白朮以補脾。蒼朮以去濕。厚朴大腹皮以寬膨。茯苓猪苓車前澤瀉以利水。

傷于氣者以開氣爲主。而佐以扶脾利水去濕寬膨之劑。如青皮枳殼木香烏藥之類以開氣。而其餘藥與前同用。

氣食兼併者以前消食開氣之藥爲主。而所佐之藥如去濕寬膨利水之劑亦與前同。

先傷于食而後傷于色者以消食爲主。如前所用之類而兼用當歸紅花蘇木桃仁以活血。其餘所佐之藥亦與前同。

先傷于色而後傷于食者以活血爲主。如當歸之類而消食之劑亦同于前。其餘所佐之藥亦同前可也。若氣食與色兼併皆以前藥參用。又當分其緩



急而次第施之。

婦人亦有氣臌、食臌、而血臌俱多。以其多起于經閉。及產後惡血不出所成也。方與論俱見婦人門。而氣食所成者亦以前所用者爲準也。

凡治此病切不可用甘艸。而諸藥之中必多用生姜皮煎服。

水腫之病有因臌脹而得者。有不因臌脹而得者。皆視其眼下高起如臥蠶者。必發此病也。論大法亦宜實脾利水寬膨去濕順氣。然病勢至此。則水氣用事。真氣無權。正如一國之中已爲大寇所據。而爲之君者。既失其地方。且以君子之道勸之。徒激其怒耳。于事竟何益哉。必以大兵臨之。乃能濟事。雖城郭宮室之美。人民庶物之富。不無大壞。而猶不失其故土。亦可以招集叛亡。復其舊業。而宗社血食。或可保也。何以異于是乎。故實脾利水之劑。雖曰穩當。而未能速應。必先用甘遂芫花葶藶大戟之類。開通水道。使從大小便一齊而出。如大禹治水。掘去壅塞。順流而下。始能底績。待其水下之。

降時時與米湯飲之。則病人不至眩暈。水既下盡。然後以參朮茯苓大棗煎湯。徐徐服下。服數劑之後。更以八物湯作九子服之。則庶乎其可也。然此亦求一生于萬死之中耳。至于死生存亡。猶未可保。醫者以活人爲心。故不能不曲爲之所。豈真以是病爲易治。而輕試其手哉。

水腫病。不問年月遠近。

用大戟當歸陳皮各一兩。剉碎。水二升。煮七分。蠶

服。當利下二三斗。至重不過再服。此方亦治血蠱。水氣遍身浮腫。氣促坐臥不安。

用牽牛二兩。微炒。搗末。以烏牛尿浸一宿。平旦入葱白一握。煎十餘沸。去渣。空心分爲二服。水從小便中出。

總治水腫。看何經加藥。

葶藶川椒雄黃澤瀉芫花

醋浸炒


大戟葶藶遂赤茯苓

桑白皮穿心巴戟

各一兩

爲末。每用一兩。水浸。煎八

分。空心溫服。小便多爲效。加藥之法。須看何經。從陰腫起。其根在腎。加澤瀉一兩。從腹腫起。其根在



肚加川椒一兩。從口唇腫起。其根在小腸。加巴戟一兩。從面腫起。其根在脾。加桑白皮一兩。從脇腫起。其根在骨。加甘遂一兩。從頂腫起。其根在膈。加茯苓一兩。仍審其虛實。加減忌食雜物。所謂加藥者。一劑之中。再加一兩也。須活法用之。

三消

消者。易消之謂也。邪火內燄。真陰枯竭。善渴善饑。不爲肌膚。飲食入胃。頃刻消盡。故曰消症。以其上中下三焦受熱。故曰三消。所謂三消者何。曰消渴。曰消中。曰消腎。乃心脾與腎三經之火症也。而心脾二經之熱。又皆繇于腎火。蓋腎之所主者水也。真水不竭。自足以滋養乎脾。而上交于心。何至有乾枯消渴之病乎。惟腎水一虛。則無以制餘火。火旺不能撲滅。煎熬臟腑。火因水竭。而益烈。水因火烈。而益乾。陽盛陰衰。

構成此病。而三消之患始劇矣。其根豈非根于腎耶。然分而言之。又若有各自爲病者。如心經既虛。邪火乘之。而又內挾心火。心火爲邪火。一時騰起。不能制抑。薰蒸上焦。以致口乾舌燥。咽喉如燒。引飲雖多。而煩渴不止。小便頻數而短少。所謂消渴者。此也。脾經既虛。邪火乘之。而內炙脾土。脾家爲火所燥。胃火亦從而起。倉廩之官失職。中宮之位已虛。令人消穀而易饑。飲食大倍于平日。肌肉漸瘦。小便如泔。雖甚煩渴。而引飲不多。所謂消中者。是也。腎經既虛。邪火乘之。水本能勝火。而今反爲火勝。一杯之水。易乾車薪之火。方熾。則先天真一之精。煎熬殆盡。由是骨髓皆枯。肢節瘦細。腿膝酸疼。唇裂口燥。渴而引飲。飲雖不多。而便溺時下。不能收攝。所謂消腎者。是也。三消雖自爲病。而根本總歸腎經。真水一虛。而三病從之。醫者可以知其原矣。此病惟好酒好色。喜食炙燂。好服丹砂金石之藥者。多成之。蓋好酒則熱易積。好色則火難制。喜食炙燂。則津液耗亡。愛服丹石。則腸胃燥烈。而火症起矣。可不慎哉。



藥例

消渴之症。上焦受熱。渴多引飲。宜滋養心經。

以大劑麥門冬爲君。石蓮黃連。天花粉。白茯苓。五味子。人參爲佐。加四物湯服之。蓋此症宜補陰血。以勝陽。故必以四物湯合劑。而消中消腎皆用之。消中之症。善饑多食。宜治脾熱。抑胃火。

以煨過石羔爲君。蒸熟大黃。生甘艸。茯苓爲佐。加


四物服之。

消腎之症。骨瘦腿疼。宜滋腎水。

以杜仲黃柏爲君。天門冬。人參。知母。五味子。乾山藥爲佐。加四物服之。

三消俱病。其勢已危。九死一生。藥亦不效。若不忍坐視。急用前三處之藥。總作一劑。水煎成膏。與消梨汁。童便。調和。渴卽飲之。或可扶持。

大凡此症。從好酒而得者。劑中加干葛。天花粉。黃芩之類。從好色而得者。加天麥門冬。黃柏。杜仲之類。與猪腰子同煎服。從喜食炙燂而得者。大碗消梨汁。苦茗之類。可服。從喜服丹砂而得者。大碗童便。



及井底泥漿水。大剉人中黃之類。可服。醫者當斟酌而用之。

噎膈

噎者。咽喉噎塞而不通。飲或可下。食則難入也。膈者。胃口隔截而不受。雖飲食暫下。少頃復吐而不能容也。求其所以致病之繇。而要皆憂鬱不開。思慮太過。忿怒不伸。或驚恐時值。變故屢遭。汲汲皇皇。無安寧之日。以致內氣并結于上焦。而噎膈之症始成矣。此皆處于逆境則然耳。至于素享富貴之人。亦有是症者。何哉。必因厚味所傷。及酒色過度。虛火用事。真陰消鑠。以致血液乾枯。頑痰膠固。結于咽喉之處。則成

噎結于胃口之處。則成膈也。又有不因酒色而得者。亦當以血枯痰膩及氣鬱治之。但審其所得之繇。及觀其所稟之厚薄。方可用藥。如瘦人多火。其血易乾。亦有因火而生痰者。肥人多濕。其痰易結。亦有因濕而血滯者。窮困之人多憂鬱。經營之人多思慮。不得志之人多忿怒。遭變之人多驚恐。好酒之人多痰火。好色之人多積血。嗜味之人多宿食。使氣之人多惱怒。醫者審而治之。不可以一端求也。又有所謂鼠噎者。見人卽不食。背人則私食之。乃食鼠糞中毒所致。又豈可以一例治之乎。凡治此症。以開鬱順氣消痰潤血爲主。此其大法也。

藥例

繇憂鬱不開而成者。宜先開其鬱。而及其餘。必以枳殼撫芳香附爲主。而佐以貝母桔梗菖蒲之類。有痰則消其痰。如瓜蒌半夏姜汁竹瀝之類。有血則潤其血。如當歸桃仁阿膠玄參生蜜之類。有食則化其食。如神曲麥芽陳皮枳實萊菔子檳榔艸菓之類。各隨症治之。

繇思慮太過而成者。宜以開心竅爲主。如菖蒲燈心。通脫木之類。而佐以順氣之藥。如蘇子茯苓陳皮。沉香白芷蔻之類。若有他症。炤前加之。

繇驚恐而成者。以安心神爲主。如茯神遠志麥門冬。菖蒲之類。佐以順氣之藥。如有他症。炤前加之。繇血液乾枯而成者。以潤血爲主。如阿膠麥門冬玄參知母生蜜之類。佐以順氣之藥。如有他症。炤前加之。

繇頑痰膠固而成者。以化痰爲主。必用海浮石蛤粉。玄明粉礞石白礪砂之類。爲極細末。用姜汁竹瀝。調少許。掌服之。必是此等藥。方可治頑痰也。其煎劑。如油炒半夏貝母瓜蒌橘紅茯苓天花粉黃芩姜汁竹瀝之類。佐以順氣之藥服之。若頑痰壅塞。不能伸氣者。必用麻油二三兩。桐油半兩。調和服之。大吐頑痰。勢卽寬矣。

繇積血不消而成者。以消血爲主。如山查紅花赤曲。丹皮降真香蘇木蓬朮當歸之類。以消血。佐以枳殼青皮香附紫蘇梗之類。以順氣。若又挾痰。加姜

汁竹瀝風化硝以消之。

繇宿食不化。傷于胃。而成者。以消食爲主。如枳殼。檳榔。蓬朮。陳皮。萊菔子。艸蓂。麥芽。神曲之類。佐以順氣之藥。如木香。青皮。香附。烏藥。蘇梗之類。若有痰。加姜汁。竹瀝。若有積血。如前消血之藥。若有乾血。如前潤血之藥。加減服之。


繇食鼠殘。而成鼠噎者。卽以鼠糞燒灰。存性爲末。與萊菔子。白荳蔻等分爲末。時時用好酒送下。或二三錢。不拘時服。

凡噎膈初起。不論痰與血。卽以韭菜白頭搗取自然汁。同姜汁。竹瀝。童便好酒調和。日服一二盞。其效如神。丹溪乃以二陳加竹瀝。童便。韭汁之類爲主治。法亦相似。

凡膈症不能容物。食之卽吐盡者。各曰翻胃。乃胃寒也。宜以溫胃爲主。用大附子去皮臍不用。切碎。入童便內。煮二炷香。取出放淨磚上。四圍用炭炙之。待其燥烈。淬姜汁內。再炙再淬。直令熟透。切片。曬乾。爲極細末。每服一二錢。用茯苓。藿香。砂仁。白荳

嘔吐

嘔者有物在中其所來之道遠故必嘔而後出也吐者亦有物在中其所來之道近故一吐而卽出也分而言之微有不同合而言之同歸于火飲食痰涎停積不化胃火上升卽湧而出矣其病與翻胃相似而實各有所屬翻胃屬寒嘔吐屬熱惟其熱也故其出也無定時或隨食隨吐或食良久而後吐隨食隨吐者火也火邪急速不及入胃而卽出無嘔逆之苦無揮咯之勞是卽吐之謂也食良久而後吐者火猶稍



緩必入胃餘時委曲而出酸苦萬狀傷神勞精腸捲而腹急是卽嘔之謂也而所出之物亦不甚盡惟翻胃也則陰氣下結水穀暫容朝食則暮吐暮食則朝吐或朝食至午而吐或午食至暮而吐其吐必盡所食日日如此不少愆期蓋胃家受寒不能運化自不容于不出則翻胃與嘔吐所以不同也又有吞酸吐酸者何也蓋飲食入胃胃弱不能消而又挾肝火是以作酸浮飲積蓄變爲酸痰肝火升則吐肝火降則吞其吞與吐皆肝火升降之所爲也故治嘔吐者必治其熱治翻胃者必治其寒治吞酸吐酸者必抑其肝而後所投之藥無不中矣

藥例

傷食嘔吐者飲食過多一時不能尅化胃窄不能容又挾火邪故也宜以消食爲主抑火順氣次之用山查麥芽檳榔艸菓之類以消食黃連石羔以抑火藿香蘇子陳皮白芷蔻之類以順氣加姜汁服痰多嘔吐以消痰爲主降火順氣次之宜半夏南星瓜蒌貝母之類以消痰黃連黃芩山梔之類以降

火蘇子茯苓白豈菟橘紅之類。以順氣。加姜汁竹瀝服之。

痰食相并嘔吐。以消食化痰爲主。降火順氣次之。用枳實萊菔子神麴麥芽之類。以消食。半夏瓜蒌貝母之類。以化痰。黃連石羔之類。以降火。蘇子白豈菟橘紅之類。以順氣。加姜汁服之。

傷酒嘔吐。以解酒爲主。降火順氣次之。用天花粉萊豈粉葛粉之類。以解酒。黃連山梔黃芩之類。以降火。蘇子枳殼陳皮之類。以順氣。加蘿蔔汁服之。

挾風吐浮沫。以荊芥天花粉半夏燕星爲主。薄荷紫蘇梗葉爲佐。若頭眩。加天麻有火。加黃連。入姜汁竹瀝服之。

惡心嘔吐。乃胃氣不足故也。以扶胃爲主。用白朮人參半夏藿香白豈菟白檀香蘇子之類。加姜汁竹瀝服之。若惡食。加枳實。

大凡嘔吐藥中。須磨沉香四五分。服之。其效如神。

附翻胃

翻胃不甚劇者。但視其所食之物。猶未盡者是也。宜

用溫藥。

如木香桂心生姜之類。以溫其脾。加半夏黃連人參茯苓煎服。

翻胃甚者。所食之物吐盡者是也。其胃大寒。必用熱藥。

如煨熟附子丁香乾姜之類。加姜炒黃連。入參茯苓蘇子沉香白荳蔻煎服。

附吞酸 吐酸

吞酸吐酸。其不同而治法則一也。皆以抑

肝火爲主。而消痰順氣次之。大劑姜炒黃連爲君。佐以半夏青皮茯苓烏藥檳榔。以順氣消痰。加姜汁竹瀝服之。或用吳茱萸三錢。黃連七錢。姜糊丸。名曰左金丸。蓋佐肺金以伐肝也。用滾湯送下。三五十九不拘時服。甚效。此方兼治兩脇膨脹。凡治酸必用吳茱萸。順其性而折之也。

凡此四症。皆禁用甘艸。蓋甘能壅氣。又能發吐。故也。河間曰。吐症有三。氣積寒是也。上焦吐者。從乎氣。脉浮而洪。食已卽吐。渴欲飲水。大便燥結。氣上冲胸。

而痛。治當降氣。和中。中焦吐者。從乎積。脉浮而長。或先吐而痛。或先痛而吐。乃食與氣相併爲積。而痛。治當去其積。行其氣。下焦吐者。從乎寒。脉沉而遲。朝食暮吐。暮食朝吐。小便清利。大便不通。治當通其秘。溫其寒。大便漸通。再用中焦藥和之而愈矣。

霍亂

霍亂之症。急于風火。心腹絞痛。腸胃并結。欲吐不吐。欲下不下。手足揮顛。滾轉煩悶。頃刻之間。死生安危。係焉。蓋繇平日過傷飲食。多勞多氣。一感臭穢。清氣混淆。于是陰陽不條暢。水火不升降。中氣潰亂。而病斯劇矣。邪在上則吐。邪在下則瀉。邪在中則吐瀉兼作。是皆易治者也。若不吐不瀉。則死生在頃刻矣。又有轉筋霍亂者。筋脉拘攣。手指足指。板攣屈曲。此尤霍亂中之至重者也。若吐瀉。則亦有可治。如不吐

三十一
瀉必死無疑矣。太抵霍亂初起。不得用藥。以其氣亂。藥不能理也。

藥例

大法霍亂初起。無如鹽水。以無灰食鹽二兩。炒乾。乘熱投河水中。調和。約二三碗。令病人連連飲之。鹽性墜下。直墜至底。浮食于上。則吐矣。若吐不通快。再飲之。直至通快而後止。吐盡宿物。則邪氣亦散。而腹痛即寬矣。

或用瀝青一錢。爲細末。長流水調下。分作二服。其痛立止。

霍亂不吐瀉。腹脹如鼓。不得用別藥。惟益元散可服。用細軟滑石。水磨。漂去黃水。曬乾。每滑石末六錢。配甘草末一錢。故名六一散。炮湯冷定。時時呷之。或連末服下。此藥能降邪氣。消食。墜痰。和胃。調中。但聞腹中有響聲。此是好消息。不吐則必下。不下則必吐。乃霍亂中之妙藥也。

調理之劑。如順氣。則藿香。烏藥。砂仁之類。如消食。則陳皮。麥芽。神曲。枳實之類。如破結。則厚朴。香附。青


皮之類。如降火消痰。則半夏茯苓黃連之類。如治轉筋。則木瓜白扁豆當歸烏藥之類。此其大法也。直待全愈之後。始可用參朮。

霍亂乃邪氣用事。正氣無主。潰亂之際。大忌姜湯米湯。及烏梅梅醬等湯。服之立死。雖熱湯亦不可用。禁之禁之。

小腹作痛。脹緊如石。氣冷并結者。乃房勞傷也。切不可誤以爲霍亂。妄投冷水。及補藥之類。服之立死。但用消傷破血調氣之劑。如紅花蘇木桃仁當歸。木香青皮檳榔之類。酒煎加童便調和。大口咽下。又令病人坐葱湯中浸之。

頭痛

頭居衆體之上。爲諸陽之會。其位至高。猶山之有巔。木之有杪也。風之起也。愈高而愈狂。山巔木杪。先得之。故雲行如飛。葉落如雨。皆風使之然也。頭居上體。爲風之所先及。然以其會乎諸陽。而不畏寒。則人多忽之。而不知所避。風邪一入。頭卽痛焉。故頭痛之病。風痛居多。夫風何以使之痛。蓋風之爲物也。善行而數變。其性易入。其氣易感。頭之諸陽。內聚而拒風。風之勢力。外攻以抗陽。風與陽而相爭。則兩不肯伏。交



戰于至高之分。而頭之諸經始病矣。以諸陽之強。且不能以勝風。而況于諸陰乎。其有血虛氣虛而作痛者。雖係本元之不足。而實風之爲病也。蓋虛之所在。邪必奏之。使無風以入之。惟覺眩運而已。而何以作痛耶。但其氣血已虛。無力拒風。風雖入而不與之爭。故其痛亦不甚也。其有飲食不消。痰涎湧上而作痛者。非盡風之罪也。醫者宜審而治之。大要皆當以川芎爲統治之藥。而諸經之主治藥爲君。佐以薄荷荊芥等藥。乃爲得宜。至于升麻。諸經皆不可缺。而獨少陰則不必也。

藥例

風入太陽經。則髮際痛。

羌活爲君。川芎升麻白芷防風甘艸爲佐。加葱白生姜。

風入陽明經。則額前痛。

白芷爲君。川芎升麻羌活防風甘艸爲佐。加葱白生姜。

風入少陽經。則兩鬢間痛。

柴胡爲君。川芎升麻羌活白芷防風甘艸爲佐。加

葱白生姜。

風入少陰經則頰骨緊痛。

細辛爲君。獨活川芎白芷防風爲佐。少加升麻甘

艸黃柏。

風入厥陰太陰之交則頂巔痛。

藁本爲君。升麻川芎防風牙皂甘艸爲佐。

風入後太陽經則後腦風池風府及頸項強痛。

羌活防風爲君。川芎升麻薄荷荆芥葱白生姜甘

艸爲佐。諸經頭痛如破不能忍者必多用蔓荊子。而以諸經

之爲君者佐之。加葱白生姜。

血虛頭痛者痛雖不甚而終日羸羸作疼如細筋牽

引。

以四物爲主治。佐以升麻白芷薄荷甘艸之類。劑

內惟川芎加倍用之。

氣虛頭痛痛則有微汗頭甚空虛眼目眩運必以重

帛包裹方可少寧。

以四君爲主治。佐以半夏川芎防風之類。

宿食不消者。飽則頭痛。饑則不痛。蓋食飽則濁氣薰蒸于上。故頭脹緊而作疼也。

宜以蒼朮厚朴檳榔艸茺黃連枳實爲主治。佐以薄荷川芎。少加艸砂仁。

痰涎湧上者。必眉稜骨痛。或云屬風熱與痰也。

宜以半夏橘紅爲主治。佐以川芎升麻黃芩薄荷艸之類。


諸經頭痛。若兼身熱。必多用柴胡紫蘇黃芩。若屬風邪。不能去。

加麻黃少許。

半邊頭痛。乃邪客于半邊。屬少陽之分。最爲難治。痛久多至害眼。蓋肝膽相爲表裏故也。太抵在左屬風。屬血虛。在右屬痰。屬熱。

宜以柴胡爲君。川芎白芷升麻艸爲佐。加葱姜水酒煎服。外用帶鬚葱白搗爛。加飛鹽及牙皂末貼在痛處。又以艾囊如帕子樣者紮之。

又有雷頭風者。如雷之鳴。爲風邪所客。風動則作聲。



也。諸藥罔效。惟清震湯主之。


諸經皆痛。並用諸經君藥。各二三錢。作劑。加升麻。其
艸葱姜之類爲佐。

附頭眩

頭痛之外。又有頭眩一症。亦人所不能堪者。雖無痛
苦。而精神眩耀。所見之物。皆顛倒搖動。身如浮雲。
足如履空。飲食下咽卽吐。胸中怏怏。眼花不定。乃
其症也。此爲風動肝木。根本皆搖。捲痰上升。遠亂

清氣故耳。

宜以天麻爲君。薄荷柴胡青皮半夏黃連生薑之
類爲佐。氣虛加參朮。血虛加歸地。痰多加生薑竹
瀝。精虛加天麥門冬。人參五味之類可也。



心痛

心痛者。非真心痛也。乃心胞絡與胃脘痛也。然果何以知之。蓋心胞絡護捧其心。脉絡相繫。位居心之四傍。火載痰而上升。碍其所居。胞絡爲痰相軋。故脂膜緊急。而作痛。遂誤認以爲心痛也。胃脘近心。位居心下。而絡于脾。飲食過多。不能尅化。傷于胃脘。病根掌在畧傷飲食。卽悶悶作疼。亦誤認以爲心痛也。太抵痛而有痰。覺惡心。嘔出痰飲。卽寬者。卽謂之心胞絡痛也。痛而作飽。時暖氣。直至饑而後緩者。卽謂之

胃脘痛也。又有痛時得飲熱湯熱酒而痛緩者。乃寒氣客于心脾之間也。又有心頭作疼。其痛應于背心者。乃憂鬱悲思積而成病也。又有心頭急痛。唇白髮豎。口吐黃水者。乃蟲之爲害也。又有心頭結痛。逆氣上升。如蟲絞擾。自覺胸中唧唧作聲者。非聲也。乃死血隨氣而動也。又有一月一發。或二三月一發。其發也痛極悶死。搔爬無措。涎水一湧而卽甦者。乃寒痰積于心脾之間。安堵不動。一爲惱怒勞倦所傷。則寒痰乘勢湧起。泛溢胃口。迷塞心竅。故悶痛而欲死。涎水一湧而出。則胃口漸寬。心竅漸通。而後甦也。凡此皆可施治。惟平素原無心痛之疾。卒然大痛無聲。面青氣冷。咬牙噤齒。手足冰冷者。乃真心痛也。蓋寒邪直犯君火。旦發則暮死。暮發則旦死。不救之症也。

藥例

心胞絡痛者。痰也。

宜以玄胡索爲君。以定痛。半夏貝母瓜蒌爲佐。以降痰。香附枳殼砂仁蘇子。以順氣。

胃脘痛者。食也。

宜以艸葶藶爲君。以定痛。佐以枳實陳皮檳榔艸菓之類。以消食。木香烏藥砂仁之類。以行氣。

寒氣客于心脾之間。而作痛者。

宜以乾姜良姜官桂丁香之類。以驅寒。艸葶藶玄胡索乳香沒藥之類。以定痛。香附枳殼陳皮青皮木香之類。以開氣。

前心應後心痛者。鬱也。

宜用香附蒼朮貝母撫芎枳殼桔梗之類。以開鬱。

木香砂仁之類。以行氣。

心頭急痛唇白毛豎口吐黃水者。蟲也。

宜用雷丸川棟使君子之類。以殺蟲。黃連烏梅之類。以安蛔。乳香沒藥之類。以定痛。砂仁檳榔枳實之類。以降氣。

心頭作痛。氣逆上冲。唧唧有聲者。血也。

宜用蘇木紅花三稜蓬朮降真香之類。以破血。青皮檳榔木香枳實之類。以降氣。水煎磨沉香五六分。或多至八九分。服之。令血下行。或加童便。

心頭悶痛。必吐而後寬者。痰也。

宜用山梔一兩煎加姜汁一盃竹瀝半盃服之
真心痛手足青至節者死寒至節者亦死蓋因寒邪
直至心經心火衰弱反爲寒氣所劫故也醫者不
忍坐視用猪心煎湯去猪心入麻黃官桂乾姜附
子之類直至心經以散寒此秘要之妙法亦死中
求生之意也

亦有似真心痛而實非者雖有爬牀穿席揮手頓足
之狀而面無青色四肢不厥其痛不至于無聲者

是也此乃胃中食積與食相絞而爲害也先
以錫灰使君子爲末酒服二三錢待痛緩服消食

之劑兼以殺蟲化痰若察其脉沉遲亦有寒也宜
以溫藥散之如木香官桂之類若唇白毛堅口吐
黃水單是蟲也宜多服使君子川棟雷丸之類禁
用花椒蓋花椒雖能殺蟲其味太辣若驟服之蟲
必驚跳攻絞反傷胃口甚至有不能堪而殞其命
也慎之慎之

大法諸般心痛先用猪心一具煎湯取出猪心入藥
煎之其效立奏蓋猪心直引諸藥至患處也其煮

熟猪心。亦切爲片子。蘸乳香沒藥。并艸官桂細末。醫之。大有奇效。

凡治諸般心痛。必以開鬱行氣爲主。此其要法也。

腹痛

腹位于人身之中。而統于脾胃水穀之府也。善理脾胃者。調其飲食。不使太過。戒暴怒。節大勞。何病之有。人有患腹痛者。非傷飲食。必多怒氣。非傷怒氣。必多勞倦。三者不慎。而根抵于中矣。一有感觸。則痛斯作焉。傷于飲食。則飽悶而痛。或痛連于兩脇。傷于勞倦。則運化自遲。則膨脹而痛。或痛連于兩脇。傷于勞倦。則運化自遲。四肢無力。中脘僂僂而痛。若三者兼而有之。則其發必重。中氣并結而不通。腹硬如石。緊急如鼓。行立不

得坐臥又難。大小便俱閉。胸膈痞塞。病卽危矣。若遇此危症。不可坐視其斃。當求一生于萬死之中。先以溫熱之劑。令其徐服。但覺腹中有聲。則可生矣。然溫熱之劑。必是一時過飽。不能通利。腹硬而冰冷者。始可用。若犯霍亂。決不可用也。蓋霍亂不吐不瀉。皆火邪內結。若用溫熱之劑。其斃立待。而參朮之類。尤不可犯。慎之慎之。蓋腹痛多有餘之症。然亦有不足者。如血虛氣虛之類。若平素慎于飲食。而視其肢體瘦弱。又不飽悶。但假假作痛。如細筋牽引者。卽血虛腹痛也。若肚腹空虛。似餓非餓。翕翕作疼。呼吸如無氣力者。卽氣虛腹痛也。又有腹中冷痛。掌欲噉氣。得熱物熨之。或飲熱酒熱湯。卽緩者。乃冷傷氣也。又有腹中攻痛。口乾舌燥。小便赤澀。肛門如燒者。火也。又有面黃肌瘦。唇白髮豎而痛者。蟲也。醫者審其新久。視其老壯。量其輕重。觀其緩急。而施治之。可也。

藥例

傷食腹痛者。宜用檳榔。艸菓三稜。蓬朮。山查。麥芽。神曲。陳皮之類。爲主治。佐以芍藥。甘艸。木香。香附。砂


仁之類煎服。然又必審其傷于何物。如食肉傷宜
山查蓬朮阿魏之類。食飯傷宜神曲麥芽之類。食
麵傷宜萊菔子之類。生冷傷宜官桂乾姜蒼朮厚
朴之類。宿食傷宜枳實黃連蓬朮檳榔艸菓之類。
因其所傷之物。而以主治之藥爲君。佐以餘藥。兼
以化氣。則得之矣。

感氣腹痛者。宜以青皮木香烏藥枳殼之類。佐以芍
藥甘艸厚朴砂仁。少加消食之劑。恐其人有食也。
過傷飲食并結膨脹前後不通。肚腹冷痛者。宜用溫

熟附子砂仁同煎。磨枳實烏藥檳榔木香在內時

時飲之。但覺腹中有響聲。則氣已轉運。而所傷之
物。當從大便而下矣。切不可便用大黃。大黃之性。
雖走而不守。然亦大寒之藥也。若驟用之。反并結
而不行。其斃可待。戒之戒之。

霍亂腹痛。不吐不瀉者。乃一時邪氣擾亂。火熱內攻。
切勿悞以爲飲食并結。妄投熱藥。如附子官桂之
類。服之立死。宜先飲鹽水。再服益元散。速速服下。
其氣自正。待腹中有聲。必發吐瀉。而痛卽止矣。此



症見于霍亂門。今以腹痛條例。復載于此。

血虛腹痛者。宜用芍藥爲主治。佐以川芎當歸地黃。兼以甘艸陳皮。木香之類。

氣虛腹痛者。宜蒸熟人參爲主治。佐以白朮茯苓甘艸陳皮砂仁木香芍藥之類。


腹中冷痛者。宜用肉桂爲主治。佐以木香乾姜烏藥砂仁芍藥甘艸之類。冷甚者加熟附子。

腹中攻痛。口乾舌燥。大小便艱澀者。宜以蒸熟大黃爲主治。佐以石膏黃連甘艸厚朴之類。水酒同煎。腹痛而泄瀉者。宜以蒼朮爲主治。佐以厚朴陳皮甘

艸山查神曲麥芽之類。少加肉桂木香。蓋腹痛而泄瀉。雖是傷食。其實胃寒所致。故用溫藥也。

宿食不消。又挾寒而作痛者。不可用黃連。而枳實則猶可用也。蓋枳實黃連。雖能消宿食。然既挾寒。則寒藥必不可用。故禁用黃連。但以枳實蓬朮爲主治。佐以消食餘藥。加溫劑。如木香肉桂之類。則自愈矣。


凡諸腹痛。皆宜用芍藥甘艸。乃治腹痛通用之藥也。



蓋芍藥味酸。能于土中尅木。其艸味甘。其先入脾。而能緩諸痛。曲直作酸。酸者甲也。稼穡作甘。甘者已也。甲已化土。此仲景妙法也。故芍藥其艸名之曰戊己湯。統治諸般腹痛。而血虛腰痛者。尤爲甚效。宜于諸藥中加之。惟腹中窄狹者勿用。以其酸寒也。若以酒浸炒熟。則寒性自散矣。

腰脇痛

人有病腰痛者。何以致之。曰腎藏于內。外應乎腰。腰之所在。腎之所在也。惟房勞不節。竭其真精。則腎臟空虛。而腰始痛矣。衰老之人。無房勞而腰掌痛者。亦因少壯之時。自恃雄健。斲喪真元。遺其病于暮年也。又有閃挫而得腰痛者。亦繇腎虛。使腎水充實。雖有顛蹶之虞。自無閃挫之患。只因腎虛無所依憑。一有挫閃。則腎離于故處。此痛之所繇作也。又有久瀉而作腰痛者。利盡其水。而真水亦涸故也。又有腰重如




帶五千錢者何也。蓋腎屬水。其質本重。而又兼脾濕下注。濕與水而同宮。水得濕而益滿。此腰之所以重也。然但重而不甚痛者。以腎水不虛故也。女人腰痛。少壯者多血滯。衰老者多血虛。產婦臨蓐而先腰痛者。乃胞繫欲脫于腎故也。治此病者。審其虛實而施之。百無不中矣。

人有患脇痛者。何以致之。曰肝藏于內。外應于脇。脇之所在。肝之所在也。所藏者血。所屬者氣。蹊跌闢毆。內傷血。血散血蓄。積于肝之分。瘀而不流。則脇痛作矣。或有外觸惱怒。欲報而不得。伸臂結不行。藏于肝

部。則雖無瘀血而亦痛矣。然何以辨其血與氣耶。蓋瘀血作痛者。痛而不膨。按之亦痛。不按亦痛。其痛無時而息也。怒氣作痛者。痛而且膨。得噉即緩。已而復痛。其痛亦有時止也。此非氣與血之辨乎。又有季脇作痛者。何也。蓋季脇在肋稍之處。肝之下。膽之位也。痛甚而下連小腹者。亦是死血。痛不甚而止于一處者。痰也。治此病者。審其所傷。而施治之。則無不中矣。

藥例



腎虛腰痛以補腎爲主。

宜君之以杜仲佐之以黃栢破故子兔絲子牛膝
茯苓人參之類加炒鹽一撮煎之或與四物湯同
用亦可。老人腰痛劑內加茴香一二錢熟附子一
片以其陽衰欲扶陽以生陰也。卽以此藥作丸亦
妙。

閃挫腰痛以和血爲主而不暇治其虛。

宜君之以當歸佐之以紅花桃仁之類以和血。杜
仲續斷牛膝茯苓以引至痛處使腎歸故所加以
烏藥勻氣甘州調和官桂爲之引導而黃栢人參
且暢用。蓋黃栢性寒雖本經之藥恐血得寒而不
流故暫舍之。若以好酒煮熟炒成褐色亦或可用。
人參味厚雖能補虛然旣欲和血則補非所宜故
不用也。

腰重如帶五千錢者以分消其濕爲主。

宜君之以黃栢佐之以茯苓澤瀉木通以利其濕。
蒼朮防已防風以燥其濕。鹽炒杜仲以領至本經。
使濕從小便而出。外用蒼朮一二斤爲粗末炒令

畧熟。入布囊中。圍裹患處。內外夾攻。則濕自去矣。
又以帶鬚葱二三百根。生姜觔餘。濃煎湯。貯深桶
中。令病人坐其內。使服煎藥。若湯冷再添。欲小便。
即令撒在湯內。其濕自去。此要法也。

女人腰痛。少壯者多血滯。

宜以當歸杜仲爲主。佐以桃仁紅花木香官桂之
類。

衰老者多血虛。

宜以四物湯配杜仲黃柏破故布牛膝茯苓之
以豬腰子湯煎之。其效甚速。

凡腰痛。皆宜豬腰子。先煎五六滾。取出腰子。入藥煎
服。服後即以腰子蘸鹽食之。

統治腰痛。不論腎虛閃挫血虛血滯。皆用杜仲一兩。
童便一碗。煎乾。同槲核炒熟。搗碎三錢。黃柏二錢。
炒令褐色。酒二鍾。煎至八分。空心服之。其效如神。
瘀血脇痛者。以破血爲主。

宜以當歸紅花蘇木桃仁山查蓬朮。以破其血。青
皮芍藥官桂柴胡之類。以引至本經。若脇痛甚者。

以大黃下之。

怒氣脇痛者以抑肝爲主。

宜以青皮芍藥柴胡官桂以伐其肝。枳殼烏藥木香之類以開其氣。紅花當歸以和其血。痛甚者加醋少許飲之。蓋酸能破結直入肝經故也。大忌陳皮生姜細辛服之卽令肝脹以其能補肝也。肝實有餘並無補法。若果肝虛不能熟睡但補其血如四物湯之類可也。然積忿不消亦令人不寐宜消息之。

季脇痛連小腹者以和血爲主。


宜以當歸紅花玄胡索山查之類以和其血。青皮芍藥柴胡檳榔引至患處少加木香烏藥以調其氣。

季脇微痛者痰也非白芥子不能達。

必以之爲君佐以柴胡青皮烏藥木香之類加姜汁竹瀝服之。

繞治兩脇脹痛。

以青皮爲君佐以枳殼烏藥木香芍藥官桂厚朴



之類。加大腹皮一團。煎服。或用吳茱萸爲君。黃連爲佐。大約吳茱萸七錢。黃連三錢。作丸子。以白湯下。不拘時服。四五十丸。亦治吞酸吐酸甚效。凡治脇痛。如青皮芍藥之類。皆宜醋炒。以酸先入肝。兼能破結故也。

股痛


股居一身之下。衆陰之所歸。而其所以作疼者。三經受病也。足太陰脾經主肉。足厥陰肝經主筋。足少陰腎經主骨。脾經受濕。下流于股。則肉內酸疼。肝經受寒。下及于股。則筋攣急痛。腎經受寒。下注于股。則骨髓冷痛。其痛各有所屬。而可以一槩治之乎。設使筋攣急痛。誤以爲濕。而用燥劑治之。則燥盡其血。而筋失所養。其痛甚矣。必投以養血之劑。則筋自舒而不攣急矣。骨髓冷痛。誤以爲濕。而用燥劑治之。則燥盡

其髓而骨內空虛其痛愈加必投以補髓之劑則骨氣充而無所苦矣肉內酸疼單用熱藥而不用燥劑肉得熱而融活因有微效而濕流于中何時可去必以熱藥爲向導而燥劑君之以血藥佐之則濕可去而血亦不枯此萬全之治法也苟不辨其爲濕爲寒而混用之非惟無益而反害之矣其可乎哉若婦人產後或患股痛皆惡血流注經絡而然也要當以熱藥爲向導而活血之劑君之以行氣之藥佐之則自愈矣若誤以爲濕而專投熱劑其何以取效乎然二者之中熱藥則可用而燥劑決不可用何也血得熱而後行不用熱藥何以活血而大熱之劑亦未可輕用若用燥劑則不惟股中之血易乾而一身之血亦病矣慎之慎之

藥例

肉內酸疼者濕也

宜以蒼朮爲君白朮防已防風茯苓爲佐煨熟附子官桂爲向導牛膝黃柏爲引經此治濕之法也筋攣急痛者血受寒也



宜以當歸爲君。川芎芍藥地黃木瓜爲佐。附子官桂爲引導。牛膝爲引經。此治筋攣之法也。

骨髓冷痛者。髓受寒也。

宜以虎骨爲君。天麥門冬破故布兔絲子杜仲爲佐。附子官桂爲引導。牛膝爲引經。此治骨疼之法也。

婦人產後股痛。非濕非寒。乃惡血下注。干經絡也。

宜以當歸稍爲君。桃仁紅花爲佐。不用附子。惟以

官桂爲引導。香附爲行氣。牛膝爲引經。此治產後


股痛之法也。

男子兩股無力作痛。上連腰膀者。乃房勞太過。精血俱損故也。

宜以四物湯補血。杜仲牛膝天麥門冬黃柏人參以補精。少加紅花以養血。烏藥以勻氣。此治房勞股痛之法也。

凡治股痛之症。藥中必加炒鹽一匙。磨沉香少許。領藥下行。切不可用其艸。恐其緩藥力。不能速下也。

統治股痛膏藥。兼治肩背酸疼。用廣膠一斤。將好醋



二碗浸軟。入生姜汁。葱汁。各一碗。慢火熬成膏。入乳香沒藥各二兩。射香五錢。攪勻。攤布上。隨其痛處大小攤之。先以生姜擦痛處。然後以膏貼上。將手烘熱運之。其效甚速。

或用赤色老松脂三斤。入鍋化開。用布濾入水中。取起。再入鍋。慢火煉至紫黑色。然後入姜葱汁。各二碗。再煉。不停手攪之。待乾爲度。入猪脂熟油半斤。再煉。滴水中。試老嫩。若老再加油。若嫩再熬少時。直待得所。入乳香沒藥各三兩。射香一兩。調和。


攤貼尤妙。



治濕氣痛。洗湯法。用鳳仙艸一大束。葱一束。搗爛。蒼朮半斤。防風荊芥各五兩。煎湯。入桶中。令病人坐湯內。多用舊衣服浸湯。搭其痛處。湯冷再添。不過三四次。卽愈矣。若遍身。亦以此湯洗浴。尤妙。

附脊痛


背脊。乃督脉所貫。屬太陽經。其所以作疼者。乃房欲過度。不恤勞力。脊髓空虛所致。若爲賊風乘虛而入。卽時踣強。不能屈伸。若誤以爲癱。而以痰藥。


之則所治非其所患矣。必用猪脊髓一條。入水煮熟。取出。投天麥門冬。人參。四物湯之類。加好酒煎服。或少加羌活。引入太陽經。若爲賊風所乘。宜去人參。加羌活。佐以防風。甘艸。烏藥。木通之類。此治脊痛之法也。然此特其大畧耳。員活變化。豈吾之所能盡乎。





C83/2912
V.3





醫鏡卷之三

金沙王肯堂字泰父著



茂苑張暎垣玄暎父叅


武水蔣儀儀用父較

麻木

人皆以麻木爲一病。而不知麻與木。固自有不同也。所謂麻者。非痒非痛。肌肉之內。如千萬小蟲。亂行雜沸。按之不止。搔之愈甚者是也。所謂木者。不痒不痛。自己之肌肉。如他人之肌肉。按之不知。搔之不覺者。

是也。麻如麻之亂。故名曰麻。木如木之可。故名曰木。
麻猶知痛痒。而木則全無所覺矣。然未知其病之所
屬。將何以斷之。蓋麻有久暫。木亦有久暫。暫時之麻
者。或因坐臥不得其所。四體相壓。阻抑榮衛。血行既
遲。而氣亦未至故也。然麻或太甚。亦有似于木焉。暫
時之木者。亦因坐臥不得其所。四體重壓。又着寒氣
不時。不曾護持。而榮衛不相聯屬。血已不行。而氣久
不至故也。然木或還醒。亦有似乎麻焉。此其暫時之
麻。木雖因氣血不足。而猶未足爲病。惟久麻久木者。

斯爲病耳。蓋經年累月。無一日而不麻者。麻之久者
也。麻之久者。非坐臥不穩所致。必其內氣虛甚。風痰
奏之。痰本不能作麻。以其挾于風邪。痰爲風所噓。如
風吹波浪。自騰沸而起。肌肉之中。已爲風痰所據。陰
陽二氣失其運行之柄矣。安得而不麻乎。經年累月
無一日而不木者。木之久者也。木之久者。亦非坐臥
不穩所致。乃是死血凝滯入內。外挾風寒。又因陽氣
虛敗。不能運動。而肉已死。若血與我不相干。此其所
以木也。人之一身。皆氣血所養。氣血行遲。卽能成病。



況其不行乎。此又麻木之所以可畏也。然麻木之處小猶可治之。若半體一肢。決難收療。醫者知此。則人之死生病之輕重。了然于胸中。而用藥之妙。尤在于善變。其可以執泥耶。設使暫麻暫木。而用重劑。則損其真元。久麻久木。而用輕劑。則不能取效。審而治之可也。

藥例

大法麻木之病。雖有風痰死血之分。然治療之藥。皆當以熱藥爲向導。如生姜附子。官桂川烏之類。以引經藥引至各經。如手臂用桑條股足用牛膝。皮膚之類。以通竅藥開其經絡。如木通川山甲牙皂之類。有痰則去痰。有風則去風。有血則行血。此其總綱也。


又麻者皆氣虛。爲風痰所轆也。雖係氣虛。亦不暇補其氣。一補其氣。則風無自而散。痰無自而去矣。宜以生姜爲向導。枳殼以開氣。半夏南星以去痰。防風荊芥羌活以散風。牙皂木通以通經絡。手臂用

桑條。股足用牛膝以引經。待其病減。然後用參芪。白朮茯苓艸之類。以補其氣。可也。

又木者皆陽氣不運。死血凝滯。外挾風寒所致也。宜以附子官桂之類爲向導。烏藥木香之類以開氣。川山甲木通牙皂之類。以通經絡。當歸桃仁蓬朮紅花阿魏之類。以消血。因其病之所在。以引經藥引之。如桑條牛膝之類。待其病減。以入物湯補其氣血。可也。

背上麻木。以羌活爲引經。胸前麻木。以桔梗爲引經。面上用升麻爲引經。風用風藥。痰用痰藥。血用血藥。皆以開氣爲主。而此三處。惟以生姜爲向導。而附子之類。不必用也。

遍身肌膚大麻木。淫淫然如蟲行者。風也。宜以姜蠶爲君。羌活防風爲佐。烏藥以勻氣。木通以開經。生姜爲開導。蓋木通能行十二經絡。烏藥能行一身之氣。生姜能開一身之奏理。羌活防風能去一身之風。而姜蠶一味。專治如蟲行者之聖藥也。至于加減輕重之劑。則存乎其人耳。而豈吾之所能備。




述者乎。

痞塊

痞者。否塞之意也。從病從否。故有痞之名焉。又以其堅實有形。故又名之曰痞塊。然是物也。從何而得哉。蓋因死血不化。宿食不消。痰飲積聚而成者也。有三者併而成塊。有三者各自成塊。各自成塊者易治。併而成塊者難治。然果何以辨之。察其脉。視其形而已矣。脉弦爲痰。脉滑爲食。脉扎爲血。三脉俱見。則并而成塊也。以其形而定之。宿食成塊者。居于中脘。視之則無形。按之則有質。在腸胃之間者。以人之飲食皆




入于胃故不在皮裡膜外。其在皮裡膜外者皆痰與血也。蓋痰能流注于脂膜。血能運行于皮肉。痰積而不流則脂膜之間爲其所據。而有形可見。血瘀而不行則皮肉之間爲其所礙。而亦有形可見也。欲辨痰與血之異亦審其痛之何如耳。痛甚者爲血。痛不甚者爲痰。又手推不動者爲血。手推易動者爲痰。以熱物熨之而痛緩者爲血。熨之而若無所覺者爲痰。此痰與血之辨也。若痰與血相成者何以辨之。塊之以漸而大者是也。蓋先有死血而又有痰以裹之則以漸而大。先有積痰而又有血以并之亦以漸而大。若單是血或單是痰無相裹相并之物只如初起之形而已。何至以漸而大乎。然宿食成塊亦未有不資于痰與血也。何也。蓋飲食所傷者惟中脘作痛或按之硬實而已。初未嘗如彈丸之形也。使不資于痰與血何以成塊乎。必先有硬飯或魚與肉或餛飩米團之類一時失嚼誤咽停于胃中。經月不能消化。俾其道路血流過其處必裹一層痰或經其處又裹一層痰與血互相裹之則不能不成塊矣。裹一層則大一層



故始如彈丸。久則如杯如碗。其初尚小。隱于胃中。猶有質而無形。其後漸大。則腹皮頂起。而形外見矣。又有時升時降。時見者。乃氣塊也。或左或右。或上或下。按之不見其塊。不按又若有形。而漉漉作聲者。乃停飲也。非塊也。此統論其塊云耳。然以其在人而言。則雖各有專病。而又不可拘也。如婦人之塊多惡血。而亦有氣成者。小兒之塊多食積。而亦有痰成者。易怒之人多氣癖。而亦有血成者。肥胖之人多痰飲。而亦有食成者。醫者當問其得病之繇。或偶傷食。自此日而起者。或偶受氣。自此日而起者。或偶負重勞力。自此日而起者。或平素有鬱痰固結。偶發作而起者。在婦人必審其月事之通閉。在小兒必審其飲食之多寡。皆當以意求之。不能盡述也。大法治一切痞塊。皆以開鬱行氣爲主。又各隨其症。而用主治之藥。佐以破結軟堅之味。則得之矣。其有癖塊成龜盤之形。如能行動者。又不獨以塊治。當自有藥以消之也。

藥例

死血成塊者。以消血爲主。



用桃仁紅花山查蘇木血見愁之類以消血三稜蓬朮之類以消堅青皮烏藥香附枳殼之類以開鬱行氣共成一劑以好醋五六碗煮乾爲末卽以醋糊爲丸隨其塊之上下以時之饑飽服之好酒送下二百餘丸一日二服所以必用醋者取其酸能破結也

痰飲成塊者以化痰爲主

用半夏南星瓦礫丁灰青礞石海浮石之類以化痰加三稜蓬朮香附青皮之類亦以醋煮爲丸如前服之

食積成塊者以消食爲主

用黃連枳實檳榔艸菓山查萊菔子阿魏之類以消食仍加三稜蓬朮青皮香附之類用醋煮乾調神曲糊丸

痰血食積相裹而成塊者

用海浮石瓦礫子礞石之類以消痰枳實萊菔子檳榔艸菓之類以消食桃仁當歸紅花之類以消血仍加三稜蓬朮青皮香附并木香之類醋煮丸

之。

諸氣成塊者以破氣爲主。

用官桂木香青皮枳實香附之類以破氣仍加三稜蓬朮醋煮丸之。

停飲作塊者以泄水爲主。


用芫遂芫花大戟之類以泄水佐以順氣之藥如烏藥青皮枳殼木香之類使從大小便而出。

癖塊之形如龜鱉狀而能行動者乃是食積死血相裹而成也以其日月既久藉人之氣血養之故成此物必日嘗使病者食鱉肉其鱉甲與骨用醋炙脆與三稜蓬朮青皮香附之類爲末將烏梅肉醋浸令軟搗爛爲膏丸之好酒送下其物皆化爲血水從大便而出矣此方亦治瘡母如神。

統治諸塊用蓬朮爲君三稜當歸青皮香附紅花瓦礮子海浮石官桂木香川山甲阿魏山查枳實檳榔爲佐少加巴豆霜礪砂射香爲末以陳米細粉入醋煮成爛粥丸之好酒送下不拘痰血食積作塊服此藥易消。

凡諸塊不宜用煎劑。只宜用丸子。蓋塊至難消。若用煎劑。如過路之水而已。徒損元氣。于塊無益。惟丸子入胃。徐徐而化。逕至所患之處。潛消嘿奪。日漸損削。其塊自小。亦不宜消盡其塊。假如驚邪大者。消至如彈丸。卽止。不必再服。蓋塊既漸小。大勢既殺。必無再大之理。如煖解冰。一解卽不能合矣。若必欲消盡。則人之元氣亦消盡。反不可保。况塊勢既衰久。必自消矣。經曰。衰其大半則止。過者死。醫者所當知也。

凡諸塊。丸子藥。每服二百丸。每日二服。若病勢已劇。一日三服。以好酒送下。不善飲者。砂仁鹽湯送下。每服丸子三日。至第四日。不要服丸子。必用大補丸。空朝用淡鹽湯送下二錢。隨用乾食壓之。守此法服藥。可奏全功。蓋治塊之藥。不得不用尅伐之劑。若不服補劑。則正氣無所養。邪氣何時而除。故攻補兼施。乃萬全之法也。補劑以人參當歸爲君。白朮茯苓艸川芎芍藥地黃官桂黃芪爲佐。名十全大補湯。卽以爲末。蜜爲丸服之。忌食蘿蔔大



醫金
蒜及生冷油膩麩麵之類。恐雜其藥氣。不能施功也。
下九左

疝氣

疝氣者。下部之病。俗名小腸氣。其實非小腸病也。而所屬者。足厥陰肝經也。人之一身。惟兩脇與小腹。以至陰囊。睪丸。皆統于肝。肝主筋。而脉循陰器。陰器者。筋之宗也。一着于寒。則宗筋短縮。而小腹急痛。下連睪丸。牽引作疼。甚至有升上入腹者焉。又有脇旁動氣。或時脹起。橫入陰處。響如蛙聲。而作下墜者。此皆爲寒疝也。至于感濕而成者。一丸漸大。一丸漸小。而小者。或至于消盡。皆并于大者。而成獨丸焉。其冷如



水其硬如石。其大如鶩卵。沉沉而痛。上連小腹。筋脉牽引。坐臥不能安。乃肝木得濕。暢茂條達。如樹得地。氣易于長成。此爲濕疝也。又有身體發熱。陰囊脹大。皮破水流。痛不可忍。乃得之于房勞。因婦人不潔。穢水浸淫。熱氣蒸染所致。此爲勞疝也。又有身體發熱。耳後忽生疥腮。紅腫脹痛。疥腮將退。而睪丸忽脹。一丸極大。一丸極小。有似乎偏墜。而非偏墜也。蓋耳旁乃少陽膽經之分。與厥陰肝經相爲表裡。少陽感受風熱。故疥腮忽生。後又遺熱于厥陰。故疥腮既滅。而睪丸卽大。此爲熱疝也。又有陰囊脹大如斗。陰莖反縮入內。小便淋瀝。不能通快。行履滯礙。不能輕健者。非疝也。乃膀胱氣也。蓋腎與膀胱爲表裡。腎主水。而不能藏。故膀胱受之。氣化則能出焉。惟腎虛爲邪所客。遺病于膀胱。膀胱受邪。氣秘而下墜。小便滲入陰囊。日積月累。故脹大如斗也。治此病者。以腎邪爲主。若夫小兒偏墜。當以食積治。蓋食積不消。脾濕下行。流入肝部。故成此症。又豈可以大人之疝同論哉。至于婦人小腹兩旁。逼近陰處。忽然并結。脹痛。或皮

肉頂起如鷄子頭者。乃寒氣聚于厥陰所致。小腹受寒。其病卽發。是之謂陰疝。孰謂婦人無疝乎。大法以熱治寒。以燥治濕。以活血治勞。有食積則消之。有邪則伐之。有寒則祛之。斯得之矣。

藥例

罌丸升上入腹者。寒疝也。

宜以青皮官桂爲主治。佐以荔枝核橘核大小茴香酒炒芍藥木通烏藥之類。先用好酒煎乾。次入水煎。加飛鹽一二錢磨沉香五六分。空心服之。

或用鷄子殼或鷺子殼燒灰爲末。空心熱酒送下。三錢。不過二服。卽能壓下。罌丸復歸故所。其效如神。

脇旁動氣。橫入陰處。下墜作聲者。亦寒疝也。

宜以青皮官桂爲主治。其餘佐藥同前。但少加升麻。炤前煎法。磨木香錢許熱服。而飛鹽沉香則不可用。恐其墜下故也。蓋或升或降。雖曰總屬于寒。而氣有上下。則不可不對酌用之也。

或用熟附子。用烏大小茴香丁香官桂乾姜良姜。

木香等分。少加射香爲丸。好酒送下。五六十丸。良久。卽覺內氣如雷動。前攻後擊。甚爲驚人。少頃如欲大便之狀。祛出寒氣。有聲連發。其痛卽寬。能使三四年不發。乃劫藥也。

罌丸一大一小者。濕疝也。

宜以蒼朮防風白朮爲主治。佐以官桂青皮木通茯苓澤瀉烏藥大小茴香橘核之類。煎之。仍以帶鬚葱一大握煎湯。浸罌丸于內。卽服此藥。嘗添熱湯浸之。以手挪之。立能使之一樣。就坐湯中撒尿。其病易去。

陰囊脹大皮爛水流者。勞疝也。

宜以猪尿脬一個。當歸三錢爲主治。佐以紅花桃仁官桂橘核青皮鹽炒黃柏酒炒芍藥茴香茯苓木通耳艸之類。煎服。

疝退後忽患偏墜者。熱疝也。

宜以柴胡青皮鹽炒黃柏爲主治。佐以赤芍赤苓并艸稍橘核生地當歸之類。若挾風邪。加荆芥防風。

陰囊大如斗小便淋瀝者膀胱氣也。

宜伐腎邪。用澤瀉一斤。切片。分作四分。一分童便浸。一分鹽水浸。一分酒浸。一分醋浸。各七日夜。日中曬乾。不要去汁。收至極乾。畧焙爲末。陳米粉粥爲丸。每空朝白滾湯下二錢。至下午饑時。又服二錢。如此服去。自然小便流利。陰腫漸寬。將久而自愈矣。不可求速效。

婦人小腹近陰之處。并結脹痛。或皮肉頂起如鷄子頭者。陰疝也。

宜以官桂爲主治。佐以木香。檳榔。青皮。大腹皮。大小茴香。香附。烏藥之類。煎之。磨沉香五六分。空心服。

小兒偏墜。乃食積也。

宜用山查。麥芽。枳實。黃連。檳榔。艸菓砂仁。蓬朮。神曲。白朮。蒼朮。半夏。陳皮。其艸之類。等分爲丸。白湯調下。量兒大小與之。久而自愈矣。大抵疝皆屬肝經。惟小兒偏墜。乃繇脾經。而反傳于肝也。

凡一切疝症。皆禁用姜橘同服。或單用姜。或單用橘。

則無所妨。但二味相合。斯補肝矣。至于細辛。尤爲補肝。能閉氣。患肝經症者服之。卽時悶脹。慎之慎之。肝無補法。以其嘗有餘也。五臟惟肝有餘。而疝氣則又肝氣有餘之甚者也。其可以復補乎哉。

諸氣


人得天地之氣以成形。形者氣之所繇以寓者也。氣者形之所繇以充者也。二者固相爲用也。而亦有輕重之差焉。形病氣不病。雖羸瘦而無害。氣病形不病。雖肥壯而可憂。是形在所輕而氣在所重也。人能安養天和。使五臟之氣均得其平焉。則何病之有。雖內傷七情。外感六氣。六氣內侵。而五臟之氣病矣。故心氣盛則煩躁不寧。口乾舌燥。肺氣盛則壅塞喘急。土膈煩滿。肝氣盛則暴怒時發。兩脇膨脹。脾氣盛則中

腕痞塞腹滿飽痛腎氣盛則膀胱滿急水道不通此皆氣之有餘者也至若心氣虛則精神恍惚夢寐不寧肺氣虛則呼吸短淺皮毛洒淅肝氣虛則筋脉不和頭空少睡脾氣虛則饑不欲食溇泄自利腎氣虛則腰痛不能轉側大便與小便前後牽引而微痛此皆氣之不足者也氣失其平則爲疾善醫者調其氣而已有餘者瀉之不足者補之又豈有實實虛虛之患乎大法一臟掌以三臟治本經之虛實固宜補而宜瀉矣然虛則補其母實則瀉其子則又不可不知也

藥例

心氣虛則補之以炒鹽心氣實則瀉之以生薑艸此本經之補瀉也然肝爲心之母虛則姜橘兼用以補肝補肝卽所以補心也肺爲心之子實則黃連枳實瀉脾瀉脾非所以瀉心乎

肺氣虛則補之以五味子肺氣實則瀉之以桑白皮此本經之補瀉也然脾爲肺之母虛則甘艸大棗補脾補脾卽所以補肺也腎爲肺之子實則澤瀉



瀉腎。瀉腎非所以瀉肺乎。

肝氣虛則補之以姜橘。肝氣實則瀉之以芍藥。此本經之補瀉也。然腎爲肝之母。虛則地黃黃柏補腎。補腎卽所以補肝也。心爲肝之子。實則生薑艸瀉心。瀉心非所以瀉肝乎。

脾氣虛則補之以大棗甘草。脾氣實則瀉之以黃連枳實。此本經之補瀉也。然心爲脾之母。虛則炒鹽補心。補心卽所以補脾也。肺爲脾之子。實則桑白皮瀉肺。瀉肺非所以瀉脾乎。


腎氣虛則補之以地黃黃柏。腎氣實則瀉之以澤瀉。此本經之補瀉也。然肺爲腎之母。虛則五味子補肺。補肺卽所以補腎也。肝爲腎之子。實則芍藥瀉肝。瀉肝非所以瀉腎乎。

合而言之。諸氣之病。分屬五臟。五臟之病。分爲諸症。要不可以一節言也。此之所言。乃補瀉之大畧耳。然此正藥之外。亦不能無增益者焉。如炒鹽補心。甘草瀉心。固矣。而麥門冬亦可以補心。黃連亦可瀉心。如五味子補肺。桑白皮瀉肺。固矣。而人參

亦可以補肺。黃芩亦可以瀉肺。如姜橘補肝。芍藥瀉肝。固矣。而細辛亦可以補肝。黃連亦可以瀉肝。如甘草大棗補脾。黃連枳實瀉脾。固矣。而白朮亦可以補脾。石膏大黃亦可以瀉脾。如地黃黃柏補腎。而澤瀉瀉腎。固矣。而杜仲亦可以補腎。茯苓亦可以瀉腎。臨病用藥。審勢定方。得于心而應于手者。其又可以言傳耶。


諸血

人身之血。猶地中之水也。水流而不息。故能滋萬物。血流而不息。故能榮百脉也。惟善調攝者。不妄作勞。則血之運于身者。無一息之停。自然肌膚潤澤。筋脉和暢。何病之有。在不善調攝者。恃其壯盛。恣情酒色。而貧窮困苦之人。又不暇自惜。涉遠負重。奔走于衣食。而無日夜之安息。其能不傷于血乎。傷于上部。則胸脇痛。傷于中部。則兩脇中脘痛。傷于下部。則腹痛。繇是衄血吐血。便血尿血之病作矣。夫衄血與吐血。



無異。但所繇之經則不同。而要之皆累于脾也。脾能
裹血。不能使血之不升。胃火上蒸。則血從口出。肺火
上騰。則血從鼻出。因其所屬之經。而繇其所通之竅。
故有口與鼻之異也。然亦有輕重之差焉。衄血太甚。
始與吐血無異。不甚不足爲慮也。至于吐血。雖不甚。
而實爲可畏之疾。用藥者。其可以混施耶。夫吐血固
重于衄血矣。而就其吐血言之。則亦自有輕重。如一
咯一塊者。胃口血也。其所從來者近。痰中見血色如
馬齒。而成塊者。亦胃口血也。其所從來者亦近。二者

勢若可畏。而猶能措手。法當任其自出。又必看其色。
不鮮者。舊血也。勿以藥止之。其色鮮者。新血也。所積
者。必不甚多。宜以藥止之。蓋舊血終不歸經。不任其
出。反以增劇。新血終當歸經。若所出者多。則損人矣。
故宜以藥止之。此皆可以調理而愈者也。若痰中見
血。或一點之小。或一絲之細。語其勢。若無可畏。而病
根反深。此血非胃口之血也。乃從肺臟中來。肺爲虛
火所逼。血隨痰出。故也。其所以少者。何也。蓋肺臟以
氣爲主。本多氣而少血。是以出者亦少也。肺臟之血



本少而又逼而出之則肺已枯而無以領一身之氣矣其害不亦大乎至于五竅出血者勢如潮湧耳目口鼻一齊迸流藥不及煎針不及下死在頃刻間此猶血症之至極者也而究其病之所成莫非酒色無度及奔走勞碌以致五臟皆傷是以五竅出血也醫者其可無急治之法乎若夫腸風臟毒大便下血與小便出血者其病易治非若上焦之血也大法未見血則宜消宜和既見血則宜涼宜止舊血未盡則化其血新血未生則補其血因其勢之輕重而為緩急之施則無不中矣若婦人崩漏女子月事則自有本科而此不及載之

藥例

衄血甚者先以濕紙搭額門其血立止然後以藕節搗取汁和童便服之煎劑用炒黑山梔炒黑蒲黃炒黑香附側柏葉茅根地榆同四物湯煎服

吐血甚者以小蘆草搗汁和童便先服次用犀角地黃玄參阿膠地榆之類為主治佐以黃連山梔側柏葉之類煎之磨沉香少許令其降下再加藕節

汁磨上等清烟墨一二錢服之待其血止然後以四物湯加敗龜板何首烏地榆之類煎服

痰中見血者于治痰藥中加止血之劑如貝母瓜蒌仁茯苓麥冬玄參竹茹蘇子之類以治痰犀角阿膠側柏葉炒黑山梔之類以止血黃芩黃連之類以降火調花蓋石細末四五分徐徐服之可用竹瀝一碗入阿膠二兩溶開將石羔煨過一兩蛤粉一兩青黛半兩好墨一兩共爲細末調和丸如黍米大每服一錢苦茗送下其效甚速

五竅出血者先將井花水當面連噴幾口急分開頭髮用草紙數層蘸醋令透搭在顙門其血卽止次以當歸一兩煎好磨沉香五六錢加秋石一二錢服之如一時無秋石卽以童便和服則血各歸經永無事矣然後以四物湯作劑加五味人參爲末將紫河車洗盡血水童便煮爛搗和爲丸空朝白湯送下可收萬全之功亦治癆瘵

大便血者看其色鮮者急宜止之如黃連槐花烏梅地榆熟地牡蠣之類煎之調藕節汁空心大口咽

下送丸子二三百粒其丸用五倍子髮灰敗龜板
灰釜底墨牡蠣棕灰之類爲末將烏梅肉煮爛搗
和如泥丸之亦治婦人血崩

其色紫者任其自下反以四物湯加桃仁山查紅
花赤曲之類合而服之則既不損新血而又能消
瘀血待其色淡只用四物湯加龜板何首烏煎服
小便血者乃心經受熱遺熱于小腸也以黃連爲君
石蓮麥冬赤茯苓赤芍藥當歸甘草稍山梔爲佐
煎之加童便調服

腸風臟毒乃酒色過度之故又有不因酒色而得者
必勞苦之人負重涉遠而不惜其身者也用藥者
當因人而施之

血有下于糞後者爲遠血從小腸經來宜清小腸之
火而兼以收澁則以黃連爲君而槐花山梔爲佐
加烏梅煎服

血有下于糞前者爲近血從大腸經來宜清大腸之
火而兼以收澁則以槐花爲君而黃連山梔爲佐
加烏梅煎服

血有糞前糞後雜下者。乃從脾胃中來也。宜以煨過石羔爲君。槐花黃連山梔并艸爲佐。加烏梅煎服。若下血太甚者。加人參以補之。牡蠣栗殼以澁之。升麻以升提之。此治酒色過度之血也。若奔走負重而得者。當于四物湯中。倍加當歸服之。任其自下。不可驟用止血之劑。待所下若鮮紅色。乃新血也。須兼補兼澁。亦不可用太澁之劑。如牡蠣烏梅之類亦可也。而槐花黃連二味。又豈可少哉。

癆瘵


遺精

盜汗

骨蒸

癆者。勞也。繇妄作勞以成病也。從病從勞。故名曰癆。勞力以負重則傷血。而氣亦傷。精猶未傷也。勞力以行房則傷精。而血亦傷。氣能燭不傷乎。如或勞力以負重。又復勞力以行房。更失于撿束。而不避風寒。恃其強壯。而縱飲麪藥。則精氣與血俱傷。而真元斲削。風寒麪藥交攻。而虛火愈熾。病根日深。已不可拔。猶不知戒。而肆情逞慾。則心肝肺腎損矣。心損則精神不守。恍惚易驚。肝損則失血少睡。面白無色。肺損則

聲音低小。言語不續。腎損則腰膝軟弱。小便短數。而虛損之症成矣。虛損者癆瘵之始。癆瘵者虛損之終。繇勞傷而成虛損。繇虛損而成癆瘵也。癆瘵之爲病。也有咽乾喉痒。頻嗽而無痰者。有哮喘滿急。氣壅而不得眠者。有痰中見血。一咳而卽出者。有面暈頰熱。或洒淅而似寒者。有胸前如火。而兩足水冷者。有腰疼背痛。而筋骸無力者。總属于虛而已。至于夢遺。鬼交。盜汗。自汗。骨蒸。潮熱。又孰非虛之所致耶。究而言之。夢遺鬼交。虛不暇言矣。然何以有是夢。有是鬼。而又有是精耶。蓋夢者。心之神也。鬼者。肝之魂也。精者。腎之液也。心之火。君火也。肝腎之火。相火也。相從君令者也。君火一動。相火從之。而夢遺鬼交之病起矣。盜汗。自汗。虛不暇言矣。然均之爲汗也。何爲而有盜。與自之異耶。蓋盜汗者。睡去則出。醒來卽收。如盜之偷竊。乘其空隙。而惟恐人知。故有盜之名焉。而求其所屬之經。則繇于心氣之不足。汗者。心之液也。心氣不足。則神不守舍。而液無所攝。故睡中汗出。而一驚覺之間。心神漸定。故汗亦收也。自汗者。無睡無醒。自



然濡濕故有自汗之名焉。較而言之則自汗爲甚是。何也。蓋盜汗本于心虛。而真元猶未盡虛也。自汗則真元耗散。腠理皆開。肺失統氣之權。不能固表。故毫竅疎豁。汗流不禁。豈不大可畏哉。若汗出膏凝而不流者。乃真元盡泄于外。而生氣已絕。死期至矣。骨蒸潮熱。虛不暇言矣。然何以使熱之蒸于骨耶。蓋骨之所屬者腎也。腎實則寒。腎虛則熱。腎熱則龍火太旺。煎熬真陰。真陰既竭。熱無所容。流入于骨。故成骨蒸。骨蒸既久。上蒸于顙。顙熱而赤。則不收矣。蓋顙者骨之本也。骨本一枯。則腎經已絕。死期至矣。又有喉啞一症。百無一生。傳屍一症。九死一活。相思一症。無藥可治。或平素有漏病。及下部忽生腫毒。與夫脾虛發腫泄瀉者。皆不治之病也。

藥例

喉痒乾嗽。以滋陰降火爲主。

大劑玄參爲君。佐以阿膠。貝母。茯苓。黃耆。知母之類。

喘急不寧。以定喘順氣爲主。

大劑蘇子爲君。佐以杏仁馬兜苓貝母瓜蒌橘紅。
茯苓黃芩竹茹之類。

痰中見血。以清痰降火爲主。

宜貝母爲君。佐以天花粉麥門冬茯苓蘇子阿膠。
降真香犀角玄參黃芩山梔之類。若痰多于血。以
痰藥君之。血多于痰。以血藥君之。俱以治火之藥
佐之可也。

面暈頰熱。少頃卽減者。虛火也。

以黃栢爲君。人參茯苓知母連翹麥冬之類爲佐。
胸前如火兩足冰冷者。陰虛火升也。

以麥門冬爲君。黃栢知母茯苓人參瓜蒌仁爲佐。
以生附子爲末。塗兩足。

酒淅似寒者。反是熱症也。

以黃芩爲君。人參連翹柴胡黃連爲佐。若無痰喘。
宜加芍藥。不可誤以爲風而用風劑。

腰疼背痛。筋骸無力者。虛甚也。

以人參爲君。龜板山藥杜仲黃栢牛膝爲佐。如無
痰。用四物湯配之。


病人虛甚而痰嗽不止。不容不補。惟以化痰之劑。送下補藥亦妙。用蒸熟人參爲極細末。將雞子青拌和。淨手揉之。令其軟潤。却以貝母阿膠天花粉茯苓蘇子橘紅竹茹黃芩之類。煎好澄清。將參末放舌上徐徐送下。

虛癆惟紫河車爲聖藥。以人補人之意也。用頭胎男子胞衣洗淨。挑去血筋。不停換水洗之。直待無一些血水乃止。入淨器中水煮爛。搗如泥。和乾藥丸之。其乾藥如人參白朮茯苓甘草以補氣。當歸川芎芍藥地黃以補血。天麥門冬五味兔絲故紙杜仲以補精。而又佐之以知母黃柏以降火滋陰。此其大法也。丸如桐子大。以滑石爲衣。秋石湯下百丸。或用鱧魚血烈日中晒乾爲末。或半斤。或一斤。配人參末。蜜丸如桐子大。空心淡鹽湯送下。百丸。或用敗龜板水浸一二日。刮去垢。晒乾。鎊碎爲細末。蜜丸如桐子大。又用阿膠將蛤粉炒成珠爲末。蜜丸如菉豆大。空心服龜板丸。以補腎水。臨晚服。阿膠丸以潤肺金。俱用白滾湯下。大有奇效。龜

板生用。不失本性。若炙則動火。

或用敗龜板人參等分爲末。將阿膠投竹瀝中。化開。丸之。空朝一服。下午饑時一服。白滾湯下百丸。癆症喉啞。無治法。蓋肺爲氣主。爲五臟之華蓋。統領一身之氣者也。火邪燥金。則氣索而無聲。是以不治。若微有聲者。猶可延半年也。若死中求生。亦有一法。用大猪肺一具。割去心。及四旁浮脂。將刀割破其中。入生蜜三四兩在內。線紫緊。入淨鍋中。用生蜜三四斤水一二斗。同煮半日。若稠厚再加滾湯煮之。取出。溫湯洗淨。蘸秋石四兩食之。能復肺氣。又于丹田連臍貼參附膏。可復真元。其方用人參半斤。附子半斤。爲粗末。將天鵝油三斤。浸半月。慢火熬至焦黑。絞出渣。再熬至滴水成珠。下上等緋丹一觔。慢熬成膏。待溫。入射香末三錢。攤紵絲上貼之。美食調養。可保復生。此秘要之訣也。惟有緣者遇之。凡膏藥必無用人參者。故此方必無人信。

癆症傳屍無治法。蓋因初起病癆之人。先爲尸蟲食。




其五臟而死。既死之後。五臟皆冷。尸蟲不能居。皆從鼻中而出。以鼻乃肺之竅。癆乃肺之病。故從其竅而出也。其色多赤。乃血所化。無翼而能飛。或有不見而自能着人者。以骨肉尋骨肉。以同氣覓同氣。雖在千里外。其人常病。必無能脫者。可畏之甚也。

此物在蟲類。則名尸蟲。在鬼道。則名尸鬼。出入無常。變化莫測。不獨病癆之人有之。而人人皆有者。但不犯此病。卽不能爲害矣。本艸雖有殺尸蟲之藥。多不能效。惟死人身上蛆。可以治之。恨人不知。雖知之。亦以爲臭穢而不用。外此無治法矣。

癆症素患漏瘡。與下部忽生腫毒者。永無可生之日。蓋虛火縱橫攻擊。流毒于腸胃。而直注于上下焦故也。

又有相思癆者。神魂縹緲。背人偷淚悲咽吞聲。亦無治法。惟得遇所思之人。以遂其欲。則自愈矣。不然有死而已。


癆症惟心肝肺腎四臟受病。而脾胃尚無恙也。脾者



肺之母脾土不衰猶可以生肺金故患肺金病者嘗令脾土調和勿使損壞可也醫者不知利害但見病人陰虛火盛日日補陰用當歸生地黃柏知母麥冬之類以爲嘗服之劑將謂補其陰則元氣自復理固然也豈知此等藥性味寒涼易滑腸胃久服必瀉瀉則元氣脫盡矣下多且亡陰將以補陰而反以亡之將見面目手足皆發浮腫喘息雖存而精神已盡不死何待乎

癆症痰多血虛醫者多以四物二陳加減與之蓋謂

二陳治痰四物補血自以爲無遺法矣豈知二陳太燥四物太膩合而用之兩無成功而病反增重况痰在上焦血居下元一劑之中豈能上消其痰下補其血哉論治法宜以清火順氣化痰之劑日間徐服而四物更合他藥作丸滾以滑石空朝服之庶不礙痰而下元亦可補矣煎劑中亦有不礙痰而能補血者阿膠玄參夏枯艸龜甲之類是也又何首烏頭髮灰二味最能補血但于丸藥中用之而煎劑則非所宜矣



夢遺鬼交

夢屬心。鬼屬肝。精屬腎。君火動而相火從。故有此症。治此症者。不徒澁其精。又必清心火。不徒清心火。又必補其虛。惟虛故火易動。惟火動故精易泄也。宜以煨過牡蠣。荷花鬚。金櫻子之類。以澁精。石蓮黃。連茯神。遠志。麥門冬之類。以清心火。安心神。人參。白朮之類。以補虛。作丸子。空朝服之。藥中加秋石一二兩尤妙。或用鹿角屑炙脆爲細末。將天麥門冬地黃人參等分煎膏拌和爲丸。如桐子大。空心鹽湯下百丸。或用童便酒下亦可。

盜汗自汗

盜汗屬心。自汗屬肺。心神不守。故有盜汗。肺氣不收。故有自汗。盜汗以茯神門冬爲主。以安心神。君以麻黃根佐以浮麥牡蠣。自汗以人參五味爲主。以收肺氣。亦君以麻黃根佐以浮麥牡蠣。大忌茯苓生薑。蓋茯苓滲血。用之則亡津液。生薑開竅。用之則汗流不止。故忌之也。此惟無痰者可用此方。若

有痰則去人參五味而麥冬亦無妨也。


或用牡蠣粳米等分爲末。包生布中。遍身撲之。隨撲隨止。亦一時外治之良法也。

傷寒汗症。則用芍藥桂枝甘草。以和其表。氣虛汗出不休。則用黃芪爲主。此非治癆瘵中之汗症也。

骨蒸潮熱

骨蒸潮熱。微有分別。骨蒸則無時而不熱。潮熱則如潮信之來。必有定期。潮熱者。將成之骨蒸。骨蒸者。已成之潮熱。而總歸于腎虛。腎虛則熱故也。宜以杜仲黃柏牛膝茯苓爲主治。佐以四物人參枸杞五味龜板天麥門冬之類。蜜丸服之。亦治腎虛腰脊痛及骨肉疼。甚效。須久服乃可。

本艸謂地骨皮治有汗之骨蒸。牡丹皮治無汗之骨蒸。此特治骨蒸之初起可也。若骨蒸而至兩頰之皆赤。亦難矣。醫者不忍坐視。求一生于萬死之中。不論有汗無汗。只用此二味洗淨。水煎成膏。晒乾爲末。以鹿脊髓一具。如無。用猪脊髓煮爛。搗如泥。丸之。不拘時服。所以必用煎膏者。何也。蓋此二




味雖有治骨蒸之功。然氣味淡薄。徒加于煎劑之中服之。安能取效。必用以煎膏。則些須之膏。已抵幾兩之劑矣。况煎膏則性又醇和。善循經絡。而更有脊髓助之。逕至患處。故可奏功。然又必令病人日常以猪脊作穀。食之。亦能助藥力。此秘要之法也。若人無他病。而單患久熱者。以生芍麥冬茯苓各三四錢煎服。甚效。

已上三症。雖亦癆瘵中之一病。然非患癆瘵者。亦恒有是症。故附于後。

咳嗽

有痰無聲之謂咳。有聲無痰之謂嗽。有聲有痰者。名曰咳嗽。然謂無聲者。非曰全無聲也。咳而易出聲之。不甚響也。謂無痰者。非曰果無痰也。但嗽而費力。痰之不易出也。分而言之。咳爲在脾。嗽爲在肺。合而言之。總歸于心。是何也。蓋肺主氣。聲之所從出也。脾主受痰之所繇藏也。心主熱火之所繇生也。火尅金者。也。而肺之所屬者金。心火未甚。則肺無傷。甚則至于干肺。肺受火邪。則熱而氣沮。不能不發而爲聲。是以




嗽也。火生土者也。而脾之所屬者土。火不甚。則脾得所養。甚則反至于困脾。脾有流飲。又因火化。不能不變而爲痰。是以咳也。然則咳自爲咳。嗽自爲嗽。二者各自爲病。與曰非也。肺與脾。迭相爲用。而又互相爲害者也。使肺不受熱。則化氣自清。亦可以利脾。而何至于生痰。脾不受熱。則游溢精氣。自足以滋肺。而何至于成嗽。此肺與脾之所以迭相爲用也。今肺家受熱。則氣已壅盛。而下流于脾。其能以不作痰乎。脾家受熱。則痰隨火升。而閉塞肺腕。其容以不發嗽乎。此

脾與脾之所以互相爲害也。繇是觀之。則脾肺雖分二經。而咳嗽總爲一病。病之所繇成。皆心火之所致也。雖然。心火固能致病矣。而亦有得于外感者。或傷于風。或傷于寒。或傷于熱。如此之類。種種不同。亦皆歸咎于心火乎。殆不知始之者。風寒與熱也。而成之者。火也。內外夾攻。病斯成焉。而不可以一端求也。然此特論夫咳嗽之繇耳。而咳嗽之名。非一言之所能盡。悉而數之。有火痰嗽。濕痰嗽。鬱痰嗽。頑痰嗽。清痰嗽。風痰嗽。寒痰嗽。酒痰嗽。食積痰嗽。與夫乾咳嗽之

異焉。而諸嗽之形症。又何以別之。蓋火痰嗽者。嗽必面赤。用力久而後出者。是也。濕痰嗽者。喉中漉漉有聲。嗽而易出者。是也。鬱痰嗽者。胸臆脹滿。連嗽不出。喉中有喘聲。夜不得眠。上飽下饑者。是也。頑痰嗽者。膠住咽喉。揮咯不能出。必努力大嗽而後出。少許如脂膏之狀者。是也。清痰嗽者。必待嗽而後出。其痰不稠粘者是也。風痰嗽者。肺氣壅盛。必頓嗽而後出。其痰浮而有沫狀如津唾而畧稠者。是也。寒痰嗽者。得于秋冬之交。或爲冷雨所淋。或爲冷風所侵。或露臥

星月或寒天入水所致。其嗽必哮喘。或肩背覺寒。得熱湯飲之。卽緩者。是也。酒痰嗽者。得之醉後。感冒風熱。腹中有酒積。飲濁酒卽發者。是也。食積痰嗽者。每食後卽嗽。胸膈不寬。其痰稠粘。覺有碍意者。是也。乾嗽者。平素陰血不足。虛火有餘。喉中掌痒。痒卽頻嗽。有聲而無痰者。是也。又有嗽而兩脇痛者。名曰肝咳。有嗽而腰輕痛者。名曰腎咳。有嗽而中脘作疼者。名曰脾咳。有嗽而鼻流清涕者。名曰肺咳。有嗽而口苦舌乾者。名曰心咳。又有嗽而遺溺者。氣虛也有嗽。



而五心煩熱者。血虛也。醫者審而治之。無不中矣。

藥例

火痰嗽者。不宜用半夏南星。以其太燥也。惟以貝母知母瓜蒌竹茹之類。以化痰。黃連黃芩山梔之類。以降火。蘇子橘紅茯苓之類。以順氣。

濕痰嗽者。不宜用玄參阿膠知母。以其滋潤也。惟以蒼朮防風之類。以燥濕。半夏南星姜汁竹瀝之類。以去痰。枳殼橘紅之類。以順氣。黃芩山梔之類。以降火。

鬱痰嗽者。不宜用五味麥冬。以其補肺也。惟以枳殼桔梗便浸香附之類。以開鬱。貝母瓜蒌半夏之類。以治痰。蘇子杏仁之類。以定喘。茯苓黃芩山梔之類。以降火。

頑痰嗽者。不宜用煎劑。宜以散子消磨之。如青黛蛤粉海浮石風化硝明礬瓜蒌礞石之類。爲極細末。以姜汁竹瀝和服。以其膠固不開。非輕劑所能愈也。

清痰嗽者。宜用緩藥以治之。如貝母天花粉茯苓黃

芩竹茹橘紅蘇子之類。

風痰嗽者。宜用輕浮之劑以治之。如薄荷紫蘇梗葉。

桑皮防風半夏黃芩枳殼之類。少加麻黃耳艸。

寒痰嗽者。宜服蘆吸散。如肉桂雄黃鵝管石款冬花。

耳艸等分。爲極細末。用蘆管挑藥。輕輕含之。吸人。

喉內。徐徐以清茶過口。或以此藥蜜丸。如雞豆大。

喻化亦妙。若熱嗽去肉桂。用井泉石。若用煎劑。宜。

半夏南星陳皮茯苓款冬花生姜炙耳艸之類。

酒痰嗽者。宜山梔黃芩黃連以治火。貝母瓜蒌半夏。

曲之類。以治痰。蛤粉菴荳粉天花粉之類。以消酒。

紫蘇梗葉陳皮之類。以順氣。

食積痰嗽者。宜以枳實萊菔子神麴麥芽山楂之類。

以消食。陳皮木香砂仁之類。以順氣。半夏南星之。

類。以消痰。石羔黃連之類。以降火。加生姜竹茹。

乾咳嗽者。宜以知母玄參阿膠貝母麥門冬之類。爲。

主治。佐以黃栢茯苓天花粉山梔耳艸之類。加燈。

心竹茹服之甚效。

諸嗽皆宜用桔梗。乃肺經本藥。故不可不用。但不可。

多用耳。以其爲舟楫之劑。上而不下。不用則不能引諸藥至肺部。多用則又承載諸藥。而不能行。反能作飽。故不可多用。若治喉痛。與玄參、甘艸同用。若開鬱。與枳殼、香附、撫芎、蒼朮、貝母同用。若作吐藥。只與甘艸等分。爲一大劑。服之。自捲痰而出矣。久嗽不愈。用麥冬爲君。貝母、知母、茯苓、竹茹、黃芩、蘇子之類。爲佐。少加五味、甘艸。焙心服之。

華蓋散

茯苓、桑橘、甘蘇子。麻本同煎。太有功。

附痰症

痰之爲病甚多。不獨咳嗽有痰。方爲痰症也。如胸膈迷悶。咽喉不清。肩背作疼。遍身微痛。或頸項支節之間。皮膚之內。無故腫起。大小不等。而無紅赤之色。按之如核。不甚痛苦。或手足上下。半邊身體麻木不仁。或頭眩眼花。卒然昏潰。角弓反張。四肢不動。或步履如踏灰上。或眼前如見白雲。或睡中昏迷。嘗覺或飯後倦怠欲眠。或脇下如湯沸響。或心頭嘈雜似餓。或惡心欲嘔。或吞酸吐酸。如此之類。難以枚舉。莫非痰之所爲也。豈特咳嗽見痰。方爲痰哉。夫人未有無痰。

者。但痰中亦有養胃。不見其爲害耳。

礞石滾痰丸 治痰之聖藥。諸痰皆可服之。

青礞石 一兩 打碎如豆大。同煆硝 一兩 拌和。入礮

內。大火煆之。以硝盡爲度。傾出礮細。入滾湯。漂三

四次。漂去硝氣。再礮細。聽用。又將川大黃 半斤 片

黃芩 半斤 切片。同姜汁竹瀝各一碗。浸一宿。連汁

晒乾。放甌桶內。蒸半日。取出。晒極乾。爲細末。上等

角沉香五錢。亦爲極細末。同一處。再研和。以姜汁

竹瀝和白蜜煉熟。丸如菉豆大。收貯磁器中。以黃

下。大人服百丸。小兒五十丸。肥人二百丸。白滾湯

痰症。已干咳嗽。條中備陳之矣。但人見痰。則爲有

痰。未見痰。則爲無痰。而不知無形之痰。能作多端

之疾。非因咳嗽而始有痰也。故復附于此。而不自

以爲贅。

蠟寒口每服三十丸一日一服痰多者一日二服
隨其痰之上下以時之饑飽服之小兒只可十丸
老人只可十五丸或二十丸量人之大小及所稟
之厚薄用之

若痰盛作飽欲使痰從大便出卽與此方礞石再加
一兩沉香再加半兩其大黃黃芩不用蒸熟以生
蜜丸如桐子大臨臥用白滾湯下五十丸再不許
開口說話睡至天明其痰卽下矣

四製半夏丸亦治痰之聖藥不拘男人婦人老人小

兒皆用之。可以寧服。不動脾胃。不伐元氣。不損陰血。勿以爲常藥也。

大半夏先泡去皮臍。洗去滑水。淨秤一斤。入淨鍋內。水二斗。生姜搗碎半斤。同煮半日。取一個切開。看之。中心透明。無白色。方止。取起。冷水洗淨。曬乾。切片。分作四分。一分用明礬二兩煎湯浸之。一分用牙皂一兩煎湯浸之。一分用竹瀝半碗浸之。一分用童便一碗。加鹽一兩浸之。各浸七日。連汁曬乾。爲細末。聽用。加水香末二兩。沉香末一兩。同一

眼疾

人之有目。猶天之有日月也。日月有明。臨照萬方。若烟霧障天。則明者暗矣。兩目有神。旁燭萬物。若風火發越。則神斯耗矣。善調攝者。安養天和。使氣血營運。何至有目痛之患乎。惟夫七情內攻。六氣外感。加以酒色過度。當風眺望。或冒熱奔走。宿水洗面。不知自惜。是以成病于目也。分而言之。眼皮上下。皆属于脾。皮紅濕爛。脾火上蒸也。兩眦左右。皆属于心。眦肉綻紅。心火上炎也。四圍白處。皆属于肺。白有紅筋。肺火

上騰也。瞳外之輪皆屬于肝。兩輪腫痛。肝火上升也。輪內之瞳皆屬于腎。兩瞳昏痛。腎火上升也。總而言之。皆以肝爲主。肝爲相火。相火一動。諸經之火從之。而痛斯作矣。然又有視瞻多淚。痒不可忍者。風也。風動肝火。吹噓鼓舞。故連眦不止。其所以多淚者。淚者肝之液。風行則水流故也。其所以痒不可忍者。純于風而無火。但痒而不痛也。又有瞳子散大。而無光者。腎虛也。腎水不足。無以滋養肝木。肝木無力。不能收斂英華。故散大。而無光也。又有視物昏花者。氣虛也。乾枯少潤者。血虛也。羞明喜暗者。虛極也。眩暈不者。風痰壅也。眼眶脹痛者。肝氣盛也。醫者審而治之。有火則瀉火。有風則散風。氣虛則補氣。血虛則補血。虛極則補虛。風痰壅則定風去痰。肝氣盛則抑肝順氣。而凡是目疾。又皆以養血爲要。此其大法也。

藥例

眼皮紅爛。以瀉脾火爲主。君以煨過石羔。佐以蒸熟大黃。黃連。白芷。升麻。連翹。生甘草。與四物湯同煎。兩胛肉綻紅。以瀉心火爲主。君以黃連。佐以石蓮赤

茯苓連喬生甘艸升麻麥冬燈心與四物湯同煎。
白上有紅筋以瀉肺火爲主。君以黃芩佐以山梔連

喬黃連升麻薄荷甘菊生甘艸與四物湯同煎。

兩輪腫痛以瀉肝火爲主。君以黃連艸龍膽佐以柴
胡青皮艸決明生甘艸連喬升麻與四物湯同煎。
瞳子昏黑作痛者以瀉腎火爲主。君以澤瀉黃栢佐
以黃連連喬升麻生甘艸與四物湯同煎。

連眵多淚作痒者以疎風爲主。君以防風荆芥佐以
薄荷紫蘇黃連升麻生甘艸與四物湯同煎。

瞳子散大無光者以補虛收斂爲主。君以五味佐以
黃栢天麥門冬與四物湯同煎。

視物昏花以補氣爲主。君以四君佐以四物加升麻
黃芪木賊甘菊之類。

乾枯少潤以補血爲主。君以四物佐以天麥門冬黃
連連喬升麻生甘艸人參黃栢之類。

羞明喜暗以大補爲主。君以八物佐以黃栢知母連
喬黃芪大棗之類。

眼眶脹痛以抑肝順氣爲主。君以黃連佐以青皮柴

胡艸決明艸龍膽生甘艸與四物同煎。

頭眩不定以定風去痰爲主。君以天麻半夏佐以黃芩柴胡黃連升麻甘艸與四物同煎。

統治一切眼疾。以四物湯爲主。加柴胡升麻以引經。防風荆芥以散風。黃連連翹生甘艸以瀉火。艸決明青皮艸龍膽以抑肝。枳殼蘇梗以順氣。密蒙花木賊以去翳。甘菊薄荷以清頭目。任意加減用之。膏子藥點諸般眼痛。以黃連不拘幾觔洗極淨。用雪水或黃梅雨水煎極濃去渣澄清熬成膏子。加熟蜜。人乳羊膽汁調和晒微乾。捏作餅子。用新井水磨點。

散子藥。點諸般眼痛。以風化硝白礬砂硃砂水片水晶珍珠琥珀等分。爲極細末。和人乳汁點之。

風化硝。必冬瓜上生者爲妙。用秋後冬瓜一枚。切去蓋。刮去瓢。將朴硝實其中。仍以蓋蓋之。用竹釘釘住。將稀糞細繩絡袋之。掛當風處。月餘其皮上自然生出鎗硝。以鬚翎刷下。入藥。必以此爲君方妙。

九子藥治一切目疾。以當歸爲君。川芎芍藥生地爲佐。加黃連升麻共爲細末。入生羊肝同搗極和。又晒乾爲末。將羊膽汁與蜜同煉。丸如桐子大者。空心服。一半。如菉豆大者。午後服。若有痰姜湯下。有風紫蘇湯下。氣不順。青皮湯下。有翳。木賊湯下。眩暈。天麻湯下。心膈熱。燈心湯下。忌蘿蔔油麵及尅氣尅血之物。大抵眼科中。用四物湯取其入于血分。以養肝也。而四物之中。又必多用當歸。乃爲得法。醫者宜知之。

喉痺

喉者。一身之關隘也。閉而不通。則道路阻絕。飲食難下。死生係焉。使不蚤治。則不救矣。而喉痺之症。惟纏風尤急。乳蛾次之。若左右皆乳蛾。是亦纏風也。纏風云者。喉中皆纏緊。微有一線之通。乳蛾云者。腫處如蛾形。猶有可通之路。要其致病之繇。皆繇平日感受風熱積之既久。留于上焦。一時未發。乘機而動。或醉後而重醉。勞後而復勞動。其相火相火一熾。而平日所積之風熱。一齊而起。痰血騰湧。如潮之至。結于咽。


喉外不得吐內不得下爲腫爲痛苦楚呻吟饑不得食渴不得飲煎劑卒難奏功丸散安能施效病勢已迫將立而視其死與必須用刀針以決之庶可洩其毒而救其勢然後治之以藥乃可愈耳

藥例

喉症口噤不開刀針無自而入宜尋經絡刺之惟刺少商穴在大指甲內邊去甲如韭菜許者是也不分男女左右兩手皆刺血出卽寬蓋此穴乃手太陰肺經之穴直通咽喉故也其針用三角柳葉扁薄者非針灸之針也

若患人畏刀針者急分開兩邊頭髮但捽住頭髮一把盡力拔之其喉卽寬亦要法也

喉閉不通以巴荳烟通之其法用粗帛數重一頭以巴荳肉末攤于一頭不用巴荳緊緊捲作一炬長可二寸餘將有巴荳一頭點火隨吹令滅其無巴荳一頭令病人含在口內使一人對火輕輕吹之令烟透喉中立破膿血而卽寬矣畧寬烟透卽取去不然令人作瀉



纏喉風雙乳蛾絕妙立驗方。用榆樹上出過載毛窠一個。剪病人指甲。腳爪如左邊乳蛾。剪其左手左腳甲。右邊乳蛾。剪其右邊手甲足甲。若雙乳蛾。左右皆剪。用食鹽少許。同入窠內。煨過爲末。吹入患處。以手指拍其後項。視其所患。在左拍左。在右拍右。兩邊皆患。兩邊皆拍。即時破潰。瘀血並出。

或用蜘蛛一枚。放在小銷銀罐底。以明礬填入。煨過爲末。吹在患處。立寬。以蜘蛛能截能擒也。若有五巴。遍身者尤妙。

喉症輕者不必用刀針。亦不必用前藥。但用白礬砂燈艸灰。風化硝黃柏青黛永片爲細末。以蘆管吹入。至妙。兼治口瘡。燈艸最難燒。一燒卽過。安能得灰。必緊緊紮作一把。令其堅實。塞入罐內。固濟。煨之。罐紅爲度。待冷取出。方有存性黑灰也。

或用青魚膽一枚。以膽礬入其中。線紮其口。懸于當風處。陰乾爲末。遇患者以雞羽蘸藥點喉中。卽大吐痰血而寬。


喉症煎劑。以玄參爲君。桔梗其艸黃芩黃連連翹薄

荷山荳根之類爲佐加燈心一大把煎服之有痰
加竹瀝石血加韭汁而半夏生姜之類絕不可用
也。

齒痛

齒與牙同類而異名齒者內床也牙者外版也內床
能嚼而外版無爲能嚼則恒勞而無爲則恒逸恒勞
則易傷而恒逸則無恙故痛多在內床而罕及于外
版也味之辛酸氣之厚薄質之堅脆性之冷煖一咀
嚼間而飲食之毒流滲于齒縫其有餘物些少偶軋
其中未能卽脫者又于當風處剔之甚至有剔傷出
血者幾何而不爲致病之階也故齒痛之病風痛居
多風入于內卽時脹腫痛連頰頤咀嚼難合此人之

所最苦者也。而風痛之外，又有火與蟲之屬焉。風從外得，火自内生，而蟲又火之所化也。何以言之？蓋齒者，骨之苗，腎之餘也。而齒根之肉，當縫之深處，則屬于足陽明胃之經。今之患齒痛者，豈真齒之痛耶？齒之堅，尤甚于骨，非血非筋，乃物之至頑而木者。何痛之有？痛之所在，則在于齒根之肉，當縫之深處也。以陽明有火，熱蒸于胃，胃家受熱，上通于齒，故其痛也必臭穢難近，根肉浮赤，齒縫流血，而味似醋，名爲牙宣，而多糜爛，此得之于胃火而成者也。其或痒或痛，或大痛難忍之際，又忽然痛止，而如無恙者，非屬于風，非屬于火，其蟲之爲害乎？然是蟲也，又何從而生之？必有些須食物，留于齒根，爲火煅煉，藉血氣而成也。嚙其齒，則齒碎；嚙其肉，則肉疼。其或不嚙而微動，則肉痒；此蟲痛之所以異于風與火也。或有不痛而焦枯脫落者，非胃熱也，乃腎氣衰弱，不能固其根也。是以老人之齒多疎豁，而少壯者則無恙焉。觀于此，則可以施治矣。又云上齦屬足陽明胃，嚼而不動；下齦屬手陽明大腸，動而不休。



藥例

風入齒縫。脹腫作疼。宜以防風爲君。猪牙皂角。荆芥。升麻。白芷。薄荷。甘艸。爲佐。挾熱。加黃芩。黃連。煎服。又用青鹽。煨過。淬竹瀝中。取起。炙乾。又淬。又炙。每青鹽一兩。收盡竹瀝一杯。爲度。碾爲末。擦痛處。血水出。卽止。或用牙皂一錢。水片二分。射香一分。點入齒縫。其痛立止。

胃火上升。臭鬱作痛。齒根紅紫。宜以煨過石羔爲君。白芷。升麻。竹茹。黃芩。黃連。酒蒸。大黃。甘艸。爲佐。挾風。加防風。荆芥。薄荷。牙皂。煎服。或加竹茹一團。細茶一撮。

又用朴硝提淨。煨過二兩。白芷。細辛。各二錢。黃柏三錢。爲末。蚤上洗面時擦之。

或用煨過朴硝。鐘乳石。等分。少加水片射香。爲末。揩入痛處。立止。

蟲牙作疼。以雄黃。蟾酥。花椒。射香。等分。爲末。以棗肉搗成膏。拌藥。丸如黍米大。塞一粒于痛處。其蟲皆

化爲水而出。

齒縫中出血不止。以竹茹四兩。醋浸一宿。少少含之。不過三度。其血自止。

或用蒲黃燒灰。用飛鹽擦之。或用白礬煎湯。含嗽立止。

牙疼不可忍。欲取落不必用手。惟以艸烏畢撥各半兩。川椒細辛各一兩。爲末。每用少許。指在患處。內外。不過三四次。自落。


齒根搖動欲落。用生地黃當歸等分。同煎濃汁。嗽之。其齒自牢。

又用黑鉛鎔開。以新柳芽投入炒之。皆成灰。待冷。篩去活鉛。研細。朝朝擦之。最能固齒。

一切牙疼。以蛤蜊艸如芥菜者。搗取汁。和好醋含嗽。其疼立止。

或用草麻子五六枚。射香少許。蒜鬚少許。燒棗少許。和搗丸。如棗核大。綿裹塞耳內。

或用石羔白芷黃芩竹茹細茶升麻各二錢。煎服立效。



附口舌


口舌生瘡。咽喉腫痛。用提淨朴硝半斤。聽用。先將蒲黃五兩。薄荷一斤。水五升。拌勻。浸一晝夜。入鍋內。加水五斗。煎至一斗。以布絞去粗。澄清。又入鍋內。慢火熬成膏。取出。放大碗內。將硝投膏中。重湯煮化。取起。露星月下。凝結成冰。微乾。入青黛二兩。共爲末。以絹囊盛之。懸當風處。愈久愈佳。每用一錢。研細。摻痛處。良久。吐出痰涎。如喉痛。吹一字于患處。立效。兼治熱痰吐血。火用等症。

口瘡舌爛。以細辛黃連等分爲末。先以布巾揩淨患處。將生姜切極薄片。蘸藥末。兩邊于口內噙之。咽汁不妨。當噙一片。


又方。將附子爲末。醋調。男左女右。貼脚心。亦妙。凡口舌病。雖皆屬火。然不可純用寒藥。必兼辛散。乃能奏功。

瘡瘍


經曰。諸痛痒瘡。皆屬心火。則瘡瘍之疾。非外得也。而昔人列之爲外科者。以形症在外。非若內症之無形可見也。然外之所成。皆內之所發。未有不繇臟腑而出者。其可視以爲外病。而忽之乎。瘡瘍之中。癰疽爲甚。而大疔之毒。尤甚于癰疽。故治大疔者。十活其一。二。治疽者。十活其五六。治癰者。十活其八九。惟毒有淺深。故治有難易耳。然果何以辨其癰疽與大疔也。哉。亦視其腫之高下。地之廣狹。脉之浮沉而已。蓋癰



者壅之義也。氣血爲毒所壅，瘀而不行，故發而爲癰也。其初發之時，必洒淅惡寒而身微熱，多生于背與項，在背之上部，或左或右，爲上搭手。在背之下部，或左或右，爲下搭手。以其手之可搭處，故俗以名焉。其在背之中心，當肺俞之處者，謂之正發背，生于頸上者，謂之對口癰。比之上下搭手，爲尤毒也。凡癰皆掀然而腫高，其勢高大，其根不甚深，乃六腑所發，從平陽也。疽者，阻之義也。氣血爲毒所阻滯而不行，故發而爲疽也。其初發之時，亦洒淅惡寒，先覺麻痺，如瘡癰之狀。按之內，實手推不能動，亦多發于背腰肩膊之間，及小腹胸旁。其發于股足間者，名附骨疽焉。凡疽腫不甚高，勢不易大，而其根反深，惟發于背心及腿足者，爲最重。乃五臟所發，從乎陰也。疔者，釘之似也。猶釘之在木，拔之不能出，搖之不能動，其根至深，其毒至重。其頭至硬，其初發之時，反不知痛癢，但覺麻木。外雖如麻，而裡則如瓜。及其勢盛，則痛苦異掌，應心入膽而不可忍。乃五臟六腑之火煅煉已久，併合于一處而生者也。多見于面部骨節之間，而究




毒之所從來多繇于飲食服餌之中。經曰：膏粱之變，足生大疔。凡肥甘厚味炙燂煎熬之物，最能助火嗜味之人，恣供口腹，而又醉之以酒，勞之以色，脾土于是乎燥烈，腎水于是乎枯竭。積之既久，流于五臟，布于六腑，火鬱而不散，乘其氣血所虛之處而發之，根抵手內而煩熾于外，其毒尤甚于鴆鳥。試割其肉以飼雞犬，立見其斃。此大疔之所以多死也。若大似疔而非疔者，則但以腫毒治之，而無大害矣。然二者之脈何以辨之？蓋浮而數者，毒氣在表，故知其爲癰；沉而數者，毒氣在裡，故知其爲疽。若沉而又沉，數而弦急者，必疔也。此皆有形之可見，而治之難易猶可因其症而施之。至于腸癰、腹癰、肺癰之類，皆爲內癰，其狀與癰疽瘡癰無異者，苟或以爲內科之症而進以削堅破結之劑，如三稜、蓬朮、阿膠之類，所治非其所患，幾何而不殞人之命也。然必何如而可以知其爲內癰耶？蓋內癰之症，體膚甲錯而緊急，如版按之有塊而根則堅牢，外無紅腫之色，內多疼痛之苦。身雖無熱而脈氣反數，經曰：脈數身無熱，內有癰也。若夫



癥瘕痞癰則豈有此等之症與脉哉此特論內癰之
大畧耳而肺癰腹癰腸癰之狀又何如耶蓋肺爲五
臟之華蓋其位最高而癰生于肺則上膈滿悶口吐
膿血腥穢之氣不可近人其始得于肺痿不治故結
而爲癰也腹居中宮脾胃之位也而癰生于腹則中
脘併結騰騰而痛飲食減于平時惡心生于飲後小
便短澀時覺惡寒者是也至于腸癰雖在于腹而實
係于腸其爲病也盤腸絞痛內氣交攻而不能通暢
生于小腸則小便不利或反滲于大腸以作瀉生于

大腸則太便秘塞而糞或從小腸出其出也痛楚非
掌欲死不死欲生不生故患此癰者多死診其脉則
弦數而芤見于寸口則謂之肺癰見于關部則謂之
腸癰腹癰脉經曰寸芤積血在胸中關內逢之腸裏
癰此之謂也觀此則可以辨三者之癰也大法瘡瘍
之在外者初發無如一灸艾烟一透其毒立散若延
至六七日則不可灸矣毒之淺者點之毒之深者決
之毒之尤深而針刀所不及者則烙之未成膿則用
化毒之劑既成膿則用托裏之藥膿既潰則一手補




而已矣。若夫癰之在內者。艾烟不能入。刀針不能加。則惟以化毒等藥。令其膿于大便中出。亦庶乎其可生也。此皆難治之症。故歷言之。其餘之毒。吾亦何暇于遍論耶。

藥例

背上癰疽。屬太陽經未成膿之始。宜解毒發散。以羌活爲君。防風紫蘇獨活金銀花當歸川芎連喬殭蠶蟬殼皂角刺川山甲白芷茸艸爲佐。加葱頭煎服。送下蠟礬丸。四五十粒。既成膿之時。宜護心托裏。以羌活爲君。黃芪茸艸金銀花連喬白芷當歸川芎之類爲佐。少加官桂煎服。送下蠟礬丸百粒。凡瘡瘍皆火也。而反用官桂者。何也。蓋氣血得寒則歛。得熱則行。故以爲血導。使毒氣自內發外。不停蓄于中也。此特其總方耳。然在上在中在下。皆各有引藥。如上搭手。則加升麻。下搭手。則加酒炒黃柏。其對心者。則加大劑麥門冬以護心。當肺俞之處者。則加桔梗玄參。要當以意參之。

癰疽已潰。以大補氣血爲主。黃芪當歸二味。爲氣血



之君。佐以人參茯苓甘草川芎芍藥地黃爲佐。加糯米一撮。大棗十枚煎服。送下長肉丸。凡瘡瘍補劑。禁用白朮。白朮雖補。大能作膿。故不用也。惟痘科不禁。

蠟礬丸。黃蠟十兩。熔化。入飛過明礬末五兩。攪和。投水中。丸如菉豆大。每服百丸。大能護心。使毒氣不入。卽以前藥送下。

長肉丸。黃蠟一斤。熔化。入乳香沒藥血竭末各二兩。象牙末四兩。攪和。投水中。丸如菉豆大。每服百丸。一日二服。卽以前藥送下。

頭癰近喉。毒氣畧入。卽爲不救。尤其可畏之甚者。必半決之。方能救療。以羌活爲君。升麻玄參桔梗白芷天花粉瓜蒌仁黃芩金銀花連翹甘草皂角刺之類。爲佐。瘡潰後。方可施補。而亦不宜用峻補之劑。以其近于喉。恐生痰閉塞也。

癰疽圍藥。必露其頭。而四圍紅腫之外。無不塗之。使毒只從頭上出。宜以人中黃爲君。大黃五倍子小粉灰白芨白蘞黃柏寒水石射香爲佐。共爲細末。

好醋調傳。痛甚者。以人中黃白。益母艸等分爲末。將草麻子肉數粒。搗爛。加生蜜。或雞子清。調傳。其痛立止。

諸腫瘍。初生于下部者。可一下而愈。以瓜蒌半個。連皮搗碎。槐花三錢。大黃三錢。煎服。得快利。其腫立消。此方治橫痃。及乳瘡。最妙。乳瘡。加橘葉。橫痃。加黃栢。分饑飽服之。

附骨疽。在富貴者。多是厚味炙燂。及酒後行房。流毒于陰經所致。其在勞苦之人。必當乘酒入水。血瘀于骨節之間。故耳。若未成膿。宜大劑牛膝黃栢爲君。佐以當歸。稍川芎。赤芍藥。生地。獨活。皂角刺。白芷。金銀花之類。加官桂。附子爲向導。水酒煎服。已成膿者。宜烙之。既烙之後。而加以調補。可也。

或用當歸半兩。甘艸一兩。山梔十二個。木鱉子一個。爲細末。每服五錢。酒調服。

疔瘡之毒至深。必拔其疔根。而後可生。用蟻蜋一個。去翅足。同礪砂五分。白礞三分。共搗爲丸。如小棗豆大。先以三稜針。刺瘡約深幾許。將此丸納入。以

類簪捺下。須臾大痛。皆變作黃水而出。然後以野菊花搗汁一盞。和酒服之。一日連進三服。盡醉爲度。再以一味人中黃爲丸。日日好酒送下。

諸毒瘡無名者。急以乾桑葉粉。艸瓜蒌當歸榆樹根皮各半兩。生姜七片。葱一把。酒煎一碗。熱服。仍飲酒大醉。睡覺卽安。

代針膏。治惡瘡。不用刀針。一點卽破。瘡大者以筆蘸膏。畫爲十字。其瘡自迸開。又于紅肉上畧畫之。卽潰出膿矣。用礞礮二碗。入礱砂五錢。煎至一碗。入天明子石灰一塊。待化過。再熬至乾。入白礞末三錢。銀油末三錢。仍入好醋研和。收貯器中。

療癰腫硬疼痛久不瘥。用貓頭蹄骨一具。酥炙黃爲末。昆布海藻酒洗去鹽水。曬乾。各一兩半。連喬黃芩金銀花。川山甲皂角枳殼香附。各一兩。用醋煮乾爲細末。將玄參煎膏爲丸。如桐子大。每服七八十丸。一日三服。以姜汁三匙調入。好酒下。能收全功。

或用丁香五十粒。斑蝥十個。射香一錢。爲末。以鹽

或五十粒湯浸研爛如泥和前藥丸如菉豆大每服五六丸食前湯酒送下日進三服至五七日外覺小便淋瀝是藥之功也便下如青筋膜之狀是病之根也忌濕麪毒物

又方昆布海藻當歸連翹乾葛石羔夏枯艸煎服肺癰喘急坐臥不安以桑白皮剉燒甜葶歷隔紙燒各一兩爲粗末每服五錢水二盞煎七分溫服以利爲度

或用桔梗一兩甘艸半兩每服七錢水二盞煎一盞頓服須臾吐出膿血爲效

或用一味五倍爲末稀糊爲丸如米大白滾湯下一二錢如欲吐惡心畧嚼生姜卽止此藥能長肺肉去肺膿亦治肺痿調理方用天花粉一兩桔梗三錢枳殼二錢黃芩二錢半甘艸一錢金銀花一團桑白皮三錢水煎徐徐服

腹癰腸癰以出過蠶蛾蠟子燒灰每灰多少配大黃多少川山甲牙皂多少共爲末酒調下三錢膿血皆從大便出其未成膿者服之其毒化爲黃水瀉

下兼治痰飲停飲肚腹膨脹。

或用牛皮膠投酒中煎濃汁送下太乙膏丸百粒。一日二服其膿皆從大便而下。

太乙膏方 玄參白芷當歸赤芍藥肉桂大黃生地各一兩爲粗末用麻油二斤浸十日入銅鍋中煎至焦黑去粗再熬滴水不化爲度入黃丹一斤再煉成膏收貯器中此藥可貼可服兼治婦人月水不通。

灸腸癰法以小艾丸灸兩肘尖銳骨上十四壯膿從大便出以此法灸癰瘡初起能令自消。

廣瘡十貼收功每貼冷飯團三兩切片水四碗煎二碗去粗入羌活獨活白芷連喬苦參黃連川山甲當歸川芎甘草蒼朮防風荆芥蟬退各二錢煎至一碗去粗入廣膠三錢煎一盞和好酒服之外用輕粉爲君硃砂雄黃蘆甘石爲佐爲細末將黃蠟熔開投前藥攪和作膏藥貼之如膏藥太硬加樟腦少許自稠若不用黃蠟爲膏單用前藥加水片敷之兼治下疳甚效。

勝上內癰。外癰。大小濕瘡。用水飛黃丹。血竭。寒水石。各一兩。爲細末。將黃蠟六兩。豬脂三兩。慢火熔開。入藥調勻。傾水中。依瘡大小。捏作膏藥。先將花椒。葱白煎湯洗淨拭乾。貼上。以油紙蒙之。輕輕紮住。貼一日。再洗淨。翻轉貼之。兩日換一膏。半月卽愈。或用黃栢。黃連各五錢。好醋一碗。煎至半碗。去渣。入冬青葉五十片。重重浸之。慢火煮至乾。撩起。停一夜。每一葉畧摻輕粉。血竭末一些。貼之。至妙。或用烟膏一兩。飛礬二錢。寒水石煨過三錢。黃栢醋煮三錢。爲細末。香油厚調塗瘡。一分厚。以油紙蒙之。輕輕紮定。痛勿按。痒勿搔。直待其乾。不覺痛痒。輕去其痂。已全好矣。

天泡瘡。小兒掌生之。瘡勢一盛。多有至死者。用香爐蓋上。烟脂三錢。黃連二錢。青黛二錢。冰片二分。爲細末。雞子清調。或豬膽汁調敷。甚妙。

膿泡疥瘡。用烟膏一兩。硫黃。煨硝各二錢。飛礬四錢。猪牙皂角二錢。共爲細末。猪脂同研如泥。先以葱姜。花椒湯洗浴。然後敷藥。三四日卽愈。

或用黃丹雄黃飛礬大風子牙皂輕粉蛇床子露蜂房蛇退花椒等分少加白砒射香研細末柏油爲丸遍身滾之。

上部癬瘡沿及頭面痒不可忍者杜大黃根生葱等分搗極碎生地紅花亦等分以醋浸爛搗如泥加枯礬又同一處搗和以生布包之擦患處先以川山甲刮碎擦之待乾再刮再擦三四日卽光不再發累驗。

通身頑癬用斑蝥去翅足二錢川槿皮五錢飛礬三錢大風子二錢輕粉二錢白砒五分爲細末醋調敷之而癬之初發者不必用此重劑也宜以陳醋一碗入川槿皮一兩牙皂半兩大風子三錢煎至半碗去渣澄清入明礬皮硝各五錢又煎至一酒盞和以禿菜根自然汁生姜自然汁各一酒盞先以川山甲畧刮微破將筆蘸塗之不幾日卽愈。陰囊濕爛黃水如流或痒或痛者名濕陰瘡用細茶爲末加水片少許再研極細糝上卽愈。

陰囊爛破兩核突出痛苦萬倍先用桑皮線一條將


旱蓮艸汁浸一宿。晒乾揉軟。以手輕輕納進兩核。梓住囊皮縫之。用血竭龍骨象牙屑共爲末。以桑樹汁調之。濃塗縫處。


內服之劑。用黃芪爲君。人參白朮黃柏橘核澤瀉。金銀花獨活白芷連翹其艸爲佐。煎之。卽以此藥空心送下。蠟礬丸百粒。半月可愈。


一切惡瘡。死肉不消。成紫黑色。突出高起。臭穢。不可近。以烏梅肉燒灰爲末。糝上立消。

或用白礬二兩。黃丹一兩。硃砂三錢。爲末。搗肉同不糝于膏藥上貼之


或用巴豆霜一錢。五靈脂半兩。阿魏黃丹各二錢。飛礬一錢。爲細末。以糊爲錠子。入瘡內。其肉自消。









C83/2912
v.4





醫鏡卷之四

金沙王肯堂字泰父著


茂苑張暎垣玄暎父叅

武水蔣儀儀用父較

婦人


乾道成男。而坤道成女。故男爲陽而女爲陰也。氣屬乎陽。而血屬乎陰。故男多氣而女多血也。陽輕清而陰重濁。故氣無形而血有形也。氣惟無形。故充滿于中而不露。血惟有形。故流溢于外而可見也。然是血

也。以其初而言。卽先天真一之水也。女子十四而天
癸至。則源泉之通。自此而始。若往來有信。如潮汐之
不愆其期。然後血脉調和。而病無繇生。一失其期。便
能作疾。而生育之機。亦因以窒矣。故治女病者。以調
經爲先。而善調經者。以順氣爲主。順氣則經自調。經
調則血寧足。是以月事旣止。新血卽生。一交媾之間。
而胚胎卽結。血少精多。則精裹血而成男。血多精少。
則血裹精而成女。欲得子者。于月事初止之後。三日。
新血始生。而氣猶清。交感而成胎者。必男也。三日之
外。新血漸多。而氣已濁。交感而成胎者。必女也。其有
交感于三日之內。而亦生女者。必其平素血氣太盛。
而其來不清故也。其有交感于三日之外。而亦生男
者。必其平素血氣不盛。而其來不濁故也。其有血氣
未嘗不足。而月事又調。宜乎成胎也。而久不生育者。
何哉。是必男子精氣不稠。或精寒不相交結故也。而
非女子之病也。其有男子精氣素充。而又無子者。是
必女子子宮之寒。不能攝精故也。而非男子之病也。
然果何以知子宮之寒哉。蓋女子尺脉寧盛。若沉細



而遲。如無所動。則子宮之寒可知矣。其有子宮不寒而亦無子者。必其血不足。或痰有餘故也。然果何以知其血之不足。痰之有餘哉。亦視其形之肥瘦而已矣。蓋瘦人多血虛。血虛則不能凝精。肥人多濕痰。濕痰流注于下焦。則痰與血混淆。而化氣不清。故亦不能凝精也。其有瘦人肥人。而亦未嘗無子者。何也。蓋瘦人多血虛。道其嘗也。若月事既調。而無內熱之症。則血常滋潤而不枯。是以能生育也。肥人多濕痰。亦道其嘗也。然或肌肉不甚浮。面色不甚白。飲食無厚

味。則濕痰亦少。而氣血猶清。是以能生育也。雖是觀之。則女子之血實所以宰生生化之機也。方其未成胎也。則此血周流不息。以期而至。及其已成胎也。則此血榮養于內。以護其胎。今婦人初有姙。卽頭眩。惡心。或發嘔吐。多厭飲食。而嘗思酸者。乃足厥陰肝經養胎也。肝主風。故頭眩。肝有餘。故惡心嘔吐。肝勝脾。故多厭飲食。肝喜酸。故嘗思酸也。過此則諸經輪次養胎。其七八月之間。兩足浮腫者。足太陰脾經養胎也。脾主四肢。故兩足浮腫也。兩手不浮腫。而獨見



于兩足者何也。蓋脾本足之陰經。況此時胎氣已墜。下故不能不見于足也。每一月則一經養之。十月則十經養之。十月滿足而後產焉。其餘二經則又養于既生之後。而化血爲乳汁矣。是乳汁亦血也。而其色白者何也。蓋胸前部位屬太陰肺經。乃西方庚辛金也。金色本白。血從金分而來。故變赤而爲白也。凡血去多則令人虛。今乳汁既爲血。亦不宜去多也。然其來也恒有餘。其出也無盡止。是以厭飫小兒。而其母不覺虛者何也。蓋人身之血皆資飲食以生者也。飲食入胃。遊溢精氣。上輸于肺。從肺之部位而去。故成乳汁。婦人既產而飲食倍于嘗日。正以既產之後。又屬足陽明胃經養之。乳房屬陽明。故乳汁多受於此。處胃能化飲食。飲食能生血。飲食既足。則血亦足。血既足。則其化爲乳汁也。自無窮盡。何至令人虛乎。甘屬胃。故乳汁亦甘。白屬肺。故乳汁亦白。是以既產之後。乃肺胃二經養之也。小兒二三歲間。其母復有姪。兒飲魁乳。卽黃瘦泄瀉者。以乳汁味酸。正足厭陰肝經養胎之日。肝能剋脾。故兒飲之卽瀉也。當此之時。

肺金失令。胃土無權。則所以滋養乎血者。已無所藉。幾何而不爲兒之病哉。此特論胎前產後之事。而原其本于血。歸其功于十二經耳。若夫胎前產後之症。又各具于諸症條下。而此不及論。又曰。一月肝。二月膽。三月心。包絡。四月三焦。五月脾。六月胃。七月肺。八月大腸。九月腎。十月膀胱。其心小腸養于既產之後。在上爲乳汁。在下爲月水。與此不同。宜共參考。

經閉

經閉所以爲女人病者何也。蓋女人以血爲主。皆也。使其經脉調和。往來有準。有以應水道潮汐之期。舊血既盡。新血復生。有以合造化盈虧之數。則周身百脉無不融液而和暢。夫何病之有。設或閉焉。則新血滯而不流。舊血凝而日積。猶如河之水壅塞不通。必變爲渾濁臭穢。其理一而已矣。幾何而不爲病哉。血癖血風。與夫熱入血室之症。多自此始。然要其閉之之繇。必有所因。而非自閉也。或月事適至之時。因渴飲水。并食生冷之物。及坐水中洗浴。寒氣入內。血卽凝滯。亦能令人經閉也。或因墮胎多產而傷其血。或

因久患潮熱而銷其血。或因久發盜汗而耗其血。或因脾胃不和。飲食減少而不能生血。凡此之類。皆能令人經閉。其有肥白婦人。月事不通者。必是濕痰與脂膜壅塞之故也。是以醫者當隨其所因而治之。其可以一例施乎。

藥例

因感暴怒而經閉者。宜君之以青皮。佐之以官桂。木香。香附。赤芍藥。當歸。梢紅。花山查。桃仁。牛膝。蓬朮。蘇木之類。好酒煎服。

因食冷物而經閉者。宜君之以官桂。佐之以乾姜。木香。厚朴。香附。山查。紅花。桃仁。歸梢。牛膝之類。好酒煎服。

因坐冷水而經閉者。宜君之以附子。佐之以官桂。木香。厚朴。香附。山查。紅花。桃仁。歸梢。牛膝之類。好酒煎服。

因墮胎多產而傷其血。又久患潮熱而銷其血者。不可用行血之劑。宜以四物湯為主。佐以木香。香附。厚朴。其艸之類。以兼調其氣。將久而自通矣。

因脾胃不和飲食減少而不能生血者亦不可用行血之劑宜以白朮人參茯苓枳實木香香附并艸之類以調胃同四物湯煎服亦將久而自通矣。肥白婦人經閉者宜以枳實爲君佐以蒼朮半夏陳皮香附烏藥厚朴牛膝桃仁之類煎服則濕痰去脂膜開而經自通矣。

月事不調

月事先期而來者血熱也其色紫者亦血熱也後期而來者血虛也其色淡者亦血虛也或先或後色淡而稠粘者痰也將來而先腰腹痛者血滯而氣不至也既止而復腰腹痛者血海空虛而氣不收也或止或來無定期者因氣不調故血亦隨之爲行止也或一月兩至或數日一至不可一月論矣氣虛血熱也或經年之後累數日而不能止者乃血海脫滑兼有火以動之也既止之後隔三兩日而復見微血者以舊血未盡爲新生之血所催故不能容而復出也譬者觀此可以施治矣。

藥例

先期而來及其紫色者以涼血爲主宜君之以黃連。佐之以槐花山梔香附之類。同四物湯煎服。而四物湯中又倍加芍藥生地可也。

後期而至及其色淡者以補血爲主宜以四物湯起劑。佐以香附蘼艾龜板玄參五味麥門之類煎服。而四物湯中又倍加當歸熟地可也。


色淡而稠粘者以化痰爲主宜以半夏茯苓橘紅甘草。名曰二陳湯。用此藥起劑。佐以烏藥香附枳殼。紫蘇梗之類。同四物湯加生姜砂仁煎服。

將來而先腰腹疼痛者以行氣爲主宜君之以木香。佐之以枳殼青皮香附。同四物湯煎服。

既止而復腰腹疼痛者以補血爲主宜君之以地黃。佐之以當歸川芎芍藥白朮人參茯苓甘草。陳皮之類煎服。

或一月兩至或數日一至者以補氣涼血爲主宜以八物湯起劑加黃連山梔香附敗龜板炒黑蒲黃之類煎服。

或止或來無定期者以調氣爲主宜君之以香附。佐



之以陳皮烏藥砂仁蘼艾之類。同四物湯煎服。

經事數日不能止者。以涼血止血爲主。宜君之以炒

黑山梔。佐之以炒黑蒲黃黃連地榆牡蠣側柏葉

香附之類。同四物湯煎服。

經止後隔三四日復見微血者。惟以四物湯起劑。加

香附陳皮甘艸之類煎服。然此不足爲病。雖不服

藥亦無害也。

血腫

血癖

血風

崩淋

帶下

熱入血

室

婦人臑脹雖有因于氣食而成者。然成于血者居多。

焉。若成于氣食。腹雖脹而經不閉。成于血。其經必閉。

也。婦人之血恒有餘。故月見其血。而不以爲病。若閉

而不通。則日積而充滿。其始發之時。小腹先膨。久則


上連中脘。緊脹如鼓。青筋綻露。而血臑之症成矣。其

有因產後惡血不下。逆而上升。滲入于皮膚。充滿于

中宮。甚至上騰于面。而成紫色者。此必死之症也。

婦人癰塊。雖因痰與氣食而成。然成于血者居多焉。

然痰與氣食而成塊。雖成而不碍于經水。成于血者。




經水雖來亦必有時而斷也。此必因經水既來之後。尚有舊血未盡。偶感于寒氣。或觸于怒氣。留滯于兩脇小腹之間。故成血癖也。

又有所謂血風者。經水逆行。上攻于腦。頭目旋悶。不省人事。甚至滿面滿頭。皆成赤斑者。此因經水適臨。感冒風邪所致。蓋風之爲氣。善行而數變。其勢易上而難下。經水爲風所激。以故倒流而上行也。

又有所謂崩淋者。其病相似而實不同。崩者如土之崩。源泉逆流而不禁。乃血熱而兼氣虛。不能收攝也。淋者如水之淋漓。澀澀而不通快。乃內有鬱熱而氣亦滯也。然崩則皆血。而淋則有赤白沙石之異。赤者屬血。白者屬氣。沙石者。氣血之尤濁者也。治此病者。惟調其氣血。清其內熱而已。

又有所謂帶下者。從腰間束帶之處而來。故名曰帶。雖有赤白。總屬腎虛。其病與淋相似。然淋疾之所下者。多散而薄。必覺臭穢。帶疾之所下者。多滑而稠。無腥穢之氣。以此爲辨耳。

又有所謂熱入血室者。何以致之。必其經水適臨。或



犯熱症。因而經止。經隨熱而入于血室。則往來潮熱。如瘧之狀。而無定期。或一日三兩發者。是也。熱久不愈。傳于骨髓。多成骨蒸。其可不早治之乎。

藥例

血賊以破血通氣爲主。宜君之以桃仁。佐之以紅花。當歸。稍牛膝。三稜。蓬朮。木香。厚朴。官桂。青皮。牙皂。川山甲之類。必先以大腹皮一大團先煎。後入餘藥。乃妙。

或用廬見愁艸汁。和酒服之。或用杜牛膝搗汁。和酒服之。

血癖以破血軟堅爲主。宜君以蓬朮。佐以三稜。桃仁。紅花。歸梢。官桂。川山甲。牙皂之類。共一處醋煮。爲末。將血見愁搗汁。浸阿魏令軟。研爛。加醋調和。煮陳米粉粥爲丸。好酒送下。每服百丸。一日二服。或單用血見愁爲君。木香爲佐。浸酒服之。亦妙。

血風乃血症中之最急者也。宜以四物湯爲主治。加桃仁。紅花。防風。荆芥。天麻。薄荷。白朮之類。其所以用白朮者。以其能去面上遊風。及利腰臍間血。故

也。

或用蒼耳艸陰乾爲末。不拘時。酒調一大盞服之。其功最大。然人不可多服。多服則連通腦頭。蒼耳艸一名喝起艸。

血崩不止。必用散子藥。如棕灰牡蠣釜底墨山梔黃連槐花側柏葉人參黃芪并艸之類爲末。飛鹽湯下。若以此爲丸亦妙。一日連進數服。立止。或用小薊艸汁同藕節汁調和服之。

淋症宜先通利用大劑牛膝爲君。佐以桃仁歸梢枳殼烏藥香附砂仁木通黃連山梔赤芍赤苓生并艸生地之類。水煎加童便服之。

或用車前子一味爲末。酒下。一日四五服。

帶下不論赤白。皆杜仲爲君。佐以人參白朮茯苓當歸川芎芍藥地黃黃柏并艸澤瀉橘核之類。若小腹先痛而後下者。不用黃柏參朮。加延胡索砂仁香附之類服之。

熱入血室。宜于四物湯中倍加生芍生地。佐以赤茯苓黃芩連翹麥冬丹皮之類服之。

胎前諸症

婦人有妊月餘。卽惡心嘔逆者。謂之惡阻。乃足厥陰肝經養胎之月也。肝嘗有餘。本不能容物。而今乃有妊。則肝氣爲胎所碍。不得發洩。故惡心嘔逆也。過此月。則別經養胎。而惡阻之病息矣。夫十二經皆養胎者也。而肝經獨養于初妊之時。何哉。蓋胎者血之始成。而肝則血之所藏。以血養血。造化之相爲合也。然受氣之始。則何經以主之。曰足少陰腎經也。天一生水。氣最先。故男子先生左腎。女子先生右腎。而婦人右腎亦以繫胞爲胞之根。抵先天真一之氣發。此以爲之胎兆也。


妊婦心氣痛者。受胎必上。胎碍其心。故心氣痛也。小便不通者。受胎必下。胎壓膀胱。故小便不通也。其有遺尿不禁者。必其胎氣受寒。逼近膀胱。故遺尿不禁也。

妊婦腹痛。人皆謂之胎痛。而不知胎痛自有分別。不可以腹痛例觀也。假如努力任重。致傷其胎。而作痛者。方可言胎痛。或平日瘦弱。血不足以潤其胎。而致

腹痛其痛如芒刺引掣者亦可以言胎痛也。若偶傷于食偶感于氣偶觸于穢惡而作痛者非于胎何以亦謂之胎痛耶。譬者當審其脉若滑而弦乃是氣食若得濇脉乃爲胎痛。脉訣云濇脉如刀刮竹行。男人有此號傷精。婦人有孕爲胎痛。無孕還須敗血凝。繇是觀之可以見胎痛繇于血不足矣。

妊婦腰痛與男子腰痛不同。男子腰痛乃腎虛也。妊婦固亦有虛者。然因勞力而得者居多焉。勞力以任重致傷胞繫。胞繫與腎相連。胞繫受傷則腰必痛。痛甚則胞繫將脫。多至小產。其有素享安逸而妊婦腰痛者必其受胎之後不節房事以致傷胞繫也。十月滿足而腰痛者非病也。欲產故也。脉訣云將產之候脉離經。又曰一息二至號離經。所謂離經者胞繫欲離腎經也。此脉在妊婦則爲欲產而無所妨。在病人則爲欲死而氣將絕。醫者亦不可不知也。

妊婦下血者人皆謂之胎漏。而不知胎漏亦有辨也。蓋胞外有血胎內無血。胎內之所有者水而已矣。使胞破漏則必有聲。而所下者皆水也。若所下者血則



皆胞外之物耳。豈可以言胎漏耶。然下血過多。則無以養胎。下水過多。則胞已乾而兒必死。皆危症也。若臨月腹痛而胞破。則爲欲產。亦不可言胎漏也。

妊婦傷寒。瘧疾。皆能墮胎。蓋懷胎最怕寒熱。則遍身筋骨皆振。易動其胎。故患此二疾者。多至小產。用藥者。先以安胎爲首務。可也。

妊婦痢疾。泄瀉。雖不至于墮胎。然臨月之時。多有產難。蓋痢疾則亡血。而胎無所養。泄瀉則去水。而胎無所滋。世間既止之後。必將有乾枯涸竭之患。而產難恐不免矣。用藥者。其可不深加意乎。若暫瀉暫痢。其勢不甚者。亦無大害也。

藥例

惡阻嘔逆。以平肝順氣爲主。宜君之以芴決明白芍藥。以平其肝。佐之以枳殼砂仁厚朴蘇子烏藥。以順其氣。藿香黃連白芷蔻。以止其嘔逆而已。然此症乃自然之氣候。雖不服藥。亦無妨。

心氣痛者。胎碍其心也。以縮胎降氣爲主。宜君之以枳殼。以縮其胎。佐之以砂仁檳榔沉香蘇子。以降

其氣少加四物湯服之。

或用艾葉茴香川棟子俱炒等分水煎加醋少許服之亦可。

小便不通胎壓膀胱也。以利小便爲主。兼用搐鼻法。以升提其氣。則小便自下。宜君之以木通。佐之以車前。甘艸梢赤茯苓澤瀉之類。又以烏梅牙皂等分爲末。畧吹些少于鼻中。鼻中酸痒。欲嚏不嚏。其氣必升。先服煎藥。如一飯之頃。後用此搐鼻法。


遺尿不禁者。胎寒迫近于膀胱也。以溫胎爲主。宜君之以艾葉。佐之以茴香。五味。牡蠣。同猪尿。煎服。

胎痛。以生血安胎爲主。宜用四物湯。以生血。佐以砂仁。白朮。黃芩。以安胎。陳皮。木香。香附。以調氣。

腰痛。以安胎爲主。宜君之以砂仁。佐之以白朮。安胎。杜仲。續斷。甘艸。以止痛。

胎漏下血。其勢已危急。用阿膠爲君。鹿角屑。熟地。艾葉。白朮。砂仁。黃芩。爲佐。加葱白一握。水煎。送下黃蠟丸一二錢。一日三服。

傷寒。癰疾。皆以安胎爲先。定寒熱爲次。宜用大劑白



木砂仁黃芩紫蘇以安胎。如傷寒則兼用羌活防風。其艸無汗則少加麻黃。如瘧疾則兼用柴胡川芎芍藥。有食加山查麥芽枳實。陳皮神麴之類。痢疾以黃連當歸爲主治。佐以白朮茯苓芍藥木香陳皮其艸之類。如泄瀉以白朮蒼朮爲主治。佐以茯苓猪苓澤瀉神麴陳皮其艸之類。二病俱加砂仁煎服。病愈後又當大補陰血。如四物湯龜板阿膠玄參知母黃柏山藥五味人參之類作丸服之。始可以免臨產乾枯澀滯之患也。

臨產諸症

婦人小腹之下陰戶之上有骨高起。中有節骹相湊。未產則合。一臨產則分開。謂之交骨。此造化之巧。爲男女生育之大關隘也。雖兒頭向下。其勢已順。而交骨不開。終難生產。立見危殆。可憂之甚者。是豈藥餌之所能及耶。

產婦橫生者。一臂先下。乃兒在母腹轉運偏側。筋斗未翻。內有所碍。而不得遂也。逆產者。兩足先下。必是母腹中脂膜窄狹。兒不轉運而直下也。此皆因勞力

挫閃候傷其胎。以致如此。不亦可駭之甚乎。

兒奏心不下者。其手必捧母心。多致母子俱死。必以藥引入心分。解開兒手。方可得下。蓋兒手捏物最緊。藥氣一到。兒手自軟。故曰解開。

子死腹中者。腹必悶痛。兼冷。畧無動意。面如土色。其舌又黑者。是也。故試驗訣云。面黑舌不黑。母死子活。舌黑面不黑。子死母活。此之謂也。決不可因其虛而緩治之。

或有未曾坐蓐。腹中畧痛。而胞水先破。乘勢而下。固爲大幸。設或胞水漏乾。惡露出盡。而兒不能下。苟無法以下之。則母子俱不可保矣。其有產後胞衣不下者。不可視以爲細故。而易之。多有升至心而死者。

藥例


交骨不開。急用急性子殼。

卽鳳仙花子

川山甲牙皂射香

等分。爲末。和蜜捏作餅子。如指頭大者。一塊塞入陰戶近骨之處。又將葱二三觔。濃煎湯。令產婦坐浸于中。以手運之。交骨自開。

橫生者。將兒手輕輕納入陰戶。逆產者。不必以兒腳



推進雖推進亦終不能轉運矣。全在收生者活法。急用蛇退一條。蟬退二十頭髮一束。共燒灰爲末。溫酒調下。仰臥片時卽下。

奏心不下者。乃兒捧母心也。急用猪心血調乳香五錢。好酒送下。兒手遂開。亦治子死腹中。與心頭痛等症。

或用蛇皮燒灰。入麝香少許。研細溫酒送下立產。子死腹中者。用當歸川芎砂仁各一兩。官桂三錢。木香二錢。水酒各半。蒸煎服立下。

或用玄明粉四錢。以清油蜂蜜各一兩。溫酒調下。須臾立產。又治男婦小兒大便乾燥。

或用馬檳榔連食三枚。治一切難產立效。

胞水漏乾兒不能下者。急以車前子二三合煎湯。以布濾去渣。連服之。兒隨水出。

統治產難。以益母艸爲君。當歸川芎木香砂仁爲佐。大約益母艸一兩。四味每用五錢。水酒煎服。

或用臘月兔腦去膜乳香末一錢。母丁香末一錢。射香一字。研勻。丸如鷄豆大。陰乾。油紙密封。臨產

破水後溫酒下一丸。卽時產下。隨男左女右手握出爲驗。

或用當歸川芎各二錢。官桂一錢。射香一分。爲末。酒服立產。

胞衣不下者。以鷄子清三個。去黃取清。以好醋三合。調和令服之。立下。

或以花蕊石一兩。硫黃四兩。入礮鹽泥固濟。煨過爲末。童便酒調服一錢。立效。兼治敗血奔心。胎死腹中。及男婦小兒跌撲損折傷。


或用初浴兒湯一盞。與服。莫令知之。立下。

或用瓦油盞烘熱。仰放產婦臍上。令一人以脚抵住油盞。其胞卽下。乃鄉村一法。果驗。

產後諸症

婦人初產。忽覺昏運。口噤眼合。面如土色。欲倒者。乃惡血冲心也。名曰血運。急令人扶住。勿使仰臥。卽以熱醋向鼻噴之。卽醒。醒後施治。須用降血之劑。

產後發狂跳躍。不顧羞恥。欲上屋者。非顛也。乃各經之血一齊乘虛上升。迷其心竅。而下部惡血。又相繼



奔騰其勢上而不下。故發狂跳躍而不能自禁。也用重劑使血歸經則安矣。

產後腹痛不可盡作惡血不行。須看新久。若初產腹中有痛陣如將產之狀。腹皮未寬軟。又若轉運不寧。必是雙胎。若經一二日腹痛者。惡血停滯而未盡去也。名曰兒枕痛。若惡露已收而腹中如芒刺痛。翁翁無力者。乃空痛。不可復以行血之劑治之。惟當養血而已。

產後腰痛多是惡血停積于兩腎空隙之處。其痛板急不能轉動得熱物熨之即緩者是也。若兩腰空痛翁翁然如不能伸氣者。乃腎虛也。

產後下血不止。看其色之紅紫。紫者爲舊血。任其自下。紅者爲新血。宜先止之。而後用補。然紫者既盡必繼之以紅。紅者既盡必繼之以淡。此必然之勢也。宜時時斟酌調治之。或丸或散。或劑隨緩急以施治。失此不治則元氣必脫而潮熱虛勞之病有不免矣。產後瘧疾適值秋七八月間發者。方可以瘧疾治。若春夏及冬時發者。非其時而有其氣。謂之似瘧非瘧。

此必因產後風食所傷。當以風食爲主治。而以血藥佐之。然須辨其爲風爲食。而後可耳。寒多熱少。而腹不飽者。風也。熱多寒少。而不思飲食者。食也。治食則消食爲先。而少兼風藥。治風則疎風爲先。而少兼食藥。全須員活。不可執滯。若有痰。加痰劑。宜斟酌之。

產後傷寒。決不用汗下之劑。以其氣血俱虛也。汗則亡陽而傷氣。下則亡陰而傷血。若犯麻黃大黃。多至不收。惟以和解爲上治。而以血藥佐之。萬無一失。然傷寒發于產後。若真正者。必費調治。而病多危。惟感冒者。爲易愈耳。

產後中風。危疾也。若外有六經之形症。內有便溺之阻塞。皆難治之症。惟口眼喎斜者。無事耳。若忽然角弓反張。目定項強者。必平素有痰症。風邪乘虛而入。風痰交作。壅塞經絡。致使榮衛不通。以于是此。雖有似中風。而實無分于六經。治之亦甚費力。若又汗出不止。或遺尿不禁。其死必矣。

產後瀉痢。甚者死。多生少。不甚者。猶可施治。若瀉比于痢。則痢爲尤難。而瀉或能調治。大抵瀉者。以補脾

爲主治。而以消食藥佐之。痢則以扶脾消食爲主治。而以血藥佐之。蓋痢多下血。故用血藥。瀉不下血。故不用血藥。用血藥則瀉不能止。瀉止後則補血藥。九子又不可不用矣。

產後身熱不止。口乾煩渴。日晡尤甚者。血虛也。宜大補其血。不宜用寒涼之藥。反佐以溫熱。則熱自除矣。所以然者。以血藥屬陰。陰非陽不生。故用溫熱之劑。以助陽而生陰。陰血既生。則邪火自退。醫者不可不知也。

藥例

產後血運不及煎藥。只用童便磨好罌在內。灌下立醒。或以降真香一錢。沉香三分。爲細末。當歸煎湯下。可免冲心之患。

或血入心經。錯語健忘失志。及產後百病。以血竭沒藥等分。爲細末。每服一錢。童便和酒調下。若干分。婉時調服一錢。惡血皆自下行。更不冲上。

產後惡血冲心。發狂跳躍。急令兩人扶住。煎當歸一兩。與服之。其惡血自下行。新血各自歸經。即時安。

寧矣。

或用芎歸各半兩。水煎。加童便服之。立效。

產後二三日間。腹絞痛者。惡血未盡也。古方獨聖散。最佳。用山查肉一兩。煎濃。調砂糖在內。熱服。血自下行。其痛立止。

或用芎歸。益母艸。桃仁。玄胡索等分。煎服。

若惡血已盡。五六月間。腹痛者。血虛也。宜四物湯。加炙甘草煎服。甚效。

產後腰痛。若惡血不甚下。而腰間不能轉側者。乃惡血停滯于兩腎空虛處也。宜君以當歸。續斷。桃仁。起劑。兼以烏藥。勻氣。杜仲。牛膝。酒炒。黃柏。引經。官桂。爲向導。空心煎服。得五六貼愈。

若血去多而腰痛者。虛痛也。宜以杜仲。起劑。兼以四物。補血。牛膝。黃柏。茯苓。引經。少加紅花。以養血。恐分娩時勞倦。以致傷其腰故也。

產後下血不止。以四物爲主。佐以止血之劑。加地榆。牡蠣。炒黑。山梔。炒黑。蒲黃。棕灰。鹿角灰。烏梅之類。作散子。服之。一日連進五六服。每服一二錢。立止。

或用熟地搗爛。每服一兩。和酒再研。溫服。連進三服。大效。

或用蒲黃三兩。炒焦。水三升。煮一升。頓服。

產後瘧疾。宜四物湯。加柴胡。黃芩。以定寒熱。有痰。加半夏。橘紅。有食。加麥芽。山楂。有風。加防風。荆芥。頭痛。倍加川芎。寒熱甚。倍加酒炒芍藥。柴胡。斟酌用之。產後惟十二朝內。大忌芍藥。以後不忌。

產後傷寒。大忌汗吐下三法。只宜羌活。防風。紫蘇。生薑。柴胡。川芎。甘草之類。以解表。陳皮。香附之類。以調氣。有痰。加痰藥。有食。加食藥。而又佐之以四物之類。多加葱白煎服。以微汗出爲度。若大便秘結。以蜜導之。或飲蜜湯亦可。

產後中風。不可以嘗人中風例治之。雖中腑亦不宜汗。禁用麻黃。雖中臟亦不宜下。禁用大黃。惟審其在表。則羌活。防風。荆芥。紫蘇。甘草之類。可用也。審其在裏。則枳實。厚朴。茯苓。陳皮。烏藥。木通之類。可用也。兼用南星。半夏。瓜蒌。蘇子。竹瀝。姜汁之類。以治痰。佐以四物湯。補陰血。治之之法。不過如此。必

不可求奇取異。而用孟浪之藥也。

產後瀉痢不可混治。瀉則補脾爲主。如白朮茯苓神
麴甘草陳皮之類。有食則消食。有氣則理氣。而四
物之類。且少停而勿用。以歸地皆非助脾之劑也。
若久瀉加烏梅大棗人參。至于痢疾則不忌四物。
當與平胃散同用。兼以消食之劑。與調氣養血而
已。

產後身熱不止。宜于四物湯中。倍加酒炒芍藥。兼以
炒黑炮姜佐之。茯苓參熟。柴胡青熱。一月後身熱
未除。宜加人參大抵產後不宜用人參。恐補住
惡血也。一月後惡血已盡。新血已生。故不忌人參。
而猶必以陳皮監制可也。

加減總方


婦人諸血不足。用當歸熟地各酒浸一宿。焙乾。芍藥

川芎等分。每服七錢。水二盞煎服。隨症加減。

血氣不調。加梔子黃連。

血虛勞瘵。加薤白柴胡。

血崩淋瀝。加炮附子赤石脂。



血滯不通加紅花桃仁。

便血帶下加荆芥地榆。

潮熱加前胡乾葛人參黃芪。

血氣滯腹股刺痛加肉桂。

虛熱口乾加麥冬黃芩。

嘔吐不止加藿香白朮人參。

產後腹脹加枳殼肉桂。

經血淋瀝加炒乾蓮房。

人便秘加大黃桃仁。

產後虛憊血熱煩悶加生地。

虛而多汗加煨牡蠣桂枝。

產後悶亂加伏神遠志。

妊娠心腹痛加竹瀝。

產後寒熱往來加柴胡麥冬。

產後風頭痛加石脂甘草。

產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝。

換湯總方

婦人室女血氣不調及胎前產後諸症用香附子童

便浸炒半斤。烏梅炒四兩。甘草炙一兩。爲末。以生
姜四兩。葱白一握。搗取汁。併好醋一碗。共打糊。丸
如桐子。每服三五十丸。隨症換湯服。

血氣不順。心胸痞滿。紫蘇湯下。

腹痛腰腿疼痛。茴香湯下。

翻胃嘔吐。脾胃感寒。以老姜燒黑切五片。鹽少許。
煎湯化下。

驚憂喜怒傷神。心滿腫疼。面浮。石菖蒲湯化下。

血運悶。血刺痛。血積。血瘀。良姜赤芍藥醋水各半。
盞煎湯化下。

喘滿氣急。面浮。生姜紫蘇湯下。

吐血。喉中腥氣。黃桑葉湯化下。

經絡感熱。血脉妄行。生地湯化下。


敗血冲胸咳逆。生姜柿蒂湯化下。

血滯大便秘。枳殼或青皮湯化下。

崩中帶下。小便頻數。炒吳茱萸湯下。

妊娠傷食。胸膈不快。木香或砂仁湯化下。

產後子腸脫下。鯽魚頭煎湯化下。



妊娠臨月。近上逼心。名曰子懸。生姜紫蘇湯化下。
產後寒氣入腹。臍下刺痛。炒吳茱萸湯化下。

小兒

男子婦人之病。可以問而知。可以切而得。斷死生。辨
難易。審差剗。猶有所依據。而不至于大悞。若小兒懷
抱之時。雖有所苦。而不能言。及能學語。又不能指其
所苦之處。欲診其脉。則骸骨短小。氣血未定。寸關尺
將何以分。浮中沉。將何以定。雖有一指。滾取三部之
說。而終未得其部位。况至數急促。豈能以悉審之。大
約八九至爲平。五六至爲遲。十一十二至爲數。依稀
彷彿之間而已。故啞科治療之難。每十倍于大人而

尤不可以不慎者也。惟虎口之脉。稍爲可驗。其脉在食指外側。每一節爲一關。三節爲三關。男視其左。女視其右。有筋脉如絲。映于肉內。仔細視之。紫則爲風。紅則爲寒。青則爲驚。白則爲疳。黃則爲脾困。青黑爲慢驚。入掌則爲內吊。若三關過度。爲沉疴之候。惟此可以少知之耳。雖然。醫者之治病。當多方求之。豈可執虎口之脉法。而盡小兒之諸病哉。必于病之未形。而用意察之。庶可以爲預消之地。如小兒呵欠連綿。乃臟腑受邪。作病之漸也。若面赤。則知其爲風熱。而渴肝之劑。可以先服。面青。則知其爲驚風。而治驚之劑。可以先服。面黃。則知其爲脾虛。而補脾之劑。可以先服。多睡。則知其爲內熱。而清熱之劑。可以先服。口中氣熱。則知其爲傷風。而疎風之劑。可以先服。皆當隨症形。而先治之。勿俟其發。而後用藥也。其有不治之症者。尤不可以不知。小兒腮上有赤脉。顙腫及陷者。一不治也。魚口氣粗。齧齒咬人者。二不治也。冷汗如雨。痰熱不退。三不治也。臍風撮口。鎖肚吊腸者。四不治也。風攻頤頤。唇項腫硬者。五不治也。鼻有黑色。

六不治也。咳喘喉痛。七不治也。四肢虛浮。八不治也。胸高而突。九不治也。五軟五硬。十不治也。凡見此等之症。卽當去矣。苟不知幾而復藥之。則病者之死。雖不繇于我。而我亦何有辭于彼哉。大凡小兒之病。有嘗多者。不得遂其欲。則易怒而啼。故肝病嘗多。飲食不知節。雖飽而猶求食。故脾病嘗多。心神未定。聞響易驚。故驚病嘗多。肌膚柔嫩。腠理未密。故風病嘗多。性喜吮乳。其味停積。而又易感風熱。故痰病嘗多。治兒之病。審其所嘗多者。酌而施之。以已之意。探病之情。亦庶乎用藥之無悞也。然此數種。雖或嘗有。而用脾之病尤多。縱有他症。嘗兼抑肝和脾之劑。爲妙神而明之。存乎其人。得心應手。要不可以言求也。

胎熱胎寒

胎熱之症。面赤眼閉。五心煩熱。大小便不通。乳食不進。啼叫不止。嘔血尿血。或生下遍體皆黃。凡若此者。皆謂之胎熱。蓋因其母受胎之後。不忌辛熱之味。或好飲酒。或好沐浴。或不節房事。或感冒風熱。兒在母腹。積受熱邪。故成此症。必以清熱之劑。爲主治也。

胎寒之症。面色青白。四肢逆冷。大便清黑。小便不禁。腹疼氣痛。盤腸內吊。或生下又感外風。不時寒戰。凡若此者。皆謂之胎寒。蓋因其母受胎之後。不忌生冷。或外着寒邪。或平素稟氣寒冷。兒在母腹。呼吸母氣。久受積寒。故成此症。必以溫熱之劑。爲主治。可也。凡治此二症。小兒不宜服藥。當大劑濃煎。令其母食後。捏去宿乳。服藥少頃。乳之。蓋因胎中受病。故于乳中過藥。得于內者。亦從其內治之。不離母氣。則藥易應。故也。

藥例

胎熱。以生地爲君。赤芍當歸川芎丹皮黃連山梔連翹犀角澤瀉猪苓赤苓天花粉木通生甘草之類。爲佐。

胎寒。以熟地爲君。當歸川芎酒炒白芍大小茴香木香乳香沒藥官桂熟附子炙甘草之類。爲佐。

二症。必用四物湯起劑者。何也。蓋血以養胎。胎中受病。大抵皆血之使然。故不離乎血分之藥也。

臍風撮口

臍風撮口。總爲一病。未有臍風而不撮口。未有撮口而不臍風也。患此病者。九死一生。蓋臍命根也。臍爲風所入。命根絕矣。而可以得生乎。求其所属之經。乃心脾之症也。開口属心。閉口属脾。風入于臍。先流于脾。繇脾而上傳于心。心爲邪所客。故口不能開而頻撮也。其發搐者。風使之也。究其病之所繇成。有內因。外因之異。蓋臍帶係于胞。必其所生之時。其母先感風邪。遺其邪于小兒。謂之胎風。其驚搐者。謂之胎驚。病從內得。故曰內。因其或斷臍之後。包裹失于周密。被窩風入。未及六七日。而臍帶已脫。必成此症。病繇外得。故曰外。因醫者。又以艾灸其臍。徒苦之耳。竟何益哉。欲求一生于萬死之中。惟下之而已矣。外此更無餘法。

藥例

大法卽以小兒脫下臍帶。洗淨。先以水煎至五六沸。去帶入牙皂。蠶蠶川山甲麻黃防風荊芥甘草半。夏南星之類。又煎五六沸。入生大黃。畧煎一二沸。澄清入射香末少許。姜汁竹瀝調勻。徐徐以匙灌。

下若得通利。卽有三四可生。不然必死。其臍上以生南星末封之。亦可以追去餘風。

或用牛黃三四釐射香半分爲細末。姜汁竹瀝調之。滴入口中。亦可。若口噤不開。以南星爲君。射香爲佐。研細擦其齦。自開。

重舌鵞口

舌者心之苗也。心爲君火。其體本熱。而况小兒以純陽之軀。先受熱于胎。復感熱于內。其母愛惜之至。惟恐其寒。而又裹之以綿衣。覆之以重衾。幾何而不爲兒之病哉。重舌鵞口之症。未必皆兒之自病。或者其母有以致之也。古人云。若要小兒安。嘗令饑與寒。饑不至于傷脾。寒不至于生熱。此非保嬰之道乎。所謂寒者。亦非使凍之也。惟令嘗溫。不至于甚煖耳。冷暖得宜。豈復有重舌鵞口之病耶。然何以名之曰重舌。重舌者。舌下腫突。其狀若又一層。故謂之重。非真有兩舌。何以名之曰鵞口。鵞口者。滿口皆白。有似鵞之口中俗謂之雪口是也。分而言之。重舌屬心。鵞口屬脾。合而言之。總爲心熱。何者。心統于脾。脾爲心之子。

心熱則遺熱于脾。故白沿于口也。使不繇于心熱。則口雖白而舌自赤。何爲而舌皆白耶。大法內服瀉心清熱之劑。而外敷涼藥。則重者可消。而白者可退矣。

藥例

重舌宜瀉心而不瀉脾。以黃連爲君。生地甘艸石蓮木通連喬燈心爲佐。臘雪水煎。待溫時時滴入鼻中。令嚙欲吐。則任其吐。亦可以發散熱邪。

鷺口以瀉心而兼瀉脾。以黃連爲君。生地生甘艸山梔煨過石羔木通燈心爲佐。臘雪水煎。如前服法。口中舌上並用故帛裹指蘸水拭淨。用黃柏青黛風

化硝礪砂黃連人中白之類。爲細末。敷之。亦可以治口瘡。

丹毒

丹毒火症也。得丁胎熱。其母受胎之後。不忌胡椒姜蒜煎熬炙燂酒麪之類。或感風熱。或不節房事。皆能助火。火邪內攻。胎受其毒。而傳氣于小兒。故小兒出胎之後。多有是症。近則五六日。或十日半月。遠則彌月之後。或兩三月。其形症不同。或頰下如櫻桃突出。

色赤而光。謂之赤瘤。或遍身紅點如洒朱。謂之丹疹。或遍身紅腫。熱氣如蒸。謂之火丹。或小腹膀上陰囊等處。忽然紅腫如霞。流行不定。謂之赤遊丹。病名非一。總爲丹毒。丹毒入腹。腹脹不飲乳者死。必于未入腹之時。急服退毒涼劑。外用小刀。輕輕刺出惡血。或猶可生。其入腹者。無如一瀉。間有瀉而得生者。乃千百中之一也。諸丹毒。惟赤遊丹爲至急。善保嬰者。若見小兒多啼少乳。卽遍視其身上。一有紅色。卽急治之。荷看視不周。丹毒在身。而母猶未覺。及至覺時。已入腹中。救之奚及。丹毒惟紅綠瘤不治。因父服熱藥。遺熱在胎。非藥所能解也。

藥例

丹瘤如櫻桃狀者。是也。宜以綿羊腦子。同朴硝研爛。貼患處。立效。或以草麻子。同麪研和敷之。

丹疹遍身紅點如洒朱。是也。宜以漢防已半兩。朴硝犀角黃芩黃芪升麻各一錢。加竹瀝煎服。

火丹遍身紅腫。是也。宜以當歸赤芍甘艸大黃等分。每服三錢。水半盞。煎三四分。食後服。或用前丹疹

方服之亦妙。

赤遊丹流行不止于一處是也。此爲至急救。遲卽死矣。宜用積年胞衣所化之水。和金汁塗之。神效。若無金汁。單以胞衣水和風化硝水片塗之。若無胞衣水。單以金汁和甘艸大黃末塗之。皆能取效。或用野人糞下土鷄子清調塗。又以人中黃二三錢煎服之。能去胎毒。

或用麻骨燒灰。先將香油調塗。次用麻骨點火。倒持之。將不點火一頭出烟。燻患處。立退。或用雄黃五倍等分爲細末。醋調塗之。

丹毒煎方。黃連黃芩黃柏生甘艸連翹天花粉皂角刺各五分水一盞煎五分飲之。丹毒入腹者加大黃一錢。

五種丹毒。用鬱金甘艸桔梗天花粉葛粉等分爲末。每服二錢。薄荷湯入蜜調下。

十種丹毒。如三日不治。毒入腸胃。則不可治。宜仔細辨認。依方治之。萬不失一。

一從頂頭起腫。用葱白研取汁塗之。

二從頭上起紅腫痛用赤小豆末雞子清調搽

三從面起赤腫用竈心土雞子清調搽

四從背起赤點用桑白皮爲末羊脂調塗

五從兩臂起赤腫黃色用柳木燒灰水調塗

六從兩脇起虛腫用生鐵屑和猪糞調塗

七從臍上起黃腫用檳榔末米醋調塗

八從兩腳赤腫用乳香末羊脂調塗

九從兩腳赤白點用猪槽下土麻油調塗

十從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗

中惡 天吊 客忤 夜啼

中惡天吊者爲惡鬼之氣所中兩目上突吊起而不能睇也此因胎氣不足精神失守虛之所在邪必凑之心虛則神走肺虛則鬼亂肝虛則魂亡脾虛則意擾腎虛則精乏而鬼邪得以犯之矣其症面白帶青或如土色目睛上視口吐白沫手足拘攣身冷如冰有似乎驚風而實非驚風也

又有所謂客忤者非中惡之謂也乃偶見生人異物卒然驚駭啼哭不止心志恍惚聞響卽跳嘗欲躲避

者是也。如爲客所忤犯。故名客忤。非鬼之爲病也。又有所謂夜啼者。非客忤之謂。乃心經受熱也。其症至夜卽啼。百計安之而不能止。蓋心爲君火。主乎血。夜則血歸于肝。心虛火熾。故煩躁不寧。而多啼也。

藥例

中惡天吊。宜先安心神。使權歸君主。如茯神遠志菖蒲。燈心麥門冬之類。煎湯調下。辰砂末量兒大小用之。外用辟鬼之法。如蒼木檀香沉香射香安息香之類。近兒旁。週圍燒之。香烟如霧。則鬼不能容。待兒稍甦。以桃葉湯浴之。

客忤亦安心爲主。或爲生人所忤。卽當令此人見之。使兒習慣。如爲物所忤。若猫犬之類。亦令兒習見。自不驚駭。其所服之藥。亦如前茯神等劑可也。

夜啼繇于心虛有熱。宜用人參麥冬炒鹽之類。以補其虛。茯神遠志菖蒲之類。以安其神。石蓮黃連之類。以去其熱。燈艸木通薄荷之類。以清其氣。外用壓鬼之法。或以井中四旁艸。暗置兒蓆下。或寫父名倒貼床脚裡面。不令人知。或以桃木杖。擊兒四

旁如趕逐狀。念呪曰：天蒼蒼，地皇皇。小兒夜啼，疎客堂。多誦幾遍。內服藥而外施法，則啼自止矣。

傷風 傷寒

傷風之症：頭疼、身熱、鼻塞、氣粗、噴嚏、呵欠、呻吟不絕。見風便泊，洒淅微寒。與大人傷風無異。若挾食即吐，食挾痰即吐痰，作劑比大人所服藥宜減一半。不論痰與食有否，嘗須兼用之。蓋小兒易傷食而熱則生痰，故劑中宜畧帶用。但輕輕疎解，令微汗出，不宜過劑。過劑則真元亦傷，是伐無過之地也。

傷寒之症六經感受亦無異于大人，但大人元氣已削，天真不完。況有七情相感，又多挾內傷，故患真正傷寒最難調理。小兒則天真未鑿，七情又少，所感之症比大人差緩。但寒多熱少，外感必深，熱多寒少，內病必重。外感必遍身骨疼，內病必腹痛飽悶。治外之劑，嘗兼治內之藥，而汗下之法比大人宜從輕焉。

藥例

傷寒一二日間，頭頂痛、腰脊強、惡寒發熱、無汗者，乃太陽經症也。宜以羌活爲君，防風、紫蘇、甘草、生姜

葱白頭爲佐。若不汗。少加麻黃桂枝。

傷寒二三日間。目疼鼻乾。不得眠。發熱不惡寒。乾嘔。有汗者。乃陽明經症也。宜以白芷爲君。防風紫蘇。芍藥桂枝。生姜爲佐。

傷寒三四日間。胸脇痛。兩耳聾。往來寒熱者。乃少陽經症也。宜以柴胡爲君。黃芩半夏枳實。防風紫蘇。甘草。生姜。葱白爲佐。

傷寒四五日間。腹滿咽乾。身無大熱。自利不渴者。乃太陽經症也。宜以蒼朮爲君。乾姜甘草。葱白爲佐。

傷寒六七日間。煩悶舌卷。囊縮身不熱者。乃厥陰經症也。宜以桂枝爲君。附子青皮。甘草。生姜爲佐。

四時感冒傷寒。宜以九味羌活湯爲主治。代桂枝麻黃湯用。方見首卷傷寒門。

春傷于風。宜以川芎爲君。柴胡紫蘇羌活。防風甘草。葱姜爲佐。

夏傷于風。宜以羌活爲君。川芎紫蘇防風。甘草。葱姜爲佐。

秋傷于風。宜以柴胡爲君。川芎羌活防風。甘草。紫蘇。

半夏黃芩葱白生姜爲佐。

冬傷于風宜以桂枝爲君升麻葛根羌活防風甘草
紫蘇葱白生姜爲佐已上傷寒傷風二症若挾食
則兼消食挾痰則兼消痰俱禁用茯苓以其滲泄
能引邪入內也又有夾驚者當兼驚治。

咳嗽

小兒咳嗽風熱居多而寒者間或有之以其爲純陽
之體其氣嘗熱而不甚懼寒也凡肌肉肥白者易于
惹風色赤而結實者易于感熱惟虛弱瘦損面青不
實乃易感寒焉感風而嗽者必鼻塞氣粗之症惟口
中覺熱舌燥煩渴面赤頓嗽嗽而有濃痰者是也感
寒而嗽者洒淅惡寒哮喘不寧至冬月卽發者是也
凡此症與大人無甚異而所感畧有不同大人兼七
情所傷或任勞嗜酒而小兒無是是以不能無少異
耳藥劑以輕清爲佳而服藥亦不宜太驟逐匙進之
不盡劑。

藥例

風嗽以牛膽南星爲君半夏黃芩薄荷防風荆芥瓜

蔓艸桔梗爲佐。兼以蘇子橘紅以順氣。若壯熱無汗氣壅喘急。少加麻黃以解其表。蓋麻黃亦肺經發散之藥也。

熱嗽以貝母爲君。半夏瓜蒌天花粉黃芩山梔竹茹茯苓桔梗艸爲佐。兼以蘇子橘紅枳殼順氣。若有食加萊菔子。枳實黃連山查麥芽之類。

寒嗽以欬冬花爲君。麻黃杏仁半夏南星炙艸桔梗生姜橘紅爲佐。

或以薑吸散爲極細末。密九如肥皂核大。姜湯磨化徐徐服之。

諸嗽初起。宜瀉宜散。而桑皮杏仁可以兼用。久則宜補宜收。而麥冬五味可以量用。如喉痒加玄參。痰盛加姜汁竹瀝。頭眩加天麻。內熱加茯苓梔子。煩渴加天花粉葛粉。而桔梗乃本經之藥。尤不可缺。惟少用則不覺飽。多用則痰反不能降。以其承載諸藥爲舟楫之劑也。

瘧疾

小兒瘧疾不外乎風痰與食。無食不發。熱無風不作。

寒而痰。繇風食之所成也。外感乎風。則手太陰肺經先病。肺主皮毛。故風易入內。傷飲食。則足太陰脾經先病。脾受有形。故食多則傷脾也。肺氣不清。則生痰。脾土受傷。則褻痰。故痰者。風食之所成也。無痰不成瘧。故寒熱作焉。要而言之。風雖屬肺。食雖屬脾。而風食之所藏。又近于膽經。故作寒熱。蓋膽爲足之少陽。其位在半表半裏。是以寒熱往來也。大率寒多則爲風熱。多則爲食寒。熱相半。則風食俱多。治此病者。惟消食疎風化痰而已。然消食則兼疎風。疎風必兼消食。而消食疎風必兼化痰。蓋三者不全。則不能成瘧。故宜兼治。但量其所屬。而輕重之可也。

藥例

風瘧寒多熱少。以防風爲君。川芎紫蘇升麻柴胡甘草爲佐。加檳榔艸菓以消食。半夏黃芩陳皮生姜以化痰。

食瘧熱多寒少。以艸菓爲君。檳榔枳實陳皮山查麥芽柴胡甘草爲佐。加半夏生姜以化痰。防風紫蘇川芎以疎風。

痰瘡寒熱交作嘔吐痰涎以半夏爲君貝母瓜蒌生
姜甘草枳殼橘紅柴胡黃芩爲佐加檳榔艸菓以
消食紫蘇防風以疎風

久瘡不愈以酒炙鱉甲爲末每服一錢一日三服姜
湯調下

或用嘗山一兩剉碎以好酒浸一宿瓦器內煮乾
爲末每服二錢水一盞煎半盞去渣停冷五更初
服之不吐不瀉大效

或用知母貝母嘗山檳榔等分水酒各半盞煎至
半盞去渣綿覆露一宿五更面東服之卽效但不
可令婦人見

痢疾

醫家以瀉爲在脾痢爲在腎故先瀉後痢者則曰脾
傳腎爲賊邪其病難愈先痢後瀉者則曰腎傳脾爲
微邪其病易愈此前人之說也以愚論之瀉爲在脾
不假言矣而謂痢在腎不能無議焉瀉固多繇于飲
食而痢獨非飲食所傷乎飲食停積因濕熱而化遂
爲稠濁膠固于腸胃之中欲下不下是以有裏急後

重之。苦明脾經病矣。而顧以痢屬于腎者。何以謂歟。吾未聞飲食之入。不繇于脾。而反繇于腎也。夫既謂之腎病矣。然治痢之藥。悉皆蒼朮。厚朴。黃連。木香。白朮。陳皮之類。並未有用杜仲。黃柏。牛膝。地黃。補腎等藥。治腎家之疾。而乃用脾家之劑。必其非腎病故也。要知先痢後瀉。而後易愈者。以積滯已盡。而脾尚虛也。豈腎傳脾之謂耶。先瀉後痢之難愈者。以脾土已壞。而積滯方壅也。豈脾傳腎之謂耶。腎能藏精。不能藏飲食。若以痢屬于腎。則飲食皆藏于腎矣。豈理也哉。大約治痢之法。與大人無異。但下痢純血者。在大人則爲難治。在小兒則爲食積。而無所妨。若治小兒之痢。又宜多以消積爲主耳。其詳具見于大人痢疾門。故此不復贅。

藥例

凡初痢腹痛。後重。宜先以消積等藥治之。問其所傷者何物。若穀食。則麥芽。神麴爲君。肉食。則山楂。蓬朮爲君。麤食。則萊菔子爲君。冷食。則艸菓爲君。宿食。則黃連。枳實爲君。而又用蒼朮以燥其濕。厚朴

以寬其腸。木香、檳榔以調其氣。當歸以養其血。木通、茯苓以分利小水。則利自通快。若不通快，少加大黃以利之。初痢無止法，切不可用粟殼。雖烏梅亦未可使用。初痢無補法，切不可用人參。雖白朮亦未可使用。若見其去後多次，欲升提其氣，而升麻立見危殆。戒之。戒之。

痢疾半月後始可用白朮。一月後始可用烏梅。若有腹痛，亦未可用也。痢久而虛，乃可用人參。而佐之以陳皮。如胃寒，則肉豆蔻、肉桂之類亦可少用。蓋痢本濕熱，若遷延日久，入于秋冬之交，則變爲寒痢，故可用溫藥也。


瘡痢兼作，莫重之病。若以風食治，則得之矣。宜防風、羌活、紫蘇以解其表。柴胡、芍藥以定其寒熱。黃連以瀉其火。檳榔、枳實、麥芽、神麴以消其積。而蒼朮一味尤不可不多用。以其氣雄，能治內外之邪也。瘡痢傳染者，卽名疫痢。禁用補劑。若下人參，其死可待。

久痢不止，去後無度，非補不可。必以人參、白朮爲主。

茯苓肉苳蔻訶子烏梅蓮肉大棗煨姜之類。爲佐補中帶收乃妙。若餘血未盡宜加當歸芍藥側柏葉地榆之類。補中帶止。庶乎不寬不驟。得調理之宜。而蒼朮厚朴檳榔黃連等劑。又不可用矣。雖木香一味。本爲治痢之良藥。但行氣太甚。久痢用之。反助下行之勢。又豈可以葷用哉。

吐瀉

兒吐瀉交作。人皆以爲脾胃受寒。不能容飲食。故上則爲吐。下則爲瀉。此據其病形而言耳。而不知脾胃受寒者。止于腹中。悞悞作痛。或微瀉。或吐痰涎而已。其勢殊無可畏。至若大吐大瀉。一時發越。津液頓下。面目乍瘦。豈受寒之爲病哉。必是平素先傷飲食。鬱蒸作熱。蓄之既久。將發未發。一感外之風熱。勢不可遏。故攻擊臟腑。一齊而至。遂令小兒困憊。當此之時。若以爲吐瀉空虛。卽投補劑。及溫熱之藥。立至危殆。慎之慎之。如有瀉而無吐。或有吐而無瀉者。乃有寒熱之分。吐酸臭而苦者。熱也。清淡則非熱矣。瀉臭穢而不可近者。熱也。清順則非熱矣。治者當自審之。



藥例

小兒吐瀉交作其氣潰亂一時未能清理只宜益元散。泡湯冷定時時進之。自能分調其氣待勢稍緩然後進以他藥。先止其吐後治其瀉。止吐以順氣爲主。如藿香陳皮砂仁蘇子黃連生姜茯苓之類。治瀉以養脾爲主。如白朮大棗茯苓神麴陳皮半夏炙甘草之類。若邪氣已盡能畧進飲食而脾胃虛怯氣短不能呼吸須用人參倍加白朮而又佐以陳皮可也。

吐酸苦者宜從熱治以姜汁炒黃連爲君半夏藿香茯苓砂仁蘇子之類爲佐。

吐清痰者宜從寒治以生姜爲君白豆蔻茯苓蘇子藿香半夏之類爲佐。

瀉臭穢者宜從熱治以黃連爲君神麴麥芽陳皮白朮茯苓芍藥滑石生甘草之類爲佐。

瀉清薄者宜從寒治以肉豆蔻爲君白朮蒼朮厚朴茯苓肉桂炙甘草大棗生姜之類爲佐。

吐瀉交作手足轉筋乃肝勝脾也爲霍亂之極候宜

以木瓜爲君。青皮黃連扁荳芍藥之類爲佐。以制肝而養筋。又用大劑藿香以正其氣。砂仁木香以調其氣。茯苓蘇子以順其氣。而手與足亦須浸于冷水中。則其筋自然調暢矣。


吐瀉之後。口乾舌燥。引飲不休。小便短少者。津液亡也。宜用人參生脉散。加烏梅酒炒黃柏。知母生其艸之類。

吐瀉之後。脾虛欲發。慢驚者。必手足微搐。急以人參白朮水煎。加姜汁竹瀝。調下硃砂礞石膽星。半夏等末。亦可以彌患于未然。若已發。慢驚則不收矣。

驚風

夫風者一也。在大人則爲中風。在小兒則爲驚風。大人無驚。故止名之曰中。小兒易恐且易惹風。故以驚名。而兼乎中也。驚之有慢有急。猶風之中腑中臟。急驚與中腑同。謂之陽症。而症俱在表。慢驚與中臟同。謂之陰症。而症俱在裏。醫者能辨其陰陽表裏而治之。斯可以無悞矣。蓋急驚之症。其身嘗熱。其眼常開。手足跳躍。頭項強直。痰涎壅盛。啼叫哭泣。煩燥不寧。

者是也。慢驚之症，身嘗不熱，眼嘗半開，手足微掣，精神倦怠，形體若呆，大便或洩者是也。又有慢脾風者，手足不動，遍身皆冷，兩眼嘗合，不能啼哭，症而至此，無復加矣。慢驚甚于急驚，而脾驚甚于慢驚，病根固有淺深，而亦可以施治于萬一之中。若因急驚而變慢驚，或因吐瀉而生慢驚，則難治矣。因慢驚而成慢脾，或因吐瀉而成慢脾，則不治矣。大抵驚属于心，風属于肝，心火動故振跳而不可遏，肝風發故搐搦而不自持。二經相助，其勢必盛，心有餘故火熾而風益猛，是風從火出也。肝有餘則風狂而火益狂，是火從風熾也。風火齊發，故病可畏。此特以急驚言之耳。而慢驚慢脾，又兼脾虛與寒勢，若稍緩而反深焉。然以其病之可生死者，而細分之，則各有所属，非謂止于心、肝二經而不入于他經也。是故不時吊眼者，驚入于肝；夢中咬牙者，驚入于腎；夜啼至曉者，驚入于小腸；喉中如鋸者，驚入于大腸；而青下白者，驚入于膽；氣喘喫水者，驚入于脾；不時乾嘔者，驚入于胃；夢中驚哭者，患在三焦。此皆可生之症也。至若爪黑者，爲



肝絕瀉黑血者爲心絕。目多盜汗者爲衛絕。忽作噦聲者爲肺絕。咬人者爲骨絕。眼半開半合者爲腎絕。口鼻乾黑者爲脾絕。驚風有此其又可生耶。

藥例

急驚屬陽屬熱。其症在表。法宜涼瀉。以茯神爲君。麥冬、菖蒲、遠志、燈心之類爲佐。以安心神。青皮、芍藥、黃連之類以瀉肝氣。羌活、柴胡、薄荷、防風、荆芥之類以疎其風。半夏、膽星、姜汁、竹瀝以治其痰。此治急驚煎劑之大畧也。

慢驚屬陰屬寒。其症在裏。法宜溫補。其安心神。抑氣疎風化痰之藥皆與急驚同。但加川烏、木香以溫其裏。更加人參、白朮以補其虛。此治慢驚煎劑之大畧也。

慢脾屬大虛大寒。法宜溫熱大補。以附子爲君。川烏、乾姜、炙甘草之類爲佐。以溫其裏。人參、白朮以補其虛。姜製半夏、姜製南星以治其痰。而安心神。抑肝疎風之劑且勿用。此治慢脾之大畧也。

急驚慢驚慢脾非金石之藥不能速效。今有一方統

治三症用硝煨礞石一兩。醋淬。蛇含石半兩。硃砂半兩。全蝎半兩。姜製半夏一兩。牛膽南星一兩。茯神一兩。猪心血晒乾半兩。射香三錢。金箔一百片。銀箔三百片。各爲末。又共研極細。以姜鷲牙皂。蘇麥冬各等分。水煎成膏。拌前藥爲丸。如櫻桃大。量兒大小加減。急驚爲熱。以黃連薄荷生甘草煎湯。加姜汁竹瀝磨服。慢驚爲寒。以熟附子炙甘草煎湯。加姜汁竹瀝磨服。每以一九二九爲止。凡小兒一二三歲爲驚風。十歲以上爲顛。十歲以下爲癇。不論大小。凡角弓反張。不能言語者。爲瘈瘲。宜以此治之。修合忌雞犬婦人。及有喪服之人。藥收貯瓷器中。以蠟塞其口。勿令出氣。用時隨症湯治之。此統治驚症之仙藥也。

痺症


小兒痺症。大抵多是過食甘甜膠膩之物。停積于脾。不能消化。久則變而爲痺。痺者。甘也。脾喜甘。而凡味之甘者。皆属于脾。從病從甘。故曰痺。其症身體嘗熱。形容黃瘦。肚腹膨脹。小便如泔。毛髮黃纖。臉多白印。

惡心欲吐飲食不爲肌膚凡頭面頸上多生痒瘡而
痺之大槩有如此者皆脾之症也脾先受病傳于他
臟故又有五痺之名焉在心則爲驚痺在肝則爲風
痺在脾則爲癢痺在肺則爲氣痺在腎則爲急痺五
痺分受五臟而其爲病亦未盡同悉而言之則渾身
壯熱四肢無力面黃臉赤怕寒愛暖口鼻乾燥者因
驚蹶而成所謂驚痺是也搖頭揉鼻白膜縵眼揩磨
多淚面有黑色渾身瘡癬毛焦髮豎者因感風而成
所謂風痺是也食物難消愛吃泥土腹大有筋頭髮
稀疎喘急呵欠無歡欲啼痢多酸臭者因傷食而成
所謂瀉痺是也多啼嗽逆鼻頸生瘡昏昏愛睡體瘦
腸滑四肢軟弱面色帶白瀉膿吐血者因傷氣而成
所謂氣痺是也瀉痢兼作吐逆脫肛身體壯熱手足
偏冷飲食不進者病勢已急所謂急痺是也五痺之
症惟急痺爲難療以其腎氣不足土來尅水故也要
而言之總起于脾脾上一虛則不能生五臟之氣故
其傳變至于如此大法惟健脾消積殺蟲而已

藥例

小兒十歲已上。痺勞壯熱。形體羸瘦者。宜服雞肉煎。
丸。宣黃連二兩。銀柴胡一兩。蕪荑半兩。去皮。川鶴
虱半兩。秦芫一兩。知母一兩。紫苓一兩。使君子肉
一兩。共爲末。以黃雌雞一隻。重斤許者。專以大麻
子飼之。五六日後。去毛令淨。于尾下開一孔。取出
肚腸。洗淨拭乾。入前藥末于內。以線縫之。用小
葱圍裹。而上亦以黑荳蓋之。亦厚三寸。自日出
蒸至晚後溫冷。取雞出去腹中藥。及筋骨頭翅。
淨肉研和得所。如乾入酒少許爲丸。如大麻子大。
每服十九。十五歲者二十九。以意加減。空心或臨
臥用麥冬湯送下。若小兒痺癆骨蒸。年十五歲以
上用酒送下。忌食猪肉。

小兒五痺。不長肌肉。不思飲食。日漸黃瘦者。並宜服
蘆薈丸。用蘆薈一錢。蕪荑一錢。去皮。青黛一錢。檳
榔一錢。蟬殼二十個。宣黃連一錢。胡黃連半兩。射
香少許。獺猪膽一個。共爲末。以猪膽汁爲丸。如大
麻子大。每服五。六。七。九。十歲。二。三。九。並用米飲



湯送下。

小兒黃瘦。腹大口臭。好食泥土。飲食不爲肌膚。腹中
嘗痛者。宜服肥兒丸。胡黃連。神麴。麥芽。各一兩。使
君子木香。各四錢。檳榔三個。蘆薈七錢。肉豆蔻半
兩。共爲末。黃米糊丸。如黍米大。姜湯送下。每服三
丸。量兒大小。加減用之。

小兒五疳。入痢。面黃肌瘦。頭髮作縷。好食泥土。不思
飲食者。並宜服保童丸。大蝦蟆一個。燒存性。皂角
一匙。去皮。核。麴。存性。蛤粉二錢。水飛。射香一錢。另
研。共爲末。黃米糊爲丸。如麻子大。每服三十九丸。
飲湯送下。

統治小兒疳症。取大蝦蟆。不拘幾個。放深缸內。取糞
坑中蛆蟲。淘淨。倒在其內。任其自食。停五六日。待其
瀉出宿糞。每一個。將砂仁半兩。擦入其腹中。以線
縫其口。倒掛陰乾。炙脆爲末。每末二兩。使君子肉
一兩。白朮一兩。陳皮。山查。麥芽。枳實。黃連。萊菔子。
各半兩。神麴。作糊爲丸。如黍米大。白滾湯下一錢。
或五六分量。兒大小加減。此統治諸疳之仙藥也。

痘疹

小兒未生之前。積受胎中穢濁之毒。足十月而始生。五臟六腑。受毒已久。一時不能發洩。雖瘡癤疥癰之類。未必非胎中所受。然亦毒之在皮膚間耳。而臟腑積蘊。全然未動。必待天行時氣。運于下土。侵入人身。觸發其根。而後向之所受于十月中者。一齊而起。一兒出痘。羣兒隨之。不論富貴貧賤。咸受一場之苦。改形易貌。輕重不齊。自幼至長。必生一次。故名之曰百歲。蓋其未出之先。或時發驚悸者。心之症也。呵欠頻聞者。肝之症也。面燥腮赤。咳嗽噴嚏者。肺之症也。乍涼乍熱。手足稍冷。而多睡者。脾之症也。惟腎在臟腑之下。不受穢濁。獨無其症。若未發而先腰痛者。必其腎氣不足。亦爲毒所干。俗謂之折腰痘。痘雖未出。而可卜其不治矣。故當天時行出痘之際。須要愛惜保護。必倍于平時。而後可。雖有可怒。不可驚嚇。雖有可撻。不可趕擊。雖有可責。不可罵詈。雖有暴熱。不可解脫。雖有甘肥。不可多喂。蓋驚嚇則兒必震懼而傷其心。趕擊則兒必傾跌而傷其腎。罵詈則兒必忿悶。

而傷其肝。解脫則兒必感邪而傷其肺。多喂則兒必作瀉而傷其脾。五臟受傷。血氣已亂。而偶值出痘。必有變異。此非爲父母者。有以致之耶。然五者之中。惟傷脾傷腎尤爲利害。傷脾則瀉不止。痘必內縮。傷腎則血已凝。痘必變黑。內縮者。或可急補而克發之。變黑者。必不能返之。而使紅活也。故苟能調護。則重者庶可以變輕。不善養者。則輕者或反至于變重。甚哉保嬰之道。不可不知也。且以痘疹之朝數言之。二日

三日之間。始見微。微纔出。如粟米大。或黍米大。或藁

子成簇。壯熱通手者。其出必繁。斯爲下矣。四日五日之間。大小不一。根窠紅潤。纍纍堅實者。上也。若頂陷灰白。及軟不堅者。其勢必危。斯爲下矣。六日七日之間。顆顆肥健。淡紅光澤者。上也。若氣促口渴。腹脹不寬者。其毒必太盛。斯爲下矣。八日九日之間。充足肥滿。色如蒼蠟者。上也。若寒戰悶亂。煩渴咬齒者。其毒必內攻。斯爲下矣。十日十一日之間。當靨而不靨者。內氣必虛也。十二日十三日之間。瘡痂漸落。而瘢尤

黯或凹或凸者。氣血未勻也。醫者視其朝數之。或近或遠。毒氣之或淺或深。正氣之或虧或足。身體之或熱或寒。病勢之或輕或重。當隨其症而加減之。不可執一定之方。而治多變之疾也。大抵痘未出。喜微熱。而微汗。痘既出。喜熱漸退。而汗止。身熱太甚。宜利小便。不可妄用發表之劑。一發表。則元氣易散。必成斑爛。洩瀉未止。急補脾胃。不可妄投收澀之劑。一收澀。則毒不出。必發腹脹。自始至終。皆宜以解毒爲主。而兼之以活血理氣。終無誤病之失。凡看痘疹。先看小兒之大小壯怯。或嬰孩一二三歲間。而形體瘦弱者。

出痘雖稀。必須謹慎。縱毒氣淺薄。而元氣猶未足。使或卒患洩瀉。亦令危殆。若十歲前後。形體長大。出痘雖多。苟無他症。亦無所妨。以其元氣將實。足以勝之故也。設有痢疾。下血。驚風。傷寒等候。則不論痘之未出已出。兒之或大或小。總歸于不治而已。不治之痘。人皆以歸腎變黑者當之。故凡有黑色者。莫不指之曰腎經痘也。而不知痘疹之中。惟黑者最難識。若初出時。隱隱有黑點。自三四朝至六七朝。其黑色如故。

醫金
不見紅色。但如玄珠。而亦有光采者。名曰黑痘。不拘男女。如有此痘。必主非嘗之貴。與歸腎變黑者。不可同日而語也。蓋歸腎變黑者。初出非不紅。至後反黑。陷。醫者又當識之。

藥例

痘疹將出。未出之際。身體壯熱無汗。乃腠理密也。法宜疎解。以升麻葛根起劑。佐以紫蘇柴胡防風之類。以疎其表。連喬白芷天花粉甘艸之類。以解其毒。當歸川芎紅花。以活其血。陳皮枳殼烏藥。以調其氣。木通以行十二經絡。此用藥于未出之時。則然也。

痘疹初出一朝。至四朝。若有微汗。卽去升麻葛根。紫蘇柴胡防風解表之劑。若無汗。仍用紫蘇柴胡。帶疎表宜。以白朮起劑。佐以白芷連喬天花粉甘艸。當歸川芎紅花陳皮枳殼烏藥。以解其毒。活其血。勻其氣而已矣。此用藥于既出之後。則然也。痘疹五朝至九朝。不用解毒之劑。宜以黃芪起劑。佐以白朮人參。以補其裡。不用當歸。但用川芎。以行

血中之氣少。加木香以助之。仍用白芷連喬天花粉。其艸以解其毒。若身熱未解。宜以茯苓木通清利小便。若或覺飽。仍用陳皮些少。以制人參。枳殼些少。以制黃芪。此用藥于發漿之際。則然也。

痘疹九朝至十三朝。瘡已回盡。宜用八物湯起劑。加天花粉連喬木通之類。若有餘熱。少加芍藥黃芩。此用藥于已回之後。則然也。

已上皆太平痘疹。故用此藥。

痘疹黑陷倒靨。乃必死之症也。而亦不可坐視。宜用無價散。以人貓猪犬四者之糞。先曬乾。至臘月辰日。燒灰研細。用熟蜜作餅子。白滾湯磨服。一歲一字。二歲一錢。三歲二錢。以意加減。即時變為紅活。無不神效。

或用人牙燒灰。入射香少許。共研極細。蜜作餅子。以溫酒調下。二三服。

或用小豬尾尖血三四點。研入冰片少許。新水調下。

或用鐵腳威靈仙一錢。炒為末。冰片一分。溫水調。

服取下瘡癰爲效。

痘疹出不快以蟬殼洗去土晒乾爲末每服一錢溫酒調下。若不善酒以白滾湯送下。

痘疹漿不足以人參黃芪各二錢炙甘草白朮各一錢大棗五枚肉桂五錢用大米泔二盞煎至半盞溫服若回不快卽于此方中去桂甘草加五味五分煎服。

痘疹入眼用白蒺藜炒炙甘草羌活防風等分爲末每服二錢熱水調下。

或用黑狗耳刺血滴入眼內其瘡自散。

痘疹眼內有雲翳用輕粉黃丹等分以竹筒吹入耳內左眼有翳吹右耳右眼有翳吹左耳內翳卽退。或用瓜蒂根半錢蛇退蟬退各二錢半爲細末用羊肝一兩薄切數片將藥末一錢揀勻用紙包線繫之于淘米水內懸煮令熟去紙臨用湯下日進二服。

痘疹不治有十

當靨不靨或熱不熱悶亂不寧臥則哽氣寒戰憂齒

大便泄瀉。詰語不止者。一不治也。瘡正出而嘔吐。
瀉痢不止者。二不治也。大便下血。乳食不化。而脾
虛者。三不治也。瀉血而瘡爛無膿者。四不治也。
大小便閉。目閉聲啞。瘡如灰色。無漿者。五不治也。
面黑或臭。有黑氣者。六不治也。口燥渴。小便澀泄。
瀉不食者。七不治也。面目閉暗。濛昧無覓者。八不
治也。頭面至胸。盡抓破碎。下半身雖好。或身熱引
飲不止。足冷至膝者。九不治也。不光澤。不起發根。
窠不紅。腹脹氣促者。十不治也。

痘疹忌觸臭氣者十四

腋下狐臭氣。一也。溝渠濁惡氣。二也。房中淫液
氣。三也。婦人經血氣。四也。諸般血腥氣。五也。
酒醉葷腥氣。六也。硫黃毒藥氣。七也。射香臊穢
氣。八也。疫汗蒸濕氣。九也。煨燒頭髮灰氣。十也。
魚骨諸臭氣。十一也。葱蒜韭薤氣。十二也。烹
煎油膩氣。十三也。坑廁尿糞氣。十四也。

凡此臭氣。有犯之者。立見變異。慎之。慎之。出痘之
家。必須多用胡荽搗汁。和酒各處噴之。門戶牆壁。

帷帳床榻皆令噴過甚能辟臭氣此第一件事也

