

前 言

民間流傳的驗方、秘方、單方，都是我國歷代人民與疾病作鬥爭所積累起來的寶貴經驗，也是祖國醫學珍貴遺產之一。為發展人民保健事業計，將這些驗方、秘方、單方及時搜集，並整理出版，實屬當前一項迫切的任務。

我區各級衛生部門，在黨的領導下，廣泛地發掘祖國醫學遺產，於一九五八年曾廣泛開展獻方獻寶運動。在運動中，各地中草醫和群眾，紛紛獻出各類驗方、秘方、單方。這些驗方，有的是獻方人祖傳的，有的是獻方人用於臨床有效的。區衛生廳指示我所將這些驗方整理付印，以資推廣。

一九五九年春，我所即進行此項工作，共選出驗方五一二條，分門別類編成“廣西中醫驗方選集”第一輯。由於本集篇幅有限，所有驗方未能盡列，待續輯時，再選編入冊。在這次整理過程中，所選各方都經多次審查，且大部分經去函向有關病者或有關單位了解，或派員訪問，經證明事實相符，方選入集中。

此集內容分為時疫、內科、婦科、兒科、外科、五官科等六門，共九十七類。其中除中醫驗方外，還有部分民族醫及民間常用之草藥驗方。為讀者對藥物便於研究計，每味草藥于編者按中均注明其別名、科屬、學名等。在每方后均附有臨床治驗實例，供讀者參考。

我所整編此集時，承蒙桂林、梧州、玉林各專區、南寧市、自治區中醫院，自治區中醫專科學校等派員協助串編，使此集能如期脫稿付梓，在此謹致謝意。

此書編串倉促，錯漏之處，在所難免，希讀者提出寶貴意見，以便改正。

廣西僑族自治區中醫藥研究所

一九五九年七月

凡 例

一、此集編輯标准，是以一九五八年十二月十三日广西僮族自治区卫生厅厅长黄征同志在广西僮族自治区第一届卫生行政会议上的报告精神，以易得、簡便、便宜、效确为标准。

二、此集編輯目的，在于及时整理祖国医学遗产，以資推广。选材方面，完全根据現有材料，故所选各类药方，多寡不一。

三、此集編輯材料，是根据一九五八年广西全区广大群众的献方材料选編的。并以經過了解，或試驗有效的民間习用驗方为主。这些献方材料，絕大部分是先經各县将群众的献方材料，选集成册，报送区卫生厅，区卫生厅轉送我所，囑我所再从各县送报的材料中，作重点选輯，編成此集。

四、此集出版，为慎重計，曾聘請区内經驗丰富之名老中医参加审查，再三校对，才交区人民出版社出版。

五、集中病例，除經有关各县审查外，大部分經我所函向有关病者或有关单位了解，或者派員直接訪問，經証明所述与事实相符，方选入集中。

六、就适应病症來說，所选各方，是有一定疗效作用的。但非“用之必灵”的仙方妙药，因此，在临床时仅可作为研究和参考之用。讀者选用时，不能脫离中医“辨証論治”的原则，应經医师审查指导然后用之方妥。

七、方中分量，除儿科門外，一般均以成人量为原則。若給小儿服用时，应酌減分量。

八、方中計量单位，在称药方面，有以錢、两为单位者，有以克为单位者；在煎药加水方面，有以碗为单位者，有以毫升为单位者。因各方来源不同，故計量单位各異，姑从所习，故并存之。讀者参考时，应以医师所用之計量单位为准。

時疫門

目 录

时 疫 門 (57方)

时行感冒类 (11方)	(1)
痢 疾 类 (20方)	(7)
疰 疾 类 (16方)	(15)
疳 腮 类 (6方)	(23)
湿 温 类 (1方)	(26)
瘟 病 类 (1方)	(27)
霍 乱 类 (2方)	(28)

內 科 門 (184方)

肺 癆 类 (10方)	(31)
咳 喘 类 (13方)	(38)
吐 血 类 (5方)	(44)
肺 痛 类 (1方)	(46)
失 音 类 (1方)	(47)
黄 疸 类 (7方)	(47)
肿 胀 类 (21方)	(50)
风 湿 类 (18方)	(61)
拘 攣 类 (1方)	(70)
鹤 膝 风 类 (4方)	(71)
腰 痛 类 (1方)	(73)
癰 瘤 类 (12方)	(74)
失 眠 类 (1方)	(80)

虛脫類(1方)	(81)
頭痛眩暈類(6方)	(81)
中風中痰類(2方)	(84)
口眼喎斜類(2方)	(85)
呃逆類(1方)	(86)
脇痛類(2方)	(86)
翻胃類(1方)	(87)
嘔吐類(3方)	(88)
吐瀉類(8方)	(89)
胃腸痛類(19方)	(94)
痞塊類(1方)	(103)
腸痛類(8方)	(104)
淋病類(18方)	(107)
遺精類(2方)	(115)
疝病類(7方)	(116)
陽痿類(1方)	(119)
大便疝血類(2方)	(120)
脫肛類(3方)	(121)
瘡病類(2方)	(122)

婦科門(47方)

調經類(9方)	(125)
胎前類(12方)	(129)
產後類(4方)	(134)
崩帶類(12方)	(135)
陰挺類(7方)	(141)
癰瘰類(1方)	(145)
陰痒類(2方)	(146)

儿 科 門 (61方)

麻 疹 类(8方)	(149)
驚 風 类(6方)	(153)
喉 症 类(4方)	(155)
小儿溫病类(2方)	(157)
小儿黃疸类(2方)	(158)
小儿麻痺类(3方)	(159)
驚 風 类(1方)	(161)
驚 風 类(6方)	(161)
咳 嗽 类(5方)	(165)
乳 疳 类(1方)	(167)
腹 瀉 类(1方)	(167)
口 腔 病 类(9方)	(168)
腹 痛 类(1方)	(172)
疳 積 类(7方)	(173)
盜 汗 类(1方)	(177)
軟 骨 病 类(1方)	(177)
天 泡 疮 类(2方)	(178)
生 殖 器 肿 类(1方)	(179)

外 科 門 (130方)

花柳病类(3方)	(181)
破 伤 风 类(3方)	(184)
跌打损伤类(2方)	(185)
疔 毒 类(2方)	(187)
癰 疽 类(1方)	(189)
血 类(2方)	(189)
木刺入肉类(2方)	(191)

火 毒 类(1方)	(191)
續筋接骨类(15方)	(192)
湯火伤类(10方)	(204)
皮肤湿毒类(6方)	(210)
皮 癬 类(8方)	(213)
风 疹 类(3方)	(217)
油 蠟 类(1方)	(218)
疮 瘍 类(10方)	(219)
疔 毒 类(8方)	(224)
骨 疽 类(3方)	(227)
乳 痛 类(9方)	(230)
无名肿毒类(1方)	(234)
瘰 癧 类(5方)	(234)
痔 疮 类(7方)	(237)
潰 瘍 类(2方)	(240)
石 硝 类(3方)	(242)
骨 哽 类(1方)	(243)
蛇咬伤类(11方)	(244)
狂犬咬伤类(6方)	(253)
鼠咬伤类(1方)	(256)
解 毒 类(4方)	(257)

五官科門 (33方)

眼 病 类(14方)	(260)
耳 病 类(3方)	(263)
鼻 病 类(2方)	(270)
口腔病类(6方)	(270)
咽喉病类(8方)	(273)

时行感冒类

治时行瘟疫（流行性感冒）方

一 方

主治：恶寒发热，头痛，咳嗽。

处方：南蛇苗三兩 两背針二兩 雄黄八錢

用法：上三味共研細末。日服二次，每服一錢五分，开水送下。

附註：此方并能治疟疾。

功效：清热，解毒，止咳，除瘴。

疗效：此方曾治疗百余人，均获效。李媽山，女，45岁。1958年恶寒发热，抽搐。用此方一服好轉，三服痊愈。

来源：田东县 林文坚

编者按：南蛇苗又名南蛇勒、南蛇引、石蓮蕨苗（桂南名）。为苏木科植物。学名：Caesalpinia minax Hance。

两背針又名两面針、入地金牛、出山虎（桂南名）、十八鑽（桂林名）。为芸香科植物。学名：Zanthoxylum nitidum(Lam.) D C.

二 方

主治：一般感冒发热，头痛。

处方：两背針根 土常山根 苦羊藤根 草鞋根 馬鞭草根 青蒿各等量

用法：晒干共为細末。每日服一、二次，每次服三錢，溫开水送服。

疗 效：此方曾治疗千余人，均痊愈。

来 源：百色县卫生科 林熙春

编者按：苦羊藤又名古羊藤、毛秀才（南宁名）。为蘿藦科植物。

学名：Streptocaulon griffithii Hk. f.

青蒿为菊科植物。学名：Artemisia annua L.

草鞋根为菊科植物。学名：Elephantopus scaber L.

三 方

主 治：一般感冒，恶寒，发热，头痛，咳嗽。

处 方：石蓮子一斤

用 法：石蓮子去壳，炒黄研末，瓶貯密封备用。成人每次服五至八分，日服三次，开水或姜湯送服。小儿酌減。

功 用：疏风，清热，止咳。

疗 效：此方曾治疗恶寒、发热、头痛、咳嗽、吃吐等病例一百三十四人，服此方后，第二天已愈者九十五人，減輕者三十七人，只二人未有显著疗效。

来 源：田东县和平公社医院

编者按：石蓮子科属学名見上一方编者按南蛇苗条（第1頁）。

四 方

主 治：微寒高热，头痛，身骨痛，咳嗽，或咽紅目赤，或渴或不渴。

处 方：山芝麻一两 青蒿二錢

用 法：以水二碗煎至一碗，作一或二次服。小儿酌減。如病症严重，可加古羊藤根一两，黄皮叶七錢；若作預防剂用，药量減半。服药日期三至五天。

疗 效：此方先后曾治疗一千余人，均服药二至三天痊愈。

来源：田阳县防疫站

编者按：山芝麻为梧桐科植物。学名：Helicteres angustifolia Linn.

五 方

主治：微寒，发热，头痛，身骨痛，咳嗽，或咽红目赤。

处方：杷叶紫苏饮：杷叶一两 黄皮叶七钱 假紫苏三钱 葱头三钱 生姜三钱

用法：将水一斤煮沸先下杷叶、黄皮叶，煎三十分鐘，去渣；再加入假紫苏，煎十分鐘，去渣；最后加入葱头和生姜，煎五分鐘即成。上药为一天剂量，作一或二次内服。小儿酌减。一般服一至三天痊愈。如作预防，用量减半，连服三至五天。

疗效：此方曾治疗五百多人，均四、五天痊愈。也可作预防服用。兹举两典型病例于下：（一）黄海仙，女，38岁，住那坡镇新民街24号。头一天得病，恶寒，发高热，头剧痛，骨节疼痛，干咳鼻衄。不能食，卧床不能起。脉浮数，咽红眼赤，舌苔黄。第三天服此方一剂。翌日，头痛解，寒热退，衄止，骨痛大减，但仍有些咳，再服此方一剂，得病后第五天痊愈，已能出勤劳动。（二）梁玉生，女，28岁，住那坡镇新兴街23号。头一天恶寒，发热，头痛，骨痛，咳嗽，口渴，腹痛便秘，舌苔黄浊，扁桃腺肿大，眼结合膜充血，第二天服此方一剂，隔天头痛骨痛止，寒热退，但仍咳嗽，腹痛，照服原方，服药后三天痊愈。

来源：田阳县人民医院 卢毓瑞

六 方

主 治：恶寒或微恶寒发热，头痛，身痛，鼻塞或流清涕，咳嗽，或气喘。

处 方：葛根六錢 銀花五錢 連翹四錢 桔梗四錢 杏仁四錢
甘菊四錢 桑叶五錢 薄荷二錢 甘草一錢五分

用 法：以清水二碗半，煎減半。分二次服，隔四小时服一次。

附 註：高热神昏譫語的加石膏一两五錢，紫雪丹五分。呕吐的加竹茹三錢，藿香一錢五分，牛只壳二錢，川朴三錢。泄瀉的加川連二錢，黃芩三錢，只壳二錢，川朴三錢。

功 用：解表，清热，止咳。

疗 效：此方治疗流感效果极佳，曾治千余病例，服药后，一、两天痊愈的达百分之九十。

来 源：南宁市民生联合診所 曹思秋

七 方

主 治：恶寒，发热，头痛，身痛，流清涕，或咳嗽气喘。

处 方：人头蕨（即貫众）一两 薄荷^{三錢}_{后下}

用 法：以水二碗，煎至一碗，入薄荷再煎数沸取出，分二次服，每隔四小时服一次。

功 用：疏风、清热。

疗 效：此方来自民間，曾治疗三千余人，輕者一、二天，重者三、四天痊愈。

来 源：岑溪县糯垌太阳公社 李棣华

八 方

主 治：发热恶寒，头刺痛，噴嚏，咳嗽，喉干口渴，面赤眼紅，

全身倦怠，腰痛及关节痛，重者呕吐，鼻衄，譫語。

处 方：羊牯木根<sup>半斤
生的</sup>

用 法：把羊牯木根洗净切碎，煲水代茶飲。小儿服用，药量酌減。如用于預防，在流行季节，每周飲用一天。用于治疗，連服两天，即痊愈。

疗 效：此方系猷方者家传治痧气热病秘方。曾治愈多人。如袁××家有一小儿患流感，全家七人服后，病者痊愈，余六人均未被传染。

禁 忌：服药期間忌飲酒及进食煎炒食物。

来 源：柳州市卫生防疫站 黃冠豪

九 方

主 治：高热头痛，周身痠痛，昏譫，二便不通，舌尖紅。脉洪虛，躁急模糊，輕按多，重按少。

处 方：肥烏梅^{五枚} 白糖^{二兩}

用 法：以水一碗，煎湯，二次分服。

疗 效：此方在容县人民医院治愈留医病人二例。容县卫协主任陈旭銓用此方治愈十三例。

来 源：出“园运动古中医学”著者彭子益遺方，容县中医药研究所搜集

十 方

主 治：恶寒或微恶寒，发高热，鼻塞或流涕，口鼻干燥或唇燥裂，咳嗽，呼吸迫促，头痛，胸痛，肢体痛，困倦，嗜臥，不思飲食。

处 方：銀花^{四錢} 蘆根^{三錢} 甘菊花^{三錢} 桔梗^{三錢} 桑叶^{三錢}
牛子^{二錢} 荊芥^{一錢五分} 薄荷^{一錢五分} 淡竹叶^{三錢}
淡豆豉^{一錢五分} 百部^{三錢} 甘草^{一錢五分} 連翹^{三錢}

用法：以水二碗半，煎取碗半。早、晚空腹服。

功用：疏风，清热，止咳。

疗效：此方治疗高热型单纯性流感五十五例，效果良好，服药一、二天即恢复健康。例如：（一）楊亚五，女，17岁，隆林德峨人。头一天微寒，高热（40度），打喷嚏，鼻塞，作呕，咳嗽，口干燥，头痛，胸痛，四肢痛，呼吸迫促，嗜卧，食欲不振，用此方治疗，服一剂诸症悉减，二剂体温正常痊愈。（二）冉也付，男，38岁，隆林德峨人。头一天恶寒发高热（40度），口鼻干燥，呼吸迫促，咳嗽，头、胸、肢、体痛，困倦嗜卧，不思饮食。初用西药磺胺类及注射退热剂和西林油，热未退，采用此方治疗，服一次，至中午各症状减轻，下午服三次药，至第二天，症状消失。（三）李和济，男，40岁，隆林德峨人。头一天下午突发高热，微恶寒，咳嗽，气喘，鼻塞，头、胸、肢、体痛，口唇干燥，困倦嗜卧，不思饮食，初服西药及注射止痛退热针无效，次日下午服此方，第二天病已好转，继续服二次药，症状消失，并能食粥两碗。

来源：隆林县德峨卫生所 林启宜

编者按：此方系银翘散桑菊饮合剂去杏仁加百部。

預防时行感冒方

处方：貫众不拘多少

用法：每成人量用貫众一至二两，以水三碗，煎成一碗，分二次服，一連服三至五天。

疗效：曾有五百多人服貫众湯进行預防，服后只有三人輕微感染。

来源：临桂县卫生科

痢疾类

治痢疾方

一 方

主治：痢疾腹泻（细菌性痢疾和急性肠炎），里急后重，大便胶粘，腹痛。

处方：乌梅肉二份 木香四份 黄连四份

用法：木香、黄连共研细末，乌梅捣和为丸。每日服四次，每次一公分。

疗效：南宁市人民医院用乌梅香连丸治菌痢十一例，服药一至五日热退泻止，大便正常。与磺胺对比，症状好转日数，平均快半天至一天半。治急性肠炎十五例，与磺胺对比，均于一、二天症状消失。

来源：南宁市人民医院

二 方

主治：白痢，里急后重，大便白脓样，腹胀痛。

处方：木棉花一两 京柿五钱

用法：以水二碗煎成一碗（约160毫升），一次服。

疗效：梁永昌，男，25岁，住梧州容光矿场。1933年某晚，忽觉腹胀痛，大便急迫，下鼻涕样粘液，每小时下一次。脉弦滑而有力，舌苔黄，不渴，为湿热下注。投以上方，一服而痢止。以后用此方治白痢，屡治屡效。

来源：区中医院中心门市部 陈绍琮

编者按：此方宜于初起急痢。

三 方

主治：红白痢，里急后重。

处 方：土前胡三錢

用 法：水煎服或生嚼服，一次服完。

疗 效：鹿寨雒容附近乡間經此方治愈的不下六十多人，疗效很好。

来 源：鹿寨雒容秀水 胡化成

編者按：土前胡又名馬連鞍。为繖形花科植物。学名：Peuced-mum decursivum(Miq)Max.

四 方

主 治：血痢不論久痢初痢。

处 方：蘿卜

用 法：洗净切粒，不用放水，文火煲熟后加蜜糖拌勻服。成人每次服一斤，或十二两，加蜜糖一两或八錢。五至十岁每次服半斤或六两，加蜜糖五錢或六錢。

疗 效：若病者身体脾胃不属虛寒者，不論初痢、久痢，服此方均有效。例如1958年永福大队四中队丘启松等三人初患血痢，服此方二次，均痊愈。

来 源：貴县大圩分社 楊蔭棠

編者按：如用紅蘿卜效果更好。

五 方

主 治：大便下粘液，或紅或白，或紅白杂下，腹痛，里急后重，便量少，日十余行，甚至数十行。

处 方：有刺野苧菜 馬齿苋各四兩 凤尾蕨 黑脚蕨各七錢

用 法：用水浸过药面浓煎，分三次服，每隔四小时服一次。紅痢加紅糖五錢，白痢加白糖五錢，紅白兼下加紅糖白糖各五錢冲服。

疗 效：岑溪太阳公社黎明德妻，患紅白痢疾，腹痛，大便里急后重，日登廁十数次。黎明德与子亦被传染，服西药无效，

均以上方治愈。廿余年前馮家十余人患痢疾，均以此方治愈。

来源：岑溪县太阳公社

编者按：有刺野苋菜又名勒苋菜（南宁名）。为苋科植物。学名：
Amaranthus spinosus L.

凤尾蕨为凤尾蕨科植物。学名：*Pteris serralata* L.F.

黑脚蕨为铁线蕨科植物。学名：*Adiantum flabellulatum* L.

六 方

主治：下痢赤白，腹痛，里急后重。

处方：苦瓜藤不拘多少

用法：晒干研末瓶装备用。成人每日服二次，隔六小时服一次，每次服一钱五分至二钱，以温开水送服。

疗效：此方疗效显著，曾先后用此方治疗患者四百余人，均痊愈。

来源：百色县卫生科 林熙春

编者按：此方宜于初痢患者，对久痢虚弱者慎用。

苦瓜藤为瓜科植物。学名：*Momordica charantia* L.

七 方

主治：痢下赤白胶状，腹痛，里急后重，或渴，或不渴，或便时肛门灼热。

处方：白头翁四钱 秦皮二钱 川连一钱五分 黄柏二钱 白芍三钱
银花二钱 槐花二钱 地榆二钱 广木香一钱

用法：用水两碗，煎取一碗，去渣，分二次温服，每四小时服一次。服完一剂后，第二天续服一剂。

功用：清热解毒，凉血导滞。

疗效：献方人及横县人民医院门诊部对患痢者常用此方，疗效很好，大都服药一剂后，痢下次数即减少，第二天继续服一

剂即愈。茲举一例：白俊明，西津水电站監察队職員，男，27岁。患痢疾，入横县人民医院留医，病况如下：日夜下痢廿余次，里急后重，大便紅白，便量少，微发热，体温38度，鏡检系細菌痢，服西药数天无变化，后服此方，一剂痢下次数减少，二剂更减少，三剂大便正常，遂出院。

禁忌：寒痢、虛痢不宜服。

来源：横县人民医院 梁济川

编者按：此方即仲景白头翁湯，加行气，导滞，涼血，清热，解毒等治痢药。对患热痢，兼气滞或血滞、腹痛者，均有卓效。

八 方

主治：下紅白痢，里急后重，便如魚脑者。

处方：紅鉄树叶五張 白糖一兩

用法：將紅鉄树叶搗碎后，与白糖攪勻，用溫开水冲服。

疗效：献方人在校讀書时下紅白痢，日数十行，便如魚脑，紅多白少，服药不效，后得同学郑国珍介紹用紅鉄树叶五張、白糖一兩，搗碎，用滾水冲服，服后痢止。此后凡有患同样病者，服此方均有效。

来源：貴县大圩分社 覃紹銘

九 方

主治：紅白痢，里急后重，日夜无度者。

处方：川連四兩 白芍二兩 訶子一兩五錢 木香一兩

用法：以吳萸一兩与川連共炒至老黃色去吳萸，和其他药共为細末，分装于容量0.5克胶囊內备用。每次服四丸，每日服三次，隔三小时一次，連服两三天。

禁忌：糯米及生冷食物。

疗效：此方治疗五十余人，均获效。

来源：柳州市联合診所

十 方

主 治：紅白痢症（細菌性痢疾）里急后重，大便下膿血。

处 方：地桃花根

用 法：取地桃花根部（紅花最好，白花也可用）晒干。成人每天三两，以水350—400毫升煎取200毫升，分二次服。小孩每天一两，以水150—200毫升煎取80毫升，分二次服。

疗 效：1959年5月献方人曾用此方治疗三十五例，經初步观察，痊愈二十四例，好转十一例。

来 源：区中医院中心門診部 叶引之

編者按：地桃花即痴头婆。为錦葵科植物。学名：Urena lobata L.

十 一 方

主 治：血痢里急后重。

处 方：木棉花五朵 白糖一兩

用 法：用水一碗半煎至半碗，去渣，冲白糖温服。

疗 效：1958年3月貴县大圩区东源乡永福社何村梁仲賢，女，3岁。患痢疾純血，里急后重，經多方治疗无效，时愈时发，已半年，后服此方二次痊愈。

来 源：貴县大圩公社 周文靜

十 二 方

主 治：痢疾及腹瀉（阿米巴痢疾及急性腸炎）。每日大便10次左右，大便中胶粘，腹痛，或里急后重。

处 方：銀花蕊二錢 茵陈二錢 槐花二錢 甘草一錢 菊花一錢五分
蜂蜜^{八錢}冲服

用 法：用水兩碗，煎成一碗，日服一剂，一次服。

疗 效：广西医学院附属医院用上方治疗阿米巴痢疾六例，急性腸炎四例，經观察九例痊愈，一例好转，痊愈率很高。

来源：广西医学院附属医院

十三方

主治：紅白痢，腹痛，大便下脓血，里急后重。

处方：烏梅炭_{研末}

用法：用开水冲服，每次一錢五分，每日二至三次。

疗效：广西医学院附属医院治疗九例，都具备痢疾（菌痢）典型症状。患者体温平均在摄氏38.5度左右，大便次数十至十八次，疗程为二天半。服药后平均一天半退热，二天半症状消失，三天大便正常。疗效很高。

来源：广西医学院附属医院

十四方

主治：紅白痢症。

处方：凤尾草二兩 蜜糖五錢

用法：用水两碗与凤尾草同煎。煎沸五分鐘，去渣。冲蜜糖，分二次服，隔四小时服一次。如属寒者加玉桂、干姜各一錢；如属热者加紅花、桃仁各一錢同煎。

疗效：1950年至1958年間献方人曾用此方治愈多人。

禁忌：肉食膩滯之物。

来源：贵县木梓分社 覃序文

编者按：1. 凤尾草是治热痢的有效药，本区民間多知采用。热痢不加桃仁、紅花亦效。

2. 凤尾草科属学名見本类五方编者按（第9頁）。

十五方

主治：紅白痢，里急后重，腹痛。

处方：当归四錢 青皮二錢 本香_{三錢另包} 胡連二錢 尖檳三錢 白芍三錢 茯苓三錢 桃仁二錢 黃芩三錢 赤石脂一錢五分

用法：以淨水三碗煎至一碗半，再加入木香同煎數沸去渣。分三次飯前服，每隔四小時服一次。

療效：獻方人曾用此方治愈十余人。如徐尙余同志，患痢疾已四天，服藥無效。每日痢下二十余次，腹痛，里急後重，不能飲食。服上藥四日痊愈。

來源：鹿寨县人民医院 羅彥

十六方

主治：紅白痢疾，里急後重，大便下膿血。

處方：含珠草二兩

用法：以水二碗半煎成一碗，分三次服。

療效：1958年桂林市中醫院用此草治療七十多例，均愈。

來源：桂林市中醫院

編者按：含珠草又名珍珠草（桂林名）。為大戟科植物。學名：*Phyllanthus simplex* Retz.

治久痢方

主治：便下膿血，腹微痛或不痛，每日大便二至四次，日久不愈。

處方：鴉胆子一兩五錢 貫眾五錢 銀花^{五錢}_{炒黑} 黃蜡一兩

用法：前三味共研為末。將黃蜡溶解後，入藥末和勻，為丸如綠豆大。每次服十五至二十丸，每日空腹吞服兩次。

功用：清熱，解毒，止痢。

療效：覃××，女，20歲，岑溪縣三堡鄉里老村人。解放前患痢多年，每日大便二、三次，伴有膿血，面黃發枯，14歲後未來過月經。1953年獻方人用此方治療，服五日後，大便減為二次，膿血減少，十日後大便正常，再服一劑痊愈。愈後月經來潮，面轉紅潤。其妹亦患此疾三年，服此方一劑而愈。

来源：岑溪县太阳公社 甘均权

針灸治痢疾

主治：紅白痢症，大便下膿血，里急后重。

取穴：天樞雙 足三里雙 中脘 神闕灸

手法：用平补平泻手法，捻轉入針后，留針十五分鐘。

疗效：区人民医院共治疗廿二例，除一例是阿米巴痢疾无效外，皆在三天之內痊愈。茲举二例：（一）赵××，男，20岁。到区人民中医院留医，住院号 50313 号。病初腹痛，大便日十多次，繼而发热，大便有紅白粘液，里急后重，小便赤。施以上法，第一天腹痛止，大便次数减少，第二天痊愈。（二）苏××，女，27岁。到区人民中医院留医，住院号 51E68 号，以感冒发热始，繼見腹痛，大便次数增多，有粘液，如鼻涕样，里急后重，口渴，舌苔黄。經用針灸治疗，三日基本痊愈。

来源：广西僮族自治区人民中医院

治痢疾及腸伤寒方

主治：大便粘膩，腹痛，发热。

处方：芭蕉蕾一个

用法：将芭蕉蕾消毒，切碎，加食盐、酒精少許，混和絞汁約100毫升，再加蜂蜜，加溫頓服。

疗效：（一）淡秀英，女，20岁。患寒热一周，入南宁市人民医院治疗。經检查体温摄氏39度，血液培养发现伤寒桿菌，未用过抗生素。入院第六天服此方，第九天体温正常。前后服此方七天，細菌培养阴性出院。（二）楊××，男，48岁。腹痛下痢，到南宁市人民医院留医，經检查培养出痢疾桿菌。服此方，第二天痊愈。大便培养阴性出院。

来源：南宁市人民医院

編者按：區人民醫院用此方治痢疾廿余例均獲效。

預 防 痢 疾 方

處 方：獻山紅根適量

用 法：以淨水適量煎濃。作預防用：日服一至二次，連服三天。
作治療用：日服三次，每隔四小時服一次，連服二日見效。

附 註：此方功效為預防痢疾流行，亦可治療痢疾患者。

療 效：曾有千余人服此方進行預防，均未發現患痢疾。

來 源：凌樂縣邏樓公社歌磨大隊民辦醫院 陳先業

編者按：獻山紅根又名金盞根、豹牙郎（桂南名）。為野牡丹科植物。學名：Melastoma normale D. Don.
此方一日量可用生藥一兩五錢至二兩。

疟 疾 类

預防疟疾方

處 方：柴胡三斤 两面針二斤 山芝麻三斤 一枝香一斤 常山三斤
蚰蛇藤三斤 假紫蘇一斤

用 法：以上各藥，曬干，共為細末。日服一次，每次服五分，溫
開水送服，連服四天。

附 註 此方功效適用於疟疾抗復發。對有症狀的疟疾患者亦
適用。

療 效：曾有一千九百二十七人服用此方為疟疾抗復發，經初步觀
察無一人有症狀發作。另有一百零八人用圓氣瓜為抗復
發，每天服一次，每次服二片，連服四天，經觀察，有一
人有症狀發作。

來 源：百色東風公社地段醫院

編者按：蚰蛇藤又名南蛇勒、南蛇藤（桂南名）、两面針、山芝麻。科属学名見时行感冒类一方。編者按（第1頁）。

一枝香为菊科植物。学名：*Gerberia piloselloides* Cass.
假紫苏为唇形科植物。学名：*Tencrium viscidum* Bl.

治 疟 疾 方

一 方

主 治：先寒后热，热多寒少，头痛身骨痠胀，汗出。

处 方：麻沙根三兩 青蒿三兩

用 法：以清水三碗煎取二碗，分三次服，疟发前二小时服一次，将发时服一次，发过后服一次。

功 用：疏风、清热。

疗 效：此方治愈疟疾病例很多，疗效很好。例如蔣愛和，男，30岁，义塘工区人。1957年在田間割禾，突然发冷发热、头痛骨痛，服此方一剂而愈。

来 源：桂平县麻垌公社 何賢

編者按：麻沙根又名山芝麻、假芝麻。科属学名見时行感冒类第四方編者按（第3頁）。

青蒿科属学名見时行感冒类第二方編者按（第2頁）。

二 方

主 治：先寒后热，热多寒少，头痛、身痛。

处 方：紫荊木強一兩

用 法：以水三碗煮取碗半，分二次服，疟发前二小时服一次，发后服一次。或研成散剂，开水冲服，每服三至五錢。

功 效：解热毒，活血。

疗 效：此方經獻方人治疗八十余例都有效。如李守南，男，28岁，古院人。1951年、1952年、1953年都患过疟疾。1954年8月又出現疟疾症状，以此方治愈后，数年来不复发。蒼梧夏郢公社医院用此方治疗疟疾，疗效很高。

来 源：岑溪县太阳公社 李棣华、蒼梧县夏郢公社医院

編者按：紫荆木又名黄荆柴、蚊烟柴、五指风、土柴胡(南宁名)。为馬鞭草科植物。学名：Vitex Cannabifolia S. etz.

三 方

主 治：各型疟疾。

处 方：生地谷根五錢至一兩

用 法：用淨水二碗，煎取一碗，日分三次服，每隔四小时服一次。

附 註：此方药量应根据患者体質决定。

疗 效：新宾公社封玉清、才塘公社石灰村李炳才、洋桥公社車塘村葛有昇等患疟疾，用此方治疗，均一剂而愈。

禁 忌：十岁以下小孩和孕妇勿服。

来 源：宾阳县洋桥公社 郑学韬

編者按：生地谷根又名地巴麻、雀儿麻、了哥根。为瑞香科植物。学名：Wikstroerma indica(L.)C. A. Mey.
此药毒性頗大，用时宜慎。

四 方

主 治：寒热往来，头暈乱語，胸胀腰急。

处 方：鬼划符十斤 鸡苦木五斤 二背木五斤

用 法：将上各药切碎，放入鑊內，以淨水三十斤煎至八斤，去渣，再煎至二斤取用。成人每服二湯匙，以蜜糖二湯匙开水一湯匙送下，每隔一小时服一次，連服二、三次。如无

蜜糖，白糖亦可。

附註：服时恶心或吐出，热减量退，再服便获痊愈。

疗效：此方曾治愈八十余人。

禁忌：忌食生冷物。

来源：贵县庆丰乡 楊卓舟

編者按：鬼划符为大戟科植物。学名：*Breynia fruticosa* Hook F.
鸡苦木藤又名土地骨皮。为馬鞭草科植物。学名：*Clerodendron cyrtophyllum* Turcz.

二肯木藤又名土常山。为灰木科植物。学名：*Symplocos chinensis* Druce.

五 方

主治：久疟血虛。

处方：民間驗方：紅娥眉豆三至四兩 鯉魚一尾約四五兩

用法：將豆魚以適量水煮食（食時加適量油鹽姜酒調味）。如無魚改用牛肉亦可。上午空腹服。

疗效：秦××，男性，25岁，县底公社久隆管工区人。自1925年7月起至1927年11月止，患疟疾两年余，歷經医治无效。其症状每隔三天在下午3至7时发作一次。热少冷多，面黃唇白，眼脸无血，食少，四肢乏力，稍事劳动則头眩目花，脉細弱无力，舌色白嫩。后經秦济民医师診治，認為是久疟血虛，用此方治疗，服一次，自覺病勢減轉，精神轉好。以后每当疟疾发作，如法煲食，共服三次，痊愈。秦医师在行医中，先后治愈三十人，效果极佳。

来源：容县中医药研究所

編者按：紅娥眉豆为豆科植物。学名：*Phaseolus cylindricus* L.

六 方

主治：微寒高热，或但热不寒，头痛体痛，无汗或微汗，口渴不大饮，脉洪数。

处方：白虎桂枝汤加川连：石膏八钱 知母四钱 甘草三钱
桂枝三钱 川连一钱五分

用法：用水一碗半煎至一碗，分二次服，每隔四小时服一次。

功用：清营分邪热。

疗效：此方治愈六十多人，效果极佳。

来源：富锺县超英人民公社人民医院 廖炎标

编者按：白虎加桂枝汤，出金匱要略，治温疟但热不寒。此方加川连去粳米，是因黄连有治天行热疾，郁热伏暑之功。胃气未伤，故去粳米之粘滞。

七 方

主治：发冷发热，每日一次，冷时身颤抖，身骨痠痛，热时体温升高至40度，口干不渴。

处方：常山二两 尖檳一兩 甜菜一兩 甘草一兩

用法：共研为細末。每服三錢，每日三次，連服三天。

疗效：1954年献方人在平南用此方治疗五十余例，均痊愈。

禁忌：服药时期戒食魚腥萝卜等物。

来源：柳州市联合診所 江永龙

八 方

主治：长寒发冷，多年不愈，年发数次。

处方：麻黄一钱五分 归身三钱 蕞拔二钱 常山三钱 烏梅二只
首烏三钱 鱉甲三钱 草果二只 檳榔二钱

用法：水一碗半煎取一碗，分二次服。

功用：祛寒，补血，除痰，截疟。

療效：治愈多人，經觀察三年未見復發，

禁忌：孕婦忌服。

來源：桂平縣人民醫院 李漢基

九 方

主治：每日或間日或三日發作，先寒後熱，頭痛身痛。

處方：白礪一兩 陀僧四錢

用法：上二味研極細末，以面糊為小丸。每服六分，日服二次，開水送下。

功用：滌痰，散結，截瘧。

療效：用此方治愈一百八十人，治愈率很高。

來源：岑溪縣東方紅人民公社中心醫院 陸秀田

編者按：此方對腸胃有些微刺激作用，服後可能微有惡心嘔吐現象。

十 方

主治：如上方。

處方：白古月一錢 生蔥頭三個

用法：將白古月研末，蔥頭搥溶共調勻，敷于手腕內關穴，男左女右。敷藥局部略有發熱，余無其他反應。

附註：于病發前二小時敷藥。

療效：此方療法簡單，對不願服藥小兒更適用。曾治二十多例均獲效。

來源：柳州市聯合診所 吳瑞周

十一 方

主治：久瘧不愈，間日、三日瘧，屬陰寒者。

處方：正胡椒末五分 冷飯一碗

用法：以胡椒末拌炒冷飯吃，每日一次，連吃一星期。

療效：（一）張登鴻，男性，三歲，靖西人。患瘧疾已一年，服中西藥俱無效，獻方人介紹用此方，一星期愈。（二）靖西武平鄉果樓屯譚娟之女，患瘧疾半年不愈。服此方，連吃三朝斷根。（三）黃付生，男性，28歲，武平鄉足未屯人。久患瘧疾，服藥無效。連服上方二星期，愈。

來源：靖西中醫學院 黃振達

十二方

主治：久瘧寒瘧。

處方：黑棗十個 良羌三錢

用法：上藥以淨水一碗半，煎取一碗，分兩次服，每隔六小時服一次。

附註：此方是祖傳驗方。

療效：（一）木格區木梓鄉龍塘區六羅村賴秀英，女性，24歲。1955年患瘧疾，一年未愈。每隔五、六天發作一次。瘧過後飲食如常。服此方，一服即愈。（二）木梓鄉棉灘村黃育政，於1955年患瘧疾，一年來百藥不效，經服此方即愈。

禁忌：非久瘧寒瘧禁用。

來源：貴縣木梓龍塘鄉 陳仕進

十三方

主治：久瘧不愈，冷多熱少，或三日發作一次。

處方：黨參五錢 青蒿三錢 柴胡三錢 秦艽四錢 當歸三錢 北芪五錢 地骨皮四錢 烏梅二錢 鱉甲六錢 知母三錢
先煎

用法：以水三碗煎成一碗，於瘧發前六小時一次服。

療效：崔履堃，男，55歲，梧州文史館館員。從1942年起，患瘧疾，連綿至1944年長期不愈，時好時發，漸成四日瘧，多在晚間發作，冷多熱少。請獻方人診治。其病況，脈弦遲，

口淡喜热飲，神弱面黯，胃弱便溏。以上方与之，囑在发作前六小时服下，当晚即愈。投以补中益气湯三剂善后，至今十年未复发。

来源：区中医院中心門診部 陈紹琮

编者按：此方乃罗謙甫秦艽鳖甲散加味。

十 四 方

主治：长寒发冷，日久不愈，冷多热少。

处方：煨鳖甲一兩二錢 雄黃二分

用法：上药共为細末。分三次服，每隔四小时服一次。用适量双酒和药燉三十分鐘，溫服。

疗效：梧州运输公司工友普××患疟疾三年，时愈时发。經公司医疗室用西药治疗，久不愈，服中药百十剂亦不見效，献方人处以上方三剂而愈。一年余未見复发。

来源：区中医院留医部 梁鵬万

编者按：此方出肘后方。

十 五 方

主治：久疟虛寒。

处方：狗肉附子湯：狗肉八兩 熟附四錢

用法：将狗肉、熟附同煲食。食时可加适量油、盐及調味品等。

疗效：此方治疗三十余例，均愈。茲举二例如下：（一）容城公社晓光工区陈某于1950年12月某日患疟疾。初，发热恶寒，头痛身痛，口渴。每天12时左右即发寒颤，后发热，历时約一小時左右，惟飲食如常。病者自購发冷丸（阿的平）服之，經月余，身体日覺困怠，食慾減退，始延医診治，历三十天无效。体极疲弱，面色萎黃，四肢无力，食慾微，整天昏睡。陈旭銓医师囑服此方，当晚半夜，病者自覺精神稍好。次日繼服余湯一盅，精神更好轉。三天服

完第一剂能扶杖慢行，語声漸响亮。次診，脉稍有力。仍服原方两天，愈。（二）梁××，女性，現年18岁，廂南乡人。1948年9月，患瘧疾。自訴：初起发热，恶寒，头痛，口渴。每天下午3时左右病即发，发时冷多热少。处以上方，服一剂，病減。次日，发冷停止，精神舒暢，飯量增，但四肢軟弱。复診，仍服原方，服后即愈。

来 源：容县中医葯研究所

疔 腮 类

治疔腮（腮腺炎）方

一 方

主 治：初起一腮，繼則两腮，或同时两腮，紅肿病痒灼热。

处 方：朴硝一分 蚯蚓粪二分

用 法：共为研末，以二漏米水調搽患处。如肿痛严重，以童便調搽，效尤速。每天搽七、八次。干后即搽更好。

功 用：除大热。

疗 效：此方曾治愈患童廿余人，輕者用葯二日即愈，重者用葯三、四天即愈。

来 源：桂平县木乐公社医院 覃健儒

二 方

主 治：疔腮（腮腺炎）两侧腮肿大，紅肿热疼，不化脓。

处 方：柴胡四錢 花粉三錢 黃芩三錢 甘草二錢 夏枯草六錢
海藻三錢 昆布三錢 三棱二錢 莪术二錢 桔梗三錢
貝母四錢 連翹二錢 山豆根二錢 元參三錢

用 法：以水600毫升煎成200毫升，分二次服。

疗效：（一）吳姓女孩，13岁，因感冒引起腮腺炎，寒热并作，不能食。經用磺胺剂热退，但肿不消。改用上药，日服一剂，共服四剂，愈。（二）陈某，男，31岁。初感，头疼寒热。两天后两耳下肿痛灼热，口渴，舌苔黄，吞嚥困难。服上方，每日一剂。第一剂热退，四剂痊愈。（三）林某，男，19岁。初患感冒，繼而两腮肿大疼痛，食欲不振，疲乏異常，微寒微热，口渴，便赤。服上药三剂，痊愈。

来源：广西僮族自治区人民医院

三 方

主治：如上方。

处方：朴硝一两 蕉树自然汁一碗

用法：共为混合。待朴硝溶解后，以消毒棉蘸药水频塗患处，勿令干。

功用：除热解毒。

疗效：木乐公社金垌工区徐世柏，男，18岁。徐善柏，男，12岁，于1956年4月均患瘰病。一用盘尼西林治疗三天无效，一用太阿先治疗两天无效。后用上方治疗，当晚痛止，翌日肿消。均三、四天痊愈。

1959年3月，赵北海，男，5岁，初起即用上方治疗两天而愈。1956年4月，桂平县大乐公社用此方曾治愈一百二十四人。

来源：桂平县木乐公社第二医院 徐积慎

四 方

主治：瘰（急性腮腺炎）两耳下肿大灼热疼痛，寒热头痛。

处方：葛根三钱 柴胡二钱 生石膏六钱 花粉三钱 黄芩三钱

牛子三錢 連翹三錢 桔梗二錢 升麻五分 甘草一錢

用法：用水二碗半，煎成一碗，分二次服。

療效：南寧鐵路醫院北站衛生所共治療八例，均一劑消腫止痛，二劑痊癒。如南寧車站黃大庭和南寧車輛段郭漢欽之愛人廖許云患腮腺炎很嚴重，均服此方二劑即癒。

來源：南寧鐵路醫院北站衛生所

五 方

主治：疔腮（腮腺炎）耳下紅腫，熱痛而硬，乍寒乍熱，口渴，舌黃，大便結，牽引頭痛，脈浮滑。

處方：牛子四錢 連翹四錢 桔梗四錢 元參三錢 馬勃二錢 銀花三錢 荊芥二錢 薄荷二錢 甘草三錢

用法：以水二碗半，煎成一碗，分二次服。

療效：此方經臨床觀察百余例，療效均顯著。

來源：柳州聯合診所 江永龍

編者按：此方乃普濟消毒飲加減法。凡疔腮初起，寒熱并作，在五天内未成腫塊者，服此方收效高。如超過五天，腫硬甚劇者，可加活血消堅劑如山茨菇、昆布、桃仁、板藍根等消散之。如大便秘，用川軍、芒硝等通便，收效更快。此方雖覺平凡，但以編者經驗，療效確實，故錄之以供推廣。

針藥并用治腮腺炎方

主治：耳下兩側或一側，腫痛灼熱，咀嚼困難。

處方：葛根四錢 浙貝三錢 連翹三錢 夏枯草三錢 米蘘子二錢 桔梗三錢 甘草梢一錢五分 赤小豆三錢

用法：以水400毫升煎成160毫升，一次服。

取穴：翳風 合谷 頰車

手法：抑制手法，留針三十分鐘。每天配合施術一次。

療效：南寧市人民醫院共治療十六例。其中計男性十例，女性六

例；患兩側十二例，患一側四例；服藥二、三次愈者十例；三、四次愈者六例。

來源：南宁市人民医院

濕 溫 類

治濕溫（腸伤寒）和瘧瘧（民間叫出痧）方

主治：惡寒，或微惡寒，或不寒。發高熱，汗出而熱不解。頭暈或脹、或痛。胸悶脘滿。腰痛，肢體痠痛。苔薄白、或厚膩。大便或溏或秘。小便短赤。面容呆滯。脈濡或數。

處方：野芋頭半斤 大米一兩

用法：（一）刮去野芋頭外皮，切片，和大米同炒，炒至米香黃為度。入沙罐內，加水二斤煎取一斤，一日分三至四次冷服。（二）野芋頭一斤至斤半，刮去外皮，切片，和米一兩至二兩同炒至米香黃為度。加水一浴盆，煮沸，先取一碗待溫服後，即將滾湯倒入浴盆內。盆上架板凳，患者坐凳上，四周以蓆密圍，上面亦蓋密，患者在其中以浴巾動盪盆中熱湯，使熱氣熏蒸全身。待湯溫度少降，遍體洗浴。浴畢臥床休息，蓋被取汗，並听其自由入睡。醒後，再冷服野芋頭湯（如用法（一）先煎備用）一碗。

附註：（一）（二）兩種用法均有效。第二種為民間習用。野芋頭有毒，其粘液沾染皮膚則發生痕癢麻痺。誤食則口舌咽喉麻痺難堪。但有上述疾病，服之反覺甘涼可口。此與中醫以毒藥治病，“有故無殞”的學理吻合。民間使用此方，對疾病是否適應，積有簡便鑑別良法。其法將生野芋頭切開，先以切開面摩擦患者掌心，如不覺掌心麻癢，即證明系患此方的適應症，且服後無中毒之患。即使中毒，飲生鹽水，即可解除。

功用：清热解毒。

疗效：此方效果卓越，玉林一带，民间普遍习用，从无失败。如周典謨于二十年前，患湿温，治疗十余天，身热未退。其母取用野芋头摩擦其掌心，无麻痒感觉，遂用此方治疗，熏蒸洗浴一次，服药四次，历时两天，病去十之八九，再休养两天遂病除如常。

来源：区中医药研究所 周典謨、黄贤忠

编者按：（1）野芋头又名朴薯头、老虎蒙（南宁名）。为天南星科植物。学名：*Alocasia cordata* (Burm. f.) C. Koch.（2）1950年柳州市防疫站曾试验十一例副伤寒带菌者。初，培养大便检查为阳性。用野芋头四两，切片，与生锈钢铁钉五枚同炒至野芋片呈黄黑，加水一碗半，煎取汤大半碗，一日分二次服，连服十天。一月后检查十一例大便，均变阴性。（3）1955年柳州市人民医院用上法治疗肠伤寒十一例均获效。其法是：用野芋头半斤，切片，加米一两置铁锅内同炒至黄色为度，取出，放入瓦罐内，加水二斤煎取一斤，一日分三至四次服。据总结报导：这十一例的入院日期平均在病后九日；用野芋头治疗日期，平均在发病后十一日开始；每人使用野芋头治疗日数，平均为七、八日；完全退热日期，平均为七至九日，最早者为服药后第五天；每人住院日数，平均廿二天半。

瘧 病 类

治瘧病（流行性脑脊髓膜炎）方

主治：项强，头疼，呕吐，寒热，无汗，便秘。

处方：（一）葛根六钱 麻黄三钱 桂枝二钱 白芍三钱 甘草一钱
生姜三片 大枣三枚 大黄_{三钱后下} 牛黄丸一枚

(二)升麻一錢 葛根六錢 赤芍四錢 甘草一錢 石膏^{一兩}_{先煎}

銀花四錢 防風二錢 白芷一錢五分 紫雪丹^{二分}_{沖服}

用法：先以水二碗半，煎第一方，煎成一碗，一次送牛黃丸一枚服。如服后大便通，有汗出，可服第二方。第二方以水三碗，煎成一碗，一次送服紫雪丹。

療效：1959年柳州某醫院中西醫合作，由西醫作物理、化學診斷，中醫根據辨症施治精神治療，一星期內便治愈三例，服藥第二天便降溫，第三天恢復常溫，抽搐項強等症也解除。

來源：柳州市茂名工地醫院

霍亂類

治霍亂方

一 方

主治：上吐下瀉，大便如米泔樣液體，腹如雷鳴而無劇痛。

處方：生松毛^{四兩}

用法：生松毛搗爛。加水一斤煎液汁，分二次服，一小時服一次。

功用：辟天行瘟疫。

療效：1934年梧州市霍亂流行，死亡相繼，用此方作大規模治療，愈千余人。

來源：岑溪太陽公社 唐曉林

編者按：生松毛即松葉。為松科植物，學名：*Pinus massoniana* Lamb.

二 方

主治：霍亂抽筋，吐瀉交作，顏面蒼白，眼眶深陷，四肢厥逆，


脉沉細。

处 方：吳子三錢 生姜三片 大枣四枚 白朮五錢 云苓五錢 丽參
四錢 熟附三錢 干姜二錢 藿香三錢 川瓜四錢 泽瀉四錢
另煨服 肉桂一錢 煨服

用 法：以水三碗煎至一碗，分二次服。

疗 效：馬四，男，23岁，住梧州容光矿場。1932年某日午突覺腹痛，繼而吐瀉并作。吐出之物酸，瀉出之糞无臭味如米泔样。顏面蒼白，眼陷有脫水象，厥逆脉微，小腿抽搐，已至危候。急投此方，一剂而愈。一月后，該矿場黎惠全同患此症，亦以此方治愈。

来 源：区中医院 陈紹琮



肺 癆 類

治肺癆（肺結核病）方

一 方

主 治：肺癆病，咳血。

处 方：半边香 千張紙 石仙桃 石奶泡 八瓣花 松树寄生
小血藤各等分

用 法：以淨水三碗，煎取一碗半，分三次服，每隔四小时服一次。

疗 效：此方曾先后治愈五人。茲举二病例：（一）陈某，男，39岁，凌乐县邏樓公社邏樓街人。患肺癆咳血已十五年。因迁延不治，病情日趋严重。1959年2月到唏林大队医院治疗。症状：咳血，气喘，喉干痒，声嘶哑，面色蒼白，肌肉消瘦，足冷，四肢无力，胸痛，食則覺胀，腰部疼痛，时感寒热，下午热甚。初診，給此方葯水二日量。服后食慾增進，血咳俱減，精神稍振。再診亦給葯二日量，病更減輕。連診三次共服葯六剂，病即痊愈。經了解，病者未另服其他葯及調养食品；身体恢复正常，能参加劳动生产。（二）唏林公社連河屯楊××患咳嗽。痰中带血已三年，晚上不能睡，多方治疗无效。1958年4月到唏林大队民办医院診治，服此方一星期，一日一剂，即見大效，能睡能食，服葯二十天痊愈。

来 源：凌乐县邏樓公社唏林大队民办医院 邓昌林

編者按：石仙桃又名石瓜子、石上仙桃（桂南名）。为蘿藦科植物。学名：Dischidia chinensis Champ.

八瓣花又名路边菊。为綉球花菊科植物。学名：Decumaria sinensis Oliv.

小血藤又名鸡血藤。为豆科植物。学名：Millettia reticulata Benth.

千张紙为紫葳科植物。学名：Oroxylum indicum (L.) Vent.

二 方

主治：肺癆发热咳嗽，痰中带血，胸痛咽干，声嘶，呼吸困难，盗汗，食慾不振，体質消瘦。

处 方：仙鶴草六錢 川貝四錢 百部^{一兩}_{先煎} 白芨六錢 桔梗二錢
浮海石五錢 馬兜鈴四錢

用 法：以水三碗煎至一碗，分二次服，每隔四小时服一次，宜冻服。如肺热盛加生地、白芍各四錢。津少加天冬、麦冬、元參各三錢，五味二錢。咳血甚加阿膠五錢(后下)，藕节五个。

附 註：服藥后微有头晕胸悶。

疗 效：柳州棉織厂周××、李××患肺結核，用此方治疗，均一月而愈。

禁 忌：辛辣食物及辛溫藥物等。

来 源：柳州市人民医院

三 方

主 治：肺結核，咳嗽，咯血，喘促，食慾不振，消瘦。

处 方：蜈蚣^{四錢}_{草藥} 白芨八錢

用 法：共为細末(忌火烘)，每日服三次，每次服一錢，开水送服。小儿酌減。

疗 效：霍××，男，62岁。廿多年前曾患咯血，后常有咳嗽，經X光透視証明为肺結核病。1958年11月咳喘不息，食慾大減，形瘦。1959年2月3日住院治疗。服上藥廿余天，咳

喘漸止；服至五十日症狀消失，面色紅潤，體重增加，精神飽滿，遂痊愈。

来源：区中医院 文心一

编者按：蜈蚣旗又名土参、竹节人参。为五加科植物。学名：
Panax repens Max.

四 方

主治：肺癆咳嗽，或咳血，胸悶或脹或痛，肩胛疼痛痠累，午后发热，或盜汗，稍劳动則气迫，面色蒼白，精神食慾不佳。

处方：外擦药油方：回春合剂：归尾二钱 赤芍二钱 吴干三钱
山甲三钱 白芍二钱 甘草二钱 升麻三钱 土茯苓二钱 黄柏
二钱 花粉二钱 黄芩三钱 白芷二钱 川连一钱五分 信石五钱
烏梢蛇一钱 白花蛇一钱（以上十六味共研粉末）古月二钱
梅片一钱 麝香一分 朴硝一钱（以上四味分別各研細末）
水銀四钱五分

制法：上方前十六味药粉放茶油六两泡浸六天，每天攪拌三次，第七天煮沸，經五分鐘后用紗布过滤去渣。冷却后加入古月、梅片、麝香、朴硝四味药末，攪拌均匀，便可使用。

用法：每次以药油四钱配水銀一钱五分外擦。使用之前，先以药油少許与水銀混和，用指头研磨至水銀不見星为度，然后加入药油四钱和匀，分別擦四肢关节及胸背部皮肤。

处方：第一次及第二次擦药前內服方：

銀花三钱 泽泻三钱 荆芥三钱 防风二钱 篇蓄三钱 甘草
二钱 赤芍二钱 瞿麦二钱 木通二钱 山梔三钱 滑石三钱
車前子三钱 土茯苓三钱

用法：用水二碗煎至一碗，在第一次及第二次擦药前服。

处方：第三次擦药前內服方：

猪苓二钱 泽泻三钱 生軍四钱 防风二钱 篇蓄三钱 甘草二钱
荆芥二钱 黄柏三钱 腹皮二钱 辛夷二钱 黑丑三钱 六一

散三錢 芒硝^{四錢}_{冲服}

用法：用水二碗，煎取一碗，在第三次擦藥前服。

處方：擦藥后出現牙痛咽腫等服解毒湯：

生地四錢 元參三錢 桔梗三錢 石膏四錢 知母三錢 甘草二錢 黃芩三錢 銀花三錢 山豆根二錢

用法：以水二碗煎取一碗服。另外以綠豆四兩水二斤煎湯頻飲。

附註：外擦藥油連水銀共五錢五分，每日擦一次。三次為一療程。

擦藥前令患者洗澡，服擦藥前內服方。擦時，擦至局部皮膚發熱為止。擦后，待藥干后才穿衣。擦藥開始至停藥后第六日方可洗澡。休息三、五日即開始第二療程。一般在擦藥后第二、三天皮膚上發生丘疹，第三天出現牙痛，喉頭發干，咽腫，不想吃飯，體溫微增（攝氏37.5度左右）。第一療程擦藥，體重稍有減輕，個別病例痰中帶血。上述反應經一療程后，即逐步減輕。個別病例有無反應者。不論是第一療程或第二療程，停藥后或給服解毒藥方，其反應消失都很快。

功用：殺菌，解毒，清血，止衄，除痰通竅。

療效：（一）李××，男，24歲，機械工人。1956年9月發冷發熱，咳嗽，胸痛，盜汗。診斷為浸潤型肺結核。痰內結核菌陽性。曾兩次入桂林結核防治所治療，病勢雖經好轉出院，但至1958年10月又惡化。咳嗽，咳痰，胸痛，喉干，間或咯血，食慾不振，精神萎靡。復查，為浸潤型肺結核溶解播散期 $\left[\begin{matrix} \text{（乙）} \\ \text{上} \\ \text{中} \end{matrix} \right. \text{（+）}$ 。左肺第一肋間出現2厘米直徑之陰影，右肺第一、二肋間出現新鮮病灶。10月14日外擦中藥回春合劑，至1959年2月16日，共擦五個療程，歷時四月，實擦藥二十四天，總共用回春合劑十三兩二錢。至本書脫稿時咳嗽、咳痰、血痰等症均消失，胸痛漸輕，精神體力好轉，食慾佳，面色紅潤，體重自用藥后增加六市斤。X光檢查：病灶大部分吸收，陰影不明顯。

化驗檢查：痰集菌細菌已變形，其數量亦大減。（二）李××，男，29歲，營業員。1955年1月突然咯血，檢查發現肺結核。經肌注鏈霉素和服對胺柳酸鈉，病勢雖有好轉，未根除。1958年9月因患闌尾炎，施手術後高熱，又間或咳血痰，咳嗽，咳痰增多。至12月初，每日下午發熱，胸痛，頭痛，不想吃。13日復查，為浸潤型肺結核。浸潤進展期 $\left[\left(\text{乙} \right) \frac{\text{上中}}{\text{上}} \left(+ \right) \right]$ 。右肺第二、三肋間出現大片新鮮病灶。1959年元月1日用外擦回春合劑，至2月16日歷兩個療程共擦十次。用藥後胸痛，頭痛，發熱，咳血等症均消失；食慾大增，精神體力好轉，面色紅潤。經X光檢查，病灶大部分吸收，痰菌陽性。（三）馮××，男，24歲，設計師。1958年12月中旬發熱，咳嗽，胸痛，盜汗，檢查為右上肺浸潤型肺結核。浸潤進展期 $\left[\left(\text{乙} \right) \frac{\text{上中}}{\text{上}} \left(+ \right) \right]$ 。右肺第一、二肋間有一大片模糊不均勻陰影，右上肺呼吸音弱，痰集菌結核菌（+）。以回春合劑外擦，至2月16日計擦兩個療程，共8次。用藥後咳嗽，咳痰，盜汗等症均消失；胸痛減輕，精神體力充沛，面色紅潤，右肺上呼吸音正常。經X光檢查，病灶大部分吸收，痰集菌結核菌陰性。

禁忌：擦藥期間忌食生雞、鯉魚、蔥、蒜。

來源：桂林市結核防治所 張作新 羅繼富

五 方

主治：肺結核，胸痛，咳嗽，咯痰，氣急，咯血，倦怠，潮熱，盜汗。

處方：加減三甲復脈湯：干地黃六錢 麥冬三錢 白芍四錢 生阿膠三錢 黑芝麻三錢 沙參四錢 川貝二錢 生龜板六錢 生鱉甲四錢 煨牡蠣四錢 南杏仁三錢 甘草二錢 銀斛二錢 地骨皮三錢

用法：以水三碗約600毫升先煎龜板、鱉甲、牡蠣、銀斛至400毫升，

次入各药，煎至180毫升，去渣，加入阿胶烱溶，分二次服。

疗效：此方治疗十五例，痊愈十例，基本痊愈三例，显著有效二例。兹举一典型病例如下：

何某，男，28岁。患肺癆已十三个月。除具备上述主要症状外，还现倦怠，梦多，遗精等症，經某医院诊断为浸潤期，肺結核。用鏈黴素长期治疗未效。服上方二十九剂痊愈。

来源：区中医院中心門診部 张汉符

六 方

主治：久患虛癆咳血，身体虛弱，脉沉无力。

处方：生龙骨一兩 生牡蠣一兩 萸肉一兩 田七粉二錢 人參一錢

用法：以水三碗，煎至二碗，日服二次，冲田七粉于飯后服。

功用：补气止血。

疗效：此方治愈患者很多，如貴县木梓乡苏××，男性，患咳血二年，脉沉迟无力，面色蒼白，四肢軟弱，咳血不止，用此方治愈。

禁忌：禁止房事。

来源：貴县木梓乡中医 卢燕飞

七 方

主治：虛癆咳血或吐血。

处方：白芨一兩

用法：为細末。每日分三次服，每次一錢，溫开水送下。

功用：斂肺生肌，化痰止血。

疗效：新井岭高××患咳血，用此方治愈。

来源：貴县 陈仕进

八 方

主治：肺癆咳嗽，痰中带血，色鮮紅，面頰潮紅，日晡潮热，夜

难入寐，气喘身热。

处 方：白芨^{五錢研末} 糯米一兩

用 法：糯米煎湯一碗，將白芨末一次送服。

功 用：化痰，止血，理肺伤，止肺血。

疗 效：容县石头区泗福村邹××，于1952至1953年因劳伤咳嗽出血，用此方治愈，后不复发。

来 源：区中医药研究所 李庆云

九 方

主 治：吐血，咳血。

处 方：山枝炭^{四錢} 蒲黃炭^{三錢} 丹皮炭^{三錢} 棕炭^{四錢} 元參^{六錢}
生地^{八錢} 麦冬^{四錢} 桔梗^{四錢} 甘草^{二錢} 訶子^{四錢} 田七^{一錢} 童便^{適量}

用 法：以水三碗，煎成一碗，冲新鮮童便一次服。

疗 效：柳州张××、潘××，均服两剂痊愈。

来 源：柳州市中医院 吳敏

編者按：田七研末冲服，效力更佳。

十 方

主 治：肺癆咳血或痰带血。

处 方：訶子丸：訶子^{四錢} 括蕒^{四錢} 海石^{四錢} 青黛^{四錢} 枝炭^{四錢}

用 法：共研細末，蜜炼为丸，每丸重一錢。每日服三次，每次一丸，口含化或开水送下。

功 用：歛肺止咳止血。

疗 效：此方曾治愈貴县謝某、韦某两例。

来 源：貴县木梓乡中医 韦进高

編者按：此方即訶子散变为丸服，用治热性咳血有歛肺止咳止血之功。

咳 喘 类

治肺燥热咳嗽方

主治：喘咳无痰，鼻翼煽动者，并麻后肺炎。

处方：五虎泻白散：麻黄六钱 石膏一两 杏仁六钱 茶叶三钱 桑白八钱 地骨皮八钱 甘草五钱

用法：以水两碗，煎取大半碗，一次热^酒，连服三天。小儿减半。

附註：大便结或不大便者加大黄五钱。

疗效：此方临床应用曾治愈一百人，疗效很高。

禁忌：忌食猪肉。

来源：柳州市联合诊所 江永龙

治哮喘方

一 方

主治：哮喘。

处方：岩白菜根二两

用法：用水一斤煎取半斤，一日分早、午、晚三次服，连服三剂可愈。如复发，依法再服三剂，永不复发。

附註：此方是十岁以下分量，成人酌加。

疗效：贵州平塘县拉梭乡胡老科，南丹麻阳乡刘治坤等廿余人，均用此方治愈。

来源：南丹县火星人民公社 唐兰亭

编者按：岩白菜又名上石蜈蚣（百色名）、肥知母（武鸣名）。为苦苣苔科植物。学名：Didymocarpus pudica Chun.

二 方

主 治：哮喘，气上冲，呼吸困难，不得卧。

处 方：牛奶浓^{四兩}_{切片干的} 猪肺^{四兩}

用 法：以水三碗放沙鍋內密封煮四至六小时，剩水一碗，一次服。

疗 效：此方經治疗卅例，疗效很高。

来 源：永福县 秦鏡宇

編者按：牛奶浓又名五指牛奶、土五加皮（南宁名）。为桑科植物。学名：Ficus hirta vahl. var. palmatiloba (Merr.) chun

三 方

主 治：哮喘，喘急不能卧，或喉中如水鸡鳴。

处 方：冬花^{四錢} 貝母^{四錢} 麻黄^{四錢} 茯苓^{一兩} 白果^{二兩} 七叶蓮^{五錢}

用 法：共研細末，蒸两小时，以桑白二兩煎浓汁为丸，每丸重一錢。早晚各服一丸，薄荷湯送服。

功 用：溫肺，化痰，定喘。

疗 效：（一）黃炳义，男，42岁，古太人。自幼患哮喘病，每月发作一次。久旱久雨，病更易发。发时，呼吸喘急，上气不接下气，不得卧，持續六、七天，时发时止。1937年用此方治疗，服丸药一料，至今未見复发。（二）李静华，女，48岁，古太人。患哮喘約十年，发时气喘，咳嗽，不得安卧。每月发二、三次，发时服麻杏石甘湯則愈，但不能根治。1958年春，服此方丸药一料，至今未見复发，虽过食燥热物，亦祇咳而不喘。此方亦可治百日咳，經試用疗效很好。

来 源：岑溪县东方紅公社 黃传国

編者按：七叶蓮即七叶一枝花。为延齡草科植物。学名：Paris polyphylla sm.

四 方

主治：呼吸急促，喉間有聲，上氣不接下氣。一月一發或數發，或數月一發。

處方：竹葉柴胡適量

用法：研末。每次用一至三錢，蒸豬腰或豬肉服，日服二次。

療效：（一）北流新圩鄉覃坑工區李盛超，14歲。自幼患哮喘，每月發作一、二次，服此方而愈。（二）北流防疫站吳站長之子，患哮喘，用此方治愈，至今半年，未見復發。

來源：北流縣新圩 陳祖慶

附者按：竹葉柴胡又名黃花草，為繖形花科植物。學名：*Bupleurum falcatum* L.

五 方

主治：寒溫失調，或氣候驟變，哮喘即發，痰鳴喘息，不得臥，時止時發。

處方：蟾蜍一個（背部雜有紅色彩的，去腸什） 生半夏適量

用法：將生半夏填滿蟾蜍腹中，放沙鍋內。鍋外以鹽泥封固，用谷壳堆燒一夜煨成炭，研末，瓶貯密封備用。每日服一次，每次服三錢，開水送服。

附註：發時，服此藥至喘止後繼服二至三次。下次發作則病情減輕，時間縮短，如此連續治三、四次，病勢會由逐漸減輕而痊愈。服藥時兼灸肺俞，天突三至五壯，收效更快。

功用：除痰，下氣，解郁，散結。

療效：金星公社付榮營黎淑英（女，30多歲）、龍山營欽坑村李炎南之孫（8歲）、衛星公社羅莫村黃甲華之子（13歲）、平南縣大州鄉馬王村蘇欽之子（10歲）均服此方而愈。愈後迄今已數年，均未復發。

來源：藤縣金星公社新慶醫院 蘇彬

六 方

主治：哮喘日久，遇寒即发，呼吸困难，不能卧，甚则抬肩喘息，或顽痰致喘。

处方：石决一兩 南星五錢 川朴三錢 建曲三錢 鐘乳石一兩 礞石^{一兩}_煨 天竺黃五錢 法半夏三錢 枯礬三錢 淡豆豉四錢 信石^{四分}_{煨為末，后入}

用法：共为研末，加入信石末和匀，以姜汁和麵为丸如黄豆大。成人每次服六粒。儿童每次三粒。开水送服。

功用：降逆，除寒痰，定喘。

疗效：此方系区中医药研究所顾问黄嘯梅传授驗方，曾治愈九十余人。

来源：桂平罗秀公社 庞品珍

七 方

主治：哮喘病，每于气候变化发作，时发时止。

处方：馬油（馬脂肪） 白米飯各適量

用法：用馬油与白米飯混合炒熟，冷后食，每日食一次。

疗效：黄惠仙，女，45岁，住百色县城廂街渡口屯。19岁时起患哮喘病，經多方診治，无效。1957年8月用此方治疗，仅服四次即痊愈，至今未复发。

来源：百色超英公社医院 黄可宜

八 方

主治：咳逆上气，喘鳴迫塞，不得卧，胸滿胀，或鼻塞流清涕，或面目浮肿。

处方：麻黃二錢 杏仁四錢 生石膏五錢 甘草一錢 葶藶^{二錢}_{煨紙炒} 大棗^{五枚}_{肥大的}

用法：先煎麻黃、石膏数滾，去上沫，后納諸药同煎。日分二

次服。

功用：泻肺，祛痰，定喘，下气。

疗效：潘××，女，38岁，住新垌公社理珍工区。患哮喘病多年，屡医不愈，年发十余次。发时喉如水鸡声，喘急不得卧。服此方，二剂，愈。新垌公社谷塘工区杨美树（男，36岁）、覃春田（男，66岁）患咳嗽气喘不得卧，均服此方而愈。

来源：桂平新垌公社谷塘工区卫生所 楊銀河

编者按：此方系仲景麻杏石甘湯、葶歷大枣泻肺湯合剂。治肺有实热胸胀满，痰喘气促者有效，若寒性哮喘不宜用。

九 方

主治：寒温失调，哮喘即发，喉间喘息有声。

处方：鸡蛋十四枚

用法：将蛋放瓦钵内，以健康男人小便浸泡七昼夜，取出清水漂净用。用时以湿透粗纸，包裹鸡蛋数层，煨熟，每天早晚各服一枚，七天服完。

疗效：此方经献方人试用于不同年龄男女八十多人。其中最小的4岁，最老的45岁，获痊愈的有垌心圩姚静芳等四十多人，无效的仅一人，其余均获不同程度的减轻。均无副作用反应。

来源：桂平县新垌公社医院 姚觉頑

编者按：此方出驗方新編。

十 方

主治：久年哮喘，气急促，喉中如水鸡声。

处方：蟾蜍散：花椒一兩 生半夏三兩 老生姜四兩 蟾蜍三只

制法：先将蟾蜍肚剖开，每只肚内放花椒一錢，縫好。余花椒七錢及生半夏、老生姜連蟾蜍同时放入新瓦煲，用谷壳煨存

性，研末，篩去粗渣，取粉入瓶，封固备用。

用法：每日早晚服一次，每次二至三錢，開水送服。小兒酌減。
如痰多用陳皮煎湯送服或姜湯亦可。

療效：這秘方是周華軒老醫師傳授。獻方人用此方治愈十三人，療效達80%。茲舉一例：上蓮鄉蓮塘村黎七叔孫女，11歲。患哮喘病，醫治數年不愈，服此方半劑，痊愈。

禁忌：寒涼食物。

來源：貴縣石卡鄉西山 梁晉賢

十 一 方

主治：體質虛弱，一遇風寒即發哮喘。

處方：柚子皮一只 黑肉雞一只

用法：雞去毛及內臟，以柚子皮納雞肚內，用沙紙密封，黃泥包裹，燒熟，去黃泥、沙紙，取雞食，食三、四次即愈。

功用：補虛化氣，消痰，定喘。

療效：曾治愈新德鄉羅樹培、辛鴻祥等十一人。其中有患哮喘十七年的，服此方亦愈。

禁忌：熱性哮喘不宜服。

來源：桂平縣蒙圩公社 龍贊深

針灸立止哮喘方

主治：支氣管喘息，呼吸困難，痰涎壅盛，不能平臥。

取穴：臍中

手法：以一寸毫針向臍中穴直刺，俟有抵抗感時向下平刺直至患者感覺有氣向下腹放散時即留針十至十五分鐘。

療效：南寧市聯合醫院治療六例，均立止喘。茲舉二例：（一）陳明超，男，51歲。患哮喘病已七年，遇寒輒發，初服氨茶鹼有效，繼則無效。4月2日哮喘發作，到院門診，針刺臍中穴廿分鐘左右，哮喘立刻緩解而止。（二）汪烈，

男，61岁。患哮喘已八年，经常发作。4月16日因哮喘发作到院門診，施以針刺膻中穴約廿分鐘左右，哮喘立刻緩解而止。

来源：南宁市联合医院 龔玉平

吐血类

治吐血咯血方

一 方

主治：吐血，咯血，发热咳嗽，痰中带血，喉干口渴，額赤胸悶，胸肋疼痛，皮肤灼热，煩躁不安。

处方：仙鶴鮮柏湯：茅根八錢 側柏叶八錢 仙鶴草一兩 生地五錢 元參四錢 丹皮三錢 白芍三錢 鮮荷叶一小張

用法：以水四碗，煎成一碗，分三次服。

附註：热甚加犀角一錢。

疗效：柳州市棉織厂职工，沈××、印刷厂梁××均因急性热病引起吐血甚剧，各服三剂皆愈。

禁忌：服藥期間，忌食辛辣食物，孕妇禁服。

来源：柳州市中医院 唐鵬

二 方

主治：吐血、咳血、衄血。

处方：旱蓮草二兩 白茅根一兩五錢

用法：以水三碗和少許瘦猪肉同煎至一碗半，分三次服。

功用：清热止血。

疗效：（一）苏黄梁××，男。1957年患肺病咳血，胸热喉干、气微粗、咳血随痰而来，經治疗无效，以此方治疗，連服

三剂而愈。(二)蒙陆蒙××,男。1958年患肺病咳血,每咳血随痰来。用此方治疗,服药四天,血止。(三)蒙陆蒙××,男。1958年因胸部撞痛,引起咳血,服此方三剂,血止。

来源: 贵县八塘 高卓带 梁治民

三 方

主治: 大吐鲜血。

处方: 坟墓旧石灰^{一块} 炒黄和鸡蛋大 韭菜自然汁一杯

用法: 将旧石灰用童便煮,滤去渣,加韭菜自然汁一杯冲入,同服。

疗效: (一)靖西武平区三足乡宛如屯黄××,男,12岁。1956年夏,忽吐血,半天未止,服上方两次即愈。(二)张××,女,15岁。常一日吐血一次,或二日一次,或一日三次。用上方,服至第二天即愈。

来源: 靖西中医学院 黄振达

四 方

主治: 肺病咯血,胃伤吐血。

处方: 白芨四钱 贝母二钱

用法: 共研末。临睡时用开水顿服,连服三至五天。

功用: 止咳止血,化痰除痰。

疗效: (一)黄××,女,60岁。咯血数年,一月或十日咯一次。过后仍有痰血,久未治愈。服此方二剂,血即止,痰血亦无,一年后因痛风又咯血,仍服此方二剂,即愈。(二)李××,女,43岁。劳动过度吐血数次,服此方三剂即止,至今无复发。

禁忌: 忌食油腻生冷。

来源: 柳州市兴仁路114号 覃保霖

五 方

主 治：一切呕血吐血。

处 方：当归_{四兩} 百草霜_{五錢}

用 法：水二碗，先煎当归，后下百草霜。煎取一碗，分二次服，每隔四小时服一次。

疗 效：曾治三人均痊愈。

来 源：鹿寨县英山公社医院 饒松圃

肺 痛 类

治 肺 痛 方

主 治：肺痛（肺脓瘍）咳嗽，胸痛，咯痰，痰浓气臭。

处 方：金花草_{四兩至一斤}

用 法：以适量水煎一小时，当茶饮。

疗 效：（一）黄××，男，32岁。寒热咳嗽、痰多气臭，发病已一月，X光透视为肺脓瘍。用上药煎水饮，三天后痰量大减。一月后透视，空洞已不明显。二月后透视，空洞消失，炎症吸收好转，咳嗽消失。（二）陈××，女，35岁。1958年2月11日经X光照片检查诊断为肺结核合并肺脓瘍。经用链霉素，结核好转吸收，但脓瘍未愈，痰臭量多。12月30日服上药二天后痰量大减，一月后空洞消失。

来 源：南宁市人民医院

编者按：金花草为华藜科植物。学名：Odontosoria Chinensis L. J. Sm.

失 音 类

治 失 音 方

主 治：病后失音，感冒失音，咳嗽失音。

处 方：青蒿五钱 童便二茶杯

用 法：以水一碗煎青蒿十余沸，冲童便服。小儿酌减。

功 用：滋阴降火，润心肺，散风火，解暑热。

疗 效：此方治愈十余人。献方人子黄凤祺，因病久失音，半年不能言语，以此方治疗，服药后一小时即能出声。沙塘乡善洛村林树交，病失音两月余，服此方一剂而愈。

来 源：柳城县上雷卫生院 黄启暄

编者按：青蒿补阴退热，童便滋阴降火、润心肺、益声。主治久咳上气失音。治阴虚咳嗽声哑亦有效。

黄 疸 类

治 黄 疸 方

一 方

主 治：面目及全身发黄，体倦无力，小便赤。

处 方：细屈头鸡根^{一两} 焙干置地上焙宿去火 鸡肉一两五钱

用 法：水二碗煎成一碗服。

疗 效：1952年至1958年用此方治愈多人。

来 源：桂平县紫荆公社 陈配球

编者按：此方细屈头鸡又名水鷓鴣（桂林名）、土田七、毛七（武鸣名），内心白色，大者名水萝卜，内心黑色。为蛛丝草科植物。学名：Schizocapsa plantaginea Hce.

二 方

主 治： 濕熱發黃。

處 方： 茵陳三兩 紅棗二兩

用 法： 將上藥以適量水濃煎後去茵陳，取藥湯二碗和紅棗分二日服。

療 效： 八塘鄉譚保香妻及鄭人娣同患黃疸病，均用此方治療，服二劑而愈。

來 源： 貴縣八塘鄉 高卓帶

三 方

主 治： 周身黃，眼黃，小便黃，指甲黃。

處 方： 錢串木蘗四兩 豬肉四兩

用 法： 將藥共豬肉以適量水煎，羹食，早晚飯後服一次。

療 效： 新蓮鄉馮放令、李衍安、蘇維平，鳳陽村李亞五等患此症，均用此方治愈。

來 源： 貴縣木梓鄉 李榜佳

編者按： 錢串木蘗又名毛七公、紙錢木（桂南）。有解熱去濕、散瘀消腫作用。為大戟科植物。學名：*Glochidion eriocarpum* Champ.

四 方

主 治： 身面均黃，小便黃。

處 方： 生薈草根（即真金菜根）一兩五錢

用 法： 與豬肉或雞肉蒸吃。第二、三次不加肉煎服。黃疸顏色暗淡者，用枯凡三錢浸三花酒二兩，分二次服，每日早晚各服一次。

療 效： 獻方人用此方治療百餘人，療效達百分之九十以上。

來 源： 鹿寨縣雒容秀水 胡化成

五 方

主治：全身发黄（传染性肝炎），小便短赤。

处方：新鲜黄牛粪不拘多少

制法：取黄牛刚排出之大便，即日炒干，经煮沸过滤，制成50%溶液。用时另加适量蜜糖（或糖精）调味。

用法：每日服三次，每次100毫升（相当于黄牛粪50公分）。

疗效：桂林市工人医院共试用五例，二例于治疗后五日黄疸消失，一例未效（是二次复发者），二例服药后二日已好转。

来源：桂林市工人医院内科

六 方

主治：面目全身俱黄，发热胁痛，口苦而渴，心烦，食慾不振。

处方：黄牛屎二两 荆芥一两

用法：上二味分别炒成炭，用清水三碗煎至二碗，一日分三次服，每隔三小时服一次。

功用：疏风清热，利湿。

疗效：此方曾治疗数十人，均获卓效。一般服药一两天，眼黄渐退，胁痛渐除。发热于第二天消失。连服四天，食慾增进，愈。

来源：藤县南安公社卫生院 蒙启光

七 方

主治：眼白，全身皆黄色，发热，疲倦，嗜睡，不思食，小便黄赤。

处方：茵陈四钱 枝子二钱 大黄一钱五分 银花三钱 连翘二钱五分

用法：以水二碗，煎取一碗，一日分三次服。

附注：大便溏泻去大黄；发热口渴加葛根，小便不利加猪苓、茯苓，消化不良加神曲、枳壳、白术。

功用：清热利湿，疗黄疸。

疗效：陈杰明，女，5岁。因发高热引起黄疸病数天，发热未退。眼白，全身指甲均黄甚，疲倦嗜睡，夜寐不宁，不思食，小便黄赤，大便溏。初诊，用此方去大黄加葛根、茯苓、苡仁，服后热退黄减。再诊，仍用此方去大黄加二苓，眼白肤黄渐减，大便好。三诊，再用此方加神曲、枳壳、白术、茯苓。连服二剂痊愈。

来源：南宁市联合医院兴宁诊所 张保赤

编者按：本方即仲景茵陈蒿汤加银花连翘。

肿 胀 类

治 肿 胀 方

一 方

主治：面目一身浮肿，四肢如瓜，腹如抱甕。

处方：鹿耳苓根一兩

用法：水煎，作茶饮。

疗效：柳州市谷埠街维新一巷52号关××之子关小球，男，4岁。患水肿鼓胀，面目四肢浮肿如瓜，腹如抱甕。经医院及中西医治疗数月，无效，用此方治疗两星期，病状逐渐消失而愈。

来源：柳州市柳石医疗站 黄海波

编者按：鹿耳苓又名陆绩消（南宁名）。为菊科植物。学名：*Laggera alata* Sch—Bip.

二 方

主治：腹部及四肢浮肿。

处 方：地谷根一錢五分 雄黃三分

用 法：地谷根研末加雄黃末，于上午三时一次冲开水服。服后三小时，皮痒腹痛，即泻下黄水十多次。若泻不停，可吃冷粥一碗即止。

疗 效：庆丰乡黄××，男性。患大腹水肿，服此方愈。桂平石龙黄××，亦患此症，經用此方治疗，泻下十余次，腹肿消失，后服健胃药，痊愈。

禁 忌：忌食盐。孕妇及身体虚弱者忌服。

来 源：贵县庆丰乡 何乐廷

编者按：地谷根，又名山黄皮、地巴麻、雀儿麻。科属学名见疟疾类第三方（第17页）。

三 方

主 治：全身浮肿，表皮呈透明状，气喘，不欲食，神疲，肢体重倦。

处 方：赤小豆四兩 商陆二兩 大蒜头二兩

用 法：用水液煎，分二次在一小时内空心服完。服后用盖屋上的旧茅数斤，煎水洗身。翌日小便下黄水，多而且长则愈。

功 用：行气，利水，消肿。

疗 效：此方先后治愈七人。

禁 忌：孕妇忌服。

来 源：桂平县防疫站 黄寿昌

编者按：商陆广西产，又名勒蘆。用大量无毒，但非本草中商陆，本草記載者有毒，用时宜注意。

四 方

主 治：腎虛水肿，先由头面以及上肢浮肿，逐漸遍及全身。

处 方：实脾消水飲：附子六錢 桂心二錢 白朮五錢 羌皮四錢 猪苓五錢 泽泻五錢 砂仁二錢 商陆三錢 茯苓皮一兩 大腹

皮五錢 草豆蔻二錢 牛膝五錢 麻黃二錢 防己五錢 木瓜六錢

用法：水三碗煮取一碗，去渣，乘熱燭桂心片，分二次服。

功用：溫腎實脾，利水消腫。

禁忌：孕婦忌服。

療效：患者×××，女，35歲，服上藥七劑愈。

來源：柳州市中醫院 吳敏

編者按：此方對腎陽衰弱水腫者宜，對實熱症慎用。

五 方

主治：因缺乏營養，全身及面目浮腫，四肢尤甚。身重氣喘，疲倦乏力，食慾不振。

處方：米皮糠一斤 黃豆四兩 花生仁四兩 糙米四兩 豬骨四兩 黃糖八兩

制法：先將米皮糠、黃豆、花生仁、糙米分別炒香黃，豬骨炒黃，研成粉末。後將黃糖煎（不用水）溶，加入藥末，搓勻即得。

用法：每日服二次，每次服二至四兩，用開水送服。虛寒人用酒送服。

功用：補養健脾，去濕消腫。

療效：輕症服藥一料，重症服藥二料即愈。1956年和1957年用此方治療多例，效果很好。

來源：藤縣城關公社衛生院 黎志清

六 方

主治：水腫，氣脹，水瀦。

處方：小皂角二錢 黑白丑二錢 檳榔二錢 陳皮二錢 大黃二錢 甘遂二錢

用法：共研細末。每日早晨空腹服，每次二錢，姜湯送下。

療效：蒙陸鄉蒙××，陳鄉黃××、蒙××之妻、黃×之媳、

岑西乡李××之妻等患此病，均用此方治愈。

禁忌：孕妇忌服。

来源：贵县八塘乡 李展华

七 方

主治：腹水，或下肢浮肿，小便不利。

处方：苦参十五兩 赤小豆五兩

用法：先将赤小豆加水少許，浸至出芽后，晒干研为細末。苦参加水4000毫升，煎取1000毫升，过滤后仍如前加水再煎二次，将前后三次药液混合，低温浓缩为500毫升，然后将苦参浓缩液及赤小豆末各分作五份，每日混和服一份，服至全消为止。

功用：利水去湿。

疗效：此方治愈十余人，现举两例如下：（一）1955年城廂黃××，男，26岁，业农。患两脚浮肿，按之没指。步履乏力，腹大，两脸赤肿，卧时呼吸困难，小便不利，大便时溏，体瘦弱，精神倦怠，能食不多，腹不痛，扣诊腹有振水音，腹围九十一公分，听诊心搏有收缩期杂音，门静脉轻度扩张。据诉患已二月余，曾食草药未愈。投以此方，第一日至第二日小便增加六倍，腹觉饥饿，食欲增进。第三日至第六日，仍服此方，尿量比第一日减少，但仍较原来增加，食欲有增无减。第六日腹围已减至八十二公分，卧时呼吸已顺，下肢浮肿消失较慢，先由脛部渐至足踝，最后两脸浮肿亦告消失，历廿一日治愈。愈后继续给强壮健脾剂调补，三年未复发。（二）1955年胜阳郑××，男，48岁，业农。患症与前例大致相同，但年老衰弱较甚，不能食，营养欠佳，阴囊亦肿，腹围八十七公分。巩膜微黄，心搏无杂音。患病已三四月，体日消瘦，腹肿渐加，步履非常吃力，服此方三天，停二天另服壮补剂二天，第

六日又服此方，第七日服壯補劑，如是輪迴服食十五天，痊愈。

此方特点，使用一至三日，腫度消退及利尿非常显著，食慾增進。至六七日后效果漸減。故凡遇体弱，营养較差者，必須如第二例治疗，痊愈較速。

禁忌：忌食盐。

来源：忻城县加仁 何雪松

八 方

主治：全身水肿（急性腎炎），先由头面肿起，漸及全身，小便短少。

处方：茅根八兩

用法：用水2000毫升入瓦罐內煎至1000毫升，分二日作飲料服。

疗效：南宁铁路医院李煥祥医师用此方治愈多人。茲举一例：周日娥，女，护士。1959年4月3日突然小便頻数，量少，头面四肢浮腫，下腹疼痛。驗尿蛋白(卅)，紅血球(卅)。診斷为急性腎炎。用茅根煎水飲，共用去茅根一斤半，痊愈。

来源：南宁铁路医院

九 方

主治：头面四肢肚腹水肿，二便減少，食慾不振。

处方：（1）烏臼根三錢 麦芽四錢 土甘遂二錢 大棗二錢 阴阳草三錢 二丑三錢 大黃_{二錢后下}

（2）党参二錢 白朮一錢五分 茯苓二錢 炙草一錢五分 木香_{三錢后下} 厚朴_{二錢后下} 山渣二錢

用法：一方用水二碗半，煎成一碗，一次服。二方用水二碗半煎成八分一次服。第一天服第一方，服后泻下两天。第三、四天服第二方，連食两日，每日一剂。第五天又服第一方一剂。連泻两日之后，服第二方去山渣加北芪、淮山，連

服二星期便愈。

疗效：陆起白，男性，6岁，靖西大道屯人。1957年12月，肚腹、脚及头部肿胀，食慾不振，口不渴，二便减少，不能寐，舌苔色赤有刺，眼潮红，脉浮大。服上药两星期，愈。

禁忌：孕妇忌用。

来源：靖西中医学院 罗发重

编者按：烏臼为大戟科植物。学名：Sapium sebiferum Roxb。
土甘遂为大戟科植物。学名：Euphorbia jolkini Boiss。
阴阳草为蓼科植物。学名：Tiniaria japonica Hedb。

十 方

主治：腹部膨胀，手足面目浮肿，或腹肿胀，青筋暴露，四肢微肿或消瘦，小便不利。

处方：白芥子三钱 桑白三钱 甘遂三钱 葶藶一钱五分 大戟三钱
江子肉^{三钱}_{去油} 芫花一钱五分 蒿苳三钱 連翹三钱 泽泻三钱
丑牛三钱 茯苓三钱 木香一钱 赤小豆三钱 萊菔三钱
蒼朮三钱 莪朮三钱 枳实三钱

用法：共研末，炼蜜为丸如黄豆大，硃砂为衣。每晨服一次，每次十丸，开水送下。

功用：行气消积，利水。

疗效：此方系献方人祖传秘方，曾治愈病者百余人，經北流医药研究院調查患者，效果确实。又六麻里村黎××，30岁，胎前子肿，产后更甚，服此方五天，浮肿全消。

禁忌：孕妇忌服。

来源：北流县六麻卫生所 龙德彪

十 一 方

主治：一身、四肢及头面均肿，按之没指，凹陷久不能起。

处方：白矾一钱 茵陈一钱五分 正春砂一钱 紅鯉魚^{一尾}_{十兩重}

用法：上三味共研細末。紅鯉魚去內脏，淨布抹下，納藥末入魚腹內，蒸熟，空腹一次服完。

功用：行气，去湿，利水，消肿。

疗效：献方者之父曾用此方治愈自己肿病。林岭苏××，一身、头、面、四肢及阴部均浮肿，皮肤光亮，按之没指，凹处久不起，服此方数剂而愈。

来源：田东县和平公社医院 刘善廷

十二方

主治：全身浮肿，阴囊肿大发亮，大便溏少，小便短少而黄，饮食不佳，舌苔厚白，脉沉实。

处方：商陆一两

用法：研为細末。每日二錢分三次服，每隔四小时服一次，飯前用开水送下。小儿酌減。

功用：大泻脏腑水飲，专作利尿药。

疗效：（一）黄××，男性，9岁。全身及阴囊浮肿，大便溏少，小便短黄，服此药四日痊愈。（二）英山韦××，女性。患浮肿，服此药亦获痊愈。

禁忌：孕妇忌服。

来源：鹿寨人民医院中医科 罗彦

十三方

主治：腹部膨胀，四肢浮肿，呼吸迫促。

处方：柚果皮二個 蒜头^{半斤}_{去衣}

用法：用水泡浸柚皮两天后，切片，同蒜头用清水煎作茶飲，用渣搽洗肿处。

功用：下气，除湿，消肿。

疗效：（一）欧××，男，50岁。腹部膨胀，全身浮肿，按之没指，陷处随手而起。气喘，消化不良，經医未愈。用此

方，三服而愈。（二）李××之妻果化船家人。患如上症，用此方五服痊愈。

来源：田东县和平公社 刘善庭

十四方

主治：全身浮肿，面部尤甚，两眼包浮肿，口渴，腰胀，小便频数，四肢浮肿，压之凹陷，久未复原。

处方：白术三钱 附子二钱 细辛五分 木通三钱 酒军二钱

用法：用水二碗，煎取碗半，一日分二次服。

功用：温肾，利水，消肿。

疗效：陈××，男性，29岁，藤县人。1958年11月患肾脏水肿，入院治疗。其症状面目及全身浮肿，眼包肿大至目不能开，指压四肢皮肤，凹痕久未复原。膝反射稍迟钝，心肺正常，尿检有蛋白（+++）。曾用链霉素、青霉素、葡萄糖等治疗无效。12月24日转用中药八正散、五皮饮等亦无效。1959年1月21日，服此方，22日浮肿即开始消退。将此方加木通去酒军连服至28日，浮肿完全消失。

禁忌：孕妇忌服。

来源：藤县中医药研究院 江希甫

十五方

主治：正水（心脏水肿）气喘，身以下浮肿，头暈，食慾不振，神衰脉弱，怔忡。

处方：北芪六钱 防党八钱 归身八钱 云苓二两 白术五钱 枣仁五钱 附子三钱 故纸三钱 车前五钱 泽泻五钱

用法：以水三碗半，煎至一碗，分三次服。

疗效：甘××，男。患上症到区中医院诊治，服上方五剂而愈。

来源：区中医院中心门诊部 温国仁

十六方

主治：头面四肢或全身浮肿，先由眼下或面部肿起。

处方：防己五錢 白朮四錢 大枣五枚 蒼朮四錢 泽瀉四錢 北芪八錢 生姜三錢 炙草五錢 云苓五錢 桂枝三錢 另济生肾气丸四錢
成集

用法：以水三碗，煎成一碗，分早晚二次送服济生肾气丸二錢。

禁忌：戒盐一百天。

疗效：（一）柳州市茂名工地工人錢××，患慢性肾炎水肿已两年。在武汉医学院留医未愈。初到工地医院检查，蛋白（卅），腹水严重，全身浮肿，經服药二月多，症状全失。蛋白（士）。（二）胡××，女，湖南人。由武汉到茂名工地二月后，便发现浮肿，先由脸部肿起，渐及全身。經用上方处理，服药两月，即基本痊愈。

来源：柳州市茂名第二建筑工程公司工地医院

十七方

主治：全身浮肿及腹水。

处方：田螺六個 車前子三錢 大蒜一個

用法：共捣烂成餅，敷臍部，每日換一次。

疗效：此方据桂北铁路医院留医部治疗慢性肾炎，效果极佳。患者經敷药一周后，浮肿及腹水均消失，小便中之蛋白質亦消失。如治传染性肝炎合併早期腹水及浮肿，經治疗一周后，浮肿及黄疸亦显著消退。

来源：桂林市工人医院内科

编者按：此方出自驗方新編。

針灸治療水腫（慢性腎臟炎）

一 方

主治：水腫顏面蒼白帶浮腫，全身四肢均腫，朝寬暮緊，皮膚光澤，尿量短少，心悸，氣緊。

取穴：水分 足三里 復溜 腎俞 氣海 關元

用法：前四穴用針，後二穴間接灸。

附註：水分穴古人列為禁穴，但據獻方人經驗，運用此穴收效極佳，並無副作用。

療效：此方法曾治十餘例，均收效良好。茲舉二例：（一）柳州市灣塘路李××，曾在前省立醫院治兩月無效，後經獻方人治療，僅一個半月即恢復健康。（二）柳州市人民醫院鍾醫師之子亦患此症，用此針灸連治二月痊癒。

來源：柳州市工人醫院 羅毅夫

二 方

主治：全身浮腫（營養性水腫），腹部膨滿，走路時胃部搖動，四肢困軟無力。飲食初旺盛，後減退，形成消化不良。面色蒼黃，脈搏虛遲。

取穴：1.針：脾俞 胃俞 腎俞 足三里 三陰交 陰陵泉

2.灸：胃俞 中脘 水分 氣海 關元 水道 足三里

用法：上項穴位，每項每次取三、四穴，輪流針灸。針用輕刺激不留針，灸用懸灸。每隔一天或兩天針灸一次，少則三次，多則五次即癒。

療效：1958年曾針灸四十餘例均癒。同年板細醫院針灸十餘例亦癒。其中有數例兼服蜂蜜半斤，以適量開水沖服，收效更快。

來源：上思縣鳳凰人民公社板細醫院 韋煥卿

治 膨 胀 方

一 方

主 治：腹胀痛，膨大如鼓，青筋暴露。

处 方：青蛙^{二只}_{酥炙} 蝼蛄^{七个}_{炒枯} 葫蘆^{五钱}

用 法：研末为散。每日服三次，每次三钱，每隔四小时服一次。
服时用热酒冲，空腹服。

功 用：利水道，除胀消肿。

疗 效：此方經治愈十余人，疗效显著。茲举一例：吳××，男，36岁，住桂平新木公社祝兴二区。患腹胀数年，多方治疗无效。其症状：腹胀痛，膨大如鼓，青筋暴露，不能进食，大便或溏或结，小便短少，給上方早午晚空腹时，各服一次，服药后大小便通利，胀痛減輕，第二天已能进食。繼續进药，第三天肿胀消失，食量递增。再服药两天，痊愈。

禁 忌：孕妇忌服。

来 源：桂平县新木公社 区警新

二 方

主 治：臌胀（晚期肝硬化）

处 方：山甲^{三钱} 鳖甲^{一兩} 三棱^{三钱} 莪术^{三钱} 田七^{一钱}_{研末} 冲服
玉金^{五钱} 当归^{一兩} 党参^{六钱} 北芪^{一兩} 白术^{一兩}
云苓^{八钱} 炙草^{二钱} 法下^{一兩} 干姜^{二钱} 桃仁^{四钱}
土鳖^{三钱}

用 法：以水五碗，先煎鳖甲、山甲成三碗，納諸药，煎成一碗半，分二次冲田七末服。每日一剂。

附 註：如患者发热，則去参、芪、术、草，加秦艽六钱，青蒿三钱，黄芩三钱，骨皮六钱。須服药数十剂至症状消失为止。

疗 效：罗婉芳，女，54岁，柳州市解放南路21号。1956年6月右

上腹經常脹痛。10月大便溏，右腹脹大。1958年惡化，全腹脹大，常昏迷，到外地某醫院確診為晚期肝硬化，証實此病。回柳州到柳州市中醫院治療，經用上方連服十劑，症狀消失，精神強壯，肝尖余一橫指，質軟。出院後繼服三劑，痊癒。

來源：柳州市中醫院

風 濕 類

治 風 濕 方

一 方

主治：慢性風濕。

處方：（一）過江龍三錢 三稜三錢 大小紅浸勒各二錢 大風艾二錢 劉寄奴四錢

（二）金櫻子二兩

用法：第一方以水二碗，煎取一碗，分兩次服。亦可做浸劑，或研成丸劑。

第二方可以好酒浸，分早晚隨量飲服。或加豬骨煲服更佳。

療效：新圩覃坑陳十嬌，65歲。16歲時患風濕，連年醫治無效。1952年10月，骨痛不能起床，服上方七天而愈。陳祖耀、楊傳溪、黃桂新三人，患風濕，用此方治愈後，已三年未復發。

禁忌：孕婦忌服。

來源：北流縣，陳祖慶

編者按：大小紅浸勒又名出山虎、入山虎、虎掌勒、象皮勒、攔路蛇、大小懸鉤子。為薔薇科植物。學名：大紅浸勒 *Rubus Tephrodes* Hce. Var. *Setosissimus* Hand—MZT, 小紅浸勒 *Rubus Parvifolius* L.

過江龍為禾本科植物。學名：*Phragmites Vulgaris*

(Lam.) Trin.

大风艾为菊科植物。学名: *Blumea balsamifera* D C.

二 方

主 治: 脚膝腿肿, 骨节疼痛, 不能履地。

处 方: 山甲白眉泽兰饮: 山甲三钱 泽兰三钱 白眉三钱 独活三钱
松节五钱 牛膝二钱 川乌二钱

用 法: 以水一碗半, 煎至大半碗, 作一次温服。

功 用: 祛风祛湿壮筋。

疗 效: 东源乡丘锦福患腿肿, 骨节疼痛, 不能履地, 服此方愈。

禁 忌: 孕妇忌服。

来 源: 贵县大圩乡 周文静

三 方

主 治: 脚肿胀坚硬。

处 方: 木瓜汤: 苡仁一钱炒 川芎一钱 桂枝三钱 苏叶一钱五分
熟附三钱 甘草一钱 吴萸三钱 木瓜八钱 独活五钱
白芷二钱

用 法: 用水三碗, 煮至碗半, 分三次服。

疗 效: 高湓乡卢锡玲患此症, 连服此方二剂而愈。

来 源: 贵县八塘乡中医 李展猷

治风湿骨痛方

一 方

主 治: 风湿腰痛, 或骨节痠胀疼痛, 甚则手不能举, 足不能步。

处 方: 石南叶三钱 独活一两 细辛三钱 川乌头三钱 桂枝四钱
续断三钱 走马胎五钱 川芎四钱 归身三钱 乳香三钱 香
附三钱 川木瓜八钱 杜仲八钱 防己八钱 牛膝六钱 金边

土鱉八錢 三花酒三斤

用法：酒浸七天后，每天早、午、晚飯前一小時各服一次，每次服一兩左右，服一至二劑可愈。服藥五天後，有全身表皮發癢反應。

功用：驅風，祛濕，活絡止痛。

療效：羅播區糧管所楊××，石咀區从××都患風濕腰痛，經县人民医院治療未愈，此方浸酒，服二至三劑，痊愈。

禁忌：孕婦忌服。

來源：桂平縣防疫站 黃壽昌

二 方

主治：風濕骨節腫痛，不能行動。

處方：川烏一錢五分 草烏一錢五分 獨活二錢 桑寄生五錢 秦艽二錢 松節三錢 川瓜二錢 靈仙一錢五分 姜黃一錢五分 加皮三錢 走馬胎二錢 苡仁五錢 枸杞根三錢

用法：用水二碗半，煮取一碗半，一日分二次服。

功用：驅風寒，利濕，通經絡，消腫，止痛。

療效：盧俊南、劉世輝、李品蘭、盧錫田妻先後患骨節腫痛，不能行動，均用此方治愈。

禁忌：孕婦忌服。

來源：容縣黎村英雄公社平洛醫院 黎元驥

三 方

主治：風寒濕痺，關節疼痛麻木，手不能舉。

處方：桂枝三錢 白朮四錢 黃芪五錢 當歸四錢 附子一錢五分 川芎二錢 獨活三錢 防風三錢 寄生五錢 甘草一錢五分

用法：以水三碗，煎成一碗，一次服。

療效：北流蒙慶庄，女，39歲。兩肩關節及膝關節疼痛麻木，右手不能高舉，旋癱瘓無力，舌色平潤，脈象虛緩。1959年

4月6日到区中医院中心門診部門診，服上方三剂，愈。

来源：区中医院中心門診部 周基邦

四 方

主治：骨节痛不能行动。

处方：独活三钱 寄生三钱 秦艽三钱 防风三钱 桂枝二钱 川仲二钱 半夏一钱 川芎二钱 北辛二钱 牛膝^{二钱}_{酒炒} 党参三钱 炙草一钱 菖蒲一钱

用法：以水二碗，煎至一碗，分二次服。

功用：祛风湿，利筋络。

疗效：此方曾治愈数人。

来源：桂平县平地卫生所 卢蔭文

五 方

主治：湿痺，双足痠麻，步履无力，小便少，大便溏。

处方：杜仲五钱 續断五钱 牛膝四钱 草薢四钱 川芎二钱 絲瓜絡四钱 独活二钱 云苓五钱 苍术三钱

用法：以水600毫升煎成200毫升，二次服。

疗效：赵××，男，中共梧州市委秘書。1956年5月覺两脚痠麻，步履无力，登高下楼覺震顫，小便短，大便溏，脉滑。投以此方，四天症状減輕，八天痊愈。

禁忌：孕妇忌服。

来源：区中医院中心門診部 陈紹綜

六 方

主治：风湿骨痛（急性关节炎），湿聚热蒸，蘊于經絡，寒顫热熾，骨骼煩疼，面色微黄，舌色灰滞，脉浮緩。

处方：杏仁五钱 滑石五钱 連翹三钱 山枝二钱 苡仁五钱 法夏三钱 蚕沙三钱 海桐皮三钱 赤小豆皮三钱 姜黄二钱

用法：以水三碗，煎成一碗，分二次服，四小时服一次。

疗效：（一）黄××，女，25岁，住解放南路140号，患本症服此药四剂即愈。（二）黎××，女，22岁，住柳州染织厂。患湿热骨节烦疼，服上药四剂，愈。

来源：柳州市中医院 唐鹏

编者按：此方乃温病条辨宣痺湯減防己。

針灸治疗风湿

主治：右下肢及两腿风湿疼痛，行动不便。

取穴：足三里 风市 崑崙 悬鐘 阳陵泉 犢鼻

手法：强刺法，留針廿分鐘。

疗效：1957年背壩乡 陈×× 和 余×× 患风湿，針灸一次即痊愈。

来源：鹿寨寨沙医院 刘炳运

針灸治湿痺（慢性关节炎）

主治：风湿痿痺（慢性关节炎）膝、足、肘、肩胛等大关节疼痛，不紅不肿，与天气转变无多大关系，經年累月不愈。

取穴：阳陵泉 膝眼 委中 肩髃 肩井 曲池 阳谿 解谿 邱墟

手法：每次选四五穴，进針后用中等度雀啄术，留針十五分鐘。并于針后加悬灸十五分鐘。

疗效：南宁市第一联合医院观察廿五例，計膝关节九例、足关节五例、肩胛关节六例、肘关节二例、腕关节三例。平均針灸三次以下的十八例，五次以下的四例，十次以下的三例。治疗效果：痊愈的十八例，好转四例、无效二例、一例不明。典型病例如下：

（一）黄××，女，63岁。患右足关节痛三月余，行动不便，經多方医治无效。1959年2月24日到南宁市第一联合医院門診，检查局部无紅肿，有压痛，診为慢性关节炎，

施以針灸治療。針刺解谿、邱墟，灸天應三次後，疼痛基本消失，行動自如。至今四月，未見復發。（二）梁××，女，60歲。患右膝關節痛已年餘，行動不便，曾服中西藥及貼膏藥等均無效。1959年3月3日到南寧市第一聯合醫院門診，檢查右膝關節不腫，有壓痛，診斷為慢性膝關節炎，施以針刺膝眼，陽陵泉，委中等穴。針三至五分鐘，先後五次，膝關節疼痛完全消失，迄今二月余未復發。

來源：南寧市聯合醫院 龔玉平

治 癱 瘓 方

一 方

主治：下肢癱瘓無力，痺痛。

處方：癱風藤 橙子葉 牛折條草 地蘇羅各等分 冰片適量

用法：上藥半料煎水內服；半料搗溶外敷患部。每日服敷藥一、二次，連續使用至自能起立行動後兼服下方，防止復發。

處方：水菖蒲 辣椒根各等分 雞蛋兩個

用法：先將雞蛋整個煮熟，搗破去皮。待上藥煮好，再將雞蛋放入，共煮約十五分鐘，連蛋一次內服。日服一劑，連服五六劑。

療效：（一）1952年凌樂縣邏樓公社陳××患右足疼痛麻痺萎縮已六月，用此方治療一月，痊癒。（二）邏樓公社歌磨大隊陳××，男性。患右足外側疼痛已一年。1956年10月，以此方治療一月，痊癒。（三）歌磨大隊龍頂屯曾××，女性，32歲。患兩足麻痺痛已四月，臥床不能轉側，以此方治療十天，痊癒。

來源：凌樂縣邏樓公社歌磨大隊民辦醫院 陳先業

編者按：癱風藤又名半風藤（百色名）。為毛茛科植物。學名：*Clematis meyeniana* Wall. var. *granulata* Fin. et Gagn.

牛折条草又名小薊、牛舌条草(百色名)、牛口參(南宁名)、牛口勒(南宁名)。为菊科植物。学名: *Cirsium sinensis* Gardn. et Champ.

地苏罗又名地毡(百色名)、土馬棕。为土馬棕科植物。学名: *Polytrichum Commune* L.

橙子叶据献方人指示标本是酸柚子叶。为芸香科植物。学名: *Citrus sinensis* Osbeck.

水菖蒲为天南星科植物。学名: *Acorus Calamus* L.

辣椒根为茄科植物。学名: *Capsicum annum* L.

二 方

主 治: 下肢麻痺痿癱。

处 方: (一) 外洗方: 大风艾 勾藤 角螺风 牛耳风 五指风 紅蓖麻莖 紅枫沙木莖 退骨木 入骨子顛 地貢草茹 走馬风 鸡爪风 葱头 榕木叶各等量

(二) 內服方: 归身五錢 北芪五錢 防风二錢 独活三錢 羌活三錢 防党五錢 白朮五錢 炙草五錢 鱉甲五錢 熟附一錢 桂枝一錢 川仲四錢

(三) 配合針灸: 取穴: 阳陵泉 阴陵泉 商丘 承山 环跳 风市 腧崙

用 法: (一) 方以适量水煲浓, 日洗患部二次。(二) 方以淨水三碗, 煎取一碗半, 分三次服, 每隔四小时服一次。(三) 方在外洗和服藥期間, 每天配合針灸治疗一至二次。均用兴奋手法針刺。

疗 效: (一) 楊××, 男性, 50岁, 民工, 民乐人。患下肢麻痺冰冷, 不能动, 小便亦需手术引导。經用此方治疗而愈。
(二) 陈××, 男性, 炊事員。北流岭头街望府井人。1957年患下肢麻痺半年多, 不愈。經用此方治疗而愈。

来 源: 北流塘岸 陈德英

編者按：角螺风又名左右扭风、半耳风、岭南虎皮楠、楠木（南宁名）。为交讓木科植物。学名：*Daphniphyllum calycinum* Benth.

五指风又名黄荆柴科属学名見疟疾类第二方編者按（第17頁）。

紅风沙木蕚又名杉木鑽（桂林名）。为紫杉科植物。学名：*Taxus cuspidata* S.et.Z.

走馬风又名走馬胎（玉林名）、赶风西（百色名）。为忍冬科植物。学名：*Sambucus javanica* Bl.

鸡爪风又名鸡爪木（玉林名）。为蕃荔枝科植物。学名：*Desmos cochinchinensis* Lour.

三 方

主 治：风湿，两足瘫痪或麻痺，不能行动。并治胃痛消化不良。

处 方：五爪风叶 凤尾草 攀墙蕨各等分

用 法：晒干，各取三錢水煎作茶飲；同时三味等分研細末，每日以四至五錢蒸猪肉或牛肉食。

功 用：驅风，去湿。

疗 效：此方系家传秘方，治愈病例很多。茲举三例如下：

（一）梁××，男，30岁。住靖西新生街，操百貨业。患风湿瘫痪，腰痛弯曲，行动失常。1952年延献方人治疗，用上方服食約月余，痊愈。（二）刘××，男，50岁左右，住靖西民权街。1952年患风湿麻痺，行动困难，給上方治疗，約服食十多天，痊愈。（三）莫××，男，40岁左右。靖西县民权街人，操車縫业。素患胃痛，經中西医生治疗及打針，久不愈。1951年发生剧痛，大便完谷不化，用上方依法服食一月，愈。

来 源：靖西县 凌美衍

編者按：五爪风又名黄荆柴，土柴胡（南宁名）。科属学名見疟疾

类第二方编者按（第17页）。

凤尾草又名凤凰草（广东名）凤尾蕨（梧州名）。科属学名见痢疾类第五方编者按（第9页）。

攀墙蕨又名海金沙、牛抄到（梧州名）、斑鳩窝（百色名）。为海金沙科植物。学名：Lygodium japonicum (Thb.) SW.

四 方

主治：中风后，半身不遂，肢体瘫痪，麻木不仁，举动困难。

处方：鯪魚<sup>二條
去腸雜</sup> 香信一兩

用法：上二味不要盐油（略加盐泊亦可），加水，文火煎三小时，去骨，肉与香信和湯隨量服食，每日服食一、二次，半月可愈。

功用：散风，益气。

疗效：都合工区梁年贵妻26岁。1959年4月間患中风，口眼喎斜，舌强不語，口角流涎，左手左足不遂，經医治半月无效。后延献方人診治，先投資寿解語湯三剂，虽病勢略減，仍未愈，改服此方五次，手足已能活动。每日繼續服一、二次，共服廿五天即痊愈，直至現在走路动作，均正常。

来源：桂平县罗播公社 卢之萼

五 方

主治：半边手足麻痺。

处方：白芍八錢 桑寄生五錢 山羊角<sup>三錢
家畜羊角亦可</sup> 甘草三錢

用法：用水三碗，先煎山羊角至二碗，納諸药煎取一碗，一日分二次服。

功用：驅风湿，通血脉。

疗效：曾治愈廿余人，每日一剂，三剂病減，十剂痊愈。

来源：賀县公会公社石塔医院 魏守疆

針灸治療半身不遂

一 方

主治：半身不遂癱瘓（腦溢血後遺症）。

取穴：肩貞 肩髃 曲池 陽市 足三里 環跳 風市 絕骨
合谷 外關 陽陵泉 肩井 瞳子髎 頰車 邱墟 足臨泣

手法：各穴輪流針灸，每日一次。上肢取二至三穴；下肢取二至三穴。不留針，用平補平瀉手法。

療效：廖××，男，53歲，業農，住柳江縣和平鄉鱗魚洞村93號。
1957年10月23日突然昏倒，不省人事約數分鐘，醒後，右側頭部及肢體發麻，右上肢不能活動，右足全無知覺。經取上穴針灸十天，痊癒。

來源：柳州市人民醫院 郭仁稀

二 方

主治：半身不遂，不能轉動。

取穴：手三里患側 足三里患側 肩髃 湧泉 勞宮 鶴頂 曲池

手法：重刺激，留針廿分鐘。

療效：陸××，男性，56歲，業農。忽患半身不遂，左上下肢不能動，不能起床。當時建議送鹿寨醫院治療，用上述穴位針灸，是日即能行動。繼續針數次，痊癒。

來源：鹿寨 梁行新

拘攣類

治筋拘攣方

主治：發熱，口渴，舌燥，兩足拘攣抽筋，痛如刀割。

處方：紫葳（凌霄花）三錢 天冬三錢 百合三錢 黃芩三錢 黃

連三錢 龍胆草三錢 花粉三錢 草薺三錢 杜仲三錢 白蒺藜三錢 白芍五錢 甘草三錢

用法：清水二碗煎至一碗服。重症每日服兩劑。

功用：清心火，瀉肝熱。

療效：從前，猷方人每年必患此症兩次或三次。症狀：兩足抽筋，有如刀割，痛楚特甚，發熱，口渴，舌燥，不斷呻吟，服此方，屢服屢驗。又在柳州、貴縣治愈病者數人，至今未見復發。

來源：南寧市中醫學會 何秉鈞

鶴膝風類

治鶴膝風方

一 方

主治：兩膝或一膝腫大疼痛，上下腿漸瘦，形如鶴膝。

處方：生莪朮 生香附各等分

用法：上二味生用，共搗爛，加酒釀一茶杯，和勻，燉熱，溫敷膝上，藥物干燥冷凍，又換一次，如是輪換，輕者四日可愈；重者十日可愈。若無酒釀，用酒餅二只和藥搗爛，加好酒一茶杯同燉，如酒餅亦無，僅用酒亦可。

附註：生莪朮，生香附，須從土中新掘出來者，藥店中莪朮已用水煎過，香附經火燒過，用之無效。

功用：驅風，散結，去瘀，活血，通絡，止痛。

療效：據猷方人云：“此方得自三十年前。當時醫一童子，年16歲。患鶴膝風年餘，兩膝腫大，不能行動，醫治經旬無效。一江湖術士用此方治愈，我向術士乞得此方。又余外甥莫無知，榕興街人。5、6歲時，右膝腫大不能行動，外科作跌打醫治，痛苦益甚，用此方一帖而愈。以後，凡患鶴

膝风来求治者，悉以此方告之，令其自行采药治疗，奏效者四十余人。”

来源：贵县中医药研究所 卢宏道
宾阳县黎塘 卢润熙

二 方

主治：两膝肿痛，大腿小腿瘦小，步行困难，甚则不能屈伸。

处方：（一）内服方：五加皮四钱 血藤五钱 细辛二钱 牛膝二钱
勾藤四钱 生花三钱 川木瓜一雨 川仲五钱 全归五钱 熟地四钱 乳香三钱 小走马四钱 大走马三钱 走马胎四钱 大枣五钱

（二）外洗方：勾藤四雨 细辛一雨 松叶一斤 独脚樟四雨 暖叶根四雨 榕树鬚五雨 威灵仙四雨

用法：（一）将上内服方第一剂和猪脚或鸡同燉服。第二剂用水煎服，后同。（二）将上外洗方加水煎浓，每日洗三次。

疗效：上方曾治愈十多人，其中有患此病十多年者，六剂痊愈。

来源：忻城县红渡 潘雅川

编者按：血藤科属学名见肺癆类一方编者按（第32页）。

走马胎科属学名见风湿类治瘫痪方第二方编者按（第68页）。

榕树鬚为桑科植物。学名：Ficus retusa L.

松叶科属学名见霍乱类第一方编者按（第28页）。

三 方

主治：如上方。

处方：附子三钱 牛膝二钱 川仲三钱 防风三钱 羌活二钱

用法：上药以清水三碗，煎取碗半，分二次服。

外用：白芥子五钱细末，以姜葱同搥，取汁塗患处。初时起泡，待干脱皮即愈。

疗 效：玉林县城皇吳××之子，患鹤膝风三年，日夜痛哭，不能行动。投以此方治愈。

禁 忌：膝部忌受寒凉及禁房事一百二十天。

来 源：贵县木梓乡中医 卢燕飞

四 方

主 治：各种关节风湿痛，鹤膝风。

处 方：樟树皮四兩 黄枝子四兩 五加皮四兩

用 法：将药研粉和生酒糟捣匀。不发热者，加温后敷之；发热者冷敷。早晚解下一小时左右后，用上药煮水洗患处，再敷上原药，连敷二天。又可用上药浸酒，酌量分服。

疗 效：经献方人用此方治愈三十余人。

来 源：鹿寨雒容 骆盛才

腰 痛 类

治 腰 痛 方

主 治：阴虚肾热，腰部疼痛，痛如物咬，转身不能。

处 方：龟板二兩 知母五錢 盐黄柏三錢 生地五錢 淮山五錢 萸肉三錢 丹皮一錢 泽泻一錢 云苓三錢

用 法：用水三碗，先煎龟板至二碗，纳诸药煎取碗半，分二次空腹服，每隔四至六小时服一次。

功 用：滋阴，清肾火。

疗 效：程××，思贤工区人。患腰部疼痛，势如物咬，转身不能。经数医治疗未愈。后用此方治愈。

来 源：容县黎村英雄公社 李为良

癲 癇 类

治癲狂症方

一 方

主 治：神經錯乱，乱打罵人，語无倫次。

处 方：滿天星尾果一兩 大將軍一兩 犁头草一兩 灵仙一兩 猪落肚血五兩

用 法：以水四碗，煎取半碗，溫服，連服二剂。

疗 效：(一)李××，男性，51岁，靖西南坡区韦力营亭烟屯人。1958年12月，神經錯乱，乱打人，到处乱跑，人屎也食。其家人延献方人診治，与上方連服二剂，精神恢复正常，后未复发。(二)隆××，男，22岁，定金营隴芒人。患癲狂，妄語狂歌，服上方二剂即愈。

来 源：靖西县中医学院 黄高堂

編者按：滿天星尾果又名大紐扣(南宁名)。为茄科植物。学名：*Solanum torvum* SW.

大將軍又名金不换、銀不换(南宁名)、紫背金牛(桂林名)。为远志科植物。学名：*Polygala chinensis* L.

猪落肚又名一点紅(百色名)。为菊科植物。学名：*Emilis Sonchifolia*(L.) D C.

二 方

主 治：神志失常，日夜歌哭，言語无倫，乱跑。

处 方：芭蕉根五斤 地浆水十碗

用 法：芭蕉根捶烂，和地浆水十碗同煎至两碗，一日分二次服。

功 用：清火解毒。

疗 效：陈××，女，32岁，木乐公社竹社工区官州屯人。1959年

1月患癲狂病，日夜歌唱，言語无倫。有时棄衣露体，有时背着小孩到处乱跑，有时把小孩摔倒地上，医治无效。服此方两剂，神志恢复正常，經調查，至今未見复发。

来源：桂平县木乐公社第二医院 徐积慎

三 方

主治：面青唇黑，神志失常，不着衣褲，言語无倫，不識亲疏。

处方：万軍巢（松樹上蟻巢）二兩 生粳米一兩

用法：去淨松毛，切碎。和粳米同炒，至米熟为度。加水二碗，煎至一碗，一日分三次服。

疗效：（一）吳××之妻，32岁。1950年3月，产后十七、八天患狂病，言語行动失常，經数医治疗无效。用万軍巢，依上法制服，每日服三次，每次三兩，連服三日，病痊愈。（二）北江張××之媳妇，年23岁。产后廿余天，发狂，棄衣露体，罵詈打人。經治疗无效。以此方治疗，由其夫强迫灌药，灌二次后，神智較為清楚，知自己服药，每日服三次，每次三兩。治疗九天，痊愈。（三）河口張××之子，29岁。在馬皮水庫回来，忽发癲狂，言动失常，狂歌乱舞，經用犀角、硃砂、牛黃等藥物治疗，无效。服此方五天，病減大半。第七天再診，处甘麦大枣湯（金匱要略方）善后，連服二剂而愈。

来源：桂平县石咀公社 黃柏初

四 方

主治：狂乱奔跑，时哭时笑，語言失常，发无定时。

处方：千斤力根 五爪龙根 五张叶竜 四方竜 三方草 紅絲綫 木賊 紅紫錦竜 生用各一兩 干用酌減

用法：將上药切細，加水适量，浓煎，溫服。日服二、三次。服至五剂后，症状好轉。愈后，以千斤力根，五爪龙根，紅

紫錦芭三味，晒干研为細末，各五錢，混合蒸猪肉食，作为愈后調补，可不复发。

疗 效：1955年至1957年，于范团乡水望洞、弄冲屯等地，治愈多人。其中有患病半年，患病三月、患病四月者，大都服此方十天至二十天即愈，至今未发。

来 源：忻城县加仁 樊然香

编者按：千斤力又名山蓮藕、地蓮藕（百色名）。为豆科植物。学名：Milletia Speciosa Champ.

五爪龙又名母猪藤（百色名）。为葡萄科植物。学名：Vitis Japonica Thunb.

三方草又名三稜。为莎草科植物。学名：Cyperus iria L.

紅絲綫又名茜草、九龙灯（桂林名）。为茜草科植物。

学名：Rubia cordifolia L.

紅紫錦藤又名播箕藤（桂林名）。

五 方

主 治：神志失常，凶狂多怒，张目罵詈，不識亲疏，喜怒无常，歌哭无度，秽洁不知。

处 方：第一方：黑山梔五錢 珍珠^{一分}_{研極細末}

第二方：雷公木根三兩 漆奴木根三兩 黑米木根三兩

香信三錢

用 法：第一方用水一碗，煎取大半碗，以药湯冲珍珠末，和匀，作一次服下。第二方用水二斤，煎至一斤，一日分三次服。先服第一方，繼服第二方七剂。

功 用：清热，安魂，定魄，宁神。

疗 效：此方曾治愈三十余人。均十天或二十天治愈。茲举例如下：成××，男，約20岁，南安公社古祀村人。1953年患癲狂病。面色蒼白，两目呆視，間歇性狂語高歌，随处乱

奔，乱撕衣服。室内随处大小便，不識污秽，經中西医治无效。后用此方治愈，未見复发。

来 源：藤县南安公社神田村女草医 曾之群

編者按：雷公木根又名酒筒木（南宁名）。为五加科植物。学名：*Aralia dasyphylla* Miq.

漆奴木根（即有毛算盘木根）又名毛七公、紙錢木根、串錢木根（南宁名）。为大戟科植物。学名：*Glochidion eriocarpum* Champ.

黑米木根又名枫树根、烏飯木根（南宁名）。为金縷梅科植物。学名：*Liquidambar formosana* Hance.

針灸治疗癲狂

主 治：目光異样，举动粗暴，言語无倫，喜怒无常，不食不臥，随处跑走，打人，好动而不思靜。

取 穴：間使 神門 心俞 鳩尾 涌泉

手 法：采用强刺激。

疗 效：此方曾治疗譚××及秦××等四人，均一次痊愈。治疗左××等三人，三次痊愈。其余数人有經治四至五天痊愈者；有六至七天而愈者。惟一人經治十余次方痊愈。此方共治廿例，只一例复发，經复治亦愈。

来 源：柳州市工人医院 罗毅夫

治 羊 癇 方

一 方

主 治：羊癇症卒然昏倒，不省人事，口角流涎，或手足抽搐等。

处 方：雷公薯五兩

用法：将薯去皮捶烂，每两加双酒五錢，炒，用水煮熟。每两加鷄蛋一只，空腹服。上述是成人量，小儿酌減。

功用：化痰鎮痙。

疗效：此方曾治愈十余人。如韦××，女，18岁，龙山平山屯人。1941年2月×日突然暈倒，不省人事，口吐涎沫，四肢抽搐，約二小时，醒后全身軟倦，次日以雷公薯五两煮鷄蛋服，一次服完，連服三天。隔四天仍发作一次，病状如前，繼續服藥三天，隔半年又复发一次，但抽搐時間減短，再服藥四天，至現在已十年未复发。經检查，患者发育正常。

来源：貴县龙山分社医院 韦世勳

編者按：雷公薯又名野大薯、文榜术、黃药。为薯蓣科植物。学名：*Dioscorea* Sp.

二 方

主治：卒然发猪羊叫声而昏倒，不省人事，手足抽搐，痰声如锯，口出白沫，移时甦醒如常，月发数次，或数月一次不等。

处方：炙芪四錢 枣仁三錢 远志三錢 党参四錢 归身三錢 木香一錢五分 元肉一錢五分 白术三錢 炙草一錢五分 煨磁石八錢 菖蒲四錢 仙茅四錢 竺黄四錢 胆星四錢 麦冬四錢 硃砂一錢五分

用法：共研細末，炼蜜为丸，每丸二錢。每日服一至二次，每次服一丸，开水送下。

疗效：献方人云：“小女7岁时患此病，每在玩耍时，卒然昏倒，不省人事，口吐白沫，手足抽搐，用此方連續服二剂，后未复发。”那吉村李某之子亦患此病，数年未愈，服上方断根。

来源：田东县和平公社医院 刘善廷

三 方

主 治：如上方。

处 方：皂矾<sup>一兩
煨紅</sup> 魚胶<sup>一兩
面炒</sup> 鉛粉<sup>一兩
炒黃</sup> 硃砂^{三兩}

用 法：上药共研细末，米糊为小丸如绿豆大。每日早、晚空心各服二钱，陈酒送服。

疗 效：高垌周××、六荔陈××等，均患是病。发时忽叫一声猝然昏倒，不省人事，四肢抽搐、口流痰涎。移时复清醒如常人。月发三、四次不等。用此方治疗，连服丸药二料而愈，至今均未复发。

禁 忌：孕妇忌服。

来 源：岑溪县东方公社中心医院 刘统铁

四 方

主 治：如上方。

处 方：尖顶檳榔<sup>六、七只
打碎</sup>

用 法：上药须尖长如鸡心，破之作锦纹，未经水漂者，否则不效。男用双数，女用单数，以水一碗，煎至八分服。轻者服一、二次，重者服五、六次，可以根治。

功 用：消积，祛痰。

疗 效：此方系从苍梧吉阳乡中村林兆基处抄来。献方人子梓臣，10岁。×月×日，卒然昏仆，不省人事，口吐痰沫，用此方试治，愈，后未复发。以后经治七、八人均愈，不复发。据林兆基云，经其治疗二十多人均获效。

来 源：苍梧县新地公社洞心大队医院 黎少枚

五 方

主 治：治羊癫症。

处 方：加味磁硃丸：磁石^{八錢} 硃砂^{五錢} 神曲^{二錢} 牛黄^{一錢}

菖蒲二錢 虎骨四錢

用法：共研細末，煉蜜為丸如綠豆大。每次服四錢，開水送下。

功用：安神定痛。

附註：牛黃太貴可減輕，加竹王數倍亦可。

療效：（一）蔣××，男，14歲，玉林人，患此症。病況：面黃，每月發四次，不省人事。1955年到玉林新生制藥廠醫治，經用此方治愈，至今未復發。（二）吳壽，男，34歲，玉林城區名山村人。1953年5月患羊癲症，每月發作二、三次，患時不省人事，經用此方治愈，未復發。

來源：貴縣木梓分社 陳仕進

六 方

主治：羊癲症。

處方：琥珀硃砂丸：天麻四錢 竹王五錢 牛黃五錢 淮山三錢
茯神三錢 熊胆四錢 硃砂三錢 琥珀三錢 白馬骨炭一兩

用法：共為細末，蜜糊為丸如指頭大。每次服三丸，日服三次，開水送服。

功用：安神定痛。

療效：此方是玉林制藥廠副廠長所授。獻方人在該廠時曾治愈羊癲症多人。

來源：貴縣木梓分社 陳仕進

失 眠 類

針灸治失眠

主治：各種原因引起之失眠。

取穴：涌泉

用法：用艾條直接灸，用雀啄法三次。

療效：經治療5例，療效很好。茲舉一例：王××，女，30歲，

干部，未婚。患結核性胸膜炎。进区人民医院后有失眠現象，服三溴合剂无效，灸涌泉穴一次，痊愈。

来源：广西僮族自治区人民医院内科

虚脱类

针灸治呼吸窒息

主治：低血糖性昏迷引起呼吸停止二分鐘。

取穴：人中 神門 十宣

手法：强刺激，不留針。

疗效：曾××，男，37岁，桂林人。1959年4月19日突然昏迷，不省人事。入区人民医院，經用人工呼吸、輸氧、甦醒針注射等法，急救处理，均无效。最后呼吸停止二分鐘，急施以上法針刺，随轉危为安。

来源：广西僮族自治区人民医院

头痛眩暈类

治头頂作痛方

主治：肝火上冲，头頂作痛，常覺眩暈，心跳，四肢麻痺。

处方：熟地五錢 山藥五錢 云苓四錢 丹皮三錢 萸肉四錢
杞子五錢 牛膝三錢 归身三錢 杜仲二兩 桑寄生二兩
夏枯草二兩 仙鶴草七錢

用法：将后四味用水五碗煎成三碗，去渣，取汁同前八味合煎成一碗，分四次服，一小时服一次。

疗效：李××，女，51岁，住柳新路90号。常患眩暈，有时突然头晕剧痛，以致双手抱头閉目不語，心跳，呕吐，四肢麻痺，血压190/130水銀柱，服此藥一剂即降至160/120水銀柱，症状显著好轉。

来源：柳州市城中中医診所 曾启光

治高血压头痛方

主治：时时头晕疼，心跳，四肢麻，梦多。

处方：生地一兩 云苓六錢 淮山八錢 丹皮三錢 泽泻三錢
萸肉四錢 杜仲一兩

用法：以水三碗，煎成一碗，分二次服。

疗效：莫潤昌，男，65岁，工人。病已年余。区中医院中心門診部診治时，血压200/164水銀柱，服此方十剂，愈。

来源：区中医院中心門診部 溫国仁

治头痛方

主治：肝阳上冲头痛（高血压症），头顶常觉晕疼，走路或工作时更甚。

处方：平肝安脑湯：石决明^{七錢} 知母^{五錢} 勾藤^{五錢}
白芍^{六錢} 杭菊^{五錢} 黑枝^{四錢} 蒺藜^{五錢} 云苓^{五錢}
龙齿^{六錢} 龟板^{八錢} 甘草^{二錢} 夏枯草^{六錢}
先煎 先煎

用法：以清水三碗半，煎成一碗，分二次服。

疗效：秦××，男，22岁，修配厂工人。患高血压病，头目眩暈作痛，服此药两天痊愈。

禁忌：飲酒。

来源：柳州市中医院 吳敏

治偏头痛方

主治：头部一侧疼痛，或左或右，时痛时止，新病久病均治。

处方：蒼耳子^{四錢} 夏枯草^{一錢} 天麻^{二錢} 菊花^{三錢} 木賊^{二錢}
赤芍^{二錢} 蝉花^{二錢} 荆芥^{二錢}

用法：水二碗煎取一碗，一日分二次服。

功用：疏风，清热，平肝，止痛。

療效：（一）南宁专署干部葛××，男，27岁。常间歇性右侧头痛。1953年，疼痛发作时，有恶心想吐，眼睑有跳动感觉，久治不愈。經診，其脉弦，舌色紅，白苔，服此方三剂，发作时疼痛減輕，繼服七剂，历三月未見发作。（二）馬××，桂西师范学生，女，21岁。近年发生左头部疼痛，用脑过度或体力过劳时即发。并有头晕失眠症状。脉迟，舌紅苔白。以此方去木賊、夏枯草連服三剂，痛止。半年来只复发一次，服原方旋愈。

来源：南宁专区医院 林琪

治头目眩暈方

主治：耳鳴，口苦，头晕，目眩，脉弦。

处方：赭石四錢 杭菊三錢 白芍三錢 黄芩三錢 甘草一錢五分
北胡四錢 茯苓三錢 青黛一錢五分

用法：以水二碗，煎至一碗，分二次服。

功用：平肝清热。

療效：經用此方治愈病例，由于時間过久，难以詳細記述，只就最近治愈者，略举二例：（一）唐××之妻，51岁，住罗播区大洋合作商店。自訴：“1958年9月，头痛目眩，行动不便，口苦，飲食无味。經延医治疗数次，病反增剧。”診其肝脉弦細而数，舌微燥帶紅，口苦，目眩，头晕，小便微赤。用此方三剂，愈。（二）陈××之母，58岁，住罗播公社万寿大队。自訴：“4月17日晚飯后，卒然暈倒，不能起立。”診其脉弦而数，舌苔平常，口苦，耳鳴，溫之欲吐，大小便正常。服此方二剂而愈。

来源：桂平罗播人民公社罗播医院 李丽山

治肝厥头痛（高血压）方

主治：头頂或后头作疼，眩暈或怔忡，四肢麻痺。

处 方：金錢草_{四兩}

用 法：以水400毫升，煎成100毫升，分三次服。

疗 效：区人民医院观察十二例，服药后血压显著下降，症状减轻。其中服用后二星期收缩压降10厘米水银柱者六例，舒张压降10厘米水银柱者四例，余二例降压不显著。

来 源：广西僮族自治区人民医院

编者按：金錢草为豆科植物。学名：Desmodium retroflexum DC.

中 风 中 痰 类

治急中风或中痰方

主 治：卒然昏倒，手足抽搐，牙关紧闭，人事不省。

处 方：火硝_{四錢} 白芷一錢 枯矾一錢 牙皂_{八錢} 雄黃_{五錢} 北細辛_{四錢} 石菖蒲_{五錢} 丁香_{三錢} 蒼朮_{五錢} 鵝不食草_{三錢} 華拔_{三錢} 冰片_{七分} 麝香_{三分}

用 法：上药共研极细末（冰片麝香后下），瓶貯密封备用。用时以少許点入目内眥一、二次即醒，或吹入鼻孔，或撒于膏药貼臍上。成人每次服一錢，小儿酌減。

功 用：疏风，化痰，通窍，鎮瘧。

疗 效：（一）田东和平公社医院孔××，1958年忽然昏倒，四肢抽搐，不省人事，痰鳴，吐沫（沒有癲癇史）。用药点目内眥，数分鐘即醒。（二）和平公社某，在水利工地时，夜出小便，卒然昏倒，不省人事。經西医打針无效。后用此药吹入鼻内而醒。

来 源：田东和平公社医院 刘善廷

治中痰不省人事方

主 治：中痰，痰迷心窍，忽然昏倒，不省人事，口角流涎。

处 方：薤白三錢 甘草一錢五分 亭陸三錢 蔓仁四錢 菊花四錢
杏仁四錢 半夏四錢 五味一錢五分 細辛一錢 麻黃一錢
射干四錢

用 法：以水二碗半，煎成一碗，灌服。

疗 效：楊××，男，60岁。忽然昏倒，痰涎壅盛，不省人事，服此方一剂而醒，三剂痊愈。

来 源：柳州市人民医院 陈端材

口 眼 喎 斜 类

治顏面神經麻痺方

主 治：口眼歪斜（顏面神經麻痺），一側眼不閉合，一側額紋消失，口角歪开，食物时从患側流出。

处 方：白附三錢 羌蚕三錢 全蝎三錢 鉤藤三錢 当归三錢
白芍三錢 熟地四錢 川芎一錢五分

用 法：以水三碗，煎成一碗，分二次服。

疗 效：李××，男，46岁，門診号2855。初患左耳前区疼痛，輕度浮肿，无发热，听覺正常，无流脓。发作一月后，口角向右歪斜，左眼不能閉合，时流淚。口时流涎，脉緩，舌苔白滑，血压128/90水銀柱。診斷为神經麻痺，服此方，一周症状显著好轉，二周痊愈。

来 源：区中医院留医部 黎平汉

編者按：上方是四物湯与牵正散合剂。对口眼歪斜确有效，特別对血虛患者更佳。方中如加重白附子收效更快。

針灸治疗口眼喎斜

主 治：口眼喎斜（顏面神經麻痺），患側額紋消失，眼不能閉合，口角歪斜，不能鼓頰及吹口哨，飲水从口角流出。

取 穴：主穴：风池 頰車 地仓 攒竹

配穴：迎香 大迎 下关 承浆

手法：均用泻法（即重刺激），或用电针疗法亦佳。每次取四穴，轮流使用，均针患侧。

疗效：共治十一例，痊愈五例，基本痊愈三例，好转三例。平均治疗七次。

来源：柳州市工人医院 罗毅夫

呃逆类

治呃逆方

主治：饮前食后呃逆。

处方：鸡内金二钱 食盐少许

用法：研细末。日服一次，每次一钱，饭前用温开水送下。

功用：健胃消积。

疗效：治愈病例颇多。

来源：贵县 陈绍三

编者按：鸡内金能治膈消反胃，有健胃安胃之功，故治呃逆有效。

胁痛类

治肝气胁痛（慢性肝炎）方

主治：肝气胁痛（慢性肝炎），右季肋下隐痛，按之微有痞块，疲乏，食慾不振，间有黄疸。

处方：逍遙散加味：

当归三钱 白芍三钱 柴胡二钱 茯苓三钱 白术三钱
炙草一钱 香附^{三钱}_{醋炒} 卜荷一钱五分 生姜二片

用法：用水两碗半，煎成一碗，分二次服。

疗效：此方治疗四例，症状显著好转，一例除肝脾未完全消失外，精神食慾皆比前好转。一例黄疸及右肋下隐痛均

消失。

来 源：广西医学院附属医院

治胆痛（急性胆囊炎）方

主 治：胆痛（急性胆囊炎），右侧肋骨下剧痛，或有寒热，呕吐，疼痛放射至右肩及右背部。

处 方：青蒿四钱 竹茹三钱 半夏三钱 赤茯苓三钱 黄芩三钱
枳壳一钱五分 陈皮一钱五分 丹皮三钱 生地三钱 甘草一钱

用 法：以水二碗半，煎成一碗，分二次服。

疗 效：南宁市人民医院用此方治疗三例，平均住院七天多痊愈。
兹举一例：郑××，女，46岁。急性右上腹痛，有寒热，噁心，痛放射至右肩及右背部，季肋下有局部抵抗及压痛。服上方一剂即好转，三天基本痊愈，五天出院。出院后三月未复发。

来 源：南宁市人民医院

翻 胃 类

治 翻 胃 方

主 治：初，食入半日许吐出，继则食入二、三十分鐘吐出。如是十数天，人已羸瘦，起床无力，大便二、三日一次，小便短。

处 方：鲜竹茹一两 生姜五钱 牛奶三匙

用 法：竹茹姜汁微炒略干，以急流水一碗半，煎取半碗服。服后三小时，饮牛奶三匙。日服二至三次，连服至愈。

功 用：清热，润燥，利痰，止呕。

疗 效：贵县何露尧之母、梁月英之姐，服此方均效果良好。

禁 忌：忌食燥热食物。

来 源：桂平县卫生学校 梁廷赞。

嘔 吐 类

治嘔吐不止方

一 方

主 治：嘔吐不止（急性胃炎）。

处 方：古羊藤_{研粉}

服 法：成人服五錢。小儿酌減。

疗 效：勞××因食冷物引起胃腸劇痛，汗出如雨，四肢厥冷，嘔吐狼藉。經服中藥及針灸治療，均無效。抬至區中醫院救治，服此方一次，嘔止痛定而愈。

来 源：區中醫院留醫部

編者按：古羊藤又名苦羊藤。科屬學名見時行感冒類第二方編者按（第2頁）。

二 方

主 治：嘔吐，諸藥入口即吐，不能服藥。

处 方：生姜自然汁_{適量}

用 法：生姜一兩，開水洗淨，搗溶。白布包裹，絞取自然汁，滴一二點入目內眥（男左女右）。

附 註：滴藥後約十分鐘，服藥即能止嘔。

疗 效：此方曾治愈黃后清、陳亞洁等多人。

来 源：岑溪縣東方紅公社中心醫院 黃傳國

灸 嘔 吐

主 治：嘔吐不止。

取 穴：間使

灸法：以艾一小粒于間使穴灸之。

療效：曾治一婦女，其發生嘔吐以後，人事不省，揚手擲足，反復顛倒，須人緊緊抱持，雖在噪擾之中，仍嘔嘯不止，所嘔只是些少口涎，歷時兩点多鐘，邀獻方人診視，以艾灸間使，灸左手一穴，嘔嘯立止。調養數日，恢復正常。

來源：區中醫專科學校 叶縵卿

吐瀉類

治上吐下瀉方

一 方

主治：上吐下瀉，瀉下清水，脈沉伏。

處方：韭菜一握約四兩

用法：絞取上藥汁一匙，以開水沖服。并用艾灸（直接灸）膈俞，小腸俞各一壯。

附註：吐瀉止後，不可遽進食物。先以稀飲少許與之，如餓則進少許稀粥。

療效：（一）吳付彩，男性，30歲，靖西武平鄉足米屯人。夏季某夜忽患上吐下瀉，臥床不起。面白，脈象沉伏，與上方及灸，一劑痊癒。（二）农存可，男，21歲，武平鄉人。1957年4月患洞泄，昏迷不省。依上法治癒。再服附子理中湯一劑，精神復原。

來源：靖西中醫學院 黃振達

二 方

主治：夏令吐瀉，發熱，腹痛，上吐下瀉，轉筋。

处 方：淮山药一兩 白芍六錢 滑石五錢 蝉衣二錢 連翹三錢
甘草三錢 苏叶三分 川連三錢 川木瓜一兩

用 法：用水四碗，煎成兩碗，一日分三次服。

功 用：滋液，解表，清热，利尿，止吐泻。

疗 效：車較寨村人周进南妻傅氏、糯垌街人林蕊秀，均于1957年夏突然吐泻，发热腹痛，大吐大下，因高度失水而腓腸肌抽筋，疼痛难耐，症危篤，用此方治疗均轉危为安。

来 源：岑溪县太阳公社中心医院

編者按：此方即夏中参西录治夏令吐泻方加苏叶，川連，木瓜。寒性吐泻勿用。

三 方

主 治：上吐下泻。

处 方：陈灶心土三錢 炮姜五分

用 法：共研細末。分三次服，冷开水送下。如小便少可加車前草一錢煎水送服。小几分七次服。

疗 效：治愈小几十余人。

来 源：鹿寨县寨沙医院 刘炳运

四 方

主 治：湿热腹痛，泄泻，日数次或十多次。

处 方：紅勒莧菜莖二兩 牛奶木皮二兩 痴头婆莖二兩 番桃木二皮一兩 青藤儿一兩五錢 鬼划符一兩

用 法：此方是生药量，宜炒干用，干者減半。小几用三分之一，煎水服。体虛加灶心土二兩同煎，分四次服。

疗 效：（一）岑溪大滢乡太平村謝鏡华，男，55岁。1958年8月，患腹痛泄泻。泻下黄色胶粘，日十多次，而致肌肉消瘦，气乏神倦。服此方后症状減輕，当日只下泻二、三次。次日再服，即愈。（二）岑溪大滢乡太平村黃正杰之子，

3岁。1958年9月，腹痛下泻十多天，每天五、六次，服药无效，骨瘦如柴，以此方三分之一加灶心土同煎服，一剂而愈。

来源：梧州专区中医研究所 陈灏

编者按：牛奶木皮又名五指牛奶、土五加皮（桂南名）。科属学名见咳嗽类哮喘方第二方编者按（第39页）。

番桃木又名番石榴、番捻（南宁名）。为桃金娘科植物。学名：Psidium guajava L.

青蕨又名凤尾草。为凤尾蕨科植物。学名：Pteris ensiformis Burm.

痴头婆又名地桃花。科属学名见痢疾类第十方，编者按（第11页）。

鬼划符又名黑面神（桂西名）、紫木兰（武鸣名）。科属学名见前瘧疾类第四方编者按（第18页）。

五 方

主治：腹痛泄泻，舌苔微黄，口苦；小便黄，大便色黄，恶臭，身骨痛。

处方：苦羊藤根^{一兩}_{炒焦}

用方：用水八两煎成10毫升候用。服1毫升痛即止。

功用：解热，止痛。

疗效：此药镇痛极效。属于热性者亦可用。献方人于工地曾治五十多例，疗效很高。

来源：广西中医专科学校 梁申

编者按：苦羊藤又名古羊藤。科属学名见时行感冒类第二方编者按（第2页）。

六 方

主 治：水泻口渴发热之热泻，脉缓苔腻之湿泻，噤腐吞酸之食泻，大人小儿患者均治。

处 方：捻子木叶四两 車前草二两

用 法：生用干用均可。水煎。大人每次服二杯。小儿每次服一杯。

疗 效：梁婉廷子、梁廷富子等患水泻，均一服即愈。

禁 忌：老年气虚体弱及产妇脾虚气陷之泻禁服。凡服此药，不宜吃肥腻及不易消化之物。

来 源：贵县木格龙塘 賴庭賢

编者按：捻子木叶又名桃金娘叶、豆捻叶。为桃金娘科植物。学名：Phodomyrtus tomentosa Hassk.

車前草为車前科植物。学名：Plantago major L.

七 方

主 治：发热，头晕，腹痛，肠鸣，呕吐泄泻，小便不利。

处 方：止呕泻汤：十八症十斤 大力王十五斤 土茯苓三斤 扫棒枝三斤 牵牛藤三斤 藿香二斤 樟木茹十五斤 石榴叶二斤 香附子三斤 黑蕨三斤 青蕨三斤

制 法：将上药切碎，放入蒸馏器，加适量水共煮。先蒸取蒸馏药液十斤后，再将药中所余之水浓缩至十五斤，过滤，混合成药液二十五斤，密封贮藏，勿令泄气。

服 法：成人每次服30毫升，日服三次。小儿酌减。

疗 效：此方治愈人很多，兹举二例：（一）夏昭明，女性，14岁，石头工区平山村人。1959年3月26日，患发热，头晕，腹痛肠鸣，呕吐泄泻，用此方治疗，第一天服药后，热退，腹泻亦减，小便较多。第二天继续服此方，至下午泻止，腹痛亦除，痊愈。（二）梁璣賢，女性，43岁，石头和农工区平山村人。1959年3月26日，患寒热往来，日泻八、

九次，頭痛腹痛，嘔瀉兼作。服此方，第一天寒熱除，腹痛、泄瀉減半。次日繼服，至下午諸症悉除，精神轉好，食量已進，小便正常，痊癒。

來源：容縣中醫藥研究所

編者按：大力王又名過山香（桂南名）。為菊科植物。學名：*Blumea* Sp.。其效用驅風行氣止痛，用作跌打藥。

牽牛藤為旋花科植物。學名：*Ipomoea triloba* L. 有利小便作用。

樟木茹又名雞骨香（玉林名）。為樟科植物。學名：*Cinnamomum Camphora* Nees et Eberm. 有驅風止痛消腫作用。

青蕨又名五爪鳳尾草。科屬學名見本類第四方編者按（第91頁）。

黑蕨又名黑腳蕨、鐵綫蕨、鐵綫草。科屬學名見痢疾類第五方編者按（第9頁）。

掃桿枝為桃金娘科植物。學名：*Baeckea frutescens* L.。

十八症又名三百銀（百色名）。有驅風利濕作用。

八 方

主治：泄瀉，腹痛，大便如水；黃色，日瀉數次或數十次。

處方：草果十二兩 檳榔八兩 白朮四兩

用法：共為細末，瓶裝備用。日服二次，每次服一錢五分至二錢，隔六小時服一次，以溫開水送服。

功用：健腸胃，止瀉利。

療效：此方療效顯著，曾先後採用此方治愈泄瀉患者五百例。

來源：百色縣衛生科 林熙春

胃腸痛類

治胃痛（胃潰瘍）方

一 方

主治：胃部疼痛，痛時或牽引腰背，過飢則劇，過飽亦痛，常在飯後一、二小時發作。噯氣，吞酸，嘈雜，間或下黑色便液。

處方：炒白芍五錢 玄胡三錢 甘草三錢 雞內金三錢 川連二錢

用法：上五味共研細末，每服二至三錢，以蜜糖二兩沖服，日服二次，飯前服，連服一月為一療程。

附註：寒性患者去川連，加吳茱萸二錢、丁香二錢。

功用：活血，散瘀，利氣，健胃，止痛。

療效：（一）北流塘岸國營商店幹部李××，男，26歲。1954年患胃痛，胸黑便，經治半年多無效。用此方連服一月痊癒，至今未見復發。（二）北流中學教師楊××，患胃痛，曾到廣州醫院治療，診斷為胃潰瘍，經治療未見好轉。1959年2月服此方，未及一月，基本痊癒。

來源：北流縣中醫研究院 梁兆彬

二 方

主治：胃脘脹痛，或痛引腰背，或嘈雜，或噯氣吞酸，或便色黑。

處方：人中黃二錢 瓦楞子二錢 海螵蛸二錢 細辛二錢 川朴二錢
海石二錢 川楝子^{二錢}_{去核} 佛手花三錢 樟木茹四錢 蘇打粉三錢
廣木香二錢 香附三錢 新砂仁三錢 台烏藥三錢

用法：上十四味，共研細末，日服三次，每次服二錢，開水送下。

功用：行氣，疏鬱，止痛。

疗效：1958年12月，和平公社医院病号林彩凤，胃绞痛，苦甚，服此方后，痛即止。连服数次，愈。又四区小学教师×××、慕仁乡刘仅，本镇林吉巨等患胃痛病多年，均服此方获愈。

禁忌：忌食粗硬不易消化及刺激性食物。

来源：田东和平公社医院

三 方

主治：胃脘疼痛（消化性溃疡），嗳气吞酸，过饥过饱均痛。

处方：煨牡蛎五分 象贝五分

用法：共为细末。一天分三次服。

疗效：南宁市红十字会医院观察廿四例，服药后一般二至四天症状减轻，平均十四天症状消失，疗效很高。

来源：南宁市红十字会医院

四 方

主治：胃脘痛（胃酸过多，消化性溃疡），胸腹满闷，嗳气吞酸，心窝处痛。

处方：角螺壳不拘多少

用法：上方烧煨成炭研细末。每日服三次，每次服二钱，开水冲服，小儿酌减。

疗效：陆绍隆，男性，58岁，上烟人。患胃痛，服各药罔效，服上方，立即止痛，连服一月，病即根除。

来源：上思县人民医院 甘群可

编者按：角螺似海螺，色白，螺壳之螺旋纹有角。凡螺壳含有碳酸钙、磷酸钙，故有制酸作用。据编者经验，用瓦楞子更佳。因瓦楞子不但有制止分泌，且有收缩细血管作用，这对治消化性胃溃疡，甚为适合。若能用蜜糖开水冲服，则有加速溃疡面愈合之功，可获早期根治之效。

五 方

主治：胃脘胀痛，吞酸噯腐，过飢过飽均痛，大便有潛出血。

处 方：海螵蛸四錢 乳香一錢五分 木香<sup>二錢
后下</sup> 川棟五錢 元胡三錢
烏藥三錢 砂仁二錢 香附三錢

用 法：以水三碗，煎成一碗，一日分二次服。

疗 效：此方經南宁市人民医院觀察四例，效果良好，皆能达到症狀消失。今舉一例如下：

田××，男，60岁。胃痛已五十余年，多方治疗未見效。經××医院确診为消化性潰瘍，用西藥制酸剂，收效一时，繼而复痛。后服此方一剂，疼痛大減，三剂止痛，且食欲好轉，休息一星期出院。大便潛血阴性。

来 源：南宁市人民医院

六 方

主 治：胃痛（消化性潰瘍）噯心呕吐，胃脘掣性疼痛，顏面蒼白，呃逆，連續不断，胃酸过多，腸鳴，便秘，腹脹痛，食欲不振，失眠，脉浮无力。

处 方：紋党五錢 法夏<sup>五錢
打</sup> 茯神五錢 沙姜二錢 广木香<sup>二錢
后下</sup>
薤白三錢 波扣<sup>三錢
打</sup> 炙草二錢 柿蒂二錢

用 法：清水三碗，煎成一碗，分二次服。

附 註：胃痛劇烈加良姜三錢，香附四錢，公丁香一錢（碎）。

疗 效：青云小学熊健南、天星巷16号潘克、柳州醬料厂黃品英等患胃痛均服上藥一月而愈。

来 源：柳州市中医院 唐鵬

七 方

主 治：胃痛，痙攣性疼痛，一日数发或数日一发，按之稍減，噯气甚則呕吐，痛時間牽連胸肋，背部，食欲減少，有脹

悶感。

处 方：烏賊骨 浙貝 元胡 鬱金 川棟子^{各二兩}不去核 瓦楞子^{各二兩}

用 法：共研細末。每日服二至三次，每次三錢，開水送下。

功 用：行氣，解鬱，散瘀，制酸，止痛。

疗 效：此方先後治療五十七人，痊癒五十一人，症狀減輕六人。
茲舉典型二例于下：

（一）糯垌太陽公社大地大隊李××，男，30歲。1955年4月22日門診。主訴：胃痛已數年，一日發作數次，痛時牽連胸部，噯氣後逐漸減輕。檢診：脈沉弱，苔白，精神憂鬱。以此方治療，連服十餘天而癒。囑以後宜注意飲食，數年未復發。（二）糯垌太陽公社清水大隊大坡村覃×，男，40歲。1953年6月17日初診，云胃氣痛已十餘年，痛時甚劇，晚間尤甚，食少。經診：脈沉細，舌苔白滑，體瘦，面色蒼白。以此方和米湯作丸，連服月餘，癒。

来 源：岑溪縣太陽公社 李棣華

八 方

主 治：胃脘痛多年不癒（胃或十二指腸潰瘍），大便黑色，時有嘔血，劇痛時上腹部拒按。

处 方：广木香^{三錢}_{后下} 川朴三錢 枳壳二錢 砂仁二錢 蒲黃三錢
灵脂三錢 玉金四錢 桃仁三錢 当归三錢 鸡內金六錢

用 法：以水二碗半，煎成一碗，分二次服。

疗 效：区××，男，42歲，桂柳小學職工。胃病已十多年，曾在醫院作胃切除四分之三，以後仍繼續劇痛出血。用此方治療數月，痊癒。

禁 忌：忌食糯米、芋頭、粟米、芭蕉及飲酒。

来 源：柳州市中醫院 吳敏

九 方

主治：胃痛，大便漆黑，面色萎黃。

处 方：鮮茅根一至二斤 蜜糖一斤

用 法：將茅根二斤，以水六斤，煎至半，去渣，加蜜糖一斤調勻。日服三次，每服二至四兩，沖開水服，空腹服。

功 用：清熱，潤燥，療傷，止痛。

療 效：江中棣，男，36歲，糯垌街人。1958年8月，突然胃痛，大便發現漆黑色，面色萎黃，極度貧血，到岑溪人民醫院留醫，診斷為胃出血，治療十多天無效。轉梧州工人醫院進行X光透視，診斷為胃出血，留醫月余，吃葯打針亦無效。後到糯垌中心醫院治療，服此方十多天痊癒。此後用此方治愈胃出血多人。

来 源：岑溪县太阳公社糯垌中心医院 林沛祺

十 方

主 治：心窩或上腹部疼痛，吐酸，噯氣，或食後半小時吐出，或飢時較痛，發無定時，數天一發或半月、一月發不等。

处 方：荔香散：荔枝核一兩二錢 廣木香七錢

用 法：共研細末。每日服三次，每次二錢，用開水或米湯送服或調服，飯前半小時服。

功 用：散寒濕結氣，導滯，止痛。

療 效：（一）梁承勛，男，27歲，賓陽縣四鎮鄉羅鳳村人。胃痛已七年，數月發作一次，或一月發作一次，或十余天發作一次不等。發作時上腹部心窩處疼痛，食後半小時許即吐出，經服各種葯物均無效。1958年4月到賓陽人民醫院留醫十余天亦無效。同年4月25日，到賓陽鄒鎮衛生所診治，與平胃散加香砂藿香治療三天，病雖稍減，但疼痛未除。改用此方治療，服葯后十余分鐘疼痛即止，腹部甚感

舒适。連續服藥八天痊愈，至今未发。(二)唐建利，男，45岁，宾阳县邹圩乡船戶。胃痛已五年，发病時間不等，在腹飢时痛較烈，服胃舒平或苏打明片則痛稍止，但未能痊愈。1958年6月到邹圩卫生所治疗，以荔香散与服，連服七天，症狀消失，至今未发。(三)李秀良，女，18岁，宾阳县邹圩乡同德村人。胃痛已一年，上腹部疼痛，經常吐酸，噯气，痛时不能进食，服中西藥均无效。1958年8月到邹圩卫生所診治，服荔香散，連服七天，即愈，至今未发。

来源：宾阳县邹圩卫生所 白瑛 关秉書

十 一 方

主治：胃脘作痛，时发时止，年久不愈。

处方：荔枝核二錢 砂仁一錢

用法：共为細末。以酒冲服，日服三次，每服一錢。

功用：散結，行气，止痛。

疗效：唐尧南妻，年30岁，思林区人。患胃气痛两年余，时发时止，屢治无效，后用此方三料即愈。

来源：田东县火箭公社医院 梁仲銘

十 二 方

主治：如上方。

处方：鷓鴣肫內皮不拘多少

用法：将肫皮焙干研末，用好酒冲服，每次适量，多服无碍，久服有效。

疗效：上方曾治愈数十人。

来源：鹿寨新圩 藍加典

治心胃气痛方

一 方

- 主治：**心胃气痛，发则痛如刀割，满地滚转，苦不欲生。
- 处方：**陈皮一钱 半夏一钱 茯苓三钱 甘草一钱五分 苦楝皮三钱
鹤虱一钱五分 乌梅二钱
- 用法：**用水二碗，煎取碗半，分两次服。
- 功用：**除痰，杀虫，止痛。
- 疗效：**某女，自幼即患心胃气痛，已十余年。发时痛如刀割，满地乱滚，多方医治无效，后用此方治疗而愈。
- 来源：**桂平县罗秀公社 卢廷新

二 方

- 主治：**一切胃脘疼痛。
- 处方：**白檀香二钱 广木香二钱 香附三钱 川朴三钱 玉金三钱
五灵脂三钱 甘草一钱
- 用法：**以水一碗，煎至半碗，一次服。
- 功用：**开郁行气止痛。
- 疗效：**经用此方治疗八例，六例痊愈，二例好转。
- 禁忌：**孕妇忌服。
- 来源：**鹿寨江口社医院 王德华

三 方

- 主治：**一切心胃气痛。
- 处方：**柑子仁 柚子仁 荔枝仁 龙眼仁 香附子 茴香子 黄皮仁 川芎 云苓 陈皮 各三钱
- 用法：**以水二碗，煎至一碗，一次服。小儿服三分之一，或三分之二。

功用：行气止痛。

疗效：此方治愈二十余人。但須連服三剂。不分男女老少，均可服用。

来源：鹿寨 韦甫星

治胃下垂方

主治：胃下垂症，經常脹痛，食物則脹甚，時吐胃酸。

处方：（一）神曲二錢五分 白朮一錢 陈皮二錢 加皮四錢 腹皮四錢 蒲黃三錢 烏藥五錢 百合八錢 當歸五錢 升麻二錢 山羊屎四錢

（二）柴胡二錢 升麻二錢 北芪五錢 台參四錢 當歸七錢 白朮四錢 陈皮二錢 炙草二錢五分 川斷四錢 干姜二錢五分 腹皮四錢

用法：以水三碗，煎成一碗。先服第一方五剂，繼服第二方五剂。日服一剂，每剂作一次服。

疗效：張××，男，50岁。患胃下垂。經透視下垂十四公分。服上二方共十剂而愈。

来源：柳州市人民医院 陳端才

針灸治疗胃切除后粘連

主治：胃切除复发生粘連疼痛，創口有压痛。

取穴：主穴：中脘 胃俞 足三里 內关 上脘

配穴：上巨虛 腎俞 日月 天樞 巨關 膈俞 不容
气海 承滿 期門 督俞

手法：以上穴位輪番針刺，每次取主穴一至二穴，配穴二至三穴。用平补平瀉法，留針三至五分鐘。間用归脾湯或补中益氣湯以作助治。

疗效：吳大鈞，男，45岁，住柳州貯木場。1956年4月7日因患胃穿孔入柳州市人民医院施行胃次全切除手术，愈合后，

創口附近有隆起之組織如酒杯大，壓迫時有痛感，創口內經常有隱痛。診斷為胃次全切除後粘連。經用以上穴位輪番針刺共二十九次，痛除出院。

來源：柳州市人民醫院 郭仁稀

治腸梗阻便秘方

主治：便秘，腹痛（腸阻塞）。

處方：豆油40—60毫升。

用法：口服。

療效：此方治愈二例。茲舉一例：

劉呂坤，男，三歲，住院號11561號。1959年以陣發性中腹痛嘔吐入南寧市人民醫院，幾日未解大便，經洗腸無效。後灌服豆油50毫升，歷六時後即瀉下大便（內有蛔蟲），觀察兩日，不再發生，出院。

來源：南寧市人民醫院

編者按：此方系河北省展覽會交流經驗方，南寧市人民醫院推廣有效。

治冷閉腹痛欲死方

主治：腹脹痛，大便秘，舌苔薄白，口潤不渴，口淡，小便如常，數天不食，脈沉數緊有力。

處方：丁香一錢 吳萸一錢五分 附子三錢 良姜三錢 川椒二分 故紙三錢 烏藥三錢 香附三錢 北芪三錢 路黨三錢 白朮三錢 茯苓一錢五分 陳皮一錢 炙草一錢五分 肉桂一錢沖服

用法：以水三碗，煎成一碗，沖肉桂分二次服，早晚各服一次。

療效：鄧××，男，24歲，玉林二區廣恩村人。1953年春患腹痛延醫治療罔效，曾入×醫院留醫，不愈，病者疼痛難忍，曾自殺獲救。家人領出院，延獻方人診治，症如上述。所慮者証脈不符，不大便，脈沉數緊有力，但舌苔白，口淡

不渴，小便如常，加以患者體質素寒。后決定捨脉从症，以加味理中湯投之，一劑痊愈。

来源：靖西中医学院 楊超

痞 塊 癰

治 痞 塊 方

主治：肋下痞块，或腹中癰瘕，腹漸膨大，青筋暴露，体漸日瘦，面黃肢倦。

处方：神曲_{四兩} 大茴香_{四兩} 川椒_{五錢} 丁香_{五錢} 檳榔_{四只} 乾漆_{六兩}
{炒至酒盡} 鱉甲{一斤}

用法：除鱉甲外，共研細末。鱉甲以好酒熬成膠和藥末為丸，每丸重一錢。早晚各服一丸，開水送下。

附註：此方治痞母（脾腫大）痞块、癰瘕、積聚均效。虛寒者加熟附、肉桂。

功用：行氣，通滯，破癰，軟堅，消積。

療效：（一）朱寶三，男，63歲，金星公社均平營人。脾臟腫大堅硬，腹膨大如抱甕，肚皮绷紧光亮，青筋暴張如網，肢體消瘦，面色蒼黃無華，舌光淡白，脉細無力。症因患痢引起。以此方倍量加附桂為丸，服一月余，症狀逐漸消失而愈。現已能參加勞動。（二）金星公社黃萬卿，男，36歲，腹部膨脹，左肋下有硬块（脾腫大），四肢消瘦，貧血明顯，脉弦數。病由患痞而起。以此方治療，服藥四十天，愈。

来源：藤县金星公社医院 黃鎮漢

編者按：大茴香一般指八角，此藥據諸家本草均謂大溫大辛，性烈，多食損目，此方以小茴香為宜。

腸 痛 類

治 腸 痛 方

一 方

主 治：腸痛（急性闌尾炎），右下腹疼痛拒按，右腳踣縮。

處 方：郁李仁六錢 丹皮四錢 紅藤一兩五錢 冬瓜仁一兩 苡仁一兩
桃仁一兩 銀花一兩 菖蒲二錢 皂刺四錢 元胡三錢

用 法：以水三碗煎成一碗，分三次溫服，每日一劑。重症每日二劑。一般三至五劑即愈。

療 效：南宁市人民医院由1958年11月至1959年4月止，共治疗四十五例，治愈率达百分之九十二。

来 源：南宁市人民医院

二 方

主 治：腸痛（急性闌尾炎）右側下腹疼痛，拒按，并有显著压痛点，发热或不发热。

處 方：腸痛湯：大黃^{五錢}_{后下} 桃仁三錢 丹皮三錢 川朴三錢 銀花二兩
敗醬草一兩 甘草二錢

用 法：以清水三碗，煎成一碗服。

注 意：要食流質三天。

療 效：柳州印刷厂韦××、陈××，患急性闌尾炎，均服上藥三劑痊愈。

来 源：柳州市中医院 吳敏

三 方

主 治：腸痛右下腹疼痛，右腳縮起。

處 方：鮮菖蒲^{六兩}_{干的无数}

用法：以清水六碗，煎至二碗，分二次服，渣再煎，当茶整日飲。
疗效：此方治愈病例多人。刘某之姪，患闌尾炎二日，剧痛时右脚弯曲不能伸直。用中藥治疗无效，服上方三剂，愈。
来源：区中医院留医部 梁鵬万

針灸治腸痛（急性闌尾炎）

主治：腸痛初起便秘，繼則右下腹疼痛，有硬块，体溫上升，麦氏压痛点拒按，患者右足常屈向腹部。
取穴：足三里 闌尾点在足三里下二寸處
手法：留針一至二小时。第一次刺后显著痛減。針至四次完全复原。
疗效：柳州市工人医院外科室近治五例，均痊愈。
来源：柳州市工人医院外科
编者按：此法系上海市华东医院介紹推广。

四 方

主治：腸痛（急性闌尾炎）。
处方：山甲片^{一兩}_{煅存性}
用法：研末。酒水各半冲服。
疗效：此方系祖传秘方。1953年武宣东乡刘钰松，女，44岁，患腸痛，服此方一次痊愈。1958年武宣街黎春兰，女，28岁。患腸痛。亦服此方一次而愈。从1953年至現在共治愈十七人。
来源：宜山县 梁果青

五 方

主治：腸痛（急性闌尾炎）右下腹剧痛，拒按，右脚縮。
处方：銀花三兩 当归三兩 地榆一兩五錢 麦冬一兩五錢 元參一兩

五錢 苡仁一兩 黃芩四錢 甘草五錢

用法：用水2000毫升，煎成800毫升，分二日服，日服四次，每次100毫升。

療效：南宁市紅十字会医院治疗四例，皆痊愈。大都服藥后第二日疼痛大減，第三日症状基本消失，第五日痊愈。

来源：南宁市紅十字会医院

六 方

主治：同上方。

处方：川連二錢 金鈴子四錢 白芍四錢 錦黃四錢

用法：用水碗余，煎至大半碗，一次服。

療效：曾治愈太平乡黃祥聚及潯眉村黃有旺等患者。

禁忌：忌吃香腥油膩之物。孕妇忌服。

来源：貴县太圩乡 黃祥光

七 方

主治：腸痛症，右小腹疼痛，蹣臥。右脚不能伸直。

处方：加味四逆散：北胡一錢 赤芍一錢 白芍一錢 枳实一錢 甘草一錢 血珀^{一錢另末}

用法：水二碗，煎至一碗，冲血珀末一次服，于空腹时服。

療效：（一）1957年岑溪县南渡乡丰田村李××，女性。患急性盲腸炎，經服此方痊愈。（二）1953年玉林新生制藥厂劳改犯人××患急性盲腸炎，疼痛难忍。經用此方一剂減輕，二剂愈。

来源：貴县木梓乡 陈士进

淋 病 类

治 砂 淋 方

一 方

主 治：小便淋瀝，膀胱胀滿，便时尿道疼痛。

处 方：(1) 紅藤罐子 散血丹 桐油树根 川牛膝 毛射香
山烏龟各等分

(2) 一枝箭 干桃子 夜摸草各等分

(3) 紅恩桃^{适量}_{鴉膽}

用 法：先将第一方以水浓煎，日服一剂。連服三剂后，繼服第二方。亦日服一剂，連服三剂。以后用第三方，搗溶窰包生殖器外。

疗 效：此方曾先后治疗三十二例，均痊愈。茲举二例：(一) 邕樓公社歌磨大队农环屯周××，男性，23岁。患小便淋瀝，小腹部胀一年余，治疗无效。1953年3月用此方治疗四天，痊愈。服药第一天后，小便量增多，小腹部胀減輕。服药第三天后，小便带有粒状結晶体，小者如芥子，大者如綠豆大数十粒。第四天并解出粘稠硬韌之胶状物如筷子大一条。(二) 黃×小便急胀不通，服第一方一剂而愈。

来 源：凌乐县邕樓公社歌磨大队民办医院 陈先业

編者按：紅藤罐子又名算盘果根(百色名)。为大戟科植物。学名：*Glochidion puberum*(L.) Hutch.

散血丹又名小叶十大功劳根(百色名)。为小蘗科植物。学名：*Mahonia fortunei* Mouill.

毛射香又名火炭根(百色名)。为菊科植物。

山烏龟又名岩鵝薯。叶似粪箕篤的叶。为防己科植物。学名：*Stephania Tetrandra* Moore.

一枝箭又名穿云箭(南宁名)。为瓶尔小草科植物。学名:
Ophioglossum nudicaule Linn.f.

干桃子即未成熟的野毛桃晒干而得。为蔷薇科植物。学名:
Prunus persica S.et z.

夜摸草又名贼仔粪、草丁香(百色名)、三叶菊(南宁名)。
红恩桃即野毛桃(百色名)。为莎草科植物。学名:
Kyllinga monocephala Bottb.

二 方

主治: 小便澀滯，尿管刺痛，用力排便，只出点滴赤色小便，自觉尿管有砂阻塞，仰臥小便，其痛稍減。并治花柳梅毒淋病。

处 方: 紅叶烏臼树根^{二兩}_{第二層皮}

用 法: 用砂盆磨烂取汁，和白糖二兩冲开水頓服。服后良久，尿尿齐来，小便通利而愈。

功 用: 利尿，通淋，解毒。

疗 效: 解放前在韶关时，用此方治愈工人患砂淋(膀胱結石)者数人。治梅毒淋病更有效。如无紅叶者其他亦可，但紅花紅叶者更好。

来 源: 南宁市 何炳鈞

編者按: 烏臼根皮有毒，能通利大小便，峻烈过于大戟，不可过服，用时宜慎。此药为大戟科植物。学名: *Sapium dicolor* (Champ.) Muell-Arg.

三 方

主 治: 同上方。

处 方: 野花生藤^{四兩}

用 法: 用水二碗，煎至一碗服。药量小儿減半。

功 用: 清湿热，利尿通淋。

疗 效：1957年柳城县賴小并患砂淋，到柳州市人民医院治疗，因年小不能开刀，請猷方人診治。小便时因痛难耐，倒地乱滾，自搖阴部。服此方后，小便时已不滾地。次日小便即暢通。此方前后經治数人，均見效。

来 源：鹿寨县 胡化成

編者按：野花生藤又名假花生藤、金錢草（桂南名）。科属学名見头痛暈眩类，治肝厥头痛方編者按（第83頁）。

四 方

主 治：尿管刺痛，小便滴瀝不通，虽极用力只能排出少量赤色小便。患者自覺有砂阻塞管内。仰臥小便，痛稍減。

处 方：金錢草四兩 海金砂四兩 篇蓄五錢 瞿麦五錢

用 法：用水四碗，煎成一碗半，分二次服，每隔四小时服一次。服二、三剂症状減輕后，将原方金錢草、海金沙減为各五錢，篇蓄、瞿麦減为各三錢。用水一碗半，煎成大半碗，分二次服，每隔四小时服一次，連服至愈。

功 用：利尿通淋，清下焦湿热。

疗 效：此方經治腎結石二人，膀胱結石三人，均获痊愈。

来 源：桂林专区人民医院

五 方

主 治：沙石淋（膀胱結石）小便不通，臍下及腰胯压胀，尿道刺痛难忍，不能食睡，大便难，脉滑。

处 方：滑石六錢 琥珀末二錢 海金沙四錢 木通四錢 篇蓄六錢
木香三錢 当归四錢 郁金四錢

用 法：清水二碗半，煎取大半碗，冲琥珀末，分二次热服。

疗 效：患者林××，女，53岁，住平南县三甲街。服上方两剂，痊愈。

来 源：柳州市联合診所 江永龙

六 方

主治：腎結石，体温正常，脉弦数，每日发痛六七次。痛时（一侧腰痛）不能走动。

处方：归身四钱 白术一兩 薏仁一兩 白芍四钱 川仲四钱 甘草三钱 金錢草二兩 魚腥草四钱

用法：以水五碗，煎成一碗，分二次服。

疗效：柳州解放北路馮庆琳，男，50岁。患上症，連服上方九剂而愈。

来源：柳州市联合診所 韦长光

七 方

主治：砂淋（尿路結石），小便时刺痛，小便頻数，尿中有砂样物質。

处方：金錢草一兩五钱 川破石五钱

用法：用水三碗，煎成一碗，分二次服。

疗效：此方治愈三例。茲举一例：王志叶，男，20岁。1959年3月11日患急性腹痛到南宁市职工医院治疗。检查右腰部陣发性疼痛，呕吐，右腰部有压痛。自訴：12岁时因膀胱結石曾动手术。現症，小便困难，茎中痛。服上方二剂，症状完全消失。

来源：南宁市职工医院

八 方

主治：小便淋涩不通，尿管刺痛，小腹急胀。

处方：木通三钱 車前子四钱 瞿麦四钱 篇蓄四钱 梔子三钱 甘草梢二钱 通草一钱五分 海金沙四钱 茯苓三钱 冬葵子五钱 滑石粉八钱 灯芯五十寸

用法：以水两碗，煎取碗半，一日分二次服，每次冲滑石粉空腹服。

功用：清下焦湿热，利尿通淋。

疗效：韦卜恆，男，30岁，隆林县沙梨区人。1956年12月底入隆林

县德峨卫生所。自訴：小便淋涩疼痛已一年余，小腹有时急胀，小便急时只点滴排出。尿管疼痛異常。經服西药及导尿治疗一月左右，无效。服此方，第二天小便較多，疼痛减少。繼服，当晚12时左右，小便較前增加。便时觉有砂物流出。检查尿盆中有芝麻大砂石十数粒。再服，第三天早上，小便排出砂石一粒，塞在龟头尿道口。患者甚为惊惶。叫其安靜。以溫水坐洗后，用力排出砂石一粒，約花生米大。至中午，小便又排出同样大小砂石一粒。繼續服此方五天，小便正常，疼痛消失，遂愈。

来 源：隆林县德峨卫生所 林启宣

編者按：此方即卫生宝鑑方八正散去大黃合葵子茯苓散加通草，海金沙。

治小便出血方

一 方

主 治：小便出血。

处 方：秤星木莖十斤

用 法：上药切碎，以淨水十五斤，煎至五斤。去渣。澄清药水，去沉淀。再煎取斤半，分四次服，每次服六两，每隔四小时服一次。

功 用：清热解毒。

疗 效：用此方治愈者十二人。献方前不久，庆丰大队一患者小便如血，痛不可忍，服此方一次便愈。

来 源：貴县庆丰乡 楊卓舟

編者按：秤星木又名点秤木、土甘草（桂南名）。为冬青科植物。

学名：Ilex Rhamnifolia Merr.

此方治疗小便出血，疗效很好，但方中分量过大，用时宜酌量。

二 方

主 治：小便出血，砂淋。

处 方：真金菜根<sup>干用二錢
生用二兩</sup> 車前草三錢 过江龙三錢 枸杞根三錢
木賊草三錢

用 法：水煎至一碗。大人当茶饮。小儿酌减。

疗 效：献方人曾用此方治愈三十余人。

来 源：鹿寨雒容 駱盛才

編者按：过江龙即蘆根。为禾本科植物。学名：Phragmites
Vulgaris Trin

真金菜为百合科植物。学名：Hemerocallis Flava L.

木賊草为木賊科植物。学名：Equisetum debile Boxb.

枸杞为茄科植物。学名：Lycium chinense Mill.

車前草科属学名見吐瀉类第三方編者按（第92頁）。

三 方

主 治：小便淋瀝，刺痛。血液和小便混同排出。

处 方：当归一兩 双酒半斤

用 法：加水半斤，煎取半斤，日分二次服。

功 用：調血，止痛。

疗 效：陈××，女，50多岁，田东县作登街人。1957年小便淋瀝疼痛，出血，小腹急胀，服西药无效，服此方而愈。1958年复发，用此方治愈。李茂檀同志亦以此方治愈数人。

来 源：田东和平公社医院

編者按：此方出肘后方。治小便出血，当归四兩（剉）酒三升，煮取一升，頓服。

四 方

主 治：小便有血（小便不頻数，无疼痛）。

处 方：生地四錢 車前四錢 桑螵蛸四錢 赤茯三錢 側柏叶三錢

用 法：水二碗半，煎成一碗，一次服。

疗 效：（一）鍾××，男性，45岁。小便带血，兩側腰部灼热，但无敲击痛，小便不頻数，茎中不痛。經服西药及針灸均无效。服上方二剂血尿即止。（二）梁××，男性，35岁，南宁市××医院医师。过去有腎盂炎及血尿史。門診，体征有浮肿，驗尿有蛋白和血球，但尿意不頻数，不疼痛。用上方二剂，血即止。

来 源：广西僮族自治区人民医院内科

五 方

主 治：小便淋涩不通，有血液排出，尿管刺痛。

处 方：木通三錢 車前六錢 生地六錢 旱連草六錢

用 法：共研为散。分六次用开水冲服，两日服完。

功 用：清热，涼血，利尿，通淋。

疗 效：潘黄氏，女，43岁，住新木公社新木工区。尿血，面赤腰胀，小便急痛。尿时排出血液半碗或一碗。用此方治疗，一剂血止，二剂小便正常而愈。

来 源：桂平县新木公社 区警新

治小便不通方

一 方

主 治：小便卒閉，少腹刺痛。

处 方：玉米鬚一握

用 法：水二碗，煎取一碗，空腹服。

疗 效：忻城城廂街卢××，女，28岁。1958年秋忽患小便卒閉，下腹胀痛。經检查，体温正常，脉搏細数。服上方二时許后，小便暢通，症状大減。翌日再服一次即愈。城廂

街馮××，男，48岁。1959年4月症同上例。但于1958年曾患同样症状一次，并伴有呕吐。当时亦系献方人投以上方服二次而愈。此次复发，据訴：因疲劳过度而起。当即投与上方，服一次后即愈。近年用此方治患小便不通者十九例。1956年介绍給数卫生人员和个别群众使用，皆获痊愈，无不良反应。

来源：忻城县 何雪松

二 方

主治：小便不通，小腹胀满。

处方：田螺^{一只}_{洗净} 葱头^{三个}_{连须}

用法：共捶碎如泥，敷臍下丹田穴，用布紮紧。

功用：清热通便。

疗效：棉滩村李世衍，患小便不通，用此方治愈。

来源：贵县木梓乡 李瑞昌

針灸治疗遺尿

主治：頑固遺尿不禁。

取穴：腎俞雙 足三里雙 復溜雙 三焦俞灸 膀胱俞灸 关元灸

手法：用中等度刺激手法。留針二十分鐘。后三穴各灸四壯。

疗效：郭××，男，15岁。因患大叶性肺炎入区人民医院治疗。肺炎痊愈后，护士同志发觉病者每晚遺尿。詢之，方知他从小即每晚必遺，15年来，經多方治疗未获愈。内科护士鍾守貞同志，用上針灸穴位針灸三次，愈。

来源：广西僮族自治区人民医院内科

針灸治疗小便失禁

主治：尿失禁，手持重物及久行时，或笑或咳，即有不随意之尿液下滴。

取 穴：气海 关元 命門 腎俞

手 法：用輕刺激手法，或用間接灸亦可。

疗 效：莫××、呂××等四名，患此病，用此法治之，快者三次，慢者十次，即获痊愈。

来 源：柳州市工人医院 罗毅夫

治多尿症方

主 治：多尿症，日小便十余次或数十次。

处 方：穿山甲肉不拘多少、五香粉适量

附 註：五香粉杂货店有售。

用 法：将上药加水适量煨食，每日服一次，連服三至四次。

疗 效：百色城廂何宪章，于1947年6月患此症。每日小便二、三十次，服此方五次，痊愈。

来 源：百色超英公社医院 黃炳之

遺 精 类

針灸治疗遺精

主 治：遺精。

取 穴：气海 关元

手 法：用輕刺激手法。針至有痠脹感后，即出針。

疗 效：献方人先后用此方治愈新久遺精病人很多，快者两三次，慢者六、七次，均获效。較取用命門，腎俞，志室，疗效更速更佳。

来 源：柳州市工人医院 罗毅夫

治 遺 精 方

主 治：遺精，寐时梦交遺泄，面色皸白，体弱。

处 方：硃砂一兩 黑枣适量

用法：硃砂研細末。黑枣洗淨，蒸后去核。每个納硃砂末三分入內，用菜叶裹好，放炭火中煨至菜叶干后取出。每日早晚各服五个，用开水送下。

功用：清心宁神，止梦遺。

疗效：此方乃梁拔南师传。治疗多例有效。茲举二例：（一）宁××，男，32岁，住白圩。1946年患遺精病。經常每晚有梦或无梦都遺精一次，以致腰痠脚軟，头暈眼花，身体衰弱。服补肾固精瀉斂方剂均无效。后服此方四天，即愈。（二）陈××，男，25岁，住蘆圩中和街。以前曾患白浊腎阴亏损，常服补药，引起遺精，每晚二次。食慾减少，面色枯槁。經治两年未愈。1948年經服此方而愈。

来源：宾阳县 覃郁文

編者按：唐璠經驗方治心虛遺精：猪心一个切片相連，以飞硃砂末掺入，綫縛，白水煮熟食之，与此方配制稍異。硃砂經火則有毒。此方用水蒸較好。

疝 病 类

治 癰 疝 方

主治：癰疝，阴囊肿大（絲虫病）。

处方：独脚樟^{半斤}_{去泥切片晒干} 三花米酒一斤

用法：上药酒浸，經七天后可服。每日早晚各服一、二两，多些亦可，不可至醉。

疗效：新肿年余者，服一料即愈，已肿十余年者，服三料痊愈。曾治七人，效果均好。宾林大宁村陈明聰即系此方治愈。

来源：宾林县中医学院

編者按：独脚樟又名鸡骨香（百色、玉林名）。为樟科植物。学名：Cinnanomum Sp.

治 疝 气 方

一 方

主 治：疝气（舉丸炎）惡寒壯熱，四肢厥冷，二便閉塞，卵子腫硬，疼痛無停止。冷汗，小腹胀痛，氣喘嘔吐，腰脹疼痛，失眠，食慾不振。

处 方：橘茴湯：川楝子四錢 橘核三錢 小茴三錢 荔枝七個 黃柏二錢 防己三錢 川木香二錢 澤瀉三錢 地夫子三錢

用 法：前五味鹽水炒。然後與各藥共用清水三碗，煎成一碗，分二次溫服。

附 註：腹痛胃疼，冷氣凝滯加山楂三錢，首烏三錢。寒甚加附子三錢去黃柏。內熱重去小茴加赤茯苓四錢，枝子二錢。血滯加桃仁二錢，紅花一錢。氣虛加北沙參四錢，白朮三錢。小便不利加車前子四錢。

疗 效：柳州解放南路116號朱××，男，60歲。患上病，服此方三劑痊愈。

来 源：柳州市中醫院 唐鵬

二 方

主 治：疝气（腹股沟疝）阴囊腫大隱痛。

处 方：北芪六錢 黨參四錢 升麻三錢 川楝三錢 橘核三錢 當歸四錢 玄參四錢 白朮四錢 陳皮二錢 黃皮核三錢 白芍五錢 甘草二錢

用 法：以水三碗，煎成一碗，分三次服。

疗 效：炤×，男，36歲，蒼梧人，住桃源路商業干校。自訴阴囊腫大已八天，隱痛不適。到區中醫院門診，診斷為疝气，處以上方，治療十五天痊愈。

来 源：區中醫院門診部 林從紀

三 方

主 治：疝气，阴囊肿大。

处 方：蟠桃核五钱 荔枝核三钱 金铃子三钱 海藻一钱五分 牛膝二钱 鹽水炙 桃仁三钱

用 法：将上药以急流水十四两煎。空心温服。

并灸疗：两足外踝直上三寸以艾绒灸五壮，阴囊肿处灸三壮，气海灸三壮。

疗 效：（一）扶绥县五区邑力屯黄某，男，16岁。自述3岁时患此症，今已十三年，曾到南宁治疗半月无效。1958年春邀献方人往诊，投此汤三剂，服后阴囊肿消，愈。（二）上思县族福小屯乡一童，年约3岁，患此病，到上思县卫星人民公社医院诊病，投此汤一剂（各药量减半），照法灸之，三天后愈。

来 源：上思县卫星人民公社医院 何武兴

四 方

主 治：疝气（即睾丸肿胀）。

处 方：秦艽四钱 巴戟八钱 楝子四钱 柴胡四钱 茯苓六钱 元胡二钱 小茴五钱 黄皮核四钱 青皮三钱 木香四钱 桃仁三钱 沙参六钱

用 法：以水四碗，煎成一碗服。

附 註：寒加附子三钱，热加黄柏三钱。睾丸肿甚加重黄皮核。

疗 效：来宾第三初中职工潘某，右侧睾丸肿大，开刀，未果，经用此方加减，服六天痊愈。

来 源：柳州市中医院 张鑑秋

五 方

主 治：膀胱蓄水，阴囊肿大，小便不通。

处 方：桂枝七分 白朮二錢 茯苓一兩 朱苓六錢 澤瀉六錢

用 法：以水碗半，煎取一碗服。

功 用：利水解熱。

疗 效：植樹標，男，28歲。膀胱蓄水，陰囊腫大，小便不通。用此方一劑而愈。此方曾治二十多人，均效。

来 源：容縣黎村英雄公社平洛醫院 黎元驥

編者按：此方即傷寒論五苓散，為治濕熱小便不利之主方。後賢每加味以治疝氣舉痛囊腫小便澀。蘇××，男，30餘歲。發熱小便不利，陰囊較常腫大，舉丸痛。處以五苓散。服藥後，臥床蓋被休息。約一小時左右遍身汗出，熱退，腫消，痛止，諸恙頓失。

治 偏 墜 方

主 治：一側舉丸腫大硬實（慢性舉丸腫大），無發炎症狀。

处 方：羊角扭根皮二兩 黃糖少許 飯米少許

用 法：羊角扭根皮洗淨，切碎，和糖、飯米共捶溶，敷患部，連續敷至腫消為止。

疗 效：此方經治數例，療效極佳。有二例到醫院檢查認為要達7歲以後，才可開刀處理。後用此方單獨外敷，痊癒。經數年觀察，未復發。

禁 忌：此方藥有毒，忌內服。

来 源：柳州市聯合診所 吳瑞周

編者按：羊角扭又名牛牙子。為夾竹桃科植物。學名：*Strophanthus divergens* Grah。

阳 痿 类

治 阳 痿 方

主 治：陽痿多年，完全不起者有卓效。

处 方：老虎鬚草八兩 香花草二兩 过江龙 木賊各一兩五錢

用 法：將上藥分別研為細末，混和。即研即用，不宜久置。每次用一兩，調酒服。服前，先使患者飲酒至微醉后，臨臥前再服上藥。

附 註：此方系祖傳秘方。經獻方人使用治愈病例甚多。近經介紹樊紹洪醫師使用此方治療二例，亦有卓效。

来 源：忻城县 韦炳蓮

編者按：香花草又名牛甘蕉（桂林名）。為禾本科植物。學名：*Hemarthria humilis keng*。

老虎鬚又名鬼箭草（百色名）。為禾本科植物。

过江龙（即蘆根）科屬學名見淋病類治小便出血方第二方
編者按（第112頁）。

大 便 疴 血 類

治大便疴血方

一 方

主 治：便血（近血、先血后便），并治吐血。

处 方：赤小豆当归散：赤小豆一斤 归身一兩

用 法：每用兩茶匙，加入粥水和黃糖少許同煮，空腹時溫服。

功 用：養血散郁，去濕清熱解毒。

附 註：將赤小豆用涼水浸透，放竹篩內用布蓋密，早晚淋水。待發芽至一寸長時，取出晒干（勿用火焙），再加入歸身研成細末，收貯待用。

疗 效：此方治愈百余人，不論便血，吐血均效。

来 源：柳州市人民医院 陈端才

編者按：此方出金匱要略。治狐惑及便血。陈端才醫師用于治療吐血，對古方的療效有進一步的發展。

二 方

主 治：大便痔血，肛門內边沿有小孔出血。

处 方：木耳^{一兩}_{炒黑} 沙糖^{二兩}

用 法：用清水二碗煎沙糖至滾加入木耳，再煎二十分鐘，濾渣，一次服。一料血減，三料血止。

功 用：活血止血。

疗 效：獻方人患痔血兼脫肛病。作腸風脏毒治疗，用清魂散加地榆、槐角、扁柏、山查炭、赤芍、銀花等藥均无效。服此方三料痊愈。至今十余年不复发。

来 源：南宁市 謝仲瑜

編者按：木耳治腸痔脏毒下血，肘后方、圣惠方、圣济总录均有記載。医林改錯內載木耳散、用木耳（炒）白糖、研敷潰爛諸疮，甚效。

脫 肛 类

治 脫 肛 方

一 方

主 治：直腸脫出。

处 方：灯盞菜一斤 蜂房^{四兩} 万年青^{二兩} 生葱头^{四兩} 升麻^{五錢}

用 法：清水浓煎，洗患部，兩、三日即愈。

疗 效：此方曾治愈数十人。如藤县和平公社覃××兄弟二人患脫肛，均用此方治愈。

来 源：藤县和平公社 覃清泉

編者按：灯盞菜又名雷公根。为繖形科植物。学名：Centella asiatica (L.) Urb.

二 方

主 治：脫肛久不收縮。

处 方：雷公根^{四兩} 雞肫一個

用 法：以水六碗，煎取一碗，一次空心服。煎前，雞肫（即雞胃）不可沾水，連砂，两头用綫縛紧和藥共煎。服藥后，將雞肫破开，去砂洗淨，加盐油溫服。

疗 效：柳江县里高乡刘繼富子，12岁，石牛甫隔里高乡七里路韦汝安，男，48岁，患脫肛医治八年未癒，1954年均以此方治疗，三剂而愈。此方先后治愈二十五例。

禁 忌：忌食魚，虾，竹笋。

来 源：宜山县 梁果青

治年久脫肛方

主 治：年久脫肛，气虛下陷。

处 方：黃芪一兩 黃肉五錢 白朮三錢 升麻一錢五分 柴胡一錢五分 桔梗三錢

用 法：以水二碗半，煎成一碗，一次服。外用曼陀罗煎水洗。

疗 效：此方乃衷中參西錄驗方。本用于大气下陷。博白县凤山公社卫生院用此方加白朮（原方无白朮）治两例年久脫肛，两例子宮脫垂都获痊愈，特介紹推广。

来 源：博白县凤山公社卫生院

痧 病 类

治痧气腹痛方

主 治：一切热症絞腸疼痛。

处 方：苧麻叶嫩梢^{四錢} 生盐二錢

用 法：將麻叶洗淨捶溶取汁，和盐用开水冲服。

功用：泻热散瘀。

疗效：此方治愈多人。疗效很高。

来源：鹿寨英山公社医院 譚儒廷

编者按：苧麻为荨麻科植物。学名：Boehmeria nivea Gaud.

治絞腸痧方

主治：絞腸痧，胸腹驟脹，或腹絞痛異常。

处方：白矾二錢 沙紙^{二張}_{煨灰}

用法：研末。分二次用开水冲服。

疗效：卢必发，男，50岁，隆林含山乡人。1959年1月24日突发急性腹痛，腹部膨胀，入隆林人民医院急诊。經西医診斷为急性腸梗塞。多方治疗，病愈危篤，已准备施行手术。献方人提出以中藥治疗要求暫緩30分鐘动手术，給此方与服，半小时后，病势漸緩。一小时后繼服二次，脹消痛止。次日給服雷击散（或方蔞散）錢半，病愈出院。

来源：隆林县人民医院 覃立成

编者按：增訂敬信录：急救絞腸痧方，生明矾研細，冲阴阳水半碗服立效。

調 經 類

治婦人經痛方

一 方

主 治：經期腹痛，月經不調。

處 方：當歸三錢 白芍三錢 白朮三錢 香附三錢 云苓二錢 柴胡二錢 丹皮二錢 枝子一錢五分 甘草一錢

用 法：以水三碗煎成一碗，加酒少許，沖服。

療 效：南宁市人民医院共治疗十三例。其中好轉三例，治愈十例。治愈例中，除下两例外，其他病例皆服藥三至五剂后，症状消失，未复发。例：（一）朱××，28岁。經前后下腹及腰胀痛，呕吐，食慾不振，已年余。服上藥五剂，下月月經来潮时症状消失。（二）薩××，40岁。經前后腰腹痛，头眩。月經来时有时需臥床休息，服上方五剂痊愈。

来 源：南宁市人民医院

二 方

主 治：妇人、室女月經来时或經前后腹痛。

處 方：陈皮五錢 枳壳八錢 烏藥八錢 良姜八錢 義术八錢 三稜一兩 尖枳六錢 春砂六錢 紅花六錢 黃芩七錢

用 法：共为細末，炼蜜为丸如梧桐子大。每次服二錢，日服一次。

功 用：溫經調气，疏郁通瘀，消积止痛。

療 效：此方服下，立止疼痛。連服二十天，下月月經来即无疼痛現象。曾治多人，无不收效。

来源：南宁市中医学会 梅元禧

治 經 閉 方

一 方

主治：妇女久不行經，而致黃肿病。

处方：天蓮地柳二兩 紅棗二兩 竹叶蜈蚣一兩；

用法：用天蓮地柳根和米炒至黃色后，用水二碗与药煮至半碗。分两次飯前服。服后大泻，肿即消失。如泻多欲止，可吃稀粥。

疗效：此方系祖传几代，治愈多人。献方人曾治好鹿寨街曾××、鵝滩村康××，均只服三剂而愈。

来源：鹿寨县 傅禎仲

编者按：天蓮地柳又名上蓮下柳、大刮、土大戟。为大戟科植物。学名：Enphorbia lunulata Bunge.

竹叶蜈蚣，又名竹节蓼。为蓼科植物。学名：Muehlenbeckia Platyclada Meisn.

二 方

主治：月經閉塞不通，日久面黃体瘦，小腹时痛。

处方：晚蚕沙四兩 黃酒二斤

用法：将晚蚕沙炒至微黃色，乘热淬入黃酒內浸二日，随意飲之。

功用：化痰通經。

疗效：岑溪县太阳公社陈××妻，1950年前未婚时，已經閉多年。婚后多次延医治疗无效。后延献方人診治，脉虛弦面黃，小腹时痛。用此方治疗，全料药酒尚未服尽，經水已来潮，小腹痛亦消失，1951年冬已抱子。以后用此方治愈室女閉經者五人。

来源：岑溪县太阳公社中心医院 甘均权

編者按：此方出本草綱目附方。

三 方

主 治：妇人产后閉經而致黃腫病。

处 方：大黑枣六兩 青矾一兩 海金沙二兩 百草霜適量 蜜糖三兩

用 法：青矾用茶油煮至溶化后，与各药共研粉，和蜜糖調勻做成药丸如黄豆大，每天吃一次，每次吃四丸，开水送服。

功 用：补血利湿。

疗 效：白合村李××之妻产后发黄，謝××之女产后年余，全身黄肿，均吃此药一剂而愈。

来 源：鹿寨县 江亚山

四 方

主 治：妇女閉經（虛閉），面色蒼白，胸腹胀痛，手足痿軟无力。

处 方：柏子泽兰合剂：柏子仁二兩 泽兰二兩 熟地三兩 卷柏二兩
牛膝二兩 續断二兩 茺蔚子三兩 当归三兩 炒白芍三兩

用 法：共为細末，炼蜜为丸，每丸重二錢。早晚每次服二丸，以盐一錢开水送服。十天后用苏木一两，煎水冲生猪血溫服。

附 註：服后感觉腹中有輕微疼痛。

疗 效：（一）龔××，21岁，住柳州市顏家巷32号。曾患閉經七月。服此丸后約廿六天經即通。（二）周××，18岁，住柳州市雅儒二路临江巷1号。閉經五月。服此丸后二十多天經即通。

来 源：柳州市城中中医医疗站

五 方

主 治：閉經，或月經素来正常，突然停經，无受孕症状者。

处 方：元胡三錢 通草三錢 留行三錢 生地五錢 卷柏三錢 丹皮

三錢 炒山枝四錢 歸尾四錢 牛膝二錢

用法：以水三碗煎成一碗服。

注意：如初服不行月經者，可連服三劑即通。

療效：李××，32歲，住柳州市柳新路。經閉六個月，服此方二劑即行經。

來源：柳州市城中中醫診所 石傑生

編者按：凡體壯屬熱有瘀者可用。如因氣虛血凝，或冷閉等不足之症，皆宜慎用。

六 方

主治：白帶多，血虛濕郁而致閉經。

處方：蒼朮四錢 川朴^{三錢}_{后下} 茯苓五錢 法夏五錢 陳皮二錢
當歸四錢 川芎二錢 元胡二錢 香附三錢 土苡仁一兩
北芪五錢 玉桂^{一錢}_{燉服}

用法：以水三碗煎成一碗服。

療效：此方曾治愈三例，今舉一例：

楊××，18歲。據訴自1958年2、3月間停經，已十月。

白帶多 混有黃白粘稠，間有腥臭。1959年1月到區中醫院門診。門診號004718號。左脈亂滑，右脈滑大。認為濕熱血虛而經閉。投以上方五劑而經通。其餘二例皆是服三劑便通。

注意：通經後應服八珍湯以調養身體。

來源：區中醫院 黎平漢

治療倒經方

主治：婦人行經，其血忽從口鼻而出。

處方：順經湯：歸身六錢 熟地五錢 白芍三錢 牛膝三錢 茯苓三錢
丹皮三錢 沙參三錢 茜根三錢 黑芥四錢

用法：以清水三碗煎成一碗，溫服。

疗 效：陈××，30岁，住柳州市中山西路79号。常两、三月来經一次。今近两月經期未来，突然口大吐鮮血，其色稍带瘀色，胸辣，气急，面紅。服上药一剂即止，三剂痊愈。

来 源：柳州市城中中医診所 曾启光

胎 前 类

治妊娠恶阻方

一 方

主 治：妊娠二三月，呕吐胸悶，不思食，精神疲乏。

处 方：归身三錢 川芎一錢五分 党参三錢 竹茹二錢 砂仁一錢五分
甘草一錢

用 法：水二碗煎成一碗，一次服。

疗 效：（一）朱如林，24岁。在孕二月，呕吐，精神萎靡，形容消瘦。处以上方，每日一帖，連服六日，痊愈。（二）李玉英，23岁。妊娠三月，噁心呕吐，不能进食，疲乏无力。服上方六剂，痊愈。（三）吴爱凤，28岁。怀孕二月，呕吐，不能进食，胸腹胀悶。服上药五剂而愈。

来 源：南宁市人民医院

二 方

主 治：妊娠期間，噁心，呕吐不止，食难下咽。

处 方：木瓜四錢 麦冬三錢 杷叶三錢 橘紅一錢 竹茹一錢五分
藿香二錢

用 法：此方一日量。以水300毫升煎成160毫升，分二次服。

疗 效：（一）李××，24岁，干部。妊娠二月，呕吐不止，食不下，精神萎靡。延医治疗未效。入区人民医院留医，住院号10065号。予上方，一剂而吐止，三剂痊愈，出院。

(二)鍾××，23岁，干部。有孕四月，呕吐反复发作，曾在区人民医院門診部診治，給以巴氏合剂。服药时暫止，停药后又呕如故。改服上方三剂痊愈，后未复发。

来源：广西僮族自治区人民医院妇科

治妊娠浮肿方

主治：妊娠数月，忽然头面四肢浮肿，小便不利。

处方：云苓三錢 猪苓三錢 泽泻三錢 白术三錢

用法：以水碗半煎成一碗，一日分二次服。

功用：利水消肿。

疗效：(一)1957年袁××妊娠七月，头面四肢浮肿。以此方治疗，連服两帖，痊愈。(二)1958年3月，南宁市解放路220号林××妊娠五月，头面四肢浮肿，連服三剂，痊愈。

来源：南宁市 范仲节

治妊娠小便不通方

主治：妊娠小便不通，小腹重墜胀痛。

处方：茯苓升麻湯：茯苓^{五錢}_{赤白各半} 升麻一錢五分 归身二錢 川芎一錢 琥珀三錢 苧麻根三錢

用法：用水三碗煎取一碗半，一日分二次服。

功用：安胎，利尿。

疗效：此方出笔花医鏡。曾治愈妊娠小便不通者十余人。如：鍾××，岑溪三堡乡都官村人。1958年6月9日在妊娠期間，小便不通，小腹重墜胀痛。到岑溪太阳公社医院留医，經三、四次导尿，仍复如故。服西药沙罗儿并注射盘尼西林油亦无效。后以此方治疗，一剂小便通利，二剂小腹重墜胀痛解，三剂小便正常，出院。

来源：岑溪县太阳公社医院 甘均权

治妊娠下血方

主治：妊娠下血。

处方：苧麻叶一兩五錢 鷄蛋四個

用法：以水二碗，煎取一碗，一次服。日服二次，早晚飯前服。

疗效：經用此方治癒平江陆天来妻。

禁忌：禁房事，忌寒涼等食物。

来源：貴县木梓乡 徐現星

治先兆流产方

主治：先兆流产，腹痛流血，腰痠。

处方：祈艾二錢 川朴一錢 荆芥一錢五分 北芪三錢 姜活一錢五分
白芍二錢 川貝一錢五分 防党三錢 当归三錢 香附一錢
川芎一錢 吐絲二錢 阿胶^{三錢}烊服

用法：以水二碗半煎成八分，二次分服。

疗效：經治疗四例，效果很显著。茲举一例：

徐丽芳，24岁。妊娠三月，阴道出血，腹痛腰痠。到区人民医院留医，經检查認為先兆流产。服此方三剂，痊癒，出院。

来源：广西僮族自治区人民医院妇科

編者按：上方是从保产无忧湯化裁而来。

人工流产方

一 方

处方：阿魏五分 宫粉一分 面粉二錢 雄黃^{為衣}

制法：先将四味药，分味研細末，过篩，然后将阿魏、宫粉混和。另将面粉煮成糊状，俟冷，和阿魏宫粉末，制成橢形小丸，雄黃为衣，每丸約三分半重，放在阴涼处阴干。

用法：先将孕妇阴戶消毒，用产科器械固定子宮，以圓嘴产鉗将

丸放进子宫内。孕两、三月者用三丸，四、五月者用四丸。

疗效：据柳州市中医院試驗十一例，作用很好，甚至有一例孕六月用此药亦获效。且流产时出血很少（約8毫升），疼痛也很少。

来源：柳州市中医院

二 方

处方：牙皂七分 花粉七分 麝香二分 葱白汁适量

制法：将牙皂、花粉二味研細末，以葱汁和作丸，外滚以麝香，用綢布包住，再用絲綫拴住，留綫二尺余，并将丸药外多余綢布剪去。

用法：先在药丸上用針刺遍，后将丸药放在子宫半里半外处。

疗效：据全州县医院作四例，二例成功，二例因麝香不翼无效。

来源：全州县人民医院 妇产科

编者按：本方适用于2—4个月之孕妇。

三 方

处方：牙皂一分 麝香一分 花粉一錢

用法：共为細末，米糊为小丸，放进子宫内廿四小时流产。

疗效：据柳州市工人医院試驗三例，效果良好。皆在二十四小时内流产。产妇无任何痛苦，只觉腹胀，不疼，流血很少。

来源：柳州市工人医院

針藥并用人工流产方

处方：当归四錢 赤芍四錢 生地四錢 川芎三錢 紅花四錢

取穴：气海 中极 关元 合谷

用法：以水三碗煎第一方，煎成一碗，一次服。服药后則进行針刺上列穴位，捻轉进針后用强刺激手法，留針三十分鐘，一連进行一星期。一般在四至六天便流产。

療效：柳江醫院門診試用三例，皆順利流產。

來源：柳江縣人民醫院

針灸催生法

主治：產婦臨產無力，胎兒難下。

取穴：三陰交 氣海 合谷

手法：捻轉進針後覺有痠麻脹痛感為止。留針三十分鐘，每隔十分鐘加強刺激一次。

療效：（一）彭惠芬，25歲。第四胎，第二產程過長，陣縮微弱。經用上穴針灸十餘分鐘即生產。（二）李桂芳，38歲。第八胎，第二產程超過二小時。曾用熱水袋熱敷及注射葡萄糖無效。後用針灸二十分鐘，胎兒即娩出。（三）趙淑貞，27歲。第三胎，第二產程達三小時。用針灸法二十五分鐘即產下。

來源：南寧市紅十字會醫院

治胎死腹中方

主治：孕婦因熱病或跌打傷胎，或臨產數日不下，惡露已盡，以致胎死腹中，產婦面赤舌青，或下紫色血塊，甚則爪甲皆青，腹脹氣喘，口出穢氣。

處方：烏臼根^{三兩}切片炒干 雞肉八兩 山甲^{二錢}炮珠為末

用法：上二味用水二碗加酒二兩煎濃汁一碗，沖山甲末服。

附註：服藥後約半小時有腹痛反應，三小時死胎即下。

功用：滑瀉，下死胎。

療效：此方曾治愈大宜垌心片陳玉英、謝秀芳、阮桂英、平南思和鄉寧秀珍、王福清等五人。

來源：桂平縣大宜公社垌心民辦醫院 余有華

編者按：烏臼有滑下、散毒、去瘀之功。但該藥有毒，多服會使人中毒，瞳孔放大。體虛者更宜慎用。

产 后 类

产后虚脱方

主 治：产后虚脱，不省人事。

处 方：高丽参^{三钱}_{先煨} 大北芪一兩 党参一兩 当归三钱 炮姜三钱
桃仁一钱 川芎一钱 枳壳一钱

用 法：水半碗先煨高丽参至一茶杯，然后再以水三碗将各药加入与参汁同煎至一碗，分二次服。

疗 效：靖西楊××之妻梁氏，30岁。妊娠时已患病，經多方医治不愈。怀孕至七月时，产下一嬰兒，随即昏迷不醒，血流不止。經打針急救，前后昏迷数次，最后一次复昏迷达二小时不能救醒，大汗出。服上方一剂好轉，再剂痊愈。

来 源：靖西中医学院 楊超

产后阴門肿痛方

主 治：产后阴戶紅腫硬，坐臥不痛，行則痛劇。

处 方：泽兰叶二钱 紅花一兩 牛膝二钱五分 桃仁五钱 急性子一兩

用 法：水三碗煎至一碗半，溫熱洗患处，每日洗四至五次。

功 用：清熱散瘀，止痛，祛毒。

疗 效：临桂县五通于大嫂，34岁。1959年3月，产后两天，阴戶腫大如石榴，硬如石，疼痛行走不安，坐臥无事，用上药二剂痊愈。計此方共治三例均效。

来 源：临桂县五通中医院 朱国基

产后及手术后盜汗不止方

主 治：产后或手术后，体虛盜汗不止。

处 方：白术二钱 黃芪五钱 防风一钱 五味子三钱 龙骨五钱 当归三钱

用 法：以水500毫升煎成200毫升，分二次服。一般服三剂汗止。

疗效：（一）黄××，23岁，到南宁市人民医院进行人工流产，住院号11418。流产后盗汗不止，服上方三剂而愈。
（二）张××，25岁。到南宁市人民医院分娩，住院号11155。产后盗汗，精神萎靡，食欲不振，服上方三剂，愈。（三）张××，30岁。因卵巢囊肿，到南宁市人民医院进行手术。施术后汗出不止，服上方二剂便愈。

来源：南宁市人民医院

编者按：此方是玉屏风散加味。

针灸催乳方

主治：产后乳汁稀少或无乳。

取穴：针：少泽 合谷 外关

灸：乳根 膻中

用法：针刺用兴奋手法，留针一刻钟。

灸用艾卷悬灸，每穴二十分钟。

疗效：区人民医院于治疗二十一例中，成功十六例，好转四例，无效一例。

来源：广西僮族自治区人民医院妇科

崩带类

治血崩方

一方

主治：妇女血崩，或产后流血不止。

处方：正走马胎叶十一张 鸡肉不拘多少

用法：上二味用水一碗煲熟，汤、药、鸡肉一次食完。

功用：化瘀，补血，止血。

疗效：此方系献方人祖传秘方。治妇女血崩或产后血流不止，经

几十年經驗，效果很好。茲舉一例：

蒼梧蒲典黃步坑張××，20歲。產後流血不止，病已四十多天，經梧州醫院治療無效。後服此方血止而愈。

來源：岑溪太陽公社 周作鑑

編者按：走馬胎科屬學名見風濕類治癱瘓方第二方編者按（第68頁）。

二 方

主治：婦人血山崩，經期，小產，產後流血不止。

處方：捻子散：自然熟枯捻子^{四兩}_{炒黑}

用法：用水二碗，煎至一碗，分二次溫服。

療效：此方曾治療多人皆效。如貴縣木格區龍塘鄉六羅村蘇××于1955年因小產流血不止，服此方而愈。

來源：貴縣木格六羅村 陳士進

編者按：捻子科屬學名見吐瀉類治上吐下瀉方第五方編者按（第92頁）。

三 方

主治：婦人漏下，淋瀝不止，腰痠腹痛，面色蒼白。并治產後漏下不止。

處方：泥鰍草^{生用半斤}_{干用四兩} 生雞^{一只}_{約重斤余}

用法：生雞去毛及內臟與泥鰍草共煲（可加鹽油調味），隨量服食。

功用：補血，止血。

療效：（一）桂平蒙圩公社新德鄉侯××之妻患漏下，經醫治多次未效，服此方而愈。（二）新塘鄉何××之妻小產後漏下不止，治療數月未愈，服此方一劑而愈。

來源：桂平縣蒙圩公社 龍贊森

編者按：泥鰍草又名黃鰍草、星宿菜（救荒本草）。為櫻草科植物。學名：Lygimachia fortunei Max.

四 方

主 治：因热瘀内积，忽而血崩不止。

处 方：常山莪^{半斤} 烏龙尾^{五錢研末}

用 法：常山莪切片炒黄，然后以米醋煮数沸，入烏龙尾末，搅匀，去渣，一次服。

疗 效：滕××、韦××、邓××等之妻均住木梓大东营，皆因劳动不慎，一时血崩不止，头昏，神倦。急以此方内服，血止而癒。

禁 忌：体素衰弱，或因大病而崩者忌服。血止后不宜房事以及重劳动。

来 源：貴县木格区木梓乡 譚栋英

编者按：常山莪为灰木科植物。学名：*Symplocos chimensis* Druce。 烏龙尾即天吊煤。

五 方

主 治：久漏成崩，或一时暴下，昏暈欲脱。

处 方：雄鷄^{一只約重一斤余} 米酒^{二至四兩}

用 法：杀鷄取血冲入酒内，搅匀，量患者酒量服下，不宜过醉。服后宜静睡，避风寒。

疗 效：木梓乡同村梁××之妻和思怀新平乡何××，患崩症均以此方治癒。

来 源：貴县木格区木梓乡 譚栋英

六 方

主 治：产后血崩不止。

处 方：砂仁^{二錢}

用 法：将砂仁用新瓦焙焦研末，兌米湯水頓服。

附 註：砂仁生虫和霉烂者，用之无效。

療效：此方獻方者之師傅，先後治癒二十例。

獻方人妻朱李氏38岁时，产后血崩，經多方治疗无效，用此方治癒。

大塘市××之妻廖氏患此症亦用此方治疗获愈。

来源：临桂县五通中医院 朱国基

七 方

主治：血崩不止，面色蒼白，全身困倦，脉象虛弱。

处方：止崩湯：紅參^{三錢}_{婦水兌服} 熟地一兩 黃芪五錢 土炒白朮一兩
歸身五錢 炮姜二錢 阿膠^{五錢}_{后下}

用法：以水二碗半，煎成一碗，溫服。

療效：（一）孔××，52岁，住沙步。曾患血崩，經十天未見好轉。服上剂，崩止。（二）柳州市解放北路25号錢××，45岁。經断年余，突然大崩，服上药三剂全止，十剂而愈。

来源：柳州市城中中医診所 曾启光

八 方

主治：月經过多，或漏下，淋瀝不止。

处方：北芪一兩 当归八錢 白芍五錢 黃芩炭二錢五分 益母炭三錢
地榆炭四錢 升麻二錢 阿膠^{三錢}_{烊化} 甘草一錢

用法：以水三碗半，煎成一碗，分二次服。

療效：（一）卢××，22岁。阴道流血，月余不止，后用上方二剂痊愈。（二）高××，25岁。結婚七年不孕，每次月經十多天不止，反复不愈，服上方二剂，愈。（三）曾××，29岁。阴道流血二十三天，服上方九剂，癒。（四）譚××，19岁。月經来潮，十多天不止，服上药四剂，癒。

来源：南宁市人民医院

治妇人白带方

一 方

主治：白带纏綿不愈，精神不佳，食慾不振。

处方：白朮一兩 山藥一兩 白芍五錢 党参三錢 蒼朮三錢
車前三錢 甘草一錢 陈皮一錢 柴胡五分 黑芥穗五分

用法：以水三碗半，煎成一碗，分二次服，每日一剂。

疗效：南宁市紅十字会医院治疗六例，皆痊愈。有一例患者流白帶已二年多，身体羸弱，食慾不振，口淡，舌苔白浊而滑，小便少，脉濡弱，为气虛，湿盛之候，服上方三剂而白帶止，五剂而精神食慾恢复。

来源：南宁市紅十字会医院

二 方

主治：帶下日久，淋瀝不止，状如涕唾，腥臭。

处方：白果^{二兩 焙干去壳} 淮山藥^{二兩 焙干} 茜草根^{一兩 晒干}

用法：共研細末。加白糖三錢，用飯湯或开水空腹調服，日服二次，每次八錢。

功用：清热，止帶。

疗效：此方治愈偏热白帶二十二例，效果良好。茲簡介二例：

（一）徐××，糯米街人，32岁。自18岁結婚后，患白帶多年，状如涕唾，淋瀝不止，小腹时痛，脉弦数，屢治不效。后服此方半月痊愈，至今已生育子女三人。（二）林××，高山村人，18岁，未婚。患帶两年余，面黃头暈，月經閉止，口时干，脉数，服此方七天而愈。

来源：岑溪县太阳公社医院 甘均权

三 方

主治：带下日久，色白或微黄，清稀无臭，淋瀝不止，腰痠肢倦。

处方：补宫丸：鹿角霜五錢 白朮三錢 米芩五錢 冬瓜仁三錢
白芍三錢 当归五錢 車前子三錢 白芷三錢 炙北芪五錢
鸡冠花三錢 龙骨二錢 半夏三錢 淮山藥三錢 牡蠣二錢
茯苓三錢 熟地黄五錢

用法：共研細末，炼蜜为丸，如梧子大。每日空腹服二次，每次三錢，开水送下。

功用：补气养血，利湿，止带。

疗效：此方曾治疗十人，效果均好。如南宁市兴宁路69号王××，32岁。患带病已十多年，多方医治无效，后用此方治疗而愈。

附註：方内鸡冠花，白带用白鸡冠花，紅、青、黄带用紅鸡冠花。

来源：南宁市中医学会 程乾

四 方

主治：时下白物，如涕如涎，淋瀝不止。

处方：青壳鴨蛋二只 面粉四兩

用法：青壳鴨蛋去黄取清和面粉为丸，如黄豆大。阴干（切勿置于太阳光下晒），早晚各服二至三錢。

功用：养阴，清热，止带。

疗效：（一）江口区，余××，13岁。患带下，曾服中西药多次均未見效，后服此方二天即見好轉，繼服半月，痊愈。
（二）大宜区楊××，26岁。患带病年余，时愈时发，屡医无效，服此方后痊愈，至今未見复发。

来源：石咀地段医院 李富銳

阴挺类

治阴挺（子宫脱垂）方

一 方

主治：子宫下垂。

处方：金英根<sup>生的四兩
干的二兩</sup>

用法：以淨水三斤煎取半斤，冲糯米酒（或三花酒）四兩，一次服，日服一次。重症者可連服三四次。

附註：如子宫脱出部分已干硬或潰烂者，于服藥时，以干淨茶油或花生油擦患部。如兼腰痛者加狗脊二兩（干的）同煎服。

疗效：此方曾先后治疗二百七十二例，治愈率达百分之九十九。茲举数例：

（一）邓××，39岁。1954年生第六胎后子宫脱垂約寸余，1955年子宫脱出約五寸，夜間睡眠时不能收回。脱出部已潰烂流出腥臭黃水，痛痒难忍，如此数年，他藥无效。1959年2月1日請献方人診治。用此方治疗三次后，痛痒消失，經检查，子宫已复位。（二）貴县覃塘三中队李××，42岁。1952年8月生第四胎后，子宫脱出阴門外約寸余，1956年子宫脱出漸增，夜間睡眠时亦不能收回，甚痒痛，經检查，子宫脱出阴道外五寸余，部分干硬，部分潰烂。1959年2月2日服用此方，当晚睡眠醒后，痛痒消失，子宫已收回，6日检查，子宫复位。（三）覃塘中队张××，53岁。22岁时生第一胎后子宫脱出約寸余，經多次治疗无好轉。近三年来子宫脱出約五寸余，夜間睡眠时不能收回。1959年2月2日服用此方，当晚子宫即收回如常。

来源：貴县覃塘 叶秀清

编者按：金英根为蔷薇科植物。学名：Rosa laevigata Michx.

二 方

主 治：子宮脫出。

处 方：（一）洗方：魚眼睛_{五兩} 粘子胶_{三兩}

（二）敷方：草麻仁_{二兩} 艾葉_{一兩} 灶心土_{二兩} 琥珀_{二錢}

（三）服方：草麻仁_{二兩} 榕木強_{一兩 去粗皮} 痴头婆強_{一兩}
黃芪_{一兩} 猪膀胱_{一只}

用 法：（一）先将魚眼睛、粘子胶热溶，以生芭蕉叶包裹扎紧，用水六斤煎至水浓有胶質为度，乘热熏洗子宮，后将包药之芭蕉叶托回子宮，平臥床上，两腿及臀部托高。

（二）将敷方藥物槌溶，用芭蕉叶包之煨热（蕉叶不可煨焦），敷百会穴，子宮縮回即除去药，如一次不縮回，可再敷二至三次。

（三）取內服方药不用水洗，将药与膀胱以适量水煎取二碗，分两次早晚飯前服。如无猪膀胱，用鸡或猪大腸头亦可。

附 註：服药期間，一月內不可負重劳动，适当增加营养，严禁房事。

疗 效：黃××，40岁，北流民乐石塘乡，塘寮坡人。1955年患子宮脫出，1957年用此方治疗，七天而愈。其他如北流沙梨村梁××、馬場梁××、楊梅公社陈××，均患子宮脫出年余，服此方痊愈。

来 源：容县中医药研究所

編者按：魚眼睛又名白飯枝（南宁名）、魚眼木（梧州名）。为大戟科植物，有收斂作用。学名：*Fluggea virosa* (Willd.) Baill.

粘子又名桃金娘。为桃金娘科植物，有收斂作用。学名：*Rhodomyrtus tomentosa* Hassk.

痴头婆强又名地桃花，科属学名見痢疾类第十方編者按

(第11頁)。

榕木蕈为桑科植物。学名: *Ficus retusa* L.

三 方

主 治: 子宫下垂。

处 方: 野栗禾二兩

用 法: 用猪骨头与药同煲, 每次取湯一碗, 連服三天。子宫收縮后, 再加合乐麻与此药煲, 再服二次。

疗 效: 此方系龙江公社波吉村李伯娘祖传秘方, 历年治愈多人, 献方人亦曾治愈十余人。

来 源: 鹿寨县 沈乙秀

編者按: 野栗禾又名白背叶、白吊粟(南宁名)。为大戟科植物。学名: *Mallotus apelta* Muell—Arg.

合乐麻又名黄麻。为椴树科植物。学名: *Corchorus Capsularis* L.

四 方

主 治: 不論初脫或脫垂而經久不愈者。

处 方: (一) 內服方: 黄蜂窩^{二兩}_{煎成灰} 紅草麻根一兩

(二) 外用方: 紅草麻叶 葵花子去壳

用 法: 內服方以水二碗煎取一碗, 日分二次服, 早晚各服一次。外用方先以紅草麻叶煎水适量洗患处, 再用葵花子研末外擦。

疗 效: 此方曾治疗廿例, 均痊愈, 沒有复发。如凤山县依弄乡滕××, 30岁。患子宫下垂已三年, 多方治疗无效, 1958年6月, 用此方治疗八天痊愈。

禁 忌: 从治疗时起, 禁止房事四十天。

来 源: 凌乐县邕楼公社歌磨大队民办医院 陈先业

編者按: 紅草麻为大戟科植物。学名: *Ricinus Communis* L.

五 方

主治：子宮脫出阴道外。

处 方：明矾 甘油

用 法：将明矾研碎溶化于甘油內，使成5%溶液。先将子宮前唇固定，将宮頸消毒，用注射器盛8—10毫升5%明矾溶液，用一号針头在宮頸两旁插入2—2.5公分，注射后患者覺下腹两侧胀痛，勿惊，靜臥四、五小时即消失。注射后，用紗布塞入阴道，历三十六小时取出，子宮即收回。

疗 效：南宁市人民医院共治疗四十六例。其中二例于第一次注射后无效外，其他四十四例，均在取出紗布团后，解大便、走路、蹲下、用腹压等均不見子宮脫出。治疗后第五天检查阴道，子宮頸上升至正常位置，后未复发。

来 源：南宁市人民医院

六 方

主 治：正产用力过度子宮脫出(无合併症一至十五日，收效迅速)。

处 方：何首烏^{一兩}_{研末} 雄鸡^{一只}_{重一斤以下}

用 法：将鸡宰杀去毛及腸脏，以白布包裹首烏末，納鸡腹內，置于鍋內蒸至鸡肉离骨，取出首烏末，加盐油姜酒調味，将湯及鸡肉一次食完。若鸡肉不能一次吃完，可分二次食。留存整个鸡骨，和首烏末搗至鸡骨不刺肉为度，敷于患者臍上，用带綑着。

附 註：敷药后，患者臀部肌肉，有牵引感，子宮自能收缩。若产妇身体过弱，子宮升上，复行墮下，可配服大剂补中益气湯重用黃耆。

功 用：补虛固摄。

疗 效：曾治疗十五人，一至二剂即愈，疗效很佳。

来 源：柳州市城中中医医疗站 馮天驥

七 方

主治：久痢或大便秘力过度以致脱肛，久不收缩。或产后未久，挑重用功过度，子宫脱出不收。

处 方：枳壳^{八钱}_{蜜炙} 烏賊骨^{三钱} 升麻^{一钱五分}_{蜜炙} 白芍^{三钱} 甘草^{一钱五分}

用 法：水二碗煎取一碗半，分二次服。儿童量：枳壳減半。

功 用：升提、收斂。

疗 效：此方曾先后共治脱肛一百零五人，阴挺三十六人。其中病史最长者为四十八年，最短者一年又四月。此方治疗脱肛痊愈八十六人，阴挺痊愈三十二人。疗程最长者为二十八天（每天服药一剂），最短者三天（每天服药一剂）。疗效很好。兹举典型病例各一如下：

（一）李××，男，54岁，岑溪县太阳社十丈村人，1953年4月診治，自訴脱肛已三十多年，大便与劳动均感痛苦，不能经常参加劳动。处以本方，一剂显效，連服十五剂（每天一剂）痊愈，年年后未复发。（二）周××，女，45岁，住岑溪县太阳公社地罗村。1958年1月7日診治，自訴患阴挺十八年，屡医无效。脉沉細，舌胎白膩，表情忧郁，精神萎靡，子宫脱出，瘀赤腥臭。以此方治疗，服药十八剂而愈，并已参加劳动，一年内子宫未脱出。

来 源：岑溪县太阳公社 李棣华

編者按：枳壳对大腸有收缩作用，但必須用大量才有效。

瘕 瘕 类

治妇人瘕瘕方

主 治：妇人瘕瘕。

处 方：当归^{四钱} 川芎^{三钱} 赤芍^{三钱} 紅花^{三钱} 桃仁^{三钱} 香附^{三钱} 肉桂^{一钱}_{煨服} 鳖甲^{四钱} 莪术^{三钱}

用法：用水三碗煎成一碗，去渣，另焗玉桂十分鐘，混合分二次服。

疗效：（一）巫××，29岁。自觉右小腹时时疼痛，經来疼痛加剧。触診有硬块。經前后头痛恶心，已八年不孕。經妇科检查診斷为右侧卵巢囊肿。經期来时給药五剂后，小腹部疼痛消失，下月經来时再給药五剂，痊愈。触不到肿块，以后未复发。（二）潘××，29岁。1958年12月因下腹极痛，入南宁市人民医院检查，为卵巢囊肿。服上药二剂，肿块消失，痛止。再服三剂，痊愈。

来源：南宁市人民医院

阴 痒 类

治阴道痕痒方

一 方

主治：阴道痕痒不堪（包括慢性子宫颈炎，滴虫性阴道炎，外阴搔痒等），常流腥臭白带，或子宫颈炎与阴道潰瘍。

处方：紫草油不拘多少

用法：先用一般消毒方法将阴道冲洗后，用棉球拭淨，然后用棉签蘸紫草油塗上。再以紗布球沾紫草油作栓塞填入阴道，历十二小时取出。疗程十至二十天。

疗效：荔浦县人民医院曾用此方治疗慢性子宫颈炎一例，滴虫性阴道炎十余例，妊娠合併外阴搔痒一例，均痊愈。

来源：荔浦县人民医院妇产科

二 方

主治：阴痒（滴虫阴道炎）。

处方：黄柏三錢 白矾三錢 苦参五錢 蛇床子五錢

用 法：用水二碗煎取一碗，先熏后洗。

疗 效：桂林工人医院采用此方治疗十例，其中二例，满一疗程，进行复查，疗效很好。

来 源：桂林工人医院

麻疹类

預防麻疹方

一 方

处 方：鷄蛋^{一只}_{去黃} 人中白^{五錢}

用 法：將人中白與鷄蛋清混合煮熟。服半個鷄蛋，只服一次。

疗 效：曾用上方與十二個未出麻疹之小孩作預防，服藥後只一小孩微有發疹，其他皆免疫。

来 源：桂林市衛生局

二 方

处 方：夏枯草^{五錢} 紫草^{四錢} 蒼朮^{二錢} 檳榔^{一錢五分} 銀花^{三錢}
連翹^{二錢} 牛子^{二錢} 黃芩^{二錢} 甘草^{二錢}

用 法：以水二碗，煎至半碗。六個月至一歲者，服三分之一。一歲至三歲者服二分之一。三歲至六歲者服一劑。六歲以上者日服二劑。一日服一次，連服三日。每月服三次，在麻疹流行季節時服。

疗 效：此方是獻方人祖傳秘方。獻方人童年時服過，七歲方出麻疹。獻方人的四個小兒，大的三個，均在五至六歲時未服此方即出麻疹。最小者二歲零七月，曾服此藥未受感染。

来 源：柳州市聯合診所 袁其謀

三 方

处 方：紅蘿卜一兩 芫荽菜七錢

用 法：水一碗半，煎至一碗，分三次服，日服三次，每隔四小时服一次。

疗 效：姚桂荣、黄老賴患惊风初愈，病后虛弱、惧出麻不利，其父母商于献方人，即予上方。日服一剂，各連服四、五剂均能防止出疹。

附 註：紅蘿卜芫荽菜晒干用也有效。

来 源：柳州市联合診所 蔡美之

治麻疹前驅期方

主 治：麻疹初起，发热出汗，流眼泪鼻涕，手足涼，咳嗽，大便溏，口腔內頰膜有白点。

处 方：銀花一錢 連翹一錢五分 公英一錢五分 沙參一錢五分 川貝一錢五分 菊花一錢 蝉退八只 枝子一錢

用 法：口盅装药，冲开水浸过药面，放鍋里蒸一小时后，分三、四次服。

附 註：初起发热，照方加荆芥一錢、防风一錢。如高热用紫雪丹一至二分冲服，以退热鎮惊。麻疹收时，仍用原方去蝉退加生地二錢、元參一錢五分。

注 意：避风以防感冒。

疗 效：曾用此方治疗小儿麻疹多例。疗效良好。

禁 忌：葷腥，鷄蛋，肉类等。

来 源：柳州市中医院 曾寿松

治 麻 疹 方

一 方

主 治：小儿出疹，因血虛，出不透，疹色隱隱，咳多气喘，脉緩，舌白，大便溏。

处 方：北芪八錢 当归二錢 葛根四錢 酒白芍二錢 升麻一錢五分 甘草一錢

用 法：清水二碗，煎成七分，分二次，早午分服。

疗 效：南宁市中府街1号楊又芳，女，4岁又2月。患疹九天，第五天始見疹点隱隱，色淡不紅而疏少，出后四天仍未透，咳多气喘，神倦食少，发热未減，脉緩小，唇舌不紅，大便溏，小便如常，与上方一剂疹轉紅潤，第二剂已全透，气亦順。以后繼服清余毒之剂而愈。此方前后治愈十二例。

来 源：区中医院中心門診部 张汉符

二 方

主 治：发疹期，高热不退，抽搐。

处 方：地龙三錢 全虫五錢 黃芩三錢 竺黄五錢 玄参三錢 骨皮三錢 天麻五錢 鈎藤二錢 青蒿五錢 石膏三錢 知母三錢 甘草五錢 另硃砂一錢

用 法：水两碗，煎取大半碗，分三次冲硃砂服，每二小时服一次。心脏衰弱加麝香一分。痰鳴加胆星一錢。大便不通去青蒿、知母，加生軍一錢五分。小便不通加滑石五錢。

疗 效：柳州連塘路97号刘元中，男，10个月。患麻疹抽搐。高热不退，神昏不醒。樊小妹1岁又6个月，患麻疹，高热，抽搐，痰鳴，均用此方治愈。

来 源：柳州市联合診所 袁其謀

編者按：此方全金虫、竺黄、天麻、青蒿、甘草分量似过大，用时宜灵活掌握。

治麻疹下痢方

主治：在麻后或出疹期間下痢，大便有脓血，发热。

处方：柳枝四兩 白糖一兩

用法：用水三碗，煎成一碗，去渣，加白糖，分三次服。

疗效：麻疹下痢是热毒下注大腸所致，南宁紅十字会医院用此方治疗十四例，均服药后第二天腹痛发热消失，第三天大便正常。

来源：南宁市紅十字会医院

治麻后眼起翳膜方

主治：麻后眼起翳膜，視物模糊。

处方：菊花三錢 荆芥一錢五分 蝉蛻一錢五分 羌活二錢 桔梗三錢
連翹三錢 柴胡二錢 前胡二錢 茯苓三錢 川連一錢 甘草一錢

用法：水二碗半，煎至一碗，分二次服。以上是八岁儿童药量。

附註：血膜重者加生地三錢，沙参二錢。

疗效：患者沈水旺，出麻后眼起翳膜，視物模糊。服此方四剂，翳膜脫落而愈。

来源：柳州市中医院 张鑑秋

鸛鷺咳類

治小兒鸛鷺咳（又名頓咳、噎咳、

鷄咳、西醫名百日咳）方

一 方

- 主治：**連聲頓咳，氣緊，咳時連聲不絕，眼臉微浮，小便短少。
- 處方：**麻黃三分 杏仁一錢 甘草五分 石膏三錢 橘紅五分 百部五分 川連一錢五分
- 用法：**上方系一至三歲量。水一碗，煎取半碗，分三次服。每日服一劑，連服六、七劑。
- 功用：**清熱，化痰，止咳。
- 療效：**1954年在桂平、蒙圩、永培、大塘江、上甫等屯治療數例。1957年在桂平人民醫院治療十例，均有效，且療效很好。
- 來源：**桂平縣人民醫院 李漢基

二 方

- 主治：**咳嗽連聲不斷，咳后有回聲，咳劇則吐，嘔后咳乃止。
- 處方：**鮮側柏葉^{一兩五錢}_{連枝}
- 用法：**以水200毫升，煎取80毫升，加蜜糖20毫升。1至2歲者日服三次，每次15—20毫升；2—3歲者日服三次，每次20—30毫升；3—4歲者日服三次，每次30—40毫升；5歲以上者日服二次，每次50毫升。
- 附註：**上方用干側柏一兩亦可。經觀察，鮮側柏比干側柏療效高；秋、冬季較春季療效高；病情短者療效較高；藥量增

大疗效亦增高，也无中毒现象。

疗效：疗程最少四天，最多十五天。大都于三四天见卓效。桂林市工人医院治疗多例。其中有五十七例作追踪，确定疗效，治愈率很高。

来源：桂林市工人医院

三 方

主治：眼睑微浮，顿咳，咳时连声不绝，面红耳赤，涕泪俱下，甚则嗜血。

处方：葶茎三钱 杏仁一钱五分 桃仁一钱五分 冬瓜仁一钱五分 薏苡仁二钱 锦军一钱 葶藶一钱 银花二钱 赤芍二钱 羌蔚子一钱五分 凌霄花一钱五分 甘草一钱 元明粉^{八分}冲服

用法：水二碗，煎至一碗，一日分三次服，每隔四小时服一次。

功用：清热，解毒，化痰，止咳。

疗效：岑溪县糯垌太阳公社民生联合诊所医师甘均懂、林少云，用此方治患者多人，均服二、三剂，即获效。

来源：岑溪县太阳公社中心医院

四 方

主治：咳连声不止，咳后有回声如鸡叫。

处方：紫苑二钱 川贝一钱 冬花一钱五分 桑叶一钱 天冬二钱 百部三钱 橘络七分

用法：水两碗，煎成半碗，分三次服。

疗效：粟金年，女，2岁，住黄蕩巷49号。代诉：咳已二十天，阵阵剧咳，日夜不停，甚则咳至气不能接，唇乌色。服此方八剂，愈。

来源：柳州市城中中医诊所·曾启光

五 方

- 主治：**咳声不断，咳剧面赤，呕痰，咳后有回声，如鸡吼。
- 处方：**白芨一兩六錢
- 用法：**加水 250 毫升，煎成 100 毫升。六月至一岁者服 3—5 毫升；一岁至二岁者服 7—8 毫升；三至五岁者服 8—12 毫升。
- 疗效：**区人民医院治疗十四例。經初步观察痊愈七例，显效四例。
- 来源：**广西僮族自治区人民医院

六 方

- 主治：**連咳不断，鼻流涕，口流涎，面目浮肿，身有寒热。
- 处方：**百部湯：百部五錢 麦冬三錢 天冬三錢 薏仁三錢
- 用法：**水一碗煎取半碗，日分二次或三次服完。
- 功用：**化痰止咳。
- 疗效：**貴县八塘高联文之子和高择晋之妹等七、八小孩，患百日咳，均服此方而愈。
- 来源：**貴县木梓乡中医 徐現星

喉 症 类

治 喉 症 方

一 方

- 主治：**咽喉肿痛，口舌糜烂，白喉。
- 处方：**木樨子 白盐 白蜜
- 用法：**木樨子去核，塞满白盐，煨存性，研細末，撒搽患部，不拘多少。或将药末調白蜜，含漱患部。
- 疗效：**此方經献方人先后治疗患白喉、喉头炎、口腔炎等症，約

千余人。岑溪县太阳公社医院試用百余例，疗效亦很高。病重者，則随症配合养阴清肺湯、黃連解毒湯、白虎湯、涼膈散等。茲举出典型二例：

(一) 1954年1月18日，威美村李亚弟，发热呕吐，煩惊不安，吮乳啼哭。20日經检查：口唇发青，顏面淡白，呼吸困難，喘鳴如犬吠声，舌苔黃膩，咽門四周紅肿坚硬，呈白色伪膜，剝离出血，发臭，用此方治疗。次日复診，病孩面露笑容，病勢已減輕，用藥三日，痊愈。(二) 甘庆芳，女，30岁，住岑溪县太阳公社古院村。1956年2月7日喉部肿痛，飲食不下。經检查，张口困难，扁桃腺紅肿，有恶臭，脉数，服此方10分鐘后，脓出痛減，次日肿痛全消。

来源：岑溪县太阳公社 李棣华

二 方

主治：初起或严重喉症。

处方：加減养阴清肺湯：魚苦胆一個 白芍二錢 元参二錢 生地三錢 桑叶二錢 貝母二錢 連翹二錢 牛子二錢 甘草一錢 丹皮一錢五分

用法：水煎，用白糖冲服，日服一至三次。

疗效：此方經治五、六例，疗效很好。如上連覃大妹、大圩甘桂才之子等，用此方治疗均愈。

来源：貴县大圩分社 李毓森

三 方

主治：白喉。

处方：熊胆^{二、三粒}_{如芝麻大}

用法：用开水少許溶解后服。

功用：解毒。

疗 效：1952年，方龟余次女初患咳嗽，发热，咽喉疼痛。投清凉剂，咳嗽加剧。第三日病势恶化，經会診后，发现喉有厚白膜。以青霉素注射，病情未見好轉。一蔡姓妇女介紹服此方，获愈。以后用此方治疗四十例，均获痊愈。

来 源：鹿寨县 易定禧

四 方

主 治：如上方。

处 方：石膏三錢 青黛三錢 熟礞砂三錢 元明粉三錢 枯凡二錢
梅片一錢 人中白三錢

用 法：共研細末，收貯候用。用时摻于病者口內。

疗 效：貴县木梓官灘乡棉灘村莫六子、新蓮乡新屋村黃振昌子均患上症。用上药二錢，分三次摻病者口內，历时半日痊愈。

来 源：貴县木梓分社 苏頌良

小 儿 溫 病 类

治小儿溫热病方

主 治：溫热病，口渴高热不退。

处 方：蚯蚓^{五律}_{芭蕉根下的}

用 法：大条的蚯蚓較好，細者加倍。洗淨搗溶，以开水乘滾冲泡十分鐘，用紗布滤去渣服。

附 註：溫热病，經服涼解清里药而热仍不退者，服此方有效。

功 用：清热，解毒。

疗 效：（一）白三弟，8岁，白花村人。患溫热病，高热，神昏，口渴，舌苔黃膩，小便黃，眼球充血，病势严重。經用白虎湯加竹叶，繼加元參、花粉、石膏用至兩半，病势虽稍緩，但仍未愈。后用此方，諸症消失。（二）黃文，16岁，大仙乡人。发高热，神昏，口渴，小便短赤，延献方

人診治。服上方，病即消失。

来 源：宾阳县 白岷

編者按：別錄謂：蚯蚓疗伤寒伏热狂謬，是溫熱病高热不退之良藥。

治小儿暑天发热不退方

主 治：小儿夏天发热不退，口渴引飲，多尿，肢凉。

处 方：羚羊角骨^{二錢 先煎} 生龙骨^{七錢 先煎} 生牡蠣^{七錢 先煎} 东洋参^{一錢 先煎} 川地
骨^{五錢} 小环釵^{三錢} 元参^{四錢} 銀胡^{三錢} 紫雪丹^{二分 冲服}

用 法：水四碗煎至一碗，分早、午、晚三次服。

疗 效：李娟云，发热40度，經某医院治疗无效。后轉某医院留
医一月仍未愈。延献方人診治，处以上方，治疗五日，痊
愈。后用此方又治愈二人。

来 源：区中医药研究所 郑启明

編者按：此症又名“小儿夏季热”。病因尚未肯定，或說是病毒传
染，亦有認為体溫調节系統发育迟緩所致者。此病多流行于
我国中部及南部气温較高地帶。三岁以內小儿易患此症。

小 儿 黃 疸 类

治小儿黃疸方

一 方

主 治：全身面目尽黃，小便短，色如浓茶，大便結。

处 方：丹皮^{二錢} 茵陈^{四錢} 枝子^{二錢} 胆草^{一錢} 忍冬花^{三錢} 川
軍^{五分 后下} 枳实^{五分} 甘草^{一錢五分} 玉金^{五分}

附 註：便秘腹胀者酌加川軍、枳实，腹痛者酌增玉金。以上是一
至四岁小兒量。年岁大者可酌增剂量。

用 法：以水300毫升，煎至100毫升。一天一剂，三次分服。

疗 效：桂林市工人医院曾治疗十三例。一般服药两三天后好转，两星期痊愈。十三例中计痊愈九例，好转二例，继续治疗二例。

来 源：桂林市工人医院儿科

二 方

主 治：嬰孩初生一月內，遍身发黄，如黄疸状（胎黄）。

处 方：土黄連（又名闊叶十大功劳）。

用 法：上药取长尺許，大如笔管者。剉碎，熬水約十五市斤，給乳孩洗澡。每洗澡一次，乳孩即泻一次。泻后即能退黄十之六七。如黄未退淨，多用一次，乳孩又微泻一次。經過两次外洗，胎黄即全解除。

疗 效：1945年曾治愈献方人的一个乳孩。

来 源：区中医专科学校 叶縵卿

小 儿 麻 痹 类

針灸治小儿麻痹方

一 方

主 治：小儿瘫痪（小儿麻痹），突发高热，退热后一側下肢或上肢麻痹，运动不便。

取 穴：下肢：环跳 絕骨 解谿 足三里 阴、阳陵泉 委中 风市 崑崙

上肢：肩井 肩髃 肩髃 臂髃 曲池 曲泽 手三里 太渊

手 法：每次选用四穴。进針后用中等度刺激。捻轉三分鐘，不留針。每日針一次。

疗 效：（一）张松秀，男，3岁，住南宁市边阳街86号。1958年12

月突发高热，經×医院治疗，热退。但右足不能运动，历时二月多，到南宁市第三联診所治疗。以下肢各穴輪流針之，共針十二次，痊愈。（二）賴昌絡，男，1岁，住南宁市解放路135号。发热，口渴汗出，昏睡，經×西医处理，热退各症状消失，惟左足瘫痪不能活动。經用針灸如前法，針六天，痊愈。（三）刘海燕，女，1岁，住南宁市明德街38号。突发高热，汗出呕吐，昏睡，抽搐，經×西医治疗，热虽退，但两足不能活动，历时五天，按上述上下肢穴位輪流选針，每日針一次，計針三次，即愈，活动如常。

来 源：南宁市第三联合診所 黃奐軒

二 方

主 治：小儿下肢麻痺。

取 穴：主穴：环跳 风市 阳陵泉 足三里 絕骨 委中

配穴：肾俞 中髎 三阴交 崬崬 商丘 垢墟

手 法：头三日每日用中刺激針治，三日后用輕刺激針治，均不灸。

疗 效：范小妹，女，3岁，住柳州貯木場。患小儿麻痺，經十二次治疗，暫愈。一年后，病又加重，右足痿軟不能行，以上穴治疗七天，痊愈。

来 源：柳州市联合診所 柯传灝

三 方

主 治：痿症（小儿麻痺），突然神志倦怠，发热噁心或呕吐，昏睡，有时发生痙攣。热退后下肢麻痺，亦有侵犯上肢者。日久則肌肉逐漸痿縮。

取 穴：上肢：大椎 身柱 肩髃 曲池 尺泽 外关 合谷
腕骨

下肢：命門 上仙 风市 阴市 崬崬 阳陵泉 足三里
三阴交

手 法：每次針三至四穴，輪流使用。初起者用輕刺激，日久者用重刺激。

附 註：治療期間，宜多休息。

疗 效：治療張國華等十八例，痊癒六例，近癒三例，好轉八例，無效一例。其中好轉者均因未堅持治療。如能堅持治療，均可痊癒。

来 源：柳州市工人醫院 羅毅夫

臍 風 類

治 臍 風 方

主 治：初舌強不能吮乳，繼而牙關緊閉，身體僵直或角弓反張，面容呈苦笑狀，俗叫三朝七日關。

处 方：硼砂末適量

用 法：潤濕指頭蘸硼砂末少許，點患者舌上，移時，舌軟吮乳，諸症消失。

功 用：清熱，除痰。

疗 效：桂平鄧明鄉陳福彬生育七子，均患臍風死亡。1950年第八子誕生，至七天又患臍風，經用此方治療，愈。1958年亦以此方治愈多例。

来 源：桂平縣衛生學校進修班 陳樹芬

惊 風 類

治小兒急惊風方

一 方

主 治：發高熱，煩躁不安，小便短赤，口舌乾燥，卒然抽搐，目直視，角弓反張，牙關緊閉，昏迷不醒。

处 方：白頸蚯蚓五、六條

用 法：芭蕉根下的蚯蚓更佳。洗淨搗溶，以沸开水冲泡，盖好，待溫頻頻灌下，小便暢利，瘧發即止，體溫亦下降。

功 用：清熱，通竅，鎮瘧。

疗 效：（一）藍小弟，男，2岁又4个月，渡口人。发高热，小便短赤，煩躁不安，哺乳不食，卒然抽搐，昏迷不醒，鼻干唇赤，舌苔干黃，大便二日未行。以此方頻頻灌下，約半小時左右，抽搐由緩而停止，神志亦漸醒。至一小時左右，患儿解一次熱臭小便，體溫漸正常，愈。（二）許小弟，男，生6月余，體質健胖，營養正常。×月×日，忽发高热抽搐，一日夜发二三次，每发一、二十分鐘自止。发时每由巨声（如关门声过大或墜物声等）所惊动引起，患已三天半，經用解熱剂磺胺及生草藥等治疗，均无效。后邀献方人往診，望之顏面稍帶蒼白，髮际及兩眉間呈現青色，指纹浮藍，撫其肌肤稍溫，无熱灼。其母代訴：“小便黃，少，大便两天未行。每惊动則发抽搐。”用此方以石斛一两煎水冲蚯蚓頻服，服至一茶杯后，当晚仅抽搐一次，連服至第二日晚上，不复发。

来 源：忻城县加仁 何雪松

二 方

主 治：高热（體溫 41°C ）不退，卒然抽搐，目上視，牙关紧，角弓反张，神志昏迷，呼吸迫促，不会啼哭，不会吸乳，肚胀，大小便不利。

处 方：二龙飲：生扁头风蛇胆^{兩個取汁} 生地龙二兩

用 法：将生地龙搗溶，用开水泡浸，置鍋內隔水燉一小時，濾去渣，冲蛇胆汁服，每日服三次。

功 用：清熱，通竅，疏風，鎮惊。

疗 效：此方秘守二十七年，最近柳州市天馬路52号廖樹平，女，

生9月，因麻后高烧，在××医院留医，經輸血輸氧，无效。病孩为小儿急惊风，后經献方人用此方治疗三天痊愈。

禁忌：忌食魚腥，肉类，油腻。

来源：柳州市联合診所 尹卓华

编者按：仓卒难找蛇胆，可临时单用生地龙（芭蕉根下白頸者更佳）。

三 方

主治：高热，唇舌干燥，煩渴引飲，痰涎壅盛，卒然抽搐，牙关紧閉，角弓反张，双目直視，昏不知人，脉象洪数。

处方：大鯉魚胆一只 天竺黃五錢

用法：水半碗煎天竺黃數十沸，冲鯉魚胆汁服。

功用：清热，除痰，鎮惊。

疗效：經治愈桂平大宣公社陈永明子、陈貴泉子、黃明森子、余崇意子、余崇俭子、余乃芬女、余乃玉子等七例。

来源：桂平县大宣公社 余友华

四 方

主治：高热不退，头痛如劈，卒然抽搐，牙关紧閉，角弓反张，目直視，昏不知人。

处方：生地四錢 归尾四錢 白菊花三錢 川連四分 胆草一錢五分 生石膏五錢

用法：用水二碗，先煎石膏，沸三至五分鐘，再納諸药煎取一碗。分二次服，每隔三至四小时服一次。

附註：重病者加大黃二錢，牛黃丸一只，以少許药湯开溶冲服。

功用：清热，平肝，定癇。

疗效：此方系湖南医药卫生月刊龔九如大夫介紹，献方人曾治卅例惊风患者，全部治愈，一般只服药一剂即效。

来源：岑溪县太阳公社 梁伟豪

编者按：此方即惺铁樵治脑炎方去犀角、回天丸，加石膏。

五 方

主治：发热，烦躁，卒然抽搐，目直视，牙关紧闭，痰涎壅塞，昏迷不醒。

处方：西牛黄一钱 正血珀一钱 全蝎一钱 川贝二钱 北天麻一钱五分 防风一钱 明雄黄八分 枳壳一钱 珠砂四钱 天竺黄二钱 石菖蒲一钱五分 龙脑香二分 胆南星五钱 当门子一分五厘 熊胆五分 正珍珠三分 姜蚕一钱五分 地龙一钱五分

用法：上药共研为极细末。未滿一岁者服一分五厘至二分。一岁以上者服三至五分。急时开水冲服。如稍缓可用桑叶二钱，乌蜂三只，勾藤一钱五分，薄荷六分，灯心三扎，水煎，冲药末服，效更速。

功用：疏风，清热，通窍，化痰，镇惊。

疗效：此方系献方人祖传秘方，治愈患者頗多。兹简述一例如下：陈大娣，1岁，某日早上发热，烦躁，啼哭，下午3时，卒然两目直视，牙关紧闭，痰涎壅塞，四肢抽搐，不省人事，即以药末二分，开水冲和，撬开牙关灌下，约二十分钟，即甦醒。翌日活泼如常。

来源：南宁市民生联合诊所 曹思秋

治小儿慢惊风方

主治：吐泻并作，气喘而急，昏迷不省。

处方：柴胡七分 白术一钱五分 茯苓一钱 附片五分 洋参七分 勾藤一钱 蝉蜕^{五只}_{去头足} 京夏七分 砂仁四分 木香六分 炙草五分

用法：以水一碗，煎成半碗，分二次灌服。

疗效：郑妹妹，女，未足一岁。1955年8月18日，初患寒热，泻而呕，夜不能寝，心焦多哭。经中西医治疗均无效。病转

危，延献方人診治。其症气喘而急，不知人事，发热大泻而呕，即服上药，一剂而醒，三剂而愈。

来源：靖西中医学院 楊超

编者按：此方宜于慢惊风之初起者。

咳 嗽 类

治 咳 嗽 方

主治：小儿咳嗽。

处方：野桃花萼一兩

用法：洗净晒干。以瘦猪肉二至三两入上药，用清水两碗煎取一碗，分二次服。肉亦可食。

附註：野桃花萼子结实能粘人，四处荒岭路旁皆有生长。苍耳子亦粘人，勿誤用。

疗效：献方人常用此方治小儿咳嗽，疗效极高。

来源：柳州市联合診所 蔡美之

编者按：此方系民间常用方。

治风痰嗽喘方

主治：小儿风寒入肺，风痰壅盛，面白唇淡，脉浮紧。

处方：麻黄五分 白芥子六分 葶藶六分 胆星二钱 半夏二钱 北杏二钱 橘红一钱 薤白六分 远志一钱五分 茯苓二钱 甘草五分

用法：以水两碗，煎成半碗，分二次服。

疗效：（一）卢耀宗，男，生10月，患感冒，延至第二天病转重，咳嗽气促，喉间有痰声，睡卧露睛，神衰面白，服上方二剂，愈。（二）黄妹妹，女，出生月余，患病，到区中医院中心門診部門診。代訴：起病已一星期，大便青綠色，有泡沫，喉间有痰，呼吸迫促，舌苔白膩，服上方三剂而愈。

来源：区中医院中心门诊部 周基邦

治小儿肺热咳嗽（肺炎）方

一 方

主治：发热，咳嗽，痰稠难排，喘促，面赤唇红。

处方：北杏仁五钱 硃砂一钱 牛黄二厘 川贝母四钱 浮海石三钱
胆星三钱 石膏六钱

用法：上药共为细末。以蜜糖调如膏，口服。三岁以下每次服一钱，每日三次，连服二至三天。

疗效：南宁铁路医院治疗三例，疗效很佳。试举一例：

李少华，男，1岁，患肺炎，到南宁铁路医院治疗。其发热 40°C ，咳嗽气急，经听诊，肺有囉音，再经血检，诊断为肺炎，注射青霉素，无效。改服上方后，历廿六小时，体温逐步下降，症状渐失。计服药四天，痊愈。

来源：南宁铁路医院

二 方

主治：小儿肺热咳嗽，痰壅气促。

处方：生山药量不拘

用法：用适量水煎，频频灌服。

疗效：献方人用此方治愈多人。兹举一例：

靖西新圩乡把坎屯黄氏芳，女，生8月，患发热咳嗽，饮食减少。医者以参苏饮及惊风药治之皆不愈，以艾灸之，热益高，颜面潮红，咳嗽连连，饮食不进，痰壅气促，病势危急，向献方人求治，勉以上方与之。服药后不到一个钟头，热渐退，痰渐消，目徐徐开，频频灌之，是夜能睡，继服一日，愈。

来源：靖西中医学院 黄大盛

治小儿咳嗽久不愈（慢性支气管炎）方

主治：小儿咳嗽久不愈，痰涎上壅，气逆，清晨咳多。

处方：僵蚕一钱 橘红一钱 麦冬一钱 白芨五分 杏仁一钱 硃砂五分 石膏一钱 清夏二钱 金薄二十三张 南星一钱 川贝三钱 琥珀五分

用法：共为细末。一岁以下每日服三分。一至三岁每日服一钱至一钱五分，均分三次服。

疗效：南宁铁路医院治愈三例，效果很好。兹举一例如下：

徐桂南，女，生9月。从出生三月起，患咳嗽，以后缠绵不愈，经西药治疗未好转。1959年3月28日患麻疹后仍咳嗽不止。转服上药两天，即愈三分之二，再服二天，痊愈。

来源：南宁铁路医院

乳 哮 类

治小儿乳哮方

主治：小儿乳哮。

处方：檸檬木强五钱 黄糖二两 猫肠二条
去屎

用法：将猫肠煨干研末。余二药以水碗半，煎取半小碗，以猫肠末，分三次冲药汤服。

功用：化气定喘。

疗效：献方人用此方曾在浦北、横县等地医好十余小儿。

来源：贵县大梓乡 卢燕飞

腹 瀉 类

治小儿腹泻方

主治：小儿水样腹泻（急性肠炎）。

处 方：新鮮紅鸡冠花二兩

用 法：水200毫升，以文火煎成100毫升，过滤，加糖浆調味，日服二次，每次服20—30毫升。

疗 效：区人民医院儿科用此方治疗廿二例。其中十六例于服药后一两日内症状消失；三例病情減輕；三例是慢性腹泻、无效。

来 源：广西僮族自治区人民医院儿科

口 腔 病 类

治 口 疮 方

主 治：口舌糜烂，牙龈出血。

处 方：內服方：生地三錢 山藥二錢 萸肉二錢 丹皮二錢 茯苓二錢 泽泻二錢 猪苓二錢 木通一錢 黃連一錢 竹叶二錢 元参一錢五分 黑梔一錢五分 甘草一錢

外用方：冰片五分 熟硼砂五錢 元明粉五錢

用 法：內服方以水兩碗，煎取半碗，分兩次飯后服。外用方共研为末。以药末搽口舌处，每日搽四至六次。

功 用：滋阴，降火，清热，解毒。

疗 效：南宁市尙仁街民安里黎群妹，女，4岁。口舌糜烂，齿齦出血，小便赤，大便酱色，体温37.5°C，不能进食，服此方药二次，齿齦止，口疮轉好，能进食，两天痊愈。

来 源：南宁市中医学会 曾昌汉

編者按：素問气交变大論謂：“岁金不及，炎火乃行，民病口疮。”是口疮乃由火所生。火有虛实之別。实者正治，虛者从治。此方系六味地黄湯加味，滋阴降火清热解毒。是口疮兼齿齦正治法。外用方即外科正宗之冰硼散，为一般口疮常用药。

治小儿鵝口疮方

一 方

主 治：白斑点累累，滿布口腔內上顎兩頰和舌上。

处 方：人中白五分 硃砂二分 熟礪砂五分 石膏五分 梅片三分
蜂蜜適量

用 法：共为細末，調蜂蜜塗于口腔內患处。

疗 效：潘××，男，1岁，住貯木場。患鵝口疮，用上药連搽三天，口腔內斑点消退。

来 源：柳州市联合診所 謝紹先

二 方

主 治：嬰孩初生一二月，口內生白块（即鵝口）

处 方：生地一錢 淡竹叶 淮通各一錢 麦冬 桑叶 糖梗 甘草
各五分

用 法：以水一小碗，煎沸五分鐘。每日分几次酌量分服。

疗 效：献方人負責樟木医务所时，义塘村一妇人来所云：我孩子患滿口白块，不能吮乳，曾用冰礪散屢擦不效。献方人給予此上方，囑煎湯服，不須药散擦口。服后如何状况，于两日內告知。至期，妇人来告，病已痊愈。

来 源：区中医专科学校 叶縵卿

三 方

主 治：小儿口舌起白泡，不能吮乳。

处 方：梅子木莖一兩

附 註：上药取不出土者，出土者不可用。

用 法：煲成药水，用新紅布湿透，洗口內，每天洗二、三次。

疗 效：此方系民間驗方。經献方人臨床实践疗效很好，每例均用

二次而癒。現舉驗案一例如下：

橫縣黃義生小孩，2歲。口腔起白粒兼咳嗽，經打盤尼西林針和塗西林油無效。服養陰清肺湯亦無顯著效果。用此方治療，兩天而癒。

來源：橫縣人民醫院 梁濟川

編者按：梅子木蠶為薔薇科植物。學名：*Prunus mume* S.et z.

治 牙 疳 方

一 方

主治：小兒齒齦腐爛，時出膿血，口有臭穢。

處方：木波羅果皮一兩 梅片二分

用法：上藥研細末。先將患處洗淨，日搽藥末二次。

功用：排膿，消毒。

療效：陸三妹，2歲；李春福，5歲；譚水養，3歲。均患牙疳，用此方擦四至六天，皆痊癒。

來源：南寧市民生聯合診所 張南山

編者按：木波羅又名樹波羅、波羅蜜、麵包果（桂南名）。為桑科植物。學名：*Artocarpus integra*(L.)Merr.

二 方

主治：小兒口內起如米粒小點，或紅或白，疼痛，甚則滿口糜爛，連及咽喉，不能飲食。

處方：木槵子二錢 雀兒麻根二錢

用法：將上二味搗爛，用蜜糖一茶杯泡浸一宿，用紗布包裹壓取汁，去渣。以藥液拭患處。

功用：清熱，解毒。

療效：此方系獻方人祖父義堂秘傳。治小兒口瘡，口糜爛，無論紅白色粒均可治。平坡蔣亞水，女，3歲，口糜爛，經治

疗数月无效，献方人用此方一剂而愈。

来源：岑溪县太阳公社 廖之章

编者按：木槵子为无患子科植物。学名：Sapindus mukorossi Gaertn.

雀儿麻根为瑞香科植物。学名：Wikstroerma indica (L.) C. A. Mey.

治小儿牙宣方

主治：牙肉收缩，牙脚宣露，牙肉色白，齿齦流血。

处方：当归白芷汤：当归一钱五分 白芷一钱五分 升麻七分 防风一钱 骨皮二钱 川芎一钱 细辛五分 槐花二钱 藁本一钱 赤芍一钱五分 黑梔一钱五分 甘草一钱

用法：净水十一两煎取六两，分三次服，饭后服。

功用：祛风，解毒，活血，止血。

疗效：南宁市尙仁街民安里刘添寿，男，6岁。患牙肉收缩，牙脚宣露，牙肉白色，每晚睡眠，齿齦流血，沾染床蓆，病十二天后，服此方一剂，齿齦流血止，牙肉逐渐恢复原状。再剂痊愈。

来源：南宁市中医学会 曾昌模

编者按：此方即医宗金鑑治齿齦口臭之玉池散去生姜、黑豆，加赤芍、黑梔。

治小儿重舌方

主治：舌下血脉胀起，状如小舌，刺痛，身无热，悶悶不安。

处方：蛇蛻不拘多少

用法：煨存性，置地上去火毒，研末。置少许于口内患处，三、五次即痊愈。

疗效：（一）覃健贞，女，24岁，桂平县木乐公社湓塘屯人。4岁时患重舌。初，舌下刺痛，饮食不便。三、四天后舌下

重生一舌，痛更甚。悶悶不安，身无寒熱。用此方治療而愈。（二）平南縣鹿風公社銀塘工區鄭思成之子，2歲。患重舌病，亦以此方治愈。

來源：桂平縣木樂公社醫院 覃健儒

編者按：此方出千金方。

治走馬牙疳方

主治：小兒走馬牙疳，牙齦潰爛，流出膿血腥臭。

處方：麝香一分 冰片 兒茶 雄黃 馬勃 秋石 硼砂 青黛
各一錢

用法：共為細末，撒患處，愈為度。

療效：此方療效顯著，1958年南寧市紅十字會醫院兒科發現四例為走馬牙疳，除一例因口角潰瘍面過廣，結合抗生素治療外，其餘三例，皆用上方治愈。一般經三日即停止蔓延。一星期即干水收口。

來源：南寧市紅十字會醫院

腹 痛 類

治食積腹痛方

主治：小兒食積，腹痛，煩渴躁擾，夜啼不眠。

處方：蒼耳根一兩 玉蘭花根一兩 白毛茶一兩 牛尾薺六錢 蘭
羊花根^{三錢}_{炒焦黑}

用法：共研細末，蒸豬肉或豬肝（不用鹽油）食，周歲小兒每服五厘。3至5歲每服七厘。5至10歲每服一分。注意勿服過量，過量則面色微紅似醉。

附註：蒼耳根立夏前採用，遲則為虫蛀根無效。白毛茶枝葉均用，花開黃、白兩色，七月開花，八月採用為宜。此藥治小兒煩渴極驗，并能退潮熱。

疗 效：此方系文昌祠老和尚惠能秘传。立誓赠送不卖钱。献方人历年制药赠送，治愈多人。

来 源：南宁市中医学会 梅元禧

编者按：白毛茶又名毛毛茶（南宁名）。为木樨科植物。学名：*Jasminum amplexicaule* Buch.-Ham.

牛尾蓄又名千斤拔、凤凰肠、牛尾蕩、老鼠尾（南宁名），为豆科植物。学名：*Moghania Prostrata* Wang et Tang.

玉兰花的根为木兰科植物。学名：*Magnolia denudata* Desr.

闹羊花为茄科植物。学名：*Datura metel* L.

疳 积 类

治 疳 积 方

一 方

主 治：小儿疳积，头髮焦稀，面黄肌瘦，腹膨胀，睛生翳膜。

处 方：煨石蟹一兩 蒙花八錢 蕤藜八錢 石决明八錢 白朮八錢
白茯苓八錢 甘草四錢 煨甘石一兩 海螵蛸一兩 蚕沙八錢
煨蘆会一兩 白菊八錢 絲餅八錢 淮山藥八錢 萸肉四錢
丹皮六錢 北五味四錢 夜明砂八錢 海金砂八錢 茯神八錢
建曲八錢 青箱子一兩 益母草四錢 硃砂一兩 磁石八錢

用 法：上二十五味，共研极細末。每服一至二錢，用飯湯冲服或拌飯亦可。如眼生翳膜以鸡肝或猪肝一片，剖开，以药末一至二錢掺入肝内，蒸熟食，每日食一至二次。

附 註：虛弱加白洋参五錢。有虫加樗子、水仙子各八錢。偏热加胡連五錢。

功 用：健脾，消积，杀虫，除翳膜。

疗 效：此方乃岑溪上游公社汶洞伍姓的家传秘方。效果卓越，久

已遍传，百里内小儿疳积，多以此方治愈。岑溪县太阳公社中心医院几年来以此方治愈小儿疳积亦不少。虽骨瘦如柴亦能转为肥健。

来源：岑溪县太阳公社中心医院

二 方

主治：小儿疳积，面黄体瘦，毛髮焦稀，不思飲食，消化不良，渐至夜盲，或睛生翳膜。

处方：赤石脂四兩 牡蠣四兩 海螵蛸四兩 滑石四兩 黃丹二兩
硃砂二兩

用法：上药細研，水飞三次，晒干，成粉末。每服五分，用鸡肝或猪肝一片，竹刀剖开，掺药末入内，以米泔水煮熟，食肝药并飲湯。每日照上服一次。

附註：随五疳症状出現加味：現心疳症状者，加重硃砂并間服甘麦大枣湯。現肝疳症状者加金蝉蛻。現脾疳症状者加淮山药、鸡内金。現肺疳症状者加沙参，蘆会（煨）。現腎疳症状者間服六味地黃丸。

功用：解热，消积，杀虫，除翳膜。

疗效：此方系献方人三代祖传秘方。治愈者不下数千人。对患疳积重症，形瘦骨立，睛生翳膜，但腹皮未有血斑点者均能轉危为安。

1957年糯垌街李凤英之女甘亚十，年5岁；林培乐之子，年3岁，均患疳积重症，肌瘦骨立，睛生翳膜，几不成人形。用此方治疗，三天膜退，五天食慾增；十天后恢复健康。

来源：岑溪糯垌中心医院 甘均权

治眼疳方

一 方

主治：小儿眼疳，头发焦稀，面黄体瘦，疳热上攻，目痒赤烂红肿，生翳障，渐至遮睛。

处方：枯凡七分 熟硼砂三钱 生煨甘石五钱 辰砂二钱 淡乌贼骨五钱 蝉衣二十只 夜明砂三钱 木槵子炭^{一钱五分 去核} 煨龙衣三钱

用法：上九味共研细末，过筛。每次用药末三钱，蒸猪肝食。或以米汤冲服。每日服一至二次。

功用：退翳，明目。

疗效：此方治愈小儿眼疳三十多例。如岑溪太阳公社古河莫柱森之女、平塘林开秀之子、林明涛之女，均患眼疳。服此方一至二料均痊愈。

来源：岑溪县太阳公社 林开基

二 方

主治：小儿眼生翳膜，赤痒疼痛，流泪难开。

处方：石蟹一钱五分 羚羊角^{一钱 先煎} 决明子一钱 连翘一钱五分 防己一钱 木贼一钱 菊花一钱 白蒺藜一钱 龙胆草五分 羌活子^{一钱 酒洗}

用法：以水三碗先煎羚羊角，后下诸药，煎成一碗。日分四次服。

疗效：靖西城郊区东利乡晒岩屯潘氏硕，女，5岁。初发寒热，眼红肿痒痛，流泪不开，口唇鲜红，手纹紫红，颜面青色，饮食减少，脉洪，以上方治疗，一日见效，五日痊愈。

来源：靖西中医学院 黄正文

三 方

主 治：小儿疳积，眼生翳膜，眼闭不能开。

处 方：頭髮灰一錢 田螺壳十只 孵出鸡蛋壳五只

用 法：上三味，共研为細末。每次用一錢，蒸猪肝或鸡肝食，日食一至二次。

功 用：消积，退翳膜。

疗 效：此方曾治疗多人，收效均好。现举一例：

李××，男，5岁，田东第二区金陵乡人。患疳积，睛生翳膜，視物不明，久治不愈。后用此方服七天而愈。

来 源：田东县和平公社 林文坚

治 蛔 虫 方

主 治：腹时有絞状疼痛，肚脐灼热，大便結或溏，有时排出蛔虫。

处 方：大黃^{四錢}_{后下} 枳实三錢 厚朴^{三錢}_{后下} 檀香^{二錢}_{后下} 黃連二錢 檳榔四錢 使君子三錢 榧子三錢

用 法：以清水二碗半，煎成一碗，頓服。服此方时，先服两面針粉二分。

疗 效：薛容清，男，7岁，住上谿埠288号。腹痛十日，經人民医院检查有蛔虫，不发热，但脐处灼热，絞状疼痛，哭至声嘶，大汗出，已十天不食，体温摄氏37度。服此方一剂而愈。

附 註：病后体弱，孕妇，虛泻等不宜服。

来 源：柳州市城中中医診所 曾启光

編者按：此方药量稍重，用时宜注意。

治 蟯 虫 方

主 治：蟯虫病。

处 方：遇仙丹：白黑丑^{一兩}_{安第一末} 檳榔^{一兩}_{半生半炒} 三稜三錢 莪术五錢 牙皂三錢

用法：共研細末，以糖拌溫開水送下。四、五歲小兒每服一錢。大人每服三錢。

療效：據獻方人云：一小兒晚間睡眠，呼其母云，屁股作痒，其母疑發疮癰，以灯火審視，見肛門有蟻虫爬出，約十余條，蠕蠕然動。來求診。予上方。每服二錢，自晨服下，至10時即泻下不消化之糞渣，蟻虫与水夾雜而出。初次泻下至少有百余條，后逐減少。共泻十余次，毫無疲憊。虫症愈后，兒亦肥健。

來源：區中醫專科學校 叶縵卿

盜汗類

灸治盜汗、多汗

主治：小兒患肺結核，體弱，夜間多汗。

取穴：陰郄 大椎

用法：用艾絨直接灸上兩穴。每次三至五壯，視出汗輕重及病人忍受力而定。每天一次。

療效：桂林市工人醫院採用灸治小兒患肺結核及身體虛弱盜汗，服藥不止者四例。經治療后，当晚盜汗顯著減少，最多兩三天汗即止。

來源：桂林市工人醫院

軟骨病類

治小兒軟骨方

主治：小兒三、四歲，不能行步，肢體軟弱無力。

處方：還少丹加味：菖蒲二錢 萸肉三錢 巴戟三錢 北味二錢 遠志肉三錢 茯苓三錢 麥冬三錢 附子二錢 肉桂二錢 續斷三錢 熟地二錢 碎補三錢 牛膝三錢 歸身三錢 北芪四錢

大枣三钱 牛骨髓四两

用法：上药研末，牛骨髓蒸熟和药末炼蜜为丸，如指头大。每次服二丸，口服三次，以淡盐汤送下。

功用：补肾，补血，强筋骨。

疗效：连服药丸四料即生效。1952年新塘村谢文德，男，5岁，谢秀娟，女，4岁，各服丸药二料即能行走。此方可治大人腰膝痠软，面色苍白，精神萎靡，虚弱症等。

禁忌：忌食水果及寒凉食物。

来源：横县百合卫生所 方德星

天 泡 疮 类

治小儿天泡疮方

一 方

主治：起疱无脓，内含清水，疮破水流，水沾处，便起疱，甚至烂漫全身。

处方：黄柏^{五钱}_{研末} 水豆腐二两

用法：上二味，拌搅和匀，扫在疮上，一、二日即结痂而愈。

功用：清湿热，解毒。

疗效：据献方人云：黄国登之子黄亚弟，患天泡疮，延及足部，用西药治疗无效。后用此方治愈。热毒烂肉出水，此方亦可治。漳州高中黄××，手腕腐烂，痕痒出水，经用此方治愈。

来源：桂平县城厢公社 冯少芝

二 方

主治：满头白泡，小瘡发痒，用手抓破流血水如南瓜浆汁，水流处即起泡，满面浮肿，眼不能开，周身发热，食慾不振。

处 方：（一）龙衣八分 五倍子五分 花粉一钱 沒药一钱 川連一钱 白芷一钱 大黃一钱 黃柏一钱 山枝一钱

（二）銀花藤二兩 水楊梅一兩 九里明一兩 牛柑木一兩

用 法：第一方各药共为細末；第二方以五碗水煎成三碗。先以第二方药水外洗患部，然后以第一方药散用冷开水調搽患处。上药量分二天搽、洗用。

疗 效：据献方人云：曾用上药治疗小儿滿头天泡疮八例，收效迅速。一般一、二剂便疮消痒止而愈。

来 源：柳州市联合診所 周七

生殖器肿类

治小儿阳物肿方

主 治：小儿阳物肿痛。

处 方：灯草湯：灯草一小把 生硼砂适量

用 法：灯草水煎不拘时服。另用生硼砂适量浸水扫阳物上。

疗 效：1955年經治棉村乡宝贝屯覃月屏小孩，扫、服各一、二次，痊愈。

来 源：貴县大圩乡 楊蔭堂

花柳病类

治花柳方

一 方

主治：花柳病，鵝臙，疳疮，芒果，白浊。

处方：（一）内服方：防风二钱 荆芥二钱 桃仁三钱 粉葛二钱
木通二钱 柴胡一钱五分 大黄二钱 白茯苓二钱 土茯苓三钱
银花二钱 蝉退一钱五分 滑石三钱 炮山甲三钱
元明粉^{一钱五分}冲服 珍珠^{五分}冲服
（二）外洗方：苦灯茶三钱 银花三钱 海桐皮三钱 大黄三钱 芒硝五钱

用法：内服方，用水二碗煎取一碗半，早晚饭前冲元明粉、珍珠末服。外洗方，以水五斤煎成四斤，冲芒硝洗患部。

功用：清热，解毒。

疗效：雷××，男，35岁，住南宁市西乡塘夏雷村。1949年，因狎妓患鵝臙、疳疮、芒果、白浊等症。经其他医药治疗廿五天无效。服此方三次，疳疮干水，芒果消灭，白浊减少。治疗四天痊愈。此方曾治四人，亦均有效。

来源：南宁市中医学会 曾昌燮

二 方

主治：口鼻头面糜烂，或边缘不整的潰瘍，下阴潰烂，全身发疹。

处方：五虎平西丹：水银一两 火硝一两 白矾一两 生盐一两 银珠一两

制法：将火硝、白矾分别研末。以直径约一市尺之铁器，放小量

灶上，將白礞末堆放鐵器中心，攤平，再把火硝末放在白礞末面上。以指頭在藥末中間插一小窩，將水銀徐徐放入窩內。用口緣平滑而質堅固的陶質飯碗，將藥復蓋。然後以生鹽一兩，溶于適量水中，以鹽水拌柴草灰（最好用花生豆藤灰，其粘性強，雖烈火燒，不易裂開泄氣）調成稠灰糊，密封碗口邊緣。外面再用于柴草灰將碗身埋好壓實，露出碗腳。上壓重約廿斤之石塊，以防藥物沸騰時，碗被沖起。上事畢，然後用文火煉燒十分鐘左右，至側耳傾聽，內無輕微沸騰聲時，改用武火速燒四十分鐘，停火（不用除炭）。待完全冷卻（約須半天）後，將碗揭起。碗內附有約六錢左右的紅黃色粉末即丹肉，用鐵鏟鏟下，密封于玻璃瓶中，以備制丸時用。殘留于鐵器的黃色粉末為丹腳，約比丹肉多兩倍，另貯玻璃瓶內密封以備作治療類皮膚病之用。藥丸的制法：用丹肉一錢，米餅粉一兩，飯米適量，共搗勻為丸二百粒。丸未干時以銀硃末（或硃砂）為衣，晒干或焙干，貯玻璃瓶內密封備用。

用法：按患者體重服用。體重一百市斤以上者，每早晚各服五丸；八十斤至一百斤者，每早晚各服四丸；六十至八十斤者，每早晚各服三丸；四十至六十斤者，每早晚各服二丸；二十至四十斤者，每早晚各服一丸。空腹或飯後服均可（最好裝入膠囊內吞服）。連服七天為一療程。

附註：一般服藥三至四日有齒齦腫痛或出血，口糜爛，咽喉腫痛，大便帶血性粘液等症狀。間或頭昏、惡心、腹痛或全身不適。這是毒性反應。發現毒性反應可用綠豆、石膏各四兩，煲水約二斤含漱。如無綠豆，可用生桑葉、生狗肝菜各四兩，煲水約二斤含漱，并吞服一些。反應症狀較重者可加用連翹、赤芍、銀花、苦參、甘草各三錢，以水一斤煎取十兩，分二次服。若反應嚴重，患者難受，則酌情暫停服丸藥。症狀消失後，如有骨痛或關節疼痛，行走

困難等病況，可用珍珠三分、琥珀三錢、苦參一兩、銀花一兩、甘草一錢五分，共為細末，米糊為丸如綠豆大，每日早晚空腹各服五丸，連服七天。若疼痛仍未消失，繼續再服七天，或每日早晚生吞犂頭蛙（拇指頭大，三角尖頭，肚黃背花，善跳躍，旱田草坪都有。淨水洗淨吞服）一只，連服七至十五天更效。如有因外傷創口不易痊愈者，可用雞蛋黃一枚放銅杓內，慢火煎焦至出油，以油塗患處即愈。若用大頭龜一只、土茯苓一斤，以水十斤熬半天後去渣，再熬成膏服之，可除淨余毒。

功用：搜毒，辟穢。

療效：此方是獻方人數代祖傳，曾治療千餘人，均有顯著療效。茲舉驗案數例：

（一）李××，26歲，農民，體重六十公斤。患梅毒，注射“六〇六”十支、“九一四”十二支，均無效。服此方半個療程，愈，且七年未復發。（二）十多年前原太平區永平鄉旺垌村韓××夫妻、子媳、孫兒一家七人，均全身發疹，頭面口鼻糜爛，經用此方治療半個月，均愈。（三）1955年平南縣東平鄉格木坑覃××，男，34歲。顏面及兩下腿、陰部等處潰爛已年餘，隱居家中，不敢見人。曾到平南、梧州治療，無效。後用此方治療三個療程，痊愈。（四）1959年春，和平公社社員陳××，男，17歲。患梅毒，鼻樑已潰爛，兩眼眶及鼻兩側至顴有邊緣不整的潰瘍約8×6公分，上唇已缺，康氏反應強陽性，經中西醫治療，無效。後用此方治療，服藥四天，僅有牙齦腫痛出血等反應。其潰瘍面，逐漸結痂而愈。

禁忌：服藥期間忌食鷄、鵝、鴨肉，以防愈後口臭。

來源：藤縣和平公社制藥廠 陸伯年

編者按：此方即瘍醫大全小鼻丹（又名三仙丹），加銀硃為衣。

治 婦 人 梅 毒 方

主 治：婦人梅毒，以致不孕或流产，或阴部潰烂肿痛。

处 方：土茯苓^{一兩}_{先煎} 忍冬^{一兩}_{先煎} 羌活三錢 大黃^{三錢}_{后下} 前胡二錢
薄荷一錢五分 甘草一錢

用 法：用水600毫升先煎前二味，煎至400毫升，下羌活、前胡、薄荷、甘草等，煎成200毫升，再下大黃，煎三分鐘。分二次服。

疗 效：苏××、陆××、許××等，或婚后四年不孕，九年不孕；或生第四子后七年不孕。經检查，均患梅毒。彼等爱人皆有冶遊史。服此方十至十五剂，皆痊愈。血检轉阴性。

来 源：南宁市人民医院

破 伤 风 类

治破伤风方

一 方

主 治：因伤感染破伤风菌，拘攣，項强，口噤，有苦笑状。

处 方：(一)老鼠仔不拘多少

(二)白附子三錢 天竺黃二錢 白芷二錢 生南星一錢 防风二錢 羌活二錢 天麻二錢

用 法：第一方須浸酒一、二年以上。第二方是成人藥量。以水二碗煎成一碗，一次服。服后飲老鼠仔酒(視各人酒量而定)以行藥力，汗出即愈。

疗 效：韦显光，男，12岁。1958年11月1日破伤左手二指关节，出血不多，伤口无紅肿化脓。第四天抽搐，口噤不能开，无大便，入来宾×医院注射抗毒素，未效，病勢甚危。服上藥三剂，好轉。繼服四君子湯，愈。

来源：区中医院中心门诊部 梁錫恩

编者按：二方即金鑑玉真散加天竺黃。

二 方

主治：破伤风手足抽搐，牙关紧闭，不省人事。

处方：川仲勾藤湯：川仲三錢 川斷三錢 白芍三錢 菟絲餅三錢
双勾藤三錢 蟬退二錢 秦艽三錢 地龍三錢 川木瓜三錢
羌活三錢 甘草二錢

用法：用水二碗煎至一碗，作二次服。

功用：驅風鎮痙。

疗效：1958年貴縣西山吳桂連妻（孕婦），脚躡趾受傷三日後，牙關緊閉，角弓反張，服此方三劑而愈。

来源：貴縣公社西山分社 楊傑才

三 方

主治：破伤风手足抽搐，角弓反张，牙关紧闭。

处方：川足^{二條}_{去頭足} 勾藤一錢五分 辰砂一錢 羌蠶一錢 蝎尾一錢
麝香一分 蟬退三錢 絲瓜絡三錢

用法：共為末。每二小時服一次，每次服一錢，用竹瀝水送下。

功用：祛風鎮驚。

疗效：經治愈梁文光小兒和譚錫仁等六七人。

来源：貴縣八塘鄉 李盛和

跌打損傷類

治跌打方

主治：跌打挫傷，扭傷，疼痛非常。

处方：跌打鎮痛散：乳香一兩 沒藥一兩 白芨一兩 半夏一兩 桃
仁一兩 紅花一兩 丹皮二兩 赤芍二兩 荊芥一兩 防風一兩

細辛一兩 羌活一兩 續斷四兩 木香一兩 青木香一兩 澤
蘭四兩 黃柏四兩 三稜一兩 莪朮一兩 碎朴四兩 五加皮
四兩 麻黃一兩 田七花二兩 羌黃四兩 土鱉一兩

用法：上藥共為細末，以50%酒精調擦患處。擦後，復以酒精調藥末成糊狀敷于患處。

療效：（一）甘國威，男，48歲。1959年3月19日，被壓傷右足，患部紅腫發炎。到南宁市紅十字會醫院治療，敷上藥，第二天止痛，歷十二天出院。（二）滕達椿，男。下肢右踝內側扭傷，局部紅腫發炎，不能隨意運動。3月20日到南宁市紅十字會醫院門診，用此藥敷之，四天愈。（三）何少明，女。上肢右腕關節扭傷，紅腫發炎，運動不便。3月22日到南宁市紅十字會醫院門診，給以上藥，治療四天，痊愈。

來源：南宁市紅十字會醫院

治刀傷方

主治：刀傷流血不止。

處方：乳香一錢 沒藥一錢 制黃丹一錢五分 川連一錢 羅芙木二錢 甘草八分

用法：共為末，撒于傷處。

療效：此方曾治療刀傷出血者百余例，效果很好。如1958年3月，桂林五通大塘大隊隊員彭保元，男，48歲。患癲狂症。自拿剃頭刀割舌將斷，昏迷一天多。請獻方人急救，僅放藥二次即痊愈。1959年五通街毛德昌孫，男，5歲。忽然咬傷舌頭，以此方治療，亦痊愈。

來源：臨桂縣五通中醫院 朱國基

脫白類

治关节脫白方

主治：手足关节脫白。

处方：千斤拔根皮二兩 两面針根皮二兩 牛大力二兩 沉妖儿根三兩 滿天星莖皮一兩 酒餅黃根二兩 小朗傘根二兩 榕樹須二兩 老鴉酸二兩 馬留手二兩 山鷄茶根二兩

用法：共搗爛，以适量好酒炒熟，待微溫敷患处。日敷三次，每次敷三小时。每剂药可連用两天。每次換敷时，祇将原药加酒炒暖，敷于患处。

附註：献方人謂：“因为关节常轉动，故凡关节脫白均不用板或竹片扎夾敷药。否則，必然固定，則关节变成僵直，不能轉动，而致誤患者終身。余医脫白法，除将脫白部位复原及敷药外，并令患者从次日起将患部自作曲伸运动，每日动作两次，每次伸縮四、五回，至癒为止。”

疗效：（一）岑溪大滙乡那兩村程仲元之女，16岁。1956年7月，因挑水不慎，跌倒致右手肘关节脫白。前医用夹板扎住，敷药一星期后，解开夹板，发现患部僵直，不能曲轉，类若廢人，其父焦急異常，繼續延医治疗无效。历廿五天，邀献方人医治，先将此方药擦热患部，施手术使能轉动，然后进行治疗，給药四次，二十天伸縮自如，痊愈。（二）岑溪大滙乡大平村謝广拔之孙亚一，8岁。1956年4月，因在棚上跌下，致右手肘关节脫白。他自用夹板夹住敷药，三天后已成僵直，后用上方法医治，仅給药二剂，一星期而愈。（三）岑溪大滙乡馬亮村李福南，男，38岁。1948年10月，因自高处跌下，致右足股关节脫白。医者用板扎敷药，致右足硬直不能行动，臥床上已月余。邀献方人医治，經手术使腿骨复原，再按照上法治疗，敷药

四剂，計廿五天而愈。（四）岑溪大滙大平村黃德庆之子，7岁。1957年6月，跌伤，右足股关节脫臼，不能行动。用上方法医治，一星期而愈。

来源：梧州专区中医药研究所 陈瀾

编者按：牛大力又名大凉散（南宁名）、刀伤木（玉林名）。为茜草科植物。学名：*Psychotria rubra*(Lour.)Poir.

沉妖儿又名三十蕩（南宁名）、老君須（百色名）、百須根。为蘿藦科植物。学名：*Tylophora yannanensis* Schltr. 滿天星又名大叶两面針（南宁名）、大入地金牛（百色名）。为芸香科植物。学名：*Zanthoxylum ailanthoides* S.et Z.

酒餅黃又名酒果（南宁名）。为芸香科植物。学名：*Glycosmis Citrifolia*(Willd) Lindl.

老鴉酸又名酸味草、斑鳩草、酸漿草（百色名）、酸醬草。为酸醬草科植物。学名：*Oxalis repens* Thunb.

馬留手又名收鷄草、藏鷄蕨、舖地蜈蚣。为石松科植物。学名：*Lycopodium cernuum* L.

山鷄茶又名假米仔兰（百色名）、接骨金粟兰。为金粟科植物。学名：*Chloranthas glaber*(Thb.) Makino

治下頷脫臼方

主治：下頷骨脫臼。

处方：古月粉一至三分

用法：先囑患者将下頷托住，将古月粉用小竹管吹入患者鼻孔內。鼻粘膜受刺激而打噴嚏，脫臼因勢接上。

来源：横县飞龙乡 林启鈺

编者按：利用噴嚏之勢，使下頷脫臼因勢自然恢复原状，法頗妙。但古月粉刺激性过强，改用柔軟紙捻刺激鼻孔粘膜，使其打噴嚏亦可。

炮 礮 类

治枪弹炮伤方

主 治：枪弹砂石鉄釘入肉不出。

处 方：久年黄牛屎 深土淨黄泥 南瓜衣 紅黑头黄蜂窩（即鬼头蜂）推車虫 ^{一個} 土螫虫 千斤拔 芭蕉心各等分

用 法：先将推車虫、蜂窩、土螫虫焙干研粉，与黄牛屎、黄泥、南瓜衣、千斤拔、芭蕉心同搗溶，混合敷伤口处。日換二次，数天即拔出。

疗 效：此方共先后治愈十余例。茲举三例如下：

（一）1931年临桂五通峯境村李树連，男，35岁。打猎不慎走火，鳥枪子弹全部打入在脚部入肉不出，敷此药二次全部拔出。（二）1953年7月，五通天府街王石民，打鳥，弹药爆炸。头脸眼睛被伤，肿大，杂物入肉不出，敷药一星期痊愈。（三）1944年湖南尹××被飞机扫射，弹中臂、腹、头、手等部，敷药二次痊愈。

来 源：临桂县五通中医院 朱国基

編者按：千斤拔为豆科植物。学名：Moghonia Prostrata Wang et Tang.

止 血 类

止 血 方

一 方

主 治：跌打刀伤，伤口出血。

处 方：秘传刀伤散：白芨

用 法：研极細末。以开水調敷伤处，日換二次。

功用：止血，止痛，生肌，埋口。

疗效：据献方人称：此方輕伤三天痊愈，重伤十天痊愈。伤处不須縫合，肌肉生长很快。宾阳县屈达桂，男，30岁。1958年因打球跌扑，口唇破裂一寸左右，到医院治疗，曾先用針縫合，治疗未愈，后来求献方人治疗，用白芨粉以开水調敷，数天即愈，愈后无疤痕。欒城高村鍾才盛，抗日时被日本鬼用枪打伤，枪弹由肩背穿过硬喉，說話无声，气由伤口噴出，伤势危重。經治，先搽少許梅片，后用白芨粉以开水調敷，痛立止，能說話。經十余天痊愈。

来源：横县 黃揚青

編者按：大明，日华本草謂白芨治扑損刀箭創。諸家本草載有化癥，生肌，止血，止痛功能。此方簡便，經濟，效高，可推广。

二 方

主治：外伤出血，內出血。

处方：止血散：海螵蛸<sup>五份
去硬骨</sup> 生蒲黃三份 白芨二份

用法：共研极細末。外伤出血以药末搽患部。內出血，內服。每次服一至二錢，开水送下。

功用：去癥，生新，止痛，止血。

疗效：此方治疗外伤出血，疗效很好。曾經过了多次临床治疗的觀察，确有止血效能，且大都未化脓即結痂生新而愈。內出血疗效亦好。如1943年，忻城县后山街藍××，业农，忽然吐血盈碗。回家后尙咯血二次，血色鮮紅，易凝为块状。邀献方人診治。据說过去不咳嗽，患前无病，祇食辣椒数餐，当天气候炎热，喝水甚少，因此致病。与此方散剂五錢，分二次用冷开水送服。下午复診，血已停止，別无痛感，痊愈。

来源：忻城县 何雪松

竹木刺入肉类

治竹木刺入肉方

主治：竹木刺入肉不出。

处方：醃酸梅<sup>三只
去核</sup>

用法：捶溶敷患处。

疗效：潯州高中学生馮亚秋，女，18岁。被竹刺刺入脚底內有部分竹刺不出，經数日肿胀疼痛，不能行。以此方治之，敷药五分鐘后，即拔出竹刺。

来源：桂平县城廂分社 馮少芝

治鉄碎竹木瓦片玻璃入肉方

主治：鉄片，鉄碎，竹，木，玻璃，瓦片入肉。

处方：牛膝三錢 沙莞三錢 酸薤头五錢

用法：上药为一次量。共同捶匀（如干燥可加白醋少許，不能用水），外敷。

附註：如鉄質入肉須加蓖麻子三錢，同煎各药外敷。

疗效：徐××，男，23岁。炼鋼时被鉄碎片刺入右大腿，深約二寸許。經用上药施治，三天痊愈。

来源：柳州市中医院 梁錫

火毒类

治火毒方

主治：火药炸伤，弹伤，火毒不清，紅肿潰瘍。

处方：万年青头 黄糖各等分

用法：先将万年青头用冷开水洗净，加黄糖同搗烂。外敷患处。药干再換，不論時間。

疗 效：林××，被火药竹箭射伤左面部，起泡破皮，肿胀，左眼不能开，发热疼痛。用上药外敷立即止痛，三天痊愈。

禁 忌：忌食酸、腥、辣等物。

来 源：柳州市人民医院 鍾海波

續 筋 接 骨 类

治續筋接骨方

一 方

主 治：筋断，骨折。

处 方：苧麻茹70% 小驳骨草25% 艾叶2.5% 葱头2.5% 小鸡一个 三花酒一斤

用 法：上五味捶溶，以三花酒煮成糊状，待温，正骨后将药敷患处，历廿四小时即去药，隔数小时重把药加酒少许，炒暖，敷患处，三天后正骨处即能固定。

功 用：續筋驳骨，去瘀，消肿，止痛。

疗 效：北流人民医院用此方治疗骨折经正位后，即敷药，重伤者不过二十天即愈。一般骨折者十多天即能恢复健康。此方曾治愈十余人。如英雄公社大燕塘梁佐球，被汽车撞倒，股骨碎断，经整复后用药三日即能固定，四日后肿渐消，一月痊愈。

来 源：北流县人民医院 罗崇兴

编者按：苧麻为荨麻科植物。学名：*Boehmeria nivea* Gaud.

小驳骨草为爵床科植物。学名：*Justicia gendarussa* Burman f.

葱头为石蒜科植物。学名：*Allium fistulosum* L.

艾为菊科植物。学名：*Artemisia Vulgaris* L.

二 方

主 治：跌伤，骨断，紅肿作痛。

处 方：大駁骨一斤 鴨脚木半斤 灵丹草一斤 駁骨草半斤 生鋸草一斤

用 法：上药搗烂，炒溫，敷伤处，日換药二次。

功 用：駁骨散瘀，消肿止痛。

疗 效：农阿娇，女，19岁，甘茶人。1958年12月曾在某工地跌断手骨，用此方治疗三天即接上。

来 源：田东县 欧阳世英 黄建林

編者按：灵丹草又名大灵丹、千檳柳、照药（桂南名）。为磯松科植物。学名：Plumbago Zeylanica L.

駁骨草又名下草（百色名）。为唇形花科植物。学名：Ajuga decumbens thunb.

大駁骨为爵床科植物。学名：Adhatoda Vasia Nees.

鴨脚木为五加科植物。学名：Schefflera octophylla (Lour.) Harms.

三 方

主 治：骨折。

处 方：茶仔二兩 古銅錢^{四枚 煅} 龙头节大駁骨^{四兩} 柏叶二兩
土鱉^{五錢} 生軍^{五錢} 羌黃^{五錢} 枝子^{五錢} 續断^{五錢} 生川
烏^{五錢}

用 法：共为細末，加面粉一两，用酒煮为糊，敷伤处。并以海蟹骨（煨存性研末），用好酒冲服，每服三錢。

功 用：駁骨。

疗 效：（一）1938年陆××家工人，40岁。因牛車翻倒压断右大腿骨，腿部成曲形，运动不自如，整复后，用此方外敷，次日去古銅錢，繼續敷上药，每日換药一次，十天后即能

起身自坐，二十天后行动自如而愈。（二）1943年，思林街叶福兴次子，6岁。从高处跌下，左手尺桡骨折断，用此方治疗八九天即愈。

来源：田东县 罗惠民

编者按：大驳骨科属学名见上方编者按（第193页）。

四 方

主治：跌打手脚骨折或诸部骨断。

处方：生鸡^{一只}_{约重一斤} 两面针根皮二两 山鸡茶根一两 千斤拔根皮一两 小朗伞根二两 大力黄根二两 沉妖儿根二两 马留手草二两 榕木叶三两 草鞋根三两 香付子一两 羊角扭根皮八钱 大茶药蕈一两

用法：将上药用臼舂细去硬渣，以酒半斤炒熟，待微温（事前应将骨固定，以竹夹包住）敷患处，日敷三次，每次敷二至三时，每次用药必须加酒炒温（勿令过热，以免皮肤起泡）。敷药一星期后，骨即固定，去竹夹，再敷上药二剂即愈。如皮肤起泡，则先治泡以免腐烂，泡愈后，再敷上药。

附：敷泡药方

鸭儿菜一两 油葱一两 蕉树根二两

用法：共捣烂敷之。敷两三日即愈。

疗效：据献方人称：此方治愈多人。兹举三例如下：

（一）大湟乡坡脚村黎湛津，男，15岁。1950年10月因上树不慎跌下，右手支沟部跌断，胸部右边第三肋骨处被撞伤，左足三阴交部，与木头相碰而致皮破骨裂，症状严重，当即一面用板仲、马勃二味混合止血；一面用手术把手脚断骨固定，用薄板片扎住，以此方药敷之。足部三阴交部伤口处，每日改用生锦纹四钱，浸润敷于伤口，连敷至愈，距

离伤口寸半以外，仍敷上药。左足伤处治四十天而愈，右足廿天而愈。伤处愈后均正常。（二）大湓乡車田村黄祚天，男，13岁。1957年7月，因玩抽水机，不慎被抽水机的踏凳打断右足股骨（约在风市上三寸处），卧床已四十天。邀献方人医治，把股骨整理复原，用此方药敷之，敷二剂即能翻身转动，四剂能起床走动，随后继续医治，共历时三十天痊愈。（三）大湓乡六杭村李树元之妻陆氏，年38岁。1957年6月，其头部被坏分子打伤，两手被打断，左足膝下五寸，亦被打断，幸获多人抢救，免于毙命。旋即抬赴医院治疗五十多天，头部已愈，惟手足折断处未愈合，不能行动。用此方治之，敷一剂，症状好转，能举手，二剂，渐能移动，三剂后，能起床走路。再敷二剂，历时三十天痊愈。

来源：梧州专区中医药研究所 陈澜

编者按：山鸡茶又名假米仔兰、米仔花（南宁名）。

沉妖儿又名寻娇儿、三十六荡（南宁名）、百鬚根（梧州名）。

馬留手又名藏鸡蕨（玉林名）、收鸡草（南宁名）。以上各品科属学名，均见脱臼类治关节脱臼方编者按（第188页）。

大力王又名过山香。为菊科植物。学名：Blumea Sp.

大茶药又名大茶根（桂南名）、断肠草（桂北名）、胡蔓藤。为馬前科植物。学名：Gelsemium elegans Benth.

羊角扭科属学名见疝病类治偏墜方编者按（第119页）。

草鞋根科属学名见时行感冒类治时行瘟疫方二方编者按（第2页）。

小朗伞为紫金牛科植物。学名：Ardisia crennata Sims.

五 方

主治：跌打损伤，骨折肿痛，或皮开肉破，骨折破碎，不省人事。

处方：吊水莲_{四两} 鸡骨香_{二两} 画眉跳_{二两} 满天星_{四两} 五加皮_{二两} 万里香_{二两} 生鸡翅脚_{各一副}

用法：上方前六味均用根皮，与鸡翅脚合併捣烂，加好酒适量炒热。将骨折部位用手术整复后，用杉木皮固定，然后将药温敷患处，每天换新药一次，并根据伤势，连敷药七至二十五天。

功用：去瘀生新，止痛，消肿，接骨。

疗效：据献方人称：此方系六代祖传秘方，治愈人数颇多，且一般骨折治疗七天可愈，伤势较重者不超过廿五天即愈。如：
（一）昭平水电站工人劳国基从高山摔下，头部数处受伤，手被摔折，流血不止，牙关紧闭，昏迷不省人事，经用此方治疗廿五天痊愈。（二）农民何其寿，肩骨被压碎，肉烂如泥，亦用此方治疗二十天获愈。

来源：昭平县医务工作者协会 许锦秀

编者按：吊水莲又名红花倒水莲（桂林名）。为紫金牛科植物。学名：Ardisia Villosa Roxb.

画眉跳又名搜山虎（桂林名）、山胡跳（南宁名）、画眉木（桂南名）、花椒树。为芸香科植物。学名：Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.

万里香又名九里香、十里香、木万年青。为芸香科植物。学名：Murraya paniculata (L.) Jack.

此方药物刺激稍大，对外伤皮开肉破者，用时宜慎。

六 方

主治：跌打骨折。

处方：蜈蚣_{七五钱} 九龙子_{三钱} 瑤山竹_{四钱} 透骨消_{三钱} 散血子

二錢 大活血四錢 小活血四錢 檳榔鑽四錢 鉄釘菜四錢 九
节風二錢 金剛風三錢 九牛藤四錢 回生草二錢 金邊土鱉
二錢 隔山消二錢 百鳥不落三錢

用法：共為細末，用酒二兩拌勻，加開水少許敷患處，四十八小
時後骨可接好，二星期可痊愈。

療效：據獻方人謂：此方曾治愈五十人左右，療效很高。秦刘
苟，男，26岁，住临桂县何家舖。外傷骨折，經獻方人用
此方治愈。

禁忌：忌食雞蛋、魚、蘿卜、帶魚、米粉、紅薯。

來源：临桂县定江人民公社大面医院 楊少廷

編者按：九节風為金粟兰科植物。学名：*Chloranthus glaber*
(Thb.) Mahino。

九牛藤為夾竹桃科植物。学名：*Parabarium micranthum*
(Wall) Pierre。

九龍根為葡萄科植物。学名：*Cayratia Corniculata*
(Benth) Gagn。

透骨消為唇形科植物。学名：*Ajaga decumbens* Thunb.

百鳥不落為五加科植物。学名：*Aralia armata* (Wall)
Seem。

瑤山竹為蘿藦科植物。学名：*Pycnosteima paniculatum*
(Bunge) K. Schum.

七 方

主治：跌打損傷骨折。

處方：紅花 桃仁 歸尾 田七 郁金 蘇木 乳香 沒藥各藥適量

用法：內服：以適量水煎，加酒或童便沖服。外敷：研末加酒
調敷。

附註：如接骨續筋加白芨、土鱉。便秘加生軍。實熱加芒硝。
小便不通加木通、車前、滑石。重傷不知人事，加狗狸胆

酒冲服。发热加地骨皮。伤上部加威灵仙。伤下部加牛膝。伤腰部加元胡、蒲黄。伤腰骨加川芎、續断。伤胸部加枳壳、香付。又青壮年人、老年人与衰弱者，用药亦不同，老年人伤骨加骨碎补，青壮年人加生地，衰弱者加川芎、归身、桂心、或鹿角霜，用酒服。壮年俱用童便冲服。

疗效：某年，昭平县有一房舍崩塌，压伤多人。有压断手骨的，有压断脚的，有压伤头部和胸背部的，重伤者不省人事。当时黄华鈞同志，担任治疗，并經别人的共同协助，給伤者敷药、服药。经过一段时间，情况均好转。次日，改用别的草药包紮，所有伤者，又呼痛呻吟，改用前方治疗，伤者才复鎮靜。这一批伤者，除重伤者痊愈較慢外，輕伤者均很快痊愈。

来源：区中医专科学校 叶綬卿

八 方

主治：因外伤骨折而化脓，肌肉腐烂，流出白色脓水，有碎骨在伤口内。

处方：（一）外敷用：蓝姜 香辣蓼 香胶叶 榕木叶 大力牛 各一两 生甘草三钱 山枝四两 碎补四钱 自然铜四钱 杜仲四钱 白芷四钱 土鳖四钱 儿茶四钱 續断三钱 樟脑一钱五分 川破石二钱 莪术一钱五分 乳香五钱 沒药五钱 冰片四分 生鷄^{一只}_{重約十二兩}

（二）外洗用：榕木叶 蕹菜根 地黄草 各等分

（三）内服用：归身二钱 自然铜四钱 无名異四钱 沒药四钱 乳香四钱 三棱一钱 莪术一钱 苏木一钱 田三七一钱 碎补四钱 土鳖五钱 川杜仲三钱 川断三钱 血竭四钱 生地五钱 枝子三钱

用法：第一方前二十味共研細末，將生鷄骨捶爛，與藥末和勻，加雙酒炒熱（以暖為度），攤于油紙上約二分厚，敷患處。每天敷一次，每次敷五至十小時（若發熱腫痛，解開，露冷再敷。以後用藥不用鷄。），連敷一月，每兩天換新藥一次。

第二方煲水洗。

第三方共為細末，每天服二次，每次服二錢，開水沖服。

療效：1956年北流縣獨竹羅章鈞，足脛折斷，經治無效，患部潰爛，露出黑色坏死骨頭，用上藥治療一月，痊愈。至今勞動，體力如常。

禁忌：忌食公鷄、禁房事一百天。

來源：北流縣衛生工作者協會

編者按：藍姜又名黑心姜、綠姜、賊老姜、風姜。為薑科植物。

學名：*Zingiber Zerumbet* (L.) Sumth.

香茅又名藥祖、耳挖草、韓信草、魚生茅（百色名）、

紅茅（南寧名）。為茅科植物。學名：*Polygonum Viscosum* Ham.

香膠樹葉又名楠木葉、柞木葉、假欖木葉（南寧名）、膠木葉（梧州、玉林名）。為樟科植物。學名：*Lindera communis* Hemsl.

大力牛又名千斤拔、老鼠尾、牛尾蕩、鳳凰腸、透地龍、千里馬、牛屯頭（百色名）、大力麻（桂林名）、土黃芪（南寧名）。為蝶形花科植物。學名：*Maghania strobilifera* (L.) J. St. ilaire ex Jacks.

榕木科屬學名見鶴膝風類第二方編者按榕須條（第72頁）。

川破石為桑科植物。學名：*Cudrania tricuspidata* Bur.

九 方

主治：由于跌打所致，不論何處骨折皆治。

处 方：（一）消肿止痛方：铁巴掌根皮二两 大力王根皮一两
鸡骨香根皮二两 石兰香根皮二两 山射香根皮二两 地肤
子六钱 韭菜根一两

（二）接骨方：黄龙退壳二两 榕树叶二两 罗狄笋二两
木骨髓一两 一包针十两 木瓜筒三两 血龙莖四两 白紙扇
莖四两

（三）理气血壮筋骨方：大力王四两 横角牛二两 坐山虎
二两 山大艾二两 黄龙退壳四两

用 法：第一方：各药共捣烂，加酒适量，炒热，先将骨折整复固
定，然后将药敷上。每二天换新药一次。痛止肿消后，换
敷第二方。

第二方：各药共捶烂，另用黄脚公鸡一只去毛及内脏，捶
烂，与药和匀，加鸡血，以酒少许共炒热敷患处。每日换
新药一次，连敷七天后，换敷第三方。

第三方：各药共捣烂加酒炒热，待温，敷患处。隔二天换
新药一次。至筋不急、不痛即愈。

疗 效：此方曾治愈李振隆、周亚五等三百余人，功效显著。

来 源：岑溪飞跃人民公社制药厂中心医院 黄道兰等

编者按：铁巴掌又名鸡骨草、铁门坎、小牛甘、红毛鸡药（南
宁名）。为蝶形花科植物。学名：Abrus cantonensis
Hance。

石兰香又名泽兰。为菊科植物。学名：Eupatorium
chinense L.

山射香又名入地射香（梧州、百色名）。

罗狄笋又名蘆狄笋。为禾本科植物。学名：Phragmites
Vulgaris(Lam)Trin.

一包针又名花叶万年青。为天南星科植物。学名：Die-
ffenbachia Picta Schott.

木瓜筒为番木瓜科植物。学名：Carica papaya L.

血龙藤又名鸡血藤。科属学名見内科肺癆类第一方編者按小血藤条(第32頁)。

白紙扇又名玉叶金花。为茜草科植物。学名: *Mussaenda Pubesens* Ait. f.

横角牛又名横角紐、羊角紐。为夹竹桃科植物。学名: *Strophanthus divarcatus*(Lour.)H.et A.。

坐山虎又名黎蘆。为百合科植物。学名: *Veratrum nigrum* L.。

山大艾又名山艾、野艾(桂林名)、鬼子艾。为菊科植物。学名: *Artemisia* SP.。

十 方

主 治: 外伤骨折肿痛。

处 方: 天吊香_{四兩}

用 法: 上药研粉, 加三花酒少許調成糊状, 蒸热, 摊于紗布上敷患处, 約一个对时, 将药取下, 再加三花酒少許調和蒸热再敷。連敷三天, 骨接如常。

疗 效: 此方系献方人祖传七代秘方, 經亲自治好六十余人。

来 源: 鹿寨县 邱国汉

編者按: 天吊香又名田基王。为金絲桃科植物。学名: *Hypericum Japonicum* Thb.

十 一 方

主 治: 骨折。

处 方: 五加皮_{四兩} 小雄鸡_{四兩}

用 法: 小雄鸡去毛什, 勿沾水, 与五加皮共捶烂敷患处, 历二十四小时去药, 另以五加皮三两, 酒煎內服。

功 用: 駁骨。

疗 效: 献方人曾用此方治愈黃廷甫骨折。其徒弟欧文德, 将此方

治鸡、鴨、兔子、耕牛及人等骨折皆愈。

来源：鹿寨 胡化成

编者按：五加皮为五加科植物。学名：*Acanthopanax spinosus* Miq.

跌打药酒方

主治：跌仆打伤（未破者），红肿疼痛，及一切身骨痠痛。

处方：三钱三根三兩 鬧羊花三兩 川烏一兩 两背針二兩 細辛一兩 黃柏一兩 療刁竹二兩

用法：上七味研粗末，用百分之七十酒精2000毫升浸漬15天可用。用时将药酒加温，外擦患部，或以紗布浸湿敷匀。輕症不須加温。

功用：散瘀，消肿，止痛。

疗效：此方使用于跌仆打伤肿痛，确有鎮痛消肿散瘀之效。1957年猷方人，由于俯仰不注意，腰脊忽然疼痛，不能屈伸，下床行走亦感痛楚。經用此方药酒加温外擦，一日六七次，第二天能翻身，自由下床，經過二天已基本复常，再擦二日痊愈。1958年在水利工地及紅渡炼鋼工区时使用，每用每愈，輕者一日，重者三四日，或加以热处理，效果尤显著。

禁忌：忌內服。

来源：忻城县加仁 何雪松

编者按：三钱三根即博落迴，又名号筒管。为罂粟科植物。学名：*Macleya Cordata* R.Br.。

两背針科属学名見时行瘟疫类第一方编者按（第1頁）。

療刁竹为蘿藦科植物。学名：*Pycnostelma chinense* Bunge。

鬧羊花科属学名見腹痛类治食积腹痛方编者按（第173頁）。

治骨折內服方

主 治：外伤骨折。

处 方：当归一兩 川芎六錢 白芍六錢 熟地六錢 木香一兩 丹皮八錢 炒乳香一兩 炒沒藥一兩 碎补六錢 紅花六錢 硃砂一兩 丁香四錢 吉林參一兩 虎脛骨四兩 自然銅^{二兩醋制}

用 法：共为細末，炼蜜为丸，每丸重一錢。每日服两三次。每次两三丸，开水送服。

疗 效：南宁鐵路医院治疗六例，效果均好。計柯氏骨折一例，脛骨折一例，髌骨折二例，腰椎橫突骨折一例，骨盆骨折一例，患者年齡在18—48之間，折骨固定后即开始服丸。一般在二至四日即消肿。廿天后即有骨痂生长。

来 源：南宁鐵路医院

接 筋 方

主 治：刀伤筋断。

处 方：干地龙三錢 干水蛭三錢 干鸡內金三錢 大梅片一錢

用 法：地龙、水蛭、鸡內金共研极細末，过篩。梅片另研細末，与上药末拌勻，瓶貯密封，勿使泄气。初伤血流不止，以药末干摻伤处，用沙布綳好。血止后，第二天将旧药除去，另以药末与适量凡士林混和敷伤处，每日换新药一次，至愈为止。

功 用：止血，止痛，接筋。

疗 效：（一）横县校椅区东圩乡茶村黄其子之女，14岁。因被鐵伤足后，筋已断，用此方治疗三星期，痊愈。（二）六蓝村吳敬敏，男，40多岁。斧伤足部，筋已断，血流一昼夜未止，經三易医治疗无效，后用此方治疗七天即能行走。（三）校椅区旺安乡旺安村某木工，被斧砍足背解谿处，筋断数条，用此方治疗十天，即能行走。（四）青桐

乡中围村李其同，男，50岁。斧伤足面，筋断数条，昏倒地上，流血不止，用某药厂止血药无效，用此方治疗二十多天痊愈。

来源：横县六蓝工地医院 王统群

治骨伤愈后僵硬方

主治：骨伤愈后僵硬。

处方：第一方：白芷一钱 独活三钱五分 北蓍四钱 桂枝一钱五分
桑寄生八钱 当归八钱 羌活二钱 川芎四钱 木瓜四钱
炙甘草二钱

第二方：桂枝四钱 干姜五钱 吴茱萸六钱 熟附八钱

第三方：宽筋藤四钱

用法：第一方：用水二碗煎取一碗服。第二方：共研末用酒蒸温敷患处。第三方：煲水温洗。

功用：祛风湿，活血，通经，舒筋络。

疗效：雷××，男，20岁。跌断右手尺桡骨。治愈后，手掌及五指和关节僵硬，麻痺，无知觉，不能摇动，经治无效。用此法内服、外敷、温洗二十天痊愈。

来源：柳州市人民医院 陈端才

湯火伤类

治沸湯伤方

一 方

主治：沸湯烫伤身体各部均可应用。

处方：（一）外用方：蔷薇花叶花更好 双酒
（二）内服方：灯盏菜半斤

用法：第一方将蔷薇花叶捣烂，冲酒和匀成浆糊状，敷患处。轻

伤日敷二次，重伤日敷五六次，至愈为止。又，此方各药用量，按伤轻重而定。外敷药时将第二方药煲水二斤，当茶频饮。

疗 效：此方曾治愈廿余人。如1958年冬，古万学校教师韦德亮及学生陈月芬两人，各被松毛油烫伤两足，疼痛，发热，经多方治疗，均未获效。后用上方药敷患处，未滿十分钟，疼痛即消失，且当晚能安眠。連續內服外敷一星期，痊愈。

禁 忌：在治病期中，禁食鷄、牛、猪肉。

来 源：梧州专区中医药研究所 陈瀾

編者按：蔷薇花又名野玫瑰花（百色名）。为蔷薇科植物。学名：*Rosa chinensis* Jacq.

灯盏菜即雷公根。为繖形科植物。学名：*Centella asiatica*(L.)Urb

二 方

主 治：水火烫伤。

处 方：金英根_{适量}

用 法：将金英根烧炭为末和茶油調塗伤处。

疗 效：猷方人堂姪亚礼被火伤足部，伤势甚重，用此方治愈。

禁 忌：忌食牛肉、生鷄、虾等物。

来 源：貴县橫岭乡 蒙惠仁

編者按：金英根科属学名見阴挺类治阴挺方一方編者按（第141頁）。

三 方

主 治：火烫伤，紅热疼痛，或起泡脫皮潰烂，流腥臭脓水。

处 方：第一方：荳藤 蒿菜（野同蒿） 大冬青 蛙滑菜 車前草 縮气凉各等分

第二方：上枚片二錢 甘草一錢五分 制黃丹二錢五分 正川連三錢

用法：一方各藥，研成粉末，先用雞蛋白搽傷處邊緣，后摻藥粉。二方各藥，研細末。于患處先塗上小麻油，后放第二方藥粉，并敷第一方草藥粉于邊緣。

療效：（一）1957年臨桂縣五通郵電局梁政之女，7歲。被燒傷下陰及腿部，潰爛，先后經過了多方的治療，但都無效。用此方治半月，痊愈。（二）1957年五通第七生產大隊黎玉妹，女，11歲。被火燒傷臀部，日久潰爛，臭氣難聞，用上方治療，痊愈。

來源：臨桂縣五通中醫院 朱國基

編者按：荳藤又名紫藤。為豆科植物。學名：Wisteria Sinensis Sweet。

蛙滑菜又名淫藤（玉林名）、大霧水葛（桂西名）、蔓葶麻、祝英台（桂林名）。為蕁麻科植物。學名：Memoralis hirta(Bl.)Wedd。

大冬青為冬青科植物。學名：Ilex rotunda Thunb。

縮氣涼為茜草科植物。學名：Mussaenda Pubscens. Ait.f.

四 方

主治：火燙傷。

處方：外用方：黃連二錢 川大黃三錢 黃芩三錢 黃柏二錢 赤芍二錢 白芷二錢 龍骨三錢 梅片六分 劉寄奴一錢五分 赤石脂三錢 生石膏一錢五分 貓骨灰三錢

內服方：蘇木一兩 荳蔻四兩

用法：外用方：十二味，共研極細末，以茶油調塗傷處。

內服方：二味水煎服。

附註：重傷須用藥散三劑。如火、熱毒內攻，傷者心煩不安，急

进内服方，以解火热毒。

功用：清热，解毒，干水，止痛。

疗效：（一）红旗公社旺岭工区社员李桂祺，于1954年4月，失足跌下高温石灰窖内，烧伤全体90%，仅余头部未伤。经用上方药散三剂，基本痊愈。足部有一疤痕，因伤过重，至六月痊愈。（二）红旗公社旺岭工区鸡斗窝村赖十三，5岁。因失火烧伤手足，筋已露出，用上方药散一料，并服内服方，痊愈。

禁忌：伤未愈时忌食鸡蛋。

来源：陆川县红旗公社 罗新民

五 方

主治：如上方。

处方：川连二两 黄柏二两 花粉二两 地榆二两 生桐油二斤 生蜜糖二斤

用法：先将前四味，共研为末，再把桐油和蜜糖搅匀后，慢慢加入药末，随放随搅，搅到均匀为止。将药塗伤处，日塗药二至三次。

功用：清热，解毒，干水，止痛。

疗效：1958年6月隆林砖瓦窑某，工作不慎从窑顶跌入窑内，被烧伤全身百分之七十以上。入隆林人民医院医治，以上药涂之，七日痊愈出院。

来源：隆林县人民医院 覃立成

六 方

主治：如上方。

处方：刘寄奴粉40克 冰片1克 花生油59毫升

用法：将上三药搅拌均匀成糊状。先用盐水洗滌创面，如有水泡先用消毒针刺破，排出泡内液后，用棉签蘸上药塗敷伤部。每

日三次，至愈为止。敷药后，不须用敷料包紮。

疗效：桂林市工人医院外科治疗二十八例，有二例烫伤面积达百分之四十，当县医院转到该院时，均有合并感染，病情严重。入院后经综合治疗，创面用刘寄奴膏处理，十六天治愈。其余大都在第二天浮肿消退，一两星期愈。

来源：桂林市工人医院外科

七 方

主治：如上方。

处方：鸡蛋^{一只}_{去黄}

用法：将鸡蛋去黄，调敷患处二次可痊愈。

疗效：柳江徐光廷之子火烫伤，用此方治疗二日痊愈。

来源：贵县木梓乡 徐现强

八 方

主治：如上方。

处方：地榆^{一两} 梅片^{五分}

用法：将地榆炒枯与梅片为末，用浓茶调匀，涂患处。日涂二、三次。

疗效：红榔乡邓树新，被开水烫伤手臂，发泡溃烂，仅涂此方药一剂愈。

来源：贵县木梓乡 吴鸿义

九 方

主治：如上方。

处方：（一）洗方：火烧藤（又名老婆臂儿）半斤

（二）敷方：地榆^{一两} 黄柏^{一钱} 大黄^{一钱} 黄连^{一钱}

（三）服方：熟附^{三钱} 干姜^{三钱} 炙草^{一钱五分} 玉桂^{七分}

银花^{三钱} 连翘^{三钱} 牛子^{二钱} 乳香^{一钱五分}

用法：將一方藥以適量水煲濃洗患部。將二方藥物晒干研粉。如不能晒干，可倍藥量數研末，不要粗頭。以粉末和桐油少許，調成糊狀，于每次洗后敷患部。將三方藥物以水二碗煎取一碗，分三次服，每隔四小時服一次。

療效：（一）凌××，男，6歲，楊梅公社紅石工區人，1958年被火燒傷足部，局部皮膚積水，僅用洗方治愈。（二）封××，男，17歲，楊梅公社人。1957年被燙傷皮膚，傷部潰爛，用（一）、（二）兩方治愈。（三）馬××，男，20歲，大王公社人。曾因燒炭不慎，于窰頂跌落窰內，兩足灼傷，皮膚紅腫疼痛，起水泡，身手也有部分皮膚起泡。送醫院留醫，用上藥治療月余，痊愈。（四）潘××，男，楊梅公社六別工區人。被沸水燙傷頭部。當時起水泡，雖經施治，傷口皮肉向四圍潰爛，時流水狀膿漿。經十余天后，得塘垌楊式君介紹用上藥煲洗。一服水狀濃漿停止，二服傷口逐漸結疤。一星期痊愈。

來源：容縣中醫藥研究所

編者按：內服方，燙傷經久不愈，有流濃水漿者可用。若初燙傷則宜慎用。

治湯火傷潰瘍化膿方

主治：湯火傷及一切創傷，潰瘍膿泡瘡，化膿性濕疹。

處方：蜜糖軟膏：蜜糖三十份 花士林一百份

用法：將上二味共同調勻瓶貯備用。如遇上症，取膏塗敷患處。

附註：不論何種瘡面，黃水滲出，經敷藥一、二次，即止，以后可兩三天換藥一次。

療效：獻方人用此方治療跌傷、火傷、燙傷、刀傷、潰瘍等三十余人。如莫紹廷被開水燙傷，右手前臂全部脫皮入院留醫六天痊愈。宋炳南跌落炭窰，兩足均被燒傷，全起水泡，入院留醫十一天，痊愈出院。姚秀華被斧頭斬傷右腳，抬

至医院留医十七天痊愈。梁柱才右脚背潰瘍，潰面寬約一寸五分、深三分，疼痛流膿，換藥八次痊愈。梁秀光刺伤左足，伤口約長一寸五分，深三分，到院留医十一天痊愈。

来 源：貴县 譚全章

皮 肤 湿 毒 类

治皮肤湿毒方

一 方

主 治：皮肤湿毒（湿疹）痕痒难堪，抓破則流黃水。

处 方：山苦楝四兩 田基王二兩 水薄荷一兩 鬧羊花根二兩

用 法：將上藥切碎，加水适量，煎一小时，洗患处，再將藥渣晒干，碾成細末，以半水半醋和勻塗患处。日洗二次，搽一次。

疗 效：黃××，女，25岁，住谷埠86号。全身皮肤肌肉起紅斑点，流黃水漿，极痒。經用上藥洗、搽各三次，痊愈。

来 源：柳州市联合診所 吳植堂

編者按：山苦楝为楝科植物。学名：Melia azedarach L。

田基王科属学名見續筋接骨类續筋接骨方第十方編者按（第201頁）。

水薄荷为馬鞭草科植物。学名：Callicarpa dichotoma K. Koch.

鬧羊花科属学名見腹痛类治食积腹痛方編者按（第173頁）。

二 方

主治：皮肤湿毒，患部极痒，皮肤红肿起泡，或折裂流黄水不止。

处方：番茄水

用法：将番茄用开水洗净削去皮，以消毒纱布包裹榨取液汁，时时外擦患部。

疗效：献方人祖母于1958年患此症。初，觉额上皮肤作痒，并红肿。以手抓之即皮破流水，逐渐蔓延。两日后几蔓延全身，流水不止，曾用中西药治疗均无效，极痒，以热水洗之，则稍舒适。后用番茄水外擦痒止，随即结痂而愈。

来源：柳州市工人医院 罗毅夫

三 方

主治：皮肤湿毒（湿疹）痕痒异常，抓破流黄水。

处方：蛤粉五钱 轻粉五钱 乳香五钱 川连五钱 煅滑石五钱 雄黄七钱五分 海螵蛸五钱 梅片二钱

用法：上药共为细末。以凉水调之，顿擦患处。

疗效：南宁市红十字会医院治疗八例，效果显著。如患者张南英，男，2岁。头部生湿疹，痕痒流水，历时两三月，屡治不效。经用上药擦五天痊愈。

来源：南宁市红十字会医院

四 方

主治：顽固皮肤湿毒（慢性湿疹），经年累月，皮肤痕痒流水。

处方：吴萸 凡士林

用法：将吴萸研末，以凡士林调成10%软膏擦患处。

介 效：（一）陈桂芳，男，住小站金鷄村。患湿疹两年，全身痒极，流黄水，經各药治疗未效。給上药15克治之，痊愈。

（二）閻屏兰，女，2岁。由于中耳炎流脓引起面部潰瘍痕痒，塗青霉素膏未愈，改塗上药二次痊愈。

来 源：南宁铁路医院

五 方

主 治：湿疹，头面手足或遍身发生湿疹，色紅微肿，极痒，抓破流黄水。

处 方：胡麻仁三錢 白菊花三錢 蔓荊子三錢 灵仙三錢 芥穗三錢
皂角刺三錢 石菖蒲三錢 苦参三錢 何首烏三錢 生竹叶三錢
姜蚕三錢 防风三錢

用 法：以水二碗半煎成一碗，分二次服。渣再煎洗身。上药量系大人量，小儿酌減。

疗 效：（一）陆英，女，46岁，江苏人，現在人民印刷厂工作。患此病經几次的治疗均未見效。到区中医院門診，服上方十八剂，基本痊愈。（二）区冶金設計院干部家属张卫星，男，生三月，患湿疹。遍身破烂，头髮掉光。服此方三剂而愈。

来 源：区中医院中心門診部 叶引之

治皮肤痕痒方

主 治：皮肤痕痒日久不愈（慢性皮炎及潰瘍、湿疹等）。

处 方：柴胡二錢 升麻一錢五分 北芪四錢 党参四錢 归身四錢 白术三錢 陈皮二錢 炙草一錢五分 萸肉三錢

用 法：清水三碗煎成一碗，分二次服。

疗 效：卢××，男，46岁，住柳州解放北路34号。患皮肤痕痒二年。謝宝光，男，38岁，住柳州罗池路62号。全身起紅粟粒疹。关婉如，女，26岁。全身痕痒流水。邓荣貴，男，

34岁，住柳城林校。患慢性湿疹痕痒。均以此方治愈。

来源：柳州市人民医院 鍾海波

编者按：此方乃补中益气汤加莢肉。有排毒去湿增强机体抗病作用，宜于寒湿虚弱皮肤痒疹。

皮 癬 类

治 皮 癬 方

一 方

主治：干湿皮癬。

处方：谷沙树浆液_{适量}

用法：摘树苗或叶，取浆液滴盛杯中。以浆液点搽患处，連点搽两三天。

功用：杀蠅、止痒。

疗效：献方人幼子患皮癬，用治癬成药，随好随发。后用谷沙浆液点搽患处片时，即微痒，紅肿，但不痛。一、二小时痂皮落屑，癬的边缘高处似稍薄，再点搽，每点搽一次减薄一些，連点搽两三日即断根。

来源：南宁市 謝仲瑜

编者按：谷沙树又名构树、紗紙树（南宁名）。为桑科植物。学名：Broussonetia papyrifera Vent 其树浆有刺激性，粘着健康皮肤会引起痛辣，若誤入口，会使舌头有麻辣感觉，将生車前草搗汁搽之即解。

二 方

主治：一切癬类，不論新久，搔痒有魚鱗屑者。

处方：癬药粉：樟脑_{五錢研末} 硫磺_{五分研末} 白糖_{四錢研末} 孵过鸡蛋壳_{一個研末}
火油_{适量}

制 法：将杯或碗，抹干燥，杯口用紙糊固如鼓样，于紙上以縫衣針密刺針嘴大小孔，将樟腦敷杯口紙面上，作墳形，然后撒上硫磺末。頂端須露出樟腦，再以白糖圍圈邊緣，使燒時不易流散。用火点燃頂端樟腦，待火恰燒到紙面，即將火熄滅。勿过早过迟。早則杯內葯物尚未結成，迟則燒破紙面，灰炆落下杯中，以致葯物不可用。火熄后，待稍冻揭去杯口糊紙，将杯內所結之白色針狀葯物和蛋壳末混合均匀，即成癬葯粉。

用 法：以火油調癬葯粉塗患处。

附 註：塗葯時注意先由患处四周逐漸塗入中心，以免癬疮向外发展。若患牛皮癬加生信石少許。此方葯力頗烈，浓度不宜过高，以免侵蝕肌肉。用葯后，若塗葯处发生赤热痒刺，不可搔抓，痒刺自能很快消失。經三、四小时后，搽葯处可能发生許多小水泡，但經三天后即自穿結痂而愈。久患頑癬和牛皮癬，如痂落后未愈，可再塗葯一次，最多不过三次即愈。

功 用：杀蟻。

疗 效：此方系献方人之师秘传。曾治廿余人，效果均好。

禁 忌：小儿及阴处过嫩之皮肤不宜用。

来 源：横县石井乡 吳克寿

治 黃 癬 方

主 治：黃癬，濕疹，痒而不痛者。

处 方：（一）內服方：荊芥三錢 防风四錢 羌活四錢 菊花四錢
川芎三錢 生地六錢 归尾六錢 苦參五錢 蟬退三錢 地
丁六錢 甘草二錢 山甲三錢 白癬皮四錢 白花蛇五錢
（二）外洗方：五倍子二兩 荊芥二兩 防风二兩 地
丁三兩 公英二兩 地肤子二兩 蛇床子二兩 青矾二兩
銀花三兩

用法：內服方以水二碗半煎成一碗，一日分二次服。外洗方以水十斤煎两小时，分两次洗。

疗效：柳州市中医院留医病者尹××曾患黃癬六年，屢医无效。用此法治疗半个月而愈。

来源：柳州市中医院 张鑑秋

治牛皮癬方

一 方

主治：皮肤糙厚，頑固粗硬，搔痒不安，終久不愈之頑癬。

处方：斑蝥十個 巴豆二十個 全蝎七個 麻油一兩 黃蜡一錢

用法：先将斑蝥、巴豆、全蝎焙干共研成細末，加入麻油、黃蜡，熬成胶状，敷患处。

功用：杀蠃，止痒，去腐。

疗效：献方人患牛皮癬多年，經多方治疗不愈，搔痒不安。后用此方治疗，只搽数次即获痊愈，数年未复发。

禁忌：此药有毒，切勿入口与眼，亦不可搽在健康皮肤上。

来源：区邮电学校 王司孔

编者按：此方中国医学大辞典內有記載。

二 方

主治：如上方。

处方：蒜头二兩 白沙糖一兩五錢 面粉一兩

用法：将蒜头去衣捣溶，加入白糖面粉，捣如膏，敷于患处（勿敷健康皮肤）。翌日患处即脫下一层厚皮，繼續換药再敷。如此連續敷药，厚皮分层脫下，脫至患处皮完好时即愈。

功用：杀蠃，去腐，止痒。

疗效：黃丽珍，64岁。患頑癬半年，敷药十二天，痊愈。黃林显，21岁，患牛皮癬二月，敷药五天痊愈。謝紹明，36岁，患

牛皮癬七年，敷藥五十天痊愈。

来源：南宁市民生联合診所 蒙佩芳

治疗頑癬方

主治：各种頑癬，搔痒不止。

处方：丹底三錢 黃丹三錢 辰砂二錢 黃連素八分 黃蜡二錢 麻油五錢

用法：先将油、蜡煮沸，加入前三味藥末，煎十分鐘左右拿出，隔火，待稍冷，再加入黃連素和勻即成。用时先将膏塗患部，用艾卷在患部悬灸之，每次灸二十至三十分鐘，每天一或二次，五至七天为一疗程。如未好，隔五天后再做第二疗程。

疗效：区中医院門診部曾用此方治疗五例，疗效均显著。

来源：区中医院中心門診部 林从紀

治汗斑方

一 方

主治：汗斑，暑热时用日晒热之巾揩汗，致皮肤生白斑发痒。

处方：狗骨^{適量}_{燒灰}

用法：研末。調茶油搽患处，搽数次即愈。如无狗骨，以硼砂用布包裹蘸酒精搽患处亦效。

疗效：桂平水联公社罗洪屯徐善才，男，32岁。面部、胸部出現点块白斑，以此方治疗七天而愈。

来源：桂平县石咀公社 黃柏初

二 方

主治：如上方。

处方：紅豆蔻^{適量}

用法: 将紅蔻打碎，用紗布包裹后，蘸酸醋搽患处，每天搽一两次。

疗效: 黄健吾患汗斑已数年，南宁市第一診所民生路門診部陈魯五医师予以上方搽两天即愈，至今未复发。1957年該所用此方治愈廿五人，1958年治愈十七人，1959年治愈八人，疗效可靠。

来源: 南宁市第一診所民生門診部

风 疹 类

治风疹（蕁麻疹）方

一 方

主治: 风疹（蕁麻疹）皮肤出疹，起丘块状，痕痒不堪。

处方: 生地三錢 黄芩二錢 山梔子三錢 銀花三錢 車前三錢 夏枯草三錢 連翹一錢五分 木通一錢五分 甘草八分 赤芍二錢 元参二錢 防风三錢 蝉退三錢 羌蚤三錢

用法: 用水三碗煎成一碗，分二次服。

疗效: （一）雷××，女，42岁。患蕁麻疹已四月，經服西药不愈，服上方三剂痊愈，以后未复发。（二）黄××，男，40岁。因注射青霉素引起蕁麻疹，服西药未效，服上药三剂痊愈。（三）韦××，男，32岁。患风疹年余，服西药无效，服此方二剂痊愈。

来源: 南宁铁路医院

二 方

主治: 风疹（蕁麻疹）皮肤无故出疹，块状丘起，痕痒異常。

处方: 秦艽三錢 牛子二錢 枳壳三錢 麻黄二錢 黄芪三錢 防风三錢 甘草三錢 玄参三錢 升麻二錢五分

用法：以水二碗半，煎成一碗，分二次服。

疗效：（一）南宁市中山路东一里二巷徐××，男，28岁。患全身风疹数年，搔痒不能睡，烦躁不安，服此方三剂好转，五剂痊愈。（二）南宁市人民医院工友吳翠英，四肢风疹，痕痒难堪，白昼尤甚，服此方三剂而愈。

来源：南宁市人民医院

三 方

主治：四肢、面、胸、腹、背等部，皮肤起紅色斑疹，散在性分布，或連串成片，搔痒不已，不时发作，或受暑热，或受风寒，或遇冻水则发。

处方：柴胡三錢 防风三至五錢 川芎二錢 桔梗三錢 地骨皮三至五錢 茯苓五錢 独活五錢 荆芥五錢 生姜三片 甘草一錢

功用：祛风、湿、热。

疗效：南宁市平等街26号黃菊芬，从小就患风疹，不时发作，每逢夏季炎热即发。經治疗多年，曾用抗組織及自血疗法均无效。后用此方治疗，服一二剂疹即减少，續服至四剂，疹消退。共服八剂痊愈。追踪观察，至今未見复发。

来源：南宁市群众联合診所 叶恆生

油 蟊 类

治 油 蟊 方

主治：阴囊微紅湿痒。

处方：紫苏叶四兩

用法：将上药二兩用水煎，二兩炒干研末。先以苏叶湯洗之，后撒以苏叶末。一日洗、撒两次，連洗、撒三天即痒止湿干而愈。如患干油蟊，可先搽合桃肉油再撒药末。

功用：杀蟊干水。

疗 效：此方治愈油蟥病例很多。兹举一例：平桂石咀 稅所李永超，男，25岁。患油蟥年余，曾打溴化鈣，氯化鈣多次均未效。后用此方药一、二次即愈。

来 源：桂平县石咀地段医院 李富銳

疮 瘍 类

治生鸡母痛疮方

主 治：生鸡母痛疮。

处 方：野香煙叶 半指連 毛水葛 独蒜头 黃糖各等量

用 法：将上药捶溶，煨热敷患处。

疗 效：此方曾治愈十一人。

来 源：貴县西山乡 黃炳新

編者按：野香煙叶为茄科植物。学名：Solanum Verbascifolium L.。

毛水葛为蕁麻科植物。学名：Pouzolzia Zeylanica(L.) Benn.。

独蒜为石蒜科植物。学名：Lycoris aurea Herb.。

治 阴 疮 方

主 治：漫肿无头，不紅不痛，肌肤胀实的寒疮。

处 方：生南星六錢 生半夏六錢 生川烏六錢 生草烏六錢 木鱉仁六錢 鬧羊花一兩五錢 生酒糟二兩

用 法：先将前五味研末，再将鬧羊花叶与生酒糟同搗烂，然后混合用叶包住，放入灶中煨热取出，适溫敷患处。每次換药时，必煨热敷之。

禁 忌：此方药有毒，切忌入口。

疗 效：(一)1956年8月，岑溪大湟乡板么村謝庆佳之子，8岁。在中板旁三寸間，生疮两只，大如鵝蛋，漫肿无头，

不紅不痛，獻方人用此方治疗，敷二剂后漸縮小，敷至四剂消失一半，再敷三剂，痊愈。計前后共治十天。（二）1957年7月，大湴乡旱田村陈亚五，男，20岁。亦在中极旁三寸生疮，不紅不痛，日漸肿大，用此方三剂，共敷七天而愈。

来 源：梧州专区中医葯研究所 陈潤

治 疮 瘍 方

一 方

主 治：疮瘍紅腫。

处 方：山胡椒叶

用 法：上葯晒干、研末备用。热疮用醋調涂，寒疮用酒調涂。

疗 效：（一）民乐工区許亚六，1957年9月患痛疮，用此葯治愈。（二）民乐旺长工区惠清，1958年6月生蛇头指，肿痛甚剧，用此葯治愈。（三）民乐旺长工区許可新，1958年右脚踏伤发热，注射西林油等无效，后以此葯治疗一次而愈。

来 源：北流县 許南山

編者按：山胡椒叶又名三枝枪、画眉跳（桂南名）。科属学名見續筋接骨类續筋接骨方第五方編者按（第196頁）。

二 方

主 治：肩膊生疮，又痒又痛，潰烂流稀脓水。

处 方：黑鮫魚牙齒^{六、七個}
燒灰研末

用 法：用茶油調上葯末涂患处。

疗 效：此方治疗多例均获效。如木山黃寿初之子27岁。两膊生疮七八个，脓水时流，痛痒难堪。曾服仙方活命飲等方，无效。后延献方人医治，搽上葯一日即好轉，搽十天痊愈。

来源: 桂平县石咀公社 黄伯初

编者按: 黑鲩魚又名黑色草魚。

三 方

主治: 恶疮初起，不論属阴、属阳，凡未成脓者皆治。

处方: 明白矾一、二兩

用法: 将白矾研末加适量冷水，以白矾完全溶解为度，用干淨細布或草紙浸于白矾溶液中，取出貼患处，日換数次即愈。

疗效: 此方曾治愈多人，效果很好。

来源: 貴县木梓乡 譚栋英

四 方

主治: 慢性疮瘍（俗称汶水疮、烂皮蛇疮），結核性脓瘍，并多年烂肉不收口。

处方: 老石灰 黄柏末等分。

制法: 将老石灰碾成細末（如无老石灰，用新石灰置于缸內，加水浸漂至三个月以后可用），加入黄柏細末混合。

用法: 視患部大小，酌取药末，加适量桐油調如膏状，外敷患部。初，每日一換。好轉后隔一、二天一換。

附註: 換药时先洗滌患部然后敷药。外洗用野菊花或苦楝树叶或加里树叶煎水溫洗。如患处覺痒，加枯凡末混合。脓液过多，加五倍子末，猫骨炭末混合，但以不加入干水收斂之药为宜。凡久患体弱者，以蛤蚧（去头足），龟板、党参、冬虫草四味焙干研末，每次內服一、二錢，日服三次，开水送下。或以此药末五錢，蒸肉类食。气虛加北芪，血少加全归，适量同服。

疗效: 此方治愈不下百余例。其中患最久者为十四年。一至三年者为最普遍。

来源: 忻城县 許翰华

五 方

主 治：阳性痛疮，红肿疼痛，或溃烂。

处 方：铅粉二两 云母石一两 银珠三两 藤黄三钱 五倍子三钱
松香三钱 樟脑三钱 白树油三钱

用 法：各研细末，和匀，加白树油和凡士林调成软膏，用纱布敷药膏二分厚敷患处，日换一次。换药时须将患处用浓茶洗净后，再敷药。

功 用：消肿，拔毒，排脓，去腐，生肌，止痛。

疗 效：用此膏治疗大小痛疮很多，效果良好。如武宣三里召村陈熊占，患手搭背疮，溃烂数寸，深数分，用此膏敷之，十五天痊愈。

禁 忌：此方有毒，忌入口。

来 源：桂平县卫生学校 梁廷赞

治深部脓瘍方

主 治：腹膜脓肿，腹股沟脓肿等。

处 方：生石膏不拘多少

用 法：研为粉末。将石膏粉末与适量桐油调成糊状，外敷患处。日换二次。一般敷至六小时后即自觉舒服，十八至廿四小时开始退热，脓肿缩小，至十二天完全消失。

疗 效：（一）黄大龙，男，百色上游公社那华大队人。患兰尾周围腹膜脓瘍，经治疗九天，症状消失。（二）陈振才，男，40岁，凌乐县沙里公社沙里大队人。患腹肌及腹股沟脓肿，经治疗四天，肿消，历时八天，愈。

来 源：百色专署人民医院外科 梁凤威

治 狼 疮 方

主 治：红斑性狼疮。

处 方：（一）水降丹：水銀一兩 純硝酸二兩 白矾五錢
（二）七星丹：水銀五錢 硼砂三錢 白矾三錢 胆矾三錢
芒硝三錢 雄黃一錢 硃砂一錢

（三）蝸牛散：蝸牛^{二十只}_{研末}

制 法：水降丹：置硝酸于瓶內，徐徐放入水銀，使其燃燒氧化（但要小心，以防爆炸），然后将白矾末加入即成。

七星丹：用升丹法制取。

蝸牛散：取等量七星丹蝸牛散加入95%酒精中，調成糊狀，即傾入于水降丹中，用玻璃棍攪勻，待澄清取液备用。

用 法：用鉛綫蘸水降丹点患处，散点数处，每星期点一次。

附 註：用时勿点至健康皮肤及眼睛。

疗 效：1958年春，北流百貨公司李德松同志，患头面紅斑，有麻痺感，曾經過了几次的治疗，均診斷为紅斑性狼疮，經三年未愈。后用此方治疗，仅点五次，历时半月痊愈，現已一年未复发。此外还治愈其他类似病例三人。

来 源：北流陵城公社医院 林栋材

治黃水疮方

主 治：浆液性黃水疮（多生子头部及耳廓），秃疮，（生于头部奇痒，俗称鷄屎准），杉木脚（脛腓部肿大，表面粗糙如杉木皮）。

处 方：藤黃膏：藤黃八錢 川椒三錢 沙姜七錢 黃、白蜡^{各二錢}_{切細}
香油四兩

制 法：藤黃打碎，薄紙包裹，藏于人体貼身处，干燥后研末过篩，将香油倒入銅鍋或鉄鍋內，随下川椒、沙姜，慢火煎至焦黃色，过滤去渣，繼下二蜡，煎至蜡溶尽为度，离火，倒于盛器內。待溫度下降至油似半凝狀，即將藤黃末徐徐加入，以箸随加随攪，攪勻即可备用。

用法：涂敷患处。

功用：杀霉，去毒，止痒，干水，生肌。

疗效：此方曾治愈患者百余人，疗效很好。如林长庆，男，糯垌人。患杉木脚，用此方涂敷三天而愈。

来源：岑溪糯垌中心医院 周佳贤

疗 毒 类

治 疗 毒 方

一 方

主治：反唇疔生于人中穴，红肿疼痛，甚则头面肿大如斗，寒热往来，烦躁不思饮食。

处方：天河芋二钱

用法：将芋用酒、醋各少许磨溶，用鸭毛蘸药液搽患处，干即再搽，约二小时后，肿消痛止。

疗效：献方人业医廿余年，经用此方治愈疗毒患者百例以上。如1935年临桂县保宁乡中濶洞陈瑞卿，男，62岁。人中穴患此症，头肿大如斗，寒热往来，坐卧不安，不思饮食，给药一剂而愈。

来源：临桂县五通中医院 朱国基

编者按：天河芋又名野芋头（桂林名）、老虎耳（桂南名）。叶如小碗心脏形，背面叶脉略带红色，其味极麻辣。其科属学名见湿温类治湿温和瘴瘧方编者按（第27页）。

二 方

主治：人中疔、锁喉疔、反唇疔等。

处方：蜘蛛三只 黄糖五分

用法：共捣烂，调匀涂患处。

疗 效：經治愈貴县八塘乡蒙早兰、梁荣兰、蒙秀珍等数人。

禁 忌：忌食酒、香热、生鸡、牛肉、鯉魚等。

来 源：貴县八塘乡 蒙惠仁

三 方

主 治：人中疔。

处 方：壁虎三只 飯少許

用 法：共捶溶，敷患处。

疗 效：經用此方治愈棉滩树李惠芹女。

禁 忌：忌辛热食物。

来 源：貴县木梓乡 李瑞昌

編者按：此疔生于鼻下人中穴，初起如粟米大（或綠豆大），有微痒，状坚硬肿痛。若治之不早，肿至头面眼紅，額角靜脉努张，便有致命之虞。

四 方

主 治：塌鼻疔。头刺痛一天，鼻樑忽生一疔，初如粟粒，很快全鼻肿大紅痛，一夜之間，化腐塌鼻，痛楚难堪。

处 方：雄黃四錢 水豆腐一塊

用 法：共捶溶敷患处。

疗 效：此方經治愈白沙公社滿堂屯黃水生、蒙圩莫棉卿、棉宠屯曹××三人。此方传自西山寺老僧：

来 源：桂平县防疫站 黃寿昌

五 方

主 治：疔疮（凡生于头面部，頸部，或两手脉部等处皆可治），其症形小极深，发生迅速，肿痛異常，甚則寒热交作，立成險候。

处 方：九龍丹：沒药 乳香 血竭 儿茶 木香 巴豆各等分

用法：將沒藥、乳香、木香、巴豆等去油研末，再與兒茶、血竭同研末，調勻，用蜜為丸，如綠豆大，每日服一錢五分。服藥後，腹瀉四、五次。如瀉次數過多，可食冷粥一碗即止。

附註：重者可再服一錢，并外用疔毒外消散：川連、黃芩、黃柏、大黃各三錢、生南星、生半夏、生川烏各二錢，梅片二分，共為末，用麻油調搽患處。

療效：柳州谷埠路西一巷鄭某，生疔于上唇，腫痛異常，勢至險惡。服此藥後腹瀉數次，外搽疔毒外消散，即痊愈。

來源：柳州市柳南醫療站 何其忠

編者按：九龍丹出自外科正宗。

治对口疮方

主治：对口疮生在頸后发际下，正对口處。初起小粒，繼則紅腫疼痛。

處方：石蟾蜍 銀花 鬧楊花葉 野苦瓜苗各等分

用法：捶溶，敷患處。

功用：清熱，拔毒，消腫，止痛。

療效：曾治愈大灣工區李修金。

來源：桂平縣天堂公社 李步成

編者按：石蟾蜍為防杞科植物。學名：*Stephania tetrandra* Moore。

鬧羊花科屬學名見腹痛類治食積腹痛方編者按(第173頁)。

野苦瓜為瓜科植物。學名：*Momordica Charantia* L.

治蛇头指方

一 方

主治：指生蛇頭疔，初起紅腫發熱，疼痛，但未化膿。

处 方：生油葱七條 茶麸二兩 浸水老石灰二兩

用 法：共搗爛盛于杯內，將患指浸入藥中，疼痛立止。如腫，將藥渣外敷患處。

疗 效：此方經治療五十余例，均獲痊愈。

来 源：百色超英公社醫院 卢叔如

編者按：油葱為百合科植物。學名：Aloe Vera L.Var chinensis (Haw.) Berger。

二 方

主 治：手指、足趾頭生瘡，潰爛疼痛。

处 方：雄黃三錢 荊芥一錢五分 防風一錢五分 乳香一錢 沒藥一錢
大黃二錢 銀花三錢 草烏二錢 黃柏二錢 厚朴二錢 細辛
一錢 歸尾二錢 苦丁茶二錢

用 法：以水煎滾數分鐘後，乘熱熏患處。熏至藥湯適溫時，將患處放入湯內溫浸之，痛立止。

功 用：祛風，解毒，去腐，生肌，止痛。

疗 效：此方系秘傳。曾治愈兩例。茲舉一例如下：

張海深，女，45歲，住南寧臨勝街。手指、足趾頭均生瘡，潰爛已一月多，痛楚難堪。用此方治療，兩劑而愈。

来 源：南寧救聯會第一中醫站 陳德才

骨 疽 類

治 骨 疽 方

主 治：骨疽（骨結核），又稱骨癆，附生于骨上。初起漫腫不紅，繼而隆起如核，日久潰穿流膿血，身體日漸消瘦，食慾不振，精神萎靡。

处 方：內服方：當歸八錢 生黃芪五錢 金銀花五錢 甘草三錢
外敷方：田七一兩 羌黃二兩 生草烏二兩 生川烏二兩

狼毒二兩 甘草二兩 生南星二兩 白芷四兩 紅文蛤

(五倍子)四兩

用法: 內服方用水三碗，煎至一碗，分早、晚服，每日一劑。外敷方共研細末，用時以面粉蔥汁調膏如泥狀，敷患處。

療效: (一)伊向春，女，28歲，廣西杂技團團員家屬。腰部第三、四節骨間生一結核如碗大，疲倦厭食，微痛，坐臥不安。用上藥外敷內服，八天痛止，二十天結核消細，經治四十五天痊愈。(二)梁建民，男。腰部第一節骨間生一疽，已九月左右，大如茶杯，堅實，行走不便。用上藥外敷內服五天後，行走自如，無痛。再繼續治療廿二天，痊愈。(三)彭秀珍，女。右肋起一疽如花生米大，繼生數顆，經年余，如茶杯大，硬實微痛，用上藥外敷內服七天，漸軟化，廿天痊愈。

來源: 南寧市聯合醫院民生門診部

治骨疽外擦方

主治: 骨疽(骨結核)。

處方: (一)乳香三錢 大楓子二錢 土茯苓二錢 鴉胆子廿粒
沒藥三錢 巴豆仁三錢 扁豆三錢 龍骨三錢 川足七條
(二)錫粉三錢 琥珀三錢 白礪三錢 牙硝三錢 陀僧三錢
信石二錢 雄黃三錢

(三)白降丹二錢 梅片一錢 三仙丹二錢 輕粉三錢 川射
一分

制法: 先將第一方藥研粉末，入鍋加蓖麻油、茶油、菜油各二兩七錢，慢火煎熬，至枯焦為度，用紗布濾過。再加第二方藥，煎至起泡沫為度。約半小時，濾過。再加松脂一兩五錢，冷卻後，加入第三方藥攪拌成藥油。用時加入水銀(體重五十公斤以上者加水銀二錢，五十公斤以下一錢五分。兒童酌減)，攪拌三至五分鐘。

用法：將葯油搽大椎，肩髃，曲池，長強，陽陵泉，崑崙等穴。
每日搽一次，一連搽六至七天為一療程。停六天，再搽一
療程。

附註：發現牙肉腫痛，唾液增多，搽葯部位肌肉發癢等，可連服
解毒湯一至三劑。其方如下：

生地二錢 赤芍一錢五分 生軍二錢 黃柏二錢 花粉二錢
銀花三錢 川足^{二條}_{去頭尾} 土茯苓四錢 川連一錢五分 角刺一錢五分
白芨二錢 只實二錢 甲珠一錢五分 元參二錢

療效：蔣××，男，21歲，農民。其腰部腫痛流膿已一年。1959年
2月中旬入桂林市工人醫院治療。經X綫檢查，診斷為第
二腰椎骨結核，合併形成瘻管，血檢：血色素46%，紅血
球310萬，用上法施治，共三個療程，為期一個半月，再
用X綫復查，認為好轉，瘻管閉合，血色素68%，紅血球
360萬，紅光滿面，精神飽滿，自覺腰部不痛，歷時六十
天痊癒出院。

禁忌：忌食魚、紅薯、芋頭、牛肉、芹菜、蔥、蒜等。

來源：桂林市工人醫院外科

治腐骨疽方

主治：腐骨疽久不收口，時時出水。

處方：外用方：推車虫^{二兩}_{要細只單推車的，焙干} 干姜二錢 老松香二錢
五倍子五錢

內服方：附子二錢 炙北芪三錢 鹿角膠四錢 熟地一兩
麻黃一錢 肉桂一錢 炙草二錢 炮姜一錢

用法：外用方共研末，以黃滾桐油調葯末貼患處，其腐骨即出。
內服方，除鹿角膠和肉桂外，以水兩碗煎取一碗。鹿角膠另
燉溶。肉桂以葯湯乘滾燉出味和鹿角膠服。日分二次服。

療效：用上二方外敷內服，腐骨拔出，膿水自止而愈。桂平城廂
王愛珍、永培工區烏羊屯陳永敬、流瀾工區楊倍文、蒙圩

工区岑亚梅等患腐骨疽，服、貼上二方均奏效。

来源：桂平县蒙圩公社 王添記

編者按：內服方为阳和湯加附子、炙北芪，是治阴疽要方。

乳 痛 类

治 乳 痛 方

一 方

主治：乳部紅肿結硬作痛，或恶寒发热。

处方：白背叶一束

用法：采回生的，挂患者胸前或放在床蓆底墊睡，三日內即消散痊愈。

功用：散瘀，止痛。

疗效：此方治愈人数很多。如李××之妻，30岁，果化圩人。患乳痛，紅肿刺痛，經医无效。后挂白背叶并放蓆底墊睡，当晚即止痛，数天而愈。

来源：田东和平公社医院

編者按：白背叶又名滿山香、白吊粟（桂南名）。科属学名見阴挺类治阴挺方第三方編者按（第143頁）。

二 方

主治：乳痛（急性乳腺炎）乳部紅肿胀痛，或寒热并作，或潰破流脓。亦可治各种恶疮脓肿。

处方：生牛奶木嫩叶不拘多少

用法：将树叶用火烤热搗烂，再煨热敷患处。如已潰者可先将一份煎水洗后再敷。

疗效：陆秀美，女，成人，凌乐汽车站地段医院保健員。乳部紅肿胀痛，用上药治疗一次，次日上述症状消失而愈。

来源：凌乐县汽车站地段医院 黄有吕

编者按：牛奶树为桑科植物。学名：Ficus hispida L. f.

三 方

主治：妇人乳痛。

处方：地谷木叶二两

用法：将此药捣碎，用布包好，吊在胸前。

附注：此药仅能外用，不能内服。

疗效：朱玉才妻，徐登寿妻等患乳痛，均用此方治愈。

禁忌：不宜食有热毒之物。

来源：贵县木梓乡 韦进高

编者按：地谷木叶又名地巴麻、雀儿麻。科属学名见疟疾类治疟疾方第三方编者按（第17页）。

此方如敷患处，效果更佳。

四 方

主治：乳部发热，红肿疼痛，或溃烂流脓。

处方：赤小豆四两 鲜蒲公英四两

用法：赤小豆研末，蒲公英捶溶，共捣如胶，用浓茶先洗患处，然后敷药，约敷四、五分厚，每日换药一次，换药时仍用浓茶洗患处。

功用：清热拔毒，排脓生肌。

疗效：此方治愈乳痛十多例，效果均好。如石龙黄张氏、韦李氏等，患乳痛，肿大未溃，均敷药五或七次痊愈。

来源：桂平县卫生学校 梁廷赞

五 方

主治：乳痛初起红肿疼痛。

处方：乳痛草一把

附註：上藥又名土細辛。氣味辛苦，葉似蒲公英，葉柄長寸許，背紫色，秋後開小黃花，乃一年生草本。

用法：生用。根葉分用。乳瘤初起時，將其葉搗碎，敷瘤上，用其根煲豬骨或豬蹄內服。用此藥，宜在初起未成膿時，如已多日將成膿，必須兼服“復元適氣散”“托里透膿湯”之類（方見醫宗金鑑外科），方可收效。

療效：此方系盧明馨醫師傳給獻方人之父，治愈多人。茲舉二例：（一）1940年、1945年、1951年獻方人妻丘孟芹曾三次患乳痛。每次發作，初則覺乳房硬痛，次日即發紅腫，痛劇。采此藥外敷內服一二次，即全消散。（二）丘子超愛人楊氏，于1953年發乳痛，三天後，用此藥一服而愈。

來源：貴縣慶豐鄉 溫煥南

編者按：乳痛草又名野芥藍、假芥藍（南寧名）、老鼠耳（梧州名）、一點紅、紅背紫丁。科屬學名見癰疽類治癰狂症方第一方編者按豬落肚條（第74頁）。

六 方

主治：婦人乳部紅腫生瘡未化膿者。

處方：生蒲公英三兩 生牛利墨三兩

用法：以一半用水三碗煎成兩碗，分三次服，一半共搗爛敷患處，一日一換。

療效：（一）岑溪那社鄉會村陳序元妻，23歲。1956年8月，乳部紅腫發熱已兩天。獻方人囑其母採用此方，按法服用。次日再診，症狀減輕一半。囑其再照法採用；數服後痊愈。（二）岑溪大滙鄉化魯村何瑞生妻，26歲。1957年6月，乳部紅腫發熱已四天，用上藥共四次而愈。

來源：梧州專區中醫藥研究所 陳瀾

編者按：生牛利墨又名假苦墨菜（南寧名）。為菊科植物。學名：

Sonchus arvensis L.

蒲公英为菊科植物。学名: *Launaea glabra* Franch.

七 方

主治: 乳瘤, 乳房結块, 头痛項强, 惡寒发热无汗。

处方: 消坚湯: 銀花五錢 連翹二錢 紅花一錢五分 赤芍五錢
乳香一錢五分 山甲二錢 归身二錢 貝母五錢 沒藥一錢五分
川芎一錢五分

用法: 淨水二碗煎至一碗, 分二次溫服。

疗效: 經用此方治愈石卡楊旭乾妻, 洗华珍等十人。

来源: 貴县西山乡 譚榜才

針灸治乳痛方

一 方

主治: 乳痛(乳腺炎), 乳房紅肿, 灼热, 疼痛, 化脓, 潰則流脓水, 或伴有寒热头痛等。

取穴: 在肿块中央一針, 沿肿块邊緣刺三或五針(視肿块大小而定)。

手法: 捻轉进針五分至一寸, 进針后, 以患者有麻痺脹痛感覺为度。留針三十分鐘, 每隔五分鐘捻轉一次, 一般每天針一次, 重症可針二次。

疗效: 据南宁鐵路医院治疗一百零二例之观察, 有效率及治愈率均很高, 計其中一天治愈者廿七例, 两天治愈者五十九例, 三天治愈者十二例, 好轉四例。

来源: 南宁鐵路医院北站卫生所

二 方

主治: 乳痛(乳腺炎), 乳房生硬, 灼热潮紅, 肿胀疼痛, 日久

可化脓外潰。

取 穴：肩井 风門 乳根

手 法：捻入后留針二十分鐘。

疗 效：先后治愈多人，均未經注射葯物及外敷处理即愈。如柳州南站工人郭××，患乳腺炎，来柳州市工人医院施行針灸治疗，三次痊愈。

来 源：柳州市工人医院 罗毅夫

編者按：乳根穴位，是重要脏器（心肺）所居，刺宜注意。

无 名 肿 毒 类

治无名肿毒方

主 治：无名肿毒疮。

处 方：法半夏三錢 大黃三錢

用 法：共研細末为散，用隔夜茶調勻涂患处。

疗 效：木梓乡黃凤祺右脚脛，发热肿痛，經多人医治无效。用此散以茶調涂二次，行动方便，三次痊愈。

来 源：貴县木梓乡 苏碩良

瘰 癧 类

治 瘰 癧 方

一 方

主 治：頸項生瘰癧肿痛。

处 方：木鱉蕊一握

用 法：以瘦猪肉不拘多少，与上葯同煮作羹服。日服一剂，連服十余剂。

功 用：解毒，消瘰癧。

疗 效：1945年献方人长女萃兰，頸項間左右生癰，屢医不效。后每早用木鱉蕊和瘦猪肉作清羹服十余剂，癰核全部消失，后不复发。

来 源：貴县大圩乡 覃紹銘

編者按：木鱉蕊即木鱉藤嫩苗。为瓜（葫蘆）科植物。学名：Mormordica Cochinchinensis (Lour.) Spreng

二 方

主 治：頸部結核，大如指头，有时色紅微热，扯痛引及咽喉。

处 方：柴胡一錢五分 当归二錢 白芍五錢 白朮二錢 茯苓一錢五分
橘叶一錢 薄荷^{五分}_{后下} 川貝二錢 玄參二錢 牡蠣一錢五分
京夏一錢五分 白芥子一錢五分 煨姜二片

用 法：头次以水一碗半煎取一碗，二次以水一碗煎取半碗，去滓，将两次所煎药液合併煎开，一日分两次服。

功 用：解郁，豁痰，消癰。

疗 效：王某，女，63岁，邕宁县大同乡胡村人。1955年3月頸部右边患結核，大如指头，时有发微热，色紅，扯痛引及咽喉，經治三月无效。經献方人診治，断为痰癰，系肝郁所致。处以此方，服药一剂，愈。

来 源：南宁市中医学会 磨汉英

編者按：此症是痰郁成核，不是淋巴腺結核。

三 方

主 治：癰癰（淋巴腺結核）。

处 方：大蒜不拘多少

用 法：将大蒜洗淨后，用紗布包之絞出汁，以蒜液0.1-0.2毫升，在肿核中注射，每周三次。

疗 效：（一）樊后期，男，54岁，农民，扶綏人。两頸側均有癰癰，每側二个，伴发喉痛，吞嚥和頸部运动困难，

曾用鏈霉素治療，未見好轉。進行局部穿刺抽膿後，注射蒜液0.2毫升，每周三次，共治療七次，痊愈。
(二)梁秋容，女，35歲，農民，扶綏人。于1955年患瘰癧，同時伴有咳嗽胸痛等症。到區人民醫院治療，經X光檢查，証明為肺結核兼瘰癧，病者不能長期住院，遂先以大蒜汁處理瘰癧，歷時二周，瘰癧直徑已縮小到1.5厘米，出院。

來源：廣西僮族自治區人民醫院

治療瘰癧骨疽方

主治：瘰癧或骨疽（淋巴結核、骨結核）。

處方：胆草二錢 升麻二錢 柴胡二錢 葛根三錢 黃柏二錢
黃芩二錢 黃連一錢 知母二錢 連翹三錢 三稜二錢
莪朮二錢 歸尾二錢 昆布四錢 花粉三錢 桔梗三錢
赤芍三錢 甘草二錢

用法：以水三碗半煎至一碗，分二次服。

療效：柳州文武街14號曾碧君，女，3歲。1958年10月4日，患淋巴結核及結核性腦膜炎。經某醫院用鏈霉素、雷米封治療，無效。轉來柳州市中醫院，用上方加減，經治四十多天痊愈，無後遺及復發症狀。他如柳州鋼鐵廠女工苑榮彬、黃河鄉小學教師黃振祥，患淋巴結核或骨結核。用上方十二劑或十劑，均痊愈。

來源：柳州市中醫院

針灸治療瘰癧

主治：頸起核狀硬塊，不紅不痛。

取穴：百勞灸 肩井灸 肘尖灸 癰上灸

用法：用姜一片，厚約一分，墊艾于上，用火燃艾，灸至肉色紅潤為止。初期可連灸四天，以後每隔四天灸一次，二星期

后可每隔一星期一次。

疗效：柳州公园路6号。彦××，女，8岁，頸上生一瘰癧，大如拇指头，色白，不紅不痛。十余日后，旁复生一小瘰，如小指头大。在上述各穴連灸四日。半月后，瘰逐渐小而愈。

痔 疮 类

治 痔 疮 方

一 方

主治：內外痔疮。

处方：田大螺一个 白矾五分

用法：将田螺磨撬开，放入白矾五分，旋即有很多粘液分泌出来（液体分泌完田螺即死），将液过滤，用瓶盛好备用。外痔用金銀花或牛子煎液洗后，再点田螺液。內痔用液注射，每次5毫升。每日一次。五至七天可愈。

疗效：此方曾治愈二例。如永福县委王墨汗同志，患痔疮来永福人民医院治疗，即以上法治愈。

来源：永福县人民医院 王燮

二 方

主治：如上方。

处方：5%明矾水0.3—0.4毫升。

用法：先用普魯卡因将痔核局部麻醉，然后以明矾水注射入痔疮基底，一次即枯死而脱。

疗效：龙胜人民医院实验十五例，疗效很高。

来源：龙胜县人民医院

三 方

主 治：內外痔瘡。肛門痕痒痛楚。

处 方：馬齒莧二斤八兩

用 法：先拣取嫩叶四兩煮食，其余二斤四兩用水煎浓注大痰盂內，先熏后洗。

功 用：清热，解毒。

疗 效：此方系广州名医黎庇留門人胡永汉医生传给献方人。屢試屢驗。1950年陆炳龙患此病，以此方治愈。

来 源：南宁市 何秉鈞

編者按：馬齒莧又名瓜子菜、木屐菜、猪肥菜（玉林名）。为馬齒莧科植物。

治 內 痔 方

一 方

主 治：內痔生于肛門內，形如菌，疼痛，登廁时即翻于肛外。

处 方：川連 鴉胆子各一錢 猪胆一個

用 法：先将川連、鴉胆子共研为末，破开猪胆，将药末放于胆囊中，加酒少許，蒸透，去渣飲汁。

疗 效：献方人患內痔，試用此方治愈后，五十年来，治內痔均用此方，一般一服痊愈。前后共治愈二十余例。百色人民医院梁升阶于临床采用此方亦治愈十多例。

来 源：百色县人民医院中医科 庞显初

二 方

主 治：同上方。

处 方：鷹一只

用 法：将鷹宰杀去腸杂燉食。不拘次数。

疗 效：此方治疗内痔，一般只服一次即愈。昔有二酒友，均患内痔，一天无意中共买一鹰来作酒菜，食后，两人内痔均愈，遂流传此方。百色城厢爱新街黄德新患内痔已十余年，服此方一次而愈。

来 源：百色城厢超英公社医院 陈家琨

新法脱痔疮方

主 治：内外痔疮，第二、三期均可治疗。

处 方：灰碱注射液：新鲜石灰 浓碱水各适量

制 法：将二药调成稀粥状，待石灰沉淀后，取上层淡黄色液体作注射用。

用 法：使患者侧卧于手术床上，局部消毒后，局部注射普鲁卡因麻醉（3%普鲁卡因油液20—30毫升）。注射毕，用止血钳将痔根部钳实，以药线结紮好，然后用细号针头抽取灰碱液0.3—1.0毫升注射于痔核中央，数分钟即变黑而坏死，除去止血钳盖上纱布，不久自脱落。脱后敷上生肌散或消炎膏，便渐渐痊愈。

疗 效：庞××，男，47岁，业医，住院号1295号。患便血已十年余。近年来每食寒凉食物则痔核外翻，食热性物则衄血，屡治无效，坐久行走更辛苦。到区中医院治疗，用上法医治，十五天痊愈出院。

来 源：区中医院留医部外科室 容佐朝

治漏管方

主 治：痈疽溃后，日久不愈，致成漏管，脓水常流。

处 方：纯白色关鸭（又名洋鸭）一只 白茯苓四两 香信三两

用 法：将关鸭宰杀去净毛屎，同白茯苓、香信加水煮熟。随意服食肉与汤。一次服不完，可作二、三次服。

功 用：补虚，去腐，生肌，化漏管。

疗 效：此方是献方人祖传秘方。使用数十年，功效卓著。如成美大队林××，男，45岁。臀部患痈疽，日久成漏管。新塘大队新田村符××，男，25岁。患痈疽成漏管。均用此方治愈。糯垌大队梁××，男，25岁。胸部患痈疽成漏管，经过了别处治疗无效。亦以此方治愈。

来 源：岑溪县糯垌太阳公社 周作鑑

潰 瘍 类

治脚部潰瘍方

主 治：脚部潰瘍，經久不愈。

处 方：(一) 烏不落叶 大冬青叶 甜菜 野同蒿 車前草 月季花 臭牡丹 满天星 牛头刺 縮气凉各等分
(二) 麝香一分 制广丹二钱 甘草一钱 白芷一钱五分 乳香一钱 沒药一钱 頂梅片二钱 正川連一钱五分 正真珠一分

用 法：一方各药晒干研粉备用。二方各药共研細粉，装瓶內，蜡封备用。用时，先将患处用浓茶洗淨，搽小麻油或猪板油，撒上方药粉后，再将一方草药粉以浓茶調匀，敷患处周围，每天換一次。換药时患处仍照前洗淨后再放药。

疗 效：(一) 1951年8月，临桂县黄沙公社大村屯罗德茂，男，36岁。7岁时患附骨疽，历廿六年，經多方治疗未效。献方人以上方治疗廿余天痊愈。(二) 临桂县白竹屯蔡桥軍，脚患潰瘍已成残废数年，五通北門街李志新，左足下部潰瘍已七年，均用上方治愈。此方共約治愈三十例。

来 源：临桂县五通中医院 朱国基

編者按：烏不落又名鹿不拨(南宁名)、紅椶木。为五加科植物。

学名：Aralia armata (Wall.) Seem.

大冬青又名救必应、狗屎木皮、熊胆木（桂南名）、铁冬青。为冬青科植物。学名：Ilex rotunda Thunb.

甜菜又名鸭脚艾、刘寄奴（南宁市名）。为菊科植物。学名：Artemisia lactiflora Wall.

野苘蒿又名蒿菜（桂林名）。为菊科植物。学名：Erigeron linifolius Willd.

臭牡丹又名头闷花（桂林名）、红龙船花（南宁名）、状元红。为马鞭草科植物。学名：Clerodendron Kaempferi (Jac.) Sieb.

满天星又名酸汁草（南宁名）、落地虾（柳州名）。为酢浆草科植物。学名：Oxalis Corymbosa DC.

牛头刺又名画眉刺（桂林名）、假南蛇鞭（南宁名）。为芸香科植物。学名：Zanthoxylum avicennae (Lam) DC.

缩气凉又名土柴胡（桂林名）。科属学名见汤火伤类治沸汤伤方第三方编者按（第206页）。

玉叶金花又名白纸扇（桂南名）。科属学名见续筋接骨类治续筋接骨方第九方编者按（第201页）。

治远年烂脚方

主治：远年烂脚，流黄水且臭，不能收口。

处方：（一）象皮生肌散：象皮一两 乳香五钱 没药五钱 石膏一两
黄丹三钱 田七一钱

（二）生肌去腐膏：生牛银四钱 两面针二钱 凡士林适量

用法：第一方各药碾成细末，装入磁瓶备用。第二方牛银、两面针为末和匀，合入凡士林搅匀成膏。用时，先将象皮散掺上后，用生肌膏敷患处，至愈为度。

疗效：李××，男，44岁。右脚胫骨皮肉溃烂，经治三年无效，后用此方治愈。

来源：柳州市联合诊所 李志强

石 硝 类

治硬硝(牛程蹇)方

一 方

主 治: 足跟脚底硬硝肿痛。

处 方: 龙骨木叶(又名羊角木)适量

用 法: 捶溶用酸醋煲开乘热敷患处,药冷再换热药,连换三、四次后,将药敷经一宿,如此敷两天痊愈。成脓者不效。

功 用: 散瘀,消肿,止痛。

疗 效: 此方曾治愈桂平石咀公社东叶屯张友桂之子,桂平南淞公社火山岭屯赖再兴爱人。

来 源: 桂平县石咀公社 黄柏初

编者按: 龙骨木叶又名羊不挨(南宁名)、龙骨浆、火秧勒(南宁名)。为大戟科植物。学名: *Euphorbia antiquorum* L.

二 方

主 治: 同上方。

处 方: 烂草鞋浸小便

用 法: 将草鞋以小便浸一小时后,穿患足上,以火砖一块,用炭火烧热,取出,将患足连草鞋踏于热砖上,至麻痛为止。如是三次即愈。

功 用: 散瘀,止痛。

来 源: 宾阳县 覃郁文

编者按: 此法民间常用。初起未成脓有效,成脓者无效。

針灸硬硝

主治：同上方。

取穴：刺患足委中穴放血

治法：患者站立，患足挺直，在委中穴以酒精消毒，在其靜脉管处，用力上下挤压，有鼓起样，用三稜針放血，刺入一分深，用大布針經消毒后刺亦可。或以清水湿脚曲处（委中），用手拍之，則靜脉管起紫黑色点，用針刺之，放出黑血，足痛即愈。

来源：桂平县人民医院 李汉基

编者按：牛程蹇，系由热脚遇冷水，或足跟脚底被石子硌伤，或风寒袭于血脉致气滞血凝而成。生于足跟底部，頑硬肿痛，不能行走。初期未化脓者，放血即愈。此法常为民間所用，确有奇效。化脓者无效。

骨哽类

治鸡骨哽喉方

主治：鸡骨哽喉不下，疼痛吞嚥困难。

处方：皂角^{一小片}_{約重三分}

用法：皂角去核弦及括去表皮，取肉，研成粉末。把药末放口内含住，徐徐嚥下。

附註：用药后，口腔及咽喉发生麻痺，口津特多，哽骨不觉而下。

疗效：此方曾治愈四人，治愈时间均四小时。兹举一例：

南宁車縫第三工业社黄克梅，男，40岁。1958年冬至节，吃鸡肉不慎，骨哽于喉，經治疗五天，不能下，用此方治疗，靜臥醒来，愈。

来源：南宁中医学会 曾昌漢

蛇咬伤类

治毒蛇咬伤方

一 方

主治：各种毒蛇咬伤肿痛。

处方：生草药部分：

霸王鞭四兩 双眼龙鞭二兩 紫背金牛二兩 紅咸苏木八兩
紅烏白八兩 双飞蝴蝶六兩 半边蓮八兩 滿天星八兩 无患
木八兩 漆木八兩 半天雷二兩 斬蛇劍八兩 蛇利草四兩
黃花草四兩 山慈姑八兩 辣椒八兩 金鎖匙六兩 通城
草四兩 假香苏六兩 滿山香六兩 两面針六兩 療刁竹四兩
中藥部分：

古月一兩 川椒二兩 白芷四兩 藜蘆二兩 田七一兩
雄黃五錢 茶辣子三兩 薄荷六兩

制法：先将生草药和中药分别晒干研末，然后将草药粉和中药粉混合，用三花酒或麵糊为丸，每丸湿重四錢。干燥后用紗紙包裹，过蜡貯藏备用。

用法：每丸配好三花酒一两，用时，以两丸搗溶冲三花酒二兩，服用药丸酒五錢，余酒与药渣搽用。如不够搽，可再增一丸冲酒。伤部紅腫可用醋冲丸搽。內服仍用酒。但搽扫伤部，由上而下，伤口周围应离一寸許，不搽药。

疗效：（一）楊叶乡保子岭尹振均，男，28岁。1955年9月×日晚，車水至半夜12时，被銀包鉄毒蛇咬伤左手大拇指外側，当时只覺胀痛，即跑返家，胀痛較剧，心神不安，即时找寻蛇医二人溫××梁××等治疗，历三小时，未能止痛消毒，当即轉叫猷方人，到其家时，已不能講話，問时只是摇头无語，病勢危急，立即配蛇药丸两个，冲酒灌二匙羹，約十

分鐘，即漸漸清醒，再過十分鐘左右，能起立，說話談笑。用藥丸搽傷口周圍。第二天轉用生草藥敷傷口，第三天基本痊愈。（三）羅昭才，男，15歲，紅光社人。1957年8月15日下午4時，被飯匙頭蛇咬傷右手無名指中部，當時紅腫疼痛，治療後，經夜未見效，疼痛不堪。第二天10時左右，傷勢嚴重，低頭，從手至臂，腫大如腿，且不能講話，其母啼泣不已，獻方人即用蛇丸兩枚令沖酒服，經十五分鐘痛減，第二天用生草藥敷傷口周圍，痛止腫消，第三天，全部消清。（三）華南工區會計李蔭南，男，25歲。×夜開會後于返家途中，右腳跟被金包鐵蛇咬傷，第二天找獻方人醫治，抵家時，病者呻吟，腫痛非常，拍指胸部，心熱脹悶，即取蛇藥丸兩枚令沖酒服，服後約一餐時間，覺舒服，痛大減，治療三天，痊愈。（四）王乃寶，楊梅公社四端工區覃龍村人。以賣藥擺武為業。1957年8月7日，在平山圩賣武，被飯匙頭毒蛇咬傷左手三里穴，疼痛異常，自用藥治，無效，即到容縣中醫院外科門診部治療，當時腫勢到肩顛，惡寒發熱，全身麻痺，口渴，行坐不定，苦楚難堪，與蛇藥丸兩枚，沖酒服。約半點鐘，痛勢減，雖腫未消，但飲食行動如常，歷時三天，愈。

禁 忌：孕婦忌服，只外搽。

附：蛇咬急救方

處 方：木虱十三只

用 法：搗落，沖酒服。成年人沖酒二兩，小兒酌減。

說 明：無論何種毒蛇咬傷，臨時無主治蛇藥，急服此方可防止蛇毒攻心，服後可延至24小時，再找主治蛇藥治療，而無生命危險之虞，如無上藥，急須找黑口草二兩，木稗二兩，搗落，沖酒或開水服亦可。

附：搽敷伤口方

处 方：文蛤粉四钱 寒水石二钱 硼砂三钱

用 法：共为粉末。用时，洗净患处，将药末搽敷伤口烂处，用药棉盖好，每天换药一次。

附：治蛇伤闭口肿痛不消方

处 方：夜鬼灯笼叶 桃子叶 千斤拔 大浪伞 辣椒叶 烏白木叶 半边莲 田基王 黑口草 薄荷叶各一两

用 法：捶溶取汁。先刺通伤口，然后将药汁搽伤处周围，立时止痛消肿。

附：拔除牙毒方

蛇咬伤后，其牙如断在伤口里，应即拔掉。否则难消肿生肌。

处 方：鴨舌公五钱 生半下一钱 辣算子二小粒 无患子仁（又名洗手果）三只 推車虫一只

用 法：将上药捶溶，敷伤口处，其牙和毒即出。

附：洗除蛇毒方

处 方：小暗菴蕒 节节花 无患木蕒 咸苏木蕒 炮子木蕒 葱头 老姜 斬蛇剑各适量

用 法：以适量水煲浓，加白蜡一两洗患处。

注意事項：①蛇咬伤不要紮，紮后容易使血液凝滞，增加麻痺疼痛，难痊愈。②蛇咬伤，切忌服参，服参者，多至死亡。

来 源：容县中医药研究所 梁福祜

编者按：双眼龙蕒即巴豆树蕒。为大戟科植物。学名：Croton tiglium L。

紫背金牛又名小金不换、小英雄（百色名）。为远志科植物。学名：Polygala Japonica Houtt.

双飞蝴蝶又名蝴蝶草、百长根（玉林名）。为蘿藦科植物。学名：Cylophora yunnanensis schltr.

无患木蓇又名洗手果树蓇。科属学名见小儿口腔病类治牙疳方第二方编者按（第171页）。

蛇利草又名蛇舌草、鷄哥利（玉林名）。为茜草科植物。学名：Oldenlandia diffusa Roxb.

黄花草又名蛇头王、土細辛（玉林名）、一枝黄花。为菊科植物。学名：Solidago Virgo—aurea L.

金鎖匙又名百鎖灵（广东名）、有毛羹箕篤（梧州名）。为防杞科植物。学名：Stephania Sp.

通城草又名通城虎、定心草（桂南名）。为馬兜鈴科植物。学名：Aristolochia Sp.

假紫苏又名山薄荷（玉林名）、蛇总管（玉林名）、乐馬衣（百色名）。为唇形花科植物。学名：Plectranthus Sp.

滿山香为菊科植物。学名：Blumea Sp.

潦刁竹又名山刁竹、竹叶細辛、徐长卿、金龙根（百色名）。科属学名见續筋接骨类跌打药酒方编者按（第202页）。

二、方

主治：一切毒蛇咬伤。

处方：白花草一兩 花斑草一兩 烏柏根皮三錢

用法：搗烂或研末。开水泡或用水煮沸后服均可。单用白花草一味也有效。

功用：散毒，消肿，止痛。

疗效：1959年元月1日，农况朝同志参加深耕运动，被鉄包金蛇咬伤左手食指根部，疼痛不堪，数小时后即昏迷不省人

事，双目看物不清，用白花草三錢，泡开水一盅，分三次服，服后 渐醒，第三日晨即能食豆浆及稀粥。共疗治五天痊愈。

来 源：田东县高峯公社 欧阳世英

編者按：白花草为菊科植物。学名：Vernonia Patula (Ait.) Merr.

三 方

主 治：一切毒蛇咬伤，肿痛难忍，毒气攻心，不省人事。

处 方：烏臼木蕈二兩 野芝麻蕈二兩

用 法：以酒煮成湯，給受毒者自酌，尽量飲至醉为度，醉后入睡，醒来肿痛皆消。

疗 效：紅棚乡吳鴻飞、雷五妹、梁雪英、甘幼珍等被毒蛇咬伤，均用此方药治疗而愈。

附 註：凡被蛇咬伤，即用尖东西挑破伤口，括去毒素，以免毒攻入心。但不可用鋼針挑。伤者不宜大叫，应安靜。

来 源：貴县木梓公社 甘春成

編者按：野芝麻为梧桐科植物。学名：Helicteres angustifolia L.

四 方

主 治：金包鉄、銀包鉄及一切毒蛇咬伤。

处 方：田基王 双料酒各適量

用 法：如冬天田基王已枯萎，亦可采集、晒干、碾細，用双酒浸好，以备急用。用时务要煎热服，后搽肿处，伤口勿搽。如服后虽不省人事，自能肿消清醒而愈。

疗 效：东罗大队黃亞德被百步蛇咬伤，頓时骨节疼痛，急取此药煎服，移时，痊愈。

来 源：貴县大圩分社 李拔廷

編者按：田基王科屬學名見續筋接骨類續筋接骨方第十方編者按（第201頁）。

五 方

主 治：毒蛇、吹風蛇咬傷，紅腫熱痛，肌肉麻硬。

處 方：鮮地桃花葉二兩五錢 糯米二兩

用 法：將地桃花葉搗爛，用開水淘取糯米泔水 200 毫升，與花葉混合，榨取汁 200 毫升，分二次服，每隔四小時服一次。渣敷患處，用紗布包裹，藥干，再以米泔水淋之。

療 效：某女，17 歲，學員，三江县人。1958 年 9 月 28 日被吹風蛇咬傷右踝關節後面，流血不多，但足腫，灼熱疼痛，腳軟，不能走路，經某中醫師治療無效。10 月 3 日到區人民醫院治療，處以上方，三天後症狀消失，五天痊癒出院。在治療中，曾給一枝箭及定心草藥粉內服，作輔助消毒善後。

禁 忌：治療中，忌食雞、魚、蝦等物。

來 源：區中醫藥研究所 區人民醫院

編者按：地桃花科屬學名見痢疾類治痢疾方第十方編者按（第11頁）。

六 方

主 治：金包鐵或銀包鐵咬傷，紅腫疼痛，毒氣攻心，全身骨痛，胸腹脹痛，發冷發熱。

處 方：七葉蓮三錢 獨腳烏柏三錢 通城虎二錢

用 法：用水一碗半煎至半碗，沖酒一兩，一次服完。

功 用：散毒，消腫，止痛。

療 效：1958 年 5 月，岑溪黎木黃兆國，被銀包鐵咬傷右足背部，毒氣內攻，以致昏迷不省人事，四肢厥冷，脈微欲絕，諸藥救治無效，服此方，約半小時即甦醒，四小時精神如常。

來 源：岑溪縣衛星人民公社 陸國瑞

編者按：七叶蓮又名七叶一支花、独脚蓮（桂南名）。科属学名見咳喘类第三方編者按（第39頁）。

通城虎又名定心草（百色名）。科属学名見本类第一方編者按（第247頁）。

独脚烏柏为葡萄科植物。学名：*Cissus repens* (H.et.A) Lam.

七 方

主 治：毒蛇咬伤。

处 方：紅草鞋根叶一兩 紅烏柏叶二兩 吳萸一錢 生烟筒屎一錢

用 法：上药共搗烂冲酒一杯，絞取汁服，渣敷伤口周围。

功 用：散毒，消肿，止痛。

疗 效：农卜依，男，50岁，感圩人。被吹风蛇咬伤，紅肿疼痛，神昏不醒。用此方治疗，服药后，肿消痛止，渐醒，服药三次，愈。

来 源：田东火箭公社 賴立矩

編者按：紅草鞋根叶又名鋪地娘（南宁名）、地胆草。为菊科植物。学名：*Elephantopus scaber* L.

紅烏柏为大戟科植物。学名：*Sapium discolor* Huell
—Arg.

八 方

主 治：各种毒蛇咬伤（包括金包鉄、銀包鉄、噴鸡蛇）。

处 方：內服方：紅烏柏木蘗适量

外搽方：独脚仙茅 豹牙郎 节节花 半边蓮 独上一枝
花 牛虽黃

用 法：先将內服方以水二碗煎取一碗服。再将外搽方各药共捶烂搽伤口周围，由上而下。同时把伤口扩大，挤出毒血。

疗 效：郑紀候，男，隆盛乡长信二区人。因捉蛇被銀包鉄咬伤，

两小时后，恶心，皮肤青色，用上药二次，愈。

来源：北流隆盛 陈胜

编者按：豹牙郎又名金香爐、野牡丹。科属学名见痢疾类预防痢疾方编者按（第15页）。

节节花为茜草科植物。学名：Oldenlandia hedyotidea (Dc.) Hand.-Mazz.

半边莲为山梗菜科植物。学名：Lobelia chinensis Lour.

独脚仙茅为仙茅科植物。学名：Curculigo orchiohdes Gaertn.

独上一枝花为延龄草科植物。学名：Paris polyphylla Sm.

红乌柏科属学名见本类第七方编者按（第250页）。

九 方

主治：一切毒蛇咬伤，肿胀疼痛。

处方：川芎四钱 白芷四钱 大黄四钱 甘草四钱 吴茱萸四钱 貝母四钱 灵仙四钱 灵脂四钱 雄黄四钱 川足十條

用法：以清水二碗，双酒二两，同煎至一碗，分二次服，隔二至四小时服一次，留少许药液，搽患处，伤口勿搽。第二天将药渣如前法煎服和外搽。第三天再将药渣加水一碗，酒二两煎浓汁，只搽伤口周围，勿搽伤口，不须内服。

功用：散毒，消肿，止痛。

疗效：此方治愈毒蛇咬伤者多人。如魏夏如、黄家祥等七人被吹风蛇咬伤，用此方治疗，其中六人均三天痊愈，一人五天痊愈。楊亲九、向也水被青竹蛇咬伤，服此方，一人三天痊愈，一人四天痊愈。蔡亚陵被金包铁咬伤，服此方七天痊愈。

来源：隆林人民医院 覃立成

十 方

主 治：被一切毒蛇初咬伤时，逐渐胀痛，毒气未攻心者适用。

处 方：細叶凤凰尾草_{适量}

用 法：将凤凰尾草嚼烂，即刻擦伤口处，另用一、二两煎水一斤，服一半，用一半洗伤处。

疗 效：此方前后共治疗十余人，皆痊愈。兹举二例如下：

(一)1958年9月，临桂县五通黄坡钢铁师李如德(住速塘公社)，被毒蛇咬伤，寸步难走，以此方治疗两次，痊愈。(二)五通公社白馬河李大嫂，24岁。某日天将亮，出工生产，在路上誤踏毒蛇，被咬伤脚背，走十余里，到献方人处治疗，用此方一次治愈。

来 源：临桂县五通中医院 朱国基

編者按：細叶凤凰尾草又名飞天蜈蚣、金不换、細叶凤凰尾(桂林名)。为菊科植物。学名：*Achillea Wisoniana* Heinn。

十 一 方

主 治：一切毒蛇咬伤。

处 方：水空菜根一至二錢

附 註：水空菜，藤本植物，非食用水蘿菜。

用 法：取水空菜根，用口嚼細嚥下其汁，用渣搽敷伤口周围，伤口勿敷，以出毒气。

疗 效：此方系献方人祖传秘方。曾治愈被飯鏟蛇、三索錢咬者共十五人。現举二例如下：

(一)周雄，女，46岁，紅旗公社人。左手食指被毒蛇咬伤，已紅肿至胸部，口唇发紺，呼吸迫切困难，經治疗无效。后用此方治疗三日，痊愈。(二)胡敬山，男，紅旗公社人。被毒蛇咬伤左足拇趾，經十三小时肿胀至腰部，口唇发紺，

呼吸迫促，煩躁不安，口出唾液，用此方治疗三日，痊愈。
来源：藤县红旗公社第一药厂 卢茂良

狂犬咬伤类

治狂犬咬伤方

一 方

主治：狂犬咬伤。

处方：虎牙汤：虎牙一條 醋一兩五錢

用法：用虎牙磨醋，磨至醋浓白色为度。作一次服完，留少许擦伤口。

疗效：（一）桂平县平浪乡刘寿汉，男，21岁。1955年7月被狂犬咬伤，用上药服擦一次，痊愈，至今无狂犬症状发作。
（二）贵县万石乡黑石屯黄细妹，10岁。黄治方，男，7岁。均被狂犬咬伤，用上药服擦各一次，痊愈。

来源：贵县庆丰分社 黄雁飞

编者按：此方出本草纲目。

二 方

主治：疯狗咬伤。

处方：八角树根三钱 烏柏木根四钱 王不留行三钱五分 倒钩藤（九片叶）三钱

用法：以水二碗煎成一碗，一次服。轻者二剂，重者三剂。

疗效：猷方人曾用此方在白桥小学治愈十一名小学生。当时该处有一疯狗，一连咬伤十二名小学生，十一名经猷方人治愈，有一名未治疗，结果死亡。

禁忌：忌食香、辣、酒等。

来源：临桂县定江人民公社大面中医院 楊少廷

編者按：八角樹根又名楓木鐵（桂林名）、八角楓、白金條（百色名）。為八角楓科植物。學名：Alangium Platanifolium Harms。

三 方

主治：狂犬咬傷。

處方：（一）野薤頭（薤白）四兩 防風五錢 自然銅五錢
（二）炮木皮一兩 棕樹根二兩 紫竹根二兩

用法：先將第一方三味搗碎，用三花酒浸三小時，再煮沸服之，以醉為度。服後兩三小時即吐出惡毒物。過一兩星期，打鑼鼓給患者听，如果患者怕听，則應繼續服第一方，不怕即可換服第二方。第二方各藥以水三碗半煎成一碗服，服二劑便可斷根不發。

療效：據獻方人說，此方是其父治愈數十人之驗方。傳給獻方人後，曾治愈三例，皆未復發。

禁忌：患者愈後終身不能走老茄瓜地，否則復發必死。

來源：龍勝縣 潘潤福

四 方

主治：狂犬咬傷。

處方：斑蝥七個 輕粉一錢

用法：斑蝥去頭足翅，以糯米少許共炒至米黃，去米，然後與輕粉共研末，分四次服，每四小時服一次，以溫酒沖服，服下一小時許，小便即出血片白脂，此即惡物。如小便疼痛，即用甘草湯飲之自利。如毒未盡，次日再服，服至小便清淨毒乃盡。

療效：昭平縣×鄉劉乃霖、戴秀榮、劉元禎、何靜康、黎秉儒、鍾旭祥妻等六人，同時被狂犬咬傷，前三人經用此方治療，獲愈。後三人，未用此方治療，死亡。

禁忌：百日內忌食諸發物。忌見苧麻、赤小豆等物，及聞鑼聲。
禁忌房事三年，終生忌食狗肉，若愈後犯前禁忌，則再發不能治。病人宜居靜室。

來源：昭平縣 劉建綱

治狂犬病方

主治：狂犬病患者。

處方：加味人參敗毒散：黨參三錢 甘草一錢五分 茯苓三錢 川芎一錢五分 獨活一錢五分 羌活一錢五分 北胡一錢五分 枳殼一錢五分 桔梗二錢 生地榆四錢 紫竹根四錢 前胡一錢五分

用法：以水二碗煎取一碗，分二次服，日服一劑，連服三劑後，改為隔七日服一劑。服完後，患者用口嚼生黃豆如覺無腥味，仍繼續服至嚼黃豆覺有腥味為止。

療效：1954年，羅播公社承祿大隊李木生，被狂犬咬傷足部兩處，血流不止，服此方七天，每天一劑，服後，患者嚼生黃豆，不但不覺腥味，且覺味甜可食，又嚼連服四劑，嚼黃豆雖覺有些少腥味，仍能吞下，這是病勢雖減而未盡除。因多服發汗解毒藥物，以致微汗常流，精神倦怠，遂將原方加防黨五錢，將各發散藥減半，每日晚上，用白米二兩，東蚝豉五錢，煲粥食。從此汗止，精神亦轉好，隨即痊癒。

羅播衛生所李保琦醫師亦用此方治愈三人。

來源：桂平羅播公社羅播醫院 李麗山

編者按：此方出驗方新編續增方。1955年廣西303醫院曾以此方治此病二例均愈。

治狂犬病發作方

主治：狂犬病發作，畏水，如犬吠，抽搐。

處方：斑蟊^{三個}_{去足翅} 馬前子^{一個}_{去毛} 紅花五錢

用法：方中斑蝥用糯米炒黃，去米。然后与馬前子、紅花粉共为細末，每次服如黃豆大粉末，用溫开水送服。輕者服一次，重者两次。

附註：服藥后寒战，小便点滴，每小时二十至三十次，有时有血尿出現，毒清則症状消失。如无反应則非狂犬病。上藥一剂能服二十多次。

疗效：此方治疗七十多例，疗效很高。临桂县卫生科曾訪問十余病例，均服此方获愈。

禁忌：孕妇忌服。

来源：临桂县卫生科

鼠咬伤类

治鼠咬伤方

用法：老鼠咬。

处方：老貓一只

用法：去毛杂煲服。

疗效：据献方人云：“1925年2月，余妻盛寿祺被鼠咬左手寸脉部位，出血，三只齿痕殷然不灭，并无痛苦，先君命用荔枝干捣烂敷之，齿痕仍然存在，但飲食行动如常，不以为意。清明，因食大虾、鸡肉等物，当夜九时病发，滿身发热、昏不知人，其热度逼人难耐，天明則醒，梳洗一切如常人，如是四十余天，諸治罔效。适买得老貓一只，与之共食。食已，随即发热、扶其安枕、昏不知人。至晚七时许，热退自醒，精神焕爽，余知貓肉之效。連夜托人訪买，蒸炖与食，連食三日，愈。后有旺岭村黃仁昌夥伴，被鼠咬，遍身起紅癰，大如荔枝龙眼不等。求治，告以吃貓，連吃三只获愈。又东山村老妇，被鼠咬伤脚底，不能埋口，經常流水，已三年。詢問治法，告以吃貓，亦获

愈。自后凡被鼠咬来問者，不下三十余人，均告以吃貓
获愈。”

来 源：貴县中医学院 卢宏道

解 毒 类

治食大茶根中毒方

一 方

主 治：誤食大茶根，不省人事。

处 方：蕹菜根一斤

用 法：搗烂取汁，灌服。

功 用：解毒。

疗 效：覃才成、蔡长发妻、陈氏等五人，誤食大茶根，均已不省
人事，服上方，愈。

来 源：桂平县木乐公社医院 覃健儒

編者按：蕹菜为旋花科植物。学名：*Ipomoea aquatica* Forsk。
藏器本草載蕹菜根汁解胡蔓草毒。

二 方

主 治：誤食大茶药及其他食物中毒。

处 方：鴨蛋一個

用 法：生用，去壳吞服。大人服二个。

疗 效：据献方人說：1946年夏黄文英家，誤煎大茶药作茶飲，中
毒者十人，皆面如死色，曾灌服生油、人尿、狗屎湯、蕹
菜汁、蕹菜汁、雷公根、瓜蒂等，均罔效。后按洗冤录所
載用鴨蛋治法，每人服生鴨蛋二只，服后均呕吐，获救。
惟其弟巨华于飯前服大茶药，毒已入腸，不能吐出，至当
晚2时即死亡。

附 註：大茶药又名断腸草、胡蔓藤。僮族名为勾肌。能防治猪染热毒，故民間有句俗語：“猪吃猪心凉，人吃断肝腸”。

来 源：貴县大圩分社医院 黃祥光

解木薯毒方

主 治：食木薯中毒，肚响，气上冲，头暈目眩。

处 方：雷公根一握

用 法：捶烂取汁，溫开水冲服。

功 用：清热，解毒。

疗 效：此方經治六旺村周胜全等20人。

来 源：貴县木梓 周俊荣

編者按：雷公根又名灯盏菜、螺髻菜、崩大碗、牛育菜、积雪草。为繖形花科植物。学名：*Centella asiatica*(L.)Urb.

治吃奎宁（或阿的平）过量中毒方

主 治：服奎宁或阿的平过量引起中毒，头暈，呕吐，昏迷等。

处 方：生甘草二兩

用 法：以水二碗煎至半碗，一次頓服。

疗 效：1958年，一男，40岁。患疟疾，一次服奎宁十二粒，半小时后头昏，肚胀，翌日面目均黃，恶心呕吐。另一妇女欲避孕，一次服阿的平二十片，当晚强直不省人事，呕吐苦水。另一妇女一次服糖衣奎宁六粒，肚腹胀，呕吐，头昏，不省人事，均以上方获救。

来 源：上思县板細医院 韦煥卿

眼 病 类

治 眼 病 方

主 治：一切内外障眼病。

处 方：外用方：神仙眼鏡草九條

內服方：赤石脂一兩八錢 牡蠣一兩八錢 淡海螵蛸一兩八錢

飞滑石一兩八錢 上好黃丹一兩二錢 正硃砂四錢

用 法：外用方：每日用神仙眼鏡草九條，洗淨，用第二次淘米水10毫升浸杯內，隔水蒸出葯味，取葯汁注入眼葯水瓶內滴患眼。滴時仰臥，每一小時滴一次，每次滴三至四滴。內服方：上六味，共研末，水飛，澄清去水晒干為末，每次用三分蒸鷄肝或豬肝食，日服一次。

附 註：滴葯水后，患眼充血變紅，多眵流淚，勿怪。繼續滴葯，自然痊愈。若滴葯無此反應，反無效。

功 用：去翳，明目。

疗 效：獻方人于玉林业醫十六年，以上方治愈千余人。茲舉五例：

（一）玉林縣水浸社文藝工作者梁惠，十餘年前，從湛江返家，當晚還看電影一場，翌晨睡醒，覺四周漆黑，以為天尚未明，家人云已日上三竿了，方知兩目失明。經中西醫檢查，認為雙目外觀並無病變，治療一年有半，無效。求治于獻方人，給以神仙眼鏡草葯水滴眼內，第二天即覺較舒服，第五天可模糊見物，第六天視力基本恢復，第七天可騎單車上街。（二）侯德照，男，36歲，梧州市九坊路聯營社同志，自訴解放前幾年左眼失明，屢醫無效。解放後曾到外地進行治療亦無效。1956年8月到隆林購買耕牛，到隆林人民醫院診病，獻方人給神仙眼鏡草葯水治療十天好轉，略能見物。當時侯因工作關係返梧州，給葯水

帶回續滴，一月后，侯从梧州来信說，其左眼視覺已完全恢复正常。（三）玉林玉豸乡杜光奎，二十四年前因患天花而致右眼失明，左眼于28岁时患急性角膜翳，經医者施手术，角膜受伤，亦完全失明。到了后来由梁惠介紹到診所求診，检查左眼复明无望，右眼內房水涨滿，眼球比普通眼大而突，风輪（即視网膜）破裂，角膜外有薄翳，症状严重。用神仙眼鏡草葯水治疗六十天，愈。（四）玉林石南鎮莫庆楷司機的儿子，患眼角膜翳，經多方治疗无效。1952年8月到隆林县人民医院診治，診断为角膜翳并角膜潰瘍，用神仙眼鏡草葯水治疗五十三天，膜翳消失，螺头亦平复。（五）玉林县人民監察院莫启光同志的儿子，8岁。左眼角膜上白翳，在博白县屢医无效，到隆林县人民医院就診，用神仙眼鏡草葯水治疗五天，痊愈。

来源：隆林县人民医院 覃立成

治眼紅腫羞明方

主治：眼目赤腫，流泪羞明。

处方：內服方：生白犂头草四兩 生狗肝菜二兩

外用方：生白犂头草一兩 生狗肝菜叶一兩

用法：內服方：煎成湯作茶飲。加猪肝煲食亦可。

外用方：搗烂。加适量人乳，調成糊状，敷于患处。

疗效：此方先后治愈十二人。且大都服二次或三次即愈。服四次而愈者仅二人。如科第村陈元烟之妻玉氏，28岁。两眼紅腫，流泪，恶日羞明，历时廿余天，用此方治之，服一次后赤減，服二次后恶日羞明消失，服三次后眼紅腫流泪完全消失，服四次痊愈。会村韦文英，女，24岁，患同样眼病，服此方四次而愈。

禁忌：服葯期間禁食辛辣物品。

来源：梧州专区中医药研究所 陈澜

编者按：狗肝菜又名小路边青（南宁名）。为爵床科植物。学名：
Dicliptera chinensis (L.) Nees.

犁头草又名牛相斗（桂林名）。为堇菜科植物。学名：
Viola inconspicus BL.

治内、外障方

主治：眼红痛发热，及内外障，胬肉攀睛，或凸或陷。

处方：白榕根（红茎的又名痴头婆）三两 细落地金钱根五钱 大落地金钱叶二钱 猪肝（鸡、羊肝亦可）三两

用法：上草药切碎晒干加盐油同猪肝煲服。体虚加五指柑叶二钱。

功用：去翳膜，清热。

疗效：此方系献方人数代祖传秘方，寒热虚实皆可用。曾治愈桂平、玉林、平南等地患者很多。

禁忌：忌食苦马菜、木瓜、芋头及有刺激性食物。

来源：桂平县下湾公社 杨家旺

编者按：细落地金钱又名小叶榕树；大落地金钱又名大叶榕树。均为桑科植物。学名：小叶榕 *Ficus retusa* L.；大叶榕 *Ficus lacor* Hamilton.

治眼膜方

一 方

主治：眼睛起翳膜，渐近瞳孔，视物朦胧。

处方：鲛鱼胆十个 鲤鱼胆十个 羊胆一至三个 牛胆一个 熊胆一分 羊肝一副 龙衣一钱 蝉退一钱

用法：各胆和羊肝风干，与龙衣、蝉退共研末，面糊为丸如黄豆大，每服七至九丸，每日二次服，淡盐汤送下。

功用：清热，平肝，退膜。

疗效：此方治愈多例，北流高和街甘木社覃运方之妻，两眼瞳孔旁起翳膜一点如黄豆大，渐遮瞳孔，视物朦朧，經治年余无效。服此方，翳膜渐退，恢复光明。

来源：北流县扶来 刘荣汉

二 方

主治：眼膜遮睛，视物不見。

处方：龙衣一钱五分 蝉退一钱五分 甲片^{七分}_炮 当归五钱 白术三钱
茯苓三钱 木贼一钱 菊花一钱五分 胆草一钱 赤芍二钱
連翹二钱 党参四钱 川芎五分 蒺藜二钱 蜜蒙花三钱
甘草一钱

用法：水二碗煮取碗半，分二次早晚飯后服。

功用：滋养，抑肝，退翳明目。

疗效：李瑞兰，女，58岁，住南宁市云亭街西一里18号。目痛十余年，屢医无效。1955年，左眼膜已遮睛，视物不見；右眼只見人影。用此方治疗，連进数剂，眼膜逐漸消退，视物漸覺清楚，后以杞菊地黄湯間服，愈。

来源：南宁市中医学会 磨汉英

三 方

主治：眼翳膜。

处方：水对菜 白犁头草 細路边青 細水芥菜 天星草 細紅背菜（細叶无毛）

用法：将上药捶至极度溶細，加乳汁和勻敷眼部。如敷上眼后，发热即換上新药。如眼紅者，紅背菜倍用，其他各药等量；如眼不紅，白犁头草倍用，其他各药等量；如因痘疮毒所引起，加入谷精草。如眼突出，再加田螺十个，和药捶溶，敷哑門、风府之間。

附註：男性患者，用育女孩之乳母乳汁，女性患者用育男孩之乳母乳汁。

療效：此方是黃萬譚醫師祖傳，曾治愈三百四十多人。茲舉近年治愈數病例如下：

（一）黃維炎母，58岁，楊梅公社三德工区人。1958年夏，双眼紅痛流泪，一眼已有翳膜，延医治不愈。十余日后，經黃醫師投此方四剂而愈。（二）潘英如，女，40岁，楊梅公社罗权工区人。1956年右眼紅肿突出，如鸡卵大，啼哭叫苦，經用此方治疗，連服三剂而愈。（三）黃××，男，43岁，楊梅公社罗权工区人。1958年12月眼紅流泪，多眵，羞明，有翳，用此方治疗，服两剂而愈。

禁忌：服藥期間，忌食腥、酸、煎、炒等物。

来源：容县中医藥研究所

編者按：水对菜又名四叶菜、水堍菜（桂南名）。为蘋科植物。学名：*Marsilea quadrifolia* L.。性凉利小便，除目疾，清肝热。

細路边青又名狗肝菜。科属学名見本类眼紅肿羞明方編者按（第261頁）。

細水芥菜又名鸡翅菜（南宁名）。为水鳖科植物。性凉味甘香，有清热作用。学名：*Ottelia alismoides* (L.) Pers.。

天星草又名滿天星（南宁名）、阿婆錢、花边灯盞（梧州名）、龙鳞草（百色、广东名）、毛叶天胡草。为繖科植物。学名：*Hydrocotylo Javanica* Thunb.

細紅背菜又名东风菜、紫背菜（桂南名）。为菊科植物。学名：*Emilia Prenanthoides* DC.

白犁头草为堇菜科植物。学名：*Viola* Sp.。

治眼瞼生小癰方

主治：眼瞼生麦粒样肿起，有障碍不安感，有时痕痒。

处方：麻线^{一根}_{長約一尺}

用法：以麻线将患侧手中指（如左眼紧左手，右眼紧右手）第二节中部紧，经六至八小时即可解线。一般第二天即痊愈。

疗效：南宁铁路医院北站卫生所用此法治疗十例，其中有八例平均一次治愈，一例二次治愈，一例无效。如黎邕安，男，24岁。眼不适已二日，经检查右眼上瞼有麦粒肿二小粒，当即予以给紧，第二天便愈。

来源：南宁铁路医院北站卫生所

治眼视物不明方

主治：眼视物不明（视神经乳头萎缩）。

处方：归身三钱 白术三钱 云苓三钱 北杞三钱 淮山三钱 丹皮二钱 泽泻二钱 萸肉二钱 兔丝子三钱 蒺藜三钱

用法：以清水三碗，煎成一碗服。

疗效：梁××，女，41岁，住柳州市罗池路16号。因感觉头有晕痛，大便溏泻，两目视物不明，颜面口唇苍白，精神萎靡，眼瞼浮肿，脉象虚弱。到柳州市人民医院诊治，经检查，认为视神经乳头萎缩，连服上方六剂，视力完全恢复，仍稍有头晕感觉，照原方加北芪三钱，天麻三钱，继续服六剂，痊愈出院。

来源：柳州市人民医院 郭仁稀

針治夜盲

主治：夜盲症。

取穴：睛明 行間

手法：用輕微刺激，留針十五分鐘。

療效：叶家井，昭平初中學生，年17。患夜盲已三月，每于夜間距離一尺遠不能見物。為針睛明、行間穴。是日下午5時施針。手法：用輕微弱刺激，留針十五分鐘。次日下午5時復診，已稍能見物，但不甚清楚，如法再針一次。次日晚上看東西已與平日一樣。

來源：區中醫專科學校 叶縵卿

治近視眼方

主治：先天性遺傳近視眼。

處方：石菖蒲三錢 云苓三錢 車前子三錢 菟絲子三錢 遠志三錢
鹽知母三錢 鹽黃柏三錢 羌蔚子三錢 五味子三錢 黨參
四錢 生地八錢 杞子四錢 石決明四錢

用法：以水600毫升，煎成200毫升，分二次服。

療效：南宁市人民医院共治療八例，一般服藥七天，視力恢復正常。

來源：南宁市人民医院

治赤箭貫瞳人方

主治：自大眥起紅絲一條橫貫瞳人至小眥，交午時則眼球刺痛流淚，痛苦不堪。

處方：六味地黃加蓮心湯：熟地八錢 丹皮三錢 澤瀉三錢 云
苓三錢 淮山藥四錢 萸肉四錢 蓮心五分

用法：用水兩碗半煎取碗半，日分二次服，上午7時服一次，10時服一次，中午則淚少痛減，連服三劑可痊愈。

功用：滋腎水，清心火。

療效：十余年前有一百色商人，忘其姓氏，年40余。目中赤箭橫貫瞳人，每交中午則刺痛流淚，經中西醫治療年余，無效。處以此方，患者以六味地黃湯之類方藥，已多服，對

此方殊失信心。时适早晨，嘱其及早煎服，至午当有效驗，如无效再說。下午来报，已痛減泪少，續服三剂，愈。1954年，×××，住南宁市，也患同样目疾未愈，告以此方，用之，三服而愈。

来源：南宁中医学会 梅元禧

編者按：赤箭貫瞳人，眼科医書謂为心火乘腎，六味地黄湯乃滋腎降火之方，蓮心清心去熱。王秉衡謂其有使心火下降于腎，腎水上潮于心之效能。心腎既交，水火相濟，此疾自愈。此方蓮心之功不鮮。

治眼睛发赤（巩膜炎）方

主治：目赤，畏光，流泪。

处方：薄荷一錢五分 荆芥一錢五分 明矾五分 苦參三錢 五倍子三錢

用法：以清水二碗半，煎至半碗，澄清，用藥棉蘸藥敷眼，每十五分鐘換一次。

疗效：此方治愈数人。高××之女，患巩膜炎，畏光流泪，經過了×××治疗七十多日，无效，且起翳膜，五丈外視物模糊。求治于献方人，处以上方，五日后，畏光流泪均消失，半月后視物漸明。嘱其再至医院檢驗，認為痊愈。

来源：区中医院留医部 梁鵬万

治目赤肿痛睛起白点方

主治：眼紅肿，疼痛，眼睛起白点。

处方：白花草叶适量

用法：捣溶，敷患眼。

功用：解毒，消肿，止痛，去翳。

疗效：1954年靖逸乡黃丙停之孙，右眼紅肿作痛，黑珠起白点，

用此方敷药一夜，肿消痛止，白点亦退。

来源：田东县和平公社医院

编者按：白花草又名臭草（梧州名）、大油草。为菊科植物。学名：Vernonia Patula(Ait.) Merr.

治目赤肿痛眼脸赤烂方

主治：沙眼，或眼赤痛红肿，眼脸赤烂，产妇褥期患者尤效。

处方：鲜石榴叶三两 鲜单竹叶心一至二两 鲜木贼草二至三两

用法：浓煎，乘热以大竹管入药煲中，使热气熏蒸患眼，每天熏蒸二、三次。或以药汤熏洗患眼亦可。

功用：清热，疏风，散瘀，消肿，止痛。

疗效：据献方人谓：“此方是外祖母秘传我母之验方。母授余后，治愈多人。兹举一、二例：（一）佛子合作商店右文珍，眼红肿不能张，眼球剧痛，经多方治疗无效。用上方，治四、五天，痊愈。（一）余孀母黄氏，褥中目赤，流泪，眼脸赤烂腐臭，病已四、五年，百药不效，以此方洗滌数天而愈。”

来源：上思县卫星人民公社医院 何武兴

编者按：石榴叶为安石榴科植物。学名：Punica granatum L. 单竹叶为竹科植物。学名：Bambusa chungii McClure. 木贼为木贼科植物。学名：Equisetum debile Roxb.

耳 病 类

治耳热流脓方

主治：耳内发热，痛痒流脓腥臭，不论初起或经久不愈者（急性中耳炎）。

处方：指甲灰 枯凡 冰片各等分

用法：共研为细末。先将患耳用温开水洗净，将药末吹入耳内。

療效：經用此方治療十一例，復查六例，均為用藥一次治愈。如田林縣銀行梁仲生，男。1958年患慢性中耳炎。田林縣樂里公社黃蘭英，女。1958年患急性中耳炎。均用此方一次治愈。

來源：田林縣人民醫院

針灸治療耳聾

一 方

主治：后天耳聾，（因大病之後而致耳聾），對面講話不聞。

取穴：听宮 听會 耳門 翳風 懸厘 風池 浮白 下關 中渚 合谷

手法：各穴輪番使用，每次針三、四穴，用興奮手法或平補平瀉法，隔日針一次。

療效：于鴻根，男，11歲，住南寧共和路工程局宿舍。1952年患病，因高燒導致兩耳聾，對面說話也不能听，右耳更甚。元月9日到區中醫院診治，共針十六次後，對面細聲講話兩耳也听到。

來源：區中醫院中心門診部 王桂英

二 方

主治：耳聾，對面講話不聞。

取穴：主穴：听宮 听會 耳門 翳風 瘰癧
配穴：足三里 腎俞

手法：用抑制手法，留針二十分鐘，隔日針一次，十五次為一療程。

療效：（一）农××，男，28歲。兩耳失聰，對面講話不聞已歷時九月。求治，針至第五次有效，三十次正常，可听電話。（二）梁××，男，60歲。兩耳聾已數年，對面講話

不聞，針十五次后，能聞鐘音。（三）卢树祥，男，42岁。耳聾已二十年，針三十次愈。

来源：南宁市人民医院

鼻 病 类

治 鼻 衄 方

主治：衄血。

处方：竹二青三钱 陈細茶一兩

用法：水一碗，煎至半碗，分二次服。

疗效：此方曾治愈新蓮大队苏維寬子、陈祖訓子、苏福明子等人。

来源：貴县 李榜佳

針灸治疗鼻衄

主治：鼻衄（一側或兩側鼻孔大量流血）。

取穴：少商穴

用法：以清制艾絨捻成如黃豆大之艾炷，連灸三、四壯。

疗效：此法系獻方人家傳，每用必效，治愈人數頗多。柳州火柴厂一女工，兩鼻孔大量出血，以此法灸之即止。

来源：柳州市工人医院 罗毅夫

口 腔 病 类

治 牙 痛 方

一 方

主治：齦齒疼痛。

处方：巴豆丸：巴豆^{一枚}去壳 花椒五十粒

用法：上二味共为細末，飯丸如黍米大，药棉包塞蛀孔。

功用：杀虫止痛。

疗效：此方用治龋齿疼痛，每年都治三、四十例，用后立即止痛，效果很好。

来源：岑溪太阳公社中心医院 林沛祺

二 方

主治：虫牙疼痛。

处方：石樟散：生石膏一钱 樟脑三分

用法：共研细末，用药棉包药粉塞于痛处，随痛随换。

疗效：此方于1958年深耕运动中，共治疗虫牙痛者八人，皆愈。

（一）陈惠中，女。患虫牙痛，齿顶穿孔，用药粉三分塞于孔中，疼痛立止。（二）陈琼，女。虫牙痛而致面部肿起，齿顶穿孔，亦用此方治愈。

禁忌：非系虫牙疼痛者禁用。

来源：贵县木樟乡 甘上陞

三 方

主治：一切牙痛（龋齿炎、牙龈炎、齿髓炎、牙龈膜炎、齿槽溃瘍、牙出血等）。

处方：立止牙痛散：砒石一钱五分 瘦猪肉三两 梅片一钱

用法：砒石研为细末，瘦猪肉切成两块，再将砒石末置瘦肉中夹好，取净瓦一块置肉于瓦上，用炉火烤焦枯（以手指能搓成细粉末为度），即取下，待凉后，掺入梅片细末，置玻璃瓶密封备用。用时将药粉少许放入患部，经数分钟，立即止痛。

疗效：经治愈百余例，效果显著。

来源：南丹县卫生防疫站 陈海筹

四 方

主 治：如上方。

处 方：白芷一兩 冰片二分

用 法：研成細末，放入牙洞內或牙縫中。

疗 效：南宁市人民医院經治疗数例，举一例：

楊××，男，26岁，南宁市人。牙痛九日，夜不能睡，曾用各种止痛药及封闭疗法，均无效。用上药放入牙洞中，立刻止痛，第二日未复发。

来 源：南宁市人民医院

五 方

主 治：风火牙痛。

处 方：芭蕉树心一斤

用 法：用淘米水碗半，煎至一碗頓服。

疗 效：梁朝宝等四人牙痛，每月发作，两年不愈。服上方三剂，愈，至今三、四月未复发。

来 源：容县黎村英雄公社 駱鶴松

治口烂久不愈方

主 治：口烂（口腔炎）久不愈，口腔舌面舌底及上下唇內皆起白泡粒点，疼痛頗甚。

处 方：白术三錢 厚朴_{二錢后下} 蒼术二錢 陈皮二錢 甘草三錢
黃連三錢

用 法：以水二碗煎成一碗服。

疗 效：伍某，男，門診挂号2185。患此症已年余，屢治罔效，服上方三剂痊愈。

来 源：区中医院中心門診部 溫国仁

咽喉病类

治喉痹方

主治：双单蛾喉及喉痺。

处方：心酸木根<sup>三兩
生用</sup>

用法：以水二碗煎取一碗，分二次服。

疗效：高岭大队宋树荣子患此症，經用此药治愈。

禁忌：辛热食物。

来源：贵县八塘公社 向广朝

编者按：心酸木为紫金牛科植物。学名：Embelia laeta Mez.。

治喉毒方

主治：喉内肉烂。

处方：山豆黄散；山豆根^{三錢} 黃連一分 儿茶三分 梅片二分 大黃三分 人中白三分 硼砂三分

用法：共为細末。每次用少許吹入喉内。

疗效：献方人行医三十多年，用此散医愈者頗多。茲举数例：

（一）李超宣，男，10岁。1954年患喉内肿痛，用此药散治愈。（二）李孙，女，15岁，北岭西二中队人。患喉内肿痛，用此散两、三次痊愈。（三）新陈大队三中队蒙先，男，3岁。1958年9月患喉内肿痛，用此药散一料痊愈。（四）船戶林启发，男，38岁。1959年1月患喉内肿痛，用此药散治疗五、六天痊愈。

禁忌：炒香辛辣等物。

来源：贵县八塘分社 李展猷

治烂喉痧方

主治：烂喉痧（猩紅热）发高热，体温摄氏四十度，咽喉紅肿，

咽峡和頰內有很多黃白色斑點，周身皮膚發紅疹，狀如塗丹，手按之紅斑退色，去指紅斑漸復，氣緊呼吸困難，閉目，神色昏迷，脈搏數，舌苔厚。

處方：黃芩五錢 牛蒡五錢 桑白四錢 川連二錢 銀花五錢 連翹三錢
竹葉三錢 甘草三錢 紫雪丹^{二分}沖服

用法：以水三碗，煎成一碗，日分三至四次服，連服三劑后，去紫雪丹。

療效：王××，男，生10月，住柳州飛鵝路河邊巷29號，患此病服上藥六劑，痊癒。

來源：柳州市聯合診所 謝紹光

治 喉 痛 方

一 方

主治：喉風，全身發燒，微眩暈，喉隱隱作痛，漸覺狹狀，呼吸困難，吞咽難下。

處方：（一）鵝不食草一兩 鮮杉皮一兩
（二）人中白五錢 桔梗三錢 澤蘭二錢 貝母一錢 甘草一錢

用法：一方以水碗半，煎成一碗服。二方以水一碗，煎十多分鐘，先服一方，若病嚴重不能吞下，以匙灌下，則吐出痰涎，喉間漸寬，繼服二方兩劑即癒。

功用：清熱，解毒，化痰，消腫。

療效：曾治愈三例，收效很好。一為猷方人弟婦；一是官橋公社扶廟屯侯姓12歲男孩，已忘其名；一是白沙公社原良美鄉獨流屯黃鶴山媳婦，初起時均發燒頭痛，喉頭微痛。二日后喉痛加劇，咽喉漸覺隘窄，咽下困難，雖液體也只能滲漏而下。服一方后吐出痰涎，謂喉漸寬，繼服二方二劑而癒。

來源：桂平縣防疫站 黃壽昌

編者按：鵝不食草為菊科植物。學名：Myriogyne minima Less。
鮮杉皮為杉科植物。學名：Cunninghamia Lanceolata Hook。

二 方

主 治：喉頭腫痛。

處 方：山豆根生藥一斤

用 法：用清水四斤煲至半斤，去渣，候水涼加入適量純糖漿。大人每次服一兩，日服三次，每隔四小時服一次。小兒酌減。

功 用：清熱，解毒。

療 效：用此方治療患者，百分之九十有效。廣西日報、中央健康報曾登載加以推廣。

禁 忌：在治療期間忌食煎炒熱物。

來 源：貴縣八塘分社 周德龍

三 方

主 治：喉風、喉頭腫痛，飲食不下，言語不出，涎自流出，不能嚥下。

處 方：桔梗三錢 牛蒡子三錢 射干二錢 銀花三錢 連翹三錢 枇
杷葉三錢 貝母一錢五分 山豆根一錢 甘草一錢
去毛

用 法：以水十二兩，煎成六兩，一次服。同時以消毒針刺少商穴出血。

療 效：陳高賢，男，40歲，靖西新民鄉逐天屯人。1954年患喉風症。不食不語，狀甚危急。服上方及針刺後，次日痊愈。

來 源：靖西 羅保寧

治喉閉驗方

主治：咽喉腫閉。

處方：心酸根二兩 蒼耳蕒二兩 松葉二兩 人中白五錢

用法：上藥以淨水四碗，煎成二碗，分二次服。

功用：清熱，解毒。

療效：據獻方人說：“1928年大圩泰盛油榨舖，梁長枝素習中醫，忽患喉閉，牙關漸緊，邀余往視，見其喉部左邊有一塊紅肉，橫封至喉右部，僅留分許，未封閉。懸壅垂已全部不見，呼吸困難。當時我認為症屬喉閉，邀外科醫生吳全會診。吳君即擬此方一服而愈。凡一切喉病此方皆可用，如已穿爛者，去松葉，如喉腫者，可加田七一至二錢，若白喉則去松葉，與養陰清肺湯合用。余用此方治愈五十七人。如貴縣林啟新，男，30余歲。1954年，喉部兩旁各起圓形一粒如拇指頭大，呈黃蜡色，紅腫日甚，極難忍，勺水難下，歷時五天。余診其六脈洪數有力，舌苔黃厚，口氣極臭，隨擬此方加川連、黃芩、大黃。藥物煎成後，令其先含少許于口中，久之即能咽下。繼服一碗，咽中不痛。隔一時許，再服一碗，至中午即能食粥。第二日再服一劑，第三、四、五日去三黃，連服三日，一共五日痊愈。”

來源：貴縣中醫研究所 盧宏道

編者按：心酸根又名透地龍（南寧名）、鷄母藤、鷄母苗（梧州名）。為紫金牛科植物。學名：*Embelia laeta* Mez.。
蒼耳蕒為菊科植物。學名：*Xanthium Sibiricum* Patr.
in。

治单双鹅喉方

主治：单双鹅喉，发热红肿疼痛，嚥物困难。

处方：大罗伞一兩 山豆根八錢 生甘草五錢 冰片三錢 薄荷一分

用法：将上药共为細末，以瓶装封固备用。用时以少許药末装入鹅毛管吹入喉部痛处，即有胶粘痰涎流出。

疗效：1957年临桂县五通供销社門市部黃初連、連塘邓玉嫂、方成嫂等三十余人，患鹅喉，均用此方治愈。

禁忌：在治疗期間，忌食辛热硬性食物。

来源：临桂县五通中医院 朱国基

编者按：大罗伞又名土凉伞（桂林名）。为紫金牛科植物。学名：*Ardisia crennata* Sims。

山豆根又名蝙蝠葛。为防杞科植物。学名：*Cyclea hypoglauca* (Schan.) Diels。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 广西中医验方选集

作者 = 广西僮族自治区中医药研究所编

页数 = 2 7 6

S S 号 = 1 1 3 2 0 5 5 9

出版日期 = 1 9 6 1 年 0 7 月 第 1 版