名方類證醫書大全

名方類證　醫書大全

名方類證　醫書大全

7-02
メ
1
貴

名方類證醫書大全

序目録

48062

新刊名方類證醫書大全序

建陽熊均宗立勿軒後人也自
幼嬰疾甫十歲受業仁齋劉先
生之門天資頴敏書無不讀讀
無不通早承師訓以醫道有活
人之功極留心焉乃取古人醫

百々依文郎寄贈

學源流所著方書會同一選始
於風寒暑濕終於小方脉科整
爲二十四卷名曰醫書大全刋
傳四方予得而讀之如登崑山
瓊瑤琅玕粲然畢陳如入武庫
戈矛甲冑森然具備究病之所
由起審藥之所宜用所以體天
地好生之仁在是所以廣
聖朝一視同仁之心亦在是矣嗟
夫人生兩間陰陽風雨晦冥感
其外男女飲食之欲傷其内疾
疢生焉扁鵲思邈之良世不常

有治病者其可以無方乎然古
今專門名家或得此失彼家無
全書人無全見臨證用藥幾何
不至於誤耶宗立自幼至長採
摭之勤服食之精所謂三折肱
而知醫之良也是編之行業術

者得以取衆論而折衷僻遠無
醫者亦得以依方而救濟倉卒
無夭横之憂頃刻有回生之力
立心何其仁且博哉其視得一
方秘而不以與人者大有逕庭
矣昔人謂達則願爲良相不達

願爲良醫夫相之與醫勢位雖
相懸絶而其調燮元氣以壽吾
民之命脉心則一也宗立是編
豈非良醫之用心乎由是推而
達之於良相之事有不難矣噫
相之用心皆能如宗立之用心
庶乎天下之福乎宗立以爲何
如耆
大明天順二年歲在戊寅六月
初吉
賜進士秋官員外太中大夫資治
少尹福建等處承宣布政使司

右參政惠陽吳高尚志書

易氏圖書

吳氏尚志

蘇齋

醫善專門方貴經驗古今方書傳於世者甚衆蓋初學之士猶臨海問津焉能適從哉書林舊刊文江孫氏醫方集成後之名醫續增宣明拔萃等方又謂之大成是皆經歷效驗有不待試而百發百中者誠衛生之捷徑也然其方中證類

大全方

混雜分兩欠明俾我同志不無憾焉余自幼多病喜讀醫書睽日因取前方芟證婦類措方入條復選諸名方中有得奇効而孫氏未嘗採者與夫家世傳授之秘總彙成編凡二十四卷目之曰醫書大全各卷分門各門析類各類載方方名之上次序順流以一二三四之數而標記之與目錄互相貫通使人展卷提其綱領而節目分明治病之際審其證候而方藥備具得無檢閱之繁庶免狐疑之患書成藏于家塾以供自治之需非敢謂之當也坊中好事者固請梓行與

衆共之余不能已因述其梗槩題
諸篇端云
正統十一年歲在丙寅暮春之初
鼇峰熊宗立道軒序

類定 熊宗立 道軒

新刊名方類證醫書大全目録

鼇峰 熊宗立 道軒 編集

卷之一

治諸風 附風論

通治 (一)烏藥順氣散 (二)人參順氣散 (三)八味順氣散
(四)大醒風湯 (五)小續命湯 (六)定風餅子
(七)牛黃清心圓 (八)排風湯 (九)側子散
(十)搜風九寶飲 (十一)勻氣散 (十二)皂角六一圓
(十三)烏附圓 (十四)楊氏荆芥圓 (十五)烏荆圓
(十六)真方白圓子 (十七)大辰砂圓 (十八)千金保命丹
(十九)神栢散 (二十)去風丹 虛證 (二十一)星附湯

二十二三生飲 二十三二香三建湯 二十四附子湯
二十五星附散 二十六雄附醒風湯 二十七羌活散
二十八是齋田陽湯 二十九真珠圓 三十八寶田春湯
熱證 三十一四白丹 三十二川芎石膏湯 三十三防風通聖散
三十四消風散 三十五八風散 三十六川芎茶調散
三十七生朱丹 三十八羌活愈風湯 三十九獨活散
四十防風散 四十一清神散 四十二上清散
四十三防風湯 四十四星香湯 四十五防風六麻散
四十六天麻散 四十七人參羌活散 四十八禹攻散
四十九解毒雄黃圓 五十奪命散 五十一稀涎散
痰涎 五十二青州白圓子 五十三苦丁香散 五十四敬烏丸圓
五十五加減青州白圓子 五十六四生圓
五十七左經圓 五十八大鐵彈圓 五十九牽正散
難產 六十一省風湯 六十二聖散
六十三天仙膏 不語 六十四獨活散 六十五小竹瀝湯
六十六資壽解語湯 六十七正舌散
麻痺 六十九治麻痺方 七十加減三五七散 七十一五痺湯
七十二獨痺湯 七十三烏頭湯 七十四木瓜煎
七十五神授圓 七十六解風散 痛痒 七十七虎骨散
七十八七聖散 七十九追風散 八十四生散
八十一獨痛圓 八十二趙痛圓 八十三貼傳芫花散
八十四枳實酒 八十五虎脛骨酒 八十六全生虎骨散
鶴膝 八十七大防風湯 雞爪 八十八治雞爪風 白虎 八十九獨活寄生湯
九十白虎注痛方 大風 九十一遇仙丹 癜風 九十二仙方
九十三洗方 九十四八葉湯 九十五追風丹
九十六何首烏散 九十七如聖膏 九十八又方

(九十九)又方 (一百)灸法

治諸寒

附寒論

中寒 (一)薑附湯 (二)理中湯 (三)葱熨法
(四)又方 感冒 (五)正氣散 (六)生料五積散
通治 (七)大已寒圓

治諸暑

附暑論

冒熱 (八)白虎湯 (九)白虎加參湯 (十)黃龍圓
(十一)益元散 傷冷 (十二)二氣丹 (十三)冷香飲子
(十四)冷香湯 冷熱不調 (十五)大順散 (十六)來復丹
霍亂 (十七)解暑三白散 (十八)桂苓甘露飲 (十九)香薷散

頑渴 (二十)桂苓圓 (二十一)縮脾飲
(二十二)五苓湯 (二十三)竹葉石膏湯 (二十四)竹葉石膏湯
通治 (二十五)消暑圓 (二十六)小柴胡湯 (二十七)大黃龍圓
(二十八)五苓散 (二十九)十味香薷散
(三十)中暑悶亂方 凡三道 (三十一)桂苓甘露飲 救急 (三十二)皂莢湯

治諸濕

附濕論

風濕 (三十三)羌附湯 (三十四)薏苡仁散 (三十五)麻黃白朮散
(三十六)白朮茯苓乾薑湯 (三十七)四物附子湯 (三十八)朮附湯
(三十九)防已黃耆湯 (四十)朮瓜圓 寒濕 (四十一)滲濕湯
(四十二)腎着湯 (四十三)滲濕湯 (四十四)生附湯
(四十五)芎朮除眩湯 (四十六)麒麟竭散 (四十七)除濕湯
暑濕 (四十八)五苓散 (四十九)苓朮湯 (五十)茯苓白朮湯

五十一 大橘皮湯 通治 五十二 蒼耳圓 五十三 白木酒
五十四 赤茯苓圓

卷之三

治傷寒

附傷寒論

宣汗 一 麻黃湯 二 十神湯 三 昌根解肌湯
四 葱白散 五 小青龍湯 六 大青龍湯
七 大柴胡湯 八 小承氣湯 九 柴胡飲子
宣下 十 防風當歸飲 十一 調胃承氣湯 十二 調中湯
十三 脾約麻仁圓 十四 蜜導方法 宣吐 十五 瓜蒂散
十六 稀涎散 宣溫 十七 五積散 十八 陰旦湯
十九 茯苓四逆湯 二十 桂枝附子湯 二十一 小建中湯
和解 二十二 和解散 二十三 消風白解散 二十四 八解散

二十五 十味和解散 二十六 香蘇散 二十七 十味芎蘇散
二十八 麻黃桂枝各半湯 二十九 柴胡桂枝湯
陽證 三十 黃連解毒湯 三十一 梔子仁湯 三十二 小柴胡湯
三十三 柴胡散 三十四 白虎湯 三十五 鵲石散
三十六 玄參升麻湯 陰證 三十七 葱熨法 三十八 白术散
三十九 真武湯 四十 薑附湯
四時 四十一 四逆湯 四十二 增損白术散 四十三 藿香正氣散
四十四 五苓散 四十五 僧伽應麥人參散 四十六 不換金正氣散
四十七 人參敗毒散 四十八 冲和散
五十 參蘇飲 疫癘 五十一 升麻葛根湯 五十二 柴胡升麻湯
五十三 神术散 五十四 井桔湯 虛煩 五十五 梔子豉湯
五十六 酸棗湯 五十七 竹葉石膏湯
五十八 溫膽湯 自汗 六十 溫粉 六十一 桂枝湯

(六十二)黃耆建中湯 自利 (六十三)黃芩湯 (六十四)理中湯
活 (六十五)枳實理中圓 (六十六)半夏瀉心湯 結胃 (六十七)大陷胸湯
(六十八)小陷胸湯 (六十九)大陷胸圓 血證 (七十)犀角地黃湯
(七十一)桃仁承氣湯 (七十二)抵當湯 (七十三)薤皮湯
(七十四)茅花湯 (七十五)桃花湯 嘔噦 (七十六)竹茹湯
(七十六)半夏生薑湯 (七十七)大橘皮湯 (七十八)小橘皮湯
(七十九)灸期門 易病 (八十)燒裩散 (八十一)假鼠糞湯
寢病 (八十二)白朮散 雜證 (八十三)金沸草散 (八十四)人參養胃湯
卷之四

治諸癆

附癆論

傷風 (一)桂枝羌活湯 感寒 (二)麻黃羌活湯 (三)正氣散
(四)五積散 冒暑 (五)黃連香薷散 (六)加減香薷散

伏濕 (七)除濕湯 (八)對金飲子 七情 (九)四獸飲
熟證 (十)白虎加桂湯 (十一)桂枝羌活湯 (十二)參蘇飲
(十三)小柴胡湯 (十四)柴胡加桂湯 (十五)桂枝石膏湯
(十六)清脾湯 (十七)八正散 (十八)白虎湯
冷證 (十九)生熟附子湯 痰證 (二十)勝金圓 (二十一)雄黃散
(二十二)露薑飲 食癆 (二十三)紅圓子 (二十四)清脾湯
癆癉 (二十五)地龍散 (二十六)定齋菓飲子 鬼癆 (二十七)麻黃桂枝湯
久癆 (二十八)人參調胃湯 (二十九)柴胡桂薑湯 (三十)灸法
(三十一)碧霞丹 (三十二)草菓飲 勞癆 (三十三)常山飲
虛癆 分利順元散 (三十四)七棗湯 (三十五)菓附湯
(三十六)四將軍飲 (三十七)大巳寒圓 癆母 (三十八)鱉甲飲子
(三十九)老癆飲 截法 (四十)截癆方 (四十一)辰砂圓
(四十二)癆神丹 (四十三)七寶飲 (四十四)治癆良方

治諸痢

附痢論

風 四十五 胃風湯　寒 四十七 椒艾圓
暑 四十八 六和湯　四十九 生料五苓散　五十 黃連香薷散
濕 五十一 芎藥薤皮圓　五十二 戊巳圓　五十三 小承氣湯
五十四 小柴胡湯　五十五 酒蒸黃連圓　五十六 二味黃圓子
冷證 五十七 大斷下圓　五十八 當歸圓　五十九 豆蔻固腸圓
六十 木香散　六十一 訶黎勒散
不調 六十二 固腸湯　六十三 真人養臟湯　六十四 黃連解毒湯
六十五 神效參香散　血痢 六十六 地榆散　六十七 木香散
六十八 槐花散　六十九 異香散
熱痢 七十 牛乳湯
積痢 七十一 蘇感圓　七十二 香豉圓　七十三 烏梅圓
七十四 木香流氣飲　七十五 靈砂丹　禁口 七十六 治禁口方
七十七 敗毒散　腹痛 七十八 薑茶方　七十九 聖棗子
毒痢 八十 茜根圓　休息 八十一 香連圓　八十二 黃芩圓
八十三 水煮木香圓　通治 八十四 赤白痢方　八十五 駐車圓
八十六 黃連阿膠圓　八十七 阿膠梅連圓

附嘔吐論

治嘔吐

傷風 八十八 藿香散　感寒 八十九 藿香半夏散　九十 丁香半夏圓
九十一 理中湯　伏暑 九十二 五苓散　九十三 香薷散
受濕 九十四 加味治中湯　九十五 藿香安胃湯　七情 九十六 藿香正氣散
九十七 大藿香散　痰證 九十八 藿香安安散　食傷 九十九 旋覆花湯
熱證 一百 竹茹湯　冷證 一百一 丁香煮散　一百二 安脾散
一百三 玉浮圓　一百四 丁附治中湯　一百五 胃冊　一百六 養胃湯
一百七 青金丹　一百八 四君子湯　一百九 生薑橘皮湯

治泄瀉

附泄瀉論

風 (一)胃風湯 (二)火炊圓 寒 (三)理中湯
(四)大羌香散 暑 (五)加味五苓散 (六)六和湯
(七)胃苓湯 (八)五苓散 (九)水浸丹
(十)來復丹 濕 (十一)羌香正氣散 (十二)戊巳圓
(十三)麴芎圓 熱證 (十四)黃連香需散 (十五)一元散
冷證 (十六)椒艾圓 (十七)四柱散 (十八)豆附圓
(十九)大巳寒圓 (二十)厚腸圓 (二十一)火輪圓
(二十二)禹餘粮圓 (二十三)豆附圓 (二十四)訶黎勒圓
脾泄 (二十五)六君子湯 (二十六)二神圓 (二十七)四神圓
腎泄 (二十八)五味子散 (二十九)金鎖正元丹 滑泄 (三十)豆蔻圓

(三十一)補脾圓 (三十二)肉豆蔻散 (三十三)真人養臟湯
(三十四)百腸圓 暴瀉 (三十五)硫黃散 (三十六)車前散
(三十七)神麴圓 (三十八)粟殼圓 通治 (三十九)實腸散
(四十)九寶飲子

治霍亂

附霍亂論

感寒 (四十一)通脈四逆湯 (四十二)薑附湯 (四十三)理中湯
(四十四)加減理中湯 暑 (四十五)黃連香需散
(四十六)水浸丹 五苓散 (四十七)桂苓甘露飲 (四十八)枇杷葉散
(四十九)香蘇正氣散 濕 (五十)藿香正氣散 七情 (五十一)七氣湯
食傷 (五十二)治中湯 (五十三)又方 煩渴 (五十四)秘方
(五十五)既濟湯 (五十六)麥門冬湯 (五十七)白朮散
(五十八)益元散 轉筋 (五十九)木瓜湯 (六十)又方

通治 六仁 不換金正氣散

治秘結

實秘 六十二 牛黃散　六十三 麻人湯　六十四 檳榔圓
虛秘 六十五 滋腸五仁圓　六十六 半硫圓　六十七 潤腸圓
六十八 葱白散　風秘 六十九 瀉腸圓　七十 潤腸圓
七十一 枳殼圓　濕秘 七十二 檳榔散　氣秘 七十三 橘杏圓
七十四 紫蘇麻仁粥　七十五 三和散　七十六 南木香圓
七十七 四磨湯　七十八 掩臍法　積滯 七十九 木香逐氣圓
八十 木香三稜散　通治 八十一 潤腸湯　八十二 順氣圓
八十三 蜜導法

附秘結論

治咳嗽

附咳嗽論

薑鹽飲

傷風 八十四 三拗湯　八十五 細辛五味湯　八十六 大利膈圓
八十七 祛痰圓　八十八 人參荊芥散　八十九 橘蘇散
九十 玉芝圓　感寒 九十一 小青龍湯　九十二 五拗湯
九十三 華盖散　九十四 金沸草散　九十五 款冬花散
伏暑 九十六 六和湯　受濕 九十七 不換金正氣散　九十八 白朮湯
七情 九十九 敗毒散　四時 一百 人參飲子
一百一 款冬花散　冷證 一百二 溫肺湯　一百三 加味理中湯
一百四 溫中化痰圓　一百五 溫肺湯　一百六 胡椒理中圓
一百七 杏子湯　熱證 一百八 紫菀圓　一百九 貝母散
一百十 小柴胡湯　一百十一 瀉白散　喘嗽 一百十二 人參紫菀湯
一百十三 紫蘇半夏湯　一百十四 人參理肺散　一百十五 杏仁煎
一百十六 大降氣湯　一百十七 平肺湯　一百十八 杏參散
一百十九 蘇沉九寶湯　一百二十 人參清肺湯　痰嗽 一百廿一 半夏圓

(百廿二)王液圓 通治 (百廿三)蠟煎散
(百廿五)參蘇飲 久嗽 (百廿六)紫參圓 嗽血
(百廿八)紫菀湯 肺癰 (百廿九)桔梗湯 勞損 (百三十)入參潤肺圓
(百卅一)人參養肺圓 (百卅二)鍾乳補肺湯 (百卅三)團參飲子

卷之六

治痰飲

附痰飲論

風 (一)半夏利膈圓 (二)葉氏分涎湯 (三)星香飲
寒 (四)枳實理中圓 (四)小青龍湯 熟 (五)治痰熱
(六)人參半夏圓 (七)化痰圓 (八)枳殼半夏湯
冷 (九)煖胃圓 (十)鹽砂白圓子 (十一)丁香半夏圓
(十二)強中圓 (十三)丁香茯苓湯 (十四)八味圓
(十五)滌白圓 (十六)順元散 (十七)温中化痰圓

(十八)蘇子降氣湯 (十九)黑錫丹 (二十)鹽砂丹
(二十一)俞尖降氣湯 實痛 (二十二)茯苓圓 酒毒 (二十三)葛花解酒湯
七情 (二十四)四七湯 通治 (二十五)半夏湯 (二十六)辰砂化痰圓
(二十七)桔梗湯 (二十八)法製半夏 (二十九)伏苓半夏湯
(三十)二陳湯 (三十一)破痰消飲圓 (三十二)橘皮半夏湯
(三十三)吳仙丹 (三十四)三仙丹 (三十五)道痰湯
(三十六)二賢散 (三十七)快活圓 (三十八)白朮湯
(三十九)蠲飲枳實圓 (四十)五苓散 諸飲 (四十一)五飲湯
(四十二)倍朮圓 (四十三)破飲圓 懸飲 (四十四)棗湯
(四十五)五苓散 支飲 (四十六)防己桂枝湯 (四十七)枳朮湯
(四十八)枳朮湯 溢飲 (四十九)大青龍湯 (五十)小青龍湯
(五十一)茯苓飲子 (五十二)丁香五套圓 (五十三)新法半夏湯
(五十四)檳榔散 (五十五)參蘇飲

治喘急 附喘論

風熱虛氣痰

(五十六)三拗湯 (五十七)加味三拗湯 (五十八)藿香正氣散
(五十九)金沸草散 (六十)參蘇飲 (六十一)黃蘆散
(六十二)蘇子降氣湯 (六十三)防已圓 (六十四)人參潤肺湯
(六十五)四磨湯 (六十六)紫蘇子湯 (六十七)杏參飲
(六十八)二黃圓 通治 (六十九)神秘湯 (七十)人參定喘湯
(七十一)紫蘇子圓 (七十二)分氣紫蘇飲 (七十三)五味子湯
(七十四)團參飲 肺疾 (七十五)杏仁半夏湯 (七十六)知母茯苓湯
(七十七)葶藶大棗瀉肺湯

卷之七

治諸氣 附氣論

諸症膀胱小腸腎氣

氣 一 獨香散 (二)八味順氣散 (三)蘇合香圓
四 田陽湯 虛冷 (五)塩煎散 (六)順氣沉附湯
七 養氣丹 八 薑合圓 九 阿魏理中圓
十 葱白散 十一 附子養氣湯 實熱 十二 五香連翹散
十三 推氣圓 十四 小承氣湯 虛實 十五 蘇子降氣湯
十六 秘傳降氣湯 十七 養正丹 七情 十八 五膈寬中散
十九 七氣湯 氣滯 二十 復元通氣散 二十一 和氣散
二十二 木香調氣散 二十三 沉香降氣湯 二十四 三和散
二十五 道寸氣圓 二十六 消脹圓 二十七 五香散
二十八 木香流氣飲 二十九 三和圓 三十 沉香升氣圓
三十一 沉香降氣湯 三十二 賺氣散 三十三 順氣寬中圓
三十四 分氣圓 三十五 紫沉通氣湯 三十六 三香正氣散
三十七 華氏消氣散 三十八 通氣圓 三十九 道寸氣快散圓

氣積 四十 助氣圓 四十一 木香順氣圓 四十二 丁香脾積圓
四十三 神保圓 四十四 五香蠲痛圓 四十五 磨積圓
氣痛 四十六 手拈散 四十七 導滯圓 四十八 化氣湯
四十九 蟠葱散 五十 雞舌香散 五十一 順氣木香散
五十二 神砂一粒丹 通治 五十三 木香分氣丸 五十四 異香散
五十五 撞氣阿魏圓 五十六 青木香圓 五十七 養氣圓
五十八 木香檳榔圓 五十九 分心氣飲 六十 經驗調氣方
疝氣 六十一 五苓散 六十二 去鈴散 六十三 失笑散
六十四 四神圓 六十五 茴香練實圓 六十六 秘方
六十七 立效散 六十八 治小腸氣 六十九 金鈴圓
七十 聚香飲子 七十一 三棱圓 冷泓 七十二 丁香練實圓
七十三 茱萸內消圓 七十四 益智仁湯 七十五 玄附湯
七十六 補腎湯 七十七 十補圓
七十八 浪毒圓
八十 川練散 八十一 茱萸內消圓 八十二 葫芦巴圓
八十三 烏頭桂枝湯 熱泓 八十四 通心散 八十五 八正散
八十六 三白散 八十七 葵子湯 偏墜 八十八 奪命丹
八十九 金鈴子圓 九十 敷法 九十一 灸法

卷之八

治脾胃

附脾胃論

虛弱 一 參苓白朮散 二 嘉禾散 三 人參丁香散
四 人參煮散 五 八味理中圓 六 大羣香散
七 秘方思食圓 八 安中湯 九 生胃丹
十 通膈圓 十一 補脾湯 十二 豆蔻橘紅圓
十三 沉香磨脾圓 十四 治中湯 十五 千金大養脾丸
十六 白朮湯 十七 丁沉透膈湯 十八 思食調中圓

十九 木香調中圓 虛寒 二十 麴术圓 二十一 燒脾散
二十二 溫中圓 二十三 棗肉圓 二十四 八味湯
二十五 壯脾圓 二十六 補真圓 二十七 扶老強中圓
二十八 養胃湯 二十九 養脾圓 三十 奪命抽刀散
三十一 大建脾散 三十二 大建脾圓 三十三 桂麴圓
三十四 厚朴煎圓 三十五 進食散 三十六 附子建中湯
三十七 木香頓散 三十八 進食散 三十九 丁香煮散
熱實 四十 橘皮竹茹湯 四十一 清脾湯
四十二 瀉黃散 四十三 枳殼圓 宿積 四十四 丁香半夏圓
四十五 宣宿圓 四十六 小七香圓 四十七 紅圓子
通治 四十八 七珍散 四十九 平胃散加減法 五十 受拜平胃散
五十一 小橘皮煎圓 五十二 溫脾散 五十三 四君子湯
五十四 開胃生薑圓 五十五 二陳湯 五十六 茯苓分氣飲

五十七 八珍湯 五十八 和中散

治翳胃 附翳胃論 五噎五膈

虛寒 六十 丁香煮散 六十一 附子丁香散 六十二 養胃湯
六十三 太倉圓 六十四 入藥靈砂 六十五 安脾散
六十六 丁香附子散 六十七 附子散 六十八 附子黃芪薑棗飲
六十九 丁香煮散 七十 青金丹 七十一 六丁圓
七十二 小半夏圓 五膈 七十三 五膈散 七十四 瓜蔞實圓
七十五 十膈氣散 七十六 人參利膈圓 七十七 百杯圓
七十八 通膈散 七十九 薑合圓 八十 五膈寬中散
八十一 膈氣散 五噎 八十二 漢防已散 八十三 五噎散
八十四 撞氣阿魏圓 通治 八十五 奪命四生散 八十六 沉香散
八十七 寬中進食圓

卷之九 治諸虛

附虛論

心虛 (一)參香散 (二)補心圓 肝虛 (三)栢子仁湯
脾虛 (四)進食散 (五)理中湯 (六)北亭圓
肺虛 (七)白石英湯 腎虛 (八)安腎圓 (九)玄兎丹
(十)四柱散 (十一)九子圓 (十二)冷補圓
(十三)陽起石圓 (十四)兎絲子圓 (十五)鹿茸圓
(十六)安腎圓 (十七)温腎圓 (十八)起痿丹
(十九)五精圓 (二十)鹿茸圓 心腎虛 (二十一)交濟丸
(二十二)小兎絲子圓 (二十三)瑞蓮圓 肝腎虛 (二十四)巴戟圓
(二十五)鹿茸四斤圓 心脾虛 (二十六)未病蓮心散 脾腎虛 (二十七)五味子圓
橘皮煎圓 交濟 (二十九)十精圓 (三十)心腎圓

(三十一)八味圓 (三十二)黑錫丹 (二十三)靈砂丹
(三十四)養氣丹 (三十五)養正丹 (三十六)丙丁圓
(三十七)補髓丹 (三十八)玉關圓 無氣虛 (三十九)黄耆建中湯
四十 天真圓 (四十一)三仁五子圓 (四十二)双和散
(四十三)說說從容圓 (四十四)戊己圓 (四十五)烏沉湯
(四十六)八仙圓 (四十七)十四味建中湯 平補 (四十八)人參養榮湯
(四十九)還少圓 (五十)胡桃圓 (五十一)黑圓
(五十二)十全大補湯 蛟補 (五十三)建湯 (五十四)固陽丹
(五十五)歸茸圓 (五十六)麝香鹿茸圓 (五十七)十補圓
勞傷 (五十八)無比山藥圓 (五十九)究原双補圓 (六十)双和湯
(六十一)金櫻丹 失精 (六十二)水中金丹 (六十三)金鎖正元丹
(六十四)秘精圓 (六十五)玉鎖丹 (六十六)黄犬肉圓
(六十七)四精圓 (六十八)石刻安腎圓 (六十九)沉香鹿茸圓

(七十)桑螵蛸圓　(七十二)飲陽丹　白濁(七十三)秘精圓
(七十二)韭子圓　(七十三)威喜圓　精冷(七十四)神仙禁寶丸
(七十五)椒附圓　通治(七十六)發蒙大補丸　(七十七)二至圓
(七十八)鹿茸大補湯　(七十九)上丹　(八十)中丹
(八十一)小丹　(八十二)固真丹　(八十三)茸珠圓
(八十四)小安腎圓　(八十五)無名丹　(八十六)五福延齡丹
(八十七)正元散　五勞(八十八)羚羊角散　(八十九)續斷湯
(九十)黃芩湯　(九十一)遠志飲子　(九十二)人參丁香散
(九十三)小甘露飲　(九十四)二母湯　(九十五)溫肺湯
(九十六)地黃湯　(九十七)羊腎圓　六越(九十八)五加皮湯
(九十九)木瓜散　(一百)茯神湯　(一百一)意苡仁散
(一百二)半夏湯　(一百三)前胡湯　(一百四)紫菀湯
(一百五)飲陽丹　(一百六)玄參湯　(一百七)鹿角圓

卷之十

治癆瘵 附療論

傳屍(一)取癆虫方　(二)神授散　(三)雄黃圓
(四)蘇合香圓　骨蒸(五)地骨皮散　(六)地仙散
(七)經驗方　(八)清骨散　(九)四美圓
(十)青蒿散　(十一)團魚圓　(十二)一物黃連飲
熱勞(十三)人參散　(十四)白朮黃耆散　(十五)秦艽扶羸湯
(十六)青蒿散　(十七)鱉甲地黃湯　(十八)秦艽鱉甲散
虛勞(十九)豬膏煎　(二十)大補十全湯　(二十一)寧肺湯
(二十二)藥令建中湯　(二十三)黃耆飲子　(二十四)混元丹
嗽血(二十五)當歸地黃湯　(二十六)黃耆鱉甲散　(二十七)阿膠圓

(二十八)蠟前圓　(二十九)團參飲子　通治(三十)灸四花穴

治咳逆

冷證(三十一)丁香散　(三十二)橘皮乾薑湯　(三十三)半夏生薑湯
(三十四)沉香降氣湯　(三十五)柿蒂湯　(三十六)桂苓白朮散
(三十七)灸期門穴　(三十八)羌活附子散　熱證(三十九)小柴胡湯
(四十)橘皮湯　(四十一)橘皮竹茹湯

附咳逆論

治眩暈

風(四十二)川芎散　(四十三)羚羊角散　寒(四十四)三五七散
(四十五)薑附湯　暑(四十六)消暑圓　(四十七)六和湯
濕(四十八)芎朮湯　(四十九)芎朮除眩湯　痰(五十)理中圓
(五十一)順元散　(五十二)加味二陳湯　失血(五十三)芎歸湯

附眩暈論

既濟(五十四)沉香磁石圓　熱證(五十五)芎黃湯

治五痺

附痺論

合痺(五十六)五痺湯　(五十七)芎附湯　(五十八)烏頭湯
風濕(五十九)木瓜煎　(六十)蒼耳散　(六十一)續斷圓
(六十二)黃耆酒　寒濕(六十三)理中湯　(六十四)增損續斷圓
熱痺(六十五)升麻湯　(六十六)蠲痺湯　(六十七)蠲痺湯
血痺(六十八)防風湯　(六十九)茯苓湯　痰痺(七十)茯苓湯
着痺(七十一)茯苓川芎湯　筋痺(七十二)羚羊角湯　行痺(七十三)防風湯

白虎歷節風痛痺

(七十四)烏藥順氣散　(七十五)羌活湯　(七十六)虎骨散
(七十七)烏頭湯　(七十八)附子八物湯

治頭痛 附頭痛論

風 (一)菊花散 (二)通關散 (三)都梁圓
(四)治頭風方 (五)一字散 (六)大川芎圓
(七)天香散 (八)感風頭痛 (九)風氣虛頭痛
(十)芎歪散 (十一)藿香散 (十二)芎歪香蘇散
(十三)消風散 (十四)川芎茶調散 (十五)如聖餅子
寒 (十六)必勝散 (十七)人參順氣散 (十八)葛根葱白湯
暑 (十九)香薷散 濕 (二十)芎术湯 (二十一)小芎辛湯
虛 (二十二)芎辛湯 (二十三)必效散 (二十四)葫芦巴散
(二十五)加減二五七散 (二十六)葱附圓 (二十七)玉真圓
熱 (二十八)川芎散 (二十九)治頭痛方 (三十)洗心散
痰 (三十一)三生圓 通治 (三十二)偏正頭痛 (三十三)菜菔汁
(三十四)止痛太陽丹 (三十五)芎烏散 (三十六)止痛太陽丹 (三十七)治頭痛
(三十八)治偏正頭痛

治心痛 附心痛論

安鎮 (三十九)妙香散 (四十)雄朱圓 (四十一)育神散
(四十二)龍齒湯 (四十三)辰砂妙香圓 (四十四)益榮湯
(四十五)歸脾湯 (四十六)八物定志圓 (四十七)遠志圓
虛 (四十八)參茵本圓 (四十九)平補鎮心丹 (五十)寧志膏
(五十一)龍齒丹 (五十二)補心神效圓 (五十三)補心圓
(五十四)心丹 (五十五)秘方 (五十六)引神歸舍丹
(五十七)十四友圓 (五十八)茯苓補心湯 (五十九)靈砂寧志圓
(六十)十補圓 (六十一)双補圓 (六十二)定心湯
(六十三)王賁圓 (六十四)降心丹 (六十五)鎮心爽氣湯
痰濕 (六十六)

作揗 (六十八)蘇合香圓　又方 (六十七)愈痛散
(六十八)加味七氣湯 (六十九)應痛圓 (七十)沉香降氣湯
(七十一)分心氣飲 (七十二)失笑散 (七十三)九痛圓
(七十四)郤痛散 (七十五)二薑圓 (七十六)氣針圓
(七十七)通心散 (七十八)沒藥散 (七十九)香附子散
(八十)手拈散 (八十一)神保圓

八〇卷十二

治腰脇痛 附腰脇論

風濕 (一)獨活寄生湯 (二)牛膝湯 (三)杜仲酒
(四)敗毒散 寒濕 (五)术附湯 (六)五積圓
氣滯 七 牽牛圓 八 人參順氣散 九 木香流氣飲
血滯 十 舒筋散 十一 熟大黃湯 挫閃 十二 菴閭圓

十六 青娥圓 十七 立安圓 十五 補髓丹
痛合 十九 薏苡仁圓 二十 異香散 脇痛 二十一 芎藭湯
二十二 枳實散 二十三 枳殼散 二十四 推氣散
二十五 枳芎散 二十六 分氣紫蘇湯

治脚氣 附脚氣論

風濕 二十七 五積散 二十八 香蘇散 二十九 活血應痛圓
三十 經効立應散 三十一 加減至寶丹 三十二 黃耆圓
三十三 經進地仙丹 三十四 仙翁地仙丹 三十五 加減地仙丹
三十六 不老地仙丹 寒濕 三十七 木瓜牛膝圓
三十九 五六丸圓 四十 萌芦巴圓 四十一 勝駿圓
四氣 四十二 換腿圓 四十三 神秘左經湯 四十四 麻黃左經湯

(四十五)大黃左經湯 (四十六)六物附子湯
(四十八)四忝木瓜圓 (四十九)四斤圓
熱毒(五十)柴胡敗毒散 腎虛(五十一)木瓜圓
(五十二)木瓜圓
發散(五十四)檳榔湯 (五十五)攢風散 (五十六)木瓜散
(五十七)直指木瓜散 (五十八)思仙續斷圓 (五十九)憂中神授方
(六十)神烏圓 (六十一)洗法 (六十二)外應散
秘結(六十三)通真圓 腫痛(六十四)大腹皮散 (六十五)透骨丹
(六十六)沉香大腹皮散 (六十七)脚氣止痛方 (六十八)又方
(六十九)趾痛散 痿弱(七十)黑虎丹 (七十一)五獸三鞭丹
氣沖心腹(七十二)方 (七十三)十全丹 (七十四)烏藥平氣湯
(七十五)茱萸圓 (七十六)八味圓 清理(七七)木通散
(七十八)搜風散

卷十三

治五疸

風(一)艾煎圓 寒(二)麻黃湯 暑(三)加減五苓散
濕(四)雙石散 時行(五)茵蔯湯 (六)黃連散
黃汗(七)苦酒湯 (八)黃芩散 黃疸(九)小半夏湯
(十)單方 (十一)茵蔯散 (十二)嗑藥瓜蒂散
穀疸(十三)穀疸圓 酒疸(十四)白木湯 (十五)當歸白木湯
(十六)葛根湯 (十七)酒蒸黃連圓 女勞疸(十八)滑石散
濕疸(十九)金黃圓 熱疸(二十)一清散 虛疸(二十一)秦艽飲
(二十二)養榮湯

附疸論

治諸淋

熱淋(二十三)八正散 (二十四)清心蓮子飲 (二十五)五苓散

附淋論

(二十六)石韋散 (二十七)道亦赤散
金瘡 (二十九)生附散 血淋 (三十)髮灰散
(三十二)琥珀飲 (三十三)立効散
(三十五)鹿角膠圓 氣淋 (三十六)沉香散 沙石淋 (三十七)石燕圓
通治 (四十一)五淋散 (四十二)秘方 勞淋 鹿角膠圓
(四十三)通竇湯 (四十四)五淋散
治消渴 附消渴論
消渴 (四十五)五苓散 (四十六)清心蓮子飲 (四十七)衛生天花圓
(四十八)大黃甘草飲 (四十九)朱砂黃連圓 (五十)真珠圓
消中 (五十二)加味白术散 強中 (五十三)黃連猪肚圓 (五十四)鹿茸圓
(五十五)葛根圓 (五十六)蒐絲子圓 (五十七)八味圓
治赤白濁 附諸濁論
心濁 (六十八)道亦赤散 (六十九)心腎圓 (七十)猪苓圓
(七十一)清心蓮子飲 (七十二)瑞蓮圓 (七十三)蓮子六一湯
(七十四)治赤濁方 (七十五)育神散 (七十六)寧志膏
腎濁 (七十七)定心湯 (七十八)鎮心菱芡湯 脾濁 (七十九)羊脬炭圓
(八十)五子圓 (八十一)固精圓 (八十二)益志湯
(八十三)安中散 (八十四)黃蘗分清飲 (八十五)悲子圓
通治 (八十六)桑螵蛸散 (八十七)秘傳玉鎖丹 (八十八)固真丹
(八十九)十四友圓 (九十)白濁出髓方 (九十一)蠟礬圓
(五十八)加減腎氣圓 通治 (五十九)黃耆六一湯 (六十)地黃飲子
(六十一)烏梅五味湯 (六十三)茯苓圓 (六十四)六神湯
頻防 (六十五)忍冬圓 卅石毒 (六十六)蟹粟湯 (六十七)三黃圓

(九十二)煉鹽散 (九十三)茯兔圓

八〇卷十四

治水腫

陰水 (一)實脾散 (二)煨腎散 陽水 (二)疎鑿飲子
(四)鴨頭圓 (五)神助散 (六)牛蠻圓
七消腫圓 (八)麻黃甘草湯 (九)大戟散
(十)三仁圓 (十一)杏蘇飲 (十二)椰李仁圓

附腫論

氣腫 (十三)葶藶圓 (十四)分氣補心湯 (十五)木香分氣圓
(十六)當歸散 (十七)復元丹 (十八)加味腎氣圓
熱證 (二十)牽牛圓 (二十一)赤小豆湯 四氣 (二十二)五皮散
(二十三)牽牛湯 (二十四)葶藶圓 (二十五)葶藶木香散
(二十六)大橘皮湯 通治 (二十七)楮實子圓 (二十八)消腫圓

(二十九)禹餘粮圓 (三十)苦葶藶圓 (三十一)蓋雞冒子飲
(三十二)茯苓散 (三十三)川活散

治脹滿

附脹論

氣脹 (三十四)平肝飲子 (三十五)紫蘇子湯 (三十六)五膈寬中散
(三十七)藿香正氣散 (三十八)煮附圓 (三十九)木香順氣湯
(四十)木香分氣圓 (四十一)調中順氣圓 食脹 (四十二)強中湯
(四十四)桂香圓 (四十五)異香散 (四十六)檳木湯
熱脹 (四十七)枳實湯 (四十八)推氣圓 (四十九)中滿分消圓
寒脹 (五十)朴附湯 (五十一)大半夏湯 (五十二)道氣圓
(五十三)附子粳米湯 (五十四)厚朴橘皮圓 (五十五)氣針圓
蟲脹 (五十六)四炒圓 (五十七)三稜煎圓 (五十八)氣鼓腸痛方
通治 (五十九)赤茯苓圓 (六十)大正元散 (六十一)桃溪氣寶圓

(六十二)木香流氣飲 (六十三)經驗調氣方

治積聚

附積聚論

心積 (六十四)伏梁圓 (六十五)温白圓

脾積 (六十七)痞氣圓 (六十八)木香檳榔圓

(七十)勝紅圓 肺積 (七十一)息賁湯

腎積 (七十二)奔豚湯

(六)聚 (七十三)散聚湯 (七十四)大七氣湯

通治 (七十六)消飲圓 (七十七)薑合圓

七十九枳殼散 (八十)香稜圓

八十二積氣圓 (八十三)感應圓

八 卷十五 治宿食

附宿食論

肝積 (六十六)肥氣圓 (六十九)五香繭痛圓

脅痛 (七十五)磨積圓

(七十八)破砂圓

(八十一)感應圓

(一)丁香脾積圓 (二)感應圓 (三)紅圓子

(四)五百圓 (五)黑圓子 (六)如意圓

(七)阿魏圓 (八)神効感應圓 (九)丁香爛飯圓

(十)消痞圓 (十一)木香枳术圓 (十二)三稜煎圓

(十三)楠木湯

治自汗

附自汗論

傷風 (十四)桂枝湯 風濕 (十五)术附湯 (十六)防己黄耆湯

貼虛 (十七)牡砺散 (十八)黄耆建中湯 (十九)黄耆湯

(二十)撫芎湯 盜汗 (二十一)麥煎散 (二十二)防風散

(二十三)白术散 (二十四)茯苓湯 (二十五)大建中湯

虛脫 (二十六)耆附湯 (二十七)正元散 (二十八)三建湯

通治 (二十九)温粉 (三十)紅粉

治虛煩 附虛煩論
病後 三十一 竹葉石膏湯 三十二 温膽湯 三十三 人參竹葉湯
三十四 橘皮湯 三十五 地仙散 心氣虛 三十六 小草湯
三十七 辰砂妙香散 胃熱 三十八 人參竹茹湯

治健忘 附健忘論
三十九 寧志膏 四十 定志圓 四十一 壽星圓
四十二 歸脾湯 四十三 朱雀圓

治癲癎 附癲癎論
癲狂 四十四 牛黃清心圓 四十五 歸神圓 四十六 金露圓
四十七 抱膽圓 四十八 礬金散 風癎 四十九 碧霞丹

治陰癲 附陰癲論
五十七 茱萸内消圓 五十八 麝香大戟圓 五十九 橘核圓
心恙 五十四 一醉散 五十五 慈珠圓 五十六 引神歸舍丹
五十 六珠丹 五十一 五癎丸 五十二 虎睛圓 五十三 控涎丹
六十 牡丹散 六十一 竹皮湯 六十二 三茱圓

治痼冷 附痼冷論
六十三 薑附湯 六十四 沉香鼈澄茄散 六十五 三建湯
六十六 洞陽丹 六十七 椒附圓 六十八 附子茴香散
六十九 紫沉煎圓 七十 雄朱丹

治積熱 附積熱論

心熱 (七十一)洗心散　(七十二)八正散　(七十三)碧雪
肝熱 (七十四)消毒犀角飲　胃熱 (七十五)龍腦雞蘇丸　(七十六)甘露飲
肺熱 (七十七)潤肺湯　腎熱 (七十八)滋腎圓　風熱 (七十九)荊黃湯
通治 (八十)凉膈散　(八十一)清氣散　(八十二)神芎圓
(八十三)三黃圓　(八十四)龍腦飲　(八十五)薄荷煎
(八十六)酒蒸黃連圓　(八十七)玄明粉　(八十八)三黃湯
(八十九)天竺散

卷十六

治失血

附吐血咳血衄血論

吐血 (一)茯苓補心湯　(二)枇杷葉散　(三)赤芍藥湯
(四)固榮散　(五)歸脾湯　(六)三黃圓
(七)大薊散　(八)加味理中圓　(九)蓮心飲

咳血 (十)薏苡仁散　(十一)選奇黃耆散　(十二)雞蘇散
(十三)是齋白术散　衄血 (十四)四物湯　(十五)鹿茸香散
(十六)茜梅圓　(十七)龍骨散　(十八)鵬砂散
(十九)茜根散　(二十)黃芩芍藥湯　(二十一)生地黃湯
(二十二)單方　(二十三)川芎三黃散　(二十四)衄血方十道
(二十五)蘇子降氣湯　通治 (二十六)又方　(二十七)四生圓
(二十六)大阿膠圓　(二十九)龍腦雞蘇圓　(三十)必勝散
(三十一)白及散　(三十二)藕汁飲　(三十三)犀角地黃湯
(三十四)門冬飲子　(三十五)天門冬湯　(三十六)天門冬圓
(三十七)黃芩芍藥湯　(三十八)黑神散

風 (三十九)敗毒散　(四十)槐花散　(四十一)黑玉冊

附下血論

(四十二)地骨皮散 (四十三)槐角圓
(四十五)黃連散 (四十六)黃連貫衆散
(四十八)香梅圓 熱 (四十九)阿膠湯 暑 (五十)黃連香薷散
濕 (五十一)不換金正氣散 (五十二)胃風湯 (五十三)槐角散
(五十四)當歸和血散 (五十五)升陽去熱和血散
熱 (五十六)三黃圓 (五十七)聚金圓 冷 (五十八)斷紅圓
通治 (五十九)伏龍肝湯 (六十)蒜連圓 (六十一)烏梅圓
(六十二)結陰丹 (六十三)柿乾散 (六十四)香連圓

治痔漏

附痔漏論

冷 (六十五)釣腸圓 (六十六)黑圓子 熱 槐角圓
(六十七)寬腸圓 (六十八)香殼圓 (六十九)黃耆菊花圓
(七十)黃連阿膠圓 (七十一)乳香圓 氣痔 (七十二)橘皮湯
血痔 (七十三)白玉丹 通治 (七十四)乾葛湯 通治 (七十五)立效圓
(七十六)蝟皮圓 (七十七)搔籐子圓
熏洗法 (七十九)熏洗方 (八十)木鼈散 熬法 (八十一)熬痔方
(八十二)又方 (八十三)槐白皮膏 (八十四)清黃散
(八十五)蝸牛膏 (八十六)五灰膏

治脫肛

附脫肛論

通治 (八十七)釣腸圓 (八十八)聖散子 (八十九)蝟皮散
(九十)脫肛方 浸洗 (九十一)浸洗方 (九十二)文蛤散
(九十三)又方 (九十四)香荊散

治遺尿失禁

附尿論

通治 (九十五)二氣丹 (九十六)秘元丹 (九十七)家韭子圓

九十八茯苓圓 九十九雞內金散
百一小便遺失方 百二桑螵蛸散
百四便宜方 百三又方

五臟內外所因

附五臟論

肝因 一枳殼煮散 二柴胡散
四治肝積 五枳實散
膽因 七瀉膽湯 八酸棗仁圓
心因 十瀉心湯 十一治心脾熱
十三清心圓 十四茯苓補心湯
十六桂花散 十七陳茶黃圓
肺因 二十導痰散 二十一外麻湯

二真珠圓
六桂枝散
九茯神湯
十二玄參升麻湯
脾因 十五良薑拈痛散
十八九治脾疼二方
二十二桔梗湯

百二兎絲子圓
百三又方

二十三排膿散 二十四柏子仁湯
腎因 二十六玄參湯 二十七椒附圓

治眼目

附眼論

肝風熱 二十八明眼流氣飲 二十九車前散
三十決明子散 三十一羌芥散
三十四撥雲散 三十五蟬花散
三十七洗肝散 三十八密蒙花散
四十羊肝圓 四十一明眼地黃圓
肝氣虛 四十三養肝圓 心經熱 四十四七寶洗心散
肺家熱 四十六桑白皮散 腎虛 四十七補腎圓
四十九腎冷眼昏方 肝腎虛 五十加減駐景圓
五十二五味子圓 五十三菊睛圓
暴赤 五十四洗方

五十五 暴赤眼 三方　翳膜 五十六 白龍散
風眩 五十八 銅綠膏　五十九 洗方
六十一 又方　六十二 黃連散　點法 六十三 黃連膏
六十四 碧霞丹　明眼 六十五 神麯圓

治耳 附耳論

虛證 六十六 補腎圓　六十七 蠟彈圓
六十九 發參圓　熱證 七十 犀角飲子　七十一 解倉飲子
氣證 七十二 塞耳丹　七十三 秘傳降氣湯　七十四 通耳法
卒聾 七十五 菖蒲圓　久聾 七十六 鼠膽方　七十八 芷芎散
虛鳴 七十八 黃耆圓　聰耳 七十九 紅綿散　八十 耳熱出汁方
八十一 耳出血方　八十二 耳出膿方
百虫入耳方 三道 八十三

治鼻 附鼻論

鼻塞 一 嗆化鼻證茄圓　二 人參湯　三 菖蒲散
四 辛夷骨　五 辛夷散　六 磨耳散
腦冷 七 腦冷流涕方　八 千金細辛膏　腦漏 九 川烏散
酒渣 十 赤瘤方　十一 凌霄花散　十二 又方
十三 硫黃散　十四 梔子仁圓　十五 又方
齆鼻息肉鼻痔方　十六 細辛散　十七 黃白散
十八 羊肺散

治口舌 附口舌論

心脾熱 十九 升麻散　二十 口舌瘡 四方　二十一 瀉黃飲子

脾肺虛 二十二 菊花圓
二十五 綠雲膏
二十八 赴筵散
三十一 吹喉散
三十四 又方
引熱歸下 三十七 傳法
四十一 薄荷蜜
四十三 舌出血方
涼痛 四十六 透關散
四十九 雄黃定痛膏
五十二 芐露散
治牙齒 附牙齒論
四十七 丁香散
五十一 牙宣止痛方
風痛 五十三 赴筵散
揩傳 二十六 又口瘡方
二十七 腦熱口瘡
二十九 氷蘗圓
三十二 消毒散
三十六 口臭方
口瘡 三十八 又傳方
四十二 必勝散
四十五 又方
舌病 三九 黑散子
四十四 治重舌
龍石散 二十四 兼金散
三十 柳花散
三十三 又口瘡
三十五 丁香圓
舌病 四十二 文蛤散
四十五 又方
牙痛 四十八 單辭散
熱痛 五十一 善草散
風痛 五十三 赴筵散

五十四 一切牙痛
五十七 消風散
牙痛 六十一 虫牙痛方
牙齒 六十三 香鹽散
宣露 六十六 小劑散
治咽喉 附咽喉論 重舌
五十五 定痛散
五十九 細辛散
六十二 又方
六十四 刷牙藥
六十七 又方
獨活散
雙枝散
取虫法
取落 六十五 取牙方
六十八 地龍散
風熱 六十九 荊黃散
七十一 玉鎖匙
風痰 七十二 如聖散
七十四 甘桔湯
七十五 解毒雄黃圓
急閉 七十六 白礬散
七十七 如聖勝金鋌
七十八 二聖散
七十九 一字散
治咽喉腫痛 八十 治喉閉
八十一 治咽喉痺
八十二 咽喉牙關緊
八十三 走馬咽痺
八十四 咽喉腫閉
碧玉圓

(八十五)麝香朱砂圓 (八十六)烏星膏
實證 (八十八)蜜附子 咽瘡 (八十九)絳雪散 氣證 (八十七)五香散
(九十一)利膈湯 (九十)牛蒡子湯

治髮鬢

澤潤 (九十二)犀皮湯 (九十三)洗髮菊花散 (九十四)玉聖膏
(九十五)巫雲散 染法 (九十六)染髮方

卷十九

治癰疽瘡癤 附論

初發 (一)忍冬酒 (二)東鼈散 (三)五香連翹散
(四)九珍散 (五)黃耆建中湯 宣熱 (六)蒲芦湯
(七)單煮大黃湯 追毒 (八)狗膽圓 (九)追毒丹

(十)神仙截法 (十一)解毒萬病圓 止痛 (十二)乳香圓
(十三)乳香膏 (十四)乳香散 未潰 (十五)消腫毒方
(十六)排膿托裏散 (十七)復元通氣散 (十八)縣蓽散
已潰 (十九)內補宣散 (二十)梔子黃芩湯 (二十一)黃芪六一湯
(二十二)八味圓 通治 (二十三)遠志酒 (二十四)治發背方
(二十五)一醉膏 (二十六)柞木飲子 (二十七)黃蠟圓
洗方 (二十八)猪蹄湯 (二十九)越桃散 (三十)蜀葵膏
傳貼 (三十一)透膿散 乳癰 (三十二)烏龍膏 (三十三)聖效散
(三十四)神異膏 (三十五)瓜蒌散 (三十六)豆豉膏
心癰 (三十七)治心癰方 (三十八)何首烏散 腎癰 (三十九)治腎癰方
肺癰 (四十)治肺癰方 (四十一)竜葉湯 腸癰 (四十二)瓜子湯
(四十三)牡丹散 便毒 (四十四)治便毒方 偏墜 (四十五)治疝氣
丁瘡 (四十六)治魚臍 (四十七)治丁瘡三方 瘤 (四十八)繫瘤法

四十九 南星膏　癮 五十 破結散

宣毒 五十一 治瘰癧　五十二 三聖圓　五十三 已驗方
通治 五十四 乳香膏　五十五 黃礬圓　五十六 白花蛇散
五十六 四聖散　五十七 連翹圓　五十八 牛蒡子圓
傳貼 五十九 蝸牛散　六十 螺灰散　六十一 傳癧方
六十二 傳癧散　六十三 又傳方　六十四 雞內金
六十五 斂瘡口　六十六 灸法二道

瘡疹 六十七 苦參圓　六十八 加味羌活飲　六十九 升麻和氣飲
七十 平血散　七十一 酒炙黃連圓　七十二 當歸飲子

附瘰癧論

治瘡疥

附瘡疥論

七十三 何首烏散　七十四 赤小豆湯　傳方 七十五 合掌散
七十六 葵花散　七十七 掃散　七十八 殺疥藥
七十九 貞平胃散　八十 神異膏　八十一 如聖散
八十二 積年疥癩　八十三 玉粉散　八十四 竹茹膏
八十五 桃花散　頭瘡 八十六 治風屑痒　八十七 口瘡方
陳瘡 八十八 隔壁膏　八十九 又方　九十 外膁脚瘡
陰瘡 九十一 外腎瘡　九十二 烏荊圓　九十三 神授圓
九十四 外腎疳瘡　九十五 陰蝕瘡　九十六 陰囊瘡
九十七 陰頭瘡　九十八 妬精瘡　九十九 蝕物腫爛方
一百 腎藏風　癬 一百一 胡粉散　惡瘡 一百二 烏頭圓
一百三 如意散　一百四 一切惡瘡　一百五 惡瘡方
一百六 又方　一百七 淨肌散　一百八 苦練膏
一百九 苦參湯　皸裂 一百十 治手足裂　一百十一 又方

百十二 治斷跟鞋 百十三 又方
貼指縫爛 湯火瘡 百廿 治湯火傷
百十六 秘方 百十七 黃散 百十八 湯火傷瘡
百十九 龍鱗散

膏藥

百二十 玄武膏 百二十一 善應膏 百二十二 神聖膏

卷二十

急救

自縊 一 救縊法二 落水 一 救溺法六 凍死 三 救凍法二
救鬼死 四 救鬼法三 五 半夏散 六 雄朱散
七 朱犀散 救鬼五方 縱慾 八 一方

治折傷 附論

十二 花蕊石散 十三 沒藥降聖丹 十四 接骨散
十五 補損當歸散 十六 淋漓頑荊散 十七 沒藥乳香散
十八 加味芎藭湯 十九 雞鳴散 二十 紫金散
二十一 黃香酒 二十二 木香調氣散 二十三 打撲折手足
二十四 折骨損斷方 二十五 打撲傷損方 二十六 趙馬散
二十七 應痛圓 二十八 內托黃耆圓 二十九 接骨方
三十 筋骨痛斷方 三十一 奪命散 三十二 打撲折骨方
三十四 秘方二 三十五 沒藥散 三十六 接骨散

治蟲毒 附蟲毒論

三十七 治蠱毒方 三十八 治中蠱下血 三十九 治五種蠱毒
四十 丹砂圓 四十一 雄麝散 四十二 泉僧方
四十三 丹砂圓 四十四 國老飲 四十五 蒸苋湯
四十六 蚕退散 四十七 藍靑水

鮮諸毒

鮮諸毒 四十八 鮮毒二方 四十九 鼈灰散 五十 鮮毒圓
五十一 靑黛雄黃散 五十二 音方 五十三 萬病鮮毒圓
又方
蛇毒 五十四 升麻湯 鮮桃毒 五十五 方十一道
蜈蚣毒 五十六 二道 菌毒 五十七 方二道 諸藥毒 五十八 方三道
河豚毒 五十九 方一道 六十 方六道 蜈蚣毒 六十一 方二道
蛇傷毒 六十二 方二道 六十三 方三道 蜂蠆蟲 六十四 方一道
斑猫毒 六十五 方一道 馬咬 六十六 方一道
蜈蚣 六十七 方一道 蜘蛛毒 六十八 方一道 犬咬 六十九 方一道
蜂咬 六十八 方一道 蜈蚣 七十 方一道 蜘蛛咬 七十一 方二道
蜘蛛咬 七十二 方二道 蜈蚣毒 七十三 方二道 蛇毒 七十四 方三道
蜈蚣毒 七十五 方八道 蜘蛛咬 七十六 方一道 豆腐毒 七十七 方一道
野葛毒 七十八 方一道 誤食桐油 七十九 方一道

湯藥

煮香湯 橙子湯 橄欖湯
桂香湯 洞庭湯 楊梅煎
金櫻煎 木瓜煎 梅花湯

婦人調經衆疾

附論

月水調 一 大温經湯 二 四物湯
四 内補當歸圓 五 熟乾地黄圓 六 南嶽濟陰丹
七 活血散 八 紫石英圓 九 小温經湯
十 皺血圓 十一 椒紅圓 十二 當歸散
十三 逍遥散 十四 再餘粮圓 十五 神仙聚寶圓
十六 醋煮香附圓 月水不行 十七 六合湯 十八 由薇圓
十九 温經湯 二十 滋血湯 二十一 凌花散
二十二 加減四物湯 二十三 牡丹散 二十四 紅花當歸散
二十五 通經圓 二十六 琥珀散 月水不斷 二十七 膠艾湯
二十八 鹿茸圓 二十九 十灰散 三十 茯苓神心湯
崩漏 三十一 鎮宮圓 三十二 十灰圓 三十三 栢子仁湯
三十四 艾煎圓 三十五 黄芩湯 三十六 荆芥散
三十七 獨聖散 三十八 金華散

四十一 補宮圓 帶下 四十二 白堊圓 四十三 白斂圓
四十三 當歸煎 四十四 卷栢圓 血崩 四十五 大調經散
四十六 異功散 四十七 伏龍肝散 四十八 當歸建中湯
四十九 靈寶散 五十 六神湯 五十一 吳茱萸湯
五十二 加減吳茱萸湯 五十三 二神圓 五十四 人參養血圓
五十五 抑氣散 五十六 玄胡索湯 五十七 内灸散
血風 五十八 虎骨散 五十九 油煎散 六十 人參荆芥散
癥瘕 六十一 千金桃仁煎 六十二 琥珀圓 六十三 磨積圓
六十四 三稜煎 六十五 小三稜煎 六十六 大腹皮飲
通治 六十七 烏雞煎 雜病 六十八 桂香散 六十九 人參白木散
七十 婦人諸淋方 七十一 内金鹿茸圓 七十二 麝香杏仁散
七十三 白礬散 七十四 陰痒洗方 七十五 取虫方

妊育 附論

求嗣 (一)秦桂圓 (二)續嗣降生丹 (三)陽起石圓 (四)訖訖圓 (五)紫石英圓 轉女成男法 四道 六

胎前 附論

惡阻 (七)半夏茯苓湯 (八)茯苓圓 (九)安胎飲 (十)竹茹湯 (十一)小地黃圓 (十二)參橘散 (十三)人參半夏圓 (十四)旋覆半夏湯 胎脹 (十五)鯉魚湯 (十六)全生白朮散 (十七)歸涼接命散 (十八)大聖散 (十九)平安散 (二十)勝金散 (二十一)安胎和氣散 (二十二)地黃當歸湯 (二十三)火龍散 感冒 (二十四)芎蘇散 (二十五)百合散 傷寒 (二十六)白朮散 (二十七)升麻散

(二十八)芍藥散 (二十九)六合湯五文 瘧證 (三十)驅邪散

風熱 (三十一)消風散 (三十二)天門冬飲 胎漏 (三十三)榆白皮散 (三十四)如聖湯 (三十五)桑寄生散 (三十六)枳殼湯

淋秘 (三十七)全生茯苓散 (三十八)安榮散 (三十九)桑螵蛸散 (四十)白薇散 (四十一)大腹皮散 (四十二)冬葵子散 (四十三)八味圓

痢證 (四十四)蒙姜黃連丸 (四十五)當歸芍藥湯

子煩 (四十六)麥門冬湯 (四十七)竹瀝湯

子懸 (四十八)知母飲 (四十九)紫蘇飲

子腫 (五十)羚羊角散

安護 (五十一)川芎散 (五十二)白朮散 (五十三)佛手散 (五十四)膠艾湯 (五十五)安胎散 (五十六)立效散 (五十七)芎歸補中湯 (五十八)救生散 (五十九)杜仲圓 (六十)枳實挾榔圓 (六十一)黃芩湯 (六十二)白朮散

滑胎 (六十三)瘦胎枳殼散 (六十四)無憂散

難產 (六十五)勝金散 (六十六)獨聖散

(六十七)金液圓
(七十)益母圓
(七十三)香桂散

產後

附論

(六十八)催生鉛丹
(七十一)催生丹
(七十四)來甦散
(六十九)霹靂奪命丹
(七十二)神應黑散
脫衣不止 (七十五)黑神散
(七十六)花蘂石散
(七十七)奪命丹
血暈 (七十八)芎歸湯
(七十九)卷荷散
(八十)黑龍丹
(八十一)神仙索金散
(八十二)清冤散
新產 (八十三)順理中圓
惡露 (八十四)增損物湯
(八十五)當歸養血圓
(八十六)地黃散
惡露不止方 (八十七)
(八十八)固經圓
通治 (八十九)四物湯
血虛 (九十)人參當歸散
(九十一)當歸黃耆湯
(九十二)濟危上丹
(九十三)熟地黃湯
血氣 (九十四)抵聖湯
(九十五)大岩蜜湯
(九十六)調中湯
(九十七)趁痛散
(九十八)調經散

(九十九)見現圓
(一百)尖笑散
(一百一)血塊痛方
(一百一)四神散
產勞 (一百二)當歸羊肉湯
虛弦 (一百三)麻仁圓
(一百四)橘杏圓
下乳 (一百五)漏芦散
(一百六)豬腰子粥
感冒 (一百七)旋覆湯
血迷 (一百八)八珍散
(一百九)豬蹄湯
中風 (一百十)交加散

卷二十三

小兒方

附論

臍風撮口 (一)定命散
臍瘡不乾 湯氏治撮口
聖惠方撮口
張氏治撮口
口瘡 (二)瀉心湯
(三)珠礬散
秘方鵝口瘡三道
(四)洗心散
重舌 (五)方三道
夜啼 (六)秘方二道
(七)燈花散
(八)龍齒散
(九)乳頭散
客忤 (十)真珠散

(十一)黃土散　胎熟(十二)釀乳方　(十三)生地黃湯
胎寒(十四)當歸散　內吊(十五)釣藤膏　驚厥(十六)魏香散
(十七)盤腸氣痛方　(十八)茴香散　(十九)木香散
急驚(二十)大青膏　(二十一)瀉青圓　(二十二)金箔鎮心圓
(二十三)睡驚圓　(二十四)天麻防風圓　(二十五)寧眠散
(二十六)金星圓　(二十七)天麻圓　(二十八)紅綿散
(二十九)抱龍圓　慢驚(三十)醒脾湯　(三十一)蝎烏湯
(三十二)术附湯　(三十三)八仙散　(三十四)釀乳法
通治(三十五)生珠膏　(三十六)浴躰法　(三十七)封顖法
(三十八)奪命散　(三十九)全蝎散　(四十)朱砂圓
(四十一)大天南星圓　(四十二)安神丹　治急慢驚風
變証(四十三)惺惺散　(四十四)神仙黑散　中惡(四十五)蘇合香圓
(四十六)辟邪膏　風癇(四十七)珍珠圓　(四十八)斷癇丹

(四十九)細辛大黃湯　(五十)大聖一粒金丹　(五十一)竹瀝膏
(五十二)至寶丹　(五十三)得効方　(五十四)分肢散
(五十五)治胎癇　天吊(五十六)九龍控涎散　(五十七)釣藤飲
傷風(五十八)麻黃散　(五十九)金沸草散　(六十)潤肺散
(六十一)薄荷散　感寒(六十二)人參羌活散　(六十三)小柴胡湯
(六十四)麥湯散　(六十五)七寶散　(六十六)加減建中湯
(六十七)解肌湯　(六十八)田方道赤散　(六十九)三拗湯
伏暑　香薷散　(七十)五苓散　冒濕(七十一)不換金散
諸熱(七十二)地骨皮散　(七十三)柴苓散　(七十四)人參前胡湯
(七十五)二黃犀角散　(七十六)益黃散　(七十七)人參黃芪散
嗽喘(七十八)華盖散　(七十九)人參清肺湯　(八十)參蘇飲
(八十一)澤瀉散　(八十二)人參散　(八十三)瀉肺散
(八十四)補肺散　(八十五)百部圓　諸濕(八十六)清脾湯

(八十七)養胃湯 (八十八)常山飲
(九十)露星飲 (九十一)通神餅 (九十二)草果飲
卷二十四 小兒方下
嘔吐 (一)藿香散 (二)助胃 (三)朱沉煎
吐瀉 (四)人參散 (五)觀音散 (六)香朴飲子 (八十九)鬼哭飲
臟寒 (七)豆附圓 (八)益黃散 (九)四柱散
(十)訶子湯 (十一)六神圓 痢 (十二)治休息痢
(十三)水煮木香圓 (十四)胃風湯 (十五)真人養臟湯
(十六)紫霜圓 (十七)香連圓 (十九)木香散二方
(二十)厚朴散 (二十一)木香圓 脫肛 (二十二)赤石脂散
(二十三)治痢後脫肛 (二十四)治腸虛脫肛 脾胃 (二十五)參苓白朮散
(二十六)四君子湯 (二十七)溫脾散 (二十八)丁香散
(二十九)和中散 (三十)調中散 (三十一)醒脾散
(三十二)加減觀音散 (三十三)白朮散 (三十四)平胃散
(三十五)瑞蓮散 (三十六)銀白散 (三十七)快膈消食圓
(三十八)瀉黃散 積聚 (三十九)挨積圓 (四十)磨積圓
(四十一)進食圓 (四十二)紫霜圓 (四十三)塌氣圓
(四十四)三稜散 (四十五)十全丹 (四十六)七聖圓
浮腫 (四十七)退腫塌氣散 (四十八)海蛤散 (四十九)取水方
(五十)內消圓 腫滿 (五十一)茸遂散 (五十二)橘皮飲子
秘結 (五十三)木香散 (五十四)梔子仁散 (五十五)冬葵子散
(五十六)勻氣散 (五十七)八正散
未出 (五十八)三豆飲子 (五十九)升麻葛根湯 (六十)惺惺散
已出 (六十一)異功散 (六十二)木香散 (六十三)豆蔻圓
倒靨 (六十四)四聖散 黑陷 (六十五)無價散 (六十六)黍粘子湯
癍毒 (六十七)消毒救苦散 (六十八)五福化毒丹 (六十九)消毒飲

已驚 (七十) 白朮散
痘眼 (七十三) 瘡入眼方
(七十六) 雄黃散
(七十九) 鱉甲散
(八十二) 肥兒圓
(八十五) 蘆薈圓
(八十八) 月蝕疳瘡
(九十一) 大蘆薈圓
諸軟 (九十四) 貼項方
(九十七) 小茸圓
(一百) 四順清涼飲
(百三) 生料四物湯
(百六) 丹毒入腹方
(七十一) 人參麥門冬散
(七十四) 又二方
(七十七) 麥煎散
水瘟 (八十) 猪肚圓
(八十三) 清肺飲子
(八十六) 史君子圓
(八十九) 木香圓
(九十二) 橘連圓
(九十五) 地黃圓
(九十八) 羚羊角散
(百一) 牛黃散
丹毒 (百四) 防已散
(百七) 化虫圓
疳痢 (七十二) 穀精草散
(七十五) 綿蚕散
諸疳 (七十八) 蘆薈圓
(八十一) 大胡黃連圓
(八十四) 胡黃連圓
(八十七) 地棗散
(九十) 使君子圓
(九十三) 龍粉圓
喉痺 (九十六) 羚羊角圓
(九十九) 甘桔湯
(百二) 白玉散
(百五) 漏蘆散
(百八) 靈犀散
(百九) 安虫散
(百十二) 化虫圓
(百十五) 外腎腫方
(百十八) 治濕癬方
(百廿一) 生附散
(百廿四) 黃連散
(百十) 川練圓
(百十三) 金露圓
疝氣 (百十六) 白散
雜方 (百十九) 鼻衄方
(百廿二) 香蒂煎
(百廿五) 芎黃散
(百廿) 白斂散

名方類證醫書大全目録畢

成化二十三年丁亥
熊氏種德堂刊

新編名方類證醫書大全卷之一

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

風

風爲百病之長故諸方首論之岐伯所謂大法有四一曰偏枯半身不遂二曰風痱於身無痛四肢不收三曰風懿者奄忽不知人也四曰風痺者諸痺類風狀此特言其大槩而又有卒然而中者皆由氣体虛弱榮衛失調或喜怒憂思驚恐勞役以致眞氣耗散腠理不密邪氣乘虛而入及其中也重則半身不遂口眼喎斜肌肉疼痛痰涎壅盛或癱瘓不仁舌強不語精神恍惚驚惕恐怖治療之法當詳其脉證推其所感之原若中於肝者人迎與左關上脉浮而弦面目多青惡風自汗左脇偏痛中

於心者人迎與左寸口脉洪而浮面赤翕又發熱瘖不能言中於脾者人迎與右関上脉浮微而遲四肢怠隨皮肉瞤動身躰通黃中於肺者人迎與右寸口脉浮濇而短面浮色白口燥多喘中於腎者人迎與左尺脉浮而滑面耳黑色腰脊痛引小腹隱曲不利中於胃者兩関脉並浮而大額上多汗膈塞不通食寒則泄凡此風證或挾寒則脉帶浮遲挾濕則脉帶浮濇二證俱有則从偏勝者治之用藥更宜詳審若因七情六淫而得者當先調氣而後治風邪此嚴氏至當之論倉卒之際救此急證宜先以皂角細辛搐入鼻内通其関竅次以蘇合香圓擦牙連進以生薑自然汁并三生飲俟其甦醒然後次第進以順氣之類排風續命之類所中在經絡脉微細者生入于臟腑口開手散眼合遺尿髮直吐沫搖頭直視聲如鼾睡者難治又有中之輕者在皮膚之間言語微蹇眉角牽引遍身瘡癬狀如虫

行目旋耳鳴又當隨證治之

〔通治〕烏藥順氣散 治男子婦人一切風気攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻凡卒中手足癱瘓言語蹇澁者先宜多服此藥以疎気道然後隨證投以風藥

烏藥去根 麻黃去根節 白姜蚕去絲嘴炒 川芎各一兩
陳皮去白 枳殼去瓤麩炒 甘草炒 桔梗各一兩 烏藥去木二兩

右為末每服三分水一盞姜三片棗一个煎七分温服如盛寒壯熱頭痛肢体倦怠加葱白三寸同煎併服出汗或閃挫身体不能屈伸温酒調服遍身瘙痒抓之成瘡用薄荷葉煎服常服能疎風順氣

〔一〕人參順気散 治感風頭疼鼻塞声重及一應中風者先宜服此藥疏通気道然後進以風藥

乾姜　人參各一兩川芎去芦　甘草炙
苦梗去芦　厚朴去皮薑製　白朮去芦　陳皮去白
白芷　麻黃去節各四分　乾葛三分半

右㕮咀每服三分水一盞姜三片棗一个薄荷五七葉同煎八分不拘時熱服如感風頭疼咳嗽鼻塞加葱白煎

三　八味順氣散　凡中風之人先服此藥順氣次進治風藥

陳皮去白　天台烏藥　人參各一兩甘草炙半兩
白朮　白茯苓　青皮去白　香白芷各三兩

右為細末每服三分水一盞煎七分溫服不拘時仍以酒化蘇合香圓間服

四　大醒風湯　治中風痰涎壅盛半身不遂歷節風筋脉拘急

天南星生用　防風去蘆　獨活生用　附子生去皮臍
甘草生用各二兩　全蝎微炒一兩

右㕮咀每服四分水一盞姜十片煎八分溫服

五　小續命湯　治中風半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澁

防已　肉桂去粗皮　黃芩　杏仁去皮尖炒黃
芎藭　甘草　芎窮　麻黃去根節
人參去芦各一兩　防風酢炙芦一兩　附子炮去皮臍半兩

右㕮咀每服三分水一盞姜五片棗一个煎七分食前熱服

六　神效定風散子　治風客陽經邪傷腠理肯督強直言語蹇澁体熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪

川烏　南星　川芎　乾姜
甘草　半夏　天麻　白茯苓等分生用

右為末姜汁園如龍眼大作餅子生朱砂為衣每服一餅細嚼熱生姜湯下不拘時

〔七〕**牛黃清心圓** 治諸風緩縱不隨語言寔澁痰涎壅盛心忙健忘或發癲狂並皆治之

羚羊角末兩人參去芦二兩半 白茯苓去皮一兩二分半
芎藭一兩二分半 防風去苗一兩半 乾姜炮七分半 阿膠炒一兩七分半
白朮一兩半 牛黃研一兩半 麝香研一兩 雄黃研飛八分
龍腦研一兩 金箔一千二百箔為衣 白芍藥半兩 柴胡去苗一兩二分半
甘草剉炒五兩 乾山藥七兩 麥門冬去心一兩半 桔梗一兩二分半
黃芩一兩半 杏仁去皮尖雙仁麩炒黃一兩二分半另研 大棗一百个蒸熟去皮核研成膏
神麴研二兩半 大豆黃卷一兩二分半炒 白斂七分半 浦黃二兩半炒
當歸去苗一兩半 肉桂去皮一兩七分半 右除棗杏仁金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味別為細末入餘藥和勻煉蜜棗膏為圓每兩作十圓以金箔為衣每服一圓食後溫水化下

〔八〕**排風湯** 治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂以至手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮一兩 當歸去芦二兩 杏仁去皮尖麩炒二兩 麻黃三兩 芎藭二兩 獨活去芦 右㕮咀每服三分水一盞姜四片同煎溫服不拘時

〔九〕**側子散** 治中風手足不隨言語寔澁今用之累驗

側子一兩炮 附子一兩炮 白茯苓去皮一兩 防己七分半 甘菊花去梗二兩 北細辛去苗二兩 當歸去芦浸一兩 川芎一兩 右㕮咀每服五分水盞半姜三片棗一个煎不拘時

肉桂去粗皮芍藥 甘草 防風去芦各二兩 茯苓去皮各三兩 白朮二兩 赤芍藥一兩 桑白皮去芦土炒 白茯神去皮木二兩 麻黃 粉草五分炙

十 搜風大九宣飲治挾氣中風痰雖微去當先服此順氣併開其關竅不致枯廢然後進以風藥

天雄大附子炮 防風去芦 南星炮 薄荷葉 地龍去土 木香不見火 全蝎去毒各 右㕮咀每服兩半姜五片水一盞煎熟入麝香啜服不拘時

十一 白氣散 此方前代曾服有效風藥服之十三日安大可治腰腿疫半身不遂手足不能屈伸口眼喎斜風與氣中風中氣便用風藥治之十無一愈當以氣藥治之氣順則風散服之見効

白朮四分 烟沉香五分 鎊天麻一兩 天台烏藥二分 青皮去瓤五分 甘草各五分 人參去芦 右為㕮咀每服三分水一盞半生姜三片紫蘇五葉木瓜三片棗子一枚煎至七分去滓空心温服

十二 皂角不一园 疏風活血肌肉不緊実者最宜服之

川烏 草烏各一兩 天台烏藥二兩 烏豆一升 何首烏二兩 猪牙皂角五條去皮炙 右剉如拍面大用无灰酒醋各二升浸一宿慢火煎乾取出晒焦揀何首烏一味別為末煮膏以六味焙乾碾末以前煮藥余酒醋及何首烏膏和圓每服三十园酒下

十三 烏附丸 去風疏氣

川烏二十个 香附子半斤姜汁淹一宿炒 右焙乾為末酒糊為丸每服十數丸温酒下肌体肥壯及有風疾者宜常服

十四 楊氏荆芥丸 治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風發熱頭疼鼻塞声重並皆治之

荆芥穗十二天麻去苗 附子炮 白附子炮

烏藥　當歸洗　川芎各一兩

右爲細末煉蜜爲圓每一兩作十圓朱砂爲衣每服一圓食後細嚼茶清任下

十五 烏荊圓 治諸風緩縱言語蹇澁遍身頑痲皮膚瘙痒又治婦人血風頭疼眼暈如腸風臟毒下血不止服之尤効

川烏 炮去皮臍一兩　荊芥穗二兩

右爲末醋煮麪糊爲圓如梧桐子每服二十圓溫酒熟水下

十六 真方白丸子 治風可常服求無風疾慮進之患

大半夏 湯泡七次 白附子 洗淨炮 天南星 洗淨炮 川烏頭 去皮臍炮 各一兩 天麻 全蝎 去毒炒 木香

右爲細末生姜自然汁打糊爲丸如梧桐子大每服一二十九食後臨臥茶清熟水送下癱瘓風溫酒送下日進三服小兒驚風薄荷煎湯送下二九

十七 大辰砂丸 清頭目化痰涎及感冒風寒鼻塞声重頭目昏眩項背拘急皮膚瘙痒並皆治之

天麻 去苗一兩　細辛 去苗葉土半兩　川芎一兩　防風 去芦二兩　甘草 炙一兩　吳白芷一兩　朱砂一兩爲衣

右以七味爲細末煉蜜丸如彈子朱砂爲衣每服一丸細嚼食後生姜湯下茶清亦可

十八 千金保命丹 治諸風痰涎不能語言心忪健忘恍惚去來頭目暈眩肩中煩聳痰涎壅塞抑氣攻心精神昏憒又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲愛慘慼虛煩少睡喜怒不時或發狂顛神情昏亂及小兒驚癇風抽搐不定及大人暗風并羊顛猪顛發叫如雷此藥大能治之

朱砂一兩真珠三分南星一兩麻黃去根白附子炮雄黃　龍腦各半　琥珀三分　姜蚕炒　犀角　門冬去心

枳殼　地骨皮　神曲
人參　柴胡各一錢　金箔一片　伯
牛黃三分　天麻半兩
膽蔞五分　腦子少許　射香少許　牙硝四分　竜車　天竹黃
防風　甘草　桔梗　茯神　遠志去心
蟬蛻洛半　黃芩二兩　荊芥二兩　右爲細末　煉蜜爲丸如彈子
大每服一丸薄荷湯化下不拘時候忌猪羊蝦核桃動風引
痰之物及諸生血更加大川烏炮去皮臍半夏生姜汁浸
白並　川芎各一錢　猪牙皂角一挺　右和前藥作末爲丸

（十九）**神柏散**　治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足戰
曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有此証無
藥去處用之得力
柏葉一握去枝　葱白一握同根
右細切如泥用無灰酒一升同煎一二十沸去查溫服無時

（二十）**去風丹**　治癱風瘓風大風一切諸風仍治脚氣并擲撲
傷折及破傷風服過百粒即爲全人尤能出汗
紫背浮萍以七月半旬或望日採擇淨者不以多少先以盆
盛水以竹篩盛萍於水盆上晒乾研爲末煉蜜丸如彈子大
每服一粒豆淋酒空心食前化下

（虛證）**星附湯**　治中風痰壅六脉沉伏昏不知人（二十一）
附子生用去皮　天南星生用名一及　木香半兩不見火
右㕮咀每服四分水一大盞姜九片煎七分去滓溫服虛寒
甚者加天雄川烏各三建湯痰涎壅盛声如牽鋸服藥不下
宜於閑穴刖田一穴多灸之

（二十一）**三生飲**　治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥氣厥
南星生用一及　川烏皮生用去皮半兩　附子生用去皮半兩　木香二分半
右㕮咀每服五分水二盞姜十片煎八分溫服不省人事者

以蘇合香圓擦牙灌以生姜自然汁

(二十三) **二香二建湯** 治中風虛極言語窒澁手足偏廢六脉俱微者不可一向攻風止用此藥扶虛

天雄 附子 川烏 各一枚生用 木香半枚不見火 沉香 旋磨入

右㕮咀每服四�therefore永盞半姜十片煎七分温服

(二十四) **附子湯** 治中風挾寒手足不仁口眼喎斜牙關緊急

附子 炮去皮臍 乾姜 炮 桂心 人參

細辛去苗 防風去叉各半兩

右㕮咀每服四�therefore水盞半姜五片棗一个煎七分食前服

(二十五) **星附散** 治中風雖能言口不喎斜而手足癱曳者

天南星 半夏二味以生姜汁製黑附子 白附子 白茯苓

川烏 白姜蚕 沒藥 人參各等分

右㕮咀每服三㕘水酒各一盞煎八分熱服并進得汗為愈

(二十六) **雄附醒風湯** 治中風涎潮牙關緊急不省人事

附子 一个炮去皮臍 天雄 一个炮去皮臍 南星 一个生用

右㕮咀每服五㕘水盞半姜七片煎七分不拘時

(二十七) **羌活散** 治中風偏廢

附子 一个炮去皮臍 羌活 烏藥各一兩

右㕮咀每服四㕘水一盞煎七分去滓温服

(二十八) **是齋回陽湯** 治風中氣中手足癱緩口眼喎斜言語窒澁

川烏 炮去皮臍 益智 附子 重一个炮去皮臍 生用 乾姜各一枚 青皮半枚

右㕮咀每服半兩水二盞姜十片棗一个鹽少許空心温服

(二十九) **真珠圓** 治肝虛為風邪所干卧則寃散而不守狀若驚悸

真珠母三分研細同碗 當歸 酸棗仁 柏子仁各一兩 犀角

人參 茯神 沉香 龍齒各半㕘

右為末煉蜜為圓如梧桐子辰砂為衣每服四五十圓金銀薄荷湯食後吞下

(三十)八全回春湯 治一切諸虛不足風疾血氣交攻脉絡疑滯拘急攣拳氣不升降癱中疼痛痰涎壅盛脾胃不和飲食不進此藥去風和氣活血大有神効凡治風不可專用風藥攻之愈急則愈甚服此輕者一月重者二三月自然愈矣

附子炮　人參　麻黃去節　黃芩
防己　香附子去毛　杏仁　川芎
當歸　茯神去木　陳皮　防風各一錢
白芍藥五錢　沉香　川烏炮各半半夏及半
肉桂一錢　白朮二錢　烏藥
黃芪三兩　甘草　熟地黃　生乾地黃各一兩

右二十四味八味去風八味和氣八味活血同剉散每三錢水一鍾半姜三片棗一枚煎空心服

(熱証)四白丹 能清肺氣養魄中風多昏冒氣不清和(三十一)

白朮　白茯苓　白芷各二錢　白檀一錢半　人參
縮砂　香附子　甘草　防風　川芎各半兩
知母二錢　羌活　薄荷
麝香一分另研　牛黃半錢另研　藿香一錢半　甜竹葉二錢　龍腦半錢另研

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸臨卧嚼一丸煎煎風湯熱下能上清肺氣下強骨髓

(三十二)川芎石膏湯 治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

川芎　芍藥　當歸　山梔子　甘草各三錢
黃芩　大黃　菊花　荊芥穗　防風
人參　白朮各半錢　滑石四兩　寒水石二兩連翹
薄荷葉各一兩　縮砂仁三錢　石膏　桔梗各二錢

右爲末每服二匁水一盞煎食後服熱甚者冷水調下

三十三 防風通聖散

防風　川芎　當歸　芍藥
大黄　薄荷葉　麻黄　連翹
芒硝 盆硝是以上各半兩　石膏　黄芩　桔梗各一兩
滑石 三兩　甘草二兩　荆芥　白朮　梔子各一分

右爲末每服二匁水一大盞生姜三片煎至六分温服涎嗽加半夏半兩製如服藥不可無生姜同煎

普救知通聖散

防風　芍藥各二匁半　滑石各三兩　甘草
薄荷　黄芩　石膏　桔梗各一兩
川芎　當歸　大黄　麻黄
連翹各半兩　荆芥三匁半　白朮　山梔子各一分

无芒硝　无縮砂

庭瑞通聖散 有縮砂无芒硝其餘皆同緣庭瑞於河間守真先生得師傳之秘從二年始受於方斯可取為端而可准憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中何以疑之因録耳以前藥庭瑞臨時以意加減一依前法嗽加半夏半兩生姜製

三十四 消風散治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻噦声重耳作蝉鳴及皮膚瘙痒瘕瘡婦人血風頭皮腫痒並治之

荆芥穗　甘草 炒各二兩　人參 去芦　茯苓 去皮
藿香葉　蝉蛻去土炒　白僵蠶炒　防風 去芦　芎藭
蛇各二兩　厚朴去粗皮半兩　羌活一兩

右為末每服二匁煎風頭疾鼻流清涕者用荆芥湯茶清調下遍身瘡癬温酒下

三十五 八風散治風氣上攻頭目昏眩肢体拘急皮膚瘙痒瘾

疹成瘡及治寒邪不調鼻塞声重

藿香去土 半斤 白芷 一斤 前胡去芦 一斤 黄耆去芦二斤
甘草炙 二斤 人參去芦 二斤 羌活去芦 三斤 防風去芦 三斤

右為末每服二分水一盞入薄荷少許食後温服茶清亦可

(三十六) 川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞声重

薄荷去根見火 四兩 川芎 四兩 羌活 二兩
細辛去葉 二兩 防風去芦 兩半 甘草 二兩
白芷 二兩 荆芥去根 四兩

右為細末每服二分食後茶清調下常服清頭目

(三十七) 生朱丹 治諸風痰盛頭痛目眩気欝積滞胷膈不利

石膏燒通紅令冷 半斤 白附子炮去皮臍 半斤 龍腦 一字
右為末燒粟米飯為圓如小豆大朱砂為衣每服三十圓食
後茶酒任下

(三十八) 羌活愈風湯 治腎肝虚勞骨弱語言難精神昏憒及治
風湿内弱風热躰重或瘦一肢偏枯或肥而半身不遂心乱則
百病生静則萬病息是以此能安定心養神調陽無偏勝

羌活 甘草炙 防風去芦 黄芪去芦 人參去芦
蔓荆子 川芎 細辛去苗 枳殻麸炒去瓤 地骨皮去骨
麻黄去根 知母去皮 甘菊 薄荷去枝 枸杞
當歸去芦 獨活 白芷 杜仲炒去絲 秦艽去芦
柴胡去苗 半夏湯洗姜製 厚朴姜製 防已 熟地黄 各二兩
芍藥去皮 黄芩 各三兩 石膏四兩 生地黄四兩 白茯苓去皮 三兩
蒼术四兩 桂一兩 前胡二兩

右剉每服一兩水二錢煎至一盞去滓温服如遇天陰加生
姜二片煎空心一服臨卧再煎滓服更有四神加減法詳見神珍方一卷

(三十九) 家藏万應活散 消風化痰治頭目眩暈

細辛去葉 一兩 石膏研 甘草炙 各半兩 防風去芦

蓁本去土　旋覆花　蔓荊子　川芎　獨活各去芦一兩
右爲細末每服二分水一大盞姜三片煎七分食後熱服

四十　家藏方防風散　治頭目不清常服去風明目
防風去芦川芎　香白芷　甘菊花　甘草炙
右各等分爲末每服二分食後荊芥湯調下

四十一　清神散　消風化痰治頭目眩耳鳴鼻塞咽嗌不利
檀香劉十兩　人參去芦十兩　羌活去苗洗焙五兩
薄荷去土二兩　荊芥穗去土二兩　甘草炙二兩　石膏研五兩　防風去芦十兩
右爲細末每服二錢沸湯食後點服或入茶末亦好日進二三服

四十二　上清散　治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者
川芎　礬金　芍藥　乳香　荊芥穗
沒藥各一分　腦子半分　薄荷葉　芒硝各半兩
右爲細末每服用一字鼻內搐

四十三　防風湯　治中風挾暑卒然暈倒口眼喎斜
防風　澤瀉　桂心　杏仁面炒去皮尖
乾姜炮　甘草炙各等分
右�once咀每服四分水盞半煎七分食前服

四十四　星香湯　治中風痰盛服熱藥不得者
南星八分　木香一分
右�once咀每服四分姜十片水一大盞煎七分温服

四十五　防風天麻散　治風麻痺走注肢節疼痛中風偏拘或暴瘖不語內外風熱壅滯解昏眩
天麻　防風　草烏頭　甘草　川芎　羌活
當歸焙　香白芷　荊芥穗　香附子略半滑石二兩
右爲末熱酒化蜜少許調半分加至一分覺藥力運行微麻

為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸或半丸
細嚼白湯亦得散鬱結宣氣道（如甚者更服防風通聖散）

（四十六）天麻散 治頭項痛頭面腫拘急風傷榮衛發燥熱

川芎　苦參　地骨皮　細辛　威靈仙　甘草二兩炙
何首烏　薄荷葉　蔓荊子　菖蒲　天麻一兩
杜若　蔾　蛇蛻草　荊芥穗　牛蒡子　防風半兩　已上各

右為末每服二三分用蜜水調下茶酒任不計時候

（四十七）人參羌活散 治風壅痰实頭目昏暈遍躰拘攣頭項強急肢節煩疫壯熱煩渴

前胡　羌活　人參　防風
天麻　赤茯苓　蔓荊子　薄荷葉
川芎　粉草　黃芩　枳殼
桔梗　川獨活各一兩

右㕮咀散每服四分姜三片桑白皮七寸煎不拘時

（急救）青玄散 治卒暴昏憒不知人事牙關緊硬藥不下咽

黑牽牛末一分　茴香二分半

右用生姜汁調少許灌鼻中立醒一方用牽牛木香尤妙

（又方）治卒暴痰食風涎不省人事（四十八）

右用生麻油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然後隨証用藥

（四十九）雄黃丸 治中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一應熱毒

礬金二分半　巴豆去皮油十四个雄黃研飛二分半

右為末醋煮麪糊為丸如綠豆大每服七丸用熱茶清下吐出頑涎立甦未吐再服如牙關緊閉灌藥不下者即以刀尺鉄器斡開口灌下

五十 家藏方奪命散 治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼目上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風證並皆治之

甜葶藶 香白芷 天南星 半夏湯洗去滑 巴豆去殼不去油五味各等分並生用

右為細末每服半豸用生姜自然汁一呷調下牙關緊急湯劑灌不下者此藥輒能治之小兒以利痰或吐為愈

五十一 救急稀涎散 治中風四肢不收涎潮臟窒氣閉不通

光明砂 磬二兩 猪牙皂角四兩肥實不蛀者去黑皮

右為細末研勻每服一豸至二豸温水調下

一方涎 青州白元子 治男子婦人手足攣癇風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風並皆治之 五十二

白附子二兩生用 半夏白好者水浸洗七兩生用 天南星二兩生用 川烏頭去皮臍半兩生用

右揾羅為末以生絹袋盛於井花水內擺出未出者更以手揉令出以滓更研再入絹袋擺盡為度放甕盆中日曬夜露每日一換新水擬而復澄春五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為圓如彔豆大常服二十圓生姜湯下不拘時如攣癇風以温酒下如小兒驚風薄荷湯下三五圓

五十三 苦丁香散 治風涎暴作氣塞卧倒或有稠涎諸藥化不下者

右用甜瓜帝即苦丁香曰乾為末每用一二錢入輕粉一字以水半合調勻灌之良久涎自出如涎未出嚼沙糖一塊下藥涎即出不損人

五十四 驚氣丸 治心受風邪涎潮昏塞牙關緊閉醒則精神若癡及驚憂積氣並皆治之

乾蝎去針尾毒微炒一分　紫蘇子炒一分　附子去皮臍一枚炮去皮臍各半兩　麻黃去根節
花蛇酒浸炙熟去皮骨各半兩　朱砂研一分半為末　南木香一兩
天麻去苗　天南星浸洗薄切姜汁浸一夕各半兩　橘紅一兩　白僵蚕炒去絲半兩
右為末入腦麝少許同研極勻煉蜜杵圓如龍眼大每服一圓用金銀薄荷湯化下或温酒亦可

五十五　加減青州白元子　治卒中風邪半身不遂口眼喎斜痰涎閉塞及小兒諸風並皆治之

白附子　天南星　半夏　川姜各二兩
天麻　白僵蚕　全蝎各一兩　川烏頭去皮臍半兩破尖
右為末醋糊為圓如梧桐子每服三十圓温酒下不拘時

癱瘓　五十六　四生圓　治中風左癱右瘓口眼喎斜

川烏去皮　五靈脂　當歸
右為末用无灰酒打糊圓如梧桐子每服十圓加至十五圓

温酒下服此藥不可服靈宝丹

五七　和劑方　左經圓　治中風左癱右瘓手足顫掉言語蹇澁

草烏炮四兩　川烏炮二兩　乳香研　没藥各一兩
生烏豆一外以班貓二十一个去頭足同煮豆熟去班貓取豆焙乾入藥
右並生用為細末麪糊為圓如梧桐子每服三五十圓生姜
湯下不拘時如癱風温酒下如小兒驚風薄荷湯下

五十八　大鉄彈圓　治諸癱瘓

川烏炮去皮臍兩半　乳香
生蠍一分　川五灵脂四兩　没藥各一兩
右為末滴水丸彈子大每服一丸薄荷酒磨下

喎斜　五九　華正散　治中風口眼喎斜半身不遂

白附子　白僵蚕　全蝎去毒並生用
右等分為末每服二分熱酒調下不拘時

(六十)稀簽圓 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言寂澁手足緩弱

稀簽草一名火炒草生於沃土間帶猪苓氣者良

右五月五日六月六日收採洗去土摘其葉不拘多少九蒸九曝每蒸用酒蜜水洒之蒸一飯久曝乾為末煉蜜圓如梧桐子每服百圓空心温酒米飲任下

(六一)是齋方二聖散 治中風手足拘攣口眼喎斜脚弱行步不正

當歸洗炒 肉桂去粗皮玄胡索微炒並為末各等分

右每服二錢空心温酒調下

(六十二)省風湯 治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

半夏生用 防風各一兩甘草炙半兩全蝎去毒三个

白附子生用 川烏生用 木香 天南星生各半兩

右�once咀每服半兩水一盞姜十片煎温服

(六十三)天仙膏 治卒中風口眼喎斜

南星大者一个 白及一錢 草烏大者一个 僵蚕七个

右為末用生鱔魚血調成膏傳喎處竟正便洗去

(又方)灸法治口喎斜

耳垂下麥粒大艾炷三壯左灸右右灸左

(不語)獨活散 治風憊不能言四肢不收手足躄曳 (六十四)

白芍藥 括蒌根 獨活

右�once咀每服四錢姜五片水一盞煎八生葛汁一合和服

(六十五)小竹瀝湯 治中風涎潮不語四肢緩縱不收

秦艽去土 防風去芦對附子炮法 獨活各一錢

右水四盞煎二盞入生地黄汁竹瀝各半盞煎分四服

(六十六)資壽解語湯 治心脾中風舌強不語半身不遂

附子炮 防風去芦 天麻

羚羊角屑 官桂洛七半 甘草 羌活各半兩

取竹瀝法

右㕮咀每服四分水一盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再煎數沸温服无時并載取竹瀝法用筆竹數竿截長一尺餘許劈破作片用磚兩口對立置竹在上其下着火磚外兩頭各置盞以盛竹瀝瀝盡以綿濾澄清夏秋須沉冷水中防瀝酸大熱有風疾人亦可單服冷暖隨意勿過度荆柴燒瀝法同

〔六十七〕**正舌散** 治中風舌本強難轉語

蝎梢去毒 一分　茯苓 一双　龍腦薄荷二双焙

右為末每服二錢温酒下或擦牙頰亦可

〔六十八〕**獨行散** 治失音不語

槐花一味炒香熟三更后床上仰卧隨意服亦治咯血

〔六十九〕**麻痺** 治十指疼痛麻木不仁

附子　木香各等分

右㕮咀用姜如常法煎木香隨氣虚实加減足弱去附子用

〔七十〕**加減三五七散** 治八風五痺肢躰不仁大治風突入腦陽虚頭痛畏聞人声目旋運轉耳内蝉鳴應濕痺脚氣緩弱並治

山茱萸去核細辛一分半乾姜炮三分防風去芦四分

附子三十五隻炮去皮臍茯苓去皮三分

右為細末每服二分温酒食前調服

〔七十一〕**五痺湯** 治風寒濕氣客皮肌躰手足緩弱麻頑不仁

片子姜黄一兩洗去灰土羌活　白朮

防己各一兩甘草微炙半兩

右㕮咀每服四分水盞半姜七片煎八分去滓病在上食後服病在下食前服

〔七二〕**家傳乙巡痺湯** 治風濕相搏身体煩疼手足冷痺四肢沉重

防風去芦各二兩半甘草炙半兩羌活

赤芍藥　薑黃
右㕮咀每服三錢水一盞姜五片煎七分温服　當歸酒浸各二兩

七十三　烏頭湯　治風寒冷濕晉痺筋脉拘攣不得轉側
大烏頭　細辛　川椒　甘草
秦艽　附子　官桂　白芍藥各七分
乾姜　白茯苓　防風　當歸各一兩川獨活一兩三錢半
右㕮咀每服三錢水一盞棗二枚煎空心服

七十四　木瓜煎　治肝腎二臟受風筋急項強不可轉側拳痺
宣州木瓜　兩个取蓋去穰沒藥二兩研　乳香一分研
右二味入木瓜内用蓋子合了竹簽定之飯上蒸三四次研爛成膏子每服三五錢用生地黃汁半盞无灰酒二盞拌和緩執稍膏吞下

七十五　神授圓　治諸風痺半身麻木兼治白虎歷節痛甚肉理枯虛生虫遊走痛痒

七十六　解風散　服之治風成寒熱頭目昏眩肢躰疼痛手足皆麻痺上膈壅滯
人參　川芎　獨活　麻黃去節各半兩　甘草
細辛去苗　右爲末每服三錢水一盞半生姜五片薄荷葉少許同煎至八分不計時候

痛痒　七十七　虎骨散　治風毒邪気乘虛攻注經絡之間痛无常処晝靜夜甚筋脉拘攣不得屈伸
蒼耳子微炒五兩　骨碎補二兩　虎脛骨酥炙二兩　沒藥
當歸去苗各二兩　天麻一兩　白附子炮各二兩　檳榔一兩　防風去苗
肉桂去粗皮二兩　敗龜酥炙　白芷　赤芍藥
右爲末每服二錢温酒調下　麒麟竭細研　牛膝去苗一兩
羌活去蘆

右為末入研藥令勻每服一分温酒調下不拘時

(七十八) **七聖散** 治風温流注經絡閉肢節緩縱不隨或脚膝疼痛

續斷　獨活　防風　杜仲
萆薢　牛膝　甘草

右件修事焙乾各等分為細末每服二分温酒調下

(七十九) **追風散** 治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚瘡痒眉角牽引婦人血風及一切頭風並治之

白僵蚕去絲嘴炒二兩　川烏炮四兩　防風去蘆叉四兩　石膏研四兩
全蝎炒二兩　川芎三兩　麝香一兩研　甘草炙二兩　荊芥二兩

右為末每服半錢食後臨卧茶調下

(八十) **四生散** 治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤痒痛羞明多淚下注脚膝生瘡及遍身風癬兩耳内痒服之尤效

黄耆　川羌活　防風　杜仲

右為末每服半錢食後臨卧茶調下

(八十一) **蠲痛圓** 治諸風歷節疼痛腫滿

川烏一枚生用　黑豆七十粒生去皮　全蝎去毒七个　麝香半分研　地龍去土半兩

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓臨卧用冷酒吞下微汗不妨

(八十二) **趙痛圓** 治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭三兩不去皮　熟地黄生者酌量　半夏麴　白僵蚕　烏藥各半兩並日乾

右為末酒糊為圓如梧桐子大晒乾每服五七圓空心温酒下如跌撲傷損姜汁和酒研十數圓塗患傷處如卒中倒仆姜汁茶清研五七圓灌下立醒本事方謂是大智禪師方

(八十三) **貼傳元花散** 治臀腿間忽一兩點痛着骨不可忍
羌花根研爲末米醋調隨大小傳之

(八十四) **枳實酒** 治遍身白珍瘙癢不止蓋風邪客於肌膚相搏
凝滯而成瘡天色冷則重天晴暖則輕用此神効更宜服烏藥
順氣散
枳實麩炒黃切剉散每服二大錢用酒浸少時去枳實但飲
最妙煞後用枳實煎水洗患処佳

偏枯 **虎脛骨酒** 治中風偏枯四肢不隨一切諸風攣拳者並治
石斛去根 石楠葉 防風去芦 虎脛骨酥炙
當歸去芦 茵芎葉 杜仲剉炒 川牛膝去芦 川續斷
苓蒐 金毛狗脊燎去毛 川巴戟去心各一兩
右件剉如豆大以絹袋盛藥用酒一斗漬之十日每服一盞
盪熱服不拘時

(八十五)

(八十六) **全生虎骨散** 治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯忌用麻
黃發汗恐津液枯竭惟當潤筋去風
當歸二兩 赤芍藥 川續斷 白术
藁本 虎骨各一兩 烏蛇肉半兩
右爲末每服二錢温酒食後調下骨中疼痛加生地黃一兩
臟寒自利者加天雄半兩

鶴膝 **大防風湯** 去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛緩弱不
能行發名曰痢風或兩膝腫痛脚脛枯腊名曰鶴膝風 (八十七)
熟地黃洗二兩 白术二兩 羌活去芦 人參去芦一兩
川芎洗 附子炮去皮臍各一兩 防風去芦二兩
牛膝去芦酒浸一兩 川當歸去芦酒浸焙一兩 黃芪去芦炙二兩
白芍藥二兩 甘草一兩 杜仲去粗皮炒令絲斷二兩
右㕮咀每服四錢水盞半姜七片棗一枚煎八分食前温服

〔雞爪〕治雞爪風手口搖動不能拿物 (八十八)
五加皮　海桐皮　川烏炮　牡丹皮
川芎　赤芍藥　絡石乾姜　肉桂各一分
右為末每服三分水一盞將古銅分一个入清油内浸每煎茶入此分同煎不拘時

〔白虎〕獨活寄生湯治白虎歷節甚痛及風寒暑濕之毒 方見腰脇痛門 (八十九)

白虎風走注痛痒方 (九十)
右用三年醯醋五升熱煎三五沸切葱白三升煮一沸漉出布帛熱裹病处熨之
又方荠菜子為末雞子白調傳之

〔大風〕遇仙丹治大風 (九十一)
紫參各一兩苦參
人參　白僵蚕去嘴各二兩

右為末麪糊丸梧桐子大每服三十丸溫塩湯吞下食前日二服

(九十二) 仙方治大風髮毛眉毛白落肌膚瘡如苔蘚勢不可救服此方効
烏甫刺三斤炭火蒸又晒乾為末濃煎大黄湯下一匕服旬日階眉髮再生肌膚潤眼目明

(九十三) 洗方治癩風即大風惡疾癩是也
右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及黑豆漿添熟水三日二浴一日一洗面却用側栢葉蒸晒乾白膠香等分為末蜜丸温水下三七粒日三服

(九十四) 八葉湯淋洗大風
桑葉　地黄葉　荷葉　皂角葉
葛葉　蒼耳葉　菖蒲葉　何首烏葉

右等分晒乾燒存性為末如面藥用洗手面浴身躰甚效切須忌口戒塩

〔瘛風〕〔追風丹〕前大軍庫張提領患白瘛風服之愈

蒼木一米泔浸焙何首烏 荊芥穗 苦參 各七上各等分

右件為細末好肥皂角三斤去皮弦於磁器內熬為膏和為丸如梧桐子大每服三五十丸空心酒茶任下忌一切動風之物 〔九十五〕

〔九十六〕〔何首烏散〕治肌肉頑麻紫白瘛風

荊芥 蔓荊子 何首烏 防風 蚵蚾草 威灵仙 艾草炙各等分

右為末每服二錢食後温酒調下

〔九十七〕〔如聖丹〕治瘛風

詩曰 紫瘛白瘛兩般風附子硫黄最有功姜汁調勻加蔥醯擦來兩度更無蹤 先以布擦洗瘡令損却用茄蔕醯煮汁擦之一說白瘛風用白茄蔕紫瘛風用紫茄蔕

〔又方〕硫黄一兩米醋煮一日海螵蛸一箇並為末浴後以生姜醯煮熟擦避風少時效 〔九十八〕

〔又方〕〔九十九〕

雄黄 硫黄 黄丹 密陀僧 南星

右為末用姜汁醯藥末擦后漸黑次日再擦黑散則無恙矣

〔灸法〕治瘛風灸左右手中指節兇中三壯未差再報之凡有贅疣諸痣但將艾炷於上灸之三壯即除 〔一百〕

新編名方類證醫書大全卷之一

新編名方類證醫書大全卷之二

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

寒

寒爲天地殺厉之氣故見於冬則爲氷爲霜草木因之而摧敗鳥獸各巢穴以自居氣体虛弱之人或調護失宜衝犯道途一時爲寒氣所中則昏不知人口噤失音四肢僵直牙關緊急疼痛或洒〻惡寒翕〻發熱面赤若有汗五臟之虛者皆能有所中也其脉多遲而緊挾風則脉帶浮眩暈不仁兼濕則脉濡而四肢腫痛治療之法只宜以姜附之藥温散寒氣切不可妄有吐下如吾卷囊縮者難治

（中寒）姜附湯 治体虛中寒昏不知人及臍腹冷痛霍乱轉筋

附子理中湯

一切虛寒並皆治之〔一〕

乾姜一兩　附子生去皮臍細切一枚

右㕮咀每服三錢水盞半煎七分食前温服

〔二〕理中湯　治五臟中寒口噤失音四肢強直

人參　乾姜　甘草　白朮各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分去滓温服一因方加附子名附子理中湯

〔三〕葱熨法　治中寒氣虛陽脫氣息欲絶不省人事及傷寒陰厥百治不効

葱一握以索繩纏如餅餡大去根葉惟存白長二寸許先以火炒一面令通熱勿令灼人乃以熟處着病人臍下上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹内更作三四餅遇一餅壞不可熨即易一餅候病人醒手足温有汗乃着更服姜湯一晚良或四逆湯之類若熨而手足不温者不可治

〔四〕又方　中寒熨法

宜以杲茱萸二升酒四碗煮濕以絹袋盛蒸令極熱熨心腹及脚手心候氣通暢勻暖即停止累用有効

〔感冒〕正氣散　治傷寒陰證憎寒惡風正氣逐冷〔五〕

半夏　厚朴各三兩為末生姜四兩同為餅子微炒　蘇葉　陳皮各乙兩　甘草七分炒

右為細末每服二錢生姜三片棗一枚水一盞煎七分食前稍熱服常服順氣寬中辟除瘟疫

〔六〕生料五積散　治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風无問内傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治之

白芷　三兩　陳皮去白六兩　厚朴去皮姜製四兩　桔梗去芦十二枚　枳殼去穰麩炒六兩　川芎　甘草炙　茯苓各三兩

蒼术 米泔浸去皮 二十四㕮 當歸 去芦 三兩 麻黃 去節六兩
肉桂 去皮 芍藥 各三兩 乾姜 四兩 半夏 湯洗 三兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片葱白三个煎七分熱服冒
寒用煨姜挾氣則加菜萸婦人調經催産則入艾醋

通治 大已涼圓 治沉寒痼冷臟府虛憊心腹污痛脇肋腹滿
泄瀉腸鳴自汗自利 方見瀉門 七

暑

暑之為氣在天為熱在地為火在人臟為心是以暑之中人先
着於心凡中之者身熱頭痛煩渴口燥甚則昏不知人手足微
冷或吐或瀉或喘或滿入肝則眩暈頑痛入脾則昏睡不省入
肺則喘滿痿躄入腎則消渴其脉多沉伏一時昏中者切不可
便与冷水并卧濕地古法當以熱湯先灌及用布衣黐熱湯熨

臍下及氣海續二以湯淋布上令煖氣透徹臍腹俟其甦省進
以黃連香薷散五苓散若体虛者冷香飲子霍乱吐瀉來復丹
二氣丹交食則用胃苓湯若挾風則其脉沉而浮證有搐搦當
於黃連香薷散內加羌活煎服却不可作驚癇治之多致不救
此方乃嚴氏累用之而有驗者若旅途中卒然暈倒急扶在陰
涼處揉道上熱土於臍上撥開作竅令人尿於其中以待求熱
湯并生姜或大蒜各一塊嚼爛以湯送下立醒

冒熱 八 白虎湯 治伏暑嘔吐

石膏四兩 知母一兩 甘草一分 粳米一合

右為剉散每服水煎熱服如伏暑作寒熱未解宜和五苓散
同前服伏熱後或冷水沐浴或喫冷物清氣在脾不克解令
日作寒慘壯熱渾身洒淅宜加桂煎服出汗便解

九 白虎加人參湯 治太陽中暍脉弦細乳遲小便已洒然

毛聳口開板齒者緣腠理司開闔寒則皮膚急腠理閉熱則皮膚緩腠理開開則洒然寒閉則熱而悶即白虎湯內加人參

（十）黃龍圓 治伏暑發熱嘔吐惡心

黃連去須三兩 好酒五升

右黃連以酒煮乾研為細末麪糊為圓如梧桐子每服三十圓熱水吞下

（十一）益元散 治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃腑積熱消石六兩好者 甘草微炒一兩

右為末每服三錢加蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗以葱白豆豉湯調下

傷冷 二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔

硝石 硫黃各等分

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊為圓梧桐子大每服四十圓新井水下不拘時

（十二）冷香飲子 治虛中伏暑煩燥引飲服涼藥不得者

草果仁三兩 附子炮去皮臍 橘紅各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服一兩水二椀薑十片煎一半沉冷不拘時

（十四）冷香湯 治夏秋傷暑引飲過食生冷無度脾胃不和或成霍亂之證

良薑二兩 檀香二兩 附子炮去皮臍二兩 丁香二分

川薑炮三分 甘草炒赤 酥草豆蔻五个去殼

右為末每服五錢以水二外煎十數沸貯瓶內沉井底代熟水服大能消暑止渴

冷熱不調 大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調（十五）

甘草三十斤乾姜四斤 杏仁去皮尖炒四斤 肉桂去粗皮

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾姜同炒却入杏仁候杏仁不作声為度用篩二淨後入肉桂一処搗羅為末每服三匁水一中盞煎七分温服如煩燥井花水調下不計時候以沸湯點服亦可

十六 **來復丹** 治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

硝石 二兩同硫黃為末入撲內以微火炒用梗篦攪不可火大過恐傷柔力再研極細名一氣末

大陰玄精石 研飛一兩 五靈脂 水澄過砂石乾二兩

舶上硫黃 透明者一兩 青皮 去白二兩 陳皮 去白二兩

右用五靈脂二橘皮為末次入玄精石末及前二氣末拌勻好醋打糊為圓豌豆大每服三十圓空心米飲下

霍亂 **解暑三白散** 治冒暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

澤瀉 白朮 白茯苓 各等分

十七

右�once咀每服四匁水一盞薑五片燈心十莖煎八分不拘時

十八 **桂苓甘露飲** 治伏暑引飲過度腹肚膨脹霍亂瀉利並皆治之

白茯苓 去皮 白朮 猪苓 去皮 滑石 研 各二匁

寒水石 研 甘草 炙 澤瀉 各一兩 肉桂 去皮半兩

右為末拌勻每服三錢熱湯冷水任下入蜜少許亦好

十九 **香需散** 治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之一方又加黃連四兩用姜汁同炒令黃色名黃連香需散如有擣加羌活煎服

香需去土一斤

白扁豆 微炒半斤 厚朴 去皮姜汁炙熟半斤

右�once咀每服三匁水一盞入酒少許煎七分沉冷不拘時

二十 **煩渴** **桂苓圓** 治冒暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便赤少

肉桂 去皮 赤茯苓 去皮各五兩

右為末蜜圓每兩作十圓每服一圓細嚼白湯冷水任下

(二十一) 縮脾飲 消暑氣除煩渴

縮砂仁 乾葛 烏梅肉 白扁豆各二兩
草菓煨去殼甘草炙略 兩

右㕮咀每服四錢水一大椀煎八分以水沉冷服

(二十二) 枇杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉去毛炙半兩 香薷三分 白茅根 麥門冬去心丁香
甘草炙 乾木瓜各一兩 陳皮去白焙厚朴去皮姜汁炙半兩

右為末每服二錢水一盞姜二片煎熳燥冷水調下

(二十三) 五苓湯 治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不得眠

猪苓去皮茯苓去皮白朮各半兩 桂去粗一分 澤瀉一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石二兩甚佳喘咳煩心不得眠者加阿膠半兩

(二十四) 竹葉石膏湯 治中暑不惡寒煩渴不已方見傷寒門

(二十五) 柴胡湯 治中暑煩渴口乾極用冷服方見傷寒門

(二十六) 消暑圓 治伏暑引飲脾胃不利

半夏湯泡七次 甘草生用 茯苓去皮各半斤

右為末姜汁煮糊為圓如梧桐子每服五十圓熱湯下

(二十七) 大黃龍圓 治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食

舶上硫黃 硝石各一兩 白礬 滑石各半兩
白麪四兩 雄黃半兩

右五味研末入麪和勻滴水圓如梧桐子每服三十圓新水下

(二十八) 十味香薷飲 消暑氣和脾胃

香薷一兩 人參去芦 陳皮湯泡去白 白朮
白扁豆炒去殼 甘草炙各半兩 厚朴姜汁炒黑 鱉乾木瓜 白茯苓

右為末每服二錢熱湯冷水調下

辰砂五苓散

(二十九) 五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍乱吐瀉小便赤少如心神恍惚加辰砂又名辰砂五苓散

澤瀉二十兩　肉桂去粗皮十兩
白朮去蘆十兩　猪苓去皮十兩
茯苓去皮十五兩

右爲細末每服二匁熱湯調下不拘時

(三十) 桂苓甘露散

官桂半兩　人參
白朮　甘草
寒水石酪乙煅　滑石二兩
藿香各半兩　茯苓
葛根　澤瀉
右爲細末每服二錢白湯下新水生姜湯亦可

(救急) (三十一) 皂莢湯 治中暑不省人事

猪牙皂莢燒灰　甘草炒
等分爲末每服二錢温熟水調下

(三十二) 治夏月途中卒然中暑悶絶

令患者仰卧以道中熱土鋪放腹上及心頭立甦如無熱土

令患者仰卧以熱尿盪腹中間亦良

(又方) 治中暑迷悶

取蒜研熱湯灌之立愈或用連皮生姜一大塊研爛熱湯灌下亦甦卒急不得熱湯以冷水研亦可

(又方) 用道上熱土同大蒜研爛以冷水和去滓飲之即差

濕

濕之爲氣沖溢天地之間流注四時之内躰虚之人或爲風雨所襲或卧里濕之地遠行涉水或感山澤蒸氣或汗出衣裏冷則浸漬脾腎皆能有所中傷着腎者腰痛身重如坐水中小便不利着脾則四肢浮腫不得屈伸若挾風則眩暈嘔噦心間煩

熱兼寒則拳攣掣痛無汗惡寒帶暑則煩渴引飲心腹疼痛面垢惡寒凡感濕之證其脉多沉緩而微其證多四肢倦怠不舉法當疎利小便爲先決不可輕易汗下并用火攻若有泄瀉等證又當於各類求之

(風濕)羌附湯 治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微浮腫

羌活去芦 附子炮去皮臍 白朮 甘草各等分 (三十三)

右�once咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分温服不拘時

(三十四)薏苡仁散 治濕氣傷腎肝氣不調自然生風遂成風濕流注四肢肌肉疼痛

薏苡仁一兩當歸 小川芎 乾薑 茵芋 甘草 官桂 川烏 防風 麻黄 白朮 羌活 人參 獨活各半兩

右爲細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服

(三十五)麻黄白朮散 治感風濕身體煩疼無汗惡寒發熱者

麻黄去節湯浸三兩 杏仁十六个去皮尖 甘草炙二兩 白朮四兩 桂心一兩

右�once咀每服四錢水盞半煎七分食前服

(三十六)白朮茯苓乾薑湯 治感風濕挾暑煩渴引飲惡風微汗

白朮 茯苓 乾薑 桂心 乾葛 甘草炙 陳皮 細辛 烏梅 豆豉各等分

右爲末每服二錢白湯調下

(三十七)四物附子湯 治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得屈伸

附子炮一分 肉桂八分 白朮六分 甘草四分

右�once咀每服半兩水一盞薑五片煎八分温服

(三十八)木附湯 治風濕相搏腰膝疼痛四肢重着不嗇不渴大便堅硬小便自利

甘草炙二兩 白朮四兩 附子炮去皮臍薄切片一兩半

右�once咀每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎七分空心温服

(三十九) 防己黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚四肢少力關節煩疼

防己四兩 黃耆五兩 甘草炙二兩 白朮三兩

右�once咀每服三錢水一盞薑棗同煎七分熱服不拘時

(四十) 木瓜圓 治風濕客搏手足膝腰不能舉動

以木瓜一枚去穰皮開竅填吳茱萸一兩線繫定蒸熟研爛

入鹽半兩研勻糊丸梧子大每服四十丸荼酒吞下

(四十一) 桂枝附子湯 治風濕相搏身躰煩疼方見傷寒門

(寒濕) 滲濕湯 治寒濕所傷身躰重着如坐水中小便赤澁大便溏泄

蒼朮 白朮 甘草炙 茯苓去皮 乾薑炮各二兩 橘紅 丁香各一分

右�once咀每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分食前温服

(四十二) 腎着湯 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾薑炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各二兩

右�once咀每服四錢水一盞煎七分空心温服

(四十三) 滲濕湯 治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑溏泄

白朮二兩 人參半兩 乾薑炮 白芍藥

附子炮去皮臍 白茯苓去皮 桂枝不見火 甘草炙各半兩

右�once咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎八分不拘時

(四十四) 生附湯 治受濕腰痛

附子生二分半 蒼朮炒 杜仲鞋酥炙各 牛膝酒浸焙 厚朴製

乾薑生 白朮 茯苓 甘草炙各二

右�once咀每服三錢薑三片棗一枚食前煎服

四十五 **芎术除眩湯** 治感寒濕頭目眩暈

甘草炙　附子炮　白术　官桂各二錢半　川芎半兩

右㕮咀每服三錢薑七片食前煎服

四十六 **麒麟竭散** 治寒濕傳於經絡疼痛不可忍

血竭　南乳香　沒藥　白芍藥　當歸

水蛭炒碎炒令烟盡　鹿茸香各二錢　虎脳骨酥炒黃五分

右八味爲末和勻每服三錢溫酒調下食前

四十七 **除濕湯** 治寒濕所傷身體重着腰脚酸疼大便溏泄小便或澁或利

半夏麯炒　厚朴姜製　蒼术各米泔製　藿香葉

陳皮去白　白茯苓各去皮　甘草炙七分　白术生用一兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎七分食前温服日三

四十八 **苓术湯** 治暑濕鬱發半身不遂口眼喎斜

附子炮去皮臍　茯苓　白术

乾薑炮　澤瀉　桂心各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心服

五十 **茯苓白术湯** 治感濕挾暑汗未乾而浴暑濕相搏

茯苓　白术　乾薑炮　甘草炙　桂心各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分食前服

五十一 **大橘皮湯** 治証同上

橘皮半兩　木香一分　滑石六兩　檳榔三分

茯苓乙兩　猪苓去黑皮　澤瀉　白术

官桂各半兩　甘草二分

右爲末每服五錢水一琖生姜五片煎至六分去滓食後服

〔通治〕蒼耳圓 治一切風寒暑濕四肢拘急攣痺

蒼耳子洗焙為末糊丸梧子大每服五十丸日二又方取蒼耳子以水煎服亦可

(五十三) 白术酒 治中濕骨節疼痛

白术一兩酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代之

(五十四) 赤茯苓丸 治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤澁

茅蒼朮四兩 防己二兩 赤茯苓乙兩 木香半兩

右為細末棗肉為丸梧子大每服三十丸煎桑白湯下食後

新編名方類證醫書大全卷之三

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

傷寒

傷寒之證固有天疫流行一時所感病無老少率相似者然多是躰虛勞役之人冬月衝犯道途不謹調護以至為風寒所傷其毒藏伏於內不即發見或為執所擊搏然後發而為病故經云冬感寒春發溫者是也其為證有陽有陰有表有裏又當知受病不同傳變不一其發也未有不自頭疼發熱自汗惡寒而始者若發於太陽即熱而惡寒發於太陰止惡寒而不發熱也傳陽則潮熱狂言如有所見其脉多長浮變陰則舌強不語手足厥冷多有自利其脉多沉細傷寒為治雖曰有法又須問證

以察於外切脉以察於内故在表宜汗之在上宜吐之在裏宜下之在半表半裏者和解之此固一定之法然又須考得病之日傳變之期方可施治一日至三日病在皮膚者為表宜麻黄桂枝之類驅散穴邪得汗之後脉靜為愈有汗不得服麻黄無汗不得服桂枝仲景至切之論不可不謹四日五日之間病在胸膈痰氣緊滿於上當以瓜蒂豆豉之類吐之而愈六日七日之間其病入腹傳胃藏腑結燥狂言潮熱須大黄芒硝之類下之而愈古今治法揔曰如此邪又有得病之日便四肢厥冷名為陰厥欲絶者丹田氣海穴灸之又有經日微厥而後發熱者今人多以水漬布帛重蠶捨之於胸為熱厥熱甚舌黑鼻燥者今人頻頻更與以拔去熱氣亦良法也又有不厥而即變陽證或胸腹恚悶牽引疼痛坐卧不安胃氣喘息則又不可拘以日數即宜下之又有六七日大腑結燥上不能食其脉細緊皆曰當下

邪有頭痛惡寒項上有汗或小便清利乃表證未除仍宜汗之或裏寒表熱或裏熱表寒皆當先救其裏後治其表應汗而反下之則熱畜於裏或為瘀血發而為狂證者有之結而為痞為結胸者有之結胸者心下緊滿而痛按之如石手不可近痞者但緊滿而不痛證雖相類用藥却有不同若應下而反汗之則津液枯竭又有亡陽譫語者證雖為實亦為虚若應吐而反温之則毒氣鬱結於胃發而為斑其色如錦紋者生黑者即死臨證用藥若不辨其陰陽觀其傳變審而行之則必致錯乱怪證百出流而為壞證傷寒甚至不救以此傷寒一證不可不謹病愈之後切不可輕用補藥尤忌房室勞傷飲食過度倘因之宜審之但腳氣則腳膝軟痛卒起即倒痰飲則頭不痛項不強食積則身不痛左手脉平和虚煩則不惡寒身不痛為異決不

可有誤作傷寒治之其中變易非止一端茲畧拳其說以備參
考其詳又當於仲景論中千金百問內求之且感冒本與傷寒
治證一同但有輕重之分耳故重者為陽輕者為感感冒之中
有風有寒又須詳別夫感寒則必惡寒面色黯慘項背拘急亦
或頭痛發熱其脉沉遲當以五積散藿香正氣散養胃湯表之
感風則必惡風面色光浮身躰發熱如瘧鼻塞畜重時引清涕
或咳唾稠粘其脉多浮數當以十神湯敗毒散治之或風寒兼
之又當用和解之藥體虛之人不可過於發散恐致他疾并述
于後審之審之

〔宜汗〕麻黄湯 治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗
杏仁七十个去皮炒別研如膏 麻黄去節三兩 甘草炙一兩 肉桂去皮二兩
右為粗末入杏仁膏令勻每服三錢水一盞煎八分溫服以
汗出為度 一

〔二〕十神湯 治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此
藥不問陰陽兩感風寒並宜服之
川芎 甘草 麻黄去根節 紫蘇
升麻 赤芍藥 白芷 陳皮 香附子
右㕮咀每服三錢水一盞半姜五片煎七分去滓熱服不以時
候如發熱頭痛加連鬚葱白中滿氣實加枳殼煎

〔三〕葛根解肌湯 治傷寒頭痛發熱惡寒肢躰拘急胃脘煩悶
葛根四兩 麻黄去節二兩 肉桂去皮 甘草炙 芍藥
右㕮咀每服三錢水一盞煎八分去滓熱服

〔四〕葱白散 治四時傷寒頭痛壯熱肢体煩疼小便赤澁及
傷風鼻塞咳嗽痰涎山嵐瘴氣並皆治之
川芎 蒼术米泔浸 白术各二兩 麻黄去根節二兩

甘草　石膏　乾薑各一兩
右㕮咀每服二𠀋水一𣗥盖姜三片棗白二十煎七分熱服不拘時如欲汗并進數服

五　小青龍湯　治傷寒表證不解心下有水氣乾嘔發熱咳或噦微喘又治胎經受寒咳噦喘急

半夏湯洗七次二兩半　乾姜炮　細辛去葉　麻黃去根節
甘草炙二兩　五味子二兩　甘草炒各三兩
肉桂去皮　芍藥
右㕮咀每服三𠀋水𣗥半煎七分去滓食後溫服

六　大青龍湯　治傷寒頭痛發熱惡寒無汗煩躁六脉浮緊

麻黃三兩　桂枝去皮　甘草炙各二兩　杏仁去皮十個
大棗五个　生姜一兩半　石膏半个雞子大
右㕮咀每服五𠀋水𣗥半煎八分去滓溫服取汗為度不可過汗恐亡陽也若汗多不止用溫粉撲之

〔卷下〕

大柴胡湯　治傷寒十餘日不解邪氣結在裏身熱煩燥語言譫妄大便不通緾腸刺痛

枳實去穰炙半兩　柴胡去芦半斤　大黃二兩
赤芍藥　黃芩各三兩半
右㕮咀每服三𠀋水一𣗥盖姜五片棗一枚煎七分去渣溫服此藥治傷寒內熱裏實若身体疼痛是表證未解不可服之宜解表

七　小承氣湯　治傷寒潮熱譫語如有所見大便六七日不通是有燥糞結滯此藥主之

枳實一枚麩炒去穰　大黃去皮一兩　厚朴去皮姜製一兩
右㕮咀每服五𠀋水𣗥半煎八分去滓溫服以利為度

八　柴胡飲子　治內實大便難糞不惡實反惡熱

柴胡　人參　黃芩　甘草

大黃　當歸
右為粗末每服三錢水一盞生姜三片去滓溫下

十 防風當歸飲子 治身熱大便秘不惡寒而煩渴
柴胡　人參　芍藥　甘草　黃芩　防風　滑石
右為粗末每服三五錢生姜三片水一盞煎至七分去滓溫
服不拘時候　大黃　當歸　等分

十一 調胃承氣散 治陽明不惡寒反惡熱大便秘讝語嘔
大黃　甘草　朴消　各五分
右為粗末每服五七錢水一大盞煎三五沸去滓溫服食後
熱頭痛宍傷於胃則下利或血或水脉數者宜此下之

十二 調中湯 治秋夏之間暴宍折於盛熱三結於四肢則北
大黃去皮三分　葛根　黃芩　芍藥　甘草　各半兩
右為粗末每服五七錢水一大盞煎三五沸去滓溫服食後

右㕮咀每服五匁水一盞半煎八分移時再服得利即止

十三 脾約麻仁丸 治傷寒燥熱糞結大便秘小便自利
方見秘結門

十四 蜜煎法 治秘結服藥不得通利宜此導之　方見秘結門

（宜吐）瓜蒂散 治傷寒四五日病在胸膈痰氣緊滿於上不得息者當以此吐之　十五

瓜蒂一兩（炒黃）　赤小豆一兩
右㕮咀每服二錢水一盞半煎至六分去滓溫服以吐得快為度亡血亡津液虛者不可服

十六 栝蔞散 治傷寒脉大胸滿痰多涎病頭疼　方見風門

（宜溫）十七 五積散 方見中寒門 治傷寒頭痛發熱惡寒身痛無汗及藏府素寒服涼劑不得者

十八 陷胸湯 治傷寒肢節疼痛內寒外熱心下盧煩
芍藥 甘草各二兩 乾薑
黃芩各三兩 桂心四兩 大棗十五个
右㕮咀每服五分水一盞煎八分温服頻進令少汗

十九 茯苓四逆湯 治傷寒汗下之後病證不解而煩燥者
附子一个去皮生破八片只用二片 人參二分半 甘草三分 乾薑三分 茯苓一兩
右㕮咀每服五錢水一盞煎八分温服

二十 桂枝附子湯 傷寒八九日不解風濕相搏身体煩疼
桂枝一兩三分 甘草二兩六銖 附子一个炮
右㕮咀每服五錢水一盞姜四片煎八分温服

二十一 小建中湯 治傷寒陽脉濇陰脉弦腹中急痛法當先与小建中湯若不瘥者小柴胡湯主之
桂枝去皮兩半 芍藥三兩 甘草一兩 生姜兩半

膠飴半斤舊有微溏或嘔者去膠 大棗六个
右剉每服五錢水一盞半姜三片大棗一枚煎八分去滓下膠飴兩�mm許再煎化温服尺脉尚濇加黃者末一錢煎

二十二 和解散 治四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐痢
陳皮洗 厚朴去皮各四兩 蒼朮去皮一斤
桔梗 甘草各半斤
右爲粗末每服三錢水一盞半姜棗煎七分不拘時熱服

二十三 消風百解散 治四時傷寒頭疼發熱及寒瘧咳嗽鼻塞聲重
羌活 白芷
麻黃去節 蒼朮各四兩 甘草炙二兩
右㕮咀每服三錢水一盞姜三片葱白三莖煎七分不拘時

陳皮去白

二十四 八解散 治四時傷寒頭疼體熱惡風多汗嘔逆惡心

人參去芦 茯苓 甘草 陳皮去白
藿香去土 白朮 厚朴 半夏湯洗七次各一兩
右㕮咀每服五錢水一盞姜三片棗薤同煎不拘時

二十五 家傳方十味和解散 治頭疼發熱發散寒邪

白朮二兩桔梗一兩 人參去芦甘草炙各一分 當歸洗焙
陳皮去白枳殼去穰炒赤芍藥厚朴薑製 防風
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片葱三莖煎熱服不拘時

二十六 香蘇散 治四時傷寒頭痛發熱惡寒

紫蘇 香附子酌各二兩 陳皮一兩 甘草炙半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜葱煎七分空心熱服如頭疼加
川芎白芷名芎芷香蘇散

徐同知加減香蘇散法

頭痛加川芎白芷○頭痛如斧劈加石膏連須葱頭○偏正頭風加細辛石膏薄荷○太陽穴痛加京芥穗石膏○傷風白汗加桂枝○傷風无汗加麻黃去節并乾葛○傷風惡寒加蒼朮○傷風發熱不退加漳柴胡黃芩○傷風咳嗽不止加半夏杏仁去皮尖○傷風胸膈痞塞加製枳殼○傷風鼻塞聲重咽痛不和加吾梗旋伏花○傷風痰涎壅盛加白附子天南星○傷風鼻內出血加茅花○傷風氣促不安加大腹皮桑白皮○傷風鼻塞不通頭昏加羌活荊芥○傷風不散吐血不時加生地黃○傷風不解耳內出膿疼痛加羌活京芥○傷風不解咽喉腫痛加苦梗○傷風中脘寒不思飲食加去白青皮枳殼○傷風嘔吐惡心不止加丁香半夏○傷風頭暈眼花顛倒支持不住加熟附子○傷風時作寒慄加桂枝○傷風痰壅嘔惡不止加白附子旋伏花半夏○傷風

後時ニ作虛熱不退加人參○傷風飲食不能消化加縮砂仁青皮○傷風一向不解作潮熱白日至日中不退日ニ如是加地骨皮澤柴胡人參葛根○初感風頭痛作熱鼻塞声重加羌活川芎○感風腰疼不能伸盹加官桂桃仁○感風渾身痛不止加赤芍藥紫金皮○感風脛項強急不能轉頭加羌活官桂○腹肚疼痛加木香○腹肚疼刺不可忍加姜黄茱萸七粒○小腹疼痛無時不可忍加木香姜黄○婦人忽然大便痛腫不能下地加木香木瓜茱萸○婦人被性所苦胷膈痞疼脅肋刺痛小便急疼加木香枳殼○婦人被氣疼所苦加木香縮砂仁○脾胃不和中脘不快加谷芽神曲○傷食吐噁泄瀉腹痛加乾姜木香○心卒痛者加延胡索酒一盞○飲酒太過忽遍身發疸或兩目昏黄加山茵陳山梔子○中酒吐惡加烏梅丁香○婦人經水將行先作寒熱

加蘇木紅花○婦人產後作虛熱不退煩渴加人參地黄○產後發熱不退加人參黄耆○產後腰疼不已加當歸官桂冷嗽不已加乾姜五味子杏仁○脾寒加良姜青皮草果○脚氣加木香木瓜牛膝紫金皮茱萸黄川練子○感風寒發熱頭疼加不換金正氣散○感寒頭痛壯熱惡寒身痛不能轉動加生料五積散○飲食不下欲吐不吐加丁香與蘿蔔子○感寒頭痛發熱身疼分陰陽加敗毒石膏○婦人產後風脚手疼痛生料五積散人參敗毒散加木瓜不換金正氣散加生地黄川芎同煎

二十七 十味豆蘇散 治四時傷寒發熱頭痛

川芎七分　紫蘇葉　乾葛　桔梗炒二分半　柴胡　茯苓各半兩　甘草三分半　半夏六分　枳殼炒三分　陳皮三分

右㕮咀每服三錢姜棗煎服

(二十八) 麻黃桂枝各半湯 治傷寒七八日發熱惡寒如瘧狀但不嘔小便清利六脉雖微而惡寒此乃陰陽俱虛不可更發汗及吐下此藥主之

桂枝一兩 麻黃 芍藥 生姜 甘草炙各一兩 杏仁十二个大棗二枚

右�once咀每服五錢水盞半煎八分温服

(二十九) 柴胡桂枝湯 治傷寒六七日發熱微有惡寒表證未解者

柴胡一兩 桂枝去皮半兩 黃芩半兩 甘草三分生姜半兩 人參半兩 半夏四分 大棗一枚

右剉每服五錢水盞半煎八分去滓温服

(三十) 黃連解毒湯 治傷寒大熱乾嘔錯語呻吟不眠

黃連一分 黃芩 黃柏各半兩 梔子四箇

每服剉五錢水二盞半煎七分去滓温服

(三十一) 梔子仁湯 治傷寒陽毒發狂煩燥面赤咽痛熱潮

梔子仁 赤芍藥 大青 知母各一分 升麻 黃芩 石膏 各二分

柴胡一分半 甘草半分 豉一百粒

右剉每服五分水一盞半煎七分去滓温服

(三十二) 小柴胡湯 治傷寒發熱如瘧胸膈煩痛小便不利大便秘澁

半夏湯洗七次兩半 柴胡去苗半斤 黃芩 人參去蘆甘草各炙二兩

右�once咀每服三分水一盞姜五片棗一枚煎七分熱服

(三十三) 柴胡散 治傷寒病後邪入經絡体瘦肌熱或又咳嗽

柴胡四兩 甘草一兩

右爲末每服二分水一盞薑煎八分食前熱服

(三十四) 白虎湯 治傷寒大汗後表證已解或吐下後邪未除熱結在裏心胷煩渴甚欲飲水方見暑門煩渴不止者加人參

三十五 鵲石散 治傷寒發狂踰墻上屋

黃連 寒水石 各等分

右爲細末每服二錢水濃煎甘草湯候冷調服

三十六 玄參升麻湯 治傷寒失下熱毒在胃發斑甚則煩燥譫語

玄參 升麻 甘草炙 各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分温服温毒亦能發斑

陰證

三十七 葱鼓法 治傷寒陰厥百治不効方見寒門

三十八 白木散 治陰毒傷寒心閒煩燥四肢逆冷

川烏頭炮去皮臍 桔梗去芦 白木 附子炮去皮臍 細辛 各一兩 乾姜炮半兩

右爲末每服二錢水一盞煎六分熱服不拘時

三十九 真武湯 治傷寒數日已後發熱腹疼頭目昏沉大便自利小便或利或澁或嘔或咳或已經汗不解仍復發熱心下悸

頭目眩暈皆由渴後飲水停留中脘所致並皆治

芩藥 茯苓 生姜 白木 各七錢 附子炮一个

右咬咀每服五錢水盞半煎八分温服不拘時咳者加五味子七錢半細辛乾姜各二錢半

四十 四逆湯 治傷寒自利脉微欲絶手足厥冷者

甘草炙二兩 乾姜一兩半 附子生去皮臍半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分温服不拘時

四十一 茯苓湯 方見中寒門 治傷寒自利六脉沉伏手足厥冷

四十二 增損白木散 病後最宜服之生津止渴順氣下痰

白木 葛根 茯苓 藿香葉 各一兩 人參 木香 各一兩 陳皮二兩 乾生姜一錢

右咬咀每服四分水一大盞半煎七分去滓温服不拘時

四十三 五苓散 方見中暑門 治傷寒汗後發渴小便不利

四十四 藿香正氣散 治傷寒頭疼增寒壯熱或感濕氣霍亂泄瀉常服除山嵐瘴氣

大腹皮　白芷　茯苓去皮　紫蘇去土各二兩　藿香三兩　厚朴去皮薑製　白朮　陳皮去白　苦梗　半夏曲各二兩　甘草炙二兩半

右㕮咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎熱服

四十五 僧伽應夢人參散 治傷寒体熱頭痛及風壅嗽咯血等疾

甘草炙六兩　人參　桔梗　白芷　乾葛　白朮各三兩　乾姜炮五分半

右㕮咀每服三分水一盞薑二片棗二枚煎七分去滓熱服不拘時如傷寒加豆豉煎

四十六 不換金正氣散 治四時傷寒瘟疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白並宜服之

厚朴去皮薑製　藿香去枝土　甘草半夏　蒼朮泔浸　陳皮各等分

右㕮咀每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分去滓食前熱服若出遠方不伏水土者宜常服之

四十七 人參敗毒散 治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽鼻塞聲重如心經蘊熱口舌乾燥者加黃芩

柴胡　甘草　桔梗　人參　羌活　前胡　茯苓　枳殼　獨活各等分

右㕮咀每服三錢水一盞半薑三片薄荷少許同煎七分去滓不拘時

四十八 五積交加散 治內感風寒上膈蘊熱

生料五積散　人參敗毒散二料等分

右和勻每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎八分溫服

四十九 沖和散 治感冒風溫之氣頭目不清鼻塞聲重肢體倦怠欠伸出淚

蒼术 六兩 荊芥穗二兩 甘草一兩一分半

右㕮咀每服三錢水一盞煎八分去滓熱服不拘時

五十 參蘇飲 治感冒風邪發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘此藥大解肌熱寬中快膈或慾或勞察潮熱往來並能治之

木香 紫蘇葉 乾葛 半夏湯洗七次 前胡去苗 人參去芦 茯苓去皮各三分 枳殼去穰麸炒 桔梗去芦 甘草炙 陳皮去白各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜七片棗一枚煎六分去滓熱服不拘時勞簡方以氣盛者不用木香

疫癘 升麻葛根湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及瘡疹已發未發疑似之間並宜服之 五十一

川升麻 白芍藥 甘草炙各五兩 葛根十五兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時

五十二 柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾痰盛咳嗽涕唾稠粘

柴胡去芦 前胡去芦各十兩 升麻五兩 桑白皮炙 乾葛十兩 赤芍藥去芦 石膏各十兩 甘草炙 黃芩去皮六兩半 荊芥去梗十兩半

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片豉十餘粒煎熟服

五十三 神术散 治四時瘟疫頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

蒼术 米泔浸五兩 薏苡米去土 香白芷 細辛 羌活去芦 川芎 甘草炙各一兩

右為細末每服三錢水一盞姜三片葱三寸煎七分溫服不拘時如傷風鼻塞用葱茶調下

五十四 甘桔湯 治四時疫癘咽痛方見咽痛門

虛煩 梔子豆豉湯 治發汗吐下後虛煩不得眠反發顛倒心中懊憹梔子豆豉湯主之若少氣絕者梔子甘草豉湯主之

肥梔子四个香豉半升

右剉水二大盞先煮梔子至一盞入豉同煎取七分去滓温服得快吐止後服

五十六 酸棗湯 治傷寒吐下後心煩乏氣昼夜不眠

酸棗四升外 麥門冬一升去心 甘草炙一兩 知母二兩

茯苓 川芎

右㕮咀每服四分水一盞煎七分去滓温服

五十七 竹葉湯 治傷寒大霍乱吐瀉後心虛煩悶内熱不解

竹葉 麥門冬二升去心 人參 茯苓去皮

小麥炒 半夏湯泡各廿草炙半兩

右㕮咀每服四分水盞半姜五片煎八分温服

乾姜各三兩

五十八 竹葉石膏湯 治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯竭心煩發熱氣逆欲吐及諸虛煩熱並宜服之

麥門冬二升去心 人參二兩去芦

石膏一斤 半夏湯洗七次二兩半

右㕮咀每服三錢水一盞入青竹葉生姜各五六片煎一半去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米温服不拘時

五十九 温膽湯 治傷寒二功病後虛煩不得睡卧兼治心膽虛怯

半夏 枳實各一兩

右㕮咀每服四分水盞生姜七片棗一枚竹茹一塊煎七分去滓食前熱服

橘紅一兩半 茯苓三分 甘草二分

六十 温粉 治汗多不止

白术 蕎麥本

等分爲末每末一兩入米粉一兩半和勻用粉周身撲之

川芎 白芷

(六十一) **桂枝湯** 治傷寒太陽經受病頭疼身痛或翕〻發熱或洒〻惡風

桂枝　芍藥各三兩　甘草一兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑二片棗二枚煎七分去滓溫服不計時候惟春初可依此方自春末夏至已前但加黃芩半兩夏至後加知母半兩石膏二兩或外麻半兩若病人素虛寒者不用加減無汗休服

(六十二) **黃耆建中湯** 治傷寒身痛尺脉遲或汗出不止方見虛門

(自利) (六三) **黃芩湯** 治傷寒腸垢協熱下利腹下必熱

黃芩二兩　芍藥

右剉每服五錢水一琖半煎七分溫服嘔者加半夏生姜

(六十四) **理中湯** 治傷寒鴨溏協寒下利腹下必寒方見中寒門

(痞) **枳實理中丸** 治傷寒曾經吐利後胷痞欲絕膈高起急痛

枳實去穰麩炒　茯苓

白朮　乾姜炮

右爲末蜜和一兩作四圓熱湯化下渴則加括樓根下利加牡砺粉

(六十五) **半夏瀉心湯** 治心下痞滿而不痛者

半夏湯洗七次一兩一分黃芩　人參

甘草炙各等分　乾姜炮半

右㕮咀每服四分水一盞薑五片棗一个煎七分溫服或傷寒中風醫反下之腹鳴心痞乾嘔心煩者加甘草半兩人參一兩名甘草瀉心湯

(結胷) **大陷胷湯** 治傷寒表證未解而誤下之則熱畜于裏小便不利身体發黃爲結胷之證脉沉而緊心下痛按之如石手不可近者此藥主之

(六十六)

(六十七)

大黃酒浸 芒硝一兩八 甘遂一分為末
右㕮咀每服五錢水盞半煎八分去滓再下芒硝煎一二沸
入甘遂末溫服得快利為愈

(六十八) **小陷胸湯** 治傷寒結胸心下緊滿而痛按之如石脉浮者是
半夏湯洗七次料 黃連一分 括樓實一枚用四分之一
右㕮咀每服五錢水盞半煮括樓至一盞去滓再下諸藥取八分
去滓溫服以微吐黃涎為愈

(六十九) **大陷胸丸** 治結胸項強如柔痙狀下之則和
大黃二兩 芒硝九分 葶藶三分 杏仁去皮尖二分
右搗羅二味內芒硝杏仁合研如脂丸如彈丸大一枚抄甘遂
末一字白蜜少許水二盞半煮取一盞服一宿乃下如不下
再服

血證 (七十) **犀角地黃湯** 治血証大便黑或發狂或發黃或衄

血或嘔水不欲嚥已上諸証是皆內有瘀血此治之門 見吐血

(七十一) **桃仁承氣湯** 治傷寒分外已解小腹急大便黑小便不利
此為血證宜此藥下之
桃仁五十枝 桂枝 芒硝 甘草各六錢半
大黃一兩三錢

(七十二) **抵當湯** 治瘀血狂言小腹滿漱水不欲嚥
水蛭 蝱虫 桃仁酪二十大黃一兩
水二外三合半煮取一外二合去滓內芒硝微煎分五服
水三盞煎至六分去滓分二服

(七十三) **藥皮湯** 治傷寒熱毒入深吐血不止
藥皮三錢 黃芩 黃連各二錢
水二盞煎至一盞去滓入阿膠一錢半煎烊 溫服

(七十四) **旱花湯** 治傷寒鼻衄不止

茅花一大握無花用根水三𦊚煎至一𦊚分二服

(七十五) **桃花湯** 治少陰下利膿血

赤石脂五兩三錢一半為末一半全用　糯米三合

水二升三合煮米令熟去滓溫服二合半內赤石脂末方寸匕日三服疾止住服

(嘔噦) 經驗 **竹茹湯** 治傷寒胃熱嘔噦方見吐嘔門

(七十六) **半夏生姜湯** 治傷寒諸嘔吐水穀不下及咳逆

半夏一兩　生姜二兩

右用水二𦊚煎至一𦊚去滓溫服

(七十七) **大橘皮湯** 治傷寒嘔噦胷滿虛煩不安

陳皮　人參各一兩　甘草半兩

右剉每服五錢姜七片水一𦊚半煎至七分去滓溫服

(七十八) **小橘皮湯** 治傷寒嘔噦手足逆冷

陳皮一兩　生姜二兩

水三𦊚煎至一𦊚分二服

(七十九) **灸期門法** 治傷寒嘔逆諸治不効

穴在婦人屈乳頭向下盡處骨間丈夫及乳小者以一指為率男左女右艾炷如小豆大三壯隔中有動脉是穴

(易病) **燒混散** 治婦人傷寒病後与男子交接病名陰易

右用婦人混襠燒灰細研冷水調服以小便利為愈(八十)

(八十一) **鼷鼠糞湯** 治男子傷寒病後与女人交接病名陽易

壯根去青一握一約徑寸半鼷鼠糞十四粒兩頭尖者

右二味水一𦊚煎六分頓服以汗出為愈

(復病) **白朮散** 治傷寒病後氣脉不和食復勞復病證如初

桔梗　茯苓各三分　乾姜炮二兩　白朮四兩　白芷

陳皮去白青皮去白　香附子　甘草　山藥各三分

右㕮咀每服二分水一盞姜三片棗一枚乾木瓜一片紫蘇三葉煎七分食前服若吐瀉入白梅喘入桑白皮杏仁傷寒勞復入薄荷中暑厥逆入香薷產前產後血氣不和入荊芥霍乱入藿香煎

(八十二)

(雜證) 金沸草散 治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

(八十三)

旋覆花去梗荊芥穗四兩麻黃去節前胡去芦各三兩甘草炒赤芍藥半夏湯洗七次姜汁浸各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎八分温服

(八十四) 人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼不問風寒二證夾食停痰俱能治之但感風邪以微汗爲好

半夏湯洗厚朴姜製蒼术米泔浸一宿陳皮各一兩人參去芦甘草炙各半兩桔梗炒紫蘇葉各七分

右㕮咀每服四錢水盞半姜七片烏梅一箇煎六分熱服兼治飲食傷脾發爲疫癘寒多者加附子爲十味名不換金散



名方類證醫書大全

四五六

02
メ1

48062

名方類證醫書大全卷之四

瘧

大瘧之為疾名狀不一有所謂痹瘧寒瘧温瘧食瘧牝瘧牡瘧
名雖不同皆由外感風寒暑温之氣與營氣相搏而後成之雖
經云夏傷於暑秋必痎瘧然四時有感皆積七情飢飽失時致
令脾胃不和榖留中脘皆成瘧疾其初發也欠伸畏寒戰慄頭
痛或先寒後熱或先熱後寒或單寒單熱或寒多熱少或熱多
寒少一日一發者易治二日三日一發者難愈瘧脉白弦二數
者多熱弦遲者多寒弦而小緊者宜下弦遲者宜温浮大者宜
吐治療之法當先發散次邪不可驟用截補之藥若截早則補
住邪氣其證變異不能即愈致成痎瘧者有之發散之藥熟多

百々行太郎寄贈

宜小柴胡湯參蘇飲清脾湯之類寒多者宜養胃湯四物飲發散不退然後以常山飲勝金丸截之截而不愈久則脾氣虛敗唯宜多進養脾驅痰之藥脾氣一盛自然平復此證既愈未當節飲食謹勞傷防其再作如煙瘴之地居人常患瘧疾又當其方士所宜藥性施以治法客旅往來瘴地當宜服平胃散草果飲先以防之

（傷風）桂枝羌活湯 治瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮惡寒有汗

桂枝　羌活　防風　甘草各半兩

右爲粗末水煎如吐者加半夏麴等分〔一〕

（感寒）麻黃羌活湯 治瘧疾頭痛項強脉浮惡風無汗〔二〕

麻黃去節　羌活　防風　甘草各半兩

右爲粗末水煎如吐加半夏麴等分〔三〕

正氣散 退寒瘧止胃寒進飲食

藿香四兩　草果四兩　半夏　陳皮　厚朴　縮砂　甘草各一分

右爲剉散生姜棗子煎溫服瘧疾俟發日早服〔四〕

積散 治躭虛作瘧先寒後熱寒則湯火不能溫熱則冰雪不知冷惡寒無汗　方見傷寒門

冒暑〔五〕黃連香需散 方見中暑門 治伏暑發瘧煩渴者

〔六〕加減香需散 治伏暑成瘧煩悶多渴微微振寒寒罷大熱小便黃赤或背寒面垢

香需半斤厚朴半斤薑汁炒　蒴藋半斤

右剉每服四錢水一盞酒半盞煎至八分去滓沉冷服

伏濕〔七〕除濕湯 治瘧疾身重骨節煩疼脹滿自汗喜嘔因汗後浴濕舍皮膚或冒雨濕所致

未附湯治証同上二方並見中濕門

(八) 對金飲子 治寒熱瘧疾愈後調理脾又治濕瘧

厚朴 去皮姜汁炙 蒼术 泔浸去皮 甘草炙各二双 陳皮去白炒赤黃色半斤

右㕮咀每服四分水一𦊚倍用蒼术名曰東平胃散 姜三片棗一个煎服一方加草菓

(七情) 四獸飲 治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾 (九)

人參 白术 茯苓 甘草減半 橘紅

草菓仁 半夏 棗子 生姜 烏梅各等分

右㕮咀以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水溫之慢火炮令香熟焙乾每服半兩水二𦊚煎六分未發前併進數服

(熱證) 白虎加桂湯 治瘧疾但熱不寒者 (十)

知母六兩 甘草炙三兩 肉桂去皮二兩 粳米三兩 石膏一斤

右㕮咀每服五分水一𦊚半煎服

(十一) 桂枝黃芩湯 治瘧服桑寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也

甘草 人參 黃芩各四分 半夏四分

柴胡七兩 石膏 知母各五分 桂枝二分

右為粗末水煎

(十二) 參蘇飲 方見傷寒門 治發瘧熱多寒少兼咳嗽者

(十三) 柴胡湯 方見傷寒門 治瘧疾熱多寒少或單熱頭痛胷滿吐乾

(十四) 柴胡加桂湯 治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡八兩 人參 甘草

半夏泡七次 黃芩

右㕮咀每服五分水盞半姜七片棗二个煎服若渴者去半要加人參瓜蔞根同煎服之

(十五) **桂枝石膏湯** 治瘧先寒後熱熱多寒少

桂枝 五分　石膏 如母酪大 黃芩乙兩

右為末分三服水煎服

(十六) **清脾湯** 治瘴瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澁

青皮去白 厚朴姜製 白术 半夏湯七次 黃芩

草菓仁 柴胡去芦 茯苓去皮 甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎至七分去滓温服不拘時候

(十七) **八正散** 治瘧發心煩臉赤声叫煩躁極熱欲冷地上卧及冷水加灯心竹茹煎神効方見諸淋門

(十八) **白虎湯** 治熱瘧表裏俱熱時時惡寒大渴口乾燥加人參二錢或有汗者宜服方見暑門

【冷證】 **生熱附子湯** 分利陰陽止寒熱治瘧疾欲作胷痞痰嘔

(十九) 附子二隻一生去皮用一鹽湯浸去皮炮用

右各取二錢沉香木香水各一盞量七片棗七枚煎一盞當發日空心服亦宜以此下黑錫丹可以回元氣隧二痰

【痰證】 **勝金圓** 治一切寒熱瘧疾胷膈停痰發散不愈者(二十)

檳榔 四兩　常山 酒浸蒸焙一斤

右為末麪糊為圓如梧桐子每服三十圓於發前一日臨卧用冷酒吞下便睡至四更再用冷酒吞下十五圓至午方可食温粥忌食熱物并一切生冷一方用雞子清為圓

(二十一) **雄黃散** 治久瘧不能食胷中欝欝欲吐而不吐此藥吐之必愈

雄黃 巫帶 赤小豆

右為細末每半錢温水調下以吐為度

(二十二) 露姜飲 用生姜四兩和皮搗汁一椀夜露至曉空心冷服大治脾胃聚痰發為寒熱

食癆 紅圓子 專治食癆 (二十三)

青皮炒三兩 阿魏醋化一分半 京三棱醋煮胡椒一兩 蓬术二兩

右為末別用陳倉米同阿魏醋煮糊為圓如梧桐子每服五十圓至一百圓淡姜湯下或因食生菓成癆用麝香為衣吞下

(二十四) 清脾湯 治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴四兩製 烏梅去仁 半夏湯去滑 青皮良薑各二分 草菓去皮 甘草酸半

右㕮咀每服四分水一盞姜三片棗二枚煎七分未發前併三服忌生冷油膩之物

瘴癆 (二五) 地龍散 治瘴癆及諸癆大熱煩燥

生地龍三條研爛入生姜汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱熾加腦子小許更効

(二十六) 定斎菓飲子 快脾治癆

草菓仁 蒼术油浸 厚朴姜製 烏梅各等分 半夏麴 甘草

右㕮咀每服半兩水盞半姜五片棗二个同煎七分不拘時寒多者加乾姜附子熱甚者止加柴胡瘴癆加檳榔

鬼癆 麻黃桂枝湯 治癆疾寒熱證而夜發名曰鬼癆 (二十七)

麻黃去節 桂枝 炙甘草三分 黃芩五分

桃仁三十个去皮尖

右為末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪也

久癆 人參養胃湯 方見傷寒門 治癆疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後用四獸飲之類截之因食倍加草菓 (二十八)

(二十九) 柴胡桂姜湯 治癆疾寒多微熱或但寒不熱并治勞癆

柴胡四兩　桂枝去皮兩半　黃芩一兩半　瓜蔞根二兩
牡砺碎炒　甘草炙　乾姜各一兩
右�once咀每服五分水一盞半煎八分温服

〔二十〕灸法　治瘧疾久不愈不問男女於大椎中第一骨節尽處先針後灸三七壯立効或灸第三骨節亦可

〔二十一〕碧霄丹　治久瘧不愈者
東方甲乙木巴豆取肉去油別研細
南方丙丁火官桂去皮
西方庚辛金白礬別研細北方壬癸水青黛別研細各等分
右於五月一日修治了用紙各裹以盤盛依前方位排定勿令猫犬及婦人見之安頓神佛前至端午日午時用五家粽尖和前荼令勻圓如梧桐子令患者以綿裹一圓塞於鼻竅中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除

〔二十二〕葛栗飲　治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾
紫蘇葉　草菓仁　良薑炒　青皮去白炒　甘草炒　白芷各等分
右�once咀每服四錢水一盞煎七分熱服

勞瘧　常山飲　治瘧疾發散不愈漸成癆瘵〔二十三〕
知母　川常山　良薑二十兩　甘草炙一斤　烏梅去仁一斤
右�once咀每服水一大盞姜五片棗一枚煎七分温服

虛瘧　分利順元散　治體虛之人患瘧寒多不可服截藥者
川烏　附子各一兩　南星二兩　木香五分仲別入　刻時
右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟合和�once咀每服四分棗七枚生薑十片水一盞煎七分當發前一日及當發日早晨連進二三服半生半熟能分解陰陽也

三十四 七棗湯 治五臟氣虛陰陽相勝作爲疫癘發作无時或寒多熱少或單寒者

附子一枚炮裂以鹽水浸一宵炮如此七次不浸去皮臍方又用川烏代附子以水調陳壁土爲糊炮浸七次

右�once咀分作二服水一椀姜七片棗七个煎七分當發日凌晨空心温服未夕再進一服

三十五 棗附湯 治気虛癘疾寒多熱少或單寒者

棗仁 附子炮去皮臍各等分

右�once咀每服半兩水一盞姜七片棗一个煎服不拘時

三十六 四將軍飲 治寒熱疝疾作而仆厥手足俱冷皆不知人此雖一時救急之方用之有驗

附子一个去皮臍炮 訶子四个去核 陳皮四个淨洗 甘草四寸炙

右�once咀爲四服每服水一盞半姜七片棗七枚煎取一半令熱灌病者立可甦省

三十七 大已寒丸 治瘧疾久虛每發極寒極熱既退則汗出如雨生姜杵膏湯吞一服不作方見泄瀉門

瘧母 鼈甲飲子 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母

鼈甲醋炙黃者去裙 白芍藥 草果仁 厚朴姜製炒 檳榔 橘紅 川芎 甘草炙各等分

右�once咀每服四分水一盞姜七片棗一枚烏梅少許煎七分温服不拘時

三十八 老瘧飲 治久瘧結成癥瘕痞癖在胷脇諸藥不愈者

蒼朮泔浸 青皮 川芎各二分 草果去皮 茯苓 桔梗 乾薑炮各三分 陳皮 良薑各半兩 白芷 桂心 半夏湯去滑 枳殼麩炒 甘草炙 紫蘇葉各二分

右�once咀每服四分水一盞鹽少許煎七分空心服

截法 四十

右用狗蝨一隻去翅足以蝎頭之作一丸當發日冷酒吞下

(四十一) 辰砂丸 治一切脾胃虛瘧邪熱毒者

信砒 甘草各乙分 硃砂二分 大豆四十九粒

為末滴水和丸分作四十丸當發日日欲出煎桃心湯下忌熱物

(四十二) 瘧神丹 治諸般瘧疾

信砒一兩 雄黃一分

右以五月五日用粽子尖左右研三千下日未出不令鷄犬婦人見丸如桐子大未發前一日面東冷水下一丸

(四十三) 七宝飲 治一切瘧疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如瘧等證

厚朴姜製 陳皮 甘草炙 草果仁

常山雞骨者 檳榔 青皮各等分

右㕮咀每服五分水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心向東溫服睡少頃時須忌熱物寒多加酒熱多加水

(四十四) 治瘧疾良方 今人治瘧疾多用常山砒霜之類發吐取涎縱使得安脾胃不能不損不若此茶最為穩當

辰砂光明者阿魏真者各一兩

右研勻和稀糊丸如皂角子大每服一圓空心人參湯化下

痢

今人患痢者古方謂之滯下是也得病之由多因脾胃不和飲食過度停積于腸胃之間不得宣化而又為風寒暑濕之氣干之故為此疾傷熱下痢則赤傷冷則白傷風純下清血傷濕則下如豆羹汁冷熱交併赤白兼下又有如魚腦髓者治法當先用通利之茶疎滌臟腑積滯然後辨以冷熱風濕之證用茶調治熱赤者清之冷白者溫之風濕者分利之冷熱相兼者溫涼

以調之仍須先調助胃氣切不可驟用墨粟殼訶子之類止瀉之便停滯不能疎泄未有不致危者凡下痢之脉宜微小不宜浮洪宜濇大不宜弦急身寒則生身熱則死間有瘧痢兼作者惟當分利陰陽理脾助胃因毒物致痢者宜解之不可槩而論

〔風〕〔胃風湯〕治大人小兒風冷乘虛客于腸胃水谷不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

白朮　白芍藥　川芎　人參
當歸去苗　肉桂去皮　茯苓去皮各等分

右㕮咀每服四錢水一盞入粟米百餘粒煎服〔四十五〕

〔寒〕〔不換金正氣散〕治臟腑受寒下痢赤白加烏梅陳米煎方見傷寒門〔四十六〕

〔椒艾圓〕治臟腑虛寒泄痢不止〔四十七〕

烏梅去核二兩半醋浸布裹蒸搗成無滓艾一兩半

川椒炒去目　乾姜　赤石脂　黑附子炮各一兩

右除烏梅外同為細末將蒸過烏梅肉研勻更入熟蜜肉蜜少許丸如梧桐子每服二十丸米飲下

〔暑〕〔六和湯〕治冒暑者伏熱煩悶煩渴小便赤方見泄瀉門〔四十八〕

〔生料五苓散〕方見中暑門治伏熱下痢分利陰陽〔四十九〕

〔黃連香薷散〕方見中暑門治感暑下痢鮮血〔五十〕

〔濕〕〔芍藥糜皮丸〕治一切濕熱惡痢頻併窘痛無問膿血並宜服之〔五一〕

芍藥　黃糜各一兩　當歸　黃連各半兩

右為末水丸小豆大溫水下三四十丸無時兼夜五六服

〔戊己丸〕治脾經受濕泄利不止米穀不化腑腹刺痛〔五十二〕

黃連去鬚　吳茱萸去梗炒　白芍藥各五兩

右為末麪糊丸如梧桐子每服三十丸米飲空心下

五三 小承氣湯 治下痢赤黄但煩喜飲冷小便不利得熱則極煩躁渴甚先服此一二服蕩之

五四 小柴胡湯 治下痢赤白心中煩燥潮熱渴者加赤芍地榆麥門冬淡竹葉煎已上二方並見傷寒門

五五 酒蒸黄連丸 治身熱下痢鮮血煩躁渴多方見積熱門

五六 三味黄丸子 止諸痢

黄連 八兩 枳殼 四兩 大黄皮栢 四兩

右件為細末麪糊為丸空心飯湯下如裹急後重加枳殼湯下

五七 大斷下丸 治臟腑停寒腹疼痛下利不已

高良姜 去芦 兩半 牡砺 火煅一兩 細辛 去土 七分半 龍骨 研一兩半 赤石脂 研一兩半 白礬 枯一兩 肉豆蔻 麪裹煨 訶子 煨去核 各一兩 酸石榴皮 去穰淨米醋浸一宿取炙令焦黄色二分 附子 炮去皮臍一兩 乾姜 炮一兩半

右為末醋煮麪糊丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下

五八 當歸圓 治冷留腸胃下痢純白腹痛不止

當歸 去芦酒浸 芍藥 乾姜 炮 厚朴 姜製炮 附子 白朮

右為末醋糊丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下

五九 豆蔻圓腸 治脾胃虚弱臟腑頻滑下痢亦白

木香 赤石脂 縮砂 厚朴 姜製炮 肉豆蔻 麪裹煨各一兩

右為末麪糊和丸如梧桐子每服六十丸空心米飲下

六十 木香散 治脾胃虚弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍下疗痛腹中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁

木香 附子 去皮臍各一兩 訶子皮 半兩 縮砂 厚朴 姜製炮 乾姜 甘草 炙 當歸 去芦焙 肉豆蔻 各一枚 丁香 二兩 赤石脂 洗焙四兩

右㕮咀每服三分水一盞煎至六分去滓空心温服

六十一 **調榮散** 治脾胃虛弱內挾冷氣心脇刺痛嘔吐惡心腸鳴泄利水谷不化漸成痢疾

青皮去穰　肉豆蔻仁麪煨　肉桂去皮五分

附子炮去皮臍　訶子仁各四兩

右為末每服三分水一盞半姜三片煎七分食前温服

六十二 **香茸丸** 治血氣衰弱下痢危困

麝香半分別研臨時入　鹿茸搥去皮毛酥炙一兩

右鹿茸為細末方入鹿麝香以燈心煮棗肉為丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下每料添滴乳香半兩尤好

六十三 **固腸湯** 治冷熱不調下痢赤白

罌粟殼二兩浸炙　醋枳殼麩炒　白芍藥各二兩　陳皮　訶子

白姜炮各半兩　甘草各一兩　人參一兩　木香五分

右㕮咀每服四分水一盞煎七分空心温服

六十四 **真人養臟湯** 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦髓裏急後重臍腹疼痛如脫肛墜下酒毒便血並治之

罌粟殼去蒂蓋蜜炙三兩　木香一兩四分不見火　肉豆蔻麪裹煨半兩

肉桂去皮八分　訶子皮去核一兩二分　人參去芦　當歸去芦洗各六分

白朮煨六分　白芍藥一兩八分炙

甘草一兩

右㕮咀每服四分水一盞煎服臟寒者加附子

六十五 **澁腸散子** 治丈夫婦人遠年近日赤白下痢

黃柏皮去皮甘草炙　枳殼去穰　罌粟殼去蒂蓋

御米即罌粟子各四兩　當歸去芦　乾姜炮各二兩

右㕮咀每服三分水一盞煎白二條擘碎同煎空心服

六十六 **地榆散** 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤多白少或純下鮮血裏急後重小便不利

地榆炒　乾薑炮二兩　當歸去芦三兩

茯苓去皮　赤芍藥酪六　甘草炙四兩　鼈甲殺蜜炒十二兩
右爲末每服二錢用溫酒熟水調下不拘時服若下痢純白及
紫黑血并腸滑不禁者不可服之

六十七　神效參香散　治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成
痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤
白相雜裏急後重日夜頻數無問新舊此能治之

白扁豆炒　人參去芦　木香各二兩　茯苓去皮
肉豆蔻煨格四兩　陳皮去白　鼈甲去蒂各十三兩
右爲末每服三大錢用溫米飲調下不拘時服

六十八　黃連解毒湯　治熱痢純血方見傷寒門

六十九　槐花散　治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮　槐花　荆芥穗
右爲末水煎空心熱服

七十　木香散　治陳年痢不止并治血痢尤佳

木香用黃連半兩各對炒　甘草炙一兩　鼈甲殺剉明生姜半兩同炒
右爲末入麝香少許每服二錢陳米飲下此方佛智和尚傳

七十一　烏梅圓　治熱留腸胃腹疼痛下痢純血或過服熱藥
致毒子內滲成血痢並能治之

烏梅肉二兩　黃連去須二兩
右爲末醋糊圓如梧桐子每服七十圓空心米飲下

七十二　異香散　治七情憂慘鬱氣滯不散腹中脹滿刺痛下
痢不止方見氣門

當歸去芦　枳殼去瓤麩炒各一兩

七十三　牛乳湯　治氣痢洩如醬汁

童便二分　牛乳半升
右同煎減半空心服

七十四　木香流氣飲　治証同上方見氣門

積痢 蘇感圓 去臟腑有積下痢以蘇合香圓治感應圓二条和勻元如粟米大每服五十圓淡姜湯空心下 七十五

七十六 靈砂丹 治一切積痢

硃砂 研細 各二分半

右用黃蠟半兩巴豆三七粒去殼皮膜同於銀石器內重湯煮一伏時候巴豆紫色爲度去二七粒止將一七粒与前藥二味同研極勻再溶蠟圓藥每炮圓豪豆大每服三圓至五圓水瀉生姜湯下白痢艾湯亦白痢烏梅湯服時須空心服單一時不可噢食物若麄痢乳香湯下

禁口 痢疾不納飲食者俗謂之禁口今人多以四柱散理中湯參苓散加肉豆蔻木香或噤震靈丹等藥調之恐非其治當以脉證辨之如脾胃脉不弱問而知其頭疼心煩手足温熱未嘗多服涼藥著此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜用敗毒散加石蓮肉 方見傷寒門 治下痢熱毒衝心不進飲食

腹痛 八十 姜茶方 治痢下腹痛不止肚皮熱手不可近用生姜切碎如粟米大草茶相等煎服效又方煮茶白痢用蜜赤痢用姜若未効用 真人養臟湯 加楊芍藥當歸立止方

散每服四仌重陳倉米一百粒姜三片棗一枚水一盞半煎八分温服若其脉微弱或心腹虛膨手足厥冷初病則不嘔因服罌粟烏梅苦澁涼劑太過以致閉食先嘔此乃脾胃虛弱一方用小藥一味判如小豆大一半銀石銚內炒熟一半生用同爲末飯飲調下 七十七

七十八 治禁口痢

石蓮槌碎去殼留心并肉碾爲末每服二錢陳米飲調下此疾蓋是毒氣上衝心肺借此以通心氣便竟思食

七十九 敗毒散 加石蓮肉 方見傷寒門 治下痢熱毒衝心不進飲食

每治人下痢腹痛此二方甚効如未効用香連圓良方見後

(八十一) 聖棗子 治一切下痢腹痛

木香二分半 乳香別研 沒藥別研各 肉豆蔻二枚麪裹煨

右爲末每服一分入乾棗一枚去核先入一半藥末在內次入水浸巴豆半粒再入藥末半分合定用油餅麪裹一指厚火煨麪熟爲度去麪并巴豆不用只細嚼棗藥米飲空心下

毒痢 苦根圓 治一切毒痢及蠱注下血如雞肝心煩腹痛

苦根洗 川升麻 犀角鎊 當歸去芦洗 黃連去須 枳殼去瓤麩炒 白芍藥各等分

右爲末醋煮米糊爲丸如梧桐子每服七十圓空心米飲下

休息痢 (八十二) 姜茶圓 治休息痢大效

乾姜炮 建茶各等分

右以烏梅取肉丸如梧子大每服三十丸食前米飲下

(又方) 用多年苦楝粉陳倉米飲調下每服二錢効

通治 治赤白痢 (八十四)

吳茱萸揀淨 黃連去須各等

右爲一處以好酒浸透取出各白揀焙或曬乾爲末糊圓如梧桐子赤痢用黃連圓三十粒甘草湯下白痢用茱萸圓三十五粒和合併甘草乾姜湯下十粒乾姜湯下赤白痢各用十五粒

(八十五) 香連圓 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連去芦一十兩用吳茱萸十兩令赤色去茱萸不用 木香四兩八分不見火

右爲細末醋糊爲圓如梧桐子每服二十元空心飯飲下

(八十六) 水煮木香圓 治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

罌粟殼去穰一兩八分青皮去白二兩 木香不見火六兩 當歸洗去芦六兩 訶子炮去核八兩

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓水八分盞煎化温服

(八十七) 駐車圓 治一切下痢無問冷熱
阿膠搗碎炒如珠子 為末十五兩以醋四升熬成膏
黃連去須十兩 當歸去芦十五兩 乾薑炮十兩
右為末以阿膠膏圓如梧桐子每服三十圓食前米飲下

(八十八) 黃連阿膠圓 治冷熱不調下痢赤白裏急後重腹疼痛口燥煩渴小便不利
阿膠炒二兩 黃連去須三兩 茯苓去皮二兩
右黃連茯苓同為細末水熬阿膠膏搜和元如梧桐子每服三十圓溫米飲空心下

(八十九) 阿膠梅連丸 治下痢無問久新赤白青黑疫痛諸證
金井阿膠淨草灰炒透明白別研不細者再炒研 烏梅肉去核炒 赤芍藥
黃蘗剉炒 黃連 乾薑炮 當歸焙 赤茯苓各等分
右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十丸食前

兼夜五六服小兒丸如菉豆忌油膩胎肥諸物也

嘔吐

人身以胃為主賴之以容受五穀但有所傷非下能食且有嘔吐之患故胃虛之人或為寒氣所干或為飲食所傷或氣結而痰聚皆能令人嘔吐又有瘀血停積胃口嘔吐之間雜以涎血當辨其脉證施以治法中寒則脉沉緊四肢厥冷飲食不下當以温暖之藥調之挾暑則脉弦數煩躁而渴又當清涼之停食則消化之痰聚則順氣滯胃停積者多由憂思過度損傷經絡其脉實大者難治虛細者易愈嘔吐之證名狀不一至若胎氣內攻婦人懷妊中毒因酒俱有嘔吐又須各從其類以求之此證決不可輕用利藥唯腹滿膨脹視其何部不利然後利之三因詳論及此不可不審

傷風 九十 藿香散 治風邪入胃嘔吐自汗或身疼
人參 半夏 官桂 粉草
厚朴 藿香 陳皮 芍藥各等分
右剉散每服四錢生姜五片紅棗一枚煎服養胃湯兼用效

感寒 藿香半夏散 治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐 九十一
半夏湯洗七次炒黃色二兩丁香皮半兩藿香葉一兩
右㕮咀每服三分水一盞薑七片煎七分食前溫服

九十二 丁香半夏圓 治胃寒嘔吐吞噦酸水
丁香不見火 乾薑炮 半夏湯洗七次各二兩 白朮一兩半 橘紅一兩
右爲末生薑自然汁打糊圓如梧桐子每服五十圓薑湯下

九十三 理中湯 方見中寒門 專治胃虛感寒嘔吐不止

伏暑 九四 五苓散 治伏暑嘔吐不止藿香煎湯調下未効用生姜汁調下或消者丸以姜湯下方並見暑門

九十五 香薷散 方見中暑門 治伏暑嘔吐

受濕 九六 加味治中湯 治躰虛感冒雨濕嘔吐
人參 白朮 乾姜 青皮
陳皮各一兩半夏 藿香各五錢 甘草三錢
右剉每服四錢生姜五片棗一枚煎服

九十七 藿香安胃湯 治嘔吐不止
藿香葉乙兩半夏二兩 陳皮去白二兩 厚朴乙兩姜製
蒼朮三兩 甘草二兩炙
右爲粗末每服五錢水一盞半生姜五片棗二枚同煎去滓溫服

七情 九八 藿香正氣散 治七情傷感氣鬱結氣嘔大効方見傷寒門

九十九 大藿香散 治七情鬱結氣嘔大効方見傷寒門
眩暈痞滿不進飲食

白茯苓去皮 桔梗去芦炒 白朮 官桂不見火 甘草炙各半兩
木香不見火 枇杷葉去毛 人參 藿香葉 半夏麴
右為末每服三分水一盞薑五片棗一枚煎七分温服

痰證 旋覆花湯 治中脘伏痰吐逆眩暈 一百
旋覆花去梗半夏湯洗七次 橘紅 乾薑炮各一兩
檳榔 人參 甘草炙 白朮各半兩
右咬咀每服四分水一盞薑七片煎服不拘時

食傷 安脾散 治停飲傷胃以致食噎醋酸嘔吐黄水不已
高良薑一兩以百年塵壁土和水煮乾切片南木香
草菓麪煨 人參去芦 陳皮去白各半兩 甘草炙一兩半
丁香 胡椒 白茯苓 白朮各一兩
右為末每服二大錢空心米飲入塩點服塩酒亦可 百一

熟証 竹茹湯 治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止 百二

葛根三兩 半夏湯洗七次二兩 甘草炙一兩
右咬咀每服四分水一盞入竹茹一小塊薑五片煎七分取
清汁冷服不拘時

冷證 丁香煮散 治脾胃虚冷嘔吐不食 百三
丁香不見火 紅豆去皮 甘草炙 益智去皮五兩半 青皮去白
川烏炮去皮 陳皮去白 良薑炮各一兩 胡椒二兩 乾薑炮
右咬咀每服三分薑三片塩一撮煎七分空心熱服

百四 丁附治中湯 治胃冷停痰嘔吐不已
丁香 甘草炙 青皮炒
人參各半兩 附子炮 陳皮炒
右咬咀每服四分水一盞薑五片煎八分空心熱服

百五 王浮園 治男子婦人脾胃虚弱一切嘔吐
白殭蠶炒去絲 白朮 乾薑炮 人參 半夏湯洗七次

肉豆寇麵裹煨 橘紅 白豆寇仁 丁香 甘草
附子 木香 南星 麥蘗 檳榔 各等分
右為末入生麪一分拌勻用生薑自然汁搜和入百沸湯內
煮令浮亟和園藥如梧桐子每服五十園薑湯吞下不拘時
病甚者不過三服惡熱藥者去附子大便秘者除肉豆寇

百六 胃丹 治真陽虛憊心火怯弱不養脾土冲和失布胃氣
虛寒胷膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消痰逆惡心嘔吐
不已一應脾胃虛弱嘔吐將成翻胃之證並皆治之
朱砂大兩不夾石者五十兩 高良薑劉炒紅豆 莪茹 胡椒
橘紅 各四兩 乾薑炮 附子炮 白豆寇仁 益智仁
丁香不見火厚朴姜製 藿香葉 白朮 草菓仁
新羅人參 縮砂仁 肉豆寇 五味子 麥門冬去心 各二兩
右將人參等二十味各如法修製劉如豆大以銀石鍋用白

沙蜜五斤將藥一半同蜜拌勻入銀石鍋內以夾生絹袋盛
貯朱砂懸於其內以柔柴火重湯煮四日四夜撈審五斤入
前藥一半和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙乾入乳鉢內用
玉鎚研十分細以米粽為園如菉豆大陰乾每服十粒加至
十五粒空心用人參湯下棗湯亦可如或嘔吐用淡薑湯下
忌食猪羊等物

百七 養胃湯 治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐
丁香 縮砂仁 白豆寇 人參 麥牙 粉草炙
沉香 肉豆寇 炮附子 橘紅
右為細末姜鹽湯調下

百八 四君子湯
茯苓 白朮 人參 黃芪各乙兩
右剉如麻豆大每服一兩水三錢生姜五片煎至一錢去滓温服

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉浮者加桂五錢○如吐瀉轉筋頭痛無汗脉浮者加麻黄五錢

通治 百九 青金丹 治一切嘔吐

硫黄一兩　水銀半兩

二味同入乳鉢内擂至黑色不見星以姜汁作糊丸如小豆大每服二三十九米飲下

百十 生姜橘皮湯 治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮四兩　生姜半斤

右�once咀每服水七盞煮至三盞去滓逐旋温服

名方類證醫書大全卷之四

名方類證醫書大全卷之五

泄瀉

泄瀉之證經中所謂飧泄濕泄洞泄濡泄溢泄水穀注下是也大腸爲五穀傳送之官脾胃虚弱飲食過度或爲風寒暑濕之氣所中皆能令人泄瀉如傷於風其脉必浮下必帶血當以胃風湯等驅散之如寒氣所傷脉必沉細腹肚切痛下必青黑當以附子理中湯治中湯等温暖之若傷於暑則脉沉微煩渴引飲其下如水當以五苓散來復丹以分利之或夾食則又當以胃苓湯下蘇感圓若濕氣所中其脉沉緩腰脚冷痺小便自利不瀉其下黄黑色當以滲濕湯藿香正氣散調之因停食而泄者下必臭類抱壞雞子或噫氣作酸先服感應圓推其食積而

後理脾氣體虛弱及年高之人脾氣虛敗而自利者又當投以四柱散寇附圓若脾腎氣虛清晨泄下一二次二神四神圓主之又有腎氣虛而泄者又須金鎖正元丹以固之凡治瀉之法先理其中焦分利水穀然後斷下竪之大法如此若肺氣泄瀉各以類求滑泄一證最已心五虛五虛者脉細皮寒少氣前後泄利飲食不入者是也若得糜粥入胃泄瀉止則可治也

風 (一) 胃風湯 大人小兒風冷乘虛客于脾胃水穀不化泄瀉注下腹痛不止方見前門

(二) 火炊圓 治風氣入於腸胃泄瀉下已

火炊草為末酯糊丸梧子大每服三十丸空心米飲下

寒 (三) 理中湯 方見中寒門 治臟腑停寒泄瀉不止

(四) 大藿香散 治一切脾胃虛寒嘔吐霍乱心腹撮痛如泄瀉不已最能取效

陳皮去白炮炙 白乾姜炮半 藿香葉 青皮去麩炒 木香 人參去芦 肉豆寇去麩煨 良姜炒 大麥蘗炒 神麯炒 訶子煨去核 白茯苓 甘草炒 厚朴姜炒各一双

右為末每服四分吐逆泄瀉不下食或嘔酸苦水用水一盞煨生姜半塊盞一捻煎服水瀉滑泄腸風臟毒陳米飲入鹽熱調下赤白痢甘草黑豆湯下脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作暈入鹽少許嚼姜棗湯熱服胃氣吃噫生姜自然汁一呷入鹽點服此茶大能消食順氣利膈開胃

暑 加味五苓散 治伏暑發熱及冒溫泄瀉或煩渴小便不利

赤茯苓去皮澤瀉 木豬苓去皮 肉桂不見火 白朮各一兩 車前子半兩

右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎至八分溫服不拘時或噦下來復丹亦好

六 六和湯 治心脾不調氣不外降霍亂嘔吐或致泄瀉寒熱交作小便赤澁

縮砂仁 半夏泡七次杏仁去皮尖人參 甘草各一兩赤茯苓去皮藿香葉去土白扁豆 木瓜各二兩香薷 厚朴姜製各四兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服不拘時

七 胃苓湯 治傷暑煩渴引飲所下如水

五苓散 見暑門 平胃散 見脾胃門 二散和勻

各一錢合和烏梅湯下未効加木香砂仁丁香煎服來復丹

八 五苓散 去桂治伏暑泄瀉渴欲飲水或車前子煎湯調下

九 水浸丹 治伏暑煩渴瀕瀉方見霍乱門

十 來復丹 方見中暑門 治伏暑泄瀉

濕

十一 藿香正氣散 方見傷寒門 治感濕泄瀉

十二 戊己圓 方載痢門 脾胃不足濕熱泄瀉不止米谷不化

十三 麴蘗圓 治臟腑受風濕泄瀉不止

芎藭 神麴 白朮 附子各等分

右為末糊圓如梧桐子每服五十圓米飲下

熱證

十四 黃連香薷散 治熱瀉煩渴溏利大便熱煩燥小便赤喜飲冷香薷散每一兩加宣連伍錢燈心二十莖車水一盞煎一盞或車前草二根同煎

十五 一元散 五苓散 去桂皆治熱瀉煩渴三方並見暑門

冷證

十六 椒文圓 方見痢門 治臟腑虛寒泄瀉不已

十七 四柱散 治元臟氣虛真陽耗散腑腹冷痛泄瀉不止

白茯苓去皮附子炮去皮人參 木香濕紙裹火煨

右等分㕮咀每服四錢水一盞姜五片鹽少許煎七分空心温服一方加肉豆蔻訶子名六柱散

(十八) **豆附圓** 治腸胃虛弱內受風冷水谷不化泄瀉注下

肉豆寇麪煨四兩 木香不見火二兩 白茯苓焙四兩 乾姜炮
肉桂 各二兩 附子炮去皮臍四兩 丁香不見火一兩

右爲末姜汁麪糊圓如梧桐子每服五十圓至百圓用生姜
湯下粥飲亦可

(十九) **大已寒圓** 治沉寒痼冷臟腑虛憊心腹疠痛脇肋脹滿
泄瀉腸鳴白利白汗

葷蒺 肉桂 各四兩 乾姜炮 高良姜 各六兩

右爲末水煮麪糊圓如梧桐子每服三十粒空心米飲下

(二十) **厚腸圓** 治泄瀉不止

白龍骨 乾姜炮 附子炮去皮臍 厚朴姜製
訶子炮去核肉豆寇麪煨 陳皮 各等分

右爲末酒糊圓如梧桐子每服五十圓米飲下

(二十一) **火輪圓** 治腸胃虛寒心腹冷痛泄瀉不止

乾姜炮 附子炮去皮臍肉豆寇麪裹煨 各等分

右爲末米糊爲圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

(二十二) **禹余粱圓** 治腸胃虛寒滑泄不禁

禹余粱石煅 赤石脂煅 龍骨 葷蒺
訶子麪裹煨乾姜炮 肉豆寇麪煨 附子炮去皮臍 各等分

右爲末醋糊圓如梧桐子每服七十圓空心米飲下

(二十三) **吉附圓** 治臟腑虛寒泄瀉不止氣躰羸困不進飲食

肉豆寇麪煨 附子炮 良姜炒 訶子麪煨
乾姜炮 赤石脂煅 龍骨生用
白礬 枯 各二兩 白茯苓去皮 陽起石煅 細辛洗 各一兩

右爲末酒煮麪糊圓如梧桐子每服七十圓空心米飲下

(二十四) **訶黎勒圓** 治大腸虛冷泄瀉不止脇腹引痛飲食不下

右爲末挂心不見火

訶黎勒麪煨附子炮 肉豆寇麪煨木香不見火
吳茱萸去梗炒 龍骨生用 白茯苓去皮 蓽茇各半兩
右為末姜煮糊圓如梧桐子每服七十圓空心米飲下

脾泄 二五 六君子湯 治臟府虛怯嘔吐不食腸鳴腹脹脾泄
四君子湯加肉豆寇訶子各等分 方見脾胃門

二六 二神圓 治脾腎虛弱全不進食
破故紙炒四兩 肉豆寇二兩生
右為末以大肥棗四十九枚生姜四兩切同煮棗爛去姜取
棗肉研膏入藥和圓如梧桐子每服五十圓鹽湯下

二七 四神圓 治脾泄腎泄
肉豆寇生二兩 破故紙炒四兩 木香不見火半兩 茴香一兩炒
右為末生姜煮棗肉為圓如梧子大鹽湯下一方去木香茴
香入神曲麥糵如前作圓

腎泄 二八 五味子散 治五更天明溏泄一次名腎泄感陰氣
而然
五味子二兩吳茱萸半兩
右同炒香研為末每服二錢陳米飲下空心服或加破故並
炒香肉豆寇煨同為末蒜丸如梧子大每服三十丸米飲下

二九 金鎖正元丹 治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛
冷之證並治之
五倍子 茯苓各八兩 龍骨煅別研 朱砂別研各三兩
紫色戟去心十六兩 補骨脂酒浸炒十兩 肉蓯蓉洗焙 葫芦巴炒各一斤
右為末入研藥令勻酒糊圓如梧桐子每服三十圓空心溫
酒鹽湯任下

滑泄 三十 豆寇圓 治腸胃滑泄
陳米一兩 赤石脂研 五味子各半兩 肉豆寇煨半兩

右爲末每服二錢粟米湯調下日三

三十一 補脾圓 治滑泄不禁

附子 炮去皮臍半兩 赤石脂 麥蘗各炒 肉豆蔻麪煨 川厚朴去皮薑製 川白姜炮 各半兩 人蔘 神麪 白朮各半兩

右爲末醋糊圓如梧桐子早晚空心五十圓米飲下

三十二 肉豆蔻散 治脾胃虛弱腹脇脹滿水谷不消臟腑滑泄

蒼朮米泔浸切八兩 乾姜炮 肉桂去皮 肉豆蔻麪煨 厚朴去皮姜制 川烏炮去皮尖 陳皮去白各四兩 甘草 訶子皮各二兩

右爲末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎八分温服

三十三 真人養臟湯 治滑泄不止方見痢門

三十四 固腸圓 治滑泄日夜無度

吳茱萸 黃連 罌粟殼去蒂各等分

爲末醋糊丸梧子大每服三十丸空心米飲下

暴瀉

三十五 硫黃散 治所下如破水

生硫黃 白滑石

右爲末温熟水調下立止

三十六 車前散 治暴瀉不止小便不通

車前子爲末每服二豕米飲調下根葉亦可立效

三十七 神麪圓 治暴泄不止

神麪二兩炒 茱萸半兩湯泡七次

右爲末醋糊丸梧子大每服四十丸食前米飲下

三十八 粟殼圓 治同上

肉豆蔻炮 粟殼去蒂蜜炙

爲末醋糊丸梧子大空心米飲下三十丸

通治

三十九 實腸散 治泄瀉不止

川厚朴製一兩半 肉豆蔻 訶子炮 茯苓各一兩 甘草四錢

縮砂　陳皮　蒼术各二分　木香半兩

右�once咀每服三分姜棗煎服手足冷者加炒乾姜

(四十) 茶艾湯傳九寶飲子 分利水穀止泄瀉

蜜栗殼炙青皮　粉草各二分半　厚朴姜製　陳皮

木通各一兩二分　赤茯苓去皮　車前子炒　黃芪微炒各三分

右�once咀每服三分水一盞煎七分温服

霍亂

霍亂之證多兼乎吐瀉皆由飲食不節或過飡脾胃乳酪之物傷于五臟停積胃脘脾弱不能運化又爲風寒之氣所干陰陽隔絶揮霍變亂而成此證輕則上吐下瀉兩脚轉筋甚者遍體轉筋腹肚疼痛手足厥冷若欲絶者倉卒之際宜於臍中灼艾又用蔥一把煎湯泡洗次投以姜附湯理中湯之類其脉洪大者易治脉微腎縮舌捲者難治又有霍亂而不吐瀉者止其類吐不吐類利不利頃刻之間便致悶絶當多灌鹽湯引其必吐宿食殆盡然後以嚴氏加減理中湯治中湯飲二調之既愈之後煩熱多渴者以麥門冬湯調之夏月中暑亦能令人霍亂吐瀉臨證又當詳審

(四十一) 通脉四逆湯 治霍亂多宗內冷脉絶

吳茱萸炒二兩　附子炮一兩去皮不見火　桂心去皮不見火　木通

細辛洗去苗土　甘草炙各半兩　當歸去苗二分

右�once咀每服四分水一盞酒半盞姜七片棗一枚煎温服

(四十二) 姜附湯 方見中寒門 治中寒霍亂轉筋手足厥冷

(四十三) 理中湯 方見中寒門 治中寒霍亂嘔吐

(四十四) 加減理中湯

若爲寒氣濕氣所中者加附子一兩名附子理中湯○若霍

乱吐瀉者加橘紅青橘各一兩名治中湯○若乾霍乱心腹作痛先以塩湯少許頻服候吐出令透即進此藥○若嘔吐者於治中湯内加丁香半夏一兩每服生姜十片同煎○若泄瀉者加橘紅茯苓一兩名補中湯○若渴泄不已者於補中湯内加附子一兩○不喜飲水穀不化者再加縮砂仁一兩共成六味○若霍乱吐下心腹作痛手足逆冷於本方内去白朮加熟附名四順湯○若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胷痞欲絶心膈高処急痛手不可近者加枳実茯苓名枳実理中湯○若渴者再於枳実理中湯内加火煅石膏一兩○若霍乱後轉筋者理中湯内加大腹皮官桂一兩半腎氣動也去朮加官桂一兩半腎惡燥故去朮恐作奔豚故加官桂○若悸多者加茯苓一兩若渴欲飲水者去白朮加附子一兩○若飲酒過多及啖炙

煿熱食發鼻衄加川芎一兩若傷胃吐血以此藥能中脘分利陰陽安定血脉只用本方

暑

四十五 **五苓散** 去桂姜煎治中暑霍乱吐利方見暑門

四十六 **黄連香薷散** 姜煎極冷服治中暑霍乱吐利方見暑門

四十七 **水浸丹** 治伏暑傷冷熱不調霍亂吐利口渴黄丹水飛一兩二分半炒 巴豆二十五个去皮心油

四十八 右同研勻用黄蠟鎔作汁和為丸梧子大每服五丸水浸半時別以新汲水吞下

四十九 **桂苓甘露散** 治冒暑霍亂方見暑門

枇杷葉散 方見中暑門 治中暑轉筋煩渴引飲

霍香正氣散 **黄連香薷散** 各相拌和姜葱煎服名二香散治暑溫相搏霍乱轉筋煩渴悶亂

濕

五十 **霍香正氣散** 方載傷寒門 治溫氣霍乱吐瀉

七情 七氣湯 治七氣鬱結五臟之間互相刑尅陰陽不和揮霍交亂吐利交作 (五十一)
半夏 湯洗五兩 厚朴 姜製 桂心 各三兩 白芍藥
茯苓 各四兩 紫蘇葉 橘皮 各二兩 人參一兩
右�once咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚煎空心熱服

食傷 (五二) 治中湯 治食傷吐瀉羞胃脘有寒 方見脾胃門

(五三) 又方 治傷食霍亂吐利以楠木同姜煎熱服効

煩渴 (五四) 秘方 淡木瓜枇杷葉同煎湯溫服

(五五) 既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠
人參 甘草 淡竹葉 炙各四兩
麥門冬 去心 附子 炮半兩半夏 湯洗五次
右�once咀每服四錢水一盞姜五片粳米百餘粒煎空心溫服

(五六) 麥門冬湯 治霍亂已愈煩渴多渴小便不利
麥門冬 去心 橘皮 半夏 白茯苓
白朮 各一兩 人參 甘草 炙 小麥 半合
右�once咀每服四錢水一盞姜五片烏梅少許煎八分溫服

(五七) 白朮散 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦
白朮 茯苓 去皮 人參 各半兩 甘草 乙兩半 炙
木香 乙分 藿香 半兩 葛根 乙兩
右爲末白湯調下二錢煩渴加滑石二兩甚者加姜汁續飲之

(五八) 益元散 治陽經發熱吐瀉煩渴不止方見暑門

轉筋 (五九) 木瓜湯 治霍亂吐瀉轉筋擾悶
酸木瓜 一兩 茴香 二分半 甘草 炙二分 呂茱萸 洗炒七次二兩
右�once咀每服四錢姜五片紫蘇十葉空心煎服

(六十) 又方 木瓜一把 濃煎水乘熱熏洗仍嚼薑湯一盞良

通治　不換金正氣散　方見傷寒門　治霍乱轉筋嘔吐泄瀉

六十一　姜鹽飲　治乾霍乱欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩　生姜半兩切

右同炒令色變以水一椀煎熟温服甚者加童子小便一盞

秘結

秘結之證不問氣虛体實之人攝養垂理三焦氣澁運掉不行雖結於腸胃之間皆有秘結之患有風秘寒秘氣秘熱秘濕秘及因病發汗利小便過多以致津液枯竭并婦人産後失血耗氣之餘皆成秘結但當審人氣體虛實脉息沉數若何然後用藥治療之法熱實者通利之寒虛者温行之氣結而澁者潤滑之風濕而秘者驅利之津液枯竭者補益之臨證更宜詳審虛實用藥不可一槩而論

實秘　六十二　牛黄散　治上焦熱藏府秘結

大黄乙兩　白牽牛頭末五分

右爲細末有厥冷用酒調下三錢無厥冷而手足煩者蜜湯調下

六十三　脾約麻仁圓　治腸胃熱燥大便秘結

芍藥　枳實麩炒各半斤　厚朴去皮姜製炒半斤

杏仁去皮尖炒五兩半　大黄蒸焙　麻仁別研五兩

右爲末蜜和圓如梧桐子每服二十九臨卧用温水下大便通利即止

六十四　橘核圓　治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便秘結

黄芩各一兩大黄蒸　麻子仁炒去殼別研　檳榔　白芷

枳實麩炒　羌活去芦　牽牛炒　人參半兩　杏仁

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服四十圓空心熟水下

六十五 潤腸五仁圓 治津液枯竭大腸秘澁傳導艱難

桃仁 杏仁 炒去皮尖各一兩 柏子仁 半兩
松子仁一分 郁李仁一分

右將五仁別研爲膏入橘皮末研勻煉蜜圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

六十六 半硫圓 治年高冷秘虛秘及痰癖冷氣

生硫黃 研細半夏 湯洗七次焙乾爲末各等分

右和勻用生姜自然汁打麪糊圓如梧桐子每服五十圓空心溫酒姜湯任下

六十七 潤腸圓 治發汗過多耗散津液大腑秘結

肉蓯蓉酒浸焙二兩 沉香 別研一兩

右爲末用麻子仁汁打糊圓如梧桐子每服七十圓米飲下

六十八 葱白散 治老人大便不通

葱白二莖 阿膠一片

右以水煎葱候熟不用却入阿膠溶化溫服

六十九 潤腸圓 治大便秘澁不通 防風各二分半

陳皮半兩 阿膠炒 杏仁炒去皮尖杓殼去殺炒 麻仁各半兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓蘇子湯煎米湯任下

七十 潤腸丸 治大腸風結氣澁

肥皂角五片醋炙焦去皮及子五片生用去皮及子二味共爲末以水一升揉取濃汁濾過慢火炒銀石器中熬成膏子入後藥

南木香一分 青橘皮乙分去白秤

檳榔乙分生用 陳橘皮乙分去瓤

右四味爲末和前皂角末令均却以皂角膏搜和成劑看得所後如桐子大每服三十丸空心溫水下

(七十一) 枳殼圓 治腸胃風氣壅盛大便秘實

皂角一挺去黑皮炙 枳殼去穰炒 川大黃二兩炒 羌活去芦 木香不見火 橘紅 桑白皮蜜炙 香白芷各二兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服七十圓空心米飲或薑湯下

(濕秘) 擣梢散 治腸胃受濕大便秘澁 (七十二)

檳榔不拘多少

右爲末每服二錢用蜜湯點服不拘時

(氣秘) 橘杏元 治老人氣秘大腑不通 (七十三)

橘紅取末 杏仁湯浸去皮尖各等分

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服七十圓空心米飲下

(七十四) 紫蘇麻仁粥 能順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁

右一味不拘多少研爛取濾取汁煮粥食之

(七十五) 三和散 治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不和心腹痞悶大便秘澁

羌活去芦 紫蘇去梗 宣州木瓜薄切焙

沉香各一兩 木香 白术 檳榔各七分半

芎藭三兩 甘草 陳皮各七分半 大腹皮炙一兩

右咬咀每服二錢水一盞盞煎六分不拘時

(七十六) 南木香元 治大便秘結

南木香不見火 槟郎 麻仁 枳殼

右等分先將枳殼去穰每个切作四片用不蛀皂角三寸生姜五片巴豆三粒略搥碎不去殼用水一盞將枳殼同煮和滾濾去生姜巴豆皂角並不用只將枳殼細剉焙乾爲末入前木香槟榔麻仁同爲末煉蜜爲丸蜜湯下不拘時候

(七十七) 四磨湯 治氣滯腹急大便秘澁有熱者加大黃枳殼名

六磨湯 方見喘急門

(七十八) 搗臍法 治大小便不通連根葱一二莖帶土生薑一塊深重叚二十一粒塩二匙同研爛捏作餅子烘熱搗臍中以帛札定良久氣透自通不然再稍換一劑

(七十九) 木香逐氣丸 治食積氣滯通利大便又治脚氣小腸氣諸氣攻刺腹痛

橘紅 枳殼 各半兩 南木香一分
巴豆肉一分半研如泥入藥夾研
為末姜汁調神麯末為糊丸如麻子大每服十丸姜湯下如氣攻腹痛枳殼木瓜湯下

(八十) 木香三稜散 治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生半炒大腹子炙用檳榔 木香 蕃丸
錫灰酷炒 三稜炒 蓬朮煨 大黃已上各乞兩

右為細末每服三錢空心用蜜水調下或沙糖水亦可須先將燒肉一片口半嚼之休歇片時吐出口中肉汁後服藥

(八十一) 潤腸湯 治大便秘澁連日不通

麻子仁一盞半淨研用水旋漉去滓取濃汁 桃仁湯浸去皮麩炒黃研如泥 荊芥穗搗未各一兩

右用前藥入塩少許同煎可以代茶飲之以利為度

(八十二) 順氣圓 治三十六種風

錦紋大黃五兩一半生用一半溫熟裹煨車前子二兩半 白檳榔二兩 火麻子仁炒赤色退殼用二兩別研入 川牛膝酒浸三分 郁李仁湯泡去皮別研 兎絲子酒浸焙乾別研為餅晒乾却入 乾山藥各二兩 山茱萸去核 防風去芦枳殼去穰炒 獨活各一兩

右為末蜜圓如梧桐子每服二十圓茶酒粥飲任下

九秘結服藥不得通利者宜用此以導之若土瓜根及大猪膽汁甘可爲導

蜜 四兩

右置銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦熱時急捻作挺子如指許長投於穀道中以手按住大便來時乃去之

咳欬嗽

肺爲五臟之華蓋聲音之所從出皮毛賴之而潤澤腎水由茲而生養腠理不密外爲風寒暑濕之氣所干皆能令人咳嗽傷風則脉浮增寒身熱自汗煩燥鼻引清涕欲語未竟而咳傷寒則脉緊無汗惡寒煩燥不渴遇寒而咳傷熱則脉數煩渴引飲咽膈乾燥咳唾稠粘傷濕則脉細咳則四肢重着骨節煩疼又有七情之氣傷于五臟六脉尅于肺經亦能致咳喜傷心者咳

而喉中介介如腫狀不已則小腸受之咳狀與氣俱失怒傷肝者咳而兩脇下痛不已則膽受之嘔吐苦汁思傷脾者咳而右脇下痛引至肩背不已則胃受之嘔吐痰沫憂傷肺者咳而喘息有声甚則唾血不已大腸受之咳則遺屎恐傷腎者咳而腰背相引痛不已則膀胱受之咳而遺溺咳而不已三焦受之咳則腹滿不欲食治療之法宜詳審其脉證若外感邪氣止當發散又須觀病者之虛實用藥若內因七情而得者又當隨其部經與氣口相應脉浮緊爲虛寒沉數爲實熱弦濇爲少血洪滑則多痰咳嗽之脉浮大者易治沉微者難愈大緊以順氣爲先下痰次之又有停飲而咳者又須消化之切不可輒用補藥最忌憂思過度等藥濫之又有寒邪未除者亦不可便用補藥最忌憂思過度房室勞傷否則多成瘵疾之證謹之謹之

治感冒風邪鼻塞声重語音不出咳嗽喘急

甘草不炙　麻黃不去節杏仁不去皮尖各等分
右㕮咀每服五錢水一盞薑五片煎服以得汗爲愈

(八十五) **細辛五味子湯** 治肺經感冒風邪咳嗽倚息坐臥不安
北細辛去苗半夏湯去滑各一兩甘草炙　烏梅去核各一兩半
罌粟殼去蒂五味子略三兩桑白皮炒二兩
右㕮咀每服三錢水盞半薑十片煎一盞溫服

(八十六) **大利膈丸** 治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻
牽牛四兩生用半夏湯洗二兩皂角去皮絲酥炙二兩
木香半兩青皮去白二兩槐角一兩炒　加枳殼　大黃各五兩
右爲細末生姜麪糊爲丸每服五十丸生姜湯下

(八十七) **怯痰丸** 治風痰喘嗽
人參　木香　天麻　槐角子　陳皮去白上各一兩
茯苓　青皮去穰白朮濃半夏　牙皂角去皮弦炙五錢

右爲細末生姜自然汁打糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸食後臨卧溫酒送下姜湯亦可

(八十八) **人參荊芥散** 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語不出咽乾項強鼻流清涕
麻黃去根節細辛去苗洗桔梗去芦炒荊芥穗陳皮去白半夏湯洗七次杏仁去皮尖人參　甘草炙各半兩通草
右㕮咀每服四錢水盞半薑五片煎八分食後溫服

(八十九) **橘蘇散** 治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱服杏子湯不得者
紫蘇葉　杏仁去皮尖　甘草炙半兩　白朮　橘紅
半夏洗七次桑白皮炙　貝母去心　五味子各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服不拘時

(九十) **王氏圓** 治風壅痰甚頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參去芦　乾薄荷　白茯苓去皮　白橘紅各枯
天南星米泔浸焙各三十兩　半夏湯洗七次姜汁和作麪六十兩
右爲末生姜汁煮麪糊丸如梧桐子每服三十丸食後姜湯下如痰盛燥熱薄荷湯下

感寒

九十二　五物湯　治感寒咳嗽喘息不得睡卧

麻黃不去節杏仁不去皮甘草生用荊芥穗　桔梗各等分
右㕮咀生姜三片同煎温服咽喉痛甚者煎熟後加朴消少許一方去桔梗荊芥用半夏枳實等分

九十三　華蓋散　治肺感寒邪咳嗽聲重胷膈煩滿頭目昏眩

紫蘇子炒　赤茯苓去皮　桑白皮
杏仁去皮尖炒　麻黃去根節各一兩　甘草炙半兩
右爲末每服二錢水一盞煎七分食後温服

九十四　金沸草散　方見傷寒門　治肺感寒鼻塞聲重咳嗽不已

九十五　款冬花散　治肺感寒邪咳嗽喘滿胷膈煩悶痰涎壅盛喉中哮呷鼻塞流涕咽喉腫痛

款冬花去梗子　甘草炙　半夏湯洗姜製　杏仁去皮炒各二十丸
麻黃去根節阿膠炒　貝母去心炒各二十丸　桑葉洗焙　知母
右㕮咀每服三錢水一盞姜三片煎食後温服

伏暑

九六　六和湯　治傷暑生痰喘滿加麥門冬烏梅煎就吞消暑丸方並暑門

受濕

九七　不換金正氣散　治傷濕四肢重着骨節疼痛洒淅咳嗽加木瓜煎方見傷寒門

九十七　白术湯　治五臟受濕咳嗽痰多氣喘身体重着脉來濡細

白术二兩　五味子　半夏湯洗七次
白茯苓去皮　橘紅各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四�therefore水一盞薑五片煎八分温服不拘時

七情 九 分心氣飲 治憂愁鬱結得嗽每服三錢加枳殼一錢五味二十粒煎

四時 九 敗毒散 方見傷寒門 治傷寒發熱咳嗽頭疼

一百 人參飲子 治感冒咳嗽寒熱雜盛

人參去芦 桔梗 半夏洗七次 五味子
赤茯苓 白朮各一兩 枳殼 甘草炙各半兩

右㕮咀每服三�therefore水一盞薑五片煎七分空心服治突聾暑加杏仁不去皮紫蘇各半兩

一百一 八味款冬花散 治肺經實熱不調涎嗽不已

款冬花洗焙紫菀茸 五味子 甘草炙各七�therefore半
桑白皮炒 麻黄去節 杏仁湯洗去皮炒 紫蘇葉各一兩

右為粗末每服五錢水盞半入黄蠟皂角子大煎一盞熱服

一百二 温肺湯 治肺虚感冷咳嗽吐痰

半夏 陳皮 北五味子 乾姜 辣桂
杏仁去皮尖各一兩 細辛

右㕮咀每服三錢薑棗煎服

一百三 加味理中湯 治肺胃俱寒咳嗽不已

甘草炙 半夏 茯苓
橘紅 細辛 北五味子 乾姜不炒 白朮

右㕮咀每服三錢薑棗煎食前服

一百四 温中化痰丸 治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心

青皮去白 良姜去芦炒 乾姜炮 陳皮去白各五兩

右為末醋麪糊丸如梧桐子每服五十丸米飲下不拘時
右為末每服二錢水一盞薑四片煎七分温服不拘時

(百五)温肺湯 治肺虛久畜寒飲發則喘嗽不能坐卧嘔吐痰沫不思飲食

白芍藥六兩　五味子去梗　乾姜炮　甘草炙各三兩　杏仁肉桂去皮　半夏煮焙　陳皮去白　細辛去芦二兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎八分食後兩服溫再煎一方去白芍藥細辛二味

(百六)胡椒理中圓 治肺虛感寒氣不宣通咳嗽喘急胷膈氣逆不進飲食嘔吐痰水

款冬花去梗　胡椒　甘草炙　陳皮去白　白朮五兩

蕳蔻　良姜　細辛去苗　乾姜各四兩

右爲末煉蜜圓如梧桐每服五十圓温湯酒米飲任下

(百七)易簡吉寧湯 治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積悉皆治療

人參　半夏　茯苓

甘草炙　官桂減半　芍藥　五味子

右㕮咀每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚姜五片煎至六分去滓服○若感冒得之加麻黄等分若脾胃素實者用御米殼去筋膜碎剉醋淹炒等分每服加烏梅一个煎服其効尤驗○嘔逆惡心不可用此○若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁入參倍麻黄芍藥如麻黄乾姜五味子各增一半名小青龍湯

(熟證)(百八)(緊死丸)治熱嗽辰時嗽酉時可安又治痰喘

枇杷葉　木通　款冬花

葉白皮等分大黄減半

爲末蜜圓雞頭大食後臨夜嚥化

(百九)貝母散 治證同上

知母　貝母巴豆七粒同貝母炒黑去巴豆不用各一兩
梨散飴糖一塊同煎服一方以二母為末入巴豆霜少許臨
卧用生姜二片薤葉亦定細嚼咽下

百十　小柴胡湯　治热嗽咳冷水而暫止者加桑白皮杏仁五
味子煎頻热加麥門冬嗜卧減食加白朮煎方見傷寒門

百十一　瀉白散　治肺臟氣实心胃壅悶咳嗽煩喘大便不利
桔梗去芦炒　地骨皮去木　甘草炙　瓜蔞子
升麻　半夏湯洗七次　杏仁去皮　桑白皮炙各等分
右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後温服

嗽喘　百十二　人參紫菀湯　治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者
五味子半分　杏仁半兩　人參　京紫菀　甘草　各二分半
縮砂一兩　桂枝二分半　罌粟殼去蒂炒　姜製　款冬花半兩
右㕮咀每服四分水一盞姜五片烏梅一枚煎服

百十三　紫蘇半夏湯　治喘嗽痰涎宿热往來
紫蘇　半夏湯洗七次　紫菀苗　陳皮
五味子各半兩　杏仁去尖皮乙兩麩炒　黄桑白皮二兩半
右為粗末每服三分生姜三片水煎日進三服

百十四　人參理肺散　治喘嗽不止
麻黄乙兩炒去節　御米殼三兩炒　人參二兩
當帰　木香各乙兩　杏仁二兩麩炒
右為粗末每服四分水煎

百十五　杏仁煎　治老人久患肺喘咳嗽不已睡卧不得服之立定
杏仁去皮尖　胡桃肉
右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如大彈子大每
服一二丸食後臨卧細嚼姜湯送下

百十六 大降氣湯 治上盛下虛膈壅痰实喘嗽咽乾不利

紫蘇子微妙 川芎
當歸洗焙 厚朴去皮薑炙
半夏湯泡七次 陳皮去白
桔梗去芦 白茯苓去皮
肉桂去皮 甘草炙各等分
細辛去葉土前胡

右㕮咀每服三錢水一盞姜五片紫蘇五葉同煎温服

百十七 平肺湯 治肺氣上壅喘嗽痰实寒熱往來咽乾口燥

陳皮一兩半夏湯泡七次 苦梗炒
烏梅去核 薄荷 紫蘇
知母 桑白皮蜜炒 杏仁炒
五味子 罌粟殼蜜炒各七分 甘草炙半兩

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片煎六分食後温服

百十八 杏參散 治胸脇脹滿上氣喘急咳嗽倚息不得睡卧

桃仁去皮炒 桑白皮蜜炙焙 杏仁去皮炒各等分
人參

右㕮咀每服三錢水一盞薑棗煎不拘時

百十九 蘇沉九 治老人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已咳嗽涕吼夜不得睡

桑白皮 甘草 大腹皮連皮 官桂 麻黃
薄荷 陳皮 紫蘇 杏仁去皮各半兩

右㕮咀每服三錢水盞半薑三片烏梅半个煎六分温服

百二十 人參清肺湯 治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安并治久年勞嗽唾血腥臭

阿膠炒 桑白皮 地骨皮 人參
杏仁去皮炒 罌粟殼去蒂蓋蜜炙 甘草炙各等分
知母 烏梅去核

右㕮咀每服三錢水盞半烏梅棗子各一枚同煎至一盞濾去滓食後温服

百廿 半夏丸 治肺藏蘊熱痰嗽胃膈塞滿

半夏湯泡七次 焙取末各一兩
瓜蔞子去殼別研

右件和均姜汁打麪糊為丸桐子大每服五十丸食後姜湯下

百一十二 **王液園** 治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石 燒令赤細研水飛過二十兩 半夏 末十兩為 白蒺藜 各十兩 研細

右合研麪糊圓如梧桐子每服三十圓食後淡姜湯下

通治 **蠟煎散** 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎 百一十三

款冬花 紫菀 洗土焙 甘草 各半兩 五味子 炒半兩

桑白皮 桔梗 杏仁 去皮炒 紫蘇葉 各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞入黃蠟少許同煎食後臨卧溫服

百一十四 **平氣飲** 治一切咳嗽并吐痰涎惡風不能食者

人參 白朮 川芎 當歸 桂心

五味子 甘草 乾木瓜 紫蘇子

茯神 烏梅去木 杏仁去皮炒白芍 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎八分食後溫服

百一十五 **參蘇飲** 方見傷寒門 治上膈有熱咳嗽聲重

久嗽 **紫參丸** 治遠年日近咳嗽諸藥不効者 百一十六

紫參 甘草炙 桔梗各一兩 五味子

阿膠 炒各半兩如珠 肉桂去皮 烏梅肉 杏仁湯去皮炒各二分半

右為末煉蜜為丸每兩作十五丸每服一丸用新綿裹定於湯內溫溫嚥化津液嚥

嗽血 百一十七 **百花膏** 治喘嗽不已或痰中有血

款冬花 百合 蒸焙各等分

為細末煉蜜為丸龍眼大每服一丸臨卧細嚼姜湯熟下含化

百一十八 **紫菀散** 治飲食過度或食前煖邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得安卧

紫菀茸洗 經霜桑葉 款冬花 百合 蒸焙

杏仁去皮尖 阿膠 蛤粉炒 貝母去心 蒲黃炒

半夏湯洗七次各兩 犀角鎊 甘草炙 人參各半兩
右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後溫服

【肺癰】【桔梗湯】治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大小便赤澁

桔梗去芦 貝母去心膜當歸去芦酒浸 瓜蔞子
枳殼麩炒 薏苡仁炒 桑白皮蜜水炙 防己各一兩
甘草節生用 杏仁去皮尖麩炒 百合蒸各半兩 黃芪去芦一兩半
右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎服不拘時大便秘加大黃小便赤少加木通 百三十九

【勞損】【人參酒肺丸】治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及療風壅痰實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘 百三十

人參 欽冬花去梗 知母六兩
肉桂去皮 杏仁去皮炒四兩 甘草炙各四兩
桔梗各五兩
右為末煉蜜丸如雞子大每服一丸食後細嚼淡姜湯下

【人參養肺丸】治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺咳嗽喘急胸中煩悶涕唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血並治之

人參去芦 黃芪去芦蜜炙各二兩 八分 小蔄根 白茯苓去皮各六兩
杏仁去皮炒二兩四分 皂角子三百个炙半夏湯洗七次為末生姜汁和作餅四兩炒
右為末煉蜜圓如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯下

【百三十二】【鍾乳補肺湯】治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳碎如米 桑白皮 肉桂去皮 白石英如米五味子
欽冬花去梗紫菀洗去土各二兩 麥門冬去心各三兩 人參去芦
右除鍾乳白石英外同為粗末後入鍾乳等同拌勻每服四錢水盞半姜五片棗一枚粳米三十粒煎七分用綿濾去滓食後溫服

百二十三 團參飲子 治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽膿血
增寒壯熱漸成勞瘵者

人參 紫苑茸洗 阿膠蛤粉炒 百合 蒸
細辛 款冬花 杏仁 炒 天門冬 湯浸去心
半夏湯洗 經霜桑葉 五味子各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎七分食後溫服氣喘者
加木香噦血而熱加生地黃噦血而寒加鍾乳粉疲極咳嗽
加黃芪損肺噦血加沒藥藕節嘔逆腹痛不食加白朮效而
小便多者加益智仁咳而面浮氣逆加沉香橘皮煎

名方類證醫書大全卷之六

痰氣 附 諸飲

人身之痰如長流水貴乎順行又賴土爲之堤防偶爲風所逆
或爲物所雜滯則使有聲可以過顙故痰之爲疾或由脾土虛
弱不能攝養金肺或爲四氣七情所干氣雜痰聚發而爲喘爲
咳又有水飲停滯胃膈亦能爲喘爲咳爲嘔爲泄爲眩暈心嘈
怔忪爲寒熱爲疼痛爲腫滿蠱膈皆痰所致古方
所載四飲生六證懸飲者飲水流在脇下咳唾引痛溢飲者飲
水流於四肢當汗而不汗身躰疼重支飲者欬逆倚息短氣不
得臥其形如腫痰飲者其人素盛今瘦腸間瀝瀝有声留飲者
背寒如手大或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下滿引缺盆欬嗽

轉甚伏飲者膈滿喘咳嘔吐發則寒熱腰背引痛眼淚流出其人振振惡寒其脉皆弦微沉滑治法縣飲當下之溢飲當發其汗支飲則隨證汗下痰飲則用温藥從小便利之此固定法而嚴氏獨以痰飲之疾皆氣不順而致之當順氣爲先分導次之氣順則津液流通痰飲自下亦至當之論亦有腎氣虛寒不能攝養腎水使邪水溢上多吐痰唾又當温利之八味丸最得其宜或因酒後停飲而嘔者二陳湯一香煮散主之或脾胃爲物所傷而停積痰飲五套圓破飲丸主之臨病之際更宜詳審

風

(一) 半夏利膈圓 治風痰雜甚頭疼目眩咽膈不利稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心痞噎不利心胃脇引痛腹内有聲

半夏湯洗三兩　白朮　白茯苓去皮　白礬生用　人參
滑石　貝母各一兩　天南星生用二兩半　白附子生用二兩
右爲末麪糊圓如梧桐子每服三十圓食後薑湯下

(二) 星香散 治風痰盛方見風門

(三) 枳實理中圓 方見傷寒門 理中焦痞滿逐痰飲止腹痛

(四) 小青龍湯 方見傷寒門 治溢飲倚息喘滿不得卧者

熱

(五) 治痰熱 痰在上焦多能令人昏眩

赤茯苓各七錢　紫蘇子　人參
半夏湯洗七次　枳殼麩炒　甘草炙
右㕮咀每服三錢水一盞生姜十片煎至七分熱服

(六) 大人參半夏丸 治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可盡述

茯苓去皮　人參　天南星　薄荷葉各半兩
乾生姜

白礬 生 寒水石 各一兩 蛤粉二兩 藿香葉 一分
右爲末麪糊丸如小豆大生姜湯下二十丸食後温水亦得一法加黃連酢黃蘗兩水丸取效愈妙治酒病調和臟腑

七 化痰園 治停痰宿飲
半夏 人參 桔梗 細切 姜汁製 白茯苓 各一分
前胡 半夏 白朮 一又 枳實 甘草 各半兩 香附子 一又
右爲末用半夏姜汁煮糊園如梧桐子每服四十園姜湯下未効更加甜葶藶馬兜苓防己薄荷同煎立効熱痰黃色者是也

八 枳殼半夏湯 除熱痰下氣寬中利膈清上治痞滿
枳殼 半夏 黃芩 桔梗 各一兩
甘草 五錢
右剉每服四錢姜三片棗白皮五寸烏梅一枚煎温服如若未効更加甜葶藶馬兜苓防己薄荷同煎立効熱痰黃色者是也

【冷】九 暖胃丸 去虛痰利冷飲
硫黃 研 白礬 枯炒 丁香 各一兩
木香 各一兩 半夏二兩 姜汁炒
右爲末姜汁煮麪糊丸如梧桐子每服二十丸空心米飲下

十 靈砂白丸子 治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐
靈砂 青州白圓子末 各一兩 丁香 茴香炒
右和勻以生姜自然汁打糊米糊丸如梧桐子每服三十丸空心人參湯或棗湯下

十一 丁香半夏園 治脾胃宿冷胷膈停痰嘔吐惡心吞酸噫醋心腹痞滿不思飲食
肉豆蔻 木香 丁香 人參 去芦
陳皮 法炮 縮砂 藿香葉 半兩 半夏 湯洗七次 姜製三兩
右爲末以生薑汁煮麪糊園如小豆大每服二十園薑湯下

(十一) 強中圓 治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降
高良姜 乾姜炮 陳皮 青皮各一兩半夏湯去滑二兩
右爲末用生姜自然汁煮麪糊圓如梧桐子每服三十圓生
姜湯下(一法)前藥並不炮製

(十二) 丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐涎沫或
有酸水不思飲食
木香 丁香各一兩 乾姜炮兩半 附子炮去皮臍
半夏洗七次 陳皮去白 肉桂去皮各一兩 縮砂半兩
右㕮咀每服四錢水二盞薑七片棗一枚煎七分不拘時服

(十四) 八味圓 治脾虛不得剋製腎水多吐痰唾而不咳者
附子炮去皮臍 桂心各二兩 山茱萸去核 山藥各四兩
澤瀉 茯苓 牡丹皮各三兩 熟地黃八兩
右爲末蜜圓如梧桐子每服五十圓空心鹽湯送下

(十五) 洪白圓 治胃腸脹滿痰涎不利頭目昏眩
天南星 半夏各生用 生硫黃別研各一兩
玄精石 盆硝各半兩 附子一个六分重者生用去皮臍
右爲末入麪三兩令勻藥停水和作餅於沸湯內煮令浮漉
出爲圓如梧桐子每服三十圓生姜湯食後下

(十六) 順元散 治氣虛痰盛不得睡卧氣中痰厥尤宜服之
南星一兩炮 川烏 附子各半兩 木香二分半
右㕮咀每服三錢水一盞姜十片煎熱服

(十七) 溫中化痰圓 治痰飲胸膈痞悶頭眩目暈咳嗽涎唾或飲酒過度嘔吐惡心

(十八) 盛下降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅
川當歸去苗 甘草炙 前胡去苗 厚朴去皮姜製各二兩
肉桂去皮 陳皮去白各半兩 紫蘇子 半夏麴各五兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎服不拘時（十八）

（十九）黑錫丹 治痰氣雍塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭應下虛之證又婦人血海久冷無子赤白帶下並宜服之

肉桂去皮半兩　沉香　破故紙　茴香舶上者炒　附子炮去皮臍　胡芦巴酒浸炒　金鈴子蒸去皮核　木香各一兩　肉豆蔻面裹煨　陽起石研細水飛　黑錫去滓秤各二兩　硫黃

右用黑盞或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並杵羅為末一處和勻自朝至暮以研至黑光色為度酒糊圓如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十粒空心鹽薑湯或棗湯下女人艾棗湯下

（二十）靈砂丹 治上盛下虛痰涎壅塞此藥喜取能鎮墜升降陰陽安和五臟扶助元氣

水銀一斤　硫黃四兩

右用新鐵銚炒成砂有烟即以醋洒候研細入水火鼎內酷調赤石脂封口鐵線扎縛曬乾鹽泥固濟用炭二十斤煅如鼎裂筆蘸赤石脂頻抹火盡為度經宿取出研為末糯米糊為圓如麻子大每服二十粒空心棗湯米飲人參湯任下

（二十一）俞山人降氣湯 治上盛下虛痰氣壅盛或喘或痛咽乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

厚朴去皮姜汁炙宿炒各二兩　羌活半兩　前胡　五加皮姜炙　黃耆　當歸去苗半兩　紫蘇子炒各　桔梗　甘草　陳皮去白　肉桂各一兩　乾姜炮　附子炮去皮臍人參去苓各五錢

右㕮咀每服三錢水盞半紫蘇三葉薑三片棗一枚煎服

（二十二）臂痛 指迷茯苓丸 治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不得者

半夏二兩洗七次　茯苓一兩　枳殼去穰麸炒半兩　風化朴硝二錢半

右為末姜汁麪糊丸如梧桐子每服三十丸姜湯下

【酒毒】葛花解酒湯 治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩乱胸膈痞塞手足戰揺飲食減少小便不利 二十三

葛花半兩　木香半分　白豆蔻仁半兩
縮砂仁半兩　白术二分　乾生姜二分　蓮花青皮去穰三分
橘皮半分　白茯苓半分　猪苓去皮半分　澤瀉一分　神麯二分炒　人參去芦一分
右為細末秤和勻每服三錢七白湯調下得微汗酒病去矣

【七情】四七湯 治七情氣欝結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

紫蘇葉二兩　厚朴三兩　茯苓四兩　半夏五兩
右㕮咀每服四分水一盞薑七片棗一箇煎八分不拘時服
若因思慮過度心氣不足小便白濁用此藥下青州白圓子最効 又一方 用半夏五兩入參官桂甘草各一兩生薑煎服亦名七氣湯大治七氣并心腹絞痛 二十四

【三通治】半夏湯 順陰陽消痞滿消酒化痰 二十五

半夏姜製　橘紅去白　枯梗炒去芦各一兩　枳实去穰炒半兩
右為㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分去滓半飢半飽熱服

【二十六】辰砂化痰丸 治風化痰安神定志利咽膈清頭目

白礬枯過別研　辰砂別研各一兩　天南星一兩半夏洗七次姜汁炮　半夏洗七次姜汁搜作麵三兩
右以白礬半夏同南星為末和合勻用生姜汁煮麵糊圓如梧桐子別用辰砂為衣每服二十圓食後姜湯下

【二十七】枯梗湯 治胷膈脹滿短氣痰逆或吐涎沫

枯梗炒　半夏湯洗七次姜汁製　陳皮去白各十兩　枳實麩炒赤五兩
右㕮咀每服三分水一盞姜五片煎七分温服不拘時

【二十八】去製半夏 消飲化痰壯脾順氣

右用大半夏以湯洗一遍去臍焙乾再洗如此七遍用濃米

泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於暖處頻放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用漿水於慢火內煮勿令滾候漿水極熱取出焙乾於銀石或磁器內收貯每服一兩粒食後細嚼溫生姜湯下又一法依前製成半夏每一兩用龍腦半分研極細同飛過朱砂分半夏上再為衣却鋪上灯草一重約厚一指單排半夏其上又排灯草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾取出於器內收貯每服一兩粒細嚼食後溫水或冷水送下

二十九 茯苓半夏湯 治停痰留飲胃腸滿悶嘔逆惡心吐痰水

茯苓去皮三兩半夏湯洗七次五兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心服一方去茯苓用陳皮半夏各七兩名橘皮半夏湯

三十 二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏湯洗七次 橘紅各五兩 白茯苓三兩 甘草炙一兩半

右㕮咀每服四分水一盞姜七片烏梅一箇同煎至六分熱服不拘時一方加丁香

三十一 破痰消飲丸 治一切停痰留飲

青皮 陳皮並洗 川姜炮 京三稜炮 槌碎

草菓麪裹煨逢木炮 槌碎 良姜溫熨各一兩半夏湯洗七次三兩

右為末木煑麪糊丸如梧桐子陰乾每服五十丸姜湯下

三十二 橘皮半夏湯 治痰涎壅滯嘔吐不已者常服養液潤燥解

橘皮去白半兩半夏湯洗七次二分半

右為末分作二服每水一盞半入生姜十片同煎七分溫服

三十三 **吳仙丹** 治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩
吳茱萸湯泡 白茯苓各等分
右爲末煉蜜丸如梧桐子每服三十圓熱水温酒任下

三十四 **二仙圓** 治中脘氣滯胷膈煩滿痰涎不利頭目不清
南星生去皮 半夏湯泡七次 二味各五兩爲末用生姜自然汁和不可太軟但手捏得聚爲度攤在篩中用楮葉蓋之令發黃色晒乾收之須是五六月内做曲如醬黃法

三十五 **追涎湯** 治一切痰涎壅盛或胷膈留飲痞塞不通
香附子 署炒於磚上磨去毛 五兩
半夏湯洗七次四兩 天南星炮去皮 枳實去穣麩炒
右用南星半夏麴二兩淨香附子一兩同爲細末水煮麪糊圓如梧桐子每服四十九食後姜湯下
赤茯苓去皮 橘紅湯去白各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四分水一盞姜十片煎至八分食後温服

三十六 **二賢散** 治痰實食後膈滿遠年痰飲
薄橘紅 四兩 甘草一兩
右爲末沸湯調下其功甚効

三十七 **快活丸** 常服消食化痰養生之家不可缺
枳殼炒 肉桂各一兩 桔梗 半夏湯洗各二兩
爲末姜汁糊丸梧子大每服二十丸食後姜湯下

三十八 **白术湯** 治胷中虛損及痰吐者
半夏麴半兩 白术一分 枳實二分半 木香 炙甘草各一分 茯苓二分
右爲末每服二錢生姜湯調下食前服

三十九 **蠲飲枳實丸** 逐飲消痰導滯清腸
枳實去穣炒半夏湯洗二次 陳皮去白各二兩 黑牽牛半斤取頭末三兩
右爲末水煮麪糊爲丸梧子大每五十丸生姜湯下食後

(四十) 五苓散 (方見傷寒門) 治臍下有悸停飲癲眩吐涎沫

(諸飲) 海藏五飲湯 治一留飲心下二飲癖飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾 (四十一)

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮
茯苓 厚朴 半夏 澤瀉 猪苓
前胡 桂心 芍藥 甘草各等分

右剉每兩分四服水二錢生姜十片同煎至七分取滓温服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加蔔根葛花縮砂仁

(四十二) 倍木圓 治五飲酒癖一癖在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水在腸間瀝瀝有声並皆治之一曰留飲停水在心二曰癖飲水

乾姜炮 肉桂去皮各半斤 白朮一斤

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服三十圓空心米飲送下

(四十三) 破飲丸 治五飲停蓄胃膈呼吸之間痛引兩脇氣促

蕈撥 丁香 胡椒
青皮 巴豆去皮木香

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆將所浸水淹烏梅肉炊一熟飯久細研爲膏圓如菉豆大每服十五圓津液送下

(懸心飲) (四四) 十棗湯 治飲水流在脅下咳嗽引痛經年不愈者

芫花 甘遂 大戟

右等分爲末以棗十枚水一錢半煎至八分去棗調藥末壯人一分羸人半錢平旦温服不下者次日更加半分下後稀粥自養下後止藥

(四十五) 五苓散 加防已 前治證同上方見暑門

支飲 四六 防已桂枝湯 治膈間支飲喘滿心下痞硬面色黑脉沉緊得之十數日醫吐下之不愈者

防已 三兩　桂心 二兩　人參 四兩　石膏 四兩

㕮咀散每服四錢水煎温服虛者即愈實者二日復發再服不愈宜去石膏加茯苓芒硝微利即愈

四十七 枳木湯 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名氣分

枳實 去白麩炒 一兩半　白朮 三兩

右㕮咀每服四分水一盞煎至七分温服其堅即當散也

四十八 枳木湯 治癖氣分心下堅硬如杯水飲不下者

肉桂 去皮不見火　桔梗 去芦 剉炒　甘草 炙　檳榔 各七分半

附子 炮去皮臍　細辛 洗去土 各一兩　白朮 各一兩　枳實 麩炒五分

右㕮咀每服四分水一盞姜七片煎至七分不拘時服

溢飲 四九 大青龍湯 治溢飲肢躰重汗不出拘急痛方見傷寒門

五十 小青龍湯 治溢飲支飲倚息不得而喘滿者方見傷寒門

痰飲 五十一 茯苓飲子 治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓 去皮　半夏 湯洗七次　茯神 去木　陳皮 去白

麥門冬 去心 各二兩　沉香 不見火　甘草 炙　檳榔 各半兩

右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎七分温服不拘時

五十二 丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故爲痰飲結聚胷膈之間嘔吐惡心脹滿不食

木香　丁香 各不見火　青皮　陳皮 各去白半兩　乾姜炮　白朮

茯苓　良姜 各一兩　半夏 各二兩同南星浸三日

右爲末用神麯一兩大麥蘗二兩同碾取末打糊和藥爲丸如梧桐子每服七十圓温熟水下常服温脾順氣

五十三 新法半夏湯 治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸水腹脇脹滿頭旋惡心不思飲食

支飲 四六 防已桂枝湯 治膈間支飲喘滿心下痞硬面色黑
脉沉緊得之十數日醫吐下之不愈者
防已三兩 桂心二兩 人參四兩 石膏四兩
㓕散每服四錢水煎温服虛者即愈實者二日復發再服不
愈宜去石膏加茯苓辛硝微利即愈

四七 枳木湯 治心下堅大如盤边如旋盤水飲所作名氣分
枳實去白麩炒一兩半 白朮三兩
右㕮咀每服四分水一盞煎至七分温服其堅即當散也

四八 枳木湯 治癖氣分心下堅硬如杯水飲不下者
肉桂去皮不見火 桔梗去芦㓕炒 甘草炙 檳榔各七分半
附子炮去皮臍 細辛洗去土葉 白朮各一兩 枳實麩炒五分
右㕮咀每服四分水一盞煎至七分不拘時服

溢飲 四九 大青龍湯 治溢飲肢躰重汗不出拘急痛方見傷寒門

五十 小青龍湯 治溢飲支飲倚息不得而喘
痰飲 五十一 茯苓飲子 治痰飲蓄于心胃怔忡
赤茯苓去皮 半夏湯洗七次 茯神去木 陳皮各不見火
麥門冬去心二兩 甘草炙 沉香不見火
右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎七分温服

五十二 丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故
爲痰飲結聚胷膈之間嘔吐惡心脹滿不食
木香 丁香各不見火 青皮 陳皮各去白半兩 乾姜炮 白朮
茯苓 良姜各二兩 南星 半夏各二兩同南星浸三日
右爲末用神麯一兩大麥蘗二兩同碾取末打糊和藥爲丸
如梧桐子每服七十圓温熟水下常服温脾順氣

五十三 新法半夏湯 治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸水腹脇脹
痛頭旋惡心不思飲食

縮砂仁　神麯炒　陳皮去白　草菓仁各一兩
白豆寇仁　丁香各半兩　大半夏四兩　甘草二兩重半生半炙
右爲末每服二錢先用生姜自然汁調成膏入炒鹽湯點服

五十四 檳榔散 治胃膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔
杏仁去皮尖旋覆花去枝半夏湯洗七次檳榔
桔梗去芦炒白朮各一兩　人參各半兩　甘草炙
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分不拘時服

五十五 參蘇飲 方見傷寒門 治痰飲停積胃膈咳嗽氣促

喘急

人之五臟皆有上氣而肺爲之總故經云諸氣皆屬於肺居五臟之上而爲華蓋喜清靈而不欲窒礙調攝失宜或爲風寒暑濕邪氣相干則肺氣脹滿發而爲喘呼吸坐卧促迫不安又有因七情之氣干於五臟鬱而生痰或體弱之人脾腎俱虛不能攝養一身之痰皆能令人發喘治療之法當究其源如感邪氣則驅散之氣鬱則調順之脾腎虛者温理之又當於各類而求凡此證脉滑而手足温者生脉濇而四肢寒者死數者亦死謂其形損故也此嚴氏之說故再述于此

風寒 五十六 三拗湯 方見咳嗽門 治肺感風邪喘呼不已

五十七 加味三拗湯 治肺感寒邪發喘
杏仁七多　陳皮一多　甘草三多　麻黃一兩夏月及有汗者減半
五味子七多　桂五多
右剉每服四錢姜三片煎喘甚者加馬兜零葉白皮

五十八 霍香三氣散 治渾身拘急增寒喘嗽頭目昏重加五味子杏仁鹽梅煎有泄不用杏仁方見傷寒門

熟證 五九 金沸草散 治肺熱喘嗽痰盛

六十 參蘇飲 治證同上用加杏仁五味子二方並見傷寒門

六十一 華蓋散 治過食煎煿或飲酒過度致肺壅喘不得臥及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶炒 桔梗去芦 瓜蒌子 桑白皮炙 葛根各一兩 甘草炙半兩 薏苡仁

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓食後温服

虛證

六十二 蘇子降氣湯 方見痰氣門 治虛陽上攻喘促咳嗽

六十三 防已丸 治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎

防已 木香各二錢 杏仁三錢

右爲末煉蜜爲丸如小豆大每服二十丸煎桑白皮湯下如大便秘加華蓋壹兩食後

六十四 人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭疼

增寒壯熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷 麻黄去節

乾葛 白朮 甘草各一兩炙 白姜半兩

右爲末煉蜜爲丸如小豆大每服二錢水一大盞生姜三片葱白二寸煎至八分如出汗連進二服通口温服

氣喘

六十五 四磨湯 治七情鬱結上氣喘急

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分盞煎三五沸放温服

六十六 紫蘇子湯 治憂愁過度邪傷脾肺心腹脹膨喘促煩悶腸鳴氣走溏瀉有声大小便不利脉虛緊而澁

紫蘇子一兩大腹皮 草果仁 半夏湯洗七次

厚朴去皮姜製 木香不見火 陳皮 木通

白朮 枳实去白炒 甘草炙 人參各半兩

右㕮咀每服四�therefore水一盞薑五片棗二枚煎七分不拘時服

(六十七) **杏參飲** 治因隊墮隔氣驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘急

人參　桑白皮
檳榔　白朮
桂心 不見火　杏仁 去皮炒紫研洗　甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片入紫蘇七葉煎七分温服

(痰喘) **二黃丸** 治停痰在胃喘息不通呼吸欲絶 (六十八)

雌黃一分　雄黃一兩

右二味研羅極細鎔黃蠟為丸如彈子大每服一丸於半夜時熱煮糯米粥乘熱以藥投在粥內攪轉和粥喫

(三通治) **神秘湯** 治上氣喘急不得卧者 (六十九)

橘皮　桔梗　紫蘇　五味子　人參各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎六分食後服

(七十) **人參定喘湯** 治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胷膈緊滿及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參去芦　麻黃去節　甘草炙　桑白皮

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎七分食後温服

(七十一) **紫蘇子圓** 治一切氣逆胷膈脹滿喘急咳嗽心腹刺痛

紫蘇子　陳皮各二兩　肉桂去皮　良薑炒各一兩　人參去芦五分

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼温酒米飲任下

(七十二) **分氣紫蘇飲** 治脾胃不和氣逆喘促

五味子去梗　桑白皮　草菓仁　大腹皮炙　茯苓炙

右㕮咀為麤末秤二十斤淨入淨紫蘇十五斤搗碎同一處拌勻每服四分水一盞薑三片入塩少許同煎空心服

(七十三) **五味子湯** 治喘促脉伏而厥者
五味子半兩 人參 麥門冬 杏仁
橘皮去白 生姜 貝母各二 棗子三枚破
右㕮咀每服水二盞煎至一盞去滓分作二服

(七十四) **團參散** 治肺氣不利咳嗽上喘
紫團參 欵冬花 紫菀茸各等分
右為末每服二錢水一盞烏梅一枚同煎七分空心温服

(七十五) **杏仁半夏湯** 治肺痿涎喘不定嗽嗽不已
杏仁去皮尖 桔梗 陳皮去白 茯苓去皮 漢防己
甘草二寸 猪牙皂角一錢 桑白皮各二錢 薄荷葉一分 白礬二分
右為末作二服水二盞生薑三片煎至六分去滓食後温服

(七十六) **知母茯苓湯** 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗
茯苓去皮 甘草略炙 五味子 知母 人參
半夏洗七次 薄荷 柴胡 白术 欵冬花
桔梗 麥門冬 黄芩各半兩 川芎 阿膠炒各二分
為末每服三錢水一盞半生姜十片同煎至七分去滓热服

(七十七) **葶藶大棗瀉肺湯** 治肺成癰胸腹脹滿上氣喘急身吉面目浮腫鼻塞声重不聞香臭
葶藶炒令黄研細丸如彈子大
右用水三盞棗十枚煎一盞去棗入藥煎七分食後服法令先投小青龍湯三服乃進此藥

名方類證醫書大全卷之七

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

氣 附 諸疝膀胱小腸腎氣

人稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其氣一氣周流於其中以成其神形神俱備乃謂全体故婦人宜耗其氣以調其經男子息養其氣以全其神惟氣得暖則行生多證故内因七情而得之喜怒憂思悲恐驚者是也喜傷於心者其氣散怒傷於肝者其氣擊憂傷於肺者其氣聚思傷於脾者其氣結悲傷於心胞者其氣急恐傷於腎者其氣怯驚傷於膽者其氣乱雖七證自殊無踰於氣又有体虛者外為風冷乘之入於腹中遂成諸疝發則小腹疼痛痛或繞腸或逆搶心

甚則手足厥冷自汗嘔逆或大小便秘澁疝氣之證亦有七種
厥疝癪疝宇疝氣疝盤疝附疝狼疝者是也厥疝則心痛足冷
食已則吐癪疝則腹中氣積如臂突疝則飲食因突卒然脇腹
引痛氣疝乍滿乍減而痛盤疝腹中痛引臍傍附疝則腹痛連
臍下有積聚狼疝小腹与陰相引而痛治療之法若因七情所
傷者當調其氣而安其五臟外邪所干者當温而散之倘治之
非道內外之氣交入於腎者為腎氣入于膀胱者為膀胱氣入
于小腸者為小腸氣因寒而得者遇寒而發喜怒而得者遇喜
怒而發甚則結而為積聚或於左右脇下有物如覆杯或長如
展臂或腹大如盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱飲食不為肌膚積
聚之脉厥而緊浮而牢強急者生虛弱者死臨證審而行之

中氣 (一) **獨香散** 治中氣閉目不語四肢不收昏沉不省

南木香為末冬瓜子煎湯調下一錢痰盛 **星木湯** 良方見風門

(二) **八味順氣散** 治中氣最妙 方見風門

(三) **蘇合香丸** 專能順气化痰并治傳屍骨蒸諸項勞瘵卒
暴心痛鬼魅瘴癘赤白下痢小兒驚搐等証並宜服之

沉香　訶梨勒煨用皮丁香　青木香
鹿茸香研　安息香研為末用无灰酒一升煮膏　香附子炒去毛　薰陸香別研
白檀香各二兩　蘇合香油入安息香膏內　白朮
龍腦研各一兩　朱砂研飛　烏犀角各二兩

右為末入研藥極勻用安息香膏并煉蜜和劑圓如梧桐子空
心用温水化下四圓酒服亦可

(四) **回陽湯** 治体虛氣中脉息大弱飲食不進

乾姜炮　川烏生去皮臍　青皮去白各一兩　益智仁二兩　附子生去皮各半兩

右㕮咀每服三錢姜七片棗一枚煎服或入少木香亦可

(五) **搜風散** 治男子婦人一切冷氣攻沖胷脇刺痛不已

及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣並皆治
縮砂仁去殼 甘草炙 茯苓去皮 草菓仁
肉豆蔻煨 川芎洗 茴香炒 薑澄茄
大麥芽 檳榔炮 良薑麪炒 枳殼麪炒
厚朴去皮 陳皮去白 羌活去芦 蒼朮米泔浸二宿各二兩
右㕮咀每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分空心服

〔六〕順氣沉附湯 升降諸氣暖則宣流
大附子 一隻炮作二服
右水一盞煎別用水磨沉香臨熟時入藥內熱服

〔七〕養氣丹 治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或喘或促一切体弱氣虛之人婦人血海冷憊諸證並宜服之
禹餘粮火煅醋淬各七次 紫石英火煅七次 赤石脂如前付
磁石火煅醋淬七次 代赭石火煅醋淬七次一斤

以上五石各以水再研揩其清者置之紙上用竹篩盛之滴盡水候乾各用瓦瓶盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五次煅此五藥以紙灰蓋之火盡再煅如此三次埋地穴內兩日出火毒再研細入後藥
肉蓯蓉洗酒浸一宿焙乾 附子炮去皮臍 茴香炒 丁香
破故紙酒炒 木香不見火 肉桂去皮 巴戟去心益智湯浸山藥
肉豆蔻麪裹煨鍾乳粉別研 鹿茸酥炙 當歸酒浸一宿焙乾
白茯苓去皮 遠志去心 五靈脂別研 乳香別研 沒藥並去砂別研 陽起石煅別研
右入前藥同研極勻用糯米糊為丸每兩作五十丸陰乾入布袋內擦令光瑩每服二十丸空心溫酒薑鹽湯任下婦人用艾醋湯下

〔八〕薑合丸 治男子婦人血氣虛弱久積陰冷停飲不化結

聚成塊、小腹膨脹、刺痛不已、或臟腑傷冷、以致泄瀉並皆治之
丁香不見火 木香不見火 人參各一兩 附子炮去皮臍 乾薑炮
青皮去白 陳皮去白 白朮焙 厚朴去皮姜製 肉豆蔻炮
右爲末、入研砂一錢、薑汁麪糊爲丸、每一兩作二十丸、每服
一丸、用老薑一塊、如拇指頭大、切開作合子、安藥於內、用濕
紙裹慢火煨一頓飯久、取出去紙、和姜細嚼、白湯送下、孕婦
不可服、小兒一丸分四服、凡內有積滯服之無不神驗

(九) 藏方 阿魏丸中丸 治一切冷氣攻刺心痛脹滿嘔逆

阿魏二分半用麪二匙醋和作餅子炙黃 京三稜煨
蓬莪朮煨 青皮去白 陳皮去白 甘草炙
乾姜炮 乾木瓜 肉桂去皮 白朮各一兩半
右爲末、麪糊爲丸、每一兩作十五丸、朱砂爲衣、每服一丸、細
嚼生姜木瓜鹽湯任下、如婦人血氣攻刺、煎艾當歸湯下、

(十) 葱白散 治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛婦人胎前
產後血氣刺痛最宜服之

川芎 當歸 枳殼去白麩炒 厚朴姜製
木香 官桂去皮 青皮 乾姜炮 茴香炒
人參 川練炒 茯苓 麥蘗炒 三稜炮
蓬朮醋浸一宿焙乾 乾地黃 神麯炒 芍藥各等分
右㕮咀、每服三錢、水一盞、葱白二寸、煎七分、入鹽少許、空心
熱服、大便秘澁加大黃、滑利加訶子

(十一) 集氏方附子養氣湯 大治久病方愈、上氣急滿、痰唾稠
粘、服此壯脾養氣、止嘔進食、

附子三兩炮裂、水浸去皮臍、切片 人參切片
白朮紙裹煨 白茯苓去皮各一兩 木香半兩 紙裹炮裂
右每服四錢、水一盞、薑七片、棗二枚、煎七分、空心服、

五香連翹散 治壯實人胃膈痞塞氣不升降百治不効或腹内脹痛大便秘澁方見癰疽門

枳殼 陳皮 黒牽牛 各等分

大黄 黄芩

右爲末姜汁糊丸梧子大每服三四十丸淡姜湯下

十三 推氣圓 治三焦痞塞氣不升降胸膈滿悶大便秘小便赤

枳殼 陳皮 黄芩

右爲末姜汁糊丸梧子大每服三四十丸淡姜湯下

十四 小承氣湯 治壯盛之人三焦痞塞氣不升降心腹脹痛諸治不止身熱大便秘者方見傷寒門

十五 蘇子降氣湯 方見痰氣門

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

十六 秘傳降氣湯 治上盛下虛氣不升降上盛則頭目昏眩痰实嘔逆胃膈不快咽乾喉燥下虛則腰腳无力小便頻數又或大便秘澁

骨碎補 去毛炒 訶子 炮去核 草菓仁 去皮 五加皮 酒浸半日炒黄

半夏麴 桔梗 各半兩 桑白皮 炒 二地骨皮 炒黄

枳殼 去瓤炒 陳皮 去白 柴胡 去芦 甘草 炒 各一兩

右爲麤散和勻再就蒸一伏時晒乾每服二錢紫蘇三葉姜三片水一盞同煎七分食後熱服又能調順榮衛通利三焦如痰嗽加半夏麴煎心肺虛滿加人參茯苓前上膈熱加北黄芩前下虛加熟附子前婦人血虛加當歸煎

十七 養正丹 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海久冷並治

水銀 黒錫 去滓淨与水艮結砂子

硫黄 研 朱砂 研細 各一兩

右用黒盞一隻火上溶黒鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黄末急攪成沙和勻

如有酸以醋洒之候冷取出研極細煮糯米糊圓如綠豆大
每服三十粒鹽湯棗湯任下

七情 五膈寬中散 方載翻胃門 治七情四氣傷於脾胃以致
陰陽不和胸膈痞滿停痰氣滯結于中心腹絞痛不可忍者
（十九） 七氣湯 治七情之氣聚結于中心腹絞痛不可忍者
人參去芦甘草炙 肉桂去皮各一兩半 夏湯洗七次焙乾五兩
右㕮咀每服三錢水一盞姜三片煎七分空心热服

氣滯 復元通氣散 治氣不宣流或成瘡癰并閃挫腰脇氣滯
不散並皆治之 （二十）
舶上茴香炒 穿山甲蛤粉炒去粉 延胡索去皮
白牽牛炒 甘草炒 陳皮去白各一兩 南木香不見火一兩半
右為末每服一錢熱酒調病在上食後服病在下食前服不
飲酒人煎南木香湯送下

（二十一） 和氣散 治脾胃不和中脘氣滯心腹脹滿嘔吐酸水
青皮去白 茴香炒 蒼术米泔浸 甘草炙各一兩
陳皮去白 肉桂去皮 良姜去芦 香附子 桔梗去芦三兩
右為末每服二錢鹽少許沸湯點服鹽酒亦可

（二十二） 木香調氣散 氣滯胃脘虛痞惡心宿冷不消心腹刺
白豆蔻 丁香 檀香 木香各二兩
麝香果 甘草炙 縮砂仁四兩
右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服 一方又名勻氣散

（二十三） 沉香降氣湯 治陰陽雜滯氣不升降胃脘痞塞喘促短
氣又治濕痰留飲意醋閉胸脇下支結常欲妨悶
沉香十八兩半 縮砂仁四兩 甘草炙十兩 香附子去毛四百兩
右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

（二十四） 三和散 方見秘結門 治五臟不調風氣雜滯面目虛浮

〔三十五〕藏方 **通氣丸** 宣導通氣除脹滿利大腸

大黃 四兩 濕紙裹煨 胡椒四十九粒 青皮去白
陳皮去白 蝎梢去毒炒 茴香炒 乾薑炮 甘草炙各一兩
阿魏半分用稀麪少許和作餅子油煎黃色 黑牽牛取頭末二兩

右為末蒸木瓜搜匀為丸如粟豆大每服二十丸溫鹽湯下不拘時量虛實加減服

〔三十六〕藏方 **消脹丸** 快氣寬中除腹脹消宿食

木香 黑牽牛炒 蘿蔔子炒 檳榔各等分

右為末滴水丸如梧桐子每服三十丸煎生姜蘿蔔湯食後下

〔三十七〕 **五香散** 升降諸氣宣利三焦疎導壅滯散邪熱

木香 丁香 沉香 乳香 麝香各等分

右㕮咀每服三分水一盞煎八分去滓食後溫服

〔三十八〕 **木香流氣飲** 治諸氣痞塞不通胸膈脹面目虛浮四肢臃滿口苦咽乾大小便秘

青皮去白 紫蘇去梗 半夏洗七次焙二兩 厚朴去皮薑汁炙 陳皮去白二斤 肉桂去皮不見火 香附子去毛 甘草炙各一斤 陳倉米一合 麝香不見火 大腹皮檳榔 丁香皮不見火 蓬莪朮煨 木香不見火 草果仁各六兩 木通去節八兩 麝香葉 白芷各四兩 赤茯苓去皮 白朮 人參去芦 石菖蒲各二兩 乾木瓜 乾朮

右㕮咀每服四分水盞半煎至一盞二枚前七分熱服

〔三十九〕 **三和圓** 治三焦不和氣不升降胸膈痞悶或傷生冷

枳實麩炒 檳榔 半夏湯洗各二兩 青皮去白 陳皮去白 丁香皮 白朮各半兩 京三稜 蓬莪朮各三兩 白豆蔻仁 肉桂去皮 麝香各一兩 黑牽牛一斤微炒取細頭末半斤

右為末酒煮麪糊圓如梧桐子每服五十丸食後生姜湯下

三十 **沉香木香丸** 治一切氣不外降脇肋刺痛胃脘痞塞

大腹皮炒 麥麩炒 紫蘇葉 香附子各二兩 人參半兩
神麯炒 一兩 姜黃 烏藥 一兩 陳皮去白 甘草各四兩
益智炒去殼厚朴去皮姜製 京三稜煨 蓬莪朮煨各三兩
檳榔 二分半 訶子煨去核半兩 白朮 一兩 沉香二分半

右爲末每服二分空心沸湯點服

三十一 **沉香降氣湯** 治三焦痞滯氣不宣暢心腹痛滿嘔吐痰涎五噎五膈並皆治之

沉香 木香 丁香 藿香葉 白豆蔻各半兩
人參去芦甘草炙 白朮各一兩 肉豆蔻 青皮去白
桂花 檳榔 陳皮去白 縮砂仁
川姜炮 枳實炒 白檀各二兩 白茯苓去皮半兩

右㕮咀每服三分水一盞入鹽少許同煎七分不拘時温服

三十二 **賺氣散** 治心胃痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通及傷寒兩脇疼痛攻心

并三稜 蓬莪朮炮各五兩 白朮三兩
木香半兩 枳殼炒一兩

右剉每服三錢水一鋌姜三片煎六分食前温服用砂糖少許調下

三十三 **順氣寬中丸** 治陰陽不和三焦痞膈氣逆澁滯中滿不快悲氣奔急肢体煩倦不欲飲食

枳實麩炒 京三稜煨 蓬莪朮煨 大麥蘗炒
人參去芦 桑白皮去皮 檳榔各一兩 甘草炙七分

右爲末每服二分入鹽少許沸湯點服不拘時

三十四 **分氣丸** 治胃膈氣痞痰實不化並宜服之

縮砂仁 青皮去白 陳皮去白 白豆蔻仁

京三稜炮　蓬莪朮炮　萬薑各　雞蔔子炒別研
枳實麩炒　木香各一兩　黑牽牛炒二兩取頭末
右爲末麪糊丸如梧桐子每服五十丸生姜湯下

三十五　紫沉通氣湯　治三焦宿食不消氣溢不能宣通腹脇脹大便秘

紫蘇葉　枳殼麩炒　陳皮去白　赤茯苓
甘草炒　檳榔各一兩　沉香　木香
麥門冬去心五味子

三十六　藏方三香正氣散　治陰多陽少手足厥冷氣刺雜滯沉滯

乾生姜　薄荷葉　荊芥穗　枳實麩炒各半兩
右㕮咀每服半兩水一盞半煎八分空心温服

三十七　葉氏消氣散　治血氣凝滯心脾不和腹急中滿四肢浮腫飲食无味小便不清

沉香　木香　丁香各半兩　陳皮去白　益智仁
木香　人參　半夏湯洗七次
青皮去白炒　桔梗炒各半兩　陳皮去白一兩炒　白茯苓去皮
草菓仁炒　大腹皮洗焙紫蘇連梗　木通各三兩
右㕮咀每服三分水一盞姜四片棗一枚煎空心熱服

三十八　藏方通氣丸　治氣滯胷膈脇痛

丁香皮　黑牽牛各五兩　蓬莪朮炮　萬薑各一兩
青皮　陳皮　白朮各一兩
茴香炒　蘿蔔子炒　益智仁
縮砂仁　枳殼去白麩炒各二兩
右爲末麪糊丸如梧桐子每服三十丸蘿蔔湯食後下

乾姜炮　丁香皮　蓬莪朮炮　烏藥各一兩
右爲末每服三分水一盞姜三片棗二枚煎服不拘時

(三十九) **通氣枳殼丸** 治氣結不散心胃痞痛通氣上攻分氣逐風

枳殼去穰麩炒　木通剉炒　青皮去白　陳皮去白
桑白皮剉炒　蘿蔔子微炒　白牽牛炒　黑牽牛炒
莪术炮　茴香炒　剉各等分

右為末生姜汁打麪糊為丸如桐子大每服二十丸煎橘皮湯下不計時候

(三十一) **氣積助氣丸** 治三焦痞塞胃脘脇肋滿悶氣不流通蘊結成積痰癖氣塊及五膈之氣並皆治之

京三稜炮　蓬莪术炮各二兩　青皮去白　陳皮去白
白术各十兩　檳榔　枳殼去穰麩炒　木香各十兩

右為末水煮麪糊丸如梧桐子每服五十丸熟水下

(四十一) **木香順氣丸** 治停飲積滯調諸氣不和

京三稜炮　石三稜　雞爪三稜　檳榔　蓬莪朮

陳皮去白　半夏生姜製　白茯苓去皮　人參去芦　白豆蔻仁
木香各一兩　黑牽牛微炒頭末五兩　縮砂仁　半兩

右為末麪糊丸如梧桐子每服五十丸食後姜湯下

(四十二) **丁香脾積丸** 治諸般食積氣滯胃膈脹滿心腹刺痛

丁香　木香不見火　巴豆去殼高良姜米醋煮各半兩
蓬莪朮三兩　京三稜二兩　青皮洗一兩　皂莢三大挺燒存性

右入百草霜三匙同碾為末麪糊丸如麻仁大每服十丸至二十丸止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡姜湯下嘔吐霍香甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔吐葛蒲湯下小兒疳氣史君子湯下此藥以五更初服利三五行後用白粥補之

(四十三) **神保丸** 治諸積氣為痛宣通臟腑

乾蝎七个全者　木香　胡椒各二分半　巴豆十个去心皮別研取霜

右為末入巴豆霜令勻湯化蒸餅圓如麻子大朱砂為衣每服五七粒心腸痛柿蒂灯心湯下腹痛柿蒂煨姜湯下血痛炒姜醋湯下肺氣甚者以白礬蛤粉各二分黃丹一分同研煎桑白皮糯米飲調下氣小喘止用桑白皮糯米飲下脇下痛炒茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一分下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿任下

四十四 五香繞痛丸 治冷物所傷脾胃遂成癖氣胷膈痞塞心腹疼痛

丁香　藿香　青皮去白枳殼去白麩炒木香　沉香　桂心各一兩硇砂四分　乳香　京三稜　陳皮一兩去白同巴豆五分去皮炒令黃色去豆　蓬莪朮　吳茱萸各一兩一方牽牛末三兩

右為末麪糊丸如菉豆大每服三十丸熟水下

四十五 磨積圓 治腸胃因虛氣癖於盲膜之外流于季脇氣逆息雜久則榮衛停滯潰為癰膿多至不救

胡椒一百五十粒全蝎去毒十个木香不見火二分半

右為末粟米飲為圓如菉豆大每服二十圓橘皮湯下

氣痛門 四六 手拈散 治心脾氣痛

草菓　玄胡索　五靈脂　沒藥各等分

右為末每服三分温酒調下

四十七 通滿圓 治心腹痞滿停氣刺痛嘔吐痰水不思飲食

黑牽牛微炒取頭末四兩檳榔　胡椒各半兩　木香二分半　京三稜兩半丁香皮一兩青皮去白二兩

右同牽牛末麪糊圓如小豆大每服五十圓空心姜湯下

四十八 化氣湯 治一切氣逆胷膈噎塞心脾卒痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣並皆治之

沉香　胡椒各一兩縮砂去殼　桂心去皮
木香各二兩　乾姜炮　蓬莪朮煨　青皮去白炒
茴香炒　甘草炙　陳皮去白炒　丁皮各四兩

右爲末每服二錢薑蘇湯調下婦人淡醋湯下

(四十九)蔥煎散　治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胷脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治之

延胡索　肉桂去皮　乾姜炮各二兩　蒼朮米泔浸一宿切焙
甘草炙各半斤　縮砂去皮　丁皮　檳榔各四兩
蓬朮　三稜煨　茯苓去皮　青皮去白各六兩

右爲末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎七分空心熱服

(五十)雞舌香散　治男子女人停積痰飲胷膈脹滿心脾引痛

良姜去芦炒　赤芍藥　肉桂去皮　香附子炒去毛

天台烏藥去木各四兩　甘草半兩

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯點服

(五十一)順氣木香散　治氣不升降胷膈痞悶時或引痛及酒食過傷噫氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛並皆治之

蒼朮米泔浸焙去芦　茴香炒各三兩　乾姜炮
陳皮去白　厚朴去皮薑炙　縮砂仁　丁皮不見火
良姜去芦　肉桂去皮　甘草炙　木香各一兩

右爲末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎八分熱服不拘時或入鹽少許沸湯點下亦可

(五十二)神砂一粒丹　治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子壹兩炮製去皮臍　橘紅並等附子停用

右爲末醋麪糊爲丸如酸棗大以硃砂爲衣每服一丸男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子

〔通治〕〔五十三〕木香分気圓 治一切気逆心胃痛悶腹脇虚脹

木香 甘松洗去泥各一兩 甘草炙六兩 香附子十六兩 蓬莪朮煨八兩

右為末米糊為丸如梧桐子每服三十圓姜湯橘皮湯任下

〔五十四〕木香分気丸 治證当前木香分気丸同

木香 香附子 蓬莪朮 丁香皮 甘松炮 甘草炙四兩 藿香葉 川姜黄 縮砂仁 檀香各一兩

右晒乾不見火搗羅為末稀糊圓如梧桐子每服三十丸生姜橘皮湯下不拘時常服寛中進食

〔五十五〕異香散 治脘気不和腹脇脹悶中刺痛飲食難化噫気吞酸一切冷気結聚最能治之

益智仁炒去売 京三稜炮 石蓮肉去皮一兩 蓬莪朮煨 甘草炙各一兩 陳皮去白各厚朴去皮姜炙二兩

右為末每服三分水一盞姜三片棗一枚塩一撿同前熱服

〔五十六〕橘気阿魏丸 治五種噎疾諸般心痛痃癖気塊冷気攻刺腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸気婦人血氣並皆治之

川芎 炒 生姜四兩切片塩半兩拌令黑色 蓬莪朮炮 茴香炒各一兩

肉桂去皮縮砂仁 丁香皮炒各半兩 甘草炙一兩

阿魏醋浸一宿同麪糊 青皮去白一兩半 胡椒半兩 陳皮去白一兩

右為末用阿魏和麪糊丸如雞頭大每嚼丸一斤用朱砂七分為衣每服三五粒丈夫気痛炒姜塩湯下婦人血気醋湯下

〔五十七〕青木香丸 治胃脘噎塞氣滞不思飲食常服寛中利膈

黑牽牛二百四十兩炒香 檳榔酸棗米飲裹煨熟去飯各四十兩 補骨脂炒香 蓽澄茄 木香二十兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和為丸如菉豆大每服三十丸茶湯送水任下

(五十八) 葉氏方 養氣丸 治一切氣疾調脾胃進飲食止瀉泄

木香　川乾姜炮　甘草炒　訶子炮去皮核
丁香各半兩　大麥蘗炒淨　白豆蔻去皮　厚朴去皮姜製
神麯炒　茴香炒　陳皮去白各一刃

右為末用白麪作糊丸如豌豆大每服五十丸空心參湯下

(五十九) 木香檳榔丸 疎導三焦寬利胸膈破瘀逐飲快氣

木香　枳殼麩炒　青皮去白　杏仁去皮尖麩炒
檳榔各一兩　郁李仁去皮皂角去白酥炙　半夏麴炒各三兩

右為末別以皂角四兩用漿水一椀搓揉熬膏更入熱蜜少許和丸如梧桐子每服五十圓食後溫生姜湯下

(六十) 分心氣飲 治一切氣留滯於胸膈之間不能流暢以致痞悶噎塞不通大便虛秘

木香不見火　人參去芦　麥門冬去心
丁香皮　陳皮去白各一刃

大腹皮炙　大腹子炮　桑白皮炒　草菓仁
桔梗去芦　厚朴去皮姜汁製　白术各半兩　香附子炒去毛
藿香去土　陳皮去白　紫蘇去根各兩半　甘草炙一兩

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片棗一个去核灯心十莖煎服

(六十一) 經驗調氣方 調順榮衛通流血脉快利三焦安和五藏治諸氣痞滯不通胸膈膨脹胃口若因乾嘔吐少食肩背腹脇走痛刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澁又治憂思太過怔忪鬱積腳氣風濕聚結腫痛喘滿脹急

人參　赤茯苓去皮　麥門冬
白术　白芷　半夏湯洗各二兩　陳皮
厚朴姜製炒　青皮去白　甘草　香附子炒去毛
紫蘇去枝梗沉香六兩　枳殼四兩炒　大黃麪裹煨切一兩
草菓仁　肉桂去皮不見火　蓬术煨切　大腹皮

丁香皮　檳榔　木香各不見火　㕮咀木通去節八兩
右粗末每服水一琖半姜三片棗二枚煎至七分去滓熱服
如傷寒頭痛總煮得疾入連根葱白三寸同煎外降陰陽汗
出立愈臟腑自利入粳米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎不拘
時候

〔六十三〕治疝氣發作痛不可忍者眞料五苓散一貼連根
葱白一寸灯心七莖煎湯吞下青木香丸五十粒即效

〔六十三〕失笑散治小腸氣痛婦人血痛欲死者
五靈脂　蒲黃妙各等分
右為末每服二分先用醋一合熬成膏水一盞煎服

〔六十四〕去鉞丸治奔豚疝氣或陰裏腫大
川烏尖七箇生用　巴豆七枚去皮只去九分油
右為末糕糊丸如梧桐子用朱砂麝香為衣每服二丸同青
木香丸三十粒空心冷鹽酒冷鹽水下三兩日一服不可多

〔六十五〕直指方四神丸治腎冷疝氣腹痛不已
吳茱萸揀淨二兩一半用老酒浸一宿一半用米醋浸一宿焙乾
大香附子炸淨一兩　菴澄茄
右為末米糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽湯吞下或乳
香葱白煎湯下亦可

〔六十六〕茴香練實丸治疝氣無問冷熱
川練子炒　茴香　山茱萸　食茱萸
吳茱萸湯洗　青橘皮去白陳橘皮　馬蘭花醋炒
芫花各乙兩
右為細末醋糊為丸桐子大每服三十丸温酒送下食前服
量人虛實加減丸數以利為度

〔六十七〕秘方治疝氣痛

杏仁一兩　舶上茴香乙兩　葱白焙乾半兩
同為末酒調噙胡桃嚥下

(六十八) **立效散** 治疝気
川芎　川練子　青皮去白　茴香舶上者
黒牽牛炒　桃仁各一兩
右為末每服二分無灰酒十盞煎八分温服

(六十九) **治小腸気** 痛不可忍者
烏藥擂研旧酒浸一宿　高良姜　茴香舶上者各一兩　青皮去白一兩
右為末每服二分遇發時熱酒調下

(七十) **金鈴丸** 治膀胱腫痛及治小腸気陰囊腫毛間水出
茴香炒　馬蘭花炒　海蛤　破故紙各三兩又　金鈴子肉五兩
兎絲子　海帶各三兩　木香　丁香各一兩
右為末麪糊丸如梧桐子每服三十丸温酒塩湯倶下

(七十一) **聚香飲子** 治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰
檀香　木香　乳香　沉香
丁香並不見火　藿香各一兩　玄胡索炒去皮　片子姜黄洗
川烏炮去皮　桔梗去芦炒　桂心不見火　甘草炙各半兩
右㕮咀每服四分水盞半姜七片棗一枚煎七分温服

(七十二) **三茱丸** 治小腸気痛外腎腫墜
山茱萸　吳茱萸　石茱萸各一兩　破故紙炒一刃七分
川練子一兩用班猫十四箇去翅足同炒赤色去班猫不用
黒牽牛炒一兩　青皮　茴香　青塩各三兩
右為末醋煮麪糊丸如梧桐子每服五十丸用桃仁十五箇
炒酒送下或茴香酒亦可

(七十三) **丁香練兒丸** 治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病治法同歸於一

當歸 去芦劉碎 附子 炮製去皮 川練子 茴香炒
右四味各一兩劉碎以好酒二升同煮酒乾為度焙作細末
每秤藥末一兩研入下項藥
丁香 木香各二分 全蝎十三个 玄胡乙兩
右四味同為細末入前項藥末內拌和酒糊為丸如桐子大
每服三十丸至百丸溫酒送下空心

(七十四) **茱萸內消丸** 治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝
陰惡偏墜痛引腎臍或生瘡瘍時出黃水
山茱萸 去核 桔梗 水浸一晚炒干 川烏 炮去皮尖 茴香 船上者去沙焙炒用 陳皮
白羌活 去蘆 青皮 去白 食茱萸 吳茱萸 湯洗七次焙干
肉桂 去皮各二兩 大腹皮 酒洗焙 枳實 去穰麩炒 五味子 海藻 洗焙
玄胡索 各二兩半 木香一兩半 川練子 炒 桃仁 去皮尖麩炒別研各二兩
右為末酒糊丸如梧桐子每服三十丸溫酒空心下

(七十五) **益智仁湯** 治疝氣痛連小腹叫呼不已診其脉沉緊是腎經有積冷所致
益智仁 乾姜炮 甘草炙
烏頭炮去皮生姜 各半兩 青皮去白二分
右㕮咀每服四分水一盞鹽少許煎七分去滓執服

(七十六) **玄附湯** 治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑滑泄
木香 不見火半兩 玄胡 炒去皮 附子 炮去皮臍各一兩
右㕮咀每服四分水一盞姜七片煎七分溫服不拘時

(七十七) **狼毒圓** 治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬刺痛
芫花 醋炒乾 漆炒烟盡 川烏 炮去皮臍各一兩 全蝎 去毒九枚 三稜 炮去皮臍各一兩
乾姜 炮 沒藥 各半兩 鱉甲 醋煮 狼毒 炒 椒紅 炒各半兩
右為末醋糊圓如梧桐子每服四十圓空心姜湯溫酒任下
甚者用鹽半斤炒極熱以故帛裹熨痛處

(七十八) **補腎湯** 治宿疝入腹小腸氣痛時復泄瀉胸膈痞塞

人參　茯苓　黃芪　附子炮去皮臍
白朮各一兩　沉香四分　木瓜兩半　羌活半兩
甘草炙　芎藭各二分　紫蘇七分半

右㕮咀每服三分水一盞姜三片棗一枚煎七分食前热服
嘔吐加半夏半兩姜七片煎

(七十九) **十補園** 小腸宿疝膀胱伏梁奔豚痰氣並皆治之

附子一兩用防風一兩判如黑豆大每四兩黑豆只用附子一合炒附子裂去諸藥只用附子去皮臍
葫芦巴　木香　巴戟去心　川練子炮取肉官桂
延胡索　茴香炒　破故紙炒各一兩
荳蔻去蒂船上茴香

右為末用糯粉酒打糊丸如梧桐子辰砂為衣每服五十丸
空心酒下婦人醋湯下若入益智子亦可

(八十) **川練散** 治膀胱小腸氣腎下撮痛上衝心腹下引足膝

夜多旋溺外腎瘙痒
破故紙炒　川練子蒸去皮核茴香炒各四兩
葫蘆巴酒浸炒三兩　乾姜炮一兩　附子炮去皮臍一兩半

右為末每服二錢空心熱酒調下

(八十一) **茱萸內消園** 治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成寒疝陰囊偏墜痛連腎腹小腸氣刺奔豚疫癖並皆治之

山茱萸去核　陳皮去白　吳茱萸湯洗七次焙干　馬蘭花醋炙　木香
肉桂去皮不見火　山藥焙　川練子蒸去皮核用　青皮去白用　茴香

右為末酒糊園如梧桐子每服五十園空心溫酒鹽湯任下

(八十二) **葫芦巴園** 治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍者

葫芦巴炒　茴香去土炒　吳茱萸湯洗七次炒十兩
川練子炒　大巴戟去心炒用　川烏炮去皮尖各六兩

右為末酒煮麪糊園如梧桐子大每服十五丸空心温酒下小兒五丸苗香湯吞下 一方加黑牽牛

(八十三)**大烏頭桂枝湯**治風寒痙柔腹中刺痛手足不仁身体拘急不得轉側或致陰縮悉皆治之

大烏頭五个炙者去皮尖蜜洗切大盞煎減半出湯洗切 芍藥 桂心 甘草炙二分半

右�once咀每服四分水盞半姜五片棗三枚入前煎烏頭蜜半盞同煎七分食前服 一法去烏頭用附子一个名蜜附湯

(八十四)**加味通忠散**治腎與膀胱虛實熱小腸氣痛小府不通

臞麥 木通 梔子 枳殼 連翹 甘草 黄芩

右剉每服五分水一盞半灯心二十條車前子五盞煎温服

(八十五)**八正散**治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門俱熱大小便不利作痛每服四分灯心二十條枳殼半斤煎食前服熱甚

者加淡竹葉十皮方見諸淋門

(八十六)**三白散**治膀胱虛熱風温相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩炒 桑白皮炒 白木 木通去節 陳皮去白各半兩

右為末每服二分姜湯調下

(八十七)**葵子湯**治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥咽不利

赤茯苓去皮 木猪苓去皮 葵子 枳实麩炒滑石 臞麥 木通去節 黄芩 車前子炒 甘草炙各等分

右�once咀每服四分水盞半姜五片煎八分温服不拘時

(八十八)**奪命丹**治遠年日近小腸疝氣腎腫硬陰間濕痒抓成瘡癬

呂宋黄去枝梗一斤四兩用酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童子小便浸各浸一宿用火焙干用澤瀉去灰土二兩

右為末酒煮麪糊園如梧桐子每服五十丸温酒鹽湯任下

或茴香湯下空心

(八十九) 金鈴子丸 治釣腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川練子 五兩 對作五分製 (一分) 用班猫一个去頭翅同炒去

班猫 (一分) 用茴香三分鹽半分炒熟去鹽留茴香入荽 (一分)

用黑犘牛三分同炒去犘牛 (一分) 用破故紙二分同炒茴

故紙入荽 (一分) 用羅蔔子一分同炒去羅蔔子

右將練子去核同破故紙茴香焙乾為末酒糊丸如梧桐子

每服三十丸溫酒空心下

(九十) 敷法 治腎氣偏墜

牡礪煅 良姜 各一兩

右為末津調傅大偏處須臾如火熱著痛即安

(九十一) 灸法 諸氣心腹痛小腸氣外腎弔痛疝氣小腹急痛不

可忍足大拇指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右極妙

又治疝氣偏墜

又法 量病人口角兩角為一摺斷如此則三摺成三角如△樣

以一角腎心兩角在腎之下兩旁尽處是穴左偏灸右右偏灸

左二七壯若灸兩邊亦無害

名方類證醫書大全卷之八

脾胃

人身之脾胃專藉之以容納五穀而尅化之脾屬土而居五臟之中寄旺於四時之內以土能容載萬物故好靜其脉常喜沉細而緩帶浮緊洪數者即有病之脉也尋常理脾助胃之道當用以平和之藥又須時其飢飽不以生冷之物傷之不爲寒暑所侵不爲七情所傷如是則氣體自然充實百病不生將理失宜或爲六淫七情相干爲嘔爲泄爲喘爲滿變生諸證又當於各類求之略述此以爲養生者之助

虛弱

參朮白朮散

治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病後調助脾胃此藥最好

白朮各二錢　蓮子肉去皮　人參
桔梗炒令黃色　山藥　縮砂仁
右爲末每服二錢棗湯調下

（一）**嘉禾散**治脾胃不和胸膈痞悶氣逆生痰不進飲食如
五噎五膈並皆治之
枇杷葉去毛炙　白茯苓去皮　薏苡仁炒　丁香
白豆蔻炒去皮　人參去苗　各一兩　白朮炒二兩　桑白皮炒　沉香
五味子炒　半兩　檳榔炒　青皮去白　谷蘗炒　藿香
杜仲去皮薑汁炙　石斛酒和炒　大腹子炒　陳皮
半夏薑一分同搗作餅炙黃色　神曲炒　麥芽半　木香七分半　甘草炙兩半
右㕮咀每服三分水一盞薑三片棗二枚煎七分溫服五噎
入乾柿一枚膈氣吐逆入雞白三寸棗五枚同煎

（二）**人參丁香散**治脾胃虛弱停痰留飲不能運化腹脇脹
滿短氣噎悶或吐痰水噫醋吞酸不思飲食漸至羸瘦
白芍藥半斤當歸去芦丁香
肉桂去皮　蓬莪朮　人參去芦各二兩　茯苓去皮　香附子炒　白朮
右㕮咀每服五錢水一盞薑三片棗三枚煎七分空心溫服

（四）**人參麥煎散**治脾胃不和中脘氣滯停積痰飲或因飲食
過度內傷脾氣嘔吐痰水
人參四兩　青皮去白三稜煨各十兩　乾薑炮　丁皮各六兩
茯苓去皮半斤　芍藥一斤　甘草炙十兩　蒼朮去皮半斤
右爲末每服二錢水一盞薑五片棗三枚煎七分空心溫服

（五）**人味理中丸**治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或嘔吐
痰水或腸鳴泄瀉
縮砂仁　川薑　麥蘗各二兩　白茯苓

神麯炒　人參各一兩　白朮四兩　甘草炙一兩半

右爲末煉蜜爲圓每兩分作十圓空心用一圓薑湯嚼下或加半夏麯一兩爲末入鹽點服亦可

六　大藿香散　治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛及泄瀉不已最宜服之方見泄瀉門

七　秘方思食圓

神麯炒九分　麥蘗炒六分　甘草炙　乾薑炮

人參各二分　烏梅去核五分

右爲末煉蜜圓如雞頭大每服十圓白湯下

八　是齋安中湯　治脾胃一切不利

麥蘗炒　神麯炒各三分　良薑炒　川薑炮　莪朮炮

陳皮去白　草菓　益智　甘草炙　三稜各一及一分

右爲末每服二錢食後鹽湯點下

九　生胃丹　治脾胃不足停痰嘔逆不思飲食此藥以南星粟米黃土爲主蓋南星醒脾粟米養胃黃土以土養土也

大天南星四兩用真黃土半斤將生姜汁作黃土成麪劑包裹南星慢火煨香透去土不用將南星切碎焙乾和後藥研

丁香　粟米一升生姜二斤和搗皮取汁浸蒸焙

木香不見火　厚朴去皮姜製　神麯炒　麥蘗炒　陳皮去白

防風去芦　白朮　縮砂仁　穀蘗炒　白豆蔻

青皮去白一兩半　夏麯二兩　人參　沉香不見火　甘草炙各半兩

右爲末法圓如菉豆大每服七十圓不拘時淡姜湯下

十　通膈圓　快氣進食利胷膈消膨脹

丁皮　黃連　白豆蔻

粉草各半兩　縮砂仁　香附子

木香五分　甘松　丁香各三分　檀香　片子姜黃各一兩

右爲末用薑湯加爲丏法圓如梧桐子每服三十圓白湯下

十一 補脾湯 治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參 茯苓 草果去皮乾姜炮各一兩 甘草炙各兩半 厚朴去皮姜製

右�once咀每服四錢水一盞煎七分空心服

十二 家藏方豆蔻橘紅散 溫脾養胃升降陰陽和三焦化宿食

丁香 木香各一兩 白豆蔻仁 人參去芦 厚朴姜製 神麯炒 乾姜炮 半夏麯炒 橘紅去白 甘草炙

右�once咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎七分温服

十三 家藏方沉香磨脾散 治脾胃虛寒心腹膨脹嘔逆惡心不思飲食或吐痰水

沉香 人參各半 丁香七分半 藿香去土一兩 白术 各半兩

檀香 甘草炙 白豆蔻仁 木香

縮砂 白术 肉桂去皮 烏藥各半兩

右�once咀每服三錢水一盞薑三片鹽一捻煎八分温服

十四 治中湯 治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉

人參去芦 甘草 乾姜炮 青皮去白 陳皮去白各一兩 白术 半

右�once咀每服三錢水一盞煎七分空心温服嘔吐不已加半夏薑分丁香減半名丁香温中湯

十五 千金大養脾圓 治脾胃虛弱停寒留飲腸氣壅塞翻胃吐食常服養脾壯氣多進飲食

枳殼去穰 陳皮去白 麥蘗炒 三棱炮 茴香 白姜炮 肉豆蔻 縮砂去皮 蓬术炮 茯苓去皮 良姜 益智去殼 胡椒 木香

藿香去梗 薏苡仁 紅豆 人參 白扁豆炒去梗炒 山藥 甘草各等分
右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯温酒任下

十六 白朮湯 理脾和胃順氣進食
白朮 厚朴 桂心 乾姜 甘草
桔梗 人參 當歸 茯苓各等分
右�once咀每服四錢水一盞棗一枚煎八分温服不拘時

十七 丁沉透膈湯 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通並皆治之
香附子炒 縮砂仁 人參各一兩 白朮二兩
木香 肉豆蔻 白豆蔻 丁香
青皮各半兩 沉香 厚朴姜製 藿香 陳皮各七錢半
麥蘗半兩 甘草炙兩半 半夏湯洗七次 草果 神麯各二錢半

右�once咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分熱服

十八 思食調中圓 治脾胃久弱三焦不調氣滯留膈痞悶不食嘔逆惡心或吐痰水
陳麯炒 麥蘗炒 陳皮去皮半夏麯各一兩 沉香 半兩
烏藥 一兩 檳榔 人參各七錢半 白朮一兩半 木香五錢
右爲末蜜調白麪打糊圓如梧桐子每服三十圓米飲吞下

十九 木香調中圓 治因飲食不調致傷腸胃心腹脹痛臟腑泄瀉米谷不化
木香 青皮去白 陳皮去白 肉豆蔻麪煨
檳榔 三稜炮 訶子 草豆蔻仁各一兩
右爲末麪糊圓如梧桐子大每服六十圓食前熱米飲下

虛寒 二十 麯术丸 治脾胃停飲腹脇脹滿不進飲食
神麯炒十兩 白朮五兩 乾姜 官桂各二兩

吳茱萸　川椒各二兩

右爲末薄糊圓如梧桐子每服五十圓生姜湯下有飲加半夏麴二兩煎服

(二十一)燒脾散治飲啖生冷黃菓不停留中焦心脾冷痛

乾姜炮　厚朴姜炒　草菓仁　縮砂仁　甘草

神麴炒　麥蘗炒　陳皮　高良姜各等分

右爲末每服三錢熱鹽湯點服不拘時

(二十二)溫中圓治脾咳惡寒口中如含霜雪中脘疼痛

白朮二兩　乾姜　半夏各一兩　細辛　胡椒各五分

右爲末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸空心姜湯下

(二十三)棗肉丸治脾腎虛寒腸鳴泄瀉胃脘不快飲食不化

破故紙四兩炒　木香不見火一兩　肉豆蔻麪裹煨二兩

右爲末燈心煮棗肉圓如梧桐子每服七十圓姜鹽湯下

(二十四)家藏方八味湯治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臟腑虛

吳茱萸湯洗七次　乾姜炮各二兩　陳皮　木香

肉桂　丁香　人參去芦　當歸洗焙各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分溫服不拘時

(二十五)壯脾丸治脾胃虛寒飲食不進心腹脹滿四肢無力或手足浮腫臟腑溏泄

豬猪肚一枚洗淨用造酒大曲四兩同剉厚朴二兩薑一兩入在肚內以線縫定外用葱椒酒煮爛取大曲前香厚朴焙乾和後藥

縮砂仁　麥蘗炒　神麴炒　附子炮去皮尖

白朮各一兩　木香不見火丁香各半兩　陳皮一兩

右爲末用猪肚和杵千百下圓如梧桐子每服五十圓用米飲送下不拘時

(二十六)補直圓大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不效者亦

有謂惡人之有生不善攝養房勞過度真陽衰憊坎火不温不能上蒸脾土沖和失布中州不運是致飲食不進胃脘痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑溏泄此皆真火衰弱不能蒸蘊脾土而然古人云補腎不如補脾余謂補脾不若補腎腎氣若壯卅田之火上蒸脾土脾土温和中焦自治皆進食矣

葫蘆巴 炒 附子 炮去皮 陽起石 煅 川烏 炮去皮
兎絲子 淘淨酒蒸沉香 不見火別研 肉豆蔻 面裹煨 肉蓯蓉 酒浸焙
五味子 略半 鹿茸 去毛蒸焙 酒川巴戟 去心 鍾乳粉 各一兩

右為末用羊腰子兩對治如食法葱椒酒煮爛入酒糊杵和圓如梧桐子每服七十圓空心米飲鹽湯任下

(二十七) 扶老強中圓 暖五臟健脾胃通和血脉除痰散積

神麯 炒二兩 麥芽 炒十兩 吳茱萸 炒 乾姜 炮各四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十元米飲下不拘時

(二十八) 養胃湯 治脾胃虚寒嘔逆惡心腹脇痛腸鳴泄瀉或有外感寒熱如瘧骨節煩疼並皆治之

藿香去梗厚朴姜製半夏湯洗茯苓各一兩 草菓
附子 炮 甘草炙 陳皮去白 人參各三分 白朮半兩

右�once咀每服四錢水盞半薑五片棗一枚烏梅半箇煎服

(二十九) 養脾圓 治脾胃虚冷心腹脹滿嘔逆惡心臟寒泄瀉

大麥蘗炒 白茯苓去皮 人參去蘆各 白朮半斤
乾薑炮 縮砂去皮各 甘草炙半斤

右為末煉蜜為圓每兩作八圓細嚼生薑湯下

(三十) 養命抽刀散 治脾胃積冷中焦不和心痞腹痛嘔吐痰癊米 炒二十五刃 乾薑二十刃 剉入巴豆半刃 良薑二十刃入班貓一 石菖蒲二十二刃 炒去班貓 黑艷去巴豆 不見火

右為末每服二分鹽湯温酒任下

(三十一) **大建脾散** 治脾胃虛寒不進飲食

白茯苓　甘草　白豆蔻　肉豆蔻　半夏 姜浸一宿
縮砂仁　青皮　薑澄茄　檀香　茴香
厚朴 姜汁製 神麯　乾姜　陳皮 各一兩 川烏 炮去皮臍
草菓仁　附子 炮去皮 尖 各二兩　白朮 四兩　丁香半兩

右㕮咀每服三錢水盞半姜七片棗一枚煎七分空心服

(三十二) **大建脾圓** 調中養氣和胃建脾治中焦積寒胃膈氣痞嘔逆惡心臟腑虛滑

肉桂 去皮 厚朴 去皮 炙 細剉 用生姜一宿 乾姜 炮 甘草 炙 各兩
附子 炮去皮臍 神麯 炒 白豆蔻 丁香 胡椒
白茯苓 去皮 人參 去芦 肉豆蔻 麪煨 麥蘗 炒 薑撥 各半兩
訶子 麪裹煨去核二錢半 白朮 木香 各五錢

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼溫米飲下

(三十三) **桂麯圓** 健脾胃進飲食尅化生冷溫中下氣

人參　薑撥　乾薑 炮　肉豆蔻 麪煨
良薑 炒　桂枝 去皮　陳皮 去白　縮砂仁
白朮 各一兩　甘草 炒　丁香 各半兩　神麯 炒 熟 三兩

右為末煮湯泡蒸餅圓如梧桐子每服七十圓米飲下

(三十四) **厚朴煎圓** 溫中下氣理脾進食常云補腎不若補脾然胃既壯則飲食進飲食既進榮衛血氣自盛矣

厚朴 一斤 浄洗切片 用水五升 同煮 水盡去朴 焙乾 乾薑 炮 肉豆蔻 麪煨
甘草 剉半寸長 一兩 一味 再用水五升 同煮 水盡去草 只將乾姜厚朴 焙乾
乾薑 同甘草煮 船上茴香 各四兩 附子 二兩 炮去皮臍

右同為末生薑煮棗肉圓如梧桐子每服五十圓米飲下

(三十五) **進食散** 治脾胃虛寒或氣或為生冷所傷或為七情所撓胃膈痞塞不思飲食痰逆惡心大便溏泄

半夏麴　肉豆蔻麪煨草果仁　乾薑炒
麥蘗菜炒　附子炮去皮尖　丁香
陳皮去白各一兩　人參去芦　厚朴去皮姜炒
右㕮咀每服四分水一盞薑五片棗一枚煎不拘時温服　青皮去白　甘草炙各半兩

（三十七）附子建中湯　治脾氣虛寒腹脇脹滿身躰沉重面色痿黃嘔吐不食大腑自利

肉豆蔻麪煨　白豆蔻　附子炮去皮厚朴去皮炒
白朮　乾薑炮　神麴炒　紅豆各一双
丁香　木香不見火　甘草炙　胡椒各半分
右㕮咀每服四分水一盞薑五片棗二枚煎不拘時温服

（三十七）木香頓散　治脾胃虛弱停食不化心腹絞痛腸滑自利

木香不見火　縮砂仁　良姜炒　乾姜炮
丁香各半兩　胡椒　青皮去白　陳皮去白

紅豆取仁　草菓仁　甘草各三分　白豆蔻仁二分
右㕮咀每服三錢水盞半姜三片棗一枚煎取一盞去滓棗再以銀器盛所煎藥於重湯內再煎八分空心熱服

（三十八）進食散　治脾胃虛冷不思飲食及久病人脾虛全不食妙

青皮去白　陳皮去白　良姜炒　肉桂去皮
甘草炙各二分　川烏頭炮　草菓肉各三箇　訶子煨去核五个
右爲末每服三錢水一盞姜五片煎七分空心服

（三十九）丁香煮散　治脾臟伏冷胃脘受寒胷膈疼痛心腹刺痛痰逆惡心翻胃吐食方見嘔吐門

熟艾（四）　橘皮湯　治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓去皮　橘皮去白　枇杷葉去毛炙　麥門冬去心
青竹茹　半夏湯七次　甘草炙　人參各半兩
右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎八分不拘時温服

(四十一) 清脾湯 治脾实伏熱口苦咽乾或有頭痛寒熱如瘧

茯苓 草菓 橘皮 白术各二兩 川芎 人參 白芷 桂心 甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片紫蘇二葉煎七分温服欲通利加大黄畧煎

(四十二) 平胃散 治胃經实熱口乾舌裂大小便秘澁及熱病後餘熱不除蓄於胃中四肢發熱口渴無汗

厚朴去皮姜炒 射干 米泔浸 升麻 茯苓各兩半 芍藥二兩 枳殼去穣麪炒 大黄蒸 甘草炙各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑棗煎七分空心熱服

(四十三) 瀉黄散 治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰痛心煩唇口乾燥氣滯不食

藿香 石膏 縮砂 山梔子

甘草各半兩 防風四兩

右剉碎同蜜酒炒香焙為末每服三錢水一錢煎温服

(四十四) 枳殼圓 治脾胃實熱風氣心腹壅滯四肢疼痛兩脇脹滿不食大小便秘方見秘結門

(宿積) (四十五) 丁香半夏圓 治脾胃宿冷嘔吐痰水噫悶吞酸

人參 丁香 木香 肉豆蔻 陳皮各一分 藿香葉半兩 半夏湯洗七次姜汁淹炒黄三兩

右為末姜汁糊元如小豆大每服四十元姜湯下

(四十六) 宣滯丸 治和脾胃寬胸消痰逆止嘔吐進益美飲食

官桂 乾姜各半兩 木香一分 大黄 蓬莪术 完花 醋浸湿焙乾 枳殼去穣麪炒 茴香炒 陳皮各乙兩

半夏二兩牽牛半斤取末四兩 巴豆四个

右為末滴水為丸如小豆大每服二三十丸温水下

(四十六) **小七香圓** 治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢

甘松炒八十兩　甘草炒　香附子炒去毛　丁香皮各一百兩

蓬莪朮煨　縮砂仁各二十兩　益智仁炒六十兩

右為末水化蒸餅圓如菉豆大每服二十圓溫酒姜湯任下

(四十七) **紅圓子** 壯脾胃消宿食并治冷癆

京三稜水浸軟青皮去白　蓬莪朮

乾姜炮　胡椒各三兩

右為末醋糊圓如梧桐子藥紅為衣每服二十圓食後姜湯下

(通治) (四十八) **七珍散** 開胃養氣溫脾進食

人參　白朮　黃芪蜜炙　山茱萸去核　甘草各一兩

茯苓　粟米炒

右為末每服三錢水一盞姜棗煎服又方加白扁豆一兩蒸用名八珍散

(四十九) **平胃散** 治脾胃不和不進飲食常服暖胃消痰

蒼朮去皮米泔浸二日五斤　厚朴去皮姜製炒香陳皮去白各二斤　甘草三十又二兩

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎或鹽湯點服亦可一方加草菓名草菓平胃散

(五十) **加減平胃散**

若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加霍香半夏○若加乾姜為厚朴湯○若瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連根葱白五寸豆豉三十粒煎二三服微出汗愈○若五勞七傷手脚心熱煩躁不安百節酸疼加柴胡○若痰嗽瘧疾加姜製半夏○若本藏氣痛加茴香○若水氣腫滿加桑白皮○若婦人赤白帶下加黃芩○若酒傷加丁香○若飲冷傷食加高良姜○若滑脫泄瀉加南星薑○若風痰四肢沉困加荊芥○若腿膝冷痛加牛膝○若渾身虛羸拘急加地

南木皮

骨皮○若腿膝濕痺加兎絲子○若白痢加吳茱萸○若赤痢加黃連○若頭風加薑本○若轉筋霍乱加南木皮○若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重膝腿酸疼及婦人宮藏久冷月脉不調者加桂○若胃寒嘔吐多加生姜一法加茯苓丁香各三兩共成六味○若氣不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各三兩生姜煎服○若与五苓散相伴爲對金飲子○若六一散相合爲黃白散○若与錢氏異功散相合爲調胃散○若欲進食加神曲麥蘗吳茱萸蜀椒乾姜爲吳茱萸湯○若加童本爲和氣散治傷寒吐利○若加霍香半夏爲不換金正氣散○若瘧疾寒熱者加柴胡○若小腸氣痛加苦練肉香

(五十二)天下受拜平胃散 治脾胃不和嘔吐痰水胃脘痞滿不飲食並皆治之

厚朴去皮薑汁炙 陳皮湯洗去白 生姜和皮 甘草炙各三兩

茅山蒼术去皮米泔浸一宿刨五兩 南京小棗二百枚去核

右用水五升煎乾搗作餅子曬乾再焙研爲細末每服二錢鹽湯點服卅湯姜五片烏梅二箇水盞半煎服

(五十三)小橘皮丸 消食化氣宜常服之

三稜 莪术 施煨 青皮 陳皮各去白

神麯炒 麥蘗炒各等分

右爲末陳米粉煮糊元如梧桐子每服五十元米飲下

(五十四)溫脾散

青皮 陳皮 縮砂仁 舶上茴香炒良薑

桔梗 白芷 厚朴各半兩 甘草 兩半

香附子 白术各半兩 木香 麥蘗

右㕮咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分空心服 紅豆 乾葛各三分

(五十四) **四君子湯** 治脾胃不調不思飲食

人參 去蘆 茯苓 去皮 白朮 各等分
甘草 炙

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分不拘時服(一方)加橘紅名異功散(又方)加陳皮半夏名六君子湯

(五十五) **開胃生姜丸** 治中焦不和胃口氣塞水穀不化噫氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹噦逆惡心嘔吐痰水宿食不消咳嗽脇肋刺痛寬中開胃進美飲食

桂心一兩 生姜四兩(切作片子焙乾) 青皮去白 陳皮去白 甘草炙各二兩 當歸各半兩 縮砂仁四十九个 廣茂

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼沸湯化下

(五十六) **二陳湯** 理脾胃消痰飲方見痰飲門

(五十七) **茯苓分氣飲** 治脾胃不和胃脘噎塞氣促喘急心下脹滿不思飲食又名分氣紫蘇飲姜三片鹽少許煎方見喘急門

(五十八) **八珍湯** 和血氣理脾胃

當歸 川芎 熟地黃 赤芍藥 人參 甘草 白茯苓 縮砂仁各等分

右㕮咀每服三錢水一盞姜七片棗三枚同煎空心溫服

(五十九) **直指方和中散** 和胃氣止吐瀉

石蓮肉 茯苓各二錢半 藿香 人參 甘草炙 白扁豆 天麻 木香 白朮各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎服

翻胃

翻胃之證其初也未有不由五噎五膈而始者五噎五膈者喜怒不常憂思勞役驚恐无時七情傷於脾胃鬱而生痰二与氣搏并而不降飲食不下蓋氣留於咽噎者為五噎結於胃膈者

附 五噎五膈 胸痺

為五膈治療之法當順氣化痰温脾養胃久而不治則氣体虛弱脾胃冷絶致成翻胃食罷即反或一日二日而反至此亦甚危矣非砭砂隊塹痰化積兼以剛劑暖胃不足以療此證如水穀並不能下方便集中一方用丁香附子為末於掌心舐喫亦一法也如趺陽脉緊而濇者為進治之證又有下虛之人氣上控膈令人心下緊滿痞急肌中苦痺緩急如刺不得俛仰名曰胃痺宜其證類乎五膈又當以厥氏瓜蔞實湯治之臨證又宜詳審

【虛寒】

方載脾胃門

(六十)【丁香散】治脾胃虛冷翻胃吐逆臟腑泄瀉等疾

丁香　肉豆蔻煨

附子一兩炮乾姜炮　白术各半兩　甘草三分

右為麤末每服三分水一盞姜五片煎六分空心服

(六十一)【養胃湯】治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

白豆蔻仁　人參　丁香　縮砂仁

肉豆蔻　炮附子　粉草炙　沉香

橘紅　麥牙　麥曲各二分半

右為細末姜鹽湯調下

(六十二)【大倉丸】治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

白豆蔻仁二兩　丁香乙兩　縮砂仁二兩　東倉米乙升用黃土炒米熟去土不用

右為細末用生姜自然汁法丸如梧桐子大每服百丸食後用淡姜湯送下

(六十四)【入參灵砂】治翻胃嘔吐飲食不下

灵砂一兩　丁香　木香　胡椒各半分末

右和勻煮東壁爛肉杵為丸景豆大每服六十粒姜湯米飲下良嚥酸曰吐黃水方載嘔吐門

(六十五)【安脾散】治翻胃吐食嘔

(六十六) **丁香附子散** 治翻胃不納飲食

大附子 一個 炙熟切去上小截留作蓋子勿使之碎
將下截窠一竅以丁香四十九粒安竅內以小截蓋之用線紮縛定砂銚內用生姜汁浸過附子為末和勻每服少許為則慢火熬至干取附子丁香為末和勻每服少許在掌內舌舐而喫日十數次忌毒物生冷

(六十七) **附子散** 治翻胃

大附子一枚炮磚上四面着火漸漸逼拶以附子淬入姜汁中再逼再淬約姜汁盡半椀為止却焙乾附子為末每服二分水一盞粟米同煎七分不過三服即愈

(六十八) **附子黃耆豆蔻飲** 治翻胃不進飲食

白朮 官桂 附子炮 厚朴去皮姜製 草蔻煨去皮
白芍藥 白茯苓 黃耆去蘆炙 良姜各一兩 白豆蔻
檀香各半兩 甘草炙三分 半夏三分湯洗七次
右㕮咀每服四分水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

(六十九) **神効丁香黃散** 治翻胃嘔逆

丁香各十四枚 北棗十個 切碎生姜七片 黃秫米
一石蓮肉
右用水椀半煮稀粥去滓食粥

(七十) **青金丹** 治一切吐逆及反胃妳神

(七十一) **六一** 治反胃妳神

五靈脂五兩 辰砂一分 母丁香一兩
為末入黃狗膽糯米粽子尖為丸雞頭大每一丸姜湯化下

(七十二) **小半夏丸** 治翻胃

半夏 胡椒
等分為末姜汁糊丸梧子大每三十丸姜湯下

(五膈) **五膈散** 治五膈氣結膀胱痞悶痰逆惡心不進飲食

木香不見火 青皮去白 大腹子
丁香不見火 乾姜炮 半夏麴炒 天南星湯泡去皮

草菓仁　麥蘗炒　白术各一兩　甘草炙半兩
右㕮咀每服三錢水一盞姜五片煎七分溫服

七十四　**瓜蒌實丸**　治胃脘痛徹背脇急妨悶
瓜蒌實別研枳殼去穰麩炒半夏湯洗七次　桔梗炒各一兩
右為末姜汁打糊丸如梧桐子每服五十丸食後炙姜湯下

七十五　**十膈氣散**　專治十般膈氣冷膈風膈氣膈痰膈熱膈憂膈悲膈水膈食膈喜膈
人參去芦　白茯苓去皮　官桂去皮　枳殼去穰麩炒
甘草炙　神麯炒黃色　麥蘗炒黃色　訶梨勒皮煨去核
蓬莪朮煨　京三稜煨　乾生姜炮　陳皮去白
白朮各一兩　厚朴去皮姜製　檳榔煨　木香各半兩
右為末每服二錢入鹽一字白湯點服如脾胃不和腹脇脹滿用水一盞姜七片棗二枚鹽少許煎服

七十六　**人參利膈丸**　治胃中不利痰噦喘滿利脾胃壅滯推陳致新治膈氣聖藥
木香　枳殼麩炒去瓤　檳榔七分半人參
甘草　枳實各一兩　大黃酒浸厚朴姜製二兩
右為末滴水為丸桐子大溫水送下

七十七　**百杯丸**　治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑將癖疾飲食不進日漸肌瘦如飲酒先服此藥百杯不醉亦無諸痰
紅皮三兩白秤去　木香
丁香五十个　甘草二錢炙　廣茂炮三分　乾姜三兩
縮砂仁三十个　白豆蔻三十个　青香
右為細末煉蜜為丸朱砂為衣每一兩作五丸生姜湯下細嚼無時

七十八　**通膈散**　治五種膈氣
京三稜炮三分　生姜一兩去皮切作片子
鹽二兩淹一宿焙乾

赤茯苓去皮 陳皮去白 訶梨勒皮 白朮 神麯炒
京三稜煨 草豆蔻去皮 檳榔半生半熟 乾姜炮 甘草炙
五味子炒 厚朴去皮姜製 郁李仁湯浸去皮麩炒 人參
肉桂去皮 半夏湯洗了和生姜同搗如泥却推在新瓦上
用文武火煆令黃色 枳殼去穰麩炒 木香各一兩
右㕮咀每服三錢水一盞姜棗煎服鹽湯點亦可

(七十九) **藏方姜合丸** 治中脘停痰胃膈痞結欲成翻胃
硇砂絹上飛過 肉桂去皮 附子炮去皮臍各一枚 茴香三錢半炒 丁香
陳皮去白 青皮去白 蓽澄茄 沉香各半兩 木香 兩
右為末次入硇砂研勻酒煮麪糊為丸每兩作二十丸每服
一丸以生姜一塊剜如合子安桑在內濕紙裹煨令香去紙
放溫細嚼鹽湯送下不拘時

(八十) **五膈寬中散** 治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胃

膈痞痛停痰氣逆遂成五膈之病一切冷氣並皆治之
青皮去白 陳皮去白 丁香各四兩 縮砂仁四枚 木香三兩
甘草炙五兩 白豆蔻去皮二兩 香附子炒去毛 厚朴去皮姜製
右為末每服二錢姜鹽湯點服不拘時

(八十一) **膈氣散** 治五種膈氣三焦痞塞嘔吐痰逆飲食不下
肉豆蔻 甘草炙 乾姜炮 青皮去白 檳榔炙
厚朴去皮姜製 枳殼去穰麩炒 木香各五兩
陳皮去白 蓬莪朮炮 益智仁 京三稜炮 肉桂去皮各十兩
右為末每服二錢水一盞姜棗煎服鹽湯亦可點服

(八十二) **漢防已散** 治噎
漢防已五錢 官桂乙兩 細辛七分半 陳皮去白一兩
羚羊角末七錢半 紫蘇七分半 杏仁洗去皮尖一兩
右為粗末每服三錢生姜三片水煎日進三服

(八十三) **五噎散** 治五噎食不下嘔噦痰多咽喉窒噎胸脅痛

人參 半夏 湯洗七次 沉香 不見火 白豆蔻 桔梗 去芦炒 木香 不見火 枇杷葉 去毛 乾生姜 杵頭糠 薑澄茄

右㕮咀每服三錢水一盞姜七片同煎食後溫服

(八十四) **攖氣向魏圓** 治五種噎疾九般心痛痰癖氣塊腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並皆治之方載諸氣門

(通治) (八十五) **奪命四生散** 治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲食服此荼多有神效不可輕視

白附子 洗淨炮 南木香 不見火 丁香 檳滓 川芎 肉桂 去皮不見火 新羅參 神麯各半兩 大草巢二个炮取仁 訶子七枚 取肉 縮砂仁二十粒 莪术炮 粉草 炙各七錢半 巴豆十四粒去殼心膜不去油冷水浸一宿別研為膏留就鉢中

右十二味曰乾為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩過入瓦合內以油紙蓋合口却用黃蠟和松脂溶如法封固合縫每以十二月上辰日或初八黃道生炁天月二德日至誠修合於地高爽處埋土中三尺深至次年六月中伏節擇吉日晴明時取出向當風處攤去濕氣以不漏瓦瓶收貯則密封壯實人每服用半錢臨睡百沸湯調半盞頻服仰卧片時徐以溫白粥壓下若羸弱只服一字二三服即能進食止嘔吐續以寒中散丁沉透膈湯橘皮煎元厚朴煎元等兼進佐助胃氣忌生冷魚腥粘膩并硬物一兩月則全愈妊孕婦不可服

(八十六) **沉香散** 治五噎五膈常服寬中進食

白朮 茯苓 各半兩 木通 大腹皮 白芷 各三兩 當歸 陳皮 青皮 大腹子 枳殼 去穣麸炒 木香 芍藥 各二兩 甘草 炙一兩 紫蘇葉 五錢

右為末每服二匁水一盞姜三片棗一枚煎七分空心温服

(八十七) 寛中進食丸 滋形氣喜飲食

草豆蔻五匁縮砂仁二匁半真蔓七匁 大麥蘗麪炒五匁半
枳実去穣麩炒四両 神曲炒五匁灸甘草一匁半
乾生姜 橘皮各二匁 木香一匁 白朮三匁
白茯苓三匁 猪苓去皮 澤瀉 人參
青皮 檳榔各二匁半

右為細末湯浸餘餅為丸如桐子大每服三十丸米飲湯送下食後服

名方類證醫書大全卷之九

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

諸虛

諸虛之證勞極鍼曰皆由体氣虛弱心腎有虧水火不自升降而致此疾然各有其所因不可不究諸虛者或稟賦素弱又為寒暑勞役所傷或色慾過度俱能戕賊真氣以致肌体羸瘦腰膝无力小便頻数大便滑泄目眩耳聾遺精自汗甚則虛炎上攻面紅發喘此皆諸虛之證勞極者七情傷乎五臟也尽力謀慮勞傷乎肝應乎筋極曲運神機勞傷乎心應乎脉極意外過思勞傷乎脾應乎肉極預事而憂勞傷乎肺應乎氣極矜持志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也勞極精氣変生

諸證其脉多弦治療之法虛者補煖之勞極者温而精而安其
五臟又隨其冷熱調之故素問云形不足者温之以氣精不足
者補之以味凡滋補之葽當用平和不可驟用峻補緣腎水枯
竭不足以當之又恐愈甚上炎之患慎之慎之

【心虛】(一)**參耆散** 治心氣不足諸虛百損常服調榮衛寧心志

人參　白朮　白茯苓　乾薑炮各半兩
烏藥　縮砂仁　沉香各二分　蓮肉去心一升
橘紅　黃耆　南木香　檀香各一分　甘草炙三分

右㕮咀每服四分水一盞姜三片棗一枚煎食前服一方加
熟附子一隻

(二)**補心圓** 治憂愁思慮過多心血虛寒悸恐不寐舌強話
難恍惚喜忘愁慘面黃多汗不進飲食方見心痛門

【肝虛】(三)**栢子仁湯** 治肝氣虛寒兩脇脹滿筋脉拘急腰膝小
腹痛面青口噤

栢子仁　白芍藥　防風　茯神
當歸　芎藭　附子炮去皮各一兩
細辛　桂心　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四分水一盞半姜五片煎七分温服

【脾虛】(四)**進食散** 治脾胃虛寒或食生冷或飲食不節或因思
慮傷動沖和之氣胃脘痞塞腹脹急情全不進食痰逆惡心大
便溏泄方見脾胃門

(五)**理中湯** 治脾胃虛寒方見脾胃門

(六)**北亭圓** 治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面
色青黃肌冷瘦弱怠惰好卧食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹
中虛鳴大便滑泄胃脘痞塞食飲不下霍乱轉筋五脇五噎反
胃吐食久痢並治之

砂仁　胡椒　肉桂
川芎　當歸　陳皮
阿魏醋化去土石　青鹽
五味子各二兩　白朮三兩

右爲末銀石器內入好酒醋五升白沙蜜十兩先下北亭阿魏青鹽三味并好頭麪一升同煎稠粘便下藥末半斤更煎如稀糊漸入藥末前得所取出更以乾藥末搜和成丸劑更擣千杵丸如梧子大每服十五丸生姜鹽湯下空心忌羊血豆豉汁

肺虛（七）**白石英湯** 治肺氣虛弱惡寒欬嗽鼻流清涕喘息氣微或咳欬膿血

白石英　細辛　五味子　陳皮　阿膠
鍾乳粉　桂心　人參　甘草各半兩　紫菀一兩

厚朴姜炒　附子炮
乾姜　甘草各四兩

北亭　醋洗去沙石

右剉每服四錢水一鈜半姜五片煎八分去滓溫服

腎虛（八）**安腎圓** 治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢无力夜夢遺精小便頻數常服補元陽益腎水

桃仁去皮尖炒四十八兩　肉桂去皮不見火十六兩
白蒺藜炒去刺巴戟去心　肉蓯蓉酒浸炙　山茱
破故紙　茯苓去皮　石斛去根炙　車前
白朮各四十八兩　川烏用去皮臍十六兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子每服三十圓溫酒鹽湯任下

九 **玄兎丹** 治腎水枯竭津液不生消渴諸證並皆治之

兎絲子酒浸溫研培乾取末十兩　五味子酒浸研末半兩
白茯苓　乾蓮肉各三兩

右爲末別碾乾山茶末六兩將浸酒余者添酒煮糊搜和擣數千杵元如梧桐子每服五十圓米湯空心下

(十)四柱散 治元臟氣虛眞陽耗散兩耳蝉鳴腎腹冷痛大小便滑數並皆治之方載泄瀉門

(十一)九子圓 強陽補腎益精氣壯筋骨

鹿茸一兩刮去毛酥塗炙令黃色其味甘酸其性温无毒主男子腰腎虛冷脚膝少力夜多異夢精溢自出助陰氣肉蓯蓉四兩酒浸三宿切焙干其味甘酸鹹其性温治男子絶陽不興女子絶陰不産潤五臟養肌肉暖腰膝益精血令人有子

仙茅一兩糯米泔浸三宿用竹刀刮去皮於槐木砧子上切陰乾其味辛其性温主丈夫虛損婦人失血无子久服通神養志壯筋骨益肌膚長精神明眼目

遠志一兩去心其味苦其性温主傷中補不足除邪氣利九竅益智慧聰耳明目強志久服輕身不老

續斷一兩搥碎去筋脚酒浸一宿其味苦辛其性温主助氣續絶補闕血脉補不足

蛇床子一兩微炒其味温辛其性平主男子陰萎温痺久服輕身好顏色強陰令人有子

巴戟一兩去心其味辛甘其性温主陰萎強筋骨安五臟補中增志益精養氣

檳榔子一兩舶上者微炒其味辛其性平主膀胱腎間冷氣周人重之能助陽道

車前子一兩其味甘其性平微寒主男子傷中強陰溢精令人有子明目利水道

右爲末用鹿角膠五條去血脉筋膜以无灰酒一升煮膠成膏更研極爛同煉蜜少許和圓如梧桐子每服五十圓温酒空心送下

（十二）**治補丸** 治腎水燥少不受峻補口乾多渴目暗耳聾腰痛腿弱小便赤澁大便或秘

天門冬去心川牛膝去芦酒浸熟乾地黃酒蒸生地黃洗白蒺藜炒 麥門冬去心白芍藥 地骨皮 石斛去根磁石火煅七次研水飛過玄參 沉香別研不見火各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十丸空心鹽湯鹽酒任下

（十三）**陽起石丸** 治腎臟虛損陽氣微弱

肉蓯蓉酒浸青鹽別研陽起石煅 韭子 山藥炒鹿茸酒蒸 鍾乳粉 兎絲子水淘酒蒸焙別研山茱萸取肉 桑螵蛸 沉香不見火原蚕蛾酒炙各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下

（十四）**兎絲子圓** 治腎氣虛損五勞七傷脚膝酸疼面色黧黑目暗耳鳴心忪氣短時有盜汗小便滑數並宜服之

鹿茸去毛酥炙一兩 續斷二分 桑螵蛸酒浸炒覆盆子去枝葉萬各半兩 防風去苗 杜仲去皮炒各三分

石龍芮去土一兩 肉蓯蓉酒浸焙三分

肉桂去皮一兩 補骨脂去毛酒炒三分

附子炮去皮尖三兩

沉香各三分 芎藭半兩 菟絲子淨洗酒浸一兩

石斛去根 熟乾地黃 茴香炒三分 白茯苓去皮 牛膝酒浸一宿焙干

山茱萸去核各二分 五味子半兩 澤瀉一兩

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子每服三十丸温酒鹽湯任下

（十五）**鹿茸丸** 治腎虛少氣腹脹腰痛手足无力飲食減少面色黧黑百節酸疼

鹿茸去毛酒蒸 五味子各二兩 川牛膝去芦酒浸 石斛去根 兎絲子淘淨酒蒸焙 棘刺 杜仲去皮炒焙

巴戟去心 山藥炒 陽起石煅 附子炮去皮尖 川練子取肉炒
磁石煅 官桂不見火 澤瀉各二兩 沉香半兩別研
右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心温酒下

十六 安腎丸 治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢体羸瘦
葫芦巴 補骨脂 川練 茴香 山藥
杏仁炒去皮尖雙仁炒別研 續斷各三兩 桃仁 茯苓各二兩
右為末蜜丸如梧桐子空心鹽湯服五十丸

十七 温腎散 治腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色
熟乾地黄一斤洗焙 牛膝 薤蓉 五味子各八兩
杜仲三兩 茸草酥炙八兩 巴戟 麥門冬各八兩 茯神 乾姜各五兩
右為末每服二錢空心温酒調下

十八 起痿丹 治腎經虛敗遂成骨痿腰腳難舉白加困乏
附子炮去皮尖 拘杞子揀去枝梗 肉蓯蓉酒浸焙乾 沉香不見火 官桂

朱砂別研 熟地黄酒洗焙 毋丁香各一兩 木香不見火 陽起石煅
天雄炮去皮臍或硫黄 鹿茸亦可 麝香別研 臍粉半兩 白丁香
右為末煉蜜丸如彈子大每用一丸以姜十火上入茶溶化
却用手點茶於腰眼上磨擦至茶尽用至二十丸大有神効
若有他処癱瘓風疾加皂角一片去筋槌爛姜汁浸一宿丸
上焙乾為末入前茶内依法用

十九 五精丸 治腎虛痿弱大補元氣
秋石剛健者 鹿角霜 茯神去木 陽起石 山藥各等分
右為末酒糊丸如梧桐子空心服五十粒須要常近火边使
乾燥庶幾服之无恋腸之患

二十 鹿茸丸 治精血虛憊補益腎水
嫩鹿茸一兩蜜炙 沉香 附子去皮臍當歸 茴香炒各半兩
兎絲子酒浸蒸數次研如泥 葫芦巴熟炒破故紙炒各半兩

右用酒煮糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽酒鹽湯下

(心腎虛)芡實丸 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面少顏色驚悸健忘小便赤澁遺精白濁足脛酸疼耳聾目暗

芡實蒸去殼 蓮花鬚各二兩 茯神去木 龍骨生用 五味子 枸杞子 熟地黃酒蒸 山茱萸取肉 韭子炒 肉蓯蓉酒浸 川牛膝去苗酒浸 紫石英煅七次各一兩

右為末酒煮山茶糊圓如梧桐子每服七十圓空心鹽湯下

(二十二)小兎絲子丸 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精常服補益心腎

兎絲子酒浸五兩 石蓮肉二兩 山茱二兩內七分半打糊 白茯苓焙一兩

右為末用山茶糊搜和圓如梧桐子每服五十丸空心溫酒鹽湯任下如脚膝无力木瓜湯下

(二十三)瑞蓮丸 定心煖腎生血化痰

蒼术主脾一斤內酒浸四兩醋浸四兩米泔浸四兩生用四兩 枸杞子主肝二兩去枝 蓮肉主心一斤去心內酒浸軟入猪肚內煮極爛取出焙干為膏每一斤約猪肚二个

北五味子主肺二兩去枝 熟地黃主血二兩酒浸蒸 破故紙主腎二兩炒

右為末煮猪肚膏同酒糊丸如梧桐子空心溫酒下四十丸

(肝腎虛)巴戟丸 治肝腎俱虛收斂精氣補元陽充肌膚進飲食

五味子 川巴戟去心 肉蓯蓉 人參 兎絲子

熟地黃 覆盆子 白术 益智仁 骨碎補

白龍骨 茴香 牡蛎各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸空心米飲送下

(二十五)鹿茸丸 治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不自勝持起居无力足脉酸疼肌体瘦悴氣血不生

肉蓯蓉酒浸天麻 兎絲子酒浸別研 牛膝酒浸

熟地黃　鹿茸火去毛酥炙　杜仲酒浸乾木瓜各等分

右為末蜜丸如梧桐子每服五十丸溫酒米湯任下

心脾虛　未病蓮心散　治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

蓮肉一兩　白朮　人參　白茯苓　五味子　木香

薏苡仁炒　扁豆炒　甘草炙　白芷

當歸各半兩　桑白皮　丁香　白芷

乾葛炒　黃耆炒　杏仁去皮尖炒

乾姜炮　山藥炒　半夏麴　百合　神麴炒各一分

右㕮咀每服三分水一盞姜棗同煎空心溫服（二十六）

脾腎虛　五味子丸　理肝腎俱虛收斂精氣補真陽止虛汗

益智仁炒　縮砂酒浸焙　白朮　兔絲子

五味子去梗　骨碎補去毛　土茴香炒

熟地黃洗　牡蠣各等分

搗篩為丸如梧桐子每服三十丸空心米飲下

（二十八）橘皮湯　治脾腎俱虛不進飲食肌体羸瘦四肢之力

常服壯脾胃益腎水

橘皮去白十兩　當歸去蘆　蓽澄　呉茱萸湯去浮者焙乾

荊三稜煨三兩　陳皮去白五兩　肉蓯蓉酒浸炙　肉豆蔻去皮

厚朴姜製　附子炮去皮尖　巴戟去心　石斛去根

鹿茸燎去毛酥炙　兔絲子酒浸焙　甘草炙一兩

右為末用酒五升於銀石器內將橘皮末煎數如餳却將諸

藥末入在內一處攪和搜勻仍入臼內擣千百杵圓如梧桐

子每服三十丸空心溫酒鹽酒任下

（二十九）十精丸　升降陰陽既濟水火平補心腎

遠志　青鹽　破故紙　白茯苓　益智仁各一兩

石菖蒲五分　兔絲子酒浸焙　牛膝各二兩　山茱萸半兩

右為末用獨活腰子一隻去膜和酒研細煮麪糊圓如梧桐

子每服五十圓空心鹽湯温酒任下如小便赤而少車前子
前湯下心虛精神不定棗仁末調湯下如心氣盛塞前冬門冬湯下一方去菖蒲加
熟乾地黃二兩并用羊腰子為圓

(三十)**完原心腎丸** 治水火不既濟心松盜汗夜夢遺精目暗
耳鳴腰膝綏弱常服調元陽補心腎
五味子去皮 人參去芦 遠志去苗甘草 附子炮去皮臍 龍骨煅
白茯神去木 鹿茸酥炙毛 當歸去芦酒煮 黃耆蜜炙各多 菟絲子酒浸蒸焙各二兩
牛膝酒浸 熟地黃各三兩 山藥一兩

右為末用浸藥酒煮糊丸如梧桐子每服七十丸棗湯送下
攝養多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通皆
治方載痰飲門

(三十一)**八味圓** 治下元冷憊心火上炎渴欲飲水或腎水不能
治方載痰飲門

(三十二)**黑錫丹** 治男子婦人上盛下虛痰涎壅塞氣不升降
方載痰飲門

(三十三)**靈砂丹** 治諸風風痰壅盛鎮墜升降陰陽方見痰飲門

(三十四)**養氣丹** 治諸虛百損真陽不固氣不升降方見氣門

(三十五)**養正丹** 治男子婦人上盛下虛水火不得升降方見氣門

(三十六)**丙丁丸** 生血養氣升降水火
附子一箇九炙重炮 川烏一箇七炙重炮
當歸二兩酒浸 赤芍藥五兩沉香 益智各半兩

右為末浸當歸酒煮麵糊丸如梧桐子朱砂為衣每服五十
丸空心鹽酒鹽湯任下婦人淡醋湯下

(三十七)**補髓丹** 升降水火益壽延年
補骨脂十兩用芝麻五兩同炒候無声去芝麻
杜仲去皮十兩炒黑 鹿茸燎去毛二兩酒炙 沒藥一兩別研

右將三味一處為末入沒藥和勻用胡桃三十箇湯浸去皮杵為膏入麪酒糊圓如梧桐子每服百丸鹽酒鹽湯任下

(三十八) 五福圓 治諸虛不足交媾心腎常服固精氣益心志滋補林白薑服之神效

辰砂一兩 鹿茸二兩炙作片 當歸酒浸焙 茯神去木各又 附子七分重者四个生去皮臍空中安辰砂在內以前頂子蓋定用線扎 杜仲去皮酒浸炙半 木瓜大者二个切開頂去穰入硃砂附子四个在內以木瓜元頂子蓋之線扎定糯米乾取出附子作片 培乾為末硃砂細研水飛和膏宣瓜者最妙 沉香別研一分 五味子一兩半 巴戟去心 黃耆去芦蜜炙各一分 遠志去心炒二兩 肉蓯蓉酒浸 川牛膝去芦酒浸 石斛去根酒浸各一兩

右為末用木瓜膏杵和入少酒打糊圓如梧桐子每服七十圓空心米飲溫酒鹽湯任下

益氣虛 黃耆建中湯 治男子婦人諸虛不足羸乏少力此茶大

生血氣補益榮衛 三十九

黃耆去芦 肉桂去皮各甘草炙二兩 白芍藥六兩

右㕮咀每服三錢水盞半姜三片棗一个同煎一法用炒浮小麥同煎去滓入飴少許再煎令溶稍熱服虛者加熟附子

(四十) 天真圓 治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不進腸胃滑泄津液枯竭又服生血養氣暖胃駐顏

羊肉七斤精者為妙洗去筋膜并去脂皮批開入茶末肉煮爛杵十分 當歸十二分去芦洗 山茶去皮十分 天門冬去心褙平一分

右四味為末置之羊肉內畢定以麻縷纏縛用无灰好酒四升又煮直候肉爛如泥再入黃耆末五兩人參末三兩白术末二兩熟糯米飯焙乾為餅將前後茶末同劑為丸如梧桐子大焙乾為末同入白中杵千下丸之如竟雞元入蒸餅五七枚焙乾為末同入蒸餅五七枚焙乾為末同入白中杵千下丸之

(四十一) **家藏五二仁五子圓** 治血氣耗損五臟不足睡中驚悸
益汗常服養心益肝生血補氣
兎絲子 酒浸一宿別研焙干 五味子 枸杞子 覆盆子
車前子 梧子仁 酸棗仁 炒 薏苡仁 炒 沉香
鹿茸 酥炙 肉蓯蓉 酒浸切焙 巴戟去心當歸 洗焙
白茯苓 去皮 乳香別研 熟乾地黃 焙各一兩
右為末次入研藥和勻煉蜜丸如梧桐子每服五十丸溫酒
鹽湯空心任下

(四十二) **双和散** 補益血氣虛勞少力
黃耆 熟地黃 當歸 川芎
官桂 白芍藥 甘草各三分人參五分
右㕮咀每服五分水二錢生姜三片肥棗一枚同煎至八分
去滓溫服大病之後虛勞氣之者此調皆驗溫而有補

(四十三) **訛訛書從容圓** 治丈夫壯受氣血有偏勝者氣勝血則陽盛宜服此藥和陽助陰
熟地黃 洗酒浸蒸二次焙乾二兩 穿山甲 炮炙巴戟
川當歸 洗焙各一兩半 人參 去芦 石蓮肉 兎絲子 炒焙
肉蓯蓉 洗焙 北五味 嫩黃耆 蜜炙 白茯苓 各一兩
右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓溫酒鹽湯任下

(四十四) **戊巳圓** 治丈夫婦人禀賦怯弱血氣衰敗飲食無味肌肉不生積年脾虛惡心嘔吐亦宜服之
胡椒五兩 人參 甘草炙各一兩 茴香炒
白茯苓 香附子炒各三兩 白朮二兩 朱砂半兩
右為末姜汁糊圓如梧桐子每服三十圓空心白湯下

(四十五) **烏沉湯** 生氣血補心腎虛損之人服此當勝大建中湯
人參 當歸大者去芦 白朮炒各一兩 天台烏藥

沉香半兩　白茯苓去皮　附子炮去皮尖一兩　肉桂去皮半兩
右為末每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎空心服

四十六 **家藏方八仙圓** 療元臟虛損血氣不足耳鳴目暗腰膝酸痛肌体羸瘦飲食无味

鹿茸一刃火去毛酒炙　麝香一分別研　肉蓯蓉酒浸焙　當歸洗焙　附子二兩炮去皮臍　天麻一兩
木瓜去子各四兩並用酒浸三日焙干
右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒送下

四十七 **十四味建中湯** 治榮衛失調血氣不足積勞虛損形体羸瘦短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸去苗酒焙　白芍藥　白术　麥門冬去心　黃耆
甘草　肉蓯蓉酒浸入參　川芎　肉桂去皮
附子炮去皮臍半兩　熟地黃酒浸焙　茯苓去皮各等分
右㕮咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎空心溫服

四十八 **人參養榮湯** 治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色汲汲短氣飲食无味

白芍藥生用　陳皮去白　黃耆蜜炙
桂心去皮　人參
熟地黃製　五味子
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗二枚煎服渣精加龍骨一兩咳嗽加阿膠

四十九 **家藏方不少園** 大補真氣虛損肌体瘦羸目暗耳鳴氣血凝滯脾胃怯弱飲食无味並宜服之鹽湯吞下空心

肉蓯蓉酒浸焙　遠志去心甘草炙各一兩
熟乾地黃洗焙各五錢　石菖蒲　山茱萸　枸杞子
杜仲去皮姜汁和酒炙香焙實　白茯苓　五味子各一兩
右為末煉蜜入蒸熟棗肉和勻園如梧桐子每服五十丸

(五十一)胡桃丸 益血補髓強筋壯骨延年明目悅心滋潤肌膚服之能除百病

破故紙 柴胡 萆薢 各等分 胡桃仁 各四兩

右三味為末次入胡桃膏拌勻杵千餘下丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒鹽湯任下

(五十二)黑囿 治精血衰竭面色黧黑耳聾目暗口乾多渴腰痛脚弱小便白濁上燥下寒不受峻補

鹿茸 酒蒸 當歸 去芦酒浸 各等分

右為末煮烏梅膏圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

(五十三)十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七傷此茶性溫平補常服生血氣壯脾腎

人參 去芦 肉桂 去皮 地黃 洗酒蒸焙 川芎 白芍藥 甘草 川當歸 去芦 各等分

右㕮咀每服四錢水二盞姜三片棗二个煎七分溫服

(後補)五十三 三建湯 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大小便滑數及中風涎潮不省人事傷寒陰證皆可服之

大川烏 附子 並炮 天雄炮 去皮臍 各等分

右㕮咀每服四錢水二盞姜十五片煎八分溫服不拘時自汗加肉桂小麥氣逆加沉香木香胃冷加丁香胡椒

(五十四)固陽丹 養氣守神固精壯陽補益眞氣常服有效

黑附子 炮三川烏頭 炮二 白龍骨 一兩 補骨脂 一兩七錢

川練子 船上茴香 各一兩

右為末酒打麪糊圓如梧桐子每服五十圓空心溫酒下日三服

(五十五)歸芎丸 補諸虛

當歸 酒洗 鹿茸 鹽酒炙 芎黃耆 鹽水炙 沉香 各一兩

靈砂二兩研 北五味子炒 遠志肉 酸棗仁 景茱萸
苗香炒 破故紙炒 牡礪煅 熟地黃
人參 龍骨煅 附子炮 巴戟各一兩
右煅製如法酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽酒下

(五十六) 鹿茸丸 益眞氣補虛憊壯筋骨生津液
鹿茸炙去毛酒浸炙十兩 熟乾地黃淨洗酒浸蒸焙半斤
附子一百四十个炮去皮臍 牛膝去苗酒浸一宿焙一斤四兩 山茱四斤
杜仲三斤半去皮炒去絲 五味子二斤 肉蓯蓉三斤酒浸一夕
右為末煉蜜丸如梧桐子用鹿茸香為衣每服三十丸温酒鹽
湯食後任下

(五十七) 十補圓 治眞氣虛撿顏色枯槁腰腳酸疼遺精白濁夜
多盜汗大便自利久服補五臟益精髓
乾姜炮 兎絲子酒浸別研 遠志去心姜汁浸炒 赤石脂煅

厚朴去皮姜汁炙各一兩 川椒去子及閉口者炒出汗二兩
巴戟去心 破故紙炒 附子炮去皮臍 肉桂去皮各一兩
右為末酒糊圓如梧桐子每服五十圓温酒送下

(勞傷) (五十八) 无比山茱丸 治諸虛百損五勞七傷肌体消瘦耳
聾目暗常服壯筋骨益腎水
赤石脂 茯神去皮木 山茱三兩 蓯蓉酒浸四兩
巴戟去心 杜仲去皮炒 牛膝去苗酒浸一宿焙 五味子揀六兩
澤瀉一兩 兎絲子酒浸三兩熟乾 地黃酒浸 山茱萸各一兩
右為末煉蜜丸梧桐子每服三十丸空心温酒下或鹽湯亦
可日三服

(五十九) 密原双補丸 治一切虛損五勞七傷面色黧黑唇口乾
燥目暗耳鳴夜夢鬼恐四肢酸疼煩熱盜汗
鹿角霜三兩熟地黃洗再沉香 兎絲子酒浸蒸

麝香一分別研　覆盆子去枝蒂　白茯苓去皮人參去芦宣木瓜
薏苡仁炒　黃耆炙
石斛去根炒當歸去芦酒浸
右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十丸空心鹽湯下

（六十一）双和湯治男子婦人五勞七傷血氣不足面色萎黃四肢倦乏將為虛勞之證常服養氣益血

白芍藥七兩　當歸去芦洗酒浸焙　熟地黃酒洗焙　黃耆去芦蜜炙各三兩
甘草炙三兩　川芎去芦半兩　肉桂去皮不見火二兩
右㕮咀每服三分水一盞姜三片棗一个煎空心温服

（六十二）金櫻丸治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷衰憊之極身体瘦削四肢困乏虛勞骨蒸羸疾並宜服之

金櫻取汁　生地黃取汁　仙靈皮取汁　木香
肉蓯蓉酒浸研　兔絲子酒浸別研　牛膝酒浸　生雞頭肉乾丁香

麝香別研後入　栢子仁別研　甘草炒
陳皮去白　葛蒲各一兩

生蓮子肉乾乾山藥
人參　茯苓去皮

右將兔絲子已下同為細末入栢子仁并以白沙蜜入銀石器中於炉內置熟火五斤煉蜜微解入兒孩母乳汁二升以木篦攪令上項膏汁同攪勻勿令住手傾入藥末一處攪黍至火消續續緩添熟火勿令大紧黍至膏成取出就于銀石器中候稍温入麝香末一處搜和成劑更於石臼中杵千餘下每兩作十丸每服一圓空心細嚼酒下

（失精）六十三水中金丹治元藏氣虛不足夢寐陰人走失精氣陽起石研　木香　乳香研　青鹽各乙分骨碎補炒
白蒺藜一兩紧者擂碎絹袋盛　黃戍腎一對酒一升煮熟切作片子焙乾研
茴香炒　杜仲各半兩生姜炙去皮　白茯苓二兩
右為細末酒麪糊和丸如皂子大每服二丸温酒下空心忌房室

黃成賢

(六十三) **金鎖正元丹** 治真氣不足吸々短氣四肢倦怠腳膝酸疼目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損之証並皆服之

五倍子八兩紫苑一戔去苗六兩補骨脂酒浸炒十兩肉蓯蓉洗焙一斤
葫芦巴炒一斤茯苓去皮六兩龍骨二兩朱砂三兩別研

右為末入研藥令勻酒糊圓如梧桐子每服二十丸空心溫酒鹽湯任下

(六十四) **松精丸** 治元氣不固夜夢遺精

大附子炮去皮臍龍骨煅赤巴戔去心肉蓯蓉酒浸一宿牛膝酒浸焙右等分為末煉蜜丸如梧桐子空心鹽酒下五十丸

(六十五) **玉鎖丹** 治精氣虛滑遺泄不禁常服澁精固陽

龍骨 蓮花蘂 雞頭実 烏梅肉各等分

右為末用熟山茶去皮研如膏和元如小豆大每服三十元空心米飲下

(六十六) **黃犬肉丸** 治真陽衰憊腎腹冷痛小便頻數夜夢遺精足脛酸疼腰背拘痛肌体羸瘦飲食無味

磁石二兩煅川烏炮去皮尖鹿茸酒炙去毛麋茸同上附子同上桑寄生川巴戔炒一兩略仙茅酒浸肉蓯蓉酒浸焙干陽起石煅別研龍骨生用沉香別研青鹽別研

右為末用黃犬肉二斤以酒煮面香煮爛杵和丸如梧桐子每服七十丸空心鹽湯任下

(六十七) **四精丸** 治思慮色慾過多損傷心氣遺精小便頻數

秋石 白茯苓各四兩 石蓮肉去心 水雞頭粉如先在上結子垂下各二兩

右為末以蒸棗肉杵和丸如梧桐子鹽酒鹽湯送下三十丸

(六十八) **石刻安腎丸** 治真氣虛憊腳弱緩弱夜夢遺精小便頻數

青鹽水研四兩 鹿茸炙去皮酥炙二兩 栢子仁擂細水酒研粉二兩 石斛去根

附子炮去皮尖 川烏炮去皮尖 巴戟鹽水浸去心 肉桂去粗皮
兎絲子酒淨酒蒸肉蓯蓉酒浸焙乾 蜚廉子微炒 胡芦巴酒炒
杜仲去皮姜汁炒去絲 破故紙酒炒 石斛去根酒蒸 遠志甘草煮去苗骨
赤石脂煅 茯苓去皮 川椒去目微炒出汗 茴香酒炒
菟朮米泔浸 川練子酒蒸去皮核 茯神去木各二兩 山茱洗淨為糊四兩

右為末山茱酒糊圓如梧桐大每服八十一圓空心鹽湯送下

(六十九) 沉香鹿茸丸 治氣不足下元冷憊腳脉酸疼四肢元力遺精溢汗一切虛損並宜服之

沉香一兩 附子炮去皮尖四兩 巴戟去心二兩
鹿茸去毛酒炙二兩 兎絲子酒焙五兩 熟乾地黃酒蒸六兩

右為末入麝香一分半別研和勻煉蜜丸如梧桐子每服五十粒好酒鹽湯空心任下

(七十) 桑螵蛸丸 治下元虛冷精滑不固時自遺瀝

附子 五味子
右為末絹糯米糊丸梧子大每服三十丸空心鹽酒下

(七十一) 斂陽丹 治脫精滑泄不禁

桑螵蛸三兩炙上焙乾 龍骨
右為末糊丸如梧子大每服七十丸白茯苓各一兩

白濁 秘精丸 治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂

牡礪煅 兎絲子酒蒸焙別研 龍骨生用 五味子
韭子炒 白茯苓去皮 白石脂煅

右為末酒糊圓如梧桐子每服七十圓空心鹽酒下 (七十一)

(七十二) 韭子丸 治膀胱脫腎冷小便白濁滑數无度

赤石脂煅 韭子炒 川牛膝去芦酒浸牡礪煅
覆盆子酒浸 附子炮去皮臍 桑螵蛸酒炙鹿茸酒炙焙
肉蓯蓉酒浸 杜骨生用 雞胵胵燒灰 沉香鏒不見火各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽酒下

七十三 威喜丸 治丈夫元陽虛憊精氣不固小便白濁餘瀝常流夢寐多驚頻〻遺泄婦人白淫白帶並宜服之

黃蠟四兩 白茯苓去皮同煮二十余沸取出日干不用豬苓一分於當內用豬苓

右以茯苓為末鎔黃蠟攪為丸如彈子大每服一丸空心細嚼津液嚥下以小便清為度忌米醋只噉糖醋

積冷 七十四 神仙楮實丸 治積冷氣衝心肖及背并蛇蟲疰痛痃癖疝氣塊眼花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡起則頭眩男子冷氣腰疼膝痛冷痺風頑陰汗盜汗夜多小便洩利陽道衰弱婦人月水不通小腹冷痛赤白帶下一切冷疾无問大小能明目益力輕身補髓益精

楮實子一升淘去泥微炒 牛膝半斤酒浸三日乾姜二兩炮 官桂去皮四兩

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下空心

七十五 椒附丸 治下經不足內挾積冷臍腹拘急辛動之方小便頻數夜多白汗

附子炮去皮尖半兩 檳榔半兩 陳皮去白 牽牛五味子各一兩 川椒去子微炒半兩 石菖蒲 乾姜炮各一兩

右剉碎以好米醋於磁器內用文武火煮令乾焙為細末醋煮麪糊丸如梧桐子每服三十丸鹽酒鹽湯空心任下

通治 七十六 茯冤丸 補圓 治元臟虛憊血氣不足白濁遺精白汗白利一切虛損並宜服之

茯苓去皮 肉蓯蓉酒浸各十兩 木香 附子炮去皮臍 巴戟去心 桂心各二兩 菟絲子酒浸別搗 羌活二兩 天麻 牛膝酒浸 白疾藜炒去刺各五兩 檳榔 萸芭五兩 川芎二兩 澤瀉各五兩 川椒炒去汗十双 桃仁炒去皮尖 五味子各一兩

右為末蜜圓如梧桐子每服五十丸鹽酒鹽湯空心任下

七十七 家藏方二至元 補虛損生精血去風濕壯筋骨

鹿角鎊細 以真酥一双无灰酒 蒼耳酒浸一宿炒焙 山茱四双
升煮干慢火炒令干
鏖角鎊細 以真酥二双米醋一升 當歸五双酒浸一宿焙干 沉香二双
煮干慢火炒干三味各半斤
白茯苓去皮 黃耆蜜炙四双 肉蓯蓉酒浸一宿焙干 人參去芦各
沙苑蒺藜去土洗焙各二双 附子炮去皮臍一双 遠志去心二双

右為末用酒三升糯米三合煮爛和杵圓如梧桐子每服五
十元溫酒鹽湯空心任下

七十八 康官大補湯 治男子諸虛不足婦人亡血一切虛損

鹿茸製 黃芪蜜炙 當歸酒浸各二兩 白芍藥
附子炮各兩半 肉蓯蓉酒浸焙 肉桂各一兩半 人參
杜仲炒去絲二兩 五味子兩半 熟地黃酒浸焙 白朮煨各兩半
白茯苓去皮二兩半夏 甘草半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎服

七十九 上冊 養五臟補不足秘固眞元調和榮衛久服明目駐顏交攝心腎男子無嗣女子不孕並宜服之

五味子半斤百部酒浸一兩焙干 兎絲子酒浸別研 肉蓯蓉酒浸
杜仲炒斷絲巴戟去心 遠志去心 枸杞子 山茱
防風去叉 白茯苓去皮 蛇床子炒 栢子仁別研各二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓空心溫酒鹽湯任下
春煎乾棗湯夏加五味子四兩秋加枸杞子冬加遠志各六
兩四季月加茯苓六兩

八十 中冊 補諸虛百損体氣羸弱精血不行上焦客熱中脘
停痰脾胃失調不進飲食並宜服之

人參 桂心各二兩 川椒炒出汗 熟附子 白茯苓
黃耆用一兩為末姜汁和作餅 當歸

右為末棗米飯搜和擣千杵圓如梧桐子每服五十圓空心

温酒米飲任下

(八十一) 小丹 補勞虛益氣血去風冷消百病

肉蓯蓉 酒浸 五味子 兎絲子 酒浸 各五兩 澤瀉 二双
熟地黃 各六双 柏子仁 別研 天門冬 去心 蛇床子 覆盆子 各三双 續斷
菖蒲 去毛 桂心 各二双 巴戟 去心 石斛 各三兩 人參 二双
天雄 炮 去皮臍 一双 煉成鍾乳粉 氣衰用三双 積老用二双 氣實則除去 常服用一双 山藥
杜仲 炒斷絲 白茯苓
右為末 煉蜜圓如梧桐子 食前酒服五十圓 小便多者去鍾乳倍地黃多忘倍遠志茯苓少氣神虛倍覆盆子欲容色光潤倍柏子仁虛寒倍桂心小便赤濇三倍茯苓一倍澤瀉吐逆倍加人參風虛倍天雄

(八十二) 家藏方 固真圓 治諸虛不足常服補益五臟接助眞陽潤澤肌膚強壯筋骨

川烏頭 鹽炒黃色 去鹽 熟乾地黃 洗焙 秦椒 各二双
肉桂 去皮苗 香附子 酒浸炒 威靈仙
山茱萸 五味子 炒 各一双 菟絲子 炒 各一双
白茯苓 去皮 當歸 洗焙 牛膝 酒浸一宿 石菖蒲 各半双
右為末 煉蜜和杵千餘下 圓如梧桐子 每服五十元 空心溫酒鹽湯任下

(八十三) 青娥丸 昔西蜀樂市中常有黑髮未顏道人每醉高歌厲声曰尾閭不禁滄浪竭九轉靈丹都謾說惟有玆穴項上珠能補玉堂闕下血即貧此葉也朝野遍傳一名玆花丸

辰砂 別研半分 當歸 去芦尾 地黃 九次蒸九焙 各八分 肉蓯蓉
鹿茸 去皮毛 切片 酥炙 無酥用燭酒炙 破故紙 炒 杜仲 去粗皮 炒斷絲 胡桃子 去殼 搗碎 鹿角膠 炒珠子 鹿角霜 大附子
右為末 酒煮麪糊丸如梧桐子 每服五十丸 空心溫酒鹽湯

任下用乳物壓之為妙

(八十四) 小安肾圓 治肾氣虛乏下元冷憊夜多漩濁股躰倦怠漸瘦弱腰膝沉重好卧以力精神昏憒耳內常鳴面無精光泄瀉腸鳴目昏藥痛一切虛損

香附子　川烏　川練子 各半斤用塩二双水二升同煮候乾切焙
熟地黃　茴香六双　川椒二双去目炒出汗
右為末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心塩酒下

(八十五) 無名丹 補虛守神強陽道澁精益氣男子服之有奇功

蒼朮一斤不浸杵令淨　龍骨一双　赤石脂二双
川烏　茴香　蓮肉　白茯苓
遠志 草水煮取皮 川練肉三双破故紙二兩炒
為末酒糊丸梧子大朱砂一兩另研為衣每三十丸漸加至百丸溫酒米飲塩湯皆可婦人無子服之有効

五味子　肉蓯蓉 酒洗　杜仲 各二兩　兎絲子 酒蒸
天門冬　川巴戟
車前子　鹿茸 酒炙　山藥　人參 去芦各一兩
澤瀉　熟地黃 酒蒸　枸杞子　生乾地黃
茴香　山茱萸
杏仁 去皮尖　胡芦巴　茯神 遠志 草水煮取皮 去骨 姜汁炒
川楝 去目炒　破故紙 炒　栢子仁　川當歸 酒蒸焙
赤石脂　伏盆子　川練子 去核 川牛膝 酒洗去芦
附子 炮去皮 沉香 不見火　麥門冬 去心續斷
右為末煉蜜為丸梧子大每服五十丸空心溫酒下或塩酒吞下或用粟肉為丸亦可

(八十七)正元散 治下元虛備心臟腑滑泄時或自汗陽氣漸微手足逆冷傷寒陰証霍乱轉筋久下冷利一切虛寒並宜服之

紅豆 炒 三分 人參 去蘆 二錢 附子 炮去皮臍一兩 肉桂 去皮半兩 陳皮 二分
山藥 姜汁炒 川芎 各一兩 川烏 炮去皮臍半兩 烏梅 去木一又 白朮 二又
乾薑 炮 三分 黃芪 炙半兩 乾葛 一兩 茯苓 去皮二兩 甘草 炙 二分

右㕮咀每服三分水一盞薑三片棗一箇入塩少許煎服不計時候

五勞

(八十八)羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤澁煩悶熱壅

羚羊角 鎊 柴胡 去苗 川當歸
決明子 羌活 去苗 赤芍藥 甘草 炙各等分

右㕮咀每服四分水一盞薑五片煎服不拘時

(八十九)續斷湯 治肝勞虛寒腹痛脹滿攣縮煩悶眼昏不食

續斷 酒浸 川芎 當歸 去苗酒浸 橘紅

半夏 湯洗七次 乾薑 炮各一兩 桂心 不見火 甘草 炙各半兩

右㕮咀每服四分水一盞薑五片煎服不拘時

(九十)黃芩湯 治心勞實熱口瘡煩渴小便不利

澤瀉 拖子仁
木通 生干地黃

黃芩 麥門冬 去心
黃連 去須 甘草 炙各等分

右㕮咀每服四分水一盞薑五片煎服不拘時

(九十一)遠志飲子 治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志 去心甘草煮干 茯神 去木
酸棗仁 炒去殼 黃耆 去蘆 桂心 不見火 人參

右㕮咀每服四分水一盞薑五片煎服不拘時

(九十二)人參丁香散 治脾勞虛寒不能運化腹脇脹滿短氣或吐痰水噫醋吞酸不思飲食漸至羸瘦方見脾胃門

人參 當歸 去蘆酒浸 甘草 炙半兩
丁香 各一兩

(九十三)小甘露飲 治脾勞實熱身体眼目俱黃咽喉腫痛

黃芩　川升麻　茵陳　梔子仁
桔梗 去芦炒　生地黃 洗　石斛 去根　甘草 炙各等分
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

（九十四）二母湯 治肺勞實熱面目浮腫咳嗽喘急煩熱頰赤漸成瘧疾

知母　貝母 去心　杏仁 去皮尖炒　甜葶藶炙各半
半夏 湯洗七次炒　秦艽 去芦　橘紅各一兩　甘草 炙半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

（九十五）温肺湯 治肺勞虛勞心腰冷氣胸脇逆痛時發咳嗽氣虛喘急

人參　鍾乳粉　半夏 湯洗七次炒　桂心 不見火
橘紅　乾姜 炮各一兩　木香 不見火　甘草 炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

（九十六）地黃湯 治腎勞實熱腹脹耳聾常夢見大水

生地黃 洗　赤茯苓 去皮　玄參 炒洗　石菖蒲
人參　黃耆 去芦　遠志 去心甘草煮　甘草 炙各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

（九十七）羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐鷩悸小便白濁

熟地黃　杜仲 去皮炒　石斛 去根　兎絲子 淘淨蒸焙別研
黃耆 去芦　川續斷 酒浸　桂心 不見火　磁石 煅醋淬
川牛膝 去芦酒浸　沉香 別研　五加皮 洗　山茱 炒各一兩
右為末雄羊腎丙對以葱椒酒煮爛入酒糊同杵和為丸
如梧桐子每服七十丸空心鹽湯下

（九十八）五加皮湯 治筋實極咳則兩脇下痛不可轉動并（六極）
脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急

羌活去芦　羚羊角　赤芍藥　防風去芦
五加皮洗　秦艽去芦　枳實去穰麩炒　甘草炙各半兩
右為末每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

九十九　木瓜散　治筋虛極腳手拘攣伸動不得十指甲痛數轉筋甚則舌卷卵縮唇青月面黑
虎脛骨酥炙　五加皮洗　木瓜去穰　當歸去芦酒浸　甘草
酸棗仁炒去殼　人參　桑寄生　栢子仁炒　黃耆去芦各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服不拘時

一百　茯神湯　脉虛極欬則心痛喉中介介如鯁狀甚則咽腫
茯神去木　人參　麥門冬去心　黃耆
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百一　薏苡仁散　治肉實極肌膚澁澁如聞虫走漆液開泄或手
薏苡仁　遠志去心甘草煮　通草
桔梗去芦炒　甘草炙各等分

川芎　薏苡仁　石膏　桂心不見火　杏仁去皮麩炒
羚羊角鎉防風去芦　漢防己　赤芍藥　甘草各等分
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百二　半夏湯　治肉虛極體重連肩脇不能轉動則咳嗽脹滿
留飲痰癖大便不利
半夏湯洗七次　茯苓　人參　白朮　大腹皮
橘皮去白　木香不見火　桂心不見火　附子炮去皮臍　甘草各等分
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百三　前胡湯　治氣實極胸膈不利咳逆短氣嘔吐不食
前胡去芦　半夏湯洗七次　杏仁去皮　紫蘇子炒
枳實　陳皮去白　桑白皮炙　甘草炙各等分
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百四 紫菀湯 治氣虛極皮毛焦枯四肢無力喘急短氣

紫菀茸　乾姜炮　黃耆去芦　人參
五味子　鍾乳粉　杏仁去皮尖麩炒　甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

百五 歡陽丹 治老人氣虛面紅自汗陽氣不斂者悉宜服之

靈砂　鍾乳各研末二分　金鈴子去皮核沉香鎚
木香　附子炮去皮臍　葫芦巴酒浸炒　陽起石煅成細粉水飛
破故紙酒浸炒　舶上茴香炒　肉豆蔻面裹煨　鹿茸酒炙
發蓉酒洗　牛膝去芦酒浸　巴戟去心各一兩　肉桂去粗半兩

右各末和勻酒煮糯米糊丸如梧桐子空心棗湯下三十丸

百六 玄參湯 治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓

苦瘖手足酸疼大小便秘

車前子　黃耆去芦　當歸去芦酒浸　枳殼去穰麩炒
麥門冬去心　白芍藥各一兩　甘草炙半兩　生地黃洗　玄參各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百七 鹿角圓 治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊

髮落齒枯甚則喜唾

鹿角二兩　川牛膝去芦酒浸焙一兩半

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓空心鹽湯下

百八 石斛湯 治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚則

胷中煩疼夜夢遺精

石斛去根　黃耆去芦　麥門冬去心
小草　玄參各一兩　甘草炙半兩
生地黃洗　白茯苓去皮

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百九 磁石圓 治精虛極氣体羸瘦盜汗走洩後遺瀝不已小
便白濁甚則陰萎

磁石煅醋淬一兩肉蓯蓉酒浸焙 鹿茸去皮毛酒蒸
川續斷酒浸 杜仲炒斷絲 栢子仁炒別研
赤石脂煅 熟地黃酒蒸焙 山茱萸取肉
兎絲子酒蒸別研 川芎戟去心 韭子炒各一兩
右爲末酒糊圓如梧桐子每服七十圓空心鹽酒鹽湯任下

名方類證醫書大全卷之九

名方類證醫書大全

十 十一
十二

VII
02
メ
1

東京

48082

名方類證醫書大全卷之十

癆瘵

癆瘵之證非止一端其始也未有不因氣体虛弱勞傷心腎而得之又有外感風寒暑濕之氣先寫瘧疾以致咳嗽寒邪入裏失於調治又不能保養過於房勞傷於飲食久而成癆瘵之候其為證者令人肌肉羸瘦皮毛乾枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹中有塊或脇後兩边有小結核或聚或散或咳嗽痰涎或咳唾膿血及傳變則為二十四種或三十六種或九十九種又有所謂五尸者曰尸蟲尸疰尸注尸厥尸痹傳變雖不一其實所傷不過五臟故傳於肝者面白目枯口苦自汗心煩驚怖傳於心者面黑昇乾口瘡喜忘大便或秘或洩

百々僕太郎寄贈

傳於脾者面青唇黃舌強喉哽吐涎体瘦飲食无味傳於肺者面赤鼻白痰吐咯血喘咳毛枯傳於腎者面黃耳枯胷滿脇痛白濁遺瀝又有二十四種勞蒸者亦可因證驗之蒸在心也心氣煩悶舌必焦黑蒸在小腸也腹內雷鳴大腸或秘或洩蒸在肝也目昏眩暈躁怒无時蒸在膽也耳聾口苦脇下堅痛蒸在腎也耳輪焦枯腰脚酸痛蒸在右腎也情意不定洩精白濁蒸在肺也喘嗽咯血声音嘶淡蒸在大腸也右鼻乾痠大腸隱痛蒸在脾也唇口乾燥腹脇脹滿畏寒不食蒸在胃也鼻口乾燥腹脹自汗睡卧不寧蒸在膀胱也小便黃赤凝濁如膏蒸在膈也心胷煩悶蒸在中時竟煩悶蒸在膈也心胷噎塞疼痛不舒蒸在宗筋也筋脉縱緩小腹隱痛陰器自強蒸在回腸也肛門秘澁傳道之時裏急後重蒸在玉房也男子遺精女子白淫蒸在腦也眼眵頭眩口吐濁涎蒸在脾也肌膚鱗起毛折髮黑蒸在骨也版齒黑燥大抒痰痛蒸在髓也肩背疼倦脇骨痛蒸在筋也眼昏脇痛爪甲焦枯蒸在脉也心煩体熱痛刺如針蒸在肉也自覺身熱多不柰何四肢曞動蒸在血也毛髮焦枯有時鼻衄或復尿血蒸傳及此未易言治若病之淺若服藥之外惟有早灸嘗言崔氏四花穴然生者可謂有命諸方所載皆云此證有虫嚙心肺間治法先當去之然後調養五臟致若傳尸一證名曰蒸殢殗復連屍疰劳疰中毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰是也大疰者注者自上注下病源无異是之謂傳尸此證相傳滅門者有之素无治法但今人多於病者未死之先逃於他所而幸免者設述於此古今有效之方開列于后

傳尸 一 取證主方

青桑枝　柳枝　桃枝　石榴枝

梅枝五枝各七莖長四寸許青蒿小握

右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉煎及一半去滓別
入安息香阿魏各一分再煎至一盞濾去滓調辰砂末半分
檳榔末一分麝香一字分作二服調下五更初一服五更三
點時一服至巳牌時必取下虫色紅者可救青者不治見有
所下即進軟粥飲温煖將息不可用性及食生冷毒物合時
須擇良日不得令猫犬孝服婦惡婦人見之

(一一) 神授散 治諸傳尸勞氣殺虫去毒
川椒二斤擇去子并合口者炒出汗
右為末每服二分空心米湯調下必痢痼暈悶少頃如不能
禁即以酒糊丸如梧桐子空心服五十丸又一方揀正川椒
炒為末老酒浸白糍丸如梧桐子每服四十丸食前鹽湯下
服至一斤瘵疾自差此藥兼治諸痢用肉桂煎湯下腰痛尚
煮酒下腎冷塩湯下

(一二) 雄黄丸 取傳尸蟲
雄黄半兩 兎糞二兩
鼈甲 木香各半兩 天靈蓋一兩酥炙
右為末法酒一升大黄半兩熬膏丸如彈大朱砂為衣凡此
疾先燒安息香煙吸之不噉非傳屍也不可用此丸若煙入
口咳不止乃尸也宜此丸五更初服勿令人知用童子小便
同酒化一丸服之如人行二拾里許吐出蟲或如灯心或如
爛瓜李或如蝦蟆未效再服以應為度虫用紅火燒之又用
油煎

(一三) 蘇合香丸 治痨瘵傳尸骨蒸發熱肺痿喘急方載諸氣門

(一四) 骨蒸地骨皮散 治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多盗汗
地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼
知母 當歸 鼈甲醋炒黄

右等分為末水一盞桃柳枝頭各七个姜三片烏梅一个每
服去滓臨卧服 (五)

(六) 地仙散 治骨蒸肌熱一切虛勞煩燥並皆治之
地骨皮 防風各一兩甘草二分半
右為末每服二分水一盞姜三片竹葉七片煎服

(七) 經驗方 治男子婦人骨蒸勞瘵增寒壯熱
青蒿 (春夏用葉秋冬用子不用葉用根不用莖四者相似而反以為痼疾必用童子小便浸過使有功淡无毒)
大鱉甲 醋炙 白朮 煨
粉草 炙 楝參 去頭 瓜蔞實 地骨皮 白茯苓 桑白皮 蜜炙
右為末每服三分水一盞姜三片煎服

(八) 清骨散 治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵去骨熱如神
生地黃 一兩 人參 防風 去芦 各一分 北柴胡 去芦 薄荷葉 七分半

奏艾 赤茯苓 酪 一胡黃連 半兩 熟地黃 一兩
右㕮咀每服四錢水一盞煎七分溫服患骨熱者先服并逢
煎丸一服使臟腑微利然後服此

(九) 四炙丸 凡骨蒸莫非是勞脊骨尤屬腎虛腦竭也以局方
黃耆鱉甲散 沉香鱉甲散 奏艽鱉甲散 青蒿鱉甲散
四散和合為末以雄羊脊骨一具斫碎煉汁調和為丸溫酒
吞下治脊痛骨熱漸成蒸疾一劑而效其功全在脊骨膏也

(十) 青蒿散 治骨蒸癆增寒壯熱
青蒿 春夏用葉秋冬用子以童子小便浸一宿
大鱉甲 炙 醋淬 白朮 地骨皮 白茯苓
粉草 人參 瓜蔞根 北柴胡 桑白皮 各等分
右剉每服四錢水一盞半煎溫服

(十一) 團魚丸 治骨蒸潮熱咳嗽累效

貝母　前胡
北柴胡各二兩　知母　杏仁
右同魚煮熟提起去頭取肉連汁食之却將藥焙乾為末用
魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥為丸梧子大每服二十丸煎
黃芪湯空心下病安仍服黃芪六一湯補理

十二 一物黃連飲 治骨節間熱漸至黃瘦
右以黃連一兩剉用童子小便一大升浸經宿微煮去滓食
前分二服如人行五里再服

十三 人參散 治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛夜
多盜汗四肢倦怠一切血热虛勞並宜服之
黃芩半兩　人參　茯苓　白朮　半夏麴
赤芍藥　杜仲　當歸　甘草　乾葛各一兩
右㕮咀每服三錢水一盞姜四片棗二枚煎服

十四 白朮黃耆散 治五心煩自汗四肢痿劣飲食減少肌瘦
白朮　黃耆　當歸　甘草炙各二兩
石膏　官桂一分人參　川芎各三分
右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服食前一日三服

十五 秦艽扶羸湯 治肺痿骨蒸已成勞嗽或突或熱去嗌不
出体虛自汗四肢怠墮
柴胡去苗　人參去芦　鼈甲米醋炙　秦艽　當歸洗焙各
地骨皮一兩半要湯洗炒　甘草各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片烏梅大棗各一枚煎七分
食後温服

十六 青蒿散 治虛勞骨蒸咳嗽聲嗄嗌皮毛乾枯四肢倦怠夜
多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱

香附子 炒去毛 桔梗 去芦 天仙藤 鱉甲 醋炙 青蒿 各一兩
甘草炙 兩半 烏藥半兩 前胡 去苗 秦艽 各一兩 川芎二分半
右為末每服二分水一盞姜三片棗一枚煎食後服

十七 鱉甲地黃湯 治虛勞手足煩熱心下怔忡及婦人血室有乾身体羸瘦飲食不為肌肉

柴胡 去芦 當歸 去芦 酒浸 麥門冬 去心 鱉甲 石斛 去根
白朮 熟地黃 酒焙 茯苓 去皮 秦艽 去芦 各一兩
人參 甘草炙 各半兩
肉桂 不見火
右㕮咀每服四分水一盞姜五片烏梅一枚煎服不拘時此藥專治熱勞其性差寒虛甚而多汗者不宜服

十八 秦艽鱉甲散 治氣血勞傷四肢倦怠面黃肌瘦骨節煩疼潮熱盜汗咳嗽痰唾山嵐瘴氣並皆治之

秦艽 去苗 天仙藤 前胡 去芦 秦艽 去芦 洗
并莽 去梗 貝母

青皮 去白 柴胡 甘草炙 陳皮 去白 白芷
鱉甲 去裙醋浸炙各一兩 肉桂 去皮 乾葛二兩 羌活 五分
右為末每服二分水一盞姜三片煎八分熱服酒調亦可

虛勞

十九 猪骨煎 治男子婦人虛勞發熱熱從脊骨上起者此藥有神効更宜審病而後服之

猪脊骨一條 去尾五寸細劉用好法醋六升青蒿一握
烏梅十个 柴胡一兩 去芦 秦艽一兩 去芦 煬火同煮耗一半去滓入
蜜半斤同煮成膏子 沉香 各半兩 川牛膝 去芦 酒浸
茴香炒 人參 去芦 白茯苓 去皮 破故紙 炒各一兩
鱉甲 醋炙 鹿茸 酒浸酥炙 肉蓯蓉 酒浸 巴戟 去心 酒浸
附子 炮去皮臍 各二兩 當歸 去芦 五味子 川芎 各一兩
右為末用前猪骨膏子搜和為丸如梧桐子米飲下五十丸

二十 大補十全湯 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨疼拘急疼痛夜夢遺精面色痿

黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩熱並皆治之方見虛門
一方治發寒熱漸成勞瘵者

十全大補湯 加黃連煎服熱在骨節更加青蒿鱉甲煎
一方治骨蒸發熱飲食自若者大補湯柴胡等分同煎

人參潤肺圓 治肺氣不足咳嗽成勞方見咳嗽門

(二十一) 家藏人參肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

人參去芦　當歸去芦　熟乾地黃
川芎　白朮　甘草炙　麥門冬去心
五味子　桑白皮　白茯苓去皮各半兩　阿膠一兩蛤粉炒

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

(二十二) 榮令建中湯 治臟腑虛損身体消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡去芦　細辛　黃耆蜜炙　人參去芦
桂心　橘皮去白　當歸去土　白芍藥
茯苓去皮　麥門冬去心　甘草炙　半夏湯洗七次

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

(二十三) 黃耆飲子 治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱乏力日漸黃瘦
胷膈痞塞咳嗽痰多甚則唾血

黃耆蜜炙兩半　當歸去芦酒浸
地骨皮去皮　人參
鹿茸酒蒸　款冬花酪一半　夏湯洗七次　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚煎服此藥溫補榮衛枯燥者不宜進唾血加阿膠蒲黃各半兩

(二十四) 混元丹 治勞損五臟補益氣

紫河車一具用小婦首生男子者良水洗斷血脉入麝香一分帶子全者於東流絹包墜懸胎於砂瓮內入麝香一分在內以線縫定用生灰酒五升慢火煮成膏

沉香別研　朱砂別研飛各一兩　人參　茯苓酒浸
乳香別研　安息香酒煮去沙各二兩　白茯苓去皮三兩
右為末入河車膏子和藥末杵千百下丸如梧桐子每服七
十丸空心温酒下沉香湯尤佳服之可以輕身延年補損扶
虛如病證虛極又須增加後項藥味
川巴戟去心鍾乳粉　陽起石煅鹿茸酒蒸　龍骨
黃耆去芦各二兩　桑寄生　香附子　紫菀
修製為末和前藥為丸如婦人血海虛損榮衛不足多致潮
熱經候不調或閉斷不通又宜增加此藥
當歸去芦石斛去根　紫石英煅醋淬水飛　栢子仁妙別研
鹿茸酒蒸　鱉甲醋炙　卷栢葉各一兩　川牛膝去芦酒浸兩半
修製為末和前藥為丸湯使如前虛冷者加炮熟附子二兩
咳嗽者加紫菀茸二兩

當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調月水過多喘嗽者

茯苓去皮　黃芩　白龍骨各一兩　當歸　芍藥
生地黃　甘草　川芎　白朮　梔子　黃蘗子各半兩
右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食前

黃耆鱉甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食多渴咳嗽有血

桑白皮　半夏煮　紫菀去芦各三兩　黃耆
地骨皮　秦艽去芦各三兩　甘草炙各二兩半　白茯苓去皮
肉桂去皮　人參　苦梗洗一兩六錢半　天門冬去心焙　知母焙　赤芍藥各三兩半
生乾地黃洗焙三兩　柴胡去苗梗三兩三錢　鱉甲炙去裙醋煮各五兩

經效阿膠丸 治勞嗽并嗽血唾血

卷栢葉　山藥炒　阿膠蛤粉炒　生地黃　防風去芦
雞蘇各一兩　栢子仁炒別研　大棗
百部洗去心　遠志去心甘草水煮入參　五味子　茯苓
右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎小麥湯下
麥門冬去心各半兩
大煎根
（二十八）家藏方蠟煎散治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血
杏仁去皮尖双仁者炒黃別研　黃明鹿角膠炙如无以甘草炙人參
麥門冬去心　乾山藥　貝母去心　白茯苓去皮　百合去苗各等分
右㕮咀將杏仁別研拌勻每服二錢水一盞入黃蠟皂角子
大同煎七分食後溫服
（二十九）團參飲子治憂思喜怒飢飽失宜致臟氣不安咳唾膿
血增寒壯熱肌膚瘦減將成痨瘵方見咳嗽門
（三十）鍾乳補肺湯治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾
血腥臭漸成肺萎方載咳嗽門

若人初得骨蒸勞瘵即便灸之無不效者用細繩一
條約五六尺蟠之勿令屈縮以病人順脚底貼肉量男左足女
右足從大拇指頭齊起從脚板底當脚跟中心向後引繩循脚
肚貼肉直上至曲脊中大橫紋截斷又令病人解髮分兩邊令
見頭縫自顖門平分至腦後以患身正坐取前所截繩子一頭
從鼻端齊引繩向上正循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩
向下至繩盡處當脊以墨點記此不是穴別取一繩子令病人
合口將繩子按口上兩頭至吻却鈎起繩子中心至鼻端根下
如人樣齊兩吻截斷將此繩展直於前在脊骨上墨點處取中
橫量勿令高下於繩兩頭以白圈記之此白圈兩穴乃是灸穴初灸七壯累灸至百壯
此名患門穴灸此訖次令病人平身正坐稍縮臂膊取一繩子
遶項向前双垂與鳩尾齊鳩尾即心岐骨人無心岐骨即取鳩尾前兩岐間量一寸即是鳩尾骨即截
斷却皆翻繩頭向項後以繩子中停取心正當喉嚨結骨上其

繩兩頭夾項双垂循脊骨中双繩頭齊會處以墨點記不是別取繩子令其人合口橫量齊兩吻截斷還於脊骨上第二次墨點處摺中橫量繩子兩頭以白圈記之此是灸穴初灸七壯累灸至百壯又將第二次量口繩子摺中當脊直上下竪停中心在第二次墨記上下繩頭尽處以白圈記之此是灸穴初灸七壯累灸百壯此縱橫四方凡四穴是名曰四花穴初灸各七壯治瘡愈其疾未効依前法復灸故云累灸至百壯點以灸時用灸足三若婦人緇帛裹足以至短小所有灸法第一次患門穴難以量度不若只取膏肓腧灸之在第四推下兩旁各三寸是穴次灸四花穴道斬累以此法灸人無有不効者

咳逆

咳逆之證古人以爲噦者是也此證多因病後未得調理或吐利之後胃中虛寒遂成此證亦有胃虛膈熱噦至八九声相連

攻氣不回者亦有噦而心下緊痞眩悸此乃膈間有痰故也當詳其脉證施以治法大率胃実則噫胃虛則噦年高氣虛及婦人産後多有此證皆是病深之候非易治也

〔一〕冷證

〔二十一〕丁香散 治咳逆噎汗

丁香 柿蒂各一分 甘草炙 良姜各半分

右爲末每服二分用熱湯點服不拘時

〔二十二〕橘皮乾姜湯 治噦

人參一兩 通草 桂心 橘皮乾姜 甘草炙各二兩

右㕮咀每服四分水一盞煎六分温服

〔二十三〕半夏生姜湯 治噦欲死

半夏洗一兩一分 生姜一兩

右水二盞煎八分去滓分作二服

〔二十四〕沉香降氣湯 治病後胃虛咳逆連声不回方見氣門

三十五 柿蒂湯 治胃膈痞滿咳逆

柿蒂　丁香各一兩

右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎服不拘時

三十六 桂苓白术散 治消痰逆止噦軟散痞滿壅塞開坚結痛悶推進飲食調和臟腑

桂　茯苓去皮　半夏各一兩

辣桂　乾生姜各分一　白术　澤瀉各半兩

陳皮去白

右為末麪糊丸如小豆大生姜湯下二三十丸日三服病在膈上食後在下食前在中不計時候一法更加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙

三十七 灸法 治咳逆其法婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴丈夫及乳小者以一指為率正男左女右与乳相直間陷中動脉處是穴艾炷如小豆許灸參壯

三十八 羌活附子散 治吐利後胃寒咳逆

附子炮去皮臍　茴香炒各半兩　羌活去芦　丁香　乾姜炮各一兩

右為末每服二分水一盞鹽少許煎七分空心熱服活人方去丁香用木香三因方一香並用

三十九 小柴胡湯 加柿蒂煎治咳逆熱噦方見傷寒門

四十 橘皮湯 治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮去白　人參　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四分水一盞煎去滓溫服

四十一 橘皮竹茹湯 治噦逆

橘皮一分　竹茹一分　甘草炙二兩

人參半兩　棗子三十个　生姜半兩

右㕮咀水十盞煎至三盞作三服

眩暈

眩暈之證發於卒然之間眼目昏花如屋旋轉起則眩倒雖經云諸眩掉皆屬於肝二風上攻而致眩暈然体虛之人或外為風寒暑濕之氣所干內為七情之氣所結鬱而生涎皆能令人一時眩暈目暗口噤頭痛項強臨病之際宜詳以脉證辨之風則脉浮而有汗寒則脉緊而制掣痛暑則脉虛而煩悶濕則脉細而重着加以吐逆如氣鬱生涎而暈者多令人眉稜角痛眼不可開寸脉多沉有此為異至若疲勞過度上盛下虛金瘡吐衄便利去血過多及婦人崩傷皆能眩暈各隨所因施以治法

(風)(四十二) 川芎散 治風眩頭暈

山茱萸一兩　山藥　茯神　人參　甘菊花　小川芎各半兩

右為末每服二匁酒調下不拘時日三服不可慎用野菊花

(四十三) 羚羊角散 治凡邪乘於陽經上注頭目遂入於腦又或痰水結聚胃膈上衝頭目一切眩暈並皆治之

茯神一兩　芎藭半兩　羚羊角一兩　甘草半兩　枳殼二匁半

半夏湯洗七次　白芷　防風各半兩　附子二匁半

右㕮咀每服四匁水一盞姜三片前七分不拘時

(寒)(四十四) 三五七散 治陽虛風冷寒濕痺脚氣緩弱等疾並能治之

風寒入腦頭痛目眩耳內蟬鳴癰

天雄炮去皮　細辛洗去土各三兩　乾姜炮　山茱萸各五兩　防風去芦

右為末每服二匁温酒調下

(四十五) 姜附湯 治一時為寒氣所中口不能言眩暈欲倒

方見中寒門

暑 (四十六) 消暑丸 治冒暑眩暈煩悶不省用香薷散生姜湯前吞下每服七十丸 方見暑門

(四十七) 六和湯 治冒暑眩暈嘔噦欲倒 方見泄瀉門

濕 (四十八) 羌木湯 治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎 半夏 湯洗 白朮 各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時

(四十九) 羌术除眩湯 治感寒濕頭目眩暈 方載濕門

痰 (五十) 理中丸 治痰迷中脘頭目眩暈 方見寒門

(五十一) 順元散 治体虛痰氣不順頭目眩暈 方見痰氣門

(五十二) 加味二陳湯 痰暈或因冷食所傷

陳皮 半夏 茯苓 各一兩 甘草五分

丁香 胡椒 各三分

右剉每服四錢姜三片烏梅一枚煎搽服

失血 (五十三) 羌鬱湯 治一切失血過多眩暈不甦

芎藭 當歸 去芦酒浸 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時虛甚加附子姜棗煎

既濟 (五十四) 沉香磁石丸 治上盛下虛頭目眩暈

葫蘆巴 炒 川巴戟 去心 陽起石 煅研 附子 炮去皮臍

椒紅 炒 山茱萸 取肉 山藥 炒各 青鹽 別研

甘菊花 去梗蔓 蔓荊子 各半兩 沉香 別研 磁石 火煅醋淬七次細研水飛 一兩

右為末酒煮米糊丸如梧桐子每服七十圓空心鹽湯下養正丹亦可

熟蕷 (五十五) 羌黃湯 治頭目眩暈

大黃 荊芥穗 川芎 防風 各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

五痺

凡痺疾自有五種筋痺骨痺皮痺肌痺是也多由体虛之人腠理空踈為風寒濕三気所侵不能隨時驅散流注經絡久而為痺其為病也寒多則攣痛風多則引注濕多則重著其病在筋者則屈而不能伸應乎肝其證夜卧多驚飲食少小便數其病在脉者則血凝而不流應乎心其證令人痿黃心下鼓気卒然逆喘不通嗌乾善噫其病在骨者則重而不能舉應乎腎其證手足不遂而多痛心腹脹滿其病在皮者多寒遇寒則急逢熱則縱應乎肺其證皮膚無所知覺気奔喘滿其病在肌肉者多不仁應乎脾其證四肢懈怠發咳嘔吐診其脉大而濇或來急而緊俱為痺之候也治之當辨其所感風寒濕三気注于何部分其表裏須從偏勝者主以蘇與又有停畜支飲亦令人痺又當隨證治之至如白虎歷節遍身痛者無非風寒濕三気染之發氏云飲酒當風汗出入水遂成斯疾久而不愈令人骨節蹉跌恐為癲癎之病如有此證治之宜早為貴

合痺 五十六

不仁方見中風門

五痺湯 五十七

治風寒濕三種痺痛自腿臂間發作不定者

小川芎　附子　防風　乾地黃　當歸　白朮　柴胡　桂心　甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎至八分去滓溫服

烏頭湯 五十八

治風寒冷濕痺於經絡攣縮不能轉側方見風門

蒼耳散 五十九

治一切風風濕痺四肢拘攣

木瓜煎 六十

蒼耳子三兩為散水一升煎去滓分三服或為末糊丸梧子

大每服五十丸温酒下

(六十一) 續斷圓 治尽温流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸炒　川續斷　蕳薤　天麻各一兩　防尽

右為末煉蜜圓如梧桐子每服四十圓温酒米飲任下

(六十二) 黄耆酒 治尽温濕痺痛筋脉攣急或身体頑麻並皆治之

當歸去芦　雲母粉　茵芋葉　白朮　虎骨　蕳薤　木香不見火　仙灵皮　川續斷　甘草炙　白芍

黄耆去芦　防尽去芦　官桂不見火　天麻　石斛去根各一兩

右㕮咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日每服一盞温煖服之常令酒气相續為佳

寒濕

(六十三) 理中湯 加附子天麻四分之一方見寒門

(六十四) 生料五積散 治寒濕麻痺亡見傷寒門

(六十五) 增損續斷圓 治寒濕之氣痺滯関節麻木疼痛

人參　防風　乾地黄各三兩　黄芪　牡丹皮　桂心

右為末蜜圓如梧桐子每服五十圓温酒空心下

熱痺

(六十六) 升麻湯 主之治熱痺肌肉熱極体上如鼠走唇口反縱皮色變兼諸風皆治

升麻三兩　茯神去皮　犀角鎊　羚羊角鎊

右為末每服四分水二七盞生姜二片碎竹瀝少許同煎至一盞温服不計時候

冷痺

(六十七) 蠲痺湯 治手足冷痺腰腿沉重及身躰煩疼背項拘急加防風等分煎方見風門

痛痺 (六十八) 茯苓湯 加減治痛痺四肢疼痛拘倦浮腫

赤茯苓去皮 亲白皮略二 防風 官桂 麻黄去節各一 川芎 芍藥

右為末每服五分水一盞棗一枚煎至八分去滓温服以姜粥投之汗出為度効矣

血痺 (六十九) 防風湯 治血痺皮膚不仁

川當歸去芦赤茯苓去皮川獨活各 防風二 赤芍藥 黄芩各一 杏仁去皮尖半 桂心不見火 甘草各半 秦艽去土一 杏仁 右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎七分温服不拘時

痰痺 (七十) 茯苓湯 治停痰支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯泡七次 赤茯苓去皮 枳实去穰麸炒 桔梗去芦 陳皮各一 甘草炙各半 右㕮咀每服四分水一盞姜七片煎服不拘時

行痺 (七十一) 防風湯 主之治行痺行走无定

防風 甘草 當歸 桂已上各一 赤茯苓去皮杏仁去皮炒熟 秦艽 葛根各三分

右為末每服伍分酒水合二盞棗三枚生姜伍片同煎至一盞去滓温服

著痺 (七十二) 茯苓川芎湯 主之治著痺留注不去四肢麻拘攣浮腫

赤茯苓 亲白皮 防風 麻黄 芎藥 當歸 官桂 川芎 甘草炙各半分

右為末每服二分水二盞棗二枚同煎至一盞去滓空心温服如欲吐汗以粥投之

筋痺 (七十三) 羚羊角湯 治筋痺肢節束痛

羚羊角 薄桂 附子炮 防風 獨活各一 白芍藥 川芎各一

右剉每服四分水一盞半姜三片煎温服

（白虎歷節風痛理）（七十四）烏藥湯治白虎歷節走注骨節疼痛加木瓜沒藥蘇木同前煎方見風門

（七十五）羌活湯治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活 去芦二兩　附子 炮去皮臍 秦艽　桂心
木香 各不見火　川芎　當歸 去芦　川牛膝 去芦酒浸
桃仁　骨碎補　防風 去芦各一分　甘草 炙半分

右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎七分温服不拘時

（七十六）虎骨散治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨 酥炙　花蛇 酒浸取肉　天麻　防風 去芦
川牛膝 去芦酒浸　白姜蠶 炒去絲嗩　川當歸 去芦酒浸　乳香 別研
桂心 不見火　甘草 炙
右為末每服二分豆淋酒調服不拘時

（七十七）烏頭湯治歷節風痛不可屈伸

麻黃 去節　黃芪　芍藥　烏頭 五枚坐以蜜二升煎取一升去烏頭　甘草
各等分每服四分水一盞煎七分去滓入蜜再煎一沸温服

（七十八）附子八物湯治白虎歷節身痛如鎚鍛不可忍

附子 炮去皮臍　乾姜 炮　芍藥　茯苓
甘草 炙　桂心 各三兩　白朮 四兩　人參 三兩
右㕮咀每服四分水一盞煎七分食前服一方去桂心用乾地黃二兩

名方類證醫書大全卷十一

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

頭痛

頭圓象天故居人身之上為諸陽之會頭疾之疾非止一端如痛引腦癲陷至泥丸宮者是名真頭痛旦發夕死夕發旦死非藥物之可療今之體氣虛弱者或為風寒之氣所侵邪正相搏伏而不散發為偏正頭疼其脉多浮緊又有胃腑停痰厥而頭痛蓋厥者逆也逆運而衝於頭也痰厥之脉時伏時見亦因有腎虛而氣厥升新沐之後當風露卧皆能令人頭痛治之當詳其所因風邪則驅散之痰聚則温利之腎虛則補暖之尋常感冒頭痛發熱又宜隨證治之

風 (一) 菊花散 治風熱上攻頭痛不止

石膏　甘菊花 去梗 防風 去芦　旋覆花 去梗
枳殼 去穰 麩炒　蔓荊子　甘草 炙　川羌活 去芦 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服

(二) 通關散 治感風發熱頭疼鼻塞

撫芎二兩　川芎一兩　川烏一兩半 細辛半兩

白芷　甘草

右爲末每服二錢葱白茶清調下薄荷湯亦可

(三) 都梁圓 治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人産前産後傷風頭痛並皆治之

龍腦薄荷各一兩半

香白芷 大塊擇白色潔者先以棕刷去塵土用沸湯泡洗四五次研用

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼用荊芥湯點茶下

(四) 治頭風方

香附子 一斤 炒　烏頭一兩 炒　甘草二兩

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓葱茶嚼下

(五) 一字散 治頭風

雄黃 研細　細辛 洗去葉各半兩　川烏尖 去皮五个生

右爲末每一字姜汁茶芽煎湯食後調服

(六) 大川芎圓 治首風旋暈眩怠外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身拘倦

川芎一斤　天麻 四兩 鄜州者

右爲末煉蜜爲圓每兩作拾圓每服一圓細嚼茶酒下

(七) 華氏方天香散 治久年頭風不得愈者

天南星　半夏 湯洗去滑尽川烏 去皮　白芷 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎一半入姜汁半盞煎八分温服

(八) 治傷風感風一切頭痛

甘菊一兩　細辛半兩　甘草半七分　白芷　香附子　羌活
薄荷各二兩　荊芥二十　茵蔯五分　蒼朮酒浸　川芎各一兩
右爲末每服二分茶清調下婦人産後當歸石膏末調下

九　治丈夫婦人風虛氣虛一切頭痛

茵蔯五兩　麻黃
右爲末每服一錢食後臘茶調下少卧霎時

十　直指方芎芷散　治風壅頭痛

川芎　白芷
荊芥穗　軟石膏　煅各等分
右爲末每服一錢食後沸湯調下

十一　藿香散　治躰虛傷風停聚痰飲上厥頭疼或偏或正并治夾腦諸風

草烏頭炮去皮尖半兩　川烏頭湯洗七次去皮尖一兩　乳香三皂角子大　藿香半兩
右爲末每服二分薄荷煎湯食後調服

十二　芎芷香蘇散　治傷風鼻中清涕自汗頭疼發熱方見傷寒門

十三　消風散　治傷風及風虛嘔惡頭疼風疹浮虛方見風門

十四　川芎茶調散　治諸風上攻頭目偏正頭疼方見中風門

十五　如聖餅子　治尽風寒伏留陽經言厥痰飲一切頭痛

防風半兩　南星一兩洗　天麻半兩　乾姜
川芎　甘草炙各一兩　半夏生半兩　川烏去皮一双
右爲末滴水丸作餅子每服五餅同荊芥細嚼茶酒任下濆寮方加細辛

寒　十六　必勝散　治風寒流注陽經以致偏正頭疼久年不愈此藥最有神効

附子大一隻生去皮臍切爲四段以生姜自然汁一大盞浸一宿火炙乾再於姜汁內蘸再炙再蘸以尽爲度
高良姜与附子等分
右爲末每服二分臘茶清調下食後連進二服忌熱物少時

(十七) **人參順氣散** 治頭疼增寒壯熱四肢疼痛因傷寒所致
麻黃去節一兩半　乾葛　甘草炙　白朮
人參　桔梗去芦　香白芷各一兩
右爲末每服二錢水一盞姜三片葱白二寸同煎連進取汗

(十八) **葛根葱白湯** 治感風熱頭疼不止
葛根　芍藥　川芎
右㕮咀以水三升煎至一升半去滓每服一盞
葱白一把　乾姜各一兩　知母半兩

暑濕 (十九) **香需散** 加茵蔯葱白姜煎熱服治伏暑頭疼方見暑門

(二十) **芎术湯** 治着濕頭重眩暈痛極
附子生去皮臍半兩　白朮　川芎　桂心各一分　甘草
右㕮咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚同煎食前服

(二十一) **小芎辛湯** 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不定
川芎一兩　細辛洗去土　白朮　甘草炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚同煎食前服

虛 (二十二) **芎辛湯** 治氣虛頭疼
生附子　生烏頭各去皮臍　天南星　乾姜
細辛　川芎各一兩　甘草炙七錢半
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎食前服

(二十三) **必効散** 專治氣虛頭痛
右用上春茶末調成膏置在盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒煙熏之曬乾用乳鉢研爛爲末每服一字別入好茶末食後點服

(二十四) **葫芦芭散** 專治頭痛
葫芦芭　乾姜炮
右㕮咀每服五錢水一大盞空心煎服

(二十五) **加減三五七散** 治風寒入腦太陽頭痛方見中風門
三稜各等分

(二十六) 葱附丸 治气虛頭痛
附子 一隻炮去皮臍
右為細末葱涎為丸如梧桐子每服五十丸空心茶清下

(二十七) 王眞丸 治腎厥頭痛不可忍其脉牽之則弦按之則緊
生硫黃二味別研 石膏硬者不煨 半夏湯洗七次 硝石別研各一兩
右為末研勻用生姜汁煮糊丸如梧桐子每服四十丸食前
姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

熱 (二十八) 川芎散 治偏頭痛神効
甘菊花 石膏 川芎各三分
右為細末每服三分茶清調下

(二十九) 治頭痛不可忍
麻黃去根節 石膏各乙兩 何首烏半兩 乾葛七分半
右為細末每服三分生姜三片水煎稍熱服

(三十) 洗心散 治風熱上攻頭目痛甚方見眼目門

痰 (三十一) 三生丸 治痰厥頭痛
半夏 白附子 天南星各等分
右為末生姜自然汁浸煮餅如彔豆大每服四十丸食後
姜湯下

通治 (三十二) 治偏正遠年近日一切頭疼
右用薄荷汁一蟬殼許令病者仰卧右疼注左鼻左痛注右
鼻兩邊皆痛並注之

(三十三) 治偏正頭疼
猪牙皂角去皮筋 香白芷 白附子各等分
右為末每服二分食後臘茶清調下右痛右側卧左痛左側
卧兩边皆疼仰卧

(三十四) 菜服汁 治偏正頭痛用一蜆殼許仰卧左痛注右右痛

注左或兩鼻孔皆注亦可數十年患皆一服而愈

(三十五) 芎烏散 治男子氣厥頭疼婦人氣盛頭疼及産後頭痛悉皆治之 川芎 天台烏藥各等分

右為細末每服二分臘茶清調服或用葱茶湯調服並食後

(三十六) 秘方止痛太陽丹

川烏 天南星

右等分為細末葱白連鬚搗爛調末藥貼於太陽痛處

(三十七) 治頭痛不可忍者

玄胡索七枚青黛二分 猪牙皂角肥実者刮去皮及子二斤

右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰卧以水化開用竹管送入男左女右鼻中竟藥味至喉少酸令病者坐却令咬定銅爹一箇於當門齒上當見涎出成盆即愈

(三十八) 治偏正頭疼 用川芎二兩香附子炒四兩共為末以茶清調服得臘茶清尤好

心痛

心為五臟之主一身之所聽命焉宜處安靜不可使有所傷之則痛若痛甚手足青過節者是名眞心痛旦發夕死夕發旦死非藥物之所能療脉經云脉浮大弦長者死沉細者生凡心痛之疾醫經所載其種有九一曰蟲痛二曰疰痛三曰風痛四曰悸痛五曰食痛六曰飲痛七曰寒痛八曰熱痛九曰來去痛名雖不同其實皆由外感邪氣內傷生冷結聚痰飲停於心胞傷於經絡重則心腸引痛輕則怔忡而已蓋心乃藏血之府憂思勞役太過耗散眞血心帝失輔亦能令人怔忡以致膽氣虛怯變生驚悸或因事聞聲卒然戰怯又憂寐之中忽隔晝產精神恍惚如有所見治法宜詳其所因若內外之氣相薄則宜驅

散邪氣温利痰飲心血有所虧損又當補益其榮衛寧其心志壯其膽氣如此調之病無不愈矣

(安鎮)(三十九)妙香散 治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

麝香一分別研　山藥一兩　木香煨一分半　茯苓去皮不焙　茯神去皮木　黃耆各一兩　桔梗半兩　甘草炙半兩　遠志去心一兩　炒辰砂三分別研

右為末每服二分温酒調服不拘時

(四十)養氏雄朱丸 治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多氣結不散積成痰涎留在心包竅竅忽竅以致狂言妄語叫呼奔走

顆塊朱砂一分研　白附子一分為末　雄黃明淨者三分

右和勻以猪心血和圓如梧桐子別用朱砂為衣每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服一粒能安魂定魄補心益氣

(四十一)養氏育神散 理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁

赤石脂別研細臨時入　白茯苓去皮　龍骨別研如粉臨時入　白茯神去木　防風　紅芍藥　遠志去心　紫菀茸　桂心去皮各等分

右為末每服二分水一盞姜三片棗一枚煎七分食後服

(四十二)龍齒湯 理心下怔忡常懷憂慮夜夢多驚如墮險地小便或赤或濁

官桂二兩半　甘草炙二兩半　當歸　遠志去心　枳殼去穰麩炒各一兩半　黃耆蜜炙一兩　人參去芦　白茯苓去皮　龍齒研　桔梗炒　茯神去木各一兩

右為末每服三分水一盞姜三片棗一枚粳米百粒煎服

(四十三)辰砂遠志圓 安神鎮心消風化痰

石菖蒲去毛　遠志去心　人參　茯神去木　辰砂各半兩

川芎　山茶　鉄粉　麥門冬去心細辛
天麻　半夏麴　南星炒黃　白附子生各一兩
右爲末用生姜五兩取汁入水煮糊圓如菉豆大別以朱砂爲衣每服三十粒夜卧生姜湯下

(四十四)益荣湯　治思慮過制耗傷心血心帝無輔怔忡恍惚夜多不寐小便白濁

當歸去芦酒浸　黃芪去芦　小草　酸棗仁去殼炒
栢子仁炒　麥門冬去心　茯神去木　白芍藥
紫石英研各一兩木香不見火　人參　甘草炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎七分不拘時

(四十五)歸脾湯　治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮　茯神去木　黃耆去芦　龍眼肉　酸棗仁炒各一兩
人參　木香不見火各半兩　甘草炙二錢半

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎七分温服

(四十六)八物定志丸　補益心神安定魂魄治痰去胷中邪熱

人參兩半　菖蒲　遠志去心　茯苓去皮　茯神去木各乙兩
朱砂乙錢　白朮　麥門冬去心各半兩　牛黃二錢另研細
右細末煉蜜爲丸桐子大米飲下三十丸不拘時候

(四十七)遠志圓　治因事有驚心神不定夜夢驚墮小便白濁

遠志去心姜汁淹　石菖蒲各二兩
白茯苓去皮　人參　茯神去木
右爲末煉蜜圓如梧桐子以辰砂爲衣每服七十圓熱湯下

(虛)(四十八)兼氏人參圓本圓　天心生血氣多用性熱之荣殊非其治髭髮不白容貌不衰今人滋補血此方蓋用生地黃能生精血用天門冬引入所生之地熟地黃能補精血用麥門冬引入所補之地又以人參能通心氣使五

味併用实補益心血一方又名二黃園

生地黃洗熟地黃蒸各一兩 麥門冬去心 天門冬去心各一兩 人參半兩

右為末煉蜜園如梧桐子空心溫酒或塩湯下三十園

常服安心腎益榮衛

白茯苓去皮 五味子去枝梗 車前子 茯神去皮 麥門冬

肉桂去皮各一兩 遠志去心耳 天門冬 山茶洗姜製各一兩半

酸棗仁去皮炒 熟地黃酒蒸 人參去芦 龍齒二兩 朱砂細研半

五分 龍齒半兩 朱砂酌為衣

右為末煉蜜園如梧桐大每服三十園空心米飲溫酒任下

(五十) 寧志膏 治心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健忘睡

卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

乳香二分以之坐水盆中研細水飛半兩 酸棗仁炒去皮取末 人參取末各

右和勻煉蜜園如彈子大每服一園溫酒嚼湯空心化下

(五十一) 龍齒丸 治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

遠志去心耳 當歸去芦 熟地黃酒蒸焙各半兩 紫石英煨醋淬七次

官桂去皮不見火 琥珀別研 附子炮去皮臍 姜酸棗仁去殼炒

木香不見火 沉香別研 南星姜汁浸一宿各一兩 龍齒半兩

右為末煉蜜園如梧桐子以朱砂為衣每服五十園棗湯下

(五十二) 補心神効園

黃耆蜜炙焙 茯神去木各四兩 熟乾地黃三兩 遠志去心 人參去芦各

栢子仁別研 酸棗仁湯炮七次去殼 五味子各二兩 朱砂一兩別研

右為末蜜丸如梧桐子每服五十丸米飲溫酒任下盜汗不

止麥麩湯下乱夢失精人參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下

虛煩發熱麥門冬湯下吐血人參湯下大便下血地榆湯下

小便出血茯苓車前子湯下中風不語薄荷生姜湯下風癎

涎潮防風湯下

五十三 補心丸 治憂愁思慮過度心血耗散故多驚恐遺精盜汗

紫石英 煅研 熟地黃 洗 菖蒲 茯神 去木
當歸 去芦 附子 炮去皮臍 遠志 去心炒
川芎 桂心 不見火 龍齒 各一兩 人參 半兩

右為末蜜丸如梧桐子每服七十丸棗湯下不拘時

五十四 心丹 治男子婦人心氣不足神志不寧一切心疾並治之

遠志 去心甘草煮 熟地黃 酒洗蒸焙 新羅人參 木鱉仁 炒去殼 白术 各五兩
朱砂 五十兩 當歸 去芦酒浸焙 麥門冬 去心 石菖蒲 石蓮肉 去心炒
黃耆 去芦 茯神 去木 栢子仁 揀淨 茯苓 去皮 益智仁 各三兩

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將朱砂袞和以夾生絹袋盛貯用麻線緊繫袋口却用瓦鍋一口盛水七分重安銀鐺一箇於鍋內入白沙蜜二十斤將藥袋懸之中心不令着底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足住火取出淘去浆煮洗淨朱砂令乾入牛心內仍用銀鍋於重湯內蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸凡七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分米粽為丸如豌豆大陰乾每服二十丸食後參湯棗湯麥門冬湯任下

五十五 秘方 治心氣虛損

猪腰子一隻用水兩椀煮至盞半將腰子細切入人參半兩去芦尾淨當歸半兩並切同煎至八分吃腰子以汁送下未尽腰子同上二味煮淫焙乾為末山茶糊為丸如梧桐子每服五十丸多服為佳

五十六 引神歸舍丸 治心氣不足并治心風

附子 一个重七分以上者炮去皮臍 大天南星 一兩去皮取心生用 朱砂 一兩水飛

右為末用豬心血并麪糊為園如梧桐子前薑章根湯下子午之交各一服止十五園

(五十七) **十四友園** 治心腎虛損神志不寧

白茯苓 白茯神去木酸棗仁炒 人參各一兩 龍齒別研二兩
肉桂 阿膠蛤粉炒 遠志湯洗去心酒焙 當歸洗 熟地黃
黃耆 栢子仁別研 紫石英別研各一兩 辰砂別研一分

右為末同別研四味細末煉蜜園如梧桐子每服三十園食後棗湯下

(五十八) **茯苓補心湯** 治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

半夏湯洗 紫蘇半夏 白茯苓 人參各七分半
枳殼麩炒 桔梗 甘草炙 乾葛各半兩 當歸二兩
川芎三分 陳皮半夏 白芍藥二兩 熟地黃一兩半

右㕮咀每服四分水一盞姜五片棗一枚同煎食前服

(五十九) **家藏方靈砂寧志園** 治男子婦人大病後傷損榮衛失血過多精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌体瘦弱

辰砂二兩不夾石者用夾絹袋盛於銀石器內懸於器內用椒紅三兩取汁花水調椒紅入於器內可八分別用鍋子注水置朱砂器在內重湯煮令魚眼沸三晝夜為度取出辰砂細研水飛 白术 鹿茸燎去毛酥炙黃 黃耆蜜炙各三兩 石菖蒲二兩 茯神去木人參各三兩

右為末次入辰砂研勻用棗肉和杵一二千下園如梧桐子每服三十園溫酒米飲空心任下

(六十) **黃氏十補湯** 治諸虛不足安益心腎

白芍藥一兩當歸酒浸一宿 黃耆蜜炙 生乾地黃洗
茯神去木各 肉桂去皮四分半兩 北五味三分 天台烏藥

麥門冬去心 人參 白朮各二分半 酸棗仁炒
陳皮去白各一分 木香煨 半夏湯洗七次 沉香不見火各半兩
右㕮咀每服五分水一盞姜五片棗二枚煎七分温服

六十一 是斋双補丸 平補精血不燥不熱
熟地黃半斤補血 兎絲子半斤補精
右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸人參湯下氣不順沉香湯下心氣煩燥不得睡酸棗仁湯下腎氣動茴香湯下小便少車前子湯下小便多益智湯下

六十二 養氏定心湯 理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中失精
人參去芦 白茯苓去皮 茯神去木 黃耆蜜炙焙各三兩
白朮 赤石脂研 川芎 厚朴姜製各二兩 官桂去皮
紫菀茸 防風各一分 麥門冬去心一兩半 甘草炙一兩
右㕮咀每服三分水一盞赤小豆七十粒煎七分食後服

六十三 養氏王賈園 治心氣不足大補心腎
大木瓜一個去皮穰納缸子內入附子在內須晉盖子蓋之竹籤定蒸熟取去竹籤大附子一個七八分重者用湯浸洗去黑皮劖作竅子辰砂一兩研入附子竅內不盡者留入木瓜內鋪盖附子一法用人參切片砌定附子於木瓜內又用白磁碗盛木瓜於飯內蒸一七日將於砂鉢內爛研如糊次入乾茯神末拌和圓如梧桐子每服二十圓人參湯下温酒亦可

既濟 六十四 養心丹 治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上盛下虛小便赤白常服鎮心益血
熟乾地黃酒洗焙乾 朱砂研飛 茯神 茯苓去皮 人參各二兩
當歸去芦三兩 肉桂去皮 山藥二兩
天門冬去心三兩 遠志甘草煮去苗骨二兩 麥門冬去心二兩
右為末煉蜜圓如梧桐子每服三十丸人參湯下

(六十五) 華氏鎮心棗神湯 治心腎不交上盛下虛心神恍惚多驚悸小便頻數遺泄白濁

石菖蒲去毛半兩 甘草炙四分 人參去芦赤茯苓 酸棗仁酸棗仁 當歸酒浸焙各三分 南星炮一分 陳皮去白 乾山茶 細辛去苗 紫苑去芦 半夏 川芎不焙 五味子 通草 麥門冬去心 覆盆子各一分半 柏子仁炒 枸杞子各一分

右㕮咀每服四分水一盞蜜一匙煎五分去滓取茶汁入麝香少許再煎二三沸溫服不拘時

(六十六) 蘇合香丸 治卒暴心痛方見氣門

又方 治心脾卒痛方

右用小烏沉湯一貼入百草霜爛研并塩一撮煎服立愈

(六十七) 愈痛散 治急心痛胃痛五靈脂去沙石 玄胡索炒去皮 蓬莪朮煨良薑炒 當歸去芦洗各等分

右為末每服二分熱醋湯調下不拘時

(六十八) 加味七氣湯 治喜怒思慮悲恐驚七氣為病發則心腹刺痛不可忍及外感風寒婦人血痛並宜服之

半夏湯洗七次五兩 桂心 人參 甘草炙各半兩 玄胡索炒去皮各一兩 乳香三分

右㕮咀每服四分水一盞姜三片煎服不拘時

(六十九) 應痛丸 治心氣痛不可忍者

好茶末四兩 揀乳香二兩

右為細末用臘月兎血和丸如雞頭大每服一丸溫醋送下不拘時服

(七十) 沉香降氣湯 治七情氣結于中腹心疠痛不可忍每服二錢用枳殼半片煨切薤葉二片塩少許煎湯再入濃磨沉香水同調下若更未効再加乳香三粒方見氣門

(七十一) 分心气飲 治証同上方見氣門更加枳殼半片木香少許

(七十二) 失笑散 治敗血冷氣心痛方見氣門

(七十三) 九痛圓 治九種心疼及冷氣攻刺發痛落馬墜車瘀血停滯並宜服之

狼毒半兩炙姜 巴豆去皮心膜炒乾研霜 乾姜炮
人參去芦 吳茱萸湯洗七次炒各一兩 附子炮去皮尖三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服一丸空心温酒下卒然心腹疙痛口不能言者服二丸立瘥

(七十四) 家藏方卻痛散 治心氣冷痛不可忍者

五靈脂去沙 蒲黃炒各一當歸去芦洗肉桂去皮
石菖蒲 木香 胡椒各一兩 川烏炮七分半

右以咀每服四分水一盞入塩醋少許煎服

(七十五) 一姜圓 治心脾冷痛暖胃消痰

乾姜炮 良姜去皮各等分

右為末麪糊圓如梧桐子每服三十圓食後橘皮湯下

(七十六) 氣針圓 治風熱疎滯氣寬膈止刺痛方見脹滿門

(七十七) 通心飲 治証同上

木通 連翹 瞿麥
黃芩 甘草 梔子仁各等分

右剉水煎每服四錢更加枳殼灯心車前子麥門冬尤良

(七十八) 沒藥散 治一切心肚疼痛不可忍者

沒藥乳香細研 乳香各三分 川山甲五分炙 木鼈子四分

右為細末每服半分至一分酒大半盞同煎温服不拘時候

(七十九) 香附子散 治心脾痛不可忍

良姜 香附子等分

為末入塩少許米飲調下二錢

〔八十〕手拈散治心脾痛不可忍方見氣門

〔八十一〕神保丸治心氣簽痛柿蒂灯心煎湯下方見氣門

名方類證醫書大全卷十二

腰肋痛

夫腎受病則腰滯而痛故經云腰乃腎之府轉搖不能腎將憊矣要知腰痛之疾所感不一有因風寒暑濕傷于腎經發爲腰痛者又有墜墮險地閃動腰肋氣血凝滯而痛者其爲痛也或引於項脊俯及兩脇不可俛仰或腰下如有橫木如坐水中多令人面目黧黑腰脇脹滿大抵腰痛之脉皆沉弦而緊者爲寒沉弦而浮者爲風沉弦而濡細者爲濕沉弦而實者爲凝滯各推其所因感邪氣者驅散之凝滯者順其氣而調其血如此治之病無不愈又有腎經虛憊心血耗散不能養其筋脉以致腰痛又當補其心腎筋骨自壯矣

風濕

一 獨活寄生湯 治腎氣盡弱為風濕所乘流注腰膝或攣拳製痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力並皆治之

獨活 三兩　細辛　桂心 不見火 川芎　防風 去芦　牛膝 酒浸　白芍藥　人參　熟地黃　秦艽 去土　杜仲 炒去絲各二兩　當歸　桑寄生 如無以續斷代　甘草 炙　茯苓 各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心服

二 牛膝酒 治腎傷風毒攻刺腰痛不可忍者

牛膝　五加皮　薏苡仁 各一兩　川芎　地骨皮　甘草　生地黃 十兩　海桐皮 二兩　羌活 三兩

右㕮咀用綿帛裹藥入無灰酒內冬浸七日夏三五宿每服一盃日三四服長令酒氣不絕一法加炒杜仲一兩

三 杜仲酒 治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲 一斤生姜汁製炒斷絲

右用無灰酒三升浸十日每服二三合日四五服一方為末用溫酒調一錢空心服

四 敗毒散 加續斷天麻薄荷木瓜等分治風熱濕毒腰痛 方見傷寒門

寒濕

五 木附湯 治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

附子 炮去皮臍　白朮 各一兩　杜仲 去皮炒去絲半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心溫服

六 五積散 治寒濕傷于腎經腰痛不可俛仰兼氣加茱萸婦人血氣加桃仁 方見傷寒門

氣滯

七 牽牛園 治冷氣流注腰疼不可俛仰

延胡索　破故紙 炒各二兩　黑牽牛 炒二兩

右為末研煨蒜為園如梧桐子每服三十園炙酒鹽湯任下

八 人參順氣散 治氣滯腰痛加五加皮煎 方見風門

（九）木香流氣飲 治氣滯腰痛不可轉側服之立效 方見氣門

（十）舒筋散 治血滯腰痛亦治閃挫

玄胡索　當歸　官桂 各等分 末

右等分每服二錢溫酒調下或加牛膝桃仁續斷更妙

（十一）熟大黃湯 治打撲腰痛惡血蓄瘀痛不可忍

大黃　生姜 並切如豆大 各半兩

右同炒焦黃以水一大盞浸一宿五更去滓頓服天明所下如雞肝即惡物也

（十二）養閒丸 治隊墜閃肭血氣凝滯腰痛

養閒子 半兩 沒藥 二錢半 乳香 二錢半 另研

補骨脂 炒 蔵零仙 洗去土 杜仲 去粗皮 剉炒令絲斷 官桂 不見火 川當歸 去蘆酒潤焙 各半兩

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下

（十三）小七香圓 治攣拘怒憂思或因閃剉撲一切氣滯腰痛

方見諸氣門

（腎虛）（十四）二至圓 治老人虛弱腎氣傷損腰痛不可屈伸

鹿角　鹿角鎊 各二兩

補骨脂 炒　杜仲 去皮 炒絲 各一兩　附子 炮去皮　桂心 不見火

右為末酒糊圓如梧桐子每服七十圓空心嚼胡桃肉鹽酒鹽湯任下惡熱藥者去附子加肉蓯蓉一兩

（十五）補髓丹 升降水火補益心腎強筋壯骨

杜仲 去皮炒黑色　補骨脂 各十兩用芝麻五兩同研以芝麻鹿茸 一兩燎去毛酒炙　肉蓯蓉 去皮炒焦色為度酒去芝麻不用　沒藥 一兩別研

右將杜仲補骨脂鹿茸一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉三十箇湯浸去皮杵為膏入麪少許酒煮糊圓如梧桐子每服一百圓溫酒鹽湯任下

(十六)青娥圓治腎經虛冷腰腿重痛常服壯筋補虛
杜仲二斤炒生姜十兩炒破故紙一斤半
右為末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮研成膏入少熟蜜
圓如梧桐子每服五十圓鹽酒姜湯任下

(十七)立安圓治五種腰痛常服補暖腎經壯健腰脚
破故紙 續斷
杜仲去皮姜制炙去絲各一兩 萆薢二兩
乾木瓜 牛膝酒浸
右為末蜜圓如梧桐子每服五十圓溫酒鹽湯空心任下

(十八)立安散專治腰痛
杜仲去粗皮剉炒令絲斷 橘核取仁炒
右等分為末每服入鹽少許溫酒調服食前

【通治】(十九)意苡仁丸治腰脇脇痛手足拘攣
薏苡仁一兩 石斛用細者七分半 附子半兩 牛膝

桃仁各一分生乾地黃二分 細辛 人參
甘草 枳殼 桔子仁 川芎 當歸各半兩
右為末煉蜜圓如梧桐子每服四十圓酒吞下空心日三服

(二十)直指方異香散治腰脇脹痞悶噎塞一切氣痞腰脇
刺痛方見前

【脇痛】(二十一)芎藭湯治脇下疼痛不可忍者
桂枝 川芎 細辛
芍藥 枳殼 麻黃 防風各半兩
右㕮咀每服五分水一盞姜三片煎七分溫服

(二十二)枳實散治兩脇疼痛
枳實一兩 白芍藥炒 人參各半兩
右為末空心姜棗湯調服二錢酒亦可

(二十三)枳殼散治脇間痛如有物以挿然及氣疾也即婦人漏

胎枳殼散濃煎葱白湯

二十四 推氣散 治右脇疼痛服痛不食

片子姜黃洗半兩 枳殼去核麩炒 桂心去皮不見火各半兩 甘草炙三分

右為末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

二十五 枳芎散 治左脇刺痛不可忍者

枳實炒 川芎各半兩 粉草炙二分半

右為末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

二十六 直指方分氣紫蘇湯 治腹脇疼痛氣促喘急方見喘急門

脚氣

脚氣之疾雖摠之曰氣而古今證治實為多端故千金論脚氣皆由感風毒所致又經云地之風寒暑濕皆作蒸氣足常履之遂成脚氣古方無脚氣之說黃帝時名為厥兩漢之間名為緩

風宋齊之後始謂之脚氣其名雖不同比實一也今之所感未有不由脾腎兩經虛弱坐卧行動之間為風寒暑濕之氣所干流注而成此疾得病之始多不令人便覺舍因他病乃始發動或卒然大悶經三二日方乃覺之先從脚起或緩弱痺痛行起忽倒或兩脛腫痛足膝枯細或心中忪悸小腹不仁大小便秘澁或拳体轉筋骨節酸疼或惡聞食氣見食吐逆或曾痛氣急壯熱增寒其為候也不一治之須詳審乃可否則誤以為他疾而小異必須以脉辨其風寒暑濕然後施以治法若寒氣中三陽經者患處必冷暑中三陰經者患處必熱又以其脉浮而弦者起於風風者汗而愈濕者温而愈熱者下而愈寒者熨而愈又當順四時調理不可拘一春夏疾盛者宜汗利之秋冬以後又須量

人氣体虛実微加滋補防其遇寒暄再作此皆嚴氏詳論及此
又如无汗走注為風勝挛急痛為寒勝腫滿重着為濕勝煩
渴熱頑為暑勝四氣兼中者但推其多者為勝分其表裏施以
治法亦三因至當之說古人得脚気之初多用針灸最忌用熱
薬熨泡恐逼邪気入于経絡為難治也今之治脚気者有一方
偶合於所患之証服之得愈便以為秘方其後遇病更不審其
脉証所因又服以前薬〻証既殊非徒不能愈病適足以重病
戒之戒之

風濕（二十七）**五積散** 治風濕流注兩脚酸疼方見傷寒門

（二十八）**香蘇散** 加檳榔木瓜名檳蘇散治風濕脚痛疎通気道

紫蘇　香附子各二刃　陳皮　甘草　檳榔　木瓜各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分盞姜煎服

（二十九）**活血應痛丸** 治風濕客於腎経血脉凝滯腰脚重疼項

背拘攣不得轉側常服活血脉壯筋骨

狗脊去毛四斤　蒼朮泔浸一宿去皮六斤　香附子去毛炒七斤半

陳皮去白五斤　没薬十二兩別研　草烏頭一斤半　威灵仙洗二斤

右為末酒糊圓如梧桐子每服二十圓温酒塾水任下

（三十）**經効立應散** 治風濕脚氣

麻黄去節炒　姜蚕各二兩炒斷絲　丁香一分　没薬別研　乳香各五分

右為末每一兩用酒一椀調服取醉蓋覆得汗即愈曾經蒸
泡者雖愈

（三十一）**歐陽康叔家傳方加減主雷丸** 專治脚気止疼痛除風濕

石膏水煮三十沸三刃　當歸酒浸二刃　骨碎補四刃去皮毛炒淨三五吹　檳榔一刃

月宝砂五兩醋煮乾　白疾藜炒赤去尖刺三兩　紫金皮去骨生用

大小瓜生各二刃　淮烏三个炒赤二兩　白膠香二兩淨水煮十數沸冷水中乾

右為末蜜丸如彈子大嚼生姜一塊空心以好酒一盞送下

多以酒助藥力服後一時久用外應散薰淋洗一方除紫金皮木瓜加防風小黑豆一方加赤芩藥一方除紫金皮石膏加白木木香川烏

(三十二) 黃耆丸 治腎臟風虛上攻頭面下注腰脚行步艱難一切風痺痛痒不定並皆治之

川練子 川烏炮 赤小豆 杜蒺藜炒去刺 茴香炒
地龍去土炒 防風去芦各一兩 烏蒸 黃芪各二兩
右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸溫酒鹽湯任下

(三十三) 經進地仙丹 治腎氣虛憊風濕流注脚膝酸疼行步无力

川椒去目及閉口者微炒出汗四兩 兎絲子酒浸 覆盆子各二兩 白朮一兩
防風去芦二兩 人參一兩半 烏蒸二兩
白附子 羌活 茯苓一兩 地龍去土三兩 赤小豆
川烏炮一兩 附子炮四兩 木鼈子去殼二兩 菟絲子酒浸 牛膝去芦酒浸焙乾各二兩 何首烏二兩
骨碎補去毛各二兩 甘草一兩 南星湯洗姜製各二兩 黃芪二兩半
右為末酒糊圓如梧桐子每服四十圓空心溫酒下

(三十四) 神芎地仙丹 專治風痺脚氣

天仙子一兩 川椒三兩去子并合口者 木鼈子四兩 白膠香五兩炭過別研
五靈脂三兩陳黑色好浸沒水淘去穢 黑牽牛六兩 黑豆八兩
草烏五及小而堅實者令色焦黃折裂候冷以紙布之類揩令淨 赤土九兩即土朱
右為末同入白膠香末鼈子末用隔年好醋打麪糊杵千百下圓如梧桐子每服三十圓茶清下病甚者頻進

(三十五) 加減地仙丹 治風冷邪濕留滯下焦足膝拘攣腫滿疼痛

地龍炒去土五靈脂去石 烏藥 白膠香別研五加皮
椒紅去汗 葳灵仙 木瓜去穰 赤小豆炒 川烏泡
黑豆炒去皮 天仙藤 羌活 木鼈子去殼油各等分
右為末酒糊圓如梧桐子每服七十圓空心鹽酒鹽湯任下

(三十六) **直指方不老地仙丹** 治腎臟風毒輕脚壯筋

蓯蓉以酒浸焙 當歸 虎骨酒炙 牛膝 赤小豆
蒺藜炒搗去刺 川椒去目出汗 川芎各一兩 蕳辭鹽水煮乾 血竭
白南星炮 白附子炮 何首烏 黃芪 防風
杜仲姜製 羌活 沒藥別研各三分 獨活
木鼈子去油 地龍去土 茴香炒 乳香別研各半兩

右為末酒糊圓如梧桐子每服四十圓木瓜陳皮湯下

(三十七) **活絡丹** 治諸般風邪濕毒之氣停滯經絡流注脚膊筋脉攣拳腰腿沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心腹一切痛風走注並皆治之

川烏炮去皮臍六兩 乳香研二兩二分 草烏炮去皮臍
地龍去土 南星炮各六兩 沒藥研二兩二分

右為末入研乳和勻酒糊圓如梧桐子每服二十圓空心冷酒下

酒下荊芥桑亦得

(寒濕) **木瓜牛膝圓** 治寒濕四氣下注腰脚緩弱無力腫急疼痛

木瓜大者二四个切開蓋去穰先用林米揀過鹽焙乾為末入瓜內令滿仍用蓋針定烝三次爛研為膏
川烏大者去皮尖用无灰酒煮乾研細為膏二兩 巴戟
青皮別研 狗脊燎去毛 牛膝酒浸
蕳薛 茴香
右為末入青鹽拌勻將前二膏搜和如硬再入酒杵數千下
圓如梧桐子每服五十圓空心鹽酒鹽湯任下 (三十八)

(三十九) **家藏乙五斤圓** 治筋血不足腰脚緩弱行步艱辛一切寒熱脚氣並皆治之

沒藥別研 川烏頭炮去皮臍 山茱各四兩 大木瓜一斤 天麻
牛膝去芦用无灰酒浸一宿控乾切焙 虎骨塗酥炙黃色各四兩
右將木瓜爛蒸研作糊和茱末如不就更用元浸牛膝酒打

糊搜勻杵一二千下園如梧桐子每服五十園温酒塩湯下

(四十一) **家藏方葫蘆巴園** 治一切寒濕腳氣腿膝疼痛行歩無力

葫蘆巴 酒浸一宿焙乾 破故紙 炒香各四兩

右爲末用大木瓜一枚切頂去穰置藥在内以滿爲度復用頂蓋之以竹簽之定蒸熟爛研同前末尽藥末和爲園如梧桐子每服五十園空心温酒下

(四十二) **勝駿丸** 治元氣不足爲寒濕之氣所襲腰足攣拳脚面連指走痛無定筋脉不伸行歩不隨常服益眞氣壯筋骨

附子一个炮去皮臍 當歸酒浸一宿 天麻 牛膝並酒浸 木香

酸棗仁炒 熟地黄酒浸防風去叉各二兩 木瓜四兩 羌活二兩

乳香半兩別研 麝香一分別研 全蝎去毒 没藥別研 甘草炙各一兩

右爲末用生地黄三斤研爛如泥入無灰酒四升煮爛如膏以前藥和勻杵令堅每兩作十園每服一園細嚼臨睡酒下

如冬月無地黄煉蜜園如梧桐子每服五十園塩湯温酒任下一方加檳榔華辨發容破故紙巴戟各一兩當歸地黄各減一兩

(四十三) **換腿園** 治足三陰經爲風寒暑濕之氣所乘發爲攣痛緩弱上攻胷脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行歩艱辛意苡仁 南星炮 石楠葉 石斛去根 檳榔

華辨炙 川牛膝去苗酒浸 羌活去苗 防風去芦各一兩 木瓜四兩

黄芪去芦蜜炙 當歸去苗酒浸 天麻去芦 續斷各一兩

右爲末酒煮糊園如梧桐子每服五十園温酒塩湯任下一方加附子肉桂等木各一兩

(四十四) **大料神秘左經湯** 治風寒暑濕流注三陽經腰足拘攣大小便秘澁喘滿煩悶並皆治之

半夏湯洗七次乾葛 細辛 麻黄去節 小草即遠志 麥門冬去心

厚朴姜製炒　茯苓　防己
桂心　羌活　防風　柴胡　黄芩　白姜各等分
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎服自汗加牡蠣
白朮去麻黄又腫加澤瀉朮通甚熱無汗減桂加橘皮前胡
升麻腹痛或利去黄芩加芍藥附子大便秘加大黄竹瀝喘
蒲加杏仁桑白皮紫蘇並等分對証加減尤宜審之

(四十四)麻黄左經湯治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痺関
節重痛增寒發熱无汗惡風頭疼或自汗惡寒或胸脇滿
麻黄去節乾葛　細辛　羌活　枳殼炒　芍藥炒
防已　桂心不見火　甘草炙　前胡
右為末每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎空心服自汗去
麻黄加肉桂芍藥重着加白朮陳皮无汗減桂加杏仁澤瀉
並加茅分

(四十五)大黄左經湯治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫
痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗
細辛去苗　茯苓　羌活　大黄蒸　甘草炙　前胡
枳殼去瓤炒　厚朴去皮炒　黄芩　杏仁去皮尖別研各等分
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心熱服
腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫蘇小便秘結加
澤瀉四肢癢痒浸淫加升麻並等分

(四十六)半夏左經湯治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰脇
疼痛頭目眩暈嘔吐不食
半夏湯泡七次　乾葛　細辛　白朮
麥門冬去心炙　茯苓　桂心不見火　防風
乾姜炮　黄芩　小草　甘草炙　柴胡各等分
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心服熱

悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

(四十七) 六物附子湯 治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子炮去皮臍桂心各四兩 白朮三兩
甘草炙二兩 防己四兩 茯苓三兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎服

(四十八) 四蒸木瓜圓 治肝腎脾虛為風寒暑濕之氣流注經絡腳膝疼痛增寒壯熱或腫或痺發作不時

藏靈仙 苦葶藶 續斷
薏米 橘皮 茯神各半兩
烏藥 黃芪

右為末以大木瓜四枚去頂穰填藥在內却用頂蓋蓋定酒洒蒸熟研為膏圓如梧桐子每服五十圓空心溫酒鹽湯任下世傳木瓜圓甚多此方為是

(四十九) 四斤圓 治腎經虛寒下攻腰腳筋脉拘攣掣痛不已復地貑辛腳心隱痛應風寒濕痺腳氣緩弱並宜服之

宣州木瓜去瓤天麻去苗 從蓉洗淨牛膝去苗各焙乾秤一斤
以上四味如前事治了用无灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日足取出焙乾再入
附子炮去皮尖二兩 虎骨塗酥炙二兩

右為末用浸煮酒打麪糊圓如梧桐子每服五十圓空心煎木瓜酒鹽湯任下常服補虛除濕大壯筋骨

(五十) 加味四斤圓 治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不隨如受風寒濕氣以致腳痛者最宜服之

虎脛骨酥炙二兩 天麻
沒藥別研 乳香別研各半兩
宣木瓜一个去瓤蒸 肉從蓉酒浸焙 川烏炮去皮臍 川牛膝去苗酒浸各一兩

右為末入木瓜膏和酒糊杵煉為圓如梧桐子每服七十圓空心溫酒鹽湯任下

熟毒 五十一 加味敗毒散 治足三陽經受熱毒氣流注脚踝上
掀赤腫痛寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒
羌活 獨活 枳殼去穰麩炒 桔梗
茯苓 川芎 甘草炙 人參
右�once咀每服四分水一盞姜三片薄荷一捻煎服皮膚瘙痒
加蟬蛻煎 大黃蒸 蒼术米泔浸各等分 前胡 柴胡

腎虛 五十二 木瓜圓 治腎經虛弱下攻腰膝筋脉拘攣腫痛行履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澁
熟干地黃洗焙 陳皮去白 烏梅各四兩赤芍藥一兩
黑牽牛炒三兩 杏仁去皮尖 牛膝酒浸 石楠藤
當歸酒浸 續斷 乾木瓜各二兩
右為末酒煮麪糊圓如梧桐子每服五十圓空心温酒下

五十三 養腎散 治腎氣虛損腰脚疫痛
草烏頭生去皮臍附子炮二分 全蝎半兩 蒼术製一兩 天麻三分
右為末空心豆淋温酒調下麻痺少時病亦隨去

發散 五十四 檳榔湯 治一切脚痛順氣防壅
檳榔 香附子去毛 陳皮去白 紫蘇葉
木瓜去穰 五加皮 甘草炙各一兩
右�once咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服婦人脚氣加當歸半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便虛秘加枳实熱者加大黃

五十五 欧陽康叔家傳方 攢風散 專治寒濕脚氣先用此發散
麻黃不去節 甘草不去皮炙 淮烏 川芎薤 杏仁不去皮各等分
右�once咀每服四分水一盞煎服不可多進

通治 五十六 木瓜散 治脚氣

大腹皮一个　紫蘇
甘草炙　木香
右㕮咀分作三服每服水一盞煎至一盞通口服

五十七　指方木瓜散　治脚氣

大腹皮　紫蘇　乾木瓜
茯苓　陳皮　羌活　各一分
右㕮咀每服水一盞煎至一盞通口服

五十八　思仙續斷圓　治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一切風毒流注並宜服之

羌活　木香
牛膝酒浸川續斷　各三兩　生地黃　五加皮　各一兩
右為末酒三升化青塩三兩木瓜半斤去皮子以塩酒煮木瓜成膏杵圓如梧桐子每服五十圓空心溫酒塩湯任下

五十九　夢中神授方　治脚氣神効

右用木鼈子每箇作兩边麩炒令黃切碎再炒用皮紙裹盡油為度每一兩用厚桂一兩同為末熱酒調服以得醉為度蓋覆得汗即愈

六十　神与圓　治遠年日近乾濕脚氣

川烏炮去皮臍　虎脛骨酥炙　海桐皮　川芎藭　各二兩
川牛膝去苗浸酒浸一兩半　金毛狗脊燎去毛半斤
右為末用木瓜嘗為圓如梧桐子每服七十圓空心溫酒下

六十一　衝法

每夜用塩塗擦腿膝至足甲淹少時却用熱湯泡洗昔有人得脚氣諸方不效後常用此法再不發

六十二　欧陽東叔家傳方外應散　治脚氣用此熏洗淋洗

石楠葉　臭樟葉　西江杉片　藿香　紫金皮　景本

獨活　大蓼　白芷　紫蘇　羌活各等分
右剉碎加大棗五六十粒葱一握用水二斗煎七分盥盆內
令病者以足加其上用厚衣蓋覆重蒸痛處候温熱可下手
時却令他人淋洗

(秘結)【歐陽康叔家傳方通真圓】專治脚氣秘結者用此通利
車蘚　破故紙　蓽牛各等分　淮烏半兩用巴豆一
右為末麪糊圓如梧桐子每服十圓空心鹽湯下如利數行
欲止之以冷水洗手即止　(六十三)

腫痛【空四】大腹皮散　治諸證脚氣腫痛小便不利
檳榔　荆芥穗　烏藥　陳皮　紫蘇葉各一兩
羅葡子炒半　沉香不見火　桑白皮炙　枳殼去穰麸炒各一兩半
大腹皮三兩　乾宣木瓜去穰二兩半
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

(六十五)【歐陽康叔家傳方續骨丹】專治脚氣
川烏一兩煨　羌活二兩　白茯苓二兩　乳香別研　檳榔
木瓜　川芎各一兩　木香兩半　沉香五分
右為末麪糊圓如梧桐子每服六十圓姜湯下

(六十六)【沉香大腹皮散】治濕氣聲滯經絡以成脚氣腫滿疼痛
筋脉不利
大腹子連皮二兩　沉香　桑白皮炒　檳榔
白茯苓去皮　木通　荆芥穗　紫蘇子炒　蘇葉各一兩
乾木瓜去穰二兩　枳殼去穰麸炒　甘草炒　陳皮去白　烏藥各一兩
右㕮咀每服五錢水一盞姜五片烏藥煎七分
温服如无羅葡用羅葡子一錢微炒搗碎同煎如竟大乾燥
即服加減神功元

(六十七)【脚氣止痛方】用蓽麻子七粒去殼研爛如泥同蘇合香

圓打和貼脚心其痛即止

(六十八) 又方 用草烏一味以麴酒糟搗爛貼痛処即止如无麴糟生姜汁調草烏末亦可

(六十九) 家藏方趙痛散 治濕攻注腰脚疼痛行歩少力

杜仲 炒斷絲一兩半 延胡索 單辭

沒藥 當歸洗焙 肉桂去皮各一兩

右為末每服三錢空心溫酒調下

(瘨弱) 歐陽康叔家傳方 黑虎丹 治脚氣筋骨軟弱歩履不隨

白朮 五加皮 肉桂各半兩 檳榔 黑小豆半升

川烏 黃芪 白茯苓 赤芍藥 杜仲各兩半

附子 熟地黃 烏藥 生蒼朮 羌活

當歸 虎脛骨 白疾藜各一兩 川牛膝 虎脛骨 去芦酒浸炙

右為末麪糊同如梧桐子每服五十圓空心鹽酒下 (七十)

(七十一) 五獸三圓丹 治因氣血耗損肝腎不足兩脚痿弱

鹿茸 酥炙 麝香 即血竭也 虎脛骨 酥炙 牛膝 赤草根也燎去毛各等分

右修事為末即五獸丹料也

辰砂一兩為末附子大者一箇去皮臍劉旋中心空入辰砂於內

宣木瓜一个劉去心仍薄去皮入上附子於內以旋附子末蓋附子口正坐於銀煖鍾中重湯蒸十分爛附子斷白為度即三圓丹也

右用三圓丹研膏調五獸末子為圓如雞頭大木瓜酒或降氣湯任下

(氣沖心腹) (七十二) 脚氣入腹衝心疼痛腫滿大小便秘

沉香 木香 羌活 白芍藥

檳榔各五分 甘草 青皮 枳殼各二分 紫蘇葉 木瓜各二分半 真蘇子六分

右㕮咀每服四分姜三片同煎溫服

七十三 十全飲 治脚氣上攻心腹足心悶急痛小腹不仁關節攣痺疼痛無時煩渴弓飲大小便或秘或利

石斛酒浸 狗脊炙去毛 萆薢 從蓉 熟地黃
牛膝酒浸 地仙子 遠志炒去心 茯苓 杜仲去皮炒 各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸溫酒鹽湯任下

七十四 烏藥平氣湯 治脚氣上攻頭目昏眩腳膝酸疼行步艱苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神去木 甘草炙 白芷 當歸 白朮 川芎
五味子 紫蘇子 烏藥 乾木瓜 人參 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

七十五 茱萸丸 治脚氣入腹上下內不仁喘急欲死

吳茱萸湯洗去穢切片日乾 谷等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸至百丸酒飲任下

七十六 味元 治腎經虛寒腳氣入腹上氣喘急此藥宜服能治之 方見諸虛門

清理 木通散 治因腳氣之疾服補劑太過小便不通淋閉脹痛

梔子仁炒赤 芍藥 赤茯苓 甘草生各一兩 當歸半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分溫服

七十七 歐陽康叔家傳方搜風散 腳氣愈後可常服之

白芷 川芎 茯苓
芍藥 當歸各兩半 陳皮
枳殼 白朮二兩 乾姜炮
桔梗兩半 蒼朮十一兩酒浸去皮 厚朴
右㕮咀每服三錢水一盞姜四片煎服 麻黃去根節三兩 肉桂半兩

名方類證醫書大全卷十三

五疸

黃疸之疾諸書所載其證雖繁其方治不過五疸一曰黃汗二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸是也黃汗之證身体俱腫汗出染衣黃如蘗汁此由脾胃有熱喜自汗汗出入水中洗浴故汗秘熱結其汗黃也黃疸之證食已即飢遍身皮膚及爪甲面目小便俱黃臥時身体又帶赤帶青者必發寒熱此由酒食過度臟腑熱極水穀相併積於脾胃復爲風濕所搏結滯不散抱氣薰蒸所致若發於陰部其人必呕一發於陽部必振寒而後熱穀疸之證食畢即頭眩心中怫鬱不安而遍体發黃此由脾胃有熱大飢過爲飲食所傷胃氣

衝蒸所致也酒疸之證身目發黃心中懊憹腹足脛滿小便黃面發赤斑此由飢中飲酒大醉當風入水所致女勞疸者其證身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由過於勞傷又於極熱之中房事之後入水所致如多渴而腹脹者難治大槩五種之病多是脾胃經有熱而後發黃治法各當究其所因分利為先解毒次之又有時氣傷寒傷風伏暑解散未盡亦令人發黃如疸狀口淡怔忡耳鳴脚弱微寒微熱小便白濁又當作虛證治之不可妄投涼藥愈傷血氣臨病之際辨之可也

風（一）艾煎丸 治因傷風瘀熱不解發為風疸身黃小便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱

生艾二月採一束研爛熱成膏子　大黃　黃連
括樓根　凝水石　苦參　夢靡 炒各等分
右為末以艾膏和得所為丸梧子大初服六七丸漸加至二十丸有熱者加苦參湯加括樓根小便少加夢靡小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃並加一倍

寒（二）麻黃湯 治傷寒不解發為黃疸其脉緊以汗解之

麻黃三兩用水酒五升煎至二升每服一盞溫服汗出愈

暑（三）加減五苓散 治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利

茵陳　赤茯苓去皮　豬苓去皮　白朮　澤瀉各等分
右㕮咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時有用局方五苓散加茵陳亦可

濕（四）雙石散 治濕疸得之一身盡痛發熱面色黑黃七八日後壯熱在裏有血下如純肝狀小腹滿者急下之其脉沉細

礬石枯　滑石各等分
右為末每服二錢麥粥飲調下日三服食前便利如血者救

時行（五）茵陳湯 治時行瘀熱在裏欲發黃

茵陳二兩　大黃一兩　梔子仁三枚

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

(六) 黃連散 治大小便秘澁雍熱累功

黃連二兩 川大黃二兩 好醋拌炒

右爲極細末每服二錢食後溫水調下日三服

(七) 苦酒湯 治身躰洪腫發熱自汗如蘗汁其脉沉

黃芪五兩　芍藥　桂心 去粗各三兩 破

右㕮咀每服四錢苦酒三合水一淺半煎至七分去滓溫服初服必心煩以苦酒阻故也六七日稍愈

(八) 黃耆散 治黃汗

黃耆去芦蜜炙赤芍藥　茵陳各二兩 石膏四兩

麥門冬去心　豆豉各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

(九) 小半夏湯 治黃疸小便黃腹滿脹喘者不可除熱熟去必嘔

半夏一味剉每三錢姜十片煎溫服

(十) 單方 治黃疸身眼黃如金色不可使婦人雞犬見修合

東引桃根 細切如筋一把

以水一大升煎至一升小空心溫服三日後其黃漸退百日平復可時時飲一盞清酒則眼中易散忌食麪猪魚肉

(十一) 茵陳散 治黃疸

瓜蔞一个　石膏一兩　甘草炙半兩

木通　梔子仁略一大黃炒半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片葱白一莖煎服不拘時

(十二) 薤菜瓜蒂散 治黃疸遍身如金色累効

瓜蒂二枚　母丁香一枚　黍米四九个　赤小豆半枚

右爲極細末每夜兩鼻孔內嗑便睡明日取下黃水便服黃連散

(十三)穀疸 專治穀疸

苦參三兩 龍膽草一兩 牛膽一个

右爲末用牛膽汁入少煉蜜爲圓如梧桐子每服五十圓空心熟水或生姜甘草煎湯送下兼服紅圓子亦可

(十四)酒疸 白朮湯 治酒疸因下後變爲黑疸目青面黑心中如啖韮狀大便黑皮膚不仁其脉微而數

桂心 白朮各一兩 枳實去白麩炒 豆豉

乾葛 杏仁 甘草各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分食前服

(十五)當歸白朮湯 治酒疸發黃結聚飲癖心胷堅滿不進飲食小便黃赤其脉弦濇

茯苓三兩 當歸一兩 白朮三兩 黃芩一兩

半夏湯洗七次二兩半 黃連一兩 茵陳一兩 甘草炙半兩

枳實去白麩炒 杏仁去皮尖麩炒 前胡各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分食後溫服

(十六)葛根湯 治酒疸

枳實去白麩炒 梔子仁 豆豉各一兩 葛根二兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

(十七)酒煑黃連丸 治酒疸方見積熱門

(十八)滑石散 治女勞疸

滑石二兩半 白礬一兩枯

右爲末每服二錢用大麥粥飲調下以小便出黃水爲度

(十九)金黃丸 治酒積食積諸積面黃疸積硬堰

荆三稜 牽牛各二兩半 巴豆四十九粒出油

黍米粉　香附子炒半　澤瀉二分半
右爲末用梔子煎湯和丸如菉豆大每服三九至五九

熱疸（二十）**一清散**　治熱疸發熱
柴胡三兩　赤茯苓二兩　栀白皮　川芎一兩　甘草半兩
剉散每服四錢姜棗煎服

虛疸（二十一）**秦艽飲**　治五疸口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白濁
秦艽去芦　當歸去芦酒浸　芍藥　白朮
官桂去皮不見火　茯苓去皮　熟地黃酒蒸　陳皮
小草　川芎各一兩半　夏湯洗七次　甘草炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎至七分去滓温服不拘時

（二十二）**養榮湯**　治証同上方見虛損門

諸淋

淋閉之疾其證有五氣石血膏勞是也氣淋爲病小便澁常有餘瀝石淋爲病並中痛尿不得卒出膏淋爲病尿似膏出勞淋爲病勞倦即發痛引氣衝血淋爲病遇熱即發甚則溺血候其鼻頭色黃者小便難也大抵此證多由心腎不交積蘊熱毒或酒後房勞或七情鬱結或飲冷逐熱發散不動結于下焦小腸膀胱受之則爲癃閉淋閉其所爲病皆一類也又有温病後餘熱不散當風取涼亦能令人淋閉故治法當以清心爲先滑利次之臨證用藥更須詳審

熟淋（二十三）**八正散**　治大人小兒心經蘊熱臟腑秘結小便澁癃閉不通及熱淋血淋並宜服之
車前子　瞿麥　萹蓄　滑石
甘草　山梔子仁　木通　大黃麪裹煨各一斤
右㕮咀每服三錢水一盞入灯心煎至七分食後温服

(二十四) **清心蓮子飲** 治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並宜服之

黃芩半兩　黃耆蜜炙　石蓮肉去心　白茯苓　車前子　人參各七分半　麥門冬去心甘草炙　地骨皮各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞麥門冬十个煎發熟加柴胡薄荷

(二十五) **五苓散** 治伏熱小便赤痛如淋方載中暑門

(二十六) **石韋散** 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出腹急痛一作有時勞倦即發或尿如豆汁或出砂石並皆治之

芍藥　白朮　滑石　瞿麥各三兩　石韋去毛　木通各二兩　甘草炙　葵子　當歸去芦　王不留行各一兩

右爲末每服二錢空心小麥湯調服

(二十七) **通草赤散** 治心虛蘊熱小便赤澁或成淋痛

生乾地黃　木通　甘草各等分

右㕮咀每服三錢水一盞竹葉少許煎六分温服不拘時

(二十八) **火府丹** 治心經蘊熱小便赤少及五淋澁痛

木通　黃芩各一兩　生乾地黃二兩

右爲末煉蜜杵圓如梧桐子每服五十粒木通煎湯下

(二十九) **生附散** 治冷淋小便秘澁數起不通攺中腫痛

附子去皮臍生用　滑石各半兩　瞿麥　木通　半夏湯洗七次各二分

右爲末每服二錢水一盞姜七片灯心二十莖蜜半匙煎服

(三十) **髮灰散** 治小便尿血并治肺疽心痛吐血

右用髮燒灰每用二錢以米醋二合湯一盞調服

(三十一) **兼氏治血淋方**

阿膠二兩　麩炒　木猪苓　赤茯苓　澤瀉　滑石　車前子各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分五更時服

(三十二) 琥珀飲 治尿血

右用琥珀為細末每服二錢灯心薄荷煎湯下

(三十三) 立效散 治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草炙三兩 瞿麥穗一兩 山梔子去皮炒半兩

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片葱三个灯心三十莖煎服

(三十四) 小薊飲子 治下焦結熱尿血成淋

生地黃洗四兩 小薊根 通草 滑石 山梔子仁

蒲黃炒 淡竹葉 當歸去芦酒浸藕節 甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分空心溫服

(三十五) 鹿角膠圓 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠半兩 沒藥別研 油頭髮灰各三錢

右為末用茅根汁打糊圓如梧桐子每服五十圓鹽湯下

(氣淋)

(三十六) 沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滿於陽而致雍滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便方利

沉香 石韋 滑石 葵子 白芍藥各三分

右為末每服二錢大麥湯調下

(沙石淋) (三十七) 石燕丸 治小便淒痛不可忍出沙石然後方通

石燕燒紅水淬二次 滑石 石韋 瞿麥

等分為末糊丸梧子大每服五十丸瞿麥灯心湯下日三

(膏淋) (三十八) 鹿角霜丸 治膏淋多因憂思失志濁氣干清小便淋閉黯如膏脂被勞筋力或傷寒溫多有此證

鹿角霜 白茯苓 秋石各等分

右為末麪糊圓如梧桐子每服五十圓空心米湯下

(三十九) 海金砂散 治膏淋

海金砂 滑石各一兩 甘草一分

右爲末每服一匕麥門冬湯下灯心湯亦可

勞淋 鹿角膠丸 鹿角膠 治勞傷疲健而後發方並見前

通治 四十 五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不宣臍腹急痛或尿如豆汁便如沙石淋膏尿血並宜服之

山茵陳二兩去根 淡竹葉四兩 木通去節 滑石 赤茯苓半斤 甘草炙六兩 山梔子仁炒十四兩 赤芍藥六兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎服一方加當歸除木通滑石

四十一 秘方 治血淋諸熱淋疾

山茵陳 淡竹葉 山梔子 滑石 赤芍藥 甘草 木通 猪苓 瞿麥各半兩

右爲剉每服五錢水一琖半灯心少許同煎去滓空心服如大便秘澁加大黃兩半同煎

四十二 地膚子湯 治諸病後体虛觸熱小便赤澁數起少出並痛如刺或尿出血

地膚子一兩 知母 黃芩 海藻洗 猪苓去皮 地膚子 瞿麥 去梗葉 枳實麩炒 升麻 葵子各半兩

通草

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

四十三 通草湯 治諸淋

王不留行 葵子 通草 葫根 蒲黃炒 當歸去芦洗 桃膠 瞿麥 滑石各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

四十四 五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或如沙石或冷淋如膏或熱沸便血並皆治之

赤茯苓六兩 赤芍藥 當歸去芦 甘草生用各五兩 山梔子仁各十兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎八分空心服

消渴

人身之有腎由樹木之有根根腎受病先必形体憔悴雖加以滋養不能潤澤故患消渴者皆是腎經受病由壯盛之時不自保養快情恣慾飲酒無度食脯炙及丹石等藥遂使腎水枯竭心火熾熾三焦猛烈五臟乾燥由是渴利生焉醫經所載有消渴內消強中三證消渴者多渴而利內消者由熱中所作小便多於所進飲食而反不渴虛極短氣強中者虛陽強大不交而精氣自泄大槩消渴之疾上盛下虛心脉多浮腎脉必弱故經云脉洪大陰不足陽有餘則為熱中即消中也又云腎實則消而不渴小便自利名曰消腎即內消也其治宜抑損心火攝養腎水消渴之人津液枯竭服諸劑過多防發癰疽之疾尤忌房事并飲酒鹹食實麪之物切不可用金石之藥臨證愼之

及下恐脫眼字

鉄艷粉
鉛華粉

四十六 **五令散** 治伏暑飲渴引飲无度 方載中暑門

四十七 **清心蓮子飲** 治心經蘊熱作渴小便赤澁 方載五淋門

四十八 **衛生天花圓** 治三消渴疾

黃連去鬚二兩童子小便浸三宿焙干 白扁豆炒二兩
辰砂別研鉄艷粉別研各一兩 牡蛎煅 知母 苦參
天花粉各半兩 芦薈一分 金箔 銀箔各二十片

右為末取生瓜婆根汁和蜜圓如梧桐子每服五十圓空心麥門冬湯下

四十九 **大黃甘草飲子** 治男子婦人一切消渴不能止者

大豆五升先煮令沸出淘洁水再煮 大黃一兩半 甘草大長者四枚炙碎

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少更添豆軟盛於盆中放冷令病人食豆渴食湯汁無時候食尽如止渴燥罷不止再煮前藥不三次病悉去矣

(四十九) 硃砂黃連圓 治心虛蘊熱或因飲酒過多致為消渴

硃砂一兩別研宜連三兩 生地黃二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓灯心棗子煎湯送下

(五十) 眞鉄圓 治心虛蘊熱或內積七情醞飲過多皆致煩渴引飲無度小便或利或不利

知母一法一兩一分 川連去毛一法一兩 苦參一兩 玄參一兩 法无

鉄銚粉一兩一分研 牡蛎煨一兩 朱砂二別研 麥門冬去心

天花粉分各半 金箔 銀箔各二百片一法白 扁豆煮去皮一兩

右為末煉蜜入生瓜蒌根汁少許圓如梧桐子以金銀箔為衣每服三十圓瓜蒌根麥門冬煎湯任下

(五十一) 秘法益元散 白虎湯五苓散 去桂合和煎或和為末大治消渴方並見暑門

消中

(五十二) 加味錢氏白朮散 治消中消穀善飢

人參 白朮 白茯苓 甘草炙 枳殼去穰麩炒各半兩 乾葛二兩 木香三分 北五味子 柴胡各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎服

強中

(五十三) 黃連豬肚圓 治強中消渴

黃連去鬚 梁米 瓜蒌根 茯神各四兩 知母 麥門冬去心各二兩

右為末用大豬肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合口置甑中炊極爛取出藥別研以豬肚為丸入蜜搗和前藥杵數千下圓如梧子每服五十圓參湯下一方加人參熟地黃乾葛濟生除知母梁米用小麥

(五十四) 鹿茸圓 治失志傷腎心虛消渴小便無度

鹿茸去毛炙三分 麥門冬去心二兩 熟地黃 黃耆 五味子 破故紙炒 茯苓 雞腔胵麩炒 茯苓酒浸 山茱萸

地骨皮洛五人參三分　牛膝酒浸　玄參各五分
右為末蜜圓如梧桐子每服三十圓米湯下

五十五　**萬根丸**　治消渴消腎

萬根三兩　括樓三又　鉛丹二兩　附子一兩炮去皮臍
右四味搗羅為細末煉蜜丸桐子大每服十九日進三服治
日飲頓水者春夏去附子

五十六　**發慈圓**　止消渴補心腎

黃耆鹽湯浸　從蓉酒浸　澤瀉　龍骨
菟絲子酒浸　磁石煅碎　桂心　萆薢
鹿茸去毛酥炙　山藥炒　熟地黃　附子炮去皮臍一个
遠志去心炒　破故紙炒　五味子　杜仲去皮薑汁製炒
石斛　覆盆子　山茱萸　茯苓各等分
右為末蜜圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

五十七　**八味圓**　治心腎不交消渴引飲方載痰氣門一方除附子加五味子名腎氣丸

五十八　**加減腎氣圓**　治腎水不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肢体消瘦並宜服之

山茱萸取肉　白茯苓　牡丹皮　熟地黃酒蒸沉香不見火
五味子　澤瀉　鹿角鎊　官桂不見火半兩
右為末煉蜜圓如梧桐子每服七十圓鹽湯米飲任下弱甚者加附子一兩兼進黃芪湯

五十九　**黃耆六一湯**　治男子婦人諸虛不足胷中煩悸時常消渴或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴者並宜服之

黃耆去芦蜜塗炙六兩　甘草炙一兩
右�once咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分温服不拘時

六十　**玄兎丹**　治腎水枯竭心火上炎消渴引飲方載諸虛門

(六十一) **地黃飲子** 治消渴咽乾面赤煩躁

人參去芦 生乾地黃洗熟乾地黃 黃耆蜜炙
天門冬去心 麥門冬去心 石斛去根炒
枇杷葉去毛炙 枳殼去穰麩炒 甘草炙各等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

(六十二) **烏梅五味子湯** 專治消渴生津液

五味子 巴戟酒浸去心 百藥煎 烏梅 甘草各等分

右㕮咀每服四分水一盞空心煎服

(六十三) **茯苓圓** 治三消渴疾累有奇效

五倍子去蘆 蓮肉一兩 龍骨煅兩半 左顧牡砺火煅一分

右用茯苓二兩爲末煮糊圓如梧桐子每服五十圓空心盬湯下仍兼服藥砂黑錫丹

(六十四) **六神湯** 治三消渴疾

枇杷葉 瓜蒌根 乾葛 甘草 黃耆各等分 蓮房

右㕮咀每服四錢水一盞空心煎服小便不利加茯苓

預方 (六十五) **忍冬圓** 治渴疾既愈之後須預防發癰疽之患用忍冬草不以多少根莖花葉皆可用置餅內用無灰好酒浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許碾爲細末以所浸酒打麪糊圓如梧桐子每服一百圓不拘時酒飲任下一方用忍冬草水浸煎服

(六十六) **雙黃湯** 治先前服丹石毒

鼈粟子煮粥入蜜飲之

(六十七) **三黃丸** 治證同上方見積熱門

赤白濁

人之五臟六腑俱各有精然腎為藏精之府而聽命於心實於

水火升降精氣內持若調攝失宜思慮不節嗜慾過度水火不
交精元失守旺是而爲赤白濁之意赤濁者心虛有熱多因思
慮而得之白濁者腎虛有寒過於嗜慾而得之其狀漩面如油
光彩不定漩脚澄下凝如膏糊治法當以赤白兼其病源心虛
者當清心調氣腎寒者温補下元仍須清上使水火既濟陰陽
和平精氣自固矣凡思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱
而腎不足故土邪干水亦能令人便下渾濁史載之云夏則土
燥而水濁冬則土堅而水清醫多峻補其疾愈甚只宜以平和
之藥療之水火既濟脾土自堅其流清矣

（心濁）**道生散** 治心虛褊熱小便赤澁遂成赤濁方載諸淋門

（六十九）**心腎丸** 治水火不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

熟地黃洗蒸　牛膝去苗酒浸　薤蓉酒浸各一兩　白茯神去木
人參去芦　遠志去苗甘草煮搥去骨　附子炮去皮臍

鹿茸火去毛酒浸炙　山藥炒　五味子去枝　當歸去芦酒浸
黃耆蜜炒　龍骨煅　兎絲子酒浸並研成餅三兩

右爲末用浸藥酒煮糊丸如梧桐子每服七十丸空心温酒鹽湯下

（七十）**猪苓丸** 治年壯氣盛慾動所願不得意漾於外夢遺白濁

右用半夏二兩破如豆大用猪苓末四兩先將一半炒半夏
黃色不令焦地上空出去火毒半日取半夏爲末糊丸如梧
桐子候乾更用前猪苓末二兩炒藥微裂同於沙甕內藏之
空心温酒鹽湯下四五十丸

（七十一）**清心蓮子飲** 心虛有熱小便赤濁有沙膜方載五淋門

（七十二）**瑞蓮丸** 治思慮傷心小便赤濁

白茯苓去皮　石蓮肉炒去心　龍骨生用　天門冬洗去心
麥門冬洗去心　遠志甘草煮去心　柏子仁炒別研　紫石英火煅七次研細
當歸去芦酒浸　酸棗仁炒去殼　龍齒各一兩乳香半兩別研

右為末煉蜜丸如梧桐子以硃砂為衣每服七十丸空心溫
酒棗湯任下

(七十三)**百指方蓮子六一湯** 治心經虛熱小便赤濁

石蓮肉連心六兩　甘草炙一兩

右為末每服二錢灯心煎湯調服

(七十四) 治心經伏暑小便赤濁

人參　白朮　赤茯苓去皮　香薷
澤瀉　木猪苓去皮　麥門冬去心各等分
右㕮咀每服四錢水一盞煎服

(七十五)**葉氏育神散** 治夜夢驚恐小便白濁 方載心痛門

(七十六)**寧志膏** 治心臟虛虧神志不守恐怖恍惚健忘赤白濁
方見心痛門

(七十七)**葉氏定心湯** 理心氣不足榮血衰少夢寐多驚心神不
守夢中遺精白濁不已 方載心痛門

(七十八)**葉氏鎮心寒神湯** 理心氣不足夜夢多驚小便白濁遺
精方見心痛門

脾濁

(七十九)**羊脛炭丸** 治思慮傷脾心不攝精遂致白濁

厚朴去皮取肉姜汁製炙為細末二兩　羊脛炭炙燃過通紅窨殺研為細末一兩

右二味煮麪糊丸如梧桐子每服百丸空心米飲下

腎濁

(八十)**五子圓** 治小便頻數時有白濁

菟絲子酒蒸　家韭子炒　益智子去皮　茴香炒　蛇床子去皮炒各等分

右為末酒糊圓如梧桐子每服七十圓米飲鹽湯任下一方
用川椒為衣恐麻人因喫加入前藥內亦可

(八十一)**固精丸** 治嗜慾過度傷腎經精元不固夢遺白濁

肉蓯蓉酒浸炒　陽起石火煅研　鹿茸去毛酥炙　韭子炒　鹿角霜
赤石脂火煅七次　川巴戟去心　白茯苓　附子炮去皮臍　龍骨生用各等分

右爲末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下

(八十二) **益志湯** 治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

鹿茸去毛酥炙　巴戟去心　枸杞子　熟乾地黃酒浸
菟絲酒浸　牛膝酒浸　附子炮去皮臍　杜仲不見火
山茱萸　白芍藥　甘草炙　防風各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片鹽少許同煎空心服

(八十三) **安中散** 治三焦虛寒短氣煩悶小便白濁精血不禁

熟地黃　巴戟去心　龍骨各二兩半　遠志去心炒
茯苓各三兩　蛇床子炒四兩半　天雄炮去皮臍　五味子
山藥各三兩半　菟絲酒浸　續斷各四兩　兎絲子酒浸四兩半

右爲末每服二錢温酒調下

(八十四) **家藏方單解分清飲** 治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度淀面如油光彩不定淀脚澄下凝如膏糊

益智仁　川萆薢　石菖蒲　烏藥各等分

右㕮咀每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前温服一方加茯苓甘草

(八十五) **菟絲子丸** 治膀胱腎冷小便白濁滑數方見虛勞門

(通治) (八十六) **桑螵蛸散** 治男子小便日數十次稠如米泔或赤或白心神恍惚憂愁瘦悴減食此證多因房勞過度耗傷真氣得之

桑螵蛸炙鹽水煮志去甘草水煮去苗菖蒲鹽炒
人參去蘆　茯神去木　龍骨煅研

右爲末每服二錢臨睡時人參湯下

(八十七) **秘傳玉鎖丹** 治心腎俱虛小便白濁淋瀝不已淀面如膏夜夢遺精虛煩盜汗

當歸酒洗去芦　鱉甲醋炙各等分
茯苓去皮四兩　龍骨二兩　五倍子十六兩

右爲末水煮麪糊圓如梧桐子每服四十粒空心鹽湯下

(八十八)固真丸 治元臟久虛小便白濁婦人赤白帶崩漏下血

蒼朮四兩 用茴香一兩鹽一兩同炒令朮黃爲度

蒼朮四兩 用川烏一兩炮裂去皮尖切片子并川楝子一兩和皮核對同炒令朮黃爲度

蒼朮四兩 用紅椒一兩去目并合口者以破故紙同炒令朮黃爲度

蒼朮四兩 用好酒好醋各半洗一處同煮三五滾却取朮焙乾

右同爲末同煮藥酒醋打麪糊圓如梧桐子每服三十圓男子溫酒鹽湯空心下婦人醋湯下

(八十九)十四友丸 補諸虛不足收斂心氣治怔忡不寧精神昏健赤白濁甚者見心痛門

(九十)治小便白濁出髓條

酸棗仁 炒 白朮 人參

破故紙 炒 益智 淨洗 白茯苓

大茴香 左顧牡砺 煅各等分

右爲末加青鹽酒爲圓如梧桐子每服三十圓溫酒米飲下

(九十一)蟬茶丸 治赤白濁

黃蟬 白茯苓 爲末等分

溶蠟和茯苓末丸如彈子大棗湯嚼下無時

(九十二)直指方煉鹽散 治漏精白濁

雪白鹽 入磁瓶內按實以瓦蓋定黃泥封火煅一日取出頓陰地上一夜用密器收貯 白茯苓 山藥 炒各一兩

右爲末入鹽一兩研勻用棗肉和蜜圓如梧桐子每服三十圓空心棗湯下

(九十三)茯菟丸 治思慮太過心腎虛損食湯不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

菟絲子五兩 白茯苓三兩 石蓮肉二兩

右爲末酒糊丸如梧桐子每服三十丸空心鹽湯下

名方類證醫書大全卷十四

水腫

岐伯所謂水腫有奮脹鼓脹腸覃石瘕者是也名雖不一皆聚水所致故人身之脾屬土五行論之雖曰剋制腎水然非土則又不能吃其汁濫水腫之疾寃其所因皆由脾土有虧不能防制以致腎水浸漬脾土凝而不流遂成此疾其為證也發見之初裏裏微腫有若臥蚕繞起之狀微而至大以手按之則隨手而起如裹水其內上則喘急咳嗽下則足膝胕腫面目虛浮外腎或腫小便不利治療之法當辨其陰陽脉證若陰水為病者脉來沉遲色多青白不煩不渴小便澁少而清大腑多泄陽水為病者脉來沉數色多黃赤或煩或渴小便赤澁大腑多秘腰

已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便然後實其脾土土盛
自能攝養腎水其腫自消虛弱者又當温補下元尤宜節飲食
絶生冷戒房事否則愈而復作凡腫證甚者肌肉崩潰足脛流
水又若唇黑缺盆平臍凸脊平足平五者皆是五臟有損非可
療之病又有內挾七情之氣停滯涎飲腹滿脇脹名爲氣分及
少血熱生瘡變爲腫痛名爲熱腫又當隨證施以治不可一塗
而取要知此證脉浮大者生沉細者死臨證施治宜詳審焉

陰水 (一) 實脾散 治陰水發腫用此先實脾土

厚朴去皮薑炒 白朮 木瓜去穰 木香不見火 乾薑炮各一兩
草果仁 大腹子 附子 白茯苓去皮 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

(一一) 濕腎散 治腎經積水流注經絡腹脇攣急四肢腫痛
耳遂半兩生木香一兩

右為末每服一匁以瘡豬腰子一隻批開去筋膜杉藥在內
淹勻用薄荷裹定外用紙四五重再裹以水煎濕於火內煨
熟臨卧細嚼温酒送下當下黄水是其效也

陽水 (一一) 疎鑿飲子 治水氣通身浮腫喘呼氣急煩燥多渴
大小便不利服熱藥不得者

羌活去苗 商陸 澤瀉 赤小豆炒 檳榔
秦艽去苗木通 大腹皮 茯苓皮各等分

右㕮咀每服四匁水一盞姜五片煎七分温服不拘時

(一一一) 鴨頭圓 治水腫面赤煩渴肢躰俱腫喘急不安小便澁
甜葶藶炒 猪苓去皮 漢防已各一双

右為末取緑鴨頭血為圓如梧桐子每服七十圓木通湯下

(五) 神助散 舊名葶藶散 治十腫水氣面目四肢浮腫以手
按之隨手而起咳嗽喘急不得安卧小便澁大便不利

澤瀉一兩　椒目一兩　黑牽牛炒取末一兩　豬苓去皮二兩　葶藶炒別研
右㕮咀每服三分葱白三莖漿水一盞煎至一半入酒半盞
調藥絶早向東立服如人行十里久又以漿水葱白煮稀粥
候葱爛入酒五合量人所飲多少須啜一升許自早至午當
利小便三四升或大便微利喘定腫減隔日再服必須善為
將理忌鹽酢麪等事

六　十棗圓　治水氣四肢浮腫上氣喘急大小便不通

甘遂　大戟　芫花各等分
右用棗子煮熟去皮核以肉杵爛如膏圓如梧桐子清晨熱
湯送下四十圓以利去黃水為度否則次早再服

七　家藏方消腫圓　治水氣腹脹頭面四肢陰囊皆腫喘急
咳嗽睡卧不安小便赤澁
淡豉二兩（新好者研）　巴豆一兩（水半升煮令干去心并出油）　京三稜（煨）

大戟（新者）　杏仁（燒存性研）各半兩　五靈脂（去沙石）一分
右為末以生麪水調搜和杵千百下圓如豌豆大每服五
圓煎桑白皮湯送下大便祕者加至十圓喘急者加杏仁去
皮炙煎湯送下忌甘草鹽醬

八　麻黃甘草湯　治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗
麻黃（去根節）四兩　甘草二兩
右㕮咀每服三錢水一盞煮麻黃再沸後入甘草煎七分取
汗愼風老人虛人不可輕用

九　大戟散　治水腫腹大如鼓或遍身皆腫
大戟　白牽牛（頭末）各等分
右為細末每服三錢以豬腰一對批開摻藥在內燒熟空心
食之如食左腰子塌左臂右腰子塌右臂如腫不能全去於
腰邊腎塗甘遂末飲甘草水少許其腫尽去

(十)三仁圓 治水腫喘急大小便不通
郁李仁 杏仁炮去皮尖 薏苡仁各一兩
右爲末米糊丸如梧桐子每服四十圓不拘時米飲下

氣腫

(十一)杏蘇飲 治上氣喘嗽面目浮腫
紫蘇葉二兩 五味子 大腹皮 烏梅肉
杏仁去皮尖各兩半 陳皮 桔梗 麻黃去節
桑白皮炒 阿膠炒各半 紫菀 甘草炒各一兩
右�once咀每服三錢水一盞薑五片煎服

(十二)直指分郁李仁丸 治水氣乘肺動痰作喘身微腫
葶藶隔紙炒杏仁去皮尖各一兩 防已 郁李仁炒
真蘇子 陳皮 赤茯苓各半兩
右爲末煉蜜丸如梧桐子每服四十丸食後紫蘇湯下

(十三)普濟丸 治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤澁
甜葶藶隔紙炒令紫色 漢防已二兩 木通一兩
杏仁二兩去皮尖取仁一 麩炒黃二兩 貝母煨令黃一兩
右爲末棗肉丸如梧桐子每服五十丸煎桑白皮湯下

(十四)分氣補心湯 治心氣欝結發爲四肢浮腫上氣喘急
大腹皮炒 香附子炒去毛 桔梗各一兩
木通 甘草炙 白茯苓
青皮炒 枳殼去白麩炒 白术各三分 細辛去苗 木香各半兩
右�once咀每服四錢水一盞棗一枚同煎食前服

(十五)木香分氣圓 治一切氣逆心胃滿悶腹脇脹急咳嗽冷痰氣不升降並皆治之方載氣門

虛證

(十六)當歸散 水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火遂不能滋養脾土故土不制水水氣盈溢氣脉閉塞滲透經絡發爲浮腫之證心腹堅脹喘滿不安

木香 煨 赤茯苓 當歸洗 桂心 木通
赤芍藥 牡丹皮 檳榔 凍皮 白朮 各等分
右㕮咀每服三錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分温服

十七 復元丹 治脾腎俱虛發爲水腫四肢虛浮心腹堅脹小便不通洒目下腫

附子炮一兩 南木香煨 茴香炒 川椒炒出汗 獨活 厚朴去皮薑製 白朮炒 陳皮 吳茱萸炒
桂心各一兩 澤瀉一兩半 肉豆蔻煨 檳榔各半兩
右爲末糊丸如梧桐子每服五十圓紫蘇湯下不拘時

十八 加味腎氣丸 治脾腎虛損腰重脚腫小便不利

白茯苓去皮 附子炮二兩 澤瀉 官桂不見火 川牛膝去芦酒浸
車前子酒蒸 山藥炒 山茱萸取肉 熟地黃 牡丹皮去木各一兩
右爲末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

十九 加味腎氣丸 治腎虛腰重脚腫小便不利

附子炮二兩 白茯苓去皮 澤瀉 山茱萸取肉
山藥炒 車前子酒蒸 牡丹皮去木各一兩 官桂不見火
川牛膝去芦酒浸熟地黃各半兩 輿前方分兩不同
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服七十九空心米飲吞

熟證 二十 牽牛丸 治一切温熱腫滿等疾

黑牽牛 大黃 大椒 滑石 各等分
右爲細末酒煮麪糊和丸如桐子大每服五九至七九生姜
湯下食後虛實加減

二十一 赤小豆湯 治血氣俱熱遂生瘡疥變爲腫滿或煩或渴

赤小豆炒 當歸去芦炒 商陸 澤瀉 桑白皮炙
連翹仁 赤芍藥 漢防己 木猪苓去皮 澤漆各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞壹壹三片煎八分温服熱甚加犀角

(四三)(二十二)**五皮散** 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹脹脹上氣促急

五加皮　地骨皮　茯苓皮　生姜皮　大腹皮　各等分

右㕮咀每服二錢水一盞煎至八分熱服不拘時切忌生冷油膩堅硬等物澹寮去五加皮地骨皮用陳皮桑白皮

(二十三)**牽牛湯** 治感四時之氣腹中有濕熱足脛微腫中滿氣急咳嗽小便不利

牽牛頭末一兩　厚朴去皮姜汁製炒五分末

右每服二錢姜棗湯調下或為丸姜棗湯每服三十丸亦可

(二十四)**普巖圓** 治脾經受濕流注四肢足脛浮腫小便澁少

赤茯苓　桑白皮炙各三分　黑牽牛生取頭末澤瀉　白朮

漢防己　川羌活　苦葶藶炒研　郁李仁去皮研　陳皮去白各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓溫水送下不拘時

(二十五)**普麻木香散** 治濕熱內外餘熱水腫腹脹小便赤澁大便滑洩

普麻　猪苓去皮　茯苓去皮　白朮各一分　滑石三兩

木香半分　木通　澤瀉　甘草各半兩　辣桂一分

右為末每服三錢白湯調下食前此藥下水溫消腫腹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉洩者此乃溫熱痞閉極深而攻之不開是能反為注洩此正氣已衰而多雜救也慎不可攻之而死益耳

(二十六)**大橘皮湯** 治溫熱內攻心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩並宜服之

橘皮去白兩半　木香一分半　滑石六兩　槟榔三分　白朮半兩

茯苓去皮一兩　木猪苓去皮　澤瀉　肉桂各半兩　甘草二分

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎六分溫服

楮实子 一斗五升熬成膏 白丁香 乙兩 茯苓 二兩

右為末用楮实子膏為丸梧子大服至小便清利及腹脹消為度後服中治調養藥疎啓其中五補七宣即其理也

二十八 消腫圓 治水腫喘滿小便不利

滑石 木通 白术 黑牽牛 炒

通脫木 茯苓 茯神 去木 半夏 湯洗七次

陳皮 各一分 木香半分 檳榔麥穗 丁香 各半兩

右為末酒糊圓如梧桐子每服五十圓灯心麥門冬湯下利但是水氣並皆治之

二十九 禹餘粮圓 治十種水氣凡脚膝腫痛上氣喘滿小便不

蛇含石 大者三兩以鉄銚盛入炭火中煅紫与銚子一樣通紅用鉗出銚子以紫淬醋中候冷研極細

真針砂 五兩先以水淘淨空干更以鉄銚子炒干去入

禹餘粮 一處用水醋二升煞銚內煮令醋干為

度却就用銚子同一煮入一赤鉗出銚子傾於淨磚地上候冷研令極細

禹餘粮 三兩 同入針沙內製

以上三物為主其次量入虛实入下項藥治水多是取轉推此方三物既非大戟甘遂又有下項藥扶持故虛老人可服之

木香 午時酒浸蓬木炮 白芷 炙黃 桂心 川芎

白豆蔻 去皮 白附子炮 當歸酒浸一夕各半兩虛人老人全用半兩实壯人者隨意減之 青皮 去白 甘松 炮羌活

右為末拌勻以湯浸煮餅搜去水和藥再搗極勻丸如梧桐子每服五十丸空心温酒下最忌食鹽否則發疾愈甚

三十 苦葶藶丸 治一切水腫氣通身腫滿不可當者

苦葶藶 四兩於鍋內鋪紙上炒黃色為度 人參 一兩

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎棗白皮湯下日進三服空心食前此藥恐君子不信試驗之

(三十一)**百治方蘿蔔子飲**治水病浮腫
蘿蔔子生用赤茯苓去皮各半兩牽牛末炒黃麻炒
甘草略煨半夏製川芎枳殼青木香
辣桂青皮陳皮
右㕮咀每服三錢水一盞姜四片煎服

(三十二)**茯苓散**治諸般氣腫水腫
芫花醋拌炒澤瀉郁李仁
漢防己葶藶本各三分陳皮去白甜葶藶
白槟榔瞿麥各半兩滑石白茯苓
右為末每服二錢桑白皮煎湯空心調下取下碧綠水如爛
羊脂為度忌鹽食百日大戟各七分半

(三十三)**川活散**治水氣浮腫冷熱通治
川羌活蘿蔔子炒各等分為末酒調下

脹滿

脹滿之疾古方以為鼓脹穀脹是也雖見之方治而其論自三因嚴氏始詳大抵脹滿之證多是脾胃素弱或病後失調外為風寒暑濕之氣所侵內為憂患七情之氣所傷及過食生冷飲漿之類并傷脾胃以致五臟傳尅陰陽之氣不得升降痰飲結聚中焦遂成脹滿之疾其為證也或腸鳴氣走漉漉有聲或兩脇腰皆痛連上下或頭疼嘔逆曾滿不食大小便為之不利其脉浮者易治脉虛小者為難至如積聚之證亦由膨脹而始又當以脉証辨之從五積治法更有水疸水氣腳氣及婦人血膨皆能令人脹滿又當各以類求之

(氣脹)(三十四)**平肝飲子**治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭暈嘔逆脉來浮弦

防風去芦　桂枝不見火　枳殼去穣麩炒　赤芍藥
桔梗去芦　炒木香不見火　人參　槟榔
各一錢　當歸去芦酒浸　川芎　玄胡索炙各半分
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

(三十五)紫蘇子湯　治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而濇
紫蘇子一兩　大腹皮　草果仁　半夏湯洗七次
厚朴去皮姜炙　木香不見火　陳皮　木通
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎服不拘時

(三十六)五膈寬中散　治七氣沉滯飲食不下氣滿膨脹方見氣門
白朮　枳實去穣麩炒　人參　甘草炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

(三十七)薑香正氣散　調榮衛利三焦行痞滯消膨脹方見氣門
蒼朮去皮　厚朴去皮姜炙　陳皮　甘草炙各半兩
右為末每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分去滓熱服不拘時

(三十八)姜附湯　治男子婦人氣虛膨脹或胃膈俾痰或滯積氣小便亦白濁並宜服之
香附子去毛一斤　老姜不去皮六兩
白茯苓去皮各四兩　北茴香淨炒一兩
右為末陳米糊丸如梧桐子每服五十圓空心煎紫蘇湯下

(三十九)木香順氣湯　治濁氣在上則生膜脹
木香三分　厚朴姜製四分　青皮去白　陳皮
益智仁　白茯苓去皮　澤瀉　半夏湯洗　吳茱萸湯洗各二分　當歸五分
柴胡各一兩　草豆蔻麪裹煨去皮三分　蒼朮泔浸三分
右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓溫服食前忌生冷及硬物息怒

(四十)木香分氣丸　善治脾胃不和心腹脹兩脇膨脹胃膈注

滿痰嗽喘息刺心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之有効

木香　檳榔　青皮去白　陳皮去白　穅

蓬莪茂炮　乾生姜　當歸

玄胡　白朮　枳殼麩炒　荆三稜濕紙裹煨香

赤茯苓　肉豆蔻　秋冬加丁香炒各等分

右爲細末白麪糊爲丸小豆大每服三五十丸生姜湯下忌生冷馬齒莧

(四十一)調中順氣丸　治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香　白豆蔻仁　青皮去白　陳皮去白

京三稜炮各乙兩　大腹子　半夏湯洗七次各二兩

縮砂仁半兩　檳榔炮一兩　沉香半兩

右爲細末水糊爲丸如桐子大每服三十丸陳皮湯下

(四十二)沉香降氣湯　治氣不外降胷膈痞悶心腹脹滿

方見諸氣門

(四十三)強中湯　治食啖生冷過飲窈漿有傷脾胃遂成腹脹

食脹

干姜炮　白朮各一兩　青皮去白　陳皮去白　人參

丁香各三兩　草果仁　附子炮去臍厚朴姜炒甘草炙各半兩

右咬咀每服四分水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時嘔者加半夏或食麪脹滿加蘿蔔子各半兩

(四十四)桂香丸　治大人小兒過食雜菓傷脾令人腹脹氣急

肉桂不見火　麝香別研一分

右爲末用飯丸如豌豆大大人十五丸小兒七丸熟水送下

(四十五)異香散　治脾氣不和飲食難化腹脇脹滿

(四十六)楠木湯　治飲食過飽所傷腹脹

方見氣門

右以楠木煎濃湯飲之

【熱脹】枳实湯 治腹脹發熱大便秘結脉多洪数此名熱脹

枳实去穣麩炒半兩 厚朴姜炒一兩 大黄酒煮 桂心不見火 甘草炙各三分

右㕮咀每服四分水一盞姜棗煎服嘔者加半夏一分 四十七

【四十八】是齋椎気丸 治三焦痞塞気不升降胃腸脹滿大便秘澁小便赤小並宜服之

檳榔 陳皮 黄芩 大黄 枳實 黒薑半生用各等分

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五七十丸臨卧以温熟水下更量虚実加減

【四十九】中滿分消丸 治中滿鼓脹気脹水気脹大熱脹不治寒脹

人參去芦 白朮 猪苓各去黒皮 黄連去須炒半兩 白茯苓去皮 姜黄 黄芩去腐剉炒各半兩 乾生姜 炙甘草各二分 枳实麩炒黄半夏湯洗七次各五分

厚朴姜製乙兩 知母剉炒 澤瀉三分 陳皮半兩

右細碾茯苓澤瀉生姜各一為末另秤外共為細末秤入上三味和勻水浸餡餅為丸如桐子大每服一百丸熱白湯送下寒因熱用故焙熱服之食遠量人虚実加減

【寒脹】【五十】朴附湯 治老人中寒下虚心腹膨脹不喜飲食

附子炮去皮臍 厚朴姜製炒各等分

右㕮咀每服四分水一盞姜七片棗二枚煎至八分温服不拘時加少木香尤佳

【五十一】大半夏湯 治肝気大盛勝克於脾脾不運化結聚涎沫閉塞腸気胃冷中虚遂成脹滿之病其脉多弦遲

半夏湯洗七次 桂心各五兩 附子炮去皮臍 枳實麩炒 茯苓 甘草炙 厚朴姜炒 當歸 人參各二兩 川椒炒出汗去合口者八百粒

右㕮咀每服四分水一盞姜五片棗二枚空心煎服

正字通 挑撥盛物器 即古之箕 屈竹為之

(五十二) **荀氣圓** 治諸氣痞塞關膈不通腹脹如鼓大便虛祕又治暨氣小腸氣等功效尤速

青皮 水蛭去蛭炒 義朮 蝕虫去蝕炒 三稜 乾漆去漆炒 檳榔 班猫炒去猫 茱萸 牽牛炒去牛 乾姜 砒礵炒去砂 附子 鹽炒去鹽 赤芍藥 川椒炒去椒 胡椒 茴香炒去香 石菖蒲 桃仁炒去仁

右各坐與所註藥炒熟去水蛭等並不用只以青皮等十件為末酒糊圓如梧桐子每服五九至七九空心紫蘇湯下

(五十三) **附子粳米湯** 治喜怒憂思擾乱臟氣胷腹脹滿腸鳴走氣嘔吐不食

半夏湯洗炒粳米各二合 乾姜炮 甘草各二錢 大附子一枚去皮臍人臍炮

右㕮咀每服四分水一盞棗二枚煎七分食前服

(五十四) **厚朴橘皮煎** 治傷冷溏泄腹肚膜脹其狀如覆槖桄喘滿奔豚氣不得舒

厚朴去皮姜製三兩 枳殼麩炒製三兩 乾姜炮 青皮 陳皮各去白 肉桂去皮 全蝎去毒并足 木香不見火 丁香 胡椒 良姜各一兩二分 青皮去白各二兩

右末用糯葡萄子炒去殼取淨四兩爛研和藥用酒同姜汁各少許煮糊圓如梧桐子每服五十丸煎紫蘇陳皮湯送下

(五十五) **氣針丸** 專治氣滯膨脹

肉豆蔻煨各一兩 片子姜黃 青皮去白各二兩

右末用羅葡萄子炒去殼取淨四兩爛研和藥用酒同姜汁各少許煮糊圓如梧桐子每服五十丸煎紫蘇陳皮湯送下

(五十六) **四炒圓** 治氣血凝滯腹內蠱脹

枳殼四兩去瓤切作兩指面大塊分四處一兩用薑汁一兩同炒黃去薑汁一兩 蓽澄茄子一兩 用同炒黃去薑汁一兩 木香一兩 用同炒黃去干漆一兩用枳殼為細末

右用元炒蒼朮四味同水二椀煎至一椀去滓煮麵糊圓如梧桐子每服五十丸食後米飲下

(五十七) **三稜丸** 治心腹堅脹脇下緊硬胃中痞塞喘滿短氣常服順氣寬中消積滯除膨脹

京三稜生細剉半斤搗為末以醋熬成膏 青皮去白羅蔔子炒 神麯炒各二兩 麥蘗炒三兩 肉豆蔻去殼 杏仁湯去皮尖炒各三兩 砂仁一兩乾漆炒

右為末以三稜膏丸如梧桐子每服二十丸食後溫米飲下

(五十八) 治氣鼓脇下痛引及背

青皮去白 川練子巴炒去巴 三稜煨 莪术煨

木通去巴炒 陳皮 甘草 檳榔各等分

右㕮咀每服四錢水一盞橘皮橘葉同煎溫服

(通治) (五十九) **赤茯苓丸** 治脾濕大過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤澁

赤茯苓乙兩 木香半兩 檳榔 防己二兩 蘇四兩

右為細末棗肉為丸桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下

(六十) **大正元散** 治脾胃怯弱為風寒濕氣所傷遂致心腹脹滿有妨飲食

厚朴姜炒 藿香葉 半夏湯泡七次 陳皮 乾薑炮

白术各一兩 甘草炙 檳榔 柱枝不見火 枳殼去瓤各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚煎七分溫服

(六十一) **桃溪氣實圓** 治腰脇俱病如抱一甕肌膚堅硬按之如鼓兩脚腫滿曲膝仰卧不能屈伸自頭至顏中瘡瘦露骨一切氣積食積并脚氣走注大便秘結寒熱往來狀如傷寒並宜服之

黑牽牛二兩大黃一兩半 檳榔 青皮去白各一兩 木香

羌活 川芎 陳皮 茴香炒 當歸各半兩

右為末用皂角膏圓如梧桐子每服一百圓生姜灯心湯下

(六十二) **木香流氣飲** 治諸氣痞帶不通腰內脹滿

(六十三) **經驗調氣方** 治証同上並見氣門皆能通胃膈膨脹

積聚

五積六聚者五臟六腑之有所積聚也其為病諸書所載皆以內為喜怒憂思七情之氣尅制五臟結而不散乃成積聚之證故憂傷肺者以所勝傳之肝遇憂則脾土旺傳尅不行故成肝積名曰肥氣其狀在左脇下大如覆杯似有頭足診其脉弦而細其色青兩脇下痛引小腹男子為積疝女子為瘕聚失志傷肝者以所勝傳心遇秋則金肺旺傳尅不行故成心積名曰伏梁其狀起於臍下大如臂猶梁之橫架於胷臆間診其脉沉細而乳其色赤腹熱心煩面赤咽乾令人食少羸瘦甚則吐血怒傷肝者以所勝傳脾遇冬則腎水旺傳尅不行故成脾積名曰痞氣其狀見於胃脘大如覆杯痞塞不通診其脉浮大而長其色黃遇飢則痛遇飽則見腹常滿而足腫兼以嘔泄久則肉削

令人四肢不收喜傷心者以所勝傳肺遇春則肝木旺傳尅不行故成肺積名曰息賁其狀覆在右脇下大如杯狀喘息奔豚診其脉浮而毛其色白氣逆背痛目喜閉而膚寒皮中時痛如刺或如風緣思傷脾者以所勝傳腎遇夏則心火旺傳尅不行故成腎積名曰奔豚其狀發於小腹或湊心下上下無時有若奔走之狀診其脉沉而急其色黑飢則見飽則減小腹裏急腰痛骨冷眼昏口乾久則令人骨痿少氣至如六聚之在六腑其痛上下亦無常必在上則格在下則脹旁攻兩脇如有坏塊易於轉動此其與五積為異耳雖曰氣之積聚而成此證余忖度之必是因氣結聚痰飲或是積聚之物而後能堅硬如此發萌見形於皮膚之下藥入腸胃重墜積聚之脉實強者生沉小者死

(心積)(六十四)伏梁圓 治心積起於臍上至心大如臂久不已病煩身體髀股皆腫環臍而痛其脉沉而乳

茯苓　厚朴　人參　枳殼去穰麩炒
白朮　半夏湯洗　三稜　煨各等分

右爲末煮麪糊圓如梧桐子米飲下二十圓作散酒調亦可

(六十五)溫白圓 治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀心脇脹滿如有所礙十種水腫八種痞塞翻胃吐逆並皆治之

川烏炮去皮臍二兩半　皂莢去皮炙半兩　巴豆去皮心膜出油炒　厚朴去皮姜製
呉茱萸湯洗炒　茯苓去皮　人參去芦　桔梗
柴胡去芦　乾薑炮　肉桂去皮　蜀椒去目及閉口炒出汗　黄連各半兩

右爲末入巴豆令勻煉蜜圓如梧桐子每服五圓薑湯下

(肝積)(六十六)肥氣圓 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉狀久不已發咳逆嘔其脉弦而細

當歸頭　蒼朮各一兩半　青皮炒一兩　蛇含石煅醋淬三分
茯苓　三稜　鐵粉各三兩　与三稜茯苓入醋煮一伏時久

右爲末煮米糊圓如梧子每服四十圓當歸浸酒下

(脾積)(六十七)痞氣圓 治脾積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢不收黄瘅飲食不爲肌膚心痛徹背背痛徹心其脉浮大而長

大烏頭一分炮去皮尖　附子半兩炮　赤石脂煅醋淬
川椒炒出汗乾薑炮各二兩　桂心半兩

右爲末蜜圓如梧桐子朱砂爲衣每服十圓米湯下

(六十八)家藏方木香檳榔圓 治脾積氣塊腹脇走痛口吐清水

木香一兩　檳榔七枚
肉豆蔻五枚　胡椒四十九粒炒

右爲末次入研砂和勻煉蜜圓如梧桐子每服七圓橘皮湯下

(六十九)五香連翹圓 治物所傷脾胃久積成癖方見氣門

乾漆炒令烟盡　肉桂去皮一兩
肉桂　乳香研各半兩別研

(七十)勝紅圓 治脾積氣滯留膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積婦人脾血積氣小兒食積並皆治之

陳皮 青皮 三稜 莪朮 二味同用醋煮乾薑炮 良薑各一兩 香附子炒去毛二兩

右為末醋糊圓如梧桐子每服三十圓姜湯下

(七十一)息賁湯 治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病洒洒寒熱氣逆喘咳發為肺癰其脉浮而毛

半夏湯洗七次 吳茱萸湯洗 桂心 人參 甘草炙 桑白皮炙 薤白各二兩半

右㕮咀每服四分水盞半煎七分食前服

(七十二)奔豚湯 治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨痿少氣其脉沉而滑

甘李根皮焙乾 乾葛各一兩一分 當歸 川芎 白芍藥 甘草炙 黃芩各二兩半 夏湯洗十次四兩

右㕮咀每服四分水盞半煎七分服

(七十三)散聚湯 治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺腰脇小腹脹大小便不利

半夏湯洗七次 檳榔 當歸各三分 陳皮去白 杏仁去皮尖麩炒 桂心各二兩 茯苓 甘草炙 附子炮去皮臍 川芎 枳殼去瓤麩炒厚朴姜製 吳茱萸湯泡洗各一兩

右㕮咀每服四分水一盞煎服大便不利加大黃

(七十四)大七氣湯 治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疼痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

桔梗去芦 肉桂不見火 藿香葉洛半 甘草炙 蓬朮 香附子炒去毛 青皮各一兩

右㕮咀每服五分水二盞煎一盞去滓食前温服

（痃癖）（七十五）磨積圓 治腸胃虛冷氣癖於肓膜之外流于兩脇氣逆喘急久敗榮衛凝滯潰為癰膿多致不救

胡椒 一百五十粒　木香 不見火二分半　全蝎 去毒十个

右為末粟米飲為圓如豌豆大每服二十圓橘皮湯下

（通治）（消飲丸）治一切積聚痃癖氣塊及大小結胸痛不能俯按

天南星 半夏　芫花 自然銅 各等分生用

右為末醋煮麪糊為丸如桐子每服五七丸食前溫水下

（七十七）姜合圓 療中脘積聚痰氣胷膈結痞方見翻胃門

（七十八）砺砂圓 治一切積聚痰飲心脇引痛

砺砂　京三稜 別末　乾漆 各一兩　木香

巴豆 去油各 大黃 別末　乾薑 各一个

青皮　胡椒各一分　檳榔

右為末醋二升煮巴豆五七沸後下三稜大黃末同煎三

五沸入砺砂同煎成膏却入別藥和勻杵圓如豌豆大每服

五圓姜湯下

（七十九）枳殼散 治五種積氣三焦痞塞胷膈痞悶嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中除痃癖消積聚

枳殼　京三稜　陳皮　益智仁　莪朮

檳榔　肉桂各一双　乾姜　厚朴　青皮

肉豆蔻　甘草　木香各半双

右㕮咀每服三分水一盞姜棗同煎七分熱服不拘時

（八十）香稜丸 治一切積聚破痰癖消癥塊

蓬朮 細剉一兩用去殼巴豆三十粒同炒巴豆令黃色去巴不用　青皮 去白　丁香

京三稜 酒浸一夕　川練子 炒　茴香 炒

右為末醋煮麪糊圓如梧桐子以朱砂為衣每服三十圓姜

薑湯下溫酒亦可不拘時

(八十二) 妙應丸 治老人一切虛冷痰癖積塊攻脹疼痛

黑附子一枚各七分重去皮臍劉仚鑵子
硇砂三分用水一盞化在盆中火上熬干研
木香不見火七分半碎故紙炒 蕳撥各一兩

右將飛過硇砂末分在附子薑內却用所剜附子末蓋口以水和白麪裹約半指厚慢火內煨令黃熟去麪同木香等為末却將元裹附子熟黃麪為末醋調煮粥圓如菉豆大每服二十圓食後生姜湯下

(八十三) 積氣丸 治陰陽不和藏府虛弱冷之氣留滯於內使氣積不散胸脇支滿食即氣噎心腹膨脹氣刺氣急宿食不化心腹引痛噎氣吞酸停飲浸漬惡心嘔逆癖塊疼痛藏府不調飲食不進往來寒熱漸覺瘦弱

巴豆一百箇去皮心膜出油取霜三分 桃仁去皮尖炒另研一分半
附子炮去皮臍 乾漆炒焦
三稜煨 肉桂 硇砂 麝香另研各二分半
米醋五升以硇砂大黃同用慢火熬成膏
朱砂

右為末以醋膏為丸梧子大每服十丸炒生姜湯溫下或木香湯亦得食後臨卧服量虛實加減丸數忌生冷

名方類證醫書大全卷十五

宿食

人之有身藉五穀以生故胃以納之脾以尅化之脾胃喜暖不宜以生冷傷之躰虛者不善調養飢飽失時或過食飲食并一切生冷之物脾胃怯弱不能尅化停畜胃脘遂成宿滯輕則吞酸嘔惡噫氣痞悶噫噫或泄或利其臭如抱壞雞子或米穀不化甚則積聚結而爲癥瘕之病治之須窮其原又須量人氣躰虛實病證淺深投以藥餌病之淺者則消化之甚者必須推利而後調補脾胃或有因挾寒暑之氣而泄者又當以脉證辨而料理

(一) 丁香脾積圓 治食積心腹膨脹不得尅化方載諸氣門

(二) 感應圓 治男子婦人小兒停積宿食冷物不能尅化有

傷脾胃或泄瀉臭如抱壞雞子或下利膿血並宜服此通利

百草霜 用村家鍋底上者細研二兩　杏仁 去皮尖取仁要肥者一百四十枚

巴豆 七十粒去皮心膜研如粉　肉豆蔻 去皮二十個

南木香 去芦二兩半　乾姜 炮一兩半　丁香一兩半

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味杵爲細末与前三味同拌研令細用蠟匱先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾滓更以好酒一升於銀石器內煮蠟鎔滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用凡春夏修合用清油一兩秋冬用清油一兩半於銚內熬令香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末成劑分作小錠子以油單紙裹之旋圓服餌每服三十圓空心姜湯下

(三) 紅圓子 壯脾胃消宿食去膨脹方見脾胃門

(四) 五百圓 治宿食留飲積聚中脘噎臭吞酸心腹刺痛

巴豆去皮心膜別研縮砂仁　胡椒　烏梅去核丁香

右件各一百箇爲細末炊餅糊爲圓如菉豆大每服五七圓熟水臨卧送下

(五) 黑圓子 治中脘有宿食不消吞酸惡心口吐清水或心腹刺痛飧泄如痢

烏梅肉七个百草霜三分杏仁去皮尖別研三七枚

巴豆去殼并油三枚半夏湯洗七次九枚縮砂仁三七枚

右爲末和勻煮麪糊圓如黍米大每服二十圓姜湯下

(六) 如意圓 治氣虛積冷停食不消心下堅痞噫宿腐氣及霍乱吐瀉米穀不消一切食癥之疾並皆治之

枳殼去白 檳榔　陳皮　乾姜　黃連去須 蓬术

三棱　半夏湯洗七次各二兩　巴豆三七粒連殼用同前藥醋煮

右除巴豆外剉如豆大用好醋煮乾去巴豆余藥焙爲細末

薄糊圓如菉豆大每服十圓加至十五圓用荼清姜湯任下食後温服孕婦不宜服之

（七）阿魏圓治脾胃怯弱過食肉麪生菓之物停滯中焦不能尅化以致腹脹刺痛嘔惡不食或利或秘悉皆主之

阿魏酒浸化宮桂不見火逢木炒　麥蘗炒
神麯炒　青皮去白　蘿蔔子炒　白朮
乾姜炮各半兩　百草霜三分　巴豆去殼油三七个

右為末和勻用薄糊圓如菉豆大每服二十圓不拘時姜湯送下麪傷用麪湯下生菓湯用麪蘇香湯下

（八）混元鄧山房神效感圓常服消宿食除積滯不動臟腑

黑角沉不見火　木香　檀香　全丁香　陳皮
青皮　黃連　砂仁　香附子去黑毛見白
半夏水浸去面衣　二棱炮煨　蓬朮十分大者温紙裹煨

已上藥各一兩淨研為細末肥烏梅有肉者一百文重巴豆三百粒搥出油去皮膜心右用薑湯一隻盛巴豆上以烏梅肉蓋之却用陳米醋浸過令極爛次用糯米粽和前件諸藥搜勻搗千百杵以黑色為度丸如菉豆大每服一十圓宿食不消陳皮湯下氣滯前香湯下酒後嘔吐淡姜湯下

（九）丁香爛飯丸治食傷太陰又治卒心腎痛

丁香一分　丁香皮三分　益智仁三分
縮砂仁三分　炙甘草三分　茅松三分去土秤
香附子半兩　木香一分　京三棱炮一分　廣茂一分炮

右為細末湯浸餘餅為丸如菉豆大每服三十丸白湯送下或細嚼亦可不拘時候

(十) 消痞丸 治一切心下痞悶及積年久不愈初因食傷者

黃連去須毛炒六錢 黃芩刮黃色炒六錢 姜黃 白朮各一兩
人參四錢 甘草炙二錢 枳實縮砂仁二錢 麯炒黃色五錢
橘皮四錢 乾生姜二錢半 厚朴各三錢 神麯炒黃色各五錢

右為細末湯浸餘餅為丸如桐子大每服五七十丸至百丸
白湯送下食後

(十一) 木香枳术丸 治皮滯氣消飲食開胃進食

木香一錢 枳实炒三錢 白朮二錢

右為細末荷葉燒飯為丸如桐子大五十丸溫水送下

(十二) 三淡湯 治胃中痞塞喘滿氣短常服順氣寬中消積
滯方見脹滿門

(十三) 橘术湯 治宿食不消方見脹滿門

自汗

心之所藏在內者為血發於外者為汗蓋汗乃心之液而自汗之證未有不由心腎俱虛而得之者故陰虛陽必湊發熱而自汗陽虛陰必乘發厥而自汗此固陰陽偏勝所致又有傷風中暑病濕兼以驚怖房室勞極壁虛腸胃癆飲產蓐等病亦能令人自汗如睡中不覺汗出者是名盜汗亦心虛所致其脉多微而濇濡而虛治之宜斂心氣益腎水使陰陽調和水火升降其汗自止自汗之證若兼以他病又當各類求之

傷風 (十四) 桂枝湯 治傷風脉浮自汗惡風方見傷寒門

風濕 (十五) 术附湯 治風濕相搏不嘔不渴時或自汗方見濕門

(十六) 防己黃耆湯 治風濕相搏時自汗出或身熱或無熱

〔滑虛〕〔牡蛎散〕治諸虛不足及大病後体虛津液不固体常自汗
黄耆去苗土 麻黄根淨洗 牡蛎炒粉米泔浸去土火煅通赤各一分
右㕮咀每服三分水一盞小麥百餘粒同煎八分不拘時服
〔十八〕〔黄耆建中湯〕男子婦人血氣不足常自汗方見諸虛門
〔十九〕〔黄耆湯〕治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自
汗或盜汗不止並宜服之
黄耆去芦蜜炙 白茯苓去皮熟地黄酒蒸 肉桂不見火
天門冬去心 麻黄根 左骨各一分 五味子
小麥炒 防風去芦 當歸酒浸 甘草炙各半分
右㕮咀每服四分水一盞薑五片煎七分温服不拘時發厥
自汗加熟附子發熱自汗加石斛
〔二十〕〔抚芎湯〕治自汗頭眩腐逆惡心
撫芎 白朮去油 麻黄根炒 橘紅各一分 甘草炙半分

右㕮咀每服四分水一盞薑七片煎至八分温服
〔盜汗〕〔二十一〕〔麥煎散〕治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼肌肉消瘦
知母 石膏 甘草炙 滑石 白茯苓各半兩 人參
右為末每服一分淨湯調服
〔二十二〕〔防風散〕治盜汗
川芎一分 人參半分 防風二分
右為末每服一錢臨卧米飲調下
〔二十三〕〔白朮散〕治盜汗極效
白朮不拘多少用浮麥一升水一斗煮乾如白朮尚硬又用
水一二升煮取出切作片焙乾去麥不用研為末別用浮麥
湯每服一二錢不以時
〔二十四〕〔茯苓湯〕治虛汗盜汗

白茯苓為末煎烏梅陳皮湯調下二錢服神効

(二十五)大建中湯治虛熱盜汗百節痛肢不舉後口苦吞酸氣短

黃芪炙　遠志甘草者　當歸　澤瀉各三兩

白芍藥　龍骨　人參各二兩　甘草炙一兩

右剉散每四錢水一盞棗五片煎溫服一方有桂枝

(二十六)三建湯治真氣不足上盛下虛面赤自汗小便頻數

方載諸虛門　如汗不收加肉桂黃耆

虛脫

(二十六)耆附湯治氣虛陽弱虛汗不止肢体倦怠

黃耆去芦蜜炙　附子炮去皮臍各等分

右㕮咀每服四錢水一盞棗十片煎八分食前溫服

(二十七)正元散治下元氣虛心腹脹滿夜嘗自汗方載諸虛門

通治

(二十九)溫粉止汗

右用川芎白芷等本各一分為末入米粉三分以帛包撲周身則汗止

(三十)紅粉止汗

麻黃根　牡蠣火煅各一兩　赤石脂　龍骨各半兩

右為末以絹袋盛如撲粉用

虛煩

虛煩之疾非止一端兒其大槩多是体虛者攝養有乖榮衛不調使陰陽二氣有所偏勝或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒此固不易之論而今虛煩之病多是陰虛生內熱所致如虛勞之人腎水有虧心火內炎其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後虛煩之證却无霍亂臨病之際又宜審之治法宜用以平和之藥清心實下未可峻用補藥又若婦人產後去

血過多虛煩發熱又當各以類求

〔病後〕〔三十一〕竹葉石膏湯　治大病後表裏俱虛內无津液煩渴心躁及諸虛煩熱与傷寒相似但不惡寒身不疼痛不可汗下宜服之　方見傷寒門

〔三十二〕溫膽湯　治大病後虛煩不得睡臥及心膽虛怯觸事易驚短氣悸之或復白汗並宜服之

橘紅一兩半　茯苓三分半　夏湯洗七次　枳實炮洗炒各一兩　甘草炙　茯苓三分半　夏湯洗七次　枳實炮洗炒各一兩　甘草炙各半兩　竹茹一塊如杏大

右㕮咀每服四分水一盞半薑七片棗一枚竹茹一塊如杏大煎至六分空心熱服

〔三十三〕人參竹葉湯　治汗下後表裏虛煩不可攻者

竹葉二把　人參　甘草炙各二兩　半夏二兩半　石膏　麥門冬各五兩

右㕮咀每服四分水盞半薑五片粳米一撮煎熱去滓空心

服濟生方除石膏加茯苓小麥二味

〔三十四〕橘皮湯　治動氣在下不可發汗發之反无汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食返嘔逆穀不得入宜服此藥

橘皮二兩半　甘草炙半兩　人參一分　竹茹半兩

右㕮咀每服四分水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服活人書加生姜一兩棗子八枚作六味

〔三十五〕地仙散　治大病後煩熱不安及一切虛勞煩熱並宜服之

地骨皮去木二兩　防風去苗一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘時又方加人參雞蘇各半兩

〔心氣虛〕〔三十六〕小草湯　治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草　黃耆去芦　當歸去芦酒浸　麥門冬去心　石斛去根　酸棗仁炒去殼各二兩　人參　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎八分温服不拘時

(三十七) 辰砂妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩方見心痛門

(胃熱) (三十八) 人參竹茹湯 治胃口有熱嘔吐咳逆虛煩不安

人參半兩 半夏一兩 竹茹一團 一方加橘紅一兩

右作六服用水一盞半姜七片竹茹一團煎温服

健忘

健忘者陡然而忘其返也雖曰此證皆由憂思過度損其心胞以致神舍不清遇事多忘忽然過思傷脾亦能令人健忘治之須兼理心脾神凝意定其証自除

(三十九) 安志湯 治心神恍惚多忘常服安神定志

(四十) 定志圓 治心氣不定恍惚健忘

遠志去苗心 人參去蘆 茯苓 菖蒲 二兩 白茯苓去皮 三兩

右為末煉蜜圓如梧桐子以朱砂為衣每服二十圓米飲下

(四十一) 壽星圓 治因事驚心神不守舍以致事多健忘或痰迷心竅妄語如有所見

天南星一斤先用炭火三十斤燒一地坑通紅去炭以酒五升傾坑內候滲酒盡下南星在坑內以盆覆坑周回用炭擁定勿令走氣吹日取出為末 朱砂別研一兩 琥珀別研一兩

右各研用生姜汁煮麪糊為圓如梧桐子每服三十圓加至五十圓煎石菖蒲人參湯食後送下

(四十二) 歸脾湯 治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

茯神去木 黃耆去蘆 龍眼肉 酸棗仁炒去殼 各一兩 白朮 人參 木香不見火各半兩 甘草炙二分半

右㕮咀每服四分水一盞姜五片棗一枚同煎温服不拘時

(四十三) 朱雀圓 治心神不定事多健忘心火不降腎水不外

茯神二兩去皮 沉香半兩並為細末

右煉蜜圓如小豆大每服三十圓食後人參湯下

癲癎

癲癎之疾諸方所載並作一證治之愚謂癲與癎難以一槩而論故癲者全歸於心癎者歸乎五臟所謂癲者神不守舍狂言妄語如有所見動經年歲不得即愈若心經有損是為真病如心經蓄熱則當清心除熱如痰迷心竅使然又當下痰而寧其心志婦人因血氣迷心或因產後惡露上衝而語言錯亂神志不守者各當隨其証治所謂五癎者馬癎羊癎雞癎猪癎牛癎是也其為証也卒然之際強直口吐涎沫食頃乃甦原其所因五臟之間或為七情之氣鬱結或為六淫之邪氣所傷閉塞諸經一時痰涎壅併心膈致有此證馬癎作馬嘶者應乎心羊癎作羊叫者應乎脾雞癎作雞吉者應乎胃猪癎作猪叫者應乎腎牛癎作牛吼者應乎肺此又以五行合五臟而言須詳考其因施以治法大抵當以祛痰順氣為先然後辨其有無風寒暑濕之氣方可補其五臟又有在母腹中受驚及幼小時有所感觸而成此證又當辨之

癲狂

四十四 **生黃清心圓** 治心氣不足神志不定驚恐悸怔煩少睡常發狂癲言語錯亂方載中風門

四十五 **歸神圓** 治心氣不足作事多忘癲癎亂語並皆治之方載心痛門

四十六 **金箔圓** 治痰迷心竅恍惚悒狂言婦人痰血上衝或歌或笑言語狂亂並皆治之

生乾地黃焙 貝母去心麩炒各一兩 巴豆去心膜醋煮三十沸焙干取一兩過其數无力

黃連洗焙 桔梗去芦 柴胡去芦 呉茱萸湯洗七次 防風去芦

紫菀去苗 菖蒲米泔浸 乾姜炮 白茯苓去皮 蜀椒出汗

厚朴去皮　枳殼去白　鱉甲米醋炙黃　人參去芦　甘草炙
甘松淨洗各一兩　草烏頭二枚炮用　芎藭忌見火　一方用甘遂
右為末以麪糊圓如梧桐子每服五圓心中痰患姜湯下心
痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯下頭痛石膏湯葱茶下一切脾
氣橘皮湯下水瀉氣瀉陳皮湯下赤白痢甘草乾姜湯下胃
脘噎悶通草湯下婦人血氣當歸酒下血氣嵐氣小腸氣及
下墜附子湯下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸結氣痞塞鶴
膝並用塩湯塩酒下

(四十七) **抱腰丸** 治男子婦人一切癲癎風狂或因驚恐沸畏所致
者及婦人産後血虛驚氣入心并室女經脉通行驚邪蘊結
水銀二兩　朱砂一兩　黑鉛一兩半　乳香一兩
右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下朱砂滴乳捵熱
用木柳捵研勻丸如雞頭大每服一丸空心井花水吞下病

者得睡切莫驚動竟来即安丹一丸可除根

(四十八) **贊金散** 治顛狂可畏多因驚恐得之涎留心竅經年不愈
欝金七兩真西川来者㕮粉炒　明礬三兩
右為末糊丸梧子大每服五十丸湯水下初服堯心胷間有
物脫去神氣洒然再服稍甦多服大能去痰安平必矣

(四十九) **風癎** **碧霞丹** 治痰涎雍塞牙関緊急目精上視時作搐
搦并五種癎疾並皆治之
石緑細研九渡飛過十兩　附子尖七十个　烏頭尖七十个　蝎梢七十个
右為末入石緑令勻麪糊圓如雞頭大每服用薄荷汁半盞
化下一圓更以酒半合温服之須臾吐出痰涎然後隨證治
之如牙関緊急幹開灌之

(五十) **六珍丹** 治風癎卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫猪
嗥等声腑臟相引氣爭制挙縱吐沫流涎久而方蘇

通明雄黃　葉子雌黃　末鑽真珠各一兩
鉛二兩熬成屑　丹砂半兩　水銀一兩半
右為末研令極細蜜和杵二三万下方圓如梧桐子每服五
圓姜棗湯吞下

五十一　家藏方五癇丸　治顛癇發作不問久年新日並宜服之
全蝎一分去毒炒　半夏二兩湯洗七次　雄黃一分半別研　蜈蚣半条去頭足炙
天南星炮一兩　烏蛇一兩酒浸一夕去皮骨焙干　麝香二分別研　白礬一兩
白附子半兩炮　皂角四兩椎碎水半升將汁与白礬一同熬干研
白姜蚕一兩半炒去絲　朱砂一分別研
右為末姜汁煮麥糊圓如梧桐子每服三十圓姜湯下

五十二　家藏方虎睛丸　治癇疾發作涎潮搐掣精神恍惚时作譫語
犀角屑　虎睛一對微炒大黃　遠志去心　梔子仁各一兩
右為末煉蜜圓如彔豆大朱砂為衣每服十五圓食後
生川烏去皮半夏　姜蚕三味不炒對碎生姜汁
全蝎去毒十个　鉄粉三分　甘遂二分半
右為末姜汁打糊圓如彔豆大朱砂為衣每服十五圓食後
用姜湯下忌甘草

五十三　控涎丹　治諸癇久不愈者頑涎結聚変生諸證並宜治之
無灰酒一椀　真麻油四兩
右和勻用楊柳枝二十條逐條撚一二百下撚遍柳條候油
酒相入如膏煎至七分碗狂者強灌之令熟睡或吐或不吐
衾来即安

五十四　心恙　二神散　治心恙

五十五　總珠丸
大猪心一枚取血　朱砂一兩末　青靛花一匙
右先将靛花同猪心血一処同研次以朱砂末共丸梧子大

每服二十九茶酒下甚者不過三服

五十六 **神佩合丹** 治心風大効方見心痛門

陰癪

陰癪之證其種有四一曰腸癪二曰氣癪三曰外腎浮脹四曰水癪是也究其所因皆是腎經虛冷或為勞役所傷或為風濕之氣所侵結而不散久則腎氣虛憊而成此證外腎腫脹者偏有小大或堅硬如石或腫或腹絞痛甚則膚裏腫脹成瘡時出黃水病而至此未易治也腸癪亦然惟氣癪水癪閃元灸之可愈又有小兒自生以來外腎偏墜者此又宿疾不必醫療可也

五十七 **茱萸內消圓** 治腎虛為邪氣所搏結成冷疝伏留不去陰囊偏墜痛連膀胱小腸氣刺奔豚痰癖疼不可忍者並皆治之方載諸氣門

五十八 **麝香大戟圓** 治陰癪腫脹并小腸氣

葫芦巴酥炒 四 大戟去皮酥炒 麝香別研 狐川練子 茴香 舶上者各六 木香 附子炮去皮尖 訶子炮去核酒浸蒸焙 檳榔刮去皮細切不見火各乃

右為末獨留川練子以好酒二升煮令七枚長四寸煮川練子去核取肉和藥杵圓如梧桐子空心姜酒下十圓

五十九 **橘核圓** 治四種癪病并核腫脹有小大或堅硬如石痛引腎腹甚則膚裏腫脹成瘡時出黃水或成瘺潰爛

橘核炒 海藻 昆布 海帶各洗

川練子炒取肉 桃仁麩炒各厚朴去皮姜炒 木通

枳實麩炒 玄胡索炒去皮 桂心不見火 木香不見火各半兩

右為末酒糊圓如梧桐子每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下虛冷甚者加熟川烏一兩堅脹久不消者加硇砂二豕醋煮旋入

六十 **牡丹散** 治小兒外腎偏墜

防風去芦　牡丹皮去木各等分

右為末每服二錢温酒調服如不飲酒塩湯點亦可

(六十一) **竹皮湯** 療交接勞後陰囊腫脹痛入腹中刮竹青皮一升以水三升煮一半去滓分服立愈

(六十二) **三茱丸** 治小腸氣并外腎腫痛方見氣門

疝冷

人之一身貴乎陰陽升降平和無偏若有偏勝是即為病疝冷之證皆以人身眞陽耗散脾胃虛弱加以飡啖冷物有傷其脾腎疝結其冷於臟府不散以致手足厥逆畏冷增寒飲食不化嘔吐涎沫或大腑洞泄或小便頻數其為証也尤多治之須暖下元兼理脾胃若又有脾虛而畏寒者令人咳嗽又當於咳嗽門求之

(六十三) **薑附湯** 治一切沉寒疝冷諸証方載中寒門

(六十四) **沉香蠲澄茄散** 治內挾積冷臍腹弦急痛引腰背面色萎黃臟府自利小便滑數小腸一切氣痛並治之

附子炮去臍皮　蠲澄茄　沉香　胡芦巴炒　肉桂去皮

補骨脂炒　茴香炒　巴戟天去心　木香

川楝子炮去核各四兩

右㕮咀每服三錢水一盞入塩少許煎八分空心熱服

(六十五) **三建湯** 除疝冷扶元氣方載自汗門

(六十六) **洞陽丹** 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰証悉皆治之

附子炮去臍　鍾乳粉　硇砂火煅　朱砂火煅別研各一兩

右為末酒煮神麯糊圓如梧桐子每服五十丸空心塩湯下

(六十七) 椒附圓 治內挾積冷臍腰弦急痛引腰背時有盜汗小便滑數心腹脹滿方見諸虛門

(六十八) 附子圓香散 治氣虛積冷心腹絞痛

肉豆蔻 煨 茴香 炒　白木 炒　木香　人參　白茯苓
乾姜 炮 各一兩　附子 大者一枚去皮臍 丁香　甘草 炙 各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞鹽少許煎七分空心服

(六十九) 紫沉煎圓 治虛寒積冷伏滯陰氣心腹膨脹兩脇疼痛

巴豆霜 一分酒半外先煮去石入巴豆酒內煮令黃熟成膏入參　丁香
硇砂 各一兩酒半外者一處煮成膏 木香 不見火 官桂 不見火 各一兩 乾姜 三分
阿魏 酒半外研化尽入七酒 檳榔 碎酒半外煮令黃熟去石入巴豆酒內煮令黃熟成膏入參　丁香
良姜 一兩水煮六七沸日乾 沉香 一兩使煉蜜 朱砂 半兩別研 木香 不見火 一兩
右為末次入硫黃朱砂二味研勻入前膏於臼內杵三千下圓如梧桐子每服三十丸陳皮湯下

(七十) 雄朱丹 治宿冷痼冷飲食嘔逆久則羸弱變為痨瘵

朱砂　雄黃 各二兩

以上用沙合一个先以牡丹皮二兩內外熏黃入藥於內以醋和麪茶作餅盖定合口以赤石脂固濟合縫又用赤石脂泥裹合子一重再用黃泥帝筋又裹一重先以草火燒令乾次以炭火五斤漸漸添至一秤候火力稍消取出掘地坑一尺埋一宿去火毒取出研入後藥

附子 炮製為末　胡椒　赤石脂　官桂　丁香
薑椒　木香　沉香　白朮 各一兩　乳香 半兩 与前同研

右為末入前藥研勻以清酒二升三分煮去二分入附子末煮糊圓如梧桐子每服十元空心溫酒鹽湯任下

積熱

積熱者挾毒蘊積於其內也夫人固有体氣素實一時感觸熱毒之氣或鬱積臟腑之間或在心肺之內令人口苦咽乾涎唾稠粘眼澁多淚口舌生瘡大小便秘結又有陰盛血衰二焦已燥服餌酒炙之物并丹石之藥愈助其熱結滯於內亦能令人變生諸証治之須詳其脉證若在心膈者清之結于臟腑者蕩滌之更量人氣体虛實輕重用藥

心熱 (七十二) 洗心散 治風壅痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小便赤澁

白朮一兩半 麻黃和節 當歸去苗洗 荊芥穗
芍藥 甘草炙 大黃面裹煨去面切焙各八兩

右為末每服二錢水一盞生姜薄荷各少許同煎溫服

(七十三) 八正散 治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥煩悶方載五淋門

(七十三) 碧雪 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒消 青黛 寒水石 石膏 煅各研
朴消 甘草 滑石 馬牙硝 各等分

右將甘草湯入諸藥再煎用柳木篦不住手攪令消溶入青黛和勻傾砂盆內候冷結凝成霜研為末每用少許含化嚥津如喉閉不能嚥下用行筒吹藥入喉中

肝熱 (七十四) 消毒犀角飲 治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮項結核遍生瘡癤已出未出並宜服之

犀角 荊芥穗 防風去苗 鼠粘子炒 各十兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

胃熱 (七十五) 龍腦雄蘇飲 治煩渴涼上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽吐血鼻衄吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膿疸口苦並宜服之

柴胡銀州者二兩和木通以湯半升浸一二宿取汁後入膏
生乾地黃六兩末　黃耆生去芦一兩　麥門冬去心四兩
阿膠炒　蒲黃炒各二兩　甘草炙二兩半　人參去芦二兩
木通二兩同柴胡浸　雞子黃一枚即薄荷

右除別研藥外並搗為末將好蜜二斤先煉一二沸然後下生乾地黃末不住手攪令勻取木通柴胡汁慢火熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為丸如梧桐子大每服二十丸嚼破熟水下虛寒煩熱消渴驚悸人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血衄門冬煎湯下惟諸淋用車前子煎湯下

七十六　甘露飲　治胃中客熱牙宣齦腫咽膈乾燥吐氣腥臭或胃經受濕伏熱在裏身黃如疸亦能治之

甘草炙　枇杷葉淨去毛干熟地黃　枳殼麩炒　石斛去芦　甘
黃芩　麥門冬去心天門冬焙去心　生地黃　茵蔯各等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

肺熱　七十七　清肺湯　發明內治大腸燥結不通

升麻　當歸尾　生甘草　煨大黃　桃仁
麻黃　熟地黃各一錢

右件�mm如麻豆大都作一服水三盞先伴藥溫煎至一盞熱服食前以通利為度

腎熱　七十八　滋腎丸　發明內治不渴小便閉邪熱在血分也

黃蘗三兩細㕮咀酒拌陰干　知母二兩酒浸陰干　肉桂一錢半

右上二味氣俱陰以同腎氣故能補而瀉下焦火也桂為火邪同体故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熱水為丸百沸湯下

風熱　七十九　荊黃湯　治風熱結滯或生瘡癤

荊芥四兩　大黃一兩

右咬咀每服三匁水一盞煎六分空心服

(八十) **涼膈散** 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利一切風熱並皆治之

連翹二斤半甘草炙　川大黃　朴消各二十兩

薄荷葉去梗　黃芩　山梔子仁各十兩

右咬咀每服三匁水一盞入竹葉七片蜜少許同煎食後服

(八十一) **清氣散** 治風痰壅滯延上膈煩熱

枳殼　川芎　柴胡　前胡　茯苓　甘草

獨活　羌活　青皮　白木　人參各等分

右為末每服二匁水一盞煎七分服

(八十二) **神芎圓** 治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癤咽膈不利大小便閉澁一切風熱之證並宜服之

大黃生　黃芩各二兩　牽牛生　滑石各四兩

黃連　薄荷葉

右為末滴水圓如梧桐子每服五十丸溫水食後下

(通治) (八十三) **三黃丸** 治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤澁大便秘結並宜服之

黃連去芦鬚　黃芩去芦　大黃煨各十兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服四十圓熟水吞下一方用腦麝為衣圓如大豆夜間啗化一兩圓亦好

(八十四) **龍腦飲** 治蘊積邪熱咽喉腫痛心煩鼻衄及痰熱咳嗽中暑煩燥傷寒餘毒發熱並宜服之

縮砂仁　茨蕎根各三兩　甘草炙　蜜炙十兩　藿香葉二兩　石膏四兩

右為末每服一匁用新水入蜜調下傷寒餘毒潮熱虛汗除

蜜入竹青煎服

(八十五) 薄荷煎 治口舌生瘡咽喉腫痛

薄荷一斤取頭未二兩半　縮砂仁半兩取未二分　腦子半分別研
川芎半兩取未二分　甘草半兩取未二分半

右為末入腦子和勻煉蜜成劑任意噙嚥和劑方無腦子有

(八十六) 酒蒸黃連丸 治腸熱解酒毒厚腸胃

黃連半斤淨用酒二升浸以瓦器盛上累蒸至爛取出曝干
桔梗

右為末滴水圓如梧桐子每服五十圓食前溫水吞下

(八十七) 玄明粉 以朴消煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用甕鐺子按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煆便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨睡斟量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下此藥大治邪熱所干腸上氣滯五臟秘澁此朴消本性寒燒過性溫無毒

(八十八) 三黃湯 治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃連去芦鬚　黃芩去芦　大黃煨各十兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心服

(八十九) 天王散 治臟腑積熱煩燥多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子去殼連翹各三分　甘草二分　麥門冬去心二分
雞冠雄黃半分　礬金用皂角水煮切片焙干三分

右為末每服一錢食後臨卧新汲水調服

名方類證醫書大全

十三 十四

十五

02
メ
1

48062

名方類證醫書大全卷十六

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

失血 附 吐血衄血咳血論

人身之血猶水行地中百川皆理則無缺決之患一身之間榮衛失調七情四氣相干氣血逆亂然後變生吐血咳血諸證夫血之妄行固由積熱所致然其證多端難以一槩而論有因飲食過飽負重傷胃而吐者有思慮傷心并積熱而吐血衄血者有勞傷心肺又為七情所干而咳血吐血者心主血肝藏之而脾為之統過思傷脾亦能令人吐血治之須究其因傷胃者調胃安血勞心者補益其心志熱則清之氣虛則順之傷脾則安之吐血之脉宜沉細不喜浮數吐而不咳者易治唾中帶紅線

百々後太郎寄贈

老難醫為其有所損故也病之淺者惟有早灸膏肓而已致若肺生疽瘡從高墜下一應傷折皆能吐血傷寒汗後不解欝結經絡隨氣湧泄吐血衄血又當從各類求之

吐血

(一) 茯苓補心湯 治心虛為邪氣所傷吐血方載心痛門

(二) 枇杷葉散 治暑毒攻心嘔吐鮮血方載中暑門

(三) 赤芍藥湯 治瘀血蓄胃心下脹滿食入即嘔名曰血嘔

赤芍藥二兩半 夏一兩半 陳皮一兩

右�once咀每服四錢水一盞姜七片煎七分温服不拘時

(四) 王醫師百葉散 治吐血便血

白芨半兩 真浦黃酥炙一甘草炙三分 地榆去芦一兩

右�once咀每服二錢温酒調服如氣壯人加石膏半兩

(五) 歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以此致妄行或吐血下血方載健志門

(六) 三黃丸 治積熱吐血咽膈不利方載積熱門

(七) 大劑散 治飲啖辛熟傷於肺經嘔吐出血名曰肺疸

大劑根洗 犀角鎊 杏仁去皮尖甘草炙半兩 桔梗炒一兩

浦黃炒

右�once咀每服四錢水一盞姜五片煎八分温服不拘時

(八) 加味理中湯 治飲酒傷胃遂成吐血

乾姜炮 人參 白朮各一兩 乾葛 甘草炙各半兩

右�once咀每服三錢水一盞煎七分温服不拘時

(九) 蓮心飲 治勞心吐血

右蓮子心五十箇糯米五十粒為末酒調服

咳血

(十) 薏苡仁散 治咳血咯血

右以薏苡仁一味為末用羊腎煮熟猪胰蘸末空腹食之

(十一) 還奇黃耆散 治咳血成勞肌體消瘦常服能解肌熱

黃耆蜜炙　麥門冬去心熟地黃　桔梗炒
白芍藥酌一甘草炙一分
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎七分温服

十二 雞蘇散 治勞傷肺經唾內有血咽喉不利
雞蘇葉　黃耆去芦生地黃洗　阿膠蛤粉炒貝母去心
白茅根洛一桔梗去芦麥門冬去心蒲黃炒　甘草炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎七分温服不拘時

十三 是齋白术散 治積熱吐血咳血因飲食過度負重傷胃而吐血者最宜服之惟忌食熱麪煎煿一切發風之物
白术三兩人參去芦　白茯苓去皮　黃耆蜜浸各一兩
山藥　百合洗心各　甘草炙　前胡去芦　柴胡去芦各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎六分温服

衄血

十四 治鼻衄用局方四物湯加側柏葉煎服

十五 麝香散 治鼻衄不止
白礬枯過別研　白龍骨粉細末者別研　麝香別研半字
右三味拌和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然後吹藥於鼻中或以濕紙醮藥鼻內尤妙

十六 茜梅元 治衄血無時
茜草根　艾葉各一兩　烏梅肉焙干半兩
右為末煉蜜元如梧桐子每服三十圓烏梅湯下

十七 龍骨散 治鼻衄過多用龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中凡九竅出血皆可用此藥吹之一方用梔子如前法

十八 鵬砂散 治大人小兒喉閉生瘡風瘀熱毒鼻衄出血
山藥六斤生　腦子七兩別研　鵬砂二十兩生別研
右為末每服半錢如茶點服

(十九) 茜根散 治鼻衄不止

茜根 側柏葉 阿膠蛤粉炒 黃芩 生地黃酪一 甘草炙半 酌右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎八分溫服不拘時

(二十) 黃芩芍藥湯 治鼻衄

黃芩 芍藥 甘草各等分 右㕮咀每服三錢水一盞煎六分溫服

(二十一) 生地黃湯 治鼻衄昏迷不省

生地黃三五斤 如不服取汁使患者生嚥吸汁又以其沖壓鼻須臾血止取服汁尤佳

(二十二) 單方 治衄血不止又治吐血

雞冠擂汁入鹽服一盞立效或雞冠汁調汁滴入鼻中

(二十三) 川芎三黃散 治實熱衄血

大黃煨 川芎 黃連 黃芩各等分

右為末每服一錢食後井水調服

(二十四) 衄血方 十道

川犛金末水調下又治吐血○旱花煎湯通口服○烏賊魚骨椶花等分末吹鼻中○椶花半生半炒為末吹鼻中○人中白燒去穢為末入麝香少許吹鼻內或加油髮灰更妙○大蒜煨香取三瓣研傳脚底鼻中有蒜氣即去之○燒山梔子灰存性為末吹之○又方頭髮燒存性研末米湯調下仍吹少許入鼻

(二十五) 蘇子降氣湯 治虛壅鼻血方見氣門

(二十六) 又方 治衄血百治不止以蒲黃血竭為末吹之

(二十七) 四生圓 治衄血吐血九竅血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉 生艾葉 生柏葉 生地黃各等分 右爛研圓如雞子大每服一圓水二盞煎一盞濾過溫服

(二十八) **大阿膠圓** 治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血勞傷肺胃吐血嘔血並宜服之

麥門冬去心乾山藥 熟干地黃 五味子 杜仲去皮炒 遠志去心 甘參 防風去芦炙半兩 貝母炒 茯苓去皮 阿膠炒 茯神去木 百部根 栢子仁 人參去芦各一兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一元水一盞煎六分和滓服

(二十九) **龍腦雉蘇圓** 治膈熱咳嗽或吐血衄血並治之

(三十) **必勝散** 治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血並治之

小薊并根用 人參去芦 蒲黃炒 當歸去芦 熟乾地黃 川芎 烏梅去核各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

(三十一) **白及散** 治吐血衄血嘔血咯血嗽血

白及為末米飲調下一匕或并水調一匕用紙花貼鼻竅中

(三十二) **藕汁飲** 治吐血衄血不止

生藕汁 生地黃汁 大薊汁各三合 生蜜半斤

右件藥汁調和令勻每服一小盞不拘時

(三十三) **犀角地黃湯** 治傷寒汗下不解臂干經絡隨氣湧泄為衄血或清道閉塞流入胃脘吐出清血如鼻衄吐血不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角鎖 生地黃 白芍藥 牡丹皮去木各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分溫服如潮熱發狂加黃芩大黃腹滿脉大而遲只依本方不須加減

(三十四) **門冬飲** 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參五分 黃耆乙炙 五味子五个 甘草乙炙一 紫菀乙炙半 當歸身 麥門冬各五分

右㕮咀分作二服水煎食後

(三十五) 天門冬湯 治思慮傷心吐血衄血
遠志去心甘草水煮 白芍藥 天門冬 麥門冬各去心
薑煮去芦 藕節 阿膠蛤粉炒 當歸去芦 生地黃酪人參
右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎八分温服不拘時

(三十六) 天門冬元 治吐血咯血大能潤肺止嗽
天門冬一兩甘草 白茯苓
右為末煉蜜丸如梧桐子每服一元嚥津嗌化日夜可十元

(三十七) 黃芩芍藥湯 治虛家不能飲食衄血吐血嘔血
黃芩 白芍藥 甘草 阿膠炒杏仁炒貝母各五錢
右等分每服三錢水一盞薑三片煎温服

(三十八) 黑神散 治食飽低頭擲損吐血至多并血妄行口鼻中俱出但声未失皆效又治衄血不止

百草霜取村中燒草鍋底煤最妙為末每服一錢糯米飲調下鼻衄搐一字如皮破出血或灸瘡出血並摻上又治舌忽然腫破乾摻之

下血

人之滋養一身惟氣與血血為榮氣為衛榮行脉中衛行脉外故心主血肝藏之而脾為之統貴於氣順則血調若內因七情并酒食所傷外為四氣相干則血氣逆亂榮衛失度皆能令人下血若風入腸胃者其脉浮下血必在糞前是名近血停積于大腸者其脉沉滯血在糞後又名遠血臟寒者其脉沉微下血無痛積熱者其脉洪數純下鮮血甚則兼痛傷濕者脉沉而遲下血如豆汁又有因氣欝結酒色過度并過食炙膾因毒生蟲亦能令人下血又當以五臟所傷辨其證治風濕則祛之寒則

黑涼說

温之熱則清之停滯則疎滌之氣則調之有毒者解利之下血之證非止一端大槩血得熱而行遇黑而止用藥當審之

風熱 已上方載傷寒門

四十九 敗毒散 治風熱流入大腸經下血不止若因酒食毒加巴豆炒黄連去巴不用

槐花 炒 柏葉 燻幷焙 判并乔穗 枳殼 各等分

右為末每服二钱空心米飲調下

四十一 槐花散 治腸風臟毒下血

槐花 炒 柏葉 燻幷焙 判并乔穗 枳殼 各等分

右為末每服二钱空心米飲調下

四十二 黑玉丹 治腸風積熱下血不止

刺蝟皮 酥炙 六兩 猪懸蹄一百枚 剉 八兩 苦練根 五兩 雷丸 四兩

脂麻 四兩 槐角 六兩 乱髮 皂角水洗淨焙 八兩

牛角腮 酥炙 十二兩 剉

右剉碎用麪鏵內燒存性研為細末入乳香二兩麝香八分研和令勻用酒打麪糊丸如梧桐子每服二十粒先細嚼胡桃一枚空心以温酒吞下多進得效

四十二 地骨皮散 治腸風痔瘻下血不止

地骨皮 鳳眼根皮 並用懸崖中者好去土不用

右二味各等分同炒微黄色搗為細末每服二錢空心温酒調服忌油膩物食

四十三 槐角丸 治五種腸風下血痔瘻脫肛下血並宜服之

槐角 去枝梗炒 一兩 地榆 黄芩

當歸 去芦酒浸一宿焙干 防風 去芦 枳殼 去白麩炒 各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服三十丸空心米飲下

四十四 腸風黑散 治腸風下血或在糞前糞後並皆治之

荆芥 二兩燒乱髮 槐花 槐角 各一兩燒

枳殼 去白二兩燒一兩 甘草 炙 蝟皮 炒 各兩半

右將所燒藥同入鼈瓶內黄泥固濟燒存三分性出火氣同甘草枳殼搗羅為末每服三钱水一盞煎七分空心服

(四十五) **黃連散** 治腸風下血疼痛不止

黃連 雞冠花 貫衆 川大黃
烏梅各一兩 甘草炙三分

右為末每服弐夕用温米飲調下日三服不計時候

(四十六) **黃連貫衆散** 治腸風下血

黃連 雞冠花 貫衆 大黃各二兩
烏梅二兩 甘草三夕炙 枳殼炮 荆芥各乙兩

右為細末二大錢温米飲下食前

(四十七) **加減四物湯** 治腸風下血不止

側栢葉 生地黃洗 當帰去芦酒浸 川芎各一兩
枳殼去白炒 荆芥穗 槐花炒 甘草炙各半兩

右㕮咀每服四夕水一盞姜三片烏梅少許同煎空心温服

(四十八) **香梅丸** 治腸風臟毒下血

烏梅肉核燒存性 香白芷不見火 百藥煎燒灰存性各等分

右為末米糊丸如梧桐子每服七十丸空心米飲下

(寒) (四十九) **阿膠湯** 治傷寒熱毒入胃下利膿血

黃連炒二兩 梔子仁半兩 阿膠炙令燻黃 薤白去粗皮炙各乙兩

右為粗末每服四錢水一大盞煎服無時

(暑) (五十) **黃連香薷散** 治伏暑純下鮮血 方載中暑門

(濕) (五十一) **不換金正氣散** 治腸胃受濕下血不止

加黃連烏梅同煎 方見傷寒門

(五十二) **胃風湯** 治風濕乘虛入于腸胃或下瘀血者 方見下痢門

(五十三) **槐角散** 治腸胃不調脹滿下血

蒼术 厚朴 陳皮 當帰
枳殼各一兩 槐角二兩 甘草炙 烏梅各半兩

右㕮咀每服五夕水一盞煎服

五十四 當歸和血散 治腸澼下血濕毒下血

槐花　青皮各六分當歸身　升麻各二分
荆芥穗六分川芎四分

右爲細末每服二三錢清米飲調下食前

五十五 升陽去濕和血湯 治腸澼下血作泓其血啲出有力而遠射四散如箭春二月中下二行腰中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當去濕毒和血而愈

升麻　熟地黄　生地黄　牡丹皮
黄耆各乙分當歸身　生甘草各半分　熟甘草
肉桂各三分　橘皮二分　蒼朮　秦艽
升麻七分　白芍藥乙分半

右㕮咀都作一服水四盞煎至一盞去滓稍熱服空心

五十六 三黄丸 治三焦熾熱下瘀血者方載積熱門

熟

五十七 家藏方聚金丸 治腸胃積熱或因酒毒大便下血腰中

挽痛作渴脉来弦数

黄連四兩一兩水浸晒干一兩炒一兩灰火炮一兩生用
黄芩　防風去芦各二兩

右爲末煮麪糊丸如梧桐子每服五十丸米泔浸枳殼水下不拘時冬月宜入大黄一兩

冷

五十八 斷紅丸 治臟腑虚冷下血不止面色萎黄日久羸瘦

側栢葉炒黄川續斷酒浸鹿茸炙去毛酥黄　附子炮去皮臍
黄耆去芦　阿膠炒成粉　白礬枯半兩

右爲末醋煮米糊丸如梧桐子每服七十丸空心米飲下

通治

五十九 伏龍肝湯 治先血後血謂之遠血兼治吐衄

伏龍肝半斤甘草炙
黄芩　乾地黄各二兩千金作干姜
白朮　阿膠

右㕮咀每服四錢水一盞煎空心服虚者加附子

(六十) 蒜連丸 治臟毒下血鴈瓜黃連去鬚不拘多少為末用獨頭蒜一个煨香熟研和入臼杵搥爛丸如梧桐子每服四十九空心陳米飲下

(六十一) 烏梅丸 治大便下血不止烏梅三兩燒存性為末用好醋打米糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

(六十二) 結陰丹 治腸風下血藏毒下血諸大便血疾枳殼麩炒 蕨灵仙 黃耆 陳皮去白椿根白皮 何首烏 荆芥穗已上各半兩

右為末酒糊為丸桐子大每服五七十九陳米飲入醋少許煎過放温送下

(六十三) 柿乾散 治腸風臟毒下血不止面色瘦黃腸癖痔漏疼痛並皆治之

乾柿燒存性為末每服二錢米飲下

(六十四) 香連丸 治炎熱不調下血如痢方載下痢門

痔漏

痔之五種牡痔腸痔血痔牝痔脈痔是也究其所因皆是素蘊熱毒或過食燒炙新酒久坐血脉不流或因七情之氣鬱結乎臟腑之間其毒不能消散發而為痔或藏於肛門之內或突出於外大者如蓮花雞冠核桃之狀小者如牛妳雞心鼠尾櫻桃之類名狀更多其實皆由臟毒所致故蘊毒深者其狀大蘊毒小者其形小或流膿水或出鮮血行坐之間病者殊為之苦久而不治血氣衰弱必然成漏今之治法多用刀線割剔其痔雖有藥可以封固然其毒在內無由而去必有再作之理否則成漏轉而為難治之證諸方多有服食數貼之藥今人用之少見有效揆度其理既有形於外非服藥之能愈必須用去毒

箪漏
木饅頭

消痔之藥點之俟其毒盡痔消方可為愈切不可用砒霜等毒藥恐致人奄忽愼之愼之又有無痔者肛門左右別有一竅流出膿血名為箪漏治之須用温煖之藥補其內又以生肌肉之藥敷於外其竅在皮膚者易愈臟腑有損而生竅者未易治也醫者詳審

冷 (六十五) 釣腸丸 治新久諸痔肛門腫痛或生瘡瘙時有膿血方見脫肛門

(六十六) 黑圓子 專治久年痔漏下血用之累驗

乾姜 百草霜一兩 木饅頭二兩烏梅 敗蕺 柏葉 油髮各五分已上七味各燒存性為末却入後件 桂心三分 白芷五分各不見火 右九味為末醋糊圓如梧桐子空心米飲下三十圓

熱 (六十七) 槐角圓 治五種痔瘡遠年近日並皆治之方載下血門

(六十七) 寬腸圓 五灰膏除痔瘡之後或臟腑秘結不通者用此

藥寬腸

黃連 枳殼各等分

右為末麪糊丸如梧桐子每服五十圓空心米飲下

(六十八) 香殼丸 治濕熱內甚因而飽食腸癖為諸痔久而成瘻

木香 黃蘗各三分 枳殼去穰炒厚朴各半兩

黃連一兩 蝟皮一个燒灰 當歸四分 荆芥穗三分

右為末麪糊為丸如桐子大每服一二三十丸温水下食前

(六十九) 黃耆湯代丸 治腸中久積熱痔瘻下血痰痛

黃耆 生地黃焙 黃赤小豆花各兩

黃芩 大黃 赤芍藥 當歸各三分

蝟皮一个 檳榔

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸至三十丸煎葉白

皮湯下食前槐子煎湯下亦得

七十 黃連阿膠丸 治痔鮮熱調血枳殼湯送下方見前門

七十一 乳香丸 治諸痔并腸風下血肛邊或生結核腫痛或已成瘡大便艱難肛腸脫出

枳殼去白麩炒半兩 牡礪煨半兩 乳香 白丁香各一分

蕪澄茄 大黃蒸焙 鶴虱

右為末粟米糊圓如梧桐子每服二十圓腸氣臟毒清下諸痔煎雞白湯下諸漏煎鐵脊湯並空心下

七十二 橘皮湯 治氣痔

橘皮 枳殼 川芎 槐花妙各半兩

檳榔 木香 桃仁去皮尖

香附子 甘草各二錢半 紫蘇葉

右剉散每服三錢水一琖半姜三片棗一枚煎溫服

血痔

七十三 白玉丹 治久年腸痔下血

寒水石煅紅研細水飛一斤入銀窩中煅紅用糯米糊丸梧子大每服五六十丸陳米飲下只一服

酒痔

七十四 乾葛湯 專治酒痔

乾葛 枳殼 半夏 茯苓

生地黃 杏仁 甘草各等分 黃芩

右剉每服三錢黑豆百粒姜五片白梅一箇煎服

通治

七十五 酒煮黃連丸 治痔因酒過多而得方見積熱門

七十六 立效丸 治一切痔

百藥煎研末每服三錢煮稀白粥撓勻服之立愈糊丸米飲下亦可治乳痔如神

七十七 蝟皮圓 治五種痔漏

猪左足蹄 黃牛角腮 蝟皮一枚同上燒灰存性 防風去芦

貫衆　梔甲子炒黑　帶醋煮各半兩　枳殼去白生用
雞冠花　梔花炒　黃耆去芦　雷丸　黃連
香白芷　當歸酒浸　油髮灰　玄參　鹿茸香別研半分
右為末米糊圓如梧桐子每服百圓空心以米飲湯送下年
高并虛弱者不宜服

（七十七）**槐藤子丸**　治腸風下血痔漏結核疼痛

苘香炒　槐藤子一个重七分者皂角刺燒存性　枯白礬
枳殼去白麩炒　檳皮焙干各　白附子炮　乳香二分半　蝟皮燒存性五分
右為末醋糊丸如梧桐子每服五十圓空心温酒下如痔
瘡痛醋研五七圓塗患處

（七十八）**五仙散**　治五種痔不問內外並宜服之

蠮螉治牡痔　蜂房脉痔　蝟皮牝痔　蛇蛻氣痔
猪左足懸蹄甲治腸痔各等分

右燒存性隨證倍用一分為末井花水調二分空心卧時服

（熏洗法）七十九　梔花并外枳殼文葉同煎水入白礬熏洗

（八十）**木鼈散**

木鼈子百枚前等分每一掬布裹煎湯以桶盛之蓋上穴一竅先以氣熏後通手洗

（繫痔法）（八十一）**繫痔**　用白芷煮白芋作線快手緊繫痔上雖痛不妨其痔自然乾落七日安

（八十二）又法　用芜花汁浸線一日夜用線繫痔如上法亦可繫瘤

（敷法）（八十三）**梔白皮膏**　治內外諸痔久年不愈者

梔白皮　楝實各五兩　赤小豆二合　桃仁六十枚
當歸三兩　井草　白芷各二兩
右咬咀以酥成猪膏一斤微火煎至黃色棄滓成膏以貼瘡

（八十四）**蒲黃散**　治下部痔漏

荊柴
劗柴

蒲黃一兩　血竭半兩
右為細末每用少許貼患處

八十五 蝸牛膏 敷痔有效蝸牛一枚麝香少許用小砂合子盛蝸牛以麝香摻之次早取汁塗痔處

八十六 五灰膏 治臟腑一切蘊毒發為痔瘡不問遠年近日形似雞冠蓮花核桃牛乳或內或外並皆治之此方親傳之專科劉叔茂累試皆驗不敢自秘

蕎麥灰半斗許　荊柴　老杉枝　山白竹　劗柴
以上四般柴竹截作二尺許長以斧劈破成片各取一束曬乾於火上燒過置攪內為炭防為灰化俟燒盡却以水於窩內煮出炭汁又用酒漏以花帛實其竅置蕎麥灰於酒漏內以所煮四般炭汁淋之然後取汁於窩內慢火熬汁約取一小椀候冷入石灰調和成膏以瓦瓶貯之上用石灰傅患面不令走氣臨用時却去石灰以冷水調開令病者以水洗洗淨拭乾仰卧搭起一足先以濕紙於瘡四圍貼護却用竹篦挑藥塗痔上須臾痛息用紙揩去藥再塗如此三四遍要痔瘡如墨樣黑方止以水洗淨每日常置冷水一盆以葱湯和之日洗三五遍六七日後膿穢出盡其瘡自消

脫肛

肺與大腸為表裏故肺臟蘊熱則大腸脫出此三因之論又有婦人產育用力過多及小兒久痢後臟寒皆能使肛門突出治之必須温肺臟補腸胃又則自能收矣

八十七 約腸圓 治內外諸痔及下血以致肛門脫出並宜服之

茯苓二兩　焼胡桃仁十五個不油者　綠礬枯　白附子

雞冠花炒各只殼去白 附子炮去皮臍生 訶子煨去核各二两
五刃枳殼麩炒 蜡皮两个鏈内燒存性
白礬枯 半夏 天南星各一两

右為末以醋煮麪糊圓如梧桐子每服三十圓空心溫酒下

(八十八) 聖散子 治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少杵為細末乾貼患處

(八十九) 蜡皮散 或肛門或因洞泄或因用力大過脫出不收

蜡皮一个性燒存 磁石煅 桂心各半两

右為末每服二分米飲空心調下肘後方治女人陰脫加麝

(九十) 治脫肛 以槐花槐角各等分炒黃為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下以猪膽去皮蘸藥炙服亦可

(九十一) 紫載膏 治臟熱肛門脫出以紫背載一大握又名魚腥草擂爛如泥先用朴消水洗淨肛門用芭蕉葉托入却用蒸於聲下貼坐自然收入

(浸洗法) (九十二) 以貼水荷葉煎水浸洗可收

(九十三) 文蛤散 治脫肛

右以文蛤為末煎汁入白礬蛇床子尤佳浸洗後用赤石脂末摻在芭蕉葉上頻用手托入或肛長尺餘者以两床相接中空一尺以甕瓶盛藥水煎架起與床平令病者仰卧以所脫肛腸浸在瓶中時換藥逐日浸縮尽為度

(九十三) 又方 採艾葉濃煎湯浸之即收

(九十四) 香荊散 治肛門脫出大人小兒悉皆治之

香附子 荊芥穗各等分

右為末每服三錢水一大椀煎熱淋洗又方用五倍子為末每用三分入白礬一塊水二椀煎洗立效又方用木賊不以多少燒存性為細末摻肛門上按入即愈

遺尿失禁

人之溲尿藉心腎二氣之所傳送蓋心與小腸為表裏腎与膀胱為表裏若心腎氣虛冷傳送失度則必有遺尿失禁之患故經云膀胱不利為癃不約為遺是也治之宜補陽下元清心寡欲又有產厚不順致傷膀胱及小兒胞冷俱能令人遺尿失禁又當隨證施治

(通治) (九十五) 二氣丹 治內虛裏寒膀胱積冷陽氣漸微小便不禁

硫黃細研 肉桂去皮為末各一分 乾姜炮為末 朱砂研為末附子一枚大者炮去皮臍為末半兩

右以麪糊為丸如梧桐子每服五十丸鹽湯空心下

(九十六) 秘元丹 治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨三兩 呵子十枚 縮砂一兩去皮 靈砂二兩

右為末煮糯米粥丸如梧桐子每服五十丸空心鹽酒下

(九十七) 家韭子丸 治大人小兒下元虛冷小便不禁或成白濁常服補養元氣進美飲食

家韭子六兩炒 鹿茸四兩酥炙 菟絲子酒浸炒 熟地黃當歸各二兩 巴戟去心 兎絲子酒浸各一兩半 杜仲去皮炒石斛去苗 桂心 乾姜炮各一兩

右為末酒糊圓如梧桐子每服一百圓空心鹽湯溫酒任下小兒須作小圓服之

(九十八) 茯苓圓 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁

赤茯苓 白茯苓各等分

右為末以新汲水投洗澄去新沫控干別取地黃汁与好酒同於銀石器內熬成膏搜和圓如彈子大空心鹽酒嚼一圓

(九十九) 雞內金散 治遺尿失禁

雞脞胫一具并腸淨洗燒為灰男用雌者女用雄者
右研為末每服二錢酒飲調服

(一百)兎絲子圓 治小便多或致失禁

兎絲子(淘淨酒蒸)牡礪(煅取粉)附子(炮去皮)五味子
鹿茸(酒炙)各一兩雞脞胫(炙)桑螵蛸(酒炙)半兩
右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽湯鹽酒任下

(百一)桑螵蛸散 治男子小便頻數如稠米泔色此由勞傷心腎得之有服此藥不終劑而愈大能安神定志

桑螵蛸(鹽水煮)遠志(去心)菖蒲(鹽炙)龍骨
人參 茯神 當歸

鹿茸(酒炙)桑螵蛸(酒炙)各等分
鱉甲(醋炙)各等分

右為末每服二錢臨卧時人參湯調服

(百三)益智子為末米飲調下每服二錢

(百四)補宣方 治遺尿

用豬胞洗淨鉄鏁上炙香熟嚼細温酒下

名方類證醫書大全卷十七

醫峯 熊宗立 道軒 編集

五臟内外所因證治 肝心脾肺腎

人身之有形於外者必有諸内故五臟之受病於内而發於外者必見之眼耳鼻舌口牙之間心經蘊熱則口舌生瘡唇口裂脾与胃相通故受熱則噎氣臭穢腎受冷則耳不能聽或兼風則牙痛頷腫肺受風邪則皮毛瘙痒積毒則發為癰疽肝受病則目不能視爰乃血之餘焦枯者血不足也此皆病在内而應乎外也凡有其證必須考其所自來辨其冷熱虚実治之

肝因

一 枳殻煮散 治悲哀傷肝氣痛引兩脇

防風去芦 川芎 細辛 枳殻麩炒

桔梗 炒 各四兩　甘草 炙二兩 乾葛一兩半
右㕮咀每服四分水一盞姜三片煎七分空心服

〔一一〕**柴胡散** 治肝氣實熱頭疼目眩眼赤心煩

柴胡 去芦　地骨皮 去木　玄參
甘菊花 去梗 赤芍藥　羚羊角鎊　黃芩 各一兩 甘草 炙半兩
右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎八分温服不拘時

〔一二〕**真珠丸** 治肝經為風邪所干卧則魂散而不守狀若驚悸方見風門

〔四〕治肝積氣滯在左脇下遇病作則左边手足頭面昏痛

乾葛一兩 麻黃三分 側子一个 川芎　甘草　羌活
防風　枳实　芍藥　桂枝　當歸 各四兩
右㕮咀每服四分水一盞姜三片煎七分熱服有汗避風

〔五〕**枳实散** 治肝氣不足兩脇疼痛

枳实一兩　白芍藥 炒　雀腦芎　人參 各半兩

〔六〕**桂枝散** 治因驚傷肝兩脇疼痛

枳殼一兩 小者　桂枝半兩
右為末每服二分姜棗湯下

〔七〕**瀉膽湯** 治膽實熱惡寒腰痛脇下堅硬口苦咽乾

膽因
半夏 三刃 洗七次　酸棗仁二兩 生地黃五兩　黃芩一兩
遠志 去心 姜汁合炒　茯苓 各二兩　甘草 炙一兩
右㕮咀每服四分水一盞炒糯米一撮姜七片煎服

〔八〕**酸棗仁圓** 治膽氣實熱煩悶不睡

茯神 去木　酸棗仁 炒　遠志 去心 炒　栢子仁 炒別研
防風 去芦 各一刃　生地黃 洗　枳殼 麸炒 各　青竹茹 二分半
右為末煉蜜圓如梧桐子每服七十圓不拘時熟水下

(九)**茯神湯**治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏遇事多驚

茯神去木 黃耆去芦五味子 柏子仁炒各一兩 人參
酸棗仁炒白芍藥 熟地黃洗 桂心不見火 甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分服不拘時

(心因)(十)**導心湯**治心經實熱痞滿發渴煩悶喘急

黃連去須二兩 半夏三兩湯洗七次 黃芩
甘草炙 人參 乾姜炮各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞棗三个煎七分服

(十一)治心脾虛熱生木舌膿脹

玄參 升麻 大黃 犀角各七錢半 甘草半兩

右爲末每服三錢水一盞煎五分溫服

(十二)**玄參升麻湯**治心脾虛熱舌上生瘡顎頰腫痛

玄參 赤芍藥 升麻 犀角

桔梗去芦 貫衆洗 甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服

(十三)**兼氏清心圓**心受邪熱精神恍惚狂言叫呼睡卧不寧

人參 蝎梢 麝金 生地黃
天麻 天南星爲末炒乾臍用黃牛膽內令滿掛當風處

右爲末湯浸蒸餅和圓如梧桐子每服三十圓人參湯下

(十四)**茯苓補心湯**治心氣虛耗方見心痛門

(脾因)(十五)**良姜拈痛散**治脾疼

良姜切細先用羊棗慢火炒不焦黃棗同炒至羊棗黑爲度
右只用良姜爲末每服一錢空心米飲調服

(十六)**百指乃桂花散**治脾積氣痛

香附子五兩炒去毛 蓬术醋煮焙 良姜 桂花 甘草炙各一兩

右爲末每服二錢空心沸湯鹽點服

蛀蝕

痺恐脾

(十七) 陳茱萸丸 治脾氣虛痛不可忍

陳茱萸二兩半 蚌粉炒赤 浮椒各一兩

右爲末醋糊圓如梧桐子每服二十圓溫酒鹽湯任下

(十八) 治脾皮用荔枝核爲末每服二錢熬醋湯調下

(十九) 東京王先生治痺疼方

巴豆 蓋內炒黃 杏仁 炒黃 犛牛各半兩 陳皮一兩去白 炒黃

右爲末醋糊圓如菉豆大每服十圓生姜湯下婦人血氣醋湯下產後氣痛艾湯下五圓酒食傷隨物下

肺因

(二十) 葶藶散 治肺癰吐膿血喘急方見喘急門

(二十一) 升麻湯 治肺癰咳唾膿血作臭氣

升麻 薏米 桔梗 地榆

黃芩 芍藥各五分 甘草七分半

右�once 水一盞煎百三服

(二十二) 桔梗湯 治肺癰咳唾膿血咽乾多渴方載咳嗽門

(二十三) 排膿散 治肺癰得吐膿後以此藥排膿補肺用綿黃蓍

二兩生爲末每服三錢水一盞煎溫服

(二十四) 栝子仁湯 治肺氣虛寒兩脇脹滿

栝子仁 炒白芍藥 茯神去木 防風去芦 桂心不見火

當歸 洗去浸芦 細辛洗去葉 附子 炮裂去皮臍 甘草炙半兩

右�once 水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

(二十五) 秦膏圓 治肺積在右脇下大如杯發爲癰疽

陳皮 桔梗

右前二味爲末入蜜搜研勻煮棗肉和圓如梧桐子每服五

腎因

(二十六) 玄參湯 治腎臟實熱心下煩悶耳聽无聲腰脊強痛

五加皮去木 生地黃 玄參 黃芩 羚羊角

石菖蒲　赤茯苓　通草　甘草炙　麥門冬去心各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分不拘時服

（二十七）椒附圓　治腎氣上攻頭項不能轉移以大附子一枚炮去皮臍爲末每用二錢以椒二十粒用白麪塡滿椒口水盞半姜七片煎七分去椒入鹽空心點服

眼目

人之有兩眼猶天之有兩曜視萬物察纖毫何所不至日月有一時之晦者風雲雷雨之所致也眼之失明者四氣七情之爲害也大抵眼目爲五臟之精華一身之至要故五臟分五輪八卦名八廓五輪者肝屬木曰風輪在眼爲烏睛心屬火曰血輪在眼爲二皆脾屬土曰肉輪在眼爲上下胞肺屬金曰氣輪在眼爲白睛腎屬水曰水輪在眼爲瞳子至若八廓無位有名膽之腑爲天廓膀胱之腑爲地廓命門之腑爲水廓小腸之腑爲火廓腎之腑爲風廓脾胃之腑爲雷廓大腸之腑爲山廓三焦之腑爲澤廓此雖爲眼目之本根而又藉血爲之包絡五臟或蘊積風熱或有七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五臟所屬而見或腫而痛羞澁多淚或生障翳昏暗失明其證七十有二治之須究其所因風則驅散之熱則清涼之氣結則調順之切不可輕用針刀點割偶得其愈出乎僥倖儻或不然爲終身之害又且不可過用涼劑恐冰其血脉凝而不流亦成痼疾當量人老少氣體虛實用藥又有腎虛者亦能令人眼目無光或生冷翳止當補煖下元溢其腎水北方之人患眼最多皆是日冒風沙夜卧熱炕二氣交蒸使然治之多用涼藥北方禀受與南方不同故也疼豆之後毒氣攻於眼目傷于瞳人者素無治法

肝風熱 〔二十八〕明目流氣飲 治肝經不足內受風熱上攻眼目視物不明常見黑花當風多淚隱澁難開或生障翳婦人血風時行暴赤一切眼疾並皆治之

大黃　牛蒡子炒　川芎　細辛去苗　防風去苗　玄參去蘆　山梔去皮　黃芩去芦　甘草炙　蔓荊子　荊芥去梗　木賊去根節各一兩　草決明一兩半　蒼术米泔浸炒二兩

右爲末每服二錢臨卧用冷酒調下

〔二十九〕曾帥幹家傳 車前散 治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞明多淚

蜜蒙花去枝葉　羌活　菊花去枝　白蒺藜炒去刺　粉草　草決明　車前子各炒　黃芩　龍膽草淨洗各等分

右爲細末每服二錢食後飯湯調服

〔三十〕 地黃圓 治肝經風熱上攻眼目澁痛不可用補藥者

熟乾地黃兩半　黃連　決明子各一兩　光明朱砂　甘菊花　防風　羌活　沒藥　桂心各半兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子每服三十丸食後熟水下

〔三十一〕 決明子散 治風毒上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤澁羞明多淚或痒或痛

決明子　甘菊花去梗木賊　黃芩　赤芍藥　川芎　羌活去芦　石膏　甘草　蔓荊子　石決明各一兩

右爲末每服三錢水一盞煎至六分食後服

〔三十二〕 荊芥散 治肝經蘊熱眼目赤腫

荊芥穗　當歸　赤芍藥各一兩半　黃連一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎三沸濾去滓洗病眼

(三十三) 羊鼠圓 治遠視不明常見黑花久服明目有功

羊鼠　菊花　荊芥　薄荷
甘草各一兩　蒼朮二兩米泔浸

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸食後茶清下

(三十四) 撥雲散 治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛怕日羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活　防風　柴胡　甘草炒各一斤

右為末每服二錢水一盞煎食後温服薄荷清調茶并菊花苗煎湯皆可服忌諸毒物

(三十五) 蟬花散 治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一切風毒傷肝者並宜服之

穀精草去土　菊花去梗　蟬蛇淨洗去土　羌活　甘草炒
白蒺藜炒去刺　草決明炒　防風去芦　山梔子去皮　川芎不見火

蜜蒙花去枝木賊　荊芥穗　黄芩　蔓荊子各等分

右為末每服二錢食後用茶清調服或荊芥湯調亦可

(三十六) 菊花散 理肝受風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澁痛

菊花去枝　羌活去芦　白蒺藜炒去刺　木賊去節　蟬脫去頭足翅各二兩

右為末每服二錢食後茶清調下

(三十七) 洗肝散 治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱澁眵淚

薄荷去梗　當歸　羌活　防風各去芦
山梔子仁　甘草　大黄　川芎各二兩

右為末每服二錢食後熟水調下

(三十八) 蜜蒙花散 治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴赤腫痛

蜜蒙花揀淨　石決明用鹽同東流水煮一伏時出研粉
杜蒺藜炒去刺　木賊

右為末每服一錢臘茶清食後調下

羌活去芦　菊花去枝各等分

(三十九) 蟬花無比散 治大人小兒風毒傷肝或為氣攻一切眼目昏暗漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶赤爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澁隱痛並皆治之

茯苓 甘草炙 防風去芦各四兩 石決明鹽水煮研如粉 川芎 羌活 當歸洗焙各二兩 芍藥赤者十三兩 蝉退去頭足二兩 蔓荊子炒去皮 木賊去節二兩 蛇蛻炙一兩

右為末每服三錢食後米泔調服茶清亦得忌毒食等物

(四十) 羊肝圓 治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝一具生用 黄連去鬚別研為末

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入黄連末杵和圓如梧桐子每服五十圓用熟水送下不拘時和劑方用白羊子肝婦人肝虛積熱上攻眼目翳膜遮睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘并治暴赤熱腫

(四十一) 明眼地黄圓 治男子婦人肝腎兩經俱虛風邪所乘并治暴赤熱腫

牛膝去芦酒浸三兩 石斛去根 防風去芦各四兩 生地黄 枳殼去白麸炒 杏仁去皮尖炒 熟乾地黄洗焙各一斤

右為末煉蜜圓如梧桐子每服三十圓食前鹽湯温酒任下

(四十二) 湯泡散 治肝經不足風熱上壅眼目赤澁睛疼多淚赤芍藥 當歸洗焙 黄連去鬚各等分

右為末每服二錢用極滾湯乘熱熏洗冷即再温日三五次

肝氣虛 (四十三) 養肝圓 治肝血不足眼目昏花或生眵淚當歸去芦酒浸 車前子酒蒸焙 防風去芦 蒺藜仁別研 熟地黄酒蒸 川芎 白芍藥

右為末煉蜜圓如梧桐子每服七十圓熟水送下

心經熱 (四十四) 七寶洗心散 治風壅痰滯心經積熱邪氣上衝眼澁睛痛或腫或赤近風多淚怕日羞明並皆治之方載積熱門

(四十五) 曾帥幹家傳 治心臟積熱上攻眼目兩皆浮腫

血侵白睛羞明洒淚
牛蒡子炒 揀子 槐子炒 生乾地黃 黃芩各等分
右為末食後麥門冬湯調二錢服

肺家熱 四十六 桑白皮散 治肺壅窒毒氣上攻眼目白睛腫脹日夜疼痛
玄參 桑白皮 枳殼去白麩炒 川升麻
杏仁炒去皮尖 旋覆花去梗 防風去蘆 赤芍藥
黃芩 甘菊花去梗 甘草炙 甜葶藶炒各等分
右㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎至八分食後溫服

腎虛 四十七 補腎圓 治腎氣不足眼目昏暗瞳人不明漸生內障
磁石煅醋淬七次水飛過 兎絲子酒蒸各二兩 五味子
熟地黃酒蒸 枸杞子 楮實子 覆盆子酒浸 肉蓯蓉酒浸
車前子酒蒸 石斛去根各一兩 沉香別研 青鹽別研各半兩
右為末煉蜜圓如梧桐子每服七十圓空心鹽湯下

四十八 曾帥幹家藏 杞菊圓 專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障
白茯苓八兩去皮 真枸杞四兩酒浸蒸 當歸二兩酒洗
青鹽一兩別研 兎絲子酒浸蒸二兩
右為細末煉蜜圓如梧桐子食前湯下七十圓

四十九 治腎經虛冷水候不升不能上蔭肝木致令眼目昏暗或赤或澁痛痒无時
川芎 荊芥 天麻 茯苓 石斛
川烏 烏藥 牽牛 當歸各等分
右為末煉蜜丸如豆大朱砂為衣每服一丸薄荷茶嚼下

肝腎虛 五十 加減駐景圓 治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明
車前子炒 熟地黃洗 當歸去蘆各一兩 楮實子 无翳膜則勿用

川椒妙出汗各一兩　五味子
右為末蜜糊丸如梧桐子每服三十丸食前溫酒鹽湯任下
五十一　四生散　治肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明多淚方載中風門

五十二　曾帥幹家傳　五味子圓　治心肝二經蘊積風邪并腎臟虛耗眼目昏暗或生翳膜

五味子　白茯苓去皮　麥門冬去心各半兩
人參　阿膠蚌粉炒　熟地黃洗各一兩
防風去蘆各　百部　貝母炒　柏子仁
杜仲去皮　山藥　五味子炒各二兩
右為細末煉蜜圓如彈子大食前薑湯嚼下一圓

五十三　菊睛圓　治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

茯神去皮木　遠志去苗取根上皮
枸杞子三兩　蒺藜炒去刺　巴戟去心
右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓溫酒鹽湯食後下　楊氏家藏方加五味子二兩

五十四　暴赤　洗方　治暴赤熱腫眼

黃連　黃柏　赤芍藥　杏仁各等分
每一錢用水少許入銅錢一箇磁楪盛覆內煮以青絹斤子蘸藥汁點眼洗之

五十五　治暴赤眼初發用　升麻葛根湯　二貼每貼加蟬蛻七箇作三服如未退用　敗毒散　加大黃又不退却用　五膈寬中散　調隧下氣氣順則平矣

翳膜　五十六　白龍散　去翳膜明眼目用川芎硝五兩取眞白如雪者置銷金銀鍋子內以新瓦蓋用熟炭火於磚外慢慢熬鎔清汁以鉄鉗子出鍋傾藥汁在別器中疑潔如玉色者方好研令極細入龍腦各等分用點退翳膜或吹入鼻中立有神效

(五十七) 家藏方搽藥散 治久新病眼昏澁雜開翳膜遮睛或成
胬肉或暴發赤眼腫痛並皆治之
炉甘石 四兩碎 黃連 六分搥碎 以一椀煮數沸除去滓
朴消半兩細研
以上先將炉甘石末入甘鍋內開口煅令外有霞色為度次
將入黃連朴消水中浸飛過候乾又入黃連半分水飛過再
候乾次入
白鑞三分生用一半飛過一半 胡粉別研一字
黃連末半兩 青鹽 膽礬 各七分 白丁香別研
乳香別研 鉛白霜 各二字 銅青 七分 硇砂別研一字
右為末同前件藥合和令勻每用少許點眼

風眩 (五十八) 銅綠膏 治風眩爛痒
銅青 枯礬等分為末以白梅肉拌搗成丸如雞頭大醋內煮

過常用挨目眩痒處

(五十九) 洗方 治爛眩風赤眼
五倍子 黃連子同前煎水澄清洗目

(六十) 治爛眩風眼目痒痛時常出淚
黃連 淡竹葉略一栢樹皮二兩一半生一半乾
右㕮咀水一升煎五合稍冷用滴洗兩目爛處

(六十一) 治爛眩風用覆盆子葉無亦拘多少日乾搗爛如粉以綿
裹之須用男孩乳汁浸少時點眼中

(六十二) 家藏方黃連散 治肝受風熱眼絃赤爛
乳香一分別研 黃連去鬚 半兩 羚羊角屑 半兩
右㕮咀每用二分水二盞煎至一盞濾去滓熱洗

點法 (六十三) 黃連膏 治一切眼目赤肉攀睛風痒淚落不止
黃連半斤 朴硝一斗以水半斛淘淨去土焙干用

白丁香五升以水一觔淘淨去土研細用
右取水朴硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末敷清汁瞧乾硝用猪羊膽和加蜜點之效矣

（六十四）碧霞丹 點一切惡眼風赤者

龍腦 麝香 礬砂各二錢 沒藥
血竭 乳香 銅青各一錢 鵬砂三錢
右為末煉蜜圓如梧桐子大用一丸新水化開點之立效

（六十五）千金神麴圓 明眼目百歲可讀細書常服有功

神麴四兩 磁石二兩煅醋晝淬
右為末煉蜜圓如梧桐子每服二十九食後米飲下

耳

夫耳者腎之所候腎者精之所藏腎氣實則精氣上通聞五音而聰矣若疲勞過度精氣先虛於是乎風寒暑濕得以外入喜怒憂思得以內傷遂致聾聵耳鳴耳底耳之患候其顏頰色黑者知其耳聾也亦有手少陽之脉動厥而聾內則煇〻焞〻也手太陽脉動厥而聾者耳內氣滿也大抵氣厥厥耳聾尚易治精脫耳聾不易愈諸證既殊治各有法

虛證

（六十六）補腎圓 治腎虛耳聾

山茱萸 芍藥 乾姜炮 巴戟 薏苡酒浸
澤瀉 桂心 兎絲子酒浸遠志去心 人參
黃耆 細辛 石斛
附子炮 蛇床子 當歸 乾地黃 甘草
羊腎二枚 茯苓半兩 防風一兩半 菖蒲一兩
右為末以羊腎研細酒煮麪糊圓如梧桐子鹽酒下五十圓

(六十七) 蠑螈彈圓 治兩耳虛聾

白茯苓二兩 山藥炒三刃 杏仁炒去皮尖兩半 黃蠟二兩

右以前三味為末研勻鎔蠟為圓如彈子大每嚼湯嚥下

(六十八) 治耳聾久不聞者

全蝎黃色全小者四十九个 生姜切如蝎大四十九片

右用銅鉄器炒姜乾為細末只作一服臨卧温酒調下

(六十九) 蒺藜圓 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉酒浸切焙 山茱萸去核 石龍芮 石菖蒲

兎絲子酒浸蒸焙 川羌活去芦 鹿茸火去毛酒蒸焙

石斛去根 磁石煅醋淬水飛過 附子炮去皮各一兩

全蝎去毒七个 麝香一字旋入

右為末煉蜜圓如梧桐子每服一百圓空心鹽酒鹽湯任下

(熱證) (七十) 犀角飲子 治風熱上攻兩耳聾閉內外腫痛膿水流出

犀角鎊 菖蒲 木通 玄參 赤芍藥

赤小豆炒 甘菊花去枝梗各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分温服不拘時

(七十一) 解倉飲子 治氣虛熱雍或失飢冒暑風熱上雍耳內聾閉徹痛膿血流出

赤芍 白芍各半兩當歸 甘草

大黃 木鼈子去殼各二兩

右剉每服四錢水煎食後臨睡服

(氣證) (七十二) 塞耳丹 治氣道雍塞兩耳聾瞶

石菖蒲一寸 巴豆一粒 全蝎一个去毒

右為末葱涎丸如粟核大每一九綿裹塞耳內

(七十三) 秘傳降氣湯 加石菖蒲治氣雍耳聾大効 方見氣門

(七十四) 通耳法 治耳聾久不聞者

緊磁石一塊如豆大
右用新綿子裹了塞於所患耳內口中嚼少生鉄氎耳內如
風雨声即愈

(七十五)菖蒲圓 治耳內卒痛聾塞不聞

菖蒲　附子炮去皮臍各等分
右為末醋糊圓如杏仁大綿裹置耳中日二易之

(七十六)以帛膽汁滴耳中雖二十年者亦効

又聾耳

(七十七)並言散 治風入耳虛鳴

虛鳴

白芷　石菖蒲　蒼朮　陳皮
細辛　厚朴　半夏　辣桂
木通　紫蘇　甘草　川芎各等分
右剉每四錢姜五片葱白二根煎食後臨卧服

(七十八)黃耆圓 治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓

黑附子大者一个　羯羊腎一双　焙干　黃耆独並者去芦一兩
白豆蔻炒去刺　羌活去芦各半兩
右為末酒糊圓如梧桐子每服四十圓食後煖葱湯送下

(七十九)聾耳

(八十)紅綿散 治聾耳出膿及黃水

白礬煅一豸　胭脂一字　麝香少許
右入胭脂一字研勻用綿杖子纏去耳中膿水尽即用別綿
杖子送藥入耳中令到底掺之即乾直指方加巨丹龍骨

(八十一)直指方 治耳热出汁

滑石　爛石膏
右用腦子少許同研為末掺耳中

天花粉　防風各一豸

(八十二)治耳內出血

龍骨末吹之愈　又治耳內出血或耳中痛以生鰿刺去血
滴耳中

(八十二) 治聤耳有膿出不止用五倍子焙乾一兩及全蝎燒灰存性三分為末搽耳中

(八十三) 治百虫入耳方

一方 用香油灌入耳即出

一方 用雞冠血滴入耳即出

一方 野牛乳最良灌入耳即出

名方類證醫書大全卷十七

名方類證醫書大全卷十八

鼻

夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調清道壅塞其為病也為衄為齆為息肉為瘡瘍為清涕為窒塞不通為濁膿或不聞臭香此皆肺臟不調邪氣鬱積於鼻清道壅塞而然也治之之法寒則温之熱則清之塞則通之壅則散之無越於斯但時氣鼻衄不可便止如此出三升已上恐多者方可斷之活人書所謂衄血者乃解蓋陽氣重故也此又不可不知

(鼻之卷) (一) 噙化單證加減 專治鼻窒不通

薑澄茄半兩 薄荷葉三分 荊芥穗一分

右為末煉蜜圓如櫻桃大每服一圓嚥化津嚥

(一) 人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通

人參　白茯苓去皮　黃芩　陳皮去白
麻黃去根節　羌活去芦　蜀椒去目及閉口者炒出汗各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞煎服

(二) 菖蒲散 治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲　皂角各等分
右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧少時

(四) 辛夷膏 治鼻生息肉窒塞不通有時疼痛

辛夷葉二兩細辛　木香　木通
白芷　杏仁湯浸去皮尖研各半兩
右用羊脂猪脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色
放冷入龍腦麝香一錢為圓綿裹塞鼻中數日肉脫即愈

(五) 辛夷散 治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

白芷　川芎　木通去節　防風去芦　甘草炙
辛夷仁　細辛洗去土葉
右為末每服二錢食後茶清調服

(六) 蒼耳散 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁半兩　蒼耳子炒二錢半　香白芷一兩　薄荷葉一錢
右並曰乾為末每服二錢用葱茶清食後調服

(七) 腦沙通竅散 治鼻塞流涕為腦冷所致

辛夷各半兩　細辛
通草　附子各一兩
桂心　川芎　甘遂
右為末煉蜜圓如杏子大綿裹入鼻中密塞勿令氣泄或以生姜自然汁為圓亦可

(八)【千金細辛湯】治鼻窒腦冷清涕常出

黒附子去皮 川椒 川芎 細辛
吳茱萸 乾姜各三分 桂心一㕮 皂角脊半㕮

右將豬脂六兩煎油先一宿以苦酒浸前八味藥取入豬脂內同煎以附子黃色為止用綿濾藥室鼻孔

【腦瀉】(九)【川烏散】治腦瀉

防風 白附子 北細辛
川烏 菖蒲 乾姜
川芎 甘草各等分 白茯苓
右為末每服二錢嚼生葱白湯調下食後服 白芷

【酒齇】(十)治鼻赤如瘤

硫黃 輕粉 細辛 乳香各等分
右為細末井花水調搽

(十一)【凌霄花散】治酒齇鼻不二次可去根但藥差寒量虛實用

凌霄花 山梔子
等分為末每服二錢食後茶調下日二服

(十二)【又方】南番沒石子有竅者水研成膏手指蘸塗

(十三)【硫黃散】治酒皰鼻及婦人鼻上生黑粉刺

生硫黃二錢 輕粉一錢 杏仁十四个去皮
右為末生餅藥調臨卧時塗鼻早則洗去

(十四)【梔子仁丸】治肺熱病發赤瘡即酒齇

右以老山梔子仁為末鎔黃蠟等分丸如彈子大空心茶清嚼下忌酒炙煿半月

(十五)【又方】以白鹽常擦 妙

【鼾鼻息肉鼻痔】(十六)【細辛散】治鼻齆不聞香臭及鼻痔

細辛
瓜蒂

等分為末綿裹如豆大塞鼻中

十七 黃白散 治鼻齆息肉鼻痔等證

雄黃　白礬

右為細末搐入鼻中

十八 羊肺散 治肺虛上壅鼻生息肉不聞香臭

羊肺一具洗　白朮四兩　肉蓯蓉　木通

乾姜　川芎各一兩　除羊肺炒五件為細末

右以水調前藥稀稠得宜灌入肺中煮熟細切焙乾為末每服二錢食後米飲調服

口舌

夫口者足大陰之經脾之所主五味之所入也蓋味入口藏于胃脾乃運化津液以養五臟五臟之氣偏勝由是諸疾生焉且

醎則為寒酸則停滯澁則因燥淡則由虛熱則從苦從甘也口臭者乃腑臟膜膈之不同蘊積於胃腸之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風執之而然至於唇者亦脾所主經合於胃脾胃受邪則唇為之病蓋風勝則唇動寒勝則唇揭燥勝則唇乾熱勝則唇裂氣鬱則生瘡血少則萎而無色治法內則當理其脾外則當數以藥無不効矣至於舌者脾脉之所通心氣之所主舌和則知五味資於脾而榮於身者也二臟不和風寒中之則舌強而不能言雜執攻之則舌腫而不得語更有重舌木舌舌胎出血等証皆由心脾虛風熱所乘而然矣

心脾熱

十九 升麻散 治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻　赤芍藥　人參洗　桔梗去芦

乾葛各一兩　甘草生用半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

(二十) 洗心散 四味清涼飲 甘露飲 八正散 並治心脾有熱口舌生瘡方見積熱門

(二十一) 瀉黃散 治風热蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷 升麻 枳殼去白麩炒 黃芩
防風去芦 半夏湯洗七次 石斛各一兩 甘草生用半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎八分温服不拘時

(二十二) 菊花丸 治脾肺氣虛上成瘖瘂唇口折裂舌上生瘡

甘菊花 枸杞子 肉蓯蓉 巴戟去心各等分

右為末蜜丸如梧桐子每服五十丸米飲下

(二十三) 龍石散 治上膈蘊熱口舌生瘡咽膈腫痛

寒水石煅三兩砂二錢半生脳子半錢

右為末每以少許摻患處如小兒瘡毒攻口先用五福化毒丹然後用此藥立效

(二十四) 兼令散 治蘊毒毋上攻口舌生瘡

細辛 黃連各等分

右為末先以布帛蘸水揩淨患處摻藥其上涎出即愈

(二十五) 綠雲膏 治瘡臭爛久而不瘥

黃蘗半兩 螺青一錢

右研細臨卧置一字在舌下不妨嚥津

(二十六) 治口瘡用縮砂不拘多少火煅為末摻瘡即愈一方用檳榔燒灰存性為末入輕粉

(二十七) 治上膈熱極口舌生瘡

腻粉二七 杏仁七粒不去皮尖

右二味臨睡時細嚼令涎出再用

(二十八) 赴筵散 治口瘡痛

五味子新者一兩 滑石半兩研 黃蘗半兩蜜炙

右為末每服半分乾摻瘡上良久便可飲食

(二十九) **米醋圓** 專治口瘡

鵬砂瘡甚者加脂子研　黃蘗日乾　薄荷葉各等分

右為末生蜜圓如龍眼大每服一圓津液嚥化

(三十) 治口瘡

白礬乙兩飛至半兩　黃丹乙兩炒紅色放下再炒紫色為度

右為細末摻於瘡上立愈

(三十一) **吹咳散** 治三焦有熱口舌生瘡咽喉腫塞

蒲黃一兩　盆硝八兩　青黛一兩半

右用生薄荷汁一升將盆硝青黛蒲黃一処入銚盛慢火熬乾細研用一字或半分摻口內良久吐出痰涎妙喉中痛用竹管吹藥半分入咽膈內立效

(三十二) **消毒散** 治口舌生瘡咽喉腫塞兩唇腫裂

晚蠶蛾　五倍子　蜜陀僧各一兩

右同為末每用少許乾傳瘡上有津吐去

(三十三) **柳花散** 治口舌生瘡

玄胡索　黃連　黃蘗

右為末每用傳貼口瘡上有津液吐出再用

(三十四) 治口內生瘡

朴消一分　寒水石火煅過一兩南人謂之軟石羔

右同研入少朱砂如桃紅色傳患處嚥下不妨味苦加甘草

口氣

(三十五) **丁香圓** 治口內臭氣

丁香三分　甘草炙一分川芎二分　白芷半分

右為末煉蜜圓如彈子大綿裹一圓嚥化

(三十六) **治口臭方** 濃煎灯心湯口含良久吐出又含多含有效

(三十七) **傳法** 治熱壅上口攻舌生瘡用此法則熱歸於

下瘡即愈矣用呆朱更鹽爛傳脚板心

(三十八) 治虛壅上攻口舌生瘡

草烏一个 南星一个 生姜一塊

右焙乾為末每用三豕臨睡時以好醋調作掩子貼手脚心

(舌病) (三十九) 黑散子 治血熱舌忽然腫破

以釜底煤醋調傳舌上下脫去更傳能先決出血竟傳之尤佳一法用塩等分調

(四十) 薄荷蜜 治舌上生白胎乾澁難語

白蜜 薄荷自然汁等分調勻

右以生姜片先煎水指患處次以薄荷蜜傳之未効更以玄明粉塗之

(四十一) 文蛤散 治熱壅舌上出血如泉

五倍子 白膠香 牡礪粉各等分

右為末每少許摻患處少時温水嗽之

(四十二) 必勝散 治舌衄

蒲黃 螺兒青等分

右為末每少許摻患處少時温水嗽之

(四十三) 舌無故出血 名曰舌衄

炒槐花為末摻之

(四十四) 治重舌 新蒲黃為末摻之吐去又摻凡五七次愈亦治舌腫脹

(四十五) 文乃 五靈脂米醋一椀同煎旋漱立安

治舌腫脹用鵬砂為末薄姜片煎藥措腫漸消

牙齒

齒乃骨之餘亦骨乃腎之所主呼吸之戶門也精氣強則齒堅

堅腎氣衰則齒白豁且乎陽明大腸之脉入於齒灌注於牙倘風寒雜熱之氣鬱滯心胃衝發於口則齒為之病矣輕則宣露斷頭浮腫甚則為疳蟲齲脫之證也亦有腎氣虛雜齒痛宣露當以補腎藥以治之

冷痛 (四十六) 委陽散 治牙疼

蜈蚣頭 蝎梢去毒 草烏頭尖如麥粒大者
川烏頭底如豆薄各七枚 胡椒七粒 雄黃七粒如米大別研
右為細末用紙撚子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳內閉口少時即可取效

(四十七) 丁香散 治牙齒疼痛

丁香 草撥 蝎梢 大椒各十枚
右為末每用少許以指蘸藥擦於牙痛處有津即吐

(四十八) 華蘚散 治牙齒疼痛

華蘚 良薑 胡椒 細辛各等分
右為末每用少許含溫水隨痛處鼻內搐

(四十九) 雄黃定痛散 治牙齒疼痛

盆硝別研二分 雄黃別研 大蒜二枚細辛二分牙皂角四鋏
右為末同大蒜一處搗為膏如梧桐子大用一丸將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳內良久痛止頑涎休吐出藥漱數十次痛止

(五十) 治牙宣藥擦藥追出頑涎

華撥 胡椒 良姜 乳香 麝香 細辛 青鹽 雄黃
右各等分為細末先以溫鹽水刷淨後用藥末於痛處擦

熱痛 (五十一) 華蘚散 治風邪熱氣上攻齒齦浮腫或連頰車疼痛或宣露血出

荊芥 柳枝 槐角
鶴虱 地骨皮 槐白皮 葇本

右剉散每一兩水一鍾入鹽少許煎熟含冷吐之又含

(五十二) 甘露飲 加升麻治證同上 方見積熱門

(五十三) 金沸草散 治風寒傷於心脾令人增寒發熱齒浮舌腫

方見傷寒門

風痛 (五十三) 赴筵散 治風牙虫牙攻痛痰痛不可忍者

良薑去芦 草烏去皮 細辛去土葉 荆芥去梗各等分

右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久用

塩水灌漱其痛即止用腐皮末一半相和常使揩牙

(五十四) 治一切牙痛

川升麻 當歸 川乙金 細辛

華撥 白芷 荆芥各等分

右為末用乾合子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許揩在

牙痛處以温荆芥湯灌漱立效

(五十五) 定痛散 治牙風疫痛立效

細辛半兩生 白芷一兩生 川烏頭一兩生 乳香三分

右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以塩水灌漱濟

生方除白芷川烏用全蝎草烏

(五十六) 獨活散 治風毒攻蛀牙根腫痛

川芎 獨活 羌活 防風各半兩

細辛 荆芥 薄荷 生地黄各二分

右㕮咀每服三分水一盞煎八分温服

(五十七) 消風散 治風牙痛方見風門

蛀痛 細辛散 治風蛀牙疼或牙齦宣爛腮頷浮腫悉皆主之

荆芥去梗 縮砂去殻半兩 細辛去苗一兩 白芷二兩 紅椒

鶴虱 牙皂 草烏二兩各半兩

右為末每用少許於痛處頻擦之有涎吐出仍用水灌漱

五十九 双枝散 牢牙去風蛀蟲宣露一切齒疾並皆治之

楤枝（柳枝 各截四十九塞切碎）
朴枝
皂角不蛀者七莖

右同入磁瓶內固濟糠火燒一夜候冷取研揩牙用如常法

六十 虫蛀牙疼方

紅川椒三分 乳香一分

右為末溶蠟為丸麻子大每一丸塞蛀孔中

六十一 又方 莽草為末揉之三五次虫即無

六十二 取虫法 治牙有虫而痛

菲菜頭連根洗淨爛擂同人家廂板上泥和勻揉患處腮上用帛貼之一時頃取下細人虫在泥上可絕根

牢固 六十三 香鹽散 牢牙去風冷

大香附子 妙令極黑 三兩 青鹽半兩別研

右為末勻和用如常法乃鐵罐先生良方

六十四 陳希夷刷牙藥

猪牙皂角 生姜 木律 旱蓮

右用新瓦罐盛藥合口以麻繫定鹽泥固濟日乾穿一地坑先放新磚後放藥以罐口向下用炭火燒令青煙出稍存性去火經宿取為末每用刷牙溫水漱去

取落 六十五 取牙落不犯手

草烏 蕪荑各兩半 川椒 細辛各三兩

右為末每用少許揩在患牙處內外其牙自落

宣露 六十六 小煎散 治牙齒出血

白草霜 小煎

右為末揩牙上立愈

香附子 蒲黃各等分

六十七 又方 用屋遊即屋青苔洗去泥水煎入塩少許含之

六十八 地龍散 治牙齒疼痛宣露出血

地龍去土 玄胡索

右為細末每用綿子裹隨左右痛処於耳內塞之

咽喉 附 重舌

咽喉者為一身之捻要与胃相接呼吸之所從出若胃腸之間
蘊積熱毒致生風痰雜滯不散發而為咽喉之病喉內生瘡或
狀如肉菌為腫為痛窒塞不通吐噫不下甚則生出重舌治之
允宜先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又
有熱毒衝于上膈而生瘡謂之懸癰又腑寒亦能令人咽閉吞
吐不利臨病須詳審其証施以治法

風熱

六十九 荊黃湯 治臟腑實熱咽喉腫痛大便秘結咽喉之

証多是風熱上壅然後成之非實熱不可服方載積熱門

七十 玉鑰匙 治風熱喉閉及纏喉風

焰消一兩半 鵝砂半兩 腦子一字 白姜蚕一分

右研勻以竹管吹半豕許入喉中立愈

七十一 碧玉丸 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或
生瘡口舌不吉並宜服之

青黛 盆硝 涌黃 甘草末各一兩

右同研勻用沙糖丸每兩作五十元每服一元噙化或用乾
藥末摻咽膈內亦好

風痰

七十二 備急如聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下
牙關緊急不省人事

雄黃細研 桑皮生用 白礬飛 猪牙皂角去皮炙黃

右等分為細末每用一豆大吹入鼻內嗌立効

(七十三) 如聖散 治風痰雍盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急

鵬砂 細研 白礬飛過 豬牙皂角去皮炙黃

右為末用一字嗑入鼻內吐痰為愈

(七十四) 甘桔湯 治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所礙

甘桔梗二兩 甘草炒二兩

右以水一盞煎七分食後溫服 每服三錢水一盞

(七十五) 解毒雄黃丸 治纏喉風及上膈壅塞痰涎不利咽喉腫痛

雄黃飛 礬 並各一分 巴豆去皮出油二十七个

右為末醋糊丸如粟豆大茶清下七丸吐出頑涎即愈

急閉

(七十六) 白礬散 治纏喉風急喉閉

白礬三錢 巴豆二枚去殼分作六片

白礬於銚內慢火熬化為水置巴豆其內候乾去巴豆

取白礬研為末每用少許以竹管吹入喉中立愈本事方去巴用烏雞子清調白礬灌入喉內

(七十七) 如聖勝金鈴 治咽喉急閉腮頷腫痛并鼻娥双蛾結喉重舌木舌並皆治之

硫黃 細研 川烏 炮一 硝石 研一 臘茶 薄荷去枝梗 生地黃各二兩

右為末烈生姜汁搜和為鈴每服先用新汲水灌漱次嚼生薄荷五七葉却用藥一鈴同嚼極爛以井水嚥下甚者連進三服并以一鈴安患處其病隨藥便消

(七十八) 二聖散 治纏喉風急喉痺

鴨嗉膽礬 一分半

右為末每用少許以竹管吹入喉中

(七十九) 家藏方一字散 治咳喉閉氣塞不通飲食不下者

雄黃一分別研　蝎梢七枚白礬生研　麝香一豬牙皂角七挺

右為末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎為愈

治喉痺痛用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少擂爛取汁吞下或動大腑即解或用醞酒同研取汁嚥引出涎瘀妙

治咽喉腫痛方用嫩支葉旋取研汁逐時吞下亦佳

(八十一) 治喉閉用鼓槌草土牛膝以二味生搗爛取汁灌下否則灌鼻中得吐即為愈

(八十二) 治咽喉用土烏藥即矮檀根以酸醋兩盞煎一盞先嚥後嚥咳吐出痰涎為愈

(八十三) 治咽喉牙關緊閉用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在紙上以此紙作撚子點灯吹滅以煙薰入鼻中即時口鼻涎流牙關開矣

治走馬咽痧

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右俱有者用二枚

(八十四) 治咽喉腫閉以山豆根洗淨新汲水浸少時用一塊入口中嚼之嚥下苦汁未愈再用又方用甘草白礬為末每以半錢許入口中津液嚥下

(八十五) 蘭香朱砂圓 治咽喉腫閉或作瘡瘍或舌根脹痛

馬牙消生用七錢　龍腦三錢　燒宻水石揀淨者半斤　鉛白霜三錢　鵬砂三兩　朱砂兩半甘草一十兩麝香二錢

右研極細用甘草膏和丸如梧桐子朱砂為衣嚥化一二元

(八十六) 烏犀膏 治咽喉腫痛及一切結喉爛喉渣蟲纏喉閉喉痺飛絲入喉重舌木舌等證

皂莢兩條搥碎用水五升浸一時久搓汁去滓入瓦器內熬

令成膏好酒一合百草霜研一分同皂角膏撓勻令稠
硇砂 人參一分為末醋消白梅霜少許並研入膏中
右拌和前藥用鵝毛點少許於喉中以出盡頓涎為度却嚼
甘草二寸嚥汁吞津若木舌先以粗布蘸水揩舌令軟次用
姜片擦之然後用藥

(八十七)五香散 治咽喉腫痛毒氣結塞不通急宜用之
木香 沉香 雞舌香 豁各一分 麝香三分別研 薰陸香 一兩
右為末入麝香研勻每服二錢水一盞煎服不拘時

寒證 (八十八)蜜附子 治腑寒咽閉吞吐不利用大附子一隻去
皮臍切作大片蜜塗炙令黃含嚥津甘味盡更以附子片塗
蜜炙用

咽瘡 (八十九)絳雪散 治咽喉腫痛毒氣結塞不通急宜用之
龍腦半字 鵬砂一分 硃砂三分 馬牙硝半分 寒水石一分
右研勻每用一字摻於舌上津嚥之

(九十)牛蒡子湯 治風熱上攻壅咽喉腫痛或生癰瘡有如肉窠
牛蒡子 玄參 升麻 桔梗去芦 木通去節 甘草各等分
右㕮咀每服四分水一盞薑三片煎八分溫服不拘時

(九十一)利膈湯 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡
雞蘇葉 荊芥穗 防風 桔梗 人參 牛蒡子隔帝炒 甘草各一兩
右為末每服二錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩
更佳

髮髮鬒

澤潤 (九十二)犀皮湯 治髮髮乾燥能令潤澤

小麥麪半升 半夏湯洗七次 沉香半兩 生姜一兩 和皮
右用水二椀生姜一兩和皮細切同煎去滓取清汁入脂麝
少許撹勻洗髮髮自然潤澤

九十三 洗髮菊花散
甘菊花 蔓荊子 乾栢葉 川芎
桑白皮 生用 白芷 細辛 去苗 旱蓮根並花葉 各二兩
右㕮咀每用藥二兩漿水三椀煎至兩椀去滓洗髮
髮脫落能令再生

九十四 三聖膏 治髭髮脫落
黑附子 蔓荊子 栢子仁 各半兩
右爲末烏雞脂和搗研乾置瓦合內封固百日取出塗在髭
髮脫處三五日即生白髮自然牢壯不脫

九十五 巫雲散 治髮髭鬚黃白不黑
膽礬 五倍子 百藥煎 訶子

細辛 青胡桃皮 醋石榴皮 木瓜皮
牙皂角 何首烏 各等分
右爲末煉蜜丸如小豆大常於木炭灰內培養勿得離灰如
要烏髮時用熱酒化開塗髮髭鬚上好熱醋亦可

染法 九十六 治髮髭鬚黃赤一染即黑
生姜半斤 生地黃一斤 各淨洗研自然汁留滓
右用不蛀皂角十莖去黑皮并筋將前藥汁釀皂角慢火炙
黃用藥汁盡為度前藥滓同入鐺內用火煅存性為末用鉄
器盛藥末三匁湯調停三日臨睡將藥離髭鬚即黑

名方類證醫書大全卷十九

癰疽瘡癤

凡瘡之痛痒自偶虛實寒熱故痛而實者爲熱虛而痒者爲寒經云諸瘡痛癢皆上於心以心主血而行氣氣血凝滯而爲癰疽瘡癤一寸以上曰癰疽一寸以下曰瘡癤諸瘡之中惟背疽一瘡最爲急證其初發也使身体或先熱而後惡寒或先養而後痛若其不痛最爲惡證且如背疽始生如黍粟粒大終有貪時使用艾於痛處灸之痛則灸至痒痒則灸至痛使毒氣隨火而散若失之於初瘡勢已成又當審其虛實寒熱熱實則清之虛寒則温之後毒消膿潰方爲可治之證一瘡者必發於手足之間生黃泡其中或紫黑色有一條如紅線直上者卒之

際急宜以針於紅線所至之處刺出毒血然後以蟾酥乳香膏等於正瘡上塗之針時以病者知痛出血為好否則紅線入瘡攻心必致危困至若漫腫頸疽豚癰之類皆毒氣鬱積於內發而為此治之皆須解毒潰膿若氣血弱者又須生之此一定之法若癤疔癬之類隨其臟腑所受冷熱調之所貴氣血宣流自失其痛痒矣如胸外兼瘡久年不愈者多是腎水流注又有脾水潰溢治各有方隨證選擇

（初發）（一）忍冬酒 治癰疽發背不問疽發何処一切癰腫及婦人乳癰皆有奇効

忍冬藤生取一把以葉入沙盆內爛研入餅子酒少許生餅酒尤佳調和稀稠得所塗付四圍中心大留一口洩其毒氣其藤只用五兩用木槌微〻打損不犯鉄器

右二味入砂瓶內以水二椀文武火慢煎至一椀入無灰酒一大椀再煎十沸去滓分三服一日一夜喫尽如病勢重更進一服如無生者可用乾者但力輕耳

（二）車熬散 治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等皆宣宣毒利下熱退為度

紫背車熬一双 塩泥固濟火煨紅地上出火毒 輕粉 甘草各二分 大黄五分 黄芩 漏芦 瓜根各半両

右為末每二分薄荷湯或酒下

（三）五香連翹散 治一切積熱結核瘰癧癰疽瘡瘤沉香不見火 連翹去蒂 射干 桑寄生 死胎以丁香去枝梗不見火 獨活羌活亦可 木通去節 升麻 大黄蒸各三分 甘草生一分 乳香研 没藥研 麝香一分半研

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服以利下惡毒為度本方有竹瀝竺黄隨熱輕重當自添減

（四）九珍散 治一切癰疽瘡癤腫毒因氣鬱血熱而生者

赤芍藥 白芷 當歸 川芎 大黃
甘草 生乾地黃 菰蕈 黃芩各等分

右㕮咀每服四錢水二盞酒一盞煎至兩盞去滓熱服兼治婦人乳癰等瘡

（五）黃耆建中湯 加附子方見自汗門 治氣体虛弱之人患背瘡頸疽不知痛痒瘡勢不作急宜服此以生血潰膿有熱者不可服

（六）瀹蠹湯 治癰疽發背及一切熱毒成瘡赤腫者

瀹蠹 黃芩 白及 麻黃去節各四兩 大黃三兩
白斂 升麻 芍藥 粉草炙各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服本方有芒硝今去之若見熱而實者加大黃五兩或加芒硝皆可

（七）單煮大黃湯 宣熱拔毒大便秘者方可用此

大黃剉如豆大每服三錢水煮服即快利

追毒（八）狗寶丸 專治癰疽發背附骨疽諸般惡漏等瘡

雄黃一錢 金頭蜈蚣七個 烏金石即石炭 袁州萍鄉縣有之二錢
乳香別研一錢 鯉魚膽七個乾者用之去皮臟月者尤佳
沒藥別研一錢 狗膽一個乾者用之去皮純黑狗腰中得之
蟾酥二錢 狗寶一兩生用癩狗腰中得之
羽砂一錢
輕粉一錢 麝香一錢 黃蠟三錢 粉霜一錢別研
鉛白霜一錢 頭首孩兒乳一合

右先將頭首兒乳黃臘放在銚內文武火化開用前藥末和成劑要用旋圓如麻子大每服一圓至五圓用白丁香七箇直者以新汲水化開送下狗寶圓要以下病食前服腰以上

食後服妊入行五里用熱葱白粥投之即以衣被盖定汗出為度已後只喫白粥常服十奇散留頭與四邊以烏龍膏貼

九 追毒用治癰疽丁腫諸惡瘡黑腐者先服狗寶圓汤貼以烏龍膏收腫散毒去赤暈然後用針刀開瘡納追毒丹使之潰然後去敗肉拼膿隨證治之

巴豆七粒去皮心腹不去油研如泥 白丁香一分

雄黄 黄丹各二分 輕粉一分加增酥尤神速

右研和加白麪三分滴水為圓如麥狀針破瘡納之上覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治者亦以此法追毒去死肌生新肉疾小者用一粒大者加用之

十 神仙截去治癰疽發背一切惡瘡服此毒氣不內攻

麻油半斤銀器內煎十沸出候冷用無灰酒兩椀侵油內重湯温稍熱通口急服一日尽之為妙

十一 解毒惡病丸治癰疽發背及諸腐瘡人多不識治之謂風癰瘭赤腫丹瘤能辨一切毒被狐狸毒鼠并毒蛊菌河魨毒食疫死牛馬肉毒或蛇犬惡虫所傷

五倍子三兩 山慈菇二兩 續隨子去壳研去油取霜一兩

大戟一兩半 射香三分

右除射香續隨霜外為末却入二味研勻用糯米煮濃飲為丸分作四十粒每一粒研生姜薄荷汁井花水研服合時宜用端午七夕重陽日合或遇天德月德日尤佳要在淨室焚香至誠端製毋令婦人雞犬孝子不具足人見之乃衛生之宝也

止痛 十二 乳香丸治發背癰疽一切瘡瘍潰痛不可忍者

當歸 川芎 羌活 桂 白芷 獨活

真乳香 五靈脂各五分 白膠香五分

沒藥各二三分

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸薄荷湯嚼下手足諸般
損痛不能起者加草烏五錢用木瓜煎湯下

(十三)乳香膏 追膿血消惡毒
木鼈子 去殼細剉當歸 各一兩 柳枝七八寸寸剉之
以上以清油四兩慢火煎令黑色次用
乳香 沒藥 各半兩 白膠香 明淨者四兩共研細入油
煎化以綿濾之

右再治淨鐵銚又傾前藥油蠟在內候溫入黃丹一兩半以
兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起住攪直待注
在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水盆中出
火毒搜成劑收之遇用貼開

(十四)乳香散 治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多令人
嘔吐應干毒瘡並皆治之

綠豆粉 四兩 乳香 好者二兩
右同研極細每服二錢新汲水濃調食後服

(十五)消膿毒之專用塗諸瘡疽
川烏 蚌粉 草烏
右為末用生地黃汁調塗患處

(十六)排膿托毒散 治一切瘡癤癰毒已破未破悉皆治之
地鱉蟲 赤芍藥 當歸 甘草 各等分
右為末每服二錢溫酒調下不拘時

(十七)復元通氣散 治諸氣滯耳聾腰膿便癰瘡疽無頭止痛
消腫
青皮 陳皮 各四兩 川山甲炮 括蔞根 各三双
加金銀花 連翹 各一兩 甘草三双生熟各半
右為細末熱酒調下

(十八)【懸薬散】治發背惡瘡
懸蒌一个大黄一兩當歸五分金銀花一对皂角刺一兩
右剉碎用酒一椀煎至七分去滓温服如有頭者加黍粘子

【已潰】(十九)【内補十宣散】治一切癰疽瘡癤未成者自然消之已成者能令速潰兌瘡痒者多是血虚此藥最能消風生血
人參去芦黄耆鹽湯浸焙當歸洗焙各二兩厚朴姜製甘草生用
桂心不見火去芦川芎
右同為末每服三分熱酒調下不飲者木香湯調服

(二十)【梔子黄芩湯】治發背瘡潰後因飲食有傷發熱不止
梔子連翹
黄芩防風
石韋無以柴白皮代白茯苓生甘草升麻
人參苦參各二分黄耆二兩
為粗末每服四大分水一錢煎六分去滓温服

(二十一)【黄芪六一湯】癰疽已潰大渴不止
綿黄芪六兩鹽水潤濕飯上蒸三次焙乾剉 粉草一兩用半生半炙
右為末每二錢白湯下當湯水服

(二十二)【八味丸】治証同上方見虚劳門

【通治】(二十三)【豁志酒】用豁志一味洗淨去心焙乾為末酒調二錢澄清服以滓傳患處治一切癰疽發背瘡毒惡候

(二十四)治發背已潰未潰者皆取有神效及一切癰疽
厚朴生薑製陳皮去白 甘草二分炙
右入桑黄芪五分同為末癰未潰浸米泔水一盞煎至八分温服

(二十五)【一醉膏】治發背脳疽一切惡瘡
甘草半兩為粗末 没藥一分研
右用無灰酒三升煮至一升放温頓服如一服不盡作三次

(二十六)【杯木飲子】治諸瘡腫發背癰疽

乾杠木葉　乾荷葉　乾萱草根　甘草　地榆各一兩
右剉每服五錢水煎服未成者自消已成膿者自乾

(二十七)黃蘗丸　治一切癰疽腫毒已潰皆可服
生肌末潰已潰皆可服
白蘞一兩　黃蠟半兩
和丸梧子大每服十丸漸加至二十丸白湯或酒下

(洗方)(二十八)薯蕷湯　治一切癰疽腫壞消毒氣去惡肉凡瘡有口便要用此湯洗
白芷　生甘草　羌活　露蜂房
黃芩　赤芍　當歸各等分
右用猪前蹄兩隻一斤水煮汁湯以湯煎此藥去滓以湯溫洗

(二十九)越桃散　洗諸癰瘡
越桃一名梅子　黃芩　甘草　當歸　羌活　白芷各等分

右收咀每用一兩水五椀煎至四椀去查溫洗

(三十)黃蠟膏　治癰疽腫毒以黃蠟炙花用塩摻收入磁器密封經年不壞每用患處傳之若無花葉皆可

(三十一)透膿散　治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服不移時自透索有効驗
蛾口蚕用出子蛾兒蚕兒

右將蚕兒一个燒灰用酒調服即透切不可兩个三个蚕兒燒服若服一个只一个瘡口若服兩个三个即兩个三个瘡口切勿輕忽

(傳貼)(三十二)烏龍膏　治一切腫毒癰疽收赤暈
木鼈子去殼半夏各一兩水粉四兩　草烏半兩
右於鐵銚內慢火炒令轉焦為末出火毒研以水調傳瘡

(三十三)聖效散

黃栢　川山甲炒焦各一兩　檳榔
木香各半兩　雞肫至七枚生用焙
右為末每用少許候大膿出盡方可摻瘡口上

(三十四)【神異膏】治癰疽膿爛及諸瘡口不合
雄黃一兩　滑石燒半兩
右為末洗后摻瘡上以綿子覆護免洗後破爛者用此貼之

【乳癰】(三十五)【瓜蒌散】
瓜蒌仁二三錢酒擂爛入乳香末一錢熱酒調服熱甚者加石膏末少許

(三十六)【真珠膏】治乳初發癰時便服即散
真珠子一味以酒擂爛去滓溫酒熱服以滓封傳患處

【心癰】(三十七)治心癰依寒熱口乾飲水渾身痛腹內作熱頭面赤先以【何首烏散】次服【乳香散】五香連翹散已潰者多服內補

十全散　方並見前

(三十八)【何首烏散】治癰疽發背折傷救壞病活死肌餌患於未萌之前拔根於既愈之後大能順氣均血先服此使氣血和暢然後隨治疾無不安
何首烏　當歸　木通　赤芍　白芷
甘草　各等分

【腎癰】(三十九)治腎虛嗜飲過度外挾寒邪發為癰腫不可施以涼劑宜【八味丸】加【十全散】服之兼用葱白桔葉椒葉煎湯淋洗仍以【神異膏】貼之方並見前

【肺癰】(四十)治男子婦人嗽而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭小便赤大便秘是曰肺癰實者先投

金匱散四服盡者先投**小青龍湯**四服後服**桂枝湯**為妙

(四十一)**薑葉湯**治肺癰吐膿

薏苡仁　瓜蔞仁　桃仁各等分

右剉每四錢先以薑葉一握水二盞煎取一半去滓入藥再煎七分食後服一方不用薑葉用側栢

(四十二)治腸癰壯熱微汗氣急小腹痛大便澁已成未成皆可用**瓜子湯**

當歸一兩　甜瓜子一合　蛇退皮一尺

右剉每四錢水煎服利下惡物為妙

(四十三)**牡丹散**治腸癰未成膿腹中痛不可忍

牡丹皮　敗醬　甜瓜子

木香　赤芍　桃仁　芒消　大黃

等分每四錢水煎服

(四十四)便毒之證皆因內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛初發用**何首烏散**數服次**五香連翹散**兼治服之後用雄黃乳香黃柏等分為末水調傳之自平方並見前

(四十五)俗名鼠鼷又謂瘰癧初作未作之時以天門冬去皮心半水半酒煎熟服即愈

又方治偏墜便毒初發以生姜一大塊米醋一合以姜離醋磨取干步塗泥數重處即消(干步峯即人家行步地上有高堆塊者是)

(四十六)治魚腸丁瘡

絲瓜葉即瓠瓜葉　連鬚蔥　韭菜

右入石鉢內擣爛如泥以酒和服以滓貼腋下如病在左手貼左腋下右手貼右腋下在左胸貼左胯右脚貼右胯如在中則貼心臍並用布帛縛住候肉下紅線處皆白則可為安

如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顫倒倒則難救矣

(四十一) 治丁瘡用耆耳根葉苗子一色者燒灰為末用醋拌調塗瘡上毒根即出或蓋數調吃好有用前藥濃煮以淬傳瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡

又方 治丁瘡最有功效用蟬蛻殭蚕為末酸醋調塗四圍留瘡

又方 治丁瘡

黃連　羌活　白殭蚕　青皮　獨脚茅　防風
赤芍藥　獨活　蟬蛻　細辛　甘草節　各等分

右㕮咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許童子錢重同擂爛熟酒和服然後用酒水各半盞煎三片煎服病勢退減後再加大黃少許煎服裹下一兩場蕩去餘毒更用白梅耆耳子研爛貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀之甚若不切然効驗神速累試之驗

(四十八) 繫瘤法 以羌花汁浸線一宿以線繫瘤旋摧緊即落

(四十九) 治皮膚項面上生瘡瘤大者如拳小者如栗或軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輒用針灸用生南星大者一枚細研調粘滴好醋五七滴為膏如無生者則以乾者為末醋調如膏先將小針刺痛處令氣透却以藥膏攤紙上象瘤大小貼之氣養則頻貼取效

(五十) 破結散 治不癭氣癭筋癭血癭肉癭等證

海藻洗　龍膽　海蛤　昆布洗　礬石煅　松蘿　各三分　麥麵四分半　夏湯洗七次

右為末每服二錢酒調服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菓等物

瘰癧

夫瘰癧之病即九漏是也古者所載各狀大槩不一難以詳述

及其生也多結於項腋之間累累大小無定發作寒熱膿水潰漏其根在藏府蓋肝主狼漏胃主鼠漏大腸主螻蛄漏脾主蜂漏肺主蚍蜉漏心主螘蟻漏膻中主浮蛆漏腎主瘰癧漏小腸主轉脉漏原其所自多因寒暑不調或由飲食乖節遂致血氣壅結而成也巢氏所載生死反其目而視之其中有赤脉上下貫瞳子見一脉一歲死一脉半一歲死見二脉半死二脉一歲死見二脉半二歲半死若赤脉不下貫瞳子可治三因云有是說驗之亦有是證理宜然也

〔五十一〕治瘰癧

薏苡　**黑牽牛**　各二錢

斑猫二十八隻去頭翅足用糯米炒

右為末臨睡時先將滑石末一錢服訖如小便無惡物行次日服五更初却用温酒調藥一錢服五更初却用温酒調藥一錢早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服更以橙心湯調琥珀末一錢重服之以小便內利去惡毒為愈

〔五十二〕三聖圓治瘰癧

丁香五十个　**斑猫**十个　**麝香**一字別研

右為末用獨蒜五十粒湯浸爛如泥和前藥令勻圓如菉豆大每服五七圓食前温酒送下日進三服至五七日外覺小便淋瀝是藥之效便加服或便下如青筋膜之狀是病之根也忌濕麪毒食

〔五十三〕已驗方治瘰癧瘡已作者

烏雞子七枚　**斑猫**四十九个去頭足翅

右每雞子一个去頂用筯攪勻入斑猫七粒以帛糊蓋於飯上蒸熟取開去斑猫食雞子前生料五積散薰每日如此服

至七日則七箇已破者生肌未破者消散

【通治】（五十四）乳香散 治瘰癧攻心嘔吐可辟其毒方見癰疽門

（五十五）黄蠟卷五 治瘰癧神效方見癰疽門

（五十六）白花蛇散 治九漏瘰癧發於項腋之間痛痛增寒發熱

白花蛇酒浸軟去皮骨焙乾秤二兩　生犀鏑半分

黑牽牛半兩一半生用一半炒　青皮半兩

右爲末每服二錢貳粉半錢研勻五更糯米飲調下以利下惡毒爲度十餘日再進一服可絶根源

（五十六）四聖散 治瘰癧用花蛇取利後用此補之

海藻洗　石決明煅　羌活　瞿麥穗各等分

右爲末每服二錢米湯調下

（五十七）連翹圓 治瘰癧結核或破未破者

皂角一挺水浸去皮裂取汁

薄荷新者二斤取汁

以上二味一處於銀石器內熬成膏次入

青皮一兩不去白　陳皮一兩不去白　黑牽牛一兩半生半炒

皂角子慢火炮去皮取皂子仁搗羅爲末兩半

右五味爲末用前膏子爲圓如梧桐子每服三十圓前連翹湯食前送下

（五十八）牛蒡子圓 治風毒結核瘰癧腫痛

牛蒡子微炒　何首烏各一兩　乾薄荷　雄黄各一兩

麝香　牛黄各半　皂角七挺水二升搗汁熬膏

右爲末以皂角膏圓如梧桐子每服二十圓煎薄荷湯下

傳貼（五十九）蝸牛散 治瘰癧已潰未潰皆可貼

蝸牛即蝸螺不拘多少以竹索串尾上晒乾焙存性爲末入

輕粉少許猪骨髓調用帶花量大小貼之

（六十）螺公散 六日螺并殼肉燒存性灰破者乾貼未破者清

油調傳之

(六十一) 【傳癘方】先用白芷荊芥煎湯洗拭乾好膏藥貼出膿汁盡用後藥傳

半夏　南星

右為末以津唾調傳

(六十二) 【傳癘散】

五倍子　海螵蛸　秫柳　雷丸　射香　五靈脂

右為末乾用清油調傳濕則乾摻

(六十三) 【又傳方】木鼈子二枚草烏半兩以米醋磨入擂爛葱白連根(蚯蚓糞)少許調勻傳之

(六十四) 【雞內金】治瘭癤效

先以水煎桃葉及枝時常洗瘭拭乾以雞卵蒸熟取黃熬令黑色塗患處

(六十五) 【歛瘡口】

血竭

棗子燒灰半錢　射香少許

右為末津唾調傳

【灸法】(六十六) 以手仰置肩上微斜肘取之肘骨尖上是穴隨患處左即灸左右即灸右兩邊俱發則左右皆灸艾壯如小筋頭大每灸如前三次灸永不發無患如四五年用藥不退辰時着灸申時即落所感稍深三作即三灸而安

【灸法】若未破者只以羔擣貼瘡上七壯一易蒜多灸取效

瘡疥

瘡疥之為病雖若不害人然而至難可者多矣諸痛痒瘡屬於心多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊於腸胃發見於皮膚古方所謂馬疥水疥乾疥濕疥今之所謂熟瘡冷瘡惡瘡反花瘡腫

臀 音兵去声 膿起痛也

類不一生於手足乃至遍躰或痒或痛或臀或腫或皮肉隱疹或爪之凹凸或疥癩或膿水浸淫治之當理心血散風熱外則傳洗而愈矣

〔瘡疥〕〔六十七〕**芎歸丸** 治肺受熱毒遍身生瘡用苦參為末粟米飯和丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下

〔六十八〕**加味羌活飲** 治四氣外搏肌膚發為癮疹增寒發熱身痛

羌活　前胡　各一兩　人參　牛蒡子　各半兩　甘草　天麻　蟬蛻　薄荷　各三分

枳殼炒　川芎　桔梗　茯苓　各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞生姜三片煎七分服

〔六十九〕**升麻和氣飲** 治瘡疥發於四肢痛痒不常甚至增寒發熱淫淫下濕痒並皆治之

升麻　大黃蒸半兩　熟枳殼半分　熟薏米

乾葛半兩　乾薑一兩　芍藥七分半　白芷

桔梗　陳皮

甘草　各兩半　熟半夏　當歸　茯苓　各半分

右㕮咀每服四分水一盞生姜灯心同煎食前服

〔七十〕**平血飲** 治身生瘡膿血臀腫極痛且痒

乾葛　赤芍

天麻　蟬退　各五錢

右剉為人參敗毒散合和生姜薄荷生地黃麥門冬煎大效

〔七十一〕**酒炙黃連丸** 治証同上方見積熱門

〔七十二〕**當歸飲子** 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或腫或痒或膿水浸淫

當歸去芦　白芍藥　川芎　生地黃洗　甘草炙各半兩

防風去芦　白蒺藜炒去刺　荊芥穗酪一　何首烏　黃耆去芦　半兩

右㕮咀每服四分水一盞姜五片煎服不拘時

〔七十三〕**回首湯** 散治脾肺風毒遍身癬疥搔痒或致肌肉頑麻

并紫癜白癜風並皆治之

荊芥穗　蔓荊子 去皮　蚵蛸 去土　威靈仙 洗
何首烏　防風 去芦　甘草 炙各等分

右為細末每服二錢食後温酒調下

(七十四) 赤小豆湯 治瘡後遍身發腫方見水腫門

(傳方) (七十五) 合掌散 治徧身生瘡百治不効

檳榔 五个 末 硫黄 五錢末 臙粉半錢

和勻每一錢安於手心内油調夜卧時塗其腎不得洗手但擦手令乾可也三日瘡即愈

(七十六) 蔡花散 治一切瘡熟

麝金　黄連　黄柏　梔子仁　槐花

等分為末冷水調成膏傳之痛即止

(七十七) 一掃散 治一切瘡疥

藜蘆皮二兩 蚌粉　水粉各一兩 輕粉十貼 雄黄五錢

右為末用大鯽魚一箇入香油煎候熟去魚以油調藥傳之效可治石末少許研杏仁十粒近陰囊勿用

(七十八) 殺疥藥

水銀滓研末黄蠟猪脂調擦之

(七十九) 真平胃散 治腫後作瘡或水泡成瘡是脾土崩害及一切瘡清油調傳濕則乾掺方見脾胃門

(八十) 神異膏 治一切瘡瘍

全蝎 七个 去毒　皂角一錠　巴豆去殼 二十粒
清油一兩　黄蠟半兩　輕粉一字　雄黄二錢

先用皂角全蝎巴豆煎油變色去了三味入蠟化開取出冷入雄黄蛇床末輕粉和勻先以苦參湯洗石以藥擦之發於皮膚變生瘡癬痒不常

(八十一) 如聖散 治肺臟風毒

蛇床子半兩 黃連去鬚二分 胡粉一兩結砂子
水銀一分同胡粉點水研黑盡
右為末用清油調稀每用藥時先以鹽漿水洗瘡令淨後以
此藥塗之乾即換不過三五度瘥

(八十一) 治積年疥癩不愈者
水銀三分及杀末少許於瓦器用津液擦化作末 輕粉三合
狼毒一兩置水中取沉者以一半炒為末一半生用
右用清油出藥面一寸高浸藥三日候藥沉油清黑夜不見
燈火只點清油塗瘡上仍以口鼻於藥盞上吸入藥氣

(八十二) 定粉散 治熱汗浸漬成瘡腫痒煩痛
定粉一兩 蛤粉九兩半 石膏 白石脂 各半兩
滑石八兩半 白龍骨半兩 粟米粉 寒水石 燒出毒各二兩
右為末研令極細每用少許乾擦患處

(八十四) 竹如膏 治黃泡熱瘡
清油二兩 青木香半兩 青竹茹團小杏仁二十七粒去皮尖
右用藥入清油內慢火煎令杏仁色黃去滓入松脂末半兩
熬成膏子每用少許擦瘡上

(八十五) 桃花散 治一切瘡生肌藥
白及 白斂 黃柏
乳香別研 鹿蓉香別研 黃丹各等分
右為細末摻於瘡上三二日生肌平滿

(頭瘡) 治惡風瘡 極痒用藥治根不拘多少為末先洗頭須避
風候未至十分乾時却用藥摻定須要藥入髮至皮方可

(八十六) 治頭瘡 先以本人小便燒秤錘令紅投小便中洗瘡皮
皆去然後以帛拭乾用滴青五文研末用油魚三箇以灯盞
燒成油調滴青傳之三日效

(八十七) 治虛壅上攻滿口生瘡

草烏　南星　各一个　生姜一大塊

右為末每服一錢臨睡時用醋調作掩子貼手心脚心

(八十八) 膿瘡

用黃酒堤頭上乾泥土研細末麻油調成膏再用煮酒堤頭

弱葉量瘡口大小樣剪二片將一片弱葉背攤藥不令浆出

弱外再將一片合之以弱葉光面貼在瘡上用帛包扎定儘

膿水流出三兩日一換即生石榴肉用忌口

(八十九) 又方

先用鹽湯洗令淨用上等好砂糖以津唾調和傳之

(九十) 治外腎腳瘡

用累經燒過窰龜黃土研極爛入黃柏末

石膏黃丹輕粉拌勻以清油調稀用油綿盛藥傳瘡上却以

布綿縛定藥縱痒不可以手開動直俟十數日後瘡愈却去之

(九十一) 治外腎攤瘡

用抱(音刨)卵殼(音巧)鴉爪黃連輕粉各等分

為末前過清油調塗

(九十二) 烏荊丸

治肝腎風痒瘡方見風門

(九十三) 神授丸

治外腎濕痒瘡方見勞瘵門

(九十四) 治外腎痒瘡

用抱(音刨)卵殼(音巧)黃連輕粉等分為末煎過清

油塗先用香附子白芷五倍子煎水洗

(九十五) 陰蝕瘡

豆粉一分　蚯蚓二分　用水研塗上乾又傳之

(九十六) 陰囊上瘡

甘草煎湯温洗却用膩粉末傳之

(九十七) 陰頭生瘡

用淡蝲蛄(音九又)溪港中螺舊者炒存鍋中煅為末先以鹽湯洗了

右傳上

(九十八) 疝精瘡

用田螺兩箇大者和殼燒存性為末入輕粉搽患處

(九十九) 五物膃臜淫汁方

大腹皮一升苦參末各二兩煎水洗拭乾以津液塗濶次
油髮燒存性入白礬末少許傳遂日煎洗搽藥或加乳香末
仍服黃蘗丸以髮灰末飲調吞下方見雜痘門

(一百) 腎臟風攻攣疥

大紅棗去目水浸濕半日夾生杏人研膏抹兩手掌揉外腎
女以兩手揉兩乳各睡至醒次日又用

癬 (百二) 胡粉散治一切瘡癬癢痒甚者

胡粉一分 砒半分 大草烏一枚生用 蝎稍七枚
雄黃 硫黃各別研一分 斑猫一枚 麝香少許

右為末先用羊蹄菜根離醋擦動次用少許藥擦患處

(百二) 烏鬚圓治宿患風癬遍身黑色肌躰麻木痺痛不常

用草烏頭一介刮洗去皮令極淨攤乾用清油四兩鹽四兩
同藥入銚內炒令深黃色傾出剩油只留鹽并藥再炒令黑
色煙出為度取一枚劈破心內如米一點白者恰好白多再
炒趁熱杵羅為末醋糊圓如梧桐子每服三十圓空心温酒
下然草烏性差熟難製五七日間以烏豆黃粥解毒

(百三) 如意散治疥癬無時痛痒愈發有時不已久新者

吳茱萸 牛李子 荆芥各二分
輕粉半分 信砒二分

右為細末研勻每臨卧抄壹錢油調徧身搓摩上一半如後
痒不止更少掠塗之股髀之間聞香悉愈

(惡瘡) (百四) 治一切惡瘡醫所不識者

水銀 甘草 黃連 松脂黃明者
臘粉 黃蘗
土蜂窠以泥做着壁上者南方多有之

右取水銀放在掌上以唾擦爲泥入甕器中以清油和勻生絹濾如稀餳和藥末再研如稠餳先以温水洗瘡以帛拭乾塗之一切無名腫毒或痛或痒并有黄水者塗即愈治疥尤妙

(百五) **惡瘡方**

白膠香一錢 明白礬三錢 黄丹二錢

右爲末先煖漿水洗拭乾清油調傳

(百六) **又方** 治惡瘡及人面瘡 鼠母爲末入雄黄少許搽之

(百七) **淨肌散** 治一切惡瘡

雄黄 海螵蛸 大腹皮 宣連

水粉 輕粉 蚌粉 杏人

右爲末麻油調傳

(百八) **苦練膏** 治惡瘡治大人小兒瘡疥

苦練皮燒灰猪脂調傳

(百九) **苦參湯** 洗一切惡瘡

苦參 蛇床子 白礬

等分水煎放温洗

皸裂 (百十) **治手足裂**

白及不拘多少爲末水調塗裂處

(百十一) 治手足皸裂春夏不愈者

生薑汁 紅糟 鹽

右研爛炒熱擦入皸内一時雖痛少頃便皮軟皸合再用即安

(百十二) **治新舊皸** 用頭髮一大握桐油一椀於瓦器内熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用百沸湯泡洗皸裂令軟拭乾傳其上即安一方加水粉

(百十三) 用五倍子爲末同牛骨髓填縫内即好

(百一) **選方** 治手足皸裂用滴青二兩黄臘一兩共熬撚勻瓦罐

盛貯先以熱湯洗令皮軟拭乾將藥於慢火上畧炙溶傳之

〔百一選方〕治凍瘡用茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

〔百一選方〕治脚指縫爛瘡搔鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒灰存性為末濕則摻之

〔湯火瘡〕凡被火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛愼勿以冷物塌之熱氣不出爛入筋肉

〔百十四〕治湯火傷未成瘡者用小麥炒黑為度研為末臘粉減半油調塗之

〔百十五〕〔赤石脂散〕治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂　寒水石　大黃各等分

右為末濕用乾摻乾用雞子清調塗傷處

〔一方〕以杉皮燒灰存性為末濕用乾摻乾用雞子清調塗

〔百十六〕〔秘方〕治湯火所傷用大黃當歸各等分為末以清油調傳之濕摻之

傷之濕則乾摻之

〔百十七〕〔四黃散〕治湯潑火燒熱瘡腫痛

大黃　黃連　黃蘗　黃芩　白及各等分

右為末水調成膏以雞翅時塗瘡上

〔百十八〕〔澄意方〕治湯火瘡用蠣蛸殼多年乾白者火煅為末如瘡破用乾藥摻之如不破入輕粉清油調傳之

〔百十九〕〔龍鱗散〕治湯火瘡爛痛

老松樹懸皮為末麻油調傳濕摻之

膏藥

〔百二十〕〔玄武膏〕治癰疽發背一切瘡癤已潰未潰悉皆治之大能拔膿血生肌肉

大巴豆去殼膜二兩淨　木鱉子去殼二兩　清油十兩

國冊 四兩淨飛過研細
右將木鼈子巴豆槐柳枝
慢火煎熬諸藥黑色用生
上冊熬却將國丹入油內
煙起即提出點藥滴在水
在磁器內收貯置新汲水

(百三十) 善應膏 治一切瘡瘕及傷折損痛

巴豆 去皮心七十个
白芷 各五分 五倍子二分
桃柳枝 各七 黃連一分
右用清油半斤浸藥三日
用絹濾去滓再澄却入銚
以桃柳枝不住手攪青煙

槐柳嫩枝 各七寸長七條剉細
用磁器或銅鐵銚盛油浸藥一宿
絹帛濾出滓復將所濾油於慢火
內用長條槐柳枝不住手攪候有微
凝結成珠不散方成膏矣傾
出火毒然後用之

蠶蛻去絲嘴赤芍藥
亂髮如雞子大
豬膏一指面大

喜却出火攪令温再入乳香末五錢沒藥末五錢桂心末三
錢黃丹攪令勻却以淨磁器收貯任意使用

(百三十一) 神聖膏 治一切惡瘡

當歸半兩 沒藥三分
藁本半兩 白及二分半
膽礬乙分 粉霜二分
巴豆卄五个去皮 槐柳枝一百卄条
右件一処先將槐柳枝下油內煮熬焦取出次後下其余藥物
煮得極焦亦撈出却將油澄清再熬成膏子用絲絹上攤

乳香末五錢 鉛丹四兩 木鼈子五个去皮
黃臘三兩 白膠三兩
清油二斤

名方類證醫書大全卷二十

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

急救諸方

自縊 一

救自縊法 凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安脚卧之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩縱一人以手按據胷上數摩動之一人摩捋臂脛屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可救暮至旦陰氣盛爲難

又法 緊用兩手掩其口勿令透氣兩時久氣急即活

【救溺水法】（一）凡人溺水者救上岸即將牛一頭却令溺水之人將肚橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹内之水如醒即以蘇合香圓之類或老姜擦牙若無牛以活人於長板攪上仰卧却令溺水人如前法將肚相抵活人身上水出即活

孫真人救落水死急解去死人衣帶艾灸臍中即活

【得效方又法】凡溺水死一宿尚可救搗皂角以綿裹納下部須臾水出即活又將醋半盞灌鼻中

【得效方又法】以屈死人兩脚着生人肩上以死人背貼生人背攙走水出即安

【得效方】又熬熱砂或炒熱灰將溺者埋於其中從頭至足出水七孔即活

又以酒壜一箇以紙糸一把燒放壜中急以壜口覆溺水人面上或腦上冷則再燒再覆水出即活數方皆效柰人不諳曉多以為氣絶而不與救可憐從其便而用之

【凍死】（二）【救凍死法】四肢直口噤只有微氣者用大盆炒灰令煖以囊盛熨心上冷即換之目開氣出然後以粥清稍稍進之若不先温其心便將火灸則冷氣與火爭必死

【又法】用氈或棗薦裹之以索繫定放平穩處令兩人對面輕輕交轉往来如捍氊法四肢若温和即活

【救魘死】（四）不得着灯火照亦不得近前急喚多殺人但痛咬其足跟大母指甲邊并多唾其面即活如不醒者移動些子徐喚之若元有灯即存如無灯切不可用灯照又用筆管吹兩耳或以皂角為末吹兩鼻中或以塩湯灌之或搗韭汁半盞灌鼻中冬月搥根研汁用

【又方】視上唇内有如黍米粒以針挑破

又用逢義木末酒調服一盞

又方 鹽一盞水一盞和服以冷水噀之吐即活

(五) 半夏散 治魘寐卒死諸暴絶證用半夏不拘多少湯洗七次為末每用少許吹入鼻中心頭温者可治倉卒無藥急於人中穴及兩脚大拇指內離甲一韭葉許各灸三五壯即活

(六) 雄朱散 治到客店官馹及久無人居冷房睡中為鬼物所魘但聞其人吃吃作声便令人叫喚如不醒急用救之

牛黄 雄黄各一分 朱砂半分

右為末每一分床下燒一分用酒調灌之無牛黄亦可

(七) 朱犀散 治中惡中忤或為鬼氣所魘急以安息香蘇木樟木之類燒於患所然後此藥灌之

犀角五分 射香 朱砂各一分

為末每一分水調灌之

又方 雄黄末桃枝葉煎湯調一分灌之

又方 故汗衣須用內衣夕遭汗者男用女衣女用男衣燒為末每服二分百沸湯調下

又方 治客忤中惡在途中得之令人好凉墨為末水調二分服或冤器盛湯用衣襯盛邊腑腹

又方 桃柳枝取東向者各三七寸煎湯嗽之

又方 竈中心土為末每二分新汲水調下更桃半指甲許吹鼻中

(紋腸沙) (八) 宜以樟木濃煎湯服之

又方 治紋腸沙證手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸温水於病人膝弯内拍打有紫黑點處以針刺去惡血即愈

(骨鯁) (九) 治骨鯁入喉

縮砂 甘草各等分

右為末以綿裹少許嚥之旋旋嚥津久之隨痰出

又方 治骨鯁以野芦根洗淨搗爛如泥每用龍眼大含化雞骨所傷以雞羹化下如被魚骨所傷以魚汁化下

又方 用金鳳花子嚼爛嚥下無子用根亦可口含骨自下忌用温水灌嗽免致損齒雞骨尤效

又方 朴消末對入雞蘇丸別丸如彈大仰卧含化

又方 鵝砂末新汲水調嚥化

又方 童衆濃煎一盞半分三服一咯而骨出

又方 多食椒橄其骨下魚骨尤妙

又方 猿爪於咽喉下外爬自下治魚骨

又方 象牙磨濃汁嚥之并治諸獸骨哽

(十) 誤吞蜈蚣 以生猪血令病喫須臾生清油灌口中惡心其蜈蚣裹在血中吐出即以雄黄末水調服之

(十一) 誤吞銅物 不化濃煎砂仁湯服之銅自下或用生韮菜研

爛服之其銅自化或以堅炭為末米飲調服於大便瀉下烏梅狀

折傷

折傷者謂其有所傷於身躰者也或為刀斧所刃或墜墮險地打撲身躰皆能使血出不止又恐瘀血停積于臟腑結而不散去之不早恐有入腹攻心之患治療之法須外用敷貼之藥散其血止其痛內則用花蕊石散之類化利瘀血然後欵欵調理生肌或因折傷而停瘸其氣又當順之或因湯火所傷并具一二方以備搜討

(十二) 花蕊石散 治一切金刃所傷打撲傷損身躰血出者急於傷處摻藥其血自化為黄水如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調一次服之立效若牛觧腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖其為線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無

桑白皮用生麻緂亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後摻藥婦人産後敗血不尽悪血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黄上色明浄者四兩搗為粗末　花蕊石一兩搗為粗末

右二味相拌和令勻先用紙筋和塩泥固済瓦罐子一个候泥乾入藥於内再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤罐置圓匝自巳午時從下着火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以絹籮子籮至細毫合内盛依前法服

十三　没藥降聖丹　治打撲閃肭筋斷骨折疼痛不能屈伸

没藥別研　當帰洗焙

自然銅火煆醋淬七次為末水飛過焙一兩

白号藥各一兩半

川烏頭生去臍川芎

骨碎補炙去毛乳香別研生乾地黄

右為末令勻以生姜汁与煉蜜等分和圓每一兩作四圓每服一圓水酒各半盞煎木少許同煎八分去滓木空心熱服

十四　接骨散　治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍者此藥能接骨續筋止痛活血

當帰各一分　鵬砂一分半

右為末每服二錢前蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

十五　補損當帰散　療墜馬落車打傷身躰呼吸疼痛連進此藥其痛即止筋骨接續

當帰炒　澤蘭炒　附子炮去皮各一分　桂心各三分　川芎炒六分

蜀椒炒出汗甘草炙

右為末每服二錢温酒調下日三服忌生葱猪肉冷水於来頑荆芥兩半　蔓荆子

十六　林洪頑荆散　治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

白芷　細辛去苗

右研細酒一椀煎至六分去滓雞鳴時服至曉取下瘀血即愈若使便竟氣絶不能言取藥不及急擘開口熱小便灌之

(二十) 家藏方紫金散 治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血停積於內心腹脹悶

紫金藤皮二兩 降眞香 無名異 煅紅 醋淬七次 琥珀別研 當歸洗焙 桃仁去皮炒各一兩 大黃紙裹煨朴消別研各一兩半

右爲末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利即安

(二十一) 直指方白香散 治打墜肢躰凝滯瘀血腰脇疼痛

破故紙炒 茴香炒 辣桂各等分

右爲末每服二錢食前熱酒調服

(二十二) 治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛 木香調氣散 加紅麴末少許童子小便同酒調空心熱服如無紅麴紅酒亦好

防風去芦 川芎 桂心 丁皮 羌活各一兩

右爲末每服一兩鹽半匙葱白連根五莖漿水五升煎五七沸去滓通手淋洪痛處吟即再換宜避風

(十七) 沒藥乳香散 治打撲傷損痛不可忍者

白朮炒五兩 當歸焙 甘草炒 白芷

沒藥別研 肉桂去皮 乳香別研各一兩

右爲末入研藥再研令勻每服二錢溫酒調下不拘時

(十八) 加味芎藭湯 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸 白芍藥 芎藭 荆芥穗 百合水浸半日各等分

右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時候

(十九) 雞鳴散 治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積痛不忍並以此藥推陳致新

大黃一兩酒蒸 杏仁二十七粒去皮尖

(二十三) 治打撲傷折手足用兼豆粉新鐵銚內炒令紫色用新汲井水調稀厚傳損処貼以紙縛杉木片縛定立效

(二十四) 治打擲折骨損斷服此藥力習往來則愈矣

身遇受病處則颯颯有聲覺藥力習往來則愈矣

自然銅火煅醋淬七次川烏去皮尖 松明節 乳香

沒藥 降眞香 蘇木各一兩 血竭三分 龍骨生用

地龍去土水蛭油炒各半兩 土狗十个油炒焙干為末本草名蝼蛄

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下食前服

(二十五) 治打撲傷損用胡孫麥研爛取汁以酒煎服淳傳傷處

(二十六) 走馬散 治折傷接骨

栢葉生 荷葉生 皂角生 骨碎補去毛各等分

右為末於折傷處揣定位入元位以薑汁調藥如糊攤在紙上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之莫令搖動三五日後開看以温葱湯洗之後再貼藥復夾七日如痛甚加沒藥

(二十七) 應痛圓 治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼术一斤破故紙一斤一半炒半生 胡上茴香十二兩炒骨碎補一斤去毛 穿山甲去膜去皮炒脹為度柴灰亦可生草烏一斤剉如麥大

右除草烏一斤用生葱二斤連皮生姜二斤擂爛將草烏一處淹兩宿焙乾連前藥一處焙為末酒煮麪糊圓如梧桐子每服五十圓酒湯任下忌熱物

(二十八) 家藏內托黃耆圓 治瘍疽發背癰疽腫毒已潰未潰

黃耆盲八兩 當歸二兩洗 肉桂去皮 木香

乳香別研 沉香各一兩

右為末用蒸棗粉四兩姜汁煮糊圓如梧桐子每服五十元熟水送下

(三十九)治打損接骨方

接骨木半兩　乳香半分　赤芍藥　川當歸
川芎　自然銅各一兩

右爲末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候温衆手圓如龍眼大如止打傷筋骨及閃挫疼痛者用藥一圓好舊酒一盞浸化藥承熱服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後服食

(三十)治打撲內損筋骨疼痛

沒藥　乳香　芍藥　川當歸各半兩　川椒去子及閉口者
川芎　自然銅三分半炭火燒

右爲末用黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻圓如彈子大每服一圓用好酒煎開乘熱服之隨痛處臥霎時連進有效

(三十一)奪命散治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心腹疼痛大小便不通

紅蛭用石灰慢火炒令乾黃色半兩　大黃　黑牽牛各二兩

右爲末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒調牽牛末二分催之須下惡血成塊以盡爲愈

(三十二)治打撲傷損骨折此藥專能接骨

夜合樹俗謂之合歡者即合歡花个人謂之烏顆樹去粗皮炒黑色四兩　芥菜子炒一兩

右爲末酒調二錢澄清臨卧服之以粗滓叠瘡上札縛之又方用葱白砂糖二味相等爛研傅之痛立止仍無瘢痕

(三十三)救急療墜馬落車傷腕折臂

當歸炒　桂心　附子炮　甘草炙　蜀椒去汗各七分半
川芎兩半　澤蘭炒各一兩

右爲末酒服二三錢立效忌海藻菘菜生葱冷水等物

(三十四)秘方治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香　没藥　川芎　白芷
芍藥　甘草　牡丹皮　生地黃各半兩
右為細末每服二錢温酒并童子小便調下不拘時候服

秘方治折傷損

南星　白芷　半夏　白及
黃柏皮　赤小豆各半兩
右為細末姜汁付患處蜜糖亦好

三十五　没藥散　治箭傷止血定痛
定粉一兩　枯白礬三錢另研
乳香另研　風化石灰各一兩
右各研為末和勻摻上

三十六　接骨散　并治惡瘡
金頭蜈蚣一个金色自然銅半兩燒紅醋碎研為細末用
乳香二錢研為細末用銅錢重半兩者取三文或五文燒紅醋研碎細
金絲水蛭一錢半每个作三截去上傳去氣道為度
右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿先用粗
藥末少許麻油少半匙同打勻再入少半匙再打勻又入前
藥接骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫
處立止痛天明一宿自破便効
如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬勃末半
錢同好酒一大盞熱調連滓温服如骨折損立接定不疼如
不折損喫了藥立便止住疼痛此方累經効驗不可具述

蟲毒

蟲之為毒醫書所載雖有数種而中土少見之今古相傳多是
閩廣深山之人於端午日以蛇虺蜈蚣蝦蟇三物同器貯之聽

其互相食啖俟一物獨存者則謂之蠱欲害其人密取其毒於
酒食中啖之若中其毒者令人心腹絞痛如有虫咬吐下血皆
如爛肉若不即治食人五臟即死然此毒中人有緩有急之者
中數日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死亦則
其毒流注於傍人亦成蠱注大抵試驗蠱毒之法令病人咳唾
水中沉者是毒浮者非也或含一大豆其豆脹皮脫者蠱也豆
不脹皮不脫又非也又以鵠皮至病人卧下勿令知冤病甚者
是否則非也治療之法必須審而後行試而後可令人凡有積
聚脹滿之病類乎蠱者便以爲蠱充爲非也世說閩廣深山之
人專有以蠱行毒於人者若欲知其姓名呼喚將去其病自愈
又一說病者善能知元中毒於何物之中終身不服此物其毒
亦不復作雖相傳如此俱未之見謹用載之以備搜覽

(三十七) **治蠱毒** 用升麻末三錢溪水調服水

(三十八) **中蠱下血者** 用蝟皮燒爲灰細研以水調下二錢日進
三服立愈

(三十九) **治五種蠱毒** 以馬兜零根三兩擣篩分爲三貼用一貼
以水大瓦煎至五分去滓空心頻服當時吐蠱出未快再服
之以快爲度

(四十) **丹砂圓** 治蠱毒
雄黃別研 朱砂別研 各等分 藜芦 器妙 鬼臼 巴豆去殼心油 各一分
右爲末蜜圓如大豆每服三圓空心乾姜湯下當轉下惡物
并蠱等如煩悶後以鴨爲羹食之

(四十一) **雄麝散** 治五種蠱毒
雄黃末 麝香末 各等分
右取生羊肺如指大以刀開內畢藥吞之

(四十二) **泉僧方** 治金銀蠱毒繞斉中毒先吮白礬味甘而不澁

次喫黑豆不腥者是也
右以石榴根皮煎汁飲之即吐出活虫而愈

(四十三) 丹砂丸 治蠱毒從酒食中着者端午日合
辰砂　雄黃　赤脚蜈蚣　續隨子各一兩　射香一分
右為末糯米飲丸雞頭大酒下一丸蛇蝎所螫醋磨塗之

(四十四) 國老飲 治蠱毒
白礬　甘草
等分為末水調下吐出黑涎一兩椀或瀉下

(四十五) 薏苡湯 治蠱毒毒多因假毒藥以投之知時宜煮大豆甘草薏苡汁飲之又治諸藥毒

(四十六) 蚕退散 治中蠱面青脉絶迷悶口噤吐血服之即甦
蚕退紙以麻油灯上焚燒存性為末新汲水調下一錢

(四十七) 蠶青水 治中金蚕蠱毒

蠶青葉多研水服之專解諸蠱毒殺腹內毒虫

解諸毒

(四十八) 解諸毒 解諸毒用黃連甘草節水一椀煎服
又方 解諸毒用玉蟬花根擂水服

(四十九) 礬灰散 治中諸物毒
晉礬　建茶各等分
右為末每服二錢新汲水調下得吐即效未吐再服

(五十) 解毒圓 治誤食諸毒草并百物毒救人於必死
板藍根生者四兩　貫衆去土二兩　青黛別研甘草生各一兩
右為末蜜圓如梧桐子以青黛別為衣如稍覺精神恍忽心即是誤中諸毒急取藥十五圓爛嚼用新汲水下

(五十一) 青黛雄黃散 凡中毒及蛇虫咬傷即服此藥令毒氣不聚

青黛　雄黃各等分
右為末新汲水調服二錢
(五十二)奇方解一切毒
白扁豆為末新汲水下二三匁得利即安
(五十三)萬病解毒丸能解一切毒方見癰疽門
挑生毒(五十四)升麻湯治肋下忽然腫起如生癰癤狀頃刻間大如椀即中挑生毒也俟五更以新汲水調二匁連服之若洞泄出如葱數莖根川升麻為末冷熟水調二匁連服二三次即止
又方治魚肉瓜果湯桊皆可挑生初中毒氣胸腹稍痛明日漸髮皆具即消宜煎平胃散補調兼進白粥
加刺痛十日則物生能動騰上胸痛沉下則腹滿積以瘦悴
其法在上膈則取之用熱桊一盞投膽礬半匁於中候礬化通口呷服良久以雞領探喉即吐出毒物在下即瀉之以桊

飲下麝金末二匁毒即瀉下乃擇人參白朮各半兩研末同好酒半升納瓶中慢火煎半日度酒熟温〻飲之日一盞五日乃止任便飲食
解砒毒(五十五)方十二道
兼豆半升細擂去滓以新汲水調下
又方青靛花二匁分兩服水調下
又方黑鉛井水磨下
又方濃研青蓝汁磨甘草節同服
又方生麻油一盞飲之不能飲灌之
百一選方解砒毒
漢椒四十九粒黑豆十四粒烏梅二个打碎甘草節三寸碎之
右㕮咀用水一椀煎至七分温服
百一選方解砒毒

白扁豆　青黛　甘草各等分巴豆一粒去殼不去油
右同為末以沙糖一大塊水化開調一大盞飲之毒隨利去
却服五苓散之類

經驗方　解砒毒用早末稈燒灰新汲水淋汁絹帛濾過冷服一
椀毒從下利即安又方用井花水調水粉豉汞豆擂水皆可

秘方　中砒毒以地漿調鉛粉末服之立解豉汁又佳

便宜方　藍飲子解砒毒及巴豆毒用藍根沙糖二味相和擂水
服之或更入薄荷汁尤妙

秘方　解砒毒鼠莽毒用旋刺下羊血及雞鴨血熱服

又方　解砒毒鼠莽毒用金線虫磨水服之即愈又有用烏桕根
擂水亦好

解鼠莽毒　五十六　枯白礬好茶末等分冷水調下

又方　解鼠莽毒用大黑江豆煮汁服之如欲試其驗先刈鼠

未苗葉以豆汁澆其根從此敗爛不復生矣

五十七　解一切菌毒　搔新地蚓以冷水於內擩之令濁澄
少頃取飲之此方見本草陶隱居注謂之地漿

又方　用羊花生為末每一矛汲新水下以利為度菌之毒毋者蓋
因蛇虫毒氣重蒸以致

五十八　治中諸藥毒　甘草生　黑豆　淡竹葉各等分
右咬咀用水一椀濃煎連服

秘方　中巴豆毒以黃連大豆黃卷汁並用之解

秘方　中烏頭天雄附子毒用大豆汁淩志防風棗肉飴糖並能
解之

五十九　食河豚魚中毒　一時困殆倉卒無藥急以清油
多灌之使毒物盡吐出為愈

蛇傷毒 六十 惡蛇咬傷頓仆不可治者香白芷為末麥門冬去心濃煎湯調一二頃刻咬処出黃水盡腫消仍用此藥滓塗傷処

又方 五倍脂一兩雄黃半兩為末溫酒下二錢仍塗患処

又方 冷水洗後用羊黃二合水一椀研汁服以滓傳

治毒蛇所傷

細辛 白芷 各五錢 雄黃二錢

右為末入麝香少許每服二錢溫酒調服

又方 應蛇虺蜈蚣咬傷用艾炷於傷處灸三五壯援去毒即愈

得效方 治一切蛇虫所傷用貝母為末酒調令病者盡量飲之頃久酒自傷處為水流出候水盡却以藥滓傳瘡上即愈

蜈蚣毒 治蜈蚣諸毒虫所傷用清油灯心點燈以傷處於煙上熏之其痛即愈 又方 用雞糞塗之 又方 嚼羊蒺藜擦之立效

狗咬 六十二 狗咬用杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗

然後以此塗傷處

經驗方 治犬咬傷用苴麻子五十粒去殼以井水研成膏先以鹽水洗咬處次以此膏敷貼一方用虎骨膏傳

秘方 治犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗

雄黃色黃而明者五錢 麝香五分重

右各研勻用酒調二錢服如不肯服者則撚其鼻而灌之服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利下惡物再進前藥即見效矣

又方 治犬所傷用班猫大者二十一隻去頭翅并足用糯米一勺先將班猫七隻入米內炒令米赤去此班猫別入七隻再於前米內炒令斑猫色變復去之又別用七隻如前法炒以米出青煙為度去斑猫不用以米研為粉用冷水入清油少許空心調服須又再進一服以小便利下惡

毒為度如不利再進一服利後腹肚疼痛急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黃連水亦可不宜便食熱物

蜂蠆螫毒（六十三）用野羊糞擦之　又方　或用塩擦之

又方　以手就頭爬垢膩傳之

班猫毒（六十四）用澤蘭葉搗汁飲之乾者為末白湯下

蠍螫蝦蟇毒（六十五）中此三物毒令人小便秘腎下痛有至死者以生豉一大合新汲水半椀浸濾汁服之

虎傷（六十六）生薑汁服兼洗傷處白礬為末納瘡口中痛即止

馬咬（六十七）用馬便稍燒灰傳之

猫咬（六十八）薄荷汁塗之

蛊咬（六十九）竹汁塗之

鼠咬（七十）猫毛燒灰射香少許津唾調傳

壁鏡咬（七十一）毒人必死棄柴灰用水煎三四沸取汁調白礬末塗磨口兼治蛇毒

蜘蛛毒（七十二）痛不可忍白礬半夏等分為末醋調貼痛止

又方　治蜘蛛蜂雄者止在一處痛用井底泥塗之雌者痛引諸處用當門簷下泥塗

八脚虫傷（七十三）其虫隱於壁間其采射人偏躰生瘡如湯火傷用烏雞糞燒灰雞子白調傳

又方　治蠐螬毒即八脚虫

白南燕窠泥新水調塗之蠍虎亦可

諸爪牙毒（七十四）治凡為能虎豹狼猫犬等爪牙所傷毒痛以水煮鉄令有味洗之又搗雞糞汁飲之留查封傷處

諸冊毒（七十五）紫背浮萍研傳之

又方　赤小豆為末雞子清傳

又方　青澱汁傳之

又方　芭蕉根取汁傳

又方　蚕沙水煎汁洗之

又方 活蚯蚓七條研爛傳之

又方 青白丹毒用伏龍干一分豉半分爲末香油調傳

蜘蛛咬 蚯蚓咬 七十六 雞白研傳 雄黃亦可 七十七 或於地上坐卧不覺咬腎陰腫塩湯洗數次效 或用蚯蚓糞爲末香油調傳

食豆腐毒 誤食桐油 七十八 生蘿蔔煎汁飲之子亦可 七十九 吐不止者食乾柿解之

中野葛毒 八十 取雞子三枚灌吞之

湯藥

百選方 煮香湯

木香 丁香 檀香 沉香

人參 甘草各一兩 檳榔五爻 白茯苓去皮二兩

右日乾爲末沸湯點服

百選方 橙子湯

橙子一个 乾山藥一兩 塩四兩炒 甘草二兩

塩白梅四兩打研去仁石去核

右先用五味一處爛研捏作餅子焙乾再碾爲末百沸湯調

百選方 橄欖湯

百藥煎三兩切片 甘草炙分半 檀香 白芷各五爻

右爲細末沸湯點服

百選方 桂香湯

桂花旋摘三升揀去蒂細研磁鍾盛覆鍾口蒸

乾姜 甘草各二兩炒

右爲末同桂花拌勻入炒塩少許磁器盛貯沸湯點服

百選方 洞庭湯用薄皮黃柑子二斤於盆內薄切去核留汁

生姜去皮半斤甘草四兩鹽三兩炒神麯麥芽各四兩拌和
晒一宿以擣汁盡爲度取出焙乾碾爲細末沸湯點服

秘方 楊梅煎取熟楊梅於瓦器內搗一宿即爛用絹袋擠出汁
慢火熬成膏瓦罐盛貯每用入蜜少許沸湯點服

秘方 金櫻煎法霜時取金櫻子先擦洗去刺然後去穰杵爛用
酒酢取汁絹帛濾過慢火熬成膏後入檀香諸香在內瓦罐
收貯沸湯點服酒調能活血駐顏

秘方 木瓜煎用木瓜去穰子煮過爛研如泥入鹽少許用瓦罐
盛貯每用入蜜少許沸湯點服

秘方 梅花湯旋摘梅花半開者溶蠟封花口投蜜罐子過時用
之以尼桃花一兩朵連蜜一起沸湯甚服

婦人調經衆疾論

夫女子十四則月水行男子十六則陽精溢此皆合乎陰陽之數各及其時故男子之精氣宜盛女子之月水宜調調經之道貴乎耗其氣以行其血血盛氣衰是謂之從從則百病不生孕育無損矣且婦人之病四時所感六淫七情所傷悉與男子治法一同惟胎前產後七傷八瘕崩漏帶下之證爲異故別貯方冗其所因多由月水不調變生諸證大槩婦人之疾以經候如期爲安或有愆期當審其冷熱虛實而調之先期而行者血熱故也法當清之過期而行者血寒故也法當温之然又不可不察其有無外邪爲之寒熱而後投藥且經行之際與產後一般

將理失宜爲病不淺若被驚則血氣錯乱經脉斬然不行逆於上則從鼻口中出逆於身則爲血分勞瘵之疾若其時勞力太過則生虛熱變爲疼痛之根若恚怒則氣逆氣逆則血逆逆於腰腿心腹脊脇之間遇經行時則痛而重着過期又安若怒極而傷於肝則又有眼暈嘔吐之證加之經脉滲漏於其間遂成窭漏淋瀝不已凡此之時中風則病風感冷則病冷久而不治崩漏帶下七證八痕可立而待若能治病於未然當以調經爲先故首論之各備諸方依次于后

【四物湯】治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠墮血停留小腹急痛五心煩熱

當歸去芦　川芎　白芍藥　熟乾地黄酒蒸焙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分空心服崩中去血過多者加膠艾煎服

【暖宮圖】治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕育崩漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黄六兩　禹餘粮九兩醋淬　赤石脂煅紅　附子炮去皮臍海螵蛸去殼各三兩

右爲末醋糊圓如梧桐子每服三十元空心温酒醋湯任下過多肌体羸困及月水將行腰腿重痛並皆治之

【內補當歸丸】始血氣虛損月水不調或崩中漏下云血

眞蒲黄炒三分半　熟乾地黄十兩　阿膠炒

當歸去芦炒　白芷　續斷　乾姜炮　甘草炙
芎藭各四兩　肉桂　附子炮去皮臍　白芍藥各二兩
白朮　吳茱萸湯洗七次鹽炒各三兩
右爲末煉蜜圓如梧桐子每服五十元食前溫酒下

五　熟乾地黃圓　治婦人風虛勞冷胃弱谷水不化或腸虛
受冷大便時泄或月水不調淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕
久不成胎一切諸虛之證並治之

芎藭　栢子仁炒別研各兩半　肉桂去皮一兩分
牛膝去苗酒浸一宿焙乾澤蘭去梗　二兩一分
石斛去根一兩二分半　禹余粮火煅醋淬研　一兩
當歸去芦炒藁本去芦各一兩三分　肉蓯蓉酒浸宿焙
白茯苓各一兩　川椒去目及閉口者　蛇床子揀淨
艾葉炒各一兩分　紫石英煅淬研飛三兩　卷栢去根　山茱各一兩

續斷三分　厚朴去皮姜制製兩赤石脂火煅淬　二兩　乾姜炮
白芷各一兩　熟乾地黃兩半　人參去芦三分　石膏火煅研飛二兩
芫荽炒三分　細辛去苗一兩　白朮　一兩二分半
杜仲去粗皮炙令黃防風去芦一兩五味子一兩半　甘草炙一兩七分半
右爲末煉蜜丸如梧桐子每服五十元空心溫酒米飲任下

六　南嶽魏夫人濟陰丹　治婦人血海虛冷久无孕育及數
墮胎一切經候不調崩中漏下積聚諸證並皆治之

秦艽二兩　京墨煅醋淬研一兩
糯米炒一升川芎一兩半　木香炮一兩　熟地黃酒蒸四兩
茯苓去皮二兩　人參去芦　當歸去芦酒浸　肉桂去粗皮
藁本去芦二兩　山茱三分　澤蘭葉四兩　細辛去苗葉一兩半
川椒去目炒出汗三分　桃仁去皮尖二兩炒　桔梗炒二兩
大豆黃卷炒半升

蚕布燒灰　甘草炙各一双　牡丹皮两半　蒼术米泔浸八两
右為末煉蜜為劑每两作六元每服一元細嚼空心温酒醋湯任下以醋糊為元如梧桐子亦可

七　活血散　治衝任經虛經事不調不以多少前後並治
當歸　川芎　白芍　桑寄生　玄胡索　肉桂去皮各二双
右㕮咀每服四分水一盞煎至七分食後熱服

八　紫石英丸　治婦人諸病補煖下元然當知諸病皆由經候不調陰陽相勝所致若陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽乘陰則血流散溢經所謂天暑地濕經水漫溢故令乍多而在月前須和其陰陽調其血氣則百病不生矣
紫石英細研水飛　禹餘粮煅醋淬　杜仲炒去系　遠志去心　桂心　川烏頭炮　澤瀉　人參　乾骨

乾姜炮　當歸　桑寄生　續斷各一双　牡砺煅　川椒去子并合口者炒出汗各半双
右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十元空心米飲下

九　小温經湯　治經候不調血臟冷痛
當歸　附子炮各等分
右㕮咀每服三分水一盞煎至八分空心温服

十　皺血圓　治婦人血海虛冷百病變生或月候不調崩中帶下癥瘕痞塊等疾並皆治之
菊花　茴香　當歸　香附子炒去毛湯浸焙
熟乾地黃　肉桂　牛膝　芍藥　蒲黃
蓬莪朮　延胡索炒各三两
右為末用烏豆一升醋煮焙乾為末再入醋二椀煮至一椀留為糊元如梧桐子每服三十元温酒醋湯任下血氣攻刺

炒姜酒下撒塊絞痛當歸酒下忌鴨肉羊血

十一 救紅丸 治血氣不調臟腑積冷臟腹疼痛肌体日瘦

沉香 麝香另研 肉豆蔻 丁香 木香 蓬莪朮 訶黎勒煨去核各一兩

撒紅 當歸去蘆炒 白朮

右為末入麝香和勻酒糊元如梧桐子每服三十元温酒下

十二 當歸散 治婦人經脉不勻或三四月不行或一月再至

白朮 黃芩 山茱萸 湯洗 當歸 川芎

白芍藥一同剉炒各一兩病証若冷去黃芩加肉桂

右為末每服二錢空心酒調下日三服

十三 逍遥散 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

甘草炙半兩 當歸去蘆炒 茯苓去皮

白朮 柴胡去苗各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煙煎至七分去滓熱服不拘時

十四 禹余糧丸 治氣血虛損月水不調赤白帶下漸成崩漏

桑寄生一兩 狗脊去毛三分 柏葉炒一兩 白石脂二兩

白芍藥三分 當歸去蘆 乾姜炮

白朮各一兩 附子炮去皮臍一兩 鱉甲醋浸去裙炙黃一兩

禹余糧煆醋淬七次飛過研二兩 吳茱萸湯洗七次炒一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十元温酒米飲空心任下

十五 神仙聚寶丹 治婦人血海虛冷外乘風冷搏結不散積

聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中帶下並宜服之

沒藥 琥珀各別研一兩 辰砂別研一兩 木香煨取末一兩

滴乳香別研一分 當歸洗焙取末一兩 麝香別研一錢

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五丸每服一丸温酒磨

下如一切難產及產後敗血衝心惡露未盡並入童子小便

(十六)【調榮香附圓】治婦人經候不調血氣刺痛腹脇脹滿頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜服之

大香附子 砂盆中擦去皮以米醋浸半日用瓦銚慢火煮令醋盡滲出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊圓如梧桐子日乾每服五十圓淡醋湯下

【方香附子】一斤 文蛤四兩 當歸二兩 製如前法治證一同名又附圓

【宵水不行】(十七)【六合湯】治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 白芍藥 官桂去皮 蓬术炮各等分 川芎 熟地黃洗

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心服

(十八)【白薇丸】治婦人月水不利四肢羸瘦漸成虛乏

當歸 白薇 栢子仁 白芍藥 白茯苓

白术 桂心 附子 川芎 吳茱萸 木香

澤蘭葉 枳殼半兩 熟地黃二兩 牡丹皮

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒下

(十九)【溫經湯】治婦人血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮

莪术各半兩 人參

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

(二十)【滋血湯】治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮腫肌体發熱疲勞瘵宜以此藥滋養通利

馬鞭草 荊芥穗略四 牡丹皮 一兩 枳殼去白麩炒

赤芍藥 肉桂去皮 當歸去蘆炒 川芎各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞烏梅一个煎服以經行為愈

(二十一) 凌花散 治婦人月水不行發熱腹脹
當歸酒浸 凌霄花 劉寄奴 紅花酒浸候煎藥一二沸即入
宮桂去皮 牡丹皮洗 川白芷 赤芍藥 延胡索各等分
右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熱服

(二十二) 加減四物湯 衝任虛損月水不行肌膚發熱如瘵狀
當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩
紫胡半兩 黃芩二分半
右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心温服

(二十三) 牡丹散 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肢体羸瘦
漸成骨蒸益宜服之
桂心 牡丹皮 芍藥 延胡索炒 沒藥別研
陳皮去白各一兩 蓬莪朮 鬼箭各一分 紅花 當歸去苗各一兩
乾漆炒一兩 蘇木一分 甘草

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分不拘時服

(二十四) 紅花當歸散 治婦人血臟虛竭經候不調或斷續不來或積瘀塊腰腹痛痹肢体瘦弱
劉寄奴草五兩 當歸去苗牛膝酒浸各肉桂去皮紅花
白芷各兩半 甘草酸二兩 赤芍藥九兩 紫葳 蘇木各二兩
右爲末每服二錢空心執酒調下如經秘澁前紅花酒調下

(二十五) 通經圓 治婦人室女經候不通腹脅痛或成血瘕
川椒炒出汗 蓬莪朮炮 乾漆炒出煙 當歸去苗青皮去白
乾薑炮 大黃 桃仁炒 川烏炮 桂心各等分
右爲末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵之
圓如梧桐子陰乾每服五十圓醋湯温酒空心任下濟生方
不用川烏有紅花等分

(二十六) 琥珀散 治婦人室女月水凝滯腰脇脹痛及血逆攻心

眩暈不省並皆治之
劉寄奴去梗 牡丹皮 熟地黃酒浸玄胡索炒去皮 烏藥
赤芍藥 蓬莪朮 京三稜 當歸去苗酒浸 官桂不見火各一兩
右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛
爲度焙乾入後五味同爲末每服一錢空心溫酒調下

【月水不斷】〔二十七〕膠艾湯 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷及妊娠調攝小宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之
阿膠炒 芎藭 甘草炙各一兩 當歸 艾葉炒各二兩 熟乾地黃 白芍藥各四兩
右㕮咀每服三錢水一盞酒半盞煎至八分空心挽服

〔二十八〕鹿茸丸 治衝任虛損又爲風冷所乘以致經候過多其色黑瘀尺脉微小甚者可參閱元百壯
鹿茸酥炙去毛 赤石脂 禹餘粮各一兩
右爲末酒糊丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒下 續斷二兩 栢葉

附子炮去皮臍各半兩 熟地黃洗焙當歸酒浸各二兩 艾葉半兩
右爲末酒糊丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒下

〔二十九〕十灰散 治下血不止
錦片 木賊 棬櫚 栢葉
乾漆 鯽魚即鮒魚 鯉魚鱗 艾葉 血餘 當歸
右逐味火化存性各等分爲末和合入麝香少許溫酒調服

〔三十〕茯苓補心湯 治婦人去血過多虛勞發熱用四物湯一兩半參蘇飲二兩和勻生姜五片煎八分溫服

【崩漏】〔三十一〕鎮宮丸 治婦人崩漏不止或下五色或如豆汁或狀若脉肝或下瘀血腐朊腰脹痛頭暈眼眩
代赭石 紫石英 禹餘粮各煅醋淬七次
香附子醋煮各二兩 川芎 陽起石煅紅研
鹿茸火去毛醋蒸焙 茯神去木 阿膠蛤粉炒成珠

蒲黃炒　當歸去芦酒浸各一兩　血竭別研半兩
右爲末用童便醋汁打糊米糊丸如梧桐子每服七十丸空心用米飲送下

〔三十二〕十灰丸　治崩中下血不止
黃絹灰　馬尾灰　藕節灰　蒲黃灰
蓮蓬灰　油髮灰　赤松皮灰　棕櫚灰　綿灰等分
右爲末用醋煮糯米糊丸如梧桐子每服一百丸米飲下

〔三十三〕栢子仁湯　治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血遂致崩中下血不止
鹿茸火去毛酒蒸焙　栢子仁炒　芎藭　當歸各一兩　香附子炒去毛二兩
川續斷一分半　阿膠　小草　甘草炙半兩
右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分空心温服

〔三十四〕艾煎圓　治崩傷淋瀝不已小腹痛痛常服益榮調經
食茱萸湯洗　當歸各七分半　熟地黃　白芍藥酪一川芎
石菖蒲炒　人參各一兩　熟艾四兩用熟米飲調作餅焙
右爲末酒糊圓如梧桐子每服五十圓酒飲任下

〔三十五〕黃芩湯　治崩中下血今人多用止血補血之藥少能見效此是陽乘陰則經水沸溢宜清之爲愈用黃芩碾爲細末燒秤錘淬酒調下

〔三十六〕荆芥散　治婦人崩下不止用荆芥穗以灯盞多着灯心好清油點灯就上燒荆芥焦色爲末每服三錢童子小便調下

〔三十七〕蜀黍散　治婦人血崩不止用防風去芦又隨多少爲末酒煮麪清調下一錢空心日二服更以麪作糊酒投之極驗

〔三十八〕金華散　治婦人經血得熱崩漏不止
延胡索　當歸　蠶蛾麥　牡丹皮　威靈仙各七分半

乾葛五分 蒲黃五分 石膏二兩 桂心三分
右爲末每服二分水一盞煎六分食前温服

(三十九) 家藏方黑金散 治婦人血氣虛損經候不調崩中漏下
鯉魚皮 乾薑炮 破故紙 棯櫚皮 黃牛角腮
亂髮各一兩 烏賊魚 熟乾地黃 當歸洗焙 木賊各半兩
右剉碎拌勻入在甕瓶內鹽泥固濟候乾以炭火五斤煅令
通赤煙盡取於土內埋令冷取出研細每服三錢入麝香少
許米飲空心調下

(四十) 家藏方補宮圓 治婦人諸虛不足久不姙娠骨熱形羸
崩中帶下並宜服之
鹿角霜 白茯苓 香白芷 白术 烏賊魚骨
白薇 白芍藥 牡砺煅 山藥各等分
右爲末麪糊圓如梧桐子每服五十圓米飲空心送下

帶下 (四十一) 白垩圓 治婦人白帶久而不止腰膝冷痛日漸羸困
白垩煅 禹餘粮 鱉甲 烏賊魚骨各用醋炙
鵲巢灰 當歸去苗酒浸 金毛狗脊 附子炮去皮臍
乾薑 紫石英煅醋七淬 川芎各一兩
艾葉灰半兩 香附子醋煮 鹿茸燎去毛切片醋炙各一兩
右爲末醋煮糯米糊圓如梧桐子每服七十圓温酒下

(四十二) 白斂圓 治室女衝任虛寒帶下純白
白斂 金毛狗脊燎去毛各一兩 鹿茸酒蒸焙二兩
右爲末用艾煎醋汁打糯米糊圓如梧桐子每服五十圓空
心温酒送下

(四十三) 當歸煎 治婦人赤白帶下腹內疼痛不飲食日漸羸瘦
當歸酒浸焙 赤芍藥 牡礪火煅取粉 熟地黃酒浸蒸焙
阿膠炒 白芍藥 續斷酒浸各一兩 地榆五分

右爲末醋糊圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

(四十四) 卷栢圓 治婦人室女腹臟冷熱相攻心腹疠痛赤白帶下面色萎黃四肢羸乏

黃耆　熟地黃洗各兩半　卷栢醋炙　赤石脂煅醋淬七次
鹿茸　白石脂　川芎　代赭石煅醋七淬
艾葉　桑寄生　艾葉醋炙　當歸去芦酒浸炒
地榆各一兩　木香不見火　龍骨各半兩　乾姜三分

右爲末醋煮糯米糊圓如梧桐子每服七十圓空心米飲下

(血氣) 大調經散 治榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫痛

大豆炒去皮一兩半　茯神一兩　真琥珀一分

右爲末每用一錢濃煎烏豆紫蘇湯調 (四十五)

(四十六) 異功散 治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四肢乏力寒熱往來狀似勞倦並宜服之

牡丹皮　芍藥　白芷　乾薑各一分
當歸　玄胡索　陳皮
烏藥　川芎　官桂
右生爲末每服二錢生姜三片酒水各半盞煎七分溫服

(四十七) 伏龍肝散 治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下或如豆汁或成血片或五色相雜腑腹冷痛經久不止

川芎三兩　肉桂去皮　當歸去芦炒乾姜炮各三分
赤石脂一兩　艾葉炒二兩　甘草炙半兩　熟乾地黃二兩
麥門冬　伏龍肝即竈心土各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞棗三枚煎七分食前溫服

(四十八) 當歸建中湯 治婦人一切血氣不足虛損羸乏

當歸去芦肉桂去皮各二兩　甘草炙二兩　白芍藥六兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑五片棗一枚同煎空心熱服

(四十九) **灵宝散** 治血氣攻刺痛引兩脇并治痃癖冷氣

丁香　木香　乳香各半錢　當歸
延胡索　白芍藥各半兩

右為末每服三錢食前温酒調下

(五十) **八神湯** 治血氣不足肌体煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸　熟地黃　白芍藥　川芎
地骨皮　黃耆各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心温服

(五十一) **吳茱萸湯** 治女人素虛又為風冷乘氣停滯腹脇刺痛

桔梗去苗防風　乾姜炮　甘草炙　當歸去苗炒
細辛去苗各五分　熟乾地黃三分吳茱萸湯洗七次炒二兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至八分空心熱服

(五十二) **加減吳茱萸湯** 治證与前茱萸湯同茶味但有加減

防風去芦　乾姜　當歸去芦酒浸炒
桂心不見火　茯苓去皮　甘草炙　半夏湯洗七次
麥門冬去心　牡丹皮　桔梗炒略　吳茱萸湯洗七次炒二兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分食前熱服

(五十三) **一神丸** 治室女血氣相搏腹中刺痛經候不調

細辛　當歸去芦酒浸炒
橘紅二兩　玄胡索去皮醋煮當歸去芦酒浸炒各一兩

右為末酒煮米糊圓如梧桐子每服一百圓空心炙醋湯下

(五十四) **人參養血丸** 治女人禀受素弱血氣虛損常服補衝任
調月候暖下元生血氣

烏梅肉二兩　當歸去芦二兩
人參去芦　川芎
赤芍藥　蒲黃炒各一兩

右為末煉蜜搜丸如梧桐子每服八十丸温酒米飲任下

(五十五) **抑氣散** 治婦人氣盛於血変生諸證頭暈腦痛皆可服之

香附子炒淨四兩 茯神去木一兩 橘紅二兩 甘草炙一兩
右爲末每服二錢食前用沸湯調服

五十六 玄胡索湯 治婦人室女七情所感血與氣併心腹作痛或引腰脇甚作搐搦但是一切血氣經候不調並可服之

當歸去芦 蒲黃 玄胡索 赤芍藥 片子姜黃
官桂不見火 各半兩 沒藥 縮砂三甘草二分半
右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎至七分食前温服吐逆加半夏橘紅各半兩

五十七 內灸散 治婦人血氣虛損崩下漏下淋瀝不已或凝積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭旋七癥八瘕並宜服之

麝香葉 丁香皮 熟乾地黃洗焙 肉桂去皮各一兩半
甘草炙 山茱萸 當歸去芦洗 白朮 各八兩
川芎 乾姜炮 黃耆去苗各一兩

筒香一兩半 木香一兩 陳皮去白四兩 白芍藥十兩
右爲末每服三錢水一盞姜五片艾十葉同煎空心熱服温酒調下亦可如産後下血過多加蒲黃煎惡露不快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生姜煎上熱下冷加荆芥煎

血風 五十八 虎骨散 治婦人血風走注疼痛不常

虎骨酥炙 敗龜醋炙 當歸
延胡索 地龍去土炒 威灵仙 牛膝去苗酒浸
蒲芦 自然銅煅醋淬七遍
右爲末每服一錢熱酒調下

五十九 油煎散 治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澁

五加皮 牡丹皮 赤芍藥 當歸去芦各一兩
右爲末每服一錢水一盞將青銅錢一文薤油入藥內慢火同煎七分煎不得撹喫不得吹常服此藥能肥婦人

(六十) **人參荊芥散** 治婦人血風發熱身体疼痛頭昏目澁煩渴盜汗或月水不調臍腹疙痛痃癖堀硬並皆治之

赤芍藥五兩　柴胡去苗七兩半　牡丹皮五兩　鱉甲醋浸去裙炙黃
荊芥穗　羚羊角　酸棗仁
生乾地黃　人參去芦　枳殼去穰麩炒
當歸　防風去叉　白朮　肉桂去皮各七兩半
右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎八分溫服不拘時

(六十一) **千金桃仁煎** 治婦人血積癥瘕月水不行並宜服之

桃仁去皮尖麩炒　大黃各二兩蝕蟲半兩炒令黑色
右和勻以酸醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃仁大黃蝕蟲末入內不住手攪度可圓時却下朴消更不住手攪良久出之圓如梧桐子五更初溫酒下五圓至日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟆衣樣以盡為愈

(六十二) **琥珀丸** 治婦人血瘕腹中有塊攻刺小腹痛引腰脊

琥珀別研　白芍藥　川烏炮去皮　川牛膝酒浸製
鱉甲　蓬朮　當歸　厚朴姜汁製各一兩
木香　澤蘭葉　官桂各半兩　麝香別研半分
右為末酒糊園如梧桐子每服七十園空心溫酒米飲任下

(六十三) **楊氏家藏方麝香丸** 婦人積氣內攻經候不調腹脇膨脹刺痛

京三稜　義朮各一兩　茴香炒　附子
川練子肉炒白芍藥　乾姜炮各半兩　巴戟去心炒一兩
當歸洗　艾葉醋炒各一兩七分半
右為末酒糊園如梧桐子每服五十園空心溫酒下

(六十四) **三稜丸** 治婦人血癥血瘕食積痰滯

三稜　蓬朮各四兩　青皮　半夏湯洗七次　麥蘗各三兩

右用好醋六升煮乾焙為末醋糊元如梧桐子每服五十九
醋湯下痰積姜湯下

六十五 小二稜湯 治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛及積滯不
消心腹堅脹痰逆嘔穢

京三稜 蓬莪朮 酪四兩 芫花一兩

右同入瓷罐內用米醋五升浸封罐口以灰水煨令乾却取
出稜朮將芫花以餘醋炒令焦焙乾同為末醋糊圓如豪豆
大每服十五圓姜湯桑白皮湯任下

六十六 大腹皮飲 治婦人血癥單腹痛

大腹皮 防己 木通 厚朴姜製
瓜姜 黃耆 枳殼麩炒 桑白皮
大黃煨 陳皮 青皮 五味子各等分

右㕮咀每服五錢水盞半煎六分去滓入酒一分温服

六十七 烏雞圓 治婦人百病

吳茱萸醋炒良姜 白姜炮 當歸 赤芍 桑
生乾地黃 延胡索炒破故紙 川楸並炒 刘寄奴
蓬莪朮 橘皮 青皮 川芎各一兩
荷葉灰四兩 白熟艾用糯米飲調作餅焙二兩

右為末醋糊元如梧桐子每服五十元月經不調紅花蘇木
酒下白帶牡蠣粉調酒下子宮久冷白茯苓煎湯下血崩豆
淋酒調綿灰下胎不安蜜和酒下腸風陳米飲調百草霜下
心疼童便煎酒下漏阻下血烏梅酒下胎死不動班猫三十
箇煎酒下腰脚痛當歸酒下

產後諸病 黑豆甘草湯 治產後中風口噤

生末調酒下四肢浮腫麝香湯下咳嗽喘痛杏仁桑白皮湯
下腹痛芎藭調酒下產前後痢白者姜湯下赤者甘草湯下

常服温酒醋湯任下並空心服

〔雜病〕〔六八〕桂香散 治婦人脾血久冷時作腰痛泄瀉

草豆蔻去殼炒 甘草 白朮 高良姜剉炒香
縮砂仁 酪一青皮去白炒 訶子肉酪半 肉桂一分生姜
厚朴去皮 棗肉各一兩

右為末每服二錢入鹽少許空心沸湯點服

〔六九〕人參白朮散 治偏身燥濕相搏玄府緻密煩心忪悸發
渴飲食減少不為肌膚

人參三分 白朮焙七分 薄荷半兩 縮砂仁 兩三分
生地黃 茯苓去皮 甘草各半兩 黃芩二分
滑石三兩 藿香三分半夏半兩 石膏一兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服食前日二三服

〔七十〕治婦人諸淋方 用苦枝根俗呼名杜牛膝淨洗搥碎一

握水五盞煎至一盞去滓入麝香乳香末各少許調服小便
內當下砂石剔剝有聲是其效也

〔七十一〕家藏方內金鹿茸圓 治婦人勞傷血脉胞絡受寒小便
白濁晝夜無度腎腹疼痛腰膝無力

黃耆 雞內金 牡礪 鹿茸
肉蓯蓉 五味子 龍骨 遠志
右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓温酒米飲任下

〔七十二〕麝香杏人散 治婦人陰瘡

麝香少許 杏人不以多少 槐存性
右為細末如瘡口深用小絹袋子二箇盛藥納繫口臨上藥
炙熱安在陰內立愈

〔七十三〕白礬香散 治婦人陰腫堅痛

白礬半兩 甘草半分生 大黃一分生

右為末每用棗大綿裹內陰中日兩換
(七十四)洗方治婦人陰痒
以蛇床子白礬煎水淋洗
(七十五)取虫方治婦人陰痒有虫用雞肝承熱內陰有虫當尽
下牛肝猪肝乘熱皆可用



名方類證醫書大全

十六 十七 十八

02 メ 1

48062

名方類證醫書大全卷二十二

鼇峯 熊宗立 道軒 編集

妊育 附 轉女成男法

生育之道陰陽二氣交感而成胎若陰血先至陽精後衝血開裹精陽內陰外陰抱陽胎而男形成矣若陽精先入陰血後參精開裹血陰內陽外陽抱陰胎而女形成矣又云婦人月信初止一日三日五日及男女生命旺相陽日時交合則有子皆男若二日四日六日又值男女生命休囚死絕陰日時交合有之多女過此之外皆不成胎又有所謂轉女成男法女子但懷始三月名曰始胎血脉不流象形而變是時男女未定故令未滿三月之間服藥方術轉令生男也

白々後太郎寄

(一)秦桂丸 治婦人血海久冷不能孕育

秦艽 桂心 杜仲 防風 厚朴 各三分
人參一兩 附子生 白茯苓 各一兩半 細辛二兩一分
白薇 乾薑 沙參 牛膝 半夏 各半兩

右並生碾為末煉蜜丸如赤豆大每服五十丸空心酢湯米飲任下無效更加丸數已覺有孕便不可服極有神效

(二)繼嗣降生丹 治婦人稟受氣弱子宮冷憊難子息者

當歸 桂心 龍骨 益智 烏藥無天台者
茯神 秦艽 川牛膝 石菖蒲 白芍藥 各三分
苦梗 半夏 防風 杜仲 吳茱萸酢炒半
乾姜二兩生一半炒一半 川椒汉二兩湯浸半日焙細辛三分
附子一隻八分中剜心作竅如皂子大入朱砂一分中以
溫麪裹煨去麪 牡砺一大片要取漳泉二州者却用

孝堂童子小便浸四十九日五日一換取出用硫黃末一
兩米醋塗遍却用皮帋裹又用米泔浸令帋濕塩泥厚
固濟乾用炭五斤煅每用入二兩余者晉後次合藥用

右為末取附子內朱砂別研為衣糯米糊丸如梧桐子每服
一百丸空心溫酒塩湯淡醋湯任下

(三)陽起石丸 治丈夫精氣不濃不能施化是以無子

陽起石火煅紅研令極細兎絲子水淘洗酒浸蒸別研
鹿茸酒蒸焙 天雄 萆薢 各一兩 覆盆子酒浸石斛 沉香別研 桑寄生 五味子 各五分

右為末酢煮糯米糊丸如梧桐子每服七十丸塩酒塩湯下
澤蘭葉兩半 肉桂去皮五分 當歸洗焙 熟地黃洗焙 各一兩
白朮兩半 川芎 石斛酒浸炒 各一兩

乾姜炮半兩　白芍藥　牡丹皮　延胡索各一兩
右爲末醋糊丸如梧桐子每服五十丸空心温酒下

〔五〕紫石英圓　治婦人子宮久冷不成孕育及數經墮胎月候不勻崩中漏下七瘕八瘕白淫白帶並宜服之

紫石英　辛夷仁　川芎　石斛去根
川烏炮去皮尖　紫威　當歸上去芦微炒各二兩　牡蠣
肉桂去皮　巻柏去根

甘草　烏賊魚骨燒灰　柏子仁炒　山蕷各一兩半

紫石英　天門冬去心各　桑寄生　熟乾地黄
牡丹皮　人參去芦　細辛去苗　厚朴去皮姜製
乾姜炮　牛膝去苗　續斷各一兩　禹餘粮煆醋淬兩半

右爲末蜜圓如梧桐子每服五十丸温酒米飲空心任下

〔轉女成男法〕〔六〕以斧置姓婦床下繫刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此置窠下一窠盡出雄雞

初產有姓取烏蝱腰下蒲百日去之

又方　取雄雞尾七長毛三並潛安姓婦卧席下勿令知

又方　取夫髮及手足甲潛安卧席下勿令知之已上四法皆在

胎前

人之夫婦猶天地也天地之道陰陽和而萬物生矣夫婦之道陰陽和而男女生矣故婦人先須調其經而百病不生百病不生而成及育然猶當知氣盛血衰則無孕血盛氣衰乃有孕須以抑氣生血爲先若有胚胎則服安胎順氣之劑及善將理以候分免如胎前產後變生諸證皆由不善調攝所致茲已詳具各方于後臨病之際又當對證求藥若外感四氣內傷七情比成諸疾治法則與男子無異當於各類求之但胎前治二婦動

胎気之薬尤宜避忌可也

惡阻 七 半夏茯苓湯 治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐惡心

白芍藥 旋覆花 人參去芦 甘草炙 赤茯苓去皮各三分

右㕮咀每服三錢水一盞姜四片煎八分空心熱服

八 茯苓圓 治妊娠惡阻停飲惡聞食氣當與半夏湯兼進

赤茯苓去皮 白朮 乾薑炮 葛根 甘草炙 半夏湯洗七次焙各二兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

九 安胎飲 治妊娠惡阻嘔吐不食胎動不安或時下血

人參去芦 枳實去白麩炒黃 肉桂去皮 陳皮 桔梗 陳皮去白麩炒 川芎各半兩 熟乾地黃 半夏湯洗七次焙一兩一分

地榆 當歸酒洗 川芎 阿膠炒 甘草炙 黃耆去芦 茯苓去皮 白朮 白芍藥各等分

右㕮咀每服三錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

竹茹湯 治妊娠嘔吐頭疼眩暈

橘紅去 人參去芦 甘草 白茯苓 白朮 麥門冬去心各一兩 厚朴姜製各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞姜五片入竹茹一塊如彈子大同煎至七分溫服不拘時

小地黃圓 治妊娠惡阻嘔吐清水腹痛不食

乾薑炮 各等分

爲末用生地黃汁圓如梧桐子每服五十圓米湯下

參橘散 治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩

元茯苓　橘皮去白各一兩　厚朴姜製　甘草炙各半兩　麥門冬去心白朮

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片竹茹少許煎七分温服

（十三）人參半夏丸　治妊娠惡阻醋心胃腹冷痛吐逆不食

半夏湯泡七次　人參　乾生姜各半兩

右爲末以生地黃汁浸蒸餅圓如梧桐子每服四十丸米飲下

（十四）旋覆半夏湯　治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多卧少起

旋覆花去枝梗　川芎　當歸去苗酒浸　乾生姜　半夏七次湯洗　甘草炙各半兩　赤茯苓去皮

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服不拘時

（十五）鯉魚湯　治妊娠胎水不利胃滿腹脹小便不通遍身浮腫或胎動腹中並能治之

當歸　細辛洗去土　人參　陳皮去白各一兩　白茯苓　白朮各等分

右㕮咀每服四錢用鯉魚一尾不拘大小破洗鱗腸白水煮熟去魚每服用魚汁盞半生姜七片橘皮少許同煎一盞空心服以胎水去盡爲度

（十六）金生白朮散　治妊娠面目虛浮如水腫狀

白朮二兩　生姜皮　大腹皮　陳皮　茯苓皮各半兩

右爲末每服二錢米飲調下

（十七）蹄涼接命散　治妊娠面赤口苦心煩腹脹

川芎　芎根　當歸去苗酒浸　白芍藥　麥門冬去心　白朮各一兩　糯米半合　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至一半温服不拘時

（十八）大聖散　治妊娠忪悸睡裏多驚腹脹膨脹坐卧不寧

白茯苓去皮　川芎　當歸去苗酒浸各一兩　木香不見火　人參　麥門冬去心　黃耆去芦蜜炙　甘草炙各七分

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服不拘時

(十九) 平安散 治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴去皮姜生薑各二分汁炒 川芎半分 木香二分半 乾地黄洗分半 甘草炙四分

右㕮咀每服四錢水一盞入燒鹽一撮煎服不拘時

(二十) 勝金散 治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸 陳皮 生薑 乾薑

川芎 厚朴 縮砂仁 甘草各等分

右為末每服二錢鹽湯調服不拘時

(二十一) 安胎和氣飲 治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子去核 白朮各一兩 陳皮去白 高良姜炒

木香不見火 白芍藥 陳米炒 甘草各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服忌食生冷之物

胎痛 (二十二) 地黄當歸湯 治婦人有孕胎痛

當歸二兩 熟地黄二兩

右為末作一服水三升煎一升去滓頓服

(二十三) 火龍散 治妊娠心氣痛

艾葉末鹽炒一兩半

右為末水煎

感冒 (二十四) 芎蘇散 治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心胷煩悶

紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮

麥門冬去心 陳皮去白 乾葛各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片葱白三寸煎服

(二十五) 百合散 治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿

百合蒸 紫菀茸洗去苗 貝母去心 白芍藥 赤茯苓去皮

前胡 去芦 桔梗 去芦炒各一兩 甘草炙半兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分温服不拘時

傷寒 二十六 白朮散 治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐逆不下食

白朮　橘紅　人參　前胡　川芎
麥門冬　赤茯苓已上各一兩　甘草　半夏洗炒各半兩
右㕮咀每服四錢姜四片竹茹二錢半水煎

二十七 升麻散 治妊娠傷寒頭痛身体熱

升麻　麥門冬　麻黄去節各一兩
黄芩　葛木　石膏二兩
大青各半兩
右為粗末每服四錢生姜四片淡竹葉二七片水煎

二十八 芍藥散 治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉者太陰也宜此藥

芍藥　白朮各一兩　甘草　茯苓各五分　黄芩一兩
右剉細每服一兩水煎

二十九 若妊娠傷寒中風表虚自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜表虚六合湯

四物湯四兩　桂枝　地骨皮各七分

拔粹方 若妊娠傷寒頭痛身熱无汗脉浮緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯四兩　麻黄　細辛各半兩

拔粹方 若妊娠傷寒下後過經不愈温毒發斑如錦文宜升麻六合湯

四物湯四兩　升麻　連翹各七分

拔粹方 若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯四兩　人參　五味子各五分

按粹云若娠婦傷寒汗下虛痞脹滿者陽明本虛也宜
合湯
四物湯四兩厚朴
枳實麩炒各五錢

〔瘧證〕〔三十〕驅邪散治娠婦停食感冷發為瘧疾
高良姜炒 白朮 草菓仁 橘紅 藿香葉
縮砂仁 白茯苓去皮各一兩 甘草炙半兩
右�once咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

〔風熱〕〔三十一〕消風散治娠婦肝臟熱毒上攻太陽穴曾膈延壅
頭旋目暈或腮項腫核
石膏煅 甘菊花去枝 防風去芦 荊芥穗
川羌活去芦 羚羊角鎊 川芎 當歸去芦酒浸
大豆黃卷炒 白芷各一兩 甘草炙半兩
右�once咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分温服

〔三十二〕天門冬飲子治娠婦肝經風熱上攻眼目帶吊失明
天門冬 菟蔚子
五味子 茯苓去皮 知母各一兩 防風去芦半兩
右�once咀每服四錢水一盞姜三片煎八分食後温服

〔胎漏〕〔三十三〕榆白皮散治娠婦漏胎去血恐其難產常宜服之
榆白皮 葵根 瞿麥各一兩 大麻仁去殼
木通半兩 牛膝三分去苗酒浸焙
右�once咀每服三錢水一盞煎八分温服

〔三十四〕如聖湯治胎動腹痛或為漏胎
鯉魚皮 當歸去芦酒浸 熟地黃酒蒸 阿膠蛤粉炒成珠
白芍藥 川芎
右�once咀每服四錢水一盞苧根少許姜五片同煎温服

〔三十五〕桑寄生散治胎漏經血妄行淋瀝不已
川續斷酒浸 甘草炙各等分

當歸 去苓酒浸 桑寄生
阿膠 蛤粉炒如珠子
白朮 各一兩 人參
右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎七分不拘時温服

(三十六) 枳殼湯 治婦人胎漏下血及因事下血
枳殼 去穣炒黃芩 各半兩 川芎 白朮 乙兩
右為末水煎食前温服

淋秘 (三十七) 全生茯苓散 治姙娠小便不通
赤茯苓 葵子 各等分 水煎每服三錢

(三十八) 安榮散 治姙娠小便澁少遂成淋瀝
滑石 各一分 當歸 去芦酒浸
麥門冬 去心 通草 甘草 各半兩 人參
燈心 細辛 各一兩
右為細末每服二錢煎麥門冬湯調服不拘時

(三十九) 桑螵蛸散 治姙娠小便不禁用桑螵蛸二十箇炙為細末每服二錢空心米飲調下

(四十) 白薇散 治姙娠遺尿不禁
白薇 白芍藥 各等分
右為末空心米飲調下二錢

(四十一) 大腹皮散 治姙娠大小便赤澁
枳殼 去白麩炒 大腹皮 甘草 炙 各一分 赤茯苓 去皮三分
右為末每服二分濃煎葱白湯調下不拘時

(四十二) 冬葵子散 治姙娠小便不利身重惡寒起則眩暈欲倒
冬葵子 三分 赤茯苓 去皮二分
右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便利則住服如不通恐是轉胞加髮灰少許極妙

(四十三) 八味圓 治姙孕小便不通名曰轉泡方見痰氣門

痎證 四十四 乾姜黃連圓 治妊娠下利赤白穀道腫痛冷熱痢可服之良效

乾姜炮 黃連去鬚 縮砂仁炒 阿膠蛤粉炒白朮各一兩 川芎 乳香三錢別研 枳殼去白麩炒半兩

右爲末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵圓如梧桐子每服四十圓白痎乾姜湯下赤痎甘草湯下赤白痎乾姜甘草湯

四十五 當歸芍藥湯 治妊娠腹中疙痛下痎

當歸去皮 澤瀉 白芍藥 白茯苓去皮 川芎各一兩 白朮一兩半

右爲末每服二錢空心溫酒米飲任下

子煩 四十六 麥門冬湯 治妊娠心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬去心 防風 白茯苓各兩 人參半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片淡竹葉十片煎八分溫服

四十七 竹瀝湯 治妊娠心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓四兩 防風 麥門冬去心 黃芩各三兩

右㕮咀每服四錢水一盞竹葉五片煎服不拘時

四十八 知母飲 治妊娠心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

赤茯苓 黃芩 麥門冬去心 甘草各二兩 黃耆各三兩 知母

右㕮咀每服四錢水一盞入桑白皮煎熟再入竹瀝同服

子懸 四十九 紫蘇飲 治胎氣不和接上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮 川芎 當歸去蘆酒浸各一兩 白芍藥 陳皮去白 紫蘇葉 人參 甘草各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片葱白七寸煎空心溫服

子癎 五十 羚羊角散 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語寇澁痰涎不消或時發搐不省人事名曰子癎

羚羊角鎉　川獨活去芦　酸棗仁炒去殼　五加皮去木各半錢
薏苡仁炒　防風去芦　當歸去芦酒浸　川芎　茯神去木
杏仁去皮尖各四兩　木香不見火　甘草各二分半

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分不拘時服

(五十二)【安護】川芎散　治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能臍腹疫痛用川芎為末每服二錢温酒調下

(五十三)白朮散　治妊娠胎氣不和飲食不進

白朮炒　紫蘇各一兩　白芷炒　人參各二兩
訶子　青皮去白　川芎各三分　甘草炙一分

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片煎七分不拘時服

(五十三)佛手散　治妊娠胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸去芦酒浸　芎藭各一兩

右㕮咀每服四錢酒一盞煎乾再入水一盞煎三二沸温服

(五十四)膠艾湯　治妊娠或因頓仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黃洗　艾葉炒　白芍藥　川芎　黃耆去芦
阿膠蛤粉炒成珠　當歸去芦酒浸　甘草炙各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎空心温服

(五十五)安胎散　治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血用縮砂不拘多少於熨斗內炒令熟却去皮研為細末每服二錢熱酒調服又塩湯亦可胃虛嘔吐者更宜服之

(五十六)立効散　治婦人胎動不安如重物所墜冷如氷

川芎　當歸各等分

右為粗末秤三錢水煎食前温服

(五十七)芎歸補中湯　治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而墜名曰半産

乾姜炮　阿膠蛤粉炒　芎藭　五味子各一分

黃耆 去芦蜜炙 當歸 去芦酒浸 白朮 赤芍藥 各兩半
木香 不見火 人參 杜仲 去皮炒 甘草 各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎服不拘時

(五十八) **救生散** 治胎氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益氣易產

人參 訶子 煨去核 麥芽 白朮
神麯 陳皮 各炒等分

右爲末每服二錢水一盞煎七分空心温服

(五十九) **杜仲圓** 治姙娠三兩月胎動不安防其欲墮預宜服之

杜仲 去皮劉姜汁炒去絲 川續斷 酒浸 各二兩

右爲末棗肉煮爛杵和爲丸如梧桐子每服七十圓米飲下

(六十) **枳實橘柹丸** 治安養胎氣調和經候癥瘕癖堀有似姙孕可以久服血氣通和兼寬腸美食

枳實 麩炒 橘柹 各半兩

黃連 黃蘗

黃芩 當歸
右爲末水和丸如小豆大温米飲下三十丸不計時

(六十一) **黃芩湯** 治婦人孕胎不安

白朮 黃芩 各一分

右爲末每服三錢水二盞入當歸一根同煎至一盞温服

(六十二) **白朮散** 治婦人姙娠宿有風冷胎瘵不長或失於將理動傷胎氣多致損墮常服壯氣益血保護胎臟

白朮 川芎 各一兩 蜀椒 去目炒 七分半
牡砺 煨 五分

右爲末每服一分空心温酒調下

(六十三) **瘦胎枳殼散** 治姙孕七八月常宜服之滑胎易產

枳殼 麩炒赤 一兩半 商州枳殼 五兩去白麩炒赤

右爲末每服一錢空心白湯點服一方加香附子尤佳
或㕮咀每服五錢水二盞煎一盞温服亦可

(六十四) 無憂散 治胎肥氣逆臨產難產

當歸去芦川芎 白芍藥各三分 木香不見火 甘草炙各一分半 枳殼去白麩炒 乳香別研各三分

血餘髮灰一分半 猪血和之

右㕮咀每服三分水一盞煎八分温服不拘時

(六十五) 勝金散 治血氣不旺臨產難產

麝香一分 塩豉一兩舊青布袋裹燒令紅急研令細

右爲末取秤錘燒紅以酒淬之調藥二錢服

(六十六) 獨聖散 治難產

黄葵子炒七十粒 研爛酒服濟君急

若也臨危難產時 免得全家俱哭泣

(六十七) 金液圓 治胎氣大肥橫逆難產

飛生毛半分火燒如腕下毛尤佳 父母羊糞燒灰

血餘无病女人髮燒灰各半分

朱砂半分別研 黑鉛二分用銚子火上溶投水銀半分

急攪結成砂子傾出研令極細

右爲末用粽子角爲圓如菉豆大遇難產以倒流水吞五圓

(六十八) 催生鉛丹 治橫逆難產用

投水銀一錢急攪結成砂子 黑鉛一錢用小銚子火上溶

菉豆大臨產時香水吞下一圓立便生下

(六十九) 霹靂奪命丹 治臨產暴然氣痊目翻口禁面黑唇青沫

出口中子母俱隕兩臉微紅子死母活修合時勿令婦妾雞犬見

蛇退一条入冤鉗內 金銀箔各七片 乳香半分別研

千里馬路上左脚草鞋一隻洗淨燒灰一分 髮灰一分

黑鉛二分半水銀七分一依前法

馬鳴退蚕退燒灰一分 里

右爲末以猪心血圓如梧桐子倒流水灌二圓化開亦得

(七十)益母圓 專治產難橫逆并安胎順氣用益母草其葉類火麻葉莖方花紫色白者不是五月五日採其葉蒸陰乾不見日忌鐵器以石磨爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓臨產以童子小便温酒送下若氣不順用木香參湯并艾醋湯送下此草今人喚作茺蔚

(七十一)催生丹 治產婦生理不順臨產艱難十二月兎腦髓去皮摸研乳香研如粉一分 母丁香末一分 麝香細研一字

右研勻用兎髓和圓如雞頭大陰乾用油紙密封貼每一圓破水後温水下即時產下隨男左女右手握藥出是驗

(七十二)集效催生神應馬散 兼治橫生逆產

百草霜研 香白芷末各等分

右和勻每用二錢童便并好醋調稀更以沸湯浸服之甚效

(七十三)香桂散 下死胎

麝香半分別研 官桂三分爲末

右和勻只作一服温酒調下須臾即下

(七十四)來蘇散 治臨產用力太過氣血暈悶不省人事

木香不見火 神麯炒 陳皮去白 麥蘗炒 黄耆去芦 生黄芪炒黑 阿膠蛤粉炒白芍藥各一分 糯米一合半 紫根洗淨 甘草炙各三分

右㕮咀每服四錢水一盞煎幹開口灌連進爲愈

産後

凡婦人生産畢且令飲童子小便一盞不得便卧且宜閉目而坐須更方可扶上床仰卧宜立膝高倚枕頭厚鋪茵褥使無賊風吹着兼時時令人以軟物從心揩至腰下使惡露不滯如此

者兩三日常令產婦聞醋氣或燒乾漆煙若無乾漆以破舊瓷器燒之以防血逆迷運之患分兒之後須臾且食白粥一味不可令太飽逐日漸增之仍時與童子小便一錢飲之或童子小便以好酒和半錢温服三日過後方可進醇酒并些鹽味及臭爛猪蹄肉或雌雞亦不可太過若絶產便與酒恐產母藏府方虚不禁酒力必引血迸入四肢致生諸証或热酒入腹致昏瞀況不善飲者乎絶產食肉太早緣藏府方虚恐成泄瀉或変積滯亦不可喜怒憂思動力太早恣食生冷及不避風寒或冷水洗濯當時雖未竟大損滿月之後致病百端或成產後諸疾小可虚羸失於將補便成大患終身悔而不及其產後倘有諸証不論巨細並有方藥可治

胎衣不下 七十五 黒神散 治婦人產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心

黒豆 炒半升 熟乾地黄 當歸 去芦 酒浸 肉桂 去皮

乾薑炮 甘草 炙 蒲黄 各四兩

右爲末每服二錢熱酒調下入童子小便尤爲佳濟生方除蒲黄加附子

七十六 花蕊石散 治產後胎衣不下極有神効方載傷折門

七十七 奪命丹 治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或去血過多肺氣喘促謂之孤陽絶陰亦難治之證急宜取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子 炮去皮臍半兩 牡丹皮 去心 乾漆 炒令烟尽 各一兩

右爲末用醋醋一升大黄末一兩同熬成膏和藥圓如梧桐子每服五七圓温酒送下

血暈 七十八 芎歸湯 治產後去血過多暈煩不醒一切去血並宜服之

當歸 去芦洗焙 芎藭 各二分

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分熱服不拘時腹中刺痛加白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾薑白芍藥水停心下微有嘔逆加茯苓生薑煩不得眠加人參竹葉大便閉澁加熟地黃橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇脹脹加厚朴血崩不止加香附子咳嗽痰多加紫菀半夏生姜腰痛脚痛加牛膝心下疼痛加玄胡索惡血不下腰腹重痛加牡丹皮煎

七十九 **卷荷散** 治產後血上沖心血刺血暈腹痛惡露不快

初出卷荷　紅花　當歸　浦黃 俗炒 牡丹皮 各乙兩

右為細末每服三錢空心溫酒調下一臘內用童子小便調下

八十 **黑簡丹** 一切產難又治妊娠臨產難生或胎衣不下產後血暈不省人事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜服之

當歸 去芦酒浸 生地黃 五靈脂 川芎 高良姜 各三兩

以上剉入沙鍋內紙筋塩泥固濟炭火煅令通紅火冷取出細研入後藥

生硫黃 花蕊石 百草霜 乳香 琥珀 各二分

右五味一兩二分細末同前藥和勻米醋煮麪糊圓如彈子大每服一圓服時再入炭火煅藥通紅入姜汁內浸碎以無灰酒合童子小便頓服神效不可述

八十一 **神仙奪命散** 治婦人產後血暈血虛積血不散突熱往來胸不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血風瘡此藥逐惡血生新血止肚痛

紫金皮　川牛膝　當歸　川芎　麻黃

玄胡索炒　官桂　神曲　荊芥

赤芍藥　熟地黃　雄黑豆 各二兩　粉草

右爲末温酒調或當歸童子小便任下

(八十二) 清魂散 治產後血暈童子小便任下
薰之類置醋炭房中次進此藥

澤蘭葉 人參去芦各一兩 荆芥穗二兩 甘草炙八分 川芎二兩

右爲末每服二錢熱湯温酒一半盞調勻灌下

(新産) (八十三) 四順理中圓 治新産血氣俱傷理胃不調百日内宜常服

甘草炙 人參去芦各一兩 白朮各一兩 乾姜炮 乾姜炮

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服三十圓空心米飲下

惡露 (八十四) 增損四物湯 治產後陰陽不和下寒下熱如有惡露未盡經滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛爲異

當歸去芦酒浸 白芍藥 川芎 甘草炙半兩 乾姜一兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎至三片煎服不拘時

(八十五) 當歸養血圓 治產後惡血不盡發熱身痛經閉者並治之

當歸去芦赤芍藥 牡丹皮 延胡索炒各二兩 肉桂一兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓空心温酒米飲任下

(八十六) 地黄煎 治產後惡物不尽腹中疗痛

當歸並炒各乙兩 生乾地黄 生姜半兩細切如蝿頭大新瓦上炒令焦黑

右爲細末姜酒調下一錢服

惡露不止 (八十七) 治產敗血不止

乾地黄生者

右擣爲末每服二錢食前熱酒調服連進三服

(八十八) 固經丸 治產後崩中暴下淋瀝不已如有腹脹則是瘀血使然此藥又非其治

赤石脂 煨　艾葉
附子一个炮去皮臍
右爲末陳米飲和圓如梧桐子每服五十圓温酒送下

通治 八十九 經驗加減四物湯 治婦人諸虛不足胎前產後諸病加減于後

當歸 酒浸一宿　熟乾地黄　白芍藥　川芎各一兩
右㕮咀爲剉散隨病證加減後藥煎服
血氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩○胎動下血加熟艾一塊阿膠七片末一錢○補下元加乾姜半兩甘草七分○血崩淋瀝不斷加炮附子一个赤石脂一兩○便血及帶下加荆芥地榆○血氣滯腹内刺痛加桂○產後傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩○血風勞加荆芥柴胡○潮熱加前胡子乾葛人參黄芩○虛熱口乾加門冬半兩黄芩一兩○嘔吐

不止加霍香白术半兩人參一錢○產後虛羸血熱煩悶加生地黄○產後腹脹加枳殼肉桂各三錢○產惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝○產後寒熱往來加柴胡門冬各半兩○經血淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥○血滯不通加紅花桃仁各一分○大便閉加大黄桃仁各一分○產後悶亂加茶神遠志各半兩○虛煩而多汗加煅牡蛎麻黄根各半兩○妊娠心煩加竹茹一塊○如有敗血則用當歸近上節白芍藥

血虛 九十 人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生内熱其證心胷煩滿吸吸短氣頭痛悶亂晡時輒其與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄　人參去芦　當歸去芦　肉桂去皮
麥門冬去心各一兩　白芍藥二兩

右㕮咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入藥并棗三枚煎温服血熱甚者加生地黃

(九十一) 當歸黃耆湯 治產後失血過多腰脚疼痛壯熱自汗

當歸去苗二兩　黃耆各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞畫五片煎服不拘時

(九十二) 濟尼上丹 治產後下血過多虛極生風唇青肉冷汗不止

太陰玄精石別研　乳香別研　五靈脂　卷栢生

硫黃別研　桑寄生　陳皮去白　阿膠蛤粉炒各等分

右將前四味同研勻石器內微火炒勿令焦再研極細却入後四味藥末用生地黃汁圓如梧桐子每服五十圓當歸酒下

(九十三) 熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣腳弱眼眩飲食無味

熟地黃一兩淨洗酒浸蒸焙　人參去苗

麥門冬去心各二兩　甘草炙半兩　括蔞根四兩

右㕮咀每服四錢水盞半糯米一撮薑三片棗二不煎服

血氣

(九十四) 抵聖湯 治產後血氣傷于脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥　半夏湯泡　澤蘭葉　陳皮去白

人參各二分甘草炙二分生薑半兩

右㕮咀每服四分水一盞煎服不拘時

(九十五) 太平聖惠湯 治產後血氣衝心時發疼痛甚者宜進玄胡索湯

熟地黃酒蒸焙　當歸酒浸去苗　川獨活去苗　白芍藥

細辛洗去苗　吳茱萸炒　桂心不見火　小草各一兩

干薑炮　甘草炙各三分

右㕮咀每服四分水一盞煎服不拘時

(九十六) 調中湯 治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛洞泄不止良薑炒

當歸去苗酒浸　肉桂不見火　白芍藥

附子 炮去皮 川芎 各一兩 甘草炙 人參 各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞煎服

(九十七) 趙痛散 治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼痛

當歸去苗酒浸 官桂不見火 白朮 川牛膝 黃耆去芦
獨活去芦 生薑 各半兩 甘草炙二分 雞白二分半
右㕮咀每服四錢水一盞煎服加桑寄生半兩尤佳

(九十八) 調經散 治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫不可作水氣治之但調經水腫自消又有去血過多心虛易驚加生龍腦一撮煎服

沒藥別研 肉桂不見火 各一分 細辛洗 半兩 琥珀別研一分
赤芍藥 當歸去苗酒浸 各一兩 麝香半分別研 甘草炙二分
右為末每服二錢生薑汁温酒任意調下

(九十九) 見現圓 治產後血氣耗散口乾煩悶心下痞痛

高良薑炒 薑黃洗 蓬朮炮 人參
右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汁煮麪糊圓如梧桐子每服五十圓就用蘿蔔湯吞下

(一百) 失笑散 治產後心腹絞痛欲絕者

蒲黃炒 五靈脂酒研淘去沙土 各等分
右為末先用醋酒調二錢熬成膏入水一盞煎七分熱服

(百一) 四神散 治產後瘀血不消積聚作堀心腹切痛

當歸 乾薑炮 川芎 赤芍藥 各等分
右為細末每服二錢温酒調下

(百二) 治產後血堀腹痛

荆芥炒 川當歸炒 乾地黃洗 芍藥 各半兩
蒲黃一分銚內隔帛炒赤

右爲末每服二錢食後熱酒下

虛秘 百三 麻仁圓 治產後去血過多津液枯竭不能傳送大便閉澁虛弱則用此圓以潤滑之

麻子仁別研 枳殼去白麩人參 大黃各半兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓溫酒米飲任下

百四 橘杏圓 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰產勞

當歸去苗酒浸 人參各七錢 黃耆去苗一兩 生薑半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去滓作六服早晚頻進

百六 猪腰子湯 治產後產勞發熱用猪腰子一隻去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盌底用熱粥蓋之如作羹生粥狀空心服之

感冒 百七 旋覆湯 治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅塞

麻黃去節前胡 五味子拂旋覆花 杏仁去皮尖麩炒 甘草炙 茯苓 赤芍藥 荊芥去梗半夏麴各等分

右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚同煎七分溫服

下乳 百八 通草散 治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

通草二兩半 蛇蛻炙一十條 瓜蔞十个急火燒存性

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍嚼熱羹助之

百九 猪蹄湯 治妳婦氣少力乏脉澁不行絶無乳汁

猪蹄一隻去 通草五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草煮取四五升取汁飲之

中風 百十 交加散 治產後中風腰脇不得轉動

生地黃五兩研取汁 生薑五兩研取汁

右交互以浸之淬一夕次日漬盡汁各炒黃焙為末油調服

【血迷】【百十一】【八珍散】治產後血迷心竅言語不正狀如癲狂或不語

人參　石菖蒲　生地黃　川芎各一兩　朱砂別研
防風去芦各半兩　細辛淨洗一分　甘草炙半兩

右為末每服一分薄荷湯下不拘時地黃多恐膈脾胃不快者以當歸代之

名方類證醫書大全卷二十三

鼇峯　熊宗立　道軒　編集

小兒方上

小兒初生受胎氣之厚者疾病自少稟賦枯弱者又藉藥力以扶植元氣何況養護不謹或受整為觸或飲食過度衝冒寒暑以致變生諸證調治之法又須察脉觀證審之而後投以藥餌要備數方于後以備急卒

○臍風撮口

小兒初生一七日內忽患臍風撮口十無一活坐視其斃良可憫也有一法極驗世罕有知者凡患此證兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水離熟帛包手指輕輕擦破即開便安不用服藥

〔一〕定命散 治因前脣傷於風濕致令唇青撮口

赤脚蜈蚣半條酒炙 川烏頭尖三个生 麝香少許別研

右為末和勻每服半字金銀薄荷湯調下

陳氏方 治小兒臍瘡不乾

白礬 煅研 白龍骨煅研各等分

右為末每用少許傳之又有用綿子燒灰亦可

湯氏方 治撮口用白姜蚕末蜜調塗口唇內外瘡

聖惠方 治撮口用牛黄一豆研竹瀝一合調勻滴入口中

張氏方 治小兒斷臍為風濕所傷或尿在抱裙之內遂成臍風面赤喘息啼声不出名曰撮口並皆治之

赤脚金頭蜈蚣一枚蜈蚣 四尾姜蚕七个 瞿麥半分

右為末先用鵝毛管吹藥入鼻內使噴々啼叫為可醫後用薄荷湯調服之

〔二〕珠蠶散 治口瘡

末使乱髮纏指指舌上令净以藥傳之

秘方 治鵝口不能乳者用地雞 即地鼈 搥碎水塗瘡即愈 地雞扁虫也人家壁下多有之

秘方 治小兒白屑滿舌狀如鵝口用髮纏指頭蘸井花水拭舌上如不脫濃煮栗殼汁以綿纏筋頭拭之却用煅過黄丹摻之小兒初生舌下有膜如石榴子連於舌根令兒言語不發可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰摻之

湯氏方 治小兒心有客熱滿口生瘡用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

〔一〕口瘡重舌

小兒夜啼要飲乳若口到乳上即啼而不乳者必身額皆微熱急取燈照口若無瘡舌必腫也隨證施治

〔二〕連心湯 治口瘡

用黄連去芦為末蜜水調服

〔三〕

治口瘡用鵝口不能乳者朱砂細研白礬等分為末使乱髮纏指舌上令净以藥傳之

秘方 治鵝口不能乳者用地雞搥碎水塗瘡即愈 地雞扁虫也人家壁下多有之

秘方 治小兒白屑滿舌狀如鵝口用髮纏指頭蘸井花水拭舌上如不脫濃煮栗殼汁以綿纏筋頭拭之却用煅過黄丹摻舌根令兒言語不發

湯氏方 治小兒心有客熱滿口生瘡用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

四 先心散 治小兒心經蘊熱涌口生瘡 方載積熱門

重舌 五 活小兒舌下生舌名曰重舌用針刺去惡血即愈

千金方 治小兒重舌用竹瀝漬黃蘗無時點舌上真蒲黃末摻塗亦可

和劑方 治小兒舌腫塞口欲痛者用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以尽為度

夜啼 ○夜啼客忤

夫小兒胎熱則心躁而喜夜啼或腹熱啼時有汗而身仰或口舌瘡腫不能吮乳故夜啼不止也客忤者見生人氣忤犯而啼也

夜啼 治兒在胎中受驚故生未滿月而發驚用朱砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入麝香當門子尤妙

秘方 治小兒夜啼用蟬退二七枚全去大腳為末入朱砂一字蜜調為圓使吮之

七 燈花散 治初乳在心內躁夜啼用燈花三兩顆研為末灯心煎湯調抹口中以乳汁送下日三服

八 龍齒散 治小兒夜哭不住

蟬殼 去翅足洗去土 茯苓去皮 人參各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

九 乳頭散 治夜啼不止腹中疼痛

黃耆 當歸 甘草炙 赤芍藥 木香各等分

右為末每服少許着乳頭上使吮乳就服之

客忤 十 真珠散 治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡臥跳時或咬牙啼叫不已小便赤澁或吐黃沫

真珠末 海螵蛸 滑石各一分 茯苓 白附子 人參各二分 甘草 全蠍各半分

朱砂一分　脳子　麝香各一分　金銀箔五片
右爲末每服半分灯心煎湯入蜜少許下

（十一）黄土散　治小兒卒然客忤
伏龍肝　蚯蚓糞
等分研勻和水塗兒頭上及五心良

○胎热胎寒　附　腹腸內吊
凡小兒胎中受热生下則多驚啼身热或大小便不通胎中受寒生下則身青躰冷或腹痛盤腸內吊須察其候而治之

胎熱（十二）醸乳方　解胎中受热生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食
澤瀉二兩半　赤茯苓　天花粉各兩半
生地黄二兩　茵陳　甘草各一兩
右�once咀每服三分水一盞煎食後令乳母摸去箔乳却服

（十三）生地黄湯　治小兒生下遍体皆黄狀如金色身上壯热大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黄之候皆因母受热而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并畧与兒服
生乾地黄　當歸　赤芍藥　川芎　天花粉各等分
右�once咀每服五分水一盞煎服

胎寒（十四）當歸散　治小兒胎中受寒生下手足外風面色青白四肢厥冷大便青黑心腹疼盤腸內吊並皆治之
當歸剉微炒黄者蜜炙　細辛
龍骨細研　桂心　赤芍藥各半兩
右爲末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減服之

內吊（十五）約藥膏　治內吊腹疼
沒藥　乳香各二分　木鱉十二个　木香　姜黄各四分
右先將後三味爲細末同前二味拌和煉蜜成劑收沙罐內

量兒大小加減煎約藤湯化下次服魏香散

(盤腸氣)(十六)魏香散 治盤腸內吊

蓬莪朮 半兩 貞阿魏一名

右先用温水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾爲末每服一字
煎紫蘇米飲空心調下

(十七) 治盤腸氣痛用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於
乳鉢內磨水半盞調乳香沒藥末煎數沸服之立效

(十八)(高香散) 治小兒盤腸氣痛

高香 炒 木香
蘿蔔子 炒 檳郎

黑附子炮 金鈴子去核用皮
破故紙炒 白豆蔻 煨各等分

右咬咀每服二錢水半盞入鹽煎服

(十九)(木香散) 治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿
如米汁

川練子七个去皮核用巴豆二十五粒去皮同炒令巴豆黃
去豆不用木香 黃史君子肉 延胡索 茴香各一分

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

(急慢驚風)

驚風有陰陽二證身熱面赤而發搐搦上視牙關緊硬者陽證
也因吐瀉或哭吐不瀉日漸困面色白脾虛或冷而發驚不甚
搐搦微微目上視手足微動者陰證也陽證急驚風用涼劑陰
證慢驚風用温藥不可一槩作驚風治也又有一證欲發瘛瘲
先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當宣解散

(急驚)(二十)大青膏

蝎尾去毒生半分 朱砂研一字 青黛一分研
天竺黃一分 天麻末一分 麝香一字
白附子末生二分半 烏稍蛇肉酒浸焙干取末半分

右為末蜜和成膏每服一丸如皂角子大同牛黄膏温薄荷湯化一処服之五歲已上同甘露散服

〔二十二〕溫青丸

當歸去芦　龍膽焙秤　川芎　山梔子仁
川大黄濕紙裹煨本无大黄羌活　防風去芦焙各等分

右為末煉蜜圓如雞頭大每服半丸至一丸煎竹葉湯同沙糖水化下

〔二十二〕金箔鎮心丸　治風痰雜熱心神恍惚急驚擡搦

紫荷車黑豆水煮軟二各半　山藥兩半　甘草五各
牙硝一兩　麝香研五各　人參五各　金箔用十片為衣
龍腦一各　茯苓五各　朱砂研飛一兩

右為末煉蜜成劑每兩作五十丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下常服安心止驚散邪涼膈

〔二十三〕睡驚丸　治心蘊邪熱怔忡不安睡中驚啼風痰雜盛

茯苓去皮鉄粉　蛇黄煅醋淬　南星炮　史君子去殼各
腦子半兩別研　麝香一兩別研　銀箔　金箔各一百片研

右為末糯米糊丸如皂荚子大朱砂為衣薄荷湯化下

〔二十四〕天麻防風丸　治一切驚風壯熱痰盛驚悸

蚕蛾去絲觜炒半兩　天麻　防風　人參各一兩
牛黄一各研　全蝎去毒炒半兩　朱砂
雄黄　麝香各二各半研細　甘草炙二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三丸薄荷湯化下

〔二十五〕安眠散　治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星炮製人參去芦白附子炮各半兩　干蝎二十一个生用
乾赤頭蜈蚣一條酒浸醋炙微黄　乳香　血蝎各一分

右為末每服一字用好酒少許浸薄荷酒調下

(二十六) **金星丸** 治急驚壯熱上壅痰涎大便不通

礬金末 雄黃 各一分 臍粉半夕 巴豆七个去油心膜

右為末醋糊丸如黍米大一歲二丸薄荷湯臍茶清下

(二十七) **天麻丸** 治急驚風四肢拘急壯熱口噤

天麻 烏蛇肉 蟬殼 乾蝎

雄黃細研 麝香細研 天竺黃細研 桂心 天南星 白附子

臍粉 白芷 半夏湯洗七次各一分

右為末煮棗肉丸如豌豆大每服三五丸薄荷酒下

(二十八) **紅綿散** 治夾驚傷寒

麻黃去節 全蝎炒 甘草炙 大黃濕帝裹煨

天麻 白附子炮 蘇木炒各等分

右為末每服一夕水半盞煎服

(二十九) **抱龍丸** 治痰嗽驚風時作潮熱

牛膽南星二兩天竺黃半兩雄黃

右為末煉蜜丸如芡實大甘草薄荷湯化下

溫驚 (三十) **吉祥醒脾散**

人參去芦 橘紅 甘草炙 白朮 茯苓 木香

全蝎各半兩半夏麴 白附子四个炮南星 陳倉米二百粒

右為末每服一錢水半盞薑二片棗一枚煎服

(三十一) **蝎烏湯** 治驚風手足搐搦涎潮上壅

川烏一兩去皮臍生用 全蝎十个去梢後毒

右作三服水一盞薑七片煎溫服

(三十二) **木附湯** 治慢脾風身弓髮直吐乳貪睡汗流不已

大附子一个炮 白朮一兩煨 木香半兩 肉豆蔻一枚麪煨甘草

右咬咀每服二錢水半盞薑三片棗一枚煎服

(三十三) **八仙散** 治慢驚虛風

天麻　白附子　防風去芦
南星炮　半夏麴　花蛇肉　全蝎各等分
右㕮咀每服一分水半盞姜棗薄荷煎服加川烏尤妙

(三十四)【醸乳法】治慢驚睡多驚啼凡面黄脉細者難治

人參　木香　霍香　沉香
陳皮　神麴　麥蘗　丁香臧半錢各等分
右㕮咀每服四分水一椀姜十片紫蘇十葉棗三枚砂瓶內煮至半椀乳母食後揑去姊汁服之即仰卧要時令藥入乳之絡次令兒吮不可過飽亦良法也

【通治】(三十五)【生珠膏】治急慢驚風

天麻一分　朱砂一分　姜蚕　白附子煨各二分　全蝎二十一个
黑附子一分　麝香半字　蜈蚣一條酒浸炙干　南星一分　花蛇酒浸炙干半椀　虫二分
右為末和勻煉蜜圓如雞頭大每服一圓金銀薄荷湯化下

(三十六)【浴体法】

天麻二分　蝎尾去毒　朱砂各半分　烏蛇肉酒浸焙
白礬各三分　麝香一字　青黛三分
右為末每用三分水一椀桃枝同煎温熱浴兒勿浴背上

(三十七)【封臍法】

麝香一字七　蝎尾去毒為末半分七一方作半字七
薄荷葉半字七　蜈蚣末　牛黄末　青黛末各一字七
右為末熟棗肉和成膏新綿上塗勻貼於顖上四方可出一指許火上炙手頻熨百日裹外兒可用此塗并浴法

(三十八)【奪命散】治急慢驚風痰潮壅滞窒於咽間命在須臾服此藥者无有不愈

青礞石一兩入旧窩內同煅消一兩用白炭火煅令通紅須消尽為灰候藥冷如金色取出研為細末

右為末急驚風痰發抽者薄荷白湯調下
者有以青州白圓子再碾煎稀糊入蜜調下神效

(三十九) 百指方全蝎散 治小兒驚風

人參 陳皮各七分 全蝎炙三个 甘草炙半分
木香二分 天南星 濕紙煨二分
右㕮咀每服一分紫蘇姜棗煎服有熱加防風

(四十) 硃砂丸 治小兒急慢驚風風熱生涎喉咽不利取驚積

珠砂 天南星 芭豆霜各半分
右為末麪糊和丸如黍粒大看病虛實大小每服二丸或天
吊戴上眼每服四五丸薄荷水下立愈

(四十一) 大天南星圓 治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視

天南星牛膽製半兩 朱砂三分 谷別研 腦子
人參 全蝎十四个去毒炒 麝香一分半

牛黃 天麻 防風各二分半
右為末煉蜜圓如雞頭大每服一圓荊芥薄荷湯下

(四十二) 安神丸 治小兒心神不寧困卧多驚痰涎雍盛

朱砂二分半 人參二分半 乳香半兩各別研
酸棗仁炒去皮一兩 遠志去心一分半
右為末蜜圓如榛子大金箔為衣每服一圓人參湯化下

又方 治小兒急慢驚風

烏藥磨水煖服之土烏藥亦可用一名僕其曾
○變蒸發熱

(四十三) 惺惺散 治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞聲重

人參去蘆 白朮 白茯苓 甘草 白芍藥
天花粉 桔梗去芦各半兩 白芷 細辛一分去苗只用根
右為末每服一分薄荷一葉煎服

四十四 神仙黑散 治小兒痙後余熱與傷寒相似者當詳其證若上唇中心有白點子者為痙後余熱宜服此藥

麻黃去節 大黃

右燒存性為末每服一字水半盞煎服抱兒於溫暖處連進之有微汗身涼即癒

○中惡風癇

中惡 四十五 獨合香圓 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡腹大而滿診其脉緊細而微者生緊大而浮則死急服蘇合香圓一丸以皂角末觸鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓不愈進以辟邪膏無不效者客忤亦可服

附 天吊

四十六 辟邪膏 治小兒卒中惡毒心腹刺痛方載著要門

降真香 白膠香

鬼臼 沉香 虎頭骨炙

龍腦草 人參 茯苓 各半兩

右為末入雄黃半兩麝香一分研勻陳蜜為丸乳香湯下及令兒帶燒臥內尤妙

風癇 四十七 珍珠丸 治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭豆霜 臘粉 二分 滑石 三分 天南星

粉霜 各一分 蝎梢 續隨子 去皮各二十四个

右為末研令極細以糯米粥為丸如黃米大小兒二歲已下每服三丸至五丸十五歲每服五丸至十丸點茶湯下荊芥湯亦得量虛實加減

四十八 斷續丸 治癇疾愈而復作者

黃耆 蜜水塗炙 鈎藤鈎子 細辛 去苗葉 甘草 炙各半兩

蛇退皮 三寸 酒炙 蟬殼 四个 洗去土

右為末棗肉為丸如麻子大煎人參湯下一歲十丸大小加減

四十九 細辛大黃湯 治風癇熱癇

細辛去土苗 大黃炮 防風去芦各十兩 甘草炙一分

右㕮咀每服一錢水半盞加犀角屑少許煎服

（五十）**大聖一粒金丹** 治大小兒急慈中風左癱右瘓口眼㖞斜涎潮語澁遍身疼痛一切風癇之證並皆治之

大黑附子炮去皮臍尖 大川烏頭炮去皮臍尖各二兩

新羅白附子炮 白姜蚕洗去絲微炒 五靈脂去石研各一兩

白礬煅 沒藥 白殭蚕炒去尖刺 朱砂

麝香各半兩各別研 金泊二百片為衣 細香墨半兩

右前六味同為細末後四味研停合和用井花水一盞研墨尽為度將墨汁搜和杵臼內搗五百下丸如彈子大金泊為衣陰乾每服一粒食後臨卧生姜自然汁磨化入熱酒服再以熱酒隨多少飲之就無風暖處卧用衣被盖得汗為愈病少者每粒分作二服忌發風姜物孕婦不可服

（五十一）**白礬膏** 治小兒諸癇

白礬 一分蜜炒 大附子去皮臍一个 犀角鎊末一个

全蝎七个每一个用大葉薄荷裹湯炮麻黃令軟鋰定慢火炙黃色 厚朴甘草水煮焙一分

右為末取竹瀝為膏丸如黑豆大每服用金銀薄荷湯化下一丸隨兒大小加減

（五十二）**至寶丹** 治諸癇急驚卒中客忤並宜服之

安息香兩半為末无灰酒飛過濾去沙石約取一兩慢火熬成膏入藥內用 琥珀研 朱砂 雄黃各一兩研水飛

金泊五十片研 龍腦 麝香各一分

牛黃半兩各研 生玳瑁屑各一兩

生犀玳瑁揭羅為細末研入餘藥令勻將安息香膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入少熟蜜丸如梧桐子二歲服

二圓人參湯化下大小以意加減

五十三 得效方 治小兒癲癎及婦人心風諸疾用甘遂末一錢豬心一个取三竅頭血三條和甘遂末捋豬心批作兩片以藥入在內用線縛定外以皮紙包裹水濕入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂末一分依四丸每服一丸豬心煎湯化下每服別取豬心煎湯此方神効

五十四 分肢散 治小兒卒風大人口眼喎斜風涎裹心驚搐天吊走馬喉閉急驚一切風热等疾

巴豆不去油 朴消各半兩 川大黃一兩

右大黃為末後入巴豆霜朴消一処細研用油單貼起如有前患每服半豕热茶下吐下頑涎立愈如小兒胃喉驚吊先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字茶下時間上吐下瀉微瀉或吐利得快為効大人半豕小兒一字看虛实加減只是一兩服見効不宜頻服如吐瀉不定以參白湯立止

五十五 治胎癎驚風用全蝎頭尾全者以去薄荷葉裹之以線扎定火上炙燥碾為末入麝香朱砂少許每門冬湯下

天吊 五十六 九龍控涎散 治小兒瘟热痰室經絡頭目仰視名為天吊

滴乳香二豕別研天竺黃二豕半雄黃別研 膩茶白礬枯各一豕 荊芥穗炒二豕 甘草炙二豕 蒙豆一百粒半生半炒

右為末每服半錢至一錢煎人參湯薄荷湯調下

五十七 釣藤飲 治天吊潮热

釣藤 人參去芦 星角屑各半兩 甘草炙半分 全蝎

右為末每服一錢水半盞薑煎至一半温服

○感冒四氣

(傷風)(五十八)麻黃湯治傷風發熱咳嗽喘急
麻黃去節根剉三分水煮肉桂去粗皮甘草各一分
杏仁四分去皮尖炒令黃色
右㕮咀每服二分水一盞煎服有汗者不宜服

(五十九)金沸草散治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕
金沸草即旋覆花 前胡去芦 荊芥 赤芍藥 甘草炙各一兩
右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服

(六十)潤肺散治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕
貝母麩炒黃 杏仁去皮麩炒各二兩半 麻黃去根節
人參各二兩 阿膠炒半兩 陳皮二分半 甘草一兩 桔梗半兩
右㕮咀每服一分水一盞食後煎服

(六十一)薄荷散治熱極生風痰涎壅盛
薄荷葉半兩 羌活 全蝎 麻黃去節
甘草半分 姜蚕 天竺黃 白附子炮各一分

右為末每服一分水半盞煎服加竹瀝少許尤妙

(感寒)(六十二)人參羌活散治傷寒發熱
羌活 白獨活 柴胡去芦 人參去芦
甘草炙 白茯苓各一兩 川芎 前胡 桔梗去芦
地骨皮 天麻酒浸焙各半兩 枳殼一兩去穰麥麩炒赤
右㕮咀每服一分水半盞姜一片薄荷一葉棗半枚煎服蹉
珍未發亦可服

(六十三)小柴胡湯治感寒發熱或作瘧疾湯氏方加生地黃
方見傷寒門

(六十四)交泰湯散治傷寒交驚交食氣急嗽聲發熱
滑石 石膏 知母 貝母
杏仁 甘草 甜葶藶 人參 麻黃 地骨皮各等分
右為末每一錢小麥二十粒煎湯下涎盛氣促加桑白皮

(六十五) **七賢散** 治感寒頭昏体熱小兒乳母同服

紫蘇葉　香附子炒去毛各三双　橘皮　甘草
桔梗去芦　白芷　川芎各一兩　加麻黃少許

右咬咀每服二爻水半盞姜一片棗半枚煎服

(六十六) **加減建中湯** 治傷寒發熱白汗虛煩

熟地黃半兩　白芍藥三兩　甘草炙　黃耆一兩　人參半兩

右咬咀每服二爻水半盞煎服

(六十七) **解肌湯** 治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃去節半兩冬用三分　人參　芍藥各半兩
川芎　前胡各二分　独活　半兩

右咬咀每服一爻水半盞姜一片薄荷一葉煎服

(六十八) **田父過赤散** 治小兒傷寒熱煩小便赤色大便褐色面赤氣

生地黃　木通　甘草各等分

右為細末每服二爻竹葉三五片同煎

(六十九) **三拗湯** 治感寒咳嗽方載咳嗽門

(伏暑) **黃連香薷散** 治伏暑發渴或作瘧痢並宜　方見中暑門

(七十) **五苓散** 治中暑身熱煩渴嘔吐　方見中暑門

(冒濕) (七十一) **不換金正氣散** 治感冒風濕頭目昏重時發壯熱

方見傷寒門

(諸熱) (七十二) **地骨皮散** 治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

知母　柴胡　甘草
地骨皮　赤茯苓　人參

右為末每服二爻妾五片水一盞煎八分溫服

(七十三) **柴苓散** 治腹中伏熱候如溫壯

柴胡去苗　麥門冬去心　人參
甘草各半兩　黃芩一兩　赤茯苓

右㕮咀每服二錢水半盞入小麥二十粒青竹葉一片煎服

(七十四) 人參前胡湯 治感冒發熱

前胡一双　柴胡　桔梗各去芦　甘草炙各半錢
人參

右㕮咀每服二錢水半盞姜棗煎服一方治瘧加地骨皮

(七十五) 二黃犀角散 治大腑秘熱

犀角屑　大黃酒蒸　芒硝各半錢
甘草

右為末看兒大小加減熱湯調服

(七十六) 益黃散 治小兒吝熱在內不思乳食宜服導赤散次服此藥

陳皮一兩青皮　柯子肉　甘草各半錢丁香二茎

右為細末每服二錢水煎

(七十七) 人參黃芪散 治發熱自汗虛煩

人參　黃芪　芍藥　甘草炙各等分

右剉每服二錢水一盞姜二片棗一枚前更加麥子二粒炒

(七十八) 并蓋散 治肺感寒邪咳嗽聲重方見咳嗽門

(嗽喘)

○嗽喘諸瘧

(七十九) 人參清肺湯 治肺胃俱寒咳嗽喘息方見喘急門

(八十) 參蘇飲 久嗽不宜卒止先須調氣宜服此方見傷寒門

(八十一) 瀉鴻散 治小兒勦鼽鼻塞熱涎潮咳嗽

瀉鴻一分　蟬殼全者二十一个　黃明膠手掌大一片炙令焦

右為細末每服一大錢温米湯調下日進二服未愈再服

(八十二) 人參散 治咳嗽發熱氣喘面紅

人參　天花粉各等分

右為末每服半錢蜜水調下

(八十三) **瀉肺散** 治肺氣雍盛咳嗽不已
桑白皮炒 地骨皮 各一双 甘草炒五分
右為末每服二分水一盞粳米同煎食後服

(八十四) **補肺散** 治肺氣不足咳嗽喘急
阿膠炒又半 牛蒡子 甘草各二分半 馬兜鈴五分
杏仁七个去皮尖
右為末每服二分水一盞煎至六分食後服
糯米一双

(八十五) **百部圓** 治小兒感寒咳嗽
百部焙干秤 麻黃去節各一分 杏仁四十个去皮尖微炒別研
右為末煉蜜圓如芡實大熟水化下一方加松子肉五十粒
同杏仁入沙糖為圓含化尤妙

諸癆

(八十六) **清脾湯** 治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱遂成癆
疾渴熱者宜 方見癆疾門

(八十七) **養胃湯** 治內傷生冷外感風寒增寒壯熱臟腑寒者宜
方見傷寒門

(八十八) **常山飲** 治一切癆疾
常山 人參去芦 草果 知母 貝母 甘草
半夏麯 茯苓 厚朴姜汁製一宿炒令黃色各等分
右咬咀每服二分水半盞姜三片棗一个空心煎服

(八十九) **鬼哭飲** 治癆疾久不愈者
常山 大腹皮 茯苓 鱉甲醋炙 甘草炙各等分
右為末用桃柳枝各七寸同煎臨發時服之暑吐出涎不妨

(九十) **露星飲** 治久癆成勞
秦艽 白朮 柴胡 茯苓 半夏曲
檳榔 黃芩 常山 甘草 官桂各等分
右咬咀每服三錢酒醋合一盞薑三片煎露一宿次早服

(九十一) 通神餅 截瘧有効
甘草 敗荷葉 棗豆各三个定粉 砒霜各半分
朱砂一分半 腦子 射香各少許 金銀箔十片
右為末煉蜜丸梧子大作餅子周歲半丸大者三丸而止一日只一服用井花水或桃柳枝煎水化下向北服了忌燒物飲食一時久亦可繫於候脉処

(九十二) 草果飲 治瘧痎久不愈少或遍身浮腫者
厚朴 姜汁製 青皮去白 草菓 藿香 半夏麯
甘草炙 丁香皮 神麯炒 良姜各等分
右㕮咀每服二分水半盞姜三片棗一个空心煎服

名方類證醫書大全卷二十四

小兒方下

○嘔吐瀉痢 附脫肛

(嘔吐) (一) 藿香散 治小兒吐嘔逆身熱面青不進乳食
藿香一分半丁香 人參 白朮
茯苓 神麯 扁豆各半分
右為末每服半分盞栗米飲温々調下陳皮煎米飲下亦可

(二) 助胃湯 治小兒冷気入胃嘔吐不已
白豆蔻十四个 木香煨三分縮砂仁四十个 人參去芦
白茯苓 白朮各半兩 丁香五分 肉豆蔻四个炮
乾山藥一双 甘草炙半兩

右為末每服一匁陳紫蘇木瓜湯調下

(三) 朱沉煎 治小兒嘔吐不止

朱砂 二匁水飛 沉香二匁 藿香三匁 滑石半兩丁香十四个

右為細末每服半匁用新汲水一盞芝麻油點成花子抄藥在上須臾隆濃去水却用別水送下

吐瀉

(四) 人參散 治小兒虛挾煩渴因吐瀉煩渴不止

人參一双半 茯苓二兩半 生犀 桔梗各二匁半

甘草 乾葛各半兩

右為末每服一大錢水一中盞入燈心五莖同前至六分放温不計時候煩渴者以新竹葉湯下量年紀加減

(五) 觀音散 治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食

石蓮肉 炒去心一分 茯苓一匁半 人參 白芷

木香炮 綿耆各一匁 神曲炒二匁 白扁豆 甘草二炙各

右為末每服一匁水半盞棗一枚藿香二葉煎服或發為瘧亦可服之

(六) 香朮飲子 治小兒伏热吐瀉虛煩悶亂如發驚狀

人參 茯苓 甘草 紫蘇葉

木瓜 澤瀉 香薷 半夏曲

白扁豆炒 陳皮 烏梅肉 厚朴炒各四匁

右為末每服一匁姜棗煎服

臟寒

(七) 豆附圓 治小兒搐搦吐瀉

肉豆蔻一个 附子一个炮

右為末麪糊圓如栗米大飯飲下

(八) 益黃散 治脾胃虛冷嘔吐不止或泄瀉腹痛並治之

丁香四匁不見火 陳皮去白二双

甘草炙 訶子炮去核 青皮去白各一双

右為末每服一錢水半盞食前煎服

(九)四柱散 治小兒元臟氣虛泄瀉不止水穀不化四肢厥冷方見泄瀉門

(十)調元湯 治臟寒泄瀉

呵子炮取肉 人參去芦 白茯苓 白朮各一兩
木香炮 陳皮去白 甘草炙 豆蔻各半兩

右為末水半盞姜二片前服空甚者加附子

(十一)六神圓 治痃癖肚腹泄瀉并聚瀉

肉豆蔻去皮 木香各炮一分 丁香 呵子肉炮各半分
史君子二分半別研 芦薈分半別研

右末米大一歲二十圓凡聚瀉不已者必須用金星圓等推去積滯而後調理脾胃

(痢)(十二)治休息痢及痃瀉日久不能安者用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內鎔以雞子拌和炒熟空心食之

(十三)水煮木香圓 治下痢亦白裏急後重方見下痢門

(十四)胃風湯 治風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉下痢腸鳴疼痛或下如豆汁或純下瘀血並皆治之方見下痢門

(十五)真人養臟湯 治冷熱不調下痢亦白或如膿血魚腦裏急後重腑臟絞痛並皆治之方見痢門

(十六)紫霜圓 治宿滯不化胷腹痞滿泄瀉如痢當以此藥推利

杏仁一五十个去皮尖別研 巴豆去皮心出油細研三十粒
代赭石火煅醋淬研 赤石脂末各一兩

右研勻湯浸蒸餅圓如黍米大三歲以下服三兩圓或以乳汁或米飲下皆可

(十七)香連圓 治冷熱不調下痢亦白裏急後重方見下痢門

(十八)木香散 治冷痢肚痛不食

木香炮　白木各一分厚朴姜製　龍骨
當帰洗炒各半兩　阿子肉各一分
右為末姜棗煎服隨大小加減

十九　木香散　治諸般瀉痢日久不安並皆治之
白木用面炒　麥芽　木香　人參　陳紅曲同白术炒
茯苓　神曲　甘草　青皮　當帰各一分

右為末每服二錢姜二片米十粒煎温服

二十　厚朴散　治小兒虛滑瀉痢不止
厚朴半兩　阿子皮半兩　史君子一个　棟丁香十个
吳白术　茯苓　青皮各二分　甘草一寸炒

右為末每服一字量歲數加減用清米湯下

二十一　木香圓　治下痢赤白
黃連一兩用吳茱萸炒去茱萸不用　肉豆蔻二个

木香一分二件一処煨熟
右為末麪糊圓如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴湯下赤
白相雜陳米飲下

脫肛

二十二　赤石脂散　治因瀉痢後肛門不收
眞赤石脂　伏龍肝各等分
右為末每服半錢傳腸頭上頻用

二十三　治瀉痢後脫肛用陳槐花不拘多少為末陳米飲調下

二十四　治大腸虛弱肛門脫下
龍骨　訶子肉炒去核各一分　沒食子大者一枚
蠶粟殼去蔕醋炙炙二分
右為末白湯點服仍用葱湯薰洗令軟欲入以手托上又用
新甎一片燒紅以醋洗之氣上即用脚布疊数重壓定使熱
氣上透不可過熱令病者以臀坐於布上如竟布温逐旋減

之以常得温熱為度并常服前藥

○調理脾胃

(二十五)參苓白朮散 治小兒脾胃不和飲食不進方載脾胃門

(二十六)四君子湯 調脾胃進飲食

人參　茯苓　甘草各等分

白朮

右為末每服一錢鹽湯點服一方加陳皮縮砂名六君子湯

(二十七)温脾散 治脾胃不和腰脇虛脹不進乳食困倦無力

訶子炮去核　人參各七分半　白朮　木香　桔梗各半兩

茯苓　藿香　陳皮　黃耆各半兩　甘草二分半

右㕮咀每服二錢水半盞薑棗煎服不拘時

(二十八)丁香散 治胃虛氣逆嘔乳不食

人參五分　丁香　藿香葉各二分半

右㕮咀每服二錢水半盞煎熱入乳汁少許調服

(二十九)和中散 治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴一兩姜製　乾姜炮　甘草各二兩　白朮三兩

右㕮咀每服二錢水小盞薑二片煎空心熱服

(三十)調中散 治脾胃不和

人參去芦　白茯苓　木香炮　白朮　甘草炙

乾姜炮　藿香葉　香附子毛炒去縮砂仁　丁香各等分

右為末每服一錢姜棗煎湯如肚疼以白湯點下

(三十一)醒脾散 治小兒脾胃怯弱為風冷所乘体熱頭疼霍亂

人參去芦　丁香四十枚　白茯苓　藿香葉　白朮

甘草炙略半兩　天南星二个重八分者　縮砂仁四十枚各炮

右為末生姜冬瓜子煎服

(三十二)加減觀音散 調理脾胃宜常服之

白朮炒　人參去芦　白茯苓　黃耆蜜水炙

白扁豆蒸

麥蘗炒 甘草 乾山藥 神麯炒 香附子炒各等分
右為末每服一錢空心米湯下

(三十三) 白朮散 治小兒脾胃虛弱
白朮 甘草 肉豆蔻 丁香 青皮 茯苓各等分
右為末每服一分紫蘇湯下

(三十四) 平胃散 治吐逆頻併手足心熱不進乳食
紅麯 三分半年久者 甘草炙一分 白朮一分半麩炒
右為末每服半分前棗子米飲下

(三十五) 瑞蓮散 治脾胃一切虛冷嘔吐不食並皆治之
石蓮肉一兩 木香 丁香各二分半 人參三分
澤瀉三分 訶子肉三个煨 陳皮五分
白芷半兩 紫蘇子炒半兩 肉豆蔻兩个煨
右為末每服一分姜棗煎湯下

(三十六) 銀白散 治小兒百病調和脾胃
薤香去土半兩 白朮對以菉豆同炒令香去豆不用一分 白扁豆微炒 山藥各一兩
縮蚕炒去絲嘴 川升麻各一分
糯米炒一方用糯粟 白附子半分 人參 白茯苓各一兩半
甘草炙半分 天麻炒半分 黃耆炒一分 木香半分
右為末隨證加減服之慢驚搐搦麝香飲下急驚定後吐不止陳米飲下夾驚傷寒發搐薄荷葱白湯下壯熱面赤乾葛金銀薄荷湯下痃氣腹急多渴百合湯下飲食不知飢飽不生肌肉炒麥芽生姜煎湯下吐瀉霍香湯下暴瀉紫蘇湯木瓜湯下赤白痢不進飲食米飲煎熙春粟殼湯下常服調理脾胃姜棗湯下和劑去木香白附子殭蚕糯米霍香加知母只八味各等分

(三十七) 快膈消食圓

縮砂仁　橘皮　京三稜　莪朮
神麴　麥蘗　各半兩　香附子一兩　各炒
右為末麪糊圓如麻子大食後白湯下隨大小加減圓數

(三十八)瀉黃散　瀉肝拔目黃口不能吮乳
藿香七分　山梔子仁二兩　甘草二兩　石膏半兩　防風四兩
右剉用蜜酒微炒香為細末每一錢二錢水一盞煎清汁服不拘時

積聚　三十九　快積丸　治宿食傷脾停滯不化臌脹痛
三稜炮　丁香　各三兩　乾姜炮一分半
丁皮　青皮各一兩　巴豆二分半
右為末醋糊圓如粟米大每服十圓生姜湯下大小加減

(四十)麝積丸　治臟腑怯弱內有積滯腹肚脹痛腸鳴泄瀉或因食丼肥虫動依痛叫哭不已悉皆治之
乾漆炒一兩　莪朮半斤　三稜炮　青皮去白炒　丁香一兩　各六兩
右為末水糊圓如粟米大每服十圓姜湯吞下

(四十一)淮食圓　治乳食不化心胃脹滿痃積肚疼並宜服之
木香炮　枳殼去白炒　當歸去苗　代赭石
朱砂各三分別研　巴豆一分去油膜　麝香半分別研
右為末麪糊圓如黍米大一歲一圓以意加減米飲送下一方以巴豆炒枳殼去巴豆可常服

(四十二)紫霜丸　治小兒乳食失前宿滯不化胃腹脹痛大便酸臭方見吐瀉類

(四十三)場氏圓　治小兒乳食不化腹急氣逆
青橘十個湯浸一宿不去皮瓤每个入巴豆半个胡椒一粒
丁香一个在內却用麻線縛之　胡椒
丁香　巴豆去殼不去油各十粒

丁巽大腹兵

右用米醋一椀煮乾爲度取出細切青橘同諸藥爲末粟米糊圓如粟米大每服五七圓飯飲下日三服以意加減

(四十四)二稜散 治氣積腹痛

縮砂仁 茸草炙 益智炒去殼 二稜 莪朮 青皮去白炒各等分

右爲末每服一錢白湯調下

(四十五)十全丹 治乳哺不調傷於脾胃丁奚哺露積聚腹滿枳殼去白麩炒 檳榔生用 青皮 陳皮各去白 木香炮各一分 莪朮炒一兩 二稜炒 縮砂仁各半兩 丁香

右末以神麯末打糊圓如黍米大空心米湯下五十圓

(四十六)七聖圓 消積滯調脾胃

芜花先用醋浸一宿炒令赤乾入二十枝莪朮同炒令赤色入

陳皮川練同炒令微焦取出用

京三稜 川練取肉 青皮去白 陳皮去白 蓬莪朮

右各件爲細末入巴豆二十大一歲常服一圓臨睡熟水送下常服宜去巴豆

(四十七)浮腫 浪腫塌氣散 治積水驚水或飲水過多停積於脾故四肢腫而身熱宜用藥內消之其腫自退

蘿蔔子 赤小豆 陳皮 甘草炙各半兩 木香炮一分

右㕮咀每服二錢水小盞姜棗煎服

(四十八)海蛤散 治小兒陰腫由啼叫怒氣閉擊于下

懷香子炒二分 薏苡仁 海蛤 白朮 檳榔麩裹煨各半兩

右爲末每服一錢食前溫酒下

(四十九)取水方 積水痞水並宜服之

甘遂　青皮　陳皮各去白　木香炮各一兩　檳榔一个生用
右為末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草

(五十)【內消丸】治頭面手脚虛浮

青皮五个去白木香一分　巴豆七个去殼
防己一分半　丁香一十四个
右青皮同巴豆炒蒼色去巴豆不用以餘藥為末蒸餅圓如
麻子大每服四五圓男用陳皮湯下女子棗湯下日三服

(五十一)【甘遂散】治胷膈伏熱內停飲食以致臟腑不舒氣

【脹滿】結脹滿

甘遂煨令赤青皮去白　黃芩　大黃炒各等分
右㕮咀每服二錢水半盞煎服以利為度

(五十二)【橘皮飲子】治日食不化心腹脹滿嘔逆惡心不進乳食

陳皮去白　人參　高良姜米泔煮　檳榔各一分

白茯苓　甘草各半分
右㕮咀每服二錢水小盞姜棗煎服

【祕結】(五十三)【木香散】治心經伏熱小便不通

木通一兩　牽牛子半兩炒　滑石一兩
右為末灯心煮白煎服

(五十四)【梔子仁散】治小便不通心神煩熱

梔子仁五枚劈　冬葵根各半兩　甘草炙一分
右為末每服二錢水小盞煎服

(五十五)【冬葵子散】治小腹急悶

冬葵子一兩　木通半兩
右為末每服一分煎服

(五十六)【白氣散】治脾肺氣逆喘嗽面浮胷膈痞悶小便不利

桑白皮一兩陳皮去白一兩半　桔梗炒一兩　甘草炙一兩

藿香葉半兩 木通四兩 赤茯苓去皮一兩
右㕮咀每服二錢水小盞姜二片煎服

(五十七)(六正散)治心經積熱大小便秘結方見諸淋門

○痘瘡斑疹

東垣先生試効方論

夫小兒痘疹始出之證必先見面燥腮赤目胞赤呵欠煩悶作涼作熱咳嗽嗢噴足稍冷多睡驚並瘡疹之證或生膿胞或生癮疹此三等不同蓋諸證皆太陽寒水起右腎之下前熬岩腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳導逆於面是壬寒水逆尅丙丁熱火故也小兒瘡疹之由皆始生之時啼声一發口中所含惡血隨吸之脈皆出於足太陽寒水之經外為太寒內為二火交攻化而下還於右腎包絡之胞中其瘡之發下焦相火熾也三等

血肉為膿寒為發寒邪可令內瀉二火又令濕气上帰本位三服痘疹即愈已後再无二番痘出之患損生命者矣

(未出)(五十八)(三豆飲子)治天行豆瘡但有此證即服之

赤小豆 黑豆 菉豆各一升 甘草節五分
右細淨水煮熟任意食豆飲汁七日自不發

(五十九)(升麻葛根湯)治小兒身熱欲作疹豆先宜服之

白芍藥 川升麻酌 甘草五分 乾葛一兩
右㕮咀每服二分水半盞煎服不拘時

(六十)(惺惺散)治小兒發熱頭痛欲作疹豆方載麥煮類

(已出)(六十一)(異功散)治豆出欲靨未靨之間頭温足冷腹脹瀉渴忌服此藥切不可与蜜水

木香 當帰各三分 官桂去皮 白朮
茯苓去皮白 厚朴姜製 人參去芦

肉豆蔻　丁香各二半　半夏姜製　附子炮去皮各一分半
右㕮咀每服二分水一盞姜五片棗三枚煎服

六十二 木香散 治發瘧發身熱作渴

木香　大腹皮　人參去芦　桂心
赤茯苓去皮青皮去白　前胡去芦　呵梨勒去核
半夏姜製　丁香　甘草炙各三分

右㕮咀每服二分水小盞姜三片煎空心溫服

六十三 豆蔻丸 治痎瘧泄瀉

縮砂仁　木香各三分　白龍骨　訶子肉各半兩
赤石脂　枯白礬各七分半　肉豆蔻半兩

右為末麪糊丸如黍米大每服三十丸至五十丸煎異功散下或瀉水穀白色淡黃色木香散下

倒壓一 必用四聖散 治小兒瘧痎出不快透及倒撅一切惡候

紫草茸　木通去節　甘草　枳殼去白麩炒各等分

右㕮咀每服二分水一盞煎服

六十四 無憂散 治斑瘧不出黑陷欲死者

人猫猪犬臘晨燒　小許微將密水調
百者救生無一死　万錠黃金也不消

右將前四黃於臘日早晨日未出時貯於銀鍋內用炭火煅令煙盡白色為度但是瘧發不快倒撅黑陷及一切惡瘧每用一字蜜湯調服其效如神

六十五 黍粘子湯 如瘧已出稠密身表急与此桑以防已後

青乾黑陷

黍粘子炒香　當歸身酒洗　甘草炙各一分　柴胡
連翹　黃芩　黃芪各一分半　地骨皮二分

右同為粗末每服秤二分水煎去滓温服空心桑畢且休與

乳食

(六十七) 消毒救苦散 治斑疹悉具消化便令不出如已出稀者再不出 東垣方

麻黄 羌活 防風各五分 川芎
薑本 葛根 蒼朮 酒黄芩
生黄芩 柴胡各二分 細辛 紅花
蘇木 橘皮 白朮各一分 升麻
生地黄 酒黄栢各五分 生甘草一分 當歸身
黄連各三分 連翹半分 吳茱萸半分

右剉如麻豆大每服五錢水二鍾煎去滓熱服

(六十八) 五福化毒丹 治疹毒餘毒未解并上焦熱壅口齒出血

玄參一兩 桔梗去苗八分 赤茯苓 牙硝別研
人參各半兩 青黛一分 甘草一分 麝香半分別研

右為末入青黛和勻煉蜜圓如芡實大金銀箔為衣磨生犀水化下或血臭氣用生地黄汁化下

(六十九) 消毒飲 治毒氣攻攣遍身熱心煩瘡疹雖出未能勻透

牛蒡子炒六兩 荆芥穗一兩 甘草炙二兩 防風
升麻各一兩半

右㕮咀每服二錢水一盞煎服如大便利者不宜服之

(七十) 巨勝散 治瘡已靨身热不退此藥清神生津除煩止渴

人參 白朮 藿香葉 木香
白茯苓 甘草各一兩 乾葛二兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎六分温服不拘時

(七十一) 人參麥門冬散 治發热煩渴

麥門冬一兩去心 人參去芦 甘草炙
陳皮 白朮 厚朴姜製各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎六分温服不拘時

(七十二) **穀精草散** 治豆已壞眼目翳膜或癢澁淚出

穀精草一兩　生蛤粉二兩

右爲末猪肝一葉以竹刀批作片子摻藥在内用竹繩縛定於鐺器内用貯水慢火煮熟令兒食之

痘眼

(七十三) 治斑瘡入眼

羌活　防風　各等分　甘草炙　羚羊角鎊炒

右搗每服二錢研水下撥雲見日有効

(又方) 朱砂　腦子　水銀　麝香　各等分

右四味研爲細末用水銀調滴耳中

(七十四) 治小兒出痘瘡眼内有雲翳方

黄丹各等分　輕粉

右爲竹筒吹在耳内左眼有翳吹右耳右眼有吹左耳即退

痘蝕瘡

(七十五) **綿裹散** 治因豆瘡身体肢節上有痘蝕瘡膿水不絶用出蛾綿裹不拘多少以生白礬搥碎置其内炭火燒令礬汁盡取細研乾摻瘡上

(七十六) **雄黄散** 治小兒因豆瘡牙齦生痘蝕瘡

雄黄一兩　銅緑二錢

右同研極細量瘡大小乾摻其上

水痘

(七十七) **交加散** 治水豆

地骨皮炒　滑石　甘草炙各半分　研萬靡滅炒用

麻黄去節　大黄炮裹煨　知母　羌活　人參各一分

右爲末每服半錢水一盞小麥七粒煎服

諸痘

(七十八) **蘆薈丸** 治脾胃積熱遂成痘疾宜服此藥

黄連去須　無美各一兩去皮先炒黄色　龍膽草　次入前藥一處炒赤色

右各件為末別入藿香末一分和勻飯飲丸如黍米大隨大小加減空心米湯下

(七十九) **鱉甲散** 治疳勞骨蒸

鱉甲九肋者沸湯浸洗用童子小便塗炙黃若蜜炙
白芍藥各一兩　生熟地黃　地骨皮　當歸去芦洗
人參去芦各半兩

右㕮咀每服二錢水半盞煎服

(八十) **豬肚圓** 治骨蒸疳勞肌体黃瘦

木香半兩　宣連　生地黃　青皮　銀州柴胡去芦
鱉甲九肋者沸湯浸洗令淨却用童子小便塗炙各一兩

右為末豬肚一枚入藥於內麻繩纏定於沙鉢內懸肚煮熟取出細研豬肚為丸如麻子大米飲下大小加減不拘時

(八十一) **大胡黃連丸** 治激發瘤腹脹虫動多睡肌体黃瘦五心煩熱

胡黃連　黃連　干蟾頭一分存性燒　麝香一分
右將前四味為末豬膽汁和為劑每一胡桃大入巴豆仁一枚在內却用油單一重裹之蒸熟又入後四味麪糊丸如麻子大每服十四五丸清米飲下食後臨卧日進三服

(八十二) **肥兒丸** 消疳進食

黃連　神曲　麥蘗各一兩微炒　史君子肉
豆蔻各半兩煨　木香一分　青黛一兩半　芦薈一分各別研

右為末面糊丸如粟米大空心飯飲下大小以意加減

(八十三) **清肺飲子** 治咳嗽鼻涼腸

桑白皮　地骨皮　黃芩　生乾地黃各等分

右㕮咀每服量大小加減水煎食後服

(八十四) **直指之胡黃連圓** 治小兒熱疳

胡黃連　川黃連各半兩　朱砂一分半別研
右為末入豬膽內繫定虛懸於銚中煮一時久取出入芦薈
青黛各二分半去足蝦蚧二分射香少許粳米飯圓如麻
子大每服十圓米飲下

(八十五) 蘆薈圓　治小兒五疳

蘆薈　無羙去皮　青黛　宣連　真麝香少許
檳榔各一分胡黃連半兩猪膽二个　蝉殼二十个
右為末猪膽圓如麻子大每服五七圓飯飲吞下

(八十六) 史君子圓　治小兒五疳下痢

史君子三兩　木香　厚朴　麝香各一分
肉豆蔻各一兩　芦薈二分
沒食子　胡黃連　肉豆蔻各一兩
右為末粟米大每服二十圓米飲下

(八十七) 北棗散　治小兒走馬疳用北棗一枚去核入鴨嗉膽臍

一片在內紙裹火煅通紅出火毒研細傳牙左右

(八十八) 治小兒耳邊鼻下赤爛濕瘡名月蝕疳瘡

黃丹一分煅令赤色　粟豆粉一分　白礬一分飛過

右研細乾傳瘡上唾調亦可

(八十九) 木香圓　治冷疳多渴煩躁啼叫乳食不進好卧冷地

木香　青黛　檳榔　豆蔻去皮各二分　麝香一分
續隨子一兩去殼
右為末煉蜜丸麻子大一歲兒十丸薄荷湯下

(九十) 使君子圓　治臟府虛滑疳瘦下痢腹脇脹痛不思乳食

常服安虫補胃消疳肥肌
厚朴去皮姜炒　青黛各半分疳熱兼驚帶挾渴者方即用
使君子肉一分半生半煨去核　訶子半生半煨去核
甘草炙　陳皮各半分
此一味只藏府不調不用

右為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸米飲化下小兒生百日以上三歲已下服半丸乳汁化下

(九十一) 大芎湯圓 治疳煞虫和胃止瀉

黃連　胡黃連　白蕪荑去扇芦薈

鶴虱炒　雷丸竅間白者佳赤者殺人勿用

青皮　木香各半分　麝香一分別研

右為末粟米飯丸綠豆大米飲下一二十丸

(九十二) 橘連圓 治疳瘦久服消食和氣長肌肉

陳皮　黃連去須米泔浸一日各等分

右為末別研入麝香半錢用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候臨熟以針微刺破以熟為度取出用粟米粥和丸如綠豆大每服十丸至二十丸米飲下量大小加減

(九十三) 龍粉圓 治疳渴

烏梅肉　黃連

等分為末麥汁調攤貼患處次服防風圓瀉青圓

(九十四) 地黃圓 治小兒頭頓不合躰瘦骨露腳軟不能行有如鶴膝皆禀賦不足腎虛不生骨髓此藥補之疾自愈

熟地黃洗焙八分　澤瀉二分　牡丹皮去心　牛膝

山茱萸　山藥　白茯苓　鹿茸去毛酥炙各四分

右為末煉蜜丸梧子大三歲已下三二丸溫水化下空心

(九十五) 羚羊角圓 治小兒五六歲骨氣虛筋脉弱不能行者

羚羊角屑　白茯苓

酸棗仁炒　生乾地黃各半兩　防風去芦　虎脛骨塗醋炙黃

黃耆

桂心　當歸妙各一分

右爲末煉蜜圓如豌豆大食前以溫酒研破三五圓服之一月漸々即可行也

(九十七)小蒼圓治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸　川牛膝　木瓜　杜仲
兎絲子　當歸　熟地黃　天麻　青鹽各等分

右爲末用蜜圓鹽湯溫酒化下皆可

(九十八)羚羊角散治面紅唇白腸熱項軟

熟地黃酒浸　白茯苓　羚羊角　酸棗仁炒
虎脛骨酒炙　肉桂　防風　甘草各等分

右爲末溫酒鹽湯化下皆可

○喉痛丹毒

喉痛

(九十九)甘桔湯治風痰壅盛咽喉腫閉方見咽喉門

(一百)四順清涼飲子治一切丹毒積熱癢滯咽喉腫痛

當歸去芦　甘草炙　赤芍藥　大黃各等分

右㕮咀每服一錢水半盞煎七分去滓食後溫服

丹毒

(百一)牛黃散治五種丹毒

麝香　桔梗去芦　天花粉　甘草炙　葛粉各等分

右爲末每服一錢薄荷湯入蜜調下

(百二)白玉散治赤游丹腫

白玉一兩　寒水石二兩

右爲末米醋調傳患處或腫至外腎有破処只用水調

(百三)生料四物湯治血熱生瘡遍身腫痒

生乾地黃　赤芍藥　川芎　當歸去芦此本方
防風續加各等分　黃芩減半

右㕮咀每服二錢水一盞煎服忌諸毒食

百四 **防已散** 治小兒伏熱毒之氣遍身赤腫入腹入腎防其殺人

漢防已半兩 朴消 黃耆 川升麻各一分 犀角 黃芩

右㕮咀加竹葉煎大小以意加減

百五 **漏蘆散** 治五種丹毒并諸瘡癰

漏蘆 麻黃去根節連翹 川升麻 川芎藭各一分 白斂三分 甘草一分 川大黃一兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎服

百六 治丹毒教作恐其入腹一時無藥急以針於紅點處刺出惡血使毒氣於此而散

蟲痛痲

百七 **化虫圓** 治一切蚘虫攻刺心腹疼痛不已叫哭合眼

胡粉炒 鶴虱各五兩 白礬枯過一兩二分半

檳榔 苦練根各五兩

右爲末麪糊圓如麻子大量兒大小加減米湯下

百八 **靈礬散** 治小兒虫咬心痛欲絕者

五靈脂末二分 白礬火飛半分

右㕮咀每服二分水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈

百九 **安虫散** 凡虫不可直攻宜安之

檳榔 胡粉炒黃 川練子去皮核秤

鶴虱炒黃色各二兩 白礬一分鐵罐內火上熬枯秤

右爲末每服一字溫米飲調下

百十 **川練圓** 治上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆一分杵碎炒煙出盡 雄黃一分 巴豆霜一分

右爲末麪糊圓如黍米大看兒大小與服取東向石榴根煎

湯下痛者煎有子者練根湯下或無羙湯下亦可

百十一 無羙散 治諸虫作痛

白無羙 去翅乾漆 炒令煙盡各等分

右爲末每服一字米飲調下臨發時服

百十二 化虫圓 治因痘前後虫作痛

無羙 黄連 神麯 炒 麥蘗 炒各等分

右爲末麪糊圓如黍米大空心米飲下

百十三 金鈴圓 專治小兒勞瘵尸虫作痛面目羸瘦五心煩熱如其他食積冷氣作痛又非其治臨證審之又有心痛欲絶一時無藥可療急用艾炙足大拇指中男左女右

厚朴 去皮姜製 柴胡 去苗各一分 附子一个炮

大黄 紫菀 茸 炒各三分 乾姜 炮 川椒 去目合口者

吳茱萸 白茯苓 人參 去芦 川烏 炮

官桂 去皮各半兩 猪牙皂角 去皮二条

右爲末別研甜葶藶子半兩巴豆二分去油膜續隨子半兩同前藥一處麪糊圓如麻子大以意加減空心下

疝氣

百十四 治小兒疝氣方

芫花 醋浸炒 木香 檳榔 三稜 炒各半兩 附子 炮

茯苓 青皮 去白 全蝎 肉桂 礦砂各一分

右爲末將礦砂浸洗去土頓在湯漉上候成膏子和糠醋打麪糊圓如豌豆大每服三十圓空心温酒下未效再服

百十五 外腎腫硬及陰瘡用乾地龍爲末先以葱椒湯於避風處洗次用津唾調傅其上

百十六 三白散 治小兒膀胱脫蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便利

滑石 二兩白者 桑白皮 木通 去節 白木

陳皮 去白各半兩

右為末每服二錢米飲調下

〔雜方〕〔百十七〕金華散治小兒痘後貼之

黃連　黃蘗各半兩並為末

輕粉一錢　麝香一字別研

右同研勻先以温水洗瘡後貼之

〔百十八〕治濕瘡瘙癢用蛇床子為末先以韭菜根煎湯洗次用臍月猪脂調塗傳之

〔百十九〕治鼻衄用生蘿蔔去葉搗汁仰頭滴入鼻中或血妄行取汁飲之立效

〔百二十〕白斂散治小兒凍耳成瘡或痒或痛

黃蘗　白斂各半兩

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

〔百二十一〕生附散治凍爛脚成瘡用生附子為末麪水調貼之即愈

〔百二十二〕香雷煎治小兒白禿不生髮燥痛

陳香需二兩　胡粉一兩　猪脂半兩

右用水一大盞煎香需取汁三分去滓入胡粉猪脂相和令勻塗於頭上日頻用之

〔百二十三〕黃散治小兒齒不生

大芎　熟地黃　山藥　當歸　芍藥　甘草各等分

右為末熱湯調服用揩齒脚

〔百二十四〕黃連散治頭瘡

川黃連　黃蘗去粗皮　貝輕粉　草決明各等分

右為細末用生小油調藥於瘡上塗立愈

名方類證醫書大全卷二十四

終

氣門　姜合丸　大明校每一斤作二十圓今拠和劑方改作每一兩

水腫門　去鈴丸　大明校冷塩湯今拠袖珍方改作冷塩酒

袖珍方改作五九加至十九　家藏方消腫圓　大明校五十圓云云加至十圓今拠

脫肛門　豹腸圓　藥種之内大明校白礬兩処有之今拠袖珍

方改一種作綠礬　癰疽門　梔子黄芩湯　藥種之内大明校黄芩兩処有之今拠

外科精要改一種作黄芪　婦人門　六合湯　六明校表虚表實藥種相反今拠拔萃


方改之

小兒門 金露圓藥種之內大明校厚朴兩処有之今拠袖
珍方改一種作官桂
今所刊之書與大明校有斤兩分銖之異彼校有藥種之下不
載斤兩者又有藥種同者竊考諸方改之若有善本自大明来
則復當用彼也

吾邦以儒釋書鋟板者往〻乏焉於来舶及醫方書
民之澤人所共鮮近世醫書大全自大明来間醫家
玉寶也所憾乎舶来稍少歟見而未見者多矣泉南阿
佐井野宗瑞捨財刊行彼舶本有三冩之謬今就諸
家考本方以正訛雖一毫髮私不挽捜盡宗瑞之
志不爲利而在救濟乎下人偉哉陰德之報永及子
孫矣

大永八年戊子七月吉日

匏雲壽桂誌




名方類證醫書大全
源流學

48062

三皇

伏羲皇帝

太昊伏羲氏風姓代燧人氏而王蛇身人首始畫八卦造書契以代結繩之政制嫁娶以儷皮為禮結網罟教佃漁養犧牲以庖厨故曰庖犧

歷代名醫圖贊曰

茫茫上古　世及庖犧　始畫八卦　爰分四時
究病之源　以類而推　神農之降　得而因之

百々橋太郎寄贈

神農炎帝

炎帝神農氏姜姓人身牛首繼風姓而立火德王謚木為
耜揉木為耒始教耕作蜡祭以赭鞭鞭草木嘗百草始
興醫教人日中為市交易而退淮南子云神農嘗百草
之滋味一日而七十毒由是醫方興焉蓋上世未著文
字師孝相傳謂之草本

歷代名醫圖贊曰

仰惟神農　植藝五穀　斯民有生　以化以育
慮及夭傷　復嘗草木　民到于今　悉沿其福

軒轅黃帝

黃帝姓公孫名軒轅又曰姬姓有熊國君少典之子炎帝
世衰諸侯相征伐軒轅乃習用干戈以征不享平定天
下殄滅蚩尤以土德王天下內經素問序云安不忘危
存不忘亡求民之瘼恤民之隱者往聖之用心也在昔
黃帝之御極以理身緒餘治天下坐明堂之上臨觀八
極考建五常以謂人之生也負陰而抱陽食味而被色
外有寒暑之相盪內有喜怒之交侵天昏札瘥國家代
有將欲斂時五福以敷錫庶民乃與岐伯等上窮天
紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難垂法後世
於是雷公之倫受業傳之而內經作矣

歷代名醫圖贊曰

偉哉黃帝　聖德天授　岐伯俞附　以左以右

天師岐伯

素問内經問答岐伯爲黄帝之師故稱之曰天師岐伯全元起有說素者本也問者黄帝問於岐伯也方陳性情之源五行之本故曰素問岐伯世師傚貨季

名醫圖贊曰

天師岐伯　善答軒轅　製立素問　始顯醫源

伯高

素問靈樞經論順逆論五味及衛氣失常論容邪伯高有答黄帝問難之語

鬼臾區

素問内經天元紀大論有答黄帝之語

俞附

林攻之作歷代名醫圖序有云俞附滷腸滌臟云云

少俞

素問靈樞經論勇論痛論五味少俞有答黄帝問難之語

少師

靈樞經愛士忘無言容備及通天論少師有答黄帝問難之語

桐君

軒轅以前文字未傳如六爻指垂畫象稼穡即事成迹至於草本藥性所主當以識識相傳不爾何由得聞至于桐雷乃著在於編簡草本應與素問同類至後人張機華佗輩遂為本經後人多更修飾之爾

太乙雷公

黃帝坐明堂召引雷公問拯濟生靈之道因而授之事見素問內經十二卷著至教論篇由是雷公醫道益著有炮炙論其序載在本草云公姓雷名敩

名醫圖贊曰

太乙雷公　醫藥之宗　炙煿炮爚　千古無窮

馬師皇

馬師皇者黃帝時馬醫也知馬形生死診治之輒愈後有龍下向之垂耳張口皇曰此龍有病知我能治乃鍼其唇下口中以芓草湯飲之而愈後數數有疾龍出其波告而求治之一旦龍負皇而去

列仙傳贊曰

師皇典馬　厥無殘駟　精感群龍　術兼殊類

靈虬報德　弭鱗銜轡　振躍天漢　粲有遺蔚

按歷代名醫圖

三皇時有俞跗祖世之師

俞跗貫季為岐伯理色脉而通神明

五帝

按歷代名醫圖

五帝時有巫咸伊尹

殷

伊尹

伊尹發內經素問之蘊著湯液之論名醫圖伊尹作五帝時人在巫咸之次愚按伊尹相湯以王於天下當在三代殷商之世豈姓字相同者乎今移于此以俟識者而校之

周

范蠡

范蠡字少伯徐人也事周師太公望好服桂飲水爲越大夫佐勾踐破吳後乘輕舟入海變名姓適齊爲鴟夷子更後百餘年見於陶爲陶朱公復棄之蘭陵賣藥後人世世識見之云

列仙傳贊曰

范蠡鄉桂　心盧志遠　受業師望　載浚載俛
龍見越卿　功遂身返　脫屣千金　與道舒卷

按歷代名醫圖　周時有七人未詳出處

秦

醫緩

晉侯有疾求醫于秦秦伯使醫緩爲之未至晉侯夢疾化爲二豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一曰居肓之上肓之下若我何醫至曰疾不可爲也在膏之上肓之下藥不能達鍼不能及侯曰良醫也厚禮而遣之

醫和

國語晉平公有疾秦伯使醫和視之文子曰醫及國家乎

對曰上醫醫國其次醫人固宜醫也乃謂趙孟曰疾不可爲也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟曰良醫也

長桑君

扁鵲少爲舍長舍客長桑君過扁鵲奇之常謹遇之長桑君曰我有藥方年老欲傳與子乃出懷中方飲以上池之水三十日當知物矣扁鵲如其言從此視病盡見五藏之癥結

神應王扁鵲

秦越人號扁鵲盧國渤海人得素問靈樞之旨設爲問荅
作八十一難以釋疑義其間榮衛度數尺寸部位陰陽
王相藏府虛實脉法證病與夫經絡流注針刺俞穴莫
不該備爲醫之祖焉
傳曰越人至虢虢太子暴死越人曰此尸厥也可活乃針
維會穴隨手而起
扁鵲見齊桓侯曰君疾在腠理不治將深桓侯曰寡人無
疾後五日復見曰君疾在血脉不治將深桓侯不應後
君疾在腸胃不治將深後五日望見桓侯即退走曰疾
居腠理湯熨之所及也在血脉鍼石之所及也在腸胃
酒醪之所及也今在骨髓雖司命無柰之何後五日桓
侯召之扁鵲逃去桓侯遂死然則學未至醫可易言哉

名醫圖贊曰
秦神扁鵲　精研醫藥　編集難經　古今欽若

安期生

安期先生聊琊阜鄉人也賣藥於東海邊時人皆言千歲
翁秦始皇東遊請見與語三日三夜賜金璧度數千萬
出於阜鄉亭皆置去留書以赤玉舄一量爲報曰後數
年求我於蓬萊山始皇即遣使者徐市盧生等數百人
入海未至蓬萊山輒逢風波而還立祠阜鄉亭海邊
列仙傳贊曰
寥寥安期　虛質幽靈　乘光適性　保氣延生
聊悟秦始　遺寶阜亭　將遊蓬島　絕影清泠

崔文子

崔文子太山人也世好黃老事居潛山下後作黃散赤丸成石父祠賣藥都市自言三百歲後有疫氣民死者萬計長吏之文所請救文擁朱旛繫黃散以循人門飲散者即愈所活者數萬後在蜀賣黃散故世寶崔文赤丸黃散實近於神

列仙傳贊曰

崔文得道　術兼秘奧　氣癘降喪　仁心攸悼
朱旛電麾　神藥捷到　一時獲全　永世作効

按歷代名醫圖 有秦三人

太醫令李醞　李勀　子陽扁鵲弟

西漢

倉公淳于意

太倉令淳于意精窮醫道齊王太后病召意入診脉曰風癉客脾難於大小便潞赤意飲以火齊湯一飲即前後溲通再飲病已潞如故病得之流汗出淋淋者去衣而汗稍也所以知太后病者診其脉切其太陰之口涇然風氣也脉法曰沉之而大堅浮之而大緊者病主在腎切之而和反也脉大而躁大者膀胱氣也躁者中有熱而潞赤見史記淳于意傳

名醫圖贊曰

漢淳于意　時遇文帝　封贈倉公　名傳萬世

淮南子

按漢書紀云淮南子姓劉名安乃厲王之長子文帝十六年安紹封淮南王為人好讀書精鑒術招賓客方士作內書二十一篇外書甚衆又著鴻烈解本草藥性多經其註武帝元狩元年淮南國廢改為九江郡因號淮南子也

樓護

本草補注序有云舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無録焉平帝紀云元始五年舉天下通知方

術本草者在所為駕一封軺傳遣詣京師樓護少誦詩

醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此

西漢有

元里公楊慶　秦信　王遂　宋邑　公孫光

馮信　高期　王禹　唐安　杜信　玄谷

東漢

張仲景

張機字仲景南陽人也為長沙太守深於醫道稱為亞聖録本草藥性作神農本經三卷又廣湯液為傷寒卒病論合十六卷垂萬世不易之法然後醫乃大備先聖後

聖若合符節至晉王叔和以仲景之書撰次成叙得全帙遂爲衆方之祖今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣如金匱方要亦有遺意焉　名醫圖贊曰　漢張仲景表棗實鹿　傷寒論語載名亞聖

郭玉

郭玉廣漢人也後漢和帝時爲侍郎善別脉知人生死帝令童男衣女子之衣詐云其病使玉診脉玉曰此女誰言病據脉狀陽盛陰虛臣謂非女帝善之遷五官中郎將

歷代名醫圖　東漢有　程高　涪翁　沉建　杜度　魏沉　張伯祖

華佗

魏志曰甘陵相夫人有娠腹痛不安方得六月佗視脉曰胞已死矣使人手摸知所在在右則女在左則男其人曰在左於是爲湯下之果下男形而愈又有人病腹中攻痛十餘日鬚髮墮落佗曰是脾半腐可刳腹治也使飲藥令卧破腹就視脾果半腐壞以刀斷之割去惡肉以膏傅之即差魏太祖聞而異之召佗常在左右太祖苦頭風每作心亂曰眩佗針鬲隨手而愈漢魏已來名醫益衆張機華佗董始因古學附以新說通爲編述本

草由是見於經録然舊經才三卷藥止三百六十五種
謂之神農本經　名醫圖贊曰　魏有華佗　設方奇科
　　　　　　　　　　　　　　　　　別胥療疾　神効巧多

李當之

李當之華佗弟子也修神農舊經作藥録

吳普

吳普亦華佗弟子也廣陵人撰本草一卷作藥録

封君達

封君達魏國人善醫號青牛道士

魏有　樊阿　韓康

呂廣

呂廣吳人爲太醫令重編雜經按丁德用補注難經歷代傳之一人至魏華佗乃燼其文於獄下於晉宋之間雖有仲景叔和之書然各示其文而濫觴其說雖吳呂廣重編此經而尚文義差迭按此則難經爲燼餘之文其編次復重經呂廣之手固不能無缺失也按名醫圖有呂博無呂廣予疑博即廣也

員局先生

負局先生不知何許人語似燕代間人常負磨鏡局循吳
市中衒磨鏡一錢因磨之輒問主人得無有疾苦者即
出紫丸藥以與之得者莫不愈如此數十年後大疫病
家至戶到與藥治之活者萬計不取一錢吳人乃知其
真人也後主吳山絕崖頭懸藥下與人將去時語人曰
吾還蓬萊山爲汝曹下神水崖頭一旦有水白色流於
石間取飲之多愈疾因立祠焉

董奉

列仙傳贊曰

負局神湍　被褐含秀　術兼和鵲　心託宇宙
引彼蓬泉　灌此絕岫　欲返蓬萊　以齊天壽

董奉吳人居廬山治病無不應效病重者種杏五株輕者
一株遂成林號董仙杏林

蜀

唐慎微

唐慎微不知何許人傳其書者失其邑里族氏避　御諱
改謹微因其見聞之所迫博采而備載之於本草圖經
之外又得藥數百種益以諸家方書與經子傳記佛書
道藏凡該明乎物品功用者各附於本藥之左其爲書
三十有一卷六十餘萬言名曰經史證類備
急本草察其爲力亦勤矣而其書不傳世罕言之迫求

大觀中集賢孫公得其本而善之邦計之暇命官校正與本經及名醫別録唐本圖經與刊定重定會集成一募工鏤板以廣其傳是謂之大觀本草

韓保昇

韓保昇僞蜀入爲翰林學士蜀主孟昶嘗命保昇等以唐本圖經參比爲書稍或增廣世謂之蜀本草

按歷代名醫圖蜀有　李譔　僞蜀主孟昶

西晉

王叔和

王叔和西晉高平人也爲太醫令性度沉靜尤好著述博通經方精意診切洞識脩養之道其行事具唐甘伯宗名醫傳中譔脉經十卷脉訣數卷脉賦一卷

名醫圖贊曰

晉王叔和　方脉之科　撰成要訣　普濟沉痾

李子豫

陶隱居序本草有云李子豫善醫嘗合赤丸能祛鬼邪病傳入藏府服之隨即瘥

皇甫謐

皇甫謐字士安號玄晏先生博通古今聚書萬卷精於醫

名醫圖贊曰

皇甫士安 治法千般 經言甲乙 造化寔難

張苗

晉書云張苗雅好醫術善消息診處陳廩丘得病服藥發汗汗不出衆醫云汗不出者死苗乃燒地布桃葉於上蒸之即得大汗便於被下傳溫粉候身極燥乃起即差

張華

晉尚書張華字茂先精窮醫道善觀察天文地理嘗見斗間有異氣密謂雷煥曰寶劍之精當在豐城華擧煥為豐城令掘獄基入地得石函中有寶劍二題曰龍泉太阿送一與華及華被誅失劍所在煥卒其子佩經延平津忽腰間躍水使人求之但見兩龍相繞懼而還乃知異物終當化去

宮泰

劉德

史脫

靳邵

趙泉

阮德

裴顏

裴顒

陶隱居云自晉代已來有張普宮泰劉德史脫靳邵趙泉李子豫等皆一代良醫其貴勝阮德如張茂先裴逸民皇甫士安及江左葛洪蔡謨商仲堪諸名人等並研精藥術

葛洪

葛洪字稚川丹陽人仕晉為勾漏令覽究典籍尤好神仙道養之法隱居羅浮山鍊丹得仙號曰葛仙翁在山積年優游閑養著述不輟撰經効方三卷名曰肘後救卒方又曰肘後備急方又著神仙書名曰內篇外篇凡一百一十六篇又號曰抱樸子因以名書云終年八十一殯入棺後舉棺輕發棺視之惟衣而已世以為尸解云

范汪

范汪東晉時人嘗注本草藥品有方百餘卷無傳名醫圖
作范注陶隱居云余祖世已來務敦方藥本有范汪方
一部斟酌詳用多獲其効内護家門傍及親族其有盡
心告請者不限貴賤皆摩踵救之凡所救活數百千人
自余投纓宅嶺猶不忘此日夜酌味常覺欣欣焉

蔡謨

商仲堪

歷代名醫圖 西晉有 蔡謨 商仲堪 仰道士
支法存 東晉有 程撝
今據陶隱居云蔡謨商仲堪江左人移東晉

南宋

徐熙

宋徐熙字秋夫善醫為射陽令常聞鬼吟呻甚慽吾秋夫
曰沒是鬼何如此吾曰我患腰痛死雖為鬼猶痛吾尚
不可忍聞君善醫願求救秋夫曰鬼類無形何由措置
鬼云縛草作人子依之但取孔穴鍼之秋夫如其言鍼
腰俞二穴肩井二穴設祭而埋之明日見一人來謝曰
蒙君治療復為設祭病今已愈感惠實深忽然不見秋
夫曰夫鬼為陰物病猶告醫既愈矣尚能感激來謝況
於人乎其鬼姓斛名斯

徐文伯

宋太子善醫召出就見一有孕婦太子自為診之是一女
令文伯診之乃一男一女太子性急欲剖腹視之文
伯曰自請鍼之令落於是瀉足三陰交補手陽明合谷
胎應鍼而落果如文伯之言愚按宋太子即少主元徽
又按南史記范雲為陳武帝屬官武帝寵之將有九錫之
命在旦夕矣雲忽感傷寒之疾恐不得預召徐文伯診
視以其事實告願得速愈文伯曰便愈甚喜只恐二年
後不復起耳雲曰朝聞道夕死可矣況二年乎文伯以
火燒地布桃葉設席置雲於上頃刻間汗解撲以溫粉
翌日愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒

少主元徽

胡洽

秦承祖

羊欣

陶隱居云宋有羊欣元徽胡洽秦承祖齊有尚書褚澄余
文伯嗣伯群從兄弟療病十愈八九凡此諸人各有所
撰用方觀其指趣莫非本草者乎或時用別藥亦循其
性度非相踰越

褚澄

齊光祿大夫褚澄仕至尚書建平孝王妃姬寺皆麗無子擇良家未笄女入御又無子知澄善醫問曰求男有道乎澄對曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽完實然後交合則交而孕孕而育育而為子堅壯強壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早洩未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽此王之所以無子也大王誠能訪求多男婦人媒至宮府有男之道也王曰善未再春生六男

徐之才

徐之才精明醫藥作本草藥對長子林卿次子同卿皆善於醫

徐嗣伯

齊書曰秣陵人張景患腹脹面黃醫莫能治嗣伯曰此石蚘爾極難療當得死人枕蒿服即往古塚中取枕蒿服之得大利并蚘虫頭堅如石者五升即差又有人嫗患

滯吟嗣伯診之曰尸疰也亦教之煮死人椓而愈後沈
僧慧恵眼痛多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可煮死人椓
服亦就愈王晏問曰三病不同治差則一何也曰石蚘
考父蚘醫療既辭其蚘轉堅世間藥不能遣須鬼物驅
之而散尸注者鬼氣也伏而不起令人沉滯須鬼物促
之夫邪氣入肝使眼痛而見鬼鬼應須鬼物以鈎之是
故三者皆用死人椓也氣因椓去故復埋於塚閒也

按歷代名醫圖

梁

北齊有　龍樹王菩薩　顧歡　李元忠　崔季舒
李密　祖挺　鄧宣文　顏光祿

正白先生陶景

正白先生初不知何許人亦不知姓氏名醫圖作貞白先生
按開寶重定本草序云本草舊經三卷至梁正白先生
陶景乃以別録參其本經朱墨雜書時謂明白而又考
彼功用爲之注釋列爲七卷南國行焉宋必陶景號正
白先生耶恐只一人矣又名醫圖梁列貞白先生次蘇
恭次陶弘景則各自是一人矣
今按書林廣記梁陶景謚正白先生況蘇恭唐人則名医
圖之誤也明矣
一作陶弘景重選草本藥品三百六十五種增入舊經作
七卷謂之名醫別録自號隱居先生按段成已題葛氏

肘後備急方序有曰華陽陶景曰葛之此製利世實多但行之既久不無謬誤乃著百一方疏于備急之後訛者正之闕者補之附以炮製服食諸法纖悉備具開卷見病備急益宜觀葛陰二君世共知為有道之士於學無不貫於術無不通故謂之華陽陶隱居補闕肘後百一方

後魏

按歷代名醫圖　後魏有　王顯　徐謇　徐雄謇之子

後周

按歷代名醫圖　後周有　徐之範　杜善方　姚僧坦

隋

巢元方

巢元方為太醫博士隋煬帝大業六年奉　敕撰病源候論五十卷今謂之巢氏病源

楊上善

楊上善隋朝人精通內經素問纂為太素

全元起

隋志全元起訓解黃帝內經一十八卷素問即其經之九

卷鍼經九卷共十八卷即內經也楊玄操云黃帝內經
二帙帙各九卷隋書經籍志謂之九靈王冰名爲靈樞

隋有 徐敏齊 許智藏

唐

藥上真人孫思邈

孫思邈京兆華原人也七歲就學日誦千言及長盛談莊
老百家之說周宣帝時以王室多事隱於太白山學道
鍊氣養形求度世之術洞曉天文推步精究醫藥審察
聲色洎藴仁慈凡所舉動務行陰德用心自固濟物爲
功偶出路行見人欲殺小青蛇已傷血出思邈求其人

脫衣贖而救之以藥封畏放於草間後出行見一白衣
少年僕馬甚盛下馬迎拜謝言小弟昨蒙所救父母欲
相見以別馬載思邈俄行到一城郭門庭煥赫人物繁
盛儼若王者之居少年延思邈入見一人端美白帢帽
絳衣侍從甚衆欣喜相接謝曰前者小兒偶出忽爲愚
人所傷賴道者救贖獲全其命感再生之恩乃命女子
領一青衣小兒出拜思邈省思嘗救青蛇但不知此何
所也心甚異之潛陪左右曰此涇陽水府也帢帽乃命
設酒饌妓樂以宴思邈堅辭以辟穀服氣惟飲酒耳遂以
輕綃珠金贈於思邈思邈堅辭不受乃取龍宮所頒藥方三
十首與思邈謂曰此真可以濟世救人俄命僕馬送歸
思邈深自以爲異歷試諸方皆有神効後著千金方三

十卷散龍宮之方在其內又著脉經一卷皆盛行於世
隨文帝徵為國子博士不就唐高宗召拜諫議大夫復
固辭年九十餘視聽不衰永徽三年二月十五日晨起
沐浴儼其衣冠端坐而化月餘顏色不變舉屍入棺如
空已尸解矣

名醫圖贊曰

唐孫真人　方藥絕倫　扶危拯弱　應効如神

藥王韋慈藏

藥王姓韋氏名訊道號慈藏醫中之聖藥中之王靈應如
神人皆仰之今醫家皆圖繪其像而祀之

名醫圖贊曰

大唐藥王　德號慈藏　老師韋訊　萬古名揚

啓玄子王冰

按唐人物志冰仕唐為太僕令年八十餘號啓玄子篤好
醫書精通素難按黃帝內經十八卷素問即其經九卷
內闕第七卷鍼經九卷共十八卷隋書經籍志鍼經九
卷謂之九靈王冰改名靈樞冰乃精勤博訪詢謀得失
得先師張公秘本以參詳因而撰註用傳不朽蕪舊
藏之卷合八十一篇分二十四卷於是內經聖意燦然
昭明素問玄言豁然敷暢後之學者何其幸歟

楊玄操

孟詵

孟詵仕唐爲光祿卿精於醫著食療本草行于世

李含光

李含光唐人著本草音義賜號玄靜先生

陳藏器

陳藏器唐人著本草拾遺

時賢

蘇恭

蘇恭唐高宗顯慶中爲朝議郎行右監同府長史騎都尉與許孝崇等採摭本草差謬表請刊定

許孝崇

許孝崇爲太中大夫行尚藥奉御

李世勣

唐司空英國公李世勣與蘇恭許孝崇等參考本草得失又增一百一十四種分門部類廣爲二十卷世謂之唐

唐翰林學士時賢撰胎前十八證

何若愚

何若愚南唐人字公務少習鍼柔既得鍼法撰指微論三卷探經絡之原賾鍼刺之理又作指微針賦貞元初常山閻明廣爲之註解今載鍼灸四書之首

周顧

明皇雜録有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰婦有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大困且渴遂飲水覺腹中堅否如石顧遂以硝石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水

梁新

唐崔魏公鉉夜暴亡召良醫梁新診之曰食毒僕曰常好食竹雞新曰竹雞多食半夏苗必是半夏毒乃命搗生姜汁而灌之即活

日華子

日華子按名醫圖作五代時人本草藥性多經日華子註

姓陳氏

宋

劉翰

馬志

宋開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與編集本草又取醫家嘗用有效者一百三十三種而附益之仍命翰

林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重爲刊定由是本草乃有詳定重定之目並鏤板摹行由此醫者用藥遂知適從

掌禹錫

大明校宋部載劉禹錫劉唐人也恐字誤欤今改刘作掌蓋掌禹錫宋人也

宋光禄卿直秘閣同校正醫書

林億

宋尚書祠部郎中秘閣校理同校正醫書

蘇頌

宋太常博士集賢校理同校正醫書

張洞

高保衡

秦宗古

朱有章

宋仁宗慶曆間詔命儒臣尚書都官員外郎孫奇騎都尉高保衡林億等重校神農本經葛洪次神醫普救太平聖惠重定鍼文俞穴校正内經素問脉經千金外臺傷寒論王函金匱等書嘉祐間又詔劉禹錫林億蘇頌張洞高保衡等相次被選仍領醫官秦宗古朱有章等編經連年作慶曆善救方簡要濟衆方既而補註本草成書

孫兆

孫兆宋仁宗朝將仕郎守殿中丞習通醫經内經素問重加改正刊誤又有傷寒脉訣

王惎

傳曰王惎少習醫方尤精鍼石遠近知名嘉祐中縣人張方文因暮宿於廣陵廟中其女有一物假作其婿因被魅惑而病惎爲治之一鍼有一祟從女被中走出而病愈矣

范九思

傳曰宋仁宗嘉祐中有太傅程公守於江夏因母之暴疾喉中患癰卒然而長氣塞不通命醫者止可用藥治之勿施鍼以損之衆醫博范九思云有藥可療須用末使新筆點之癰便差公遂取新筆與之九思乃以點藥上癰藥到則有紫血頻出漸氣通而差公曰此達神聖之妙矣命九思飲而求其方九思大笑曰其患熱毒結於喉中塞之氣不宣通病危甚公堅執用藥不可鍼若從公意則必誤命九思曾用小針藏於筆頭中妄以點藥乃鍼破其癰而效也若非此何紫血隨下也公方省而歎且善之

劉元賓

劉元賓自號通真子宋神宗熙寧間人精通方脉嘗補註叔和脉訣作診脉須知傷寒總括脉要秘訣等書刊行于世

劉温舒

劉温舒宋哲宗元符時人爲朝散郎太醫學司業作素問入式運氣奥論刊附靈樞經卷末

許叔微

許叔微字知可白沙人宋翰林學士年少未遇時嘗以登

科爲禱一夕夢神告曰汝欲登科須憑陰德叔微自念家貧無力惟鬻乃可於是精意方書又乃通妙人無高下皆急赴之既而所活愈多聲名益著復夢神授以一詩曰藥有陰功陳樓閣處堂上呼盧喝六作五是年登第六名進士第上一名陳祖言下一名樓材及注闕用外甲恩如第五名授職官以歸與詩中之言無差此則濟人之病急者也後爲學士著傷寒百證歌集本事方等書並行世

鮑志大

鮑志大江南括蒼人官至承直郎博學宏詞科精通醫術編集醫書會同

錢乙

宋朝錢乙字仲陽汶陽人也精小方脉无得其妙者小兒方藥直訣爲世專科門人閻孝忠所纂集也按演山省翁活幼口議云晉朝鍼工錢乙著小兒方訣又按養生必用方卷末附說閻孝忠議初虞世所著必用方謂中風不可吐小兒瘡瘽當轉瀉二說誤人甚多蓋初虞世乃宋哲宗紹聖時人雖五代後晉至此百有餘年況前晉年代愈遠則錢氏宋朝人也必矣

初虞世

初虞世宋哲宗紹聖中人居靈泉山蒲池寺善會院撰次

龐安常

龐安常宋哲宗元祐時人自號蘄水道人以醫聞淮甸嘗著傷寒卒病論有脉法其畧曰鄉人皆爲我能與傷寒語我察傷寒與四温變辨其疑似而不可亂也故定傷寒於喉手配覆溢於尺寸寓九候於浮沉分四温於傷寒此皆扁鵲畧開其端而余參以内經諸書考究而得其説審而用之順而治之病不得逃焉詳見醫經往從之游張子充留意於醫長聞戰水龐安常善醫經往從之游一日丐者扣門自言爲風寒所苦龐以藥濟之丐者問當用何湯數龐君見其手執敗蒲扇指以此煎湯調服子充初不省其意乃曰豈非本草所謂敗蒲扇能止汗者乎龐曰然翌日其疾果愈子充辭歸嘆曰龐君用藥真善矣

何澄

宣和間有一士人抱病經年百治不瘳聞何澄善醫其妻召至引入密室中告之曰妾以良人抱疾日久典貲殆盡無以供醫藥之資願以身相酬澄正色拒之曰小娘子何出此言但放心當爲調治取効不可以此言相污萬一外人知之非獨使澄醫賈藥不効不有人誅必有鬼責未幾其夫疾愈何澄一夕夢入神祠有判官語之曰汝醫藥有功不於艱難之際以色慾爲貪亂良人婦女

上帝令賜汝錢五萬貫官一資未數月東宮得疾國醫不能治有詔召章澤醫酒澄乃應詔進劑而愈朝廷賜錢五萬貫與初品官自後醫酒道盛行遂置殿宮京師號爲何藥院家見張季明醫說

聶從志

儀州華亭人聶從志良醫酒也邑丞妻李氏病垂死治之得生李氏美而淫慕聶之貌他日丞出李僞稱疾邀之伺其至語之曰我幾鬼録賴君復生無足以報願以身供枕席之奉聶驚而趍出治夜李復出就之聶絶袖脫去後歲餘儀州推官黃靖國病陰吏追入冥證事還至河邊見獄吏捽一婦人剖其腹滌其腸閇其故吏曰此汝

同官其之妻也欲與醫酒聶通聶不許聶良醫酒善士壽止六十以此陰德遂延一紀仍世世子孫一人官婦人滅筭如聶所增之數今滌蕩其腸洗其淫也靖國素與聶善既覺以其事告之聶驚曰方私語時無人聞而奔來我處亦無人知因異之聶後果七十二歲終一子登科其孫圖南紹興中爲漢中雒縣丞見夷堅志

朱肱

朱肱宋政和中人以奉議郎致仕號無求子著傷寒百問武夷張蔵序其書曰張長沙南陽人也著傷寒論其言雖詳其法難知奉議公傷寒百問蓋祖述其說神而明之以遺惠天下後世余因揭其名爲南陽活人書

張渙

宋徽宗太子壽王聰慧幼時常發癎疾諸大名醫莫之能愈時有北方醫士張渙挾盞貨藥于都下召之入內用藥即効宮至翰林醫正留方五百有餘逐病叙說深參其要近傳于世云

陳承

宋陳承將仕郎措置藥局檢閱方書

裴宗元

宋裴宗元試太醫令兼措置藥局檢閱方書

陳師文

宋朝奉郎守尚書庫部郎中提轄措置藥局陳師文與裴宗元陳承等同選編太平惠民和劑局方

寇宗奭

寇宗奭宋徽宗政和間授承直郎澧州司戶撰成本草衍義二十卷轉湊差充收買藥材所辨驗藥材通直郎

陳言

陳言字無擇宋高宗紹興中青田鶴溪人著三因極一病源論粹凡十八卷一百八十門得方一千五十餘道

湯民望

湯氏民望宋南渡時東陽人精小方脉求者不擇貧富悉治療如法其子麟登進士第人以爲陰德之報麟子衡尤邃於此學因以得官遂述其家傳有明驗方二十卷刊于會稽郡齋謂之曰嬰孩寶書

莊綽

莊綽字季裕清源縣人宋高宗建炎中官至朝奉郎前江南道都總管同幹公事以醫顯於時熟砭焫之微乃取膏肓腧穴灸法著書作圖刊行于世今附鍼灸四書中是也

李知先

李知先字元象號雙鍾處士宋孝宗乾道中人撰傷寒百問次韻成歌便於記誦因名曰活人書括

楊倓

楊倓宋孝宗淳熙閒代郡人世傳醫業有家藏方三十卷行于世

温太明

温氏太明五世行醫宋淳熙閒爲保義郎差充殿前司提點諸班醫藥兼和劑局監收買藥材官後棄利名隱居

求志取家傳秘方并生平行用有應効圖散及古今諸
方良法叶韻成詩謂之隱居助道方服藥須知

許洪

許洪宋寧宗嘉定中仕太醫助教差充四川總領所檢察
惠民局嘗增校和劑局方具註本草藥性於方藥遂品
之下附以吳直閣等得効名方及諸局經驗秘方又編
次和劑指南總論

張杉

杉字茂之宋嘉定中授承節郎監饒州城商稅著宛源方
及傷寒百問經絡圖方十餘卷行于世

王珍

王瑨宋寧宗慶元中人號是齋作百一選方

詹端方

詹端方宋時建安人纂次本草類要鏤板行世

杜光庭

杜光庭號廣成先生特進檢校太傅太子賓客主管大學
士户部侍郎徽國公選王函經上下卷

丁德用

丁德用宋朝人有難經補註

紀天錫

紀天錫宋朝人居仕麓註解黃帝難經三卷

謝復古

謝復古宋人有難經註

錢聞禮

錢聞禮宋李建寧府通判作傷寒百問歌九十三首既以龍溪隱士湯尹才所撰傷寒辨惑論刋附卷首合爲一書尹才乾道時人良醫普也

郭稽中

郭稽中宋大觀時人作產後二十一論與唐翰林時賢胎前十八證合謂之胎產真經板行

陳文中

陳文中字文秀宿州維揚人爲和安郎判太醫局兼翰林良醫著小兒痘瘡經驗方金亡歸宋處連水十五年理宗淳祐中與保安郎翰林醫正鄭惠卿同編校幼幼新書陳氏又有小兒病源方論一卷

陳自明

自明字良甫臨川人宋理宗嘉熙中爲建康府明道書院
醫諭著婦人良方及管見良方又有外科精要宗立續
作婦人良方補遺刋附各卷

鄭端友

端友宋理宗淳祐中人集全嬰方論行于世

楊士瀛

楊士瀛字登父福州三山人號仁齋宋理宗景定中人著
直指方活人撮括嬰兒秘要等書刋行

黎民壽

民壽字景仁宋景定中參釋氏號黎居士初註玉函經後
作簡易方斷病提綱決脉精要俗謂之醫家四書

王惟一

宋咸淳間翰林醫官朝散大夫殿中省尚藥奉御騎都尉
王惟一奉　敕編脩銅人腧穴鍼灸圖經凡五卷

朱佐

朱佐字君輔咸淳間人有集驗良方刋板印行

嚴用和

廬山嚴用和宋慶宗咸淳間人作濟生方論凡八十門製

方凡四百餘道鑿爲十卷又續方三十四評論義精詳曲盡其意

李駉

李駉字子塋號睎范子宋咸淳間臨川人集註叔和脉訣又有難經句辨並行世

歷代名醫圖 宋有

趙從古　孫用和　宋道方　王從益　吳復圭
曹孝忠　王光祐　陳明遇　安自良　翟煦
賈祐　蔣淮　張素

金

李源

李源字巨川金時名醫也名醫圖作李道源竇太師序流注指要後有云李君巨川以鍼法救疾除疾病於目前愈瘵疾於指下信所謂伏如橫弩應若發機萬舉萬全百發百中加以好生之念素無竊利之心嘗謂予曰天寶不付於非仁聖道須傳於賢者僕不揆遂伸有求之貌寢者萬千無一云云

竇漢卿

竇氏名傑字漢卿古肥人官至太師以醫顯於世得鍼

灸法遂著鍼經指南大金時人燕山竇杜芳序鍼灸四書曰余先君漢卿公以藥與艾見重於當時士大夫如雨嵓吳憲與以借補憲司官醫助教之職達齋游憲親爲書其藥室曰燕山活濟堂至元丙子以來余挾父術游於江淮間得遇至人授以鍼法且以子午流注鍼經實漢卿鍼經指南三書見遺余乃拜而受之珍藏翫味大有進益且喜其姓字醫術與余先君同也因是作而言曰南北有二漢卿姓同字同而爲醫亦同也北之漢卿得時行道鍼法精於八穴以愈疾名顯于世官至太師南之漢卿隱居求志惟以藥與艾推積活人濟世之功由是觀之信矣南北氣質之不同達則爲相不達則爲醫亦其志之出處異矣

成無己

成無己金國人嘗注解仲景傷寒論

張子和

張子和宛丘人大定明昌間以醫聞世南渡以來興定中召補太醫著儒門事親書刊印行

劉守真

劉氏名元素字守真大金河間人也因號河間居士作傷寒直格素問玄機原病式及醫方精要素問藥證宜明論方等

張素元

一云張元素字潔古因號潔古老人精通方脉尤喜著述有藥註脉訣難經引經主藥潔古家珍補闕錢氏方藥性珠囊産育保生方等書行于世昔許文正公語及近代醫術謂潔古之書醫中之王道然觀潔古氏藥註疑其草稾姑立章指義例未及成書也今所見者往往言論於經不相涉且無文理既言潔古平日著述極醇正此絶不相似不知何自遂及板行反爲先生之累豈好事者爲之而托爲潔古之名耶

張璧

張璧號雲岐子潔古之子也著醫學新說保命傷寒論叙和百問已刊附藥註脉訣内

按歷代名醫圖金有

何公務　侯德和　馬宗素　楊從政　袁景安

元

李杲

李杲字明之自號東垣先生潔古老人之門弟也金亡值元遂爲元人著作甚多惟有用藥珍珠囊脾胃論内外傷辨惑論等書刊行

王好古

王好古字進之號海藏先生東垣弟子也著仲景詳辨一卷活人節要歌括三備集醫壘元戎湯液本草癍疹論光明論標本論小兒吊書雜著有傷寒辨惑論辨守真論十二經藥圖辨仲景一集此事難知

羅天益

天益號謙甫先生東垣弟子也著衛生寶鑑藥象圖又有經驗方

吳恕

吳恕號蒙齋元至元中錢塘人精熟醫家以傷寒證類書刻成圖詳其證治名曰傷寒指掌圖

僧紹洪

紹洪號澹寮汝川釋氏精通方脉有澹寮集驗秘方一十五卷至元時人

胡士可

胡士可宣豐人元貞時授瑞州路醫學教授以本草圖經藥品三百三十九種編成節要叶韻爲歌鏤板印行便於記誦宗立復取諸醫方中常用而胡氏所闕未編入者八十四種悉補增歌括纂圖附註以全之

陳澤民

陳澤民字希元大德中建陽人善於醫作四時治要方
刊于鼇峯家塾

孫允賢

孫允賢文江人元仁宗延祐中選醫方集成予先祖彦明
公復選宣明拔粹等方而附益之是謂醫方大成

李仲南

李仲南號栖碧隱士元延祐中人深爲醫藥作錫類鈐方
今曰永類

馮道玄

馮道玄元泰定年間人以醫術行於江淮間尤精小方脉
因集全嬰簡易方刻梓崇川書府

薩謙齋

謙齋先生姓薩氏名字未詳元泰定間爲建昌郡守公隙
之時考訂名醫方書嘗經驗者分門別類爲一十五卷
鋟梓郡庠目其書曰瑞竹堂經驗方本齋教授王都中
序其書云

危亦林

亦林號達齋南豐人充本州醫學學録轉充宮醫副提領集世醫得効方自序曰鼻祖自撫而遷于南豐高祖雲仙游學東京遇董奉二十五世孫京授以大方脉還家而醫道日行伯祖子美復傳婦人正骨金鏃等科大父碧崖得小方科於周氏伯熙載惟學眼科及療瘵疾至亦林尋參究瘡腫咽喉口齒等科及儲積古方并近代名醫諸方由高祖至亦林凡五世矣隨證隨効然而方書浩若滄海卒有所索目不能周乃於天曆初以十三科名曰依按古方叅之家傳昕夕弗怠刻苦凡十稔編次甫成爲十有九卷名曰世醫得効方

滑壽

滑壽字伯仁元至正間人著難經本義

朱彦脩

朱彦脩元至正間人得東垣海藏之傳醫振南方爲一時名醫之最重者

附遺

斗門方楊師方勝金方廣利方靈苑方煙霞方等猶未得見難稽作者姓名又如孫用和方蘇沈方姚和衆方阮民望經驗方吳月潭傷寒一覽演山省翁活幼口議仁存孫氏活法方太監王公鍼灸資生經等雖有板刻以行未能詳其年代出處又據醫說宋有張子充善能診脉知人生

死及生平貴賤禍福吉凶榮辱酬應如神然予觀之不過
近於相術未足爲診候之善是故未敢編耳
夫醫之道肇自伏羲流於炎皇嘗百草之滋味始
興醫藥以及黃帝之聖與岐伯等更相問難垂法
後世於是雷公得以受業相傳而內經作矣治亦
商之伊尹論湯液秦之扁鵲著難經漢仲景啓傷
寒晉叔和述脉訣皇甫謐甘稚川輩皆著書作方
爰隋唐已來真人孫思邈藥王韋慈藏等皆有勳
天地感鬼神驚人駭俗之藝歷代推爲名醫也唐
甘伯宗撰歷代名醫自三皇始而迄於唐繪刻成
圖宋許慎齋又録唐及五季宋金數代之人如逼
真子劉元賓嶠古老人張素元等序次以續乎伯

宗所作名之曰歷代名醫探源報本之圖然窮其
圖雖顯名醫之名而無傳文可攷未免不有年代
差譌姓名各別之患如趙宋之王纂列於南宋大
唐之蘇恭贊於南梁范汪作注孝崇作宗之類覽
者豈無憾焉予不揣庸愚罔知固陋竊以前圖詳
加校訂訛者正之闕者增之間嘗討尋史子百氏
諸醫方書作爲傳義以發乎行事之實復以元人
裨續于後儻或搜求不及姑闕之矣惟我
皇朝混一而來治化文明雍熙盛世醫林中往往有聲然
高明洞達夐邁如前人者甚衆國初徐彦純劉宗
厚劉淵然等而接乎王海藏朱彦脩之傳著王機
微義及濟陰備急等方刊行四方莫不爲當時之名

醫學源流

醫也宗立徒長山林識見不廣未免輕易爲訟
俟後之君子而續作焉是編既成并附醫書卷首
展卷則見上古聖賢道藝相傳歷代名醫著方垂
訓功名行迹燦然可觀俾人咸知起敬而不敢忽
則斯道之大而有所自來爾熊宗立拜手敬書時
景泰新元庚午歲也