

編 者 的 話

祖国医学是人民群众几千年来同疾病进行斗争的经验总结，内容丰富多采。蕴藏在民间的各种灵驗方术，更是无穷无尽，这是祖国医学重要的組成部分，是伟大的宝库，应该努力发掘并加以整理提高。

为了继续发掘民间医药所蕴藏的宝贵遗产，我厅于1958年10月間，曾发动了一批医务人员到全省各地采风；同时全省各地中医和人民群众，热烈地拥护党的中医政策，积极而主动地献出了不少秘方和驗方，在这些秘方和驗方中，我們曾选择了一部分在广东省医药卫生技术革命成就展览会的中医館內展出。

本书是根据展出的資料和群众所献出的驗方秘方，选择其中疗效較著的加以整理后編成。全书共有十五部分，包括內、外、妇、儿等科，其中不少驗方还附有病例或疗效报告和統計，从这里可以发现中医治病的规律和有价值的医疗經驗。

本书所选的驗方，虽然是疗效較著的，但是祖国医学是以“辨証論治”为原則，所以一般讀者，在沒有医师指导下，希望不要随便服用。

我們对編輯錦方的經驗不足，加之在分类上和計量的单位上，都受到原始材料的一定限制，如讀者发现有不妥当的地方，希望随时提出，以便改正。

为了便于一般讀者对本书內藥量的換算，特附比較表如下：

32兩 = 1000克。

1兩 = 31.25克。

1錢 = 3.125克。

1分 = 0.3125克。

1分 = 312.5毫克。

50毫克 = 1.6厘。

0.5克 = 1.6分。

1克 = 3.2分。

10克 = 3.2錢。

100克 = 3.2兩。

1茶匙約 = 5毫升。

1湯匙約 = 15毫升。

1茶杯約 = 150—200毫升。

1飯碗約 = 300—400毫升。

1滴約 = $\frac{1}{20}$ 毫升。

1959年5月10日

目 录

第一部分 传染病

一、感冒	1
二、麻疹	3
三、白喉	5
四、流行性乙型脑炎（暑温）	10
五、疟疾	12
六、痢疾	14
七、霍乱	16
八、传染性肝炎（黄疸）	16
九、狂犬病	18
十、破伤风	22
十一、其他	28

第二部分 呼吸系病

一、哮喘	30
二、肺癆咯血	32
三、咳嗽	40

第三部分 循环系病

一、高血压·····	41
二、血栓塞·····	43
三、血液病变·····	46

第四部分 消化系病

一、肠痈（阑尾炎）·····	49
二、腹泻及消化性溃疡·····	53
三、肠梗阻·····	55
四、肝胆病·····	56

第五部分 神经系病

一、神经官能病·····	62
二、癲、癇、狂·····	63
三、痛症·····	64

第六部分 泌尿系病

一、肾结石·····	65
二、乳糜尿·····	67
三、肾炎·····	68
四、膀胱结石·····	79

五、糖尿.....	80
六、其他.....	81

第七部分 水湿、癰肿

一、甲状腺肿.....	85
二、风湿.....	86
三、水肿.....	89

第八部分 寄生虫病

一、血吸虫.....	91
二、鉤虫.....	92
三、中华分支睾吸虫.....	95
四、蛔虫.....	97
五、血絲虫.....	97

第九部分 正骨伤科

一、取子弹.....	99
二、正骨.....	103
三、脑震荡.....	110

第十部分 外 科

一、湯火伤.....	111
------------	-----

二、痛疽疮疡·····	116
三、瘰癧·····	118
四、痞瘤·····	122
五、痔瘡·····	124
六、蛇毒·····	128

第十一部分 皮花科

一、麻风病·····	140
二、皮肤病·····	150
三、性病·····	152

第十二部分 妇 科

一、乳疮乳痛·····	153
二、月經病·····	154
三、崩漏·····	156
四、子宫疾病·····	158
五、子癰·····	162
六、妊娠疾病·····	163
七、小产及不孕症·····	163
八、其他·····	165

第十三部分 小儿科

一、急慢惊风·····	167
-------------	-----

二、鎖喉風·····	169
三、小兒麻痺·····	170
四、百日咳·····	172
五、小兒久熱不退·····	175
六、腸胃病·····	177
七、其他·····	178

第十四部分 五官科

一、眼科·····	180
二、鼻科·····	183
三、喉科·····	183
四、口腔科·····	187

第十五部分 針灸科

一、內科疾病·····	190
二、外科疾病·····	194
三、神經系疾病·····	195
四、婦兒科疾病·····	202
五、泌尿系疾病·····	206
六、五官科疾病·····	209
七、痛症·····	216
八、其他·····	222

第一部分 传染病

一、感 冒

加减桑菊银翘合剂治疗流行性感

【处方】 荆 芥三錢半 薄 荷八分 連 翹三錢 金銀花三錢
 桑 叶三錢 杭 菊二錢 甘 草八分 桔 梗一錢
 牛蒡子三錢 北杏仁二錢 枇杷叶三錢 芦 根三錢
 淡竹叶二錢

【加减法】 热甚口苦者，加黄芩三錢或山梔三錢；骨痛甚者，加葛根五錢、桑枝四錢；不恶寒有汗者，去荆芥、薄荷；无咳者，去北杏仁、枇杷叶。

【疗效分析】 用加减桑菊银翘合剂治疗流行性感二百四十例，其中二百例用煎剂，四十例用提炼剂，經治疗观察，煎剂效果較好。

服煎剂二百例

起病日数		体 温		治 疗 结 果				
				治愈剂数		百分比	合計剂数	平均治愈剂数
1 日	116人	38°C ↑	116人	1	86人	43	357	1.79
2 日	72人	39°C ↑	74人	2	79人	39.5		
				3	27人	13.5		
3 日	12人	40°C ↑	10人	4	8人	4		

服提炼剂四十例

起病日数		体 温		治 疗 结 果			
				治愈剂数	百分比	合计剂数	平均治愈数
1 日	20人	38°C ↑	34人	1	11人	27.5	84
				2	18人	45	
2 日	16人	39°C ↑	6人	3	8人	20	
				4	2人	5	
3 日	4人			5	1人	2.5	

广州市第一人民医院

防治流行性感胃方

【处方】 菊花、桑叶、薄荷、猪屎兰、生鸡谷、丝子根、土荆芥、布渣叶、硬骨草根，以上各药适量，水煎服。

【疗效】 此方可于流行时集体饮用，可治疗并能预防，化县碌塘村流行时曾有八十二人集体服用五天，全部痊愈，且于服用两天内无新病例发现，以后全县推行此法，效果显著。

化 县

黄皮树叶治流行性感胃

黄皮树叶治疗流行性感胃和疟疾，效果显著。曾治愈流行性感胃病二百多例，治愈疟疾二十多例，兹各举一例如下：

【处方】 阴干黄皮树叶二至三钱，两碗水煎成一碗，一次服。

【流行性感胃病例】 汤××，女性，81岁。在“流感”时期高

热至40.1°C，微恶寒，口干苦，即服黄皮叶药水，服药三天内体温复常，连续服药五天，完全恢复健康。

【疟疾病例】 陈××，男性，28岁。患慢性疟疾两年多，后用黄皮叶煎水服十余天痊愈。

刘仲汤

野芋头汤防治流行性感胃

【处方】 野芋头十斤 大米半斤 白盐二两 水四十斤

【制法】 先将野芋头切碎洗干净，后与大米、白盐混合放锅炒三十分钟，将大米炒成黑色才放水四十斤，再煮三十分钟，待米烂即可。

【用法】 预防：每人每天饮半口盅，连饮三天。治疗：每人每天饮三次，每次半口盅，到退热为止。

【疗效】 鹤地水库北联生产大队一百多人，其中患“流感”二十人，饮野芋汤后当晚退热。此方又可预防，百多人饮此汤后，仅有新发病例一人。

湛江专区

二、麻 疹

辨证治疗麻疹的法則

本院由1956年至1958年秋，治疗麻疹一千零一十五例，除

0.5%的病者，因不耐心轉醫外，全部治愈。

【治疗原則】 根据“辨証論治”原則，按下列各期症狀處方：

1. 初期：发热，咳嗽、噴嚏，流涕，两眼潮紅，眼臉微肿，流眼水，情緒煩躁，口腔粘膜炎发现粟米样的細小白点。

【處方】 升 麻 五 分 黃 芩 二 錢 葛 根 二 錢 垂 絲 柳 二 錢
牛 蒡 子 錢 半 蝉 蛻 一 錢 桔 梗 二 錢 連 翹 二 錢
浙 貝 母 二 錢

【加減法】 兼風寒外感，加防風二錢；劇則加芥穗錢半；血熱郁滯，疹子欲透難透，發高热者，加西紅花(燉服)二分；惊抽加鉤藤二錢、桑叶二錢；口渴加花粉二錢、葦莖二錢。

2. 中期：熱盛咳嗽，疹子漸露。

【處方】 連 翹 三 錢 桔 梗 二 錢 黃 芩 二 錢 金 銀 花 三 錢
西 紅 花 三 分 桑 白 三 錢 木 通 二 錢 北 杏 仁 錢 半
葛 根 二 錢 瓜 蘆 皮 二 錢
紅 条 紫 草 (或 紫 花 地 丁) 三 錢

【加減法】 高热煩渴，加生石膏四錢、芦根五錢、知母二錢；大便滯泄，加薏苡仁四錢。

3. 恢复期：熱漸減退，疹色由紅紫轉为紫褐，皮疹漸次脫屑。

【處方】 蜡 梅 花 二 錢 桔 梗 錢 半 連 翹 錢 半 枇 杷 叶 二 錢
玄 參 錢 半 北 杏 仁 錢 半 薏 苡 仁 四 錢 谷 芽 四 錢

广东省中医院

三、白 喉

椰果树根治疗白喉

【症状】 分为咽头白喉、咽喉白喉、扁桃腺白喉、鼻咽喉白喉和輕型、重型、严重型、极重型。

【四型的分类】 ①輕型：如吞咽障碍，喉痛不发热，咽充血发紅，或已有白色小点，抹片找到白喉杆菌。②重型：发热 38°C 以上，吞咽障碍，流口水，頸淋巴腺輕度肿大，白色伪膜如黄豆大或指头大，精神尚佳；或伪膜虽小，热度在 39°C 以上，精神疲乏。③严重型：发热不拘高低，伪膜范围大，吞咽困难，声音嘶哑，下頷部淋巴腺肿大，精神委頓。④极重型：发热不拘高低，有严重的呼吸困难，吸气时鎖骨上窝及胸肋骨下陷，唇发紺，脸色蒼白，精神疲倦；或呈半昏迷状态，伪膜范围大及有并发症。計入院治疗八十三例，其中死亡七例，剔除十小时以内死亡四例救治不及者外，治愈率达96.2%。此外尚有十多个白喉門診病例，亦系服此树根治愈而未列計在內。

【椰果树根的疗效】 按照我院經驗，一般輕病例服药后的第二天，即自感喉痛与吞咽障碍消失，伪膜縮小，重病例及严重病例进步亦快。

【采用材料及用法】 选用椰果树肥而强壮的树根，刨去面上的脏土及粗皮，用鋤刀切成薄片晒干。

【剂量】 小儿八錢至两半，每天煎水分作二、三次服，成人每天二两。

【味道】 味淡而稍带一些涩，煎好后状如赤色薄浆糊，小儿易服，若加上一些糖浆則更易服食。

【副作用】 无副作用，只有极个别的小儿服后有輕度腹瀉现象。

【毒性】 并未有发现有毒性反应，究竟服多少才会中毒，未作試驗。曾有一例七岁患儿一天服二两，亦未有中毒现象出现。

为了巩固治疗效果，伪膜消失后，仍須服藥一周左右。

揭阳县河婆人民医院

土牛膝預防白喉

【处方】 土牛膝

【煎液的制法】 用于土牛膝根500克搗碎，加清水 2000 毫升，浸一夜，第二天用慢火煎至1000毫升，滤出，将渣再加水 1800毫升，用慢火煎至600毫升，最后将两次所得液混合，加入尼泊金 4 克防腐，即成土牛膝煎液。这时每10毫升的土牛膝煎液，相当于干根一錢。

【用量】 每日三次，每次10毫升，或每日一次，每次30毫升。預防用量，一般可服食四天，带菌者服至隔天一次的喉液培养三次阴性为止。

【預防效果】 根据我們在白喉病暴发流行区內的集体儿童一千一百人，用土牛膝根煎液的預防观察結果，及江門专区第一人民医院对白喉病流行区二百四十二名儿童預防观察，

认为土牛膝根煎服后,在人体内停留时间不长,半个月左右即逐渐消失。因此,在白喉流行时期,必须每隔半月服食一程,以保持预防获得良好的效果。

广州市西区卫生防疫站

土牛膝合剂治疗白喉

【处方】 阴热白喉：土牛膝根配合养阴清肺汤：

土牛膝根一两 生地一两 玄参八钱 开冬六钱
川贝母四钱 丹皮四钱 白芍四钱 甘草二钱
薄荷二钱半

【处方】 阳热白喉：土牛膝根配合神仙活命饮：

土牛膝根一两 石膏五钱 生地一两 梔子四钱
马兜铃四钱 龙胆草四钱 白芍四钱 黄柏四钱
瓜蒌皮四钱 板蓝根四钱 甘草二钱

【处方】 风热白喉：土牛膝根配合桑葛汤：

土牛膝根六钱 桑叶四钱 葛根一两 薄荷三钱
川贝母四钱 甘草二钱 木通三钱 竹叶三钱
金银花四钱 瓜蒌皮四钱

【疗效】 江門专区第一人民医院等医疗单位,通过七百余例白喉病的实验,治愈率达95%以上。棠下卫生所并曾试用于预防白喉,结果亦满意。

新会县黄华庭中医师献方
江門专区第一人民医院临床实验研究

巴豆朱砂外治法治疗白喉

我院自1958年11月中旬至12月中旬間，用巴豆朱砂膏治疗輕重白喉病共四十五例，全部治愈。

【处方】 朱砂、巴豆研末各0.5克，小药膏一帖。

【用法】 将药膏熨軟，調入朱砂巴豆末，和勻，貼在患者印堂穴（即两眉中間），八小时后取去，局部則发现紅紫色，并发生小水泡；用針将水泡刺破流去水分，涂上龙胆紫液。二十四小时后伪膜逐漸縮小，普通三至四天，伪膜完全脫落，症狀消失痊愈。此疗法手續簡單，药价低廉。

【巴豆朱砂膏疗效初步观察】 一般在貼药后三至四小时开始发生效力，患儿能安靜思睡，呼吸困难減輕；二十四小时开始，声嘶逐漸減輕，体溫下降，伪膜縮小，喉痛減輕。在治愈的十二例中，只一例检查喉部未见白膜；十一例中，二十四小时后白膜消失的一例，四十八小时消失的五例，七十二小时以后消失的四例，一周以上消失的一例。一般在二十四小时内白膜縮小，多在四十八小时后三十六小时内完全消失。

中山县人民医院

山大顏治疗白喉

【处方】 山大顏

【制法】 以山大顏嫩芯或嫩叶五斤，加水十斤，煮成500毫升待用。

【服法】 一个月至一岁：30毫升—40毫升。

一岁至三岁：40毫升—50毫升。

四岁至五岁：50毫升—60毫升。

六岁至十岁：70毫升—100毫升。

以上是一天用量。

【疗效】 以山大顏为主綜合治疗一百一十八例，死亡二例，疗效很高。

【山大顏介紹】 山大顏又名板叶芯、大心唇，为多年生小乔木，其叶常年皆綠，随地皆生，最多生在树林蔭下，我省各地皆有，叶橢圓而尖，底面均光滑，无毛。高約五尺，在秋冬之間結果实，如小粒状，色紅，药用采其嫩芯或嫩叶。

惠阳县多祝人民公社卫生院

馬錢子炭治疗白喉

我院曾治疗一百八十九例，病者年龄从二岁到四十七岁，临床类型分为：左侧扁桃腺白喉占 11.02 %；右侧扁桃腺白喉占 7.87 %；双侧扁桃腺白喉占 59.06 %；咽散布型白喉占 18.90 %；散点型白喉占 2.37 %；喉炎占 0.78 %。

細菌培养阳性率为 50 %，各病例均有局部典型伪膜存在。

【处方和服法】 馬錢子一两，放在新瓦片上烧成炭状，研为細末，分作五服（每服約为 0.5—1 克）。成人剂量每日二服至三服，用烧酒 15 毫升冲服，小儿八岁以下剂量每日一至二服，烧酒量可酌减至 5 毫升，全疗程三至七天，視临床症状消失之迟早而定，最多可服至十八至二十服，无反应，无中毒症状。

【脫膜時間】 最短一天，最长十二天，平均脫膜時間为四天，与西医药治疗差不多。

【細菌培养轉阴性時間】 最短一天，最长十四天，平均为3.8天，比1954年至1955年西药治疗一千三百一十二例的統計，还短0.7天。

【疗效观察】 一百八十九例中，因防止合并感染加注青霉素的有二十四例；經過临床治疗三至四天未见好轉，补注白喉抗毒素的有十二例，其他例均用馬錢子炭末治疗，西药只用維生素乙、丙丸服食，疗效很高。

广州市传染病院

四、流行性乙型腦炎（暑溫）

流行性乙型腦炎常用方

【处方】 紫雪丹五分 連翹三錢 川黃連錢半 竹茹六錢
丹皮三錢 蜡梅花三錢 象牙絲四錢 天竹黃五錢

【加減法】 小兒減半。便秘加大黃四錢；口渴加天花粉四錢、生地三錢、甘草一錢；高热加黃芩、黃柏各四錢、石膏一两、西紅花（焗服）五分。余用上列药方运用加減。

另外隨症選用白虎湯、竹叶石膏湯、犀角地黄湯等。

【治疗效果】 經治疗八例均获良好效果，只有一例有后遺症，如失語，吞咽困难，肢体瘫痪等。

中山医学院

流行性乙型脑炎的中医治疗

1958年治疗七例重症流行性乙型脑炎，全部治愈，且无后遗症，其主要处方及治疗规律，综述如下：

【处方】 生 地 三錢 麦 冬 三錢 石 膏 五錢 芦 根 五錢
連 翹 五錢 甘 菊 三錢 甘 草 七分 木 瓜 二錢
鉤 藤 二錢 竹 叶 二錢 牡 角 三錢 蓮 叶 三錢
知 母 錢半 金銀花 三錢半

【制法】 用水850毫升先煎石膏、牡角后加入諸药，煎存300毫升。

【服法】 五岁以下分三次服，六至十岁分二次服，成人一次服，重症者日夜各服一剂。难以口服者，用鼻饲法。

掌握病情，适当加减：症重者加洋参；抽搐者加全蝎、天麻、蜈蚣；神昏嗜睡者加川葛、天麻，加服安宫牛黄丸；大便溏泻者（初期症状有之）加香薷、厚朴、扁豆；高热不退者（便秘亦可）加羚羊或紫雪丹；咳嗽加川贝母、竹茹；并发肺炎加桑白、川贝母、黄芩，间服安宫牛黄丸；若热退37°C左右者去石膏、知母；热退神清而便秘者（中末期必有）加玄参、白芍、天花粉、石斛，去甘菊、木瓜、钩藤、石膏、莲叶、芦根，或转服复脉汤加减，间有个别在恢复期，有懒言而不语者宜用金银花、连翘、蝉衣、川葛、玄参、粉丹、土鳖、赤芍、川贝母、麦冬、生竹茹、莲子心等。药物分量，按病情酌定。

汕头专区海丰县

五、疟疾

截疟方治疟疾

【处方】 北柴胡 四錢 尖檳榔 三錢 山楂炭 二錢 烏梅 三錢
黃芩 三錢 法半夏 二錢 生薑 一錢 鸡骨常山 四錢

【制法】 制成水剂，每剂50毫升，每日于疟发前分二次开水冲服，以服用六天为一疗程。

【疗效】 共治疗间日疟有一百多例，其中再复检查五十七例，疗效总结如下：

1. 退热作用：服药后一日内退热，症状消失者占39%，二日退热者占61%。
2. 原虫消失时间：间日疟原虫于服药后一日内消失者占22.8%，二日内消失者占64.5%。
3. 二十七例为恶性疟，服药后退热时间为二至三天，原虫消失时间为四至五天。

广州中医学院

民间截疟外贴法

【处方】 一号合剂：老虎筋叶、假绿豆叶、曼陀罗叶、猪尿林、生毛草、鹅儿草，各等量，加酒七、八滴，熟烟约尾指头大，混合捣烂如桃核大。

二号合剂：老姜二份，蒜头半份至一份，熟烟約尾指头大，混和搗烂如桃核大。

【用法】 一律貼手寸口，即“內关”穴位，在发作前一至二小时貼下，用小布包扎。

【疗效】 茂名防疫站对五十四例患者試用观察結果：貼药一至四次，症状消失率由71.4%至100%，原虫在一至五天內消失，用法簡便，无毒性，无吃药苦味，小儿更喜用。二号合剂有效率較高。

茂名防疫站

黄皮叶治疗疟疾

【处方】 黄皮叶

【制法】 用阴干黄皮叶二斤半，加水二十四斤，用瓦鍋煎煮四小时，約余水八斤，将水傾出，再加水二十斤，将渣再煮四小时，約得水八斤，傾出和前次煎出之水合并，再濃縮至八斤乘热加入安息香酸粉10克搅匀，使粉溶解作为防腐劑即得，每毫升黄皮叶水相当于生药0.3克余。

【服法】 黄皮叶全无毒性，其有效剂量，照过去使用的經驗，成人每次用阴干生药5—10克，煎成水剂15—30毫升，每日服三次即可，縱使每次服60—80毫升亦无不良反应，小孩每次服5—15毫升，亦可服至30毫升。

【病例】 陈××，男性，28岁。患慢性疟疾，每月必发作一、二次，发作时注射复方奎宁，再服百乐君片，四、五天后即见效，但經過十余天又再复发，經两年多来，都是这样未有停止，后用黄皮叶煎水給他服，連服四至五日，病即

停止，再繼續服十余天，至今两年多来，未见复发。

刘仲湯

六、痢 疾

黃連治疗細菌痢疾

我院內科傳染病学教研組进行黃連对細菌痢疾（根据临床症状或細菌培养診斷）治疗的临床实验，其治疗方法如下：

【处方】 用制成片剂的盐酸黃連碱（每片为50毫克）口服。

【服法】 第一次400毫克或600毫克，以后每次200毫克，每天四次（或第一次200毫克，以后每次100毫克，每天四次），如临床症状較明显，兼用症状疗法，例如剧烈腹痛，兼用颠茄酊等，現經初步小結十九例，說明上法的治疗效果是比較显著的。

列表說明如下：

口服黃連碱治疗細菌痢疾疗效表

黃連碱治 疗后天数	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	……	12.5	平均 天数
退 热	9	3	1													1.2
腹 痛	4	3	4	1	2	1	1									2.3
里急后重	7	3	5		1	1		1								1.8
便次正常	6	5	2	1	1			1								1.6
大便恢复 正常	6	4	4	1	1	1										2
住院例数	1	1	3	1	2		5	1	3						1	3.8

上表說明，黃連碱对細菌痢疾的治疗是滿意的，平均退热時間为1.2天，大便次数正常需1.6天，大便的性状正常需二天。从这些数字来看，用黃連碱治疗，仅需两天半時間便可完全控制症状，因此，我們初步認為，黃連碱在細菌痢疾治疗上是很有前途的藥物。

中山医学院

綠茶治痢疾

【处方及服法】 將綠茶40克加开水400毫升，作三次分服（这是成人每日量）。

【疗效】 經用綠茶治疗細菌性痢疾患者十二例，均获得痊愈。如梁××之母，56岁，診斷为細菌性痢疾，腹痛，每日大便十多次，使用綠茶，連服三日后痊愈。

广州铁路管理局

凤尾草治疗痢疾

【处方】 取生凤尾草四至六两，加石榴叶一至二两，火麻仁七錢（研破外壳）。

【服法】 用水四碗煎至三碗，加蜜糖少許，六小时內分三次服完，小儿酌减。

【疗效】 用凤尾草治疗細菌性痢疾七十四例全部治愈。服藥一天治愈二十例；服藥二天治愈十七例；服藥三天治愈三十七例。

欽县卫生防疫站

七、霍 乱

治 霍 乱 方

【处方】 川黃連二兩四錢 黃 芩二兩四錢 干 姜二兩四錢
川貝母(去心)六錢 芩 朮六錢 荊芥穗三錢
砂 仁(去壳)三錢 車 前六錢 丁 香三錢
陳 皮三錢 麥 芽(炒)三錢

【制法】 先將上列十一味藥共研細末，用適量生蓮葉搗自然汁
(忌蜜糖)和成丸，如梧桐子大。

【服法】 成人每次服一丸至二丸，重症繼服一丸，童子酌量
服，滾水送下立效。

【說明】 此方由廣客傳來約有二十余年之久，經過我縣數次霍
亂吐瀉大流行証實服此丸皆有效，對時疫腹痛、瀉泄、絞
腸、霍亂等症，服之同樣見效。

儋縣 羊瑞平

八、傳染性肝炎(黃疸)

石竹根治療傳染性肝炎

【藥物】 石竹的根部。

【用法】 石竹根一两，猪瘦肉二两，每日用四碗水煎至一碗服，渣复煎，連服十四天为一治程，此药无任何副作用。

【病例】 1.广州铁路局运输处工程师李××，于1958年5月患传染性肝炎，住院休养，調治未效，11月10日起服用石竹根三天，肝区胀痛大减，睡眠轉好，心煩宁靜；連服一星期，飯量大增，肝痛消失，肝部仅可触及。在服用石竹根期間，并未休息，12月30日自西安出差回市，复查肝区无异常。

2.广州市邮电医院何剑豪医师报告：患者刘×，邮电医院技工，因倦怠、恶心、食欲不振、右上腹不适就診，检查肝在肋緣下二横指半可捫及，触痛明显；服石竹根第四天后，一切症状消失，检查肝在肋緣下一横指半，可捫及，触痛輕微，服药第九天，检查肝仅在肋緣下可捫及，无压痛，一切正常。

广东省中医药研究委员会 萧 熙

传染性肝炎有效方

【处方】 鸡骨草一两 山梔子三錢 飞滑石四錢 土茵陈六錢
黄 柏四錢 藿 香三錢 木 通四錢 晚蚕沙四錢
黄 芩四錢

【服法】 用清水三碗，煎至大半碗，分二次服。

广州一德卫生所 朱剑鴻

治疗传染性肝炎驗方

【病例1】 謝××，男性，26岁。右上腹痛，眼巩膜及全身黃

疸，腹部脹滿，病情日益加重。到廣州市第三人民醫院住院臨床診斷為：1.傳染性肝炎；2.亞急性肝萎縮。曾用腎上腺素、金霉素治療未效，請中醫會診，採用泄肝運脾清熱利濕法，病情迅速好轉，腹水消退，體重增加，痊癒出院。

【處方】 二金雞湯：

雞內金 五錢 海金砂 五錢 川厚朴 三錢 大腹皮 三錢

豬 苓 三錢 通 草 二錢

佐使藥：

麥 芽 一兩 川棟子 四錢 陳 皮 一錢 川黃連 二錢

綿茵陳 五錢 龍胆草 三錢 茯苓皮 一兩 柴 胡 四錢

青 皮 三錢 川加皮 六錢 泡蒼朮 四錢 加減為方。

【病例2】 职工陳×患此病月余，中西醫治療未效，自覺胃口不佳，疲乏，低熱經久不退，肝臟腫大，肋下三橫指有觸痛，服下方後即退熱，肝臟縮小，胃口好轉，已恢復工作。

【處方】 熟附子 三錢 赤 芍 三錢 蒼 朮 三錢 炒山梔 三錢

黃 芩 三錢 綿茵陳 三錢 枳 實 三錢 茯 苓 三錢

陳 皮 錢半 甘 草 七分 生 姜 三片 清水煎服。

【療效】 廣州市結核病防治所主治醫生陸彬彥曾治愈十二例，一般服藥四至八劑。

九、狂 犬 病

治狂犬咬傷驗方

【處方】 川黃連 一兩 黃 柏 一兩 黃 芩 一兩 大 黃 一兩

巴豆(去壳取仁)一两 牙硝两半 洗手子(去核)十个

【制法】 将洗手子剪碎，連各药晒干，研末过筛，巴豆另研，牙硝免晒，研末与上药末研匀，取龙骨质胶汁五钱，慢慢加入经冷却的紅米湯五两，随加随搅，至成粉红色，再加上上述药末，制成药丸十六只，晒干，砂纸包好备用。

【服法】 取生姜少許煎水，俟冻，姜水一碗冲药丸一只服下，未滿十二岁小孩減半，服后必泻五、六次，取隔夜稀粥食立止，过一小时取韭菜煲猪肉湯食，忌魚腥一日。

【禁忌】 1. 孕妇及产后未过四十天者忌服。
2. 各种燥热、煎炒食物，葱蒜、花生、牛肉等忌食四十天。

3. 忌食木薯、三角麦及飲酒一百二十天。

【說明】 1. 此药应用于癲狂症状未出现之前，或被咬后三天內服，效果最佳。

2. 患者周围应保持安静，尤应勿受鑼鼓刺激为要。

3. 本法系浦北县众水乡翁桂德三媽祖先所传，附近各地經治愈者极多，屢試屢驗。

浦北 翁桂德三媽

治疗狂犬病驗方

【处方】 1. 外用：

狗牙花三钱 万年青叶五钱 狗采花叶五钱

麝香一分 馬錢子六至九粒

注：①无狗牙花，用叶亦可。

②初次用馬錢子九粒，第二次六粒。

【用法】 先将馬錢子放入瓦鍋內，用細沙炒至烟尽，研为粉末，将万年青叶等药捶烂，与馬錢子粉拌匀加入麝香末，掺在药上面，敷在患处周围，伤口不敷，連用四次，每天一次。

2. 內服:

北杏仁 四錢 防 风 三錢 尖檳榔 四錢 細 辛 五分
枳 壳 二錢 川厚朴 二錢 桃 仁 四錢 苏 木 三錢

【用法】 每天服一剂，共服六至七剂。

【禁忌】 腌肉、腊肉、狗豆、黄粟、綠豆、牛肉。

【疗效】 曾作过十六例病人治疗，治愈十五例，一例因不遵医嘱忌口而致死亡。

外敷药四次，內服药六至七剂，即能治愈，疗效很高。

狂 犬 病 方

【处方】 杏 仁（去皮尖）四錢 山豆根 一錢 雄 黃 一錢
馬錢子（去毛、煨存性）一錢 桃 仁（去皮）二錢
生甘草 一錢

【用法】 清水一碗煎服。分二天服。每天早晚飯后各服一次，連服三剂——六日量，孕妇忌服。

【疗效】 灵山县新墟乡曾发现被狂犬咬伤五十一人。其中四十二人服上药，一人注射狂犬疫苗，均痊愈。五人未服该药，病发死亡。

灵山县丰塘卫生院

狂犬咬伤秘方

【处方】 第一方：

鴉鵲飯根 三叉楓根 山椒根 狗咬草 牛崗隘根
上藥各一两許煮酒。

第二方：

川貝母一两和糯米數两煮成飯。

【用法】 被狂犬咬伤后即用第一方一剂，分三次服，每四小时一次，另用一剂洗伤口，共洗三、四次，伤口愈后用第二方，隔日食一方，共三次。

【禁忌】 一百二十日內禁聞銅鼓声，三年內忌食生鸡、鯉魚、田鸡、鸚鵡等。

【說明】 此方是茅根坪村黃张飞三代祖传秘方。

廉江县

癩狗咬方

【处方】 馬錢子（另制）三錢 川貝母三錢 天花粉三錢
連翹三錢

【用法】 川貝母、天花粉、連翹共为粉末，將馬錢子去淨毛，洗淨切成薄片，用好米酒數两（按人酒量定）置盅內燉熟，冲藥粉服。

【禁忌】 禁房事，勿入黃麻地，忌吃芝麻一百二十天。

【疗效】 共治疗三十例，痊愈的二十七例。

獾狗咬方

【处方】 地榆一斤

【用法】 分四次服，每天服四两，两碗水煎回一碗。此方經治二十余人。如未发病的能預防，已发病的內服后恢复正常。

徐聞县

治狂犬病方

【处方】 人参敗毒散

【病例】 王××，男性，40岁。狂犬咬伤手部，十余天后开始发病，惊恐畏风，震顫，服此方三剂，五日痊愈。

李子房

十、破 伤 风

以木萸散加減治破伤风疗效好

本会崔景山中医师，使用木萸散加減治破伤风病，疗效很高。茲將治疗方法介紹如下：

初起在表者：症状如见頸項微强、不灵活，牙关无力或不能张大，四肢不随并漸见加甚，便秘，神志尚清，脉浮带数，人体形气未衰者，用木萸散加味治疗，处方如下：

川木瓜 六至八錢 吳茱萸 五至八錢 防 风 三至五錢

全 蝎 二至四錢 僵 蚕 一至二錢 白 芷 三至四錢
 天 麻 二至三錢 荆 芥 二至三錢 法半夏 三至五錢
 炙甘草 二至四錢

猪胆一个，取汁燉熟，和药服。

如见口渴、喉痛者，去法半夏，加胆星二錢。这是一般性初起的輕型症的用药方法。

半表半里者：症状角弓反张，牙关紧闭，苦笑面容，四肢刚瘳，不能起坐与行动，間有抽搐，腹肌硬，大便秘結，神志清，脉两寸浮微数，两尺沉紧。用木萸散加味治疗，处方如下：

川木瓜 六至八錢 吳茱萸 四至八錢 防 风 三至五錢
 全 蝎 二至四錢 蜈 蚣 二至四条 僵 蚕 一至二錢
 蝉 衣 四至六錢 朱 砂 四至六分 白 芷 三至四錢
 菖 蒲 二至三錢 川 芎 三至四錢 桂 枝 二至四錢

猪胆一个，取汁燉熟，和药服。

这是半表半里中重型症的用药方法，还須結合临床症状，随症加减。

重型已入里者：症状角弓反张，牙关紧闭，苦笑面容，四肢刚瘳，或至挺直，或不能自己动轉；腹肌硬如板，昏迷或半昏迷，抽搐頻繁至每小时十二三次之多，或抽搐持續期間至三十余分钟，或十余天不大便等；六脉皆沉紧，或口渴汗多，夜睡不宁等。用木萸散加味治疗，处方如下：

川木瓜 六至八錢 吳茱萸 五至八錢 防 风 三至五錢
 全 蝎 二至四錢 蜈 蚣 二至四条 僵 蚕 一至二錢
 朱 砂 四至七分 雄 黄 五至七錢 炙甘草 三至四錢
 川 芎 二至四錢 全当归 五至八錢 生白芍 八錢至两半

猪胆一个，取汁燉熟，和药服。

这是入里的重型症的用藥方法，須結合臨床症狀隨症加減。

極重症型危殆者：症狀如上的重症型，并見面目青黑，或目小眼瞪，或額上汗珠不流，或身汗如油，這四種症狀，間或一種至二、三、四種同時兼現。這是危甚的病象，縱使神志清不及時救治者，可能在一、二天內死亡。有這四種見症，為陰陽均將脫絕之象，治法按上重症型方法去僵蚕、蜈蚣、雄黃，加炮附子六錢至一兩、炙北芪六錢至一兩、黨參四至六錢、干姜三至四錢或白附子三至四錢，這時體溫可能高至40°C，脈轉洪數帶亂，沉指無根，乃陽氣被隔于外而發熱，為脫變之象。可照用上開溫熱的藥，若不治者，那便是無可挽救的了。

上開幾個類型的主方用藥，是對前期約三至七天所用的，雄黃一味用二至四天，可以不用，朱砂一味是用來鎮定的，驚抽減退，亦可以不用。以上用藥分量，系按成人計算，八歲以上至十二歲者改用十分之六；八歲以下可按情況酌減。

廣東省中醫藥研究委員會

中西醫合作治療破傷風

【病例分析】

- 1.年齡：四至七十歲。
- 2.性別：男十四，女六。
- 3.分類：輕型五例，中型六例，重型九例。

【中醫主要處方】

川羌活 四錢 吳茱萸 三錢 白 芷 錢半 全 蝎 二錢
胆南星 三錢 蜈 蚣 一條 北防風 三錢 川木瓜 六錢

【用法】 用水二碗半煎至大半碗，溫服。

【西医主要用藥】 破伤风血清及鎮靜剂（水化氯醛，魯米那，硫酸鎂）。

治疗情况及疗效

分 类	例	方 式	痊 愈	死 亡	死 亡 率
輕 型	5	西 医	5	0	0%
中 型	6	西 医 中 西 医	0 3	3 0	100% 0%
重 型	9	西 医 中 西 医	3 2	4 0	57% 0%

中山医学院外科教研組

五虎追风散治疗破伤风

病 例 分 析

【病例統計】 二十三例（1955年9月至1958年8月）。

【年齡、性別】 最小五岁，最大六十三岁，一般十八至四十岁，男十六例，女七例。

【受伤部位】 头部二例，上肢五例，骨折一例，下肢十五例。

【潜伏期】 最短三天，最长六十天，一般十至二十天。

【发病后入院治疗】 最快一天，最迟九天，一般五至六天。

【治愈例数】 二十例。

【服藥治疗痊愈時間】 最少七天，最多二十五天，一般十至十五天。

【治疗后停藥观察時間】 一般三至十天，平均七天。

【住院時間】 一般十二至二十天。

【病型分析】 严重七例，死亡二例。中型十二例，死亡一例。輕型四例。

使用說明

【制剂】 金蝉衣99克，生南星55克，天麻66克，地龙干33克，

淡全蝎33克，朱砂33克，混合干燥研成最細粉末备用。

【剂量】 成人用量20—30克，一日分三至四次服，小儿用量10—15克，一日分三至四次服。

【服法】 成人每次用黄酒10—15毫升冲服，小儿可用开水或少量黄酒冲服。

【治疗总量】 十至十五天或服药后抽风及苦笑容貌消失，可停药观察。

配伍疗法

1. 普魯卡因封閉療法。
2. 針灸療法。
3. 合并肺炎、气管炎、伤口潰瘍等可用抗生素配合治疗。

韶关专区

中藥針灸配合治疗破伤风

【处方】 蝎 尾三錢 当 归五錢 北 芪五錢 羌 活五錢

独 活五錢 蜈蚣头五个(煨焦研末开服)

清水煎服，每日一次。

【針灸】 面部取穴：頰車，听会，下关，迎香，四白，水沟，地仓，承浆，大迎，翳风。每天針一次，每次留針一小时。

腹部取穴：天樞。腹肌板硬，大便秘結須針此穴，針后翌日大便即通。

肩部、項部取穴：肺俞，新建，肩井，肩中俞，肩外俞。間日針一次，留針一小時。

胛骨、腰部、足部取穴：天宗，腎俞，委中，殷門，承山。間日針一次，留針一小時。

以上所針各穴，均加電針機配合使用。

【病例】 梁××，女性，25岁。1955年2月27日从井口跌下井底受伤，伤口敷药后，經二星期，正当伤口漸愈之际，面部咀嚼肌突然感觉强硬，张口困难，随着頸、腰、背亦牵强疼痛，至第六日乃送当地医师診斷为破伤风，經治未效前来診治。患者当时症状：面部肌肉紧张，咀嚼肌强硬，张口困难，頸項强硬，不能俯仰，如回顧，背部、腰部均觉抽紧；受伤部分之腿能伸不能屈，能屈不能伸，臑窝部位紧紧抽住，步履难行；腹部肌肉紧张板硬，大便秘結，形容憔悴，肌体消瘦，脉搏八十五次，重按无力，腋探 37.5°C ，患者晚上特別辛苦，全身不时突发抽搐，舌头亦受咬伤，腿上伤口仍未尽愈，同时有液体渗出，及給予藥物針灸綜合治疗，三个星期后全部治愈。

梁巨天

治疗破伤风有效方

【处方】 生黑豆四十粒 朱砂一錢

【服法】 將黑豆研成粉末和朱砂末，以热酒冲服。

【处方】 独蒜头一只 花生油五錢 威灵仙五錢

【服法】 将独蒜头捣烂如泥，加入花生油内，以威灵仙煎水，加酒烘热服。

【处方】 灰色蚱蜢十只（煨存性）

【服法】 以热酒冲服。

以上三方，任意选择一方，同样是服后出汗而愈。

【疗效】 治疗十二例，痊愈十例，二例无效。

湛江专区

破伤风外用驗方

【处方】 生蝙蝠一只 生艾叶一两 生羊食木叶一两
生蕒叶一两 火炼根（用嫩叶）五錢 生甘竹（用青）二錢
冷飯二錢 生桐油 五錢

【制法】 先将以上各药舂烂后，加生桐油调匀，贴伤口三小时见效。

【适应症】 破伤风，牙根紧闭，全身麻木，四肢抽搐等症。

海南儋县 羊晋福

十一、其 他

治蚕豆黄病良方

1956年3月間，彭、林、古三寨忽然发生似黄疸病例多人，在彭寨地区二天内死亡三人，同时病例不断增加，后经防疫站調查，系属蚕豆黄病。因患者皆因食蚕豆引起，在治疗过程中，先

用西藥虽有見效，但時間長，藥費多，后改用民間流傳草藥治療，療效顯著，計在七十二個病例中一般在一、二劑即告痊癒，近二年來推廣該方，患蚕豆黃病者服之皆癒。

【處方】 過山龍根二錢 黃果根一兩 楓樹果一錢 生甘草一錢
水煎服。

以上系成人量，小兒酌減。

韶關專區和平縣防疫站

三黃瀉心湯治腸伤寒

【處方】 三黃瀉心湯：

大黃八錢 黃連四錢 黃芩六錢

如高熱時加石膏一兩、地骨皮一錢；傷津加玄參一錢、
生地一錢。水煎服。

【療效】 本人治療三百四十例，除了三例因信心不強而另請他
醫外，三百三十七例均已治癒。一般治癒劑數為四至十劑。

清遠 何季甫

第二部分 呼吸系病

一、哮喘

改制黑錫丹治哮喘病

【处方】 黃 丹二兩 硫 黃二兩 葫 芦 巴 五錢 沉 香 五錢
肉 桂 五錢 破 故 紙 一兩 熟 附 片 五錢 肉 豆 蔻 一兩
小 茴 一兩 木 香 一兩 金 鈴 子 肉 一兩
上藥共为末，制成小丸。

【服法】 每服五至十五丸，一日三次，溫水送服。

【反应】 一般无不良反应，有个别人多服了稍觉腹痛而已。每服四、五天后即停服一、二天，服藥量如果不超过二两，则无反应。

【疗效】 本方曾治五例，十余年支气管炎哮喘患者，服藥后症状均已消失，經訪查各例，两年无复发。

【說明】 因当时无黑錫和黑錫丸，故改制本丹。

廉江人民医院 黃育霖

鮮胎盘与中葯合剂治疗頑固哮喘

新兴县某部长患哮喘，周期发作，曾經广州某医院西医治疗未效，后回江門专区第二人民医院服中葯加“胎盘”治疗，經三次天气轉变也无复发。此方先后治愈十年以上哮喘患者三例。

【处方】 生 姜 五錢 橘 紅 五錢 菟絲子 五錢 萊菔子 八錢
旋复花 五錢 法半夏 六錢 枸杞子 三錢 五味子 五錢
苏 子 五錢 陈 皮 三錢 川貝母 三錢 楮实子 五錢
肉蓯蓉 五錢 川朴花 三錢 当 归 四錢
鮮胎盘一个，用水漂淨。

清水3000毫升煎至 300 毫升，一次服。

每天一次，共服十服为一疗程。

江門专区

治哮喘驗方

本院中医师何桐生，三十年来治哮喘百余例，复查有效率达95%，且可断根，现在正推广研究。

【处方】 川貝母两半 款冬花两半 紫 菀两半 猴子枣七分
皂 角四两半

【服法】 上葯共为細末，蜜和为丸，如黄豆大，每日大人服四次，每次四粒或三粒。小童減半。用大枣煎水送服。

高要县人民医院

治牽蝦（哮喘）驗方

【處方】 紅 菊（百日紅）十朵 酒 餅四錢 水煎服。

江門专区

“补天河車再造丸”治哮喘

【處方】 防党參二兩 熟 地四兩 炒白朮三錢 当 归兩半
炒枣仁兩半 龟板胶一兩 炒白芍兩半 山 藥兩半
远志通兩半 童鹿胶一兩 茯 苓兩半 枸杞子四兩
蜜炙黃芪三兩

鮮河車一具，洗淨煮熟合上藥。

【制法】 搗爛和晒干或烘干后研成幼末，蜜煉和二胶做成小丸如豆大，每服二錢至三錢，早晚空腹開水送服。

【療效】 采用“补天河車再造丸”根治久年哮喘病症，有七例获得显著療效。

汕头市安寧第三門診部 熊柏槽

二、肺 癆 咯 血

止紅散治肺出血

【病例】 葛××，男性，49岁。主訴：咯血痰，咳嗽，胸痛，疲

乏。入院时情况：发热38°C，脉搏88次/分，呼吸20次/分，胸部听診左上部有湿性罗音。血检查：血色素70%，紅血球335万，白血球6350，中性球78%，淋巴球26%，酸性球1%，血沉降第一小时94毫米，康氏反应(+++)，痰結核菌阴性，胸部照片診斷浸潤型肺結核 $\frac{\text{上}+\text{中}+\text{下}}{\text{上}0+\text{中}+\text{下}}$ 。入

院后当日（1958年4月3日）上午突然剧咳，咯血約200毫升，給止血剂和鎮靜止咳剂，次日晨又大量咯血300毫升，顏面較蒼白，当日注射凝血質、維生素和維生素丙，并注射脑垂体后叶素十个单位，加入25%葡萄糖液注射靜脉，并注射各种止血素，均无效。后經会診决定才开始服用中藥治疗。患者脸色蒼白，疲困，大便秘結，乃以止紅散（湯剂）每日服二次，服藥次日大便三次。5月15日血痰漸减少，无再有大咯血。5月16日改用止紅散粉每日服三次，每次10克，服至5月26日痰已完全无血，繼續服至6月14日便停药，該患者至今五个多月来未再有咯血。

本病例由4月3日咯血，至5月9日未止，每日除血痰外，間有少量、中等量、大量肺出血。5月9日配合服中藥后咯血减少，并且能够基本控制沒有大咯血，直到近半年来未再发现肺出血。

【处方】 止紅散：

龙 骨 五錢	牡 蠣 五錢	白茅根 五錢	熟大黃 三錢
棕 炭 三錢	焦梔子 二錢	炒丹皮 三錢	藕 节 三錢
川貝母 三錢	黃芩炭 五錢	白 芨 三錢	桔 梗 三錢
生蒲黃 三錢	白 芍 四錢	生地炭 四錢	熟地炭 四錢
天 冬 四錢	麦 冬 四錢	甘 草 三錢	生阿膠 四錢

生代赭石一两 大小蓟炭四錢

【用法】 大咯血病人服湯剂，每日服二次，每次服一剂。咯血停止后，酌量患者情况，改每日服一剂。如有腹瀉次数多，咯血已基本停止，可去方中熟大黃，如果以后又痰帶血，則可改服原方散剂，每天三次，每次10克。

广东省干部疗养院

治肺癆吐血咳血驗方

【处方】 鉄包金三两 穿破石三两 大甘草三錢 猪瘦肉半斤

【服法】 以水七大碗煎成一大碗，一次服完，隔二、三日再服一次。

【疗效】 二十年前我弟若湖患肺癆咳血数年，中間大出血数次，經中西医治疗无效，后服此方数剂即痊愈不复发。又乡人张××亦患此病，数剂痊愈。

东莞太平人民医院 王树棠

中西医合作，救活大咯血病人

两例大咯血病人，每日咯血共約 500—1200 毫升，迭經西医应用各种止血剂、輸血、人工气腹、脑下垂体注射等治疗，仍未能止血，后經中医会診，并用中葯治疗，次日即行止血。簡要病例如下：

【病例】 李××，43岁，工人。患慢性纖維空洞型肺結核，左侧肺破損，近两年来反复多次咯血，由数十至数百毫升，經各种方法治疗，无法止血，病情危篤，曾拟施行外科手术

以进行止血，但病員一般情况极为恶劣，恐不能支持，后来在党委号召下，千方百计抢救病人，乃进行中医会诊。会诊时症状发热 38°C ，面色蒼白，咳嗽咯血，病象危急，脉芤，舌苔微黄，当日下午服中药后，次日即无再咯血，病情轉危为安。

【处方】 犀角地黄湯加味：

犀 角（冲服）一錢	生 地一兩	丹 皮四錢
黄 芩三錢	蒲黄炭四錢	側柏炭四錢
荷 叶三錢	藕节炭八錢	花蕊石三錢
茅 根八錢	大蓟炭三錢	小蓟炭三錢
参三七末（冲服）三錢		

【处方】 藕汁童便各半碗服之。

【处方】 党参八兩煎湯代茶服。

【处方】 清金宁路湯加味：

沙 参五錢	桑 叶三錢	生 地六錢	麦 冬四錢
玄 参五錢	川貝母三錢	旱蓮草四錢	黄 芩三錢
蒲黄炭四錢	側柏炭四錢	荷 叶三錢	茜草炭四錢
藕节炭八錢	茅 根八錢	丹 皮四錢	百 合四錢
淮 山一兩半	参三七末（冲服）二錢		

广东省干部疗养院

复合黄芩湯治疗肺結核

本院內科，曾用复合黄芩湯治疗肺結核患者一百例。其中三十二例完全治愈。其余大部分症状显著进步。

【处方】 黄 芩一斤 胡黄連一斤 連 翹一斤 黄 柏一斤
天香炉一斤 白 前一斤 青 蒿一斤 金銀花一斤

【制法】 将上列各药加水10000毫升煎成1000毫升即成。其中青蒿及金银花应待煎剂将成前十五分钟时加入。

【服法】 成人日服三次，每次服30—40毫升，小儿一至三岁服成人量十分之一，五至十岁服成人量五分之一。

合浦县人民医院

治疗肺结核方

中医对肺结核的诊疗有悠久历史，对于慢性肺结核，特别是慢性纤维空洞型肺结核，经常咯血者有一定的疗效。根据茂名分界人民医院中医师林巽权，最近治疗七个病例分析，服药平均三十余剂，自觉症状消失，体重增加，精神良好。

林医师对肺结核治疗的体会，以一般长期患者身体虚弱、心燥、火亢、脾弱，初不宜给予补剂，仅能服用清凉汤。

【处方】 杏仁四钱 桔梗三钱 枳壳钱半 桑白皮三钱
甘草一钱 山楂三钱 瓜蒌仁三钱 川贝母钱半
薏苡仁五钱 麦芽三钱

上药服后胸痛咳嗽减轻，待至浮火下降，心神宁静之后，才给予一般补剂。

【处方】 石柱参钱半 麦冬三钱 五味子一钱 归身钱半
北芪三钱 白芍三钱 生地五钱 知母三钱
陈皮钱半 甘草七分 川贝母钱半 黄精三钱
太白二钱

服数剂后，各种自觉症状消失。

茂名县人民医院

痕芋头治疗肺結核病

我院邓树棠医师，曾治疗肺結核病二十二例，其中十三例症状全部消失，二例經 x 光检查証明已治愈，五例显著好轉。二十二例中有四例經 x 光透視，証实为肺結核，十八例未經透視检查，只有临床症状，如咯血、潮热、盜汗、咳嗽等。

【服法与配方】 将采回的痕芋头放干，用干的刀刮去皮，切为薄片，切勿接触水分，若是接触水分，服后产生副作用或中毒。待水煎至开花时才将痕芋头放入，放入后切勿搅动，一直煎至三十分钟或一个钟头，去火，将汁倒出，作为內服。服法以用四两开始，每天增加一两，增至十二两后，即每天减一两，减至四两，又每天加一两加至十二两，后停止五至七天再服。

一个疗程痕芋头用量表

日 期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
用 量	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	10	9	8	7	6

日 期	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
用 量	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	停服 5—7 天				

【对症配伍葯物】 发热时加龙骨一两至一两半、牡蠣一两至一两半、小环釵三至七錢；咯血时加側柏炭六錢至一两二錢，或馬糞炭一两；无热时加猪骨、猪肝、大魚等用作营养剂。如咳嗽、咯血、发热均齐可用龙骨、牡蠣、小环釵、側柏炭共一剂。

【副作用与中毒处理】 痕芋头的副作用，是服后口痒、喉痒或舌肿痛等现象，如切片时洗过水再煎服时可能产生神经松弛，四肢无力，头眩晕等中毒现象。用甘草五钱，水二碗煎至八分内服，可解除副作用。曾有一例，因痕芋头制作过程沾了生水，服后舌灼热、喉痒，后给以甘草流浸膏4毫升、汽水10毫升二次分服，即解除。至于中毒处理，用北芪、甘草煎水内服便可消除。

新会县棠下中心医院

铁破汤治肺结核

【处方】 铁包金二两 紫菀三钱 白芨四钱 穿破石二两
牡蛎三钱 百部三钱 北杏仁三钱 阿胶三钱
川贝母三钱 制半夏三钱 瓜蒌仁六钱 白茯苓四钱
薏苡仁六钱 枇杷叶四钱

【用量和煎法】 铁包金、穿破石成人每剂一至二两，有时可用至三两，先放入瓦煲内煲四十至五十分钟。阿胶则要另外烱化，冲入温服，每天一剂。

【加减法】 1.咳嗽、胸痛：加天冬四钱、麦冬四钱、白芍三钱、柴胡三钱、甘草三钱等。

2.咯血、咳血：加仙鹤草六钱、藕节四个、侧柏叶三钱、茅根四钱、竹茹三钱、小蓟三钱等。

3.潮热：去半夏、紫菀，加银柴胡三钱、秦艽三钱、鳖甲六钱、骨皮三钱、青蒿三钱、知母三钱、石斛三钱等。

4.盗汗：加龙骨五钱、白芍四钱、浮小麦三钱、黄芪四钱等。

5. 食欲不振：去瓜蒌仁、北杏仁，加党参四錢、白朮三錢、淮山四錢、鸡内金三錢等。

6. 失眠：加酸枣仁四錢、柏子仁四錢等。

7. 遺精：去瓜蒌仁、薏苡仁，加龙骨五錢、金櫻子三錢、芡实三錢等。

【疗效】 一年多来应用此湯治疗肺結核三十八例，已經治愈者九例，显著好轉者二十七例，服藥后无变化者只有二例。

【禁忌】 本湯方孕妇忌服。

龙川县老隆鎮人民医院 謝作材

鉄破湯治疗肺結核

鉄破湯治肺結核，效果很好，1956年以来經临床实践一百一十八例，痊愈者三十四例，好轉的七十九例，有效率95.5%。服用簡便，且无毒性。

【处方】 鉄破湯：

鉄包金 二兩	穿破石 二兩	阿 胶 三錢	白 芩 四錢
瓜蒌仁 三錢	北杏仁 三錢	川貝母 三錢	紫 菀 三錢
百 合 三錢	枇杷叶 三錢		

【加減法】 鉄包金、穿破石、阿胶、白芩为必用藥，其余可依症取舍。发热甚加天冬三錢、麦冬三錢；潮热加丹皮三錢、石斛三錢；有痰火加青天葵二錢、馬兜鈴四錢；盜汗加龙骨五錢、牡蠣五錢；大便溏泄加云苓四錢、蓮肉三錢、淮山四錢；咳劇加百部三錢、延胡索三錢；消化不良加阿胶三錢。

何澤芬

灵芝草治肺癆

【用量和服法】 灵芝草叶干的一两（或新鮮的一两二錢），水煎一日量，二次分服。

【說明】 灵芝草产于我国云南及南洋一带，对肺癆病疗效良好，多数病者服后症状迅速減輕或消失，灵芝草含有一种配糖体及中性成分，具有抗結核菌作用，在动物实验治疗方面，亦有同样效果。

广州中医学院

三、咳 嗽

黄连治疗急性支气管炎

番禺公社中心医院，应用黄连粉治疗急性支气管炎及上呼吸道感染疾患共六十例，疗效显著，平均三天治愈。

【用量】 体重每公斤用0.15克--0.2克。

【用法】 黄连粉和糖浆一天四次分服。

番禺 黎萃拔

第三部分 循环系病

一、高 血 压

治疗高血压方

患者陈××，男性，52岁。血压增高已四、五年，现血压上升220—280/170—200毫米水銀柱，感觉头晕、眼花、恶心、呕吐、心悸，极度烦躁不安，两下肢麻痛，尤以膝关节痛为剧，病情非常危重。經西医用硫酸鎂、寿比安、魯米那、冬眠灵和泻血等治疗，病情不见好轉。后改用中医治疗，以平肝降火、鎮靜、养阴的治疗法則及配合梅花針刺双膝关节，病情漸奏好轉，轉危为安，血压下降至接近正常，已无自觉症状。

【处方】 石决明一兩 干地黄一兩 甘 菊五錢 丹 皮四錢
干地龙四錢 鈎 藤五錢 牡 蠣七錢 夏枯草五錢
杜 仲五錢 牛 膝五錢 川木瓜五錢 白 芍六錢
川續断五錢 黃 芩三錢 龙 齿七錢

梅花針刺双膝关节痛处，并內服六味丸。

广州市大新卫生所

治高血压方

本所用下列处方治疗高血压三百四十例，按苏联分类方法，第一、二期疗效达100%，第三期达85%。

【处方】 石决明 三两 生地黃 八錢 杭 菊 五錢 白 芍 八錢
桑寄生 二两 夏枯草 一两 苦丁茶 六錢 玄 参 八錢
丹 参 五錢 槐 花 八錢 牛 膝 八錢 龙胆草 五錢

【处方】 玄 参 二两 当 归 一两 生 地 八錢 槐 花 八錢
山 楂 一两半 黑梔子 八錢 牛 膝 八錢 桑寄生 五錢
川 芎 六錢 丹 参 八錢 白 芍 一两 秦 艽 四錢

【处方】 石决明 二两 桑寄生 两半 玄 参 二两 生 地 八錢
白 芍 六錢 黑梔子 六錢 夏枯草 两半 希干草 五錢
牛 膝 六錢 槐 花 六錢 杭 菊 四錢 女貞子 五錢

【处方】 石决明 两半 夏枯草 八錢 生 地 六錢 玄 参 八錢
馬兜鈴 六錢 天 冬 六錢 杭 菊 四錢 防 风 六錢

【处方】 杜 仲 二两 桑寄生 二两 夏枯草 二两 山 楂 二两

【用法】 以上五方，可以輪流应用，也可連續使用。

广州市大新卫生所

粉葛治疗高血压

【处方】 粉 葛

【用法】 粉葛湯：将生粉葛二至五斤，去皮后切成小块，加水四至十碗（一斤加二碗水按比例計算），煮成一碗，頓服或二次服，五至七天服一次。

粉葛糊：葛粉（市面有售），每次用16克加水煮成糊状，可加糖調味，服一、二次。

佛山专区第一人民医院，使用葛粉治疗原发性高血压和妊娠毒血症高血压共二十例。初步观察显效者十五例，其中血压稍降低，自觉症状有改善者三例；收缩压和舒张压显著降低或血压降至正常范围，自觉症状有改善者占十二例。无改善者五例。

佛山专区

治疗脑出血方

雷××，在一天早上，不能起床，并有半昏迷不語，右上下肢弛緩癱瘓，小便失禁，入医院用西药治疗未效，后用中药經十五天治疗，症状消失，痊愈出院。

【处方】 薄荷五錢 菊花三錢 菖蒲三錢 天竹五錢
天冬三錢 茯苓四錢 山龙錢半 赤芍三錢
白芷錢半 当归五錢 北芪六錢

【加减法】 上方最初用时加乳香三錢，服二剂后去乳香，加紅花三錢、玄参三錢、川芎三錢、鉤藤一錢；最后去天冬、菊花、山龙、鉤藤，再加入茯神四錢、枳实四錢、陈皮錢半、白朮四錢、炙甘草三錢。

韶关专区

二、血 栓 塞

中医治疗靜脉栓塞

有一产妇，于1958年10月28日产嬰二天后，下地行走，突然

左腿肿痛，随后逐渐加剧，患肢肿痛，夜不能睡，經西医行腎囊封閉，抬高固定患肢，使用盘尼西林、硫酸砒鉄、磺胺加重曹、盐酸嗎啡、50%葡萄糖、維生素和輸血等治疗，病情有增无减，而且左側下肢高度浮腫，病情更为危險，于11月14日轉中医科用中葯治疗，获得奇效，至11月26日(計中医治疗十二日)，左下肢肿痛全部消退，11月28日下地行走，恢复健康。中医师周瑞石在施治中所用主要葯方：

【处方】 牛 膝 五錢 黃 芪 一兩 白 朮 五錢 猪 苓 四錢
 桃 仁 二錢 忍冬花 六錢 泽 泻 四錢 防 党 四錢
 杜 仲 五錢 云茯苓 七錢 桂 枝 三錢 当归片 五錢
 木 瓜 五錢 水煎服。

湛江市人民医院

治疗血栓閉塞性脉管炎方

【主用葯方】 木瓜虎骨丸：

木 瓜 五錢 血 竭 五錢 虎 骨 五錢 沒 药 五錢
 乳 香 五錢 甜瓜子 一兩 木 香 一兩 枫香脂 一兩
 安息香 二兩 地龙干 二兩 当 归 一兩 肉 桂 一兩
 骨碎补(去毛) 一兩 龟 板(酥炙) 一兩
 自然銅(醋淬) 五錢

上葯共研末糊丸如梧桐子大，每服三十丸。

独活寄生湯：

独 活 兩半 桑寄生 兩半 杜 仲 兩半 牛 膝 兩半
 細 辛 兩半 秦 艽 兩半 桂 心 兩半 茯 苓 兩半
 防 风 兩半 川 芎 兩半 人 参 兩半 甘 草 兩半

当 归一两 熟 地一两 芍 药一两

共研为末，每服三錢，生姜五片煎湯送下。

【冲服常用方】 当 归一两 金銀花二两 生 地一两

牛 膝一两 乳 香三錢 田 七三錢 海风藤三錢
独 活三錢

气虛加党参、北芪各五錢；痛甚加延胡索四錢、沒药三錢。余用上方斟酌加減，水煎冲服。

【病例】 汪××，男性，35岁。原患亚急性細菌性心內膜炎，住院期間，出現左足小腿下三分之一有瘀血斑一块，几日后左足拇趾完全变为干枯，呈黑色，无潰瘍形成。診斷为左足拇趾干性坏疽。用上方加減使用，共服七剂，患肢之坏死处恢复正常。

血栓性靜脉炎及閉塞性脉管炎七例疗效統計

症 状	人 数	消 失	效 果
疼 痛	7	7	100%
間歇性跛行	7	5	71%
发 白	4	4	100%
肢 体 变 冷	7	7	100%
脉 搏 消 失	2	2	100%
水 肿	3	2	66%
发 紺	3	3	100%
坏 死	3	1	33%
不 能 行 走	3	3	100%

病人情况	人数	百分比
痊愈	4	57%
显著进步	2	28.6%
进步	1	14.2%
无效	0	
恶化	0	

中山医学院

三、血液病变

治疗再生障碍性贫血方

我們初步认为，再生障碍性贫血，大抵属于虚劳亡血一类病症。

【治疗方针】 补虚劳：以温补气血为原则。止出血：以扶阳、温气摄血为原则。

【所用方剂】 小建中汤、十全大补汤丸、人参养营汤、归脾汤丸、附桂八味丸、附桂理中丸、天雄散、真武汤等，随症加减使用。

【治疗效果】 患者六例，经西医治未效，后以中医治疗，三例显著进步，周围血象除血小板外，恢复至正常数字。临床症状亦有显著进步，骨髓象稍有改善。

广东省人民医院

治疗亚急性白血病方

本院中医科根据“内经”所载治疗“血枯”采取养阴补气血方法治疗“亚急性白血病”，经过四个疗程（四周）后，血色素、红血球均有好转。病者一般病情好转，食睡如常，照常活动，尚在治疗中。

【处方】 丹胶养血汤加减：

丹 参 四钱 阿 胶 三钱 熟 地 五钱 归 头 四钱
麦 冬 三钱 茯 神 五钱 防 党 五钱 白 芍 五钱

【化验结果】 治疗前血色素36%，红血球195万/mm，白血球1400/mm。治疗后血色素50%，红血球311万/mm，白血球2800/mm。

湛江市人民医院

治疗阴毒斑病（类似紫斑出血）方、

中医使用升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒，经治疗阴毒斑病五例，全部治愈。

典型病例：叶××，女性，30余岁。患阴毒斑病（紫斑出血）脉象代伏，遍身紫斑，瘀黑色，鼻口齿及下阴均出血，身腰均痛，经诊断，按“金匱要略”认为阴毒，拟用升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒加减法治疗。

第一方： 升 麻 一钱 当 归 一两 炙甘草 三钱 炒鳖甲 六钱

服后口齿鼻血均止，惟下阴仍有少许出血，斑已减退大半，能坐起。

第二方： 升 麻一錢 当 归一两 炙甘草三錢 蟄 甲四錢
服后血全止，斑全收，只存斑痕。

第三方： 升 麻一錢 当 归一两 炙甘草三錢 炒蟄甲三錢

第四方： 照前方再服一剂。

广东省人民医院

第四部分 消化系病

一、肠痈（阑尾炎）

治疗阑尾炎方

我院治疗阑尾炎十九例全部痊愈，所用方剂如下：

【处方】 白芍四钱 当归四钱 川楝子四钱 冬瓜仁一两
忍冬四钱 延胡索四钱 生薏米一两 桃仁四钱
五灵脂五钱 丹皮四钱 半夏三钱 郁金三钱
鸡内金八钱 等药加减。

【服法】 清水煎，分二次服。服药后患者反应良好，十九例均无副作用，治疗二至三天后，体温下降至正常，白血球和中性球均剧减至正常，自觉症状及体检阳性症亦逐渐消失，出院时已痊愈。

病例治疗前后分析表

姓名: 謝 × ×		性別: 女	年齡: 23	診斷: 急性 闌 尾 炎	
症 狀			体 檢		
治 疗 前		治疗后	治 疗 前		治疗后
腹 痛	右下腹部持續性16小时	⊖	体 溫	37.8°C	36.5°C
惡心嘔吐	惡 性	⊖	腹肌紧张	过 敏	⊖
胃 納	減 退	佳	压 痛	麦氏点++	⊖
寒 热	畏 寒 感	⊖	回 跳 痛	⊖	⊖
大 便	正 常	正常			

广州市第二人民医院

治疗闌尾炎驗方

1. 紅藤湯治疗急性闌尾炎。

先后共接受治疗三例，其中二例已痊愈出院，一例尚留院治疗中，一般情况良好，病人亦要求出院。疗程：一例四天，一例十天，一例七天。处方如下：

紅 藤三錢 金銀花四錢 郁李仁三錢 冬瓜仁五錢
皂角刺二錢 菖 蒲四錢

若高热口渴加石膏一两、知母四錢。

2. 大黃牡丹皮湯合附子薏米敗醬散加減治疗慢性闌尾炎。

先后接受治疗二例，一例治愈出院，一例尚在院治疗中，但病情已好轉。疗程：一例六天，一例八天。处方如下：

大 黃三錢 牛 膝四錢 冬瓜仁五錢 丹 皮五錢

桃 仁 三錢 元明粉 二錢 赤小豆 五錢 归 尾 四錢
敗醬草 五錢 薏苡仁 四錢 附 子 三錢

广州 邮电医院

治闌尾炎驗方

我院中医师梁剑波，用加味薏苡散，大黃牡丹皮湯，治疗十五例闌尾炎，均获痊愈，其中一例系肇庆市草鞋街居民，65岁，妇人，患闌尾炎穿孔，合并腹膜炎，即用加味薏苡散治疗，七天症状消失，十二天基本痊愈。

【处方】 加味薏苡散：

薏苡仁 五錢 瓜 蒌 仁 三錢 丹 皮 二錢 桃 仁 一錢
延胡索 三錢 蒲公英 三錢 当 归 錢半 青木香 二錢
金銀花 七錢 清水煎服。

【处方】 加味大黃牡丹皮湯：

大 黃 三錢 牡丹皮 三錢 芥 子 錢半 桃 仁 一錢
金鈴子 三錢 佩 兰 錢半 金銀花 五錢 清水煎服。

高要县人民医院

治闌尾炎驗方

【外用草藥】 灯籠草 二錢 骨苦棟 二錢 捶烂和白酒貼局部。

【內服处方】 白 芍 二錢 青 皮 二錢 枳 壳 錢半

麦 芽 三錢 川厚朴 錢半 火麻仁 四錢 胡 麻 三錢
泽 泻 二錢半

【病例】 张××，男性。曾患闌尾炎經西医診治无效，认为需

要开刀，后服此药数日痊愈。

汕头公园联合诊所第二门诊部 潘光辉

草药治阑尾炎

【处方】 金香芦 五钱 千斤拔 五钱 山芝麻 六钱 白立头 六钱
金不换 六钱 铁包金 四钱 鸡骨香 五钱 凤凰鸡 五钱
净水三碗煎至一碗。

【病例】 馮×，女性，39岁。在1955年12月30日患急性阑尾炎，经服药三剂，便得痊愈，现在没有复发。

中山万顷沙人民医院 杨 球

治疗阑尾炎方

【病例分析】 计急性阑尾炎九例，慢性阑尾炎四例，阑尾周围脓肿三例，一般服药一次后疼痛减轻，二、三天后压痛不明显，平均痊愈时间六至七天。

【处方】 1. 大黄牡丹皮汤。
2. 薏苡附子败酱散。

上面处方分量按病情加减或交替使用。

东莞县人民医院

治阑尾炎方

【处方】 冬瓜仁 八钱 薏苡仁 八钱 桃 仁 五钱 丹 皮 四钱
忍 冬 五钱 川楝子 三钱 白 芍 五钱 五灵脂 八钱

郁金四錢 延胡索五錢 芦根八錢 川黃連一錢
竹葉四錢 連翹四錢 青蒿三錢 蘇葉錢半
上藥看病情加減出入。

【病例】 陆×，男性，49岁。于1958年10月24日入院，經西医診斷为急性闌尾炎穿孔，脓肿形成，服中藥九剂，痊愈出院。

广州市第二人民医院 梁具天

二、腹瀉及消化性潰瘍

炒米治腹瀉

【处方】 大 米

【制法及用法】 將大米磨成粉炒成焦样，成年人每天服三次，每次5—10克。

【疗效】 此土方法在鶴地水庫普遍使用，因当时該水庫缺乏磺胺咪和次炭酸鉍，后用炒米粉代替这两种藥，治疗腹瀉病七百多例，治愈六百多例。

湛江专区

治腹瀉藥——黑口草

【处方】 黑口草

【形状】 黑口草是一种野生植物，生长在田边，花白色，將其茎折断，折口很快便成黑色，故称黑口草。

【适应范围】 作用是收斂、杀菌，对阿米巴原虫也有作用。一般

治疗急性胃肠炎腹泻见效快，曾治疗三十多例腹泻病人，每人服二次黑口草已经止泻，其中一例因患阿米巴痢下泻，次数也减少。廉江新生石灰厂有二百多人患急性胃肠炎（医院确诊），其中一百七十五人服黑口草二次，症状消失显著。

【用法】 将生黑口草 65 克用冷开水洗净磨烂，压榨汁液 100 毫升开水冲服（可以加砂糖调味），分二次服，药渣可煲水后再榨取汁液加入原来汁液内，加强药力（成人量）。若不压榨汁亦可取生黑口草一斤，加水二斤煮沸十至十五分钟后过滤，每次服 60 毫升，连服二、三次。此药无副作用。

廉江新生石灰厂 吳单富

治疗急性肠胃炎方

【处方】 果合树叶

【用量】 多少均可。

【用法】 取叶煎水服，或用口嚼烂用开水送服亦可。

【疗效】 黄××等数人患腹泻呕吐，以致精神萎靡，眼目深陷，声音低微，语言不清，呈失水现象，经用上药服治而愈。

清远 黄锦秀

香砂六君子汤治顽固性消化性溃疡

【处方】 木香三钱 砂仁三钱 党参四钱 茯苓五钱
甘草四钱 白朮五钱 陈皮三钱 半夏三钱
厚朴三钱 白芍四钱 海螵蛸四钱 乌药四钱
水煎服，分量随症状加减。

我院选择三个病例，經胃液分析检查及 x 光鋇餐証实。其中二例經各种西药治疗无效，持續疼痛，长期入疗养院休养，均无好轉。用香砂六君子湯加減，治疗約二十至三十天，每天一剂，症状完全消失，x 光鋇餐复查，暗影已看不见。另一例虽症状完全消失，后三个月复发，但疼痛程度和次数比前較輕。

广州 邮电医院

三、肠 梗 阻

治肠梗阻驗方

【处方】 枳 壳 錢半 天花粉 三錢 陈 皮 一錢 川 芎 一錢
川貝母 錢半 京半夏 錢半 甘 草 五分 津桔梗 一錢
胆南星 一錢 归 身 三錢 茯 苓 三錢 香 附 錢半
菖 蒲 一錢 海 藻 二錢 黄 芩 二錢 灯心草 五个
生 姜 三片 防 党 三錢

【疗效】 我院中西医配合治疗了四例肠梗阻（一例粘連性，三例蛔虫性），以中医治疗为主，必要时西医配合胃肠减压、肛管排气、灌肠、腰封。

【說明】 中医理論認為宿食滯肠或病中胃腸虛不能运化，所食之物停滯肠中形成，燥糞作祟及阴阳失度而形成的。宜用通气散坚法。

茂名县人民医院

新訂寬暢飲治療腸阻塞症

【處方】 萊菔子 五錢 山 楂 六錢 枳 殼 三錢 鷄內金 四錢
陳 皮 二錢 五穀虫 四錢 廣木香(后下) 二錢
川厚朴 三錢

如是蛔虫阻塞，加使君子四錢、尖檳榔六錢。

【主治】 腸阻塞，忽然腹部劇痛，陣發性作嘔，大便秘，按腹部有索狀硬團。

【療效】 近年來此方在樂昌城鎮衛生所應用，有典型腸阻塞病人，即用此方治療，無論糞阻塞或腸阻塞，均于服藥二、三劑后，即解除症狀，計治愈有二十例。

樂昌城鎮衛生所 謝國豪

四、肝 胆 病

治療晚期肝硬化方

我院治療晚期肝硬化，自1955年至1958年，共三十七例，有效的二十六例。

三十七例晚期肝硬化療效統計表

療 效	治 愈	著 效	無 變 化	死 亡
病 例	3	23	5	6
%	8	63	13	16

【治愈标准】 黄疸及腹水消失，小便通利，肝区无胀痛，或肝功能基本正常。

【治法】 舒肝、实脾、顺气、调血、散结、软坚。

【处方】 丹参五钱 三棱钱半 莪朮钱半 鳖甲七钱
牡蛎七钱 茯苓六钱 郁金三钱 甘草一钱
白芍三钱 赤芍二钱 金钱草一两 绵茵陈六钱
鸡骨草八钱

【加减法】 肠胃积热加川黄连三钱、白头翁三钱；积滞加麦芽四钱、山楂三钱、鸡内金三钱；鼻衄牙龈出血加仙鹤草四钱、茅根四钱、生地黄四钱；失眠加五味子三钱、熟枣仁四钱；尿少加木通三钱、猪苓三钱、泽泻三钱、薏苡仁四钱；气虚加党参五钱；血虚加何首乌七钱、熟地黄五钱；肾虚加菟丝子五钱、山萸肉四钱。

广东省中医院

治愈肝硬化方

【处方】 猪苓四钱 云茯苓五钱 白朮五钱 木通四钱
泽泻四钱 腹皮四钱 车前四钱 海金沙四钱

【处方】 猪苓四钱 云茯苓五钱 肉桂七分 干姜二钱
泽泻四钱 白朮五钱

【处方】 干姜八钱 赤茯苓四钱 川芎三钱 豆蔻三钱
莪朮二钱 桔梗三钱 肉桂七分

【处方】 大戟三钱 芫花三钱 葶藶三钱 甘遂三钱
藜蘆二钱 桑白皮二钱 连翘三钱 赤小豆三钱
巴豆(去油)二钱

上藥为末每服三錢，土茯苓湯送下，禁吃盐。

藥量根据病情輕重加減。

【病例】 区××，男性，30岁。腹胀黄疸，入院診斷为肝硬化，
西医处理用維生素酵母，葡萄糖汞类利尿剂，抗菌素及腹
腔穿刺九次，治疗三月余无进步，后轉中医治疗，經服藥
多次后腹胀消退，食欲良好，在家疗养一个月痊愈。

广州市工人医院

治黄疸肝硬化驗方

【处方】 猪 苓 四錢 泽 泻 三錢 綿茵陈 六錢 茯 苓 六錢
厚 朴 二錢 草 果 二錢 藿 香 二錢 莪 朮 三錢
川棟子 三錢 桂 枝 四錢 枳 壳 錢半 青 皮 二錢
香 附 三錢 芍 药 三錢 等加減。五服后，腹胀略
消，胃口轉佳，惟間有惡寒。

【处方】 用茵陈五苓散加：

附 子 五錢 当 归 四錢 白 朮 四錢 厚 朴 二錢
桂 枝 四錢 草 果 二錢 白 芍 三錢 等加減。三
服后精神增，胃納健，小便清长，但大便硬而干澀。

【处方】 复用前藥減去燥湿、利水品，加：

归 身 四錢 白 芍 三錢 郁李仁 三錢 火麻仁 四錢
生麦芽 五錢 鸡骨草 五錢 防 党 五錢 等加減。三
服后大便正常，精神更佳，腹胀消八九，肝脾尚胀大。

【处方】 前藥中再加：

莪 朮 三錢 柴 胡 三錢 蟹 甲 五錢 牡 蠣 六錢
穿山甲 五錢 延胡索 三錢 枳 壳 錢半 鸡骨草 五錢

上药加减，十三服后，腹胀全消，肝脾仅可扪及（入院时肝大三横指，脾一横指），体重增加，经检查黄疸指数减低，红血球由入院时100万增至300万，黄疸已无明显象征，病者遂出院。

广州市第二人民医院中医科

治疗肝硬化方

【处方】 丹 参 三钱 白 朮 三钱 泽 泻 三钱 商 陆 三钱
云茯苓 七钱 黑梔子 二钱 鳖 甲 五钱 绵茵陈 四钱
木 香 钱半 腹 皮 四钱 归 片 二钱 阿 胶 二钱
三 棱 三钱 白 芍 四钱 陈 皮 钱半 川厚朴 钱半
黑 丑 四钱 甘 遂 二钱 桃 仁 二钱 琥 珀 四钱
上药按病情加减出入。

【病例】 “肝硬化”目前还是比较难治的一种慢性疾病。本院采用中药治疗，获得良好效果。

例一，治疗一个半月：腹部肿大如蛙，完全消失。

例二，治疗一周后腹水减退。

例三，脾肿大，硬突过脐，且腹大如箕，采用散瘀软坚利尿法，有所好转。

湛江人民医院

治疗肝硬化验方

民间中药验方黄豆蒜头治疗肝硬化腹水二例。一例痊愈，一例显著进步，现仍继续治疗。二例病人是经县人民医院及梧州工

入医院，检查証明为肝硬化，而又是屡医无效的病例。

【处方】 黄 豆四两 蒜 头五两

慢火煮約四小时，不加油盐，空腹服食。

德封县长岡卫生院 司徒 劍雄

柴胡鳖甲湯治肝硬化

肝硬化中医称为单腹胀，过去认为难治之症，我在治疗鉄场叶××等二例，均用柴胡鳖甲湯加減，各服二三十剂，症状消失，后經了解没有一个复发。

【处方】 柴 胡三錢 鳖 甲三錢 腹 皮三錢 当 归三錢
青 皮錢半 三 棱三錢 蒼 朮三錢 芥 子一錢
北 芪五錢 茯 苓三錢 扁 豆四錢 炙甘草錢半
厚 朴錢半 桂 枝錢半 何首烏五錢 春 砂錢半
陈 皮錢半

【适应症】 腹胀臌肿，青筋显露，小便短，左脉数。

【禁忌】 忌食盐。

龙川 謝作材

鸡骨茵陈湯治黄疸

【处方】 鸡骨草一两 土茵陈四錢 柴 胡四錢 黄皮核三錢
郁 金四錢 火炭星八錢 糖香櫟片三錢 山梔子二錢
水煎服。

【病例】 李××，男性，22岁。初起微寒发热，漸則皮肤及二目巩膜发黄，精神疲乏，右肋疼痛，服本方十剂后，全身

症狀消失。

廣州中醫學院 杜明昭

治胆石病方

【病例】 陈××，青年学生。患胆石病，經西医院摘除了胆囊，两年后又复发，胆管絞痛，停学一年返回原医院治疗未效，发作頻頻，疑是胆管結石，打算再开腹检查，但后經我院教师用內服葯治疗，服下方加減十多剂后，痊愈复学。

【处方】 川郁金 四錢 柴 胡 三錢 桃 仁 二錢 蒲 黃 一錢
白 芍 四錢 五灵脂 四錢 归 尾 二錢 綿茵陈 八錢
枳 壳 三錢

廣州中醫學院

第五部分 神經系病

一、神經官能病

补阳还五湯治疗截瘫偏瘫

【处方】 黄 芪四两 归 尾三錢 赤 芍二錢 地 龙二錢
川 芎錢半 桃 仁錢半 紅 花錢半

【疗效】 此方治截瘫偏瘫疗效很高，对中风后遺症、小儿麻痹症后遺症等均有效。

【病例】 曾××，女性，26岁。截瘫症，入医院診斷为小儿麻痹症，治疗无效。两腿瘫痪，肌肉痿縮，不能行走，月經停止，經服上方，仅一剂月經恢复，半月多即能慢步行走、上下楼梯。

广州中医学院 邓铁涛

治神經官能病方

【处方】 北 芪八錢 桂 枝三錢 白 芍四錢 地 龙三錢
当 归四錢 党 参三錢 炙甘草二錢 菖 蒲二錢

全 蝎三錢 白花蛇五錢 川郁金三錢 茯 苓四錢
柴 胡三錢 等加減成方。

【疗效】 朱××，男性，32岁。患严重神經官能病，记忆力极差，精神不能集中，失去閱讀能力，睡眠时身体动摇，如在舟中，每夜睡眠不足五小时，性机能消失，右肩鈍痛，触觉存在，但溫觉、痛觉消失，胸翳如繩縛，病已三年，歷經东北、北京、广州等地医院治疗未效。經我院教师治疗痊愈，性机能恢复，睡眠达九小时，可讀报一、二小时。

广州中医学院

二、癲、癩、狂

癲狂症方

【处方】 品有子（大号墙帮子）配犀角地黄湯加郁金、川貝母。继用礞石滾痰丸，輪服。

【用法】 取品有子根煲水，将葯水晚上放于露天吸露（冬季經七天、春季三天）。

日量二两，分二至三次服完。

【疗效】 曾治十三例均痊愈。

广州中医学院进修部 江世英

治疗神經病方

【处方】 生 地 六錢 当 归 五錢 桃 仁 三錢 紅 花 二錢
香 附 三錢 炙甘草 三錢 烏 枣 五个 小 麦 四錢
火盛加川黃連、朱砂各二錢。

大便少加大黃四錢。

【疗效】 用此方配合針灸治疗十六例，如林××，男 性，22 岁。患精神失常症，每年发作，連有二年，經服此药五剂及針灸內关、手三里、水沟、合谷、少商等穴，經七天而愈。

徐聞县人民医院 黃庭益

三、痛 症

治偏头痛驗方

【处方】 川 芎 二錢 僵 蚕 錢半 杭 菊 四錢 蔓荆子 二錢
白 芷 二錢 石 膏 三錢 吳茱萸 五分至錢半
偏左加青皮錢半，偏右加桔梗三錢，水煎服。

連平 叶映初

第六部分 泌尿系病

一、腎 結 石

治腎結石方

【处方】 生 地 六錢 木 通 五錢 車 前 八錢 黃 柏 四錢
丹 皮 四錢 知 母 四錢 沙 牛（为末冲服）五分

【疗效】 张××，男性，31岁。主訴：小便刺痛，每日五至六次，色淡紅，右側腰痛。曾用西药治疗无效。尿液检查：蛋白+，上皮細胞+，紅血球++++，經服中藥后，小便排出沙石一粒，大如黃豆，菱形。二剂痊愈。

广州市第二人民医院

治腎結石方

本院中医科治疗腎結石二十例，服藥后，腎石能排出，疼痛、血尿同时消失。

以下处方是我們在临床上获得良好效果的。

【处方】 血 珀 一錢 金錢草 六錢 大 枣 六錢 归 尾 三錢

冬葵子四錢 生地四錢 錦軍二錢 木通四錢

沉香(后下)一錢

【服法】 水三碗煎至一碗，溫服，每天一劑，復渣煎服一次。約服一至三星期，腎石自然排出。若有血尿加蒲黃炭三錢、牛膝三錢。

【处方】 滑石六錢 冬葵子四錢 桑椹子三錢 歸尾六錢
煨棟子三錢 血珀七分 沉香(后下)錢半
金錢草一兩

【典型病例】 廖××，男性，27岁。于1957年12月底发觉尿血。1958年5月10日又觉腰有微痛，完全血尿。于8月中旬到中医科門診，服中藥治疗，于8月底排出腎石二个。

診斷为腎結石，用x光检查，发觉左腹部第三腰椎橫突出处有一約0.1×0.3cm之高度密影造影，后上述密影在左輸尿管中。

中山医学院

中藥能使腎石排出

【处方】 大茴香錢半 小茴香錢半 金錢草六錢 篇蓄一兩
錦軍(后下)五錢

【服法】 三碗水煎至一碗。另嘱病者在家煎黃豆卷湯作飲食以爲輔助。

【疗效】 曾治疗六例，全部治愈。治愈者，有石排出为据。有一患者經x光检查証实为腎結石，患者左腰疼痛，牽連腹痛如刺，轉側不安，曾經西医治疗未效，用上方治愈。

高維博

二、乳 糜 尿

治疗乳糜尿方

【处方】 草 薢四錢 白 朮三錢 泽 泻四錢 归 尾四錢
甘 草一錢 土茯苓四錢

照上方服四剂，服完四剂后，小便較清，然后服下列
处方五剂。

【处方】 草 薢四錢 金錢草三錢 归 尾三錢 連 翹三錢
金銀花三錢 荊芥穗一錢 土茯苓四錢 黃 連二錢
白 朮二錢 甘 草一錢

服上方五剂后，小便即呈固定澄清，經观察共三周，
小便未发现乳白或混浊者，痊愈出院。

【病例】 黃××，女性，26岁。于1958年9月20日入院，入院
前二个月发现小便呈乳白色，有时呈块状，临床診斷为血
絲虫病合并乳糜尿，入院后即給予針灸治疗，小便无明显
改变，仍有乳白色，以后即改服上方而愈。

中山医学院第一附属医院

治乳糜尿方

【处方】 麦 冬四錢 天 冬四錢 生 地四錢 熟 地四錢
桑 螵 蛸四錢 石 韋一兩 杜 仲四錢

阿 胶(后下)四錢

龟 胶(后下)四錢

水煎服。

【病例】 陈××，男性，68岁。四十年来每至春夏季尿乳白尿，每发数月，时作时止，此次复发将一年，小便白色混有血液，呈粉红色，甚者如猪血色，且有裹以薄膜之块状物排出，间或阻塞不畅，要用力排出，食欲不振，精神疲倦，形体消瘦。本院诊断为乳糜尿，尿液检查酸性，蛋白++++，红细胞++++，治疗十天无效，转至中医科治疗，服中药十天而愈。如间中有咳嗽和消化不良等，则随症加减。主要以补肾育阴法，服至第九天，小便复查，蛋白及血球均已消失。

广州市第二人民医院

三、肾 炎

益母草治急慢性肾炎

本院林品生祖传三代研究治疗水肿病(包括急慢性肾炎)，在临床上取得了一些成绩。1956年起，开始着重研究，采用益母草治疗肾炎获得满意效果，病例分类如下。

十三例肾炎中，急性四例，慢性九例；男占八例，女占五例；其中小孩占七例。治疗结果列表如下：

病例分类	治 疗 人 数			治 疗 结 果		
	男	女	合 計	痊愈	显著进步	无效
慢性肾炎	5	4	9	4	4	1
急性肾炎	3	1	4	4	0	0

【益母草药理及功用】 辛甘微温无毒，主治消浮肿、下水、大小便不通、尿血、消恶毒、调经等。

【益母草的用法和制法】 用晒干益母草依量加水 500—800 毫升，煎至 200—300 毫升，去渣分四次温服。

年 龄	一 次 量	一 天 量	时 间	备 注
18—60岁	1 两	4 次	3 小时 1 次	成人每天量 可服至五两
10—17岁	8 錢	4 次	3 小时 1 次	
5—9岁	6 錢	4 次	3 小时 1 次	
1—4岁	4 錢	4 次	3 小时 1 次	

在治疗末期必须配合服“固守丸”，主要作用是以培元补土法使机体旺盛，增进血液循环，促进肾功能早期恢复。

【处方】 固守丸：

淮 山	四两	白 朮	四两	炒扁豆	四两	蓮子肉	四两
潞 党	二两	北 芪	二两	熟附子	二两	云茯苓	二两
熟 地	二两	芡 实	二两	杜 仲	二两	山萸肉	两半
归 身	两半	菟絲子	两半	砂 仁	五錢	陈 皮	五錢
肉 桂	四錢						

【制法】 共研末，以米糊为丸，如绿豆大。

用 量 表

年 齡	一 次 量	一 天 量	时 間
18—60岁	5錢	3次	6小时1次
10—17岁	1.5錢	3次	6小时1次
5—9岁	1.2錢	3次	6小时1次
1—4岁	1錢	3次	6小时1次

三水县中医院

中西医結合治疗急性腎脏炎危症

【病例】 林××，男性，15岁。患急性腎脏炎，面部浮腫，尿量少300—600毫升，体温中度热，检查N.P.N.76.5mg%，尿蛋白++++，白血球+，管型+。患者不省人事、乱言、煩躁、狂叫、抽搐日夜十四五次，舌苔灰黑干燥，中医认为溫毒內伏，火热攻心。

【处方】 犀角地黄湯加味：

犀 角三錢 大生地七錢 白 芍五錢 丹 皮三錢
 鉤 藤三錢 白 菊三錢 夏枯草三錢
 牛黃丸（冲服）半粒

另每四小时服牛黃丸三分，每日早晚各服藥一剂。

【次日处方】 犀 角三錢 丹 皮三錢 生 地八錢

白 芍四錢 玄 参五錢 車前子三錢 麦 冬五錢
 夏枯草三錢 石决明五錢 蜈 蚣三条 白 菊三錢
 全 蝎（去足）一錢 牛黃丸（冲服）三分

每日服二剂，另牛黄丸四小时服三分。服上药抽搐基本控制，但有时烦躁狂叫，乱言大闹，原则上依上药加减，每天早晚各服一剂。五天计服犀角二两四钱，安宫牛黄丸六个，患儿才得安宁，认识人；同时注射硫酸镁、青霉素，至此，方得转危为安。以上事实，证明我院中西医亲密合作，对疾病的治疗是很有利的。

海口市人民医院中医师 梁愉軒

用肾炎酒治慢性肾炎

我院采用肾炎酒治疗肾炎，经实验研究治疗三例，初步获得较显著的疗效，兹将初步经验小结如下：

（一）服药酒一个月，尿量日渐增加，全身头面浮肿全部消退，

（二）尿蛋白由++++减至+，红血球、血色素均有增加。

（三）肾功能有所改善，酚红试验接近正常，尿颗粒管型部分消失。

（四）全身症状消失或好转，营养改善，出院能恢复劳动生产。

（五）其中一例追踪检查一年无复发，二例有复发，但仍能劳动生产。

【处方】 鹰不朴（广东民间草药）一斤（切碎）

【制法】 先用双蒸酒一斤，和上药蒸熟，再加入好双蒸酒六斤，浸十五天即可服用。

【服法】 每日服二次，每次一至二两，饭后服用，以连服三十天为一疗程，必要时可服二疗程。

【反应】 飲后有腹鳴，轉失气多及小便多。

【配用藥】 如貧血体弱，可隔日进归脾湯一剂，收效更速。

广州中医学院

治慢性腎炎水肿方

本院中医治疗慢性腎炎水肿三十例，疗程最长为半年，最短仅十余天，二个多月痊愈者占大多数，疗效显著。

【处方】 1.大黃丸(大黃末用猪胆汁煮沸加适量蜜糖为小丸)。

2.知柏八味丸，用西瓜汁吞服。

3.西瓜灰散，用西瓜汁送服。

4.土茯苓生地煲猪瘦肉，溫服。

广州市第二人民医院

治疗慢性腎炎經驗

1.治疗原則及采用方剂：按病情与水肿程度可分为三个阶段：第一阶段以利水、渗湿、发汗、泻下法。方用五苓散、五皮飲、麻黃附子細辛湯、实脾飲等治疗。第二阶段以利水、渗湿、降气、溫补兼施法。方用真武湯、实脾飲治疗。第三阶段以溫补方法。方用附桂理中湯、金匱腎气丸湯治疗。

2.疗效：在治疗十七例中，有消肿效果的占十六例，全部消肿的占十例，小便蛋白减少的占十一例，酚紅排泄进步的占十二例，血清蛋白升高的占十二例，非蛋白氮进步的占十五例。

广东省人民医院 卢宗强、陈治平、譚新洪

治疗慢性肾炎方

本院由1957年9月至1958年10月用中医治疗肾炎十七例。治愈十四例，死亡三例。死亡三例中，一例为合并败血症，二例为合并尿毒症。

【治愈标准】 1.水肿完全消失，自觉症状消失。2.血压下降至正常，红血球及血色素增加。3.肾功能增进。

【治疗原则】 补脾养血，温中利尿，增强体力，促进生理机能恢复。

【采用方剂】 浮肿期：五皮饮及当归补血汤合剂、消水丹、十枣丸、茯苓导水汤。

补脾利水：五苓散、实脾饮、防己黄芪汤、防己茯苓汤、粟米须。

补肾强心利水：金匮肾气丸、桂苓龙甘汤加减、复脉汤加减。

【病例】 龙×，女性，26岁，工人，已婚。于1958年2月25日入院。主诉：咳嗽气促，全身浮肿，尿闭五天。病员曾于1957年12月21日因慢性肾炎、妊娠及水疱性皮炎，入本院内科医治，经用葡萄糖，维生素乙、丙，胺茶碱，可待因，寿比南，铈剂，甲状腺丸等药治疗后，尚余二下肢有轻度水肿及有些咳嗽，而在1958年2月10日出院。后因水肿增加，咳嗽气促等症状加重，头痛，食后呕吐等急诊入院。

体检：体温36.7°C，脉搏100次/分，呼吸35次/分，发育中等，营养欠佳，急性病容，神清合作，面目浮肿苍白，呼吸促，唇及两手指甲轻度发绀，二眼结合膜苍白，球结

合膜下有出血現象，二上下眼瞼及皮膚有溢血斑；胸部皮膚有中等度水腫，心界向左擴大并上揚于第四肋間，心尖部有第二度收縮期吹風樣雜音，腹壁軟有波動感及移動性濁音（輕度），肝在肋下約2厘米，劍突下4厘米，軟無壓痛，子宮底臍下二橫指，四肢均有輕重度水腫。

化驗檢查：紅血球208萬，血色素5克，白血球3500，中性多型核65%，淋巴球34%，小便比重1.005，蛋白+，管型±，白血球+，總蛋白6.01（A/G3.8/2.21=1.7/1），總膽固醇400；胸部透視，心部符合貧血性心臟改變，血壓136/92mmHg。

治療經過：用五皮飲加當歸補血湯加減：十二太保片，鹽酸硫胺肌肉注射。服藥次日尿量增加，十日後水腫基本消退，其餘症狀減輕。

出院情況：浮腫現象完全消失，無咳嗽，食欲增加，心臟無改變，肝臟未觸及，無腹水征，下肢無水腫，小便檢查蛋白±，白血球+，管型±，血壓100/70mmHg。

診斷：①慢性腎炎。

②貧血性心臟病。

③妊娠四月。

廣州市第一人民醫院

治療慢性腎炎方

1955年1月至1958年6月，我院治療慢性腎炎一百二十二例，功效卓著。

【痊癒標準】 水腫消失，活動後無水腫出現，一切臨床症狀消

失，恢复工作能力，小便检查完全正常，肾功能正常，血象及血生化检查正常。

【有效标准】 水肿消失，临床症状消失，可以恢复工作，但小便检查蛋白13—11之間，肾功能有改善，血象及生化检查有进步。

【无变化标准】 临床症状有改善，水肿时肿时消，入院出院肾功能检查无变化，血象及生化检查无进步。

【治疗过程】 第一阶段治法以平补气血，健脾导滞，利水除湿为主。

【处方】 茯苓一两 猪苓五钱 泽泻五钱 何首乌五钱
法半夏四钱 党参六钱 当归六钱 厚朴三钱

【疗效】 服上方三天后显著利水，小便由每天平均800毫升增至1800毫升，十六天，体重由100斤降到96斤。

第二阶段治法以大补气血，健脾轻利为主。

【处方】 党参六钱 当归六钱 北芪六钱 何首乌六钱
茯苓六钱 白朮四钱 法半夏三钱 厚朴三钱
泽泻五钱

第三阶段治法以固肾育阴为主，根据病情，辨证论治。

【营养】 在整个治疗过程中，只要病人胃口良好，则要供给高蛋白每公斤体重1.2—1.5克为合适，同时注意碳水化物的供给，在水肿消退后可给以低盐饮食。

【处方】 冬虫草三钱 当归三钱 何首乌四钱 熟地四钱
茯苓六钱 北芪六钱 山萸肉五钱 党参六钱
菟丝子五钱 龙眼肉一钱 杞子一钱
以上药燉羊肉或猪瘦肉五两服食。

一百二十二例疗效分析表

疗 效	痊 愈	有 效	无 变 化	死 亡	合 計
病 例	17	77	18	10	122
比 率	14%	63%	14%	9%	100%

广东省中医院

治肾炎水肿有效方

我院內科室用中藥治疗肾炎水肿病十一例，均迅速消肿而获痊愈。

高要人民医院陈彰就副院长，亦用該方治疗六例小儿肾炎水肿，均获痊愈。

【处方】 泽 泻四錢 茯 苓五錢 白 芍五錢 枳 壳四錢
法半夏四錢 厚 朴三錢 猪 苓三錢 陈 皮二錢
甘 草三錢 水煎服。藥量随症状加減运用。

江門专区第一人民医院

加味五皮飲治疗慢性肾炎水肿

【处方】 桂 枝三錢 猪 苓三錢 白 朮三錢 泽 泻二錢
茯 苓三錢 炒扁豆四錢 炒薏仁四錢 北 芪五錢
赤小豆四錢 腹 皮三錢 陈 皮二錢

1.上藥是成人量。2.小儿酌減。3.溫服，忌食盐。

【疗效】 曾治愈二十二个病例。

龙川 謝作材

治疗脾虚肿胀方

我于1958年第三季度治疗脾虚肿胀十六例，治愈十一例，效果良好。

【处方】 丁香二钱 豆蔻二钱 党参四钱 白朮五钱
干姜三钱 炙甘草二钱 椒目四钱 巴戟一两

【服法】 清水三碗煎至一碗，一般连服十余剂可痊愈。

番禺 黎萃生

治疗肾炎水肿效方

我院治疗八例肾性水肿，有高血压的五例，消失三例；水肿的八例，消失五例；蛋白尿的七例，消失五例。八例中痊愈二例。

【处方】 郁李仁五钱 甘遂五钱 檳榔一两 白朮一两
茯神钱半 黑丑七钱 陈皮七钱
上药共研末，和米粉为丸，姜汤送服。

【处方】 黑丑二两 甘遂一两 沉香七钱 血珀七钱
共研末和蜜为丸，每服一钱。

【处方】 葶藶、薤白根各二两，共研末和蜜为丸，每服一钱。

【处方】 桂心五钱 当归一两 云茯苓一两 泽泻一两
台乌一两 檳榔一两 瞿麦一两
共研末和蜜为丸，每服一钱。

中山医学院

葫芦茶消退慢性肾炎水肿

【处方】 葫芦茶

【病例】 萧××，女性，23岁。两年前始觉头晕发热，全身酸痛无力，约经两个月后脸肿，渐至全身各处均浮肿，腹部日见膨胀，小便短少。曾经中西医治疗，浮肿时消时肿，于1958年3月中入院，诊断为慢性肾炎。入院后按一般肾炎情况处理，第四天开始服用中药葫芦茶，每天二次，每次一两，加水煎一小时后服，服后小便量由原来每天600—700毫升增加到1400毫升，以后每天输出量超过输入量，共服葫芦茶十一天浮肿完全消退，住院十五天后出院。

【疗效】 曾用葫芦茶治疗五十四例，浮肿消退者三十七例，症状减轻者八例，无明显改变者七例，无效者二例。葫芦茶的优点：1.虽长期服用亦无副作用；2.价格便宜，大部分病员可在家服食。

广州市第三人民医院

木瓜赤石脂汤治肾脏炎水肿

【病例】 张××，男性，62岁。于1956年患两足水肿，目窝浮肿，小便不利，每日小便十余次，有尿意频数之感，举步蹒跚，不良于行。诊得其尺部肾脉沉弦，肺气上逆而喘不得息，此肾水上凌心肺，脾阳不宣，失其健运之常，以致三焦水道失职，水气泛滥，宜用健脾导水之剂为治，投与陈

伯坛师創制“木瓜赤石脂重湯煎”，每日一服，不十日而全症消失。余依方曾治疗此种足肿症不下十余人。

【处方】 大木瓜(俗名番芒果)一枚重二斤，赤石脂四两研末。

【制法】 将木瓜上部切去四分之一为盖，再将木瓜除去内核及瓢一半，放赤石脂入木瓜中隔水用瓦鉢盛之，将木瓜燉透取赤石脂和汁尽量服之。

广州中医学院 程祖培

四、膀胱結石

治膀胱結石方

【处方】 川芎 蘇 五錢 石菖蒲 錢半 甘 草 二錢 烏 藥 錢半
滑 石 五錢 車 前 三錢 篇 蓄 三錢 瞿 麥 三錢
梔 子 五錢 赤 芍 三錢 茯 苓 五錢 綿茵陳 三錢
清水煎，空腹服。

【疗效】 1956年我在县人民医院門診部工作时，有一病人患膀胱結石，几天不小便，腹胀如鼓，經西医处理无效，后轉中医治疗，服藥后，便排出結石，小便暢通。

海南儋县三都卫生院 吳荣尧

治膀胱結石方

【处方】 海金砂 八錢 生甘草 三錢 北紫草 錢半 連 翹 五錢

梔 子三錢 金銀花五錢 通 草五錢 黃 芩三錢

北 鈴 羊（燉水沖服）一錢

【服法】 分四次服，二小時一次。

【病例】 梁××，男性，22歲。小便困難，莖痛。診斷為膀胱結石。服此藥一劑，屢出結石一個即愈。

梅縣衛生所

五、糖 尿

水芹菜治療糖尿病

本院根據民間經驗，用水芹菜治糖尿病二例，均獲得顯著效果。

【劑量及用法】 水芹菜12.5克，加水作煎劑內服，每日一次。

【病例】 潘××，女性，36歲，農民。因頻渴、多尿、易飢，多年病狀嚴重，診斷為糖尿病，入院當時檢查血糖為908.8毫克%，尿糖+++，尿比重為1.046，用飲食療法按體重每日給予1109卡，經三星期後，血糖降至285.6毫克%以後不再下降，但患者為農民，從事體力勞動，低熱後不能解決以後的勞動問題，遂改用水芹菜治療，在治療期間，每三天檢查血糖一次。同時並按周增加其食米量，計用水芹菜治療三十五天，食米量從最初的每天85.5克（不足三兩）增加到360克（約十二兩），患者糖尿仍維持在300毫克%以下，最低曾降至252.2毫克%（當時食米量為十兩），以後因找不到水芹

菜而停服，患者食量不变，但血糖于一星期后又回复增至322毫克%以上。

广州市第三人民医院

六、其 他

糯稻根治疗血尿症

本院内科，采用民间秘方糯稻根（即糯米稻子的根）治疗血尿症三例，效果显著。每日用量一至三两。

病例	血尿原因	血尿持续时间	过去曾用药物	糯稻根治疗效果
第一例	特发性	6个月	各种止血剂及输血等无效	数次后血尿消失
第二例	特发性	2个月	各种止血剂无效	次日血尿消失
第三例	血丝虫	1个月	各种止血剂及海狗肾生果无效	3日后小便在显微镜下无血球

广州市第一人民医院

中西医合作治疗尿毒症

【中医处方】 西洋参（另煎）六钱 石决明（先煎）一两

半地黃八錢 茯苓八錢 白芍五錢 甘草四錢
丹皮四錢 牛膝七錢 郁金四錢 黃芩四錢
竹茹六錢 龍骨(先煎)八錢 何首烏六錢
水煎服。

【西法合作】 輸液糾正酸鹼平衡和電解物平衡，少量輸血和吸
氧。

【中醫善後處方】 石柱參四錢 當歸六錢 茨實八錢
茯苓八錢 澤瀉六錢 何首烏八錢 熟地黃八錢
冬蟲草五錢 厚朴二錢 鹿茸(另燉)五分
水煎服。

廣東省中醫院

夏枯草治愈泌尿系沙門氏菌病

中藥夏枯草經實驗室研究結果，有抗菌作用，國內文獻已有
報告。我院在臨床上試用于沙門氏菌病感染者，慢性腸炎及急性
泌尿系感染，有一定效果，其中有一例泌尿系感染，經氯霉素、
鏈霉素治療無效，而用夏枯草治愈，特介紹如下：

盧××，女性，醫務工作者。在本市某醫院生產，產後突然
發熱，腰痛，小便困難，下腹部疼痛，輕度黃疸，小便培養發現
有沙門氏桿菌，經用鏈霉素注射及氯霉素內服無效，小便培養仍
有沙門氏桿菌，乃至我院治療，給予中藥夏枯草，每日三錢作煎
劑，分三次內服，共五天，症狀消失，治後，小便培養三次均為
陰性。

廣州市第三人民醫院內科

治疗尿閉症方

我院中医科治疗尿閉症四例，其中三例为磺胺中毒，一例为內痔，手术切除后引起尿閉，均經西医治疗无效，后用五苓散猪苓湯合剂，服藥后二至八小时，小便即告流畅而愈。

【处方】 猪 苓 三錢 茯 苓 三錢半 泽 泻 三錢半
白 朮 三錢半 桂 枝 三錢 滑 石 四錢
阿 胶 二錢半

湛江专区人民医院

补中益气湯治疝气症

【主治】 小肠疝气，腹股沟疝，小儿疝。

【处方】 加減补中益气湯：

柴 胡 一錢 升 麻 一錢 北 芪 三錢 白 朮 三錢
当 归 錢半 党 参 三錢 小 茴 一錢 川 椒 五分
荔 核 三錢 川棟子 錢半 附 子 一錢 炙甘草 一錢
肉 桂（后下） 三分

【疗效】 本人用“补中益气湯”加味治疗疝气六例，均获得显著效果。如謝×，2岁，服藥八剂痊愈，至今十年，不见复发。

龙川县人民医院 謝作材

薺菜治腎結核

薺菜治疗腎結核，分別在广东省人民医院和广州市第一、二

人民医院进行实验治疗，三年来通过三十六病例初步观察，效果良好，血尿症状很快消失。

【服法】 用鲜薺菜八两（或干的二两）加水三大碗，煎二十分钟后，放进鸡蛋一个（去壳拌匀）再煮五分钟，即可取服，蛋与湯同服尽，可加盐少许，每日二次，連服四个月为一疗程。

【典型病例】 周××，女性，22岁。1954年2月，因左肾结核性脓肾及右侧肾盂积水住院，后实行左肾切除，手术经过良好。同年10月又因高热及大量全血尿，尿频，尿痛一星期而第二次入院。入院后，呈休克状态，經补液輸血及抗结核药物的大量应用，休克略好转，但症状依旧，治疗三月之久未见效果，乃于1955年初开始利用薺菜治疗，二星期后高热渐退，血尿停止，其他排尿症状消失，一般体力情况大见好转，于10月基本痊愈出院。最近追踪，已完全恢复健康，正常工作。

广东省中医药研究委员会

第七部分 水湿、癭肿

一、甲状腺肿

治甲状腺肿驗方

【处方】 吊兰下垂根叶 三至五片 猪瘦肉 三两

【用法】 水三碗煎湯一碗，为成人每日一次量，一般連服一至二周。病期长的可停服一个时期再服。

【疗效說明】 1935年，我的爱人年20岁，患甲状腺肿半年，大如半边鸡卵，中西药无效。漸见心悸，走路气促，西医主张割治。时余在广东中医专校肄业，范叔仪师教以兰花（指盆栽剑兰墨兰的花）煲猪瘦肉服。当时草药店无兰花，以吊兰下垂根叶十片售予（叶全绿，无黄边的）。分三次服，肿消七、八，后再服兰花数次，肿全消，至今二十余年无复发。此后輒介绍患者服用，二十年来在百多病例中，一般病期在一年以内的，疗效显著。吊兰叶有黄边的，称为金边吊兰，功效似較逊。此药性寒，須与猪瘦肉数两同煲，如能加入猪鬃（甲状腺）或羊鬃十数枚同煲連鬃吃更佳。

广州中医学院 朱敬修

甲状腺肿（大颈泡）特效方

【处方】 陈 皮 二錢 夏枯草 二錢 青 盐 二錢 海 藻 三錢
昆 布 三錢 浙貝母 三錢 縮砂仁 錢半 甘 草 一兩
桔 梗 二錢 熟 地 三錢 玄 参 二錢 甘 松 一錢
云茯苓 三錢 海 帶 三錢 海螵蛸 二錢半
厚 朴 二錢半

【服法】 用清水四大碗，把上药与猪瘦肉二两，煎至一碗，二次分服，連服三剂痊愈。

【疗效】 用此方治疗十多人均获痊愈。全方共十六味，均属行气开郁清火化痰之品，尤妙在浙貝母、昆布、海藻、夏枯草、縮砂仁等药物，故能获得疗效。

韶关市卫生协会

二、风 湿

土法治疗关节炎

【处方】 望远鏡草（全草。又名蛇蝇草）七錢，臭馊粥米（又名过时粥）适量。

【用法】 上药共捶烂，晚上敷患肢转动关节处，翌晨取去，輕一服，重三服即愈。

【注意】 1.敷药处会起黑色水泡，用消毒针头刺穿自愈，但不

可洗生水，否則潰爛。

2.此藥有毒忌食，同時終身忌食花麥、木薯，否則會復發。

【療效】 共治療黃××等十一人，除一人中途停止治療外，均痊癒。

醫治頑固性風濕關節炎方

曾治療二例頑固性風濕關節炎患者，其中一例系石油鉗探技工，經中西醫、針灸治療，前後四個月均無效，快要殘廢，用下方治療，不足一月，便完全治癒，恢復工作。

【內服處方】 活絡丹，一日服二丸，早晚用酒沖服。

【內服處方】 大熟地 五錢 麻 黃 一錢 鹿角膠 三錢
白芥子 三錢 上肉桂 二錢 炮姜炭 二錢 杜 仲 三錢
牛 膝 錢半 追地風 三錢

【外用處方】 無名異 五錢 地骨皮 三錢 制乳香 錢半

制沒藥 錢半 麝 香 一分

共研細末用黃酒、金錢草汁各半，攪勻後敷患處。

治愈久年風濕症驗方

【處方】 熟石膏 一兩 地骨皮 四錢 木 瓜 二錢 牛 膝 二錢
當 歸 二錢 川 芎 錢半 白 芍 二錢 熟 地 二錢
蘇 花 錢半 連 翹 二錢 枳 實 錢半 走馬胎 錢半
金不換 三錢 生甘草 錢半
水二碗煎至八分，每天一劑，連服三劑。

【处方】 跌打风湿药丸：

蒼朮	四兩	羌活	五錢	制川烏	五錢	制草烏	五錢
川芎	五錢	當歸	一兩	金蟬	一兩	石斛	五錢
麻黃	五錢	防風	七錢	桑寄生	五錢	牛膝	七錢
秦艽	五錢	白芍	五錢	續斷	七錢	前胡	七錢
五加皮	七錢	骨碎補	七錢	刁竹	五錢	土鱉	五錢
杜仲	五錢	鈎藤	五錢	田七	三錢	僵蚕	五錢

共研細末，用蜜為丸，朱砂為衣，每粒一錢重，成人每日早晚服，每次二粒，童子每次服一粒，開水送服。

【处方】 燉雞藥方：

續斷	二錢	骨碎補	二錢	牛膝	三錢	木瓜	三錢
桂枝	二錢	走馬胎	三錢	鈎藤	錢半	刁竹	錢半
小狼樹根 一兩							

【制法】 雄雞一只重約八兩，去毛開腹去頭翅，腹內勿洗，將上各藥和小狼樹根一兩放入雞腹內，用綫縫好。

【服法】 水四碗煎沸後，將雞及藥放入沸水內，以緩火煎存一碗半，去渣，加米酒四兩，再煎沸連湯和雞內服。

【处方】 风湿藥酒方：

桑寄生	兩半	當歸	六錢	田七	三錢	鈎藤	四錢
獨活	六錢	川芎	四錢	秦艽	四錢	刁竹	三錢
杜仲	六錢	白芍	六錢	茯苓	三錢	木瓜	六錢
黨參	八錢	熟地	六錢	防風	四錢	甘草	三錢
金不換 一兩							

以上各藥浸米酒五斤，一星期後，每日早晚飯前飲一、二兩。

【病例】 楊××，63歲。十五年前患風濕，屢醫無效，腰痛足

痛不能行动，甚而臥床不起，經治疗先后用葯八次而愈。

汕头中医院 陈汉麟

三、水 肿

治腹水臌胀方

【病例】 陈××，女性，巫××，男性，皆患一年之久单腹臌胀，經過許多医生医治无效，后用下方治疗痊愈，迅速恢复健康。

【处方】 治陈××，女性：

半边蓮 三錢 金錢草 三錢 枳 实 三錢 陈 皮 三錢
北 芪 四錢 当 归 三錢 蒼 朮 四錢 川 芎 二錢
川厚朴 三錢 水煎服。服后再服归脾湯三剂。

【处方】 治巫××，男性：

枳 实 六錢 白 芍 八錢 大 黄 四錢 半边蓮 三錢
金錢草 三錢 水煎服。連服五天，每天一剂，后加重半
边蓮、金錢草二味，將原方去大黃，加神曲、麦芽、砂
仁，連服十天，最后將此方做成小丸，每天服五錢，
服半个月痊愈。

【禁忌】 在治疗中少食盐，或暫時完全不食盐。

【主治】 四肢不肿，单腹胀如鼓，面黃肌瘦，四肢无力。

翁源 刘琼瑤

生草藥治腹水方

- 【处方】 山薤菜三錢 煲水冲黃糖口服，服藥二小时即瀉。
- 【疗效】 經治二十多人，均服一次即愈。
- 【禁忌】 忌吃盐。

第八部分 寄生虫病

一、血 吸 虫

蒼櫨合剂治疗早中期血吸虫病

我院与曲江、英德等血吸虫病防治站合作采用蒼櫨合剂，治疗早中期血吸虫病九十五例，现将治疗經驗总结如下：

（一）应用蒼櫨合剂治疗早中期血吸虫病九十五例，在治疗后患者一般症状如腹痛、腹胀、腹泻，大便脓血，头晕疲倦等，均见减轻或消失，食欲增进，精神好，劳动力加强，紅血球血色素均有增加，营养好转。

（二）治疗结束后，大便检查（沉卵三次）阴性率达70—90%。三个月追踪检查阴性率一直保持75—80%，证明蒼櫨合剂在临床上有一定疗效，对体内血吸虫可能有杀灭或抑制作用。

治疗后三至五个月第三次追踪检查统计表

人 数 批 数	检查人数	粪检阳性	粪检阴性	阴 性 率	备 考
第 一 批	10	4	6	60%	
第 二 批	10	4	6	60%	
第 三 批	14	3	11	78.5%	
第 四 批	12	4	8	66.6%	
合 計	46	15	31	67.4%	

【处方】 蒼耳全草 一两半 枣儿檳榔 一两半

【制法和服法】 上药为一剂量，以新法提炼成水剂，每剂120毫升，每日作二次空腹服。

【疗程】 以服用二十天为一疗程。

【反应】 在初服药一至五天有胸悶、腹瀉、头晕等輕度反应，六天后即消失，一般可照常劳动，无须臥床休息。

广州中医学院

青矾丸治疗血吸虫病

【处方】 土茵陈三两 大 黄三两 砂 仁一两 木 香三錢
青 皮五錢 穿山甲一两 通 草三錢 泡蒼朮五錢
麝 香三分 針 砂(醋制)三两
紅枣肉(酒浸蒸过)三两 青 矾(醋制)五錢
共研末，炼蜜为丸。

【服法】 每日二次，每次10克，飯后开水送服。

【疗程】 四十天为一疗程，严重者可連服二至三疗程。

【禁忌】 孕妇忌服。

【适应症】 血吸虫病有肝脾肿大、貧血、萎黃、黄疸者。

韶关专区清远县

二、鈎 虫

治鈎虫病秘方

【症状】 初发丘疹，体力痿弱，智力減退，貧血面黃，耳鳴心

跳，头晕眼花等。

【处方】 当 归 七錢 川 芎 五錢 白 芍 六錢 雷 丸 五錢
茯 神 八錢 蒼 朮 四錢 生 地 一兩 麻 黃 五錢
防 風 六錢 尖 檳 四錢 綿茵陈 一兩 枯 矾 一兩
枯青矾 二兩 紅 花 錢半 腹 皮 五錢 海金砂 七錢
赤石脂 五錢 百草霜 一兩

【制法】 共研末，以醋或粥水为丸，如綠豆大。

【用量】 每服三十丸，每日三次，开水送服，热者用淡盐水送服。

【禁忌】 感冒及虛弱孕妇勿服。

【注意】 服后如觉口苦燥，可多飲淡盐水。发生腹泻，用止泻药后再服。

【病例】 徐××，女性。患此病七年之久，照服此药丸治愈。最近三坑用显微鏡检查九人有钩虫的，服药丸二天后再检查无虫卵，症状好转，初步观察此方治疗有效。

翁源县周陂 张仁辉

四君加味治钩虫

【处方】 防 党 五錢 蒼 朮 四錢 云茯苓 四錢 甘 草 二錢
大蒜头 二兩 榧子肉 二兩 檳 榔 二兩 南瓜子 二兩
上药为成人量，小儿按年龄酌减。

【服法】 水四碗煎取一碗，晨早空腹一次頓服，吃药前夜不禁食，服药后四小时进食，連服三日为一疗程。服药后保留病人大便进行检查，以后分別每周检查大便一次，連續检查三周，以大便中不再发现虫卵为治愈。

【反应】 服药后病者无特殊的反应，仅有轻微的腹痛以及肠蠕动略亢进。

【疗效】 十三例阴性，仅有一例在服药后大便中找到二条虫体，且已无头，并有腐化现象。

佛山中医院

复方虫蠱草胶丸治钩虫病

使用复方虫蠱草胶丸治疗十一个病例中，首次服药，即有一例驱出钩虫，服药二、三次后驱出钩虫者七例（其中一例驱出钩虫三十二条，一例二十九条，一例十二条，其他三数条不等），同时有十例驱出蛔虫，三例驱出蛲虫。有效率较高，肯定了复方虫蠱草胶丸对治疗钩虫有效。

【处方】 复方虫蠱草胶丸：虫蠱草0.47—0.625克

甘汞0.1—0.2克 山道年0.03—0.1克

以上为成人一日量，小童照山道年按年龄计算。

【制法】 把虫蠱草洗净、晒干、研细末，载入胶囊中，每管重量0.3125克；甘汞、山道年是采用市面出售的混合剂。

【服法】 先服甘汞、山道年，隔一小时服虫蠱草胶丸，宜在半空腹时用冷开水送服，每日一服，连服三天为一疗程。两周后如粪检仍有钩虫卵可再服一疗程。如出现山道年的最初中毒症状（黄视症）时，应即停药，作对症治疗。

【禁忌】 在服药期中，忌食脂肪、蛋类、酸味食物，对有感冒，肺、胃、肾病，孕妇和未滿十周岁的小孩，不宜服食。

【反应】 本方是剧剂，用之适量，无不良反应，个别在服药后

二十至三十分钟有腹鳴灼热、輕微的恶心呕吐、眩暈、大便里急、食欲减退等症狀，經一、二小时后反应消失。

【藥物性能簡述】 虫蠱草系前人治虫蠱病而得名，广东亦名“大叶双眼龙”或“独行千里”，气味辛烈，入口灼舌癢痛，为兴奋神經、刺激腸胃、消水降壓的劇藥，但远遜于巴豆仁。

山道年对蛔虫最敏感，能使虫的肌肉发生痙攣性的收縮，不能牢固地附在腸粘膜炎上，对寄生在人腸中的圓虫类，都有不同程度的抑制力。

甘汞即中藥的輕粉，內服能激进腸蠕動及增加分泌，有緩下作用。

鶴山县中医研究小组

三、中华分支睾吸虫

中医用中藥防治中华分支睾吸虫之介紹

中华分支睾吸虫病者，多患头眩，胸胁及背部常觉翳痛，于清晨未起床前腹部暗痛，能食而肌瘦，面色萎黃；妇女患此，多感月經不調，什么都不感兴趣。男子則精神萎靡，喜怒无常。

中医书籍內名为肝癆虫，古法以吳茱萸、苦楝根皮、干漆、粘米粉、鸡子清、蜜蜡等混合为小丸，每服三十丸米湯送下。上列方中有些藥已属罕见难得。今用吳茱萸末半份，苦楝根皮末一份，蜜蜡份半，鸡子清适量。先将藥末用鸡子清搓匀，将蜜蜡放鍋

內，放炭火上溶解后与前药混合搓透，然后做成片剂，每日清晨空腹用白粥水或白糖水吞服，每服約二錢至二錢半，后服适量滑肠丸，以防便秘，但用量仍参考病人虛实而增减，照这方法进行处理。在三十个病例中，除一例中途停药无效外，其余二十九例均获显效。

治疗經過：年輕体力尚健者，治程一至三星期。

服此方在病愈后絕无副作用及后遺症发现。

广州市宝华街卫生所

用蕪矾丸治疗辜吸虫

【处方】 蕪矾丸：

蕪 荑 四两半 苦楝皮 三两 黑 丑 二两二錢半
枯 矾 七錢半 郁 金 三两 广木香 二两二錢半
檳 榔 四两半 貫 众 三两 青 皮 二两二錢半
潞党参 六两 雷 丸 三两 綠 矾(醋拌炒透) 六两
干 漆(炒透去尽黑烟为度) 二两二錢半
土茵陈 九两 薏米蘆 三两

【制法】 将前十三味共为細末，将土茵陈、薏米蘆 两味用水 5000毫升煎成 300 毫升浓汁，加入些少面粉和药末做成小丸，如綠豆大。

【服法】 成人每次 5 克，每日服二至三次，隔七小时一次。

【禁忌】 服药期間忌飲茶、酒。

四、蛔 虫

治蛔虫、鈎虫驗方

【处方】 榧子肉 二两 青 矾 二两 使君子 二两 雷 丸 一两
鹤 虱 一两 枣子檳 一两 黑白丑 五錢 蒼 朮 二两
陈 皮 三两 蜂 蜜 五两

【用法及疗效】 上药共研細末，炼蜜为丸，如龙眼核大，早晚各吞服二丸，一般服半料丸后痊愈。

【病例】 杨××，女性，23岁，农民。半年来腹痛时作，或时肠鳴，食欲减退，面色萎黄，并有浮肿，精神不振，四肢困倦，月經不潮，头晕心悸，不能劳动。大便检查发现鈎虫卵+++，蛔虫卵+，服本方半料后痊愈。

广州中医学院 杜明昭

五、血 絲 虫

治血絲虫病方

【病例】 陆××，女性，29岁。二年前患乳糜尿属血絲虫病，尿如米汁，时出紅尿或块状带油层物，西医治疗未效，轉用

中医。初用补中益气汤、六味丸加减无效，随改用补中益气汤加糯稻根一两，小便即转为黄混体，并服糯米饭及下方：

【处方】 生地六钱 山萸肉五钱 丹皮四钱 泽泻四钱
糯稻根一两 淮山六钱 云茯苓五钱 牡蛎一两
龙骨一两 石斛五钱 北芪一两 地骨皮四钱

【疗效】 上方连服八天，块片上，乳糜尿转淡黄色，无沉淀，半月后复有乳糜尿，再照上方服四天痊愈。

广州市人民医院中医科

治血絲虫方

【处方】 布狗尾（又名蛙虫草，根茎叶全用）二两

【服法】 用水煎，冲酒少许，一次服。

上方经汕尾医院庄耀华医师治疗五例，十年至二十年的患者均获显著效果，如患者刘××，病二十多年，左脚成象皮肿，寒热时作时止，经中西医治疗多次，不见进步，服药二十余剂，症状消失，象皮肿亦见消退。

汕头专区海丰县

、第九部分 正骨伤科

一、取 子 弹

取炮弹枪伤驗方

【外敷藥方】 吹筒叶 娥眉叶 地稔草 紗仔叶 橫紋叶
黑神叶 残花叶 豆豉叶

上列草藥采鮮叶各等量，搗烂外敷伤处。

【內服藥方】 干芦根 一兩 鮮竹茹 三錢 全当归 三錢
天花粉 四錢 金銀花 三錢 山梔子 三錢 玄 参 五錢
杭白菊 三錢 生甘草 二錢 連翹壳 三錢 大生地 五錢
川黃連 三錢 西藏紅花 二錢

加味法：伤头部加川芎三錢、白芷二錢；伤胸部加田
七三錢、腹皮二錢；伤四肢加牛膝三錢、桂枝二錢；伤肋
骨加續断二錢、自然銅二錢；大小便不通加朴硝二錢、大
黃二錢；病重加羚羊一錢、犀角一錢。

【療效】 治疗子弹入肉三十余例，全部治愈。

增城县

治疗枪炮弹片伤方

(一) 枪炮弹片伤于皮肉治法

【洗伤口方】 老鼠牙叶 銀花藤 牛耳树叶 紅心狗屎树叶
上药各等量，煎水溫洗伤口，另敷后药。

【外敷药方】 鏟牙郎叶一两 白花雷公根 三錢 糞箕督草 五錢

【用法】 上药共晒干研末，用时以冷开水擦第二过米泔水調药末成膏，敷于伤口上，每天換一次。換药时，伤口不洁，可用洗伤口法洗之。外敷药极有生肌防腐作用，伤口能迅速愈合。

(注：白花雷公根又名蚶壳草，广州名鉄缺草)

(二) 枪炮弹片伤口出血治法

【外敷止血药方】 鏟牙郎叶 抗 青

上药各等量研末，以冷开水擦第二过米泔水調敷，血即可止。血止后用下方敷貼使伤口愈合。

【外敷收伤口药方】 节节花 金花草(又名龙鮮草) 鏟牙郎叶
上药各等量研末調米泔水敷貼伤口，每天換一、二次。

(三) 枪炮弹片陷于肉内治法

【外敷吊枪炮弹片药方】 四天公虫 一个 三 蔡 五錢

江子仁(巴豆) 五个 土狗虫 二个 蒜 仁 五个

珍珠(另研末用时拌入) 三分

【用法】 以上各药共研細末，用时以冷开水擦第二过米泔水調敷于伤口，弹片即能吊出。一次不能出，隔天換药再敷，

不过三次，定可吊出，免开刀钳出之苦。弹片吊出后，用第一法洗敷收口。

(四) 枪炮弹片嵌于骨内治法

【内服方和用法】 弹片嵌于骨内不能吊出时，先用鯪鱼一条以醋和水煮服，然后用第一法敷药收口，愈后永不变动。

(五) 枪炮弹片伤折骨治法

【外敷接骨方和用法】 苦菊心树根，晒干研末，每次三钱和鸡血一碗、白酒四钱调匀，隔水燉热，乘温时敷于骨折部位，每天换药一次，约一星期骨可接好。

伤口愈合仍按照第一法处理。

(六) 枪炮弹片伤内服法

【内服药方】 穿山甲三钱 皂角刺二钱 乳香二钱半
連翹二钱半 沒药二钱半 天花粉钱半 归尾二钱
荆芥二钱 防风钱半 赤芍钱半 红花钱半
血竭钱半

共研末，每服二钱，早晚各一次，开水冲服。

发热及重症，加羚羊三分、犀角三分、麦冬一钱、灯芯一把，綠竹心十条，燉水和以上药散冲服，每天一次至症轻或热退为度。

(七) 枪炮弹片伤兼症治法

1. 兼伤风者，用第一法处理外，服下方：

生地二钱 麦冬二钱 淡竹叶二钱 連翹二钱

川黃連 錢半 黃 芩 二錢 黃 柏 二錢 皂角刺 錢半
黑梔子 二錢 木 通 二錢 大 黃 二錢 石 膏 三錢
滑 石 三錢 蘇 花 二錢 灯 芯 卅条 甘 草 一錢
共研末，每次三錢，一日二次，開水沖服。

2. 兼傷水者，用第一法處理外，服下方：

生 地 二錢 木 通 二錢 赤 芍 二錢 川黃連 一錢
歸 尾 錢半 防 風 錢半 白 芷 兩半 川 芎 兩半
石 膏 三錢 黃 芩 二兩 梔 子 二兩 黃 柏 二兩
滑 石 二兩 連 翹 二兩 灯 芯 卅条 甘 草 一兩
共研末，每次三兩，每日服二次，開水沖服。

陳漢麟醫師在抗日戰爭期間于曲江開業時，日軍飛機濫炸曲江，居民受傷甚多，經陳醫師用以上土法治愈病者甚多。

汕頭專區

槍傷出鉄沙子驗方

【處方】 野苧麻根（用量看傷口大小而定），土狗子（用量每粒沙子用土狗子一只）。

【用法】 上二味搗爛敷患處，每日換藥一次，連敷數日。

【病例】 黃××，男性，28歲。在1956年，被鳥槍傷左乳旁，經敷此藥五服，便將沙子拔出，後再用生肌消毒藥收口。

樂昌縣九峰大廊社 柏戶寬

二、正 骨

正 骨 秘 方

我行医二十八年来，使用祖传五代秘方“活絡效灵丹”及“正骨妙灵丹”；治疗各种骨折及关节脱臼，达二万余例，疗效卓著。

【内服处方】 活絡效灵丹加味：

当 归 六錢 乳 香 二錢 白 芍 四錢 杜 仲 四錢
党 参 六錢 沒 药 二錢 續 断 三錢 五加皮 二錢
生 地 五錢 正紅花 一錢

【服法】 清水二中碗，煎存一中碗，冲酒冲糖各二匙，温服。

【禁忌】 忌食鸡、鸭、蛋、虾、酸、辣、血类、羊肉、狗肉等。

【说明】 骨折断者，加白芷二錢、金边土鳖二錢、骨碎补二錢、自然铜五錢。

【外熨处方】 正骨妙灵丹（生草药）：

接骨草 一兩 散血丹 一兩 鵝不食 五錢 金鎖匙 五錢
上山虎 五錢 鉄馬鞭 五錢 鉄包金 五錢 还魂草 一兩
桑寄生 五錢 接骨仙桃 五錢

【用法】 以上十味生草药，洗净，切碎捣烂，加锦大黄一两、白酒六錢，将药煮沸，用净布包裹熨熨，药冷后再加水螞蝗五条、生雄鸡一只、田蟹五只（切烂），混合生草药，用净布一幅，将药包裹成片，按折脱范围大小，敷于患处，用夹板纱布固定，每天换药一次。

海南正骨医师 林天辉

駁骨良方

【处方】 牛牯筋皮 兩半 石蓮子根 兩半 白背香 兩半
騎篤𧄸 兩半（連根叶）

上列山草藥生山野間，各處均有。

【用法】 生雞一只重十二兩至一斤，連毛用，去其內脏，和藥搗極爛，先將傷處骨節托正，用夾板扎好兩端，後將藥加酒少許，炒熟敷上，夾板固定約二十四小時為度。

【病例】 1. 张伟良医生的孙子，跌断手骨，治疗七天痊愈。2. 周天济医生的小孩，跌断手骨，治疗三天愈合，七天痊愈。

增城 邓燕川

中西医合作治疗骨折

我院从1958年4月起，开始进行中西医配合治疗部分骨折伤者，西医用牵引或夹板固定，中医用服藥配合治疗，共治十四例，其中四肢骨折四例，头、肋、肩胛、腰骨折各一例，盘骨骨折六例，一般能縮短治疗時間二分之一以上，疗效滿意，部分經x光照片复查証实。

【內服处方】 生骨散：

骨碎补	一兩	地 龙	一兩	虎脛骨	五錢	牛 膝	一兩
自然銅	一兩	五加皮	一兩	千年健	一兩	龙 骨	五錢
蟹 壳	五錢	赤石脂	五錢	白 朮	五錢	田 七	三錢
麝 香	一錢						

此方适应复杂骨折，日服一次。

如骨折伤后肌骨已愈但无力，用四物湯加千年健一兩、骨碎补六錢、甘草四錢、北芪七錢、木瓜四錢、龟胶三錢。

【外用处方】 地骨皮一兩 骨碎补一兩 川 椒一兩
 生 羊一兩 茯苓皮一兩 川 烏一兩 五加皮一兩
 黃 柏一兩 威灵仙一兩 南 星一兩 半 夏一兩
 梔 子一兩 姜 黃一兩 泽 兰一兩 赤 芍一兩
 厚 朴一兩 防 風一兩 羌 活一兩 松 頭一兩
 葱 頭一兩 生 姜一兩 淨水煎后冲酒熱洗傷處。

湛江专区人民医院

跌打驗方

【主治】 跌打、扭傷、瘡瘍、痛疔等。

【处方】 驅風太陽膏：

生川烏 六錢	川 軍 六錢	乳 香 六錢	生草烏 六錢
梔 子 六錢	生南星 六錢	姜 黃 六錢	胡 椒 六錢
生半夏 六錢	赤 芍 五錢	僵 蚕 五錢	桃 仁 五錢
威灵仙 五錢	半 拔 五錢	白 芷 五錢	昆 布 五錢
山 龍 五錢	桂 枝 五錢	五加皮 五錢	羌 活 五錢
自然銅 五錢	川秦艽 五錢	川 芎 五錢	歸 尾 五錢
獨 活 五錢	蒲公英 五錢	香 附 五錢	牛 膝 五錢
紅 花 五錢	血 竭 五錢	走馬胎 五錢	甘 松 五錢
土 鱉 五錢	細 辛 五錢	泽 兰 五錢	血風根 五錢
薄 荷 五錢	春 根 五錢	吊 風 五錢	續 斷 五錢
木 瓜 五錢	苏 木 五錢	黑 丑 五錢	地 風 五錢
骨碎补 五錢	荊刁根 五錢	炒黃馬錢 六錢	

另落：公丁香 六錢 桂通 六錢 三利 六錢 樟腦 一錢

【制法】 1. 先将上藥研末過篩，后放入釜中同时加入花生油二

斤，桐油半斤。

2.待起泡时即将紅丹粉（一斤四两）徐徐撒入，并搅拌使均匀，勿粘釜底。

3.变黑色后，仍續加紅丹，直至呈泡沫状沸騰，乃示成熟，如紅丹沉下，即为未成熟阶段。

4.紅丹用一斤四两，占油量50%（桐油半斤，花生油二斤），冷天时油略增加，丹稍减少。

【病例】 林××，男性。右肺跌伤，解谿穴疼痛，举步困难，敷此方三天即愈。

揭阳 吕世如

內服接骨丹方

【处方】 田 七 六錢 乳 香 六錢 沒 药 六錢 白 芍 六錢
自然銅 六錢 土 鱉 六錢 炙虎骨 兩半 血 竭 六錢
良 姜 六錢 紅 花 八錢 麝 香 八錢 礞 砂 六錢
大 黃 六錢 炒神曲 六錢 麻 黃 六錢

【制法】 研极細末，炼蜜为丸，每只二錢。

【服法】 每日三次，每次一丸，先用开水送下，五分鐘后再喝好酒二杯。

【适应症】 跌打損伤，骨折筋伤，有散肿消瘀、活血止痛功效。

【病例】 王××，男性，50岁。由高墜下跌伤腰部，患部浮肿，疼痛难忍，运动艰难，有刺痛感，伤处下陷，运动机能丧失。施用手术后，敷上外用接骨丹，并用夹板固定，內服此丸，七天痊愈。

清远卫生院 邓伟文

外用接骨丹方

【处方】 田 七 二錢 三 棱 六兩 广 香 六兩 香瓜皮 六兩
 桃 仁 六兩 藿 香 六兩 乳 香 六兩 沒 药 六兩
 归 尾 六兩 義 朮 六兩 泽 兰 六兩 骨碎补 六兩
 山 茶 六兩 細 辛 六兩 梔 子 六兩 丁 香 六兩
 川 芎 六兩 川續断 六兩 生紅花 六兩 大 黃 六兩
 白 芷 六兩 沉 香 六兩 牛 膝 六兩 金土鱉 六兩
 川加皮 六兩 自然銅（醋制七次） 六錢
 牛 根（醋制七次） 六錢

以上各药共研細末。另用生草药駁骨丹六兩、金不换一斤、大幌伞五兩、小幌伞五兩、田基黃二兩、石关蕊二兩、大膝头五兩、凤尾草三兩、鉄塑基二兩、生木賊二兩、透骨消三兩。共搗烂外敷。

【病例】 邓××，男性，3岁。被門板压断大腿骨，浮肿疼痛。检查：股骨折断处，明显突出，患肢下部，运动机能丧失，不能站立，并有骨擦音。施用手术后外敷此丹，第一天加生鸡一只，第二天去生鸡，連敷三天痊愈。

清远县城鎮卫生所 邓伟文

正 骨 秘 方

新兴县人民医院正骨医师傅耀林，用家传秘方，治疗七百六十七例断肢折臂患者，一般疗程为二十天。

【处方】 鸡骨草 駁骨草 駁骨消 鬼灯苳 猪肚脯 榕树須

入地金牛 文头梳叶 田基黄 白胡椒 五指金龙
以上十一味等分，共为末，同时将生鸡一只，同捣至烂，酒煎成糊，外贴患处，夹板固定。

江門专区

跌打骨折药方

【处方】 生地一两 生花一两 当归二两 丹参八钱
乳香八钱 川芎二两 土狗四钱 五灵脂六钱
土鳖四钱 延胡索一两 血竭二两 韭菜一斤
地龙五钱 桂枝六钱 續断八钱 榕树根六两
骨碎补六钱 桃仁八钱 郁金六钱 赤芍八钱
紅柳根两半 千打捶二两 牛膝八钱 沒药八钱
酒餅二十只 风行根四两 秦艽一两 將軍甲两半
入地金牛三兩

【制法】 共研末，用烧酒煮好，敷患处。

【說明】 韶关市人民医院外科自1957年下半年至1958年11月选择了十五名单純性股骨骨折住院病例，邀請中医合作，用生熟草药外敷及木板固定法，經過二十一至六十天并經 x 光綫照片检查对比，愈合良好，全部无功能障碍，不但比石膏固定疗法縮短了疗程，減輕患者不必要的痛苦和节约医药費用，而且疗效甚好。

韶关市人民医院

跌打秘方“至宝膏”

【处方】 田七八钱 血竭六钱 龙骨六钱 沒药六钱

黃 丹 六錢 生 油 十兩 蜜 蜡 十一兩

此方以前有珍珠末。

【制法】 將上藥研末，先將油、蜡煮沸，然後將藥末放下，放時邊放邊用銀棒搗攪，使藥不致沉下，攪成糊狀。

【療效】 此方乃祖傳秘方名“至寶膏”，凡炮火刀傷敷此膏無不見效。近來有開放性骨折，西醫認為要割除之症，用此方後不只生肌止痛，約二十至三十天傷口愈合即愈。如華建麻織廠女工胡××，手指被機器壓傷，成開放性骨折，西醫認為要割除，經本所治療，敷此藥膏之後，能照常工作，此方曾治療二百多人，全部痊愈。

廣州市清平衛生所 李家裕

萬 應 膏

【處方】 萬應膏：

生 地 二兩	白 蜡 四兩	草麻仁 一兩	生川烏 五錢
山八角 三兩	黃蟾蜍 二只	白 芷 五錢	田 七 三錢
梅 片 四錢	西紅花 四錢	老 姜 三錢	過山龍 五錢
細 辛 八錢	蜈 蚣 二條	猪 胆 三只	草 烏 一錢
蜂 窩 一只	京 皮 八錢	三 茶 三錢	丹 皮 三錢
穿山甲 三兩	鉛 粉 六錢	黃 丹 十兩	蟬 衣 五錢
連 翹 八錢	薄 荷 五錢	龍 骨 二錢	生南星 八錢
天花粉 八錢	防 風 八錢	七枝蓮 五錢	生慈姑 二錢
肉 桂 五錢	牛 胆 一只	照藥根 五錢	鉄 扣 一兩
馬錢子 八錢	赤石脂 三錢	麻 油 三錢	象 皮 三錢
蒼 朮 一兩	大茶藥根 一兩		

【制法】 以上药加五油（净茶油半斤、山仓油一斤、松节油半斤、草麻油半斤、桐油三斤）共煎成膏。

【处方】^① 生肌散：

麝香一分 上梅片 钱半 赤石脂一两 龙骨一两

【病例】 1. 陈××，患栓塞性血管炎（十指冷落），用上药，历时二月愈。

2. 黄××手指破断后，被接上。

黄院香

三、脑 震 荡

治好脑震荡症方

【处方】 归 头 三钱半 白 芍 四钱 丹 皮 三钱半
甘 草 三钱半 川 芎 一钱 北柴胡 三钱半
甘 菊 三钱半 薄 荷 八分 桃 仁 二钱半
龙 骨 三钱半 石决明 三钱半 蒺 藜 三钱半

【疗效】 脑震荡症三例，均以此方治愈。上方有驱风止痛和镇静作用。

湛江专区人民医院

第十部分 外科

一、湯火傷

治愈大面积燙傷

【病例】 鮑××，女性，8岁。因被开水燙傷腹背部、会阴及下肢十七天，于1958年10月6日急診住院。

十七天前患者被开水燙傷后，曾在西医院住院十六天，經急救处理及各种抗菌素輸血补液等，治疗效果不显，其家属便要求用中医治疗。

入院时检查：发育正常，营养中等，煩躁不安，輕度失水，舌苔黃厚，脉浮洪数，体温 38.5°C ，脉搏110次/分，呼吸25次/分，五官心肺大都正常，局部伤口渗液較多，大部分为二度傷，脓液多，稠臭，黃綠色，部分皮肤坏死脫落，露出肉芽面而成三度，部分一度伤口呈干水，表皮脫落。

診斷：1.腹背部、会阴及下肢傷1—3度31.25%，其中3度10%。2.伤口继发感染。

【治疗原則】 內服以清熱护心解毒为先，成脓者則配合托里敗毒，最后則按体質情况，以滋养扶脾固本为主之剂，如

北芪、白朮、防风、山萸肉等。外用以制腐清凉法，用黃連水冲洗創口后，并用琥珀生肌膏。

【內服处方】 連翹五錢 忍冬一兩 梔子三錢
黃芩三錢 牛蒡子三錢 蒲公英五錢 天花粉四錢
芦根一兩 甘草二錢 鉤藤五錢 蟬蛻二錢
生地五錢 木通三錢 花旗參二錢 川黃連三錢
紫花地丁三錢 等藥物加減。

【外用处方】 琥珀生肌膏：

正蜜蜡廿二兩 川白蜡八兩 琥 珀三兩半

珍珠（后入）八錢 安息油（后下）三兩

用猪脊肥肉煎成軟油四十兩，將上藥合成軟膏。

广东省中医院

生草藥治疗燙傷方

【处方】 井栏草一兩 梅 片五分

【用法】 把井栏草搗烂取汁，加入梅片，調冷开水涂患处，日涂五至七次，連用一周，患部結痂痊愈。

【病例】 献方人曾治愈自己的爱人，当时因被沸水燙伤下半身，伤达全身的二分之一，伤处起水泡，痛楚异常，經用上方治疗，如法敷用，藥到患部即觉凉快，七至八天痊愈，不留疤痕。

韶关市卫生协会

湯火傷方

【處方】 連麻樹皮(研末)

【適應症及用法】 專治烈火烙傷、沸水泡傷、沸油灼傷等以致潰爛，無論久暫，將此藥末撒落患處，二十分鐘後，立即止痛、退熱，活血生肌。如未損破皮肉者，可用藥末煎液汁調塗。

【病例】 鍾××，男性。因采石灰，在石場被硝藥灼傷面部，當時兩眼不見天日，勢甚嚴重，後將此藥末煎液汁調搽，立即止痛，不久恢復原狀。

樂昌縣廓田鄉人民醫院 黃觀靈

火毒水治燙傷

【主治】 火燒傷，水燙傷，腫泡流水，局部皮膚灼熱疼痛難忍，塗之清涼解毒。

【處方】 生山棗樹皮五十至一百斤

【制法】 將上藥剪碎合入一百至一百五十斤水，放入鑊內煮成，以缸或樽貯藏備用。

【用法】 將藥水倒入腰盆或茶杯內，用棉花或鴨毛蘸塗患處。

【病例】 鄧×，男性，2歲。沸粥水燙傷，身及腿部起水泡，紅腫疼痛，呻吟不已。第一天用一兩白糖開水內服，外把火毒水搽患處，三小時後，水泡逐漸下降，痛減，第二天仍有潮熱痛覺，第三天仍有痛覺，第四天消失痛覺，第五天痊癒。

鄧偉文

鉄水烙伤方

【处方】 化鉄散：糯米 花生油 白糖

【治疗】 凡鉄水烙伤用此散撒在伤口上七、八天左右，便可痊愈，严重者最多三星期，无后遗症。此方无禁忌及副作用，应用数十年，愈人三百以上。

【制法】 先将糯米用水浸一星期，后用石磨磨成米浆状，然后用布袋将水隔出，以去清米浆胶，做成团状，每斤粉加白糖半斤和匀，然后用生油炸之，炸至该粉老黄色便可，隔一夜将它研碎放入瓦缸中，用炭煨至焦枯，去火气后研末。

【用法】 较小伤口可用该粉干撒上便可，较大伤口除用该粉撒外，再用熟石膏外敷。

【熟石膏（白药膏）处方与制法】 用生石膏打成小块煨烧约八小时，候冷取出，放地上三、四天，去火毒，然后研为极细末，用芝麻油或花生油合成软膏（凡士林亦可，用前要经高压消毒）。

白药膏治疗汤火伤，通过数十年临床上观察，很为满意，已有数百病例有良好的疗效。愈后伤处皮肤色素多数正常，无疤痕和皮肤紧束现象。

佛山普君医院 吳祖賜

湯火伤驗方

【处方】 高山茶油 鴨蛋白 百草霜

【用法】 百草霜研末，与上二味调匀搽患处。

【病例】 王××因火伤，用上药物搽患处二次，痊愈。

兴宁 凌奇辉

火烧伤驗方

【处方】 鉄扫帚

本方只用鉄扫帚一味，治疗烧伤，不論輕重俱效，已用过一百多例无一不愈。

【用法】 鉄扫帚晒干研末（炒干亦可），开蓖麻油涂患处。

廉江县石崗峰 戚培廷

地榆黃連膏治燙伤

【处方】 凡士林10克 地榆末50克 黃連末50克

【制法】 将上药混合成油膏状。

【用法】 用生理盐水或硼酸水清洗伤处，涂上地榆黃連膏，再撒上地榆黃連粉，伤处暴露即可，不用包扎。

【疗效】 治疗二十余例，有显著疗效。

广州铁路管理局

鸡蛋白硼酸粉糊剂治燙伤

【处方】 鸡蛋白一个 硼酸粉5克

【用法】 以无菌操作法，将鸡蛋白一个加硼酸粉5克，調成糊状，涂于消毒紗布上，敷于燙伤处，有防腐促进新生作用。此方經医治十八例燙伤病人，得到全部治愈，且无瘢痕。

广州铁路管理局

二、痛 疽 疮 疡

治疗外伤疗疮方

用神授卫生湯加川貝母、陈皮，內服治疗疮三十四病例，全部治愈，效果迅速，平均三至四天治愈。

【处方】 神授卫生湯加味：

皂角刺 一錢	防 风 七分	归 尾 錢半	白 芷 一錢
羌 活 八分	炒山甲 一錢	連 翹 一錢	乳 香 五分
沒 药 五分	石决明 六分	甘草节 一錢	沉 香 六分
天花粉 一錢	大 黄 二錢	金銀花 一錢	紅 花 六分
陈 皮 錢半	川貝母 一錢		

每天服一剂，連服三至四天。

阳和湯治阴疽疮

【內服处方】 阳和湯：

熟 地 一两	鹿角胶 四錢	白芥子 三錢	肉桂心 四分
甘 草 錢半	炮 姜 三錢	麻 黄 六分	

【外敷生药】 水慢伞蕈、半耳风蕈，取皮捣烂，以水开面粉混合煮熟，敷患处。

【病例】 稔村乡陈×的小孩患阴疽，經西医治疗三十天未效，后經用此方治疗二十天，恢复正常。此方曾治疗一百四十

例,其中只有六例因发病時間过长,腐烂严重,而告失效。

傅耀林

治疗疮疖脓肿方

本院从1957年夏季起,制成了內服外敷二种治疗疮疖藥品,經過二百五十例的治疗观察,在三至四天內基本痊愈的达二百三十七例。又据广州市大新卫生所統計治疗疮疖三十一例,全部有效。

广东省中医院处方

【內服处方】 川銀花二錢 防 风七分 白 芷七分

甘草节一錢 黃 芩一錢 天花粉錢半 土茯苓二錢

陈 皮五分 归 身七分 浙貝母二錢 皂角刺三錢

蒲公英一錢 穿山甲錢半 乳 香七分 夏枯草一錢

沒 药四分 紫花地丁一錢

【用法】 清水煎服,小儿每天服一剂,成人每天服二剂。

【外敷处方】 扁 柏三十二两 薄 荷三十二两 皂角刺八两

大 黄三十二两 泽 兰三十二两 黃 柏三十二两

鮮苦瓜一千三百两

【制法】 將鮮苦瓜切成薄片,压出11000毫升汁,將其他药研末放入汁內,搅匀,隔水在80°C加热至四十八小时,使药粉全部溶化,混合后入瓶,用低温間歇灭菌法灭菌,用时按疮的大小敷上。

广州市大新卫生所內服药处方

金銀花一兩 蒲公英二兩 野 菊五錢 夏枯草六錢

丹 皮 四錢 玄 參 二兩 石 斛 六錢 生 地 八錢
赤 芍 四錢 紫花地丁 六錢 水煎服。劑量小兒酌減。

廣東省中醫院

犀角地黃湯醫膿毒

【主治】 高熱昏迷，譫語，煩躁不安，全身紅紫色，遍身膿腫，
游走無定，舌黑干澀，脈數。

【處方】 犀 角 干地黃 丹 皮 玄 參 麥 冬 金銀花
甘 草 浙貝母 芍 藥 紫花地丁

以水煎服。此方分量根據病情輕重，年齡大小酌定。

如無犀角可改用柱角，量須加三倍。

【療效】 本院近年來先後治療急性膿毒症患者四例，均用本方
治療，輕者二至三劑，重者五至六劑痊癒。

東莞縣人民醫院 謝其彥

三、瘰 癧

瘰癧內消外脫方

我所朱國英治療瘰癧（淋巴結核）共三百例，有效的二百七十多例。治療法以內服消癭丸，外貼消癭膏。

【內服處方】 消癭丸：

血 珀 三錢 川貝母 三錢 三 棱 三錢 莢 朮 三錢

僵 蚕 三錢 延胡索 三錢 蜈 蚣 十條 夏枯草 三錢
珍珠末 一錢 法半夏 三錢 牛 黃 一錢 至宝丹 一錢

【制法】 共研細末，加蜜拌为小丸。

【用法】 每天早晚各服三分，开水冲服。

【外敷处方】 消瘰膏：

川 芎 三兩	知 母 三兩	青 皮 三兩	藁 本 三兩
天 麻 三兩	蜈 蚣 三兩	桑 白 三兩	黃 芩 三兩
白 朮 三兩	枳 壳 三兩	远 志 三兩	猪 苓 三兩
五加皮 三兩	細 辛 三兩	薄 荷 三兩	僵 蚕 三兩
两头尖 三兩	麻 黃 三兩	防 风 三兩	何首烏 三兩
桃 仁 三兩	生 地 三兩	羌 活 三兩	五倍子 三兩
川續断 三兩	梔 子 三兩	玄 參 三兩	前 胡 三兩
羌 活 三兩	蒺 藜 三兩	川貝母 三兩	木 通 三兩
风 藤 三兩	淮 山 三兩	独 活 三兩	香 附 三兩
黃 柏 三兩	荆芥穗 三兩	熟 地 三兩	蒼耳子 三兩
良 姜 三兩	川黃連 三兩	柴 胡 三兩	升 麻 三兩
桔 梗 三兩	半 夏 三兩	当 归 三兩	烏 藥 三兩
枫子肉 三兩	檳 榔 三兩	大 黃 三兩	杏 仁 三兩
巴 豆 三兩	甘 草 三兩	鮮 皮 三兩	杜 仲 三兩
連 翹 三兩	泽 泻 三兩	白 芷 三兩	草 烏 三兩
益智仁 三兩	牛 膝 三兩	地 榆 三兩	苦 參 三兩
金銀花 三兩	田 七 (后下) 三兩		

【制法】 茶油十二斤，將藥浸十五天后，慢火煎至黑色，撈起藥渣，將淨油称过，每斤油落綫丹八兩半，煎至不軟不硬便成藥膏，用水浸二年至五年可用。

广州市下九街卫生所

淋巴結核(頸癰)驗方

【處方】 浙貝母 五錢 筋慈姑 五錢 老鼠筋 五錢 風栗壳 五錢
羅漢果 一個 千層紙 三錢 夏枯草 三錢
白花鬼燈籠 五錢

【服法】 三碗半水煎至一碗之八分，溫服，以服用三十天為一療程。

【適應症】 頸部淋巴結核，腫大疼痛，顆粒如核，推之可移。

【療效】 本方有消結散腫療效，但能否抑制結核桿菌作用還待研究。

廣州中醫學院 張景述

治療淋巴結核方

【處方】 冰解膏：

石灰膏 10 克（用鮮石灰加適量滾水淬透，化為粉狀，微有粘潤性）。

百草霜 0.5 克（用山上百草燒飯積累在鍋底的。煤灶無用）。

梔水精 4 毫升（用瓦缸煎熬濃縮至 50%，但有蘇打的失效）。

先將石灰膏搓至無粒狀，加入梔水、百草霜和勻便成。

【處方】 翻核丹：

結晶白降丹 1 克。

三黃末（黃連、黃芩、黃柏各等分研成粉），按照方

內葯量配合和勻，用米糊捻成葯條（如火柴枝大）、餅子（如衫骨紐樣大）。

【處方】 消毒膏：

假番薯 四兩 羊角扭 三兩 癩蛤蟆 六只 黃丹 四兩
花生油 九兩

【制法】 先將花生油煮上三味，煮至葯粘為止，去葯渣，待冷，加入黃丹，再煮至滴水成珠，葯鑊離火後，用新汲水浸一小時，膏成後，再加入生南星、生半夏、生川烏三味葯末。每味三錢，調勻使用。

【治療要點】 檢查診斷核之形態大小方向，核之深淺，推之移動否，有根無根，分別進行施治。

1. 推之移動為無核根的，用冰解膏敷貼，使結核溶解於內，逐漸脫落。

操作：將冰解膏敷患處，寬度和核之大小相等，將膏加厚與核之深淺相等，須平正，使葯力直透核下，敷葯守候三、四小時，觀察葯膏四周边緣呈黑色水泡為度，去葯拭干疤痕上水液，撒上三黃散或淨黃丹即可，囑患者對患部保護，不要被水濕、汗濕和碰傷或抓破，經過二三十天，內部肌肉生長，被化之核自然枯脫痊愈。

2. 推之不移動為有核根的，用翻核丹，使結核腐蝕逐漸翻出。

操作：翻核丹捻作餅子、葯條二種，第一天貼上消毒膏，中間放置丹餅子，第二天除去葯膏，丹餅子溶化、表皮肌肉已腐，用銀針向結核中間探進一小孔，探至不能再進為度，沿針孔插入葯條，外面敷上消毒葯固定。如有子母核或核過大，可用葯條插入核子，每日換葯一次，照前

法用銀針探取孔穴，再插藥條，面封藥膏，不限日數，直至腐蝕之核翻出外。如核過深，可將翻出一截剪去，繼如法用藥，直透核根才可停藥，候二、三天自然完全翻出，用消毒藥膏敷回，自然愈合。

3. 凡患淋巴結核有紅腫癰痛，惡寒壯熱不可用上法施治，須內服消炎解毒藥，如仙方活命飲，小柴胡湯，三黃解毒湯加貝母、射干、牡蠣，六味地黃湯加牡蠣等疏解之。外敷消毒膏，連續十五天即見效果。

【注意】 用翻核丹每次不能超過三個，插入的藥條不能接近食管和氣管，其他地方亦有洞破血管發生大流血，但不必驚惶，可先止血。

雷東人民醫院 林 偉

四、癌 瘤

治療食道癌方

【處方】 丹 參五錢 穿山甲五錢 鱉 甲八錢 皂角刺六錢
三 棱二錢 莪 朮二錢 僵 蚕二錢 桔 梗一錢
歸 尾五分 甘 草三錢

【病例】 邓××，男性，61岁。病已三个多月，近十来天吞咽困难，食入即吐，飢不能食，經領劑造影診斷為食道癌。用此煎劑由肛門滴入，翌日即能飲水及食流質食物。

治疗前后对比

	飲食情况	精力	体重	大便
治疗前	水物不能下胃,食之即吐	疲乏无力	74市斤	秘結
治疗后	半流质飲食完全不吐	正常	90市斤	較正常(隔一天一次)

广东省中医院

治疗子宫癌单方

【处方】 紅莧菜 四两

【服法】 以四碗水煎至一碗，溫服。

【疗效】 以上药治疗五例，病情均有显著好转。

广州市 何开紀

治疗恶性子宫瘤肿方

【症状】 子宫瘤肿，症状腹部有块状，会移动，經期无伦次，阴道排出腥臭分泌物，腹部陣痛，头晕形瘦。

【处方】 七星剑 一两 五时合 一两 雨伞根 一两

生用量，干的改为各五錢，煎水适量，冲酒少许，一次服。

【处方】 熟地 四錢 当归 四錢 黃芪 一两 洋参 三錢
炙甘草 一錢 肉桂 一錢 水煎，一次服。

【服法】 第一方連服三天，第四天服第二方，第五至第七天繼續服第一方，第八天再服第二方，第九至第十一天又服第一方，以后連服第二方十剂。

【病例】 姚××，女性，54岁。曾經往香港瑪麗医院診斷为恶性瘤肿，因病情恶化，該院不肯收治而返家，复經海丰县人民医院作同样診斷，服上方而愈。

海丰中医师 袁学勤

瓜子菜治直肠癌

【处方】 瓜子菜四两 鸡蛋花五錢 以四碗水煎至一碗服用。

【疗效】 治疗十例，疗效显著好轉，一般二十天症状消失。

玉簪花头治毒瘤

【处方】 玉簪花头

【用法】 毒瘤未割过者，用玉簪花头一斤搗烂，白醋煮成流膏外搽，一日五至七次，內服八味逍遙散临床加减；对一般毒瘤能够解除痛苦，減輕症状，或延长寿命。

【疗效】 治疗三十例，有效的十五例。

广州市 何开記

五、痔 瘡

治疗痔瘡經驗

【痔疮疗法】 第一阶段：用枯痔散，把痔核腐死，快者五天，

慢者十天，极少数至十一二天，至痔核全部枯黑，按診底部已硬为度。

第二阶段：先用茛菪湯或双菜湯熏浸，然后用脫痔膏解毒消炎而起新生排腐作用，把枯死部分脫离。

第三阶段：用拔毒膏把新腐口清除，三天后作一般处理，至全部痊愈。

【肛瘻疗法】

1.胶綫挂綫：对单纯性或复杂性肛瘻的处理，有内口者可挂綫，无内口之盲管只要瘻管斜向肛头，可能用銀針貫穿肠头肌壁时，都采用挂綫法。

2.药綫插綫：对无法穿刺者采用之。

【药方配制及使用】

枯痔散：

【配方】 信石六錢 白矾一斤 丁香末三錢 川烏一錢

【制法】 先把信石搗碎和白矾放下瓦罈中，用文武火煨透，研末，待二、三天火气过后，加上后二味药末，和匀即成。

【用法】 用时先将患部消毒洗净后，以芝麻油或豆油，最好是茶油，开稠，视痔核大小把药敷上縛好，每天换药三、四次，每次要洗净，如药干后疼痛，亦可多换一、二次。

脫痔膏：

【配方】 川黃連兩半 獾皮六錢 象皮六錢 紅丹三錢
輕粉錢半 寒水石兩半 甘草末六錢 凡士林二斤

【制法】 上七味药研成細末后，把凡士林煮沸，下药末搅匀即

成。

【用法】 每天用荅草湯或双菜湯熏浸后拭干，用藥涂上，以涂滿痔核及其两旁为度，每天換藥两次，直至痔核全部脫落。

荅草湯：

【配方】 土茯苓一兩 土銀花一兩 九里明五錢 荊芥五錢
大黃六錢 明矾三錢 甘草梢一兩
上藥同煮數十沸，趁熱傾下盆中，先熏后浸洗。

双菜湯：

【配方】 紅骨筋菜頭約半斤 瓜子菜半斤
同煮如上法熏洗。

拔毒膏：

【配方】 木香六錢 紅丹一兩二錢 枯矾一兩二錢
川黃連六錢 輕粉三錢 猪胆三个 凡士林二斤

【制法】 各藥研末，放下猪胆汁內和勻晒干，再研成末，煮沸凡士林，加藥和勻。

【用法】 每天用硼酸水或過錳酸鉀水洗淨創口，敷上藥膏扎好。每天換藥两次，三天以后可換其他消炎藥粉，直至痊愈。

藥綫：

【輕度藥綫制法】 枯痔粉二錢 白飯二錢 先把飯研至极烂加藥搗成綫条，阴干代用。

【重度藥綫制法】 枯痔散一錢 白降丹一錢 百草霜一錢

白飯三錢 制法同上。

【用法】 先將輕度綫插入瘻孔至尽头處，用枯痔散敷上，約六至十天，每天換藥三次，每天把瘻管積存舊藥弄出，換上藥綫一次，至瘻管枯干，然後再換插重度綫二至三天，最後用脫痔法轉治。

膠綫：

即象皮綫，市面所售的小膠綫。

【用法】 先將銀針探通內口，或穿刺腸肌壁造成內口，用指探入肛門，把銀針屈出肛外，把膠綫縛在銀針頭，從內口引出外口，結扎縛緊即可。每天要用蒼草湯或高錳酸鉀液浸洗兩次，外敷拔毒膏，數天后膠綫脫落。注意洗滌消毒，數天便能痊愈。

【輔助療法】

1.在第一個治療階段，如痔核未突出時，可先用換痔膏，其配方是：

生蓖麻子一錢 生川烏末一錢 生半夏末一錢

制法：先將蓖麻子打開去殼研至極爛，加入后二味藥末，搗勻，如太稠，可加些花生油。

用法：先把藥膏抽入肛內，再將余藥貼在肛外，數小時后，痔核即突出，即換敷枯痔散。

2.痔核完全突出，初敷枯痔散如感疼痛，即暫停藥，用暖和的雙料湯或高錳酸鉀液浸洗，過敏退后，再行上藥，浸洗后局部可塗布可卡因溶液。然後陸續用藥。普通可注射或內服鎮痛劑，消毒劑，不必停藥。

3.在第二个治疗阶段，痔核在半脱离状态，如碰伤未离部分，出血较难止，应嘱病者行动要小心，如出血可用止血散按上。

止血散的配方是姜炭一味研极幼末，貯备待用。

用法：用棉紗球装大量药末，把整个痔疮包上，用指力輕压紧痔核边缘，血止为度，如再流可再加药按上。

4.对失血过多患严重贫血病者，应严密注意其饮食营养，配合内科治疗，一般常用十全大补湯、人参养营湯、补中益气湯、当归拈痛湯、归脾湯等。

本所在治疗五百六十五例中，仅有三例大出血，原因是挫伤，均在第二治疗阶段发生事故，須注意。

湛江市中心中西医联合診所痔科中医师 伍錦濤

六、蛇 毒

蛇医何晓生經驗介紹

我医治毒蛇咬伤已有四十七年，經医三千多例，未有一例死亡。现将几种蛇咬伤的症状和诊断分述如下：

(一) 飯罐头蛇

【症状】 人被此蛇咬伤后，伤口有血样小点，微肿，后麻痹約十分鐘，继則伤口疼痛麻木，向上蔓延，附近淋巴腺肿大，患肢不能活动，三小时后渗透入心，七小时后全身浮

肿，再过二小时后咽喉部肿大充血，不能吞咽，四肢无力，呼吸加速，进入死亡状态，再过一、二小时便死亡。

【诊断】 ①伤口少流血，微肿痛，十分钟后有麻木。

②牙痕为横状排列的两个圆形（· ·），伤口颜色淡黑。

（二）青竹标蛇

【症状】 人被此蛇咬伤，伤口即时有轻度浮肿，有痛，无麻痹，痛如刀刺状（特征之一），并渐向上蔓延，过八小时，在患伤处有浮肿，表面有烫伤样水泡，过四天后自行穿破，皮肉便开始溃烂，有轻度痒感，活动障碍，四小时后入心，致昏迷谵语、烦躁，咽喉肿大，喷白色泡沫，而临死亡。

【诊断】 ①伤口有痛，无麻痹，或少麻木。

②患部有浮肿，且成水泡或溃疡。

③痛如刀刺。

④牙痕扁长形，八字形（八）排列。

（三）铁包金蛇

【症状】 伤口麻木疼痛，轻度浮肿，并向上侵犯，为时不久，即有骨痛，波及头部，过十小时有咽喉不适，吞咽困难，全身浮肿，进入死亡状态。死后皮肤发黑（缺氧）。

【诊断】 ①伤口麻木疼痛，轻度浮肿。

②有骨痛及头痛。

③将死时全身浮肿。

④牙痕为扁长形，品字形（六）排列。

(四) 破基硤蛇

【症狀】 伤口有微痛及痒（蚁咬感，時間約二十分鐘），继則伤口及附近皆疼痛，无明显之全身症状，过五小时后毒入心，六至七小时咽喉不适，肿大，感觉到有异物梗塞，发音嘶哑，逐渐失音，八小时后四肢活动障碍，呈瘫痪状态，十小时呼吸困难，口吐泡沫而死。

【診斷】 ①伤口有痒感，微痛時間短。

②严重时嘶哑、失音。

③呼吸困难。

④牙痕呈品字形（）排列，伤口連皮肤有撕裂伤。牙形如此，原因是牙小鈍，同时咬入时反方向轉，故有尾。

(五) 三索綫蛇

【症狀】 伤后伤口微痛，微肿，六、七小时后才向上蔓延，十二小时后嗜睡疲倦，二十四小时后入血入神經，說話震顫，深呼吸而死亡。

【診斷】 ①微痛微肿。

②疲倦嗜睡。

③严重时說話震顫。

④牙痕圓形（），前小后大。

(六) 鵝公蛇

【症狀】 伤口初时无肿痛，四小时后則劇痛如烧灼状，发热发冷，臥床不起，伤口微肿，以后漸加剧，并向上而波及全

身，八至九小时症状最剧，再过一至二小时全身浮肿，发音震颤，重者失音，呼吸困难而死亡。

【诊断】 ①初时无疼痛，四小时后有烧灼痛。

②有发热发冷。

③牙痕扁细，呈八字形（八）排列。

（七）馬鬃蛇

【症状】 受伤后伤口浮肿，痛如针刺，渐波及上方，六、七小时后入心，犯中枢神经，骨痛麻木，疲倦，重则昏迷，四肢轻瘫，再过二小时咽部肿，呼吸困难，吐泡沫而死。

【诊断】 ①骨痛麻木。

②牙痕四个呈圆形（::），大小平均。

（八）鸡公蛇

【症状】 伤口有剧痛痒，浮肿，四至六小时渐向上波及，有发热发冷，倦怠，不愿讲话，十至十一小时病状加剧，咽部肿痛，吞咽困难，进入死亡状态，死后全身浮肿。

【诊断】 ①受伤后有剧痛的麻木疼痛。

②四至六小时后有怕冷怕热。

③牙痕呈楔形排列，前小后大，如圆锥形（▲▲）。

（九）百步金錢蛇

【症状】 有头晕，全身肌肉疼痛，伤口黑色，无肿而剧痛是特征，是蛇咬伤最痛的一种。一小时则四肢瘫痪，不能活动，四至五小时毒入心，有胸膈痛，气喘，四肢不能活动，瘫痪，声嘶，七至八小时毒发，人昏迷，呼吸困难，

窒息而死，全身浮肿。

- 【诊断】 ①头晕，全身肌痛。
②伤口无肿有剧痛。
③四至五小时全身瘫痪。
④牙痕左右有圆形牙痕一个，呈横状（…）排列，伤口黑色。

（十）天 蛇

- 【症状】 轻微痛，少浮肿，四至五小时痛加剧，渐向上蔓延，疼痛随时间而增剧，八小时后人烦躁谵语，昏睡，耳聋，四肢瘫痪，二小时后人昏迷，再过四小时死亡。

- 【诊断】 ①初微痛，后加剧。
②昏睡继而昏迷。
③牙痕呈圆形（○），附近皮肤有撕裂。

（十一）水雷炮蛇

- 【症状】 咬后过二小时伤口剧痛如刀割，无肿，有发冷无发热，四小时后四肢肌肉疼痛，丑至六小时后伤口浮肿且向上波及，八小时后昏睡，四肢不能活动，十至十二小时后昏迷气促，呼吸困难，有痰音，吐泡沫而死，全身发黑。

- 【诊断】 ①有痛，在伤后二小时才出现，无肿。
②有发冷无发热。
③肌肉肿痛。
④昏迷，四肢瘫痪，有痰音。
⑤牙痕上下各有四个小孔（::::），二小时后伤口有黑线连贯，附近皮肤黑。

(十二) 皮騰蛇

【症狀】 傷口有痒，三至四小時后有痛，隨即浮腫，麻木，五小時后向上蔓延，六至七小時后有咳嗽，八至九小時后下頷腫大，說話不清，十至十二小時昏睡，不能語言，氣喘，深呼吸，吐泡沫而死。

【診斷】 ①咬傷后傷口痒，六至七小時有咳嗽，后下頷腫大。
②牙痕品字形排列，是半月形（）。

各種蛇咬傷的牙痕比較

飯鏟頭蛇	...
青竹標蛇	八（扁長形）
鐵包金蛇	六
破基硤蛇	匚
三索綫蛇	::
鵝公蛇	八（牙痕扁細）
馬鬃蛇	::（大小平均）
鷄公蛇	▲▲（圓錐形）
百步金錢蛇	..（組織有深黑色）
天蛇	○（圓形）
水雷炮蛇	::::
皮騰蛇	 （半月形）

根据牙痕的距离估计蛇的体重长度

牙 距	重 量	长 度
1.5分	3两	8寸
2—2.5分	7两	1.4尺—1.5尺
3分	14两	1.8尺—2尺
4分	14两—1斤	2尺多
5分	1.5斤	3尺

应用药物说明

药 名

功 用

双眼龙	入筋骨；驱风毒。
独脚莲	去毒。
对面针	止痛，止血。
鸡骨香	散毒，去瘀，生新。
黑面神	去麻痹，止痛，行筋骨。
半边莲	清凉解毒，去风毒。
田基黄	去郁，宽筋，解热毒。
威灵仙	治内藏风邪。
风香叶	清凉，生新，散血。
半边旗	生新，散血，去瘀。
山檸檬	消肿，排脓。
大罗伞	止筋骨切痛。
波碌叶	入骨，解风邪。
柏子叶	解毒。
山芝麻	解毒，去热气。
波山麻	消毒，除痰。
行千里	宽筋活络，止痛。

老鴉胆

散毒，去骨热。

容胆草

解心肺毒。

牛 黄

化痰，止咳。

田 七

止痛，止血，解心中毒。

湛江 何晓生

治蛇毒驗方

【处方】 田 七 川貝母 細 辛 威灵仙 黃 芪 甘 草
波 薐 朱 砂 白 芷 滑 石

上药各等分，清水煎服。

【草药】 田基黄 墓松草 黄花鱼仔菜 半边莲 欖仔草

以上药口嚼吞汁，药渣敷伤口。青蛇咬加寮刁竹。

此驗方为高要县永安乡七十一岁蛇医师謝三才献出。

近二十年来，謝医师用上方治蛇咬，从来没有一例失败。

高要县

蛇 丸

【处方】 独脚莲 六月雪 雪花盖頂 田基黄 鸡骨香
鵬鵠米 清竹仔 水底白菜 两面針 韓信草
节节花 魚狗同 紫背金牛 大茶叶 九里香
上药各等分，研末为丸内服。

【說明】 新兴县刘夫应擅医毒蛇咬伤，四十年来成績卓著，并传授治蛇徒弟一百一十八人。刘夫应的治蛇咬方法，以内服为主，虽剧毒如百步金錢蛇咬伤，患者虽失去知觉，服上药

亦能救治。

江門专区

治毒蛇咬伤秘方

【处方】 七枝蓮 一两 独脚蓮 一两 黄 藤 二两 正姜黃 二两
半边蓮 一两 鉄門舟 三两 小号羊角扭 五两半
单鞭救主 二两 蒲壳藤 二两半 軟蒲对面針 三两

【制法】 上药研末为丸。

【服法】 冲酒服，每次服三錢。

【疗效】 此方系三代祖传，治愈患者难以計算，其中最危险的有五人，呼吸将停，后經服此药即愈。

湛江电白水东鎮 陈瑞华

蛇咬伤特效秘方

【处方】 野牵牛 一两 凉口蓮 一两 大青蛇 一两 散血丹 五錢
三脚蛇 一两 独脚烏 一两 五灵草 一两 承露盅 五錢
独脚絲茅 一两 长尾牛奶 五錢

【制法】 以上十味为末，用木薯粉糊为丸，每顆三錢，开烧酒成稀糊状，为涂敷剂。

【注意】 涂布患部周围皮肤，切勿涂伤口。

【治疗方法】 一、若患者被咬伤后，一至二小时感觉胸翳发热，伤口封閉，先用无菌針挑开口，再用艾茸姜片灸之。

二、若即时被咬伤，患处不见流血，伤口随即封閉，須照上法艾灸数天，使伤口开放，以免毒气內攻。

三、如患部附近皮肤紅肿，可用蛇蓉一至二兩，煲水洗，然后涂敷药丸。

四、如伤口潰烂腐臭，可用崩砂叶二兩，煲水洗，并趁溫貼敷患处，后涂敷药丸。

五、如伤口肿痒，可先用狗尾婆一两，开猪油敷患处，然后敷药丸。

六、如患部潰烂，并无別症，可用黃芩、黃柏、川黃連、滑石、雄黃各二兩，加三仙丹一錢半、川烏四分为末，撒布患处。

七、如被毒蛇咬伤，毒气攻心，可用黃連、甘草各三錢、金銀花六錢，清水煎，去渣，一次頓服，再飲清泉半碗至一碗。

【病例】 1952年韶关市中医师宋××被山藜蛇（即过山嵐）咬伤，經医院治疗，病勢增剧，头目眩暈，胸膈舌肿，不能呻吟，說話困难，神昏眼閉，病勢危急，深夜求治，用上药丸治疗后，頓觉舒适，繼續治疗一周痊愈。

韶关市 黃玉珍

治疗多种毒蛇咬伤秘方

本秘方公开后，經治疗毒蛇伤患者二十余人，均告痊愈。

【优点】 1.不論任何毒蛇咬伤，均可收到同等效果。2.产地广泛，容易找寻，如有金鎖匙，可用金鎖匙独味单方，沒有此药时，用三脚凳亦可收效。

【处方和制服法】 金鎖匙一两，将叶除去，舂烂，加酒二兩，口服一湯匙左右，余者搽伤口周围；症状严重者，加大黃

錢半、刁竹二錢、細辛五分。但加藥后，只能外敷，不可內服。小孩酌減。

如无金鎖匙，可用三脚凳代替，分量和用法与金鎖匙同。且用之搽手足，可防止蛇咬。

連平 林大欽

治疗毒蛇咬伤驗方

治疗毒蛇咬伤病人五十二例，全部治愈，效果显著，平均八至十二天可治愈。

(一) 內服藥

【处方】 患者先給以米酒飲至醉为度，或以酸醋冲烟筒垢少許服用，至患者嗅有臭味时即可停服。

【处方】 白 芷五錢 五灵脂五錢 北細辛二錢 川黃連三錢
黃 芩二錢 生梔子二錢 雄 黃(另末冲服)六分
痰多者加川貝母一錢半。

輕症服一剂，重症連服二剂，次服通血解毒散。

【处方】 通血解毒散：

生 地三錢 石苧蓆三錢 川黃連三錢 黃 芩三錢
黃 柏錢半 梔 子二錢 荆 芥錢半 防 風一錢
金銀花三錢 牛蒡子二錢 連 翹三錢 归 尾一錢
土桔梗三錢 煎服。

(二) 外用藥

【用法】 1. 蛇毒攻出皮肤痛时，用紫苏叶和盐擦患处周圍，汗

出即愈。

2. 患处紅腫不消时，用北細辛和两面針鹽共研末涂患处周围，但勿涂伤口。

3. 伤口閉口时，用蛤一只、食盐一錢，共捶烂外敷，創口即开。

4. 毒攻周身起水泡时，先刺出水，后用韭菜头与辣蓼各三两，白鬼灯籠藤半斤，共煮水洗之，并用熟石膏粉撒上，或开茶油外涂。

5. 蛇牙不出时，用白矾、生盐适量共捶烂外敷，蛇牙即出。

信宜上游人民公社卫生院

第十一部分 皮花科

一、麻 风 病

复方麻风片治麻风疗效显著

【处方】 复方麻风片：

石菖蒲二斤	天 麻二斤半	丁 香二斤
二 丑三斤	海桐皮五斤	木鳖子六点四斤
白 薇三点二斤	独 活三斤	朱 砂四两
白藓皮十二点八斤	五加皮三点二斤	田 七一两
黄 柏一点四斤	蒼 朮五斤	白附子五斤
白花蛇十点八斤	孩儿茶二点四斤	僵 蚕二斤半
苏 木三点二斤	川木瓜三点二斤	鍾乳石三点二斤
胡 麻六点四斤	桃 仁三点二斤	归 尾一斤
制草烏三点二斤	笠紅根一百斤	蝉 蛻二斤
全 蝎一点四斤	牙 皂二斤	川牛膝二点四斤
蒼耳子十二点八斤	升 麻二斤	沒 药二斤
皂角刺五斤	川紅花三点二斤	石南叶三点二斤
桑寄生三点二斤	笠黃根一百斤	大枫子肉二十斤

蒼耳子根 - 壹斤

【制法】 先将笠黃根、笠紅根、蒼耳子根煎水，其余各药共研末，調上药水制成丸剂。服法根据病情而定。

【疗效】 經观察三年，疗效达90%以上，稍潭医院已治愈四十六人出院。

全省許多医疗单位都用中药治疗麻风病，服用复方麻风片的病例就有二百多名，据了解均有显著疗效。现只将稍潭医院治疗的效果情况列表說明如下：

分 項	療 效 類 型 病 例 數	有 效		穩 定				惡 化					
		瘤 型		結 核 樣 型		瘤 型		結 核 樣 型		瘤 型		結 核 樣 型	
		病例	%	病例	%	病例	%	病例	%	病例	%	病例	%
臨 床		23	92.59	8	100	2	7.4						
細 菌		23	85.15			4	14.8						
病 理		22	81.48	8	100	4	14.8			1	3.7		
備 考		35例麻风病人中有27人是瘤型，8人是結核樣型。結核樣型病例，治疗前后細菌检查均为阴性。											

刘炳章

了哥王合剂治疗麻风病

【处方】 干了哥王根 五斤 大枫子肉 三两 川秦艽 四两
蒼耳子 四两 土茯苓 四两 当 归 四两 广陈皮 四两

何首烏四兩 蒼朮四兩 川烏三兩 川牛膝三兩
荊芥四兩 羌活二兩 桂皮二兩 菟絲子五兩
炒熟米粉十四兩

【制法】 用晒干了哥王根（切碎）五斤，加水二十五斤，煮煎五小時，約剩水六斤，將水倒出載起，再加水二十五斤和藥渣再煮五小時，約剩水六斤，將水倒出與前次煎好的液混合，再用微火濃縮為五斤半。其餘十四味中藥共碾成粉末，篩過，與了哥王液混和。將炒熟的米粉煮成糊狀配入，然後捏成丸劑，晒干備用。

【服法】 第一至第四周，每天內服10克，服六天休息一天，早晚用開水或米湯送下。

第五至第八周，每天內服15克，其他同上所述。

第九至第十三周，每天內服20克，其他同上所述。

第十四至第十七周，每天內服25克，其他同上所述。

第十八周以後，若病者情況良好，可酌情加藥至每天35克為止。

【注意】 1.服藥劑量，根據病者身體條件、年齡、病情進展等具體情況增減。

2.服藥時無特殊禁忌，一般忌酒、醋、辣、房事。

廣寧麻風病防治站

治麻風介紹

1.治療結核型麻風一例介紹：

患者王×，男性，20歲。患結核型麻風已兩年之久，用中藥磨風丸、萬靈丹、消風散輪流與服，治療十四個月痊愈。

2. 中西合并药膏外敷治疗麻风溃疡:

使用中西合并药膏, 第一号、第二号药膏治疗二十例麻风溃疡患者, 取得显著疗效, 十八例三至七天治愈, 二例无效。

【处方】 第一号药膏:

紅 丹 9 克	普魯卡因粉 15 克
甘 油 6 毫升	魚肝油 30 毫升
大枫子油 25 毫升	黄色素 0.5 克
复合維生素乙什 30 片	凡士林 100 克

【制法】 将紅丹、維生素乙什片研成細末, 凡士林用低溫溶化后加入大枫子油、甘油、黄色素、魚肝油搗勻, 最后加入普魯卡因粉。

【处方】 第二号药膏:

黃 連 9 克	黃 柏 9 克	鋅养粉 15 克
龙胆紫 3 克	大枫子油 25 毫升	黄色素 0.5 克
甘 油 15 毫升	石炭酸 1 克	消发灭錠粉 20 克
凡士林 100 克		

【制法】 先将黃連、黃柏研成細末, 石炭酸和凡士林搗勻用低溫溶化, 后加入大枫子油和甘油、黄色素、龙胆紫、消发灭錠粉, 最后和鋅养粉混合。

汕头市麻风专科医院

治疗麻风反应性皮肤炎方

【处方】 青蛤散:

蛤 粉 一兩	石 膏 一兩	青 黛 三錢	輕 粉 五錢
黃 柏 五錢			

【制法】 上药研碎混和，加花生油调成糊状，后加冷开水捣拌成为稀糊，涂患处。

【疗效】 青蛤散原是治黄水疮方，用以治疗麻风反应急性皮肤炎，流水不止者，搽后即愈，配合内服方，则效果更快。此方已治愈十八例。

廉江 戚培廷

治麻风反应方

【处方】 白藓皮 钱半 防 风 钱半 荆 芥 钱半 薄 荷 一钱
川 芎 钱半 蝉 蛻 钱半 归 身 二钱 生 地 三钱
独 活 七分 柴 胡 七分 紅 枣 二只 赤 芍 钱半

【服法】 加清水 500 毫升，煎成 300 毫升饮之。每日服一至二剂，三、四次痊愈。

【疗效】 此方原治赤白游风，用于治疗麻风反应效果良好，三十个病例服此方后症状消失。

廉江 戚培廷

治疗麻风反应方

【处方】 归 身 一至三钱 連 翹 一至三钱 金銀花 一至三钱
牛蒡子 一至三钱 生 梔 子 一至三钱 羌 活 一至三钱
白 芷 一至三钱 紅 花 一至三钱 防 风 一至三钱
甘 草 一至三钱 桔 梗 一至三钱

每味三钱为大剂量，每二钱为中剂，每一钱为小剂。

【用法】 大剂用清水 700 毫升煎至 350 毫升服，中剂用 500 毫升

煎至250毫升服，小剂用400毫升煎至200毫升服。

【疗效】 此方原治浸淫疮，但治麻风反应急性皮肤炎效果亦好。有十例用此方服一至二剂痊愈。

廉江 戚培廷

治疗麻风性神经痛方

【处方】 细辛二钱 吴茱萸二钱 威灵仙三钱 白芷三钱
甘草三钱 钩藤三钱 桂枝三钱 梔子二钱
川牛膝三钱 香薷二钱 当归二钱 苦参三钱
黄柏二钱 川黄连一钱 生地二钱 鹿耳苓三钱
苍耳子三钱

【用法】 用清水二大碗煎至一大碗，温服，每天一剂。另用珍珠末一分，每天睡前服一次，以滾水送下。

【疗效】 稍潭医院采用刘炳章中医师药方“行气活血汤”治疗三十九例各型麻风性神经痛，均获得治愈。一般用药一至二剂后疼痛大减退，二至四剂后可见到眉部神经抽痛大减轻，严重的服药一周便可逐渐痊愈。

广东省卫生厅

五根饮治疗麻风神经痛

【处方】 钉地根30克 埔银根30克 虎黄根30克 刺子根30克
穿山龙30克 煎水服用。

【疗效】 治疗二十例，十六例抽痛消失，三例减轻，一例无效。一般服一至三剂症状消失。此药有逐瘀退炎、通经活络、解

毒止痛之效。

汕头市濠院医院

解攀湯治疗麻风病早期垂足鷹爪

【处方】 炮山甲 三錢 荆 芥 錢半 防 风 二錢 紅 花 錢半
苏 木 一錢 羌 活 一錢 当 归 三錢 天 麻 一錢
蟬 蛻 錢半 白 芷 二錢 連 翹 一錢 骨碎补 三錢

【服法】 水二碗煎至一碗。每七天服藥一剂，早晚煎服一次，
在停服甌类药物及胺硫脲时进行。

經治三例疗效如下表：

病期及治疗前后比較表

病 期	治 疗 期	治 疗 前	治 疗 后	备 考
1 年	5 个 月	左脚垂足不便 行动	垂足恢复正常 行动无碍	
2 年	8 个 月	右手經变鷹爪 取物不方便	鷹爪消失，指 能恢复正常	
3 年	4 个 月	右手經变鷹爪 取物不方便	有好轉	沒有繼 續服藥

舒筋活絡湯治疗麻风垂足

新洲医院用中藥舒筋活絡湯治疗四例，一般服藥几剂后就觉
运动輕松，逐步恢复自由活动。

【处方】 黃 芪 五錢 党 参 五錢 当 归 三錢 川 芎 二錢
桂 枝 二錢 独 活 二錢 桑寄生 三錢 牛 膝 三錢
木 瓜 四錢 蒼耳子 四錢 熟 地 三錢 蒼 朮 二錢
秦 艽 三錢

【服法】 水煎服，二至三日服一剂，連服二十剂。

【病例】 黃××，男性，48岁。丁类麻风，于1957年3月右足开始下垂，足臑部不能举起，不能左右摆动，履不着足，运动障碍，行走困难，1958年7月开始用舒筋活絡湯治疗，二十余剂，就恢复正常。

治疗麻风足底潰瘍方

【疗效】 新洲医院采用蔡益泉中药方治疗麻风性足底潰瘍，經治疗三百八十六例，有效率达90%以上，一般經過三至五星期的治疗就生肌愈合。治疗藥物有外敷藥和內服藥，現分別介紹如下：

【处方】 外敷藥：

白芷四錢	黃連四錢	人中白三錢	烏賊骨四錢
乳香五錢	沒藥五錢	明矾四錢	象皮五錢
輕粉三錢	梅片三錢	龙骨五錢	

【处方】 內服第一方：

黃芪五錢	姜黃錢半	山慈姑錢半	金銀花四錢
皂角刺二錢	苏木錢半	归尾三錢	蘇皮三錢
黃連錢半	木通二錢	瞿麥錢半	甘草二錢
穿山甲二錢半	水煎服。		

【处方】 內服第二方：

桂枝二錢	桔梗二錢	川芎二錢	防風錢半
黃芪四錢	厚朴錢半	当归四錢	白芷二錢
党参四錢	甘草錢半	水煎服。	

【說明】 內服藥第一方，是以去脓消肿止痛为目的，若患者潰

瘍伤口疼痛，分泌物多，局部肿胀，可用此方治之，每二天服一剂，至肿痛消失为止。据临床经验，一般服药三至四剂后，肿痛即消失，分泌物停止。

内服第二方，是以促进肉芽新生为目的，若患者身体弱，且伤口大，病期长的，可以每四天服一剂，以促进肉芽新生，加速愈合。一般者可免服此方。

【注意】 内服药方，若病轻的可免服。治疗期间应注意休息，少劳动。愈合初期勿从事繁重劳动，应休息十五至二十天。伤口有腐败组织者，须先行外科切除。

广东省卫生厅皮肤性病防治处

中西药结合治疗麻风病溃疡

【西药处方】 10%的樟脑膏加80%的凡士林合成100克的药膏，作为外敷；每隔三天换药一次。

【中药处方】 白芷五钱 黄连二钱 乳香二钱
没药三钱 乌贼骨四钱 人中白二钱 象皮三钱
轻粉二钱 血竭三钱 梅片五分 龙骨三钱
共为细末，用甘油调匀外敷。

经过二个试点，共有二十七人，病期不超过五年的十五人，治疗痊愈时间共十八天，二十年以上的麻风病溃疡有十二人，经一个多月的疗程，五人已达到痊愈阶段。

治麻风病水肿方

【处方】 水翁树皮约一斤

洗淨，煎沸，倒在盆內，令皮肤感溫時便可洗患处。

【疗效】 此方治疗麻风病人水肿功效良好。在患部淨洗二、三次，便逐漸消肿，恢复正常。使用此方約有五十多病人。

东莞麻风病防治站

治麻风潰瘍方

【处方】 当 归 二两 松 香 八两 旧石灰（淨粉末）八錢
白芥子 五錢 萊菔子 五錢 凡士林 一斤 枯 矾 八錢
紅 花 四錢 猪 油 三两 血余炭 三錢 蜜 蜡 一两
白 芷 五錢 大枫子肉 三两

【制法】 先将凡士林、猪油、蜜蜡放在瓦盆內隔水 燉 足二小
时，然后把熟松香粉徐徐加入，随放随搅匀，再把各药研
末加入（白芥子、萊菔子后下），也要边放边搅匀，至各
药溶合为止，将药膏盆放在冷水內，才把白芥子、萊菔子
粉末加进去，搗匀便成膏。

【用法】 先把伤口洗淨，后敷上此膏，用消毒棉盖住，紗布包
好。若潰瘍沒有惡水，可以数天換一次药，否則要每天清
洁伤口，換药一次。

【疗效】 用此药膏治疗六十六例麻风病人的潰瘍，經過一年五
个月来观察，有四十五例患者完全痊愈。

【注意】 尽可能休息，以免沙石刺伤。要经常保持伤口清洁。
应当增加营养。切勿用未消毒的生冷水洗。

曾耀西

二、皮 肤 病

治汗斑驗方

- 【处方】 蜜陀僧一两 海螵蛸一两 硫 黄 五錢
共研細末，用生姜汁調成糊。
- 【用法】 用生姜切片点药揉擦患处。
- 【疗效】 曾治愈不少汗斑皮肤病患者。

桉树叶治疗神經性皮炎

- 【处方】 桉树叶約五两
- 【用法】 将桉树叶煲水五口盅，待热度适宜时，用作患部浸洗。
- 【疗效】 我的頸部曾患神經性皮炎，十数年来曾經各种治疗，未见好轉，且曾在汕头专区医院作詳細检查，診斷为頑固性神經性皮炎而进行治疗，均未效；后得友人介紹曾多次治驗的桉树叶作治疗，經過几次浸洗后，即好轉，再治一月痊愈。

方书成

治鵝掌風驗方

- 【处方】 韭 菜 二两 蓖麻子肉 一两
- 【用法】 韭菜切碎，蓖麻子去壳，共搗烂，以热飯和勻敷患处。

【病例】 姜××，男性，24岁。患两手掌发痒，两年不愈，敷此药痊愈。

广东省人民医院中医科

苦楝溶液治愈脓性皮肤病

【处方和制法】 苦楝叶一斤，水六斤煎沸一小时，冷后滤过制成。可用作湿敷、洗剂或浴剂（如制备貯用可加10%石炭酸5毫升作防腐剂）。經試用二十例，平均用藥六次痊愈。

治丹毒方

【处方】 酸杨桃三只 韭菜四两 菜豆四两 走馬风四两

【用法】 先将菜豆放水浸透后，和各药捣烂，挤汁涂患处。

【适应症】 游走丹毒，走馬天紅，各种肿毒疼痛。

【疗效】 治疗七例（其中有三例曾用过青霉素无效后用此方），好转二例，痊愈五例。

湛江专区

銀翹解毒散治疗皮肤敏感病

【处方】 銀翹解毒散方：

天花粉二錢 牛蒡子二錢 荆芥錢半 防风錢半
連翹三錢 金銀花三錢 赤芍二錢 甘草一錢
川黃連一錢 生地三錢 灯芯一束
清水煎服，成人每日二剂，小童一剂分三次服。

【外洗方】 加味道遙散：

风化硝一錢 赤芍五錢 赤小豆五錢 商陸六錢
枳壳三錢 側柏三錢 金銀花三錢 防風三錢
荊芥三錢
水七碗煎存三碗，乘熱洗患處。

海丰 曾岳庵

三、性 病

花 柳 丹

【处方】 青 矾 四兩 白 矾 四兩 牙 硝 四兩 水 銀 一兩
月 石（即礬砂）四兩

牙硝要選用縫衣粗針形長約二分，有晶瑩色者為佳。

【升丹法】 先將各藥置瓦鉢中，蓋碗，炭爐煮，待有沸水及氣
從鉢罅滾出，用石膏粉封密，水洒石膏粉使之略潤，約煮
八小時即有丹結成，原鉢取起冷卻，則鮮紅色的丹藥升在
碗內或有少數者在丹底的表面，宜注意檢視，用刀刮取，約
得丹藥一兩至兩半者為合度，鉢內者為丹底，取出研末，
并加黃連末治風濕爛腳（俗名為香港腳）甚效。

【服法】 以膠囊裹之順口吞下，五分為一服。

【注意】 此藥制成後，需要放置三個月之久方可服用，不然服
後必嘔吐、下痢或口爛，牙齒腫痛或出血，咽喉痛或聲
嘶，此是中毒，服綠豆水可解。

廣州中醫學院

第十二部分 妇 科

一、乳 疮 乳 痛

治疗急性乳腺炎方

我院拟訂的乳腺炎方，治疗患者三十三例，无一化脓或潰破，一般服药五天，局部紅肿疼痛及自觉症状均消失。

【处方】 蒲公英一两 連翹三錢 金銀花二錢 牛膝四錢
台烏四錢 赤芍四錢 当归三錢 穿山甲三錢
天花粉四錢 桔梗四錢 乳香(后下)三錢
清水四碗，煎至一碗之八分溫服。

广东省中医院

朴硝治回乳

我院治疗回乳采用了中药朴硝外敷，回乳效果甚佳，只要二十小时，乳汁吸收良好，并能預防乳腺炎。

【处方】 朴硝40克

【用法】 加入适量热水用药棉浸热敷。

江門专区第一人民医院

二、月 經 病

治疗經痛单方

【处方】 金不换

【服法】 每次三錢，一天二次，水煎服。

【病例】 罗×，中年妇女。經痛十年之久，其痛重时竟历十日不愈，經本地及广州某医院治疗未效。疼痛約三个月发作一次，后經服用金不换二天而痛止，随用海螵蛸三錢、茜草二錢、延胡索三錢、川棟子三錢、川厚朴三錢、甘草四錢，服两日即能进食，后服六君子湯数剂而痊愈，至今未见复发。

博罗 陈 裕

治疗經痛效方

我院采用协訂的“經痛方”，治疗各种因素所致的經痛一百七十五例，有效率97.14%。

【处方】 当 归 四錢 白 芍 三錢 延胡索 三錢 桃 仁 三錢
广木香(后下) 錢半 乳 香(后下) 錢半
水二碗半煎至一碗之八分，溫服，每日一次。

【疗效分析】

一百七十五例疗效分析表

致病原因 治疗效果	病例数	有 效 数			无 效	有 效 率
		痊 愈	卓 效	有 效		
精 神 因 素	118	57	47	14		100%
內 分 泌 因 素	17	5	5	7		100%
感 染 因 素	25		15	10		100%
器 质 因 素	12		5	3	4	66.66%
其 他 因 素	3		1	1	1	66.66%
总 计	175	62	73	35	5	97.14%
		170				

【說明】 1.器质因素十二例中，子宫发育不良者八例，子宫位置不正者二例，子宫肌病一例，子宫内膜增殖症一例。

2.其他因素三例中，子宫异位，营养不良，手术后遗症各一例。

3.一百七十五病例中有部分根据病情需要，除应用經痛方外，还加入其他中藥配合治疗。

【疗效标准】 痊愈——經痛消失。卓效——經痛显著減輕。有效——經痛減輕。无效——經痛仍旧。

广东省中医院

治閉經驗方

【处方】 月月紅根一两

【用法】 用生的月月紅根一两与猪瘦肉一同煎服，每日一剂，

連服數劑。孕婦忌服。

【病例】 邓××，女性，19岁。患閉經七个月，服一剂痊愈。

乐昌城关鎮中医师 丘潤芳

三、崩 漏

治崩漏驗方

本院中医科以崩漏固止湯加減治疗經漏九例，全部痊愈。

【处方】 崩漏固止湯：

山萸肉 五錢 淮 山 一兩 熟地黄 一兩 生龙骨 一兩
生牡蠣 一兩 炙升麻 二錢 益母草 三錢

【病例】 黄××，45岁。經漏二个多月不止，头眩，下腹部胀，口略干。

【疗法】 1.以原方去升麻、益母草，加藁本五錢、炙龟板一两。
2.上方去龟板、藁本，加当归三錢，此方服后經漏止，头仍眩。

3.再照上方加入天麻三錢、白芍三錢，此方服后經漏全止。

广东省人民医院

治产后血崩方

【处方】 高丽参錢半 大归头 一兩 烏 梅 三錢 酒白芍 三錢

黑荆芥錢半

用水煎服。此方是先輩口授，屢用收效良好。

徐聞縣錦和衛生院 郭景明

固本止崩湯加味治血崩症

婦人經血忽然暴下，若山崩然，謂之血崩，多屬脾胃虛損，氣不攝血所致，治法以固氣攝血為主。

【處方】 加味固本止崩湯：

黨參一兩 旧熟地五錢 當歸炭五錢 血余炭三錢
黑姜五錢 肉桂(沖)五分 祈艾五錢 黃芪一兩
京阿膠(烱化)三錢 土炒白朮八錢

水煎服。一劑即效，一般約服十劑可愈。

廣州中醫學院 杜明楨

加減膠艾湯治崩漏

【處方】 阿膠五錢 制祈艾八分 當歸炭四錢 川芎三錢
熟地一兩 白芍五錢 炙甘草三錢 高麗參五錢
用水煎服。

【典型病例】 李×，42岁。患經漏兩月多，一日，突然子宮出血，面白頭眩，心驚氣短，病勢沉重，用此方一劑，出血已減半，然後以此方加山萸肉一兩、龍骨一兩，連服四劑而愈。

廣州中醫學院 關濟民

四、子宮疾病

針灸治療子宮脫垂

黎咀醫院曾繁基醫生自1956年开始，使用針灸療法，合併服用首紅合劑，至1958年，共治療五十例子宮脫垂患者，除十八例只針灸一至二次即回家，症狀顯著好轉尚未痊愈外，其餘三十二例，均获痊愈。

【針灸治療子宮脫垂穴位】 腎俞 陽關 次膠 血海 三陰交 中脘 關元 中極 足三里

【首紅合劑方】 何首烏一兩 黃芪四錢 益母草四錢
白朮三錢 枳殼三錢 升麻二錢 當歸三錢
陳皮八分 大棗二只 生薑一片 水煎服。

治療子宮下墜驗方

採用當歸芍藥散加北芪、桂枝、附子，連服而治愈十一年子宮下墜症。

【處方】 川芎三錢 歸身三錢半 白芍三錢半
茯苓三錢半 澤瀉三錢半 白朮三錢半
北芪一錢 附子三錢半 桂枝三錢半
水煎服。

湛江专区人民医院

治子宮脫垂及脫肛驗方

【內服處方】 熟地三錢 柯子三錢 五味子一錢
升麻七分 白芍二錢 海螵蛸二錢 甘草一錢
水煎服。

【外用處方】 紅花五分 元明粉一錢 大梅片二分
文蛤錢半 大黃錢半 黃芩一錢 黃柏一錢
朱砂五分 黃丹五分

共研細末，取生青蒿叶盛此藥末，將子宮或腸頭托入。同時用紅蓖麻子一兩，去壳搗爛，敷頭頂中心百會穴，至子宮或腸頭縮入后，立即除去，敷前先将該穴部分头发剃去。

此法系何仁先生家傳秘方，經何氏五十多年來用上法治愈患者不下千人。

湛江专区

加味補中益氣湯治療子宮脫垂

根據經驗，用補中益氣湯加杜仲、赤石脂、五味子治療子宮脫垂有顯著療效。

【處方】 潞黨參一兩 白朮二錢 陳皮二錢 炙甘草二錢
杜仲三錢 蘇當歸五錢 升麻三錢 柴胡錢半
炙北芪五錢 赤石脂六錢 北五味錢半 生薑錢半
大棗三枚

水二碗煎至一碗之八分，渣再煎至一碗之六分。

【护理】 服藥宜空腹，服后宜安臥二、三小时，并将臀部及腿部用褥垫高。

汕头中医院 蔡仰高

治疗子宫脫垂方

蔣成佐同志下放到农村之后，在海康农村应用补中益气湯为主，治疗子宫脫垂二十一例，二十例痊愈，一例好轉，治愈率和有效率都很高。

用藥最多的十八剂，最少的三剂，使由三个月至二十五年的患者得以解除疾苦。

【处方】 黃芪六錢 党参五錢 当归五錢 陈皮二錢
生 姜三錢 炙甘草三錢 柴胡四錢 大 枣五枚
炒白朮四錢

【分量及加減】 根据患者病情及体質而配用，并适当加入杜仲五錢、川續断五錢、枳壳三錢、白芍五錢、熟地五錢、五味子三錢、淮山五錢、茯苓四錢、川芎三錢、天麻三錢、干姜二錢等藥。

广东省中医药研究委员会整理

枯矾丸治疗子宫頸糜爛

广州市紅十字会医院妇产科应用中藥枯矾丸治疗子 宫 頸 糜 爛，效果良好。

【处方】 枯矾丸：

乳 香三錢 沒 药三錢 黃 丹三錢 孩儿茶三錢

蛇床子 錢半 麝 香四分 白 矾十兩 硼 砂四分
雄 黃四錢四 硫 砂三錢半 冰 片三錢半
鍾乳石 四錢四 血 竭二錢半

以上藥制成丸八百粒，每次用一粒。

【用法】 月經完后五至七天，拭淨子宮頸表面粘液，用鉗子夾枯矾丸放入子宮頸糜爛處，外加棉塞一個，棉塞用粗綫系着，囑患者次日自行取出，禁性交，一周后復查，如未愈再次處理一次，經期及孕期禁用。每周二次，五、六次見效。

黃精治愈慢性子宮頸炎

【處方】 黃 精

【使用方法】 以棉球將阴道粘膜炎抹干，用雙氧水溶液蘸于棉簽上，放入子宮頸管，除去子宮頸粘液，再抹淨子宮頸管，以50%黃精液涂于子宮頸糜爛處（或以棉塞蘸50%黃精溶液塞入阴道內，但要注意与宮頸接觸），每日一次，連續六次為一療程，棉塞于四至五小時后取出。

【療效】 治療四十例的結果，患者白帶增加症狀消失，臨床有效率為：輕度子宮頸糜爛治愈率 77.78 %，中等度則為 79.17 %。

中山醫學院

五、子 癇

治子癇症效方

我院治疗子癇共六例，經中医科曾凡伟医生用羚羊角散、大秦芫湯，針灸配合，均藥到病除。

【处方】 羚羊角散：

羚羊角二錢	北杏仁一錢	薏苡仁一錢	防 风二錢
独 活二錢	川 芎二錢	木 香錢半	甘 草一錢
茯 神三錢	枣 仁三錢	归 身(后下)三錢	

【处方】 大秦芫湯：

知 母五錢	枳 实錢半	秦 芫三錢	石 膏五錢
川 芎二錢	白 芍五錢	羌独活錢半	防 风二錢
黄 芩五錢	白 朮二錢	熟 地三錢	茯 苓錢半
細 辛一錢	炙甘草一錢	归 身(后下)五錢	

【針灸穴位】 足三里 涌泉 阳陵泉 神門

【病例 1】 崔××，产前子癇入院，給予羚羊角散，加竹瀝一杯冲服，三小时后清醒，六小时后正常分娩，休养一周痊愈出院。

【病例 2】 张××，分娩过程中发生子癇，抽搐、高热、昏迷，合并肺水肿，由本院用封闭、硫酸镁鎮靜剂治疗无效，病情恶化，后用中药治疗，給予羚羊角散加双鉤藤五錢、竹黄三錢，服藥后二小时許，热度下降，血压正常，抽搐痰

涌制止，神志清醒，休养十天，痊愈出院。

【病例3】 丁××，产时子痫，經鉗产后仍昏迷抽搐，中医科用大秦芎湯和針灸，二十天治愈。

茂名县人民医院

六、妊娠疾病

治妊娠恶阻方

我院妇科以健脾化痰，順气和胃止呕养血为主，拟訂了妊娠恶阻方，疗效显著，从門診一百六十例观察，治愈的一百二十八例，服藥一至三剂，一般恶心呕吐停止，食欲增加，恢复工作。

【处方】 妊娠恶阻方：

法半夏二錢 薏仁八分 生姜三片 当归头二錢
柿蒂二錢 竹茹二錢 厚朴二錢 枳实二錢
白朮二錢 茯苓四錢 水煎服。

广东省中医院

七、小产及不孕症

“所以載丸”治习惯性流产

新訂“所以載丸”治疗习惯性流产九例，全部有效。

【处方】 党 参 四两 杜 仲 八两 白 朮 十两 桑寄生 六两
茯 苓 八两

【服法】 共研細末，炼蜜为丸，每服三錢。用以治胎漏、胎气
不长，均有良效。

高要县人民医院

治不孕症驗方

【处方】 川郁金 四錢 白 芷 五錢 白 朮 五錢
黃 柏 三錢二分 知 母 三錢七分 生 地 一两
白 芍 五錢 阿 膠 四錢 归 身 一两
泽 泻 三錢七分 地骨皮 五錢 牛 膝 三錢七分
羌 活 七錢 田 七 三錢七分 炙甘草 二錢
砂 仁 三錢七分 防 党 一两三錢 丹 皮 三錢七分
香 附 七錢半 熟 地 一两三錢 延胡索 三錢半
紅 花 三錢七分 川 芎 五錢 益母草 四錢
云茯苓 五錢 防 风 三錢二分 陈 皮 三錢七分
上药共研細末，炼蜜为丸。

【服法】 每服四錢，开水送下，每月于經前經后服二至三次。

此方来源：由一眼鏡店刘某所传，治不孕奇效，有种子丸之称，本人試用疗效很好，开业时会制备以供病人，后来更不少远地来买，亲試不孕多例有效。

广州中医学院 邓铁涛

八、其 他

黃連素治疗滴虫性阴道炎

試用黃連素制成栓剂治疗滴虫性阴道炎，并作追踪检查，結果如下：

【葯物剂量】 用硫酸黃連素及柯豆脂制成阴道栓剂使用，每枚栓剂2.5克，含黃連素0.25克。

【治疗方法】 每日以1：5000过錳酸鉀溶液冲洗阴道后，抹干阴道，放入黃連栓剂一枚，每日一次，連續六日为一疗程，必要时可作第二疗程。

【治疗效果】 痊愈的十三例，有效的五十二例，复发的十二例，无效的五例。

【痊愈标准】 自觉症状消失，阴道分泌无滴虫检查三次以上。

【有效标准】 阴道分泌无滴虫，但追踪未及三次。

【复发标准】 治疗后阴道滴虫消失，但追踪检查复发现滴虫。

【无效标准】 治疗后仍有阴道滴虫。

【体会】 黃連素治疗滴虫性阴道炎有一定疗效，絕大部分病例經治疗后症状消失，阴道分泌无滴虫发现，无效和复发的均未能按医嘱坚持治疗。

大蒜治疗阿米巴阴道炎

佛山专区第一人民医院使用大蒜治疗溶組織性阿米巴原虫性

阴道炎，疗效很好。

【处方】 大蒜头

【用法】 将大蒜头去皮切碎取汁，加水一半成50%溶液涂入阴道，十五分钟后，用盐水拭去，每天一至三次，显效为止。

佛山专区

外用烟熏法治疗妇人产后风瘫

陈宇平医生用烟熏法治疗风瘫患者百例以上，效果显著。

【处方】 雄黄末 八錢 吳茱末 四錢 干姜末 八錢 艾 茸 五两

【制法】 将雄黄、吳茱、干姜三种粉末和艾茸調合备用，名为“药艾”。

【用法】 每天用五錢，将药艾放一鉄罐中，用火燃之出烟熏膝后，距膝后約三寸高，膝上盖一方布，免被风吹散烟力。

【病例】 黄××，女性，36岁。产后双足风瘫无力，不能步行，依法熏之，六次痊愈。

第十三部分 小儿科

一、急慢惊风

小儿癫痫症治驗

魏老婆婆几十年来以中药及手术，治愈不少小儿癫痫症，治法如下：

【手术部位】 1.肘关节内侧，2.前后腋窝线上，3.颈上端两侧，4.膻窝部。

【手术操作】 以右手大拇指与食指按上列次序在该部一提，即发痛而哭，精神顿爽。

【内服药散】 郁金二钱 黄芩二钱 羌活二钱
朱砂二钱 柴胡二钱 川芎二钱 天竹黄二钱
龙胆草二钱 共研细末。

【服法】 一至二岁每次五分，一日四次。

【禁忌】 乳母忌食香、辣、霉、腥等物。

【外用药散】 梔子五钱 桃仁一两 杏仁五钱
共研细末。

【用法】 1.取桃叶七片，生姜五钱，生葱头连须五根，黄酒少

許，以布包裹，擦小儿背心、两腋窝、腋下，两手和脉門以及两臑窝部，擦后以被盖上，使体溫和。2.若有发热，則取上药粉五錢和糯米粉一两、鸡蛋白一个搓成餅，貼于心窝部，貼时須在小儿两腋窝部提几下貼上。

南雄县

七岁小孩昏迷抽搐四十六天得救

【病例】 鄺××，7岁。恶寒发热，口吐白沫，四肢抽搐，大小便失禁，經英德医院及中山医学院第二附属医院用西法治疗无效，后請我院进修部(当时是省进修学校)教师会診，中西医合作下，結果使昏迷抽搐四十六天的病儿挽救过来，最后由中山医学院第二附属医院中医科繼續治理，月余痊愈出院。

【处方】 前期服下方加減：

生龙齿 两半 双鉤藤 五錢 地 龙 三錢 云茯神 三錢
川菖蒲 八分 天竹黄 三錢 淡全蝎 二錢 紫雪丹 三分

【处方】 中期(此时已醒，但痴呆)服下方加減：

潞党参 三錢 生枣仁 三錢 云茯神 三錢 远 志 二錢
胆南星 三錢 菖 蒲 二錢 淡全蝎 三錢 猴枣散(冲)一分

【处方】 后期(此时已能行走，能說話会笑，但視物不清)服下方加減：

防 党 四錢 白 朮 三錢 云茯苓 四錢 炙甘草 二錢
黄 芪 三錢 归 头 二錢 熟 地 四錢 白 芍 三錢
菖 蒲 七分 远 志 二錢 柏子仁 二錢

广州中医学院

二、鎖 喉 風

金鎖匙治療新生兒破傷風

【病例】 張××，生後三日，發熱，牙關緊閉，目呆視，呼吸困難，時而頭向後仰，如抽噎狀，手足抽搐，腹脹而硬，神志昏迷，不啼不哭，此即“鎖喉風”（新生兒破傷風的俗稱）。服金鎖匙後各症俱解，調養而愈。

【處方和用法】 金鎖匙約五錢，搗爛，清水一盅，煎取八分，以一半拭口內，撈出痰涎，余一半，少量頻頻內服。

七日鎖喉風驗方

梁劍波中醫師用崔景山加味木萸散救治新生兒破傷風兩例，服藥三帖，即能吮乳，十一天痊愈。

【處方】 川木瓜 三錢 川貝母 一錢 吳茱萸 錢半 僵 蚕 七條
甘 草 五分 全 蝎 三個 蜈 蚣 一條 細 辛 五分

【用法】 共為粗末濃煮，用滴管吸藥液滴注內服，一天兩劑。
一例加豬胆汁三天，一例因發熱加川黃連、天麻，均研細煎煮。

高要縣

三、小兒麻痺

治療小兒麻痺效方

我院林澄庄医生从1957年开始系統地研究治療小兒麻痺症，對該病的急性期和后遺症都有顯著的效果，特別是对后遺症效果更好。

療效分析表

性別 \ 例數	痊 愈	著 效	无 效	共 計
男	24	62	4	90
女	11	35	2	48
共 計	35	97	6	138
比 率	26%	70%	4%	100%

【痊癒標準】 1.動作正常，姿勢正常。2.患肢肌肉恢復。

【著效標準】 1.能站立，但不持久，姿勢不正常。2.行動有進步，但不正常。

【無效標準】 治療一個半月症狀無進步者。

【處方】 祛痿方：

防 己二錢 防 風二錢 威靈仙三錢 赤 芍三錢
 澤 瀉三錢 薏苡仁四錢 海風藤三錢 黃 柏三錢
 木 瓜三錢 葛 根三錢 甘 草一錢

【適應症】 早期小兒麻痺急性發作時，有發熱惡心、嘔吐，頸

痛或腹痛等症狀，或有痿軟的，脈象浮洪數，舌苔黃色或黃白色。

【處方】 復痿方：

北 芪八錢 茯 苓五錢 歸 身五錢 炒牛膝三錢
淮 山四錢 熟 地五錢 白 朮三錢 麻 黃七分
炙甘草錢半

【適應症】 後遺症有下肢或上肢痿軟無力或肩部痿軟無力，口眼喎斜等，脈象一般濡緩沉細，舌苔白滑，脈細數。如出現吞嚥困難時，則症甚危重。

【加減法】 1. 陰虧太甚，加鹿角膠三錢。2. 痿軟太甚，加虎骨三錢。3. 陽虛，加附子三錢。

廣東省中醫院

治小兒麻痺症驗方

茂名人民醫院中醫科治療兩例小兒麻痺，效果良好。

【處方】 犀角地黃湯加減：

犀 角三錢 丹 皮二錢 僵 蚕二錢 地 龍錢半
全 蝎一錢 龍胆草錢半 以水煎服。

【處方】 白附子一錢 天竹黃二錢 蟬 蛻三錢 天 麻三錢
白 芍三錢 全 蝎二錢 珍 珠五分 麝 香五分
僵 蚕二錢 胆南星二錢 牛 黃一錢 血 竭錢半
冰 片二分 朱 砂五分
共研細末，日服三分。

【處方】 虎潛丸 錢半 北 芪三錢 骨碎補 錢半

以北芪、骨碎补煎湯送丸服下。在治疗过程中，配合梅花針疗法。

湛江专区

四、百 日 咳

黃連治疗百日咳

我院采用中藥黃連治疗百日咳共一百三十二例，治愈的九十四例，好轉的二十三例，平均治愈日程八至十一天。

【处方】 黃 連

【制法】 將黃連做成煎剂。以黃連一斤，水3000毫升，煎至完全出味，濃縮成500毫升，即可备用。

【服法】 一岁以下日量为1—2毫升，每加一岁加服1毫升，分三次服用，最大日量不超过8毫升，服时加糖漿。

以两星期为一个疗程，如仍未愈可繼續半个疗程。

广州 邮电医院

民間驗方治疗百日咳

我院儿科門診最近以应用民間驗方百咳糖漿为主，并結合辨症加入本院的疏咳方、宁咳方、止嗽散等治疗百日咳，疗效尚称滿意。

【主方】 百咳糖漿（民間驗方）：

风栗干(連壳)二两 粟米須二錢 糖冬瓜一兩

加水煎至25毫升，作为一剂量，內服。

【副方】 疏咳方(应用于起病不久，风热外邪未清咳嗽)：

薄荷梗三錢 牛蒡子三錢 前胡三錢 桔梗二錢
北杏仁二錢 桑叶三錢 瓜蒌皮三錢 枇杷叶三錢
加水煎至50毫升，作一剂量。

【副方】 宁咳方(应用于热盛伤肺，痰稠黄)：

牛蒡子三錢 桔梗三錢 瓜蒌皮四錢 桑白四錢
黄芩二錢 馬兜鈴二錢 甘草一錢 北杏仁二錢
枇杷叶四錢

加水煎至50毫升，作一剂量。

【副方】 止嗽散(医学心悟方。应用于百日咳后期，体温正常，咳嗽痰稀，外邪已轉)：

桔梗錢半 紫菀錢半 荆芥穗錢半 白前錢半
百部錢半 陈皮七分 甘草五分
加水煎至25毫升，作一剂量。

【疗效】 二百例中，痊愈于十天內停止者70%，于十五天內停止者80%，均于十五至二十天內左右症状消失。

广东省中医院

养阴清肺湯治疗百日咳

【处方】 大生地一两 麦冬四两 白芍四錢 貝母四錢
薄荷二錢半 玄参八分 丹皮四錢 甘草二錢
二至四岁服三分之一，五至六岁服二分之一。

【疗效】 服药七、八服，十例中有七、八例痊愈。

治百日咳效方

【处方】 麻 黄 三錢 細 辛 一錢 法半夏 三錢 射 干 四錢
款冬花 四錢 五味子 四錢 紫 菀 四錢 生 姜 三錢
大 枣 五枚

【疗效】 該方在临床上治疗患者五十例，經過三至五天治疗可痊愈。

伍秉衡

天冬合剂治百日咳

用天冬合剂治疗五十二例，証明除对早期百日咳有效外，用于晚期效果亦滿意。

【处方】 天冬合剂：

天 冬 五錢 麦 冬 五錢 化橘紅 二錢 瓜 薤 仁 二錢
法半夏 二錢 淨竹茹 二錢

【用法】 用清水一碗煎成四分，再复渣用清水一碗亦煎成四分，二次煎液混合后服。一至三岁分四次服，四至五岁分三次服，六岁以上分二次服。每天服一剂，可連服三至八剂。

【加減法】 痰多加萊菔子、泽泻、白芍、山药各二錢；呕吐頻繁者用伏龙肝五錢，泡化澄清用此濾液煎药；鼻衄及咳血者，加藕节及茅根各五錢。

广州市第三人民医院

加味麻杏甘石湯治小兒肺熱咳喘

- 【處方】 石 膏 一兩 麻 黃 二錢 北杏仁 四錢 甘 草 二錢
葶 藶 三錢 射 干 三錢 黃 芩 三錢 瓜 蘤根 四錢
- 【服法】 水煎服。此方為二歲至五歲分量，連服二天。
- 【療效】 一百五十八例中，治愈一百四十二例。

小兒肺炎效方

- 【處方】 桔 梗 一錢 白 前 八分 貝 母 一錢 荊 芥 一錢
青 蒿 一錢 天 冬 一錢 知 母 一錢 地骨皮 一錢
瓜 蘤仁 一錢 牛 蒡子 八分 款冬花 一錢
- 【服法】 上藥採用提煉中藥，加水15毫升為小兒一歲劑量，一日三次分服，年齡稍大酌加。
- 【療效】 本院採用上列合劑治愈小兒肺炎不下一千例，療效迅速良好，無副作用。

靈山縣丰塘衛生院

五、小兒久熱不退

治療小兒夏季熱效方

本院治療小兒夏季熱共十二例，效果顯著，療程五至八天痊

愈。

【处方】 加減清暑益氣湯：

西洋參錢半 淡竹葉錢半 蓮 梗二錢 甘 草一錢
西瓜皮二錢 知 母錢半 石 斛一錢 白 薇二錢
水煎服。

【处方】 加減清絡飲：

鮮蓮梗二錢 川銀花錢半 西瓜皮二錢 南豆花二錢
淡竹葉錢半 青 蒿一錢 白 薇二錢 甘 草一錢
水煎服。

【病例】 馬××，2岁。持久发热二十三天不退，夜間熱甚，
體溫持續38—39℃左右，食欲不振，體重減輕，煩躁不
寧，口渴，小便黃，脈數，中西醫診斷為小兒夏季熱，先
用加減清絡飲服二劑，症狀減輕，再用加減清暑益氣湯去
知母、淡竹葉，加糯稻根三錢、生谷芽三錢，連服四劑而
愈。

廣州中醫學院

治夏季熱驗方

本院張竟成醫師採用自訂的“地骨知母湯”先後治療夏季熱
十五例，取得滿意效果。

【处方】 川地骨三錢 知 母三錢 連 翹三錢 梔 子三錢
金銀花四錢 綿茵陳四錢 檳 榔二錢 山楂肉三錢
麥 芽四錢 丹 皮三錢 甘 草二錢

【加減法】 大便秘結加生大黃三錢、枳實二錢；便溏或泄瀉去
梔子，加薏苡仁五錢、木通二錢；小便短黃加薏苡仁五錢、

木通二錢、滑石三錢；口渴甚加生地黃四錢、生石膏五錢、川石斛三錢。其餘隨症加減。上方是一般用量，小兒酌減。

廣州 郵電醫院

治小兒久熱不退驗方

本院治療小兒久熱不退四例，皆在發熱期間曾用合霉素、金霉素治療無效，轉服中藥後二、三天即行退熱痊癒。

【處方】 蟬 蛻 一錢 雙鉤藤 二錢 生白芍 三錢 地 龍 錢半
淡竹葉 錢半 薏苡仁 三錢 小木通 錢半 小環釵 錢半
水煎服。

廣州市工人醫院

六、腸 胃 病

苦瓜藤粉治小兒腹瀉

根據民間經驗，用苦瓜藤治小兒腹瀉，結果証明療效優越。

【處方和制法】 將苦瓜藤用清水洗淨除根，掛在室內陰干，干後用慢火炒過或焙脆研末，過篩備用。

【用法和劑量】 兒童每次 2—5 克，若無效隔六小時再服一次，直至有效為止。此藥性溫和，雖大量及多次服用亦無副作用。用開水送服。

黃連酊灌腸治嬰兒腹瀉

我院采用市售黃連酊灌腸，治療流行性嬰兒腹瀉四百三十四例，獲得驚人療效。

【處方】 黃連酊

【用量】 六個月以下，1—1.5毫升，一日二次。

七個月至一歲，1.5—2毫升，一日二次。

一歲至二歲，2—3毫升，一日二次。

有嚴重脫水症狀時，應予適當補液、強心、給氧等。

防城縣人民醫院

七、其 他

普濟消毒飲及消癰丸治療腮腺炎

我院治療腮腺炎（瘡腮）五十例，採用“普濟消毒飲”及“消癰丸”二方加減，療效良好。95%病例均在五天內體溫恢復正常，局部腫痛消失而愈。

【處方】 普濟消毒飲：（李東垣）

黃 芩 五錢	黃 連 四錢	玄 參 三錢	甘 草 二錢
桔 梗 二錢	柴 胡 三錢	陳 皮 二錢	馬 勃 二錢
連 翹 二錢	薄 荷 二錢	僵 蚕 一錢	板藍根 二錢
升 麻 二錢	鼠 粘子 二錢		

【处方】 消癰丸：

浙貝母 四兩 玄 參 四兩 牡 蠣 四兩

上藥研末，蜜煉為丸，每服三錢，每日服二服，開水送下。

廣東省中醫院

雄艾烟熏法治小兒肛瘻

【雄艾藥條制法】 用藥棉剪成長方形，將雄黃末密撒于棉上，然后把艾茸平均鋪撒于雄黃面上，再加一層雄黃于艾上，以麻紙卷成條，密貯待用。

【改進綠雲膏】 此乃“醫宗金鑑”里所記的綠雲膏，去松香換蜜蠟，去豬胆加牛胆和羊胆，加重川黃連。

【病例】 黃××，4歲。染肛瘻通腸，用雄艾烟熏法治愈，二年未見復發。

【療法】 先將瘻口用0.5%的碳酸水或雙氧水洗淨，用藥棉拭干，按瘻口粗細，用化腐護口藥綫插入，初入極少藥綫，逐日進深，約二至三天停止用藥綫；再以苦參、槐角子煎水熏浸，約半點鐘，再用梅片和石膏幼末和凡士林為軟膏敷好，用膠布固定，三天後腐肉和瘻管自然脫落。每日洗淨，拭干瘻口，每天用雄艾藥條烟熏約十餘分鐘，貼改進的綠雲膏一星期，患口愈合不再發。

江門市中醫院

第十四部分 五官科

一、眼 科

治結核性結节性巩膜炎方

【处方】 桑 白 五分 連翹壳 五分 生 地 一錢 麦 冬 二錢
玄 参 五分 木 賊 五分 防 风 一錢 荆 芥 一錢
白 菊 五分 蒙 花 二錢 白蒺藜 五分 蝉 蛻 二錢
清水煎服。

【处方】 甘 菊 一錢 蒙 花 五分 木 賊 五分 桑 白 二錢
柴 胡 二錢 梔 子 一錢 蒺 藜 五分 赤 茯 苓 三錢
玄 参 三錢 防 风 一錢 荆 芥 一錢 青 葙 子 二錢
天花粉 五分 蝉 蛻 二錢 清水煎服。

【处方】 甘 菊 一錢 蒙 花 五分 木 賊 五分 桑 白 二錢
柴 胡 二錢 梔 子 一錢 蒺 藜 五分 赤 芍 五 分
赤 茯 苓 二錢 玄 参 二錢 荆 芥 一錢 青 葙 子 二錢
天花粉 五分 蝉 蛻 二錢 麦 冬 五 分 防 风 一錢
关沙苑 一錢 石决明 一錢 夜明砂 一錢 清水煎服。

【疗效】 湛江市张开光老中医，祖传四代专治各种眼疾，历年

来，附近各地就医者甚众，其中患有頑固难治的而經张先生治愈者已达一千六百多例，最近专区医院杨同志，因患結核性結节性巩膜炎极严重，經医院用尽各种疗法无效，后轉由张老医生用上列葯物迅速彻底治愈。

湛江专区

自救草治眼角膜白斑

【处方】 自救草

【用法】 取自救草五分捶烂，入梅片二分，敷在患者关脉（挠骨茎突）脉門之上，上面用貝壳盖好，用綳带扎好，敷二十四小时，取去，即愈。

【疗效】 經治三十多人，全部有效。

湛江专区

消障丸治疗翼状肉眼病

翼状胬肉眼病，在现在科学中唯一的是手术割除或用放射綫照射，而应用葯物彻底治疗甚为少见。江門专区第一人民医院采用中葯消障丸，得到显著疗效。

【处方】 消障丸：

煅石蟹	两半	蒺藜	两半	生地	五錢	熟地	五錢
关沙苑	一两	木賊	两半	丹皮	八錢	云茯苓	一两
夜明砂	一两	白芍	一两	薏仁肉	一两	蝉蛻	一两
淮牛膝	一两	泽瀉	一两	羚羊末	（后下）	一錢	
煅石决明	一两						

【制法】 上藥混和，研成細粉末，用蜜制成丸。

【服法】 每日兩次，每次三錢，早、晚飯後服。

江門专区

治疗夜盲症方

【处方】 夜明砂 五錢 楮實子 三錢 威靈仙 三錢 石 蟹 二錢
磁 石 二錢

【制法】 將上藥研末，裝罐待用。

【用法】 三至四歲每次服一錢，七至八歲每次服二錢。

上藥散用雞肝或豬肝煮湯送服。藥量則按年齡比例增減。

【療效】 輕者一次，重者三次可愈，治療三百多例，全部有效。

海丰 袁學勤

鵝不食草治疗眼翳

【处方】 鵝不食草

【用法】 將鵝不食草搗爛，用紗布包裹，塞患眼對側鼻孔。

【处方】 鋪地錦 蜜 糖 梅 片

【用法】 將鋪地錦搗爛，和以梅片、蜜糖，塗紗布上，貼患眼處。上藥均適量。二方同時用。

【療效】 海丰县紅草鄉竹圍村洪勝之母，曾用此法治療三百多例眼翳患者，90%以上治愈無復發。

海丰县

二、鼻 科

鼻淵的中藥療法

【症狀】 長流鼻涕如膿樣，有時流膿血，有臭氣，甚則不聞香臭，古名“鼻淵”，可能是今天的慢性鼻炎。

【處方】 藿香末 四兩 豬胆汁 八錢

【制法和服法】 先將豬胆汁煮熟，入藿香末做成小丸，陰干候用。每日服三次，每次服二錢，用白糖一兩和開水送下。

【禁忌】 服藥期間，忌食辣椒、酒、油炸物。

【療效】 療程為四至二十天。本人應用此方曾先後治愈三十二人。

清遠縣中醫進修班 何季甫

三、喉 科

八代祖傳治喉科秘方

【處方】 萬應療喉散：

川黃連	錢半	黃 芩	錢半	紅 花	錢半	豆 根	錢半
黃 柏	錢半	甘 草	錢半	血 珀	八錢	煨硼砂	一錢

元明粉一錢 雄黃四錢 朱砂四錢 麝香五分
梅片三錢 青黛四錢 牛黃一錢 煨人中白二錢

【用法】將上藥研細末，吹進患處，每隔二小時吹進一次。風火喉痛，以及各種急慢性喉症均效。

【處方】碧蓮散：

川黃連一錢 黃芩一錢 紅花一錢 青黛一錢
冰片一錢 煨硼砂一錢 元明粉一錢 血珀二錢
雄黃一錢 珍珠五分 麝香五分 煨人中白二錢

【用法】將上藥研細末，吹進患處，治喉痛、喉蛾、喉風均見效。

【處方】朱梅散：

血珀二錢 朱砂一錢 硼砂八分 雄精五分
梅片五分 甘草一錢 紅花五分 珍珠五分
牛黃五分 煨人中白錢半

【用法】將上藥研細末，吹入喉內患部，治喉疳、喉癰、白腐腫痛等喉症。

潮州公園第一門診部 吳楚材

治雙單蛾喉症驗方

【處方】山豆根 鬼面符 耳環草 雷公筋梗 紅倒勾筋

【制法】將上藥加黃糖少許搗爛，以布包如甘攪大，含于口中，連續含三、四枚，共約一小時即可，過久會使牙齒鬆動。

【內服藥方】生地四錢 紅花二錢 麥冬四錢

天花粉三錢 煨 苡一錢 金銀花四錢 連翹三錢

清水煎服。

【外用藥方】 鹿角草 鵝不食 雷公筋 紅車帶藤

上藥等量，煎湯外敷 若因腫痛影响頷關節開關時，
熱敷頷關節，無此症者則免。

【療效】 合浦縣福盛鄉陳家持先生祖傳此方，專治喉症數十年，治愈病人數以百計。

合浦縣

治鵝喉良方

【處方】 榕樹吊須 大兩 黑 醋一湯碗

【用法】 煎好含漱。

【療效】 曾經治三百余例，有效的二百七十多例。

廣州市華林街衛生所 鄧伯祥

祖傳萬應吹喉散

【處方】 白攪炭 三錢 燈芯炭 錢半 川連炭 三錢 胆 礞 三分
生硼砂 一錢 正梅片 五分

【用法】 各藥研末（煨燈芯炭勿煨成白色），吹入患部，二、三小時一次，重病每小時一次，每次用量二至三分。

三水 林品生

治喉痹重舌驗方

【處方】 攪山狗（切片曬干）約一、二錢 金耳環末

【用法】 先将攢山狗焯开水含漱，后用竹管吹金耳环药末入喉，并在少商穴上泄血。

【病例】 錫××，女性，30岁。于1957年7月患喉痹，用此方治疗一次痊愈。

（注：攢山狗又名盘龙草、九条龙）

乐昌县城关镇 李亚娇

鸡、鱼、猪骨梗阻咽喉验方

【处方】 浦芦草（又名二等栖头蛭、铁包金）一钱

千斤拔（又名牛参、白须公）六钱 沙 姜 三钱

硝 磺（或用爆竹药粉亦可）三钱 烧 酒 四两

【用法】 以上药物共捶烂，煨热烫敷患处颈部，烫敷时患者坐着，医者应鼓励患者仰首作颈部频频旋转，同时微作吞咽动作，正如鹅鸭吞食时之状。一般采用此烫敷约一小时，梗阻物即滑下。

如有红肿加蓖麻叶三钱，另用马鞭草、淡竹叶各二钱，煎水含漱。

【疗效】 上法是防城县江山乡中医师徐瑞文祖传治法，多年来治疗患者无数，未有无效者。防城人民医院曾有长约3.5厘米的鸡股骨梗阻咽喉病例，经西医用喉镜检查，多方设法未能取出，后用上法处理，约半小时，该骨即滑下。

湛江专区

祖传鹅喉方

【处方】 馬錢子（又名牛銀）三、四粒

【用法】 烧成炭研末篩过，与溫烧酒半杯飲之，即愈。

儿童医院 陈汉华

四、口 腔 科

中西結合治疗急性冠周炎

中医科和牙科合作，治疗十例急性冠周炎，获得良效，尤其是对抗菌素及磺胺过敏者，中西結合，能够解决治疗困难問題，迅速解除病者痛苦。本病十例，均通过会診或由牙科轉来，內服中藥，外部由牙科处理。

疗效如下三表：

一、退热（內一例无发热）

退 热 剂 数		平 均 剂 数
1 剂	2 例	1.9剂
2 剂	6 例	
3 剂	1 例	

二、消除颌关节障碍

消除颌关节障碍剂数		平均剂数
1 剂	1 例	3 剂
2 剂	4 例	
3 剂	2 例	
4 剂	1 例	
5 剂	1 例	
6 剂	1 例	

三、消除肿痛

消除肿痛剂数		平均剂数
2 剂	3 例	4.3 剂
3 剂	3 例	
5 剂	1 例	
7 剂	2 例	
9 剂	1 例	

【处方】 防风通圣散加减，改作汤剂，水煎服。

广州市第一人民医院

黄连治疗口腔疾患

【治疗病症】 智齿冠周炎、牙周膜炎、阿弗他性口炎、各型渗

出性紅斑、齦管病等。

【劑量和用法】 內服：採用黃連全碱，每天4克或8克，分四次服用，成人量計。

外用：①1—10%黃連碱性溶液。用法：沖洗齦袋或齦管，有時局部塗擦。②1：3黃連蜜糖，或以甘油代蜜。用法：口腔粘膜疾病患部塗擦。

【說明】 如冠周炎、各型滲出性紅斑等內服外用兼施。

口腔科疾患例數療效表

例 數	病 名	治 療 效 果		
		有 效	无 效	未 明
10	智齒冠周炎	7		3
7	牙周膜炎	3		4
1	牙槽肌腫	1		
1	牙周肌腫	1		
8	齦 管 病	6	1	1
4	阿弗他性口炎		1	3
1	唇部潰瘍(原因未明)		1	
總 計 32		18	3	11
百 分 比		56.2	9.4	34.4

中山医学院

第十五部分 針灸科

一、內科疾病

針灸治愈頑固的間日疟

【病例】 李××有疟疾史已七、八年，每年皆发作三数次，曾用各种抗疟特效药仍常复发。入院后半年内虽不断使用各种抗疟治疗，结果仍复发疟疾三次。最后发作时停用一切抗疟药物，改用针刺治疗，仅针五次，每天一次，疟疾截止，临床症状消失，验血无疟原虫，又经两年观察未再复发。

【取穴】 大椎 天柱 身柱

【配穴】 合谷 后谿 膏肓

【手法】 兴奋手法，入针后每隔三、四分钟捻转一次，予以数次的间隔性兴奋刺激。

广东省干部疗养院

針灸治愈間日疟疾

本院用針灸治疗疟疾四例，效果滿意，临床症状消失，迅

速跟踪检查，沒有复发。

【取穴】 大椎

【配穴】 膏肓 陶道 章門 脾俞 內关 間使

每次針后隔姜灸大椎七至九壯。

【病例】 張××，高热40.5℃，血片間日疟原虫+，施針一次体温正常，血片找不到疟原虫，共針三次痊愈出院，追踪已四年未有复发。

主穴：大椎。臥針四十分钟，并隔姜灸七壯。

配穴：脾俞。

注意：要在发疟前两小时施針。用重刺激手法。

广州 邮电医院

化脓灸疗治晚期血吸虫病

針灸治血吸虫病有效，本站根据試用化脓灸治疗十例晚期血吸虫病者，結果肝脏縮小六例，脾脏縮小八例，体征、血象、肝功能均有好轉。

【取穴】 痞根 左章門 左期門 中脘 膏肓(双) 脾俞(双)
足三里(双)

四会血吸虫病防治站

針灸治疗高血压

【取穴】 內关 曲池 肩髃 委中 足三里 期門 风池

上穴每次取二至三穴。用泻法，留針十五至二十分钟。

【疗效】 曾治疗四十七例，痊愈的三例，显效的十八例，进步

的二十一例，无效的五例。

【痊愈标准】 痊愈是针后血压降至正常，头晕痛症状消失，观察半年无复发者。

【显效标准】 头晕痛消失，血压降至接近正常。

【进步标准】 头晕痛减轻，血压亦下降。

【无效标准】 血压等症状无明显改善。

【病例】 王××，男性，70岁。头晕痛，血压检查208/126mmHg，经针刺一次后，血压已下降至188/126mmHg，头晕有减，针十九次后，头晕基本消失，血压下降至160/80mmHg，经观察半年无复发。

广东省中医院

针灸治疗哮喘病

支气管哮喘用针灸治疗一百一十二例中，有效率很高，其中有部分病例，未见复发，有些病例，虽有复发，但亦较原来症状减轻。

【常用穴位】 少商 合谷 喘息 肺俞 膻俞 璇玑 风门

【针法】 每次选用四至六穴，每天针一次，针至有酸麻感，留针十至十五分钟。

【灸法】 采用直接灸法，选穴亦以上述穴位为主，每次选用四至六穴，每穴灸三至五壮。

【疗效】 曾治疗一百一十二例，痊愈的二十一例，显著进步的五十二例，有效的三十例，无效的九例。

【痊愈标准】 治后经较长时间观察无复发。

【显著进步标准】 治后症状基本消失。

【有效标准】 症状减轻。

【无效标准】 症状无变化。

广东省中医院

針灸治疗肺結核

我院用針灸治疗肺結核病，一年半以来，共治疗四十八例，收到良好的效果。有些病例在抗痨葯物治疗下，病情未有好轉，或繼續恶化，經針灸治疗，病情有所好轉；有些病例对抗痨葯物有反应，不能使用，后用針灸治疗，病情得到进步。

針灸常规主要穴位和治疗日程表

星 期	一	二	三	四	五	六
上午穴位	胆俞 膈俞	膏肓 腰眼	胆俞 膈俞	心俞 肝俞	胆俞 膈俞	百劳 肺俞
下午穴位	三阴交	足三里	丰隆	上廉	下廉	涌泉

上表穴位每日針治二次，每次十分钟，每星期治疗六天，停一天，再按表上穴位治疗，三个月为一疗程。

广东省干部疗养院

針灸治疗胸椎結核

【取穴】 第一方：膏肓 大椎 肝俞 膈俞 委中

第二方：肺俞 长强 外关 足三里

第三方：骨节患处天应穴

【手法】 用重刺激烧山火手术，留針二十分钟，第一、第二方

用电針，隔日輪用，第三方每日針灸并用，十四天为一疗程，每一疗程間休息七天，共針灸三个疗程，可获治愈。

【疗效】 防城县人民医院針灸科曾用上法治愈胸椎結核患者多人，曾治疗两例，均經合浦专区人民医院及北海人民医院x光診斷，并拟用睡石膏床治疗，患者未同意而轉由該院針灸医治，經三疗程針灸后，患部平复，疼痛消失，脊椎俯仰运动等恢复正常，至今不复发。

湛江专区

二、外科疾病

針灸治愈甲状腺肿

【病例】 蔡××，女性，64岁。喉兩側肿大，已一年余，經中西医治疗无效，轉用針灸治疗二十二次痊愈，且經二年多无复发。

【手法】 在肿核部刺入毫針三至四支，在針柄上扎艾茸燃烧，使适度热力由針体透入患部，共燃烧五次为止。

【取穴】 肩井 天突 大杼 缺盆

如有并发症时酌加穴位。用26号毫針，强刺激，留針三十分钟。

大埔 张冠新

針灸治愈七年頑癬

江門专区德封县人民医院，試用針灸治一例七年的牛皮癬患者，針刺十二次，隔二、三天一次，一个月后患者手足部癬患尽除，表皮平滑，恢复原来肤色。

【取穴】 手——曲池 內关 外关 神門 太淵 勞宮
足——足三里 解谿 昆仑 商丘 太冲

針灸治愈蝎咬伤

我院收进二个蝎咬伤的病人，两个患者到急診室时都剧烈疼痛，呻吟不已，患指紅肿，全身出汗，当即針患側合谷，針刺后不到五分鐘剧痛漸止，到十分鐘完全止痛，十五分鐘后拔針，继按一般处理，以后即痊愈。

两例只針一側合谷一次。

广州市第三人民医院外科

三、神經系疾病

針灸治愈“舞蹈病”一例

“舞蹈病”是神經机能病的一种，患者曾在某医院留医，“舞蹈”依然。后轉本院用針灸治疗，經施針十二次，病愈。

【病例】 萧××，女性，15岁，学生。左手足不由自主持续性舞蹈样动作数月，手指象仰臥蟹爪运动，左肩不时跳动，左手无力，左脚亦不停跳动，但較手輕，膝关节微痛，走路时身体歪斜，左面部觉不舒服，精神痴呆，不愿讲话，飲食如常，大小便无异，經检查心肺无异常。

【取穴】 曲池 手三里 外关 少海 神門 阳池 下巨虛
膝眼 足三里 合谷

【疗效】 針灸第四次开始有效，“舞蹈”減輕，針至第十二次痊愈。距今一年多未复发。

广州市第一人民医院

針灸治疗面神經癱瘓

【取穴】 翳风 頰車 下关 外地仓 合谷 曲池 臁子膠
一般取面区患側的二、三穴，交替使用。

【手法】 采用补手法，进針后每隔二、三分鐘輕捻一次，留針五分鐘。

【灸法】 用艾卷或艾粒灸，或直接灸頰車、外地仓、合谷、曲池等穴，灸十分鐘，直接灸每穴三壯。

療效統計表

病 侵 犯 部 位		例 數	有 效			无 效	有 效 率
			痊 愈	显 效	进 步		
外 段	面神經顙外段	53	37	3	10	3	
	面神經管内	23	18	2	3		
	面神經核下位	7	2	3	2		
內 段	腦橋內左 側基底部	3				3	
	核上 位	2	1			1	
合 計		88	58	8	15	7	92.4%

【痊愈标准】 面神經癱瘓症狀完全消失。

【显效标准】 症狀消失，但在笑時口微歪。

【进步标准】 症狀好轉。

【无效标准】 針後症狀無改變。

广东省中医院

針灸治療顏面神經麻痺

針灸治療顏面神經麻痺六例，平均治療九次，最多針至十三次，即獲痊愈。

【取穴】 合谷(雙) 頰車 地倉 下關 承漿 水溝 瞳子膠

【手法】 患側輕刺激，留針五分鐘；健側重刺激，留針十分鐘。

高要县人民医院

羅定縣第二人民醫院

針挑療法治愈舌下神經麻痺

目前對舌下神經麻痺症用一般藥物不易治好，江門專區廣四縣四會人民醫院中醫採取針挑療法治一例舌下神經麻痺，飲食言語均困難，經針挑“喉一”及“喉四”二處六天，即恢復正常。

【喉一】 位於結喉之上相當於針灸廉泉穴。

【喉四】 位於甲狀軟骨旁胸鎖乳突肌前之凹陷處。

江門專區

針灸治療頸肌痙攣

頸肌痙攣為常見疾患，我院過去均用松節油外擦及熱敷等方法，須數天始愈，患者甚感痛苦；用針灸治療效果甚佳，大多數患者針一次頸部即能轉動自如，部分患者第二天再針一次即好，共治療五十四例，全部治愈。

【病例】 傅××，男性，27歲。左側頸及肩部痛已兩天，頭頸轉動困難，針患側天柱、肩井穴，強刺激留針十五分鐘，患者頭頸轉動自如，不痛。

【取穴】 天柱 肩井

【手法】 強刺激手法。

廣州市第三人民醫院

針灸治療風濕性關節炎

我院用針灸治療風濕性關節炎，有效率高達88.6%。

1.慢性风湿关节炎痛采用关节附近的腧穴或合谷，用泻法，留针十五至三十分钟，宜同时用艾粒直接灸。

2.急性发作并发高热者，宜选用关节远隔部分的腧穴或合谷，或配合药物对症治疗。

疗效 例数	有 效			无 效
	痊 愈	显 效	进 步	
598	193	208	129	68
比 率	88.6%			11.4%

【痊愈标准】 关节痛完全消失，恢复正常活动。

【显效标准】 关节痛完全消失。

【进步标准】 针后关节痛减轻。

【无效标准】 症状无改善。

广东省中医院

针灸点刺及吸杯综合治疗肌风湿

1.针刺及取穴：主要是取患区附近腧穴及配合取远隔腧穴，如腰肌风湿可取肾俞、委中……等，用泻针手法，留针十至十五分钟。

2.丛针点穴法（梅花针）：可在患区周围消毒后，广泛扣打使局部表皮中度充血为度。

3.艾卷灸疗法：用艾卷在患区悬灸十至二十分钟。

4.拔火罐疗法：在患区拔罐，以局部有充血为度。

例数 \ 疗效	治愈	显效	进步	无效	不明
726	242	225	209	22	28
比率	33.3	31.0	28.8	3.0	3.9

【治愈标准】 肌肉酸痛症状消失。

【显效标准】 症状消失間或微酸。

【进步标准】 症状有改善。

【无效标准】 症状无改善。

【不明标准】 治疗一至二次未来复診

广东省中医院

中藥結合电針治疗癥病

【內服处方】 甘麦大枣湯：

甘 草二錢 小 麦一两 大 枣三枚

水煎服，每日一剂。

【电針疗法】 針肩髃、肩井、心俞、曲池、手三里、三阴交等穴，輪流刺激各穴。

【小达松发木氏火花局部电疗法】 胸部、頸部，每次五至七分鐘。

每星期二至二十次为一疗程。

【病例】 翁××，女性，44岁。发病数年，精神障碍，每因微小事感情冲动，疑虑，忧郁不安，失眠，每晚只睡一至二小时，精神萎靡，屢治无效。汕头市熊士林中医师采用电針疗法，結合小达松发木氏电疗法，及內服中藥，

經過兩個多月的療程，獲得治愈，恢復工作。

汕頭專區

針灸治療癲癇

癲癇俗稱“羊癲風”，我院治療癲癇二十例，痊癒的三例，顯效的七例，進步的八例，無效的二例。

針灸治療法：

1.取穴以印堂、顳會、百會、風府、大椎、陶道、身柱為主。次要穴以鳩尾、內關、神門、足三里、中脘等穴為輔。每次取穴四至六穴。

2.針灸治療十次左右，大多數間歇時間延長，發作時間縮短，症狀減輕，必須堅持治療，直到長期不發作。

3.治療期間要增加營養，適當休息。

廣州市第一人民醫院

針灸治療破傷風

我院中醫伍士賢醫師，用針灸治療破傷風兩例，獲得奇效。金渡鄉大園夏××和鰲鶴王×患破傷風症，治療八天均告痊癒。

【取穴】涌泉 關元 肝俞 中脘 十宣（出血） 水溝 顳車 承漿 曲池 合谷 足三里 三陰交 地倉 風府 百會

共取十五個穴，一例還加針環跳、肩髃兩穴。

高要縣金渡鄉衛生院

四、妇儿科疾病

針灸治疗产后子癇病

【病例】 1958年11月10日，我院收进一个由北区第七妇幼保健站送来的产后子癇病人何×，当时患者处于深度昏迷状态，血压升至210/130mmHg，虽經各种方法救治，病情不见好转。經搶救后仍处极度昏迷状态，且病情不断恶化，直至12日上午，由針灸医生何友良会診，仅針一次，口吐白沫及喉間痰声均減，呼吸較前緩和，是晚第二次施針，手已能动。13日进行第三次施針后，病者已有痛感，且能自行咳嗽吐痰。14日病人神志开始清醒，能对答简单言語。15日进行第四次施針后，能自己行动，体温恢复正常。21日治愈出院。

【治疗】 俱用針刺。

【第一次取穴】 委中 涌泉 血海 魚际 天突 中脘 关元 中极 水沟 印堂

【第二次取穴】 卜宣 尺泽 水沟 百会 天突 上脘 中脘 关元 中极 足三里 血海 委中 合谷 印堂

【第三次取穴】 曲池 合谷 天突 印堂 上脘 中脘 大椎 气海 足三里(双) 血海(双)

【第四次取穴】 曲池 合谷 天突 中脘 上脘 关元 足三里

广州市第一人民医院

針灸治療產後乳汁分泌不足或無乳

浦北人民醫院常用此法為農村婦人解決產後缺乳問題，獲得良好效果。

【取穴】 以興奮手法針少澤、外關、膻中。

湛江專區

針灸能止血崩、嘔血

【病例1】 張××，男性。患急吐血，中西醫治療無效，針一次痊愈。

【病例2】 譚××，女性，25歲。患血崩，經內科醫生治療二晝夜無效，用針灸獨穴治愈。

【取穴】 勞宮

【說明】 用中刺激，留針一小時，血止後精神不佳，溫灸百會、足三里。

針灸治療肺結核病人閉經

【療效】 曾治療三例全部有效。其中一例曾經市內各大醫院治療均無效，來我院後，針灸一次，次日來月經，以後月經正常。

【取穴】 三阴交 归来 曲骨下穴（即曲骨穴下一寸）

【手法】 入針後以興奮手法，興奮後稍留針。

【針灸次數】 平均一次。

【效果】 針后平均一天，即來月經。

【病例】 李××，女性，33岁。右上肺浸潤型結核患者，半年來月經推遲，每來月經有腹痛，腹脹，兩下肢發酸，有子宮頸糜爛，白帶增多已兩年，近期月經逾期八天未來。

針雙归来、曲骨下穴。針后当晚即來月經。

广东省干部疗养院

針灸治愈多年子宮脫垂

我院中医科从1956年开始用針灸疗法先后治愈子宮脫垂十五例，其中一例已十年，經針灸二十次即愈，現已二年，并再婚且妊娠。

【取穴】 关元 气海 百会 足三里 委中 腎俞 八髎 三阴交 白环俞

湛江专区人民医院

針灸治疗小儿麻痺后遺症

广东省中医院針灸临床处理

【取穴】 上肢：曲池 合谷 內关 肩髃 臂臑 阳池 外关
下肢：环跳 腎俞 阳陵泉 风市 委中 足三里
三阴交 秩边

【手法】 上穴每次取三至四个，交替使用。采用补針手法，一般进針后捻轉十五至二十秒可繼續进針。

【疗效】 曾治疗四十五例，痊愈的十四例，显效的十三例，进

步的七例，无效的三例，不明的八例。

【痊愈标准】 瘫痪肢体完全恢复正常，能步履如常。

【显效标准】 肢体活动恢复正常，但微障碍乏力。

【进步标准】 症状有改善。

【无效标准】 针后症状无改善。

广州市第二人民医院疗法

【主穴】 大肠俞 环跳 委中

【配穴】 风市 阳陵泉 悬钟 解谿 昆仑 丘墟 足三里

阴市 箕门 太谿 中封 三阴交 阴陵泉

针灸治疗小儿麻痹后遗症

【取穴】 采用麻痹肢体的关节部穴位及脊中的大椎、命门、腰阳关等穴，轮换使用，主用针刺辅以灸治。

【手法】 捻转进针后，轻捻经十五秒钟即出针。

【疗效】 曾治疗三十五例，痊愈的四例，显著好转的九例，好转的十三例，不明的九例。

湛江专区

针灸治疗小儿喘息

我院针灸治疗小儿喘息六十三例，止喘作用迅速确实，大多数患儿在针后十五分钟后，即可止喘安睡。止喘作用达95.4%。部分患儿吸氧及用肾上腺素、可待因等无效，改用针灸即消除喘息。

【取穴】 列缺 太渊 合谷 大椎 大抒 肺俞

【手法】 針与灸同时进行，每次在背部灸十分鐘，即在孩手扎針，中度短暫刺激，不留針，每次三、四个穴位。隔日一次，以五次为一疗程，在发作时施术，疗效更高。

中山医学院

五、泌尿系疾病

針灸治疗膀胱过敏症

【病例】 张××，男性，8岁。无血尿病史，尿数少，食欲减退，日漸消瘦，經医无效。針刺一次，翌日尿頻数恢复正常，再未复发。

【取穴】 关元 中极 三阴交(双)

【手法】 采用泻法，强烈捻針，留針二十分鐘。

中山医学院

針灸治疗急性胆囊炎

过去治疗急性胆囊炎时，需要禁食、补液，足量止痛剂及大量抗生素。我院曾經选择二例試行針灸治疗，二例均有发热，胆区压痛，白血球升高，应用針灸后，一例三天，一例五天痊愈出院。

【病例】 李×，男性，成人。急性胆囊炎三天入院，白血球20000，发热38°C，右上腹有肿块压痛，入院后即行針

灸：大腸俞、胆俞、肝俞、合谷。每天三次，第二天腹痛減少，壓痛仍有，食欲开始好轉，繼續針灸三天，腫物消失，腹痛亦消失。

中山医学院

針灸治疗夜間遺尿

我院采用針灸治疗夜間遺尿九例，三例完全治愈，六例效果显著。其中有的病例夜間遺尿已达十年以上。

【病例1】 黃××，男性，13岁。从小患夜間遺尿症，严重时一个晚上竟遺尿三、四次之多，屢經中西醫治疗均屬无效，后由本院采用針灸治疗，取穴：关元。不留針，仅刺激数下，立即起針。此后遺尿次数即漸次減少，后来針后加灸，效果更为显著，經一年来观察，遺尿已完全治愈，仅睡前飲水过多时，間有遺尿而已。

【病例2】 蔡××，女性，20岁。自小患遺尿症，每晚遺尿，严重时，达三次之多，屢經中西醫治疗均无效，經人介紹来我院門診，試行針灸治疗，逐步好轉，經三周治疗后，已不再遺尿。

【取穴】 关元 三阴交(双)
留針十五分鐘。

广州市第三人民医院

針灸治疗尿瀦留

許多产妇在分娩过程中，由于产程延长，产后往往并發尿瀦

留，殊感痛苦，我院施用針灸治疗共二十九例，临床效果良好。

1. 針灸治疗次数平均一至二次。

2. 尿潴留消失時間平均一天零十小时。

3. 針灸有效穴位为血海、中极、膀胱俞、八髎、三阴交、关元等，作中度刺激，留針十五分钟。治疗一般以骶区、下腹穴位作为直接刺激，腿部穴位作为远隔刺激。

4. 腰骶区以梅花針浅刺激取兴奋。

江門专区人民医院

針灸治疗产后尿潴留

【病例】 初产妇柯××，产前阴道流血，用鉗产下，但产后四天未能自行小便，服药无效，轉用針灸治疗，針后二小时即能自行小便。

【取穴】 曲骨 横骨

【手法】 捻轉搗針法，留針十五分钟，每隔五分钟进行捻轉搗針一次，約三至四搗。

广州市人民医院中医科

針灸治好两年不辨香臭的慢性鼻炎

【病例】 苏××，女性，36岁。两年来左右鼻孔經常交替閉塞，均不辨香臭，常引起左侧头痛及左胸痛，长期在某医院用西药治疗未见收效，后經中医以針灸为主，服中药为輔助治愈。

【取穴】 初期取迎香、阳白、攒竹、太阴、合谷，針后左偏头

痛及左胸痛消失。第二步取迎香、頰車、禾膠、合谷、曲池等穴。

【藥物】 补中益气湯为主，以沙参、玉竹、蒺藜、蒼耳子、天麻、薄荷等味加減內服。

【療效】 在本所治疗后，曾將香皂靠近患者右鼻孔，已嗅到香味，此后两鼻孔已通，有鼻液分泌，漸能辨別香臭。

广州市北区解放中卫生所

六、五官科疾病

針灸治神經性耳聾

我院耳科自1957年起应用針灸疗法治疗神經性耳聾五十二例，有效的四十例。这些病例有些已失去听觉，有些要在耳旁大声講才能听见，針刺后，談話时对方不用提高声調也能听聞；有些病例只听见声响，但不知別人說什么，針刺后就能听清楚所說的内容。

【取穴】 翳風 听会 听宮 合谷

一般針刺六至十次时发生效果。

广州市第二人民医院

針灸治愈聋子复聰

聋哑是一向認為无法治疗的，我院用針灸治疗七十五例，收到显著效果。

【主穴】 听会 听宫 翳风 廉泉 哑门 合谷

【配穴】 曲池 涌泉 风池 大椎 足三里

【灸穴】 听会 听宫 百会 大椎 肾俞

每次取主穴两个，配穴一个，并直接用艾粒灸一至二穴，交替使用。

【手法】 用补针手法，进针后留针二十分钟，每隔四至五分钟捻针一次，每次十至二十秒。

隔日针一次，二十次为一疗程。第一疗程满，隔两周再作第二疗程，共针两个疗程。

疗效统计表

病 因	例 数	显 著 进 步	进 步	无 效	有效率
脑 炎 后 遗	26	3	12	11	
高 热	10	1	7	2	
麻 疹	7		2	5	
伤 寒	2		2		
中 毒	1		1		
病 后	19	2	7	10	
中 耳 炎	2	1		1	
先 天 性	2		1	1	
原 因 不 明	6			6	
总 计	75	7	32	36	52%

【显著进步标准】 治疗前听力消失，检查全聋，治疗后能在背后一至七米外听到声音，并能把语言内容复述出来。

【进步标准】 治疗前听力消失，治疗后能在背后听到说话声，

并能說出語言內容。一般听力較前进步。

【无效标准】 經針灸后无改善。

广东省中医院

針灸治疗失語症

【病例】 陈××，头部受重伤，半身不遂，已不能講話十五天了，經我院外科診斷为顱骨粉碎，即施行手术，不久即恢复了肢体活动，能下床行走，但仍不能講話。針灸科会诊，仅針刺一次，第二天即能开口講簡單詞句，繼續針灸五次已恢复了語言能力，并可讀書报。

【取穴】 哑門 风府 廉泉 天突 通里

广州市第一人民医院

針灸治哑吧二例

【病例1】 黃××，4岁。一向不会說話，二岁期間，发单音，但字音不清楚，針刺第二次后，即可发“好痛呀”“阿姨、娃娃”“要食飯”等字句；針刺十次后，发音流利自然。

【病例2】 杜××，女性，6岁。自小因注射鏈霉素过量引致聋哑，不会講話，只会发“爸”“媽”单音，但不多。針刺十次后，目前可学唱“雄赳赳，志昂昂，跨过鴨綠江”歌曲。

【取穴】 哑門 大椎 頰車 翳风 听官 天容 合谷

每次針刺四、五个穴位，短暫强刺，不留針。隔日一

次，十次为一治疗程。

中山医学院

針治白翳遮眼

石岐市郭大耀，眼痛四年，視物完全不见，自認已絕望，后經石岐市中医院李尘医师診治，患者双眼角膜全被白膜遮閉，有严重睫毛倒插，后用針法治疗一个多月，白膜漸退，視力恢复，现已参加麻网厂工作。

【取穴】 风池 合谷 魚腰 絲竹空 攢竹 阳白

針刺并进行挑砂，配合外治。

石岐市

中西結合治疗砂眼

石岐市中医院針灸室，利用針灸、挑砂配合西药治疗砂眼一百二十二例，全部有效。

【治疗过程】 先将患眼点2%普魯卡因溶液，术者左手固定翻轉的眼臉，右手执消毒牙筋針，以平面向顆粒輕輕挑去，往返三、五遍，見顆粒已显，即以竹枝棉花蘸0.4%硝酸銀溶液輕輕搽过，再用4%的生理盐水冲洗，同时用干淨竹枝棉花把污物挑淨，冲洗毕即点硼酸水或磺胺砂眼水，并即进行針刺三間、攢竹、絲竹空等穴。

【备注】 1.如有合并症，按情况酌加其他有关穴位。一百二十二例中有合并症的有九十例，占73%。

2.在炎性进行期有疼痛时不可挑砂，用針刺使炎退痛

止后才可进行。

3. 以上一百二十二例，半数是经过挑砂治疗的，一般经挑砂一次，针一至五次，症状消失，重者甚至已失明，挑砂二至四次，针约三十次，可使症状消失或显效。

针灸治疗视网膜动脉痉挛过敏黑朦

这是眼科治疗学中抢救失明的一项重要发现。病者欧某、曹某，均患眼视力消失十天，检查为无光感，经用针灸治疗，主要取穴以睛明、瞳子髎、翳风、攒竹、合谷等，先后取得疗效。前者于第四天恢复光感，以后视力在角膜斑翳情况下仍达0.1，后者于1米距离内可辨扇、钟、枕和高矮等。眼底检查，动脉痉挛并获一定改善。

中山医学院眼科教研组

针灸治疗色盲

【病例】 黄××，患色盲，经针灸十余次后痊愈，五色分辨不错。

【针刺取穴】 内关 列缺 合谷 睛明 臂臑 鱼腰 肝俞

广州市工人医院

针灸治愈截瘫

【病例】 卢×，女性，19岁。主诉：两下肢瘫痪不能起坐行动，大便、小便失禁已两周。病者两年前有脊椎结核病

史，曾在某医院用过石膏背心作固定脊椎疗法，但二年来腿部常有复发痛，痛剧时行动困难。1955年8月17日突觉腰剧痛，及两下肢痛苦，仅三天两下肢便瘫痪，剧痛至不省人事，出冷汗，经注射急救才清醒过来，经十多天的中西药治疗无效，始入我院，经诊断是脊椎结核急性截瘫并采用针灸治疗。

【取穴】 以环跳、阳陵泉、足三里、解谿、大肠俞、委阳、阴陵泉等为主穴，并加配穴，每次用三至四穴交替使用。

【疗效】 治疗五次腰腿痛显著减轻，知觉渐次恢复，能坐。七次能扶床站立起来。三周能行走。二月后一般症状消失，体重显著增加，出院恢复工作，至今三年来未复发。

广东省中医院针灸科

针灸治疗色盲

【主穴】 光明 鱼腰 瞳子髎

【配穴】 肝俞 肾俞 行间 睛明 攒竹 风池 临泣

【手法】 抑制法，一般留针十五至三十分钟，上穴轮流使用，每次取五至六穴。

【疗效】 二十余病例中，经三至十七次的治疗，均痊愈。

针灸治疗长期过敏性鼻炎、鼻窦炎

【病例】 杜××，男性，22岁。1954年12月13日入院初诊。主诉：间歇性鼻塞一年，影响睡眠，头痛位置不定，涕多黄，鼻内痒，喷嚏，天气较冷及热时，症状加重。曾用西法治

疗无效，后改用针灸治疗。

【取穴】 迎香(双) 合谷(双) 印堂

【手法】 轻捻入针后，留针十五分钟，留针期间轻啄一、二次。

【疗效】 针灸四次后头痛减少，精神好转，鼻塞大为改善，已不影响睡眠，鼻内分泌物明显减少，在针灸印堂时，头有触电感，随即鼻通气。

【检查】 双下甲无肿大，通气良好，粘膜色淡红，左中道收缩后，仍可见小块瘰肉如前。

针灸十次后，只左侧间有少许鼻塞，右侧完全通畅，头痛、喷嚏、鼻痒、眼刺等症状完全消失，说话已无鼻音，鼻内分泌物明显减少，睡眠、精神良好。

中山医学院

针灸治疗急性口腔炎

我院采用针灸疗法治疗急性咽腔疾患，十例效果显著。

【取穴】 天柱

【手法】 针二厘半深，以患者觉麻痹感为止，留针十五至三十分钟，轻捻啄一、二次。

【病例1】 凤××，女性，10岁。患喉痛四天，发热寒战，吞咽障碍，疲乏，打过两次针，未见效。检查：体温 38.2°C ，双侧扁桃腺炎肿大(++)，明显充血，陷窝内有脓性分泌物，W.B.C. = 11300 (中性54)，针一次后，痛明显减轻，吞咽已不痛，第二日检查扁桃腺上脓性分泌物已消失，仅轻度充血，体温 37.4°C 。第三日自觉已无不适，扁桃腺充血消退，肿大(+)，体温 37°C ，W.B.C. = 10400 (中

性33)，針灸时无兼用其他藥物。

【病例2】 陈××，女性，49岁。患急性扁桃腺炎，喉痛二天，发热，吞咽障碍，全身骨痛。检查：双侧扁桃腺肿大（++）陷窝有脓性分泌物，体温 38.3°C ，W.B.C.=12100（中性77）。針天柱穴二次，針后痛明显減輕，吞咽已无障碍，第二日检查扁桃腺仍肿胀充血但脓性分泌物已消失，体温 37.2°C ，自觉痛明显減輕，但仍有骨痛，再針天柱。第三天已无任何不适，检查扁桃腺充血已不明显，体温 37°C ，W.B.C.=4200（中性63），針灸时无兼用其他藥物。

中山医学院

七、痛 症

針灸治疗腰麻后头痛

对于“腰麻”后头痛，以往我們多用一般鎮痛剂及靜脉注射50%葡萄糖，但效果总是不大，后来我們改用針灸疗法，效果特別显著。所用穴位多数是太阳、合谷、大都，有的患者經用二、三次后头痛即消失。总共針刺二十例，其中有七例除針刺上述穴位外，另加針印堂（因針刺二、三次仍說头痛，故加針印堂），效果显著，八例头痛略減輕。

【病例】 黄××，男性，27岁。因急性闌尾炎，于1958年3月21日急診，入院后当即于腰麻下作闌尾切除术，术后第三日据患者訴头痛，坐起时头痛更增剧，无恶心，无呕吐，

即針刺太陽、合谷、大都，一次后頭痛即減輕，翌日又針了兩次，痛即完全消失，术后第五日拆除縫綫，第六日出院。

廣州市第三人民醫院

針刺治療腰麻后頭痛四十三例

【取穴】 主穴：太陽 印堂 風池 合谷 足三里

輔穴：陽白 頭維 天柱 身柱 列缺 委中

每次取五至九穴（單穴計），單針不灸。

【手法】 強刺激（體弱、敏感者用中刺激），留針二十至三十分鐘。

四十三例療效統計表

針刺次數	1	2	3	4
病 例	12	15	9	7
有 效 率	28%	34.8%	21%	16.2%

剖腹术后傷口痛針灸療法

【取穴】 足三里 合谷

【手法】 強刺激，留針十五分鐘。

【病例】 黃××，女性，28岁，已婚。患者为宫外孕，手术后，傷口痛，呻吟不止，患者結婚十一年未有生育，发病后四天入院，經剖腹检查为輸卵管妊娠流产，輸腹腔血液至600毫升，出現反应，四肢及下頷关节顫抖劇烈，經藥物

处理十五分钟后未止，即針足三里、合谷，反应即停止；八小时后伤口复痛，服鎮靜药二次未止，再針一次，疼痛消失，未再发作。

【疗效】 曾治疗六十九例，痊愈的二十六例，好转的四十例，无效的三例。

广州市卫生局

針灸治疗胆絞痛

【病例1】 患者长期有突然陣发性上腹部剧痛，痛时有黄疸出现，用药物治疗无效，針灸一次即能止痛，再針二次痛消失，至今已二年多未复发。

【病例2】 患者患胆石症絞痛，黄疸，高热，药物治疗未改善，針灸后即能止痛，当晚能安睡，第二天針后热度下降，治疗至一般情况好转后，轉手术治疗。

【病例3】 症状与第二例相同，經針灸治疗共十天，疼痛消失，黄疸退减，未施手术出院，至今将两年未见来复診。

以上病例針灸一次止痛，一般能达六小时，最长达一天，就算用药物止痛，亦难如此理想。

【取穴】 足三里 中脘 期門(右) 合谷

其中以足三里及中脘为主穴，用强刺激手法。

广州市第三人民医院外科

針灸治疗坐骨神經痛

广四县四会人民医院中医馬匡民，用針灸治疗坐骨神經痛三

十六例，痊愈的三十二例，其中三十例病人都曾用多种药物治疗无效，改用针灸疗法治愈。

【取穴】 主穴：昆仑 环跳 委中 阳陵泉 悬钟 八髎

配穴：小肠俞 承浆 风市 委阳 足三里

【手法】 用重刺激手法，进行后加电三分钟，艾卷灸小肠俞、八髎、环跳、阳陵泉、足三里，每穴灸五至十分钟。

针灸治疗坐骨神经痛

我院在临床上采用长针深刺腰臀部及腿部的经穴，治疗一百八十二例坐骨神经痛的患者，其中有受寒型坐骨神经痛十二例，平均有效率为91.8%。

在各型坐骨神经痛中，以受寒型效果最好，一般针灸二至五次症状消失，有效率达100%。

【取穴】 大肠俞 委中 承山 昆仑 足三里 环跳 阳陵泉
以上穴为主，每次取二至四穴。

【手法】 用长针深刺术，取先深后浅，从深部得气后，以得气动而伸之的泻针手法，针刺留针十五至二十分钟。

针灸治疗坐骨神经痛疗效统计表

类 别	总 例 数	效 果			治愈率	有效率
		治愈	进步	无效		
受 寒 型	37	33	4		89%	100%
挫 伤 型	12	6	5	1	50%	92%
风 湿 型	133	57	72	4	43%	97%

各类型针灸有效次数统计表

类 别	有效数	治 愈		进 步	
	总例数	总次数	平均每人数 针次	总次数	平均每人数 针次
受 寒 型	37	178	5	24	6
挫 伤 型	12	49	8	23	5
风 湿 型	133	832	15	675	9

广东省中医院

针灸治疗神经性头痛

用针灸治疗神经性头痛一百一十六例，有效的一百一十例，大部分病者愈后不会复发。

【取穴】 前头痛：合谷 太冲 上星 攒竹 丝竹空
 全头痛：合谷 太冲 百会 风池
 头顶痛：百会 委中 涌泉
 两颞痛：太阳 头维 率谷

【手法】 进针后，采用较强刺激手法，每五至十分钟进行捻转捣动一次，留针时间可按情况，一般十至三十分钟。

【疗效】 曾治疗一百一十六例，治愈的七十二例，平均针治十一次；进步的五十八例，平均针治九次半；无效的六例，平均针治五次半。在一百一十六例中，病状属于前部头痛的十九例，治愈的四例，进步的十三例，无效的二例。全部头痛的四十六例，治愈的十九例，进步的二十五例，无效的二例。头顶部痛的十九例，治愈的十例，进步的九例。两颞区痛的三十二例，治愈的十九例，进步的十一例，无效的二例。

針灸止牙痛

我院用針灸治疗牙痛三百一十七例，全部有效，其中不少是經服磺胺类葯物及其他各类止痛葯或注射青霉素无效的，經針刺后，均收到滿意效果。

【取穴】 合谷 下关 頰車

【手法】 强刺激，留針半小时。

广州市第三人民医院

梅花針治疗各种痛症經驗

梅花針對扭伤挫伤、神經痛、胃痛，均能取到一定效果，其中以挫扭伤疗效最著。

【病例】 一例胃痛連痛半年未止，二例腰胁痛曾經各种治疗未效，采用梅花針治疗而得痊愈。

【梅花針叩打方法】 先打脊椎两旁，次打局部，最后叩打四肢末梢，有肿須打至出血点。

广州市第三人民医院

針灸治疗剧烈腹痛

应用針刺治疗剧烈疼痛患儿十例，其中九例为肠蛔虫病，一例为消化性潰瘍。此十例剧痛時間最短为三小时，最长者达二天，在針刺前均經過多种治疗而无效，如注射或內服鎮痙攣剂、止痛剂或热敷腹部等，但針灸对此十例疗效迅速，十例中，仅有

一例于治疗后三小时复发，再针刺后即未再复发，其余九例曾观察数日未再复发。

【取穴】 中脘及二侧、足三里为主，采用泻的手法，十例均于进针后立即止痛。

中山医学院

针灸治疗睫毛倒刺

【病例】 刘××，男性，28岁。两眼睫毛倒刺，十余年来经三次眼睑缘切除术，不久睫毛复生，结果无效，痛苦难忍，后转针灸治疗，经针十一次，根本痊愈，至今三年无复发。

【取穴】 风池 太阳 攒竹 瞳子髎 四白 合谷 上星 睛明

【手法】 上列各穴，每次用二、三穴轮流使用，除睛明穴外均留针五分钟，睛明深针一寸二分，针后眼的周围加丛针轻打皮肤，针另用粗铜丝四英寸一端，用酒精灯发热，反出睫毛，将烧红铜丝烫使向外出，隔日治疗一次。

大埔 张冠新

八、其 他

用针灸作急性腹痛症鉴别诊断

急性腹痛有时很难分别是外科病或内科病，不能决定是否要立即进行手术，广州市第三人民医院外科在学习了针灸疗法后，

創造性地把針灸用于急腹痛的鑒別診斷，給針灸療法的作用开辟了新的途径，使不少須进行手术的患者能及时进行手术，迅速恢复健康。

【方法】 針刺足三里、中脘，如立即止痛，即为內科病，不用开刀。如果痛只略減，或完全没有減輕，即为外科病，須进行手术治疗。

无痛进針法

本院針灸医师陈全新为减少病人痛苦，参照古法，綜合創造了一种无痛进針方法，据病員反映，确能收到无痛或减少疼痛效果。有效率高达90%。

无痛进針法操作及其內容：

（一）掌握无痛針刺手法，除了有熟練的技术操作外，在治疗过程中还需要多方面配合，較主要还是病員与医生合作。注意事項如下：

- 一、治疗前消除患者扎針必痛观念。
- 二、患者体位必須舒服，适合針刺方向。
- 三、注意避开皮肤上的痛苦瘢痕血管硬块。
- 四、在針刺穴旁加押手，既可减少末梢痛觉产生，給患者制造一种皮肤定位錯觉，也可固定体位。
- 五、进針时捻抹角度不宜大于120度，以往返輕捻压为原則。
- 六、进針前应检查針体，不用重針或鈍針。

（二）主要操作內容提要：

这种手法主要是应用刺激点旁押匀法，和运用均匀的捻抹压手法进針，因可借錯觉影响分散病員注意力和減輕末梢神經敏感

度，在避免污物接触針体的严格原則下，而达到无痛进針目的。

一、两种短針进針手法比較：

甲、古代指切押手，用拇指按压于皮肤上，入針时将針体紧贴指甲之边缘刺下。

优点：較能固定針体，重压皮肤有效地減輕痛觉产生。

缺点：不能达到严格消毒的目的。

乙、改进牵压捻抹进針法：拇食指在消毒穴旁紧压及牵引皮肤（指不接触針体及消毒穴內皮肤，因能固定体位及达到严格消毒目的）。

二、两种长針进針手法比較：

甲、拇食指押手刺入法：用拇食指持針迅速入穴內，其缺点是骤然刺入的过强刺激，会引起病人体位移动及消毒不严格。

乙、按压刺入法：左手用反迭消毒棉球扶持針体，露出少許針尖，右手用均匀力在消毒穴位旁反复用力按压数下后，左手把針尖迅速輕快压入，因此可減輕痛觉又能收到严格消毒的目的。

广东省中医院

水針疗法治疗失眠症

我院利用針灸結合苏联封閉疗法原理，对失眠患者进行水針疗法（即普魯卡因穴位封閉），获得显著疗效，从四十例治疗当中有效的三十四例。

【方法】 用0.1—0.25%普魯卡因溶液 4—6 毫升按穴位注射，每次二至六个穴位。

【穴位】 合谷 神門 足三里 三阴交 曲池 內关

华南区干部疗养院

針刺治疗昏迷症状

我院在治疗神經器質性病变而昏迷的病例，曾采用針灸疗法治疗三百四十三例，均获成功。病員往往扎針十多次即完全清醒，以后根据病因，进行治疗，便可除病。此方法很簡便，必要时用縫衣針、大头針、扣針亦有效。

【取穴】 水沟 中冲 十宣

【手法】 强刺激。

广州市第三人民医院

針刺水沟及中冲制止高热惊厥

本院利用針刺水沟、中冲制止高热惊厥，效果显著。曾有一患儿高热惊厥来院急診，当时診断系由感冒发高热而致，乃令吸入氨水，冰袋敷額部，并注射强心退热針及苯巴比妥鈉，但惊厥仍未止，再注射苯巴比妥鈉一剂，亦无效果，于是用抑制手法，針水沟，继刺中冲，刺一側后痙攣稍止，再刺第二側中冲，刺后立即停止惊厥并啼哭，恢复神志。

广州市第三人民医院

針灸治疗急性扁桃体炎

本院以針灸疗法治疗十例急性扁桃体炎病人，一至三天痊愈。

【取穴】 少商 合谷 列缺 曲池 曲泽 扶突 廉泉 頰

車 風池

上穴輪翻使用，取兩側或單側。

【手法】 先刺少商出血，不留針；其次由遠而近下針，用中等度刺激，留針十五至三十分鐘，隔五分鐘捻轉一次，緩緩出針。

東莞縣人民醫院

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 广东中医锦方选集 第一集

作者= 广东省卫生厅编

页数= 2 2 6

S S 号= 1 0 3 8 8 0 6 3

出版日期= 1 9 5 9 年 1 2 月第 1 版