

前 言

中央卫生部在北京举办的全国医药卫生技术革命展览。中医中药部分，有很多项目已赶上和超过国际水平，如中医治疗乙型脑炎、癌肿、柳枝接骨、蛇咬、兰尾炎等；还有很多项目是我国首创。在国际上没有办法，或办法很少，疗效很底的，我国可以治癒或有很好的疗效，如聾哑、視神經萎縮、色盲、脫髮再生等数十項。都值得我們学习和推广。

为了全面开展中医中药工作，进一步贯彻党的中医政策，我所曾派四位同志前往参观，获益匪淺，特将该展览的中医中药部分比較突出的治疗經驗彙編成冊。供同志們临床参考。在党的总路綫光輝照耀下，让我省的中医工作能放出更大的卫星。

中国医学科学院 中医研究所
陕 西 分 院

1958.11.17.

目 录

一、内科、儿科

茶叶熬劑治疗細菌性痢疾(駐成都部队总医院).....	(1)
白头翁片劑治疗急性細菌性及阿米巴性痢疾 (上海提籃桥区中心医院).....	(1)
雞苦胆治疗百日咳(張家口医学院附屬医院).....	(2)
治百日咳新驗方(哈爾濱市公安医院).....	(2)
中葯百日咳飲临床疗效显著(哈爾濱市紅十字兒童医院).....	(3)
中医治疗百日咳.....	(3)
中葯板蘭根治疗腮腺炎(天津葯物研究所、傳染病院).....	(3)
蓮藕片.....	(4)
中医治疗痒腮(成都中医学院附屬医院).....	(4)
中医治疗流行性腮腺炎.....	(4)
飞仙遙治白喉(常州市中医院).....	(5)
巴豆硃砂膏葯治白喉.....	(5)
白喉散(西安市傳染病院).....	(6)
中葯土牛膝加桑葛湯治疗白喉效果显著 (广东佛山專区医院).....	(6)
桔梗湯治疗猩紅热.....	(7)
中葯治疗腦脊髓膜炎.....	(7)
雞骨草治疗傳染性肝炎(广西南宁工人医院).....	(8)
小兒傳染性肝炎的特效方(济南铁路中心医院).....	(8)
中医治疗傳染性肝炎(安徽蕪湖医院).....	(8)
中医治疗傳染性肝炎效果良好(中医研究院).....	(9)
慢性肝炎.....	(9)
中医中葯攻下肝硬变的堡垒(河北省中医研究院).....	(10)

消积散治疗單腹脹和水腫病.....	(10)
中医治疗80例肝硬变收到显著效果(北京市中医院).....	(11)
中医治疗肝硬变效果良好(重庆第一中医院).....	(12)
肝硬化腹水治疗处方.....	(12)
魚腥湯治疗大叶性肺炎.....	(13)
中医治疗枝气管肺炎.....	(13)
小兒喘息性支气管炎.....	(13)
抗喘丸(广州鉄路管理局卫生处).....	(13)
寒喘丸(天津医学院附屬医院).....	(14)
重庆第一医院用中葯治疗枝气管喘息效果显著.....	(14)
由蛤散治疗浸潤型肺結核(錦州市紫荆山結核医院).....	(15)
黃連素治疗肺結核(陝西省第一康复医院).....	(15)
止血煎治疗肺結核咯血(蚌埠中医院.....	(16)
中医治疗肺膿腫(天津紅十字会医院).....	(16)
消化性潰瘍(安庆中医院).....	(16)
烏參散.....	(17)
消化性潰瘍丸(蘭州医学院).....	(17)
甘草粉(上海市第二劳工医院).....	(17)
北京中医研究院用中葯治疗53例消化性潰瘍.....	(17)
中医治疗大衄及紫斑症(北京同仁医院).....	(18)
紅棗治疗过敏性紫癍(上海第四医院).....	(19)
征服血小板减少性紫癍症.....	(19)
糖尿病(北京市中医院).....	(20)
中葯治疗再生不良性贫血效果显著.....	(21)
中医对原发性再生障碍性贫血有显著疗效	
(辽宁省中医院).....	(21)
中医治疗神經衰弱(安庆市人民医院).....	(22)
健腦丸(西安紅十字会医院).....	(22)
养肝宁神合劑治疗神經衰弱.....	(23)

中藥治疗风湿性关节炎(成都中医学院).....	(23)
风湿止痛藥酒.....	(23)
花蛇追风丸白花散治疗风湿性关节炎	
(石家庄中医进修学校).....	(24)
讓高血压低头(黑龙江省祖国医药研究所).....	(24)
云母治疗高血压(云南省).....	(25)
妇女高血压特效方.....	(25)
臭梧桐治疗高血压胜过蛇根草制剂.....	(26)
叫高血压讓路.....	(26)
葛湯葛糊治疗高血压(广东佛山專区第一医院).....	(26)
桑叶膏能治高血压.....	(27)
稀龙丸治疗高血压.....	(27)
我們基本上征服了高血压(北京市第一中医門診部).....	(27)
羊奶的利尿作用,可以治疗腎炎.....	(29)
白茅根治疗急性腎炎效果好(湖北貿易职工医院).....	(29)
中医治慢性腎炎效果好(福建省人民医院).....	(30)
中医治癒急性白血病(貴阳医学院).....	(30)
中医治癒兩例何杰金氏病.....	(31)
加味葛根芩連湯治小兒麻痺症(中医研究院).....	(31)
中医治疗小兒流感(西安市中医院).....	(32)
消疳化虫散.....	(33)
百部油煮治蟯虫(南京中医院).....	(33)
中医治疗乙型腦炎(北京中医院).....	(33)
八味消毒飲治疗梅毒(四川涪陵專区性病防治队).....	(35)
复方土茯苓治疗梅毒效果好.....	(35)
治疗梅毒秘方“清血搜毒丸”和“三仙丹”	
(河北隆化县盛子章).....	(36)
中医秘方治疗精神病(北京海淀医院).....	(40)
中医对尿毒症的治疗(中医研究院).....	(40)

中医治疗囊虫病的驗方(佳木斯中医院).....	(41)
中医治疗大骨节病.....	(41)
治食道癌驗方(陕西省中医研究所).....	(41)

二、外 科

治阳萎驗方(陕西省中医研究所).....	(42)
治疗蘭尾炎不用手术(吉林桦甸县夹皮沟职工医院).....	(42)
中医治疗蘭尾炎超过国际水平.....	(43)
用金錢草治胆結石(中医研究院).....	(43)
消石散治疗胆結石(西安市中医院).....	(43)
桐油石膏(广州鐵路管理局卫生处).....	(44)
草药金錢草和滿天星治疗胆管結石(重庆第二中医院).....	(44)
江猪油(广州鐵路管理局卫生处).....	(44)
征服破伤风(山西万荣县人民医院史济生).....	(45)
五虎追风散治疗破伤风.....	(45)
燙伤油膏.....	(46)
燙伤药.....	(46)
銀化解毒湯治疗頤部化膿(中医研究院).....	(47)
金花草治燙火伤(广西中医葯研究所).....	(47)
猪胆膏.....	(47)
中医接骨丹治疗骨折及急性挫伤.....	(48)
用中葯接骨創纪录骨折癒合速度超过国际水平	
(广西人民医院).....	(48)
中葯八合丹圍葯治疗疔瘡癰毒(四川医学院).....	(48)
口服中葯治疗痔瘡.....	(49)
中医治疗骨癆症七十四例(中医研究院).....	(49)
中医治疗血栓閉塞性脈管炎(河北天津專区第一医院).....	(50)
中葯治疗143例脫疽效果良好(北京市中医院).....	(51)
柳木接骨膏接骨法(陕西省中医研究所).....	(51)

土法治大病刺菜膏治外伤感染(天津汗沽鹽場医院).....	(52)
去腐羔(天津医学院).....	(52)
生肌散(天津医学院附屬医院).....	(53)
提毒散治阴疽瘡(天津医学院).....	(53)
陈旧性肩关节复位手法(陕西省中医研究所).....	(53)

三、皮 科

中葯热烘疗法治疗神經性皮炎及慢性濕疹

(上海市中医学院).....	(54)
慢性濕疹用青黛膏(上海中医学院).....	(54)
黑豆溜油治疗小兒濕疹疗效达97%(西安医学院).....	(54)
中葯白疾藜治疗白癜風(河南省人民医院).....	(55)
紫草油治疗臀部尿布性皮炎.....	(55)
腋臭散.....	(55)
紫歸膏治疗冻伤.....	(56)
嬰兒濕疹軟膏.....	(56)
濕疹湯.....	(56)
白癜風中医疗法(長春中医院).....	(56)
脚气粉.....	(57)
中葯治疗腋臭不用开刀.....	(57)
中医能治汗斑症.....	(57)
紅皮肤潰瘍驗方.....	(58)
皮鼻液治疗酒渣鼻.....	(58)
神經性皮炎用瘋油膏.....	(58)
偏方有奇效酒渣鼻能治好.....	(58)
中西医結合治疗甲癬(北京友誼医院).....	(59)
中葯治疗一例毛发全脫(四川成都中医学院).....	(60)
中医治疗脫发(鬼剃头)(山西省人民医院).....	(60)
神經性皮炎的中医疗法(北京市中医院).....	(61)

中藥蛤粉膏治疗酒渣鼻有卓效(哈爾濱醫學院).....(62)

四、婦 科

中医治疗子宮頸上皮癌获得疗效(成都市第一醫院).....(63)

中医治疗习惯性流产处方(海澱醫院).....(63)

中藥治疗妊娠惡阻(北京市中医医院).....(64)

中藥治疗痛經的方劑(北京市中医医院).....(64)

中医治疗49例不育症臨床經驗介紹(北京市中医医院).....(65)

52例慢性盆腔炎觀察(中医研究院).....(66)

烏金粉治疗子宮頸糜爛效果好(中医研究院).....(66)

定坤丹.....(67)

調經丸.....(67)

五、五官科

退翳散加減治疗树枝狀角膜潰瘍(上海市同濟醫院).....(68)

中医治疗一例玻璃体退行性变(中医研究院).....(68)

中医治疗視神經萎縮超过国际水平(中医研究院).....(69)

中医治疗沙眼的簡易方法(上海市沙眼防治委員會).....(69)

磁珠丸治疗白內障(四川醫學院眼科).....(70)

中医治疗視網膜神經膠質瘤收到突出成績.....

(河北省中医研究院).....(70)

中藥牛蒡子的治病研究(天津師大醫務室).....(71)

蒼耳子合劑治慢性副鼻竇炎(天津市第六醫院).....(71)

鐵板吹喉丹治疗急性扁桃腺(重慶第二醫院).....(72)

中藥治愈美尼尔氏病(北京第一中医門診部).....(72)

独角蓮制劑治疗慢性萎縮性鼻炎(辽宁省).....(72)

六、針 灸

灸法治疗淋巴腺結核性潰瘍(天津市第三醫院).....(73)

針灸治療腰麻後頭痛·····	(73)
針灸治療半身不遂(中醫研究院)·····	(74)
針灸治療中風·····	(74)
針灸治色盲症·····	(74)
針灸治頭暈之新療法(哈爾濱第一醫院)·····	(74)
針灸治療視網膜出血的療效(中醫研究院)·····	(75)
針灸治療帶狀泡疹(中國醫學科學院皮研所)·····	(75)
針灸治療術後尿瀰留·····	(75)
針灸治菌痢(甘肅省中醫院)·····	(76)
針灸治療心絞痛效果很好(零陵人民醫院)·····	(76)
針灸治療百日咳(上海)·····	(76)
針灸治療無脈症(蘇州醫學院)·····	(77)
針灸治療小兒幽門痙攣(北京兒童醫院)·····	(77)
針灸治療夜盲·····	(77)
針灸治療急性蘭尾炎·····	(78)
針灸治療放射反應病(中國醫學科學院)·····	(78)
針灸催乳(上海醫學院)·····	(79)
針灸引產(上海第一二醫學院)·····	(79)
針灸治遺尿症·····	(79)
中西醫協作針灸治療麻痺性腸梗阻(上海兒童醫院)·····	(80)
針灸治療神經性皮炎(上海第一醫學院)·····	(80)
針灸治療聾啞(河北省與河北河間縣中醫學院)·····	(80)
針灸療法減輕肺結核症狀(北京結核病研究所)·····	(81)
針灸治療癰病有奇效(沈陽醫學院)·····	(81)
針灸治療慢性腹瀉(陝西省中醫研究所)·····	(82)
針灸治療小兒麻痺(陝西省中醫研究所)·····	(82)
針灸治療陽萎(北京)·····	(83)
附：施金墨老先生獻出多年經驗方10張·····	(83)
一、肝硬變腹水合劑·····	(83)

二、肝硬变黄疸合劑·····	(83)
三、胃潰瘍合劑·····	(84)
四、十二指腸潰瘍合劑·····	(84)
五、肝硬变腹脹合劑·····	(84)
六、肝脾腫大合劑·····	(85)
七、慢性腸炎合劑·····	(85)
八、慢性痢疾合劑·····	(86)
九、胃擴張胃下垂合劑·····	(86)
十、胆石黄疸合劑·····	(86)

一、內科、兒科

茶葉煎劑治療急性細菌性痢疾

駐成都部隊總部醫院

處方：

以茶葉煎劑 2 毫升每六小時服一次，以 7—10 天為一療程。共治療 20 例全部治癒，無副作用。

濃茶煎劑的制法：

用茶葉 100 克置煎器中，（最好是陶器）加蒸溜水，約 7 倍，煮沸 20 分鐘，用精制棉過濾，趁熱將濾液濃縮至 75 毫升，放冷加醇，使全量成 100 毫升即成。

以茶葉與黃連對比，抑菌效價，殺菌效價，以及症狀消失情況，均比黃連优越。

白頭翁湯片劑治療急性細菌性 及阿米巴性痢疾

上海提籃橋區中心医院

處方：

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮各等量磨粉混合以 70% 酒精為溶媒，重滲濾過法做成流浸膏，經低溫減壓，收回乙醇，然後在水浴上濃縮成浸膏，加吸粉阿拉伯樹膠，拌成顆粒壓片，每三片含以上各藥為 2.5 克。

用法：每日三次，每次三片口服。

· 鷄苦胆治疗百日咳

張家口医学院附属医院

治疗百日咳超过国际水平

处方：鷄苦胆汁加白糖

劑量：一週岁以下，三天服一个

二週岁以下，二天服一个

二週岁以上，一天服一个

服法：用針刺破苦胆，擠出胆汁加白糖每天服二——三次

备注：雌雄鷄均可，白糖量不限。

治百日咳新驗方

哈爾濱市公安医院

哈爾濱市公安医院中医彭洪鈞用中医驗方治疗百日咳疗效显著，經临床200余例百日咳患兒观察治疗效果达80%以上。

处方一、

白朮，川連，車前(加倍)，猪苓，泽夕，云苓

治湿盛的

处方二、

糖蓼，桔梗，葦根，枝子，苦参，香附，柴胡，浮石

治湿热的

註：以上兩处方药量一样，以灯心，竹叶引

1个月至1岁每付各等份四錢。

1岁至5岁每付各等份六錢。

本处方的用法可分为湯，散兩種，一日量，每日分三次服用。

中藥百日咳飲臨床療效顯著

哈爾濱市紅十字兒童醫院

哈爾濱市紅十字兒童醫院用中藥百日咳飲治百日咳，療效達80.6%。在痊癒期療效大為顯著。

百日咳飲煎劑組成：

百部、川貝、沙參、白前、各一錢加水400毫升濃縮成200毫升（兩歲小兒一日量）

中醫治療百日咳

處方：

六月寒 兔耳風 五皮草 肺經草 青蛙草

用法：½歲各用一錢、半歲以上三歲以下各用二錢、三歲以上各用三錢，水煎口服。

如久咳不癒加蜂蜜或冰糖日服數次，每次2—3匙。

中藥板蘭根治療腮腺炎

天津藥物研究所
傳染病醫院

板蘭根片劑量及服法：

每片含生藥1.5——2克 每次吃5——6片 成人劑量小兒減半（約十克合中國4——5錢），每四小時吃一次，每日吃4——6次。

療效：一千多例全部治癒。吃三至四天就好。

蔓 嗽 丸

处方：

牛蒡子三錢 葶苈子三錢 旋復花三錢 山楂肉三錢 青蒿子二錢
紫蘇子二錢

用法：共為細末，煉蜜為丸，每次服二錢，一日三次。

主治：腮腺炎

中 医 治 疗 疔 腮

成都中医学院附属医院

51例，100%治愈。

疗法：

例 数	内 服	外 敷
32	羌活、荆芥、防风、連翹、大力、薄荷、桔梗、銀花、角参（玄参）板蘭根、黃連、黃芩、殭蚕、姜黃、甘草、花粉、	如意金黃散
19	荆防敗毒散、普濟消毒飲，逍遙散合消瘰丸	

中医治疗流行性腮腺炎

北京市

处方：

普濟消毒飲一號單純腮腺炎時用。

生石膏一兩 蟬蛻三錢 薄荷二錢 牛蒡子三錢 連翹五錢 大

青叶三錢 生地三錢 馬勃子二錢 黃芩三錢 甘草二錢 板蘭
根三錢 元參三錢 苦梗二錢

普濟飲二號即普濟清毒飲一號加川棟子三錢 小茴香二錢

桔梗三錢 紫雪散（併發腦炎時加入）其量根據年齡的大小來
增減，成人每次一錢每日三次，用紙包好用開水送下。

功效：

一般2—3次痊癒，有效率100%

飛仙遙治白喉

常州市中醫院

處方：

薄荷 西瓜霜 煨月石 西黃 甘遂 蒲黃粉 濂珠 大梅
各適量

用法：將以上各味藥共為細末混合，每二小時向喉部吹一次。

功效：應用2—3次後喉部假膜即可消失。

巴豆硃砂膏藥治白喉

處方：

粉碎生巴豆0.5克

硃砂0.5克

普通膏藥1張

用法：將巴豆末和硃砂混合均勻，撒在膏藥上，貼敷在患兒前額兩眉
之間的上方，貼七至八小時。

功效：共治77例，无一例死亡，效果很好。

白 喉 散

西安傳染病院

处方：

牛黃六分 珍珠 梅片 琥珀 礞砂各三分 血竭花 象皮
龙骨 兒茶 乳香 沒藥各一錢 五倍子一兩 (炒黃)

配制方法：

先將珍珠微煨，五倍子焙黃，其餘均為生藥分別研為細末，過細篩混勻備用。

用法：用吹粉器將白喉散噴撒喉面約3—5分鐘，令患者嗽口，一日2—3次，每次撒一層，直止症狀消失為止。

中藥土牛膝加桑葛湯治療白喉效果顯著

佛山專區第二人民醫院

本院於1956年根據新會縣黃庭華中醫師供獻了使用中藥土牛膝加桑葛湯治療白喉病的寶貴經驗，從同年5月開始在臨床應用截止1958年5月共治182例白喉病人，其中119例痊癒，治癒率80.27%

治療用藥：

1. 土牛膝煎液：土牛膝一市斤搗碎加水2000cc慢火煎至1000cc濾出其渣同樣返煎一次，最後兩次煎液再煎至1300cc加入95%酒精300cc防腐。

2. 土牛膝加桑葛湯：桑葉三錢 木通二錢 淡竹二錢 銀花二錢
甘草錢半 川貝二錢 薄荷錢半(後下) 杷葉二錢 瓜蒌皮二錢
葛根三錢 另加干土牛膝根三錢

水三碗煎至一碗三小時一次分三次服。其渣同樣往返煎一次并同法，給服，為一晝夜量，此量適合於1—12歲小兒，如

病情过重或系成人，则可适当加倍用量。

3. 疗程：患者入院后立即给服土牛膝煎液20—30cc随即煎服土桑汤第1—4日每日一剂，第5—7日改服土牛膝煎液每日30. cc分三次服，第8日停药观察若第五日假膜未消，则继续用土桑汤至假膜消失为止，然后换服土牛膝煎液三日。

桔梗汤治猩红热

处方：

将桔梗制成10%煎剂，服时加糖漿3—5cc加薄荷水(百分之一)一滴作矫味用，

用量：三岁以下者每日三次，每次30. cc

3—5岁 每次35cc一日三次

6—8岁 每次40cc一日三次

9—10岁 每次45cc一日三次

11—12岁 每次45cc一日三次

12岁以上者每次50cc一日三次

中藥治疗流行性腦脊髓膜炎

处方：

生石膏四錢至一兩 乾生地四錢至一兩 京元參四錢 生麥冬各四錢
金銀花四錢 連翹壳三錢 京赤芍三錢 粉丹皮一錢半 生甘草一錢
淡豆豉三錢 生梔子二錢 至寶丹一粒(先服)

用法：每日一次，分二次口服

加減法：得微汗后除淡豆豉，神清后除至寶丹，原方再服神清后体温

仍不下降者可服粉葛根三錢

功效：治疗73例治愈率95.9%。該方可以用于整个病程过程。

鷄骨草治疗傳染性肝炎

广西南宁工人医院

处方：

鷄骨草每日量为2—4兩与等量之瘦猪肉或猪肝，同放于沙鍋內，煮沸后用微火煎2—3小时，然后将肉湯分三次服，草不服，小兒量减半。

小儿傳染性肝炎特效方

济南铁路中心医院

处方：

粉丹皮二錢 茵陈四錢 梔子二錢 龙胆草一錢 玉金五分 枳实五分 敗醬草三錢 川軍五分 甘草一錢半 忍冬花三錢
各味葯量可按年岁大小增减

用法：水煎服。

功效：治疗率100%，疗程短只需2—9天，整个病程均可应用不需加减。

中医治疗傳染性肝炎

(安徽蕪湖医院)

处方：

茵陈三錢 薏米六錢 紅棗五錢 广皮二錢 猪茯苓各二錢 佛手三錢 冰糖一兩

加减法：嘔吐加叩壳藿香

腹脹加厚朴、太腹皮

发热加連翹黃芩

腹瀉加車前子、澤瀉

咳嗽加竹茹貝母荆芥

肝大久不消加何首烏，當歸、白芍、青皮、鱉甲、柴胡。

用法：上述劑量為1—3歲小兒一日量，分3—4次服不滿一周歲減去一半劑量成人加量。

功效：

共治44例90%療效。

中医治疗傳染性肝炎效果良好

中医研究院

治法：

①急性黃疸期：茵陳蒿湯，梔子柏皮湯，茵陳五苓散，胃苓湯等 有高热加甘露消毒丹。

②肝脾腫大者：化堅丸，青蒿龜甲湯，柴胡桂枝湯為主。

③消化功能障礙者：八正散，溫胆湯，胃苓湯。

④肝功能不良者：化堅丸、溫胆湯加健胃藥。

慢性肝炎

處法：

黃玉金四錢半 枳實四錢半 牛胆素七分，作成片劑（每丸含一分）。

用法：每日三次，飯後服每次3—7片，

輔藥：金鈴子、延胡、赤芍、天仙屯、香附、雞金水煎日服二次。

30—50天為一個療程。

中医中藥攻下肝硬变的堡壘

河北省中医研究院

治疗方法：

1. 早期用枳椇逍遙散加減法。

当歸五錢 杭芍五錢 云苓五錢 白朮三錢 柴胡三錢
薄荷三錢 丹皮三錢 梔子三錢 甘草二錢

①肋痛加桃仁（三至四錢）玉金（二至三錢）姜黃

香附 元胡 之類

②腕肋痠甚者加三稜、莪朮（錢半至三錢）鱉甲之類。

③黃疸加茵陳、大黃。

2. 腹水：用八正散加減。

云苓一兩 扁蓄五錢 瞿麥五錢 車前子五錢 滑石五錢
木通三錢 梔子三錢 川軍三錢 澤瀉三錢 白朮三錢
豬苓三錢 甘草二錢

本方一律与四苓散化裁加三稜莪朮牛膝。

3. 善后調理：用六君子湯加減。

云苓五錢 陳皮四錢 白朮三錢 台參三錢 清夏三錢
甘草二錢。

肋仍疼加三稜莪朮各錢半，下肢腫加防己，木通。

功效：

根据45例統計分析治療率85%左右

消積散治療單腹脹和水腫病

处方配制：

甲：消積散：甘遂五錢（去粗皮用蕎面包煨火存性）二升六錢

100：

神曲三錢 榔片五錢共为細末每天一次，开水送下忌鹽百日。

乙：消积散：二丑四錢、木香三錢、榔片五錢、肉桂五錢、陈皮八錢、枳壳二錢共为細末每次服一錢半

註：腹水严重时用甲消积散，待腫消后用乙消积散

甘遂去粗皮用蕎面包煨火存性（把甘遂粗皮去掉后，用蕎面和好微皮，包好甘遂，用火烤黄后取掉皮，把甘遂研末与二丑榔片、神曲混合）

中医治疗80例肝硬变收到显著的效果

北京市中医院

1) 肝硬变有高度腹水属于虚性者，治以健脾利水益气补血之法。

处方：生芪、当归、杭芍、腹皮、車前子草，抽葫蘆、党参、云苓泽瀉、泽蘭、通草、生牡力、桃仁、丹皮。

2) 肝硬变有高度腹水属于实性者治以利水消脹，通瘀之法、处方、赤苓、泽瀉、茵陈、炙山甲、炙鳖甲、車前子草、生牡力、木通、防已、桃杏仁、赤小豆、腹皮子、青陈皮、椒目、焦內金。

丸药分水丹治实水：

处方：甘遂、甘草、醋丸每服十至四十丸

3) 肝硬变肝脾腫大，无腹水者，治以清滲化瘀消脹軟坚健胃之法

处方：茵陈，生牡力，炙山甲、玉金、紅花、桃杏仁，炙別甲、橘紅叶、焦內金、青皮、砂仁、杭芍、腹皮。

4) 加减药味：

1) 黄疸显明者，加茵陈，柏皮、梔子、大豆卷等药

2) 肝区痛（右肋痛）加元胡、香附、炒川楝忍、冬藤、紅花、姜黄等药。

3) 脾区痛（左肋痛）加馬鞭草、柴胡、元胡、木香等药

4) 食欲不振腹脹者，加焦內金、腹皮、川朴，枳壳、萊菔子、

焦三仙、砂仁等药。

5)吐血衄血者，加仙鹤草、藕节、大小蓟、汉三七、鲜茅根、生地、槐子炭，十灰散等药。

中医治疗肝硬变效果良好

重庆第一中医院

共治疗30例有效率达92.3%。

方剂：①五苓散。

②五皮饮。

加减法：理气行水：厚朴 茵陈 鸡内金 香附 丑牛粉。

理血逐瘀：桃仁 红花 郁李仁 郁金 别甲茜草

湿脾固正：党参 黄耆 附片 干姜

疏肝解热：柴胡 青蒿 黄芩 茅根

用法：水煎服

肝硬化腹水治疗处方

方剂：清肝化淤汤

处方：赤白芍 猪茯苓 生桃仁 生内金 生三仙 生玉金 青陈皮
大腹皮 半边莲 生别甲 莱菔子。

加减法：

①四肢清冷脉息沉细滞者原方去赤白芍加生棗仁 黑蒼朮 紫苏梗 草寇 附子

②食少 脉沉缓 原方去桃仁 青陈皮 生别甲加焦白朮 砂仁 白党参 炒苡米

③有瘀血 瘀热 脉象弦实 胸腹青筋外露 鼻和齿龈出血
原方去生别甲 玉金 加臭枝子 藕节炭 大小蓟炭

④有黄疸征象发热 呕吐 腹脹 气喘 原方去莱菔子加茵陈 赭石 青半夏 生万蒿 香薷。

魚腥湯治疗大葉性肺炎

处方：

桔梗15克加水250cc煎10分鐘后加魚腥草30克再煎5分鐘，煎成150cc濾清后放入瓶內备用

用法：每日三至五次，每次30cc，口服

中医治疗枝气管肺炎

处方：

生麻黄八分 桔梗錢半 桔紅一錢 前胡一錢 苏子一錢
杏仁一錢 括簍錢半 杷叶錢半 生石膏錢半 生草一錢
生石羔錢半

以上各藥劑量是根据年齡大小增減，并可依据病情加入人參
乾姜 桂枝 局方至宝丹 黃連。水煎口服

功效：一般服藥4—5次即可痊癒—有效率90%以上

小儿喘息性支氣管炎

中医研究院

58例療效98%

处方：

銀翹散 桑杏湯 麻杏石甘湯加減

抗 喘 丸

广州鐵路管理局衛生處

說明：內含

信石1分，白礞10分，淡豆豉10分，研末成丸每日睡前服0.5克，

服三个月为一疗程。

服藥期間禁食多脂肪食物。

功效：治疗支气管哮喘

优点：功效大，成本低。

寒 喘 丸

天津医学院附属医院

处方：

生信石2份 淡豆豉17份 江米粉（或藕粉）1份以蒸溜水做成
如綠豆大小之丸

服法：將上藥分成三厘、四厘、五厘三種包

阳历 8—10月服三厘包

2—4月服四厘包

10—12月服四厘包

4—5月服三厘包

12—2月服五厘包

第一次服三厘包之 $\frac{1}{2}$ ，待40分鐘后，观察有无反应（胸悶、喘加重）如

无不良反应，可观察一次服藥能抑制多長時間，如能抑制40小
时，就每隔40小时服一次

重庆第一医院用中藥治疗支气管 喘息效果显著

方劑：

1. 射干麻黃湯

麻黃 射干 仙半夏 紫苑 細辛 五味子 冬花 生姜
大棗

2. 射干丸

仙半夏 射干 茯苓 橘皮 冬花 百部 干姜 細辛

皂矾(焙) 郁李仁 五味子 共末为丸

3. 哮喘丸

香薷 葶苈子 海浮石 桑白皮 共为细末为丸

白蛤散治疗浸润型肺结核

锦州市紫荆山结核病医院

处方：白芨20克， 蛤蚧去头足炙5克， 海浮石5克 共研成细末。

用法：每日服7.5克，每次服2.5克

辅助：根据病情佐以养阴清肺方剂。

黄连素治疗肺结核

(骨结核合併膿瘻管)

陕西省第一康复医院

将黄柏树皮磨成粗粉，以50%酒精作溶剂，按渗漉法浸渍24小时，将浸液滤过蒸发成硬膏状，趁热分成丸块，再用滑石粉与淀粉(10:1)做扑粉制成丸状，因干燥较困难，可用吹风机帮助干燥。

每丸含黄柏浸膏0.3•2丸一日3次。

主治各型肺结核，对新鲜病灶有效率80—90%，对陈旧性病灶尤其是对于链霉素无效者，也收到了肯定的疗效。

2%黄连溶液治疗四例，骨结核合併膿瘻管达十年之久的病人，曾用各种抗痨药无效，但在使用黄连液按瘻管大小深浅隔日注射一次，填塞纱布引流后，仅一个月时间，瘻管闭合而愈。

(其价比链霉素便宜20倍)

止血煎治疗肺結核咯血

蚌埠中医院

处方：

生地炭 白芍炭各三錢 陈阿膠四錢 白芨片三錢 生龙骨一兩
(先煎) 生牡蠣一兩(先煎) 生側柏三錢 艾叶灰一錢
十灰丸六錢 三七參三錢 分二次冲

用法：先煎二次混合約200cc分二次服一日一劑每次間隔3—4小时。

功效：共收治九例肺結核大咯血病人服藥1—9劑均癒。

中医治疗肺膿腫

天津紅十字会医会

处方：

以千金葦莖湯加減为主 輔以清熱 利痰 鮮毒如二冬二母
知柏地黃湯等類

治疗效果：共4例完全痊癒

消化性潰瘍

安庆中医院用延芍合劑治疗消化性潰瘍，据100例統計分析，效果良好。

处方：延胡索 生白芍 烏鰂骨 甘草各四兩 加水4000cc火煎濃縮至1200cc

用法：每日二次，早晚飯前各服30cc一般一月左右即癒

烏 參 散

处方：

海螵蛸一兩 三漆參一兩 乳香六錢 大貝母二錢半共為細末

用法：每日二次，每次一錢，病重者每三小時一次。

消 化 性 潰 瘍 丸

（ 蘭州醫學院 ）

处方：

沙參三錢 寸麥冬三錢 肥玉竹三錢 霜桑葉三錢

炒扁豆三錢 生甘草三錢 金銀花五錢 蒲公英五錢

乳香一錢 沒藥一錢 共為細末 煉蜜為丸，每丸重三錢

用法：每日二次，每次一丸口服。

甘 草 粉

上海市立第二勞工醫院研究用甘草粉治了胃潰瘍，初步應用20例服後經過X線檢查証明臨床效果好。

处方：

甘草適量磨成粉末。

用法：每日三次每次5克加水適量蒸熟口服三週為一個療程。

北京中醫研究院用中藥治療53例消化

性潰瘍有效率85.4%

处方：

潰瘍病：

主要湯藥：當歸三錢 靈脂二錢 沒藥三錢 天麥冬各四錢
云苓三錢 白芍三錢 玄胡二錢 枳殼一錢五 北沙參五錢
建曲三錢

止痛潰瘍合劑(粉劑)烏賊骨半斤 當歸二兩 乳香二兩
茜草一兩 滑石一兩 制香附一兩 白芍二兩 沒藥二兩
玄胡一兩

上藥九味，研細末和勻，每服一錢，米飲下。

隨症加減辨症施治法

寒痛 苔白脈遲喜熱①良附丸。②大小建中湯。③烏頭赤石脂丸。

熱痛 舌紅苔淨口干脈滑①金鈴子散。③左金丸。

虛痛 脈弱喜按舌嫩①黃芪建中湯。②歸芍六君子加乳香。③歸

脾湯。

血瘀痛①隔下逐瘀湯。②紅花。③川芎。

嘔便血①失笑散。②十灰丸。

噯氣①金橘叶。②砂蔻壳。

食慾不佳①建曲

反酸①烏貝散。②左金丸

腹脹①枳壳。②木香。③香附。

嘔吐①生代赭石。②半夏。

便秘①天木通片。②山梔。

中医治疗大衄及紫癍症

北京同仁医院

其觀察22例，其中痊癒18人占81.8%，接近痊癒4人占18.2%。

1.血小板减少，紫癍症处方：

人參一錢 不炒阿膠三錢 血余炭三錢 當歸身三錢

小蘗炭三錢 白茅根三錢 鹿角膠三錢 炙甘草三錢

炒杭芍三錢 蓮房炭三錢 熟地黃三錢 炙黃耆五錢

用法：

水煎溫服，小兒減半。

2. 過敏性紫癍病處方：

人參五分 赤芍三錢 生白朮二錢 甘草二錢 木妙阿膠三錢
丹參三錢 全當歸三錢 大小蘗三錢 廣木香二錢 赤茯苓三錢

用法：

水煎溫服，小兒減半。

紅棗治療過敏性紫癍

上海第四人民醫院

曾有六例過敏性紫癍病人經A.C.T.H.等藥治療無效，后用大棗治療后三天出血點消失，六天退盡。

服法：

小兒每天一斤煎連棗肉分數次服。

成人每天服生紅棗10個，每三次。

征服血小板減少性紫癍症

上海中醫學院第十一人民醫院用中藥治療血小板減少性紫癍症，效果顯著。

治療方法：

1. 涼血清熱法：犀角地黃湯加減。

2. 補血法：四物湯加減。

3. 補氣法：四君子湯加減。

4. 止血法：十灰散加減。

（附注）

1. 涼血清熱藥：如丹皮、赤芍、硝黃、川連、黃芩、銀花、連翹、鮮生地、大小蘗、白茅根、紫草。

2. 止血药：地榆炭、侧柏炭、茜根炭、阿膠、仙鶴草、槐花炭、参三七、藕节、黑山梔、牡蠣、龟板。

3. 补气药：党参、炙参、白朮、云苓、炙草、肉桂。

4. 补血药：当歸、白芍、熟地、首烏、旱蓮。

以上之药随病症轻重加减

糖 尿 病

北京市中医院治疗糖尿病50名，有效率达94%。

方法：以五味地黄汤为主，随症加减。

处方：生地四钱 人参一钱 天冬四钱 枸杞二钱 山萸肉二钱。

用法：水煎二次，分二次服，每日一次，饭前服用。煎法每次用水一碗，煎至半碗。

加减法：

①身体羸瘦、四肢酸痛、腰背痛、小便频数、早洩阳痿、耳聾

目暗、眩暈者，每日加鹿茸末二次冲服。

②头痛腰痛，腿膝无力，表虚自汗者，每日加肉桂一钱

③气虚盗汗，皮肤瘙痒，手足麻木、癰疽等症加黄耆三钱

④皮肤痒者倍加山萸肉。

⑤肌肉酸痛、口渴甚者，加葛根二钱

⑥视力减退，倍加枸杞。

⑦阴虚频渴加知母二钱

⑧齿齦腫痛，口舌生瘡，加花粉、銀花。

⑨大便干燥、肌肉刺痛，加当歸三钱 麻仁五钱。

⑩阴虚肺热，咳嗽者加沙参。

⑪虚煩不得眠者加棗仁、远志、生牡蠣。

⑫昏迷嘔吐加人参二钱

⑬嘈杂吞酸，嘔吐用半夏、茯苓、生姜另方煎服。

⑭如併发之癰疽症，如腦后疽、齿齦腫痛、或膿腫等病，酌加

以下各药，分量视病情轻重而定。

生黄芪、人参、生地、当归、川芎、连翘、蒲公英、银花、天花粉、甘草节。

⑮糖尿病并发头晕头痛、目眩、耳鸣、手足麻木等症酌加以下各药，分量视病情轻重而定。

黄芪、天麻、钩藤、生牡蛎、黄芩、生地、当归、桑叶。

中藥治疗再生不良性貧血效果显著

浙江省

处方：

①丹归芍散：归身二两 丹参五两 白芍一两

用法：

共为细末，每日三次，每次一钱。

②归脾汤加减。

潞党参四钱 黄芪八钱 归身四钱 首乌一两 白朮二钱 天
麦冬各四钱 阿膠五钱 棗仁四钱 紫河車四钱 远志二钱
大生地六钱。

用法：

水煎二次，早晚分服。

中医对原发性再生障碍性 貧血有显著疗效

辽宁省中医院

处方：（再造生血汤）：

地骨皮5.0克 天門冬5.0克 寄生5.0克 生地5.0克

犀角1.5克 郁金2.0克 丹皮2.0克 甘草1.5克 棗子2.0克

仙鶴草4.0克

加減法：

- 1 齒齦出血重時，加側柏炭，花蕊石。
- 2 鼻出血時加川軍炭，便秘時加川軍。
- 3 失眠心忙時加棗仁、天竺黃。
- 4 下腿疼痛加重時，加懷牛膝。
- 5 脈弱無力而不發熱時，亦可酌加入參、黃芪、當歸之類藥物。

中醫治療神經衰弱

安慶市人民醫院

處方：

天麻合劑：明天麻 双鉤藤 酸棗仁 西路党 制首烏 龍腦肉各四兩。

用法：

加水4000cc 煎至1000cc 成人每次25cc，每日二次，早晚開水送下。

功效：

據200例分析統計療效80%。

健腦丸

安慶市西醫學會醫院

主治神經衰弱，治療率達90%以上。

處方：

當歸二兩半 遠志一兩 菖蒲一兩 棗仁四兩（生熟各一半）
天麻一兩 五味兩半 枸杞二兩 胆星一兩 天竺黃一兩
龍齒一兩 益智仁兩半 琥珀一兩 苁蓉二兩 柏子仁兩半
硃砂一兩 胡桃肉二兩

將上藥研成細末，用蜜合成硬膏狀，做成丸，每丸三錢，每日服二丸，分二次服，15天为一疗程。

全國醫葯衛生技術革命展覽會印

养肝宁神合剂治疗神經衰弱

生石决明三錢 当歸三錢 珍珠母八錢 代赭石三錢 复花三錢
杭芍五錢 生首烏五錢 棗仁五錢 柏子仁五錢 远志三錢
五味子一錢 硃茯神五錢 硃蓮子心一錢 川連一錢 菖蒲三錢

用法：

用煎二次，濃縮至100—120cc，每次根据輕重酌給25—30cc
一日服2—3次，開水冲服。

成都中医学院用中藥治疗 风湿性关节炎效果好

方法：①祛風除濕活血鎮痛之法。

②祛寒散風除濕溫經絡之法。

方劑：①烏頭湯、獨活寄生湯。

②千金獨活寄生湯。

加減法：

熱重加黃柏、知母、木瓜、寒重加肉桂、附子、細辛、吳
萸、煨姜，濕重加蒼朮、萆薢、白朮、六脈不通加南藤、五
加皮、血藤、海風藤、木通、茜草。

风湿止痛藥酒

主治：慢性风湿性关节炎。

处方：

陽明花四兩 川烏四兩 草烏四兩 沒藥四兩 乳香四兩
白芷二兩 樟腦二兩 松節油一磅
加75%酒精3000cc，清水1000cc浸泡三周。

用法：

外擦

花蛇追風丸、白花散， 治療風濕性關節炎療效80%

石家莊中醫進修學校附屬醫院

(一)，花蛇追風丸：

大花蛇一兩，川烏三錢，草烏三錢，烏藥五個，羌獨活一兩，
威靈仙三錢，川牛夕三錢，五加皮三錢，當歸兩半，
桂枝五錢，明天麻五錢，殭蚕五個，全蝎三個，甘草三錢，
豬牙皂錢半，麝香五分，赤金十張

共為細面煉蜜為丸，每次服一錢五分至三錢，日服二次。

(二)，白花散：

白花子，川烏，草烏，巴豆霜，透骨草，杜仲炭各一兩。

共為細面，取五錢用人乳調勻，攤青布上貼腫痛處，約隔二十個
小時，有刺痒感稍揭視之，見有小水泡即可去掉，俟水泡消失后再行
敷用，一般貼二至四次即可痛止腫消。重者兩者都用效果好。

讓 高 血 壓 低 頭

黑龍江省祖國醫藥研究所

甲方：生赭五錢 生龍骨四錢 生牡蠣四錢 懷牛夕四錢 大生地六錢
生石決四錢 寒水石四錢 生石膏五錢 紫石英五錢 菊花三錢
鉤藤三錢 甘草二錢

乙方：龙胆三錢 黃芩三錢 山枝三錢 大黃一錢半 川羌三錢
防風二錢 川芎二錢 西歸三錢 荊子三錢 薄荷二錢
甘草二錢

丙方：當歸三錢 生地五錢 桃仁三錢 枳殼二錢 紅花二錢
赤芍三錢 紫胡三錢 川芎二錢 桔梗二錢 懷夕三錢
甘草二錢

丁方：安神丸 每日三次 每次服一丸

云母治疗高血压效果达90%

雲 南 省

处方：

鍛赭石三錢 生杜仲三錢 云母石三錢 石決明三錢
白芍三錢 牡蠣三錢 杭菊二錢 全虫錢半 當歸七錢
天麻四錢 蒼耳子七錢 黃芩四錢 夏枯草五錢

用法：

共為細末，以水為丸，硃砂為衣

每日三次，每次4—8丸。

妇女高血压病的特效方

上海中医學院附屬第十一人民醫院用二仙湯治療婦女高血壓病
306余例，有效率74.6%。

处方：

仙茅 仙靈脾 巴戟天 當歸 知母 黃柏各三錢

用法：

每日一劑煎二次，分二次口服，一般二星期后血壓即可下降。

臭梧桐治疗高血压胜过蛇根草制剂

上海第十一人民医院用臭梧桐子治疗男性高血压病人434例，有效率达72.6%。

处方：

臭梧桐：用开花前的生药阴乾磨粉轧片。

用法：

每日4—16克，分3—4次口服。

叫高血压让路

上海治疗高血压病又一新的发现，用牡丹皮治疗27例病人有效率达81.5%。

处方：

牡丹皮

用法：

每日一两半至二两，煎汤，分二次服，一般一星期后血压就有明显下降。

葛汤葛糊治疗高血压

广东佛山专区第一医院

处方：

①葛粉汤：生粉葛2—5市斤去皮切成小块，加水4—10碗，（1市斤加两碗水比例）煮熬成一碗。

用法：

分二次服5—7天服用一次。

②粉葛糊：粉葛粉每次用16克（相当于一食匙）加水一碗煮成糊

可加糖类作調味。

用法：

每日1—2次，可当餐食。

功效：共治21例效果很好。

桑葉膏能治高血压

处方：

鮮桑叶二斤 加至四斤煎取七分去渣 微火熬膏药二斤（乾桑叶亦可）

用法：

每次一兩，每日三次，可用白糖調味。

豨龍丸治疗高血压

处方：

豨簽草十兩 夏枯草十兩 龍胆草一兩五錢

共为細末，煉蜜为丸。

用法：每日2—3次，每次服三錢。

功效：共治40余例，效果良好。

我們基本上征服了高血压

北京第一中医門診部

从1958年五月开始至于八月底采取針药并用治疗高血压161例，
100%的有效。

治疗方法：

第一类：虛性高血压

針灸：肩髃 曲池 合谷 內关 神門 三里 三阴交 太冲

腎俞 心俞 大腸俞等

方劑：

- ①腎虛肝旺者：用知母地黃丸補陰煎虎潛丸。
- ②上實下虛者：地黃飲子，桂附八味丸茸珠丹。
- ③肝陰不足者：大定風珠 眞珠母丸 一貫煎 三甲復脈湯。
- ④營血不足：虛風上撓 地黃地骨皮湯 當歸 川芎湯，滋液和陽湯 四物湯
- ⑤氣虛下陷者：升陷湯 理中應氣湯 加味理陰煎 人參益氣湯
- ⑥營衛失調者：桂枝加桂湯黃芪五物湯

第二类：實性高血壓

針灸：上脘 中脘 氣海 梁門 天樞 上耳虛

方劑：

- ①風疾上撓者：加味白附丸 辰砂遠志丸 星香湯
- ②肝風上逆者：本事鉤藤飲 羚羊角散 清肝湯 桑丹瀉肝湯

第三类：寒性高血壓

針灸：陽關 氣海 關元 手足三里 陽陵泉 曲泉

方劑：

- ①髓海空虛者：龜鹿二仙和磁珠丸 胡桃枸杞湯 滋陰潛陽湯 壯水滋燥湯
- ②寒氣上沖者：黑錫丹 三健三生湯 桂枝八味丸

第四类：熱性高血壓

針灸：手十二井出血 十宣出血 大椎 曲池 合谷 外关

方劑：

- ①肝胆風火上升者：黃芩湯 龍胆瀉肝湯 當歸蘆薈丸

②胃腸滯熱者：三石湯 陶氏黃龍湯 承氣陷胸湯

④燥熱生風者：調胃承氣湯 葛根苓連湯 防風通聖丸

第五类：气血障碍性高血压

針灸：①氣虛者：針肩髃 曲池 巨骨 肩井 支溝 陽陵泉
內庭 三里 至陽

②血郁者：曲池 內關 陽陵泉 三陰交 血海 膈俞
方劑：

①氣虛血滯者：補陽還五湯

②血郁氣滯者：通經逐瘀湯

羊奶的利尿作用，可以治疗肾炎

錦州市紫荊山結核醫院 錦州市醫院

處方：煮沸之新鮮羊奶

用法：每晨口服一次500毫升，如病情嚴重，可每日口服二次，每次500毫升。

療程約一個月左右

白茅根治疗急性肾炎效果好

湖北貿易職工醫院

處方：

鮮茅根一斤切成小節，加水500.cc至1000.cc用緩火煮一沸，
而后移其鍋于爐旁，靜置十分鐘，根沉于底去渣。

用法：將煎湯溫熱分早、中、晚三次分服或給病人作飲料均可，制劑
必需當日用完，如發酵變為綠色即失效不可用。

功效：利尿、消炎、降血壓、改善腎臟功能。

用此單方共治六例急性腎炎病人效果很好。

中医治慢性肾炎效果好

福建省人民医院

本院自55年4月至58年2月，計收治慢性肾炎患者60例，証明对消腫效果极佳，部分病例尿变化，血液化学，腎功能均有不同程度的恢复。

治疗原則及方劑：

按中医辨証施治的原則，將慢性肾炎分为阳証与阴証，对水腫也分阳水与阴水两个类型，按照不同类型，不同病期，不同症狀选用下列方劑。

	消 除 水 腫	健 脾 利 水	溫 补 脾 腎
阴証	五苓散，小青龙湯，实脾飲，济生腎气丸，五皮飲。	六君子丸，枳朮丸，防己黃耆湯，四苓散。	金匱腎气丸，当歸补血湯，青娥丸，六君子丸。
阳証	十棗湯，疏凿飲，麻黄连翘赤小豆湯，导水茯苓湯，通关滋腎丸，甘草麻黃湯，五皮飲。	防己黃耆湯，四苓散、六君子丸，二金湯。	六味丸，六君子丸，青娥丸。

用法：口服

中医治癒急性白血病

贵阳医学院

1958年5月2日貴阳医学院附屬医院收容一位女性病人，住院及經檢查診斷为急性白血病 用輸血等疗法毫无进步，以后請中医会診。

中医診斷为瘟邪上受，竄入营阴，阴精內伤，骨髓內热，所謂热在骨髓，破坏了造血机能。处方主要葯物为犀角、石羔、生地、元

参、麦冬、龟板、鳖甲，重点着重在清瘟、解毒、止血、养阴、如犀角用以解毒、清瘟、止血，石膏用以解热，生地、元参、麦冬用以养阴，鳖甲、龟板用以清肝肾、骨髓至阴之热。同时佐以辅助药物，如地骨皮协助鳖甲、龟板以解至阴之热，用青黛、山梔以和缓犀角作用，再以柴胡帮助石膏解表里之间的热，更以党参补正。总之，立方用意是清瘟、解毒、清肝肾骨髓至阴之热，辅之补正养阴，也是攻病补正即所谓攻补兼施之法。

自服中药后病情逐渐好转，以后终于获得全愈。

中医治愈两例何杰金氏病

医宗金鑑外科“喉瘤”系“何杰金氏病”之一发病原因是由于肺經积热，多語損气而成病。

治疗采用方劑：

①益气清金湯：（为主）

处方：苏叶二錢 川朴二錢 貝母三錢 桔梗三錢 沙参四錢 陈皮二錢
清夏三錢 甘草二錢 金灯籠六分

用法：水煎分二次服

配合用补中益氣湯和歸脾湯三方灵活加减辨症施治

加味葛根芩連湯治小兒麻痺症

中医研究院

有效率100%

治則：

按溫病小兒中風例，采取清熱解毒，芳香辟穢，調肝熄風，定痺通絡之法。

处方：加味葛根芩連湯

葛根四錢 生石膏六錢 黃芩三錢 銀花四錢 蜈蚣一錢

全蠍一錢 杭芍四錢 川連一錢半 甘草三錢

加減法如下

无汗者：加麻黃五分——一錢

发热者：加青叶、蘭根、連翹 三——四錢

煩躁者：加鈎藤 三——四錢 胆草五分——一錢

痛者：加天麻四錢 芍藥四——六錢

通絡者：加地龍三錢 殭蚕三錢

麻痺在下肢：加牛膝三——四錢 寄生五錢——一兩

麻痺在上肢：加川芎二錢、地龍、寄生。

口眼喎斜：加細辛一錢 辛夷一錢 川芎二錢 白芷三錢

兼暑者：加藿香三錢 滑石三錢

嘔者：加半夏三——五錢 陳皮二——三錢 竹茹三——五錢

大小便閉者：大柴胡湯加芒硝、車前、地肤子、紫雪丹

恢復期：

加自拟加味金剛丸

草薢 兩 牛夕一兩 木瓜一兩 巴戟天一兩 菟絲一兩五錢

蜈蚣五十條 殭蚕二兩 全蠍一兩 苡蓉一兩 杜仲一兩

天麻一錢 烏賊骨一兩 制馬錢子二兩

蜜丸錢重每服一粒至二粒 日服二次至三次或單用或与湯劑

合用。

中医治疗小兒流感

西安市中医院

处方：

麻黃五兩 連翹六兩 二花六兩 生石膏六兩 浙貝母六兩

制法：先將麻黃用稀鹽酸25.cc加水500.cc浸24小時濾去，將麻黃加

入藥內水煎約四小時，然後去渣將麻黃浸液加入再加白糖一斤

蜂蜜二斤共煎濃縮至200.cc

用法：

一歲以內小兒 每次服 3—10.cc

2—5 歲小兒 每次服 3—15.cc

6—10歲小兒 每次服 15—20.cc

一日三次或每四小時一次

消疳化虫散

主治：小兒蛔虫，消化不良

處方：使君子仁三兩 貫仲二兩 鶴虱一兩 雄黃二錢 檳榔一兩
木香一兩共為細末

用法：10歲以下小兒每日服一錢，15歲以下小兒每次服二錢。

百部油羔治燒虫

南京中醫學院附屬醫院

處方：

百部浸膏 羊毛脂 液体石蜡配制成油羔

用法：臨睡前將藥羔由肛門塞入1—2克

功效：連用一週即癒。

中医治疗乙型腦炎

北京市中醫院

本院从1957年3月至9月收容乙型腦炎病人共53例，用腦炎合劑
治療，45人痊癒出院，占92%。

腦炎合劑組成內容：

1. 加味銀翹散：

銀花六錢 連翹六錢 薄荷一錢 桔梗二錢 蟬衣一錢 姜蚕二錢

生石膏一兩 大青葉二錢 青竹茹三兩 蘆根二兩 甘草一錢
鮮霍香二錢 鮮佩蘭二錢 黃芩一錢 梔子二錢 鮮吞下。

水煎400cc或自酌量

2. 加減清瘟毒飲

生石膏四兩 知母三錢 粳米一兩 甘草二錢 竹葉二錢
連翹五錢 銀花一兩 鮮生地一兩 元參四錢 丹皮二錢
廣犀角五錢 天竺黃二錢 大青葉四錢 川連一錢 黃芩二錢
生梔子二錢 赤芍二錢 鮮菖蒲二錢

水煎600.cc每次250.cc

3. 加味勾藤熄風散

勾藤四錢 姜蚕二錢 蜈蚣六條 全虫一錢 蟬衣一錢 胆草一錢
地龍二錢 生石決明一兩 天竺黃二錢

水煎200.cc

4. 生脈散

野人參八錢 麥冬五錢 五味子一錢

水煎200.cc

5. 止汗護陽和陰合劑

生龍骨一兩先煎 生牡蠣一兩先煎 白芍六錢 野台參五錢
沙參五錢 元參五錢 鮮石斛兩片 生石膏五錢 天竺黃二錢
山芋一兩 山藥五錢

水煎400.cc

6. 清絡飲

鮮荷葉邊五錢 銀花五錢 扁豆衣五錢 竹葉一錢 西瓜翠五錢
沙參五錢

水煎200.cc

7. 腦炎頭痛合劑

生石決明一兩 生石膏八錢 辛夷一錢 菊花二錢 鮮薄荷五分
鮮荷葉五錢

水煎200.cc

上述七個方劑必須根據病情，辨証施治。

八味消毒飲治疗梅毒

四川涪陵专区性病防治队

处方：

硃砂 礞砂 礞砂 銀朱 黃丹 水銀 白錫 輕粉 各等份

制法：先將白錫熔化次加入水銀同炒，倒在地上待冷后研細，再同其它藥研細混合。

用法：

每次用藥五分，用杉木細末3—4分混勻放入碗內（另用一碗裝柴灰，壓成一酒杯小窩，藥即放入鍋內）點藥末，對准鼻端燻之。

注意事項：

- ①燻時用布罩上噴白酒，罩住頭部。
- ②口緊閉，不談話、口內涎液不要嚥下燻后吐出。
- ③每5天燻一次，每次15—20分到熱完為止，燻后用淡鹽水嗽口
- ④頭暈，心悸用雷公散一兩煎水服，腹脹、腹瀉用路邊蛇一兩煎服（孕婦兒童忌服）

復方土茯苓治梅毒效果好

处方：

土茯苓六兩 金銀花三兩 黃柏二兩 草薢二兩 白芷一兩
當歸一兩

效果：共治14例血清反應陽性，用此藥后有六例完全轉為（—）4例基本轉為（—）4例無變化。

治疗梅毒秘方“清血搜毒丸”

和“三仙丹”

河北省隆化县运用中医盛子章老先主治梅毒秘方“清血搜毒丸”和“三仙丹”，苦战三十天，消灭了全县现症梅毒。实践证明，这个秘方有五大优点：（一）经济，治好一人只需一、二元；（二）简便，口服即可，不需注射，适合人民用药习惯；（三）治愈快，轻者七天，重者一个日即能治愈；（四）便于推广，只要学习三、五天，即能掌握运用；（五）副作用小。现将盛子章老先生写的“治疗梅毒秘方清血搜毒丸和三仙丹介绍如下：

方剂及治疗方法

（一）清血搜毒丸

1. 成人处方及配制方法

处方：

血竭花二两 广木香 青木香 丁香 兒茶各一两 豆霜六钱

配制方法：将上药研成细末，用薏仁米二两煮粥混合为丸，按每一钱二分为一剂分装。如欲多或少量配制，可按此比例混合配制。

2. 儿童处方及配制方法

处方：

成人清血搜毒丸七钱 麝香一分五厘

配制方法：以薏仁米三钱煮粥，将上药混合团成绿豆大丸三百丸。

3. 功效：泻下清除结毒淤积。血竭花为君：散淤通经去五臟邪气。广木香、青木香：健胃调气。丁香：温脾胃、消痼癖。兒茶：清上膈热定痛生肌。豆霜：通闭塞利水谷道。薏仁米：健脾渗湿。

(二) 三仙丹

1. 成人处方及配制方法

处方：

火硝七錢 白矾八錢 水銀一兩(簡記為七硝八矾一兩銀)。

配制方法：將火硝、白矾研成細末，放在砂鍋或小鉄鍋里攤平，在上面軋成豆大坑窩(窩深度勿達鍋底)若干，然後將水銀傾入各坑窩里，再用大碗扣在鍋上，鍋碗的結合縫用鹽水合成的黃土泥抹嚴，嚴防裂開漏氣。碗底上放塊棉花，用銅錢壓上，即可架炭火燒鍋。燒時發現泥裂縫漏氣，隨時用稀泥塗嚴。先用弱火燒，待縫泥干燥後，再用裂火燒，約歷一至二小時至碗底棉花變成黃褐色時，除去縫泥，揭開大碗，碗內有一種象硃砂色的物質，即為三仙丹。

三仙丹製成後，每四分三仙丹中，再加輕粉二分，元明粉一至三分，天麻一分，姜虫一分五厘，珍珠(末)三厘，麝香三厘，冰片三厘。將上藥混合後，以棗肉為丸算一劑，為三仙丹合劑(以下簡稱三仙丹)。

2. 兒童处方及配制方法

处方：

一劑成人三仙丹合劑，再加麝香二厘 珍珠(末)二厘。

配制方法：將上藥以棗肉為丸分成二十四丸。

3. 功效：驅梅毒，三仙丹為主藥，佐以輕粉等八味藥，使驅梅毒作用更為徹底。

輕粉：逐水劫瘡毒。元明粉：清內熱，潤燥破結。天麻：諸風，麻木不仁。姜虫：疳蝕鱗體，去搔痒。珍珠：潤澤皮膚。麝香：開經絡，透肌骨。冰片：通諸竅，散淤火。大棗：和百藥。

(三) 漱口靈

從服三仙丹起，每日漱口連續五至七天，漱口用口靈。

处方：

土茯苓一錢 双花一錢 青代一錢 薄荷、冰片少許，混在一起
為一日量，稠在二至四斤開水內溫涼後含漱。

漱口靈有散熱解毒作用。土茯苓為君：可解經粉、銀珠之毒。双
花：散熱解毒。青代：清熱，涼血解毒。薄荷：喉痛，口齒腫痛。冰
片：通諸竅散瘀火。

(四) 局部用藥

遇有皮膚瘡面嚴重潰爛的病人，在服藥同時，可以在局部塗抹藥
品。

處方：

由人中白、珍珠和冰片製成，取男仕人中白一錢，用瓦焙黃，
加冰片一錢，珍珠（末）少許，混合一起，局部塗抹。

人中白佐以珍珠、冰片能消腫止痛，使瘡面加速癒合。

注：以上各方用之珍珠必須先放在豆腐內煮沸三十分鐘
左右，取出曬干後，研成細末再用。

(五) 服用法

1. 成人服用法

一般十天為一個療程，第一、三兩日各服清血搜毒丸一劑，以瀉
為度，如不瀉可連服，直至兩次全瀉為止（服搜毒丸後二至三小時
內，如仍不瀉，可再服一劑，一般這時都能瀉下）；第五、六兩日服
三仙丹一劑，分兩天服，每天服一次；第九或十日再服清血搜毒丸一
劑（瀉否無妨），一個療程即為結束。這最后一劑清血搜毒丸非常重
要，吃它就能根治，不吃它就必然復發。不論是清血搜毒丸或三仙
丹，都必須在早起空腹時用熱開水送服，服後不吃早飯，過中午吃飯
，如吃早飯則病人必發生嚴重的頻繁的吐瀉。

早期梅毒，只給一個療程，晚期的、局部損害嚴重的梅毒可給二
至四個療程，每個療程的間歇期是三至七天。

2. 兒童服用法（服用兒童清血搜毒丸和三仙丹）

清血搜毒丸：一岁以内的每次服一丸，二至五岁每次服二丸，五至十五岁每次服三丸（十五岁以上按成人量，成人办法服用），连服三天，每天一次，早空腹服，不要求泻。

三仙丹：十五岁以下儿童每次服一丸，连服三日，每日一次，早起空腹服（十五岁以上者按成人量和成人办法服用），服最后一次三仙丹后，隔三至七天再服一次清血搜毒丸，一个疗程即为结束。轻症给一个疗程，重症给二至四个疗程，每个疗程的间歇期是三至七天。

（六）清血搜毒丸和三仙丹的禁忌

1. 孕妇及产褥期的妇女忌服。
2. 服三仙丹后，一年之内不准吃母猪肉，食则必复发。
3. 服清血搜毒丸时，不许喝冷水及米汤。
4. 晚期喉痹病人经常吐血者忌服。

（七）服清血搜毒丸和三仙丹后的反应及救治办法

成人服清血搜毒丸后，约二至六小时开始腹泻三至十次左右，这是应有的反应。泻的次数越多，证明毒清的越彻底，服三仙丹时反应越小。

成人服三仙丹后，约二至六小时也发生腹泻，口腔流涎，这也是药的应有的反应。

有一些人在服三仙丹后，口腔和牙龈发生红肿糜烂疼痛，特别是原有口腔病或牙齿不清洁的人较严重。为防止和救治口腔炎，即从服三仙丹起，坚持做到勤漱口（用漱口灵），白天不睡觉，持续漱五至七天。如果坚持做好这两条，就不发生或少发生口腔炎。

一般人在服药后还有轻度的腹痛、腹鸣、头晕、四肢无力、不适等感觉，也不需救治。

所有上述反应，除较严重的口腔炎外，都不影响劳动和操持家务，

儿童服清血搜毒丸和三仙丹后，除个别人发生轻度腹泻外，一般没有反应。

中医祖傳祕方治疗精神病

北京市海淀医院用徐鴻民同志的祖傳祕方治疗三例病人病历如下：

治疗病历

病 名	第一次服藥	第二次服藥	列 考
急性躁狂	症狀好轉	同 前	一 例
反应躁狂	” ” ” ”	基本痊癒	一 例
躁狂症	” ” ” ”	” ” ” ”	一 例

藥方：

胆矾一錢 硃砂一分 甘草炭一分 白糖一錢二分

（如用藥量多可用此比例增減總之硃砂、甘草炭各是胆矾的壹份白糖，是胆矾、硃砂、甘草炭的总量）

用法：

研為粉劑，用膠囊裝一周一次，晨空腹用黃酒，（一至二兩）送下，服藥后多飲開水，服藥前作詳細體檢。

劑量：初得者五至八分，一年以上者一錢

反应：服藥二十分鐘后有嘔吐二至四次，一、二時后即無不適感。

适应症：躁狂症，反应性精神病。

禁忌症：心臟病，开放性肺結核、气管炎、胃潰瘍、孕婦、肝脾疾患，老年性高血壓。

中医对尿毒症的治疗

中医研究院

尿毒症在現代医学來說，尙无好的治疗方法，我們根据中医“辯証施治”的原則治疗数例效果很好，治疗原則：是“崇土制水”法。

选用方劑：①四君子湯

②六君子湯

說明：但必須靈活加減。

中医治疗囊虫病的驗方

佳木斯中医院

方劑：

①硃矾丸：明矾一斤 硃子一錢半 黄腊四兩 蜂蜜二錢 先將明矾軋細面待用，再將江硃子微炒黃色研細面合矾面，另將腊、蜜用火化开，合前面藥乘热众手为小丸如黄豆粒大。

用法：

每服一錢 日三次飯前服。

註：在服硃矾丸之前应先用驅虫葯打虫。

②驅蟯虫葯：南瓜子三兩先微炒去皮吃下，隔一小时再服煎劑
葯栝榔三兩 石榴皮五錢 川条三錢 芒硝二錢 用水三飯碗，煎剩一碗溫服此葯服下約五个小时，即可打出蟯虫。

中医治疗大骨节病

处方：

乳香、沒药、土虫、地龙、赤木、双皮、降香、白芷、各等量
共为細末。

用法：每晚內服每次 4 克用黄酒为引

禁忌：孕妇、月經期忌用。

治食道癌驗方

陕西省中医研究所

蛻螂七个，用黄泥單个包，包好放紅炭火內煨的將紅时 取出去足、翅硬壳合下葯。

巴豆三枚去油輕粉一錢、青木香五錢、老紫蔻四錢、象牙磨粉一錢、珍珠粉五分。同蜆蠹一起共為細末，再用米粉八兩白糖八兩拌勻，白開水送下，每服兩錢，早晚服。

治 陽 萎 驗 方

陝西省中醫研究所

處方·

力參五錢 白朮一兩 巴戟一兩 黃芪五錢 北五味一錢 熟地一兩 肉桂一錢 遠志一錢 柏仁子一錢 山萸肉三錢

用法：水煎連服三十劑則陽旺而舉。

獻方人：李紫榮

二、外 科

治 療 蘭 尾 炎 不 用 手 術

吉林樺甸縣夾皮溝職工醫院

中藥治療蘭尾炎200例的統計觀察，療效達98%

處方·

1. 大黃牡丹湯：

大黃兩半 朴硝三錢 西歸四錢 雙花二兩 丹皮三錢 桃仁五錢 冬瓜仁五錢 連翹八錢 貝殼一錢 桔梗一錢 甘草一錢

2. 敗醬湯：

敗醬二兩 附子三錢 苡米四錢 雙花五錢 西歸三錢

敗醬湯與大黃牡丹皮湯合併交替應用提高療效，平均住院七天費用15元。

中藥治疗蘭尾炎超过国际水平

处方：

金銀花三兩 当歸二兩 生地榆一兩 麦冬一兩 大元參一兩
黃芩二錢 薏米五錢 甘草三錢
水四大碗煎至一大碗

用法：口服

功效：据200例急性蘭尾炎分析，治愈率100%

用金錢草治胆結石

中医研究院

处方：

用四川大金錢草每日半斤煎兩次分服。

消石散治疗胆結石

西安市中医院

处方：

鬱金粉二分 白鬱末 一分六厘 火硝粉 三分半 滑石粉
六分 甘草末一分

用法：

上药共为細末为一次量成人每日服2—3次，小兒酌減，孕婦忌服。

桐 油 石 膏

广州铁路管理局卫生处

說明：萍乡铁路卫生所，采用民間秘方。

主石膏粉和桐油等量配漿糊狀，敷于患处。

功效：治疗深部膿腫及一般炎症。

优点：疗效大，不用开刀排膿，不用打針吃葯，减少患者的痛苦，減輕病人經濟負担。

用法：同魚石脂膏一样外敷。

草藥金錢草和滿天星治疗胆管結石

重庆第二中医院 重庆医学院附属医院

处方：

1. 炒柴胡四錢 枳实三錢 炒赤芍四錢 生甘草一錢半 茵陈一兩
赤苓八錢 丹参三錢 淡子苓二錢 川郁金四錢 金錢草一兩
2. 金錢草一兩 滿天星一兩 炒柴胡三錢 炒枳实三錢 茵陈一兩
炒黑梔四錢 炒丹参四錢 郁金二錢 赤白芍各三錢

用法：加水600毫升，煎至300毫升，分三次服一日一劑。

江 猪 油

广州铁路管理局卫生处：

說明：岳阳铁路卫生所利用江猪油治疗燙伤。

此葯为动物性油脂（河豚魚脂肪提煉）暗黃色，其味甚腥，在零度下的气候中也不凝固。

功效：治愈后无瘢痕，是其优点，对皮肤粘膜无刺激，而有镇痛作用。

用法：先用消毒生理盐水冲洗患处，用无菌纱布泡在江猪油里，然后拿出敷在患处，用绷带包扎，隔一天换一次，在治疗日程，服磺胺类药物。

征服破伤风

山西万荣县人民医院史济生

疗效100%：超过了国际水平

处方：

1. 用蝉退五钱 去头足翅膀炒黄研细用黄酒二两冲服，一日一次，六七日以后症状即可消失。（小儿可根据年龄酌减剂量）
2. 每日服蝉退发汗后，输林格尔氏液1000毫升，促使排除病毒，并防脱水。
3. 痉挛甚者，辅助针刺疗法（针刺：百会、风府、大椎、曲池、合谷、承山、太谿等穴）以缓解其痉挛。

五虎追风散治疗破伤风

处方：

净蝉衣一两 天南星 二钱 明天麻二钱 全虫（带尾）七个 僵蚕七条 硃砂面五分（另包）

用法：水煎、黄酒二两为引，服前先硃砂面冲下，其硃砂与黄酒量均按年龄计算。

果效：共治 五例痊癒。

燙 傷 油 膏

處法：

白芷一兩 紫草一兩 冬藤一兩 白腊五錢 冰片五分 香油
一斤

制法：先將白芷、紫草、冬藤放在香油中炸焦除渣入白腊最后將冰片
研細入藥。

用法：外用

燙 傷 藥

處方：

1. 天青地白草（又名冷水丹）二兩 过山龙二兩 土牛夕一兩
土荊芥一兩 （均用新鮮的）无土荊芥可买白腊三錢麻油一斤
將上述四味藥和麻油用火熬3—4煎（用手指試不燙手）后濾過
渣，下入白腊待凉化后凉冷敷用。

（安徽來安縣武集鄉醫院）

2. 10%黃連油

配制方法：

①以精制法先將川黃連制成1—1的浸膏。

②黃連流浸膏10%加甘油或麻油至100cc。

③用法：塗在新燙的傷面上，一日三次，如傷面污染，可先
用鹽水洗淨。

（四川重慶工人醫院）

3. 地榆黃連粉

地榆100克

黃連素2克

用法：混為細末，外撒于傷面。

銀花解毒湯治療頰面部化膿

中医研究院

处方：

銀花、連翹、竹叶、元參各3—5錢

用法：水煎服，連用二劑疗程为三天。

功效：共治75例有效率100%。

金花草(細葉蕨)治燙火傷

广西中医藥研究所

处方：

金花草治燙火傷效果很强，用生叶鎚爛加冷水濕透或晒干研成末，用米泔水混成糊狀，塗患處，極涼快，立即止痛。小傷敷兩小時即癒。深部重傷，一天敷幾次，兩天可癒。用生叶鎚爛外敷，對於跌打創傷的炎腫，效果也很好。

猪胆膏

1. 适应症：治療蜂窩織炎有特效

2. 处方：

藤黃錢半 沒藥一兩 松香一斤 牛夕一兩(水制)

廣膠三兩 生薑二斤 蔞四斤 猪胆二十个

苯甲酸鈉0.2%。

制法：藤黃、沒藥、松香、牛夕、各研為細末取猪胆汁、姜葱搗汁一起放入鍋內燒滾，加入藥末，再入廣膠和勻，每料加苯甲酸鈉0.2%。

用法：

外用、日敷一次3—7天癒

中医接骨丹治疗骨折及急性

挫伤200例超过国际水平

处方：

老雄雞腿一付 前額骨一克 土國一兩（烤乾成粉）取其香加
黃酒煮沸內服

接骨膏：

乳香、沒藥、鹿角霜、桑白皮各四錢

細白麵、蕎麵各30克，加陳醋250.00

用法：骨折整服同時患處敷接骨膏后用夾板固定，同時內服接骨丹一
付即可。

用中藥接骨創紀錄骨折癒合

速度超过国际水平 广西人民医院

处方：

1.地龟虫13只 金边水蛭三条 2.大毛七 小毛七 烏药
金錢草 白背毛 小榕树叶 鵝不食草 八角黃，各等份，
研末备用

用法：用酒、麵調黃成膏外敷患處夾板固定。

中藥六合丹圍藥治疗疔癰瘡毒

四川医学院皮花科

处方：

大黃三兩 黃柏三兩 白芨一兩八錢 薄荷叶兩一五錢 紅梅肉
一兩五錢 白芷六錢 烏金散一兩八錢 陳小粉五兩

制法：

上述前七味药共为细末，加入陈小粉，匀备藏，用时同蜂蜜调和。

用法：外涂

适应症：各期疗疮癰毒不论初起或成膿，收口均适用。

功效：塗擦方便，簡單經濟、消炎、止痛迅速可靠。

口服中藥治疗痔瘡

处方：

猪大腸連肛四寸 槐花四錢 槐角四錢 柿餅一个(去蒂)

地榆四錢 苦参四錢 刺猥皮四錢 无花果四錢 黃連三錢

黃柏四錢

上方当病重时六錢，病輕时三錢

加减法：

①嗜酒引起者加葛花四一五錢 銀花三至五錢黃連三至四錢

②因怒而引起者加黃芩、木賊、白芍各三至四錢

③因喜吃辛辣而引起者，加梔子三至四錢重加黃連一至二錢

④吸烟而引起者，加桑皮三錢枯苓三錢

⑤发炎腫痛，加黃柏，黃連、苦参

⑥流血者加炒蒲黃四錢陈棕炭四錢

⑦流血特多者加茜草根四錢白朮三至四錢

⑧噴血者加除⑥条外再加党参三錢北耆三錢

⑨除根时加木耳三錢海帶三錢猪悬蹄 2——4个

用法：每劑水煎平分四次口服，每日二次早晚空心服。

中医治疗骨癆症74例

北京中医研究院

中医治疗骨癆的方法一般采內用外兼治在整体疗法的原則下辨証用藥随証加减。本院共治74例骨与关节結核有效率81%。

1. 外治用藥：

①骨癆散：生甘草、生川草烏、生白芨各八兩 藤黃十二兩 狗寶四錢 射香二錢五分（共研細末，同時以開水調膏如泥狀，外敷于未潰之病灶處，用量按大小決定，每週換藥一次）

②滾膿丹，紅昇丹一兩 老廣丹三兩 狗寶一錢 梅片一錢半 射香八分（共研為細末亦可用富強粉制成药綫用于結核性潰瘍及瘻管。

③化腐生肌丹：百降丹三錢 乳沒、白丁香、甘石、海螵蛸各三錢 梅片一錢 珍珠射香各三分，（共為細末也可用富強粉制成药綫用于結核性潰瘍及瘻管。

2. 內服藥：

主要用陽和湯，或丸、犀黃丸、益氣養榮湯、黃芪膏八珍丸、骨癆丸等。

3. 优越性：

①不用石膏固定，能早期活動，

②治療方法簡便經濟易于推廣。

③适用于部分手術療法的禁忌症及對抗癆藥物產生抗藥性者，且可為手術準備條件。

中医治疗血栓閉塞性脈管炎療效草著

河北天津专区第一医院中医科

用中藥四妙勇安湯治療61例閉塞性脈管炎，除一例因合併梅毒而截肢外，其餘均得痊癒，使病人免于手術和殘廢的痛苦。

处方：

黃芪四兩 銀花四兩 當歸二兩四錢 甘草一兩二錢

用法：水煎服一日一劑

注意：服藥不可間斷，此外尚可根據病情用陽和湯、人參養榮湯、保元大成湯、托里定痛散等配合治療。

中藥治療143例脫疽效果良好

北京市中醫院

治療法則：

1. 在酸痛、畏虛、寒冷，夜臥不安，不能入睡、面色蒼白、脈象沉細者給予：回陽補氣鎮法（陽和湯加八珍湯）。

陽和湯：熟地 麻黃 鹿角膠 肉桂 白芥子 炮姜 炭炙甘草

八珍湯：四君子湯加四物湯（人參 苓 茯 川 芎 當 歸 白 芍 地 黃 白 朮 甘草）

2. 在四厥逆；脈象沉弱，而身體強健者給予：破瘀通利活血法（抵當湯）

抵當湯：水蛭 虻蟲 桃仁 大黃

3. 行走困難，腿肚發墜酸痛發涼等時給予“舒筋活絡法”藥物，宜木瓜、絲瓜絡、伸筋草沒藥、當歸。

4. 行路困難、有急燥不安，酸痛難忍、并有潰瘍時，給予解毒內托法（顧步湯加內托藥）

顧步湯——雙花、元參、石斛、全歸、黃芪、半芍

5. 面色蒼黑，四肢厥逆，行路困難，患肢發白發涼如水脈象沉細而弱，趺陽脈微遲甚而不見者可給予（附子理中湯：西邊湯或陽和湯并用）

四逆湯：附子、甘姜、甘草

附子理中湯：附子、干姜、白朮、人參、炙甘草

柳木接骨膏接骨法

陝西省中醫研究所

處方：

活柳木鋸末三錢 公半角炭二兩 舊面一兩 加撒毛枝 自然銅

三錢 鐵白皮一兩 將上藥研為細末，裝入瓶內。

用法：陳米醋一斤、煎沸，放藥入鍋中，煎成糊狀，攤于黑布上，趁熱外敷傷處，七日揭去。

功效：5—10分鐘止痛，12小時即有軟骨連接，30天持拐行走，80天恢復工作。

土 法 治 大 病

天津汗沽鹽場醫院

刺菜膏治療瘡瘍外傷感染

處方：刺菜（青青菜）凡士林

制法：用水洗淨刺菜，放容器內搗爛，濾出汁，和凡士林調勻即可。

用法：外敷患處

去 腐 羔

天津醫學院附屬醫院

一、處方：大棗二兩（去皮核）紅粉三錢 輕粉三錢 冰片二錢

共搗膏，治陰疽，除腐肉。

二、效用：適用於瘡口面積很大腐爛組織很多處，如癰，其有擴大瘡的作用。

二 粉 提 毒 散

天津醫學院附屬醫院

一、處方：枯礬一兩 輕粉三錢 冰片二錢 共為細末

二、效用：適用於形成癰管的瘡口，治陰疽瘡口分泌物較多者。

生肌散

天津医学院附属医院

1. 配制法：乳香、沒药各二兩 血竭三錢 冰片二錢，共为細末。
2. 效用：治一般不癒合的瘡面，其使血球增加、使血液循环旺盛。

提毒散治阴疽瘡

天津医学院

- 一、处方：牛蹄壳炒黄为末一兩 冰片三錢 輕粉二錢 麝香少許 共为細末。
- 二、效用：适用于結核性伤口，治阴疽瘡面肌肉坏死腐脫未脫。

陈旧性肩关节脫位复位手法

陈旧性肩关节脫位一般需采用切开复位，而祖国医学在正骨方面具有丰富的經驗和科学成就，朱兴恭同志用手法治疗4、8个月的肩关节脫位效果很好。

創造人：陕西省中医研究所朱兴恭，張超然。

疗 效：4个月以上之陈旧脫位，均可用手法复位，最長者一例，8个月亦順利整复，此法亦适用于新鮮脫位。

手 法：用綳帶固定患側肩关节，令病人側臥，患側向上，术者双手握患肢使外展90°牽引，在牽引中內收至胸壁，然后背屈30°，同时尽量旋前，內收，再貼胸壁滑至胸前，使患肘达体中線，在滑移上肢之同时，助手用双拇指置鎖骨下向上，力推脫出之肱骨头，如肩头由方形变为飽滿即已复位，新鮮脫位复位时必有响亮之吓噠声。

備 註：用此法治疗陈旧肩关节脫位40余例，效果良好。复位后繼續固定三星期。

三 皮膚科

中藥熱烘療法治療神經性皮炎及 慢性濕疹(神經性皮炎用瘋油膏)

上海市中醫學院附屬第十一人民醫院

處方：

輕粉錢半 廣丹一錢 飛辰砂一錢

上藥共為細末先以麻油煎微滾入黃脂一兩，再煎後無黃沫為度，
離火後，再將藥末漸投入調膏。

慢性濕疹用青黛膏

上海中醫學院附屬第十一人民醫院

處方：

青黛二錢 石膏四兩 滑石四兩 黃柏二兩

上藥共為細末，用凡士林油調成25%軟膏。

黑豆溜油治療小兒濕疹療效達97%

西安醫學院兒童保健所

將黑豆裝入罐中，用鋸末火加溫，蒸溜出純黑豆油，用時可根據
病變大、小、深、淺、年令分別使用10%、20%、50%黑豆油治療。

发揚祖國醫學遺產应用白蔹藥

浸羔来治疗白癩风

白癩风——此病在口內外，尙无有特效療法，河南省人民醫院皮花科醫師米鉢，使用了中藥白蔹藥治療每日三次每次5—10cc即可，他在兩個月中共治療10例2例完全治愈，七例均有好轉只有一例未見效。此藥市面上已有賣的可自行購買。

40%紫草油治疗臀部尿布性皮炎

配制方法：

將30克紫草溶于100cc植物油中浸泡一週去渣呈深紅色油劑經消毒后外用

鵝掌風藥膏

处方：

信石一錢 黃腊一錢 麻油一兩混合為膏外敷

腋臭散

处方：

蜘蛛炭一分 輕粉一錢（為一劑量）

制法：用黃泥混水包裹蜘蛛放火內煨紅為度

取出待冷，將泥剝開，取出蜘蛛炭與輕粉共研細末

用法：先將腋窩用溫水洗淨拭乾在將藥末擦在腋窩上稍用力反復擦每

日擦2—3次，每四小時塗擦一次

用量：每劑量2至3次一般二劑。

紫旧膏治疗冻瘡

处方：

紫草一兩 当歸一兩 胡麻油一兩 黄臘五兩配成藥膏。

用法：外塗。

嬰兒濕疹軟羔

处方：

黃連 枯凡 單軟羔配成軟膏

用法：每日三次塗患处

适应症：小兒濕疹搔痒一般5—7天即显效，治愈效85%。

濕疹湯

主治：急性濕疹

处方：

荆芥二錢 防风一錢 全退二錢 当歸二錢 紅花二錢 胡麻

三錢 苦參二錢 牛旁子二錢 生地二錢 桃仁二錢 双花四錢

甘草二錢 連翹三錢 薄荷一錢

用法：水煎服，其量可按年齡增減。

白癜風中医疗法

长春市医院

观察200例治愈率80%基本上解决了白癜風治疗問題。

处方：

1. 白癜片（內服）

紫草50克 降真香50克 重楼50克 白药子50克 白薇50克
苍术20克 海螵蛸35克 红花50克 桃仁50克 生首乌50克
胆草20克 刺疾莉750克 甘草35克

共为细末，制成片重1克每次服10克每日二次开水送下，小儿酌减。

2. 黄灵粉（外用）

火硝150克 枯凡150克 水银100克

制法：上药混合盛于磁锅用碗严扣固封，烧成黄粉，再加等量升华硫黄。

用法：春夏秋用醋，冬用白酒，用棉球涂擦患处20分钟，每日二次

脚 气 粉

处方：

轻粉二钱 冰片二钱 煅甘石一两

用法：研细为末，用麻油调敷患处每日二次

中藥治腋臭不用开刀

处方：

紫丁香二分 三仙丹三分 龙脑（冰片）二分

明矾（或枯矾）五分 石膏五分 滑石粉三分

用法：

每日早晚用肥皂水洗患处擦净后用，本方药末敷于患处如汗多可装入纱袋挟入也可，每日二次，半月可好。

中医能治汗斑症

处方：

鹿角炭 密陀僧 白茯苓 天门冬各等量共为细末

用法：睡前用净水洗脸后用茄子一小块先擦拭患处后用蜜调本剂，敷患处一日一次用水洗去，一週至一月即退。

治皮膚潰瘍驗方

处方：

黃連20克 寒水石20克 冰片2.0克 蓖麻油20.0cc

凡士林40克

用法：作成膏劑外敷患处。

紅鼻液治疗酒皰鼻

处方：

硫磺25克 輕粉5克 白矾5克

將此藥共为細末，然后浸入75%酒精300.0cc中，二日后使用。

用法：

白天擦3—4次疗程1~2月

神經性皮炎用瘋油膏

处方：

輕粉錢半 广丹一錢 飞辰砂一錢

上藥共为細末先以麻油煎微滾入黃腊一兩，再煎后无黃沫为度，离火后，再將藥末漸投入調膏。

偏方有奇效酒皰鼻能治好

天津市鹹水沽醫院

处方：

水銀 冰片 樟腦 紅粉各33克 火麻仁500克 核桃仁400克

制法：共搗成泥

用法：外塗患处一日一次

中西医結合治疗甲癬

·北京中苏友誼医院·

第一軟膏：

处方：

柳酸12.0 乳酸5.0 凡士林82.0

第二軟膏：

处方：

柳酸5.0 凡士林95.0

用法：先將第一劑軟膏塗于患处蓋油紙或棉花，用繃帶包紮，經過48小时后改換第二劑（包法同前）經48小时后修甲。

拔甲膏：

处方：

蛇蛻一兩五錢 川椒一兩 生川烏六錢 皂角一兩五錢 杏仁一兩

風仙子四兩 千金子四兩五錢 殭蚕一兩 風先花二兩

天南星一兩五錢 太桐子一兩 烏梅一兩 地肤子一兩五錢

威靈仙一兩五錢 五加皮一兩五錢 生草烏六錢 地骨皮一兩五錢

用法：上藥加香油三斤熬黑去渣入樟丹（适当量）成膏后溫入礞沙二兩將拔甲膏火烤軟貼患甲膏隔日一換，2~3次直至患甲修拔乾淨貼換黑布膏。

黑布膏：

处方：

黑醋五斤 五倍子一斤十二兩 蜂蜜六兩 蜈蚣十二條

將上藥制成黑色稠膏配藥時應掌握火候研柔一方向忌金屬器。

用法：

治疗之甲先將甲用茶水擦后，將藥膏塗上用黑布蓋好再用茶水擦，候稍乾再包裹好隔二日一換直至健甲完全生長。

（註：如用第一二劑軟膏就不用拔甲膏，三方只用一方，拔甲膏与軟膏可認选一方配合黑布膏治疗）

中藥治癒一例毛髮全脫

四川成都中醫學院

中醫認為髮為血之余、肺又合皮毛、毛肺主氣、今氣血兩虛故髮全脫。

治療方法：調補氣血

處方：

黨參 白芍 白朮 云苓 炙草 川芎 當歸 生地
頭目暈眩加黃芪 首烏 夢多記憶減退加遠志 茯神 龜板
菖蒲 頭兩側痛，一身肌肉跳動加鉤藤 白芍

功效：經治後除眉毛未出外，頭髮腋毛均生長極多。

中醫治脫髮(鬼剃頭)

山西省人民醫院

治療方法：

1. 內服藥：當歸一兩 川芎八錢 杭菊一錢 明天麻八錢
羌活八錢 熟地二兩 木瓜六錢 兔絲子二兩
共為細末煉蜜為丸，每丸三錢重

用法：每日早晚飯後用開水送下一丸

2. 外用藥：祁艾三錢 菊花三錢 薄荷二錢 防風三錢 藿香二錢
甘松二錢 薔木三錢 荊芥三錢 蔓荊子三錢

用法：上藥用布袋裝好，置手砂鍋內加水煎至一小時，用藥水洗頭，
一日一次，一劑藥洗四次，再換新藥，一般需要3—5劑。

功效：曾治14例全部治癒。

神經性皮炎的中医疗法

北京市中医院

神經性皮炎是一种慢性搔痒性而且常見的皮肤病，本院从1956年10月至1957年12月共治疗103例病人有效率95.4%

治疗方法：

一、外燠治法

处方：

蒼朮 松香 大楓子 五倍子 白鮮皮 黃柏 鶴虱 防风
苦參

主治：病損肥厚粗糙脫屑搔痒者

用法：將以上藥串粗末紙捲燃烟燠皮損。

二、燠藥油膏電輻熱電法：

燠藥油膏制法：用以上燠藥制成干溜油配成50%油膏。

用法：將以上油膏薄塗皮損，用電爐制成的輻射器烤患處，每日1—2次，每次15——40分皮膚表面受熱約40°C—50°C這種療法是在燠藥療法改進而成的。

主治：同上。

三、外用藥：

（一）第三方藥燠油膏

处方：同上。

主治：同上。

（二）去溼原料膏

处方：

苦參 薄荷 防风 鶴虱 芥穗 白芷 大黃 靈仙 連翹

蒼朮 楓子 白鮮皮 五倍子

用香油將上藥煎枯去渣加醋成膏

主治：主要做軟膏基質和潤肤解毒

(三) 止痒藥膏

制法：用去濕原料膏加止痒藥粉配成10%軟膏，止痒藥粉。

处方：松香 定粉 枯礬 甘石 輕粉 乳香 冰片 陀僧

(四) 狼毒膏

制法：用去濕原料膏加狼毒方粉配成10%軟膏狼毒方粉。

处方：狼毒 檳榔 蛇床子 川椒 硫黃 文蛤 楓子 枯礬

四、內服藥

(一) 羣亢丸：

处方：

羣亢 苦參 大黃 黃芪 防風 漏蘆 烏蛇肉 胡黃連

共為細粉、煉蜜為丸

(二) 蒼耳膏：

处方：鮮蒼耳 切碎煮爛取汁熬膏加蜜貯存

中藥蛤粉膏治疗酒渣鼻有卓效

哈爾濱醫學院

用中藥蛤粉膏治疗酒渣鼻患者40例獲卓效

处法：

蛤粉五錢 輕粉二錢半 青黛一錢半 川黃柏二錢半 石膏(煨)五錢

用法：

塗藥前用溫水洗面部塗膏(如冷水適量)對久二次塗患處。

治疗時間：1—3個月(14例治愈平均日數)

优点：原料國產，配制容易便宜，效果好。

注意事項：勿與金屬鐵器接觸。

四 妇 科

中医治疗子宫颈上皮样癌获得疗效

成都市第一人民医院

处方：

- ① 硃茯神五錢 西砂仁三錢 老葱三錢 秦歸首四錢 黑木耳二錢
韭菜十根 炙升麻四錢 炙甘草二錢
- ② 次方： 制附片二兩 貢朮四錢 硃茯神五錢 潞党参六錢
砂仁三錢 熟棗仁四錢 生杜仲五錢 韭菜十根 皂心土一塊
- ③ 三方： 制附片二兩 砂仁四錢 潞党参八錢 硃茯神五錢
貢朮四錢 秦歸首八錢 炙甘草二錢 生薑一兩 韭菜十根

中医治疗习惯性流产处方

海 淀 医 院

一、千金保孕丸 怀山药(微炒)四兩 杜仲(去粗皮鹽水炒)三兩
川断(酒炒)三兩

以上三味共为末，糯米粥为丸，每晨服三錢，米湯送服，应連續服用(此药需在中藥舖訂制)

二、泰山磐石飲：炙黃耆一錢 杜仲(姜汁烘)一錢 黃芩一錢半
生白朮(去皮)五分 茯苓一錢 阿膠(蛤粉炒)一錢

甘草五分 川断八分 苏梗五分 糯米百粒
黃酒二茶杯(約100cc)加水煎服，一劑服兩次朝夕各服一次每五日服一次(与千金保孕丸同时服 如有流产象征或經每次易于流产之時間可連日服用待流产象征消失后再改为五日服一次，服至妊娠六個月時方可停藥。

中藥治疗妊娠惡阻处方

北京中医医院

一、和胃飲：白扁豆八錢 苏叶七分 竹茹三錢 麻皮炭二錢
炒半夏一錢半 炒仁一錢 佩蘭叶三錢 玫瑰花一錢 生杭芍四錢
台參三錢 云茯苓三錢 代代花一錢

二、歸脾湯：人參一錢 炙黃芪三錢 焦白朮三錢 當歸身三錢
龍眼肉四錢

三、橘皮竹茹湯：桔皮三錢 竹茹三錢 大棗五枚 生姜二片 甘草一錢
人參一錢 半夏一錢半 麥冬三錢 赤茯苓三錢 枇杷叶三錢

以上三方劑量仅适用于一般惡阻如有其他兼病或症狀严重的則需
根据具体情况加減劑量和葯味。

中藥治疗痛經的方剂如下

北京中医医院

(一) 血虛氣滯者用 四物湯加味：

处方：杭白芍四錢 當歸三錢 川芎二錢 生地四錢 香附(尖)二錢
元胡索三錢 木香一錢半 丹參三錢

(二) 寒凝氣血者用 大溫經湯：

处方：台黨參三錢 當歸二錢 白芍三錢 川芎二錢 丹皮二錢
阿膠二錢 寸冬二錢 桂枝二錢 淡吳萸一錢 甘草二錢
法夏二錢 生姜一錢

(三) 血滯血瘀者用 元胡索湯：

处方：元胡索四錢 乳香一錢半 沒藥一錢半 蒲黃二錢 姜黃一錢半
當歸三錢 木香一錢 甘草一錢半 生姜二片

(四) 熱郁瘀結者用： 宣郁通經湯：

处方：當歸三錢 白芍三錢 柴胡一錢 丹皮二錢 炒梔一錢半 香附二錢

白芥子一錢半 五金二錢 酒苓二錢 甘草一錢

(五)經后虛痛者用：

- 1.八珍湯加味：處方：台黨參三錢 白朮三錢 茯苓四錢
甘草一錢 當歸三錢 川芎一錢半 生地四錢 白芍四錢
炙香附二錢 木香一錢半
- 2.當歸建中湯：處方：當歸三錢 桂枝尖二錢 白芍四錢
炙甘草一錢

說明：以上各方所列劑量須斟酌病者體質強弱，年歲臨時須要靈活掌握。

中醫治療49例不育症臨床介紹

北京市中醫醫院

本院王志敏大夫祖傳祕方治療不育症有豐富的經驗，所治之不育症及指因宮頸發育不良，腫硬、位置不正頸管口太小，糜爛等疾患引起者，共治療49例，局部症狀痊癒29人，近愈20人有不少經追綜觀察均已受孕及生育。

一、藥物成份及制藥方法：

乳香三錢三分 沒藥三錢 兒茶三錢六分 蛇床子一錢四分
鐘乳石四錢四分 雄黃四錢四分 硼砂四分 礞砂三錢五分
上藥共研成面

血力三錢五分（另包） 章丹一兩五錢五分（另包）

冰片三錢五分 麝香四分（共研） 白矾十九兩五錢

用具：煤爐一個，菜勺一個、長柄小銅勺二把、大理石板一個，
長二尺寬一尺五寸，酒精、香油少許。

首先將白矾放入勺中加涼水250cc用微火煮沸20分鐘，放入共研之藥末10分許，加入血力5分再放入章丹10分，加入冰片、麝香1—2分，即離開火，于此制作過程隨時攪拌以免煮焦或粘

鍋，其次用酒精75%，消毒大理石面后塗抹已蒸過之香油一層，用勺挑出藥液于石面上成圓片形量約3—4分重。

又藥分一般用藥及口上用藥，口上用藥制法同前只是留上液 $\frac{1}{2}$ 再多加入血力礮砂極少量拌勻，藥片重量5分。

二、用藥方法，及禁忌和注意事項：

藥分口上及其它部分兩種，原則上是將藥上在有病部位，如口小即用口上藥，如宮頸左下方腫硬藥即上于該處，用藥最多二片（但口上藥不能用二片，初診不用二片及用口上）

凡有陰道出血歷史及經常暈倒重度胃潰瘍者是禁忌的，用藥時一定避免性交，及海物，一般情況是每星期上藥兩次，經期前後三天均不上藥用藥時尽可能少走路及作重的體力勞動。

52例慢性盆腔炎觀察

中醫研究院

1957年我院系統觀察了慢性盆腔炎52例，按中醫理論將慢性盆腔炎分為三個類型，即陽虛、陰虛、實熱分別授與四物湯，溫經湯、血腑逐瘀湯等加減收到滿意的效果，有效率达82.7%。

烏金粉治療子宮頸糜爛效果好

中醫研究院

用烏金粉治療子宮頸糜爛54例，療效甚佳，輕度糜爛18例，上藥三、四天痊癒中度糜爛21例上藥1—4月痊癒，重度糜爛15例上藥3—6月痊癒，治療方法：

先用過錳酸鉀水沖洗患部，用消毒棉球蘸上烏金粉，塞入陰道子宮頸糜爛處，晚上取出每日反復一次。

烏金粉：血竭三兩 綠豆粉四兩 冰片二錢 云香二兩 甘草四兩

白芷四兩 桃仁三兩 松香一兩 青黛四兩 蒲黃三兩
 枯凡二兩 馬勃四兩 土別三個 五倍子一兩 黃脂二兩
 薄荷二兩 皂莢二兩 以上十七味共研為細末過篩。

生采鮮藥：車前葉五斤 蒲公英十斤 酢醬草五斤 桃仁片不拘多
 少。

以上三味浸入香油內陳久取油用，最短需滿一百天，用時再酌加
 冰片，調和藥末棉球蘸用。

定 坤 丹

主治：月經不調、行經腹痛、崩漏下血 貧血衰弱 血暈血脫。

處方：鹿茸 當歸 藏紅花

用量：每次用半丸至一丸，早晚空心服。

調 經 丸

主治：月經不調、赤白帶下，久不生育。

處方：益母草一斤 川紅花四兩 制香附一斤 南木香五兩

赤白苓十二兩 歸尾四兩 黑山藥四兩 元胡索四兩

桃仁泥四兩 真阿膠四兩 赤芍四兩 川郁金四兩 炒靈脂五兩

敗醬草五兩 煅礞石一兩 大川芎三兩 共為細末，作成丸劑。

用法：內服。

功效：有效率90%。

（注 該方系蕪湖醫院楊中書醫生貢獻的祖傳祕方）

五 五 官 科

退翳散加減治疗树枝狀角膜潰瘍

上海市同濟醫院

處方：

銀花三錢 連翹三錢 黑山梔三錢 制香附三錢 當歸三錢
川芎一錢 沙白芍三錢 嫩勾藤三錢 蟬衣一錢

說明：結合臨床症狀隨症加減

中医治疗一例玻璃体退行性变

中医研究院

一例患者經各醫院治疗二年无效，經后本醫院治疗一年半視力恢复正常。

治 疗 前		治 疗 后
視 力	左0.2	1.2
	右0.3	1.0

處方：初以六味地黃湯加減，繼而併服磁珠丸，后以补中益氣湯，八珍湯等为主。

中医治疗视神经萎缩超过国际水平

中医研究院

视神经萎缩是一种难治的眼底病，目前无特效方法治疗，我院眼科用中药治疗142例收到良好效果，有效率达77.4%

治疗方法：中医认为本病是因亡血过多，忧思过度，高烧后之精液耗损，肾阴亏虚……等因此治疗原则要根据中医理论四诊八纲，结合不同情况进行不同的整体治疗。

- ①亡血过多者先服逍遥散以调整荣卫，继服人参养荣汤，八珍补其气血。
- ②发高热后，邪热郁结，玄府壅闭，目内阴液耗损，或散走，则光华失。治宜舒经开郁，清热为主。
- ③劳困过度，饥饱失节者伤其脾胃。治宜先服逍遥散，以舒经开郁，调整荣卫，继补中气之不足。
- ④房劳不节，精血耗损，肾阴亏虚者，宜服六味地黄汤以壮水，涵木为主。

中医治疗沙眼的简易方法

上海市沙眼防治委员会

应用药物：

1. 黄连西瓜霜眼药水

(处方)：

硫酸黄连素0.03(或生药黄连0.50煎汁)
西瓜霜 0.50(或皮硝0.50)
月石 0.02

蒸餾水 10cc

以上各藥放入蒸餾水內，加熱過濾如用生藥黃連，須煎成濃汁，與各藥混和，加入適量之蒸餾水，再加熱冷卻後過濾。

2. 海螵蛸摩擦棒

(制法) 剔去堅硬面，根據其長度切成2—3塊，每小塊再切成3—4段成棒狀，并把四周刮得均勻，將棒浸在10%黃連液內，煮沸30分鐘後晒干。

用法：手執摩擦棒粗頭，以另一頭向沙眼濾泡乳頭處用輕快的手法，从左到右反復輕輕摩擦，摩擦力量根據病變輕重決定，摩擦時間與反復摩擦次數，亦隨病變的輕重決定。

適應症：

適于第一、二期乳頭腫脹、肥大及濾泡出現時。

功效：

①對不同程度砂眼，用黃連西瓜霜眼藥水治療，觀察一月痊癒143例，進步46例。

②眼藥水配合摩擦棒治療重症沙眼效果顯著。

磁珠丸治療白內障

四川醫學院 眼科

本院自1956年1月至1958年8月，用磁珠丸治療各類白內障共計180人243只眼，視力有不同程度進步者145眼，有效率達59%，眼力維持或進步到0.4者120眼。

· 中醫治療視網膜神經

膠質瘤收到突出成績

河北省中醫研究院

河北省中醫研究院中醫師龐贊襄家傳眼科，臨床治療效果很好，1957年共治兩例視網膜神經膠質瘤，均獲得痊癒。

治疗采用方劑加味瀉腦湯

处方：

車前子三錢 木通八分 芫薊子二錢 云苓三錢 酒川軍錢半
元參二錢 元明粉一錢 桔梗錢半 炒黃芩一錢 怀牛夕二錢
川玉金錢半 川貝母二錢

中藥牛蒡子的治病研究

天津师大医务室

主治：急性及慢性咽炎、喉炎，典型猩紅熱及癰、淋巴腺炎、流感、痢疾等。其中猩紅熱的治疗率为80%

劑量及服法：

每片含1.5克，成人每次吃2—3片（小兒酌減），每天吃3—4次，三四天可好，最多不超过四天。

蒼耳子合劑治慢性副鼻竇炎

天津市第六醫院

处方：蒼耳子二斤 辛夷六兩 双花二兩 菊花二兩 茜草二兩
蜂蜜八兩

制法：先將蒼耳子和辛夷分別碾碎，然后混同双花菊花茜草放入鍋中煎熬約四、五小时、將藥汁傾出，再加水繼續煎熬，共計四次，然后過濾去渣，將所有藥汁混合加熱，使水份蒸發至藥汁已濃縮至起大泡時加入蜂蜜，攪勻約得藥汁600毫升，裝瓶备用，或加2—3%安香酸鈉以防腐。

服法：一日三次，每次五毫升，服二周后增量至十毫升，一個月為一療程。

疗效：計135例，有效率85.1%

鉄板吹喉丹治疗急性扁桃腺炎

重庆第二医院

处方：

我管石 飞雄黄 山慈姑 百草霜 西牛黄 上射香 白馬勃
灯心灰 銀珠 梅片 扫粉 青代
共为細末备用

用法：向局部吹鉄板吹喉丹。

功效：治疗率100%

中藥治癒美尼尔氏病

北京第一中医門診部

方劑、藥物：

龙胆泄肝湯 生地 車前 龙胆草 当歸 木通 泽瀉 連翹
甘草 茯苓 梔子 大黃

功效：共治疗13例，总有效率92.3%

独角蓮制剂治疗慢性萎縮性鼻炎

辽宁省

处方：

独角蓮100公分

蟾酥 1公分

射香 1公分

冰片 2公分 香油适量

在塗药前先用微溫的鹽水洗淨鼻腔。

1. 用膏劑：取消毒棉球，沾药后塗擦整个鼻腔，以后再放入鼻中甲与鼻中膈之間，時間越長效果越好。

2. 用油劑：取棉棒塗药于鼻腔中每日2—3次。

功效：共治200例其中80例有效。

六 針 灸

灸法治疗淋巴腺結核性潰瘍

天津市第二医院

处方：

艾絨八分 硫磺三分 麝香二厘 雄黃三分

制法：將以上三藥研細兌入艾絨混合作成艾炷（大小如蚕豆）

用法：

在腿膝后橫綫下一公分处，放一个銅錢，艾炷放在錢上面燃燒，至全艾炷之三分之一时，病人皮肤感到灼热和痛疼可再加一或三个銅錢即可，每周灸一次，每次灸六七个艾柱。

注意：如皮肤起水泡，可不挑破，使其自己吸收，一般六七週即可痊癒

針灸治疗腰麻后头痛

取穴：

1. 前額痛，取头維印堂

2. 顳部痛，取头維太陽

3. 枕部痛取風池，天柱

4. 頂部痛取百會

配穴：列缺，合谷

功效：止痛率100%

針灸治療半身不遂

中醫研究院

94例，有效率88.4%

主穴：人中、風府、風池、肩髃、間使、合谷、環跳、風市、陽陵泉、光明

配合：古今錄驗續命湯方，小續命湯，安宮牛黃丸

針灸治療中風

取穴：

1. 神志不清取人中、十宣

2. 語言蹇澀取啞門、廉泉

3. 口眼歪斜取：頰車、地倉

4. 半身不遂：風池、肩髃、曲池、合谷、環跳、陽陵泉、絕骨、崑崙。

針灸治色盲症

取穴：主穴：

天牖、上關、目瞳子膠膠

配穴：听宮、晴明、絲竹空、四白、巨髎、頭維、攢竹、風池、陽白、目窗、合谷、光明、臂臑、足三理。

功效：共治19例13例有效。

針封治頭暈之新療法

哈爾濱第一醫院

哈爾濱市第一醫院採用針刺與封閉相結合的療法，即肩胛間針穴部位注射奴弗卡因，治療頭暈、療效頗佳。在80例病人觀察中，療效

达77.5%

方法：

取背部之风門穴（2——3胸椎棘突間外二橫指）或肺俞穴（3——4胸椎棘突外二橫指）首先用拇指按压該处，找到異常之酸麻发脹等感觉后，用0.5%奴夫卡因5毫升一日一次或隔日一次均可，兩側交替注入皮下。

針刺治疗視網膜出血的疗效

中医研究院

91例143只眼睛中有效率91%

取穴：

1. 燒山火手法：风池、顙息、孙角、大椎、肝俞、腎俞。
2. 一般普遍手法：太阳、阳白、魚腰、攢竹。
3. 压針緩进手法：睛明

以上穴位輪流配合使用，每日針一次，一般30—40次，視力恢复，大多數病人要針半年后才能巩固疗效。

針灸治疗帶狀泡疹

中国医学科学院皮研所

取穴：

局部天应穴为主

功效：共治41例全部治癒，而且治癒快。

針灸治疗术后尿瀦留

取穴：

主穴：三阴交、足三里

配穴：八髎、膀胱俞

功效：

共治211例治疗率88.2%。

針灸治菌痢

甘肅省中醫院

取穴：

主穴：下脘、天樞、氣海、關元、足三里。

配穴：

①大便次數過多者，取神闕隔鹽用艾灸。

②發熱者取大椎、合谷、曲池、陽陵、委中、復溜。

③頭痛者配百會、上星、風池、風府。

④周身關節痛者針陽輔。

⑤后重而大便者針支溝、天樞、陽陵透三里。

功效：共治63例菌痢，有效率100%。

針灸治療心絞痛效果很好

零陵人民醫院

心絞痛是比較少見的病，本院收治三例經現代醫學各種治療無效，隨後採用針灸辦法，獲得奇效。

取穴：內關、間使、足三里三穴、四肢對稱性進針，留時20分鐘。

針灸治療百日咳

上海市

取穴：

內關、太淵、合谷、商陽、少商、中沖、關沖、少澤、四縫。

每日一次，共計3—4次。

功效：共計200例痊癒率80%以上。

針灸治好走脈症

苏州医学院

治疗 5 例、5 分鐘收效。

腧穴：

主穴：內关

配穴：大淵、尺澤、曲池、肩井、風池等。

手法：輕刺激，留針不超過一刻鐘。

原理：主要的兴奋血管神經及中樞神經。

針灸治疗小儿幽門痙攣

北京儿童医院

取穴：

足三里、內关、合谷

配穴：中脘、支溝

手法：速刺不留針

功效：共治 24 例，痊癒 17 例，近癒 1 例，显效 5 例，进步 1 例。

針灸治疗夜盲

取穴：

头部：攢竹、太阳。

下肢：三里、阳陵。

手法：头部輕刺、下肢强刺，留針 30 分。

針灸治療急性蘭尾炎

取穴：蘭尾點（右）

手法：捻轉進針，留針30分鐘。

退針用手壓分段退，針深3—4厘米，每天1—2次，共刺3——6次。

適應症：于發病後48小時以內確認為急性蘭尾炎患者。

功效：共治50例，平均針刺3.8次100%治癒。

禁忌：

- ①蘭尾炎已穿孔，
- ②已有膿腫形成，
- ③慢性之急性發作，
- ④發病前多量飲酒者。

針灸治療放射反應效病果顯著

中國醫學科學院

共治療31例有效率达99.6%。

1. 頭痛、頭暈、食慾不振，噁心、嘔吐、上腹膨脹。

針：頭維、曲池、合谷主治頭暈、足三里、曲池主治胃腸。

2. 白血球降低

針：大椎、足三里、曲池。

3. 劇痛、因放射引起潰瘍

針：陽陵、足三里、合谷、曲池。

4. 口乾：

針：合谷、足三里、三陰交、復溜、太谿、風池。

針 灸 催 乳

上海第一医学院

針穴：合谷双、外关双、少泽双、用雀啄法。

灸穴：膻中、乳根双、温和灸15分鐘。

每日或隔日治疗一次，4次为一个疗程，如效果不显著，再重复第二个疗程。針灸治疗時間，以下午一时治疗效果最佳，治疗越早，效果越好，共治疗500人其中378人随訪，有效率达81.9%。

針 刺 引 产

上海第一、二医学院

引产的方法虽多，但效果不能令人滿意，且对胎兒和孕妇都有一定的限制，用針灸引产兩院共作63例，成功者46例，有效率达73%。对胎兒和孕妇均无不良影响。

采用穴位：

主穴：合谷、三阴交、配穴、支溝、次髎。

疗程：每天針一次、三次为一个疗程，最后一次施針后48小时不临产者即作为无效。

針 刺 治 疗 遺 尿 症

上海中医学院

遺尿症是小兒常見的病，現代医学尚无良好的治疗方法，应用中医針刺治疗既方便，效果又相当显著，本院共治疗42例有效率达88.1%。

治疗方法：

取穴：中极、膀胱俞、关元、气海、腎俞

手法：采用燒山火刺制法，以得气为度

中西医协作针刺治疗麻痺性腸梗阻

上海儿童医院

小兒外科腹部手术后的腸麻痺症常常危及生命，在目前治疗上，还是属于难题，我們用針刺方法試治41例小兒麻痺性腸梗阻，痊癒者11例，在治疗中有多数仅下針一次即获疗效，少数病例下針二次。

取穴：

气海、天樞、足三里

手法：捻轉进針，輕刺激。

針灸治神經性皮炎

上海第一医学院

一 神經性皮炎为常見的皮膚神經机能障碍病，本院用針灸治疗68例神經性皮炎，有效率94.2%。

治法：

1. 以燻灸为主：采用直徑約2公分的艾捲在皮損区燻之，从損害邊緣向中心逐漸移动，每日1—2次，燻治時間按皮損的厚薄及範圍大小而定，約20—30分鐘。

2. 針治：每周1—3次，取穴采用周身性和局部性两种，前者取风池、天柱、天髎、内关、合谷、委中、足三里等輪流針刺。局部性在皮損区周圍沿皮下进針。

在临床症狀消失后再繼續一个短时期治疗，以免复发。

針灸治疗耳聾啞

河北省
河間县 中医学院

河北省中医学院与河間中医学院 共治483例，其中全癒有86例，显著疗效的317例，有效率达94%以上。

主穴：医风，听会，听宫，耳门，廉泉，通里，外关，中渚，液门，
 哑门。

配穴：角孙，天突，关冲，商阳，间使，足三里，照海，太谿。每次
 取六至十穴轮流使用。

针刺疗法減輕肺結核症狀

北京結核病研究所

症狀	例數	有效率	主要穴位
咯血	76	85.5%	尺澤 膈俞 俠谿
食慾不振	122	92.6%	中脘 足三里
胸疼	36	92.1%	列缺 內关 太淵 期門
盜汗	45	100 %	合谷 复溜 阴郄
咳嗽	51	62.7%	肺俞 尺澤 天突、列缺
遺精	34	97%	三阴交 腎俞 气海 大赫
失眠	354	88.3%	神門 三阴交 足三里、太淵 合谷
头晕头痛	214	86%	外关 合谷 风池 百会 足三里
全身不適	188	97.2%	外关 足三里 曲池 阳陵泉
月經不調	23	87%	气海 关元 三阴交
潮热	5	100%	陶道 大椎 湧泉 三阴交
合計	1183	87.8%	

針灸治疗癆病有奇效

瀋阳医学院

治疗方法：

当病人发作时，术者兩人立于仰臥的患者之左右兩側，各以20号

針向已消毒好的內关穴同时进針，进針后作瀉的手法約 2—5 分鐘置針 20—30 分鐘，其手法与留針時間的長短，按病情決定。

功效：共治 100 例仅一次痊癒的占 90%，而一次以上治癒 6 名其中 2 例无效。

針灸治疗慢性腹瀉

陕西省中医研究所

取穴：

百会（灸）中脘 天樞 关元 气海 足三里 神闕（灸）
每次选 3—5 个孔穴

手法：均以捻轉进針，用中度刺激，使患者有酸麻，脹困等感觉，然后留針 5—10 分，緩退針，起針后灸 3—5 壯。

治疗時間：兩天針灸一次，六次为一个疗程，如不癒时可休息一週，再进行第二个疗程

功效：共治 14 例有效率 92.8%

針灸治疗小儿麻痺

陕西省中医研究所

取穴：

①上肢麻痺：取大椎 肩髃 曲池 合谷 外关 阳池等

②下肢麻痺：取环跳 风市 阳陵 足三里 委中 会阳

阳关 崕崙 絕骨等

手法：捻轉进針，用輕刺激手法，进針后捻轉 10—20 秒迅速退針，然后灸阳关，三里 3—5 分鐘最好。对初診患兒可以先針健側足三里等穴。

治疗時間：兩天一次，10 次为一个疗程。

功效：共治 20 余例有效率达 90% 以上。

針灸治療陽萎

北 京

取穴：

主穴：陽關（背） 氣海 中極

配穴：腎臥 心俞

手法：弱刺激取針位，留針10分鐘左右，先針陽關 后針下腹部穴
使感應下達生殖器。

附施金墨老先生獻出多年經驗方十張

一、肝硬變腹水合劑

行水藥占70%，溫通去瘀藥占30%

華澄茄兩 川附片兩 芫花兩 大戟兩 云苓皮二兩 上交桂
五錢 桂枝兩 沉香四錢 白商陸兩 廣木香五錢 澤瀉兩
白朮二兩 水紅花子兩 草豆蔻四錢 射香二錢 桃仁兩
淡豬苓兩

共研細末，醋糊小丸，滑石為衣，每日早、午、晚各服一錢至一
錢二分，白開水送下。比例，每料可服20余日至30余日。

二、肝硬變黃疸合劑

退黃藥50%，柔肝25%活血25%

川玉金二兩 鱉甲二兩 茵陳二兩 血琥珀兩 紫河車二兩
川黃連兩 炒建曲兩 赤白芍各一兩 西紅花兩 枯礬五錢
皮硝五錢 生地黄二兩 全當歸兩 枳實一兩 柴胡一兩
黃芪皮二兩 真熊胆五錢 甘草五錢

共研細末，棗肉合為小丸，每日早、午、晚各服二錢，白開水
送下。 比例，每料可服30余日

三、胃潰瘍合劑

潰瘍藥約65%，健胃30%

甘草四兩 薄荷兩 烏賊骨去硬壳三兩 石菖蒲兩 建曲二兩
白朮二兩 廣木香五錢 台烏藥兩 枳實兩 砂仁五錢 雞內金二兩
廣陳皮五錢 沒藥兩 乳香兩 云苓塊二兩 全當歸一錢
丹參二兩 三七一兩 土炒杭芍兩 白松香五錢
共研極細末，分400小包，每日早、午、晚飯前後各服一小包
(約日服四、五小包)白開水、菜粥湯送下均可。比例，約服八、
九十日至百日。

四、十二指腸潰瘍合劑

潰瘍藥約占65%，固腸防腐藥35%

苦參二兩 柴胡兩 敗醬草二兩 仙鶴草二兩 滑石二兩
川連兩 刺蝟皮二兩 香附米二兩 蒼朮二兩 白朮兩 粉丹皮兩
紫油朴兩 阿膠二兩 枳殼二兩 青廣皮各五錢 赤白芍各一兩
延胡兩 萆薢五錢 鳳尾草兩 灸甘草兩
共研細末蜜成小丸，每日早晚各服5錢白開水送下。比例，約
可服七、八十日。

五、肝硬變腹脹合劑

方內行氣藥占40%，強壯健胃藥20%，活血藥40%。

柴胡兩五錢 白朮二兩 川玉金兩 上川朴兩 白朮二兩 莪
朮二兩 三稜兩 川芎兩 川棟二兩 大腹皮兩 枳實二兩
廣皮五錢 當歸兩 二丑兩 廣木香五錢 血琥珀兩 蒼朮二兩
砂仁五錢 檳榔兩 青皮五錢 上肉桂五錢 云苓塊二兩
桃仁兩 血竭兩 丹皮兩 法夏兩 紅人參兩 台烏藥兩

地龙兩 甘草兩

共研細末水泛小丸，菰豆大，每日早、午、晚各服錢半，白开水送下。

六、肝脾腫大合剂

消腫藥60%調和氣血藥20%，通利水道藥20%

鳖甲一兩 白朮二兩 元胡索二兩 茜草根兩 柴胡兩 莪朮兩
香附米酒炒一兩 赤白芍各一兩 乳香兩 當歸兩
馬鞭草兩 台烏藥兩 粉丹皮兩 三稜兩 赤小豆兩
鷄內金兩 龟板兩 蒼朮一兩 五靈脂兩 瓦楞子二兩
滑石粉二兩（用為衣） 射香二錢 龍胆草八錢 甘草稍兩
三七兩 血余兩 敗醬草二兩

共研細末水泛小丸，滑石為衣，每日早、午、晚各服錢半至二錢白開水送下，比例，每料約可服四十余日至五十日

七、慢性腸炎合剂

方為理中四種蒼白二陳合劑加以調腸之味，治慢寒性者為宜。

普洱茶二兩 乾姜兩 訶子肉煨一兩 御米壳如有米壳膏用五錢
更佳）兩五錢 白朮二兩 紅人參兩 川附片兩 五味子兩
蒼朮兩 破故紙兩 天生礞兩 煨肉果兩 川連兩 淡吳萸五錢
廣陳皮五錢 清半夏兩 炙甘草兩 云苓塊二兩
共研細末用神曲八兩，打糊合成小丸每日早、午、晚飯後各服二錢，白開水送下。比例，可服30余日。

八、慢性痢疾合剂

此方治非細菌原虫性的赤白痢均可采用各效药組成。

黑大豆酒炒三兩 石蓮肉二兩 芡实米二兩 川連二兩
椿根皮二兩 金櫻子二兩 广木香兩 当歸兩 土炒杭白芍二兩
炒地榆二兩 炒枳壳兩 苦参二兩 薤白二兩 金銀花三兩
老棕炭二兩 陈阿膠二兩 板榔兩 茅蒼术二兩 云苓块二兩
米炒党参二兩 炙草四兩

共研細末，用醋若干，打为小丸，每日早、晚、午各服二錢，
空心服，白开水或米湯送下。比例，約可服500上下。

九、胃擴張胃下垂合剂

方內治擴張下垂的各占半数

白朮二兩 枳实二兩 升麻二錢 柴胡五錢 訶子五錢 苦梗兩
肉桂五錢 細辛二錢 人參二錢 黃連五錢 良姜二錢 广皮五錢
吳茱萸五錢 薤白二錢 当歸五錢 川芎五錢 炙草兩 砂仁五錢
元胡五錢 蒼朮二兩 烏藥五錢 闊姜五錢 藿香二錢 菖蒲五錢
共研極細末，分为42小包，每日早、午、晚飯后紧接一小包茶
湯茶水均可，此方可服百余日。

十、胆石黄疸合剂

化石药約占50%，消炎药30%，退黄药20%

枯皂矾五錢 风化硝五錢 滑石二錢 魚枕骨兩五錢 川玉金二兩
茵陈二兩 蓬莪朮兩 香附米醋炒二兩 山梔兩 川連五錢
川大黃五錢 条黃芩兩 眞熊胆二錢

共研極細末，棗肉合为小丸，每日早、午、晚各服六分至七分，
白开水送下。比例，約可服六七十日。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 全国医药卫生技术革命展览会秘方与验方汇集

作者 =

页数 = 86

S S 号 = 10461314

出版日期 = 1958年11月第1版

一、内科、儿科

茶叶熬剂治疗细菌性痢疾（驻成都部队总医院）

白头翁片剂治疗急性细菌性及阿米巴性痢疾
（上海提蓝桥区中心医院）

鸡苦胆治疗百日咳（张家口医学院附属医院）

治百日咳新验方（哈尔滨市公安医院）

中药百日咳饮临床疗效显著（哈尔滨市红十字儿童医院）

中医治疗百日咳

中药板兰根治疗腮腺炎（天津药物研究所、传染病院）

 ？嗽片

中医治疗疳腮（成都中医学院附属医院）

中医治疗流行性腮腺炎.....（ 4 ）

飞仙遥治白喉（常州市中医院）

巴豆硃砂膏药治白喉

白喉散（西安市传染病院）

中药土牛膝加桑葛汤治疗白喉效果显著
（广东佛山专区医院）

桔梗汤治疗猩红热

中药治疗脑脊髓膜炎

鸡骨草治疗传染性肝炎（广西南宁工人医院）

小儿传染性肝炎的特效方（济南铁路中心医院）

中医治疗传染性肝炎（安徽芜湖医院）

中医治疗传染性肝炎效果良好（中医研究院）

慢性肝炎

 中医中药攻下肝硬变的堡垒（河北省中医研究院）...（ 1 0

）消积散治疗单腹胀和水肿病

 中医治疗 8 0 例肝硬变收到显著效果（北京市中医院）

 中医治疗肝硬变效果良好（重庆第一中医院）

 肝硬化腹水治疗处方

 鱼腥汤治疗大叶性肺炎

 中医治疗枝气管肺炎

 小儿喘息性支气管炎

 抗喘丸（广州铁路管理局卫生处）

 寒喘丸（天津医学院附属医院）

 重庆第一医院用中药治疗枝气管喘息效果显著

 田蛤散治疗浸润型肺结核（锦州市紫荆山结核医院）

 黄连素治疗肺结核（陕西省第一康复医院）

 止血煎治疗肺结核咯血（蚌埠中医院）

中医治疗肺脓肿（天津红十字会医院）
消化性溃疡（安庆中医院）
乌参散
消化性溃疡丸（兰州医学院）
甘草粉（上海市第二劳工医院）
北京中医研究院用中药治疗 53 例消化性溃疡
中医治疗大衄及紫斑症（北京同仁医院）
红枣治疗过敏性紫癜（上海第四医院）
征服血小板减少性紫癜症
糖尿病（北京市中医院）
中药治疗再生不良性贫血效果显著
中医对原发性再生障碍性贫血有显著疗效
（辽宁省中医院）
中医治疗神经衰弱（安庆市人民医院）
健脑丸（西安红十字会医院）
养肝宁神合剂治疗神经衰弱
中药治疗风湿性关节炎（成都中医学院）
风湿止痛药酒
花蛇追风丸白花散治疗风湿性关节疗效
（石家庄中医进修学校）
让高血压低头（黑龙江省祖国医药研究所）
云母治疗高血压（云南省）
妇女高血压特效方
臭梧桐治疗高血压胜过蛇根草制剂
叫高血压让路
葛汤葛糊治疗高血压（广东佛山专区第一医院）
桑叶膏能治高血压
豨龙丸治疗高血压
我们基本上征服了高血压（北京市第一中医门诊部）
羊奶的利尿作用，可以治疗肾炎
白茅根治疗急性肾炎效果好（湖北贸易职工医院）
中医治慢性肾炎效果好（福建省人民医院）
中医治愈急性白血病（贵阳医学院）
中医治愈两例何杰金氏病
加味葛根芩连汤治小儿麻痺症（中医研究院）
中医治疗小儿流感（西安市中医院）
消疳化虫散
百部油煮治蛲虫（南京中医院）
中医治疗乙型脑炎（北京中医院）
八味消毒饮治疗梅毒（四川涪陵专区性病防治队）
复方土茯苓治疗梅毒效果好

治疗梅毒秘方“清血搜毒丸”和“三仙丹”

（河北隆化县盛子章）

中医秘方治疗精神病（北京海定医院）

中医对尿毒症的治疗（中医研究院）

中医治疗囊虫病的验方（佳木斯中医院）

中医治疗大骨节病

治食道癌验方（陕西省中医研究所）

二、外科

治阳萎验方（陕西省中医研究所）

治疗兰尾炎不用手术（吉林桦甸县夹皮沟职工医院）

中医治疗兰尾炎超过国际水平

用金钱草治胆结石（中医研究院）

消石散治疗胆结石（西安市中医院）

桐油石膏（广州铁路管理局卫生处）

草药金钱草和满天星治疗胆管结石（重庆第二中医院）

江猪油（广州铁路管理局卫生处）

征服破伤风（山西万荣县人民医院史济生）

五虎追风散治疗破伤风

烫伤油膏

烫伤药

银化解毒汤治疗颌部化脓（中医研究院）

金花草治烫火伤（广西中医药研究所）

猪胆膏

中医接骨丹治疗骨折及急性挫伤

用中药接骨创纪录骨折愈合速度超过国际水平

（广西人民医院）

中药？合丹？药治疗？疮痈毒（四川医学院）

口服中药治疗痔疮

中医治疗骨痹症七十四例（中医研究院）

中医治疗血栓闭塞性脉管炎（河北天津专区第一医院）

中药治疗143例脱疽效果良好（北京市中医院）

柳木接骨膏接骨法（陕西省中医研究所）

土法治大病刺菜膏治外伤感染（天津汗沽盐场医院）

去腐羔（天津医学院）

生肌散（天津医学院附属医院）

提毒散治阴疽疮（天津医学院）

陈旧性肩关节复位手法（陕西省中医研究所）

三、皮科

中药热烘疗法治疗神经性皮炎及慢性湿疹

（上海市中医学院）

慢性湿疹用青黛膏（上海中医学院）

黑豆溜油治疗小儿湿疹疗效达 9 7 % (西安医学院)
中药白疾藜治疗白癜风 (河南省人民医院)
紫草油治疗臀部尿布性皮炎
腋臭散
紫归膏治疗冻伤
婴儿湿疹软膏
湿疹汤
白癜风中医疗法 (长春中医院)
脚气粉
中药治疗腋臭不用开刀
中医能治汗斑症
红皮肤溃疡验方
皮鼻液治疗酒渣鼻
神经性皮炎用疯油膏
偏方有奇效酒渣鼻能治好
中西医结合治疗甲癣 (北京友谊医院)
中药治疗一例毛发全脱 (四川成都中医学院)
中医治疗脱发 (鬼剃头) (山西省人民医院)
神经皮炎的中医疗法 (北京市中医院)
中药蛤粉膏治疗酒渣鼻有卓效 (哈尔滨医学院)

四、妇科

中医治疗子宫颈上皮癌获得疗效 (成都市第一医院)
中医治疗习惯性流产处方 (海淀医院)
中药治疗妊娠恶阻 (北京市中医医院)
中药治疗痛经的方剂 (北京市中医医院)
中医治疗 4 9 例不育症临床经验介绍 (北京市中医医院)
5 2 例慢性盆腔炎观察 (中医研究院)
乌金粉治疗子宫颈糜澜效果好 (中医研究院)
定坤丹
调经丸..... (6 7

-) 五、五官科退翳散加减治疗树枝状角膜溃疡 (上海市同济医院)
中医治疗一例玻璃体退行性变 (中医研究院)
中医治疗视神经萎缩超过国际水平 (中医研究院) (6 9)
) 中医治疗沙眼的简易方法 (上海市沙眼防治委员会)
磁硃丸治疗白内障 (四川医学院眼科)
中医治疗视网膜神经胶质瘤收到突出成绩
(河北省中医研究院)
中药牛蒡子的治病研究 (天津师大医务室)
苍耳子合剂治慢性副鼻窦炎 (天津市第六医院)
铁板吹喉丹治疗急性扁桃腺 (重庆第二医院)
中药治愈美尼尔氏病 (北京第一中医门诊部)

独角莲制剂治疗慢性萎缩性鼻炎（辽宁省）
六、针灸
灸法治疗淋巴腺结核性溃疡（天津市第二医院）
针灸治疗腰麻后头痛
针灸治疗半身不遂（中医研究院）
针灸治疗中风
针灸治色盲症
针封治头晕之新疗法（哈尔滨第一医院）
针刺治疗视网膜出血的疗效（中医研究院）
针灸治疗带状疱疹（中国医学科学院皮研所）
针灸治疗术后尿潴留
针灸治菌痢（甘肃省中医院）
针灸治疗心绞痛效果很好（零陵人民医院）
针灸治疗百日咳（上海）
针灸治疗无脉症（苏州医学院）
针灸治疗小儿幽门痉挛（北京儿童医院）
针灸治疗夜盲
针灸治疗急性兰尾炎
针灸治疗放射反应病（中国医学科学院）
针灸催乳（上海医学院）
针刺引产（上海第一二医学院）
针刺治遗尿症
中西医协作针刺治疗麻痹性肠梗阻（上海儿童医院）
针灸治疗神经性皮炎（上海第一医学院）
针灸治疗聋哑（河北省与河北河间县中医学院）
针刺疗法减轻肺结核症状（北京结核病研究所）
针灸治疗瘰病有奇效（沈阳医学院）
针灸治疗慢性腹泻（陕西省中医研究所）
针灸治疗小儿麻痹（陕西省中医研究所）
针灸治疗阳萎（北京）

附：施金墨老先生献出多年经验方 10 张

- 一、肝硬变腹水合剂
- 二、肝硬变黄疸合剂
- 三、胃溃疡合剂
- 四、十二指肠溃疡合剂
- 五、肝硬变腹胀合剂
- 六、肝脾肿大合剂
- 七、慢性肠炎合剂
- 八、慢性痢疾合剂
- 九、胃扩张胃下垂合剂
- 十、胆石黄疸合剂

