宋板傷寒論

徐乾

一

特和
490.9
C53
1

立
府
都
総
資
料
合
館
図
書
館
印

傷寒卒病論集

論曰。余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。婴非常之疾。患及禍至。而方震慄。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。賫百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身已斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣。痛夫舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮

B535964

寄贈
秋元光二様
平成6年9月9日

立
府
都
総
合
資
料
館
蔵
書
印

傷寒卒病論集

論曰。余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。婴非常之疾。患及禍至。而方震慄。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。賚百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身已斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣。痛夫舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮

B535964

寄贈
秋元先二郎
平成乙丑年九月吉日

和
特
490.9
C53
1

勢之云哉而進不能愛人知人退不能愛身知已遇災
值禍身居尼地蒙蒙昧昧悉若遊魂哀乎趨世之士馳
競浮華不固根本忘軀徇物危若冰谷至於是也余宗
族素多向餘二百建安紀年以来猶未十稔其死亡者
三分有二傷寒十居其七感往昔之淪喪傷横夭之莫
救乃勤求古訓博采衆方撰用素問九卷八十一難陰
陽大論胎臚藥錄并平脉辨證為傷寒雜病論合十六
卷雖未能盡愈諸病庶可以見病知源若能尋余所集
思過半矣（原始）夫天布五行以運萬類人稟五常以有五藏
經絡府俞陰陽會通玄冥幽微變化難極自非才高識
妙豈能探其理致哉上古有神農黄帝岐伯伯高雷公
少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉
公下此以往未之聞也觀今之醫不念思求經旨以演
其所知各承家技終始順舊省疾問病務在口給相對
斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三
部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無
髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別
生實為難矣孔子云生而知之者上學則亞之多聞博
識知之次也余宿尚方術請事斯語漢長沙守南陽張
機著

傷寒論序

夫傷寒論蓋祖述大聖人之意諸家莫其倫擬故晉皇甫謐序甲乙鍼經云伊尹以元聖之才撰用神農本草以為湯液漢張仲景論廣湯液為十數卷用之多驗近世太醫令王叔和撰次仲景遺論甚精皆可施用是仲景本伊尹之法伊尹本神農之經得不謂祖述大聖人之意乎張仲景漢書無傳見名醫錄云南陽人名機仲景乃其字也舉孝廉官至長沙太守始受術於同郡張伯祖時人言識用精微過其師所著論其言精而奥其法簡而詳非淺聞寡見者所能及自仲景于今八百餘年惟王叔和能學之其間如葛洪陶景胡洽徐之才孫

思邈輩。非不才也。但各自名家。而不能循明之開寶中節度使高繼沖魯編錄進上。其文理舛錯。未嘗考正。歷代雖藏之書府。亦關於讐校。是使治病之流。舉天下無或知者。國家詔儒臣校正醫書。臣奇績被其選。以為百病之急無急於傷寒。今先校定張仲景傷寒論十卷。總二十二篇。證外合三百九十七法。除複重。定有一百一十二方。今請頒行。太子右贊善大夫臣高保衡。尚書屯田員外郎臣孫奇。尚書司封郎中祕閣校理臣林億等謹上

國子監

准尚書禮部元祐三年八月八日符。元祐三年八月七日酉時准　都省送下。當月六日　勅中書省勘會下項醫書冊數重大紙墨價高。民間難以買置。八月一日奉　聖旨。令國子監別作小字雕印。內有浙路小字本者。令所屬官司校對別無差錯。即摹印雕版。並候了日廣行印造。只收官紙工墨本價。許民間請買。仍送諸路出賣奉

勅如右牒到奉行。前批八月七日未時付禮部施行。續准禮部符。元祐三年九月二十日准

都省送下當月十七日
勑中書省尚書省送到國子監狀據書庫狀准
朝旨雕印小字傷寒論等醫書出賣契勘工錢約支用
五千餘貫未委於是何官錢支給應副使用本監比欲
依雕四子等體例於書庫賣書錢內借支又緣所降
朝旨候雕造了日令只收官紙工墨本價即別不收息
慮日後難以撥還欲乞
朝廷特賜應副上件錢數支使候指揮尚書省勘當欲
用本監見在賣書錢候將来成書出賣每部只收息壹
分餘依元降指揮奉
聖旨依國子監主者 依

勑命指揮施行
治平二年二月四日
進呈奉
聖旨鏤版施行
朝奉郎守太子右贊善大夫同校正醫書飛騎尉
賜緋魚袋臣高保衡
宣德郎守尚書都官員外郎同校正醫書騎都尉
臣孫奇
朝奉郎守尚書司封郎中充秘閣校理判登聞檢
院護軍賜緋魚袋臣林億
翰林學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰宗

正寺脩玉牒官兼判太常寺兼禮儀事兼判秘
閣秘書省同提舉集禧觀公事兼提舉校正醫
書所輕車都尉汝南郡開國侯食邑一千三百
戶賜紫金魚袋臣范鎮

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍
郎叅知政事柱國天水郡開國公食邑三千戶
食實封八百戶臣趙槩

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍
郎叅知政事柱國樂安郡開國公食邑二千八
百戶食實封八百戶臣歐陽脩

推忠協謀同德佐理功臣特進行中書侍郎兼戶部
尚書同中書門下平章事集賢殿大學士上柱
國盧陵郡開國公食邑七千一百戶食實封二
千二百戶臣曾公亮

推忠協謀同德守正佐理功臣開府儀同三司行尚
書右僕射兼門下侍郎同中書門下平章事昭
文館大學士監脩國史兼譯經潤文使上柱國
衛國公食邑一萬七百戶食實封三千八百戶
臣韓琦

知兗州錄事參軍監國子監書庫臣郭直卿奉議
郎國子監主簿雲騎尉臣孫準

朝奉郎行國子監丞上騎都尉賜緋魚袋臣何宗元

朝奉郎守國子司業輕車都尉賜緋魚袋臣豐稷

朝請郎守國子司業上輕車都尉賜緋魚袋臣盛僑

朝請大夫試國子祭酒直集賢院兼徐王府翊善護軍臣鄭穆

中大夫守尚書右丞上輕車都尉保定縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋臣胡宗愈

中大夫守尚書左丞上護軍太原郡開國侯食邑

千八百戶食實封二百戶賜紫金魚袋臣王存

中大夫守中書侍郎護軍彭城郡開國侯食邑一千一百戶食實封二百戶賜紫金魚袋臣劉摯

正議大夫守門下侍郎上柱國樂安郡開國公食邑四千戶食實封九百戶臣孫固

太中大夫守尚書右僕射兼中書侍郎上柱國高平郡開國侯食邑一千六百戶食實封五百戶臣范純仁

太中大夫守尚書左僕射兼門下侍郎上柱國汲郡開國公食邑二千九百戶食實封六百戶臣呂大防

傷寒論目録

翻刻宋板傷寒論全文

卷第一
辨脉法　平脉法
卷第二
傷寒例　辨痓濕暍脉證
辨太陽病脉證并治上
卷第三
辨太陽病脉證并治中
卷第四
辨太陽病脉證并治下

卷第五
辨陽明病脉證并治
辨少陽病脉證并治
卷第六
辨太陰病脉證并治
辨少陰病脉證并治
辨厥陰病脉證并治
卷第七
辨霍亂病脉證并治
辨陰陽易差病脉證并治
辨不可發汗病脉證并治
辨可發汗病脉證并治
卷第八
辨發汗後病脉證并治
辨不可吐
辨可吐
卷第九
辨不可下病脉證并治
辨可下病脉證并治
卷第十
辨發汗吐下後病脉證并治

傷寒論卷第一

漢 張仲景述
晋 王叔和撰次
宋 林 億校正
明 趙開美校刻
沈 琳仝校

辨脉法第一

平脉法第二

問曰。脉有陰陽。何謂也。答曰。凡脉太浮數動滑。此名陽也。脉沈濇弱弦微。此名陰也。凡陰病見陽脉者生。陽病見陰脉者死。〇問曰。脉有陽結陰結者。何以別之。答曰。其脉浮而數。能食不大便者。此為實名曰陽結也。期十

成本留作流

七日當劇其脉沈而遲不能食身體重大便反鞕音硬下同名曰陰結也期十四日當劇○問曰病有洒淅惡寒而復發熱者何荅曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之曰何謂陽不足荅曰假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也曰何謂陰不足荅曰尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也陽脉浮一作微陰脉弱者則血虛血虛則筋急也其脉沈者榮氣微也加燒針則血留不行更發熱而躁煩也○脉譋譋如車蓋者名曰陽結也○二云夏脉○脉瞥瞥如羹上肥者陽氣微也○脉縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也○一云陰氣○脉綿綿如瀉漏之絕者亡其血也○脉來緩時一止復來者名曰促一作縱脉陽盛則促陰盛則結此皆病脉○陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也○陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰脉與陽脉同等者名曰緩也○脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無常也○脉弦而大弦則為減大則為乾減則為寒乾則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半産漏下男子則亡血失精○問曰病有戰而汗出因得解者何也荅曰

脉浮而緊。按之反乾。此為本虛。故當戰而汗出也。其人本虛是以發戰。以脉浮故當汗出而解也。若脉浮而數按之不乾。此人本不虛若欲自解但汗出耳。不發戰也。問曰。病有不戰而汗出解者。何也。荅曰。脉大而浮數。故知不戰汗出而解也。○問曰。病有不戰不汗出而解者。何也。荅曰。其脉自微。此以胃發汗。若吐若下。若亡血。以內無津液。此陰陽自和。必自愈。故不戰不汗出而解也。問曰。傷寒三日。脉浮數而微。病人身涼和者。何也。荅曰。此為欲解也。解以夜半。脉浮而解者。濈然汗出也。脉數而解者。必能食也。脉微而解者。必大汗出也。○問曰。脉病欲知愈未愈者。何以別之。荅曰。寸口關上尺中三處大小浮沈遲數同等雖有寒熱不解者。此脉陰陽為和平。雖劇當愈。○師曰。立夏得洪浮作大脉是其本位。其人病身體苦疼重者。須發其汗。若汗濈濈自出者。明日便解矣。何以言之。立夏脉洪大是其時脉。故使然也。四時倣此。○問曰。凡病欲知何時得。何時愈。荅曰。假令夜半得病者。明日日中愈。日中得病者。夜半愈。何以言之。日中得病夜半愈者。以陰得陽則解也。夜半得病明日日中愈者。以陰得陽則解也。○寸口脉浮為在表。沈為在裏。數為在府。遲為在藏。假令脉遲。此為在藏也。○趺陽脉浮而濇。少陰脉如經者。其病在脾。法當下利。何以知之。若脉浮大者。氣

成本直接上無師曰二字

成本脉洪大作得洪大脉

或本若作也

實血虛也。今趺陽脉浮而濇故知胃氣不足胃氣虛也。以少陰脉弦而浮。一作纖見此為調脉。故稱知經也。若反滑而數者。故知當屎膿也。王注函○寸口脉浮而緊浮則為風緊則為寒。風則傷衛寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。當發其汗也。○趺陽脉遲而緩。胃氣如經也。趺陽脉浮而數。浮則傷胃。數則動脾。此非本病。醫特下之所為也。榮衛內陷。其數先微。脉反但浮。其人必大便鞕。氣噫而除。何以言之。本以數脉動脾。其數先微。故知脾氣不治。今脉反浮。其數改微。邪氣獨留心中。則飢。邪熱不殺穀。潮熱發渴。數脉當遲緩。脉因前後度數如法。病者則飢。數脉不時。則生惡瘡也。○師曰病人脉微而濇者。此為醫所病也。大發其汗。又數大下之。其人亡血。病當惡寒。後乃發熱無休止。時夏月盛熱。欲著複衣。冬月盛寒。欲裸其身。所以然者。陽微則惡寒。陰弱則發熱。此醫發其汗。使陽氣微。又大下之。令陰氣弱。五月之時。陽氣在表。胃中虛冷。以陽氣內微。不能勝冷。故欲著複衣。十一月之時。陽氣在裏。胃中煩熱。以陰氣內弱。不能勝熱。故欲裸其身。又陰脉遲濇。故知亡血也。○脉浮而大。心下反鞕。有熱屬藏者。攻之不令發汗。屬府者。不令溲數。溲數則大便鞕。汗多則熱愈。汗少則便難。脉遲尚未可攻。○脉浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。仍靜仍亂。此為命絕也。又未知何

藏先受其災。若汗出髮濡喘不休者。此為肺先絕也。陽反獨留。形體如煙熏。宜視搖頭者。此為心絕也。唇吻反青。四肢熱者。此為肝絕也。環口黧黑。柔汗發黃者。此為脾絕也。溲便遺失。狂言目反直視者。此為腎絕也。又未知何藏陰陽前絕。若陽氣前絕。陰氣後竭者。其人死。身色必青。陰氣前絕。陽氣後竭者。其人死。身色必赤。腋下温。心下熱也。○十口脉浮大而醫反下之。此為大逆。浮則無血。大則為寒。寒氣相搏。則為腸鳴。醫乃不知而反飲冷水。令汗大出。水得寒氣。必相搏。其人即餓音噎下同。跌陽脉浮。浮則為虚。浮虚相搏。故令氣鬲言胃氣虚竭也。脉滑則為臧。此為醫忽責虚取實。守空迫血。脉浮

鼻中燥者必衄也。○諸脉浮數當發熱而洒淅惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也。○脉浮而遲。面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解。反發熱者差遲。遲為無陽。不能作汗。其身必痒也。十口脉陰陽俱緊者法當清邪中於上焦。濁邪中於下焦。清邪中上名曰潔也。濁邪中下名曰渾也。陰中於邪必內燥也。表氣微虚。裏氣不守。故使邪中於陰也。陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛酸所為陽中霧露之氣。故曰清邪中上。濁邪中下。陰氣為燥。足膝逆冷。便溺妄出。表氣微虚。裏氣微急。三焦相溷。內外不通。上焦悒音佛下同鬱。藏氣相熏。口爛食斷也。中焦不治。胃氣上衝。脾氣不轉。胃中為濁榮衛不

通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經絡出入藏府熱氣所過則為癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣內入噦而出之聲嗢乙骨咽塞寒厥相追為熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下焦不禁（一作閉）清便下重令便數難strike-through糞漱痛命將難全〇脈陰陽俱緊者口中氣出脣口乾燥瞤臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者此為欲解或到八日以上反大發熱者此為難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也〇脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去入安此為欲解若脈遲至六七日不欲食

成本齊作臍

此為晚發氷停故也為未解食自可者為欲解病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也若脈和其人大煩目重臉內際黃者此欲解也〇脈浮而數浮為風數為虛風為熱虛為寒風虛相搏則洒淅惡寒也〇脈浮而滑浮為陽滑為實陽實相搏其脈數疾衛氣失度浮滑之脈數疾發熱汗出者此為不治〇傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也

平脈法第二

問曰脈有三部陰陽相乘榮衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作效象形容春弦秋浮冬沈夏洪察色觀脈大小不同一時之間變

無經常尺寸參差或短長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願為其陳令得分明師曰子之所問道之根源脈有三部尺寸及關榮衛流行不失銖銓腎沈心洪肺浮肝弦此自經常不失銖分出入升降漏刻周旋水下百刻一周循環當復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沈潛水滴支飲急弦動則為痛數則熱煩設有不應知變所緣三部不同病各異端大過可怪不及亦然邪不空見終必有奸審察表裏二焦別焉知其所舍消息診脈料度府藏獨見若神為子條記傳與賢人○師曰呼吸者脈之頭也初持脈來疾去遲此出疾入遲名曰內實外虛也○問曰上士望而知之中工問而知之下工脈而知之願聞其說師曰病家人請云病人苦發熱身體疼痛人自臥師到診其脈沈而遲者知其差也何以知之若表有病者脈當浮大今脈反沈遲故知愈也假令病人云腹內卒痛病人自坐師到脈之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脈當沈而細今脈浮大故知愈也○師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁臥此熱已去也設令脈不和處言已愈設令向壁臥聞師到不驚起而眄視若三言三止脈之躁煩者此詐病也設令脈自和處言此病大重當須服吐下藥

針灸數十百處乃愈○師持脉病人欠者無病也脉之
浮者病也言遲者風也搖頭言者裏痛也行遲者表強
也坐而伏者短氣也坐而下二脚者腰痛也裏實護腹
如懷卵物者心痛也○師曰伏氣之病以意候之今月
之內欲有伏氣假令舊有伏氣當須脉之若脉微弱者
當喉中痛似傷非喉痺也病人云實咽中痛雖爾今復
欲下利問曰人恐怖者其脉何狀師曰脉形如循絲累
累然其面白脫色也○問曰人不飲其脉何類師曰脉
自漉唇口乾燥也問曰人愧者其脉何類師曰脉浮而
面色乍白乍赤○問曰經說脉有三菽六菽重者何謂
也師曰脉人以指按之如三菽之重者肺氣也如六菽

之重者心氣也如九菽之重者脾氣也如十二菽之重
者肝氣也按之至骨者腎氣也菽者小豆也假令下利寸口
關上尺中悉不見脉然尺中時一小見脉再舉頭按按菽
者腎氣也若見損脉來至為難治腎謂所勝脾脾勝不應時問曰脉
有相乘有縱有橫有逆有順何謂也師曰水行乘火金
行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘火
火行乘木名曰逆金行乘木木行乘火名曰順也○
問曰脉有殘賊何謂也師曰脉有弦緊浮滑沈濇此六
脉名曰殘賊能為諸脉作病也○問曰脉有災怪何謂
還送湯如食頃病人乃大吐若下利腹中痛師曰我前

来不見此證今乃變裏是名災惟又問曰何緣作此吐利荅曰或有舊時服藥今乃發作故為災惟耳○問曰東方肝脉其形何似師曰肝者木也名厥陰其脉微弦濡弱而長是肝脉也肝病自得濡弱者愈也假令得純弦脉者死何以知之以其脉如弦直此是肝藏傷故知死也○南方心脉其形何似師曰心者火也名少陰其脉洪大而長是心脉也心病自得洪大者愈也假令脉来微去大故名反病在裏也脉来頭小本大故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死西方肺脉其形何似師曰肺者金也名太陰其脉毛浮也肺病自得

此脉若得緩遲者皆愈若得數者則劇何以知之數者南方火火剋西方金法當癰腫為難治也○問曰二月得毛浮脉何以處言至秋當死師曰二月之時脉當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝屬木脉應濡弱反得毛浮脉者是肺脉也肺屬金金来剋木故知至秋死他皆倣此○師曰脉肥人責浮瘦人責沈肥人當沈今反浮瘦人當浮今反沈故責之○師曰寸脉下不至關為陽絶尺脉上不至關為陰絶此皆不治決死也若計其餘命生死之期期以月節剋之也○師曰脉病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人者知命則死人病脉不病名曰内虚以無穀神雖困無苦○

問曰。翕奄沈名曰滑。何謂也。師曰。沈為純陰。翕為正陽。陰陽和合。故令脉滑。關尺自平。陽明脉微。沈食飲自可。少陰脉微滑。滑者緊之浮名也。此為陰實。其人必脫內汗出。陰下濕也。○問曰。曾為人所難。緊脉從何而来。師曰。假令亡汗若吐。以肺裏寒。故令脉緊也。假令飲冷水。故令脉緊也。假令下利。以胃虛冷。故令脉緊也。十口衛氣盛名曰高。高者。暴任而肥。榮氣盛名曰章。章者。暴漲而光。高章相搏名曰綱。綱者。身筋急故也。衛氣弱名曰惵。惵者。心中氣動迫悸。榮氣弱名曰卑。卑者。心中常自羞愧。惵卑相搏名曰損。損者。五藏六府俱虛之氣虛羸故也。衛氣和名曰緩。緩者。四肢不能自扶。榮氣和名曰遲。遲者。身體俱重欲眠也。緩遲相搏名曰沈。沈者。腰中直。腹內急痛但欲臥。不欲行。

十口脉緩而遲。緩則陽氣長。其色鮮。其頻光。其聲商。毛髮長。遲則陰氣盛。骨髓生。血滿肌肉緊薄鮮。鞕陰陽相抱。榮衛俱行。剛柔相得名曰強也。○衛氣實緊者。脾氣強。持實擊強。痛還自傷。以手把刃坐作瘡也。○十口脉浮而大。浮為虛。大為實。在尺為關。在寸為格。關則不得小便。格則吐逆。○跌陽脉伏而濇。伏則吐逆。水穀不化。濇則食不得入。名曰關格。○脉浮而大。浮為風虛。大為氣強。風氣相搏。必成隱瘾。身體為痒。痒者名泄風。久久為痂癩。（痂少髮癩。乾瘡而腥臭也。）○十口脉弱而遲。弱者衛氣微。遲者榮中寒。榮為血。血寒則發熱。衛為氣。氣微者心內飢。飢而虛滿。不能食也。○跌陽脉

大而緊者當即下利為難治○寸口脉弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞酸食卒不下氣填於膈上也（一作又）下上○趺陽脉緊而浮浮為氣緊為寒浮為腹滿緊為絞痛浮緊相搏腸鳴而轉轉即氣動膈氣乃下少陰脉不出其陰腫大而虛也○寸口脉微而濇微者衛氣不行濇者榮氣不能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣虛者則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲○趺陽脉沈而數沈為實數消穀緊者病難治○寸口脉微而濇微者衛氣衰濇者榮氣不足衛氣衰面色黃榮氣不足面色青榮為根衛為葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也○趺陽脉浮而芤浮者衛氣虛芤者榮氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相搏宗氣微衰四屬斷絕（四屬者謂皮肉脂髓俱竭宗氣則衰矣）○寸口脉微而緩微者衛氣疎則其膚空緩者胃氣實實則穀消而水化也穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成榮盛則其膚必疎三焦絕經名曰血崩○趺陽脉微而緊緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣○少陰脉弱而濇弱者微煩濇者厥逆○趺陽脉不出脾不上下身冷膚鞕○少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸腹宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰服與陰相動令身不仁此為

尺厥當剌期門巨闕（宗氣者。二焦歸氣（之）也。有召無形。氣（之）神（使）也。下（榮玉）莖（之）故（宗筋）聚縮（之）也。○寸口脉緊其人虛損多汗。知陰常在絕不見陽也。○寸口諸微亡陽。諸濡亡血。諸弱發熱。諸緊為寒。諸乘寒者。則為厥。欝冒不仁。以胃無穀氣。脾濟不通。口急不能言。戰而慄也。○問曰。濡弱何以反適十一頭師曰。五藏六府相乘故令（然）也。○問曰何以知乘府何以知乘藏。師曰。諸陽浮數為乘府。諸陰遲濇為乘藏（也）。

傷寒論卷第一

傷寒論卷第二

傷寒例第三　辨痓濕暍脉證第四

辨太陽病脉證并治上第五

傷寒例第三

四時八節。二十四氣。七十二候決病法。

立春正月節斗指艮　雨水正月中指寅
驚蟄二月節指甲　春分二月中指卯
清明三月節指乙　穀雨三月中指辰
立夏四月節指巽　小滿四月中指巳
芒種五月節指丙　夏至五月中指午
小暑六月節指丁　大暑六月中指未

立秋七月節指坤　處暑七月中指申
白露八月節指庚　秋分八月中指酉
寒露九月節指辛　霜降九月中指戌
立冬十月節指乾　小雪十月中指亥
大雪十一月節指壬　冬至十一月中指子
小寒十二月節指癸　大寒十二月中指丑

二十四氣節有十二中氣有十五日為一候亦同合有七十二候決病生死此須洞解之也

陰陽大論云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冰冽。此則四時正氣之序也。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷於寒。觸冒之者。乃名傷寒耳。其傷於四時之氣。皆能為病。以傷寒為毒者。以其最成殺厲之氣也。中而即病者。名曰傷寒。不即病者。寒毒藏於肌膚。至春變為溫病。至夏變為暑病者。熱極重於溫也。是以辛苦之人。春夏多溫熱病者。皆由冬時觸寒所致。非時行之氣也。凡時行者。春時應暖而反大寒。夏時應熱而反大涼。秋時應涼而反大熱。冬時應寒而反大溫。此非其時而有其氣。是以一歲之中。長幼之病多相似者。此則時行之氣也。夫欲候知四時正氣為病及時行疫氣之法。皆當按斗曆上之。九月霜降節後宜漸寒。向冬大寒至正月雨水節後宜解也。所以謂之雨水者。以冰雪解而為雨水故也。至驚蟄二月節後氣漸和暖。向夏大熱。至秋便涼。從霜降以後。至春分以前。凡有觸冒霜露體中

（成本熱病下無者字）

寒即病者謂之傷寒也九月十月寒氣尚微為病則輕十一月十二月寒冽已嚴為病則重正月二月寒漸將解為病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即為病也其冬有非節之暖者名為冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為治不同證如後章從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病勢猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病勢則重七月八月陽氣已衰為寒所折病勢亦微其病與溫及暑病相似但

成本為作自

治有殊耳十五日得二十氣於四時之中一時有六氣四六名為二十四氣然氣候亦有應至仍不至或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣也但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳是以彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之怒是故冬至之後一陽氣下一陰氣上也斯則冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也陰陽交易人變病焉此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也小人觸冒必嬰茶疹須知毒烈之氣留在何經而發何病詳而取之是以春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必病瘧秋傷於濕冬必咳嗽冬傷於寒春必病溫此必然之道可不審

成本四氣之下有也字

成本至仍不至作至而不至

成本足字下無故字

明之傷寒之病逐日淺深以施方治今世人傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫人又不依次第而治之則不中病皆宜臨時消息制方無不效也今搜採仲景舊論錄其證候診脉聲色對病裒方有神驗者擬防世急也○又土地温涼高下不同物性剛柔飡居亦異是故黄帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟者臨病之工宜須兩審也○兩ヲ以ヲ可見凡傷於寒則為病埶埶雖甚不死若兩感於寒而病者必死○尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脉上連風府故頭項痛腰脊强○尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉夾鼻絡於目故身埶目疼鼻乾

不得臥○尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脉循脅絡於耳故脅痛而耳聾此三經皆受病未入於府者可汗而已○尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發以其脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾○尺寸俱沈者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴○尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮此三經皆受病已入於府者可下而已○若兩感於寒者一日太陽受之即頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與大陰俱病則腹滿身埶不欲食譫之康切ス下同語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾監切下同

成本寸尺作尺寸

成本當依後壞病証當依舊壞証病成温瘧作爲温瘧

囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行藏府不通則死矣其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹滿如故則思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日厥陰病衰囊縱少腹微下太氣皆去病人精神爽慧也若過十二日以上不瘳寸尺陷者大危若更感異氣變爲他病者當依後壞病證而治之若脉陰陽俱盛重感於寒者變成温瘧陽脉浮滑陰脉濡弱者更遇於風變爲風温陽脉洪數陰脉實大者更遇温熱變爲温毒温毒爲病最重也

成本如作若

陽脉濡弱陰脉弦緊者更遇温氣變爲温疫一本作瘧以此冬傷於寒發爲温病脉之變證方治如說○凡人有疾不時即治隱忍羞差以成痼疾小兒女子益以滋甚時氣不和便當早言尋其邪由及在腠理以時治之罕有不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制此爲家有患備慮之要凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣如或差遲病即傳變雖欲除治必難爲力服藥不如方法縱意違師不須治之○凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有温覆而當不消散者不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之若表已解而內不消非大滿猶生寒

熱則病不除若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能為禍也若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩躁諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣○夫陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背千里吉凶之機應若影響豈容易哉況桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃陰盛以亡死生之要在乎須臾視身之盡不暇計日此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹懵然不知病源為治乃誤使病者殞沒自謂其分至今冤魂塞於冥路死屍盈於曠野仁者鑒此豈

成本卽作則　成本誤作悞汝作娘

不痛歟○凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷用意者乃云神丹幷遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違夫智者之舉錯也常審以慎愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉世上之士但務彼翕習之榮而莫見此傾危之敗惟明者居然能護其本近取諸身夫何遠之有焉○凡發汗漏煖湯藥其方雖言日三服若病劇不解當促其間可半日中盡三服若與病相阻即便有所覺病重者一日一夜當晬時觀之如服一劑病證猶在故當復作本湯服之至有不肯汗出服三劑乃解若汗不出者死病也○凡得時氣病至五六日而渴欲飲水飲不能多當與不

成本用意作安意　成本漏煖作溫服

也。何者。以腹中熱尚少。不能消之。便更與穀。入作病也。至七八日。大渴欲飲水者。猶當依證而與之。與之常令不足。勿極意也。言能飲一斗。與五升。若飲而腹滿。小便不利。若喘若噦不可與之也。忽然大汗出是為自愈也。〇凡得病反能飲水。此為欲愈之病。其不曉病者。但聞病飲水自愈。小渴者乃強與飲之。因成其禍。不可復數也。凡得病厥。脉動數服湯藥。更遲。脉浮大減小。初躁後靜。此皆愈證也。〇凡治溫病。可刺五十九穴。又身之穴三百六十有五。其三十穴灸之。有害。七十九穴刺之為災并中髓也。

脉四損三百。死平人四息。病人脉一至名曰四損。

脉五損一日死。平人五息。病人脉一至名曰五損。

脉六損一時死。平人六息。病人脉一至名曰六損。

脉盛身寒。得之傷寒。脉虛身熱。得之傷暑。脉陰陽俱盛。大汗出不解者。死。脉陰陽俱虛。熱不止者。死。脉至乍數乍疎者。死。脉至如轉索。其曰死。讖言妄語。身微熱。脉浮大手足溫者。生。逆冷。脉沈細者。不過二日死矣。此以前是傷寒熱病證候也。

辨痙濕暍脉證第四　痙音徑又作痓　巨郢切下同

傷寒所致太陽病。痙濕暍。此三種。宜應別論。以為與傷寒相似。故此見之。〇太陽病發熱汗出而不惡寒。名曰柔痙。〇太陽病發熱汗出而不惡寒。病源云。惡寒。名曰剛痙。

成本証字下無而字
成本與之下無也字
成本數字無也字
成本三十穴作三十九穴
成本大陽之下無病字
成本汗下無而字惡寒下有者字

成本病作痛

太陽病。發熱脉沈而細者。名曰痓。〇太陽病。發汗太多。因致痓。〇病身熱足寒。頸項强急。惡寒時頭熱。面赤。目脉赤。獨頭面搖。卒口噤。背反張者。痓病也。〇太陽病。關節疼痛。而煩脉沈而細。緩。作者。此名濕痺。中濕濕痺之候。其人小便不利。大便反快。但當利其小便。濕家之為病。一身盡疼。發熱身色如熏黃。濕家其人。但頭汗出。背强。欲得被覆向火。若下之早則噦。脾滿小便不利。舌上如胎者。以丹田有熱。胸中有寒。渴欲得水而不能飲。口燥煩也。〇濕家下之。額上汗出。微喘。小便利。一云不利者。死。若下利不止者亦死。〇問曰。風濕相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云此可發汗。汗之病不愈者何也。荅曰。發其汗汗大出者。但風氣去。濕氣在。是故不愈也。若治風濕者。發其汗。但微微似欲出汗者。風濕俱去也。〇濕家病。身上疼痛。發熱面黃而喘。頭痛鼻塞而煩。其脉大自能飲食。腹中和無病。病在頭中。寒濕故鼻塞。內藥鼻中則愈。〇病者一身盡疼。發熱。日晡所劇者。此名風濕。此病傷於汗出當風。或久傷取冷所致也。〇太陽中熱者。喝是也。其人汗出惡寒。身熱而渴也。太陽中喝者。身熱。疼重而脉微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中所致也。〇太陽中喝者。發熱惡寒。身重而疼痛。其脉弦細芤遲。小便已洒洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口開前板齒燥。若發汗則惡寒甚。加溫針則

成本出汗作汗

發熱甚數下之則淋甚

辨太陽病脉證并治上第五　合一十六法。方一十四首。

太陽中風陽浮陰弱。熱發汗出惡寒鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之第一。五味。前有太陽病一。十一證。○太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之第二。用前第一方。○太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之第三。七味。○太陽病下之後其氣上衝者桂枝湯主之第四。用前第一方。下有三。○太陽壞病一證。○桂枝本為解肌若脉浮緊發熱汗不出者不可與之第五。下有酒客不可與程枝一證。○喘家作桂枝湯加厚朴杏子第六。下有服湯吐膿血二證。甲○太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢急難以屈伸桂枝加附子湯主之第七。六味。○太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之第八。四味。○若微寒者桂枝去芍藥加附子湯主之第九。五味。○太陽病八九日如瘧狀熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯第十。七味。○太陽病服桂枝湯煩不解先刺風池風府却與桂枝湯第十一。見前第一方。○服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯若形似瘧一日再發者宜桂枝二麻黃一湯第十二。七味。○服桂枝湯大汗出大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之第十三。五味。○太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者宜桂枝二越婢一湯第十四。七味。○服桂枝或下之頭項強痛發

熱無汗。心下滿痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。第十五。六味。○傷寒脉浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯。得之便厥。咽乾煩躁吐逆。作甘草乾薑湯與之。厥愈。更作芍藥甘草湯與之。其脚伸。若胃氣不和。譫語。與調胃承氣湯。若重發汗。加燒針者。四逆湯主之。第十六。甘草乾薑湯。芍藥甘草湯。調胃承氣湯。四逆湯。並二味。

太陽之為病。脉浮。頭項強痛而惡寒。○太陽病。發熱汗出。惡風。脉緩者。名為中風。○太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脉陰陽俱緊者。名為傷寒。○傷寒一日。太陽受之。脉若靜者。為不傳。頗欲吐。若躁煩。脉數急者。為傳也。○傷寒二三日。陽明少陽證不見者。為不傳也。○太陽病。發熱而渴。不惡寒者。為温病。若發汗已身灼熱者。名風温。風温為病。脉陰陽俱浮。自汗出。身重多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。剽疾如驚癎。時瘛瘲。若火熏之。一逆尚引日。再逆促命期。○病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽七日愈。發於陰六日愈。以陽數七。陰數六。故也。○太陽病頭痛至七日以上自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。針足陽明。使經不傳。則愈。○太陽病。欲解時。從巳至未上。○

風家。表解而不了了者。十二日愈。○病人身大熱反欲

得衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也○太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之方一

桂枝 三兩去皮 芍藥 三兩 甘草 二兩炙 生薑 三兩切 大棗 十二枚擘

右五味咬咀三味以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流離病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半

成本惡風之下有者字

日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物○太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯主之方二用前第一方○

太陽病項背强几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之方三

葛根 四兩 麻黃 三兩去節 芍藥 二兩 生薑 三兩切 甘草 二兩炙 大棗 十二枚擘 桂枝 二兩去皮

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌臣億等謹按仲景本論太陽中風自汗用桂枝

傷寒無汗用麻黃今證云汗出也第三卷有葛根湯一證云汗出惡風而方中有麻黃恐非本意證云無汗惡風正與此方同是合用麻黃也此云桂枝加葛根湯恐是桂枝中但加葛根耳

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不得與之四〇太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與之也觀其脉證知犯何逆隨證治之桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與之也常須識此勿令誤也

若酒客病不可與桂枝湯得之則嘔以酒客不喜甘故也〇喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳六〇凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也〇太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之方七

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　甘草三兩炙　生薑三兩切
大棗十二枚擘　附子一枚炮去皮破八片

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今加附子將息如前法

太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之方八

（促作縱）

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今去芍藥將息如前法

若微寒者桂枝去芍藥加附子湯主之方九

桂枝三兩　去皮　甘草二兩　炙　生薑三兩　切　大棗十二枚　擘
附子一枚　炮去皮破八片

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。本云桂枝湯。今去芍藥加附子。將息如前法。

太陽病。得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脉微緩者。為欲愈也。脉微而惡寒者。此陰陽俱虚。不可更發汗更下更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出身必痒。宜桂枝麻黄各半湯方十。

桂枝　一兩十六銖　去皮　芍藥　生薑　切　甘草　炙
麻黄　各一兩　去節　大棗　四枚　擘　杏仁　二十四枚　湯浸去皮尖及兩仁者

B535964

成本療字下無一字

右七味。以水五升。先煮麻黄一二沸。去上沫。内諸藥。煮取二升。去滓。温服六合。本云桂枝湯三合。麻黄湯三合。併為六合。頓服。將息如上法。臣億等謹按桂枝湯方。桂枝麻黄湯方。各三兩。杏仁二十四枚。甘草二兩。芍藥生薑各二兩。大棗十二枚。今以算法約之。二湯各取二分之一。即得桂枝一兩十六銖。芍藥生薑甘草各一兩。大棗四枚。杏仁二十三箇。零三分枚之一。甘草麻黄各一兩。杏仁十四箇。零二分箇之一。兼各半也。宜云各半湯。

太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。十一。用前第〇服桂枝湯。大汗出。脉洪大者。與桂枝湯如前法。若形似瘧。一日再發者。汗出必解。宜桂枝二麻黄一湯方十二

桂枝　一兩十六銖　去皮　芍藥　一兩　麻黄　十六銖　去節

生薑 一兩六銖切　杏仁 十六箇去皮尖　甘草 一兩二銖炙　大棗 五枚擘

右七味。以水五升。先煮麻黃。二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。本云桂枝湯二分。麻黃湯一分。合為二升。分再服。今合為一方。將息如前法。臣億等謹按桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚。麻黃湯方。麻黃三兩。桂枝二兩甘草一兩杏仁七十箇。今以算法約之。桂枝湯取十二分之五。即得桂枝芍藥生薑各一兩六銖甘草一兩杏仁十箇。麻黃湯取九分之二。即得麻黃一兩二銖桂枝一兩二銖芍藥一兩二銖甘草一兩二銖杏仁十箇。今合為一方。將息如前法。

桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。方十三。

知母 六兩　石膏 一斤碎綿裹　甘草 炙二兩

粳米 六合　人參 三兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。日三服。

大陽病。發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯。方十四。

桂枝 去皮　芍藥　麻黃　甘草 各十八銖炙

大棗 四枚擘　生薑 一兩二十銖切　石膏 二十四銖碎綿裹

右七味。以水五升。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本云當裁為越婢湯桂枝湯。合之飲一升。今合為一方。桂枝湯二分。越婢湯一分。

臣億等謹按桂枝湯方桂枝芍藥生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚越婢湯方麻黃二兩生薑三兩甘草二兩石膏半斤大棗十五枚今以算法約之桂枝湯取四分之一即得桂枝芍藥生薑各十八銖甘草十二銖大棗三枚越婢湯取八分之一即得麻黃十八銖生薑九銖甘草六銖石膏二十四銖大棗一枚二湯所取相合即共得桂枝芍藥甘草麻黃各十八銖生薑二十四銖大棗四枚今方舊云桂枝三兩今取四分之一即當云桂枝二兩也越婢湯方見仲景雜方中外臺秘要亦云起脾湯。

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方十五。

芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑切　白朮　茯苓各三兩　大棗十二枚擘

右六味以水八升煮取三升去滓溫服一升小便利則愈本云桂枝湯今去桂枝加茯苓白朮。

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和讝語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之方十六。

甘草四兩炙

芍藥

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服。

乾薑二兩

白芍藥
右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分温再服。○

調胃承氣湯方
大黄四兩去皮清酒洗　甘草二兩炙　芒消半升
右三味。以水三升。煮取一升。去滓。内芒消。更上火微煮令沸。少少温服之。

四逆湯方
甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片
右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分温再服。强人可大附子一枚乾薑三兩。

問曰。證象陽旦。按法治之而增劇。厥逆咽中乾。兩脛拘急而讝語。師言夏月温覆汗出。復發其汗。病人惡寒。何以故。答曰。寸口脉浮而大。浮為風。大為虚。風則生微熱。虚則兩脛攣。病形象桂枝。因加附子參其間。增桂令汗出。附子温經。亦陽故也。厥逆咽中乾。煩躁陽明内結。讝語煩亂。更飲甘草乾薑湯。夜半陽氣還。兩足當熱。脛尚微拘急。重與芍藥甘草湯。爾乃脛伸。以承氣湯微溏。則止其讝語。故知病可愈。

傷寒論卷第二

胷滿痛與小柴胡湯脉但浮者與麻黃湯第七（小柴胡湯方味。）○太陽中風。脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之第八。（二味）○傷寒脉浮緩。身不疼但重乍有輕時。無少陰證。大青龍湯發之第九。（用前第八方。）○傷寒表不解心下有水氣。乾嘔發熱而欬或小青龍湯主之第十。（八味。減法附。）○傷寒心下有水氣。欬而微喘。小青龍湯主之第十一。（用前第十方。）○太陽病外證未解。脉浮弱者。當以汗解宜桂枝湯第十二。（五味）○太陽病。下之微喘者。表未解桂枝加厚朴杏子湯主之第十三。（七味）○太陽病。外證未解不可下也。下之為逆。解外宜桂枝湯第十四。（用前第十二方。）○太陽病。先發汗不解復下之。脉浮者。當解外宜桂枝湯第十五。（用前第十二方。）○太陽病。脉浮緊無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證在發汗已發煩。必衄。麻黃湯主之第十六。（用前第五方。下二有太陽病并一陽併病四證）脉浮者。病在表。可發汗。宜麻黃湯第十七。（用前第壹方。用桂枝湯法。）○脉浮數者可發汗。宜麻黃湯第十八。（用前第九。用前第十二方。）○病常自汗出。榮衛不和也。發汗則愈。宜桂枝湯第十九。（用前第十二方。）○病人藏無他病。時自汗出。榮衛不和也。因衄。麻黃湯主之第二十。（用前第十二方。）○傷寒脉浮緊不發汗。因衄。宜桂枝湯第二十一。（用前第五方。）○傷寒不大便六七日。頭痛有熱。與承氣湯。小便清者。知不在

裏當發汗。宜桂枝湯。第二十二。用前第十二方。○傷寒發汗解半日許。復熱煩。脉浮數者。可更發汗。宜桂枝湯。第二十三。用前第十二方。病證有三。○下之後。復發汗。晝日煩躁。不得眠。夜而安靜。不嘔。不渴。無表證。脉沈微者。乾薑附子湯主之。第二十四。二味。○發汗後。身疼痛。脉沈遲者。桂枝加芍藥生薑各一兩。人參三兩。新加湯主之。第二十五。六味。○發汗後不可行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯。第二十六。四味。○發汗過多。其人叉手自冒心。心悸欲得按者。桂枝甘草湯主之。第二十七。二味。○發汗後臍下悸。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。第

二十八。四味。甘爛水法。作。○發汗後。腹脹滿者。厚朴生薑半夏甘草人參湯主之。第二十九。五味。○傷寒吐下後。心下逆滿。氣上衝。頭眩。脉沈緊者。茯苓桂枝白朮甘草湯主之。第三十。四味。○發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芩藥甘草附子湯主之。第三十一。三味。○發汗若下之。不解。煩躁者。茯苓四逆湯主之。第三十二。五味。○發汗後。惡寒。虛故也。不惡寒。但熱者。實也。與調胃承氣湯。第三十三。三味。○太陽病。發汗後。大汗出。胃中乾躁。不能眠。欲飲水。小便不利者。五苓散主之。第三十四。五味。即是。○發汗已。脉浮數。煩渴者。五苓散主之。第三十五。用前第三十四方。○傷寒汗出而

渴者五苓散不渴者茯苓甘草湯主之第三十六。四味中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆五苓散主之第三十七。用前第二十四方。下三別有三證。○發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之第三十八。梔子豉湯二味。梔子甘草豉湯。梔子生薑豉湯並三。○發汗若下之煩熱胷中窒者梔子豉湯主之第三十九。用上初方。○傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者梔子豉湯主之第四十。用上初方。○傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之第四十一。三味傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯

主之第四十二。二味。與梔子湯一證。○大陽病發汗不解仍發熱心下悸頭眩身瞤真武湯主之第四十三。五味下有不可下有五證。○汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰陽俱虛竭死微者愈之第四十四。方本闕。下有二證。○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛急當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯第四十五。桂枝湯用前第十二方。四逆湯三味。○大陽病未解脉陰陽俱停陰脉微者下之。解宜調胃承氣湯第四十六。用前第三十三方。一云大陽病發熱汗出榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯第四十七。用前第十二方。○傷寒五六日中風往來寒熱胷脅滿不欲食心煩喜嘔者小柴胡湯

主之。第四十八。再見柴胡加減法附。○血弱氣盡腠理開邪氣因入。與正氣分爭。往來寒熱。休作有時。小柴胡湯主之。第四十九。用前方。渴者屬陽明證。附。下有柴胡不中與一證。○傷寒四五日。身熱惡風。頸項强。脅下滿。手足温而渴者。小柴胡湯主之。第五十。用前方。○傷寒陽脉濇。陰脉弦。法當腹中急痛。先與小建中湯不差者。小柴胡湯主之。第五十一。用前方。小建中湯。六味。下有嘔家不可用建中湯。并服小柴胡一證。○傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。第五十二。用前第五十一方。○太陽病。過經十餘日。反二三下之。後四五日。柴胡證仍在。微煩者。大柴胡湯主之。第五十三。加大黄八味。○傷寒十三日不解。胷脅滿而嘔。日晡發潮熱。柴胡加

芒消湯主之。第五十四。八味。○傷寒十三日過經譫語者。調胃承氣湯主之。第五十五。用前第三方。○大陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。宜桃核承氣湯。第五十六。五味。下之。胷滿煩驚。小便不利。譫語身重者。柴胡加龍骨牡蠣湯主之。第五十七。十二味。○傷寒腹滿譫語。寸口脉浮而緊。此肝乘脾也。名曰縱。刺期門。第五十八。○傷寒發熱。嗇嗇惡寒。大渴欲飲水。其腹必滿。自汗出。小便利。此肝乘肺也。名曰橫。刺期門。第五十九。下有太陽病二證。○傷寒脉浮。醫火劫之。亡陽必驚。狂。臥起不安者。桂枝去芍藥。加蜀漆牡礪龍骨救逆湯主之。第六十。七味。下有不可火五證。○燒針被寒。針處核起

必發奔豚氣桂枝加桂湯主之第六十一。味〇火逆下之因燒針煩躁者。桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之第六十二。四味。下二有三證。〇太陽病。過經十餘日。溫溫欲吐胃中痛。大便微溏與調胃承氣湯。第六十三。用前第三太陽病六七日表證在脉微沈。不結胸。其人發狂。以熱在下焦。少腹滿小便自利者。下血乃愈。抵當湯主之。第六十四。四味。〇太陽病。身黃脉沈結。少腹鞕。小便自利。其人如狂者。血證諦也。抵當湯主之。第六十五。用前方。〇傷寒有熱。少腹滿應小便不利。今反利者。有益也。當下之宜抵當丸。第六十六。四味。下二有太陽病一證。

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之方一。

葛根 四兩　麻黃 三兩 去節　桂枝 二兩 去皮　生薑 三兩 切
甘草 二兩 炙　芍藥 二兩　大棗 十二枚 擘

右七味。以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白沫。內諸藥煮取三升去滓。溫服一升。覆取微似汗。餘如桂枝法。將息及禁忌。諸湯皆倣此。

太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。方二。用前方。二云用後第四方。〇太陽與陽明合病不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。方三。

葛根 四兩　麻黃 三兩 去節　甘草 二兩 炙　芍藥 二兩
桂枝 二兩 去皮　生薑 二兩 切　半夏 半升 洗　大棗 十二枚 擘

右八味。以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫。內

諸藥煮取二升去滓温服一升覆取微似汗
太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也
喘而汗出者葛根黄芩黄連湯主之方四促作縱
葛根半斤　甘草二兩炙　黄芩三兩　黄連三兩
右四味以水八升先煮葛根減二升内諸藥煮取二
升去滓分温再服
太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘
者麻黄湯主之方五
麻黄三兩去節　桂枝二兩去皮　甘草一兩炙　杏仁七十箇去皮尖
右四味以水九升先煮麻黄減二升去上沫内諸藥
煮取二升半去滓温服八合覆取微似汗不須啜粥

餘如桂枝法將息（）太陽與陽明合病喘而胸滿者
不可下宜麻黄湯六用前第五方（）太陽病十日以去脉浮
細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脉
但浮者與麻黄湯七用前第五方
小柴胡湯方
柴胡半斤　黄芩　人參　甘草炙
生薑各三兩切　大棗十二枚擘　半夏半升洗
右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升
温服一升日三服
太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者
大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服之服之

則厥逆筋惕肉瞤此爲痙也。大青龍湯方八。

麻黃 六十兩 去節　桂枝 二兩 去皮　甘草 二兩 炙　杏仁 四十枚 去皮尖

生薑 三兩 切　大棗 十枚 擘　石膏 如雞子大 碎

右七味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉撲之。一服汗者。停後服。若復服。汗多亡陽。遂逆（一作虛）惡風煩躁不得眠也。（○）傷寒脈浮緩。身不疼。但重。乃有軽時。無少陰證者。大青龍湯發之。（用前第八方）

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴或利。或噎（一作噦）或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。方

麻黃 去節　芍藥　甘草 炙　細辛　乾薑

各三兩　五味子 半升　半夏 半升 洗

右八味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。若渴。去半夏。加栝樓根三兩。若微利。去麻黃。加蓯蓉花如一雞子。熬令赤色。若噎者。去麻黃。加附子一枚炮。若小便不利。少腹滿者。去麻黃。加茯苓四兩。若喘。去麻黃。加杏仁半升。去皮尖。且蓯花不治利。麻黃主喘。今此語反之。疑非仲景意。臣億等謹按小青龍湯。大要治水。又按本草蓯花下云。十二水。若水去。利則止也。又按千金。形腫者應內麻黃。乃內杏仁者。以麻黃發其陽故也。以此證之。豈非仲景意也。（○）傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已渴者。此寒去欲解也。小青龍湯主之。十一。用前第（○）太陽病。外證未解。脈浮弱者。

當以汗解宜桂枝湯方十二〇

桂枝去皮　芍藥　生薑各三兩切　甘草二兩炙
大棗十二枚擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾啜熱稀粥一升。助藥力。取微汗。〇太陽病下之微喘者。表未解故也。桂枝加厚朴杏子湯主之。方十三。〇

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩　芍藥三兩
大棗十二枚擘　厚朴二兩去皮炙　杏仁五十枚去皮尖

右七味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。〇太陽病外證未解不可下也。下之為逆。欲解外者。宜桂枝湯。十四。用前第〇十二方。〇太陽病先發汗不解而復下之。脈浮者不愈。浮為在外。而反下之。故令不愈。今脈浮。故在外。當須解外則愈。宜桂枝湯。十五。用前第十二方。〇太陽病。脈浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服藥已微除。其人發煩目瞑。劇者。必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。十六。用前第五方。〇太陽病。脈浮緊。發熱。身無汗。自衄者愈。〇二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之為逆。如此。可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。熏之。若發汗不徹。不足言。陽氣怫鬱不得越。當汗。不汗。其人躁煩。不知痛處。乃在腹中。乃在四

肢拯之不可得。其人短氣但坐。以汗出不徹故也。更發汗則愈。何以知汗出不徹。以脉濇故知也。○脉浮數者。法當汗出而愈。若下之身重心悸者。不可發汗。當自汗出乃解。所以然者。尺中脉微。此裏虛須表裏實津液自和。便自汗出愈。○脉浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。何以知然。以榮氣不足。血少故也。○脉浮者。病在表。可發汗。宜麻黄湯。十七。用前第五方法用桂枝湯。○脉浮而數者。可發汗。宜麻黄湯。十八。用前第五方病常自汗出者。此為榮氣和。榮氣和者。外不諧。以衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脉中。衛行脉外。復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。十九。用前第十二方○病人藏無他

病時發熱自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗則愈。宜桂枝湯。二十。用前第十二方○傷寒脉浮緊。不發汗。因致衄者。麻黄湯主之。二十一。用前第五方○傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。若頭痛者。必衄。宜桂枝湯。二十二。用前第十二方○傷寒發汗已解。半日許復煩。脉浮數者。可更發汗。宜桂枝湯。二十三。用前第十二方○凡病若發汗若吐若下若亡血亡津液。陰陽自和者。必自愈。○大下之後復發汗。小便不利者。亡津液故也。勿治之。得小便利。必自愈。○下之後復發汗。必振寒。脉微細。所以然者。以内外俱虛故也。○下之後復發汗晝日煩躁不

成本亡津液無亡血二字

得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沈微身無大熱者
乾薑附子湯主之方二十四。

乾薑一兩　附子一枚生用去皮切八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服。

發汗後身疼痛脉沈遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人
參三兩新加湯主之方二十五。

桂枝二兩去皮　芍藥四兩　甘草二兩炙　人參三兩
大棗十二枚擘　生薑四兩

右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升本
云桂枝湯今加芍藥生薑人參。

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻
黃杏仁甘草石膏湯方二十六。

麻黃四兩去節　杏仁五十箇去皮尖　甘草二兩炙　石膏半斤碎綿裹

右四味以水七升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮
取二升去滓溫服一升本云黃耳杯。

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘
草湯主之方二十七。

桂枝四兩去皮　甘草二兩炙

右二味以水三升煮取一升去滓頓服。

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗
湯主之方二十八。

茯苓半斤　桂枝四兩去皮　甘草二兩炙　大棗十五枚擘

右四味。以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取二升去滓温服一升日三服。

作甘爛水法。取水二斗置大盆內。以杓揚之。水上有珠子五六千顆相逐取用之。

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之方二十九。

厚朴半斤炙去皮　生薑半斤切　半夏半升洗　甘草二兩　人參一兩

右五味。以水一斗煮取三升去滓温服一升日三服。

傷寒若吐若下後。心下逆滿氣上衝胷起則頭眩脉沈緊發汗則動經身為振振搖者。茯苓桂枝白朮甘草湯主之方三十。

茯苓四兩　桂枝三兩去皮　白朮　甘草各二兩炙

右四味。以水六升煮取三升去滓分温三服。發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之方三十一。

芍藥　甘草各三兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右三味。以水五升煮取二升五合去滓分温三服。疑非仲景方。

發汗若下之病仍不解煩躁者。茯苓四逆湯主之方三十二。

茯苓四兩　人參一兩　附子一枚生用去皮破八片　甘草二兩炙　乾薑一兩半

右五味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服七合。日二服。發汗後。惡寒者。虛故也。不惡寒。但熱者。實也。當和胃氣。與調胃承氣湯。方三十三。（玉函云。與小承氣湯。）

芒消半升　甘草二兩　炙　大黃四兩　去皮　清酒洗

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。內芒消。更煮兩沸。頓服。

太陽病。發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。欲得飲水者。少少與飲之。令胃氣和。則愈。若脉浮。小便不利。微熱消渴者。五苓散主之。方三十四。（即猪苓散是。）

猪苓十八銖　去皮　澤瀉一兩六銖　白朮十八銖　茯苓十八銖　桂枝半兩　去皮

右五味。擣為散。以白飲和服方寸匕。日三服。多飲煖水。汗出愈。如法將息。

發汗已。脉浮數。煩渴者。五苓散主之。（前第三十四方。）

傷寒汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。方三十六。

茯苓二兩　桂枝二兩　去皮　甘草一兩　炙　生薑三兩　切

右四味。以水四升。煮取二升。去滓。分溫三服。

中風發熱。六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。三十七。（前第三十四方。）

未持脉時。病人手叉自冒心。師因教試令飲水。與一杯。飲一杯。或一升。或一斗。寒實結胸。無熱證者。與之則吐。如此。必兩耳聾無聞也。所以然者。以重發汗虛故。如此。

汗後飲水多必喘以水灌之亦喘
發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止發
汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒音到下同心中
懊憹上烏浩下奴冬切下同梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草
豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之三十八。

梔子豉湯方

梔子十四箇擘　香豉四合綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。內豉煮取一
升半。去滓。分為二服。溫進一服得吐者止後服。

梔子甘草豉湯方

梔子十四箇擘　甘草二兩炙　香豉四合綿裹

右三味。以水四升。先煮梔子甘草。取二升半。內豉煮
取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者止後服。

梔子生薑豉湯方

梔子十四箇擘　生薑五兩　香豉四合綿裹

右三味。以水四升。先煮梔子生薑。取二升半。內豉煮
取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者止後服。〇
發汗若下之而煩熱胷中窒者梔子豉湯主之三十八
用上方〇傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者
未欲解也梔子豉湯主之四十。用上方〇傷寒下後心煩
腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之方四十一。

梔子十四箇擘　厚朴四兩炙去皮　枳實四枚水浸令黃

右三味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。温進一服。得吐者止後服。（一）

傷寒。醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯主之。方四十二。

右二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。温進一服。得吐者止後服。（一）

凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與服之。

太陽病。發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。真武湯主之。方四十三。

茯苓　芍藥　生薑各三兩切　白朮二兩　附子一枚炮去皮破八片

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。温服七合。日三服。

咽喉乾燥者。不可發汗。（一）淋家。不可發汗。發汗必便血。

瘡家。雖身疼痛。不可發汗。發汗痓。（一）亡血家。不可發汗。發汗則寒慄而振。

汗出必額上陷。脈急緊。直視。不能眴不得眠。（眴音舜。又胡絹切。下同。一作瞬。）

汗家重發汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。與禹餘粮丸。四十四。方本闕。（一）病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。（一作逆）

本發汗而復下之。此為逆也。若先發汗。治不為逆。本先下之。而反汗之。為逆。若先下之。治不為逆。（一）傷寒。醫下之續得下利。清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。宜桂枝湯。

四十五。用前第十二方病發熱頭痛脈反沈若不差。身體疼痛。當救其裏。宜四逆湯方。

甘草二兩　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

太陽病。先下而不愈。因復發汗。以此表裏俱虛。其人因致冒。冒家汗出自愈。所以然者。汗出表和故也。裏未和。然後復下之。〇大陽病未解。脈陰陽俱停（一作微）必先振慄汗出而解。但陽脈微者。先汗出而解。但陰脈微（一云尺）者。下之而解。若欲下之。宜調胃承氣湯四十六。

用前第三十三方。〇大陽病發熱汗出者。此為榮弱衛強。故使汗出。欲救邪風者。宜桂枝湯四十七。方用前法〇

傷寒論　卷三　十六

傷寒。五六日中風。往來寒熱。胸脅苦滿。嘿嘿不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脅下痞鞕。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或咳者。小柴胡湯主之方四十八。

柴胡半斤　黃芩三兩　人參三兩　半夏半升洗

生薑各三兩切　大棗十二枚擘　甘草多

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。若胸中煩而不嘔者。去半夏人參。加栝樓實一枚。若渴去半夏。加人參。合前成四兩半。

成本桂字下無枝字

括樓根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若嘔者下痞鞕去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫覆微汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於胷中正邪分爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也（三云藏府相違其病必下邪高痛中痛）小柴胡湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之（四十九用前方）得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足温醫二三下之不能食而胷下滿痛面目及身黃頸項强小便黃者與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡湯不中與也（食穀者噦）傷寒四五日身熱惡風頸項强胷下滿手足温而渴者小柴胡湯主之五十（用前方）傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者小柴胡湯主之五十（用前方）

小建中湯方

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　芍藥六兩　膠飴一升

右六味以水七升煮取三升去滓內飴更上微火消解温服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸

而振却復發熱汗出而解○傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之五十二用前第五○太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯下之則愈方五十三

柴胡半斤　黄芩三兩　芍藥三兩　半夏半升洗
生薑五兩切　枳實四枚炙　大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎温服一升日三服○方加大黄二兩若不加恐不為大柴胡湯○傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之以不得利今反利者知醫以丸藥下之此非其治也潮熱者實也先宜服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之五十四

柴胡二兩十六銖　黄芩一兩　人參一兩　甘草一兩炙
生薑一兩切　半夏二十銖本云五枚洗　大棗四枚擘　芒消二合

右八味以水四升煮取二升去滓內芒消更煮微沸分温再服不解更作○方中無芒消別一方云以水七升下芒消二合大黄四兩桑螵蛸五枚煮取一升半服五合微下即愈本云柴胡朗再服以解其外餘二升加芒消大黄桑螵蛸也○傷寒十三日過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞕而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯主之五十五用前第三十三方

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯方五十六後云宜桂枝湯

桃仁　五十箇去皮尖　大黃　四兩　芒消　二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之方五十七。

柴胡　四兩　龍骨　鉛丹　人參　黃芩　生薑　切　桂枝　去皮　茯苓　各一兩半

半夏　二合半洗　大黃　二兩　牡蠣　一兩　熬　大棗　六枚擘

右十二味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一兩沸去滓溫服一升本云柴胡湯今加龍骨等

傷寒腹滿譫語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門五十八〇傷寒發熱嘗惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門五十九〇太陽病二日反躁凡熨其背而大汗出大熱入胃二作一日內燔背大汗出火氣入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者此為欲解也故其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲吐小便不利者必發作頭痛若吐若下後不多大便已頭卓然而痛其人

足心必熱穀氣下流故也○太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲飲陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至哉手足躁擾捻衣摸床小便利者其人可治○傷寒脈浮醫以火迫劫亡陽必驚狂臥起不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之方六十

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘
牡蠣五兩熬　蜀漆三兩洗去腥　龍骨四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨○形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脈浮解之當汗出愈○太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必清血名為火邪○脈浮熱甚而反灸之此為實實以虛治因火而動必咽燥吐血○微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也欲自解者必當先煩煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解○

漆牡蠣龍骨○形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脈浮解之當汗出愈○太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必清血名為火邪○脈浮熱甚而反灸之此為實實以虛治因火而動必咽燥吐血○微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也欲自解者必當先煩煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解○

二十兩也方六十一。

桂枝五兩　去皮　芍藥三兩　生薑三兩　切　甘草二兩　炙

大棗十二枚　擘。

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加桂滿五兩所以加桂者。以能泄奔豚氣也。火逆下之。因燒針煩躁者。桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。

方六十二。

桂枝一兩　去皮　甘草二兩　炙　牡蠣二兩　熬　龍骨二兩

右四味。以水五升。煮取二升半。去滓。溫服八合。日三服。

太陽傷寒者。加溫針必驚也。○太陽病。當惡寒發熱。今自汗出。反不惡寒發熱。關上脉細數者。以醫吐之過也。

一二日吐之者。腹中飢。口不能食。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。以醫吐之所致也。此為小逆。

太陽病吐之。但太陽病當惡寒。今反不惡寒。不欲近衣。此為吐之。內煩也。○病人脉數。數為熱。當消穀引食。而反吐者。此以發汗。令陽氣微。膈氣虛。脉乃數也。數為客熱。不能消穀。以胃中虛冷。故吐也。○太陽病。過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時。自極吐下者。與調胃承氣湯。若不爾者。不可與。但欲嘔。胸中痛。微溏者。此非柴胡湯證。以嘔故知極吐下也。調胃承氣湯。六十三。用前第三〇二方。○太陽病。六七日。表證仍在。脉微而沈。反不結胸。其人發狂者。以熱在

下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之方六十四。○

水蛭熬　蝱蟲各三十箇去翅足熬　桃仁二十箇去皮尖　大黃三兩酒洗

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下更服

太陽病身黃脉沈結少腹鞕小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之六十五用前方一

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸方六十六。

水蛭二十箇熬　蝱蟲二十箇去翅足熬　桃仁二十五箇去皮尖

大黃三兩

右四味搗分四丸以水一升煮一丸取七合服之睡

時當下血若不下者更服

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也。

傷寒論卷第四

辨太陽病脉證并治下第七 合三十九法方三十首 並見太陽少陽合病法

結胸項強如柔痓狀下則和宜大陷胸丸第一 六味前後有結胸藏結病六證（）太陽病心中懊憹陽氣內陷心下鞕大陷胸湯主之第二 三味（）傷寒六七日結胸熱實脉沈緊心下痛大陷胸湯主之第三 用前第（）方傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與大柴胡湯第四 六味水結附

太陽病重發汗復下之不大便五六日舌燥而渴潮熱從心下至少腹滿痛不可近者大陷胸湯主之第五 用前第（）方小結胸病正在心下按之痛脉浮滑者

小陷胸湯主之第六。（三味。下有太〇病在陽應以汗解。反以冰潠熱不得去。益煩不渴。服文蛤散不差與五苓散。寒實結胸。無熱證者。與三物小陷胸湯。白散亦可服。第七。（人參散五味。小陷胸湯用前第六方。白散三味。）太陽少陽併病。頭痛眩冒。心下痞者。刺肺俞。肝俞。不可發汗。發汗則譫語。譫語不止。當刺期門。第八。〇婦人中風。經水適來。熱除。脉遲。脅下滿。譫語。當刺期門。第九。婦人中風。七八日寒熱。經水適斷。血結。如瘧狀。小柴胡湯主之。第十。（上〇婦人傷寒。經水適來。譫語無犯胃氣及上二焦。自愈。第十一。〇傷寒六七日。發熱微惡寒。支節疼。微嘔。心下支結。柴胡桂枝湯主之。第十二。（九味。〇傷寒五六日已發汗。復下之。胸脅滿。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。往來寒熱。心煩。柴胡桂枝乾薑湯主之。第十三。（七味。〇傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。不欲食。大便鞕。脉細者。為陽微結。非少陰也。可與小柴胡湯。第十四。（用前第十方。〇傷寒五六日。嘔而發熱。以他藥下之。柴胡證仍在。可與柴胡湯。蒸蒸而振。却發熱汗出解。心滿痛者。為結胸。但滿而不痛。為痞。宜半夏瀉心湯。第十五。（七味。下有太陽併病并氣痞二證。）太陽中風。下利嘔逆。表解乃可攻之。十棗湯主之。第十六。（三味。下有太陽一證。）心下痞。按之濡者。大黃黃連瀉心湯主之。第十七。（二味。）心下痞而復惡寒汗出者。附子

瀉心湯主之。第十八。四味○心下痞與瀉心湯不解者。
五苓散主之。第十九。用前第七證方○傷寒汗解後。胃中不
和。心下痞生薑瀉心湯主之。第二十。八味○傷寒中風。
反下之。心下痞。腎復下之。痞益甚。甘草瀉心湯主之。
第二十一。六味○傷寒服藥利不止。心下痞與理中利
益甚。宜赤石脂禹餘粮湯。第二十二。二味。下有○
傷寒發汗若吐下心下痞噫不除者。旋復代赭湯主
之。第二十三。七味○下後不可更行桂枝湯。汗出而喘
無大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯。第二十四。四味
大陽病外未除。數下之。遂協熱而利。桂枝人參湯主
之。第二十五。五味○傷寒大下後。復發汗。心下痞惡寒

者。不可攻痞。先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。
攻痞宜大黃黃連瀉心湯。第二十六。瀉心湯用前第
傷寒發熱。汗出不解。心中痞。嘔吐下利者。大柴胡湯
主之。第二十七。用前第四方○病如桂枝。證頭不痛。項不
強。寸脉浮。胷中痞。氣上衝。不得息。當吐之。宜瓜蒂散。
第二十八。二味。下有不可○病胷中痞。氣上衝。不得息。當吐之。宜瓜蒂散。
引少腹者。此名藏結。第二十九。○傷寒若吐下後不
解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。白虎加人參湯主之。第三十。
五味。下有不可與白虎證上○傷寒無大熱。口燥渴。背微寒者。白虎
加人參湯主之。第三十一。用前○傷寒脉浮。發熱無
汗。表未解。不可與白虎湯。渴者。白虎加人參湯主之。

第三十二。用前第三十一方。○太陽少陽併病。心下鞕。頸項強而眩者。刺大椎肺俞肝俞。愼勿下之。第三十三。○太陽少陽合病。自下利。黃芩湯。四味。加半夏生薑湯。六味。○傷寒。胷中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。第三十四。黃芩加半夏生薑湯。七味。○傷寒十五日。風濕相搏。身疼煩。不能轉側。不嘔不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。大便鞕者。去桂加白朮湯主之。第三十五。桂附湯。五味。○風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。近之痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風或身微腫者。甘草附子湯主之。第三十六。四味。○傷寒脉浮滑。此表有熱。裏有寒。

寒。白虎湯主之。第三十八。四味。○傷寒脉結代。心動悸。炙甘草湯主之。第三十九。九味。

問曰。病有結胷。有藏結。其狀何如。答曰。按之痛寸脉浮。關脉沈。名曰結胷也。○何謂藏結。答曰。如結胷狀。飲食如故。時時下利。寸脉浮。關脉小細沈緊。名曰藏結。舌上白胎滑者難治。○藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者不可攻也。○病發於陰。而反下之。因作痞也。所以成結胷者。以下之太早故也。結胷者。項亦強。如柔痙狀。下之則和。宜大陷胷丸方。

◐ 大黃半斤 葶藶子熬半升 芒消半升 杏仁半升去皮尖熬黑

右四味。擣篩二味。內杏仁芒消。合研如脂。和散取如彈丸一枚。別擣甘遂末一錢匕。白蜜二合。水二升。煮取一升。温頓服之。一宿乃下。如不下。更服。取下為效。禁如藥法。

結胸證。其脉浮大者。不可下。下之則死。○結胸證悉具。煩躁者亦死。○太陽病。脉浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈内拒痛。一云。頭痛即眩。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣内陷。心下因鞕。則為結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黄。大陷胸湯方二。

大黄去皮　六兩　芒消　一升　甘遂　一錢七

右三味。以水六升。先煮大黄。取二升。去滓。内芒消。煮一兩沸。内甘遂末。温服一升。得快利。止後服。

傷寒六七日。結胸熱實。脉沈而緊。心下痛。按之石鞕者。大陷胸湯主之。三用前第二方。○傷寒十餘日。熱結在裏。復往来寒熱者。與大柴胡湯。但結胸無大熱者。此為水結在胸胷也。但頭微汗出者。大陷胸湯主之。四用前第二方。

大柴胡湯方

柴胡半斤　枳實四枚　生薑五兩　黄芩三兩

芍藥三兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎重服一升。

日二三服。一方加大黃二兩。若不加。恐不名大柴胡湯。
太陽病重發汗而復下之不大便五六日。舌上燥而渴。
日晡所小有潮熱。一云日晡所發。心胸大煩從心下至小腹鞕滿而
痛不可近者。大陷胸湯主之。五用前第一方。小結胸病正在
心下。按之則痛。脉浮滑者。小陷胸湯主之。方六

黃連 一兩 半夏洗 半升 栝樓實大者 一枚

右三味。以水六升。先煮栝樓。取三升。去滓。內諸藥。煮
取二升。去滓。分溫三服。
太陽病二三日。不能臥。但欲起。心下必結脉微弱者。此
本有寒分也。反下之。若利止。必作結胸。未止者。四日復
下之。此作協熱利也。○太陽病。下之。其脉促。一云作縱。不結

胸者。此為欲解也。脉浮者。必結胸。脉緊者。必咽痛。脉弦
者。必兩脅拘急。脉細數者。頭痛未止。脉沈緊者。必欲嘔。
脉沈滑者。協熱利。脉浮滑者。必下血。○病在陽。應以汗
解之。反以冷水潠之。若灌之。其熱被劫不得去。彌更益
煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差者。
與五苓散。寒實結胸。無熱證者。與三物小陷胸湯。用前第六
方。○白散亦可服七。二云與三物小白散

文蛤散方

文蛤五兩。

右一味為散。以沸湯和二方寸七。服湯用五合。

五苓散方

猪苓十八銖去黑皮 白朮十八銖 澤瀉一兩六銖 茯苓十八銖

桂枝半兩去皮
右五味為散更於臼中粹之白飲和方寸七服之日
三服多飲煖水汗出愈

白散方

桔梗三分　巴豆一分去皮心熬黑研如脂貝母三分
右三味為散內巴豆更於臼中粹之以白飲和服強
人半錢七羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不
利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身熱皮粟不
解欲引衣自覆若以冰潠之洗之益令熱却不得中
當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩
如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞
鞕者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則
譫語脈弦五日譫語不止當刺期門入婦人中風發熱
惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脅下
滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其
實而取之九〇婦人中風七八日續得寒熱發作有時
經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發
作有時小柴胡湯主之方十。

柴胡半斤　黃芩三兩　人參三兩　半夏半升洗
甘草三兩　生薑三兩切　大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升。

温服一升。日三服。

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語。如見鬼狀者。此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈十一。

傷寒六七日。發熱微惡寒。支節煩疼微嘔。心下支結外證未去者。柴胡桂枝湯主之方十二。

桂枝去皮　黄芩各一兩　人參半兩　甘草一兩炙　半夏二十合半洗　大棗六枚擘　生薑一兩半切　柴胡四兩

右九味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。本云。人參湯作如桂枝法。加半夏柴胡黄芩。復如柴胡法。今用人參作半劑。

傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脅滿微結。小便不利渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此為未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。方十三。

柴胡半斤　桂枝去皮三兩　乾薑二兩　栝樓根四兩

黄芩三兩　牡蠣二兩熬　甘草二兩炙

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。〇

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞕。脉細者。此為陽微結。必有表復有裏也。脉沈亦在裏也。汗出為陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此為半在裏半在外也。脉雖沈緊。不得為少陰病。

所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非渉陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解十四用前第〇十方

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯方十五

半夏半升洗　黄芩　乾薑　人參　甘草炙各三兩　黄連一兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取三升去滓再煎取二升温服一升日三服須大陷胸湯者方用前第二法一方用半夏一升

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩〇脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳〇太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之方十六

芫花熬　甘遂　大戟

右三味等分各別擣為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢温服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒鍼因留煩面色青黃膚嗣者難治今色微黃手足温者易愈心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之方十七。

大黃二兩　黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分温再服

臣億等看詳尤黃黃連瀉心湯諸本皆二味又後附子瀉心湯本云加附子也按後云黃連黃芩附子也恐是前方中亦有附子一也

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之方十八。

大黃二兩　黃連一兩　黃芩一兩　附子一枚炮去皮破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分温再服

本以下之故心下痞顯瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之十九。一方云忍之一日乃愈用前第七證方○傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭胸中有氷氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之方二十。

生薑四兩切　甘草三兩炙　人參三兩　乾薑一兩

黃芩三兩　半夏半升洗　黃連一兩　大棗十二枚擘

右八味以氷一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服附子瀉心湯本云加附子半夏瀉心湯本云理中人甘草瀉心湯同體別名耳生薑瀉心湯本云理中人

參黃芩湯去桂枝朮加黃連并瀉肝法

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之方二十一

甘草 四兩 炙 黃芩 三兩 乾薑 三兩 半夏 半升 洗 大棗 十二枚 擘 黃連 一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服臣億等謹按上生薑瀉心湯法本云治理中人參黃芩湯今詳瀉心以療痞痞氣因發陰而生是半夏生薑甘草瀉心三方皆本於理中也又按千金并外臺秘要治傷寒蠱食用此方皆有人參今甘草瀉心中無者脫落之也知脫落無疑

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘粮湯主之復不止者當利其小便赤石脂禹餘粮湯方二十二

赤石脂 一斤 碎 太一禹餘粮 一斤 碎

右二味以水六升煮取二升去滓分溫三服

傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞕脅下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋復代赭湯主之方二十三

旋復花 三兩 人參 二兩 生薑 五兩 代赭 一兩

甘草三兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味。以水一斗煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。

下後不可更行桂枝湯。若汗出而喘。無大熱者。可與麻黄杏子甘草石膏湯方二十四。

麻黄四兩　杏仁五十箇去皮尖　甘草二兩炙　石膏半斤碎綿裹

右四味。以水七升。先煮麻黄。減二升。去白沫。内諸藥。煮取三升。去滓。温服一升。本云黄耳杯。

太陽病。外證未除。而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞鞕。表裏不解者。桂枝人參湯主之。方二十五。

桂枝四兩別切　甘草四兩炙　白朮三兩　人參三兩

乾薑三兩

右五味。以水九升。先煮四味。取五升。内桂更煮。取三升。去滓。温服一升。日再。夜二服。

傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黄黄連瀉心湯。二十六。瀉心湯用前第十七方。

不解。心中痞鞕。嘔吐而下利者。大黄甘草湯主之。二十七。用前四方。

〇病如桂枝證。頭不痛。項不强。寸脉微浮。胸中痞鞕。氣上衝咽。不得息者。此為胷有寒也。當吐之。宜瓜蒂散。方二十八。

瓜蒂一分熬黄　赤小豆一分

右二味。各別擣篩為散。已合治之。取二錢匕。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓。取汁和散。溫頓服之。不吐者。少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與瓜蒂散。

病胷下素有痞連在臍傍。痛引少腹入陰筋者。此名藏結。死。二十九。○傷寒若吐若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。方三十。

知母　六兩　石膏　一斤　碎　甘草　二兩　炙　人參　二兩　粳米　六合　右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。日三服。此方立夏後。立秋前。乃可服。立秋後不可服。正月二月三月尚凜冷。亦不可與服之。與之則嘔利而腹痛。諸亡血虛家。亦不可與。得之則腹痛利者。但可溫之。當愈。

傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒者。白虎加人參湯主之。三十一。用前方。○傷寒。脉浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。三十二。用前方。○太陽少陽併病。心下鞕。頸項強而眩者。當刺大椎肺俞肝俞。慎勿下之。三十三。○太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。三十四。

黃芩湯方

黃芩三兩　芍藥二兩　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右四味。以水一斗煮取三升。去滓。溫服二升。日再夜一服。

黃芩加半夏生薑湯方

黃芩三兩　芍藥二兩　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

半夏半升洗　生薑一兩半一方三兩切

右六味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

傷寒會中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。方三十五。

黃連三兩　甘草三兩炙　乾薑三兩　桂枝三兩去皮

人參二兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味。以水一斗煮取六升。去滓。溫服晝三夜二。疑非仲景方。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若其人大便鞕云。膀下心下鞕小便自利者。去桂加白朮湯主之。方三十六。

桂枝四兩去皮　甘草二兩炙　附子三枚炮去皮破　生薑三兩切　大棗十二枚擘

右五味。以水六升煮取二升。去滓。分溫三服。

去桂加白朮湯方

附子 三枚炮去皮破 白朮 四兩 生薑 三兩切 甘草 二兩炙
大棗 十二枚擘

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分温三服。初一服其人身如痺。半日許復服之。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。此以附子朮併走皮内。逐水氣未得除故使之耳。法當加桂四兩。此本一方二法。以大便鞕小便自利。去桂也。以大便不鞕小便不利。當加桂。附子三枚。恐多也。虚弱家及産婦。宜減服之。

風濕相搏。骨節疼煩掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯主之。方三十八

甘草 二兩炙 附子 二枚炮去皮破 白朮 二兩 桂枝 四兩去皮

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。温服一升。日三服。初服得微汗則解。能食。汗止。復煩者。將服五合。恐一升多者。宜服六七合為始。

傷寒脉浮滑。此以表有熱。裏有寒。白虎湯主之。方三十九

知母 六兩 石膏 一斤碎 甘草 二兩炙 粳米 六合

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。温服一升。日三服。臣億等。謹按前篇云。熱結在裏。表裏俱熱者。白虎湯主之。又云其表不解。不可與白虎湯。此云脉浮滑。表有熱。裏有寒者。必表裏字差矣。又少陰一證云。裏寒外熱。通脉四逆湯主之。又陽明一證云。裏寒自差。明矣。千金翼云。白虎湯主之。以法言表裏也。〇

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之方三十九○

炙甘草四兩　生薑三兩切　人參二兩　生地黃一斤
桂枝三兩去皮　阿膠二兩　麥門冬半升去心　麻仁半升
大棗三十枚擘○

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烊消盡溫服一升日三服一名復脉湯○

脉按之來緩時一止復來者名曰結又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而中止不能自還因而復動者名曰代陰也得此脉者必難治

傷寒論卷之四

傷寒論卷第五

辨陽明病脉證并治第八

辨少陽病脉證并治第九

陽明少陽合病法

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯第一○三味

前有陽明病二十七證

少陽病脉遲汗出不惡寒身重短氣

辨陽明病脉證并治第八　合四十四法方一十首二方附并見

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯第一○三味

前有陽明病二十七證

少陽病脉遲汗出不惡寒身重短氣○陽明病潮熱大便腹滿潮熱大便鞕大承氣湯主之若腹大滿不通者

大承氣四味　小承氣三味

可與小承氣湯第二○大承氣四味　小承氣三味○陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯若不大便六七日恐有燥屎

與小承氣湯若不轉失氣者不可攻之後發熱鞕者

小承氣湯和之。第三。用前第一一方。下二有三一病證。○傷寒若吐下不解。至十餘日。潮熱不惡寒。如見鬼狀。微喘直視。大承氣湯主之。第四。用前第二方。○陽明病多汗。胃中燥。大便鞕讝語。小承氣湯主之。第五。用前第二方。○陽明病。讝語。潮熱。脉滑疾者。小承氣湯主之。第六。用前第二十方。○陽明病。讝語。潮熱。不能食。胃中有燥屎。宜大承氣湯下之。第七。用前第二十方。下二有陽明病一一證。○汗出讝語。有燥屎在胃中。過經乃可下之。宜大承氣湯。第八。用前第十一方。下二有傷寒病一一證。○三陽合病。腹滿身重。讝語遺尿。白虎湯主之。第九。四味二陽併病。太陽證罷。潮熱汗出。大便難。讝語者。宜大承氣湯。第十。用前第二二方。○陽明病。脉浮緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。惡熱身重。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。梔子豉湯主之。第十一。二〇若渴欲飲水。舌燥者。白虎加人參湯主之。第十二。二五味若脉浮。發熱渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。第十三。五味。下二有與猪苓湯一一證。○脉浮遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。第十四。三味。下二有二一病證。○陽明病。下之。其外有熱。手足温。不結胸。心中懊憹。不能食。但頭汗出。梔子豉湯主之。第十五。用前第十二一方。○陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胃中滿而不去者。與小柴胡湯。第十六。七味○陽明病。脉弦浮大。短氣腹滿。胃下

及心痛。鼻乾不得汗。嗜臥。身黃。小便難。潮熱。不可與小柴胡湯。第十八。用上方。〇脉但浮。無餘證者。與麻黃湯。第十九。四味。〇陽明病。自汗出。若發汗。小便利。津液內竭。雖鞕。不可攻之。須自大便鞕。當煎導而通之。若土瓜根。豬膽汁。第二十。一味。猪膽。二味。〇陽明病。脉遲。汗出多。微惡寒。表未解。宜桂枝湯。第二十一。五味。陽明病。脉浮。無汗而喘。發汗則愈。宜麻黃湯。第二十二。用前第十九方。〇陽明病。但頭汗出。小便不利。身必發黃。茵蔯蒿湯主之。第二十三。三味。〇陽明證。喜忘。必有畜血。大便黑。宜抵當湯下之。第二十四。四味。〇陽明病。下之心中懊憹。而煩。胃中有燥屎者。宜大承氣湯。第二

十五。用前第十一方下有一病證。〇病人煩熱。汗出解。如瘧狀。日晡發熱。脉實者。宜大承氣湯。脉浮虛者。宜桂枝湯。第二十六。大承氣湯。用前第二十一方。桂枝湯。用前第二十一方。〇大下後六七日不大便。煩不解。腹滿痛。本有宿食。宜大承氣湯。第二十七。用前第二十一方。〇病人小便不利。大便乍難。乍易。時有微熱。喜忘者。必有畜血也。宜抵當湯。第二十八。用前第二十四方。〇食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。第二十九。四味。〇太陽病。發熱汗出。惡寒。不嘔。心下痞。此以醫下之也。如不下。不惡寒而渴。屬陽明。但以法救之。宜五苓散。第三十。五味。下二有一病證。小便數。大便鞕。其脾為約。麻子仁丸主之。第三十一。六味。〇太陽病。三日。發汗不解。蒸蒸熱

者調胃承氣湯主之。第三十二。用前第一方。○傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯。第三十三。用前第一方。○太陽病若吐下發汗後微煩。大便鞕與小承氣湯和之。第三十四。用前第二方。○得病二三日。脈弱無太陽柴胡證。煩躁心下鞕。小便利屎定鞕。宜大承氣湯。第三十五。用前第二十方。○傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。宜大承氣湯。第三十六。用前第二方。○陽明病發熱汗多者。急下之。宜大承氣湯。第三十七。用前第二方。○陽明病發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。第三十八。用前第二十方。○腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。第三十九。用前第二十方。○陽明少陽合病。必下利。脈滑而

數。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。第四十。用前第二方。○病人無表裏證。發熱七八日。脈數可下之。假令已下不大便者。有瘀血。宜抵當湯。第四十一。用前第二十四方。下有二十病證第二十方。○傷寒七八日。身黃如橘色。小便不利。茵蔯蒿湯主之。第四十二。用前第二十方。○傷寒身黃發熱。梔子蘗皮湯主之。第四十三。用前第二十方。○傷寒瘀熱在裏。身必黃。麻黃連軺赤小豆湯主之。第四十四。八味

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約是也。少陽陽明者。發汗利小便已。胃中燥煩實。大便難是也。○陽明之為病。胃家實是也。○問曰。何緣得胃家實。實一作寔

陽明病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也○問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也○問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也○問曰病有得之一日不發熱而惡寒者本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然者是轉屬陽明也○傷寒三日陽明脉大○傷寒脉浮而緩手足自温者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞕者為陽明病也○傷寒轉繫陽明者其人濈然微汗出也○陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也○陽明病若能食名中風不能食名中寒○陽明病若中寒者不能食小便不利手足濈然汗出此欲作固瘕必大便初鞕後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也○陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共并脉緊則愈○陽明病欲解時從申至戌上○陽明病不能食攻其熱必嘔所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必嘔○陽明病脉遲食

成本無主字

成本中寒下無者字

成本欲食上無初字

成本注作併

難用飽飽則微煩頭眩必小便難欲作穀癉雖下之
腹滿如故所以然者脈遲故也〇陽明病法多汗反無
汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也〇陽明病反
無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若
不欬不嘔手足不厥者頭不痛一云久陽明〇陽明病但頭
眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛若不欬者咽不痛
一云久陽明〇陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發
黃〇陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃
〇陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗
出〇陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄〇陽明
病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此

成本穀癉作穀
成本註頭不痛下無一云久陽明五字
成本咽必痛作必咽痛
成本註咽不痛下無一云久陽明五字

必大便鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕當問
其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大
便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不
久必大便也〇傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之
陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利
止者愈〇陽明病面合色赤不可攻之必發熱色黃者
小便不利也
陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯方一

芒消半升　大黃四兩清酒洗　甘草二兩炙

右三味切以水三升煮二物至一升去滓內芒消更
上微火一二沸溫頓服之以調胃氣

成本必大便鞕作大便必鞕
成本色赤作赤色黃下無者字

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也一云桂枝湯與其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下大承氣湯方二

大黃四兩酒洗　厚朴半斤炙去皮　枳實五枚炙　芒消三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取二升去滓內芒消更上微火一二沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯方

大黃四兩　厚朴二兩炙去皮　枳實三枚大者炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞕而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

小承氣湯三用前第二十七方○夫實則讝語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視讝語喘滿者死下利者亦死

發汗多若

重發汗者亡其陽讝語脉短者死脉自和者不死

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識

成本轉氣作轉失氣

久循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者死濇者死微者但發熱讝語者大承氣湯主之若一服利則止後服四（用前第一方）

（陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則讝語小承氣湯主之若一服讝語止者更莫復服五（用前第二方）

（陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也為難治不可更與承氣湯也六（用前第二方）

（陽明病讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞕耳宜大承氣湯下之七（用前第二方）

（陽明病下血讝語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈（汗作臥出）

讝語者以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之若單語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜大承氣湯八（用前第二方云大柴胡湯）

（傷寒四五日脉沈而喘滿沈為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則讝語（三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢（又作枯一云向經）讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之方九（

成本湯劑作飴餅

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合

右四味。以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服。

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之則愈宜大承氣湯十用前第二方

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒公對切反讝語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之方十一

肥梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味。以水四升煮梔子取二升半去滓。內豉更煮取一升半去滓。分二服溫進一服得快吐者止後服

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之方十二

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合

人參三兩

右五味。以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服。

若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之方十三

豬苓去皮　茯苓　澤瀉　阿膠　滑石碎各一兩

右五味。以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊消溫服七合日三服

陽明病汗出多而渴者不可與豬苓湯以汗多胃中燥豬苓湯復利其小便故也○脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之方十四

甘草二兩 炙 乾薑一兩 半 附子一枚生用去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。若胃中虛冷。不能食者。飲水則噦。○脈浮發熱。口乾鼻燥。能食者則衄。○陽明病。下之。其外有熱。手足溫。不結胸。心中懊憹。飢不能食。但頭汗出者。梔子豉湯主之。十五。用一前第一方。○陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胃脘滿。不去者。與小柴胡湯。方十六。

成本與小柴胡湯作小柴胡湯主之

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 半夏半升 洗 甘草三兩 炙 生薑三兩 切 大棗十二枚 擘。

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。陽明病。脅下鞕滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濈然汗出而解。十七。用上一方。○陽明中風。脈弦浮大。而短氣。腹都滿。脅下及心痛。久按之氣不通。鼻乾。不得汗。嗜臥。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脈續浮者。與小柴胡湯。十八。用上一方。○脈但浮。無餘證者。與麻黃湯。若不尿。腹滿加噦者。不治。麻黃湯。

成本自桂枝麻黃各半湯作麻黃湯主之

麻黃三兩 去節 桂枝二兩 去皮 甘草一兩 炙 杏仁七十箇 去皮尖

右四味。以水九升。煮麻黃。減二升。去白沫。內諸藥。煮

取二升半去滓。温服八合。覆取微似汗。
陽明病自汗出若發汗小便自利者。此爲津液内竭。雖
鞕不可攻之。當須自欲大便宜蜜煎導而通之。若土瓜
根及大猪膽汁。皆可爲導。方二十。

蜜煎方

右一味。於銅器内。微火前。當須凝如飴狀。攪之勿令
焦著。欲可丸。併手捻作挺。令頭銳大如指。長二寸許。
當熱時急作。冷則鞕。以内穀道中。以手急抱。欲大便
時乃去之。疑非仲景意。已試甚良。○又大猪膽一枚。
瀉汁和少許法醋。以灌穀道内。如一食頃。當大便出。
宿食惡物甚衆。

成本及字下右旁字

陽明病脉遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗宜桂
枝湯二十一。

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　生薑三兩　甘草二兩
大棗十二枚擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。須臾啜
熱稀粥一升。以助藥力。取汗。
陽明病。脉浮。無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黄湯二十二
前第（）方　陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黄也。
但頭汗出。身無汗。剂頸而還。小便不利。渴引水漿者。此
爲熱在裏。身必發黄。茵蔯蒿湯主之。方二十三

茵蔯蒿六兩　梔子十四枚擘　大黄二兩去皮

右二味。以水一斗二升。先煮茵蔯減六升。內二味。煮取三升。去滓。分三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

陽明證。其人喜忘者。必有蓄血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖鞕大便反易。其色必黑者。宜抵當湯。下之。方二十四。

水蛭熬　蝱蟲去翅足熬　桃仁二十箇去尖及兩人者　各三十箇　大黃三兩酒洗

右四味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。不下。更服。

陽明病。下之。心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。可攻。腹微滿。初頭鞕。後必溏。不可攻之。若有燥屎者。宜大承氣湯。

二十五。用前第〇方。病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁發作有時者。此有燥屎故使之不大便也。〇病人煩熱汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脉實者宜下之。脉浮虛者。宜發汗。下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。

二十六。大承氣湯。用前第二十一方。注〇大下後。六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎也。所以然者。本有宿食故也。宜大承氣湯。

二十七。用前第〇方。病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒。一作息不能臥者。有燥屎也。宜大承氣湯。

二十八。用前第一方。食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。屬上焦也。吳茱萸湯。方二十九。

吳茱萸一升洗　人參三兩　生薑六兩切　大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散方三十

豬苓去皮　白朮　茯苓各十八銖　澤瀉一兩六銖

桂枝半兩去皮

右五味為散白飲和服方寸匕日三服

脉陽微而汗出少者為自和汗出多者為太過

陽脉實因發其汗出多者亦為太過太過者為陽絕於裏亡津液大便因鞕也（）脉浮而乳浮為陽乳為陰浮乳相搏胃氣生熱其陽則絕（）趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則鞕其脾為約麻子仁丸主之方三十一

麻子仁二升芍藥半斤　枳實半斤炙　大黃一斤去皮

厚朴一尺炙去皮　杏仁一升熬別作脂尖

右六味蜜和丸如梧桐子大飲服十九日三服漸加以知為度

太陽病三百發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之三十二用前第（）傷寒吐後腹脹滿者與調胃

成本微煩上無煩字

○承氣湯三十二。用前第一方。○大陽病。若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞕者。與小承氣湯和之。愈。三十四。用前第二方。○得病二三日。脈弱。無太陽柴胡證。煩躁心下鞕。至四五日。雖能食。以小承氣湯少少與。微和之。令小安。至六日。與承氣湯一升。若不大便六七日。小便少者。雖不受食。一云不欲食。但初頭鞕後必溏。未定成鞕。攻之必溏。須小便利。屎定鞕。乃可攻之。宜大承氣湯三十五。用前第二方。○傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此為實也。急下之。宜大承氣湯三十六。用前第二方。○陽明病。發熱汗多者。急下之。宜大承氣湯。三十七。用前第二方。云大柴胡湯。○發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜

成本不受食作不能食

成本陽明上無病字

成本順字上為字

大承氣湯三十八。用前第二方。○腹滿不減減不足言。當下之。宜大承氣湯三十九。用前第二方。○陽明少陽合病。必下利。其脈不負者。為順也。負者。失也。互相剋賊名為負也。脈滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯四十。用前第二方。病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者。可下之。假令已下。脈數不解。合熱則消穀喜飢。至六七日。不大便者。有瘀血。宜抵當湯四十一。用前第二十四方。○若脈數不解。而下不止。必協熱便膿血也。○傷寒發汗已。身目為黃。所以然者。以寒濕（濕作溫）在裏不解故也。以為不可下也。於寒濕中求之。○傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。茵蔯蒿湯主之。四十二。用前第二十三方。

成本有若字

傷寒身黃發熱梔子蘗皮湯主之方四十三。

肥梔子十五箇擘　甘草一兩炙　黃蘗二兩

右三味。以水四升。煮取二升半。去滓。分温再服。

成本有發字

傷寒瘀熱在裏。身必黃。麻黃連翹赤小豆湯主之方四十四。

麻黃二兩去節　連翹二兩連翹根是　杏仁四十箇去皮尖　赤小豆一升

大棗十二枚擘　生梓白皮一升切　生薑二兩切　甘草二兩炙

右八味。以潦水一斗。先煮麻黃再沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分温三服。半日服盡。

辨少陽病脉證并治第九　方一首并見

太陽病不解。轉入少陽。胷下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尚未吐下。脉沈緊者。與小柴胡湯第一。七味

成本有上缺為字

少陽之為病。口苦咽乾目眩也。○少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胷中滿而煩者。不可吐下。吐下則悸而驚。

傷寒脉弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。此屬胃。胃和則愈。胃不和。煩而悸。一云躁。

本太陽病。不解。轉入少陽者。胷下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尚未吐下。脉沈緊者。與小柴胡湯方一。

柴胡八兩　人參三兩　黃芩三兩　甘草三兩炙

半夏半升洗　生薑三兩切　大棗十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。

若已吐下發汗溫鍼灸讝語煩胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之

三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故也

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

傷寒三日少陽脉小者欲已也

少陽病欲解時從寅至辰上

若已吐下發汗溫針讝語柴胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之

三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故也

傷寒二三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

傷寒三日少陽脉小者欲已也

少陽病欲解時從寅至辰上

傷寒論卷五

宋板傷寒論

徐崇

特和
490.9
C53
2

立教大学
池袋図書館蔵

辨太陰病脉證并治第十

辨少陰病脉證并治第十一

辨厥陰病脉證并治第十二 厥利嘔噦附

辨太陰病脉證并治第十 合三法方三首

太陰病脉浮可發汗宜桂枝湯第一 五味前有太陰病三證自利不渴者屬太陰以其藏寒故也宜服四逆輩第二 下有利自止一證 ○本太陽病反下之因腹滿痛屬太陰桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之第三 桂枝加芍藥湯五味加大黃湯六味減芍藥黃芩藥法附

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若

成本脉上無病字

寄贈
敬元堂二様
平成6年9月吉日

B535965

和
特
490.9
C53
2

下之必胷下結鞕○太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者為欲解時從亥至丑上

桂枝三兩 去皮 芍藥三兩 甘草二兩 炙 生薑三兩 切 大棗十二枚 擘

右五味以水七升煮取三升去滓温服一升須臾歠熱稀粥一升以助藥力温覆取汗

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當温之宜服四逆輩二○傷寒脉浮而緩手足自温者繫在太陰太陰當發身黄若小便自利者不能發黄至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之三○

桂枝加芍藥湯方

桂枝三兩 去皮 芍藥六兩 甘草二兩 炙 大棗十二枚 擘 生薑三兩 切

右五味以水七升煮取三升去滓温分三服本六桂枝湯今加芍藥

桂枝加大黄湯方

桂枝三兩 去皮 大黄二兩 芍藥六兩 甘草二兩 炙 生薑三兩 切 大棗十二枚 擘

右六味以水七升煮取三升去滓温服一升日二服

太陰為病。脉弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱。易動故也。（下利者。先煎芍藥三沸。）

辨少陰病脉證并治第十一　方一十九首。

少陰病。始得之。發熱。脉沈者。麻黃附子甘草湯。微發汗。第一。（三味。前有少陰病二十證。）

少陰病二十三日。麻黃附子甘草湯主之。第二。（三味。前有少陰病二十證。）

少陰病。二三日以上。心煩不得臥。黃連阿膠湯主之。第三。（五味。）

少陰病。二三日口中和。其背惡寒。附子湯主之。第四。（五味。用前第一方。）

少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脉沈者。附子湯主之。第五。（五味。用前第四方。）

少陰病。下利便膿血者。桃花湯主之。第六。（三味。）

少陰病。下利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第八。（四味。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第七。（用前第六方。下有少陰病一證。）

豬膚湯主之。第九。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第十。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第十一。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第十二。（三味。）

下利。白通湯主之。第十三。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第十四。（白通湯用前第十三方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第十五。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第十六。（用前第八方。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第十七。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第十八。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第十九。（三味。）

下利。白通湯主之。第二十。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二十一。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二十二。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二十三。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二十四。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二十五。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二十六。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二十七。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二十八。（三味。）

下利。白通湯主之。第二十九。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三十。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三十一。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三十二。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三十三。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第三十四。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第三十五。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第三十六。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第三十七。（三味。）

下利。白通湯主之。第三十八。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三十九。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第四十。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第四十一。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第四十二。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第四十三。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第四十四。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第四十五。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第四十六。（三味。）

下利。白通湯主之。第四十七。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第四十八。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第四十九。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第五十。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第五十一。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第五十二。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第五十三。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第五十四。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第五十五。（三味。）

下利。白通湯主之。第五十六。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第五十七。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第五十八。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第五十九。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第六十。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第六十一。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第六十二。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第六十三。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第六十四。（三味。）

下利。白通湯主之。第六十五。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第六十六。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第六十七。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第六十八。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第六十九。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第七十。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第七十一。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第七十二。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第七十三。（三味。）

下利。白通湯主之。第七十四。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第七十五。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第七十六。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第七十七。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第七十八。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第七十九。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第八十。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第八十一。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第八十二。（三味。）

下利。白通湯主之。第八十三。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第八十四。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第八十五。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第八十六。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第八十七。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第八十八。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第八十九。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第九十。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第九十一。（三味。）

下利。白通湯主之。第九十二。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第九十三。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第九十四。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第九十五。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第九十六。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第九十七。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第九十八。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第九十九。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百一。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百二。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百三。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百四。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百五。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百六。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百七。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百八。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百九。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百十。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百十一。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百十二。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百十三。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百十四。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百十五。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百十六。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百十七。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百十八。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百十九。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百二十。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百二十一。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百二十二。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百二十三。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百二十四。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百二十五。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百二十六。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百二十七。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百二十八。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百二十九。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百三十。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百三十一。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百三十二。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百三十三。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百三十四。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百三十五。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百三十六。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百三十七。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百三十八。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百三十九。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百四十。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百四十一。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百四十二。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百四十三。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百四十四。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百四十五。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百四十六。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百四十七。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百四十八。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百四十九。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百五十。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百五十一。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百五十二。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百五十三。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百五十四。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百五十五。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百五十六。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百五十七。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百五十八。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百五十九。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百六十。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百六十一。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百六十二。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百六十三。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百六十四。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百六十五。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百六十六。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百六十七。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百六十八。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百六十九。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百七十。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百七十一。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百七十二。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百七十三。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百七十四。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百七十五。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百七十六。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百七十七。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百七十八。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百七十九。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百八十。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百八十一。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百八十二。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百八十三。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百八十四。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百八十五。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百八十六。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百八十七。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百八十八。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百八十九。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百九十。（三味。）

下利。白通湯主之。第一百九十一。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第一百九十二。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第一百九十三。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百九十四。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第一百九十五。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第一百九十六。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第一百九十七。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第一百九十八。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第一百九十九。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百一。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百二。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百三。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百四。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百五。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百六。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百七。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百八。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百九。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百十。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百十一。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百十二。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百十三。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百十四。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百十五。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百十六。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百十七。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百十八。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百十九。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百二十。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百二十一。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百二十二。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百二十三。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百二十四。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百二十五。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百二十六。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百二十七。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百二十八。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百二十九。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百三十。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百三十一。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百三十二。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百三十三。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百三十四。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百三十五。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百三十六。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百三十七。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百三十八。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百三十九。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百四十。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百四十一。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百四十二。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百四十三。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百四十四。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百四十五。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百四十六。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百四十七。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百四十八。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百四十九。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百五十。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百五十一。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百五十二。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百五十三。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百五十四。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百五十五。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百五十六。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百五十七。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百五十八。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百五十九。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百六十。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百六十一。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百六十二。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百六十三。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百六十四。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百六十五。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百六十六。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百六十七。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百六十八。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百六十九。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百七十。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百七十一。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百七十二。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百七十三。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百七十四。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百七十五。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百七十六。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百七十七。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百七十八。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百七十九。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百八十。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百八十一。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百八十二。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百八十三。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百八十四。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百八十五。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百八十六。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百八十七。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百八十八。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百八十九。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百九十。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第二百九十一。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第二百九十二。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百九十三。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第二百九十四。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第二百九十五。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第二百九十六。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第二百九十七。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第二百九十八。（三味。）

下利。白通湯主之。第二百九十九。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三百。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三百一。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百二。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百三。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第三百四。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第三百五。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第三百六。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第三百七。（三味。）

下利。白通湯主之。第三百八。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三百九。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三百十。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百十一。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百十二。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第三百十三。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第三百十四。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第三百十五。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第三百十六。（三味。）

下利。白通湯主之。第三百十七。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三百十八。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三百十九。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百二十。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百二十一。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第三百二十二。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第三百二十三。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第三百二十四。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第三百二十五。（三味。）

下利。白通湯主之。第三百二十六。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三百二十七。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三百二十八。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百二十九。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百三十。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第三百三十一。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第三百三十二。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第三百三十三。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第三百三十四。（三味。）

下利。白通湯主之。第三百三十五。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三百三十六。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三百三十七。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百三十八。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百三十九。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第三百四十。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第三百四十一。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第三百四十二。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第三百四十三。（三味。）

下利。白通湯主之。第三百四十四。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三百四十五。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三百四十六。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百四十七。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百四十八。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第三百四十九。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第三百五十。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第三百五十一。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第三百五十二。（三味。）

下利。白通湯主之。第三百五十三。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三百五十四。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三百五十五。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百五十六。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百五十七。（用前第八方。）

豬膚湯主之。第三百五十八。（三味。）

少陰病二三日。咽痛。與甘草湯不差。與桔梗湯第三百五十九。（甘草湯一味。桔梗湯二味。）

生瘡不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。第三百六十。（三味。）

少陰病咽痛。半夏散及湯主之。第三百六十一。（三味。）

下利。白通湯主之。第三百六十二。（三味。）

白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔者。白通加豬膽汁湯主之。第三百六十三。（白通湯用前第二十方。加豬膽汁湯五味。）

少陰病至四五日。腹痛。小便不利。便膿血者。桃花湯主之。第三百六十四。（用前第六方。下有少陰病一證。）

便不利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百六十五。（用前第八方。）

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。第三百六十六。（用前第八

之第十五。五味減法附加○少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絶。惡寒或利止。脈不出。通脉四逆湯主之。第十六。三味減法附加○少陰病四逆或欬或悸。四逆散主之。第十七。四味減法附加○少陰病下利六七日。欬而嘔渴煩不得眠。猪苓湯主之。第十八。五味○少陰病二三日。口燥咽乾者。宜大承氣湯。第十九。四味○少陰病自利清水。心下鞕。口乾者。宜大承氣湯。第二十。用前第十九方○少陰病六七日腹滿不大便。宜大承氣湯。第二十一。用前第十九方○少陰病脈沈者。急温之。宜四逆湯。第二十二。三味○少陰病食入則吐。心中温温欲吐。手足寒。脈弦遲。當温之。宜四逆湯。第二十三。用前第二十一方。下有少

陰病一證。

少陰之為病。脈微細。但欲寐也。○少陰病。欲吐不吐。心煩。但欲寐五六日。自利而渴者。屬少陰也。虚故引水自救。若小便色白者。少陰病形悉具。小便白者。以下焦虚有寒。不能制水。故令色白也。○病人脈陰陽俱緊。反汗出者。亡陽也。此屬少陰。法當咽痛而復吐利。○少陰病。欬而下利讝語者。被火氣劫故也。小便必難。以強責少陰汗也。○少陰病脈細沈數。病為在裏。不可發汗。○少陰病。脈緊。至七八日。自下利。脈暴微。手足反温。脈緊反去者。為欲解也。雖煩下利。必自愈。○

少陰病下利若利自止惡寒而蜷臥手足温者可治〇少陰病惡寒而蜷時自煩欲去衣被者可治〇少陰中風脉陽微陰浮者為欲愈〇少陰病欲解時從子至寅上〇少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者（至一作足）灸少陰七壯〇少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也〇少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者（成本從目出者作從目出）是名下厥上竭為難治〇少陰病惡寒身蜷而利手足逆冷者不治〇少陰病吐利躁煩四逆者死〇少陰病四逆惡寒而身利止而頭眩時時自冒者死〇少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而復煩躁不得臥寐者死（躁一作吐利而躁逆者死）〇少陰病始得之反發熱脉沈者麻黄細辛附子湯主之方一〇

麻黄二兩去節　細辛二兩　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮取三升去滓温服一升日三服

少陰病得之二三日麻黄附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗也方二〇

麻黄二兩去節　甘草二兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水七升先煮麻黄二兩沸去上沫内諸藥煮取三升去滓温服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿膠湯主之方三。

黃連四兩　黃芩二兩　芍藥二兩　雞子黃二枚
阿膠三兩一云三挺。

右五味以水六升先煮三物取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服。

少陰病得之一二百。口中和。其背惡寒者當灸之附子湯主之方四。

附子二枚炮去皮破八片　茯苓三兩　人參二兩　白朮四兩
芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服。

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沈者附子湯主之五用前第四方。

赤石脂一斤一半半㕮咀　乾薑一兩　粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服。

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之七。用前第六方。

赤石脂一斤一半半㕮咀　乾薑一兩　粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服。

少陰病下利便膿血者桃花湯主之七。用前第六方。

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之方八。

吳茱萸一升人參二兩　生薑六兩切　大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日二服。

少陰病。下利。咽痛。胸滿心煩。猪膚湯主之。方九。

猪膚一斤。

右一味。以水一斗。煮取五升。去滓。加白蜜一升。白粉五合。熬香和令相得。溫分六服。

少陰病。二三日咽痛者。可與甘草湯。不差。與桔梗湯。十

甘草湯方

甘草二兩

右一味。以水三升。煮取一升半。去滓。溫服七合。日二服。

桔梗湯方

桔梗一兩 甘草二兩

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。溫分再服。

成本與桔梗湯下無十字

少陰病。咽中傷生瘡。不能語聲。不出者。苦酒湯主之。方十一。

半夏洗破如棗核十四枚 雞子一枚去黃肉上苦酒着雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中。以雞子殼置刀環中。安火上。令三沸。去滓。少少含嚥之。不差。更作三劑。

少陰病。咽中痛。半夏散及湯主之。方十二。

半夏洗 桂枝去皮 甘草炙

右三味等分。各別擣篩已。合治之。白飲和服方寸匕。日三服。若不能散服者。以水一升。煎七沸。內散兩方寸匕。更煮三沸。下火。令小冷。少少嚥之。半夏有毒。不

當散服。

少陰病下利白通湯主之方十三。

葱白 四莖　乾薑一兩　附子一枚生去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服。

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者生白通加猪膽湯方十四。白通湯用上方。

葱白 四莖　乾薑一兩　附子一枚生去皮破八片　人尿 五合　猪膽汁 一合

右五味以水三升煮取一升去滓内膽汁人尿和令相得分温再服若無膽亦可用。

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者真武湯主之方十五。

茯苓三兩　芍藥三兩　白朮二兩　生薑三兩切　附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日二服若欬者加五味子半升細辛一兩乾薑一兩若小便利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩若嘔者去附子加生薑足前為半斤。

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絶身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之方十六。

成本五味之下無子字

成本色赤作赤色

甘草二兩炙　附子大者一枚生用去皮破八片　乾薑三兩強人可四兩

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分温再服。其脉即出者愈。面色赤者加葱九莖。腹中痛者去葱。加芍藥二兩。嘔者加生薑二兩。咽痛者去芍藥。加桔梗一兩。利止脉不出者去桔梗。加人參二兩。病皆與方相應者。乃服之。

少陰病四逆。其人或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。方十七。

甘草炙　枳實破水漬乾　柴胡　芍藥

右四味。各十分。擣篩。白飲和服方寸匕。日三服。欬者加五味子乾薑各五分。并主下利悸者。加桂枝五分。小便不利者加茯苓五分。腹中痛者加附子一枚炮。令坼。泄利下重者。先以水五升。煮薤白三升。煮取二升。去滓。以散三方寸匕。內湯中。煮取一升半。分温再服。

少陰病。下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠者。猪苓湯主之。方十八。

猪苓去皮　茯苓　阿膠　澤瀉　滑石各一兩

右五味。以水四升。先煮四物。取二升。去滓。內阿膠。烊盡。温服七合。日三服。

少陰病得之二三日。口燥咽乾者。急下之。宜大承氣湯方十九。

枳實五枚炙　厚朴半斤去皮炙　大黃四兩酒洗　芒消三合

右四味。以水一斗。先煮二味。取五升。去滓。內大黃。更煮取二升。去滓。內芒消。更上火令一兩沸。分溫再服。

少陰病。自利清水色純青。心下必痛。口乾燥者。可下之。宜大承氣湯二十。用前第十九方。一法用大柴胡。○少陰病六七日。腹脹不大便者。急下之。宜大承氣湯二十一。用前第十九方。

少陰病。脉沈者。急溫之。宜四逆湯方二十二。

甘草二兩　炙　乾薑一兩　附子一枚　生用去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

少陰病。飲食入口則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脉弦遲者。此胸中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐也。當溫之。宜四逆湯二十三。方依上法。○少陰病。下利。脉微澁。嘔而汗出。必數更衣。反少者。當溫其上。灸之。脉經云。灸厥陰可五十壯。

辨厥陰病脉證并治第十二　厥利嘔噦附　合一十九法。方一十六首。

傷寒病。厥厥。靜而時煩。為藏寒。蚘上入膈。故煩。得食而嘔。吐蚘者。烏梅丸主之。第一。十味。前後有厥陰病四證。厥逆十九證。

傷寒。脉滑而厥。裏有熱。白虎湯主之。第二。四味。○手足厥寒。脉細欲絕者。當歸四逆湯主之。第三。七味。○若內有寒者。宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯。第四。九味。○

大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。下利厥逆。惡寒者。四

逆湯主之。第五。三味○大汗若大下利而厥冷者。四逆湯主之。第六。用前第五方。○病人手足厥冷。脉乍緊。心下滿而煩。宜服茯苓甘草湯。第七。三味○傷寒厥而心下悸。宜先治水。當服茯苓甘草湯。第八。四味○傷寒六七日。大下後。寸脉沈遲。手足厥逆。麻黄升麻湯主之。第九。十四味。下二有欲自利一證。○傷寒本自寒下。醫復吐下之。若食入口即吐。乾薑黄芩黄連人參湯主之。第十。四味。下二有下利一證。○下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脉四逆湯主之。第十一。三味○熱利下重者。白頭翁湯主之。第十二。四味○下利腹脹滿。身疼痛者。先温裏。乃攻表。温裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。第十三。四逆湯。用前第五方。桂枝湯五味○下利欲飲水者。以有熱也。白頭翁湯主之。第十四。用前第十二方。下利讝語者。有燥屎也。宜小承氣湯。第十五。三味○下利後更煩。按之心下濡者。虚煩也。宜梔子豉湯。第十六。二味○嘔而脉弱。小便利。身有微熱。見厥者。難治。四逆湯主之。第十七。用前第五方。前有嘔膿一證。○頭痛者。吴茱萸湯主之。第十八。四味○乾嘔吐涎沫。黄胡湯主之。第十九。七味下二有二證。厥陰之為病。消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐蚘。下之利不止。○厥陰中風。脉微浮。為欲愈。不浮。為未愈。○厥陰病。欲解時。從丑至卯上。○厥陰病。渴欲飲水者。少少與之。愈。○諸四逆厥者。不可下之。虚家亦

然○傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利○傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐為除中云食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後日脈之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦為九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者此為熱氣有餘必發癰膿也○傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今反能食此名除中必死○傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無

汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不痺傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤○傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈○凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷者是也○傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為藏厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘今病者靜而復時煩者此為藏寒蚘上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘厥者烏梅丸主之又主久利方一

成本手足厥冷者作手足厥冷

成本非蚘厥作非為蚘厥

成本時煩者作時煩入其膈作入膈

B535965

烏梅三百枚　細辛六兩　乾薑十兩　黃連十六兩
當歸四兩　附子六兩炮去皮　蜀椒四兩出汗　桂枝去皮六兩
人參六兩　黃蘗六兩

右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十丸日三服稍加至二十丸禁生冷滑物臭食等。

成本微厥作厥微

傷寒熱少微厥指一作頭寒嘿嘿不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胷脅煩滿者其後必便血。○病者手足厥冷言我不結胷小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也。○傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多者其病當異愈四日至七日熱不除者必便膿血。○傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故為進也。

傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死。○傷寒發熱下利至甚厥不止者死。○傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也。○傷寒五六日不結胷腹滿脈促復厥者不可下也此亡血下之死。○發熱而厥七日下利者為難治。○傷寒脈滑而厥者裏有熱白虎湯主之方二

成本此亡血作此至二

知母六兩　石膏一斤綿裹碎　甘草二兩炙　粳米六合

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。手足厥寒。脉細欲絕者。當歸四逆湯主之。方三。

當歸三兩　桂枝三兩　去皮　芍藥三兩　細辛三兩
甘草二兩　炙　通草二兩　大棗二十五枚　擘

右七味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。若其人內有久寒者。宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯方四。

當歸三兩　芍藥三兩　甘草二兩　炙　桂枝三兩　去皮　通草二兩　細辛三兩　大棗二十五枚　擘　生薑半斤　切

右九味。以水六升。清酒六升。和。煮取五升。去滓。溫分五服。一方水酒各四升

大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯主之。方五。

甘草二兩　炙　乾薑一兩半　附子一枚　生用　去皮　破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。若強人。可用大附子一枚。乾薑三兩。

大汗。若大下利。而厥冷者。四逆湯主之。六　用前第五方一

病人手足厥冷。脉乍緊者。邪結在胸中。心下滿而煩。飢不能食者。病在胸中。當須吐之。宜瓜蒂散。方七

瓜蒂　赤小豆

右二味。各等分。異擣篩合。內白中。更治之。別以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓。取汁。和散一錢七。

温頓服之不吐者。少少加得快吐乃止諸亡血虚家不可與瓜蒂散。

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯。却治其厥不爾水漬入胃。必作利也茯苓甘草湯方八。

茯苓 三兩　甘草 一兩 炙　生薑 三兩 切　桂枝 二兩 去皮

右四味。以水四升。煮取二升。去滓。分温三服。

傷寒六七日。大下後。寸脉沈而遲。手足厥逆。下部脉不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者。為難治。麻黄升麻湯主之方九

麻黄 二兩半　升麻 一兩　當歸 一兩　知母 十八銖　黄芩 十八銖　萎蕤 十八銖 一名菖蒲　芍藥 六銖　天門冬 六銖 去心

桂枝 六銖 去皮　茯苓 六銖　甘草 六銖 炙　石膏 六銖 碎綿裹　白朮 六銖　乾薑 六銖。

右十四味。以水一斗。先煮麻黄二兩沸。去上沫。内諸藥。煮取三升。去滓。分温三服。相去如炊三斗米頃。令盡汗出愈。

傷寒四五日。腹中痛。若轉氣下趣少腹者。此欲自利也。

傷寒本自寒下。醫復吐下之。寒格更逆吐下。若食入口即吐。乾薑黄芩黄連人參湯主之方十

乾薑　黄芩　黄連　人參 各三兩

右四味。以水六升。煮取二升。去滓。分温再服。

下利有微熱而渴。脉弱者。令自愈。〇下利脉數。有微熱

成本今作令

汗出今自愈設復緊為未解一云設脉〇下利手足厥冷無脉者灸之不温若脉不還反微喘者死少陰負趺陽者為順也〇下利寸脉反浮數尺中自濇者必清膿血〇下利清穀不可攻表汗出必脹滿〇下利脉沈弦者下重也脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖發熱不死〇下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虚故也〇下利脉數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也〇下利後脉絶手足厥冷晝夜不還者死〇傷寒下利日十餘行脉反實者死〇下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四

逆湯主之方十一

甘草二兩炙 附子大者一枚生去皮破八片 乾薑三兩强人可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服其脉即出者愈

熱利下重者白頭翁湯主之方十二

白頭翁二兩 黄蘗三兩 黄連三兩 秦皮三兩

右四味以水七升煮取二升去滓温服一升不愈更服一升

下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表温裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯十三方用前第五方

桂枝湯方

桂枝三兩　去皮　芍藥三兩　甘草二兩　炙　生薑三兩　切
大棗十二枚　擘

右五味以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。須臾歠熱稀粥一升。以助藥力。

熱故也。白頭翁湯主之。十四。用前第十下利欲飲水者。以有熱故也。宜小承氣湯方十五。一〇下利讝語者。有燥屎也。

大黄四兩　酒洗　枳實三枚　炙　厚朴二兩　去皮　炙

右三味。以水四升。煮取二升。去滓。分二服。初一服讝語止。若更衣者。停後服。不爾盡服之。

下利後更煩。按之心下濡者。為虛煩也。宜梔子豉湯方十六。

肥梔子十四箇　擘　香豉四合　綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子。取二升半。內豉。更煮取一升半。去滓。分再服。一服得吐。止後服。

嘔家有癰膿者。不可治嘔。膿盡自愈。〇嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥者。難治。四逆湯主之。十七。用前第五方

乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。方十八。

吳茱萸一升　洗　人參三兩　大棗十二枚　擘　生薑六兩　切

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。温服七合。日三服。

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。方十九。

柴胡八兩　人參三兩　甘草三兩　炙
生薑三兩　切　半夏半升　洗　大棗十二枚　擘

右七味以水一斗二升煮取六升。去滓。更煎取三升。温服一升。日三服。

傷寒大吐大下之極虚。復極汗者。其人外氣怫鬱。復與之水。以發其汗。因得噦。所以然者。胃中寒冷故也。傷寒噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之即愈。

（或本汗之字下有出學者之字下有以字）

傷寒論卷第六

傷寒論卷第七

辨霍亂病脉證并治第十三

辨陰陽易差後勞復病脉證并治第十四

辨不可發汗病脉證并治第十五

辨可發汗病脉證并治第十六

辨霍亂病脉證并治第十三（合六法。方六首。）

惡寒。脉微而利。利止。亡血也。四逆加人參湯主之

第一。（四味。前有二證。一利止。一惡寒。）

五苓散主之寒多不用水者。理中丸主之。第二。（五苓散。五味理中丸。四味。作加減法附）

霍亂頭痛。發熱身疼。熱多飲水者。

之第三。（五味。）

吐利止。身痛不休。宜桂枝湯小和

出發熱惡寒。四肢拘急。手足厥

冷者。四逆湯主之。第四。三味。○吐利小便利。大汗出下利清穀。內寒外熱。脉微欲絕。四逆湯主之。第五。用前一方。○吐已下斷。汗出而厥。四肢不解。脉微絕。通脉四逆加豬膽湯主之。第六。四味。勝穀氣一證。

問曰。病有霍亂者。何。荅曰。嘔吐而利。此名霍亂。

問曰。病發熱頭痛。身疼惡寒。吐利者。此屬何病。荅曰。此名霍亂。霍亂自吐下又利止。復更發熱也。

傷寒其脉微濇者。本是霍亂。今是傷寒。却四五日至陰經上轉入陰。必利。本嘔下利者。不可治也。欲似大便而反失氣。仍不利者。此屬陽明也。便必鞕十三日愈。所以然者。經盡故也。下利後當便鞕鞕則能食者愈。今反不能食到後經中頗能食。復過一經能食。過之一日當愈。不愈者。不屬陽明也。○惡寒脉微而復利。利止亡血也。四逆加人參湯主之。方一。

甘草二兩炙　附子一枚生去皮破八片　乾薑一兩半　人參一兩

右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。

霍亂頭痛發熱。身疼痛熱多欲飲水者。五苓散主之。寒多不用水者。理中丸主之。二。

五苓散方

豬苓去皮　白朮　茯苓各十八銖　桂枝半兩去皮　澤瀉一兩六銖

右五味。為散。更治之。白飲和服方寸七。日三服。多飲

煖水汗出愈。

理中丸方（下二有作湯加減法。）

人參　乾薑　甘草炙　白朮各三兩

右四味。擣篩。蜜和為丸。如雞子黃許大。以沸湯數合。和一丸。研碎。溫服之。日三四。夜二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。湯法。以四物依兩數。切用水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。若臍上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。吐多者。去朮加生薑三兩。下多者。還用朮。悸者。加茯苓二兩。渴欲得水者。加朮足前成四兩半。腹中痛者。加人參足前成四兩半。寒者。加乾薑足前成四兩半。腹滿者。去朮加附子一枚。服湯後。如食頃。飲熱粥一升許。微自溫。勿發揭衣被。

吐利止而身痛不休者。當消息和解其外。宜桂枝湯小和之。方三。

桂枝三兩　去皮　芍藥三兩　生薑三兩　甘草二兩　炙　大棗十二枚　擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。

吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷者。四逆湯主之。方四。

甘草二兩　炙　乾薑一兩半　附子一枚　生去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之。五。用前第四方一

厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽湯主之。方六。

甘草二兩炙　乾薑三兩强人可四兩　附子大者一枚生去皮破八片

右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。內豬膽汁。分溫再服。其脈即來無豬膽。以羊膽代之。

吐利發汗脈平小煩者。以新虛不勝穀氣故也。

辨陰陽易差後勞復病脈證并治第十四方六法

傷寒陰陽病。身重少腹裏急熱上衝胷頭重不欲舉眼中生花。花一作胗膝脛拘急者。燒褌散主之。第一。一味。

婦人中褌近隱處。取燒作灰。

枳實梔子湯主之。第二　三味下有宿食加大黃法附。

後更發熱小柴胡湯主之。第三。七味。

以下。有水氣者。牡蠣澤瀉散主之。第四。七味。

後喜唾久不了了胷上有寒當以九藥溫之。宜理中丸。第五。四味。

膏湯主之。第六。七味新差一證。

傷寒陰陽易之為病。其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胷頭重不欲舉眼中生花。花一作胗膝脛拘急者。燒褌散主之。方一。

婦人中褌近隱處。取燒作灰。

右一味。水服方寸七。日三服。小便即利。陰頭微腫。此為愈矣。婦人病取男子褌燒服。

太病差後。勞復者。枳實梔子湯主之。方二。

枳實三枚炙　梔子十四箇擘　豉一升綿裹。

右三味。以清漿水七升。空煑取四升。內枳實梔子。煑取二升。下豉更煑五六沸。去滓。溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者。內大黃。如博碁子五六枚。服之愈。○傷寒差以後。更發熱。小柴胡湯主之。脉浮者。以汗解之。脉沈實者。以下解之。方三。

柴胡八兩　人參二兩　黃芩二兩　甘草二兩炙　生薑二兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘。

右七味。以水一斗二升。煑取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

太病差後。從腰以下有水氣者。牡蠣澤瀉散主之。方四

牡蠣熬　澤瀉　商陸根熬　海藻洗去鹹　蜀漆煖水洗去腥　葶藶子熬　括樓根各等分

右七味。異擣。下篩為散。更於臼中治之。白飲和服方寸匕。日三服。小便利。止後服。

太病差後。喜唾。久不了了。胸上有寒。當以丸藥溫之。宜理中丸。方五。

人參　白朮　甘草炙　乾薑各三兩。

右四味。擣篩。蜜和為丸。如雞子黃許大。以沸湯數合

和一丸研碎溫服之。日三服。

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之方六

竹葉二把　石膏一斤　半夏半升洗　麥門冬一升去心
人參二兩　甘草二兩炙　粳米半升。

右七味。以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服。

病人脉已解而日暮微煩以病新差人强與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈。

辨不可發汗病脉證并治第十五　一法方本闕

汗家不可發汗發汗必恍惚心亂。小便已陰疼宜禹餘粮丸第一。方本闕前後有二十九病證。

夫以為疾病至急倉卒尋按要者難得。故重集諸可與不可方治。比之三陰三陽篇中。此易見也。又時有不止是三陽三陰出在諸可與不可中也。○少陰病脉細沈數病為在裏。不可發汗。○脉浮緊者。法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者。不可發汗。何以知然以榮氣不足。血少故也。○少陰病脉不可發汗。亡陽故也。○脉濡而弱。弱反在關濡反在巔微反在巔濡反在關微反在上。濇反在下。微則陽氣不足。濇則無血。陽氣反微。中風汗出而反躁煩濇則無血。厥而且寒。陽微發汗躁不得眠。○動氣在右不可發汗。發汗則劇而渴。心苦煩。飲即吐水。○動氣在左。不可發汗。發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤。○動氣在

上不可發汗發汗則氣上衝正在心端○動氣在下不可發汗發汗則無汗心中太煩骨節苦疼目連惡寒食則反吐穀不得前○咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絶手足厥冷欲得蹉臥不能自温○諸脉得數動微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾（二云小便難胃中乾）躁而煩其形相象根本異源○脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽連微為陰寒上實下虚意欲得温微弦為虚不可發汗發汗則寒慄不能自還○欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中飢煩睡時而發其形似瘧有寒無熱虚而寒慄欬而發汗蹉而苦滿腹中復堅○厥脉緊不可發汗發汗則聲

亂咽嗌舌萎聲不得前○諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死（二云譫言目晴亂者死）命將難全○太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便續自可一日二三度發脉微而惡寒者此陰陽俱虚不可更發汗也○太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者無陽也不可發汗○咽喉乾燥者不可發汗○亡血不可發汗發汗則寒慄而振○劒家不可發汗汗出必額上陷脉急緊直視不能眴不得眠（一日見）○汗家不可發汗發汗必恍惚心亂小便已陰疼宜禹餘粮丸二（方本闕）○淋家不可發汗發汗必便血○瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痓○下利不可發汗汗出必胸滿○欬而小

便利若失小便者。不可發汗。汗出則四肢厥逆冷。○傷寒一二日至四五日厥者。必發。熱前厥者。後必熱厥深者。熱亦深。厥微者。熱亦微。厥應下之。而反發汗者。必口傷爛赤。○傷寒脉弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。傷寒頭痛。翕翕發熱。形象中風。常微汗出。自嘔者。下之益煩。心懊憹如飢。發汗則致痙。身強難以伸屈。熏之則發黃。不得小便。又則發欬唾。○太陽與少陽併病。頭項強痛。或眩冒。時如結胸。心下痞鞕者。不可發汗。太陽病。發汗。因致痙。○少陰病。欲而下利。讝語者。此被火氣劫故也。小便必難。以強責少陰汗也。○少陰病。但厥無汗。而強發之。必動其血。未知從何道出。或從口鼻。或從目出者。是名下厥上竭。為難治。

辨可發汗病脉證并治第十六　合四十七法　方一十四首

太陽病。外證未解。脉浮弱。當以汗解。宜桂枝湯。第一。五味。前有二四一法。○脉浮而數者。可發汗。屬桂枝湯證。第二。用前第一方。一法用麻黃湯。○陽明病。脉遲。汗出多。微惡寒。表未解也。屬桂枝湯證。第三。用前有可汗二證。○病人煩熱。汗出解。又如瘧狀。脉浮虛者。當發汗。屬桂枝湯證。第四。用前第一方。○病常自汗出。此榮衛不和也。發汗則愈。屬桂枝湯證。第五。用前第一方。○病人藏無他病。時發熱。汗出此衛氣不和也。先其時發汗則愈。屬桂枝湯證。第六。用前第一方。○脉浮緊浮為風。緊為寒。風傷衛。寒傷榮

榮衛俱病。骨節煩疼。可發汗。宜麻黃湯。第七。四味。○太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。愈。外未解者。屬桂枝湯證。第八。用前第一方。○太陽病下之。微喘者。表未解。宜桂枝加厚朴杏子湯。第九。七味。○傷寒脉浮緊。不發汗。因衄者。屬麻黃湯證。第十。用前第七方。○陽明病。脉浮無汗而喘者。發汗愈。屬麻黃湯證。第十一。用前第七方。○太陽病。脉浮者。可發汗。屬桂枝湯證。第十二。用前第一方。○太陽病。脉浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日。表證在。當發汗。屬麻黃湯證。第十三。用前第七方。○脉浮者。病在表。可發汗。屬麻黃湯證。第十四。用前第七方。○一法用桂枝湯。○傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。續在表。屬桂枝湯證。第十五。用前第一方。○下利。腹脹滿。身疼痛者。先溫裏。乃攻表。宜四逆湯。攻表。宜桂枝湯。第十六。四逆湯二味。桂枝湯用前第一方。○下利後。身疼痛。清便自調者。急當救表。宜桂枝湯。第十七。用前第一方。○太陽病。頭痛發熱。汗出。惡風寒者。屬桂枝湯證。第十八。用前第一方。○太陽中風。陽浮陰弱。熱發。汗出。惡寒。惡風。鼻鳴。乾嘔者。屬桂枝湯證。第十九。用前第一方。○太陽病發熱汗出。此為榮弱衛強。屬桂枝湯證。第二十。用前第一方。○太陽病下之。氣上衝者。屬桂枝湯證。第二十一。用前第一方。○太陽病。服桂枝湯。反煩者。先刺風池風府。却與桂枝湯。愈。第二十二。

用前第一方〇燒針。被寒針處核起者。必發奔豚氣。與桂枝加桂湯第二十三。五味〇太陽病。項背強几几。汗出惡風者。宜桂枝加葛根湯。第二十四。七味。注見二卷中。〇太陽病。項背強几几。無汗。惡風者。屬葛根湯證。第二十五。用前方〇太陽陽明合病。自利。屬葛根湯證。第二十六。用前方。二云用後第二十八方〇太陽陽明合病。不利。但嘔者。屬葛根加半夏湯。第二十七。味〇太陽病。桂枝證。反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。喘而汗出。屬葛根黃芩黃連湯。第二十八。四味〇太陽病。頭痛發熱。身疼。惡風。無汗。屬麻黃湯證。第二十九。用前第七方〇太陽陽明合病。喘而胃滿者。不可下。屬麻黃湯證。第三十。用前二

第二方〇太陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼不汗而煩躁者。大青龍湯主之。第三十一。七味。下有〇陽明中風。脉弦浮大。短氣。腹滿。胃卜及心痛。鼻乾。不得汗。嗜臥。身黃。小便難。潮熱。外不解。過十日。脉浮者。與小柴胡湯。脉但浮。無餘證者。與麻黃湯。第三十二。小柴胡湯。七味。麻黃湯用前第七方〇太陽病。十日以去。脉浮細。嗜臥者。外解也。設胃滿痛者。與小柴胡湯。脉但浮。與麻黃湯。第三十三。並用前方〇傷寒。脉浮緩。身不疼。但重乍有輕時。無少陰證。可與大青龍湯發之。第三十四。用前第三十一方〇傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔。發熱而欬。或渴。或利。或嘔。或小便不利。或喘。小青龍湯主之。第三十五。八味。

加減法附○傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴屬小青龍湯證第二十六。用前方○傷寒五六日。中風往來寒熱。胷脅苦滿。不欲飲食。心煩喜嘔者。屬小柴胡湯證第三十七。用前第三方○傷寒四五日。身熱惡風頸項强。脅下滿。手足温而渴。屬小柴胡湯證第三十八。用前第三方○傷寒六七日。發熱微惡寒。支節煩疼。微嘔。心下支結。外證未去者。柴胡桂枝湯主之。第三十九味五○少陰病。得之二三日。麻黄附子甘草湯。微發汗。第四十。三味○脉浮。小便不利。微熱消渴者。與五苓散。第四十一。味五

大法。春夏宜發汗。○凡發汗。欲令手足俱周。時出。似微

成本此一段作出以益字作亦字誤

一時間許。益佳。不可令如水流離。若病不解。當重發汗。汗多者。必亡陽。陽虚不得重發汗也。○凡服湯發汗。中病便止。不必盡劑也。○凡云可發汗無湯者。九散亦可用。要以汗出為解。然不如湯隨證良驗。○太陽病外證未解。脉浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。方一。

桂枝三兩去皮　芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。啜粥。將息如初法。

脉浮而數者。可發汗。屬桂枝湯證二。用前第一方。一法用麻黄湯

陽明病。脉遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。屬桂

枝湯證三用前第一方○夫病脈浮大問病者言但便鞕耳設利者為大逆鞕為實汗出而解何以故脈浮當以汗解○傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火必讝語弱者發熱脈浮解之當汗出愈○病人煩熱汗出即解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈浮虛者當發汗屬桂枝湯證四用前第一方○病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈屬桂枝湯證五用前第一方○病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈屬桂枝湯證六用前第一方○脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮

衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯方七

麻黃三兩去節　桂枝二兩　甘草一兩炙　杏仁七十箇去皮尖

右四味以水八升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合溫覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝將息

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外未解者尚未可攻當先解其外屬桂枝湯證八用前第一方太陽病下之微喘者表未解也宜桂枝加厚朴杏子湯方九

桂枝去皮三兩　芍藥三兩　生薑三兩切　甘草二兩炙

厚朴二兩炙去皮　杏仁五十箇去皮尖　大棗十二枚擘

右七味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。

傷寒脉浮緊。不發汗。因致衄者。屬麻黃湯證。（用前第七方）

陽明病。脉浮無汗而喘者。發汗則愈。屬麻黃湯證。（用前第七方）

○太陽病。脉浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。當復發汗。服湯已。微除。其人發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。屬麻黃湯證。（用前第七方）

○脉浮者。病在表。可發汗。屬麻黃湯證。（用前第七方）

十四。一法用桂枝湯。

○傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。若頭痛者。必衄。屬桂枝湯證。（用前第十五方）

下利腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。（用前第十六方）

四逆湯方

甘草二兩　炙　乾薑一兩半　附子一枚生去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

○下利後。身疼痛。清便自調者。急當救表。宜桂枝湯發汗。（用前第一方）

○太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嚴嚴惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。屬桂枝湯證。（用前第一方）

○太陽病發熱。汗出。惡風。寒者。屬桂枝湯證。（用前第一方）

○太陽病。頭痛發熱。汗出。惡風。寒者。屬桂枝湯證。（用前第一方）

汗出者。此為榮弱衛強。故使汗出欲救邪風屬桂枝湯。

證二十。用前第一方

太陽病下之後其氣上衝者屬桂枝湯證二十一。用前第一方

○太陽病初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。二十二用前第一方

○太陽病。項背強几几。反汗出惡風者。宜桂枝加葛根湯。

桂枝 五兩 去皮

生薑 三兩 切

芍藥 二兩

甘草 二兩 炙

大棗 十二枚 擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加桂滿五兩。所以加桂者。以能泄奔豚氣也

葛根 四兩

麻黃 二兩 去節

桂枝 二兩

生薑 三兩

甘草 二兩 炙

芍藥 三兩

大棗 十二枚 擘

右七味。以水一斗。煮麻黃葛根。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘將息依桂枝法。注見第二卷中

太陽病項背強几几。無汗惡風者。屬葛根湯。證二十五用前第二方

○太陽與陽明合病。必自下利。不喘者。屬葛根湯。證二十六。用前第二方

○太陽與陽明合病。不下利。但喘者。宜葛根加半夏湯。方二十七。

葛根 四兩

半夏 半升 洗

大棗 十二枚 擘

桂枝 去皮 二兩

芍藥二兩　甘草二兩炙　麻黃三兩去節　生薑三兩
右八味。以水一斗。先煮葛根麻黃減二升。去上沫。內
諸藥煮取三升。去滓溫服一升。覆取微似汗

太陽病。桂枝證醫反下之。利遂不止。脉促者。表未解也
喘而汗出者。宜葛根黃芩黃連湯方二十八縱促作

葛根八兩　黃連三兩　黃芩三兩　甘草二兩炙、
右四味。以水八升。先煮葛根減二升。內諸藥。煮取二
升。去滓。分溫再服。

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘
者。屬麻黃湯。證二十九。用前第七方

而胷滿者。不可下。屬麻黃湯。證三十。用前第七方。

太陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。
大青龍湯主之。若脉微弱。汗出惡風者。不可服之。服之
則厥逆筋惕肉瞤。此為逆也。大青龍湯方三十一

麻黃六兩去節　桂枝二兩去皮　杏仁四十枚去皮尖　甘草二兩炙
石膏如雞子大碎　生薑三兩切　大棗十二枚擘、
右七味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。
煮取三升。溫服一升。覆取微似汗。汗出多者。溫粉粉
之。一服汗者。勿更服。若復服。汗出多者。亡陽。遂逆。作
虎惡風煩躁。不得眠也。
陽明中風。脉弦浮大而短。氣腹都滿。脅下及心痛。久按
之。氣不通。鼻乾。不得汗。嗜臥。一身及目悉黃。小便難有

潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解過十日脉續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻黄湯用二前第七方不溺腹滿加噦者不治三十二

小柴胡湯方

柴胡八兩　黄芩三兩　人參三兩　甘草三兩炙
生薑三兩切　半夏半升洗　大棗十二擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

太陽病十日以去脉浮而細嗜臥者外已解也設胷滿脇痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黄湯三十三並用前方

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者與

大青龍湯發之三十四用前第三〇方傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者宜小青龍湯方三十五

麻黄二兩去節　芍藥二兩　桂枝二兩去皮　甘草二兩炙
細辛二兩　五味子半升　半夏半升洗　乾薑三兩

右八味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮取三升去滓温服一升若渴去半夏加栝蔞根三兩若微利去麻黄加蕣花如雞子熟令赤色若噎去麻黄加附子一枚炮若小便不利少腹滿去麻黄加茯苓四兩若喘去麻黄加杏仁半升去皮尖且蕣花不治利麻黄主喘今此語反之疑非仲景意注見第二卷中

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也屬小青龍湯證三十六用前方〇中風往來寒熱傷寒五六日以後胷脅苦滿嘿嘿不欲飲食煩心喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者屬小柴胡湯證三十七用前第三十二方〇傷寒四五日身熱惡風頸項強胷下滿手足温而渴者屬小柴胡湯證三十八用前第三十二方〇傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之方三十九

柴胡四兩　黄芩一兩半　人參一兩半　桂枝一兩半去皮　生薑一兩半切　半夏二合半洗　芍藥一兩半　大棗六枚擘　甘草一兩炙

右九味以水六升煮取三升去滓温服一升日二服本云人參湯作如桂枝法加半夏柴胡黄芩如柴胡法今者人參作半劑

少陰病得之二三日麻黄附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗也四十

麻黄二兩去節　甘草二兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水七升先煮麻黄一二沸去上沫内諸藥煮取二升半去滓温服一升日三服

脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散利小便發汗四十一

猪苓十八銖　茯苓十八銖　白朮十八銖　澤瀉一兩六銖
桂枝半斤去皮
右五味。擣爲散。以白飲和服方寸匕。日三服。多飲煖水。汗出愈。

辨發汗後病脉證并治第十七

辨發汗後病脉證并治第十八　辨可吐第十九

太陽病發汗遂漏不止。惡風。小便難。四肢急難以屈伸者。屬桂枝加附子湯第一（六味前有〇太陽病服八味病證。）

桂枝湯煩不解。先刺風池風府。却與桂枝湯第二（五味）

服桂枝湯。汗出。脉洪大者。與桂枝湯。若形似瘧。一日再發者。屬桂枝二麻黃一湯第三（七味〇服桂枝湯汗出後煩渴不解。脉洪大者。屬白虎加人參湯第四（五味）

傷寒脉浮。自汗出。小便數。心煩。惡寒。脚攣急。與桂枝

攻表得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯厥愈
更作芍藥甘草湯其脚即伸若胃氣不和調胃承
氣湯若重發汗加燒針者與四逆湯第五甘草乾薑
草湯並二味調胃承氣湯四逆湯並三味〇太陽病脉浮緊無汗發熱身
疼八九日不解服湯已發煩必衄宜麻黃湯第六四味
傷寒發汗已解半日復煩脉浮數者屬桂枝湯證第
七用前第十二方〇發汗後身疼脉沈遲者屬桂枝加芍藥
生薑各一兩人參三兩新加湯第八六味〇發汗後不
可行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘
草石膏湯第九四味〇發汗過多其人叉手自冒心心
下悸欲得按者屬桂枝甘草湯第十二味〇發汗後腹

下悸欲作奔豚者屬茯苓桂枝甘草大棗湯第十一四味
甘爛水法附〇發汗後腹脹滿者屬厚朴生薑半夏甘草
人參湯第十二五味〇發汗後不惡寒但熱
芍藥甘草附子湯第十三三味〇發汗後不惡寒者虛也屬
者實也當和胃氣屬調胃承氣湯證第十四用前第〇
太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠若脉浮
小便不利渴者屬五苓散第十五五味〇發汗已脉浮
數煩渴者屬五苓散證第十六用前第十五方〇傷寒汗出
而渴者宜五苓散不渴者屬茯苓甘草湯第十七四味
太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤動欲擗地者屬真武湯第十八五味〇傷寒汗出解之後胃中

不和。心下痞。乾噫。腹中雷鳴下利者。屬生薑瀉心湯。
第十九（八味）○傷寒汗出不解。心中痞。嘔吐下利者。屬
大柴胡湯。第二十。（八味）○陽明病。自汗。若發其汗。小便
自利。雖鞕不可攻。須自欲大便。宜蜜煎。若土瓜根。豬
膽汁為導。第二十一。（蜜煎一味。豬膽方二味。）○太陽病。三日發
汗不解。蒸蒸發熱者。屬調胃承氣湯證。第二十二。（用前
第五方）○大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利厥逆
惡寒者。屬四逆湯證。第二十三。（用前第五方）○發汗後不
解。腹滿痛者。急下之宜大承氣湯。第二十四。（四味）○
發汗多。亡陽譫語者。不可下。與黙胡桂枝湯。和其榮
衛。後自愈。第二十五。（九味）

二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬
陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可
下。之為逆。如此可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫
鬱在表。當解之。熏之。若發汗不徹。不足言。陽氣怫鬱不
得越。當汗不汗。其人煩躁。不知痛處。乍在腹中。乍在四
肢。按之不可得。其人短氣但坐。以汗出不徹故也。更發
汗則愈。何以知汗出不徹。以脈濇故知也。○未持脈時。
病人叉手自冒心。師因教試令咳而不即咳者。此必兩
耳聾無聞也。所以然者。以重發汗虛故如此。○發汗後。
飲水多必喘。以水灌之。亦喘。○發汗後。水藥不得入口
為逆。若更發汗。必吐下不止。○陽明病。本自汗出醫更

重發汗。病已差。尚微煩。不了了者。必大便鞕故也。以亡津液。胃中乾燥。故令大便鞕。當問小便日幾行。若本小便日三四行。今日再行。故知大便不久出。今為小便數少。以津液。當還入胃中。故知不久必大便也。○發汗多。若重發汗者。亡其陽。讝語。脈短者死。脈自和者不死。○傷寒發汗已。身目為黃。所以然者。以寒濕在裏不解故也。以為不可下也。於寒濕中求之。○病人有寒復發汗。胃中冷。必吐蚘。○太陽病。發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。屬桂枝加附子湯方一

桂枝去皮三兩　芍藥三兩　大棗十二枚擘　甘草二兩炙　生薑三兩切　附子一枚炮

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加附子。

太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯。則愈。方二。

桂枝去皮三兩　芍藥三兩　生薑三兩切　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾。啜熱稀粥一升。以助藥力。

服桂枝湯。大汗出。脈洪大者。與桂枝湯。如前法。若形似瘧。一日再發者。汗出必解。屬桂枝二麻黃一湯方三

桂枝一兩十七銖去皮　麻黃一兩十六銖去節　生薑一兩一六銖　甘草一兩一六銖炙　杏仁七十個去皮尖　大棗四枚擘

右五味。以水七升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。本一方二升。

杏仁十六箇去皮尖　甘草一兩二銖炙　大棗五枚擘

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。本云桂枝湯二分。麻黃湯一分。合為二升。分再服。今合為一方。

桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脉洪大者。屬白虎加人參湯。方四

知母六兩　石膏一斤碎綿裹　甘草二兩炙　粳米六合

人參三兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。日三服。

傷寒脉浮自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝。欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。與四逆湯。五

甘草乾薑湯方

甘草四兩炙　乾薑二兩

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

芍藥甘草湯方

白芍藥四兩　甘草四兩炙

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

調胃承氣湯方

大黃四兩去皮清酒洗　甘草二兩炙　芒消半升

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。內芒消。更上微火煮令沸。少少溫服之。

四逆湯方

甘草二兩 炙 乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

太陽病。脉浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當復發汗。服湯已。微除其人發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。宜麻黃湯方大。

麻黃三兩 去節 桂枝二兩 去皮 甘草一兩 炙 杏仁七十箇 去皮尖

右四味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝湯法。

傷寒發汗已解。半日許復煩。脉浮數者。可更發汗。屬桂枝湯證七。用前第〇發汗二方。

加芍藥生薑各一兩。人參三兩新加湯方八。

桂枝三兩 去皮 芍藥四兩 生薑四兩 甘草二兩 炙 人參三兩 大棗十二枚擘

右六味。以水一斗二升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加芍藥生薑人參。

發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯方九。

麻黃四兩 去節 杏仁五十箇 去皮尖 甘草二兩 炙 石膏半斤 碎

右四味。以水七升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本云黃耳杯。

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸欲得按者。屬桂枝甘草湯方十。

桂枝二兩　去皮　甘草二兩　炙

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。

發汗後。其人臍下悸者。欲作奔豚。屬茯苓桂枝甘草大棗湯方十一。

茯苓半斤　桂枝四兩　去皮　甘草二兩　炙　大棗十五枚　擘

右四味。以甘爛水一斗。先煮茯苓。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

作甘爛水法。取水二斗。置大盆內。以杓揚之。水上有珠子五六千顆相逐。取用之。

發汗後。腹脹滿者。屬厚朴生薑半夏甘草人參湯方十二。

厚朴半斤　炙　生薑半斤　半夏半升　洗　甘草二兩　炙

人參一兩

右五味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

發汗。病不解。反惡寒者。虛故也。屬芍藥甘草附子湯方十三。

芍藥三兩　甘草三兩　附子一枚　炮去皮破六片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫三服。疑非仲景方。

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣屬調胃承氣湯證十四用前第五方一法用小承氣湯〇太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者屬五苓散方十五

猪苓十八銖去皮　澤瀉一兩六銖　白朮十八銖　茯苓十八銖　桂枝半兩去皮

右五味擣為散以白飲和服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈

發汗已脉浮數煩渴者屬五苓散證十六用前第十五方

傷寒汗出而渴者宜五苓散不渴者屬茯苓甘草湯方十七

茯苓二兩　桂枝二兩　甘草一兩炙　生薑一兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身膶動振振欲擗一作僻地者屬真武湯方十八

茯苓三兩　芍藥三兩　生薑三兩切　附子一枚炮去皮破八片　白朮二兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者屬生薑瀉心湯方十九

生薑四兩　甘草三兩炙　人參三兩　乾薑一兩　黃芩三兩　黃連一兩

黃芩三兩　半夏半升洗　黃連一兩　大棗十二枚擘、

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服生薑瀉心湯本云理中人參黃芩湯去桂枝术加黃連并瀉肝法

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者屬大柴胡湯方二十

柴胡半斤　枳實四枚炙　生薑五兩　黃芩三兩　芍藥三兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘、

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服一方加大黃二兩若不加恐不名大柴胡湯

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖鞕不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大豬膽汁皆可為導方二十一

食蜜七合

右一味於銅器內微火煎當須凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指許長二寸當熱時急作冷則鞕以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之疑非仲景意已試甚良

又大豬膽一枚瀉汁和少許法醋以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效

大陽病二百發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也屬調胃承

氣湯證二十二用前第〇夫汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者屬四逆湯證二十三用前第五一方發汗後不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯方二十四五一方

大黃四兩酒洗　厚朴半斤炙　枳實五枚炙　芒消三合

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃更煮取二升去滓內芒消更一二沸分再服得利者止後服發汗多亡陽讝語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈方二十五

柴胡四兩　桂枝一兩半去皮　黃芩一兩半　芍藥一兩半　生薑一兩半　大棗六擘　人參一兩半　半夏二合半洗　甘草一兩炙

右九味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服

大陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也若得病一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆〇大陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣者此為吐之內煩也少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胷中實不可下也若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之〇諸四逆厥者不可吐之虛家亦然

辨可吐第十九合一法 五證

大法春宜吐○凡用吐湯中病便止不必盡劑也○病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中亦鞕氣上撞咽喉不得息者此為有寒當吐之○一云此以內有久痰宜吐之○病胸上諸實二作寒胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利日十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之吐之利則止○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐者宜吐之○宿食在上脘者當吐之病手足逆冷脈乍緊結以客氣在胸中心下滿而煩欲食不能食者病在胸中當吐之

傷寒論卷第九

辨不可下病脈證并治第二十

辨可下病脈證并治第二十一 合四法 方六首

辨不可下病脈證并治第二十二

陽明病潮熱大便微鞕與大承氣湯若不大便六七日恐有燥屎與小承氣湯和之第一○大承氣四味小承氣三味前有

四十病證○傷寒中風反下之心下痞鬱復下之痞益甚屬甘草瀉心湯第二味○下利脈大者虛也以漐下之也設脈浮革腸鳴者屬當歸四逆湯第三七味有陽明病汗自出若發汗小便利津液內竭雖鞕不可攻須自大便宜蜜煎若土瓜根豬膽汁導之

成本陽微之下無則字

第四。蜜煎一味。猪膽汁二味。

脉濡而弱。弱反在關濡反在尺。薇反在上。濡反在下。微則陽氣不足。濡則無血。陽氣反微。中風汗出而反躁煩。濡則無血。厥而且寒。陽微則不可下。下之則心下痞鞕。動氣在右。不可下。下之則津液內竭。咽燥鼻乾。頭眩心悸也。〇動氣在左。不可下。下之則腹內拘急。食不下。動氣更劇。雖有身熱。臥則欲蜷。〇動氣在上。不可下。下之則掌握熱煩。身上浮冷。熱汗自泄。欲得水自治。〇動氣在下。不可下。下之則腹脹滿。卒起頭眩。食則下清穀。心下痞也。〇咽中閉塞。不可下。下之則上輕下重。水漿不下。臥則欲蜷。身急痛。下利日數十行。〇諸外實者。不可下。下之則發微熱亡。脉厥者。當發痙熱。〇諸虛者。不可下。下之則大渴求水者易愈。水者劇。〇脉濡而弱。弱反在關濡反在尺。薇反在上。微反在下。弦為陽運。微為陰寒。上實下虛。意欲得溫。微弦為虛。虛者不可下也。微則為效。效則吐。涎下之則效止而利因不休。利不休則胷中如蟲齧粥入。則出小便不利。兩脅拘急。喘息為難。頸背相引臂則不仁。極寒反汗出。身冷若冰。眼睛不慧。語言不休。而穀氣多入。此為除中。〔一云消中。〕口雖欲言。舌不得前。脉濡而弱。弱反在關濡反在尺。薇反在上。數反在下。浮為陽虛。數為無血。浮為虛。自汗出而惡寒。數為痛。振而寒慄。微弱在關。胷下為急。喘汗而

成本而寒作寒而

成本衛氣作胃氣

不得呼吸呼吸之中痛在於胷振寒相搏形如瘧狀醫反下之故令脉數發熱狂走見鬼心下為痞小便淋瀝少腹甚鞕小便則尿血也○脉濡而緊濡則衛氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫謂有大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵怏不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施汲水灌其身客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆之汗出而冒顛體惕而又振小便為微難寒氣因水發清穀不容閒嘔變反腸出顛倒不得安手足為微逆身冷而內煩遲欲從後救安可復追還○脉浮而大浮為氣實大為血虛虛為無陰孤陽獨下陰部著小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更實津液四射榮竭血盡乾煩而不眠血薄肉消而成暴一云黑液腎復以毒藥攻其胃此為重虛客陽去有期必下如汗泥而死○脉浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗而不可下也○趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便鞕氣噫而除何以言之本以數脉動脾其數先微故知脾氣不治大便鞕氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺

數潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如法病者則飢數脉不時則生惡瘡也○脉數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脉數者不可下下之必煩利不止○少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺中弱濇者復不可下之○脉浮大應發汗醫反下之此為大逆也○脉浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈汗少則便難脉遲尚未可攻○二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下下之為逆○結胸證脉浮大者不可下下共之即死

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下○太陽與少陽合病者心下鞕頸項強而眩者不可下○諸四逆厥者不可下之虛家亦然○病欲吐者不可下之為逆○病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞○病脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞○夫病陽多者熱下之則鞕○本虛攻其熱必嘔○無陽陰強大便鞕者下之必清穀腹滿○太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛下之必胸下結鞕○厥陰之為病消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐蚘下之利不止○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得

之手足寒脉弦遲者此胃中實不可下也○傷寒五六
日不結胃腹濡脉虛復厥者不可下此亡血下之死○
傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人憙之則喘不得
小便心腹滿下之則短氣小便難頭痛背强加温針則
衄○傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥者脉初
来大漸漸小更来漸大是其候也如此者惡寒甚者翕
翕汗出嗌中痛若熱多者目赤脉多晴不慧醫復發之
咽中則傷若復下之則兩目閉寒多便清穀熱多便膿
血若熏之則身發黄若熨之則咽燥若小便利者可救
之若小便難者為危殆○傷寒發熱口中勃勃氣出頭
痛目黄衄不可制貪水者必嘔惡水者厥若下之咽中
生瘡假令手足温者必下重便膿血頭痛目黄者若下
之則目閉貪水者若下之其脉必厥其聲嚶咽嗌塞若
發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食
大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩躁脉數實
不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也○
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下痞至四五日
雖能食以承氣湯少少與微和之令小安至六日與承
氣湯一升若不大便六七日小便少雖不大便但頭鞕
後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻
之○藏結無陽證不往来寒熱其人反靜舌上胎滑者
不可攻也○傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之○

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大便必復鞕而少也宜小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

大承氣湯方一

大黄四兩　厚朴八兩炙　枳實五枚炙　芒消三合

右四味以水一斗先煮二味取五升下大黄煮取二升去滓下芒消再煮一二沸分二服利則止後服

小承氣湯方

大黄四兩酒洗　厚朴二兩炙去皮　枳實三枚炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温再服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虚客氣上逆故使鞕也屬甘草瀉心湯方二

甘草四兩炙　黄芩三兩　乾薑三兩　大棗十二枚擘　半夏半升洗　黄連一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服有加人參見第四卷中

下利脉大者虚也以强下之故也設脉浮革因爾腸鳴

者屬當歸四逆湯方三

當歸三兩　桂枝去皮　細辛三兩　甘草二兩
通草二兩　芍藥三兩　大棗二十五
枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升半日三服陽明病身合色赤不可攻之必發熱色黃者小便不利也陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈○陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖鞕不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及豬膽汁皆可為導方四

食蜜七合

右一味於銅器內微火煎當須凝如飴狀攪之勿令

焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞕以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之疑非仲景意已試甚良又太豬膽一枚瀉汁和少許法醋以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效

辨可下病脉證并治第二十一　合四十四法方一十一首

陽明病汗多者急下之宜大柴胡湯第一○加大黃八朱一法用小承氣湯前別有二法○少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯第二○四味○少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜大承氣湯第三○用前第二方○少陰病下利清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣

成本差下有後字日字下無此字

湯。第四。大柴胡湯用前第一方。○下利。三部脉平。心下鞕者。急下之。宜大承氣湯用前第二方。○下利。脉遲滑者。內實也。利未止。當下之。宜大承氣湯。第五。用前第二方。○下利。脉反浮數。尺中自濇。必圊膿血也。以有宿食。當下之。宜大承氣湯。第六。用前第二方。○陽明少陽合病。下利。脉不負者。順也。負者。失也。互相剋賊。名曰負也。脉滑數者。有宿食。當下之。宜大承氣湯。第七。用前第二方。○寸脉浮大。反濇。尺中微而濇。故知有宿食。當下之。宜大承氣湯。第八。用前第二方。○下利不欲食者。以有宿食。當下之。宜大承氣湯。第九。用前第二方。○下利。差至其年月日時復發者。以病不盡。當下之。宜大承氣湯。第十。用前第二方。○病人腹中滿痛。此為實。當下之。宜大柴胡湯。第十一。大承氣用前第二方。大柴胡用前第一方。○下利。脉反滑。當有所去。下乃愈。宜大承氣湯。第十二。用前第二方。○腹滿不減。減不足言。當下之。宜大柴胡湯。

成本下之辭作下解之

胡用前第一方。大承氣用前第二方。○傷寒後脉沈沈者。內實也。下之解。宜大柴胡湯。第十四。用前第一方。○傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。實也。急下之。宜大承氣大柴胡湯。第十五。大柴胡用前第一方。大承氣用前第二方。○太陽病未解。脉陰陽俱停。先振慄汗出而解。陰脉微者。下之解。宜大柴胡湯。第十六。用前第一方。一法用調胃承氣湯。○脉雙弦而遲者。心下鞕。脉大而緊者。陽中有陰也。可下之。宜大承氣湯。第十七。用前第二方。○結胸者。項亦強。如柔痓狀。下之和。第十八。結胸門用大陷胸丸。○病人無

成本者字下有必字

表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之宜大柴胡湯第十九（用前第一方）○太陽病表證仍在脉微而沈不結胸發狂少腹滿小便利下血愈宜下之以抵當湯第二十（四味）○太陽病身黃脉沈結少腹鞕小便自利其人如狂血證諦屬抵當湯證第二十一（用前第二十方）○傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利為有血當下之宜抵當丸第二十二（四味）○陽明病但頭汗出小便不利身必發黃宜下之茵蔯蒿湯第二十三（三味）○陽明證其人喜忘必有畜血大便色黑宜抵當湯下之第二十四（用前第二十方）○汗出讝語以有燥屎遺經可下之宜大柴胡大承氣湯第二十五（大柴胡用前第一方大承氣用前第二方）○陽明病讝語潮熱不能食胃中有燥屎若能食但鞕耳屬大承氣湯證第二十七（用前第二方）○病人煩熱汗出如瘧狀日晡發熱脉實者可下之宜大柴胡大承氣湯第二十八（三味）○陽明證讝語者有燥屎也屬小承氣湯第二十九（用前第二方）○下利讝語者有燥屎也屬小承氣湯第三十（三味）○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下痞小便利屎定鞕宜大承氣湯第三十一（用前第二方）○云大柴胡湯○太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之屬十棗湯第三十二（三味）○太陽病不解熱結膀胱其人如狂宜桃核承氣湯第三十三（五味）○傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者屬茵蔯蒿湯證第三十四（用前第二十三方）○

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐下利者屬大柴胡湯證第三十三（用前第一方）○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者屬大柴胡湯證第三十四（用前第一方）○但結胸無大熱水結在胸脅也頭微汗出者屬大陷胸湯第三十五味○傷寒六七日結胸熱實脉沈緊心下痛者屬大陷胸湯證第三十六（用前第三十五方）○陽明病多汗津液外出胃中燥大便必鞕讝語屬小承氣湯證第三十七（用前第二十八方）○陽明病不吐下心煩者屬調胃承氣湯第三十八味○陽明病脉遲雖汗出不惡寒身必重腹滿而喘有潮熱大便鞕大承氣湯主之若汗出多微發熱惡寒桂枝湯主之熱不

潮腹大滿不通與小承氣湯三十九（大承氣湯用前第二方小承氣湯用前方）○陽明病讝語潮熱脉滑疾者屬小承氣湯證第四十（並用前方）○陽明病潮熱大便微鞕與大承氣湯若不大便六七日恐有燥屎與小承氣湯若不轉氣不可攻之後發熱大便復鞕者宜以小承氣湯和之第四十一（用前第二十八方）○二陽併病大陽證罷但發潮熱汗出大便難讝語者下之愈宜大承氣湯第四十二（用前第二十八方）○病人小便不利大便乍難易微熱喘冒者屬大承氣湯證第四十三（用前第二方）大下六七日不大便煩不解腹滿痛者屬大承氣湯證第四十四（用前第二方）○

大法。秋宜下。

凡可下者用湯勝丸散。中病便止。不必盡劑也。〇陽明病。發熱汗多者。急下之。宜大柴胡湯。方一。一法用小承氣湯

柴胡八兩　枳實四枚炙　芍藥三兩　大棗十二枚擘　半夏半升洗　生薑五兩　黃芩三兩

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。更煎取三升。溫服一升。日三服。一方云加大黃二兩。若不加。恐不成大柴胡湯。

少陰病。得之二三日。口燥咽乾者。急下之。宜大承氣湯。方二。

大黃四兩酒洗　厚朴半斤炙去皮　枳實五枚炙　芒消三合

右四味。以水一斗。先煮二物。取五升。內大黃。更煮取二升。去滓。內芒消。更上微火一兩沸。分溫再服。得下餘勿服。

少陰病六七日。腹滿不大便者。急下之。宜大承氣湯。三。用前第二方〇少陰病。下利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。可下之。宜大柴胡大承氣湯。四。用前第二方〇下利。三部脈皆平。按之心下鞕者。急下之。宜大承氣湯。五。用前第二方〇下利。脈遲而滑者。內實也。利未欲止。當下之。宜大承氣湯。六。用前第二方〇陽明少陽合病。必下利。其脈不負者。為順也。負者。失也。互相剋賊。名為負也。脈滑而數者。有宿食。當下之。宜大承氣湯。七。用前第二方〇問曰。人病有宿食。

何以別之。師曰。寸口脈浮而大按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食。當下之。宜大承氣湯。八。用前第一方〇下利不欲食者。以有宿食故也。當下之。宜大承氣湯。九。用前第二方〇下利差。至其年月日時復發者。以病不盡故也。當下之。宜大承氣湯。十。用前第一方〇病腹中滿痛者。此為實也。當下之。宜大承氣湯。十一。用前第二方〇下利。脈反滑。當有所去。下乃愈。宜大承氣湯。十二。用前第一方〇腹滿不減。減不足言。當下之。宜大柴胡湯。十三。用前第一方〇傷寒後脈沈沈者。內實也。下之解。宜大柴胡湯。十四。用前第二方〇傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此為實也。急下之。宜大承氣湯。十五。用前第一方〇大陽病未解。脈陰陽俱停。一作微必先振慄汗出而解。但陰脈微者。下之而解。宜大柴胡湯。十六。用前第二方〇結胸者。項亦強。如柔痓狀。下之則和。十七。用前第二方〇病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者。可下之。宜大柴胡湯。十八。用前第一方〇大陽病。六七日。表證仍在。脈微而沈。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當鞕滿。而小便自利者。下血乃愈。所以然者。以大陽隨經。瘀熱在裏故也。宜下之。以抵當湯。方

水蛭三十枚熬　桃仁二十枚去皮尖　蝱蟲三十枚去翅足熬
大黃三兩去皮破六片

右四味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。不下者更服。

太陽病。身黃。脉沈結。少腹鞕滿。小便不利者。為無血也。小便自利。其人如狂者。血證諦。屬抵當湯。證二十一。（尹前第二十方）○傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。為有血也。當下之。宜抵當丸方二十二。

水蛭熬　蝱蟲去翅足熬　桃仁二十五箇去皮尖　大黃三兩

右四味。搗篩。為四丸。以水一升。煮二丸。取七合服之。晬時當下血。若不下者更服。

陽明病。發熱汗出者。此為熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。以瘀熱在裏。身必發黃。宜下之。以茵蔯蒿湯方二十三。

茵蔯蒿六兩　梔子十四箇擘　大黃二兩破

右三味。以水一斗二升。先煮茵蔯。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

陽明證。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖鞕。大便反易。其色必黑。宜抵當湯下之。（二作飲）二十四。用前第二十方○汗出讝語者。以有燥屎在胃中。此為風也。須下者。過經乃可下之。下之若早者。語言必

亂以表虛裏實故也下之愈宜大柴胡湯二十五用前第一方○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者可下之宜大柴胡湯二十六用前第二方○陽明病讝語有潮熱反不能食者胃中有燥屎五六枚也若能食者但鞕耳屬大承氣湯證二十七用前第二方○下利讝語者有燥屎也屬小承氣湯方二十八。

大黃四兩　厚朴去皮炙二兩　枳實炙三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温再服若更衣者勿服之。

得病二三日脈弱無大陽柴胡證煩躁心下痞至四五日雖能食以承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不大便但初頭鞕後必溏此未定成鞕也攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大承氣湯二十九用前第二方。

太陽病中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也屬十棗湯方三十。

芫花熬赤　甘遂　大戟各等分

右三味各異擣篩料已合治之以水一升半煮大肥棗十枚取八合去棗內藥末強人服重一錢七分羸人半錢温服之平旦服若下少病不除者明日更服加

半錢得快下利後糜粥自養。

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外未解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯方三十一

桃仁 五十枚 去皮尖
芒消 二兩
大黃 四兩
甘草 二兩 炙
桂枝 二兩 去皮

右五味以水七升煮四物取二升半去滓內芒消更上火煎微沸先食溫服五合日三服當微利

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者屬茵蔯蒿湯證三十二用前第二〇傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者屬大柴胡湯證三十三用前第十三方

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者屬大柴胡湯證三十四用前第一方〇但結胸無大熱者以水結在胸脅也但頭微汗出者屬大陷胸湯方三十五

大黃 六兩
芒消 一升
甘遂末 一錢七

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消更煮一二沸內甘遂末溫服一升

傷寒六七日結胸熱實脉沈而緊心下痛按之石鞕者屬大陷胸湯證三十六用前第三〇陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則讝語屬小承氣湯證三十七用前第二十八方

陽明病不吐不下心煩者屬調胃承氣湯方三十八

大黃四兩 酒洗　甘草二兩 炙　芒消半升

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。內芒消。更上火微煮令沸。溫頓服之。

陽明病。脉遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。若汗出多微發熱惡寒者。外未解也。桂枝湯主之。其熱不潮未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令至大泄下。（大承氣湯。用前第二方。小承氣湯。用前第二十八方）

桂枝湯方

桂枝去皮　芍藥　生薑切各三兩　甘草二兩 炙　大棗十二枚 擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。服湯後。飲熱稀粥一升餘。以助藥力。取微似汗。

陽明病。潮熱。大便微鞕者。可與大承氣湯。不鞕者。不可與之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中。轉失氣者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉失氣者。此但初頭鞕後必溏。不可攻之。攻之必脹滿不能食也。欲飲水者。與水則噦。其後發熱者。大便必復鞕而少也。宜以小承氣湯和之。不轉失氣者。慎不可攻也。四十。（並用前方）陽明病。讝語。發潮熱。脉滑而疾者。小承氣湯主之。因與承氣湯一升。腹中轉氣者。更服一升。若

不轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也為難治不可更與承氣湯四十一用前第二十八方二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之則愈宜大承氣湯四十二用前第二方病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也屬大承氣湯證四十三用前第二方〇大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也屬大承氣湯證四十四用前第二方

傷寒論卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治第二十二合四十八法方二十

九百

太陽病八九日如瘧狀熱多寒少不嘔清便脉微緩惡寒者不可更發汗吐下也以其不得小汗身必痛屬桂枝麻黄各半湯第一七味前有二十二病證〇服桂枝湯或下之仍頭項強痛發熱無汗心下滿痛小便不利屬桂枝去桂加茯苓白朮湯第二六味〇太陽病發汗不解而下之脉浮者為在外宜桂枝湯第三五味〇下之後復發汗晝日煩躁夜安靜不嘔不渴無表證脉沈微者屬乾薑附子湯第四二味〇傷寒若吐下後

心下逆滿。氣上衝胷。起則頭眩。脉沈緊。發汗。則身為振搖者。屬茯苓桂枝白朮甘草湯。第五。四味〇發汗若下之病不解。煩躁者。屬茯苓四逆湯。第六。五味〇發汗吐下之後。虛煩不眠。若劇者。反覆顛倒。心中懊憹。屬梔子豉湯。少氣者。梔子甘草豉湯。嘔者。梔子生薑豉湯。第七。梔子豉湯。二味。梔子甘草豉湯。三味。梔子生薑豉湯。並三味〇發汗下之而煩熱。胷中窒者。屬梔子豉湯。證第八。用上方〇太陽病。過經十餘日。心下欲吐。胷中痛。大便溏。腹滿。微煩。先此時極吐下者。與調胃承氣湯。第九。三味〇太陽病。重發汗。復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡潮熱。心腹鞕滿。痛不可近者。屬大陷胷湯。第十。三味〇傷寒五六日。發汗復下之。胷脅滿。微結。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。寒熱心煩者。屬柴胡桂枝乾薑湯。第十一。七味〇傷寒發汗吐下解後。心下痞鞕。噫氣不除者。屬旋復代赭湯。第十二。七味〇傷寒下之。復發汗。心下痞惡寒。表未解也。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。第十三。桂枝湯。用前第三方。大黃瀉心湯。二味。吐下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。惡風。大渴。舌上燥而煩。欲飲水數升者。屬白虎加人參湯。第十四。五味〇傷寒吐下後。不解。不大便至十餘日。日晡發潮熱。不惡寒。如見鬼狀。劇者。不識人。循衣摸床。惕而不安。微喘直視。發熱讝語者。屬大承氣湯。第十五。四味

三陽合病。腹滿身重。口不仁。面垢。讝語遺尿。發汗。則讝語。下之則額上汗。手足逆冷。自汗出者。屬白虎湯第十六。四味○陽明病。脉浮緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。反惡熱。身重。若發汗。則讝語。加溫針。必怵惕煩躁。不眠。若下之則心中懊憹。舌上胎者。屬梔子豉湯證第十七。用前第七方○陽明病。下之心中懊憹而煩。胃中有燥屎可攻。宜大承氣湯第十八。用前第十五方○太陽病。吐下發汗後。微煩。小便數。大便鞕者。與小承氣湯和之第十九。三味○大汗。大下。而厥者。屬四逆湯第二十。三味○太陽病下之。氣上衝者。與桂枝湯第二十一。用前第三方○太陽病下之後。脉促胷滿者。屬桂枝去芍藥湯第二十二。四味○若微寒者。屬桂枝去芍藥加附子湯第二十三。五味○太陽桂枝證。反下之。利不止。脉促喘而汗出者。屬葛根黃芩黃連湯第二十四。四味○太陽病。下之微喘者。表未解也。屬桂枝加厚朴杏子湯第二十五。七味○傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。小便清者。知不在裏。當發汗。宜桂枝湯第二十六。用前第三方○傷寒五六日。下之後。身熱不去。心中結痛者。屬梔子豉湯證第二十七。用前第七方○傷寒下後。心煩腹滿。臥起不安。屬梔子厚朴湯第二十八。三味○傷寒以丸藥下之。身熱不去。微煩者。屬梔子乾薑湯第二十九。二味○傷寒下之續得下

利不止身疼痛急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯第三十（並用前方）太陽病過經十餘日二三下之柴胡證仍在與小柴胡湯嘿嘿不安欝欝微煩者可與大柴胡湯第三十一（八味）○傷寒十三日不解胷脇滿而嘿嘿日晡發潮熱微利潮熱者實也先服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之第三十二（八味）○傷寒十三日過經譫語有熱也若小便利當大便鞕而反利者知以丸藥下之也脉和者內實也屬調胃承氣湯證第三十三（用前第九方）○傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者屬柴胡加龍骨牡蠣湯第三十四（十二味）○火逆下之因燒針煩躁者屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯第三十五（四味）○太陽病脉浮而動數頭痛發熱盜汗惡寒反下之腸內拒痛短氣躁煩心中懊憹心下因鞕則為結胷屬大陷胷湯證第三十六（用前方）○傷寒五六日嘿嘿而發熱者小柴胡湯證具以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心滿而鞕痛者此為結胷大陷胷湯主之但滿而不痛者為痞屬半夏瀉心湯第三十七（七味）○本以下之故心下痞其人渴而口燥煩小便不利者屬五苓散第三十八（五味）○傷寒中風下之其人下利日數十行腹中雷鳴心下痞鞕乾嘿心煩復

下之其痞益甚屬甘草瀉心湯第三十九。六十〇傷寒服藥下利不止心下痞鞕復下之利不止與理中利益甚屬赤石脂禹餘粮湯第四十。二味。〇太陽病外證未除數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解屬桂枝人參湯第四十一。五味〇下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者屬麻黄杏子甘草石膏湯。第四十二。四味〇陽明病下之外有熱手足温心中懊憹飢不能食但頭汗出屬梔子豉湯證第四十三。用前第七方〇傷寒吐後腹脹滿者屬調胃承氣湯證第四十四。用前第九方〇病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數可下之假令已下脉數不解不大便者有瘀血屬抵當湯第四十五。四味〇本太陽病反下之腹滿痛屬太陰也屬桂枝加芍藥湯第四十六。五味〇傷寒六七日大下之後脉沈而遲手足厥下部脉不至喉咽不利唾膿血者屬麻黄升麻湯第四十七。十四味〇傷寒本自寒下復吐下之食入口即吐屬乾薑黄芩黄連人參湯第四十八。四味

師曰病人脉微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒甚熱欲著衣今反盛熱欲著衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虚冷以陽氣内微不

能勝冷故欲著複衣○十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲濇故知亡血也○十口脉浮大而醫反下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出冰得寒氣必相搏其人則龖○太陽病三日已發汗若吐若温針仍不解者此為壞病桂枝不中與之也觀其脉證知犯何逆隨證治之○脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尽中脉微此裏虛須表裏實津液和便自汗出愈○凡病若發汗若吐若下若亡血無津液陰陽脉自和者必自愈○大下之後復發汗小便

不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈○下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外俱虛故也本發汗而復下之此為逆若先下之治不為逆本先下之而反汗之為逆若先下之治不為逆○太陽病先下而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也得表和然後復下之○得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足温醫二三下之不能食而胷下滿痛面目及身黃頸項强小便難者與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡不中與也食穀者噦○太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脉微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胷未

止者四日復下之此作協熱利也○太陽病下之其脈促（一作不結）縱結胸者此為欲解也脈浮者必結胸脈緊者必咽痛脈弦者必兩脅拘急脈細數者頭痛未止脈沈緊者必欲嘔脈沈滑者協熱利脈浮滑者必下血○太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩○脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳○傷寒吐下發汗後虛煩脈甚微八九日心下痞鞕脅下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿陽明病能食下之不解者其人不能食若攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦○陽明病脈遲食難用飽飽則發煩頭

眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也○夫病陽多者熱下之則鞕汗多極發其汗亦鞕○太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也○太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕○傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也○吐利發汗後脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足温者易愈○太陽病得之八

九日。如瘧狀。發熱惡寒。多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脉微緩者。為欲愈也。脉微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出。身必癢。屬桂枝麻黄各半湯。方一

桂枝 一兩十六銖　芍藥 一兩　生薑 一兩切　甘草 一兩炙
大棗 四枚擘　杏仁 二十四箇湯浸去皮尖及兩人者
麻黄 一兩去節

右七味。以水五升。先煮麻黄一二沸。去上沫。内諸藥。煮取一升八合。去滓。温服六合。本云桂枝湯三合。併為六合。頃之。不解。更服桂枝湯。或下之。仍頭項强痛。翕翕發熱。無汗。心下滿微痛。小便不利者。屬桂枝去桂加茯苓白朮湯。方二

芍藥 三兩　甘草 二兩炙　生薑 三兩切　白朮 三兩
茯苓 三兩　大棗 十二枚擘

右六味。以水八升。煮取三升。去滓。温服一升。小便利則愈。本云桂枝湯。今去桂枝加茯苓白朮

太陽病。先發汗不解。而下之。脉浮者不愈。浮為在外。而反下之。故令不愈。今脉浮故在外。當須解外則愈。宜桂枝湯。方三

桂枝 三兩去皮　芍藥 三兩　生薑 三兩切　甘草 二兩炙
大棗 十二枚擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。須臾啜

熟稀粥一升。以助藥力。取汗。

下之後復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脉沈微。身無大熱者。屬乾薑附子湯。方四。

乾薑一兩　附子一枚生用去皮破八片

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。

傷寒若吐若下後。心下逆滿。氣上衝胷起則頭眩。脉沈緊。發汗則動經。身為振振搖者。屬茯苓桂枝白朮甘草湯。方五

茯苓四兩　桂枝三兩去皮　白朮二兩　甘草二兩炙

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。分温三服。

發汗若下之後。病仍不解。煩躁者。屬茯苓四逆湯。方六

茯苓四兩　人參一兩　附子一枚生用去皮破八片　甘草二兩炙　乾薑一兩半

右五味。以水五升。煮取二升。去滓。温服七合。日二服。

發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。屬梔子豉湯。若少氣者。梔子甘草豉湯。若嘔者。梔子生薑豉湯。七

肥梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。內豉。煮取二升半。去滓。分為二服。温進一服。得吐者。止後服。

梔子甘草豉湯方

肥梔子十四箇擘　甘草二兩炙　香豉四合綿裹

右三味。以水四升。先煮二味。取二升半。內梔子。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者。止後服。

梔子生薑豉湯方

肥梔子十四箇擘　生薑五兩切　香豉四合綿裹

右三味。以水四升。先煮二味。取二升半。內豉。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者。止後服。

發汗若下之而煩熱。胸中窒者。屬梔子豉湯。證八物方前

太陽病。過經十餘日。心下溫溫。欲吐。而胸中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時。極吐下者。與調胃承氣湯。若不爾者。不可與。但欲嘔。胸中痛。微溏者。此非柴胡湯證。以嘔故知極吐下也。調胃承氣湯方九。

大黃四兩酒洗　甘草二兩炙　芒消半升

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。內芒消。更上火令沸。頓服之。

太陽病。重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹。鞕滿而痛。不可近者。屬大陷胸湯方十。

大黃六兩去皮酒洗　芒消一升　甘遂末一錢匕

右三味。以水六升。煮大黃。取二升。去滓。內芒消。煮兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利。止後服。

傷寒五六日已發汗。而復下之。胸滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此為未解也。屬

柴胡桂枝乾薑湯方十一。○

柴胡半斤　桂枝三兩去皮　乾薑二兩　栝樓根四兩
黃芩三兩　甘草二兩炙　牡蠣二兩熬

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。後汗出便愈。

傷寒發汗。若吐若下。解後。心下痞鞕。噫氣不除者。屬旋復代赭湯方十二。

旋復花三兩　人參二兩　生薑五兩　代赭一兩
甘草三兩炙　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

傷寒大下之。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻。攻痞當先解表。表解乃攻痞。解表宜桂枝湯。用前方。攻痞宜大黃黃連瀉心湯方十三。

大黃二兩酒洗　黃連一兩

右二味。以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分溫再服。（有黃芩見第四卷中。）

傷寒若吐下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。屬白虎加人參湯方十四。

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙
粳米六合　人參三兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。日三服。傷寒若吐若下後。不解。不大便五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸牀。惕而不安。微喘直視。脈弦者生。濇者死。微者但發熱讝語者。屬大承氣湯方十五

大黃四兩去皮酒洗　厚朴半斤炙　枳實五枚炙　芒消三合

右四味。以水一斗。先煮二味。取五升。內大黃。煮取二升。去滓。內芒消。更煮令一沸。分溫再服。得利者。止後服。三陽合病。腹滿身重難以轉側。口不仁。面垢。又作枯。一云向經。讝語遺尿。發汗則讝語。下之則額上生汗。手足逆冷。自汗出者。屬白虎湯。十六。

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。日三服。陽明病。脉浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則躁。心憒憒而反讝語。若加溫針。必怵惕煩躁不得眠。若下之則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。屬梔子豉湯證十七。用前第七方

陽明病。下之。心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。可攻。腹微滿。初頭鞕。後必溏。不可攻之。若有燥屎者。宜大承氣湯。第十八。用前第十五方

太陽病。若吐若下若發汗後。微煩。小便數。大便因鞕者。與小承氣湯和之。愈。方十九。

大黃四兩酒洗　厚朴二兩炙　枳實三枚

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分温二服。〇大汗。若大下而厥冷者。屬四逆湯方二十。〇

甘草二兩 炙　乾薑一兩　附子一枚生用去皮破八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分温再服。强人可大附子一枚。乾薑四兩。〇

太陽病。下之後。其氣上衝者。可與桂枝湯。若不上衝者。不得與之。二十一。用前第〇太陽病下之後。脉促。胸滿者。屬桂枝去芍藥湯方二十二。促一作縱

桂枝三兩 去皮　甘草二兩 炙　生薑三兩 切　大棗十二枚擘

右四味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。本云桂枝湯。今去芍藥。〇

若微寒者。屬桂枝去芍藥加附子湯方二十三。

桂枝三兩 去皮　甘草二兩 炙　生薑三兩 切　大棗十二枚擘

附子一枚 炮

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。本云桂枝湯。今去芍藥加附子。〇

太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。喘而汗出者。屬葛根黄芩黄連湯方二十四。促二作縱

葛根半斤　甘草二兩 炙　黄芩三兩　黄連三兩

右四味。以水八升。先煮葛根。減二升。内諸藥。煮取二升。去滓。温分再服。

太陽病。下之微喘者。表未解故也。屬桂枝加厚朴杏子

湯方二十五。

桂枝三兩　去皮　芍藥三兩　生薑三兩　切　甘草二兩　炙

厚朴二兩　去皮　炙　大棗十二　枚　壁　杏仁五十箇　去皮尖

右七味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升

傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。若頭痛者。必衄。宜桂枝湯。二十六。用前第〇傷寒五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。屬梔子豉湯。證二十七。用前第〇傷寒下後。心煩腹滿。臥起不安者。屬梔子厚朴湯。方二十八。

梔子十四　枚　壁　厚朴四兩　炙　枳實四　筒　水浸　炙令赤

右三味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。温進一服。得吐者。止後服。

傷寒醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩者。屬梔子乾薑湯。方二十九。

梔子十四　箇　擘　乾薑二兩

右二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。一服得吐者。止後服。

凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與服之。

傷寒醫下之。續得下利清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。三十。並用前方〇大陽病過經十餘日。反二三下

之。後四五日。柴胡證仍在者。先與小柴胡。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。為未解也。可與大柴胡湯。下之則愈。方三十一。

柴胡半斤　黃芩三兩　芍藥三兩　半夏洗半升
生薑五兩　枳實四枚炙　大棗十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。一方加大黃二兩。若不加。恐不為大柴胡湯。

傷寒十三日不解。胸脅滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此本柴胡下之不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。此非其治也。潮熱者實也。先服小柴胡湯以解外。後

柴胡加芒消湯主之。方三十二。

柴胡二兩十銖　黃芩一兩　人參一兩　甘草一兩炙
生薑一兩　半夏二十銖舊五枚洗　大棗四枚擘　芒消二兩

右八味。以水四升。煮取一升。去滓。內芒消。更煮微沸。溫分再服。不解更作。

傷寒十三日。過經譫語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當鞕。而反下利。脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此為內實也。調胃承氣湯。證三十三。用前第〇傷寒八九日方。下之。胷滿煩驚。小便不利。譫語。一身盡重。不可轉側者。

柴胡加龍骨牡蠣湯。方三十四。

柴胡四兩　龍骨一兩半　黃芩一兩半　生薑一兩半切
鉛丹一兩半　人參一兩　桂枝一兩半去皮　茯苓一兩半
半夏二合半洗　大黃二兩　牡蠣一兩熬　大棗六枚擘

右十二味。以水八升。煮取四升。內大黃。切如碁子。更煮一兩沸。去滓。溫服一升。本云柴胡湯。今加龍骨等。火逆下之。因燒鍼煩躁者。屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯。方三十五。

桂枝一兩去皮　甘草二兩炙　龍骨二兩　牡蠣二兩熬

右四味。以水五升。煮取二升半。去滓。溫服八合。日三服。太陽病。脉浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。（一云頭痛即眩）胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞕。則為結胸。大陷胸湯證。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃。二十六。用前第〇傷寒五六日。十方。

嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不為逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而鞕痛者。此為結胸也。大陷胸湯主之。用前方。但滿而不痛者。此為痞。柴胡不中與之。屬半夏瀉心湯。方三十七。

半夏半升洗　黃芩三兩　乾薑三兩　人參三兩
甘草三兩炙　黃連一兩　大棗十二枚擘

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。

本以下之。故心下痞與瀉心湯。痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利者。屬五苓散方三十八。一云。忌心之。一日乃愈。

猪苓十八銖　去黑皮
白朮十八銖
桂心半兩　去皮
茯苓十八銖
澤瀉一兩　六銖

右五味。為散。白飲和服方寸七。日三服。多飲煖水。汗出愈。

傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞕而滿。乾嘔心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞕也。屬甘草瀉心湯方三十九。

甘草四兩　多有人參見四卷中
大棗十二枚　擘
黃芩三兩
乾薑三兩
半夏半升　洗
黃連一兩

右六味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。有人參。

傷寒服湯藥。下利不止。心下痞鞕。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中理中焦。此利在下焦。屬赤石脂禹餘粮湯方四十。

赤石脂一斤　碎
太一禹餘粮一斤　碎

右二味。以水六升。煮取二升。去滓。分温三服。

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞕表裏不解者屬桂枝人參湯方四十一

桂枝四兩別切去皮　甘草四兩炙　白朮三兩　人參三兩　乾薑三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者屬麻黃杏子甘草石膏湯方四十二

麻黃四兩去節　杏仁五十箇去皮尖　甘草二兩炙　石膏半斤碎

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升本云黃耳杯

陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者屬梔子豉湯證四十三用前第七法方

傷寒吐後腹脹滿者屬調胃承氣湯證四十四用前第九方

病人無表裏證發熱七八日脈雖浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血屬抵當湯方四十五

大黃三兩酒洗　虻蟲去翅足三十箇熬　桃仁二十枚去皮尖　水蛭三十枚熬

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下更服

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也屬桂

枝加芍藥湯方四十六

桂枝三兩去皮　芍藥六兩　甘草二兩炙
大棗十二枚擘　生薑三兩切

右五味以水七升煮取三升去滓分温三服本云桂枝湯今加芍藥〇

傷寒六七日大下十脉沈而遲手足厥逆下部脉不至喉咽不利唾膿血泄利不止者為難治屬麻黄升麻湯方四十七〇

麻黄二兩半去節　升麻一兩六銖　當歸一兩六銖
知母十八銖　黄芩十八銖　菱蕤十八銖作昌蒲一
芍藥六銖　天門冬六銖去心　桂枝六銖去皮

茯苓六銖　甘草六銖炙　石膏六銖綿裹碎
白朮六銖　乾薑六銖

右十四味以水一斗先煮麻黄一兩沸去上沫内諸藥煮取三升去滓分温三服相去如次二斗米頃令盡汗出愈〇

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐屬乾薑黄芩黄連人參湯方四十八〇

乾薑　黄連　人參各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服〇

夫以傷寒者百病之長也上工之所
重下工之所畏也蓋自仲景著傷寒
論以來生命之安危仁民之樞要係
焉可謂偉矣且成氏所註釋者徧行
于世而林氏所校正者未徧于世矣
茲我師立伯先生採是書而俾刋諸
梓而以與天下之人共之乃命予使

加筆點予雖固陋聊加筆點以備講習云爾

洛下岡鳴玄提書

寛文八年戊申五月吉日

姉小路通堀川東江入町

中川茂兵衛板行

加筆點予雖固陋聊加筆點以備講習云爾

洛下岡鳴玄提書

寛文八年戊申五月吉日

姉小路通堀川東江入町
中川茂兵衛板行