

鹽山張錫純壽甫著

醫學衷中參西錄

前三期合編

上冊

民國四年六月安海濟生館

藐焉俯仰地天中遭際嶙

峒百慮空獨有拳拳

消未盡同胞疴

癢繫私衷

慘淡經營

幾度年此心非

不愛逃禪爲求後世

堪持贈長作千秋未了緣

自題



張錫純壽甫肖像

## 張序

吾友壽甫張君宿學士也自幼讀書即不落恒蹊長而好學篤志近思一字一句不容放過於六經類多深造而尤邃於易曾衍有圖說以發前人未發之奧夫易由四聖以成而吾友探賸索隱別具神奇非大聰明曷克語此嘗見以文會友談妙理揭精蘊舉座傾聽共相首肯知其得力者深也方今大重算學天元代數諸書耐人尋味實費人研究而吾友一見卽解因著書立說教課生徒多所成就凡此固天資高亦由學力到也名爲實之賓吾友能勵躬行尙節義立廉隅修於己聞於人雖身爲布衣而於流俗之披靡殊有整頓誠者物之終始不誠無物吾友天性諒直無稍涉虛浮忠信爲本實事求是此其所以進德即其所以立業也今夫人有文固貴有本能知尤貴能行博雅弘通之士當持論剴切非不娓娓動人及徵諸日用之地宣於口者不能體諸身以視吾友之本末交修知行並進豈可同日語哉其誦讀餘暇兼及醫學於中西方書搜閱極博而生平得力實在乎本經內經恒因經文一二語悟出無限法門故其臨證手到病除卽病勢重危羣醫束手一經診視立能回春然此特吾友之緒餘初非以此見長也迨夫閱歷日久其經驗良方

不忍拋棄爰成斯編質諸同好志在濟人情殷覺世指迷津普慈航一片婆心喚醒夢夢是不獨收效於當時尤將流澤於後世也雖然天性發爲文章事功根於學問吾願覽斯編者不以醫視醫而以經術視醫審其製方之精義用藥之要着化裁通變方智圓神於以見醫學精華之流露即以見六經精華之流露也而吾友之深於經學彰彰矣乃知道明德立之儒不爲良相必爲良醫利用厚生之道與起死回生之能其事異其理同也宣統二年季春愚弟張慎敬亭氏敬序

袁序

夫古者神農本經實爲藥性之真詮軒轅內經窮盡陰陽之奧旨於以歎聖神首出不但利濟一時實能利濟萬世也至漢張仲景得伊聖湯液經更上溯本經內經之精義著傷寒金匱兩書醫學於以大備後世論醫學者推爲正宗但本經內經醫者多因其文字艱深義蘊難窺束閣不觀傷寒論及金匱醫者又多畏疑其方而不敢輕試雖晉唐迄今諸名家立論咸遵古訓而闡發本經內經及傷寒金匱諸書仍多餘蘊至獨出已見更能發前人所未發則行世方書中誠不易覩也吾友張壽甫君鹽山博雅士素有窮經工夫於



本經內經及仲景以後諸名醫著作莫不探索其精奧又兼通西人醫學及西人化學之理亦恆運用於方藥之中是以生平臨證疏方活人無算於內傷外感諸要證無不應手輒效而其屢試屢驗之方久而恐其遺失輒於方後各加詮解並附載緊要醫案緝爲八卷名曰醫學衷中參西錄實能闡發前人所未發更能融匯中西爲一致見者爭相傳鈔予於春杪客京師適見鈔本讀閱一過驚爲當時醫學中有一無二之著作函勸於內務部呈請立案公諸世界君韙予言內務部果批准有著作權而君仍未敢自信也於夏季正自錄真本並細加研思夜以繼日心力疲甚不覺睡去夢升講臺對大衆演說醫理忽有人捧一冠若南海大士所戴蓮花冠形爲加於首醒後恍悟曰此中殆有神靈欲我速成此書以普濟羣生也遂覺精神奮發頓忘其勞而付梓之意亦決並委予以參訂予雖不習醫然十年作吏於民間疾苦時痼瘕在抱頗志同而道合焉古人云上醫醫國又云爲醫等於爲相君之大著欽佩已深故樂得而贊成之

民國六年季秋奉天桓仁愚弟袁澍滋霖普序

# 蘇序

先王以不忍人之心行不忍人之政醫書之作其具不忍人之心乎生命至重也辨證不清投劑多誤時有因此而戕賊人者斯道也非寢饋於古今中外各家諸書悉心抉擇獨闢機緘不足以問世非洞明陰陽氣運虛實表裏之理盡人合天如見肺肝不足以臨證以故神農黃帝而後以醫學著者若扁鵲若倉公若張仲景若王叔和僅問世一出豈彼蒼有所祕惜歟誠以醫理精微空談易實施良難也若本其生平之著作施用於臨證之際而皆能得心應手者誠曠世不一覩也僕於往歲有志醫學涉獵羣書未竟其事因函學發明太陽不動地球繞轉之說風行一世詳究其理疑義叢生因疑生悟由是研究天地學歷十餘寒暑未暇兼顧醫學而傾慕之心仍未有已也民國五年秋以自製天地模型入都呈准 大部適有鹽山張壽甫先生函寄醫書原稿八卷簽題醫學衷中參西錄且云拙作本懷救世之心深恐已誤誤人請校正焉翻閱數過觀其審證精詳立方確當究藥性之寬猛以老幼強弱爲標準不拘拘成法不趨於險路誠所謂獨闢機緘如見肺肝者也以之問世臨證必不脛而走但僕於醫學雖知津涯何足負校正之責必質諸

高明始不負壽甫先生濟世之苦心遂於民國六年春與同社友張君鍾山姜君指歐代爲呈部註冊立案回奉後即乞醫學研究會正副會長高振鐸王松閣兩先生暨精於醫術諸同人詳加校正不惟人人稱絕凡遵其方施治者莫不立起沉疴是眞能振興醫學大有進化者矣於是遂與同社友集資代付剞劂以公諸同好俾百萬蒼生羣躋壽域則於不忍人之心庶乎近焉書成後爰書數行於編首以誌巔末

中華民國七年三月九日蘇中宣明陽氏序於瀋陽天地新學社

### 自序

人生有大願力而後有大建樹一介寒儒伏處草茅無所謂建樹也而其願力固不可沒也老安友信少懷孔子之願力也當令一切衆生皆成佛如來之願力也醫雖小道實濟世活人之一端故學醫者爲身家溫飽計則願力小爲濟世活人計則願力大而此願力之在錫純又非僅一身之願力實乃祖訓斯紹也錫純原籍山東諸城自前明遷居直隸鹽山邊務里累世業儒先祖友三公繼修家乘垂訓來茲謂凡後世子孫讀書之外可以學醫蓋即范文正公不爲良相必爲良醫之意也錫純幼時從先嚴丹亭公讀書嘗述斯

言以教錫純及稍長又授以方書且爲指示大意誦讀之暇遊藝於此爲益良多且又遵祖訓也特當時方習舉子業未能大致力於斯耳後兩試秋闈不第雖在壯年而淡於進取遂廣求方書遠自農軒近至國朝著述諸家約共搜閱百餘種知本經與內經詒之開天闢地之聖神爲醫學之鼻祖實卽爲醫學之淵海也迨漢季張仲景出著傷寒金匱兩書爲本經內經之功臣而晉之王叔和唐之孫思邈王肅宋之成無已明季之喻嘉言又爲仲景之功臣國朝醫學昌明人才輩出若張志聰徐大椿黃元御陳念祖諸賢莫不率由仲景上溯本經內經之淵源故其所著醫書皆爲醫學正規特是自晉唐迄今諸家著述非不美備然皆斤斤以傳舊爲務初未嘗日新月異俾吾中華醫學漸有進步夫事貴師古者非以古人之規矩準繩限我也惟藉以淪我性靈益我神智迨至性靈神智洋溢活潑又貴舉古人之規矩準繩而擴充之變化之引伸觸長之使古人可作應歎爲後生可畏凡天下事皆宜然而醫學何獨不然哉錫純存此意念以孜孜研究醫學者有年偶爲人疏方輒能得心應手挽回沉疴時先慈劉太君在堂錫純恐溫清有缺不敢輕應人延請適有以急證相求者錫純造次未遑應先慈謂錫純曰病家盼醫如溺水求援汝

果能治宜急往救之然臨證時須多加小心慎勿鹵莽誤人

錫純

唯唯受教自此臨證者

幾無虛日至今十餘年矣今匯集十餘年經驗之方其屢試屢效者適得大衍之倍數方後綴以詮解與緊要醫案又兼採西人之說與方中義理相發明緝爲八卷名之曰醫學衷中參西錄有客適至翻閱一過而問曰觀子之書多能發前人所未發於醫學誠有進化然今凡百事皆尙西法編中雖採取西人之說而不甚採取西人之藥恐於此道仍非登峯造極也答曰中華苞符之秘啓自三墳伏羲易經神農本經黃帝內經是也伏羲畫易在有文字之前故六十四卦止有其象而能包括萬事萬物之理經文王周公孔子闡發之而猶有餘蘊本經內經之包括醫理至精至奧神妙無窮亦猶易經之包括萬事萬物之理也自周末秦越人後歷代諸賢雖皆各有發明而較之三聖人之闡發易經實有不及故其中餘蘊猶多吾儒生古人之後當竟古人未竟之業而不能與古爲新俾吾中華醫學大放光明於全球之上是吾儒之罪也

錫純

日存斯心孜孜忘老於西法醫學雖

嘗涉獵實未暇將其藥餌一一試驗且其藥多係猛烈之品又不敢輕於試驗何能多採取乎然斯編於西法非僅採用其醫理恒有採其化學之理運用於方藥中者斯乃合中

西而融貫爲一又非若採用其藥者僅爲記問之學也持是學問之道貴與年俱進斯編既成之後行將博覽西法更探其可信之說與可用之方試之確有效者作爲續編此有志未逮之事或即有志竟成之事也 己酉孟春鹽山張錫純壽甫氏書於志誠堂

題詞

淵源仲景舊家聲博考旁通術益精薄海同胞關痛癢中華醫界放光明滿腔熱血如潮湧到處陽春著手成脈案方書千萬卷慈心濟世獨先生 瀋陽愚弟李樹勛翰宸敬題  
抱負非凡韋布身遭逢時世偃經論青囊小試活人術大地釀成不老春

安新愚弟楊世榮杏村敬題

良醫良相本相同妙藥功參造化功萬里相延時先生寓湖北漢皋來塞外活人事業徧遼東

鐵嶺愚弟劉尙清海泉敬題

同胞疾苦最關心費盡精神著等身恍若旱苗齊待雨權將靈素化甘霖

瀋陽愚弟苗蘭生孟馥敬題

八卷方書闡隱微聲名無羽六州飛大悲閣上東風起吹到塵寰轉化機

黃縣同學社弟淳于兆禧廉谿敬題

醫界浮沈二十年讀君大著心豁然從今識得活人術歷試羣方妙勝仙

鐵嶺同學社弟吳衷輯瑞五敬題

閱徧方書意渺茫偶讀大著喜如狂中西合撰發名論醫界撐持有棟梁

柳河小弟王德一尊三敬題

憶在荊門覩此書精言名論近今無署名喜出同宗手一脈相傳紹漢初

青縣同宗弟樹筠敬題

仲景醫宗衆所欽後先輝映古同今著書盡洩苞符祕具見先生濟世心

南昌愚弟萬 澐 敬題

冀北儒醫矯不羣鯁生何幸接蘭薰雄談汨汨河懸水神態悠悠岫出雲勝日郊垞從遣興忘年樽酒快論文勿勿半歲駒光盡風雨鷄鳴輒憶君 灤縣愚弟桑麟祥素村敬題  
胸羅靈素費揣摩腹貯奇才勝緩和德被羣黎消疫癘功參造化濟人多

潛江愚弟朱登五 敬題

學貫天人醫理通此心久欲坐春風活人無量恆河數妙藥深參造化功

天門後學崔壽康蘭亭敬題

南陽而後道沉淪醫學紛更莫問津幸有此編昭日月農軒事業又重新

同邑愚弟李恩綽曰綸敬題

書著活人苦費心學經閱歷益深深探源庖羲靈明闢究極軒岐奧義尋神術救時留寶笈良方餉世度金鍼宣傳簡冊足千古仲景風規又到今 同邑愚弟黃祺海仙槎敬題  
鴻網細目手編摩醫界指南受益多精力過人成妙手苦心救世洗沉疴神靈默相追倉扁診斷分明蠲緩和案列此書生異彩震驚二豎不爲魔 津沽後學楊秀章學忱敬題  
遠紹靈素得真傳醫藥活人到處然濟救蒼生無限苦學參造化貫人天

瀋陽受業王德峻子岡敬題

心存匡濟裕經猷遭際偃蹇志莫售權託刀圭活衆庶良醫良相本同流

棗強受業李書剛毅伯敬題

醫國醫人易地然廣行仁術徧坤乾萬言靈素羅胸臆四海蒼黎待保全著作爲經參造化中西合撰費陶甄心香一瓣留千古君是長生不老仙 同邑世晚李煊鎔心泉敬題



## 例言

一發明藥性之書始於神農本經其書爲有文字之後第一書

易雖在先其時猶無文字

簡策之古可知

其書共載藥三百六十五味以象周天之日數分上中下三品上品者養生之藥也中品者治病之藥也下品者攻病之藥也各品之下皆詳載其氣味與主治明其氣味主治之理亦即寓其中矣而藥性獨具之良能又恒有出於氣味之外者古聖洞徹精微皆能爲之一一表出此在醫學中誠爲開天闢地之鼻祖也乃後人識見短淺凡於藥有獨具之良能不能以氣味推求者皆刪去不載如桂枝治上氣吐吸

吸不下達即吐出即喘者之不納氣也

甚效本經載之而後世本草不載也山茱萸治寒熱往來

肝虛極者之寒熱往來

甚效本經載之而

後世本草不載也若此者不勝舉愚每觀至此等處恒深爲惋惜故斯編於論藥性處皆祖述本經而於後世本草不輕採取也或有疑其未載明入何臟腑及何經絡者不知其所主何病即知其藥力能至何處究之服藥後藥隨氣血流行無處不到後世之詳爲分疏其臟腑經絡者似轉貽學者以拘墟之弊也

一闡發醫理之書始於黃帝內經其書係黃帝與其臣岐伯伯高鬼臾雷公相問答之詞

分爲素問靈樞素問大旨以藥治病靈樞大旨以針灸治病特其年遠代湮不無殘缺古時相傳多以口授尤易亡失故晉皇甫謐言其書不完全宋林億疑其書有僞託且仲景傷寒論序謂撰用素問九卷今素問二十四卷其中有僞託可知然其醇粹之處確乎貽之聖神斷非僞託者所能爲即如以鍼灸治病此時爲東西所共認設非古聖開其始後世能創造乎即西人之細講剖解者能創造乎是以讀內經之法但於其可信之處精研有得即能開無限法門其不可信之處或爲後世僞託付之不論可也此孟子所謂書難盡信之義也乃今之偏重西法者不於內經可信之處費心研究但於其不可信之處極力指摘推其意見直謂內經真本久失所傳於世者皆係僞託有斯理乎夫我四萬萬同胞皆黃帝之子孫也以祖宗嘉惠後人之典冊不知抱殘守缺倍加愛護而轉欲弁毛棄之此真令人可發浩嘆者也故斯編於各門中祖述內經之處甚多而於後世醫書之祖述內經者若難經若傷寒金匱諸書亦偶有所採取焉

一斯編所載之方多係拙擬間有用古人成方亦恒有所加減或於方中獨有會心之處亦偶載其方而詳爲疏解又於各門方後附錄西人恒用之效方及西藥試之果有實

效者至論臟腑經絡之處恒兼取道家之說以其授受有自來也又間採西人之說以其剖驗有實攷據也

一西人於臟腑剖驗雖精而仍有未能剖驗之處人之臟腑有氣有血有功用有性情西人剖驗之學詳於論血略於論氣能明臟腑之功用未識臟腑之性情究於醫學未臻醇備斯編論臟腑之氣血及其功用性情不但多爲西人所未發明即漢晉以來名醫亦多有未發明者

一西人之藥喜用猛烈之品吾中華服之恆與臟腑有不宜誠以西人多肉食吾人多穀食自幼養料既異臟腑之性質即因之有異斯編於用西法處恆取其化學之理運用於醫理之中而自處方藥即間有引用西藥之時亦必其性稍和平不至含有猛烈毒害者

一古人用藥多是煎一大劑分三次服下病愈不必盡劑不愈者必一日服盡此法今人不講久矣愚治傷寒瘟疫與一切急證必用此法蓋治此等證勢如救火以水潑之火勢稍減若不連番潑之則火勢復熾而前功盡棄若治他證不必日服藥三次亦必朝

夕各服藥一次煎渣再服可權作一次使藥力晝夜相繼見效自速也

一富貴之家服藥多不用次煎不知次煎原不可廢慎柔和尙治陰虛勞熱專用次煎取次煎味淡善能養脾陰也夫淡氣歸胃內經曾言之淡能養脾陰之義原自淡氣歸胃悟出而之所以然之故人仍多不解徐靈胎曰洪範言五行之味水曰潤下潤下作鹹火曰炎上炎上作苦木曰曲直曲直作酸金曰從革從革作辛皆直言其物之本味至於土則變其文曰土爰稼穡稼穡作甘蓋土本無味借稼穡之味以爲味夫無味即是淡故人脾胃屬土凡味之淡者皆能入脾胃也又按治陰虛專責重於脾人亦多不解陳修園謂脾爲太陰乃三陰之長故治陰虛者當以滋脾陰爲主脾陰足自能灌溉諸臟腑也

一白虎湯中用粳米古方生用今人亦生用至爲蕙米芡實山藥之類猶粳米也諸家本草多註炒用者爲丸散計耳今人用之入湯劑亦必炒熟殊令人不解惟專用以健脾胃或可炒用若用以止瀉利即不宜炒蓋生者汁漿稠黏可以留戀腸胃若炒熟煮之則無汁漿矣至於用以滋陰用以淡滲則不宜炒熟尤彰彰明矣

一今之黨參即古之人參爲其生於山西之上黨山谷故曰黨參而生於山西之五臺山者尤佳故又別之曰臺黨參與今之遼東人參原非一種而氣溫性和實較遼人參爲易用且其價又甚廉貧家亦可服用誠濟世之良藥也今遼東亦多有此藥不必皆生於山西然必參皮作橫紋若胡萊菔之紋而更密於胡萊菔之紋者方爲野山自生之參用之以代人參甚有功效若無橫紋係土人種植之物不堪用也又斯編方中所用人參皆可用野黨參代之而不可用遼東秧參代之遼東秧參俗名高麗參其性燥熱不宜輕用而用於傷寒瘟疫諸方中尤非所宜又有潞黨參皮色微紅生於潞安紫團山故又名紫團參其補力亞於臺黨參而性平不熱用於氣虛有熱者甚宜

一黃芪入湯劑生用即是熟用不必先以蜜炙若丸散劑中宜熟用者蜜炙可也若用治瘡瘍雖作丸散亦不宜炙用王洪緒證治全生集曾詳言之至於生用發汗熟用止汗之說尤爲荒唐蓋因氣分虛陷而出汗者服之即可止汗因陽強陰虛而出汗者服之轉大汗汪洋若氣虛不能逐邪外出者與發表藥同服亦能出汗是知其止汗與發汗不在生熟亦視用之者何如耳

一石膏寒而能散以治外感有實熱者直同金丹神農本經謂其微寒則性非大寒可知且謂其能治產乳則性甚純良可知世人多誤認爲大寒而煨用之則辛散之性變爲收斂

點豆腐者必煨用以其能收斂也

用於外感有實熱者至一兩即能傷人因外感之熱宜散不宜斂也

乃重用煨石膏而僨事者不知其誤在煨不在石膏轉謂煨用之而猶猛悍如此則不煨者更可知矣於是遂視用生石膏爲畏途即有放胆用者亦不過七八錢而止夫石膏之質甚重七八錢不過一大撮耳以微寒之藥欲用一大撮以挽回極重之寒溫又何能有大效是以愚治外感有實熱者輕證亦必用至兩許若實熱熾盛又恆重用至三四兩將藥煎湯數鍾分三四次溫飲下欲以免病家之疑且欲其藥力常在上焦而寒涼不侵下焦致滑瀉也蓋石膏生用以治外感實熱斷無傷人之理且放胆用之亦斷無不能退熱之理特是坊間軋細之石膏多係煨者即方中明開生者亦恆以煨者充之因煨者其所素備且又自覺慎重也故凡用生石膏者宜買其整塊明亮者自監視軋細方的

或問同一石膏也何以生用之則能散煨用之則性之散者驟變爲斂乎答曰石藥之

性與草木之藥不同恒因煨與不煨而其性迥異如丹砂無毒煨之即有毒煨石作石灰其燥烈之性頓發以水沃之其熱如火石膏原硫養輕鈣化合而成煨之則硫養輕皆飛去所餘之鈣已變爲石灰黏澀異常是以燒洋灰者必多用石膏洋灰豈可服乎故凡煎石膏其渣凝結於礮底者即係煨石膏其藥即斷不可服

一細辛有服不過錢之說後世醫者恒多非之不知其說原不可廢凡味辛兼能麻口之藥若花椒天雄生半夏大抵皆有此弊不但細辛也蓋能麻口者即能麻肺肺麻則其呼吸即停矣嘗因胃中受涼嚼服花椒約三十粒下咽後即覺氣不上達移時呼吸始復常乃悟古人諫君恐有不測故有搗椒自隨者由斯觀之用藥可不慎哉

一半夏爲降逆止嘔之主藥今坊間製以白礬若用以降逆氣止嘔吐恐服後病轉增劇因礬味能令人涌吐也愚用半夏治此等證必用微溫之水將半夏淘洗數次務須將礬味淘淨然淘時須斟酌其礬有多少即額外加半夏多少約計其淘淨晒乾後仍還足原定分量至坊間之好清半夏其礬較少用時亦須淘之若專用以利痰則清半夏不淘亦可

一龍骨牡蠣若專取其收澀可以煨用若用以滋陰用以斂火或取其斂兼取其開通者二藥皆斂而能開皆不可煨若用於丸散中微煨亦可今用者一概煨之殊非所宜

一山茱萸之核原不可入藥以其能令人小便不利也而僻處藥坊所賣山茱萸往往核與肉參半甚或核多於肉即方中註明去淨核亦多不爲去誤人甚矣斯編重用山茱萸治險證之處甚多凡用時愚必自加檢點或說給病家檢點務要將核去淨而其分量還足然後不至誤事又山茱萸之功用長於救脫而所以能固脫者因其味之甚酸然間有嘗之微有酸味者此等萸肉實不堪用用以治險證者必須嘗其味極酸者然後用之方能立建奇效

一肉桂氣味俱厚最忌久煎而坊間又多搗爲細末數沸之後藥力即減況煎至數十沸乎至於石膏氣味俱淡且係石質非搗細煎之則藥力不出而坊間又多不爲搗細是以愚用石膏必搗爲細末然後煎之若用肉桂但去其粗皮而以整塊入煎至藥之類肉桂類石膏者可以肉桂石膏爲例矣

一乳香沒藥最宜生用不可炒枯若用於丸散中先軋作粗渣入鍋內隔紙烘至半鎔候



冷軋之即成細末此乳香沒藥去油之法

一威靈仙柴胡諸藥原是用根坊間恒雜以莖葉醫者不知甄別即可誤事細辛之葉其功用亦不如根故李瀕湖本草綱目亦謂用根至樗白皮與桑白皮亦皆用根上之皮其真偽尤屬難辨用者必自採取方的如樗根白皮大能固澀下焦而帶皮樗枝煎湯又能通大便俗傳便方大便不通者用帶皮樗枝七節每節長寸許煎湯服之甚效其枝與根性之相異如此用者可不慎哉

一赭石爲鐵養化合性同鐵鏽原不宜煨徐靈胎謂若煨之復用醋淬即能傷肺此書諸方中有赭石者皆宜將生赭石軋細用之

一藥有非製過不可服者若半夏附子杏仁諸有毒之藥皆是也雖古方中之附子亦偶生用實係瀘水淹透未經炮熟之附子亦非採取即用也凡此等藥方中雖未註明如何炮製坊間亦必爲製至無毒若其藥本無毒原可生用者斯編方中若未註明製用皆宜生用有用斯編之方者甚勿另加製法致失藥之本性也

一古人服藥病在下者食前服病在上者食後服此定法也後人有謂服藥後必待脾胃

消化而後方能四達若病在上者食後服則脾胃必先消化宿食而後消化藥物是求速而反遲也此說亦似近理而不知非也藥力之行於周身端藉人身之氣化以傳遞之猶空氣之傳聲也使兩間無空氣發聲於何處即止於何處使人身無氣化脾胃雖能消化藥物亦不能傳遞於周身蓋人身之氣化流行原無臟腑界限而藥物下咽之後即附之而行其傳遞之神速誠有頃刻可徧周身者特是空氣傳聲雖速實漸遠而聲漸微推之氣化傳藥亦漸遠而力漸減由是觀之病在下者食前服病在上者食後服俾藥近病所其直達之力必尤捷也

一凡湯劑藥汁不可煎少少則藥汁仍多半含於渣中而滋陰清火之藥尤必藥汁多煎方效故斯編凡用重劑之處必煎汁數杯分數次服下又或誤將藥煎乾復添水重煎則藥盡失其本性服之病必增劇即宜棄之勿服

一煎時易沸之藥醫者須預告病家如知母若至五六錢微火煎之亦沸若至一兩幾不能煎然此藥最易煎透先將他藥煎十餘沸再加此藥敞開藥罐蓋略煎數沸其湯即成至若山藥阿膠諸有汁漿之藥龍骨牡蠣石膏滑石赭石諸搗末之藥亦皆易沸大

凡煎藥其初滾最易沸煎至將滾時須預將藥罐之蓋敞開以箸攪之迨沸過初滾其後仍沸廠蓋煎之無妨若不沸者始可蓋而煎之蓋險急之證安危止爭此藥一劑設更諉之僕婢將藥煎沸出復不敢明言則誤事多矣故古之醫者藥餌必經已手修製即煎湯液亦必親自監視也

一此書即一期加三萬餘言爲二期後即二期又加三萬餘言爲三期是三期書原即前三期合編也今又即原書添補若干又間有刪改之處實較原書爲完備

一書中所載諸方其方中緊要之藥有未確知其性味能力者宜詳觀四期藥物學講義所載本葯後之註解蓋愚對於諸藥雖劇如巴豆甘遂亦必親自嘗試是以凡所用之藥皆深知其性味能力於諸家本草之外恒另有發明也

一書中所載各門諸病有與五期醫論相同者當與五期醫論匯通參觀蓋醫論爲登各省醫學誌報之論說每論一證至爲詳細周到若肺病膈噎諸論中所用之方恒有爲此書中所不載者

一書中未備之證五期論中亦恒及之若鼠疫疔瘡癩疾諸論是也是五期之書可爲此

書之副本宜間採之以補此書所未備也

一古方分量折爲今之分量諸說莫衷一是從來愚用古方原不拘於分量若間有用古分量時則以陳修園之說爲準

說見五卷  
第一方後

一西醫用藥分量以柯蘭某爲起點合中量貳分陸厘肆毫東人依其法而易其名曰瓦有用三分瓦之一者將一瓦分爲三分而用其一分也有用四分瓦之一者將一瓦分爲四分而用其一分也有用十分瓦之二者將一瓦分爲十分而用其二分也餘可類推

一書中諸方除古方數首之外其餘一百六十餘方皆係拙擬此非矜奇立異欲與古人爭勝也誠以醫者以挽回人命爲孜孜當盡之天職至遇難治之證歷試成方不效不得不苦心經營自擬治法迨擬出用之有效且屢次用之皆能隨手奏效則其方即不忍拋棄而詳爲錄存是此一百六十餘方皆迫於孜孜挽回人命之熱忱而日積月累以成卷帙者也計書自初期出版至今已歲星一周矣而此十餘年間醫界同人用書中之方有效而來函相告者已不勝紀有謂此書當於醫界中開新紀元者有推此書

爲至貴至寶之救命書者有謂視此書爲第二生命者有謂拙著此書當爲醫學革命家者夫同人如此推許在愚原不敢當然區區寸衷未嘗不深感佩也且亦足徵此書爲醫界有用之書不至濫竽貽譏也

第一卷

例言



# 第一卷目錄

治陰虛勞熱方

資生湯 1

十全育真湯 6

醴泉飲 15

一味薯蕷飲 20

參麥湯 22

珠玉二寶粥 29

沃雪湯 30

水晶桃 30

既濟湯 32

來復湯 34

鎮攝湯 37

## 第二卷目錄

治喘息方

參赭鎮氣湯 1

薯蕷納氣湯 6

滋培湯 8

治陽虛方

敦復湯

附心腎相交  
以助元陽方 11

治心病方

定心湯 17

安魂湯 23

治肺病方

黃芪膏<sub>25</sub>

清金益氣湯<sub>27</sub>

清金解毒湯<sub>29</sub>

安肺寧嗽丸<sub>29</sub>

清涼華蓋飲<sub>31</sub>

治嘔吐方

鎮逆湯<sub>35</sub>

薯蕷半夏粥<sub>35</sub>

治膈食方

參赭培氣湯<sub>37</sub>

治吐衄方

寒降湯<sub>41</sub>

溫降湯<sub>47</sub>

清降湯<sub>48</sub>

保元寒降湯<sub>48</sub>

保元清降湯<sub>49</sub>

祕紅丹<sub>50</sub>

二鮮飲<sub>52</sub>

三鮮飲<sub>53</sub>

化血丹<sub>54</sub>

補絡補管湯<sub>54</sub>

化瘀理膈丹<sub>63</sub>

治消渴即西人所  
謂糖尿證方

玉液湯<sub>64</sub>

滋脾飲<sub>67</sub>

治癰閉方



宣陽湯 71

濟陰湯 71

白茅根湯 74

溫通湯 76

加味蒼桂朮甘湯 77  
寒通湯 80

升麻黃芪湯 80

鷄脰湯 86

鷄脰茅根湯 87

### 第三卷目錄

治黃疸方

審定金匱黃疸門硝石礬石散方 1

治淋濁方

理血湯 4

膏淋湯 9

氣淋湯 10

勞淋湯 10

砂淋丸 11

寒淋湯 13

祕真丹 13

毒淋湯 14  
清毒二仙丹 14

鮮小薊根湯 15

硃砂骨湃波丸 16

澄化湯 18

清腎湯 18  
舒和湯 19

治痢方

化滯湯 20

變理湯 20

解毒生化丹 25

天水滌腸湯 26

通變白頭翁湯 27

三寶粥 30

通變白虎加人參湯 33

治燥結方

硝菴通結湯 45

遂硝攻結湯 47

通結用葱白熨法 49

治泄瀉方

益脾餅 53

扶中湯 54

薯蕷粥 55

薯蕷鷄子黃粥 58

薯蕷茅苴粥 58

加味天水散 59

加味四神丸 60

治痰飲方

理飲湯 61

理痰湯 65

龍蟾理痰湯 67

健脾化痰丸 69

期頤餅 70

治痰點天突穴法 附捏結喉法明礬湯麝香香油灌法 73

治癲狂方

盪痰湯 76

盪痰加甘遂湯 76

調氣養神湯 79

## 第四卷目錄

治大氣下陷方

升陷湯 1

回陽升陷湯 30

理鬱升陷湯 32

醒脾升陷湯 34

治氣血鬱滯肢體疼痛方

升降湯<sub>38</sub>

培脾舒肝湯<sub>40</sub>

金鈴瀉肝湯<sub>41</sub>

活絡效靈丹<sub>42</sub>

活絡祛寒湯<sub>46</sub>

健運湯<sub>附健運丸 47</sub>

振中湯<sub>47</sub>

曲直湯<sub>48</sub>

熱性關節腫痛用阿司必林法<sub>53</sub>

## 第五卷目錄

治傷寒方

麻黃加知母湯<sub>1</sub>

加味桂枝代粥湯<sub>5</sub> 小青龍湯解<sub>9</sub>

從龍湯<sub>21</sub>

簡水石膏湯<sub>24</sub>

葛根黃芩黃連湯<sub>25</sub> 小柴胡湯解<sub>27</sub>

通變大柴胡湯<sub>39</sub>

加味越婢加半夏湯<sub>40</sub>

治溫病方

清解湯<sub>42</sub>

涼解湯<sub>46</sub>

寒解湯<sub>47</sub>

石膏阿斯必林湯<sub>52</sub>

和解湯<sub>53</sub>

宣解湯<sub>53</sub>

滋陰宣解湯<sub>54</sub>

滋陰清燥湯<sub>55</sub>

滋陰固下湯<sub>58</sub>

猶龍湯<sub>59</sub>

## 第六卷目錄

傷寒溫病同用方二病治法  
始異終同

仙露飲<sup>1</sup>

石膏粳米湯<sup>28</sup>

鎮逆白虎湯<sup>30</sup>

白虎加人參以山藥代  
粳米湯<sup>32</sup>

寧嗽定喘飲<sup>46</sup>

盪胸湯<sup>47</sup>

一味萊菔子湯<sup>50</sup>

鎮逆承氣湯<sup>51</sup>

## 第七卷目錄

治瘟疫瘟疹方

青孟湯<sup>1</sup>

護心至寶丹<sup>13</sup>

清疹湯<sup>14</sup>

治瘡疾方

加味小柴胡湯<sup>20</sup>

治霍亂方

急救回生丹<sup>24</sup>

衛生防疫寶丹<sup>27</sup>

急救回陽湯<sup>29</sup>

治內外中風方

搜風湯<sup>38</sup>

逐風湯<sup>41</sup>

加味黃芪五物湯<sup>42</sup>  
加味玉屏風散<sup>42</sup>

鎮肝熄風湯<sub>44</sub>

加味補血湯<sub>53</sub>

治小兒風證方

定風丹<sub>57</sub>

鎮風湯<sub>59</sub>

附方 逐寒蕩驚湯<sub>60</sub>

附方 加味理中地黃湯<sub>61</sub>

治癰風方

加味磁硃丸<sub>63</sub>

通變黑錫丹<sub>66</sub>

一味鐵養湯<sub>67</sub>

治肢體痿廢方

振顏湯<sub>70</sub>

振顏丸<sub>72</sub>

薑膠膏<sub>72</sub>

## 第八卷目錄

治女科方

玉燭湯<sub>1</sub>

理衝湯<sub>4</sub>

理衝丸<sub>8</sub>

安衝湯<sub>12</sub>

固衝湯<sub>14</sub>

溫衝湯<sub>16</sub>

清帶湯<sub>17</sub>

加味麥門冬湯<sub>20</sub>

壽胎丸<sub>22</sub>

安胃飲<sub>24</sub>

大順湯<sub>25</sub>

和血熄風湯<sub>28</sub>

滋陰清胃湯<sub>31</sub>

滋乳湯<sub>32</sub>

消乳湯<sub>32</sub>

升肝舒鬱湯<sub>33</sub>

資生通脈湯<sub>34</sub>

治眼科方

蒲公英湯<sub>38</sub>

磨翳水<sub>39</sub>

磨翳散<sub>39</sub>

明目蓬硝水<sub>40</sub>

清腦黃連膏<sub>40</sub>

益瞳丸<sub>41</sub>

羊肝猪胆丸<sub>41</sub>

附方護眉神應散<sub>42</sub>

治咽喉方

咀華清喉丹<sub>44</sub>

附方養陰清肺湯<sub>46</sub>

治牙疳方

古方馬乳飲<sub>49</sub>

牙疳敷藥方<sub>46</sub>

牙疳敷籐黃法<sub>49</sub>

治瘡科方

消癰丸<sub>51</sub>

消癰膏<sub>53</sub>

化腐生肌散<sub>54</sub>

內托生肌散<sub>55</sub>

洗髓丹<sub>59</sub>

雜錄

服硫黃法<sub>62</sub>

解砒石毒洋火<sub>法毒65</sub>

治夢遺運氣法<sub>65</sub>

# 衷中參西錄前三期合編第一卷

## 治陰虛勞熱方

資生湯

治勞瘵羸弱已甚飲食減少喘促咳嗽身熱脈虛數者亦治女子血

生山藥壹兩

玄參伍錢

於朮叁錢

生雞內金搗碎貳錢

牛蒡子炒搗三錢

熱甚者加生地黃五六錢

易有之至哉坤元萬物資生言土德能生萬物也人之脾胃屬土即一身之坤也故亦能資生一身脾胃健壯多能消化飲食則全身自然健壯何曾見有多飲多食而病勞瘵者哉內經陰陽別論曰二陽之病發心脾有不得隱曲在女子爲不月其傳爲風消其傳爲息賁者死不治夫病至於風消息賁勞瘵之病成矣而名爲二陽之病者以其先不過陽明胃腑不能多納飲食也而原其飲食減少之故曰發於心脾原其發於心脾之故曰有不得隱曲者何居蓋心爲神明之府有時心有隱曲思想不得自遂則心神拂鬱心血亦遂不能濡潤脾土以成過思傷脾之病脾傷不能助胃消食變化精液以溉五臟在男子已隱受其病而尙無顯徵在女子則顯然有不月之病此乃即女以徵男也至於傳爲風



消傳爲息責無論男女病證至此人人共見勞瘵已成挽回實難故曰不治然醫者以活人爲心病證之危險雖至極點猶當於無可挽回之中盡心設法以挽回之而其挽回之法仍當遵二陽之病發心脾之旨戒病者淡泊寡欲以養其心而復善於補助其脾胃使飲食漸漸加多其身體自漸漸復原如此湯用於朮以健脾之陽脾土健壯自能助胃山藥以滋胃之陰胃汁充足自能納食胃化食賴有酸汁 特是脾爲統血之臟內經謂血生脾蓋謂脾係血液結成故中多函血西人亦謂脾中多回血管詳第二卷補絡補管湯下 爲血匯萃之所此證因心思拂鬱心血不能調暢脾中血管遂多閉塞或如爛炙或成絲膜此脾病之由而脾與胃相助爲理一氣貫通臟病不能助腑亦即胃不能納食之由也鷄內金爲鷄之脾胃中有瓷石銅鐵皆能消化其善化有形鬱積可知且其性甚和平兼有以脾胃補脾胃之妙故能助健補脾胃之藥特立奇功迥非他藥所能及也方中以此三味爲不可挪移之品玄參本經謂其微寒善治女子產乳餘疾且其味甘勝於苦不至寒涼傷脾胃可知故用之以去上焦之浮熱即以退周身之燒熱且其色黑多液本經又謂能補腎氣故以治勞瘵之陰虛者尤宜也牛蒡子體滑氣香能潤肺又能利肺與山藥玄參並用大能止嗽定喘



以成安肺之功故加之以爲佐使也

地黃生用其涼血退熱之功誠優於玄參西人謂其中函鐵質人之血中又實有鐵鏽地黃之善退熱者不但以其能涼血滋陰實有以鐵補鐵之妙使血液充足而蒸熱自退也又勞瘵之熱大抵因真陰虧損相火不能潛藏夫相火生於水臟之命門穴爲陰中之火方書謂之龍雷之火猶兩間之電氣也電之性喜緣鐵傳遞爲地黃函有鐵質故又善引相火下行安其故宅本經列之上品洵良藥也然必燒熱過甚而始加之者以此方原以健補脾胃爲主地黃雖係生用經水火煎熬其汁漿仍然黏泥恐於脾胃有不宜也至熱甚者其脾胃必不思飲食用地黃退其熱則飲食可進而轉有輔助脾胃之效

生山藥即坊間所鬻之乾山藥而未經火炒者也然此藥坊間必炒熟然後鬻之以俗習所尙使然也而此方若用炒熟山藥則分毫無效

理詳後一味  
藥預飲下

於朮色黃氣香乃浙江於潛所產之白朮也色黃則屬土氣香則醒脾其健補脾胃之功迥異於尋常白朮今坊間鬻者均名於朮而價值懸殊其價之廉者未必出於於潛而但觀其色黃氣香即其價值甚廉用之亦有殊效此以色列爲重不以地道爲重也且價廉

則貧者可服利濟之功益普也

西人謂胃之所以能化食者全賴中有酸汁腹飢思食時酸汁自然從胃生出若憂思過度或惱怒過度則酸汁之生必少或分毫全無胃中積食即不能消化此論與內經二陽之病發心脾過思則傷脾之旨暗合

或問曰內經謂脾主思西人又謂思想發於腦部子則謂思發於心者何也答曰內經所謂脾主思者非謂脾自能思也蓋脾屬土土主安靜人安靜而後能深思此大學所謂安而後能慮也至西人謂思發於腦部內經早寓其理脈要精微論曰頭者精明之府夫頭之中心點在腦頭爲精明之府即腦爲精明之府矣既曰精明豈有不能思之理然亦非腦之自能思也試觀古文思字作慮囟者腦也心者心也是知思也者原心腦相輔而成又須助以脾土鎮靖之力也

或問曰子解二陽之病發心脾一節與王氏內經之註不同豈王氏之註解謬歟答曰愚實不敢云然然由拙解以釋經文自覺經文別有意味且有實用也夫二陽之病發心脾與下三陽爲病發寒熱一陽發病少氣善咳善泄句法不同即講法可以變通蓋二陽之

病發心脾謂其病自心脾而來也三陽爲病發寒熱是形容三陽之病狀也故將之病之字易作爲字至一陽發病數句其句法又與三陽爲病句不同而其理則同也。

或又問三陽一陽病皆形容其發病之狀二陽病獨推究其發病之原因者何居答曰三陽一陽若不先言其病發之狀人即不知何者爲三陽一陽病至二陽胃腑原主飲食人皆知至胃腑有病即不能飲食此又人人皆知然其所以不能飲食之故人多不能知也故發端不言其病狀而先發明其得病之由來也

或又問胃與大腸皆爲二陽經文既渾曰二陽何以知其所指者專在於胃答曰胃爲足陽明大腸爲手陽明人之足經長手經短足經原可以統手經論六經者原當以足經爲主故凡內經但曰某經而不別其爲手與足者皆指足經而言或言足經而手經亦統其中若但言手經則必別之曰手某經矣經文俱在可取而細閱也

民國二年客居大名治一室女勞瘵年餘月信不見羸弱不起詢方於愚爲擬此湯連服數劑飲食增多身猶發熱加生地黃五錢五六劑後熱退漸能起狀而腿疼不能行動又加丹參當歸各三錢服至十劑腿愈月信亦見又言有白帶甚劇向忘言及遂去丹參加

生牡蠣六錢又將於朮加倍連服十劑帶證亦愈遂將此方郵寄家中月餘門人高如璧來函云鄰村趙芝林病勞瘵數年不愈經醫不知凡幾服藥皆無效今春驟然咳嗽喘促異常飲食減少脈甚虛數投以資生湯十劑全愈審斯則知此方治勞瘵無論男女服之皆有捷效也

女子月信若日久不見其血海必有堅結之血治此等證者但知用破血通血之藥往往病猶未去而人已先受其傷鷄內金性甚和平而善消有形鬱積服之既久瘀血之堅結者自然融化矧此方與健脾滋陰之藥同用新血活潑滋長生新自能化瘀也

十全育真湯 治虛勞脈弦數細微肌膚甲錯形體羸瘦飲食不壯筋力或自汗或咳逆或喘促或寒熱不時或多夢紛紜精氣不固

野台參 肆錢

生黃芪 肆錢

生山藥 肆錢

知母 肆錢

玄參 肆錢

生龍骨 搗細肆錢

生牡蠣 搗細肆錢

丹參 貳錢

三稜 錢半

莪朮 錢半

氣分虛甚者去三稜莪朮加生鷄內金三錢喘者倍山藥加牛蒡子三錢汗多者以白朮易黃芪倍龍骨牡蠣加山萸肉 去淨核 生白芍各六錢若其汗過多服藥仍不止者可但用

龍骨牡蠣炙肉各一兩煎服不過兩劑其汗即止汗止後再服原方若先冷後熱而汗出者其脈或更兼微弱不起多係胸中大氣下陷細閱拙擬升陷湯

在第四卷

後跋語自知治法

仲景治勞瘵有大黃蟣蟲丸有百勞丸皆多用破血之藥誠以人身經絡皆有血融貫其間內通臟腑外溉周身血一停滯氣化即不能健運勞瘵恒因之而成是故勞瘵者肌膚甲錯血不華色即日食珍饈服參苓而分毫不能長肌肉壯筋力或轉消瘦支離日甚一日誠以血瘀經絡阻塞其氣化也玉田王清任著醫林改錯一書立活血逐瘀諸湯按上中下部位分消瘀血統治百病謂瘀血去而諸病自愈其立言不無偏處然其大旨則確有主見是以用其方者亦多效驗今愚因治勞瘵故擬十全育真湯於補藥劑中加三稜莪朮以通活氣血竊師仲景之大黃蟣蟲丸百勞丸之意也且仲景於金匱列虛勞一門特以血痺虛勞四字標爲提綱益知虛勞者必血痺而血痺之甚又未有不虛勞者並知治虛勞必先治血痺治血痺亦即所以治虛勞也

或問治勞瘵兼用破血之藥誠爲確當之論但破血用三稜莪朮將母其力過猛乎答曰仲景之大黃蟣蟲丸與百勞丸所用破血之藥若大黃乾漆水蛭皆猛於三稜莪朮而方

中不用三稜莪朮者誠以三稜莪朮本經不載至梁陶弘景著名醫別錄於本經外增藥品三百六十五味皆南北朝以前名醫所用之藥亦未載三稜莪朮是當仲景時猶無三稜莪朮即有之亦未經試驗可知而愚於破血藥中獨喜用三稜莪朮者誠以其既善破血尤善調氣三稜莪朮詳解在第八卷理衝湯下補藥劑中以爲佐使將有瘀者瘀可徐消即無瘀者亦可藉其流通之力以行補藥之滯而補藥之力愈大也況後天資生納穀爲寶無論何病凡服藥後飲食漸增者易治飲食漸減者難治三稜莪朮與參朮棗諸藥並用大能開胃進食又愚所屢試屢效者也

或問勞字從火誠以勞瘵之證陰虛發熱者居其強半故錢仲陽之減味地黃丸張景岳之左歸飲皆爲對證良方以其皆以熟地黃爲君大能滋真陰退虛熱也子方中何以獨不用也答曰若論用熟地我固過來人也憶初讀方書時曾閱趙氏醫貫張氏八陣馮氏錦囊諸書遂確信其說臨證最喜用熟地曾以八味地黃丸作湯加蘇子白芍治吸不歸根之喘逆加陳皮白芍治下虛上盛之痰涎加蘇子厚朴治腎不攝氣以致衝氣上逆之脹滿時病人服之覺有推激之力後製參又嘗減茯苓澤瀉三分之一二治女子消渴小便頻數金匱謂治男子

時病人服之覺有推激之力後製參

治男子

消渴以治女子亦按案  
詳第二卷玉液湯下

又嘗去附子加知母白芍治陰虛不能化陽致小便不利積成水腫又嘗

用六味地黃丸作湯加川芎知母以治如破之頭疼加膽草青黛以治非常之眩暈加五

味枸杞柏子仁以欽散大之腫子且信其煎汁數碗浩蕩飲之之說用熟地四兩茯苓壹

兩以止下焦不固之滑瀉用熟地四兩白芍一兩以通陰虛不利之小便又嘗於一日之

中用熟地斤許治外感大病之後忽然喘逆脈散亂欲脫之險證

此證當用後來復湯彼時其方未擬出惟知用熟地亦幸成功是知

渴楚難耐熱地能大補  
腎中元氣誠有所試也

且不獨治內傷也又嘗用熟地阿膠大滋真陰之類治溫病脈陽浮而陰

不應不能作汗一日連服二劑濟陰以應其陽使之自汗

詳案在第五  
卷寒解湯下

並一切傷寒外感因

下元虛憊而邪深陷者莫不重用熟地補其下元即以托邪外出惟用以治陰虛勞熱之

證輕者可效若脈數至七八至鮮有效者彼時猶不知改圖且以爲地黃丸即金匱之腎

氣丸自古推爲良方此而不效則他方更無論矣不知腎氣丸原用乾地黃即藥坊間之

生地也其桂用桂枝即神農本經之牡桂也與今之地黃丸迥不侔矣其方金匱凡五見

一治脚氣上入少腹不仁一治虛勞腰痛少腹急拘小便不利一治短氣有微飲當從小

便去之一治男子消渴小便反多飲一斗小便一斗一治婦人轉胞胞系了戾不得溺統

觀五條原治少腹膀胱之疾居多非正治勞瘵之藥况後世之修製又失其本然乎後治一婦人年近五旬身熱勞嗽脈數幾至八至先用六味地黃丸加減作湯服不效繼用左歸飲加減亦不效愚忽有會悟改用生黃耆六錢知母八錢爲方數劑見輕又加丹參當歸各三錢連服十劑全愈以後凡遇陰虛有熱之證其稍有根柢可挽回者於方中重用黃耆知母莫不隨手奏效始知叔和脈法謂數至七八至爲不治之脉者非確論也蓋人稟天地之氣以生人身之氣化即天地之氣化天地將雨之時必陽氣溫暖上升而後陰雲會合大雨隨之黃耆溫升補氣乃將雨時上升之陽氣也知母寒潤滋陰乃將雨時四合之陰雲也二藥並用大具陽升陰應雲行雨施之妙膏澤優渥煩熱自退此不治之治也

此理參觀第二卷玉液湯後設語益明

况勞瘵者多損腎黃耆能大補肺氣以益腎水之源使氣旺自能生水

以退虛熱然遇陰虛熱甚者又必須加生地黃八錢或至一兩方能服之有效

黃耆知母雖可並用

或又問腎氣丸雖非專治虛勞之藥而金匱虛勞門明載其治虛勞腰疼似虛者皆可服之子獨謂無甚效驗豈古方不可遵歟答曰腎氣丸若果按古方修製地黃用乾地黃桂



用桂枝且止爲丸劑而不作湯劑用之得當誠有效驗蓋生地能逐血痺

神農本經

而熟地無

斯效也桂枝能調營衛而肉桂無斯效也血痺逐則瘀血自消營衛調則氣血自理至於

山萸肉之酸溫亦能逐痺

本經山萸肉逐寒濕痺

牡丹皮之辛涼亦能破血附子之大辛大溫又能溫

通血脈與地黃之寒涼相濟以共成逐血痺之功是腎氣丸爲補腎之藥實兼爲開瘀血之藥故列於金匱虛勞門而爲要方也其止爲丸劑而不作湯劑者誠以地黃經水火煎熬則汁漿稠黏性近熟地其逐血痺之力必減是以神農本經謂地黃生者尤良也後賢徐靈胎曾治一人上盛下虛胸次痰火壅滯喘不能臥將人參切作小塊用清火理痰之藥煎湯送服而愈後其病復發病家自用原方並人參亦煎服病益甚靈胎仍教以依從前服法其病仍愈夫同一人參也生切塊送服則效煎湯則不惟不效轉至增劇觸類引伸可以悟古人製腎氣丸之精義矣

或又問腎氣丸既按古方修製可以有效而金匱虛勞門腎氣丸與大黃蟄虫丸之外又有七方皆可隨證探擇則子之十全育真湯似亦可以不擬歟答曰金匱虛勞門諸方雖皆有效而一方專治虛勞門一證若拙擬十全育真湯實兼治虛勞門諸證如方中用黃

遂以補氣而即用人參以培元氣之根本用知母以滋陰而即用山藥元參以壯真陰之淵源用三稜莪朮以消瘀血而即用丹參以化瘀血之渣滓至龍骨牡蠣若取其收澀之性能助黃耆以固元氣若取其涼潤之性能助知母以滋真陰若取其開通之性

本經龍骨主癥瘕後

證本草亦謂牡蠣消血。

又能助三稜莪朮以消融瘀滯也至於療肺虛之欬逆腎虛之喘促山藥最良治多夢之紛紜虛汗之淋漓龍骨牡蠣尤勝此方中意也以尋常藥餌十味彙集成方而能補助人身之真陰陽真氣血真精神故曰十全育真也

勞瘵者多兼於血其證原有兩種有因勞瘵而瘀血者其人或調養失宜或縱慾過度氣血虧損流通瘀周身者必然遲緩血即因之而瘀其瘀多在經絡有因瘀血而成勞瘵者其人或跌傷碰傷或力小任重或素有吐衄證服藥失宜以致先有瘀血日久寢成勞瘵其瘀血多在臟腑此二者服十全育真湯皆可愈而瘀血在臟腑者尤須多用破血之藥又瘀在經絡者亦可用前方資生湯加當歸丹參瘀在臟腑之劇者又宜用拙擬理衝湯或理衝丸

方在第八卷

此數方可參變匯通隨時制宜也

世俗醫者遇脈數之證大抵責之陰虛血涸不知元氣虛極莫支者其脈可至極數設有

人或力作或奔馳至氣力不能支持之時其脈必數乃以力倦之不能支持以仿氣虛之不能支持其事不同而其理同也愚臨證細心體驗凡治虛勞之證固不敢純用補藥然理氣藥多於補氣藥則脈即加數補氣藥多於理氣藥則脈即漸緩是知脈之數與不數固視乎血分之盈虧實尤兼視乎氣分之強弱故此十全育真湯中台參黃芪各四錢而三稜莪朮各錢半補氣之藥原數倍於理氣之藥若遇氣分虛甚者猶必以鷄內金易三稜莪朮也

藥性之補破寒熱雖有一定亦視乎服藥者之資稟爲轉移嘗權衡黃芪之補力與三稜莪朮之破力等分用之原無軒輊嘗用三稜莪朮各三錢治臟腑間一切癥瘕積聚恐其傷氣而以黃芪六錢佐之服至數十劑病去而氣分不傷且有愈服而愈覺強壯者若遇氣分甚虛者纔服數劑即覺氣難支持必須加黃芪或減三稜莪朮方可久服蓋虛極之人補藥難爲功而破藥易見過也若其人氣壯而更兼鬱者又必須多用三稜莪朮或少用黃芪而後服之不至滿悶又嘗權衡黃芪之熱力與知母之寒力亦無軒輊等分用之可久服無寒熱也

此論湯劑作丸劑則知母寒力勝於黃芪熱力

而素畏熱者服之必至增熱素畏寒者服之又轉增寒

其寒熱之力無定亦猶補破之力無定也故臨證調方者務須細心斟酌隨時體驗息息與病機相符而後百用不至一失也古人云良工心苦志在活人者尙無愧斯言也

西法曰小腸外皮光滑內皮摺疊其紋以顯微鏡窺之紋上有尖甚密即吸管之口端吸管者吸喻食物之精液管也百派千支散布腸後夾膜之間與膜同色細微難見食後少頃內有精液始見如白絲然夾膜有小核甚多即吸管回旋疊積所成者一切吸管附近脊處乃合爲一名曰精液總管在腰骨第二節附脊骨而上至頸骨第七節即屈轉而下左入頸下回血會管會者兩管相會合處直達於心食物由胃至小腸頭即與膽汁甜肉汁會合漸落漸榨榨出精液色白如乳衆管吸之初甚稀淡漸入漸濃運至會管即混爲血小腸細管病液核凝大其人多食猶瘡

按小腸吸管實爲血脈化生之門徑設有不通人即病瘡則治勞瘵者宜兼用破血之藥以化其液核之凝大更可知矣

又按胆汁甜肉汁與小腸會合之理西法言之甚詳其說謂胆乃肝液之囊存其汁以待用者也胆汁色綠味極苦繫連右肝內旁之下其汁乃下部回血回血說在第二卷補絡補管湯下至肝所化

其功用能助小腸以化胃中不化之物蓋胃中之液能化蛋白質爲滋養素然不能化澱粉及脂肪迨至傳入小腸小腸飽滿腸頭上逼胆囊使其汁滲入小腸能助小腸榨化一切食物爲乳糜白汁以資養血脈若無胆汁或汁不足用則小腸之物精粗不分糞色白結而不黃矣如胆汁過多則嘔吐苦涎泄瀉色青是也胆管閉塞胆汁滲入血分即有痘病俗名黃病溺色黃赤胆汁之用實以得中爲貴甜肉者即甜肉經長約五寸橫貼幽門胃之下口形如犬舌頭大向右尾尖向左中有一汁液管斜入小腸上口之旁與膽管入小腸處同路所生汁如口津水能參贊膽汁同助小腸以榨化食物

按西人所謂甜肉經唐容川謂當係胰子蓋胰子善於滌油即善消油故能助小腸以化脂肪至化澱粉當全賴膽汁蓋澱粉屬土膽汁屬木木能疏土物理之自然也

醴泉飲 治虛勞發熱或喘或嗽脈數而弱

生山藥 壹兩

大生地 伍錢

人參 肆錢

玄參 肆錢

生赭石 軋細肆錢

牛蒡子 炒搗三錢

天冬 肆錢

甘草 貳錢

勞熱之證大抵責之陰虛有肺陰虛者其人因肺中虛熱薰蒸時時癢而作嗽甚或肺中

有所損傷略一動作輒發喘促宜滋補肺陰兼清火理痰之品有腎陰虛者其人因腎虛不能納氣時時欬逆上氣甚或喘促宜填補下焦真陰兼用收降之品若其脈甚數者陳修園謂宜滋養脾陰蓋以脾脈原主和緩脈數者必是脾陰受傷宜於滋陰藥中用甘草以引之歸脾更兼用味淡之藥如薏米石斛之類

理詳例言第十四頁

特是人身之陰所蓋甚廣凡周身之濕處皆是也故陰虛之甚者其周身血脈津液皆就枯涸必用汁漿最多之藥滋臟腑之陰即以溉周身之液若方中之山藥地黃是也然脈之數者固係陰虛亦係氣分虛弱有不能支持之象猶人之任重而體顫也故用人參以補助氣分與玄參天冬之涼潤者並用又能補助陰分且慮其升補之性與欬嗽上逆者不宜故又佐以赭石之壓力最勝者可使入參補益之力下行直至湧泉而上焦之逆氣浮火皆隨之順流而下更可使下焦真元之氣得人參之峻補而頓旺自能吸引上焦之逆氣浮火下行也至於牛蒡子與山藥並用最善止嗽甘草與天冬並用最善潤肺此又屢試屢效者也

初製此方時原無赭石有丹參三錢以運化人參之補力後治一年少婦人信水數月不行時作寒熱乾嗽連連且兼喘逆胸膈滿悶不思飲食脈數幾至七至治以有丹參原方

不效遂以赭石易丹參一劑欬與喘皆愈強半胸次開通即能飲食又服數劑脈亦和緩共服二十劑諸病皆愈以後凡治婦女月閉血枯寢至虛勞或兼欬嗽滿悶者皆先投以此湯俾其飲食加多身體強壯經水自通間有瘀血暗阻經道或顯有癥瘕可據者繼服拙擬理衝湯或理衝丸皆在第八卷以消融之則婦女無難治之病矣若其人胸中素覺短氣或大便秘滑瀉者又當預防其大氣下陷大氣下陷詳第四卷升陷湯用醴泉飲時宜減赭石牛蒡子並一切蘇子藁仁紫苑杏仁治欬喘套藥皆不宜用

按短氣與喘原迥異短氣者難於呼氣不上達也喘者難於吸氣不下降也而不善述病情者往往謂喘爲上不來氣是以愚生平臨證凡遇自言上不來氣者必細細詢問確知其果係呼氣難與吸氣難而後敢爲施治也

又按方書名欬喘曰欬逆喘曰喘逆因二證多由逆氣上干也而愚臨證實驗以來知因大氣下陷而欬喘者亦復不少蓋肺懸胸中必賴大氣以包舉之而後有所附麗大氣以鼓舞之而後安然呼吸大氣一陷則包舉之力微肺即無所附麗而欬嗽易生鼓舞之機滯肺必努力呼吸而喘促易作曾治一少年泄瀉半載方愈後因勞力過度覺喉中之氣

不舒五六呼吸之間必欬嗽一兩聲而其氣始舒且覺四肢無力飲食懶進診其脉微弱異常知其胸中大氣下陷投以拙擬升陷湯數劑而愈

又曾治一人年近五旬素有喘疾因努力任重舊證復發延醫服藥罔效後愚診視其脉數近六至而兼有沈濡之象愚疑其陰虛不能納氣因其脉兼沈濡不敢用降氣之藥遂用熟地生山藥枸杞玄參大滋真陰之藥大劑煎湯送下人參小塊二錢連服三劑脉即不數仍然沉濡喘雖見輕仍不能愈因思此證得之努力任重胸中大氣因努力而陷所以脉現沉濡且其背惡寒而兼發緊此亦大氣下陷之徵也亦治以升陷湯方中升麻柴胡桔梗皆不敢用以桂枝尖三錢代之因其素有不納氣之證桂枝能升大氣又能納氣歸腎也理詳第二卷參緒氣湯下又外加滋陰之藥數劑全愈詳案在第四卷升陷湯下按此二證之病因與醴泉飲所主之病迥異而其欬喘則同必詳觀升陷湯後跋語及所載諸案始明治此二證之理而附載於此者恐臨證者審證不確誤以醴泉飲治之也

藩陽商家子婁順田年二十二虛勞咳嗽甚形羸弱脈數八至按之即無細詢之自言曾眠熟炕之上晨起覺心中發熱從此食後即吐出夜間咳嗽甚劇不能安寢因二十餘日



寢食俱廢遂覺精神恍惚不能支持愚聞之知脈象雖危仍係新證若久病至此誠難挽回矣遂投以醴泉飲爲其嘔吐將赭石改用一兩

重用赭石之理詳第一卷參赭鎮氣湯下

一劑吐即止可以進食

嗽亦見愈從前五六日未大便至此大便亦通下如此加減服之三日後脈數亦見愈然猶六至餘心中猶覺發熱遂將玄參生地皆改用六錢又每日於午時用白蔗糖沖水送服西藥阿斯必林

藥性詳後參麥湯下

七厘許數日諸病皆愈脈亦復常

潘陽蘇惠堂年三十許勞嗽二年不愈動則作喘飲食減少更醫十餘人服藥數百劑分毫無效羸弱轉甚其姊丈李生在京師見表中參西錄再版大加賞異急郵函俾其來院診治其脈數六至雖細弱仍有根抵知其可治自言上焦恒覺發熱大便三四日一行時或乾燥遂投以醴泉飲爲其便遲而燥赭石改用六錢又加雞內金二錢

搗細

恐其病久臟

腑經絡多瘀滯也數劑後飯量加增心中仍有熱時大便已不燥間日一行遂去赭石二錢加知母二錢俾於晚間服湯藥後用白蔗糖水送服阿斯必林四分瓦之一

瓦之分量得詳於例言

微汗後令於日間服之不使出汗數日不覺發熱脈亦復常惟欬嗽未能全愈又用西藥幾阿蘇六分薄荷冰四分和以綠豆粉爲丸梧桐子大每服三丸日兩次湯藥仍照方服

之五六日後嗽亦愈身體從此康健

按幾阿蘇亦名結列阿曹篤乃乾鰾山毛櫟樹脂和那篤倫滴液而振盪之取其所得之依的兒及依的兒那篤留謨之化合物以硫酸分解之再以鰾精製之得中性透明微黃色油狀之液有竄透特異之烟臭彷彿那布答林俗名洋潮腦其功用近於石炭酸而其抑制

發酵防腐敗之力遠勝石炭酸能消除一切毒菌凝固蛋白質及血液故善治肺結核詳後

麥湯下

及腸胃炎補內外血管破裂妊娠嘔吐小兒吐瀉用其液浸棉臙乾塞牙孔止牙疼如神惟性過乾燥且又臭味難服佐以薄荷冰之辛涼芳香則性味和平以治肺炎肺結核其效尤速故以治久嗽能愈也

幾阿蘇之用量初服宜百分瓦之一久服之可以漸漸加多以加至一次服百分瓦之五爲極量在西藥中甚屬猛烈之品慎勿多服

一味薯蓣飲 治勞瘵發熱或喘或嗽或自汗或心中怔忡或因小便不利致大便滑瀉及一切陰分虧損之證

生懷山藥

肆兩切片

煮汁兩大碗以之當茶徐徐溫飲之

山藥之性能滋陰又能利濕能滑潤又能收澀是以能補肺補腎兼補脾胃且其含蛋白質最多在滋補藥中誠爲無上之品特性甚和平宜多服常服耳

陳修園謂山藥爲尋常服食之物不能治大病非也若果不治大病何以金匱治勞瘵有薯蕷丸嘗治一室女溫病痰喘投以小青龍加石膏湯又遵傷寒論加減法去麻黃加杏仁喘遂定時已近暮一夜安穩至黎明喘大作脈散亂如水上浮麻不分至數此將脫之候也取藥不及適有生山藥兩許急煮汁飲之喘稍定脈稍斂可容取藥方中仍重用山藥而愈

詳案在第六卷仙露湯下

一室女月信年餘未見已成勞瘵臥牀不起治以拙擬資生湯前在復俾日用生山藥四兩煮汁當茶飲之一月之後體漸復初月信亦通見者以此證可愈訝爲異事

一婦人產後十餘日大喘大汗身熱勞嗽醫者用黃連熟地白芍等藥汗出愈多後愚診視脈甚虛弱數至七至審證論脈似在不治俾其急用生山藥六兩煮汁徐徐飲之飲完添水重煮一晝夜所飲之水皆取於山藥中翌日又換山藥六兩仍如此煮飲之三日後諸病皆愈

一人年四十餘得溫病十餘日外感之火已消十之八九大便忽然滑下喘息迫促且有煩渴之意其脈甚虛兩尺微按即無亦急用生山藥六兩煎汁兩大碗徐徐溫飲下以之當茶飲完煎渣再飲兩日共用山藥十八兩喘與煩渴皆愈大便亦不滑瀉西人謂食物中之蛋白質最能益人山藥之汁晶瑩透澈黏而且滑純是蛋白之質故人服之大有補益然必生煮服之其蛋白之質始全若炒焦而後入煎劑其蛋白之質已涸雖服亦何益哉

### 參麥湯

治陰分虧損已久寢至肺虛有痰欬嗽勞喘或兼肺有結核者

人參 三錢

乾麥冬 帶心肆錢

生山藥 陸錢

清半夏 貳錢

牛蒡子 炒搗三錢

蘇子 炒搗貳錢

生杭芍 三錢

甘草 錢半

人參爲補肺之主藥而有肺熱還傷肺之虞有麥冬以佐之則轉能退熱麥冬爲潤肺之要品而有欬嗽忌用之說有半夏以佐之則轉能止嗽至於山藥其收澀也能助人參以補氣其黏潤也能助麥冬以滋液雖多服久服或有壅滯而牛蒡子之滑利實又可以相濟且牛蒡子能降肺氣之逆半夏能降胃氣衝氣之逆蘇子與人參同用又能降逆氣之

因虛而逆平其逆氣則喘與嗽不治自愈矣用白芍者因肝爲肺之對宮肺金虛損不能清肅下行以鎮肝木則肝火恒恣橫而上逆故加芍藥以斂戢其火且芍藥與甘草同用甘苦化合味近人參即功近人參而又爲補肺之品也

按古方多以麥冬治肺虛欬嗽獨徐靈胎謂嗽者斷不宜用蓋以其汁漿膠黏太甚肺中稍有客邪即可留滯不散惟濟以半夏之辛燥開通則不惟治嗽甚效即治喘亦甚效故仲景治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐有竹葉石膏湯麥冬與半夏同用治火逆上氣有麥門冬湯以麥冬爲君亦佐以半夏也又肺虛勞嗽者醫者多忌用半夏是未知半夏之性者也徐靈胎曰肺屬金喜斂而不喜散蓋斂則肺葉垂而氣順散則肺葉張而氣逆半夏之辛與薑桂之辛迥別入喉則閉不能言塗金瘡則血不復出辛中滯澀故能疏又能斂也又辛之斂與酸之斂不同酸則一主於斂辛則斂中有發散之意尤與肺投合也又喻嘉言讚麥門冬湯中用半夏曰於大建中氣大生津液藥中增入半夏之辛溫一味以利咽下氣此非半夏之功實善用半夏之功也

西人謂勞証因肺體生堅粒如沙名都比迦力或在左肺或在右肺或左右俱有右多過

左上多過下先生多小粒在肺本體內漸合爲一大粒久而潰爛成穴穴有大小有肺體全壞者此証各國俱有冷地尤多病原或因父母延累性質易患此証或因身虛居處濕地衣服單薄冷風吹襲或天時寒熱驟變或熱地人遷居冷地或食物不足或屋內臭濁不通風氣或辛苦勞倦或房事過度或飲酒過度在女子或漏經帶下或哺嬰兒太久男女患此証者每在十五歲以上三十歲以下病狀先乾嗽或有血噲出漸至氣短促行動呼吸更促困倦無精神手足疲軟羸瘦頸變細長胸膈變窄略有勤苦則汗出泄瀉食物不化夜臥不安脈微細而數心跳多痰或欬血胸膈時疼聲音不清久則啞手指末節生大甲彎曲以問病筮聽試覺有聲從潰穴泄出夜晚顏色鮮紅早起多冷汗舌苔先白後紅或吐痰稠黏與膿相雜又有總氣管出聲之處潰爛不能出聲者有累大小腸爛色白過常度者有因此肝血不得入肺肝體大過常度者且都比迦力不但肺有之也如小兒疳積肚腹大四肢瘦是因大小腸皮膜生都比迦力飲食之津不能吸入液管所致食雖多不長肌肉法令其改變習氣勿居濕地勿過勞辛勿太煩怒勿提舉重物勿貪色慾勿飲酒過度宜散步間適遊玩怡情遷徙他處變易水土所居之室開戶牖以通外氣着綿

當

亦名背心即無袖之短衣也

令胸背常暖頻用兩臂前後開合令胸肺舒張呼吸大通更用酸醋水洗頸前胸膈各處布巾擦之令熱內服之藥大概以出痰止血斂汗止瀉安身爲主欸嗽用乙畢格散鴉片酒最宜或先用嘔藥以去其痰汗多宜斂鉛散三四厘白礬四五厘能收斂止汗泄瀉者用胆礬二厘鴉片二三厘配水一兩日服二三錢肺疼者貼斑蝥膏藥按西人所謂勞證因肺生都比加力致有種種羸弱冷熱痰嗽諸證勞瘵病中皆有其病狀而用西人所言之治法治之則愈者恒鮮也

迨西歷一千八百九十九年西人遏爾倍兒富兒德氏製阿斯必林藥出治此證較前似有把握其法用阿斯必林一日之間少則一瓦多不過三瓦皆分爲三次服下以退此証之發熱且同時投以止汗之藥以防其出汗過多蓋此証最要之點在於發熱熱愈甚則氣血愈虧實能促病機之進行阿斯必林最善解熱且無不良之輔作用惟其性善發汗而過汗非體虛者所宜故以同時服止汗之品以防其過汗也

東人衍西人之說名其病曰肺結核其治法不出西人範圍至丁仲祐推廣其說謂此証自始至終之經過未有不發熱者因感染結核菌後有一種物質生交換產物與崩壞產

物吸收時影響於體溫者皆甚大熱即由是而生又因釀膿菌及各種細菌

連鎖球菌葡萄球菌綠膿菌四疊菌

類之侵入起混合續發性傳染氣管與空洞之分泌物因之分解發生腐敗性及毒素性

之物質此物質吸收之際亦發生此熱夫罹此証者營養原極缺乏加以發熱不已則食機不振心力萎弱分泌蛋白質日見消耗宜用阿斯必林一瓦半和以乳糖分三次服下佐以利痰健胃之藥至於結核之証兼小便下血其生殖器官亦有結核者治以阿斯必林而以清血止血之藥佐之

愚對於此証悉心研究知其治法當細分爲數種其證有自腎傳肺者如西人所謂色慾過度及女子經漏帶下致肺生都比加力者是也有自肺傳腎者如西人所謂肺生都比加力以致現出種種陰虛之證而成勞瘵者是也有因肺腎交病而累及脾胃者如丁仲祐所謂結核發熱致食機不振者是也腎傳肺者以大滋真陰之藥爲主以清肺理痰之藥爲佐若拙擬之醴泉飲在前是也肺傳腎者以清肺理痰之藥爲主以滋補真陰之藥爲佐若此麥麥湯是也其因肺腎俱病而累及脾胃者宜肺腎雙補而兼顧其脾胃若拙擬之滋培湯在第二卷珠玉二寶粥在後是也如此分途施治斟酌咸宜而又兼服阿斯必林凡其



脈之稍有根柢可挽回者需以時日皆愈也至於但肺有結核而未累及他臟者可於斯

編肺病門中

在第二卷

酌其治法

第五期三卷載有論肺病治法實合虛勞肺病詳細論之也凡治虛勞及肺病者皆宜參觀

阿斯必林係用亞里斯爾酸

即楊曹其原質在於楊柳皮中

製成其形狀爲白色細針形之結晶無臭微酸似

有楊柳皮汁氣味其性涼而能散善退外感之熱初得外感風熱服之出涼汗即愈兼能退內傷之熱肺結核者藉之以消除其熱誠有奇效又善治急性關節腫疼發表痘毒癩疹及腸胃炎肋膜炎諸證西藥中之最適用者也

特其發汗之力甚猛若結晶堅而大者以治外感半瓦即可出汗若當天氣寒涼或近寒帶之地須服至一瓦或至瓦半若其略似白粉微有結晶者藥力薄弱服至一瓦方能出汗多可服至瓦半或二瓦是在臨證者相其藥力之優劣而因時因地因人制宜也

至用阿斯必林治內傷其分量尤須少用因內傷發熱之人陰虛陽浮最易發汗西人用治肺結核之熱日服三瓦其在歐洲地寒且其人自幼多肉食臟腑營衛壯固或者猶可在吾中華則定然不可以丁仲祐用阿斯必林治肺結核一日三次共服一瓦半則視西人所用之分量減半矣

愚用阿斯必林治肺結核視西人所用之數則減之又減曾治一少年染肺結核欬嗽食少身體羸弱半載不愈求爲診治遂投以理肺清痰健胃滋陰之藥又於晚間臨睡時用白蔗糖沖水送服阿斯必林三分瓦之一須臾周身即得大汗過三點鐘其汗始止翌日覺周身酸懶蓋因汗太過也而欬嗽則較前見輕食慾亦少振繼服滋補之藥數劑每日止用阿斯必林六分瓦之一作一次服下或出微汗或不出汗從此精神漸漸清爽調治月餘而愈自此以後用阿斯必林治肺結核必先少少試服初次斷不敢稍多也

至西人謂防其出汗可與止汗之藥同服亦係善法然仍恐服後止汗之藥不效而阿斯必林之發汗仍然甚效也愚治肺結核證若一日用至一瓦或一瓦強恆作十次或十餘次服下勿須用止汗之藥亦可不出汗即有時微見汗亦係佳兆

凡勞瘵陰虛之證其脈之急數者無論肺結核與不結核於每服滋補劑外皆宜服阿斯必林或半瓦或至一瓦恐其出汗多分幾次服下其初日服之俾微見汗後日日常服以或出汗或不出汗爲適宜如此旬日之間脈之數者可漸和緩

乳糖係用牛乳製乾酪之際蒸發其所生之甘乳清而採取精製者也若無乳糖即以白

蔗糖代之功效相同

珠玉二寶粥

治脾肺陰分虧損飲食懶進虛熱勞嗽並治一切陰虛之證

生山藥二兩

生薑米二兩

柿霜餅八錢

右三味先將山藥薏米搗成粗渣煮至爛熟再將柿霜餅切碎調入融化隨意服之山藥薏米皆清補脾肺之藥然單用山藥久則失於黏膩單用薏米久則失於淡滲惟等分並用乃可久服無弊又用柿霜之涼可潤肺甘能歸脾者以爲之佐使病人服之不但療病並可充飢不但充飢更可適口用之對證病自漸愈即不對證亦無他患誠爲至穩善之方也 薏米若購自藥房多係陳者或間有虫糞宜水淘數次然後可用柿霜餅即柿霜熬成者爲柿霜白而淨者甚少故用其熬成餅者然熬此餅時恒有攪以薄荷水者其性即不純良遇陰虛汗多之證用之即有不宜若果有白淨柿霜尤勝於餅

一少年因感冒懶於飲食猶勤稼穡枵腹力作遂成勞嗽過午發熱徹夜欬吐痰涎醫者因其年少多用滋陰補腎之藥間有少加參朮者調治兩月不效飲食減少痰涎轉增漸至不起脈虛數兼有弦象知其脾肺皆有傷損也授以此方俾一日兩次服之半月全愈

或問脈現弦象何以卽知其脾肺傷損答曰脈雖分部位而其大致實不分部位今此證左右之脈皆弦夫弦爲肝脈肝盛必然侮脾因肝屬木脾屬土也且五行之中惟土可以包括四行卽脾氣可以包括四臟故六部脈中皆以和緩爲貴以其饒有脾土之氣也今其脈不和緩而弦硬其脾氣受傷不能包括四臟可知又肺屬金所以鎮肝木者也故肺金清肅之氣下行肝木必不至恣橫卽脈象不至於弦今其脈旣現如此弦象則肺金受傷不能鎮肝木更可知也

沃雪湯

治同前證更兼腎不納氣作喘者

生山藥一兩半

牛蒡子炒搗肆錢

柿霜餅沖服六錢

一人年四十餘素有喘證薄受外感卽發醫者投以小青龍湯一劑卽愈習以爲常一日喘證復發連服小青龍湯三劑不愈其脈五至餘右寸浮大重按卽無知其從前服小青龍卽愈者因其證原受外感今服之而不愈者因此次發喘原無外感也蓋其薄受外感卽喘肺與腎原有傷損但知治其病標不知治其病本則其傷損必益甚是以此次不受外感亦發喘也爲擬此湯服兩劑全愈又服數劑以善其後

水晶桃 治肺腎兩虛或欬嗽或喘逆或腰膝痠疼或四肢無力以治孺子尤佳

核桃仁二斤

柿霜餅一斤

先將核桃仁飯甑蒸熟再與柿霜餅同裝入瓷器內蒸之融化爲一晾冷隨意服之果之有核猶人之有骨是以骨亦名骸其右旁皆從亥也腎主骨而爲生育之本果核之仁亦爲生生之機故凡果核之仁具補益之性者皆能補腎核桃乃果核之最大者其仁既多脂味更香美爲食中佳品性善補腎可知柿霜色白入肺而甘涼滑潤其甘也能益肺氣其涼也能清肺熱其滑也能利肺痰其潤也能滋肺燥與核桃同用肺腎同補金水相生虛者必易壯實且食之又甚適口飢時可隨便服之故以治小兒尤佳也

(附方)俗傳治勞嗽方秋分日取鮮萊菔十餘枚去葉自葉中心穿以鮮槐條令槐條頭透出根外懸於茂盛樹上滿百日至一百零一日取下用時去槐條將萊菔切片煮爛調紅沙糖服之每服一枚數服即愈

按萊菔色白入肺槐條色黑入腎如此作用蓋欲導引肺氣歸腎其懸於茂盛樹上者因茂樹之葉多吐養氣萊菔藉養氣醞釀其補益之力必增也懸之必滿百日者欲其飽經

霜露借金水之氣以補金水之臟也。邑中孫姓，年近六旬，勞喘百藥不效。後得此方服之，而愈。每歲多備此藥，以贈勞喘者服之，愈者甚多。六卷仙露飲後附有來函中載治嗽方，其第二方甚效，宜選用。

既濟湯

治大病後陰陽不相維繫，陽欲上脫，或喘逆，或自汗，或目睛上竄，或心中搖搖如懸旌，陰欲下脫，或失精，或小便不禁，或大便滑瀉，一切陰陽兩虛，上熱下涼之證。

大熟地 一兩

萸肉 去淨核 一兩

生山藥 六錢

生龍骨 搗細 六錢

生牡蠣 搗細 六錢

茯苓 三錢

生杭芍 三錢

烏附子 一錢

一人年二十餘，稟資素羸弱，又耽烟色，於秋初患瘧，兩旬始愈。一日大便滑瀉，數次頭面汗出，如藩精神積潰，昏昏似睡，其脈上盛下虛，兩寸搖搖，兩尺欲無數，至七至延醫二人，皆不疏方。愚後至，爲擬此湯一劑而醒，又服兩劑，遂復初。

友人張壽田

滄州人其子姪從愚學醫

曾治一少年，素患心疼，發時晝夜號呼，醫者屢投以消通之藥，致

大便滑瀉，虛氣連連下泄，汗出如洗，目睛上泛，心神驚悸，周身顫動，須人手按而心疼如故。延醫數人，皆不敢疏方。壽田投以此湯，將方中萸肉倍作二兩，連服兩劑，諸病皆愈。心疼竟從此除根。

或問既濟湯原爲救脫之藥方中何以不用人參答曰人參之性補而兼升以治上脫轉有氣高不返之虞喻嘉言寓意草中論之甚詳惟與赭石同用始能納氣歸根而證兼下脫者赭石又不宜用爲不用赭石所以不敢用人參且陽之上脫也皆因真陰虛損不能潛藏元陽陽氣始無所繫戀而上奔故方中重用熟地山藥以峻補真陰俾陰足自能潛陽而佐以附子之辛熱原與元陽爲同氣協同芍藥之苦降本經味苦自能引浮越之元陽下歸其宅更有萸肉龍骨牡蠣以收斂之俾其陰陽固結不但元陽不復上脫而真陰亦永不下脫矣

或問此方能治脫證宜矣而並能治心疼者何也答曰凡人身內外有疼處皆其氣血痺而不通本經謂山茱萸主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺是萸肉不但酸斂而更善開通可知李士材治肝虛作疼萸肉與當歸並用愚治肝虛腿疼曾重用萸肉隨手奏效詳案在第四卷蓋萸肉得木氣最厚酸斂之中大具條暢之性故善於治脫尤善於開痺也大抵其證原屬虛痺氣血因虛不能流通而作疼醫者不知惟事開破迨開至陰陽將脫而其疼如故醫者亦束手矣而投以此湯惟將萸肉加倍竟能於救脫之外更將心疼除根此非

愚製方之妙實壽田之因證施用而善於加減也

來復湯

治寒溫外感諸證大病瘥後不能自復寒熱往來虛汗淋漓或但熱不寒汗出而熱解須臾又熱又汗目睛上竄勢危欲脫或喘逆或怔忡或氣虛不足以息諸證若見一端即宜急服

黃

肉去淨核貳兩

生龍骨搗細壹兩

生牡蠣搗細壹兩

生杭芍陸錢

野台參

陸錢

甘草蜜炙貳錢

一人年二十餘於孟冬得傷寒證調治十餘日表裏皆解忽徧身發熱頓飯頃汗出淋漓熱頓解須臾又熱又汗若是兩晝夜勢近垂危倉猝迎愚診治及至見汗出渾身如洗目上竄不露黑睛左脈微細模糊按之即無此肝胆虛極而元氣欲脫也蓋肝胆虛者其病象爲寒熱往來此證之忽熱忽汗亦即寒熱往來之意急用淨黃肉二兩煎服熱與汗均愈其半遂爲擬此方服兩劑而病若失

一人年四十餘外感痰喘愚爲治愈但脈浮力微按之即無愚曰脈象無根當服峻補之劑以防意外之變病家謂病人從來不受補藥服之則發狂疾峻補之藥實不敢用愚曰



既畏補藥如是備用亦可病家依愚言遲半日忽發喘逆又似無氣以息汗出徧體四肢逆冷身軀後挺危在頃刻急用淨莢肉四兩爆火煎一沸即飲下汗與喘皆微止又添水再煎數沸飲下病又見愈復添水將原渣煎透飲下遂汗止喘定四肢之厥逆亦回

一少年素傷烟色又感冒風寒醫者用表散藥數劑治愈間日忽徧身冷汗心怔忡異常自言氣息將斷急求爲調治診其脈浮弱無根左右皆然愚曰此證雖危易治得莢肉數兩可保無虞時當霖雨藥坊隔五里許遣快騎冒雨急取淨莢肉四兩人參五錢先用莢肉二兩煎數沸急服之心定汗止氣亦接續又將人參切作小塊用所餘莢肉煎濃湯送下病若失

一人年四十八大汗淋漓數日不止衾褥皆濕勢近垂危詢方於愚俾用淨莢肉二兩煎湯飲之其汗遂止翌晨迎愚診視其脈沉遲細弱而右部之沉細尤甚雖無大汗徧體猶濕疑其胸中大氣下陷詢之果覺胸中氣不上升有類巨石相壓乃恍悟前此之汗亦係大氣陷後衛氣無所統攝而外泄之故遂用生黃芪一兩莢肉知母各三錢一劑胸次豁然汗亦盡止又服數劑以善其後

此案參看第四卷升陷湯後跋語方明

一妊婦得霍亂證吐瀉約一晝夜病稍退胎忽滑下覺神氣頓散心搖搖似不能支持求愚治療既至則病勢大革殮服在身已昇諸牀病家欲竟不診視愚曰一息猶存即可挽回診之脈若有若無氣息奄奄呼之不應取藥無及適比舍翁預購藥兩劑未服亦係愚方共有莢肉六錢急揀出煎湯灌下氣息稍大呼之能應又取莢肉生山藥各二兩煎湯一大碗徐徐溫飲下精神頓復俾日用生山藥末兩餘煮粥服之以善其後

歷觀以上諸案則莢肉救脫之功較參朮更勝哉蓋莢肉之性不獨補肝也凡人身之陰陽氣血將散者皆能斂之故救脫之藥當以莢肉爲第一而本經載於中品不與參朮並列者竊憶古書竹簡章編易於錯簡此或錯簡之誤歟

凡人元氣之脫皆脫在肝故人虛極者其肝風必先動肝風動即元氣欲脫之兆也又肝與胆臟腑相依胆爲少陽有病主寒熱往來肝爲厥陰虛極亦爲寒熱往來爲有寒熱故多出汗莢肉既能斂汗又善補肝是以肝虛極而元氣將脫者服之最效愚初試出此藥之能力以爲一己之創見及詳觀神農本經山茱萸原主寒熱其所主之寒熱即肝經虛極之寒熱往來也特從前涉獵觀之忽不加察且益歎本經之精當實非後世本草所能

及也又本經謂山菜莢能逐寒濕痺是以前方可用以治心腹疼痛四卷曲直湯用以治肢體疼痛爲其味酸能斂二卷中補絡補管湯用之以治欬血吐血再合以此方重用之最善救脫斂汗則山菜莢功用之妙真令人不可思議矣

(附錄)湖北張港崔蘭亭君來函 張港紅十字會朱總辦之兒媳產後角弓反張汗出如珠六脈散亂無根有將脫之象迎爲診治急用淨莢肉二兩俾煎湯服之一劑卽愈舉家感謝云先生之方如此效驗神速真神醫也愚應之曰此非我之功乃著衷中參西錄者之功也總辦因作詩一首託寄先生相謝且以表揚先生之大德云

鎮攝湯 治胸膈滿悶其脉大而弦按之似有力非真有力此脾胃真氣外泄衝脉逆氣上千之證慎勿作實證治之若用開通之藥凶危立見服此湯數劑後脈見柔和卽病有轉機多服自愈

野台參

伍錢

生赭石

軋細伍錢

生芡實

伍錢

生山藥

伍錢

莢肉

去淨核伍錢

清半夏

貳錢

茯苓

貳錢

服藥數劑後滿悶見輕去芡實加白朮二錢

脈之真有力者皆有洪滑之象洪者如波濤疊湧勢作起伏滑者指下滑潤纍纍如貫珠此脈象弦直既無起伏之勢又無貫珠之形雖大而有力實非真有力之象

和緩者脾胃之正脈弦長者肝胆之正脈然脾胃屬土其脈象原宜包括金木水火諸臟腑故六部之脈皆有和緩乃爲正象今其脈弦而有力乃肝木橫恣侵侮脾土之象故知其脾胃虛也

衝脈上隸陽明故衝氣與胃氣原相貫通今因胃氣虛而不降衝氣即易於上干此時脾胃氣化不固既有外越之勢衝氣復上干而排擠之而其勢愈外越故其脈又兼大也一媼年過六旬胸腹滿悶時覺有氣自下上衝飲食不能下行其子爲書賈且知醫曾因竇書至愚書校述其母病證且言脈象大而弦硬爲擬此湯服一劑滿悶即減又服數劑全愈

一人年近五旬心中常常滿悶嘔吐痰水時覺有氣起自下焦上衝胃口其脈弦硬而長右部尤甚此衝氣上衝並迫胃氣上逆也問其大便言甚乾燥遂將方中赭石改作一兩又加知母生牡蠣各五錢厚朴蘇子各錢半連服六劑全愈

# 衷中參西錄前三期合編第二卷

## 治喘息方

參赭鎮氣湯

治陰陽兩虛喘逆迫促有將脫之勢亦治腎虛不攝衝氣上干致胃氣不

降作滿悶

野台參 肆錢

生赭石 軋細陸錢

生芡實 伍錢

生山藥 伍錢

炙肉 去淨核陸錢

生龍骨 搗細陸錢

生牡蠣 搗細陸錢

生杭芍 肆錢

蘇子 炒搗貳錢

一婦人年三十餘勞心之後兼以傷心忽喘逆大作迫促異常其翁知醫以補斂元氣之藥治之覺胸中窒礙不能容受更他醫以爲外感投以小劑青龍湯喘益甚延愚診視其脉浮而微數按之即無知爲陰陽兩虛之證蓋陽虛則元氣不能自攝陰虛而肝腎又不能納氣故作喘也爲製此湯病人服藥後未及覆杯曰吾有命矣詢之曰從前呼吸惟在喉間幾欲脫去今則轉落丹田矣果一劑病愈強半又服數劑全愈

按生赭石壓力最勝能鎮胃氣衝氣上逆開胸隔墜痰涎止嘔吐通燥結用之得當誠有捷效虛者可與人參同用一人當上脘處發瘡大如核桃破後調治三年不愈瘡口大如

錢覺自內潰爛循脇漸至背後每日自背後以手排擠至瘡口流出膿水若干求治於愚  
自言自患此瘡後三年未嘗安枕強臥片時即覺有氣起自下焦上逆衝心愚曰此即汝  
瘡之病根也俾用生芡實一兩煮濃汁送服生赭石細末五錢遂可安臥又服數次徹夜  
穩睡蓋氣上逆者乃衝氣之上衝用赭石以鎮之芡實以欽之衝氣自安其宅也繼用拙  
擬活絡效靈丹在第四卷加生黃芪生赭石各三錢煎服日進一劑半月全愈

一人傷寒病瘥後忽痰涎上湧杜塞咽喉幾不能息其父用手大指點其天突穴息微通  
點天突穴法詳第三卷急迎愚調治遂用香油二兩熬熱調麝香一分灌之旋灌旋即流出痰涎若干

繼用生赭石一兩人參六錢蘇子四錢煎湯徐徐飲下痰涎頓開

一婦人年近五旬得溫病七八日表裏俱熱舌苔甚薄作黑色狀類舌斑此乃外感兼內  
虧之證醫者用降藥兩次下之遂發喘逆令其子兩手按其心口即可不喘須臾又喘又  
令以手緊緊按住喘又少停診其脈尺部無根寸部搖搖此將脫之候也時當仲夏俾用  
生鷄子黃四枚調新汲井泉水服之喘稍定可容取藥遂用赭石細末二錢同生鷄子黃  
二枚溫水調和服之喘遂愈脈亦安定繼服參赭鎮氣湯以善其後

一婦人連連嘔吐五六日間勺水不存大便亦不通行自覺下腕之處疼而且結凡藥之有味者入口即吐其無味者須臾亦復吐出醫者辭不治後愚診視脈有滑象上盛下虛疑其有妊詢之言月信不見者五十日矣然結證不開危在目前內經謂有故無損亦無損也遂單用赭石二兩煎湯飲下覺藥力至結處不能下行復返而吐出繼改用赭石四兩又重羅出細末兩許將餘三兩煎湯調細末服下其結遂開大便亦通自此安然無恙至期方產

友人毛仙閣曾治一婦人胸次鬱結飲食至胃不能下行時作嘔吐仙閣用赭石細末六錢濃煎人參湯送下須臾腹中如爆竹之聲胸次胃中俱覺通豁至此飲食如常

友人高夷清曾治一人上焦滿悶艱於飲食胸中覺有物窒塞醫者用大黃蘗實陷胸之品十餘劑轉覺胸中積滿上至咽喉飲水一口即溢出夷清用赭石二兩人參六錢爲方煎服頓覺窒塞之物降至下焦又加當歸肉蓯蓉再服一劑降下瘀滯之物若干病若失友人李景南曾治一人寒痰壅滯胃中嘔吐不受飲食大便旬日未行用人參八錢乾薑六錢赭石一兩一劑嘔吐即止又加當歸五錢大使得通而愈

門人高如璧曾治一叟年七十餘得呃逆證兼小便不通劇時覺杜塞咽喉息不能通兩目上翻身軀後挺更醫數人治不效如璧診其脈浮而無力遂用赭石台參生山藥生芡實牛蒡子爲方投之呃逆頓愈又加竹茹服一劑小便亦通利

歷觀以上諸治驗案赭石誠爲救顛扶危之大藥也乃如此良藥今人罕用間有用者不過貳叁錢藥不勝病用與不用同也且愚放胆用至數兩者非鹵莽也誠以臨證既久凡藥之性情能力及宜輕宜重之際研究數十年心中皆有定見而後敢如此放膽百用不至一失且赭石所以能鎮逆氣能下有形瘀滯者以其饒有重墜之力於氣分實分毫無損況氣虛者又佐以人參尤爲萬全之策也其藥雖係石質實與他石質不同即未經火煨爲末服之亦與腸胃無傷此從精心實驗而知故敢確鑿言之

或曰赭石質甚重墜故別錄謂其墜胎諸案中如此重用赭石以治他證猶可以治姙婦惡阻腸胃堅結縱能治愈獨不近於行險乎答曰此中理甚精奧非細心研究不知也赭石之原質係鐵七養三化合而成其實原與鐵銹相似鐵與養氣化合則生銹鐵銹善補血赭石亦善補血故本經謂其主赤沃漏下別錄謂其治帶下養血氣日華謂其治月經不止普濟方



用治血崩統視以上主治則赭石善於理血養血可知既能養血其血足不自能墜胎乎而別錄謂其墜胎者指五六月以後之胎而言也蓋五六月以後之胎已成形體赭石重墜有壓力故可迫之下墜若惡阻時胞室之血脉初次凝結無所謂形體也此時惟過用破血之藥可以墜胎豈善於養血之赭石服之亦慮其墜胎乎且惡阻至於腸胃堅結百藥不效惟重用赭石猶可救挽縱有墜胎之弊猶當權其事之輕重緩急而放胆用之此孫思邈所謂心欲小而胆欲大也况用之又斷不至墜胎乎 按赭石色赤養氣與鐵化合之色也其原質類鐵銹故與鐵銹同色鐵銹研末服之不妨腸胃故赭石生研服之亦於腸胃無損也鐵銹之生層層作薄片而赭石亦必層層作薄片且其每片之兩面一點點作凸形一面點點作凹形者方爲真赭石故有釘頭赭石及龍眼赭石之名

仲景旋覆代赭石湯赭石人參並用治傷寒汗吐下解後心下痞鞭噫氣不除參赭鎮氣湯中人參藉赭石下行之力挽回將脫之元氣以鎮安奠定之亦旋覆代赭石湯之義也一婦人年二十餘因與其夫反目怒吞鴉片已經救愈忽發喘逆迫促異常須臾又呼吸頓停氣息全無約十餘呼吸之頃手足亂動似有蓄極之勢而喘復如故若是循環不已

勢近垂危延醫數人皆不知爲何病後愚診視其脈左關弦硬右寸無力精思良久恍然悟曰此必怒激肝胆之火上衝胃氣夫胃氣本下行者也因肝胆之火衝之轉而上逆並迫肺氣亦上逆此喘逆迫促所由來也逆氣上干填塞胸膈排擠胸中大氣使之下陷夫肺懸胸中須臾無大氣包舉之即須臾不能呼吸此呼吸頓停所由來也此理參觀第四卷升陷湯後跋語方明迨大氣蓄極而通仍上達胸膈鼓動肺臟使得呼吸逆氣遂仍得施其擊撞此又病勢之所以循環也神農本經載桂枝主上氣欬逆結氣喉痺吐吸吸不歸根即吐出其能降逆氣可知其性溫而條達能降逆氣又能升大氣可知遂單用桂枝尖三錢煎湯飲下須臾氣息調和如常夫以桂枝一物之微而升降逆兩擅其功以挽回人命於頃刻誠天之生斯使獨也然非親自經驗者又孰信其神妙如是哉繼用參赭鎮氣湯去山藥蘇子加桂枝尖三錢知母四錢連服數劑病不再發此喘證之特異者故附記於此

薯蕷納氣湯

治陰虛不納氣作喘逆

生山萸壹兩

大熟也伍錢

萸肉去淨核伍錢

柿霜餅沖服肆錢

生杭芍肆錢

牛蒡子 炒搗武錢

蘇

子 炒搗武錢

甘草 蜜炙武錢

生龍骨 搗細伍錢

前方治陰陽兩虛作喘此方乃專治陰虛作喘者也方書謂肝腎虛者其人即不能納氣此言亦近理然須細爲剖析空氣中有養氣乃養物之生氣也

養氣詳解在後  
補絡補管湯下

人之肺臟下無

透竅而吸入之養氣實能隔肺胞息息透過以下達腹中充養周身肝腎居於腹中其氣化收斂不至澎漲自能容納下達之氣且能導引使之歸根有時腎虛氣化不攝則上注其氣於衝以衝下連腎也夫衝爲血海實亦主氣今因爲腎氣貫注則衝氣又必上逆於胃以衝上連胃也由是衝氣兼挾胃氣上逆並迫肺氣亦上逆矣此喘之所由來也又內經謂肝主疏泄腎主閉藏夫肝之疏泄原以濟腎之閉藏故二便之通行相火之萌動皆與肝氣有關方書所以有肝行腎氣之說今因腎失其閉藏之性肝遂不能疏泄腎氣使之下行更迫於腎氣之澎漲轉而上逆由斯其逆氣可由肝系直透膈上亦能迫肺氣上逆矣此又喘之所由來也方中用地黃山藥以補腎莢肉龍骨補肝即以斂腎芍藥甘草甘苦化陰合之柿霜之涼潤多液均爲養陰之妙品蘇子牛蒡又能清痰降逆使逆氣轉而下行即能引藥力速於下達也至方名薯蕷納氣湯者因山藥補腎兼能補肺且饒有

收斂之力其治喘之功最弘也

或問養氣雖能隔肺胞透過亦甚屬些些無多何以當吸氣內入之時全腹皆有澎漲之勢答曰若明此理益知所以致喘之由人之臟腑皆賴氣以撐懸是以膈上有大氣司肺呼吸者也膈下有中氣保合脾胃者也臍下有元氣固性命之根蒂者也當吸氣入肺之時肺胞澎漲之力能鼓舞諸氣節節運動下移而周身之氣化遂因之而流通且喉管之分支下連心肝以通於奇經諸脈當吸氣內入之時所吸之氣原可由喉管之分支下達以與肺中所吸之氣相助爲理也下焦肝腎奇經與腎相維繫屬陰陰虛氣化不攝則內氣澎漲遂致吸入之氣不能容受而急於呼出此陰虛者所以不納氣而作喘也

滋培湯

治虛勞喘逆飲食減少或兼欬嗽並治一切陰虛羸弱諸證

生山藥壹兩

於朮炒三錢

陳廣皮貳錢

牛蒡子炒搗貳錢

生杭芍叁錢

玄參三錢

生赭石軋細三錢

炙甘草貳錢

痰鬱肺竅則作喘腎虛不納氣亦作喘是以論喘者恆責之肺腎二臟未有責之於脾胃者不知胃氣宜息息下行有時不下行而轉上逆並迫肺氣亦上逆即可作喘脾體中空

能容納諸回血管之血運化中焦之氣以爲氣血寬閒之地有時失其中空之體或變爲緊縮或變爲脹大以致壅激氣血上逆迫肺亦可作喘且脾脈緩大爲太陰濕土之正象虛勞喘嗽者脈多弦數與緩大之脈反對乃脾土之病脈也故重用山藥以滋脾之陰佐以於朮以理脾之陽脾臟之陰陽調和自無或緊縮或漲大之虞特是脾與胃臟腑相依凡補脾之藥皆能補胃而究之臟腑異用脾以健運磨積宣通津液爲主胃以熟腐水穀傳送糟粕爲主若但服補藥壅滯其傳送下行之機胃氣或易於上逆故又宜以降胃之藥佐之方中之赭石陳皮牛蒡是也且此數藥之性皆能清痰涎利肺氣與山藥玄參並用又爲養肺止嗽之要品也用甘草白芍者取其甘苦化合大有益於脾胃兼能滋補陰分也並治一切虛勞諸證者誠以脾胃健壯飲食增多自能運化精微以培養氣血也一人年二十二喘逆甚劇脈數至七至用一切治喘藥皆不效爲製此方將藥煎成因喘劇不能服溫湯三次始服下一劑見輕又服數劑全愈或問藥之健脾胃者多不能滋陰分能滋陰分者多不能健脾胃此方中芍藥甘草同用何以謂能兼此二長答曰本經謂芍藥味苦後世本草謂芍藥味酸究之芍藥之味苦酸

皆有陳修園篤信本經謂芍藥但苦不酸然嚼服芍藥錢許恆至齏齒兼有酸味可知若取其苦味與甘草相合有甘苦化陰之妙

甘苦化陰說始於葉天士

故能滋陰分若取其酸味與甘草相

合有甲已化土之妙

甲木味酸已土味甘

故能益脾胃此皆取其化出之性以爲用也又陳修園曰芍

藥苦平破滯本瀉藥非補藥也若與甘草同用則爲滋陰之品與生薑大棗桂枝同用則爲和營衛之品與附子乾薑同用則能收斂元陽歸根於陰又爲補腎之品本非補藥昔賢往往取爲補藥之主其旨微矣按此論甚精能示人用藥變化之妙故連類及之

西人謂心有病可以累肺作喘此說誠信而有徵蓋喘者之脈多數夫脈之原動力發於

心脈動數則心動亦數可知心左房之赤血與右房之紫血皆與肺循環相通

理詳後定心湯下

若

心動太急偏血之力過於常度則肺臟呼吸亦因之速過常度此自然之理也然心與腎爲對待之體心動若是之急數腎之真陰不能上潮以靖安心陽可知由是言之心累肺作喘之證亦即腎虛不納氣之證也

西人又謂喘證因肺中小氣管痰結塞住忽然收縮氣不通行呼吸短促得痰出乃減有日日發作者又數日或因辛苦寒冷而發作者又有因父母患此病傳延者發作時苦劇

不安醫治無良法應用紙浸火硝水內取出晒乾置盆內燃點乘烟燄薰騰時以口吸養氣入肺火硝多含養氣或用醉仙桃乾葉當烟吸之內服樟腦鴉片酒壹貳錢更加薑末一分半白

礬七厘共爲散水調服雖未必能除根亦可漸輕按此證乃勞疾之傷肺者當名爲肺勞雖發作時甚劇仍可久延歲月其治法當用拙擬黃蘗膏黃蘗膏在後

按醉仙桃即曼陀羅花也其花白色狀類牽牛而大其葉大如掌而有尖結實大如核桃實蒂有托盤如錢皮有芒刺如包麻中含細粒如火麻仁渤海之濱生殖甚多俗呼爲洋金花李時珍謂服之令人昏昏如醉可作麻藥又謂熬水洗脫肛甚效蓋大有收斂之功也西人藥學謂用醉仙桃花實葉俱要鮮者榨汁或熬乾或晒乾作膏每服三厘能補火止疼令人熟睡善療喘嗽正與時珍之說相似然此物有毒不可輕用今人治勞喘者多有取其花與葉作烟吸之者實有目前捷效較服其膏爲妥善也

### 治陽虛方

敦復湯

治下焦元氣虛憊相火衰微致腎弱不能作強

內經云腎者作強之官

脾弱不能健運或腰

膝痠疼或黎明泄瀉一切虛寒諸證

野台參

肆錢

烏附子

三錢

生山藥

伍錢

補骨脂

炒搗肆錢

核桃仁

三錢

萸肉

去淨核肆錢

茯苓

錢半

生鷄內金

搗細錢半

或問人之相火生於下焦而遊行於中焦上焦夫下焦既爲相火所生之地其處當熱於他處何以人之下焦轉多畏寒乎答曰此段理解微妙難言然可罕譬而喻也君不見夫西洋火柴乎夫火柴原蘊蓄一團火氣然以手捫之初不覺其熱也惟手執火柴以其頂着物而劃之且劃至如許之遠而後火發而熱熾是以火柴之火與熱實生於與物相磨之道路也火柴有然人身之相火何莫不然當其初起於命門原是一縷生發之氣息息上達以流行於周身與周身之經絡相磨相盪而生熱猶火柴之劃物而生熱也是人之下焦所以多畏寒者誠以相火始生其熱力猶微也且相火爲水中之元陽乃陰中之火猶兩間之電氣也電氣無處不有隨物而寓即含電氣最多之物亦非熱於他物如鐵能含電尤善傳電西人以兩鐵相磨而生電光兩鐵之相磨愈速電光之生亦愈速故凡欲補相火者須兼補腎中元氣元氣旺則流行於周身者速磨盪於經絡者必加力而相火之熱力即因之而增也故拙擬救復湯原爲補相火之專方而方中以人參爲君與萸肉



茯苓並用藉其收斂下行之力能大補腎中元氣元氣既旺相火自生又用烏附子補骨髓之大熱純陽直達下焦以助相火之熱力核桃仁之溫潤多脂峻補腎臟以厚相火之基址且附子與人參同用名參附湯爲回元陽之神丹補骨髓與核桃仁並用名青蛾丸爲助相火之妙品核桃仁屬本補骨髓屬火並用之有木火相生之妙又恐藥性太熱於下焦真陰久而有礙故又重用生山藥取其汁漿稠黏能滋下焦真陰其氣味甘溫又能固下焦氣化也至於鷄內金其健運脾胃之力既能流通補藥之滯其取澀膀胱之力又能逗留熱藥之性也

人身之熱力方書恆責重相火而不知君火之熱力較相火尤勝蓋生育子女以相火爲主消化飲食以君火爲主君火發於心中爲陽中之火其熱下濟大能溫暖脾胃助其消化之力此火一衰脾胃消化之力頓減若君火旺而相火衰者其人仍能多飲多食可享大壽是知君火之熱力關於人身者甚大也愚自臨證實驗以來遇君火虛者不勝記其人多廉於飲食寒飲留滯爲恙投以辛熱升補之劑即隨手奏效拙擬理飲湯爲治是病的方方在第三卷彼謂心臟惡熱用藥惟宜寒涼者猶是一偏之論曾治一人年二十餘嗜睡無節即動作飲食之時亦忽然昏倒鼾睡診其脈兩尺洪滑有力知其腎經實而且熱也遂用黃柏知母各八

錢茯苓澤瀉各四錢數劑而愈是知人之資稟不齊心臟多惡熱而亦有宜溫補者腎臟多惡寒而亦有宜涼瀉者是在臨證時細心與之消息不可拘於成見也

欲明心火之熱力今又得一確實徵驗愚資稟素強壯心火頗旺而相火少衰飲食不忌寒涼恆畏坐涼處因此數年來常於食前服生硫黃如黑豆大一塊約有四厘

服生硫黃法  
在第八卷

甚見效驗後見道家書有默運心火下行與腎氣互相交感之法且引崔公入藥鏡先天氣後天氣得之者常似醉四語爲註解初未深信後觀抱朴子大丹問答篇有意雙則和和則增壽之語疑即此法反覆尋繹恍悟內經四氣調神論所謂使志若伏若匿若有私意若已有得者即此法之權輿也遂效而行之數日覺下元溫暖即不欲再食硫黃月餘功效異常其神妙有不可言傳者由此觀之心火之功用何其大哉

按人之元神在心

元神藏於腦  
而出於心

人之元氣在腎欲心腎相交者須於有意無意之間運心中

元神隨呼吸之氣息息下降與腎中元氣會合然從前道家書皆謂呼升吸降獨明伍冲虛謂吸升呼降方合有意無意之奧旨善哉此論誠千古未發之秘也愚未睹此論時嘗默自體驗亦是如此忽睹此論欣喜異常益信愚所體驗者誠不誤也蓋心中元神若必

隨吸氣下降則拘於迹象久之氣分必覺不順惟呼氣外出之時心中元神默默收斂內氣下降與腎中元氣會合渾融不使隨呼氣外出則息息歸根存之又存而性命之根蒂自固也不但此也此法須心腎互相交感不惟心感腎腎亦感心當呼氣外出之時腎中元氣原自上升宜少加主宰之力俾其上升之機稍大始能與心中下降之元神欣欣相遇互相交感則一念在心一念在腎抱朴子所謂意雙則和也然此法功候不可太過使熱力熾盛宜休息行之又宜清心寬欲戒謹色慾涵養真水與真火相濟始能有效

或問子所論交心腎之功至精至確矣似與道書所謂媒合嬰兒姪女以結金丹之功無異將毋違斯道而專心行之即可爲學仙之基礎乎答曰非也仙與佛同一宗旨當於精明之府內經脉要精微論曰頭者精明之府常保此無念之正覺有如日麗中天照臨下土無心而成化也此中消息自然而然純屬先天至微至妙原非淺學所能窺愚何人斯敢參末議乎至愚右所云云者皆係後天工夫欲人藉以却病也非妄談修仙之道以誤人也

心火之熱力大矣哉聞之腎爲先天脾爲後天二臟不失職諸臟皆和然非君火之陽光有以普照之腎與脾亦無以伸其用蓋腎中相火雖亦能薰蒸脾土熟腐水穀不遏

依君火之末光以成功也僕自去秋黎明泄瀉屢治不效自疑無藥可醫矣偶與友弟壽甫言及壽甫授以吸升呼降以心溫腎之法初試之四五日間覺丹田生暖由斯工夫加密泄瀉遂愈乃知心爲百體所從令心所至氣必至以心氣交腎氣即以心火溫腎水夫斯以水火既濟而病可却也然非吾友之先覺剴切指示何由得焉疾既愈喜甚因誌之以示不忘云

庚戌仲春愚小兄張愼敬亭敬識

天地交而後陰陽和萬物生人身一小天地也心腎常交而身始無病余患寒飲證發則喘急不坐亦不臥服藥無效間習道家運氣之方亦無大驗戊申冬友人張君壽甫告以吸升呼降之說余乃恍然悟悟而喜甚如獲拱璧依法習之今年餘矣覺丹田常暖熱力充於周身而病遂霍然已神哉術乎道家之奧乎醫林之秘乎抑天地之精乎非明造化之機者孰能與於斯愼之祕之非人勿傳然而有心攝養者細繹此書當自得之

庚戌春日愚弟弋文藻翔高敬題

世謂參贊北育之功古今人不相及非也余素不留心道家書以其雖能壽身未能壽世及讀友兄壽甫醫學衷中參西錄見有鍊氣治病法要旨在吸升呼降亦以爲道家

吐納之術而未之奇也庚戌春因事北上路感風寒鼻息熱而痰涎鬱胸食梨一顆下焦覺涼痰熱如故遂於車中試吸升呼降法約行三十里覺心爽體舒外感頓解鍊氣之功神妙竟至此哉蓋人之心火常與腎氣交感則元氣充周血脈流通新症即時可除夙病久將自愈使人盡得此術既可保身於預又可救患於猝無須用藥而能濟世活人參贊化育之功孰大於斯然壽甫傳之余幸得之尙望不僅予得之也於是乎書

庚戌孟夏愚弟丁振鸞翊仙敬題

### 治心病方

### 定心湯 治心虛怔忡

龍眼肉 查兩

酸棗仁 炒搗伍錢

萸肉 去淨核伍錢

柏子仁 炒搗肆錢

生龍骨 搗細肆錢

生牡蠣 搗細肆錢

生明乳香 壹錢

生明沒藥 壹錢

心因熱怔忡者酌加生地數錢若脈沈遲無力者其怔忡多因胸中大氣下陷詳觀拙擬

升降湯 在第四卷 後跋語及諸案自明治法

內經謂心藏神神既以心爲舍宇即以心中之氣血爲保護有時心中氣血虧損失其保

護之職心中神明遂覺不能自主而怔忡之疾作焉故方中用龍眼肉以補心血棗仁柏仁以補心氣更用龍骨入肝以安魂牡蠣入肺以定魄魂魄者心神之左輔右弼也且二藥與黃肉並用大能收斂心氣之耗散並三焦之氣化亦可因之團聚特是心以行血爲用心體常有舒縮之力心房常有啓閉之機若用藥一於補斂實恐於舒縮啓閉之運動有所妨碍故又少加乳香沒藥之流通氣血者以調和之其心中兼熱用生地者因生地既能生血以補虛尤善涼血而清熱故又宜視熱之輕重而斟酌加之也

西人曰人身心肺關係尤重與腦相等凡關係重者造化主護持之尤謹故腦則有頭額等八骨以保護之而心肺亦有胸脇諸骨以保護之心肺體質相連功用亦相倚賴心之功用關係全體心病則全體皆受害心之重如此然論其體質不過赤肉所爲其能力專主舒縮以行血脈有左右上下四房左上房主接肺經赤血右上房主接周身回血左下房主發赤血運行周身右下房主接上房回血過肺更換赤血而回左上房左上房赤血落左下房入總脈管以養全體右上房回血落右下房上注於肺以出炭氣而接養氣

此理

與後補絡補管湯  
既證參看方明

故人一身之血皆經過於心肺心能運血周流一身無一息之停即時接入

即時發出其跳躍即其偪發也以時辰表驗試一瞥呢

即一分鐘

跳七十五次每半時跳四千

五百次一晝夜計跳十萬八千次然平人跳不自覺若覺心跳即是心經改易常度心房之內左厚於右左下房厚於右下房幾一倍蓋左房主接發赤血功用尤勞故亦加厚也心位在胸中居左當脅骨第四至第七節尖當脅骨第五第六之間下於乳頭約一寸至半寸橫向胸骨病則自覺周遭皆跳凡心經本體之病或因心房變薄變厚或心房之門有病或夾膜有病或總管有病亦如眼目之病或在明角罩或在瞳人或在睛珠非必處處皆病也大概心病左多於右因左房功用尤勞故耳心病約有數端一者心體變大有時略大或大過一半因心房之戶有病攔阻血出入不便心舒縮之勞過常度勞多則變大亦與手足過勞則腫大之理相同大甚則偪血舒縮之用因之不靈矣一者心房門戶變小或變大或變窄或變闊俱爲非宜蓋心血自上房落下房之門開張容納血入後門即翕閉不令血得回旋上出其自下房入總管處亦有門血至則開張使之上出血出後門即翕閉不令血得下返若此處太窄太小則血不易出太大太闊則血偪發不盡或已出復返運行不如常度矣再者心跳凡無病之人心跳每不自覺若因病而跳時時自覺

撫之或覺動然此證有真有假真者心自病而跳也或心未必有病但因身虛而致心跳亦以真論若偶然心跳其人驚懼防有心病其實心本無病即心跳亦暫時之事是爲假心跳證醫者均須細辨凡心勻跳無止息側身而臥可左可右呼吸如常大概心自不病所慮跳躍不定或三四次一停停後復跳不能睡臥左半身着牀愈覺不安當慮其門戶有病血不週運如常有停滯妄流而爲膨脹者有累肺而欬嗽難呼吸或喘者有累腦而昏蒙頭疼中風慌怯者有累肝而血聚積滿溢者有累胃不易消化食後不安心更跳者皆心病之關係也若心自不病但因思慮過多或讀書太勞或用力過度或驚懼喜怒失度或色慾醉飽無節或泄瀉失血或多食瀉藥或夜失眠在婦女或因月事不調凡遇此等心跳病醫者應審察致病之由如因房勞者令戒房事因飲食者戒口止酒更服黃連水樟腦酒以安心服鷄那或鐵酒以補虛弱戒勤勞行動常平臥以安身體遊玩散步以適情意停止工作以養精神此治心跳良法也若胸脅骨之下有時動悸人或疑爲心跳其實因胃不消化內有風氣與心跳病無涉虛弱人及婦女患者最多略服補胃及微利藥可也若飲食太少或更過於菲薄亦可令心跳宜服鷄那及鐵酒兼多食肉爲宜按西



人論心跳證有真假真者手捫之實覺其跳假者手捫之不覺其跳其真跳者又分兩種一爲心體自病若心房門戶變大小窄闊之類可用定心湯將方中乳香沒藥皆改用三錢更加當歸丹參各三錢一爲心自不病因身弱而累心致跳當用第一卷治勞瘵諸方治之至假心跳即怔忡證也其收發血脈之動力非大於常率故以手捫之不覺其跳特因氣血虛而神明亦虛即心之尋常舒縮徐徐跳動神明當之亦若有衝激之勢多生驚恐此等證治以定心湯時磨取鐵銹水煎藥更佳至於用鐵銹之說不但如西人之說取其能補血分實藉其鎮重之力以安心神也第七卷載有一味鐵養湯細觀方後治驗諸案自知鐵銹之妙用惟怔忡由於大氣下陷者斷不宜用

又按西人謂人之知覺運動皆腦氣筋

東人名腦髓神經

主人遂謂人神明皆在於腦而與心無涉

且設法能即物之腦而實驗之然西人凡事必實驗而後信若心之能知覺與否固不能若腦之可實驗也內經謂心者君主之官神明出焉又謂神游上丹田在泥丸宮下夫腦之中心點即泥丸宮也古文思字作慮上從囟即頂門骨徐氏說文釋此字謂自囟至心如絲相貫不絕是知心與腦相輔而成思而自腦至心皆爲神明之所貫徹普照也

此理也即可以西人之說證之西人謂腦之左右各有血脈管兩支分佈兩支在前兩支在後此管由心而出運血養腦以全體之血計之腦得七分之一由其所言形迹論之心與腦顯然相通豈神明之於中者猶有隔闕而不相通乎

又丁韋良者西人之甚博雅者曾爲同文館之總教習然其人於中書亦甚有研究工夫故所著天道溯源一書凡論思想處皆歸於心而不仍西人之舊說此誠研究中書而有得者也

又明金正希曰人見一物必留一影於腦中此言人腦中如攝影鏡子一般此理雖無處可實驗而實確有可信愚於此語悟得心與腦雖功用相輔助有時亦有偏重於一部之時如人追憶往事恆作擡頭想像之狀此凝神於腦以印證舊留之影也若研究新理恆作低頭默思之狀此凝神於心無所依傍以期深造也

更以愚自體驗者明之愚素留心算學而未諳西法欲學之又無師承歲在丁酉遂自購代數幾何諸書朝夕研究漸能通曉而每當食蒜之後研究算學即覺心上若有蛛絲細網羈住與算理即有隔膜因此不敢食蒜且人陡遇驚恐甚劇之事即心中怔忡或至手

捫之亦覺其跳動若謂神不在心何他處不跳動乎若謂傷腦其人即無知覺試問果傷其心其人亦復能知覺乎

安魂湯 治心中氣血虛損兼心下停有痰飲致驚悸不眠

龍眼肉 陸錢

酸棗仁 炒搗肆錢

生龍骨 搗末伍錢

生牡蠣 搗末伍錢

清半夏 三錢

茯苓片 三錢

生赭石 軋細肆錢

若服一兩劑後無效者可於服湯藥之外臨睡時用開水送服西藥臭剝

性詳第七卷加味礞石丸下

一瓦

藉其痲痺神經之力以收一時之效俾湯劑易於爲力也

方書謂痰飲停於心下其人多驚悸不寐蓋心火也痰飲水也火畏水刑故驚悸至於不寐也然痰飲停滯於心下者多由思慮過度其人心臟氣血恆因思慮而有所傷損故方中用龍眼肉以補心血酸棗仁以斂心氣龍骨牡蠣以安魂魄半夏茯苓以清痰飲赭石以導引心陽下潛使之歸藏於陰以成嗑睡之功也

一媼年五十餘累月不能眠屢次服藥無效診其脈有滑象且其身形甚豐腴知其心下停痰也爲製此湯服兩劑而愈

一婦人年三十許一月之間未睡片時自言倦極彷彿欲睡即無端驚恐而醒診其脈左右皆有滑象遂用苦瓜蒂十枚焙焦軋細空心時開水送服吐出膠痰數碗覺心中異常舒暢於臨眠之先又送服熟棗仁細末二錢其夜遂能安睡後又調以利痰養心安神之藥連服十餘劑其證永不反覆矣

內經邪客篇有治目不得瞑方用流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升製半夏製好之半夏五合徐炊令竭爲一升半去其渣飲汁一小杯日

三稍益以知爲度

知覺好也

故其病新發者覆杯則臥汗出而已矣久則三飲而已也觀此方

之義其用半夏並非爲其利痰誠以半夏生當夏半乃陰陽交換之時實爲由陽入陰之

候故能通陰陽和表裏使心中之陽漸漸潛藏於陰而入睡鄉也秫米即蘆稷之米

俗名高粱

取其汁漿稠潤甘緩以調和半夏之辛烈也水用長流水更揚之萬遍名曰勞水取其甘

緩能滋養也薪用葦薪取其能暢發腎氣上升以接引心氣下降而交其陰陽也觀古人

每處一方並其所用之薪與水及其煎法服法莫不詳悉備載何其用心之周至哉

按內經之方多奇驗半夏秫米湯取半夏能通陰陽秫米能和脾胃陰陽通脾胃和其人

即可安睡故內經謂飲藥後覆杯即瞑言其效之神速也乃後世因其藥簡單平常鮮有用者則良方竟埋沒矣門生高如璧治天津河北玄緯路劉姓年四十二四月未嘗少睡服藥無效問治法於愚告以半夏秫米湯方如璧因其心下發悶遂變通經方先用鮮萊蕪四兩切絲煎湯兩茶杯再用其湯煎清半夏四錢服之時當晚八點鐘其人當夜即能安睡連服數劑心下之滿悶亦愈

### 治肺病方

黃芪膏

治肺有勞病薄受風寒即喘嗽冬時益甚者

生箭芪

肆錢

生石膏

搗細肆錢

鮮茅根

剉碎肆錢如無鮮者可用乾者貳錢代之

粉甘草細末

貳錢

生懷山藥細末

叁錢

淨蜂蜜

壹兩

右藥六味先將黃芪石膏茅根煎十餘沸去渣澄取清汁二杯調入甘草山藥末同煎煎時以箸攪之勿令二末沈鍋底一沸其膏即成再調入蜂蜜令微似沸分三次溫服下一日服完如此服之久而自愈然此乃預防之藥喘嗽未犯時服之月餘能祓除病根肺胞之體原玲瓏通徹者也爲其玲瓏通徹故具開關之機而司呼吸之氣其開關之機

無碍即呼吸之氣自如。也有時肺臟有所損傷其微絲血管及肺胞涵津液之處其氣化皆澀淤凝滯致肺失其玲瓏之體即有碍於闢闢之機呼吸即不能自如矣。然當氣候溫和時肺葉舒暢呼吸雖不能自如猶不至甚劇。有時薄受風寒及令屆沍寒之時肺葉收縮則瘀者益瘀能闢而不能闢而喘作矣。肺中之氣化瘀而且喘痰涎壅滯而嗽亦作矣。故用黃芪以補肺之陽山藥以滋肺之陰茅根以通肺之竅俾肺之陰陽調和竅絡貫通其闢闢之力自適均也用石膏者因其涼而能散其涼也能調黃芪之熱其散也能助茅根之通也用甘草者因其味甘歸脾益土即以生金也用蜂蜜者因其甘涼滑潤爲清肺潤肺利痰寧嗽之要品也。

茅根不但中空周遭月上兼有十餘小孔乃通體玲瓏之物與肺胞之形體大有相似故善通肺胞之竅絡又治病之法當兼取對宮之藥茅根係萑葦之屬於卦爲震稟初春少陽之氣升而能散原肺臟對宮肝家之藥也夫肺金主斂肝木主散此証因肺金之斂太過故用茅根導引肝木之氣入肺以宣散之俾其闢闢之機自若而喘嗽均不作矣。或問凡藥之名膏者皆用其藥之原汁久經熬煉而成膏今僅取黃芪石膏茅根之清汁

而調以山藥甘草之末與蜜以成膏者何也答曰古人煎藥皆有火候及藥之宜先入後入或浸水摻入及藥之宜湯宜膏宜丸宜散之區別然今人不講久矣如此方黃芪茅根過煉則宣通之力微石膏過煉則清涼之力減此三味所以不宜熬膏也然猶恐藥入胃之後由中焦而直趨下焦其力不能灌注於肺故加山藥蜂蜜之潤而黏甘草之和而緩者調入成膏使人服之能留戀胃中不遽下俾其由胃輸脾由脾達肺也

或問調之成膏者恃山藥蜂蜜也至甘草何不與黃芪石膏同煎取汁而亦爲末調入答曰西人謂甘草微有苛苛即薄荷辣之味煎之則甘味減而苛辣之味轉增是以西人潤肺之甘草水止以開水浸之取其味甘且清輕之氣上升也此方將甘草調入湯中止煎一沸亦猶西人作甘草水之意也

清金益氣湯

治疴嘔少氣勞熱欬嗽肺痿失音頻吐痰涎一切肺金虛損之病

生黃芪三錢

生地黃伍錢

知母三錢

粉甘草三錢

玄參三錢

沙參三錢

川貝母去心貳錢

牛蒡子炒搗三錢

一婦人年四十上焦發熱欬吐失音所吐之痰自覺腥臭漸漸羸瘦其脈弦而有力投以

清火潤肺之藥數劑不效爲製此湯於大隊清火潤肺藥中加生黃芪一味以助元氣數劑見輕十餘劑後病遂全愈

或問脈既有力矣何以復用補氣之藥答曰脈之有力有真有假凡脈之真有力者當於敦厚和緩中見之此脾胃之氣壯旺能包括諸臟也

脾胃屬土能包括金木水火諸臟腑

其餘若脈象洪而有力

多係外感之實熱若滑而有力多係中焦之熱痰若弦而有力多係肝經之循盛尤爲有病之脈此證之脈是也蓋肺屬金肝屬木金病不能鎮木故脈現弦而有力之象此肝木橫恣轉欲侮金之象也凡肺痿肺癰之病多有脇下疼者亦係肝木偏勝所致

一人年三十餘肺中素鬱痰火又爲外感拘束頻頻欬嗽吐痰腥臭恐成肺癰求爲診治其脈浮而有力關前兼滑遂先用越婢湯解其外感欬嗽見輕而吐痰腥臭如故次用葶蘆鮮地骨皮煎湯少少送服日三次即用葶蘆大棗湯之日亦服一次如此調治數日葶蘆大棗湯用過三次痰涎頓少亦不腥臭繼用清金益氣湯貝母牛蒡各加一錢連服十餘劑以善其後



清金解毒湯

治肺臟損爛或將成肺癰或欬嗽吐膿血者又兼治肺結核

生明乳香三錢

生明沒藥三錢

粉甘草三錢

生黃芪三錢

玄參三錢

沙參三錢

牛蒡子炒搗三錢

貝母三錢

知母三錢

三七搗細貳錢藥汁送服

將成肺癰者去黃芪加金銀花三錢

一人年四十八欬吐痰涎甚腥臭夜間出汗日形羸弱醫者言不可治求愚診視脈數至六至按之無力投以此湯加生龍骨六錢又將方中知母加倍兩劑汗止又服十劑全愈肺結核之治法曾詳載於參麥湯下在卷第一然彼所論者因肺結核而成勞瘵之治法此方及後方乃治肺結核而未成勞瘵者也若服此二方不見效時亦可兼服阿斯必林其服法亦詳參麥湯下或兼服幾亞蘇薄荷冰丸其藥性及服法詳載於醴泉飲在卷第一下鹽酸規尼涅詳第七卷加味小柴胡湯下亦可爲輔用之品因其善退肺炎又善治貧血炎退血生結核之潰爛者自易愈也其用量每次服半瓦一日可服兩次

安肺寧嗽丸

治肺鬱痰火及肺虛熱作嗽兼治肺結核

嫩桑葉壹兩

兒茶壹兩

蓬砂壹兩

蘇子炒搗壹兩

粉甘草壹兩

右藥五味爲細末蜜作丸三錢重早晚各服一九開水送下

肺臟具闢闢之機治肺之藥過於散則有碍於闢過於斂則有碍於闢桑得土之精氣而

生

根皮黃脆應

夏季是其明徵

故長於理肺家之病以土生金之義也至其葉涼而宣通最解肺中風熱其

能散可知又善固氣化治崩帶脫肚

肺氣旺自無諸疾

其能斂可知斂而且散之妙用於肺臟闢

之機尤投合也蓬砂之性涼而滑能通利肺竅兒茶之性涼而澀能安斂肺葉二藥並用

與肺之闢闢亦甚投合又佐以蘇子之降氣定喘甘草之益土生金蜂蜜之潤肺清燥所

以治嗽甚效也 按蓬砂兒茶醫者多認爲瘡家專藥不知其理痰寧嗽皆爲要品且二

藥外用能解毒化腐生飢故內服亦治肺結核或肺中損爛亦甚有效驗

或問本經謂桑根白皮主五勞六極此方治勞嗽不用皮而用葉且不用霜桑葉而用嫩

葉者何居答曰樹之有葉猶人之有肺是故人以肺爲吸呼植物即以葉爲呼吸

化學家謂葉能吸炭

氣吐

以其葉治肺實有同聲相應同事相求之妙也且桑根白皮雖有補益之力而與嗽

之夾雜外感者實有不宜吳鞠通曾詳論之其言固不可廢也至桑葉必用嫩者因嫩葉

含有蛋白質

嫩葉採下葉帶必出白漿

故能於人有所補益若霜桑葉乃乾枯腐敗之物作柴用之尙可

豈可以之爲藥乎

清涼華蓋飲

治肺中腐爛衰成肺癰時吐膿血胸中隱隱作疼或旁連脇下亦疼者

甘草

陸錢

生明沒藥

不去油肆錢

丹參

肆錢

知母

肆錢

病劇者加三七二錢

搗細送服

脈虛弱者酌加人參天冬各數錢

肺癰者肺中生癰瘡也然此證肺中成瘡者十之一二肺中腐爛者十之八九故治此等證若葶藶皂莢諸猛烈之藥古人雖各有專方實不可造次輕用而清火解毒化腐生肌之品在所必需也甘草爲瘡家解毒之主藥且其味至甘得土氣最厚故能生金益肺凡肺中虛損糜爛皆能愈之是以治肺癰便方有單用生粉草四兩煎湯頻頻飲之者而西人潤肺藥水亦單有用甘草製成者特其性微溫且有壅滯之意而調以知母之寒滑則甘草雖多用無礙且可藉甘草之甘溫以化知母之苦寒使之滋陰退熱而不傷胃也丹參性涼清熱色赤活血其質輕鬆其味微辛故能上達於肺以宣通臟腑之毒血鬱熱而消融之乳香沒藥同爲瘡家之要藥而消腫止痛之力沒藥尤勝故用之以參贊丹參而癰瘡可以內消三七化瘀解毒之力最優且化瘀血而不傷新血其解毒之力更能佐生

肌藥以速於生肌故於病之劇者加之至脈虛者其氣分不能運化藥力方雖對證無功又宜助以人參而猶恐有肺熱還傷肺之虞是以又用天冬以解其熱也

一人年三十餘晝夜欬嗽吐痰腥臭胸中隱隱作疼恐成肺癰求爲診治其脈浮而有力

右勝於左而按之却非洪實投以清金解毒湯前在似有煩燥之意大便又滑瀉一次自言

從前服藥略補氣分即覺煩躁若專清解又易滑瀉故屢次延醫無效也遂改用粉甘草兩半金銀花一兩知母牛蒡子各四錢煎湯一大碗分十餘欠溫飲下俾其藥力常在上焦十劑而愈後兩月因勞力過度舊證復發胸中疼痛甚於從前連連欬吐痰中兼有膿血再服前方不效爲製此湯兩劑疼止爲脈象虛弱加野台參三錢天冬四錢連服十劑全愈

邑孝廉曾鈞堂先生愚之忘年友也精通醫學曾告愚曰治肺癰方林屋山人犀黃丸最效余用之屢次皆隨手奏功今錄其方於左以備參觀

證治全生集王洪緒所著犀黃丸用乳香沒藥末各一兩麝香錢半犀牛黃三分共研細取黃米

飯一兩搗爛入藥再搗爲丸菜菔子大曬乾忌火烘每服三錢熱陳酒送下

徐靈胎曰蘇州錢復庵歎血不止諸醫以血證治之病益劇余往診見其吐血滿地細審血中似有膿而腥臭因謂之曰此肺癰也膿已成矣金匱云膿成則死然有生者余遂多方治之病家亦始終相信一月而愈蓋余平日因此證甚多集唐人以來驗方用清涼之藥以清其火滋肺之藥以養其血滑降之藥以祛其痰芳香之藥以通其氣更以珠黃之藥解其毒金石之藥填其空兼數法而行之屢試必效今治復庵亦兼此數法而痊按此論誠爲治肺癰者之準繩故錄之以備參觀

西人東人對於肺結核皆視爲至險之證愚治以中藥湯劑輔以西藥阿斯必林恆隨手奏效參麥湯下論之甚詳而於近今又得一治法奉天清丈局科員宿貫中之兄遼陽人年近五旬素有肺病東人以爲肺結核屢次醫治皆無效一日忽給其弟來電報言病勢已革催其速還貫中因來院中求爲疏方謂前數日來信言痰嗽較前加劇又添心中發熱今電文未言及病情大約仍係前證而益加劇也夫病勢至此誠難挽回因其相求懇切遂爲疏方玄參生山藥各一兩而佐以川貝牛蒡甘草諸藥至家將藥煎服其病竟一汗而愈始知其病之加劇者係有外感之證外感傳裏陽明燥熱得涼潤之藥而作汗所

以愈也其從前肺病亦愈者因肺中之毒熱隨汗外透暫覺愉快而其病根實猶伏而未除也後旬餘其肺病復發欬吐痰腥臭貫中復來詢治法手執一方言係友人所贈問可服否視之林屋山人犀黃丸也愚向者原擬肺結核可治以犀黃丸及徐氏所論治肺癰諸藥爲其價皆甚昂恐病者辭費未肯輕於試用今有所見與愚同者意其方必然有效慙患製其丸服之未盡劑而愈夫黃麝原爲寶貴之品吾中醫恆用之以救險證而西人竟不知用何也

奉天車站開飯館者趙煥章年四十許心中發熱懶食欬吐痰腥臭羸弱不能起牀詢其得病之期至今已遷延三月矣其脈一分鐘八十五至左脈近平和右脈滑而實舌有黃苔滿布大便四五日一行且甚燥知其外感稽留於肺胃久而不去以致肺臟生炎久而欲腐爛也西人謂肺結核證至此已不可治而愚慨然許爲治愈投以清金解毒湯去黃芪加生山藥六錢生石膏一兩三劑後熱大清減食量加增欬嗽吐痰皆見愈遂去山藥仍加黃芪三錢又去石膏以花粉六錢代之每日兼服阿斯必林四分瓦之一如此十餘日後病大見愈身體康健而間有欬嗽之時因忙碌遂停藥不服二十日後欬嗽又劇

仍吐痰有臭再按原方加減治之不甚效驗亦俾服犀黃丸病遂愈

### 治嘔吐方

鎮逆湯 治嘔吐因胃氣上逆胆火上衝者

生赭石 細札陸錢

青黛 貳錢

清半夏 叁錢

生杭芍 四錢

龍胆草 叁錢

吳茱萸 壹錢

生薑 貳錢

野台參 貳錢

薯蕷半夏粥

治胃氣上逆衝氣上衝以致嘔吐不止聞藥氣則嘔吐益甚諸藥皆不能

下咽者

生山藥 札細壹兩

清半夏 一兩

右二味先將半夏用微溫之水淘洗數次不使分毫有礬味用作飯小鍋

勿用藥甑

煎取清湯

約兩杯半去渣調入山藥細末再煎兩三沸其粥即成和白砂糖食之若上焦有熱者以

柿霜代沙糖涼者用粥送服乾薑細末半錢許

按吐後口舌乾燥思飲水者熱也吐後口舌濕潤不思飲水者涼也若嘔吐既久傷其津液雖有涼者亦可作湯又當細審其脈滑疾爲熱弦遲爲涼滑而無力爲上盛下虛上則

熱而下或涼弦而有力爲衝胃氣逆脈似熱却非真熱又當問其所飲食者消化與否所嘔吐者改味與否細心詢問體驗自能辦其涼熱虛實不誤也

從來嘔吐之證多因胃氣衝氣併而上逆半夏爲降胃安衝之主藥故金匱治嘔吐有大小半夏湯特是嘔者最忌礬味而今之坊間醫者雖清半夏亦有礬故必將礬味洗淨而後以治嘔吐不至同於抱薪救火也其多用至一兩者誠以半夏味本辛辣因坊間治法太過辣味全消又經數次淘洗其力愈減必額外多用之始能成降逆止嘔之功也而心與山藥作粥者凡嘔吐之人飲湯則易吐食粥則藉其稠黏留滯之力可以略存胃腑以待藥力之施行且山藥在上大能補肺生津則多用半夏不慮其燥在下大能補腎欽衝則衝氣得養自安其位且與半夏皆無藥味故用於嘔吐甚劇不能服藥者尤宜也

有因胆倒而嘔吐不止者續名醫類案載許宣治一兒十歲從戲臺倒跌而下嘔吐苦水綠如菜汁許曰此胆倒也胆汁傾盡則死矣方用溫胆湯加棗仁代赭石正其胆腑可名正胆湯一服吐止按此證甚奇異附載於此以備參考

治膈食方



參耨培氣湯

治膈食

第五期衷中參西錄第三卷論胃病證膈治法及反胃治法宜參看

潞黨參 陸錢

天門冬 四錢

生赭石 軋細八錢

清半夏 三錢

淡荊蓉 四錢

知母 伍錢

當歸身 三錢

柿霜餅 五錢服藥後含化徐徐咽之

人之一身自飛門以至魄門一氣主之亦一氣懸之故人之中氣充盛則其賁門胃之上口寬展自能容受水穀下通幽門胃之下口以及小腸大腸出爲二便病何由而作若中氣衰憊不能撐懸於內則賁門縮小以及幽門小腸大腸皆爲之緊縮觀膈證之病劇者大便如羊矢固因液短實亦腸細也况中氣不旺胃氣不能息息下降而衝氣轉因胃氣不降而乘虛上干致痰涎亦隨逆氣上併以壅塞賁門夫此時賁門已縮如藕孔又加逆氣痰涎以壅塞其間又焉能受飲食以下達乎故治此證者當以大補中氣爲主方中之人參是也以降逆安衝爲佐以清痰理氣爲使方中之赭石半夏柿霜是也又慮人參性熱半夏性燥故又加知母天冬當歸柿霜以清熱潤燥生津生血也用荊蓉者以其能補腎即能斂衝衝氣不上衝則胃氣易於下降且患此證者多有便難之虞荊蓉與當歸赭石並用其潤便通結之功又甚效也若服數劑無大效當係賁門有瘀血宜加三稜桃仁各二錢

一叟年六十餘得膈證向愚求方自言猶能細嚼焦脆之物用湯水徐徐送下然一口咽之不順即嘔吐不能再食且嘔吐之時帶出痰涎若干診其脈關後微弱關前又似滑實知其上焦痰涎壅滯也用此湯加邑武帝臺所產旋覆花二錢連服四劑而愈

仲景傷寒論有旋覆代赭石湯原治傷寒汗吐下解後心下痞鞭噫氣不除周揚俊喻嘉言皆謂治膈證甚效拙擬此方重用赭石不用旋覆花者因旋覆花本經原言味鹹今坊間所鬻旋覆花苦而不鹹用之似無效驗惟邑武帝臺爲漢武帝築臺望海之處地多鹹鹵周圍所產旋覆花大於坊間鬻者幾一倍其味鹹而兼辛以治隔食甚效誠無價之良藥也夫植物之中含鹹味者甚少惟生於鹹鹵之地故能饒有鹹味與他處產者迥異爲僻在海濱無人採取購買其處居民亦不識爲藥物俗名六月蘭但取其作柴惜哉

或問本經旋覆花未言苦亦未言辛藥坊之苦者既與本經之氣味不合豈武帝臺之辛者獨與本經之氣味合乎答曰古人立言尙簡多有互文以見義者本經爲有文字後第一書其簡之又簡可知故讀本經之法其主治未全者當於氣味中求之其氣味未全者即可於主治中求之旋覆花本經載其主結氣脇下滿驚悸除水去五藏間寒熱補中下

氣三復本經主治之文則覆花當爲平肝降氣之要藥應藉金之辛味以鎮肝木其味宜鹹而兼辛明矣至於苦味性多令人涌吐是以旋覆花不宜兼此味也且其花開於六月而能預得七月庚金之氣故爾雅又名之曰盜庚庚者金也其味辛也顧其名而思其義則旋覆花宜鹹而兼辛尤明矣有用拙擬之方者有可用之旋覆花其味不至甚苦亦可斟酌加入也

一人年四十六素耽葉子戲至廢寢食初覺有氣上衝咽喉寢至防礙飲食時或嘔吐不能下行其脈弦長而硬左右皆然知係衝氣挾胃氣上衝治以此湯加武帝臺旋覆花二錢生芡實四錢降其衝逆之氣而收斂之連服十劑而愈

族家姑年五旬有六初覺飲食有碍後寢增重惟進薄粥其脈弦細無力蓋生平勤儉持家自奉甚薄勞心勞力又甚過其脈之細也因飲食菲薄而氣血衰其脈之弦也因勞心過度而痰飲盛也姑上有兩姊皆以此疾逝世氣同者其病亦同惴惴自恐不愈愚毅然以爲可治投以此湯加白朮二錢龍眼肉三錢連服十餘劑全愈

堂姪女年四十八歲素羸弱多病姪婿與兩甥皆在外營業因此自理家務勞心過度恒

徹夜不寐於癸卯夏日得膈證時愚遠出遂延他醫調治屢次無效及愚旋里病勢已劇其脈略似滑實重按無力治以此湯加龍眼肉五錢兩劑見輕又服十餘劑全愈

奉天北鎮縣蕭叟年六十七歲友人韓玉書之戚也得膈證延醫治不愈遷延五六月病寢加劇飲水亦間有難下之時因玉書介紹來院求爲診治其脈弦長有力右部尤甚知其衝氣上衝過甚迫其胃氣不下降也詢其大便秘結不易下多日不行又須以藥通之投以參赭培氣湯赭石改用一兩數劑後飲食見順脈亦稍和覺胃口仍有痰涎杜塞爲加清半夏三錢連服十劑飲食大順脈亦復常大便亦較易遂減赭石之半又服數劑大便一日兩次遂去赭石柿霜餅當歸知母加於朮三錢數劑後自言覺胃中消化力稍弱此時痰涎已清又覺胃口似有疙瘩稍碍飲食之路遂將於朮改用六錢又加生雞內金細二錢佐於朮以健運脾胃即藉以消胃口之障礙連服十餘劑全愈

友人吳瑞五

奉天鐵嶺

治姜姓叟年六十餘得隔食證屢次延醫調治服藥半載病轉增進瑞

五投以參赭培氣湯爲其脈甚弦硬知其衝氣上衝又兼血液枯少也遂加生芡實以收斂衝氣龍眼肉以滋潤血液一劑能進飲食又連服七八劑飲食遂能如常

治吐衄方

寒降湯 治吐血衄血脈洪滑而長或上入魚際此因熱而胃氣不降也以寒涼重墜之藥降其胃氣則血止矣

生赭石 軋細陸錢

清半夏 叁錢

藜仁 炒搗肆錢

生杭芍 肆錢

竹茹 叁錢

牛蒡子

炒搗叁錢

粉甘草

錢半

一童子年十四陡然吐血一晝夜不止勢甚危急其父通醫學自設有藥房亦束手無策時愚應其鄰家延請甫至其村急求爲診視其脈洪長右部尤<sub>重</sub>按有力知其胃氣因熱不降血隨逆氣上升也爲擬此湯一劑而愈又服一劑脈亦和平

一人年十八偶得吐血證初不甚劇因醫者誤治遂大吐不止診其脈如水上浮麻莫辨至數此虛弱之極候也若不用藥立止其血危可翹足而待遂投以此湯去竹茹加生山藥一兩赭石改用八錢一劑血止再診其脈左右皆無重按亦不見愚不禁駭然詢之心亦頗安穩惟覺痿懶無力忽憶呂滄洲曾治一發斑證亦六脈皆無滄洲謂脈者血之波瀾今因發斑傷血血傷不能復作波瀾是以不見斑消則脈出矣遂用白虎加人參湯

化其斑毒脈果出

詳案在第七卷青蓋湯下

今此證大吐亡血較之發斑傷血尤甚脈之車按不見或亦

血分虛極不能作波瀾歟其吐之時脈如水上浮麻者或因氣逆火盛強迫其脈外現歟

不然聞其診畢還里

相距十里

途中復連連嘔吐豈因路間失血過多歟躊躇久之乃放胆投

以大劑六味地黃湯減茯苓澤瀉三分之二又加人參赭石各數錢一劑脈出又服平補

之藥二十餘劑始復初

金匱治心氣不足吐衄有瀉心湯大黃與黃連黃芩並用後世未窺仲景製方之意恆多誤解不知所謂心氣不足者非不足也若果不足何又瀉之蓋此證因陽明胃腑之熱上逆衝心以致心中怔忡不安若有不足之象仲景從淺處立說翼人易曉遂以心氣不足名之故其立方獨本內經吐血衄血責重陽明不降之旨用大黃直入陽明之腑以降其逆上之熱又用黃芩以清肺金之熱使其清肅之氣下行以助陽明之降力黃連以清心火之熱使其元歸潛伏以保少陰之真液是瀉之實所以補之也且黃連之性肥腸止瀉與大黃並用又能逗留大黃之力使之不至滑瀉故吐衄非因寒涼者服之莫不立愈且愈後而瘀血全消更無他患真良方也即使心氣果係不足而吐衄不止將有立危之勢

先用瀉心湯以止其吐衄而後從容調補徐復其正所謂急則治標亦醫家之良圖也乃世人竟畏大黃力猛不敢輕用即或用之病家亦多駭疑是以愚不得已擬此寒降湯專用赭石以代大黃降逆之力屢次用之亦可隨手奏效也

或問後世本草謂血證忌用半夏以其辛而燥也子所擬寒降湯治吐衄之因熱者何以方中仍用半夏獨不慮其辛燥傷血乎答曰血證須有甄別若虛勞欬嗽痰中帶血半夏誠爲所忌若大口吐血或衄血不止雖虛勞證亦可暫用半夏以收一時之功血止以後再徐圖他治蓋吐血之證多由於胃氣挾衝氣上逆衄血之證多由於胃氣衝氣上逆並迫肺氣亦上逆內經厥論篇曰陽明厥逆喘欬身熱善驚衄嘔血煌煌聖言萬古不易是治吐衄者原當以降陽明之厥逆爲主而降陽明胃氣之逆者莫半夏若也

斯更可以前哲之言徵之黃坤載曰人之中氣左右回旋脾主升清胃主降濁在下之氣不可一刻而不升在上之氣不可一刻而不降一刻不升則清氣下陷一刻不降則濁氣上逆濁氣上逆則嘔噦痰飲皆作一切驚悸眩暈吐衄欬喘心痞脇脹膈噎反胃種種諸病於是生焉胆爲少陽之腑屬甲木而化相火順則下行而溫腎水相火寧秘故上清而

下暖逆則上行出水府而升火位故下寒而上熱然甲木所以息息歸根溫水臟者緣於胃腑戊土之下降戊土不降甲木失根神魂飄蕩此驚悸眩暈所由來也二火升炎肺金被尅此燥渴煩燥所由來也胆胃上逆木土壅迫此痞悶膈噎所由來也凡此諸證悉宜溫中燥土之藥加半夏以降之其火旺金熱者須用清斂金火之品然肺爲病標胃爲病本胃氣不降金火無下行之路也半夏辛燥開通沉重下達入胃腑而降逆氣胃土右轉濁痰掃蕩肺腑冲和神氣歸根綿綿不竭矣血原於臟而統於經升於肝而降於肺肝脾不升則血病下陷肺胃不降則血病上逆緣中腕濕寒胃土上鬱濁氣冲塞肺氣隔礙收令不行是以吐衄此與虛勞驚悸本屬同原未有虛勞之久不生驚悸驚悸不止不至吐衄者當溫中燥土煖水斂火以治其本而用半夏降攝胃氣以治其標庸工以爲陰虛火動不宜半夏率以清涼滋潤之法刊諸紙素千載一轍四海同風靈樞半夏秫米之奧旨

治目不得瞑  
在邪客篇

鮮有解者可勝歎哉

按因寒因熱皆可使胃氣不降然因熱胃氣不降者人猶多知之因寒胃氣不降者則知者甚鮮黃氏論胃氣不降專主因寒一面蓋有所感觸而言也曾有一少婦上焦煩熱不



能飲食頻頻欬吐皆係稀涎脈象弦細無力知係脾胃濕寒不能運化飲食下行致成留飲爲恙也詢其得病之初言偶因欬嗽懶食延本處名醫投以瓜薑貝母麥冬之類旋愈旋即反覆服藥月餘竟至如此遂爲開苓桂朮甘湯加乾薑半夏細觀第三卷理飲湯後跋語自知且細爲剖析用藥之意及愚旋里其藥竟不敢服復請前醫治之月餘而亡夫世之所謂名醫者其用藥大抵如此何不讀黃氏之論而反躬自省也哉

門人高如璧實驗一方赭石滑石等分研細熱時新汲井泉水送服冷時開水送服一兩或至二兩治吐衄之因熱者甚效如璧又在保陽治一吐血證甚劇者諸藥皆不效診其脈浮而洪至數微數重按不實初投以拙擬保元寒降湯前在稍見效旋又反覆如璧遂放胆投以赭石二兩台參六錢生杭芍一兩一劑而愈

唐容川曰平人之血暢行脈絡充達肌膚是謂循經謂循其經之常道也一旦不循其常溢出於肺胃之間隨氣上逆於是吐出蓋人身之氣游於血中而出於血外故上則出爲呼吸下則出爲二便外則出於皮毛而爲汗其氣沖和則氣爲血之帥血隨之而運行血爲氣之守氣得之而靜謐氣結則血凝氣虛則血脫氣迫則血走氣不止而血欲止不可

得矣方其未吐之先血失其經常之道或由背脊走入腦間由腦溢入胃中病重者其血之來辟辟彈指漉漉有聲病之輕則無聲響故凡吐血胸背必疼是血由背脊而來氣迫之行不得其和故見背疼之證又或由兩脇助走油膜入小腸重則潮鳴有聲逆入於胃以致吐出故凡失血復多腰脇疼痛之證此二者來路不同治法亦異由背上來者以治肺爲主由脅下來者以治肝爲主蓋肺爲華蓋位在背與胸膈血之來路既由其界分溢出自當治肺爲是肝爲統血之臟位在脅下血從其地而來則又以治肝爲是然肝肺雖係血之來路而其吐出實則胃主之也凡人吐痰吐食皆胃之咎血雖非胃所主然同是吐證安得不責之於胃况血之歸宿在於血海衝爲血海其脈隸於陽明未有衝氣不逆上而血逆上者也仲景治血以治衝爲要衝脈隸於陽明治陽明即治衝也陽明之氣下行爲順今乃逆吐失其下行之令急調其胃使氣順吐止則血不致奔脫矣此時血之原委不暇究治惟以止血爲第一要法血止之後其離經而未吐出者是爲瘀血既與好血不相合反與好血不相能或壅而成熱或變而成癆或結痼成刺疼日久變證未可預料必亟爲消除以免後來諸患故以消瘀爲第二法止吐消瘀之後又恐血再潮動則須用

藥安之故以寧血爲第三法邪之所輟其正必虛去血既多陰無有不虛者陰者陽之守陰虛則陽無所附久且陽隨而亡故又以補虛爲收功之法四者乃通治血證之大綱也按此論甚精當愚向擬治吐衄諸方猶未見唐氏書今補錄之以備參觀

### 溫降湯

治吐衄脈虛濡而遲飲食停滯胃口不能消化此因涼而胃氣不降也以溫補

開通之藥降其胃氣則血止矣

白朮 叁錢

清半夏 叁錢

生山藥 陸錢

乾薑 叁錢

生赭石 札細陸錢

生杭芍 貳錢

川厚朴 錢半

生薑 貳錢

一童子年十三四吐血數日不愈其吐之時多由於欬嗽診其脈甚遲濡右關尤甚疑其脾胃虛寒不能運化飲食詢之果然蓋吐血之證多由於胃氣不降飲食不能運化胃氣即不能下降欬嗽之證多由於痰飲入肺飲食遲於運化又必多生痰飲因痰飲而生欬嗽因欬嗽而氣之不降者更轉而上逆此吐血之所由來也爲擬此湯一劑血止數劑欬嗽亦愈

一童子年十三從愚讀書一日之間衄血四次診其脈甚和平詢之亦不覺涼熱爲此證

熱者居多且以童子少陽之體時又當夏令遂略用清涼止血之品嘔益甚脈象亦現微弱遂改用此湯一劑而愈

或問此湯以溫降爲名用藥宜熱不宜涼矣乃既用乾薑之熱復用芍藥之涼且用乾薑而更用生薑者何也答曰脾胃與肝胆左右對待之臟腑也肝胆屬木中藏相火其性恆與熱藥不宜用芍藥者所以防乾薑之熱力入肝也且肝爲藏血之臟得芍藥之涼潤者以養之則寧謚收斂而血不妄行更與生薑同用且能和營衛調經絡引血循經此所以用乾薑又用生薑也

清降湯 治因吐衄不止致陰分虧損不能潛陽而作熱不能納氣而作喘甚或衝氣因虛上干爲呃逆爲眩暈心血因虛甚不能內榮爲怔忡爲驚悸不寐或欬逆或自汗諸虛證蜂起之候

生山藥

登兩

清半夏

三錢

淨炙肉

伍錢

生赭石

札細陸錢

牛蒡子

炒搗貳錢

生杭芍

肆錢

甘

草錢半

保元寒降湯

治吐血過多氣分虛甚喘促欬逆血脫而氣亦將脫其脈上盛下虛上焦

兼煩熱者

生山藥 壹兩

野台參 五錢

生赭石 札細八錢

知母 陸錢

大生地 陸錢

生杭芍 肆錢

牛蒡子 炒搗肆錢

三七 七 札細貳錢 藥汁送服

一叟年六十四素有勞疾因勞嗽太甚嘔血數碗其脈搖搖無根或一動一止或兩三動一止此氣血虛極將脫之候也診脈時見其所欬吐者痰血相雜詢其從前嘔吐之時心中發熱爲製此湯一劑而血止又服數劑脈亦調勻

保元清降湯

治吐衄證其人下元虛損中氣衰憊衝氣胃氣因虛上逆其脈弦而硬急

轉似有力者

野台參 伍錢

生赭石 札細八錢

生芡實 六錢

生山藥 六錢

生杭芍 六錢

牛蒡子 炒搗二錢

甘草 錢半

友人毛仙閣曾治一少年吐血證其人向經醫者治愈旋又反覆仙閣診其脈弦而有力知其爲衝胃之氣上逆也遂於治吐血方中重用半夏赭石以降逆白芍牡蠣煨不以斂衝瀉熱又加人參以補其中氣使中氣健旺以斡旋諸藥成功有從前爲治愈之醫者在座

頗疑半夏不可用仙閣力主服之一劑血止再劑脈亦和平醫者訝爲異事仙閣曉之曰此證乃下元虛損衝氣因虛上逆並迫胃氣亦上逆脈似有力而非真有力李士材四字脈訣所謂直上直下衝脈昭昭者即此謂也若誤認此脉爲實熱而恣用苦寒之藥涼其血分血分因涼而凝亦可止而不吐而異日瘀血爲恙竟成勞瘵者多矣今方中用赭石半夏以鎮衝氣使之安其故宅而即用白芍牡蠣以斂而固之使之永不上逆夫血爲氣之配氣爲血之主氣安而血自安矣此所以不治吐血而吐血自止也況又有人參之力者以參贊諸藥使諸藥之降者斂者皆得有所憑藉以成功乎醫者聞之肅然佩服以爲聞所未聞云

祕紅丹 治肝鬱多怒胃鬱氣逆致吐血衄血及吐衄之證屢服他藥不效者無論因涼因熱服之皆有捷效

川大黃細末 一錢

油肉桂細末 一錢

生赭石細末 六錢

右藥三味將大黃肉桂末和勻用赭石末煎湯送下

一婦人年近三旬欬嗽痰中帶血劇時更大口吐血常覺心中發熱其脈一分鐘九十至

按之不實投以滋陰寧嗽降火之藥數劑無效因思此證若用藥專止其嗽嗽愈其吐血亦當愈遂用川貝九錢煎取清湯四茶鍾調入生山藥細末一兩煮作稀粥俾於一日連

進二劑其嗽頓止

此方可爲治虛嗽良方

吐血證亦遂愈數日後覺血氣上潮肺復作癢而嗽因此又

復吐血自言夜間睡時常作生氣惱怒之夢怒極或夢中哭泣醒後必然吐血據所云云

其肝氣必然鬱遏遂改用舒肝

連翹薄荷不可多用

瀉肝

龍胆棟子

之品而以養肝

柏子仁生阿膠

鎮肝

生龍骨生牡蠣之藥輔

之數劑病稍輕減而猶間作惱怒之夢夢後仍復吐血欲辭不治病家又信服難却再四

躊躇恍悟平肝之藥以桂爲最要肝屬木木得桂則枯也

以桂作釘釘樹其樹立枯

而單用之則失於熱

降胃止血之藥以大黃爲最要

觀金匱治吐衄有瀉心湯重用大黃可知

胃氣不上逆血即不逆行也而單用之又

失於寒若二藥並用則寒熱相濟性歸和平降胃平肝兼顧無遺況俗傳方原有用此二

藥爲散治吐血者

詳後化痰理血湯下

用於此證當有捷效而再以重墜之藥輔之則力專下行其效

當更捷也遂用大黃肉桂細末各一錢和勻更用生赭石細末煎湯送下吐血頓愈惱怒

之夢亦從此不作後又遇吐血者數人投以此方皆隨手奏效至其人身體壯實而暴得

吐血者又少變通其方大黃肉桂細末各用錢半將生赭石細末六錢與之和勻分三次

服白開水送下約點半鐘服一次

生赭石可以研末服之  
理詳前參赭鎮氣湯下

按肉桂味辣而兼甜以甜勝於辣者爲佳辣勝於甘者次之然約皆從生旺樹上取下之皮故均含有油性皆可入藥至其簿厚不必計也若其味不但不甚甜且不甚辣又兼甚乾枯者是係枯樹之皮不可用也

## 二鮮飲

治虛勞證痰中帶血

鮮茅根

切碎肆兩

鮮藕

切片肆兩

煮汁常常飲之旬日中自愈若大便滑者茅根宜減半再用生山藥細末兩許調入藥汁中煮作茶湯服之

茅根善清虛熱而不傷脾胃藕善化瘀血而兼滋新血合用之爲涵養真陰之妙品且其形皆中空均能利水血亦水屬故能引泛濫逆上之血徐徐下行安其部位也

堂兄贊宸年五旬得吐血證延醫治療不效脉象滑數搖搖有動象按之不實時愚在少年不敢輕於疏方因擬此便方煎湯兩大碗徐徐當茶溫飲之當日即見愈五六日後病遂脫然自言未飲此湯時心若虛懸無着既飲後覺藥力所至若以手按心使復其位此



其所以愈也

按茅根徧地皆有春初秋末其根甚甜用之尤佳至於藕以治血證若取其化瘀血則紅蓮者較優若用以止吐衄則白蓮者勝於紅蓮者

### 三鮮飲 治同前證兼有虛熱者即前方加鮮小薊根二兩

京都名薊門故畿內之地各處皆有大小薊乃以本地土物醫者猶多不能辨認恆以大薊爲小薊小薊爲大薊殊屬可怪夫二薊之形象最易辨別大薊葉縐初貼地而生狀類蒲公英嫩時可生啖當菜蔬老則自葉心出莖高二三尺莖上亦有小葉花黃色亦如蒲公英英俗名曲曲菜小薊邊有芒刺故亦名刺薊嫩時即生莖其葉在莖上高尺許花紫色狀如小絨球嫩時可作羹俗名青青菜亦名刺兒菜大小薊皆能清血分之熱以止血熱之妄行而小薊尤勝凡因血熱妄行之證單用鮮小薊根數兩煎湯或榨取其自然汁開水冲服均有捷效誠良藥也醫者多視爲尋常土物而忽之可謂貴耳賤目矣

小薊莖中生蟲即結疙瘩如小棗若取其鮮者十餘枚搗爛開水冲服治吐衄之因熱者甚效鄰村李心泉愚之詩友也曾告愚曰余少年曾得吐血証屢次服藥不效後得用小

薊瘰瘡便方服一次即愈因呼之謂清涼如意珠真藥中之佳品也

化血丹 治欬血兼治吐衄理瘀血及二便下血

花蕊石 煨存性叁錢

三七 貳錢

血餘 煨存性壹錢

共研細分兩次開水送服

世醫多謂三七爲強止吐衄之藥不可輕用非也蓋三七與花蕊石同爲止血之聖藥又同爲化血之聖藥且又化瘀血而不傷新血以治吐衄愈後必無他患此愚從屢次經驗中得來故敢確實言之即單用三七四五錢或至一兩以治吐血衄血及大小便下血皆效常常服之並治婦女經閉成癥瘕至血餘其化瘀血之力不如花蕊石三七而其補血之功則過之以其原爲人身之血所生而能自還原化且煨之爲炭而又有止血之力也曾治一童子年十五大便下血數月不愈所下者若爛炙雜以油膜醫者謾謂不治後愚診視其脈弦數無力俾用生山藥軋細作粥調血餘炭六七分服之日二次旬日全愈作血餘炭法用壯年剃頭的短髮洗淨剪碎以鍋炒至融化晾涼軋細過羅服之

補絡補管湯 治欬血吐血久不愈者

生龍骨 搗細壹兩

生牡蠣 搗細壹兩

黃肉 去冷核壹兩

三七 研細貳錢  
藥汁送服

服之血猶不止者可加赭石細末五六錢

一婦人年三十許欬血三年百藥不效即有愈時旋復如故後愚診視其夜間多汗先用龍骨牡蠣黃肉各一兩煎服以止其汗一劑汗止再服一劑欬血之病亦愈自此永不反覆後又治一少年或旬日或浹辰之間必吐血數口寢至每日必吐屢治無效其脈近和平微有芤象亦治以龍骨牡蠣黃肉各一兩三劑而愈張景岳謂欬嗽日久肺中絡破其人必欬血西人謂胃中血管損傷破裂其人必吐血龍骨牡蠣黃肉性皆收澀又兼具開通之力 三藥之性詳第一卷既濟湯來復湯與第四卷理鬱升陷湯第八卷清帶湯下故能補肺絡與胃中血管以成止血之功而又不至有遽止之患致留瘀血爲恙也又佐以三七者取其化腐生新使損傷之處易愈且其性善理血原爲治吐衄之妙品也

欬血之原由於肺吐血之原由於胃人之所共知也而西人於吐血論之尤詳其說謂胃中多回血管有時潰裂一二處而血出其故或因胃本體自生炎證爛壞血管或因跌打外傷胃中血管斷裂其血棕黑而臭穢危險難治但此類甚少常見之證大概血管不曾

潰裂其血亦可自管中溢出其血多帶黑色因回血管之血色原紫黑而溢出在胃胃中酸汁又能令血色變黑也若血溢自胃中血管即時吐出其色亦可鮮紅其病原或因胃致病或因身虛弱血質稀薄皆能溢出有胃自不病或因別經傳入於胃如婦女倒經是子宮之血傳入於胃又如肝脾脹大血不易通行回血管滿溢入胃則吐出入大小腸則便出便與吐之路不同其理一也

吐血紫黑者方書多謂係瘀血愚向疑其不然又不能確指其果係何故今觀此論心始昭然又論中所謂回血管乃導回紫血入心之管也管內有門門無定處其體比脉管稍薄其徑稍大有血則圓無血則扁總管二支由心右上房而出一支向下以接下身臟腑兩足之回血一支向上以接頭腦兩手之回血散布小支一如脉管之狀但脈管深居肉內者多而回血管深淺皆有藍色無脉者是也另有一種名曰微絲血管目力不能見以鏡顯之見密結如網骨肉內外徧體皆然與血脈管回血管兩尾相通故赤紫兩血通行無碍夫血以赤色爲正其有紫色者何也凡血運行由心左下房發源直出血脈總管流布周身長骨肉養身命然漸行漸改其性迨由微絲血管入回血管之中其色遂變爲紫

矣由是紫血由回血管行近至心流歸總血管以達心右上房轉落右下房右下房有大大血管一支長寸許即分爲二以入肺左右葉運行肺中隨呼氣吐出炭氣復隨吸氣納進養氣其色復變爲赤即由肺血管<sub>左右各二支</sub>回心左上房轉落左下房復出血脈總管往來運行如環無端

按化學家謂空氣中所含之氣大要可分爲二種一爲養氣一爲淡氣淡氣居百分之七十九養氣居百分之二十一養氣者養人之生氣也然淡氣多而養氣少者誠以養氣濃烈必須以淡氣淡之而後得其和平人之百體日有消長其合骨肉用者固賴血以生之不合骨肉用者又須賴血以出之何以血行漸改變爲紫色緣其中有炭氣也炭氣者乃身體中無用之物雜化爲氣與養氣合即有毒與炭氣同類故曰炭氣凡人一呼一吸合爲一息呼者吐炭氣也吸者吸養氣也養氣入血則赤赤爲正血炭氣入血則紫紫爲壞血故紫血必須入肺運至氣胞之上洩炭氣於胞內氣管遞而出之是爲一呼炭氣既出復遞生氣以入直抵胞內血遂攝之是爲一吸呼吸一停轉流改換人始無病或問西人回血管之說甚微妙突然其說可確信乎答曰其說確有憑據以其雖爲行血

之管而按之無動脈也心體常動每呼吸之間約動四次每心一動即激發新血注於脈管中而周身之脈管皆隨之一動特其管多深藏肉裏故人周身動脈處無多至回血管多淺在肉外微透青色世俗誤呼爲青筋者皆是雖密絡周身而按之皆不動與血脈管之行血實有進退之分血脈管鼓進新血隨心力運行故按之常動回血管收回陳血不隨心力運行故按之不動蓋運久之血中含炭氣漸變紫色賴心部收回注之於肺呼出炭氣吸進養氣仍變爲赤此造化之神妙也若心於回血管亦鼓之使動則其氣機外向即不能收回陳血是以不藉心力鼓之惟藉血脈管之餘力透過微絲血管以運行之如微弱之水涓涓徐流不起波瀾以轉回於心部故曰因其按之無動脈而可決爲回血管也向嘗疑治痧證者刺血管放血其血莫不發紫若謂其證因熱甚而血發紫何以因寒之證其血亦紫且周身之血既發紫何以止刺其數處出血少許病或即愈今乃知其所刺者皆回血管其出血無多而病可愈者放出炭氣之力也

或又問西人回血管之說既可信則其膈肺呼出炭氣吸進養氣血仍變赤復歸於心之說亦必可信何以古聖賢皆未言及答曰此理內經言之扁鵲難經亦言之而難經較詳

其書第一節曰十二經皆有動脈獨取寸口以決五臟六府死生吉凶之法何謂也然

審病也

寸口者脈之大會手太陰之動脈也人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六

寸人一晝夜凡一萬三千五百息脈行五十度

內經謂十六丈二尺爲一度

周於身漏水下百刻榮衛行陽

二十五度行陰二十五度爲一周也故五十度復會於手太陰寸口者五臟六府之所終

始故取法於寸口也蓋人之臟腑皆有血脈管與回血管其回血管之血由心至肺將炭

氣呼出是諸臟腑之回血管至此而終也迨吸進養氣其血仍赤歸於心而散於諸臟腑

是諸臟腑之血脈管自此而始也故曰五臟六腑之所終始也爲肺能終始諸臟腑是以

諸臟腑之病可於肺之寸口動脈候之而寸口之動脈遂可分其部位而應諸臟腑矣特

古書語意渾含有待於後世闡發耳

或又問回血管之說證以秦越人難經益可確信然據西人之說謂吐紫黑成塊者亦係

回血管之血何以人之腑中或脇下素有瘀積偶有因吐紫黑成塊之血而愈者答曰此

等證西人亦嘗論及謂有因肝脾瘀血及他處瘀血由胃而出而胃自不病者吐後即覺

鬆適所謂以病醫病也然他處瘀血既假道於胃而出雖云胃自不病而胃中回血管必

有潰裂之處亦宜治以化瘀兼收澀之藥濃煎龍骨牡蠣湯送下三七細末可以頃刻奏效若但認爲瘀血任其傾吐未有不危殆者此有關性命之證醫者切宜知之

或又問據西人之說是他經之血皆可以借徑於胃而吐出至欬血出於肺而他處之血亦或借徑於肺而上行否答曰此問甚精微然可實指而確論之也吾友蘇明陽先生當世之哲學士也

著有天地新學說

嘗告愚曰肺管下行連心連肝及胆其相連之處心及肝胆皆有

門與之相通再下行至臍下連於氣海氣海即醫林改錯謂其狀若倒提鷄冠花者是也然相連之處仍有膜膈之在若通若不通之間因氣海之中所存者元氣若與此管不通則元氣不能上達若與此管過通元氣又不能存蓄也氣海之下又有管與之相連亦在若通若不通之間其管由氣海之下轉而上行循脊梁上貫腦部復轉而下行氣海上之管任脈也下之管督脈也人當未生之時息息得母之氣化以貫注於氣海迨其氣化充滿即衝開督任二脈以灌溉諸臟腑此人之先天督任所以常通也既生之後氣海之來源既停其中所存之元氣遂蘊蓄其中以爲百年壽命之根而其所以培養諸臟腑者端藉呼吸與飲食之力此人之後天督任所以不通也愚曾即其言驗諸物類剖解之時其



形迹亦分毫不謬由是觀之是心肝之血皆可由喉出也任脈在下焦又與衝脈血海相通斯下焦之血亦可由喉出也夫喉爲肺管其正支入肺其分支即爲任脈之管凡血自任脈上溢而出於喉者雖非借徑於肺與借徑於肺者無異也再者人之欬嗽不已則氣必上升而血即可隨之上溢其血因嗽可從肺管上溢久之亦可因嗽自胃管上溢故凡自上失血之証兼欬嗽者無論欬血吐血衄血皆當急治愈其欬嗽爲要着也

或問內經謂陽明厥逆則吐衄西人謂胃中血管損傷破裂出血則吐血此二說亦相通乎答曰陽明厥逆胃腑氣血必有澎漲之弊此血管之所以易破也降其逆氣血管之破者自閉設有不閉則用龍骨牡蠣諸收澀之藥以補之防其潰爛佐以三七乳香沒藥諸生肌之品以養之此拙擬補絡補管湯所以效也設使陽明未嘗厥逆胃中血管或因他故而破裂則血在胃中亦恒隨飲食下行自大便出不必皆吐出也

此方原無三七有乳香沒藥各錢半偶與友人景山談及景山謂余治吐血亦用兄補絡補管湯以三七代乳香沒藥則其效更捷愚聞之遂欣然易之

景山又謂龍骨牡蠣能收斂上溢之熱使之下行而上溢之血亦隨之下行歸經至黃肉

爲補肝之妙藥凡因傷肝而吐血者莢肉又在所必需也且龍骨牡蠣之功用神妙無窮即脈之虛弱已甚日服補藥毫無起象或病虛極不受補者投以大劑龍骨牡蠣莫不立見功效余亦不知其何以能然也愚曰人身陽之精爲魂陰之精爲魄龍爲天地之元陽所生理詳第五卷從龍湯下故能安魂牡蠣爲水之真陰結成海氣結爲礫山即牡蠣山故能強魄魂魄安強精神自足虛弱自愈也是龍骨牡蠣固爲補魂魄精神之妙藥也

邑有吐血久不愈者有老醫于平津先生重用赤石脂二兩與諸治血藥治之一劑而愈後其詰嗣錦堂向愚述其事因詰之曰重用赤石脂之義何居錦堂曰凡吐血多因虛火上升然人心中之火亦猶爐中之火其下愈空虛而火上升之力愈大重用赤石脂以填補下焦虛火自不上升矣愚曰兄之論固佳然猶有賸義赤石脂重墜之力近於赭石故能降衝胃之逆其黏澀之力近於龍骨牡蠣故能補血管之破兼此二義重用石脂之奧妙始能盡悉是以愚遇由外傷內若跌挫致吐血久不愈者料其胃中血管必有傷損恆將補絡補管湯去莢肉變湯劑爲散劑分數次服下則龍骨牡蠣不但有黏澀之力且較煎湯服者更有重墜之力而吐血亦即速愈也錦堂聞之欣然曰先嚴用此方時我年尙

幼未知詳問今聞兄言既我多矣

邑張某家貧傭力身挽鹿車運貨遠行因枵腹努力太過遂致大口吐血臥病旅邸恐即不起意欲還里又乏資斧乃勉強徒步徐行途中又復連吐不止目眩心慌幾難舉步腹中覺飢懷有乾餅又難下咽偶拾得山查十數枚遂和乾餅食之覺精神頓爽其病竟愈蓋酸者能斂而山查則酸斂之中兼有化瘀之力與拙擬補絡補管湯之意相近故獲此意外之效也

### 化瘀理膈丹

治力小任重努方太過以致血瘀膈上常覺短氣若吐血未愈者多服補藥或涼藥或多用諸藥炭強止其血亦可有此病皆宜服此藥化之

三七 搗細貳錢

鴨蛋子 去皮四十粒

右藥二味開水送服日兩次凡服鴨蛋子不可嚼破若嚼破即味苦不能下咽強下咽亦多嘔出

一童子年十四夏日牧牛野間衆牧童嬉戲強屈其項背納頭袴中倒縛其手置而弗顧戲名爲看瓜後經人救出氣息已斷俾盤膝坐捶其腰背多時方甦惟覺有物填塞胸膈

壓其胸中大氣妨碍呼吸劇時氣息仍斷兩目上翻身軀後挺此必因在袴中悶極之時努掙不出熱血隨努掙之氣力上溢而停於隔上也俾單用三七三錢搗細開水送服兩次全愈

一人年四十七素患吐血醫者謂其虛弱俾服補藥連服十餘劑覺胸中發緊而血益不止後有人語以治吐血便方大黃肉桂各五分軋細開水送服一劑血止然因從前誤服補藥胸中常覺不舒飲食減少四肢痿懶無力愚診之脈似沉牢知其膈上瘀血爲患也俾用鴨蛋子五十粒去皮糖水送服日兩次數日而愈

治消渴方

玉液湯

治消渴

消渴即西醫所謂糖尿病忌食甜物

生山藥

壹兩

生黃芪

伍錢

知母

陸錢

生鷄內金

搗細貳錢

葛根

錢半

五味子

三錢

天花粉

三錢

消渴之證多由於元氣不升此方乃升元氣以止渴者也方中以黃芪爲主得葛根能升元氣而又佐以山藥知母花粉以大滋真陰使之陽升而陰應自有雲行雨施之妙也用

鷄內金者因此證尿中皆含有糖質用之以助脾胃强健化飲食中糖質爲津液也用五味者取其酸收之性大能封固腎關不使水飲急於下趨也

邑人某年二十餘貿易津門得消渴證求津門醫者調治三閱月更醫十餘人不效歸家就醫於愚診其脈甚微細旋飲水旋即小便須臾數次投以此湯加野台參四錢數劑渴見止而小便仍數又加荳肉去淨五錢連服十劑而愈

方書消證分上消中消下消謂上消口乾舌燥飲水不能解渴係心移熱於肺或肺金本體自熱不能生水當用人參白虎湯中消多食猶飢係脾胃蘊有實熱當用調胃承氣湯下之下消謂飲一斗溲亦一斗係相火虛衰腎關不固宜用八味腎氣丸按白虎加人參湯乃傷寒論治外感之熱傳入陽明胃腑以致作渴之方方書謂上消者宜用之此借用也愚曾試驗多次然必胃腑兼有實熱者用之方的中消用調胃承氣湯此須細爲斟酌若其右部之脈滑而且實用之猶可若其人飲食甚勤一時不食即心中怔忡且脈象微弱者係胸中大氣下陷中氣亦隨之下陷宜用升補氣分之藥而佐以收澀之品與健補脾胃之品拙擬升陷湯

在第四卷

後有治驗之案可參觀若誤用承氣下之則危不旋踵至下

消用八味腎氣丸其方金匱治男子消渴飲一斗溲亦一斗而愚嘗試驗其方不惟治男子甚效即治女子亦甚效曾治一室女得此證用八味丸變作湯劑按後世法地黃用熟地桂用肉桂丸中用幾兩者改用幾錢惟茯苓澤泄各用一錢兩劑而愈後又治一少婦得此證投以原方不效改遵古法地黃用乾地黃即今生地桂用桂枝分量一如前方四劑而愈此中有宜古宜今之不同者因其證之涼熱與其資稟之虛實不同耳

嘗因化學悟出治消渴之理今試以靈貯凉水置爐上壺外即凝有水珠恆至下滴迨壺熱則其水珠即無蓋爐心必有輕氣上升與空氣中之養氣合即能化水着於凉水壺上即可成珠下滴迨壺熱則所着之水旋着旋即涸去故又不見水人腹中之氣化壯旺清陽之氣息上升其中必挾有輕氣上升與自肺吸進之養氣相合亦能化水着於肺胞之上而爲津液津液充足自能不渴若其肺體有熱有如爐上壺熱所着之水旋即涸去此渴之所由來也當治以清熱潤肺之品若因心火熱而鑠肺者更當用清心之藥若肺體非熱因腹中氣化不升輕氣即不能上達於肺與吸進之養氣相合而生水者當用升補之藥補其氣化而導之上升此拙擬玉液湯之義也然輕氣必隨清陽上升而清陽實

生於人身之熱力猶爐心有火而爐心始有輕氣上升也故消渴之證恆有因脾胃濕寒真火衰微者此腎氣丸所以用桂附而後世治消渴亦有用乾薑白朮者嘗治一少年咽喉常常發乾飲水連連不能解渴診其脈微弱遲濡投以四君子湯加乾薑桂枝尖一劑而渴止矣 又有濕熱鬱於中焦作渴者蒼柏二妙散丹溪越鞠丸皆可酌用

### 滋脾飲 治同前證

生箭芪 伍錢

大生地 壹兩

生懷山藥 壹兩

淨黃肉 伍錢

生豬胰子 三錢切碎

右五味將前四味煎湯送服豬胰子一半至煎渣時再送服餘一半若遇中上二焦積有實熱脈象洪實者可先服白虎加人參湯數劑將實熱消去強半再服此湯亦能奏效消渴一證古有上中下之分謂其證皆起於中焦而極於上下究之無論上消中消下渴約皆渴而多飲多尿其尿有甜味是以聖濟總錄論消渴謂渴而飲水多小便中有脂似麩而甘至謂其證起於中焦是誠有理因中焦脾病而累及於脾也蓋脾爲脾之副臟在中醫書中名爲散膏即扁鵲難經所謂脾有散膏半斤也脾尾銜接於脾門其全體之動脈又自脾脈分支而來故與脾有密切之關係有時脾臟發酵多釀甜味由水道下陷其大小便遂含有糖質迨至脾病累及於脾致脾氣不

能散精達肺

內經謂脾氣散精上達於肺

則津液少不能通調水道

內經謂脾通調水道下歸膀胱

則小便無節是以渴而多飲

多洩也嘗閱申報有胡適之者當世之文豪也因病消渴求治於北平協和醫院久而無

效懼而旋里亦以爲無藥可醫矣其友勸其延中醫治療服藥竟愈所用方中以黃芪爲

主藥爲其能助脾氣上升還其散精達肺之舊也金匱有腎氣丸善治消渴其方以乾地

黃

即生地黃

爲主取其能助腎中之真陰上潮以潤肺又能協同山萸肉以封固腎關也又向

因治消渴曾擬有玉液湯（方在前）方中以生懷山藥爲主屢試有效近閱醫報且有單

服山藥以治消渴而愈者以其能補脾固腎以止小便頻數而所含之蛋白質又能滋補

脾臟使其散膏充足且又色白入肺能潤肺生水即可以止渴也又俗傳治消渴方單服生

豬胰子可愈蓋豬胰子即豬之脾是人之脾病而可補以物之脾也此亦猶鷄內金諸家

本草皆謂其能治消渴之理也鷄內金與豬胰子同爲化食之物也愚因集諸藥合爲一

方以治消渴屢次見效用敢筆之於書以公諸醫界

（附記）天津盧抑甫君評此方云按糖尿病一證在西醫病理上之研究由於脾臟之島

組織萎縮製造內分泌物之機能減却故對於副腎之內分泌物亞篤列那林助肝臟造



糖之過勝技能不能制止之因而血液內含糖量過多以致尿內亦含有糖質西醫起初無適切之治法自西歷一千九百二十年西醫邦廷古氏由牛馬豕等之膀胱抽出其內分泌物名之曰依蘇林注射於皮下或靜脈內能使血內過量之糖立即減少雖至病劇陷於昏睡時亦有起死回生之望今先生治糖尿病之處方內有豬胰一味屬於古來臟器療法與現今西醫之內分泌療法暗合但古人只知以臟補臟不知其有內分泌物之作用又內服之法不如注射因經口入胃其有效成分爲酸性胃液所破壞即難奏效注射則成分直達於病所其奏效必確也如除去豬胰子之脂肪結締組織及蛋白酵素製成水製流膏使僅含有抗糖物質再加鹼性液以防制其胃液之酸性則內服之缺點可以免去病人不欲行注射者當以此法爲最良矣中國古方治糖尿病有黃芪湯與八味丸以新學理釋之必有使糖量減少之作用至於何種藥味有此作用尙待研究此時難以指定也日醫博士上條秀介曾於中藥何首烏抽出一種有效成分名之曰巴利夠寧以治糖尿病確有減少糖質作用發表治驗報告東西醫界甚爲驚異我國醫家如能於黃芪湯八味丸抽出某藥成分證明有減糖質作用則上條秀介不能專美於前矣然而未

能抽出者科學落後其程度不如人也以哲學的藥性治哲學的病理則終於哲學的範圍而已而先生此方由黃芪湯與八味丸脫胎變體而來有西醫製方之精神又加豬胰子之臟器療法暗合於科學之原理此則爲現今醫界所未有而爲鄙人所甚欽佩無已者也

又先生所著之衷中參西錄中各種處方類於此方之理想者甚多鄙人臨證採用多取良效擬撰張氏醫方新解以西醫之理發明之俾西醫界中亦可放胆試用此誠溝通中西之資藉也以後得暇當按方循序披露登於拙撰醫學報即醫藥衛生淺說報以便中西醫界之參考庶於當今醫學有小補云

觀盧君此段議論誠當今醫界之偉人也盧君印(謙)先畢業於西醫校後又自精心研究中醫生平臨證以西理斷病以中藥治病自命爲新醫學家凡所用之中藥皆細心研究其成分將其有用之成分提出或製爲流液或製爲結晶用之較諸藥片恆有捷效且將其提出諸藥之成分恆披露於所撰醫報中盧君自命爲新醫學家洵非虛語也

### 治癰閉方

宣陽湯 治陽分虛損氣弱不能宣通致小便不利

野台參

四錢

威靈仙

錢半

寸麥冬

帶心六錢

地膚子

壹錢

濟陰湯 治陰分虛損血虧不能濡潤致小便不利

懷熟地

壹兩

生龜板

搗碎伍錢

生杭芍

伍錢

地膚子

壹錢

陰分陽分俱虛者二方並用輪流換服如左案所載服法小便自利

一媼年六十餘得水腫証延醫治不效時有專以治水腫名者其方祕而不傳服其藥自大便瀉水數桶一身腫盡消言忌鹹百日可保永愈數日又見腫旋復如故服其藥三次皆然而病人益衰憊矣蓋未服其藥時即艱於小便既服藥後小便滴瀝全無所以旋治而旋腫也再延他醫皆言服此藥愈後復發者斷乎不能調治後愚診視其脈數而無力愚曰脈數者陰分虛也無力者陽分虛也膀胱之腑有下口無上口水飲必隨氣血流行而後能達於膀胱出爲小便內經所謂州都之官津液存焉氣化則能出者是也此脈陰陽俱虛致氣化傷損不能運化水飲以達膀胱此小便所以滴瀝全無也易繫辭曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

往者屈也來者信

音伸

也屈信相感而利生焉此天地之氣化即人身之氣化也爰立兩方

一方以人參爲君輔以麥冬以濟參之熱靈仙以行參之滯少加地膚子爲嚮導藥名之

曰宣陽湯以象日象暑一方以熟地爲君輔以龜板以助熟地之潤芍藥以行熟地之滯

芍藥善利小便故能行熟地之泥

亦少加地膚子爲嚮導藥名之濟陰湯以象月象寒二方輪流服之以象日

月寒暑相推往來屈伸相感之義俾先服濟陰湯取其貞下起元也服至三劑小便稍利再服宣陽湯亦三劑小便大利又再服濟陰湯小便直如泉湧腫遂盡消病家疑而問曰前服濟陰湯小便微通此時又服之何其功效百倍於從前答曰善哉問也前服濟陰湯似於冬令培草木之根莖以厚其生長之基也於服宣陽湯數劑後再服濟陰湯如純陽月後一陰二陰甫生時當五六月大雨沛行萬卉之暢茂有迥異尋常者矣

或問西人謂膀胱有進水之口在出水之口下其口斜透膀胱且有油膜繞護故不易辨認西人實驗最精其說必不差謬予論膀胱何以仍遵古說答曰西人之說雖得之實驗然必以中法參之始能盡臟腑之微奧唐容川曰三焦之根出於腎系兩腎之間有油膜一條連於脊骨自下而上第七節命門穴處即腎系也由腎系下生連網油膜

俗名網油西人名連網

是爲下焦中生板油是爲中焦上生隔膜是爲上焦蓋三焦即人身之油膜上絡心肺中絡脾胃下絡腸與腎連膀胱食入於胃由腸而下飲入於胃則胃之四面皆有微絲血管將水吸出散走油膜之上即三焦也水緣三焦下行由腎濾過以達膀胱今試取物臍驗之其出水口下油膜繞護之處即與三焦連網相連之處初無外露之口三焦氣化流行自能運轉水飲由連網而達於膀胱內經所謂三焦者決瀆之官水道出焉者是也由斯觀之其進水之口原在若有若無之間謂之有可也謂之無亦無不可也彼西人駁三焦之說而不知其所謂連網即三焦且不知連網生於腎系是實驗雖精而猶未精也

一婦人年三十許因陰虛小便不利積成水腫甚劇大便亦旬日不通一老醫投以八正散不效友人高夷清爲出方用生白芍六兩煎汁兩大碗再用阿膠二兩鎔化其中俾病人盡量飲之老醫甚爲駭疑夷清力主服之盡劑而二便皆通腫亦頓消後老醫與愚覲面爲述其事且問此等藥何以能治此病答曰此必陰虛不能化陽以致二便閉塞白芍善利小便阿膠能滑大便二藥並用又大能滋補真陰使陰分充足以化其下焦偏勝之陽則二便自能通利也

長子蔭潮治一水腫證其人年六旬二便皆不通利心中滿悶時或煩躁知其陰虛積有內熱又兼氣分不舒也投以生白芍三兩橘紅柴胡各三錢一劑二便皆通繼服滋陰理氣少加利小便之藥而愈

一婦人年四十許得水腫証百藥不效偶食綠豆稀飯覺腹中鬆暢遂連服數次小便大利而愈有人向愚述其事且問所以能愈之故答曰綠豆與赤小豆同類故能行水利小便且其性又微涼大能滋陰退熱凡陰虛有熱致小便不利者服之皆有效也

白茅根湯 治陰虛不能化陽小便不利或有濕熱壅滯以致小便不利積成水腫

白茅根

掘取鮮者去淨皮與節間小根細切一斤

將茅根用水四大碗煮一沸移其鍋置爐旁候十數分鐘視其茅根若不沉水底再煮一沸移其鍋置爐旁須臾視其根皆沉水底其湯即成去渣溫服多半杯日服五六次夜服兩三次使藥力相繼周十二時小便自利

茅根形象中空頗類葦根鮮者煮稠汁飲之則其性微涼其味甘而且淡爲其涼也故能去實火爲其甘也故能清虛熱爲其淡也故能利小便且其根不但中空周遭上有十

二小孔

補視可見

象人十二經絡故又能宣通臟腑暢達經絡兼治外感之熱而利周身之水

也然必須如此煮法服之方效若久煎其清涼之性及其宣通之力皆減服之即無效矣所煮之湯歷一晝夜即變綠色若無發酵之味仍然可用

一婦人年四十餘得水腫證其翁固諸生而精於醫者也自治不效延他醫診治亦不效偶與愚遇問有何奇方可以救此危証因細問病情知係陰虛有熱小便不利遂俾用鮮茅根煎濃汁飲旬日全愈

一媼年六十餘得水腫證醫者用藥治愈三次皆反覆再服前藥不效其子商於梓匠欲買棺木梓匠固其親屬轉爲求治於愚因思此證反覆數次後服藥不效者必是病久陰虛生熱致小便利不利細問病情果覺肌膚發熱心內作渴小便甚少俾單用鮮白茅根煎湯頻頻飲之五日而愈

一婦人年四十許得水腫證其脈象大致平和而微有滑數之象俾濃煎鮮茅根湯飲之數日病愈強半其子來送信愚因囑之曰有要緊一言前竟忘却患此證者終身須忌食牛肉病愈數十年食之可以復發孰意其子未返已食牛肉且自覺病愈出坐庭中又兼

受風其證陡然反覆一身盡腫兩目因腫甚不能開視愚用越婢湯發之以滑石易石膏用越婢湯原方常有不汗者若以滑石易石膏則易得汗一劑汗出小便頓利腫亦見消再飲白茅根湯數日病遂全愈

按白茅根拙擬二鮮飲與三鮮飲用以治吐衄此方又用以治水腫而其功效又不止此也愚治傷寒溫病於大便通後陽明之盛熱已消恆俾濃煮鮮茅根湯渴則飲之其人病愈必速且愈後即能飲食更無反覆之患蓋寒溫愈後其人不能飲食與屢次復病者大抵因餘熱未盡與胃中津液未復也白茅根甘涼之性既能清外感餘熱又能滋胃中津液也至內有鬱熱外轉覺涼者其性又善宣通鬱熱使達於外也

又按凡臃脹無論或氣或血或水腫治愈後皆終身忌食牛肉蓋牛肉屬土食之能壅滯氣血且其彭亨之形有似腹脹故忌之也醫者治此等證宜切囑病家慎勿誤食

### 溫通湯 治下焦受寒小便不通

椒 目 炒搗八錢

小茴香 炒搗二錢

威靈仙 三錢

人之水飲由三焦而達膀胱三焦者身內脂膜也曾即物類驗之其脂膜上皆有微絲血管狀若紅絨毛即行水之處此管熱則澎漲涼則凝滯皆能閉塞水道若便濁兼受涼者



更凝結稠黏杜塞溺管滴瀝不通故以椒目之滑而溫茴香之香而熱者散其凝寒卽以通其竅絡更佐以靈仙溫竄之力化三焦之凝滯以達膀胱卽化膀胱之凝滯以達溺管也涼甚者肉桂附子乾薑皆可酌加氣分虛者更宜加人參助氣分以行藥力

加味苓桂朮甘湯

治水腫小便不利其脈沉遲無力自覺寒涼者

於朮三錢

桂枝尖二錢

茯苓片二錢

甘草一錢

乾薑三錢

人參三錢

烏附子二錢

威靈仙一錢五分

腫滿之證忌用甘草以其性近壅滯也惟與茯苓同用轉能瀉濕滿故方中未將甘草減去若腫脹甚劇恐其壅滯者去之亦可

服藥數劑後小便微利其脈沉遲如故者用此湯送服生硫黃末四五厘若不覺溫暖體驗漸漸加多以服後移時覺微溫爲度

人之水飲非陽氣不能宣通上焦陽虛者水飲停於膈上中焦陽虛者水飲停於脾胃下焦陽虛者水飲停於膀胱水飲停蓄既久遂漸漬於周身而頭面肢體皆腫甚或腹如抱甕而臃脹成矣此方用苓桂朮甘湯以助上焦之陽卽用甘草協同人參乾薑以助中焦

之陽又人參同附子名參附湯

能固下焦元陽將脫

協同桂枝更能助下焦之陽

桂枝上透胸膈下通膀胱故腎氣丸用桂枝不用肉桂

三焦陽氣宣通水飲亦隨之宣通而不復停滯爲患矣至靈仙與人參並用治氣虛小便

不利甚效

此由實驗而知故前所載宜陽湯並用之

而其通利之性又能運化朮草之補力俾脹滿者服之毫無滯

碍故加之以爲佐使也若藥服數劑後脈仍如故病雖見愈實無大效此眞火衰微太甚恐非草木之品所能成功故又用生硫黃少許以補助相火諸家本草謂其能使大便潤小便長補火之中大有行水之力故用之因涼成水腫者尤良也第八卷載有服生硫黃法其中有治水腫之驗案宜參觀

脈沉水腫與脈浮水腫迥異脈浮者多係風水腠理閉塞小便不利當以金匱越婢湯發之通身得汗小便自利若浮而兼數者當是陰虛火動宜兼用涼潤滋陰之藥脈沉水腫亦未可遽以涼斷若沉而按之有力者係下焦蘊熱未化仍當用涼潤之藥滋陰以化其陽小便自利惟其脈沉而且遲微弱欲無詢之更自覺寒涼者方可放胆用此湯無碍或但服生硫黃試驗漸漸加多亦可奏效特是腫之劇者脈之部位皆腫似難辨其沉浮與有力無力必重按移時使按處成凹始能細細辨認

按苓桂朮甘湯爲治上焦停飲之神方金匱曰短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之喻嘉言註云呼氣短宜用苓桂朮甘湯以化太陽<sup>上</sup>之氣吸氣短宜用腎氣丸以納少陰<sup>經</sup>之氣推喻氏之意以爲呼氣短則上焦陽虛吸氣短則下焦陰虛故二方分途施治然以之爲學者說法以自明其別有會心則可以之釋金匱謂其文中之意本如是則不可何者仲景當日著書立言原期後世易於率由使二方果如此分用仲景何竟統同言之致令後世費如許推測蓋膈上與膀胱相隔雖遠實皆太陽寒水之所統貫太陽者天也膈上也寒水者水也腎之膀胱也水氣上升而爲雲復得天氣下降而爲水天水相連升降一氣此太陽寒水所以相併而爲一經也愚臨證體驗多年見有膈上氣旺而膈胸開朗者必能運化水飲下達膀胱此用苓桂朮甘湯治飲之理也見有腎氣旺而膀胱流通者又必能吸引水飲下歸膀胱此用腎氣丸治飲之理也故仲景淋上焦有微飲而短氣者並出兩方任人取用其一皆能立建功效況桂枝爲宣通水飲之妙藥茯苓爲淡滲水飲之要品又爲二方之所同乎且金匱之所謂短氣乃呼氣短非吸氣短也何以言之吸氣短者吸不歸根即吐出神農本經所謂吐吸即喘之替言也金

匿之文有單言喘者又有短氣與喘並舉者若謂短氣有微飲句當兼呼氣短與吸氣短而言而喘與短氣並舉者又當作何解耶

惟論盜飲變其文曰氣短似言吸氣短

用越婢湯治風水愚曾經驗遇藥病相投功效甚捷其方金匱以治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者而愚臨証體驗以來即非續自汗出者用之亦可若一劑而汗不出者可將石膏易作滑石

分量須加重

寒通湯

治下焦蘊蓄實熱膀胱腫脹溺管閉塞小便滴瀝不通

滑石 壹兩

生杭芍 壹兩

知母 八錢

黃柏 八錢

一人年六十餘溺血數日小便忽然不通兩日之間滴瀝全無病人不能支持自以手揉擠流出血水少許稍較輕鬆揉擠數次疼痛不堪揉擠徬徨無措求爲診治其脈沉而有力時當仲夏身覆厚被猶覺寒涼知其實熱鬱於下焦溺管因熱而腫脹不通也爲擬此湯一劑稍通又加木通海金沙各二錢服兩劑全愈

升麻黃芪湯

治小便滴瀝不通偶因嘔吐欬逆或側臥欠伸可通少許此轉胞也用升提藥提其胞而轉正之胞系不了戾小便自利

生黃芪 五錢

當歸 四錢

升麻 貳錢

柴胡 貳錢

一婦人產後小便不利遣人詢方俾用生化湯加白芍治之不效復來詢方言有時惡心嘔吐小便可通少許愚恍悟曰此必因產時努力太過或擗擠太甚以致胞系了戾是以小便不通惡心嘔吐則氣機上逆胞系有提轉之勢故小便可以稍通也遂爲擬此湯一劑而愈

三焦之氣化不升則不降小便不利者往往因氣化下陷鬱於下焦滯其升降流行之機也故用一切利小便之藥不效而投以升提之藥恆多奇效是以拙擬此湯不但能治轉胞並能治小便癰閉也

古方有但重用黃芪治小便不利積成水腫者陸定圃冷庵醫話載海寧許珊林觀察精醫理官平度州時幕友杜某之戚王某山陰人夏秋間忽患腫脹自頂至踵大倍常時氣喘聲嘶大小便不通危在旦夕因求觀察診之令用生黃芪四兩秫米一酒鍾煎一大碗用小匙逐漸呷服至蓋許氣喘稍平即於一日間服盡移時小便大通溺器易三次腫亦隨消惟脚面消不及半自後仍服此方黃芪自四兩至一兩隨服隨減佐以祛濕平胃之

品兩月復元獨脚面有錢大一塊不消恐次年復發勸其歸屆期果患前證延紹城醫士診治痛詆前方以爲不死乃是大幸遂用除濕猛劑十數服而氣絕次日將及蓋棺其妻覓其兩目微動呼集衆人環視連動數次復用芪米湯灌救至滿口不能下少頃眼忽一睜湯俱下咽從此便出聲矣服黃芪至數斤並脚面之腫全消而愈觀察之弟辛未曹部謂此方治驗多人先是嫂吳氏患子死腹中渾身腫脹氣喘身直危在頃刻余兄徧檢名人醫案得此方遵服便通腫消旋即產下一無所苦後在平度有姬顧姓患腫脹脫胎此方數服而愈繼又治愈數人王某更在後矣蓋黃芪實表虛則水聚皮裏膜外而成腫脹得黃芪以開通水道水被祛逐脹自消矣

按水腫之證有虛有實實者似不宜用黃芪然其證實者甚少而虛者居多至其證屬虛矣又當詳辨其爲陰虛陽虛或陰陽俱虛陽虛者氣分虧損可單用重用黃芪若醫話中所云云者陰虛者其血分枯耗宜重用滋陰之藥兼取陽生陰長之義而以黃芪輔之至陰陽俱虛者黃芪與滋陰之藥可參半用之醫者不究病因痛詆爲不可用固屬鹵莽至其連用除濕猛劑其鹵莽尤甚蓋病至積成水腫即病因實者其氣血至此亦有虧損猛

悍藥或一再用猶可若不得已而用至數次亦宜以補氣血之藥輔之况其證原屬重用黃芪治愈之虛證乎至今之醫者對於此證縱不用除濕猛劑亦恆多利用水之品不知陰虛者多利用水之藥則傷陰陽虛者多用水利之藥亦傷陽夫利水之藥非不可用然貴深究其病因而爲根本之調治利水之藥不過用作嚮導而已

(附方)葛穉川肘後方治小便不通用大蜈蚣二枚取下體以水一升漬飲須臾即通又壽域方用土狗後半焙研調服半錢小便即通生研亦可又唐氏經驗方用土狗後截和麝香搗納臍中縛定即通

按土狗即蜈蚣日華本草謂其治水腫頭面腫李時診謂其通大小便治石淋誠爲利小便要藥凡小便不通者無論涼熱虛實皆可加於藥中以爲嚮導即單服之亦甚有效驗然觀古方皆用其後半截蓋其前半開破之力多後半利水力多若治二便皆不通者當全用之

俗傳治小便不通聞藥方用明雄黃一錢蟾酥五分焙發麝香六厘共研細鼻聞之小便即通

西法曰膀胱失却舒縮功用而成癰證小便或全不出或滿積後略出涓滴因膀胱無力不能使小便暢出或因中風所致或因下身截癰或偏癰所累亦有老人無癰證忽然膀胱自失功用又有腦證熱證溺秘不出者凡病人自言溺不利不能全出有時涓滴而出無力暢送醫者即應推究膀胱中積溺多少有無關係小腹脹大旁擊之覺有水是有積溺也治法用引溺銀管自陽莖透入膀胱將溺引出立覺輕鬆引溺銀管以銀爲之外面須極光滑滑有大小長短曲直或大曲略曲須各種俱備今各種皆有賣者臨證用常用微彎者約長七八寸略似鵝毛管彎端左右有細眼五六溺自眼入即可引出若膀胱偶失功用無別證者引一二次即愈若兼別證須另治病源仍用引出法以鬆適之可也引溺後服斑蝥酒數滴腰貼斑蝥膏藥多着衣令身煖食潤物如胡麻子水及粥之類

又謂有溺管變窄證有初起略通漸窄而塞者有忽然變窄初起即塞住溺道者其故或因炎證或因流白濁致病之源或飲酒房勞過度或傷於飲食遂致溺質改變溺管不安而病生此變窄所由也治分二法忽然變窄溺管素無病者鴉片膏四五厘漿和貯水節中射入溺管如無水節鴉片膏作丸納入肛門更用深澡盆滿盛熱水下身坐浸一二刻



時上身用綿被擁護發表當有小便出也內服胡麻子水或胡麻子粥戒飲酒戒食酸宜服微利藥勿令大便秘一法用朴硝一錢樟腦一二分滾水冲服凡患此者身宜溫暖勿觸犯冷氣慎飲食爲最要初起略通漸窄而塞者因溺管多生炎證更多流白濁或外被打踢跌落所傷內皮硬厚管塞阻溺或在腎囊肛門之間或在龜頭內寸許或在龜頭口或在膀胱蒂前有一處者有兩三處者治法用銀引溺管略逼深送入膀胱溺出後稍停片刻抽出日用一兩次用時須管以手搓熱擦以香油令極滑易入初用小者溺管漸開漸換大者其大小須有多種備用

按引溺管法甚妙邑有患小便難者初不甚劇漸至僅通滴瀝屢次服藥無效求愚診治愚曰此證但服藥不能療當用西人引溺法彼依愚言求西人用引溺管治之旬日而愈一人年近五旬小便陡然不通用一切利小便藥無效求爲診治投以升麻黃芪湯亦不效自言小便之口有物杜塞若小魚尿胞俾用針挑破小便湧出

又一婦人小便陡然不通滴瀝全無局迫之際其夫以細挺探其便處小便即時通下此其夫見愚爲述其事且問何以得此小便即時通下答曰此西人所謂溺道陡然變窄耳

治以引溺管之理也。按此證與前證雖皆未治以引溺管而皆爲引溺管可治愈之證。故連類及之以徵引溺管之確乎可用也。

鷄胚湯

治氣鬱成臑脹兼治脾胃虛而且鬱飲食不能運化

生鷄內金

去淨瓦石糟粕搗碎四錢

於朮三錢

生杭芍建錢

柴胡貳錢

廣陳皮三錢

生薑三錢

內經謂諸濕腫滿皆屬於脾。誠以脾也者與胃相連以膜能代胃行其津液且地居中焦

爲中焦油膩厚也

更能爲四旁宣其氣化脾若失其所司則津液氣化凝滯腫滿即隨之矣。是臑脹

者當以理脾胃爲主也。西人謂脾體中虛內多回血管若其回血管之血因脾病不能流通瘀而成絲成塊原非草木之根莖所能消化。鷄內金爲鷄之脾胃中有瓦石銅鐵皆能消化其善化有形瘀積可知故能直入脾中以消回血管之瘀滯而又以白朮之健補脾胃者以駕馭之則消化之力愈大。柴胡本經謂主腸胃中飲食積聚能推陳致新其能佐鷄內金消瘀可知且與陳皮並用一升一降而氣自流通也用芍藥者因其病雖係氣臑亦必挾有水氣芍藥善利小便即善行水且與生薑同用又能調和營衛使周身之氣化流通也。夫氣臑本爲難治之證從擬此方之後連治數證皆效後治一叟年六旬腹脹甚

劑治以此湯數劑其效不速用黑丑一錢炒研細煎此湯送下兩劑大見功效又去黑丑再服數劑全愈若小便時覺熱且色黃赤者宜酌加滑石數錢

按鷄內金雖饒有消化之力而諸家本草實有能縮小便之說恐於證之挾有水氣者不宜方中用白芍以利小便所以濟鷄內金之短也

內經謂按之脅而不起者風水也愚臨證體驗以來知凡係水臌按之皆不能即起氣臌則按之舉手即起或疑若水積腹中不行於四肢如方書所謂單腹脹者似難辨其爲氣爲水不知果爲水證重按移時舉手則有微痕而氣證則無也且氣臌證小便自若水臌證多小便不利此又其明徵也

### 鷄胚茅根湯

治水臌氣臌併病兼治單腹脹及單水臌脹單氣臌脹

生鷄內金

去淨泥土石精  
粕乳細五錢

生於朮

分量用  
時斟酌

鮮茅根

剉細貳兩

先將茅根煎湯數茶鍾

不可過煎一兩沸後慢火  
溫至茅根沉水底湯即成

先用一鍾半加生薑五片煎雞內金末至半鍾

時再添茅根湯一鍾七八沸後澄取清湯

不拘一鍾  
或一鍾多

服之所餘之渣仍用茅根湯煎服日進

一劑早晚各服藥一次初服小便即多數日後大便亦多若至日下兩三次宜減鷄內金

一錢加生於朮一錢又數日脹見消大便仍勤可減雞內金一錢加於朮一錢又數日脹消強半大便仍勤可再減雞內金一錢加於朮一錢如此精心隨病機加減俾其補破之力適與病體相宜自能全愈若無鮮茅根可用藥房中乾茅根一兩代之無鮮茅根即不用生薑所煎茅根湯宜當日用盡煎藥後若有餘剩可當茶溫飲之

雞內金之功效前方下已詳論之矣至於茅根最能利水人所共知而用於此方不但取其利水也易繫辭謂震於植物爲萑葦茅根中空其四圍月上且有十餘小孔與萑葦爲同類而春日發生最早是稟一陽初生之氣而上升者也故凡氣之鬱而不暢者茅根皆能暢達之善利水又善理氣故能佐雞內金以奏殊功也加生薑者恐鮮茅根之性微寒也且其味辛能理氣其皮又善利水也繼加於朮減雞內金者因脹已見消即當扶正以勝邪不敢純用開破之品致傷其正氣也或疑此方初次即宜少加於朮者而愚曾經試驗早加於朮固不若如此晚加之有效也

或問茅根能清熱利小便人所共知至謂兼理氣分之鬱諸家本草皆未言及子亦曾單用之而有確實之徵驗乎答曰此等實驗已不勝記曾治一室女心中常覺發熱屢次服

藥無效後愚爲診視六脈皆沉細診脈之際聞其太息數次知其氣分不舒也問其心中脇下恆隱隱作疼遂俾刮取鮮茅根剉細半斤煎數沸當茶飲之兩日後復診其脈已還浮分重診有力不復聞其太息問其脇下已不覺疼惟心中仍覺發熱耳再飲數日其心中發熱亦愈又嘗治少年得肺鼠疫病鼠疫分肺鼠疫腺鼠疫敗血鼠疫其咽喉唇舌異常乾燥精神昏昏似睡周身飢膚不熱脈象沉微問其心中時常煩悶此鼠疫之邪閉塞其少陰致腎氣不能上達也問其大便四日未行遂投以大劑白虎加人參湯先用茅根數兩煎湯以之代水煎藥取汁三鍾分三次飲下其脈頓起變作洪滑之象精神已復周身皆熱諸病亦皆見愈俾仍按原方將藥煎出每飲一次調入生鷄子黃一枚其病遂全愈蓋茅根生於水邊原兼稟寒水之氣且其出地之時作尖銳之錐形故能直入少陰助腎氣上達與心相濟則心即跳動有力是以其脈遂洪滑外現也再加上生鷄子黃以滋少陰之液俾其隨氣上升以解上焦之因燥生熱因熱生煩是以諸病皆愈也此二案皆足徵茅根理氣之效也

第  
二  
卷



# 衷中參西錄前三期合編第三卷

## 治黃疸方

審定金匱黃疸門硝石礬石散方

第五期衷中參西錄論黃疸治法宜參觀

仲景治黃疸方甚多有治外感之黃疸者傷寒論治發黃諸方是也有治內傷之黃疸者金匱黃疸門諸方是也其中治女勞疸硝石礬石散方爲治女勞疸之的方實可爲治內傷黃疸之總方其方硝石俗名火硝亦名焰硝礬石等分爲散大麥粥汁和服方寸匕約重一錢日三服病

隨大小便去小便正黃色大便秘黑是也特是方中礬石釋者皆以白礬當之不無遺

議嘗考本經礬石一名羽涅爾雅又名涅石徐氏說文釋涅字謂黑土在水中當係染黑之色礬石既爲涅石亦當爲染黑色所需之物豈非今之皂礬乎是知皂礬白礬古人皆名爲礬石而愚臨證體驗以來知以治黃疸白礬之功效誠不如皂礬蓋黃疸之證中法謂由脾中蘊蓄濕熱西法謂由胆汁溢於血中皂礬退熱燥濕之力不讓白礬故能去脾中濕熱而其色綠而且青亦名綠礬又名青礬能兼入胆經藉其酸收之味以斂胆汁之妄行且此物化學家原可用硫酸水化鐵而成是知礦中所產之皂礬亦必多含鐵質尤可藉金鐵之

餘氣以鎮肝胆之木也。硝石性寒能解臟腑之實熱，味鹹入血分，又善解血分之熱。且其性善消，遇火即燃，又多含養氣，人身之血得養氣則赤，又藉硝石之消力以消融血中之渣滓，則血之因胆汁而色變者不難復於正矣。矧此證大便難者甚多，得硝石以軟堅開結，濕熱可從大便而解，而其鹹寒之性善清水腑之熱，即兼能使濕熱自小便解也。至用大麥粥送服者，取其補助脾胃之土以勝濕，而其甘平之性兼能緩硝礬之猛峻，猶白虎湯中之用粳米也。

按原方礬石下註有燒字，蓋以礬石酸味太烈，製爲枯礬則稍和緩，而愚實驗以來，知運用生者其效更速。臨証者相其身體強弱斟酌適宜可也。

或曰：硝石、朴硝性原相近，仲景他方皆用朴硝，何此方獨用硝石？答曰：朴硝味鹹，硝石則鹹而兼辛，辛者金之味也。就此一方觀之，礬石既含有鐵質，硝石又具有金味，既善理脾中之濕熱，又善制胆汁之妄行。中西醫學之理皆包括於一方之中，所以爲醫中之聖也。且朴硝降下之力多，硝石消融之力多。理詳後砂淋丸下胆汁之溢於血中者，布滿周身，難盡降下。實深賴硝石之善消融也。又朴硝爲水之精華，結聚其鹹寒之性，似與脾濕者不宜，硝石



遇火則燃兼得水中真陽之氣其味之鹹不若朴硝且兼有辛味似能散濕氣之鬱結而不致助脾濕也

戊午仲秋愚初至奉天有小北門裏童子朱文奎者年十三歲得黃疸證月餘服藥無效寢至不能飲食其脈甚沈細治以此散爲其年幼一次止服六分旬日病愈而面目猶微黃改用生山藥生薏米各八錢茯苓三錢連服數劑全愈文奎雖在髫齡已善書畫自書對聯酬愚字態韶秀蓋仿王夢樓也

或謂西人謂胆汁能滲入小腸消化食物若過少則大便色白食物不化若過多則嘔吐綠水苦澁若溢於血分則成黃疸今既論疸證兼採其說想其能助小腸消食之說亦可信歟答曰其說殊有理小腸雖爲心之腑而與胃相連同爲消化食物之具亦當從胃之氣化與胃均以土論五行之理木能疏土胆之汁亦木也故能疏通小腸之氣化助之消化食物有如柴胡爲肝胆之藥而本經謂其主腸胃中飲食積聚能推陳致新也即使小腸經絡與心相表裏當以火論而以木助火是亦五行相生之理也西人又謂甜肉汁與胆汁同入小腸以助小腸化食甜肉係胰子胰子善消油能入小腸助小腸以化脂肪而

食物以穀爲主五穀皆屬土澱粉乃穀之重要分子故胆汁能助小腸以化澱粉也

接近今所譯西人方書黃疸又名白血病似不專主其胆汁溢於血中之說也又有名爲

脾疳者似亦改從中法脾有濕熱之說也其治法用鹽酸規尼涅每日一瓦至二瓦

清金解毒湯下

分三次服下規尼涅即鷄納霜

詳第七卷加味小柴胡湯下

其藥以硫酸製者名硫酸規尼涅以鹽酸

製者名鹽酸規尼涅皆有透表之力善治間歇熱鹽酸者似稍優或治以林擒鐵丁係林

擒精液與鐵浸酒所製性能補血化滯清熱解煩然二藥以治外感黃疸猶可以治內傷

黃疸則迥不如硝石礬石散也

### 治淋濁方

#### 理血湯

治血淋及溺血大便下血證之由於熱者

生山藥 壹兩

生龍骨 搗細陸錢

生牡蠣 搗細陸錢

海螵蛸 搗細四錢

茜草 貳錢

生杭芍 叁錢

白頭翁 叁錢

真阿膠 不用炒三錢

溺血者加龍胆草三錢大便下血者去阿膠加龍眼肉五錢

血淋之證大抵出之精道也其人或縱慾太過而失於調攝則腎臟因虛生熱或慾盛虛

制而妄言採補則相火動無所洩亦能生熱以致血室男女皆有男以化精女以聚胞中血熱妄動與敗精涸

合化爲腐濁之物或紅或白成絲成塊溺時杜塞牽引作疼故用山藥阿膠以補腎臟之

虛白頭翁以清腎臟之熱茜草螵蛸以化其凝滯而兼能固其滑脫龍骨牡蠣以固其滑

脫而兼能化其凝滯四藥詳解在第八卷清帶湯下芍藥以利小便而兼能滋陰清熱所以投之無不效也此

證間有因勞思過度而心熱下降忿怒過甚而肝火下移以成者其血必不成塊惟溺時

牽引作疼此或出之溺道不必出自精道也投以此湯亦效

一人年三十許患血淋洩時血塊杜塞努力始能洩出疼楚異常且所洩者上多浮油膠

黏結於器底是血淋而兼膏淋也從前延醫調治經三十五人服藥年餘分毫無效廷臚

已甚後愚診視其脈弦細至數略數周身肌膚甲錯足骨凸處其肉皮皆成旋螺高寸餘

觸之甚疼蓋臥牀不起者已半載矣細詢病因謂得之忿怒之餘誤墜水中時當秋夜覺

涼甚遂成斯證知其忿怒之火爲外寒所束鬱於下焦而不散而從前居室之間又有失

保養處也擬投以此湯爲脈弦遂以柏子仁炒八錢代方中山藥以其善於養肝也疏方

甫定其父出所服之方數十紙欲以質其同異愚曰無須細觀諸方與吾方同者惟阿膠

白芍耳聞之果然其父問何以知之愚曰吾所用之方皆苦心自經營者故與他方不同服三劑血淋遂愈而膏淋亦少減改用拙擬膏淋湯後在連服二十餘劑膏淋亦愈而小便

仍然頻數作疼細詢其疼之實狀謂少腹常覺疼而且墜時有欲便之意故有尿即不能強忍知其又兼氣淋也又投以拙擬氣淋湯後在十劑全愈周身甲錯足上旋螺盡脫

或問柏子仁本經謂其能安五臟未嘗專言治肝子獨謂其善養肝者何也答曰凡植物皆喜陽光故樹杪皆向東南而柏樹則獨向西北西北金水之方也其實又隆冬不凋飽經霜露得金水之氣甚多肝臟屬木中含相火性甚暴烈內經名爲將軍之官如驕將悍卒必恩威並用而後能統馭之柏子仁既稟金水之氣水能滋肝金能鎮肝滋之鎮之肝木自得其養也曾治一少年其肝臟素有傷損左關脈獨微弱一日忽脇下作疼俾單用柏子仁兩許煎湯服之立愈觀此則柏子仁之善於養肝可知矣

或問白頭翁與羌活獨活皆名獨搖草以其有風不動無風獨搖也審是則白頭翁當養祛風與二活同性何爲其功專在於理血乎答曰白頭翁仲春貼地開花狀如小蓮花謝然後生葉數葉一梗其梗甚梗其葉之蒂又甚軟爲其葉之蒂軟微風吹嘯他草未動此

葉亦動所謂無風自動也爲其梗甚硬雖在大風中亦不動而其葉因蒂軟隨風偏於一邊無自反之力亦似不動也是知白頭翁亦名獨搖草原係古人之誤也蓋此藥多生於岡埠之陰其性寒涼其味苦而兼澀涼血之中大有固脫之力也

或問白頭翁既兼有收澀固脫之力金匱白頭翁湯何以治熱痢下重答曰白頭翁頭頂白毛形如其名必具有金氣熱痢下重係肝火下迫大腸藉金氣以制肝木之盛則肝火自消下重自除矣唐容川謂白頭翁通身皆有白毛似與白頭翁命名之義不符且與坊間醫者亦異然或別有此種想其所具之金氣愈全也

阿膠係用黑驢皮熬以阿井之水而成人之所共知也然必冬至後取其水熬者方爲合法蓋阿井爲濟水之伏流其水原重於他水而冬至後取之則素日盛水百斤之器又可加重二斤故以之熬膠沉重下達滋補肝腎伏藏血脈特是井中之泉不旺終日不遇取水數石且又俟冬至後取之所熬之膠何能濟一世之用且非自視熬之亦不知其真假也大抵用阿井水熬者無論何時皆可爲真者其膠以舌飴之甘淡異常不甚黏滯且無別臭能澄濁水爲清至於其本色熬老則黃而暗嫩則微黃而亮若黑者乃熬時攪以罌

色也然此亦難得今坊間所鬻之阿膠若果經夏不軟擘之可碎乃濟南濟水熬成雖非眞者用之亦有效驗以濟水與阿井原係一脈也不宜炒用者恐炒則涸其原汁且難辨其眞僞也

溺血之證不覺疼痛其證多出溺道間有出之精道者大抵心移熱於小腸則出之溺道肝移熱於血室則出之精道方中加生地黃者瀉心經之熱也若係肝移熱於血室者加龍胆草亦可

按溺血之証熱者居多而間有因寒者則此方不可用矣曾治一人年三十餘陡然溺血其脈微弱而遲自覺下焦涼甚知其中氣虛弱不能攝血又兼命門相火衰微乏吸攝之力以致腎臟不能封固血隨小便而脫出也投以四君子湯加熟地烏附子連服二十餘劑始愈又有非涼非熱但因脾虛不能統血而溺血者方書所謂失於便溺者太陰之不足也仍宜用四君子湯以龍骨牡蠣佐之

大便下血者大抵由於腸中回血管或血脈管破裂方中龍骨牡蠣之收澀原可補其破裂之處而又去阿膠者防其滑大腸也加龍眼肉者因此證間有因脾虛不能統血而然

者故加龍眼肉以補脾若虛甚者又當重用白朮或更以參芪佐之若虛而且陷者當兼佐以柴胡升麻若虛而且涼者當兼佐以乾薑附子減去芍藥白頭翁一少婦大便下血月餘屢次服藥不效愚爲診視用理血湯去阿膠如龍眼肉五錢治之而僻處藥坊無白頭翁權服一劑病稍見愈翌日至他處藥坊按方取藥服之病遂全愈則白頭翁之功效何其偉哉

### 膏淋湯 治膏淋

生山藥壹兩

生芡實六錢

生龍骨搗細六錢

生牡蠣搗細六錢

大生地切片陸錢

潞黨參叁錢

生杭芍叁錢

膏淋之證小便溷濁更兼稠黏便時淋澀作疼此證由腎臟虧損暗生內熱腎臟虧損則蒸藏不固精氣易於滑脫內熱暗生則膀胱薰蒸小便改其澄清久之三焦之氣化滯其升降之機遂至便時牽引作疼而溷濁稠黏矣故用山藥芡實以補其虛而兼有收攝之功龍骨牡蠣以固其脫而兼有化滯之用理詳第八卷 帶下地黃芍藥以清熱利便潞參以總提其氣化而斡旋之也若其證溷濁而不稠黏者是但出之溺道用此方時宜減龍骨牡蠣

之半

氣淋湯

治氣淋

生黃 莖五錢

知母 肆錢

生杭芍三錢

柴胡 貳錢

生明乳香 壹錢

生明沒藥 壹錢

氣淋之證少腹常常下墜作疼小便頻數淋澀疼痛因其人下焦本虛素蘊內熱而上焦之氣化又復下陷鬱而生熱則虛熱與濕熱互相結於太陽之腑滯其升降流通之機而氣淋之證成矣故以升補氣化之藥爲主而以滋陰利便流通氣化之藥佐之

勞淋湯

治勞淋

生山藥 壹兩

生芡實 叁錢

知母 叁錢

真阿膠 不用炒 叁錢

生杭芍 叁錢

勞淋之證因勞而成其人或勞力過度或勞心過度或房勞過度皆能暗生內熱耗散真陰陰虧熱熾薰蒸膀胱久而成淋小便不能少忍便後仍復欲便常常作疼故用滋補真陰之藥爲主而少以補氣之藥佐之又少加利小便之藥作向導然此證得之勞力者易治得之勞心者難治得之房勞者尤難治又有思慾無窮相火暗動而無所洩積久而成



淋者宜以黃柏知母以涼腎澤瀉滑石以瀉腎其淋自愈

或問以上治淋四方中三方以山藥爲君將山藥之性與淋證最相宜乎答曰陰虛小便不利者服山藥可利小便氣虛小便不攝者服山藥可攝小便蓋山藥爲滋陰之良藥又爲固腎之良藥以治淋証之淋澀頻數誠爲有一無二之妙品再因證而加以他藥輔佐之所以投之輒效也

### 砂淋丸 治砂淋亦名石淋

黃色生鷄內金

鷄鴨皆有脆皮而鷄者色黃宜去淨砂石壹兩

生黃芪

捌錢

知

母

捌錢

生杭芍

陸錢

蓬砂

陸錢

朴硝

伍錢

硝

石

伍錢

共軋細煉蜜爲丸桐子大食前開水送服三錢日兩次石淋之證因三焦氣化瘀滯或又勞心勞力過度或房勞過度膀胱暗生內熱內熱與瘀滯煎熬久而結成砂石杜塞溺道痿瘳異常其結之小者可用藥化之若大如桃杏核以上者不易化矣須用西人刮取之法此有關性命之證刮取之法雖險猶可於險中求穩也

雞內金爲鷄之脾胃原能消化砂石蓬砂可爲金銀銅錐藥其性原能柔五金治骨蠹故

亦善消硬物朴硝本經謂其能化七十二種石硝石本經不載而別錄載之亦謂其能化七十二種石想此二物性味相近古原不分即包括於朴硝條中至陶隱居始別之而其化石之能則同也然諸藥皆消破之品熱於元氣有傷故加黃蘗以補助氣分氣分壯旺益能運化藥力猶恐黃蘗性熱與淋證不宜故又加知母芍藥以解熱滋陰而芍藥之性又善引諸藥之力至膀胱也

西人用硫黃九分朴硝一分可製爲黃強水又用黃強水與朴硝等分可製爲硝強水二水皆能化石質之物由此理推之若去方中黃蘗加生硫黃四錢取其與朴硝化合更加生石膏兩半以解硫黃之熱其有效當更捷

醋之性善化硬物如鷄鴨蛋皮醋浸久可至消化若於食料中多調以醋亦可爲思患預防之法或患此者多食醋亦佳按化學之理鈣一分炭一分養三分化合則爲石鈣者石灰也水中皆有石灰原質開水中之白屑是也由此理推之水至膀胱與人身養氣炭氣渾合而適符化合之數即可結爲石淋人不能須臾離養氣而炭氣則可蠲除也預防此證當以蠲除炭氣爲第一要着

按囊炭二氣渾合其性必熱方書謂此證因膀胱蓄熱煎熬小便而成洵不誣也

又此證有救急之法當石杜塞不通時則仰臥溺之可通若仍不通或側臥或立而以手按地俾石離其杜塞之處即可通

堅夷志曰唐與正能以意治病吳巡檢病不得洩臥則微通立則不能涓滴徧用通藥不效唐詢其平素自製黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫黃飛去鉛質不化鉛砂入膀胱臥則偏重猶可洩立則正塞水道故不通取金液丹硫黃所製三百粒分十次服瞿麥湯送下鉛得硫則化水道遂通按此爲罕見之證其杜塞溺道與石淋相似附記於此以備參觀

寒淋湯 治寒淋

生山藥 壹兩

小茴香 炒搗貳錢

當歸 叁錢

生杭芍 貳錢

椒目 炒搗貳錢

右所論五淋病因不同而證皆兼熱外此實有寒熱凝滯寒多熱少之淋其證喜飲熱湯喜坐暖處時常欲便後益抽引作疼治以此湯服自愈

秘真丸 治諸淋證已愈因淋久氣化不固遺精白濁者

五倍子 壹兩 去淨蟲糞

粉甘草 八錢

右二味共軋細每服一錢竹葉煎湯送下日再服

毒淋湯 治花柳毒淋疼痛異常或兼白濁或兼溺血

金銀花六錢

海金沙三錢

石葦貳錢

牛蒡子炒搗貳錢

甘草稍二錢

生杭芍三錢

三七搗細貳錢

鴨蛋子去皮三十粒

右藥八味先將三七末鴨蛋子仁開水送服再服餘藥所煎之湯

鴨蛋子一名鴉胆子詳解見痢疾門漿理湯後

此證若兼受風者可加防風二三錢若服藥數劑後其疼瘥減而白濁不除或更遺精者可去三七鴨蛋子加生龍骨生牡蠣各五錢

今人治毒淋喜用西藥猛悍之品以其善消淋證之毒菌也不知中藥原有善消此等毒菌更勝於西藥者即方中之鴨蛋子是也蓋鴨蛋子味至苦而又善化癰解毒清熱其能消毒菌之力全在於此又以三七之解毒化腐生肌者佐之以加於尋常治淋藥中是以治此種毒淋更勝於西藥也

消毒二仙丹 治花柳毒淋無論初起日久凡有熱者服之皆效

丈菊子搗碎壹兩

鴨蛋子去皮肆十粒仁破者勿用服時宜囫圇吞下

右藥二味將丈菊子煎湯一鍾送服鴨蛋子仁

丈菊俗名向日葵其花善催生子善治淋

詳解在第八卷大順湯後

鄰村一少年患此證便時膏淋與血

液相雜疼痛頗劇語以此方數次全愈

鮮小薊根湯

治花柳毒淋兼血淋者

鮮小薊根

洗淨剉細壹兩

右一味用水煎三四沸取清湯一大茶鍾飲之一日宜如此飲三次若畏其性涼者一次用六七錢亦可

曾治一少年患此證所便者血溺相雜其血成絲成塊間有脂膜疼痛甚劇且甚腥臭屢次醫治無效授以此方連服五日全愈

小薊之形狀於三鮮飲

在第二卷

下曾言之然彼則用治吐血此則用治毒淋中之血淋

救驗而其功用實猶不止此也一十五六歲童子項下起疙疹數個大如巨栗皮色不顯發熱作疼知係陽證俾濃煎鮮小薊根湯連連飲之數日全消蓋其善消血中之熱毒又能化瘀開結故有如此功效也

硃砂骨湃波丸 治花柳毒淋久不愈者

骨湃波十瓦

硃砂 研細叁錢

將骨湃波與硃砂調和再用熟麥粉與之調和適宜可以爲丸即分作九十九丸成後再用一大盤盤中滿鋪麥粉將藥丸置盤中旋轉之俾外面以麥粉爲衣骨湃波之油質不外透易於曬乾每日服九丸分三次服下

骨湃波南美洲帶地方所產決明科樹中樹脂也西人謂脂油之類曰拔爾撒謨故亦名爲骨湃波拔爾撒謨其性最善治淋而以治毒淋尤效丁仲祐謂其自古迄今占治淋藥之首位惟其性近於熱淋證初得挾熱者似有不宜以硃砂之涼而解毒者濟之則無斷用而不宜矣此方愚用過多次皆效而以治毒淋之久不愈者尤效也

按硃砂爲水銀硫黃二原質合成此二原質皆善消除毒菌化合爲硃砂尤善防腐除炎解毒生肌且又色赤入心能解心經之熱內經謂諸痛瘡癢皆屬於心心中熱輕減而淋證之尿管疼或兼如瘡瘍之腐爛者自能輕減矣

西醫治淋恆用之方白檀香油二瓦烏羅透品一瓦撒魯兒一瓦和爲丸分作二十粒每

服二粒日服三次頗有效驗

按白檀香油出於前印度及印度羣島白檀香木心蒸餾水之揮發油色黃質稠厚難溶解於水易溶於強酒精其香氣特異而竄透長久留存稀釋之則芳芬似薔薇味奇烈而稍苦爲治淋要品然其性降下且有碍消化對於慢性淋疾似無效驗用時以其二十滴少加薄荷油一日之間分三次服下烏羅透品未詳何基之藥撒魯兒即楊曹詳痢疾門

見第三卷所附載西藥中

丁仲祐謂德國所製山推而善治五淋白濁並開胃益神固精健體歷經試驗甚效用量一日三回每回二粒又謂英國倫敦大藥廠所製之檀香五淋白濁丸凡淋證初起刺疼難忍繼有白濁此丸能將白濁之微生物排出數日即覺小便通暢淋濁自止用量初服每點鐘一粒服三日後一日僅服三回每回一粒至三粒

按西人治淋之藥恒統言治五淋究之惟宜於治毒淋而毒淋原不在五淋之內也即以治毒淋亦恒有不效之時如毒淋之兼血淋者但用西藥多不效而與鴨蛋子三七鮮小薔根並用則效至於淋久滑脫之甚者亦必須與中藥同用曾治一人從前患毒淋服各

種西藥兩月餘淋已不疼白濁亦大見輕然兩日不服藥白濁仍然反復愚俾用膏淋湯送服秘真丹兩次而愈

澄化湯

治小便頻數遺精白濁或兼疼澀其脈弦數無力或欬嗽或自汗或陰虛作熱

生山藥

壹兩

生龍骨

搗細陸錢

牡

蠣

搗細陸錢

牛蒡子

炒細叁錢

生杭芍

肆錢

粉甘草

錢半

生車前子

布包三錢

清腎湯

治小便頻數疼澀遺精白濁脈洪滑有力確係實熱者

知母

肆錢

黃

柏

肆錢

生龍骨

搗細肆錢

生牡蠣

炒搗三錢

海螵蛸

搗細三錢

茜草

貳錢

生杭芍

肆錢

生山藥

肆錢

澤

瀉

錢半

或問龍骨牡蠣收澀之品也子治血淋所擬理血湯中用之前方治小便頻數或兼淋澀用之此方治小便頻數疼澀亦用之獨不慮其收澀之性有礙於疼澀乎答曰龍骨牡蠣斂正氣而不斂邪氣凡心氣耗散肺氣息賁肝氣浮越腎氣滑脫用之皆有捷效即證兼瘀兼疼或兼外感放胆用之毫無妨礙拙擬補絡補管湯

在第二卷

理鬱升陷湯

在第四卷

從龍湯

在第五卷

清帶湯

在第七卷

諸方中論之甚詳皆可參觀



一叟年七十餘遺精白濁小便頻數微覺疼澀診其六脈平和兩尺重按有力知其年雖高而腎經確有實熱也投以此湯五劑全愈

一人年三十許遺精白濁小便時疼如刀勢又甚澀數診其脈滑而有力知其係實熱之證爲其年少疑兼花柳毒淋遂投以此湯加沒藥不去油三錢鴨蛋子皮去四十粒藥汁送服數劑而愈

舒和湯 治小便遺精白濁因受風寒者其脈弦而長左脈尤甚

桂枝尖肆錢

生黃芪三錢

續斷三錢

桑寄生三錢

知母三錢

服此湯數劑後病未全愈者去桂枝加龍骨牡蠣皆不用煨

各六錢

東海漁者年三十餘得騙白證甚劇旬日之間大見衰憊懼甚遠來求方其脈左右皆弦而左部弦而兼長夫弦長者肝木之盛也木與風爲同類人之臟腑無論何處受風其風皆與肝木相應內經陰陽應象論所謂風氣通於肝者是也脈之現象如此肝因風助倍形其盛而失其和也况病人自言因房事後小便當風從此外腎微腫遂有此證尤爲風之明徵乎蓋房事後腎臟經絡虛而不閉風氣乘虛襲入鼓動腎臟不能蟄藏內經謂腎主蟄藏顯

爲腎行氣之肝木又與風相應以助其鼓動而大其疏泄內經肝主疏泄故其病若是之劇也爲握此湯使脈之弦長者變爲舒和服之一劑見輕數劑後遂全愈以後凡遇此等症其脈象與此同者投以此湯無不輒效

治痢方

化滯湯

治下痢赤白腹疼裏急後重初起者若服藥後病未全愈繼服後方

生杭芍 壹兩

當歸 伍錢

山查 陸錢

萊菔子 炒搗伍錢

甘草 貳錢

生薑 貳錢

瘠身形壯實者可加大黃朴硝各三錢下之

雙理湯

治下痢服前藥未全愈者若下痢已數日亦可逕服此湯又治噤口痢

生山藥 捌錢

金銀花 伍錢

生杭芍 陸錢

牛蒡子 炒搗貳錢

甘草 貳錢

黃連 錢半

肉桂 去粗皮錢半將藥煎至數十沸再入

單赤痢加生地榆二錢單白痢加生薑二錢血痢加鴨蛋子二十粒去皮藥汁送服痢證古稱滯下所謂滯下者誠以寒火凝結下焦瘀爲膿血留滯不下而寒火交戰之由

又逼迫之以使之下也故方中黃連以治其火肉桂以治其寒二藥等分並用陰陽變理於頃刻矣用白芍者傷寒論諸方腹疼必加芍藥協同甘草亦變理陰陽之妙品且痢證之噤口不食者必是胆火逆衝胃口後重裏急者必是肝火下迫大腸白芍能瀉肝胆之火故能治之矧肝主藏血肝胆火戕則膿血自斂也用山藥者滯下久則陰分必虧山藥之多液可滋臟腑之真陰且滯下久則氣化不固山藥之收澀更能固下焦之氣化也又白芍善利小便自小便以瀉寒火之凝結牛蒡能通大便自大便以瀉寒火之凝結金銀花與甘草同用善解熱毒可預防腸中之潰爛單白痢則病在氣分故加生薑以行氣單赤痢則病在血分故加生地榆以涼血至痢中多帶鮮血其血分爲尤熱矣故加鴨蛋子以大清血分之熱拙擬此方以來歲遇患痢者不知凡幾投以此湯即至劇者連服數劑亦必見效

痢證多因先有積熱後又感涼而得或飲食貪涼或寢處貪涼熱爲涼迫熱轉不散迨歷日既多又寢至有熱無涼猶傷於寒者之轉病熱也所以此方雖黃連肉桂等分並用而肉桂之熱究不敵黃連之寒况重用白芍以爲黃連之佐使是此湯爲變理陰陽之劑而

實則清火之劑也

或問以此湯治痢雖在數日之後或服化滯湯之後而此時痢邪猶盛遽重用山藥補之獨無留邪之患乎答曰山藥雖饒有補力而性略遲鈍與參芪之迅速者不同在此方中雖與諸藥同服約必俟諸藥之涼者熱者通者利者將痢邪消融殆盡而後大發其補性以從容培養於諸藥之後俾邪去而正已復此乃完全之策又何至留邪乎且山藥與芍藥並用大能瀉上焦之虛熱與痢之噤口者尤宜是以愚用此湯遇痢之挾虛與年邁者山藥恆用至二兩或至一兩強也

或問地榆方書多炒炭用之取其黑能勝紅以制血之妄行此方治單赤痢加地榆何以獨生用乎答曰地榆之性涼而且澀能涼血兼能止血若炒之則無斯效矣此方治赤痢所以必加生地榆也且赤痢之證其劇者或因腸中潰爛林屋山人治湯火傷皮膚潰爛用生地榆末和香油敷之甚效夫外敷能治皮膚因熱潰爛而內服亦當有此效可知也鴨蛋子一名鴉胆子苦參所結之子也不但善治血痢凡諸痢證皆可用之即純白之痢用之亦有效驗而以治噤口痢烟後痢尤多奇效並治大小便因熱下血其方單用鴨蛋

子皮去擇成實者五六十粒白沙糖化水送服日兩次大有奇效若下血因涼者亦可與溫補之藥同用其善清血熱而性非寒涼善化瘀滯而力非開破有祛邪之能兼有補正之功誠良藥也坊間將鴨蛋子去皮用益元散爲衣治二便下血如神名曰菩提丹讚有其神靈之功也

一人年五十餘素吸鴉片當霍亂盛行之時忽然心中覺疼惡心嘔吐下痢膿血參半病家懼甚以爲必是霍亂暴證診其脈毫無閉塞之象惟弦數無力左關稍實愚曰此非霍亂乃下焦寒火交戰故腹中作疼下痢膿血上焦虛熱壅迫故惡心嘔吐實係痢證之劇者遂投以白芍六錢竹茹清半夏各三錢甘草生薑各二錢一劑嘔吐即愈腹疼亦輕而痢獨不愈不思飲食俾單用鴨蛋子五十粒一日連服兩次病若失審斯鴨蛋子不但善理下焦即上焦虛熱用之亦妙此所以治噤口痢而有捷效也

一人年四十八資稟素弱亦吸鴉片於季秋溱瀉不止一日夜八九次且帶紅色心中怔忡不能飲食日服溫補之藥分毫無效延愚診治其脈左右皆微弱而尺脈尤甚知係下焦虛寒爲其便帶紅色且從前服溫補之藥無效俾先服鴨蛋子四十粒瀉愈其半紅色

亦略減思飲食繼用溫補下焦之藥煎湯送服鴨蛋子三十粒後漸減至十粒十劑全愈蓋此證雖下焦虛寒而便帶紅色實兼有痢證也故單服鴨蛋子而瀉瀉已減半然亦足徵鴨蛋子雖善清熱化瘀而實無寒涼開破之弊洵良藥也

滄州友人滕玉可壬寅之歲設教鄰村於中秋下赤痢且多鮮血醫治兩旬不愈適愚他出新歸過訪之求爲診治其脈象洪實知其純係熱痢遂謂之曰此易治買苦參子百餘粒去皮分兩次服下即愈矣翌日愚復他出二十餘日始歸又訪之言曾偏問近處藥坊皆無苦參子後病益劇遣人至敝州取來如法服之兩次果愈功效何其神哉愚曰前因粗心言之未詳苦參子即鴨蛋子各藥坊皆有特其見聞甚陋不知係苦參所結之子耳玉可因病愈喜甚遂作詩以存紀念其詩曰一粒苦參一粒金天生瑞草起疴沉從今覓得活人藥九轉神丹何用尋後玉可旋里其族人有適自奉天病重歸來者大便下血年餘一身悉腫百藥不效玉可授以此方如法服之三次全愈

接鴨蛋子味甚苦服時若嚼破即不能下咽若去皮時破者亦不宜服恐服後若下行不遂或作惡心嘔吐故方書用此藥恆以龍眼肉包之一顆龍眼肉包七數以七七之數爲

劑以象大衍之用數

易繫辭曰大衍之數五十其用四十有九

然病重身强者猶可多服常以八八之粒爲劑然亦

不必甚拘

又按鴨蛋子連皮搗細醋調敷疔毒甚效立能止疼其仁搗如泥可以點痣拙擬毒淋湯

前在

又嘗重用之以治花柳毒淋其化瘀解毒之力如此治痢所以有奇效也

解毒生化丹

治痢久鬱熱生毒腸中腐爛時時切疼後重所下多似爛炙且有腐敗之

臭

金銀花一兩

生杭芍陸錢

粉甘草三錢

三七搗細貳錢

鴨蛋子

去皮揀成實者六十粒

右藥五味先將三七鴨蛋子用白沙糖化水送服次將餘藥煎湯服病重者一日須服兩劑始能見效

按此證乃痢之最重者若初起之時氣血未虧用拙擬化滯湯或加大黃朴硝下之即愈若未全愈繼服變理湯數劑亦可全愈若失治遷延日久氣血兩虧寢至腸中腐爛生機日減致所下之物色臭皆腐敗非前二方所能愈矣此方則重在化腐生肌以救腸中之腐爛故服之能建奇效也

一人年五十二因大怒之後中有鬱熱又寢於冷屋之中內熱爲外寒所束鬱而不散大便下血延醫調治醫者因其得於寒涼屋中謂係脾寒下陷投以參桂溫補之藥又加升麻提之服藥兩劑病益增重腹中切疼常常後重所便之物多如爛炙更延他醫又以爲下元虛寒而投以八味地黃丸作湯服之病益加重後愚診視其脈數而有力兩尺愈甚確知其毒熱鬱於腸中以致腸中腐爛也爲擬此方兩劑而愈

一婦人年五十許素吸鴉片又當惱怒之餘初患赤痢滯下無度因治療失宜漸至血液腐敗間如爛炙惡心懶食少腹切疼其脈洪數純是熱象亦治以此湯加知母白頭翁各四錢當日煎渣又另取鴨蛋子六十粒三七二錢送服每日如此服藥兩次三日全愈

天水滌腸湯 治久痢不愈腸中寢至腐爛時時切疼身體因病久羸弱者

生山藥 壹兩

滑石 壹兩

生杭芍 陸錢

潞黨參 三錢

白頭翁 三錢

粉甘草 貳錢

一燼年六十一歲於中秋痢下赤白服藥旋愈旋又反覆如此數次遷延兩月因少腹切疼自疑寒涼燒輒熨之初熨時稍覺輕以爲對證遂日日熨之而腹中之疼益甚晝夜呻



吟嚙口不食所下者痢與血水相雜且係腐敗之色其脈至數略數雖非洪實有力實無  
寒涼之象舌上生苔黃而且厚病人自謂下焦涼甚若用熱藥溫之疼當愈愚曰前此少  
腹切疼者腸中欲腐爛也今爲熱輒所熨而腹疼益甚敗血淋漓則腸中眞腐爛矣再投  
以熱藥危可翹足而待病人亦似會悟爲製此方因河間天水散一即六散原爲治熱痢之妙  
藥此方中重用滑石甘草故名之天水滌腸湯連服四劑疼止痢亦見愈減去滑石四錢  
加赤石脂四錢再服數劑病愈十之八九因上焦氣微不順俾用鮮藕四兩切細絲煎湯  
頻頻飲之數日而愈

按此證亦痢中至險之證而方中用人參者因痢久體虛所下者又多腐敗故於滋陰清  
火解毒藥中特加人參以助其生機而其產於潞者性平不熱於痢證尤宜也

又按此證若服此湯不效則前方之三七鴨蛋子金銀花亦可酌加或加生地榆亦可試  
觀生地榆爲末香油調塗湯火傷神效其能治腸中因熱腐爛可知也

通變白頭翁湯 治熱痢下重腹疼及患痢之人從前曾有阿片之嗜好者

生山藥 壹兩

白頭翁 肆錢

秦皮 三錢

生地榆 三錢

生杭芍 肆錢

甘草貳錢

旱三七札細三錢

鴨蛋子去皮揀成實者六十粒

右藥共八味先將三七鴨蛋子用白蔗糖水送服一半再將餘煎湯服其相去之時間宜至點半鐘所餘一半至煎湯藥渣時仍如此服法

傷寒論治厥陰熱利下重者有白頭翁湯其方以白頭翁爲主而以秦皮黃連黃柏佐之

陳古愚解曰厥陰標陰病則爲寒下厥陰中見

少陽

病則爲下利下重者經所謂暴注是

也白頭翁臨風偏靜特立不撓用以爲君者欲平走竅之火必先定動搖之風也秦皮浸水青藍色得厥陰風木之化而性涼能瀉肝家之熱故用以爲臣以黃連黃柏爲使者其性寒能除熱其味苦又能堅腸也總使風木遂其上行之性則熱利下重自除風火不相煽而燎原則熱渴飲水自止也

唐容川解曰白頭翁一莖直上四面細葉莖高尺許通體白芒其葉上下亦皆白芒花微香味微苦乃草中秉金性者能無風動搖以其得木氣之和也有風不動以其秉金性之剛也故用以平木熅風又其一莖直上故治下重使風上達而不迫注也

愚用此方面又爲之通變者因其方中盡却病之藥而無扶正之藥於證之兼虛者不宜

且連柏並用恐其苦寒之性妨碍脾胃過侵下焦也矧傷寒白頭翁湯原治時氣中初得之痢如此通變之至痢久而腸中腐爛者服之亦可旋愈也

唐氏論白頭翁詳矣而猶有剩義拙擬理血湯

在第三卷

下於白頭翁另有發明可與唐氏之

論參觀再者白頭翁入藥宜用其根且宜用其全根至根上端之白茸則用不用皆可也乃關外東三省藥房中所鬻之白頭翁但根端白茸下帶根之上端少許亦有不帶根者問其根作何用乃謂其根係漏蘆賣時作漏蘆不作白頭翁也愚聞之不禁啞然失笑夫漏蘆與白頭翁迥異而竟以白頭翁充之耶於是在東三省診病欲用白頭翁處方時即開漏蘆然醫藥所關非輕愚顧東三省之業醫者咸知之欲用白頭翁時勿爲藥房所誤陸軍團長王劍秋奉天鐵嶺人年四十許已未孟秋自鄭州病歸先瀉後痢腹疼重墜赤白稠黏一日夜十餘次先入奉天東人所設醫院中東人甚畏此證處以隔離所醫治旬日無效遂出院歸寓求爲診治其脈弦而有力知其下久陰虛肝胆又蘊有實熱也投以此湯一劑痢愈仍變爲瀉日四五次自言腹中涼甚愚因其疾原先瀉此時痢愈又瀉且恆以溫水袋自熨其腹疑其下焦或有伏寒遂少投以溫補之藥纔服一劑又變爲痢下

墜腹疼如故惟次數少減知其病原無寒不受溫補仍改用通變白頭翁湯一劑痢又愈一日猶瀉數次繼用生山藥一兩龍眼蓮子各六錢生杭芍三錢甘草茯苓各二錢又少加酒麴麥芽白蔻消食之品調補旬日全愈

奉天省議長李亞僑年近四旬因有事連夜廢寢陡然腹疼繼而泄瀉兼下痢其痢赤多於白上焦有熱不能飲食其脈弦而浮按之不實先投以三寶粥方在後腹疼與瀉痢皆見輕仍不能飲食繼用通變白頭翁湯方連服兩劑痢愈可進飲食腹疼泄瀉猶未全愈後仍用三寶粥方去鴨蛋子日服兩次數日病全愈

三寶粥 治痢久膿血腥臭腸中欲腐兼下焦虛憊氣化滑脫者

生山藥 札細壹兩

三七 札細貳錢

鴨蛋子 去皮五十粒

右藥三味先用水四鐘調和山藥末煮作粥煮時不住以箸攪之一兩沸即熟約得粥一大碗即用其粥送服三七末鴨蛋子

己巳之歲愚客居德州有盧雅雨公曾孫女年五十六於季夏下痢赤白遷延至仲冬不愈延醫十餘人服藥百劑皆無效驗亦以爲無藥可醫矣其弟月潭素通醫學偶與愚觀

面談及愚曰此病非難顧用藥何如耳因診之脈象微弱至數略數飲食減少頭目時或眩暈心中微覺煩熱便時下墜作疼然不甚劇詢其平素下焦畏涼是以從前服藥略加溫補上即煩熱略爲清理下又腹疼泄瀉也爲擬此方一日連服兩次其病遂愈後旬餘因登樓受涼舊證陡然反覆日下十餘次腹疼覺劇其脈象微弱如前至數不數俾仍用山藥粥送服生硫黃末服生硫黃詳解在第八卷三分亦一日服兩次病愈強半翌日又服一次心微覺熱繼又改用前方兩劑全愈

戊午秋日愚初至奉天有鐵嶺李濟臣年二十八下痢四十餘日膿血雜以脂膜屢次服藥病益增劇羸弱已甚診其脈數而細弱兩尺尤甚亦治以此方服後兩點鐘腹疼一陣下膿血若干病家言從前腹疼不若是之劇所下者亦不若是之多似疑藥不對證愚曰腹中瘀滯下盡即愈矣俾再用白蔗糖化水送服去皮鴨蛋子五十粒此時已屆晚九點鐘一夜安睡至明晨大便不見膿血矣後間日大便又少帶紫血俾仍用山藥粥送服鴨蛋子二十粒數次全愈

又斯秋中元節後愚自漢口赴奉路過都門小住數日有劉發起者下痢兩月不愈持友

人名片造寓求爲診治其脈近和平按之無力日便五六次血液腐敗便時不甚覺疼後重亦不劇亦治以此方一劑病愈強半翌日將行囑以再按原方服兩劑當愈後至奉接其來函言服第二劑效驗不如從前至三劑病轉似增重因恍悟此證下痢兩月其脈毫無數象且按之無力其下焦當係寒涼俾仍用山藥粥送服炒熟小茴香末一錢連服數劑全愈

或問西人謂痢爲腸中生炎所謂炎者紅熱腫疼甚則腐爛也觀此案與治盧姓之案皆用熱藥成功亦可謂之腸炎乎旣非腸炎何以其腸亦欲腐爛乎答曰痢證原有寒有熱熱證不愈其腸可至腐爛寒證久不愈其腸亦可腐爛譬如瘡瘍紅腫者陽而熱白硬者陰而寒其究竟皆可變爲膿血管觀張園隨筆錄言其曾患牙疳醫者治以三黃犀角純寒之品滿口肉爛盡而色白不知疼後醫者改用肉桂附子等品一服知疼連服十餘劑而愈夫人口中之肌肉猶腸中之肌肉也口中之肌肉可因寒而腐爛腸中之肌肉獨不可因寒而腐爛乎曾治一人因久居潮濕之地致下痢三月不愈所下者紫血雜以脂膜腹疼後重或授以龍眼肉包鴨蛋子方服之下痢與腹疼益劇後愚診視其脈微弱而沉

左部幾不見俾用生硫黃研細搗熟麵少許作丸又重用生山藥熟地龍眼肉煎濃湯送服連服十餘劑共計服生硫黃兩許其痢始愈由是觀之即純係赤痢亦誠有寒者然不過百中之二三耳且嘗實驗痢證若因寒者雖經久不愈猶可支持且其後重腹疼較因熱者亦輕也且傷寒論有桃花湯治少陰病下利便膿血者原赤石脂與乾薑並用此爲以熱藥治寒痢之權輿註家不知謂少陰之火傷陰絡所致治以桃花湯原係從治之法又有矯誣藥性謂赤石脂性涼重用至一斤乾薑雖熱止用一兩其方仍以涼論者今試取其藥十分之一煎湯服之果涼乎熱乎此皆不知傷寒論此節之義而強爲註解者也通變白虎加人參湯 治下痢或赤或白或赤白參半下重腹疼周身發熱服涼藥而熱不休脈象確有實熱者

生石膏

搗細瓦兩

生杭芍

捌錢

生山藥

陸錢

人參

伍錢用野黨參按此分量若遠東真野參宜減半至高麗參則斷不可用

甘草

貳錢

右五味用水四鍾煎取清湯兩鍾分二次溫飲之

此方即傷寒論白虎加人參湯以芍藥代知母山藥代粳米也痢疾身熱不休服清火藥而熱亦不休者方書多諉爲不治夫治果對證其熱焉有不休之理此乃因痢證夾雜外

感其外感之熱邪隨痢深陷永無出路以致痢爲熱邪所助日甚一日而永無愈期惟治以此湯以人參助石膏能使深陷之邪徐徐上升外散消解無餘加以芍藥甘草以理下重腹疼山藥以滋陰固下連服數劑無不熱退而痢愈者

按外感之熱已入陽明胃腑當治以苦寒若白虎湯承氣湯是也若治以甘寒其病亦可暫愈而恆將餘邪錮留胃中變爲骨蒸勞熱永久不愈世補齋醫書論之甚詳石膏雖非苦寒其性寒而能散若煨用之則斂矣故石膏不可煨用且無汁漿迥與甘寒黏泥者不同而白虎湯中又必佐以苦寒之知

母即此湯中亦必佐以芍藥芍藥亦味苦經本微寒之品且能通利小便故以佐石膏可以消解陽明之熱而無餘也

一叟年六十七於中秋得痢證醫治二十餘日不效後愚診視其痢赤白膠滯下行時覺腸中熱而且乾小便亦覺發熱腹疼下墜並迫其脊骨盡處亦下墜作疼且時作眩暈其脈洪長有力舌有白苔甚厚愚曰此外感之熱挾病毒之熱下迫故現種種病狀非治痢兼治外感不可遂投以此湯兩劑諸病皆愈其脈猶有餘熱擬再用石膏清之病家疑年高石膏不可屢服愚亦應聘他往後二十餘日痢復作延他醫治療於治痢藥中雜以甘



寒濡潤之品致外感之餘熱永留腸胃不去其痢雖愈而屢次反覆延至明年仲夏反覆甚劇復延愚診治其脈象病證皆如舊因謂之曰去歲若肯多服石膏數兩何至有以後屢次反覆今不可再留邪矣仍投以此湯連服三劑病愈而脈亦安和

一人年四十二患白痢常覺下墜過午尤甚心中發熱間作寒熱醫者於治痢藥中重用黃連一兩清之熱如故而痢亦不愈留連兩月寢至不起診其脈洪長有力亦投以此湯爲其間作寒熱加柴胡二錢一劑熱退痢止猶間有寒熱之時再診其脈仍似有力而無和緩之致知其痢久而津液有傷也遂去白芍柴胡加玄參知母各六錢一劑寒熱亦愈一媼年六旬素多疾病於夏季晨起偶下白痢至暮十餘次秉燭後忽然渾身大熱不省人事循衣摸牀呼之不應其脈洪而無力肌膚之熱烙指知係氣分熱痢又兼受暑多病之身不能支持故精神昏憤如是也急用生石膏三兩野台參四錢煎湯一大碗徐徐溫飲下至夜半盡劑而醒痢亦遂愈詰朝煎渣再服其病脫然

一人年五十餘於暑日痢而且瀉其瀉與痢俱帶紅色下墜腹疼嚙口不食醫治兩旬病勢寢增精神昏憤氣息奄奄診其脈細數無力周身肌膚發熱詢其心中亦覺熱舌有黃

苦知其證夾雜暑溫暑氣溫熱瀰漫胃口又兼痢而且瀉虛熱上逆是以不能食也遂用生山藥兩半滑石一兩生杭芍六錢粉甘草三錢一劑諸病皆見愈可以進食又服一劑全愈此證用滑石不用石膏者以其證兼瀉也爲不用石膏即不敢用人參故倍用山藥以增其補力此就通變之方而又爲通變也

痢證又有肝胆腸胃先有鬱熱又當暑月勞苦於烈日之中陡然下痢多帶鮮血脈象洪數此純是一團火氣宜急用大苦大寒之劑若芩連知柏胆草苦參之類皆可選用亦可治以白虎湯方中生石膏必用至二兩再加生白芍一兩若脈大而虛者宜再加人參三錢若其脈洪大甚實者可用大承氣湯下之而佐以白芍知母

有痢久而清陽下陷者其人或間作寒熱或覺胸中短氣當於治痢藥中加生黃芪柴胡以升清陽脈虛甚者亦可酌加人參又當佐以生山藥以固下焦然用藥不可失於熱也有痢初得兼受外感者宜於治痢藥中兼用解表之品其外邪不隨痢內陷而痢自易治不然則成通變白虎加人參湯所主之證矣

痢證初得雖可下之然必確審其無外感表證方可投以下藥其身體稍弱又宜少用參

菑佐之

痢證忌用滯泥之品然亦不可概論外祖母年九旬仲夏下痢赤白甚劇脈象數而且弦愚用大熟地生杭芍各一兩煎湯服下即愈又服一劑脈亦和平後壽至九十四歲痢證間有涼者然不過百中之一耳且又多係純白之痢又必脈象沉遲且食涼物坐涼處則覺劇者治以乾薑白芍小茴香各三錢山查四錢生山藥六錢一兩劑即愈用白芍者誠以痢證必兼下墜腹疼即係涼痢其涼在腸胃而其肝胆間必有伏熱亦防其服熱藥而生熱也

凡病人酷嗜之物不可力爲禁止嘗見患痢者有恣飲凉水而愈者有飽食西瓜而愈者總之人之資稟不齊病之變態多端尤在臨證時精心與之消息耳曾治一少年下痢晝夜無數裏急後重投以清火通利之藥數劑痢已減半而後重分毫不除疑其腸中應有阻隔投以大承氣湯下燥糞長數寸而愈設此證若不疑其中有阻隔則燥糞不除病將何由愈乎

有奇恆痢者張隱菴謂其證三陽並至三陰莫當九竅皆塞陽氣旁溢咽乾喉塞痛併於

陰則上下無常薄爲腸澼其脈緩小遲澀血溫身熱者死熱見七日者死蓋因陽氣偏劇陰氣受傷是以脈小沈澀此證急宜用大承氣湯瀉陽養陰緩則不救若不知奇恆之因見脈氣平緩而用平易之劑必至誤事

陳修園曰嘉慶戊午夏泉州王孝廉患痢七日忽於寅卯之交聲微啞讖語半刻即止酉刻死七月榕城葉廣文觀鳳之弟患同前證來延言伊弟患此亦不重飲食如常惟早晨咽乾微疼如見鬼狀午刻即止時屆酉刻余告以不必往診令其速回看視果於酉戌之交死此皆奇恆痢也若投以大承氣湯猶可挽回

按此證愚實未見修園所遇二證皆在戊午年天干戊爲火運地支午又爲少陰君火司天火氣太盛故有此證其危在七日者火之成數也由斯觀之內經歲運之說原自可憑唐容川曰內經以痢屬於肝熱故曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱下迫與吐酸同言則知其屬於肝熱也仲景於下利後重膿血者亦詳於厥陰篇中皆以痢屬肝經也蓋痢多發於秋乃肺金不清肝木遏鬱肝主疏泄其疏泄之力太過則暴注裏急有不能待之勢然或大腸開通則直瀉下矣乃大腸爲肺金之腑金性收澀秋日當令而不使瀉出則

滯澀不得快利遂爲後重治宜開利肺氣使金性不收則大腸通快而不後重矣枳殼桔梗粉葛枇杷葉皆須爲用又宜清潤肝血使木火不鬱則肝木疏泄而不暴注矣白芍當歸生地丹皮地榆皆須爲用至於腸胃之熱皆從肝肺而生西醫名腸中發炎言其色紅腫也故黃連黃芩胆草黃柏能退肝火石膏知母天冬麥冬花粉連翹銀花白菊能清肺火皆可擇用此清肺氣調肝血之法也至噤口痢世多不知治法惟仲景存胃津液足以救之此卽胃炎欲腐爛之候也非大寒涼中加人參花粉不能助救故凡噤口痢但得舌上津回則能進食而生矣至於大黃惟滿實者可暫用之其餘蘊釀之熱皆宜苦堅爲法不可用猛悍藥也仲景治痢主白頭翁湯夫白頭翁一莖直上中空有瓢能通達木氣而徧體有毛無風動搖有風不動其色純白此形象與坊間鬻者不同兼稟金氣總爲金木交合之物予從白頭翁悟出清肝木達風氣之法又從下利肺痛金匱文一肺字悟出肝之對面即是肺金清金以和大腸又爲屢效之法矣

西人治痢先用草麻子油或甘汞即水銀粉降之不愈者繼用楊曹確蒼單那而並那布答林諸藥以清熱解毒防腐生肌兼用血清灌腸諸方以佐之

東人衍西人之法謂赤痢初期腸中毒熱腫疼決不可用收斂之劑至第二期腸中腐爛有若潰瘍可用硝蒼阿片之劑蓋在初期當務去腸內之刺戟流通糞便以防病勢之上進爲治赤痢療治第一義故病有上進之象當相機而投以下劑但下劑易增進患者之衰弱不可不謹慎用之至灌腸及注腸不惟足以疏通腸內之停滯且有緩解裏急後重之效是以用之最宜但於炎證期則當但行食鹽水之灌腸於潰瘍期則可用硝酸銀單寧酸等收斂兼以消除毒菌

按東人之論如此用以治痢者有效有不效大概體壯者可愈體弱者仍然危險至痢證之夾雜外感溫病者尤不能見效東人志賀潔著有赤痢新論載有未治愈之案兩則一爲宮野某女五十六歲下腹部及左腹部忽發疼痛繼乃發熱頭疼翌日腹疼下痢一小時內約排三次之粘血便診之則體格及營養皆佳良體溫三十七度八分脈搏七十至食思缺損舌有苔思嘔吐頭疼爲注射血清翌日舌苔乾燥而龜裂體溫三十八度脈搏七十二至痢下二十次又翌日體溫三十八度七分諸證依然便通二十五次注射血清又翌日口渴及食思缺乏如故心機亢進體溫三十八度七分脈搏至百一十至神識朦

臙言語不清衰弱較前爲甚又翌日時時呃逆嘔吐舌腫大乾燥舌苔剝離下唇糜爛心音微弱脈搏極微若無注射食鹽水又二日衰弱益甚午前二時遂虛脫而死其一爲田中某女二十一歲腹疼下痢又發劇熱便性爲粘液便間混有血液其腸之曲折處及盲腸管覺有壓疼發病第五日之夜發噪狂狀之舉動精神發揚第六日之夜亦然嗣後即不復發而時發譫妄人事不省爲昏睡狀至第三星期後精神證狀全愈諸證輕快乃未幾而體溫再昇達於四十度二分復發譫妄經過二十八日虛脫而死

細觀東人所載二案皆痢而夾雜溫病者也東人對於前案但知治痢不知治溫所以不愈至後案雖未明載治法其治法大抵與前案等至三星期而見愈者因溫病即不治而常有自愈者至其後體溫再昇達於四十度二分屢發譫妄顯係溫病反覆熱入陽明之腑西人不能治溫安能治溫之重發況此重發者又爲久痢體虛之人乎然而治此二案之證固非難事以前所載通變白虎加人參湯投之一二劑皆可愈矣次取通變白虎加人參湯下所治驗之案與此二案對勘自明也

楊曹一名撒里矢爾酸那篤留謨一名撒里矢爾酸曹達一名水楊酸曹達一名水楊酸

那篤留謨省文曰楊曹亦曰撒曹爲白色無臭鱗屑狀結晶或爲結晶質粉末味甘鹹而稍帶辛辣其原質出於楊柳皮及美州所產植物中化以安息香酸爲撒里矢爾酸亦名撒魯爾再用撒里矢爾酸精製爲楊曹大抵外用及滌腸劑皆用撒里矢爾酸內服則用楊曹其性退熱防腐愈偏頭疼爲治赤痢要藥

硝蒼爲次硝酸蒼鉛之省文一名鹽基性硝酸蒼鉛一名硝強鉍一名鉍養淡養五爲白色結晶性粉末檢視於顯微鏡下現有光輝細小稜柱形結晶爲金屬收斂藥含有多量蒼鉛少量硝酸之製品也其性能制異常發酵保護腸胃不受異物之刺戟善治胃癌胃潰瘍赤痢等證一日服三四次每次可服半瓦多至一瓦

重曹即重酸曹達之省文又名重炭酸那篤留謨爲白色結晶性粉末係用水寢出木炭之汁鍊爲炭酸那篤留謨再用炭酸那篤留謨精製爲重曹能治臟腑中慢性加答爾胃中分泌過多消化不良肝臟硬化證之初起腹部臟器靜脈鬱積所致之諸般障礙止嘔吐退黃疸利肺痰解尿酸於諸般之浮腫水腫用爲利便藥又爲大便之緩下劑每服半瓦其極量可至二瓦



單那爾並即單寧酸亞爾布明乃蛋白化單寧酸

單寧酸之原質有於沒石子中

爲褐色無味臭之粉末其藥

服至胃中不甚溶解下至腸中始分爲蛋白及單寧酸呈單寧酸之收斂作用故不害胃

之消化機能爲大小腸之收斂藥專用於大小腸加答爾兼治腸瀉囊之潰瘍機轉肺勞

者之下利慢性赤痢夏期小兒下利

無味易服

等代單寧酸爲灌腸劑用量每次可服半瓦多

至一瓦日服數次可少少增加

那布答林爲無色有光澤之版狀結晶有特異竄透臭氣與燒味乃化生於有機物

石灰

乾

餾之際在最高熱餾出之炭水素之一也其性最能消除各種毒菌饒防腐之力內瘍潰

爛能催肉芽速長治膀胱加答爾小兒蛔蟲外用和脂油能除疥癬於創傷潰瘍爲乾燥

綳帶藥能除惡臭促肉芽之發生用於室中可以逐穢祛邪置於書篋衣笥可以避蠹驅

蟲每服三分瓦之一或半瓦其極量不過一瓦

右所錄東西人治痢之藥其解毒清血之力遠不如鴨蛋子其防腐生肌之力遠不如三

七且於挾虛之痢而不知輔以山藥人參於挾熱之痢而不知重用石膏宜其視赤痢爲

至險之證而治之恆不愈也

東人志賀潔謂熱帶之地有阿米巴赤痢其證間或傳於溫帶地方阿米巴者爲蟲類生殖之毒菌傳染於人則爲阿米巴赤痢阿米巴之現狀爲球形或橢圓形之結核與尋常赤痢菌之爲桿狀者不同外有包爲玻璃透明形其內結之核爲血球間有膿球取新便下之混血黏液一滴置玻璃片上加以生理的食鹽水更以小玻璃片輕覆其上以顯微鏡視之若有假足之伸縮助其活動即爲阿米巴赤痢之毒菌其劇者痢中混有壞疽潰瘍片而帶腐肉樣之臭氣或爲污泥色至其證狀之經過與慢性赤痢大略相似其身體大率無過熱之溫度故遲之累月累年不愈而猶有可支持者此證治法宜日服甘汞十分瓦之一至十分瓦之三當連服七八日但須注意於中毒狀若稍發現中毒形狀宜速停止又可服硫黃半瓦一日三次又宜用鷄納霜爲注腸劑惟不可自始即用濃厚之液最初當用五千倍之溶液繼乃可用千倍水者數日後則可用五百倍水者

愚未至熱帶東人所論阿米巴赤痢未經治過然彼又云間有傳至溫帶者至所載其證之劇者一段云云愚右所治痢證案中似有具此狀況者而未用其治法亦皆應手奏效至其謂內服可用硫黃右所治痢證案中已載兩則其爲阿米巴痢與否尙不敢斷定而

當其時臨證疏方固未聞有阿米巴痢也惟度其證宜投以硫黃且再四躊躇若不用硫黃他藥恐難於建功故遂放胆用之耳

治痢之方再參看五期衷中參西錄第六卷論痢證治法方備

### 治燥結方

硝菴通結湯

治大便秘結久不通身體兼羸弱者

淨朴硝

肆兩

鮮萊菴

伍斤

將萊菴切片同朴硝和水煮之初次煮用萊菴片一斤水五斤煮至萊菴爛熟撈出就其餘湯再入萊菴一斤如此煮五次約得濃汁一大碗頓服之若不能頓服者先飲一半停一點鐘再溫飲一半大便即通若脈虛甚不任通下者加人參數錢另燉同服

軟堅通結朴硝之所長也然其味鹹性寒若遇燥結甚實者少用之則無效多用之則鹹寒太過損肺傷腎其人或素有勞疾或下元虛寒者尤非所宜也惟與萊菴同煎數次則朴硝之鹹味盡被萊菴提出萊菴之汁漿盡與朴硝融化夫萊菴味甘性微溫煨熟食之善治勞嗽短氣

方附在第一卷水晶桃下

其性能補益可知取其汁與朴硝同用其甘溫也可化朴硝之鹹寒其補益也可緩朴硝之攻破若或脈虛不任通下又藉人參之大力者以爲之扶持

保護然後師有節制雖猛悍亦可用也

一媼年近七旬傷寒初得無汗原是麻黃湯證因誤服桂枝湯遂成白虎湯證上焦煩熱太甚聞藥氣卽嘔吐但飲所煎石膏清水亦吐俾用鮮梨片蘸生石膏細末嚼咽之約用石膏兩半陽明之大熱遂消而大便旬日未通其下焦餘熱仍無出路欲用硝黃降之聞藥氣仍然嘔吐且其人素患勞嗽身體羸弱過用鹹寒尤其所忌爲製此方煎汁一大碗仍然有朴硝餘味復用萊菔一個切成細絲同葱涼油醋和藥汁調作羹病人食之香美並不知是藥大使得通而愈

一媼年七旬勞嗽甚劇飲食化痰涎不化津液致大便燥結十餘日不行飲食漸不能進亦擬投以此湯爲羸弱已甚用人參三錢另燉汁和藥服之一劑便通能進飲食復俾煎生山藥稠汁調柿霜餅服之勞嗽亦見愈

按用朴硝煉玄明粉法原用萊菔然此法今人不講久矣至藥坊所鬻者乃風化硝非玄明粉也今並載其法以備參觀實心救人者亦可照法煉之以備施用其法於冬至後用潔淨朴硝十斤白萊菔五斤切片同入鍋中用水一斗五升煮至萊菔爛熟將萊菔撈出

用竹篩一個鋪綿紙二層架托於新缸之上將硝水澆過在庭露三日其硝凝於缸邊將餘水傾出曬乾將硝取出用砂鍋熬於爐上融化後攪以銅鏟熬至將凝用鏟鏟出再裝以瓷罐末滿者寸許蓋以瓦片用釘三個釘地作鼎足形釘頭高二寸罐置其上用磚在罐周遭砌作爐形多留風眼爐磚離罐三寸將木炭火置於爐中罐四圍上下都被炭火壅培以煨至硝紅爲度次日取出再用綿紙鋪於靜室地上將硝碾細用絹羅篩於紙上厚一分將戶牖皆遮蔽勿透風三日後取出其硝潔白如粉輕虛成片其性最能降火化痰清利臟腑怪證服之可蠲狂躁用之即愈搜除百病安斂心神大人服二三錢小兒服五分至一錢用白湯惑葱湯融化空心服之服藥之日不宜食他物惟飲稀粥服二三次後自然精神爽健臟腑調和津液頓生百病如失矣惟久病泄瀉者服之不宜

### 赭遂攻結湯

治宿食結於腸間不能下行大便多日不通其證或因飲食過度或因恣食生冷或因寒火凝結或因嘔吐既久胃氣衝氣皆上逆不下降

生赭石

札細貳兩

朴

硝五錢

乾

薑貳錢

甘

遂

錢半札細藥汁送服

熱多者去乾薑寒多者酌加乾薑數錢嘔多者可先用赭石一兩乾薑半錢煎服以止其

嘔吐嘔吐止後再按原方煎湯送甘遂末服之

朴硝雖能軟堅然遇大便燥結過甚腸中毫無水氣者其軟堅之力將無所施甘遂辛竄之性最善行水能引胃中之水直達燥結之處而後朴硝因水氣流通乃得大施其軟堅之力燥結雖久亦可變爲溏糞順流而下也特是甘遂力甚猛悍以攻決爲用能下行亦能上達若無以駕馭之服後恆至吐瀉交作況此證多得之湧吐之餘或因氣機不能下行轉而上逆未得施其攻決之力而即吐出者故以赭石之鎮逆乾薑之降逆脇力下行以參贊甘遂成功也且乾薑性熱朴硝性寒二藥並用善開寒火之凝滯寒火之凝滯於腸間者開宿物之停滯於腸間者亦易開也愚用此方救人多矣即食結中腕下腕亦未有不隨手奏效者

乙卯之歲客居廣平忽有車載病人造寓求診者其人年過五旬呻吟不止言自覺食物結於下腕甚是痛楚數次延醫調治一劑中大黃用至兩半不下且凡所服之藥覺行至所結之處即上逆吐出飲食亦然此時上焦甚覺煩燥大便不通者已旬日矣診其脈雖微弱至數不數重按有根知猶可任攻下因謂之曰此病易治特所服藥中有猛悍之品

服藥時必吾親自監視方安然亦無須久淹能住此四點鐘結處即通下矣遂用此湯去乾薑方中赭石改用三兩朴硝改用八錢服後須臾腹中作響遲兩點半鐘大便通下而愈後月餘又患結証如前仍用前方而愈

### 通結用葱白熨法

治同前證

大葱白

肆斤切  
作細絲

乾米醋

多備待用

將葱白絲和醋炒至極熱分作兩包乘熱熨臍上涼則互換不可間斷其涼者仍可加醋少許再炒熱然炒葱時醋之多少須加斟酌以炒成布包後不至有湯爲度熨至六點鐘其結自開

一孺子年六歲因食肉過多不能消化鬱結腸中大便不行者六七日腹中脹滿按之硬如石用一切通利藥皆不效爲用此法熨之至三點鐘其腹漸軟又熨三點鐘大便通下如羊矢其脹遂消

一童子年十五六因薄受外感腹中脹滿大便數日不通然非陽明之實熱燥結也醫者投以承氣湯大便仍不通而腹轉增脹自覺爲腹脹所迫幾不能息且時覺心中怔忡診

其脈甚微細按之即無脈虛證實幾爲束手亦用葱白熨法腹脹頓減又熨三點鐘覺結開行至下焦繼用豬胆汁導法大使得通而愈

按豬胆汁導法乃傷寒論下燥結之法也原用豬胆汁和醋少許以灌穀道中今變通其法用醋灌豬胆中手捻令醋與胆汁融和再用以通氣長竹管一端裝豬胆中用細繩紮住一端納穀道中用手將豬胆汁由竹管擠入穀道若穀道離大便猶遠宜將竹管深探至燥糞之處若結之甚者又必連用兩三個若畏豬胆汁涼或當冷時可將豬胆置水中溫之若無鮮豬胆可將乾者用醋泡開再將醋灌豬胆中以手捻至胆汁之凝結者皆融化亦可用若有灌腸注射器則用之更便

一人年四十許素畏寒涼愚俾日服生硫黃

服生硫黃法  
在第八卷

如黑豆粒大兩塊大見功效已年

餘矣偶因暑日勞碌心中有火恣食瓜果又飽餐肉食不能消化腸中結而不行且又疼痛時作嘔吐醫者用大黃附子細辛湯降之不效又用京都薛氏保赤萬應散三劑並作一劑服之腹疼減去而仍不通行後愚診視其脈近和平微弦無力蓋此時不食數日不大便十日矣遂治以葱白熨法覺腹中鬆暢且時作開通之聲而仍然惡心欲作嘔吐繼



用赭石二兩乾薑錢半俾煎服以止其惡心仍助以葱白熨法通其大便外熨內攻藥踰五點鐘大使得通而愈

按金匱大黃附子細辛湯誠爲開結良方愚嘗用以治腸結腹疼者甚效卽薛氏保赤萬應散三劑作一劑服之以治大人亦爲開結良方愚用過屢次皆效而以治此證二方皆不效者以其證兼嘔吐二方皆不能止其嘔吐故也病人自言從前所服之藥皆覺下行未至病所卽上逆吐出獨此次服藥則沉重下達直抵病結之處所以能攻下也

一人年四十三房事後恣食生冷忽然少腹抽疼腎囊緊縮大便四日不通上焦兼有煩躁之意醫者投以大黃附子細辛湯兩脇轉覺疼脹診其脈弦而沉兩尺之沉尤甚先治以葱白熨法腹中作響大有開通之意腎囊之緊縮見愈而大便仍未通又用赭石二兩附子五錢當歸蘇子各一兩煎湯甫飲下卽覺藥力下墜俾復煎渣飲之有頃降下結糞若干諸病皆愈

按此證用葱白熨之雖未卽通而腸中之藥已開至所服之藥重用赭石者因此證原宜用熱藥以溫下焦而上焦之煩躁與大便之燥結又皆與熱藥不宜惟重用赭石以佐之

使其熱力下達自無僭上之患而其重墜之性又兼有通結之功上焦之浮熱因之歸根下焦之凝寒因之盡化矣

古方治小便忽然不通者有葱白炙法用葱白一握捆作一束將兩端切齊中留二寸以一端安臍上一端用炭火炙之待炙至臍中發熱小便自通此蓋藉其溫通之性自臍透達轉入膀胱以啓小便之路也然僅以火炙其一端則熱力之透達頗難若以拙擬葱白熨法代之則小便之因寒不通或因氣滯不通者取效當更速也

又此熨法不但可通二便凡疝氣初得用此法熨之無不愈者然須多熨幾次即熨至疝氣消後仍宜再熨兩三次或更加以小茴香胡椒諸末同炒亦佳

用胡椒末時不宜過五錢小茴香可多用

西人降下之藥習用草麻子油硫苦旃那葉按草麻子油即用草麻子製成其藥來自英國晶潔稠黏所製甚精每服二錢多至五錢通結甚效惟其臭稍劣且草麻子性近巴豆壯人不過服五粒製爲油仍含有毒性故服後間有作嘔吐者硫苦即硫酸麻偏涅叟謨亦名瀉利鹽係用朴硝製成爲白色透明之細粒結晶其鹹苦之味減於朴硝而其軟堅降下之力亦稍弱於朴硝每服二錢至四錢至旃那葉爲印度熱帶地方所產之決明科等葉之乾

燥者狀若小竹葉毫無臭味其色嫩而綠者良老而微黃者稍弱每服一錢置碗中開水浸飲之下便結甚效其力雖近猛而服後腸胃安然不覺攻戟自然通下較前二藥爲獨良也

### 治泄瀉方

益脾餅 治脾胃濕寒飲食減少長作泄瀉完穀不化

白朮四兩

乾薑貳兩

雞內金貳兩

熟棗肉半斤

右藥四味白朮雞內金皆用生者每味各自軋細焙熟

先軋細而後焙者爲其焙之易勻也

再將乾薑軋細共和

棗肉同搗如泥作小餅木炭火上炙乾空心時當點心細嚼咽之曾爲友人製此方和藥一料服之而愈者數人後屢試此方無不效驗

藥坊鷄內金因揀擇不淨恒有包瓦石者若入丸散劑中甚非所宜臨軋此藥時須先親自檢點

一婦人年三十許泄瀉數月用一切治瀉諸藥皆不效其脈不涼亦非完穀不化遂單用白朮棗肉如法爲餅服之而愈此證並不用鷄內金者因鷄內金雖有助脾胃消食之力

而究與瀉者不宜也

扶中湯 治泄瀉久不止氣血俱虛身體羸弱將成勞瘵之候

於朮

炒壹兩

生山藥

壹兩

龍眼肉

壹兩

小便不利者加椒目

炒搗三錢

一婦人年四十許初因心中發熱氣分不舒醫者投以清火理氣之劑遂泄瀉不止更延他醫投以溫補之劑初服稍輕久服則瀉仍不止一日夜四五次遷延半載以爲無藥可治後愚爲診視脈雖濡弱而無弦數之象知猶可治但瀉久身弱虛汗淋漓心中怔忡飲食減少躊躇久之爲擬此方補脾兼補心腎數劑瀉止而汗則加多遂於方中加龍骨牡蠣皆不用煨各六錢兩劑汗止又變爲漫腫蓋從前瀉時小便短少瀉止後小便仍少水氣下無出路故蒸爲汗汗止又爲漫腫也斯非分利小便使水下有出路不可特其平素常覺腰際涼甚利小便之藥涼者斷不可用遂用此方加椒目三錢連服十劑全愈

龍眼肉味甘能補脾氣香能醒脾誠爲脾家要藥且心爲脾母龍眼肉色赤入心又能補益心臟俾母旺自能蔭子也愚治心虛怔忡恆俾單購龍眼肉斤許飯甑蒸熟徐徐服之

皆大有功效是能補心之明徵又大便下血者多因脾虛不能統血亦可單服龍眼肉而愈是又補脾之明徵也

薯蕷粥

治陰虛勞熱或喘或嗽或大便滑瀉小便不利一切羸弱虛損之證

生懷山藥

查斤軋  
細過羅

右藥一味每服用藥七八錢或至一兩和凉水調入鍋內置爐上不住以箸攪之兩三沸即成粥服之若小兒服或少調以白糖亦可

此粥多服久服間有發悶者攪以西藥白布聖一瓦同服則無此弊且更多進飲食按白布聖乃取吃乳之小豬小牛胃中津液而製爲白粉者也其性善助胃消化每食後服二瓦則化食甚速然久服之生脾胃依賴性與健補脾胃之藥同服則無斯弊此藥東人更以糖製之名含糖白布聖以治小兒尤便

門生吳書林年二十一羸弱發熱脈象虛數不能飲食俾早晚服山藥粥加白布聖晌午單服玄參三錢煎湯服如此數日食量增加發熱亦愈自此健壯

一婦人年三十餘泄瀉數月不止病勢垂危倩人送信於其父母其父將往瞻視詢方於

愚言從前屢次延醫治療百藥不效因授以山藥煮粥方日服三次兩日全愈又服數日身亦康健

一娠婦日發痢風其脈無受娠滑象微似弦而兼數知陰分虧損血液短少也亦俾煮山藥粥服之即愈又服數次永不再發

奉天大東關關氏少婦素有勞疾因產後暴虛喘嗽大作治以此粥日服兩次服至四五日喘嗽皆愈又服數日其勞疾自此除根

奉天大東關學校教員鄭子綽之女年五歲秋日爲風寒所束心中發熱醫者不知用辛涼表散而純投以苦寒之藥連服十餘劑致脾胃受傷大便滑瀉月餘不止而上焦之熱益熾醫者皆辭不治始求愚爲診視其形狀羸弱已甚脈象細微浮數表裏俱熱時時惡心不能飲食晝夜猶瀉十餘次治以此粥俾隨便飲之日四五次一次不過數羹匙旬日全愈

農村小兒於秋夏之交多得滑瀉證蓋農家此時多飲涼水而小兒尤喜飲之農家此時多食瓜果而小兒尤喜食之生冷之物皆傷脾胃脾胃傷則滑瀉隨之此自然之理也而

滑瀉之證在小兒爲最難治蓋小兒少陽之體陰分未足滑瀉不止尤易傷陰分往往患此證者數日即渾身發熱津短燥渴小便不利乾嘔懶食惟嗜涼物當此之際欲滋其陰而脾胃愈泥欲健其脾而真陰愈耗涼潤溫補皆不對證而小兒又多苦服藥病家又多姑息以婉隨小兒之意以致遷延歲月竟成不治者多矣惟山藥脾腎雙補在上能清在下能固利小便而止大便真良藥也且又爲尋常服食之物以之作粥少加沙糖調和小兒必喜食之一日兩次煮服數日必愈若係哺乳穉子不能食粥即食之亦不能多者但濃煮生山藥汁飲之亦可愚以此方治小兒多矣志在救人者甚勿以爲尋常服食之物而忽之也

山藥之功效一味薯蕷飲

在第一卷

後曾詳言之至治泄瀉必變飲爲粥者誠以山藥汁本稠

黏若更以之作粥則稠黏之力愈增大有留戀腸胃之功也憶二十年前歲試津門偶患瀉泄飲食下咽覺與胃腑不和須臾腸中作響遂即作瀉濃煎甘草湯調赤石脂細末服之不效乃用白粳米慢火煮爛熟作粥盡量食之頓覺脾胃舒和腹中亦不作響泄瀉遂愈是知無論何物作粥皆能留戀腸胃而山藥性本收澀故煮粥食之其效更捷也且大

便溏瀉者多因小便不利山藥能滋補腎經使腎陰足而小便自利大便自無溏瀉之患按生芡實軋細作粥收澀之力過於山藥而多服久服易作滿悶不若山藥作粥可日服之也

### 薯蕷鷄子黃粥

治泄瀉久而腸滑不固者即前薯蕷粥加熟鷄子黃三枚

一人年近五旬泄瀉半載不愈羸弱已甚遣人來詢方言屢次延醫服藥皆分毫無效授以薯蕷粥方數日又來言服之雖有效驗瀉仍不止遂俾用鷄子數枚煮熟取其黃捏碎調粥中服之兩次而愈蓋鷄子黃有固澀大腸之功且較鷄子白易消化也以後此方用過數次皆隨手奏效

### 薯蕷菜苣湯

治陰虛腎燥小便不利大便滑瀉兼治虛勞有痰作嗽

生山藥軋細壹兩

生車前子肆錢

右二味同煮作稠粥服之一日連服三次小便自利大便自固蓋山藥能固大便而陰虛小便不利者服之又能力小便車前子能利小便而性兼滋陰可爲補腎藥之佐使五子衍宗丸中又能助山藥以止大便況二藥皆汁漿稠黏同作粥服之大能留戀腸胃是以效也



治虛勞痰嗽者車前宜減半蓋用車前者以其能利水即能利痰且性兼滋陰於陰虛有痰者尤宜而仍不敢多用者恐水道過利亦能傷陰分也

按車前子能利小便而驟用之亦無顯然功效惟將車前子炒熟

此藥須買生者自家經手炒以微熟爲度過熟則無力

嚼

服少許須臾又服約六點鐘服盡一兩小便必陡然利下連連不止此愚實驗而得之方也

又單用車前子兩半煮稠粥頓服之治大便滑瀉亦甚效驗鄰村黃姓媼大便滑瀉百藥不效或語以此方一服即愈然必用生者煮之始能成粥若炒熟者則不能成粥矣

加味天水散

作湯服治暑日泄瀉不止肌膚燒熱心中燥渴小便不利或兼喘促小兒

尤多此證用此方更佳

生山藥壹兩

滑石六錢

粉甘草三錢

此久下亡陰又兼暑熱之證也故方中用天水散以清溽暑之熱而甘草分量三倍原方

原方滑石六甘草一故亦名六一散

其至濃之味與滑石之至淡者相濟又能清陰虛之熱又重用山藥之大滋

真陰大固元氣者以參贊之真陰足則小便自利元氣固則泄瀉自止且其汁漿稠黏與

甘草之甘緩者同用又能逗留滑石不至速於淡滲俾其清涼之性由胃輸脾由脾達肺水精四布下通膀胱則周身之熱與上焦之燥渴喘促有不倏然頓除者乎

小兒少陽之體最不耐熱故易傷暑而飲食起居喜貪寒涼故又易泄瀉瀉久則亡陰作熱必愈畏暑氣之熱病熱循環相因所以治之甚難也此方藥止三味而用意周匝內傷外感兼治無遺一兩劑後暑熱漸退即滑石可以漸減隨時斟酌用之未有不應手奏效者小兒暑月瀉久虛熱上逆與暑熱之氣相併填塞胃口恆至惡心嘔吐不受飲食此方不但清暑滋陰和中止瀉其重墜之性又能鎮胃安衝使上逆之熱與暑氣之熱徐徐下行自小便出而其惡心嘔吐自止初定此方時授門人高如璧錄之翌日如璧還里遇一孺子泄瀉月餘身熱燥渴嗜飲凉水強與飲食即惡心嘔吐多方調治不愈如璧投以此湯一劑燥渴與泄瀉即愈其半又服一劑能進飲食諸病皆愈

加味四神丸 治黎明腹疼泄瀉

補骨脂 酒炒六兩

吳茱萸 鹽炒叁兩

五味子 炒四兩

肉豆蔻 麵裹煨肆兩

花 椒 微焙一兩

生硫黃 六錢

大棗 八十一枚

生 薑 切片六兩

先煮薑十餘沸入棗同煮至爛熟去薑餘藥爲細末棗肉爲丸桐子大

人稟天地之氣而生人身一小天地也天地之一陽生於子故人至夜半之時腎系命門之處有氣息息萌動即人身之陽氣也至黎明寅時爲三陽之候人身之陽氣亦應候上升自下焦而將達中焦其人或元陽之根柢素虛當臍之處或兼有凝寒遮蔽即互相薄激致少腹作疼久之陽氣不勝凝寒上升之機轉爲下降大便亦即溏下此黎明作瀉之所由來也夫下焦之陽氣少火也即相火也其火生於命門而寄於肝胆故四神方中用補骨脂以補命門吳茱萸以補肝膽此培火之基也然瀉者關乎下焦實又關乎中焦故又用肉豆蔻之辛溫者以暖補脾胃且其味辛而澀協同五味之酸收者又能固澀大腸攝下焦氣化且薑棗同煎而丸以棗肉使辛甘化合自能引下焦之陽以達於中焦也然此藥病輕者可愈病重者服之間或不愈以其補火之力猶微也故又加花椒硫黃之大補元陽者以助之而後藥力始能勝病也

硫黃生用理詳第八卷服生硫黃方下

### 治痰飲方

理飲湯

治因心肺陽虛致脾濕不升胃鬱不降飲食不能運化精微變爲飲邪停於胃

口爲滿悶溢於膈上爲短氣漬滿肺竅爲喘促滯膩咽喉爲欬吐黏涎甚或陰霾布滿上焦心肺之陽不能暢舒轉鬱而作熱或陰氣逼陽外出爲身熱迫陽氣上浮爲耳聾然必診其脈確乎弦遲細弱者方能投以此湯

於 朮四錢

乾 薑五錢

桂枝尖二錢

炙甘草二錢

茯苓片二錢

生杭芍二錢

橘 紅錢半

川厚朴錢半

服數劑後飲雖開通而氣分若不足者酌加生黃棗數錢

一婦人年四十許胸中常覺滿悶發熱或旬日或浹辰之間必大喘一兩日醫者用清火理氣之藥初服稍效久服轉增劇後愚診視脈沉細幾不可見病家問係何病因愚曰此乃心肺陽虛不能宣通脾胃以致多生痰飲也人之脾胃屬土若地輿然心肺居臨其上正當太陽部位膈上屬太陽觀傷寒論太陽篇自知其陽氣宣通若日麗中天暖光下照而胃中所納水穀實藉其陽氣宣通之力以運化精微而生氣血傳送渣滓而爲二便清升濁降痰飲何由而生惟心肺陽虛不能如離照當空脾胃即不能藉其宣通之力以運化傳送於是飲食停滯胃口若大雨之後陰霧連旬徧地汗淖不能乾滲則痰飲生矣痰飲既生日積月累鬱滿

上焦則作悶漬滿肺竅則作喘阻遏心肺陽氣不能四布則作熱醫者不識病源猶用涼藥清之勿怪其久而增劇也遂爲製此湯方中用桂枝乾薑以助心肺之陽而宣通之白

朮茯苓甘草以理脾胃之濕而淡滲之

茯苓甘草同用最爲濕滿

用厚朴者葉天士謂厚朴多用則破氣

少用則通陽欲藉溫通之性使胃中陽通氣降運水穀速於下行也用橘紅者助白朮

茯苓甘草以利痰飲也至白芍若取其苦平之性可防熱藥之上僭

平者主降

若取其酸斂之性

可制虛火之浮游

本經謂芍藥苦平後世謂芍藥酸斂其味實苦而微酸

且藥之熱者宜於脾胃恐不宜於肝膽又取其涼

潤之性善滋肝膽之陰即預防肝膽之熱也况其善利小便小便利而痰飲自減乎

服之一劑心中熱去數劑後轉覺涼甚遂去白芍連服二十餘劑胸次豁然喘不再發

一婦人年三十許身形素豐胸中痰涎鬱結若碍飲食上焦時覺煩熱偶服礞石滾痰丸有效遂日日服之初則飲食加多繼則飲食漸減後則一日不服即不能進飲食又久服之竟分毫無效日僅一餐進食少許猶不能消化且時覺熱氣上騰耳鳴欲聾始疑藥不對證求愚診治其脈象浮大按之甚軟愚曰此證心肺陽虛脾胃氣弱爲服苦寒攻瀉之藥太過故病證脈象如斯也擬治以理飲湯病家謂從前醫者少用桂附即不能容受恐

難再用熱藥愚曰桂附原非正治心肺脾胃之藥況又些些用之病重藥輕宜其不受若拙擬理飲湯與此證針芥相投服之必無他變若畏此藥不敢輕服單用乾薑五錢試服亦可病家依愚言煎服乾薑後耳鳴即止須臾覺胸次開通繼投以理飲湯服數劑心中亦覺涼甚將乾薑改用一兩又服二十餘劑病遂除根

一婦人年四十許上焦滿悶煩躁思食涼物而偶食之則滿悶益甚且又黎明泄瀉日久不愈滿悶益甚將成臌脹屢次延醫服藥多投以半補半破之劑或佐以清涼或佐以收澀皆分毫無效後愚診視脈象弦細而遲知係寒飲結胸阻塞氣化欲投以理飲湯病家聞而遲疑似不敢服亦俾先煎乾薑數錢服之胸中煩躁頓除爲其黎明泄瀉遂將理飲湯去厚朴白芍加生雞內金錢半補骨脂三錢連服十餘劑諸病皆愈

一婦人年近五旬常覺短氣飲食減少屢次延醫服藥或投以宣通或投以升散或投以健補脾胃兼理氣之品皆分毫無效寢至飲食日減羸弱不起奄奄一息病家亦以爲不治之證矣後聞愚在其鄰村屢救危險之證復延愚診視其脈弦細欲無頻吐稀涎詢其心中言覺有物杜塞胃口氣不上達知其爲寒飲凝結也遂投以理飲湯方中乾薑改用

七錢連服三劑胃口開通又覺呼吸無力遂於方中加生黃芪三錢連服十餘劑病全愈方書謂飲爲水之所結痰爲火之所凝是謂飲涼而痰熱也究之飲證亦自分涼熱其熱者多由於憂思過度甚則或至顛狂雖有飲而恆不外吐其涼者則由於心肺陽虛如方名下所言種種諸情狀且其證時吐稀涎常覺短氣飲食廉少是其明徵也

後世謂痰之稀者爲飲稠者爲痰且

金匱所載四飲名義不同

邑韓蕙圃醫學傳家年四十有四偶得奇疾臥則常常發搐旋發旋止如發寒戰之狀一呼吸之間即愈即不發搐時人偶以手撫之又輒應手而發自治不效廣求他醫治療皆不效留連半載病勢寢增後愚診視脈甚弦細詢其飲食甚少知係心肺脾胃陽分虛憊不能運化精微以生氣血血虛不能榮筋氣虛不能充體故發搐也必發於臥時者臥則氣不順也人撫之而輒發者氣虛則畏人按也授以理飲湯方數劑飲食加多搐亦見愈二十劑後病不再發

理痰湯 治痰涎鬱塞胸膈滿悶短氣或漬於肺中爲喘促欬逆停於心下爲驚悸不寐滯於胃口爲脹滿噦呃溢於經絡爲肢體麻木或偏枯留於關節着於筋骨爲癱仰不利

牽引作疼隨逆氣肝火上升爲眩暈不能坐立

生芡實

壹兩

清半夏

四錢

黑脂麻

炒搗三錢

柏子仁

炒搗貳錢

生杭芍

貳錢

陳皮

貳錢

茯苓片

貳錢

世醫治痰習用宋局方二陳湯謂爲治痰之總劑不知二陳湯能治痰之標不能治痰之本何者痰之標在胃痰之本原在於腎腎主閉藏以膀胱爲腑者也其閉藏之力有時不固必注其氣於膀胱膀胱膨脹不能空虛若谷即不能吸引胃中水飲速於下行而爲小便此痰之所由來也又腎之上爲血海奇經之衝脈也其脈上隸陽明下連少陰爲其下連少陰也故腎中氣化不攝則衝氣易於上干爲其上隸陽明也衝氣上干胃氣亦多上逆不能息息下行以運化水飲此又痰之所由來也此方以半夏爲君以降衝胃之逆即重用芡實以收斂衝氣更以收斂腎氣而厚其閉藏之力腎之氣化治膀胱與衝之氣化自無不治痰之本原清矣用脂麻柏實者潤半夏之燥兼能助芡實補腎也用芍藥茯苓者一滋陰以利小便一淡滲以利小便也用陳皮者非藉其化痰之力實藉其行氣之力佐半夏以降逆氣並以行芡實脂麻柏實之滯膩也



初製此方時愚年未及壯醫術無所知名有李龍章先生邑之宿醫也見之大加賞異謂異日必成名醫後果用此方屢次能建奇效即痰証垂危服之亦可挽救

友人毛仙閣曾治一婦人年四十餘上盛下虛痰涎壅滯飲食減少動則作喘他醫用二陳湯加減治之三年病轉增劇後延仙閣診視投以此湯數劑病愈強半又將芡實減去四錢加生山藥五錢連服二十餘劑痰盡消諸病皆愈至今數年未嘗反覆

仙閣又嘗治一少婦患癰風初兩三月一發寢至兩三日一發脈滑體豐知係痰涎爲恙亦治以此湯加赭石三錢數劑竟能祓除病根後與愚覲面述之愚喜曰向擬此湯時原不知能治癰風經兄加赭石一味即建此奇功大爲此方生色矣  
按此方若治癰風或加硃砂或加生鐵落或用磨刀水煎藥皆可

龍蟾理痰湯 治因思慮生痰因痰生熱神志不寧

清半夏

肆錢

生龍骨

搗細陸錢

生牡蠣

搗細陸錢

生赭石

軋細三錢

朴硝

貳錢

黑脂麻

炒搗叁錢

柏子仁

炒搗叁錢

生杭芍

叁錢

陳皮

貳錢

茯苓

貳錢

此方即理痰湯以龍骨牡蠣代芡實又加赭石朴硝也其所以如此加減者因此方所主

之痰乃虛而兼實之痰實痰宜開礪石滾痰丸之用硝黃者是也虛痰宜補腎虛泛作痰當用腎氣丸以逐之者是也至虛而兼實之痰則必一藥之中能開痰亦能補虛其藥乃爲對證若此方之龍骨牡蠣是也蓋人之心腎原相助爲理腎虛則水精不能上輸以鎮心而心易生熱是由腎而病及心也心因思慮過度生熱必暗吸腎之真陰以自救則腎易虧耗是由心而病及腎也於是心腎交病思慮愈多熱熾液凝痰涎壅滯矣惟龍骨牡蠣能甯心固腎安神清熱而二藥並用陳修園又稱爲治痰之神品誠爲見道之言故方中用之以代芡實而猶恐痰涎過盛消之不能盡消故又加礪石朴硝以引之下行也

一人年三十餘常覺胆怯有時心口或少腹動後須臾覺有氣起自下焦上衝胸臆鬱而不伸連作呃逆頓項發熱即顛狂唱呼其夾咽兩旁內突起若瘰癧而不若瘰癧之硬且精氣不固不寐而遺上焦覺熱下焦覺涼其脈左部平和微嫌無力右部直上直下

李士

材脈訣云直上直下衝脈昭昭

彷彿有力而按之非真有力從前屢次醫治皆無效此腎虛致衝氣挾痰上衝亂其心之神明也投以此湯減厚朴之半加山萸肉

去淨核

五錢數劑諸病皆愈惟覺短氣

知係胸中大氣下陷

理詳第四卷升陷湯下

投以拙擬升陷湯去升麻柴胡加桂枝尖二錢兩劑而愈

蓋此證從前原有逆氣上干升麻柴胡能升大氣恐兼升逆氣桂枝則升大氣兼降逆氣故以之代升柴也

一媼年六十二資稟素羸弱偶當外感之餘忽然妄言妄見驚懼異常手足擾動飢渴不敢飲食少腹塌陷胸膈突起脈大於平時一倍重按無力知係肝腎大虛衝氣上逆痰火上併心神擾亂也投以此湯去朴硝倍赭石加生山藥山萸肉去淨核生地黃各六錢又磨取鐵銹水煎藥理詳第七卷一味鐵養湯下一劑即愈又服一劑以善其後

健脾化痰丸 治脾胃虛弱不能運化飲食以致生痰

生白朮二兩

生鷄內金去淨瓦石糟粕二兩

右藥二味各自軋細過羅各自用慢火焙熟不可焙過煉蜜爲丸梧桐子大每服三錢開水送

下白朮純稟土德爲健補脾胃之主藥然土性壅滯故白朮多服久服亦有壅滯之弊有鷄內金之善消痰積者以佐之則補益與宣通並用俾中焦氣化壯旺流通精液四布清升濁降痰之根柢蠲除矣又此方不但治痰甚效凡廉於飲食者服之莫不飲食增多日久服之並可消融腹中一切積聚

初擬此方時原和水爲丸而久服者間有咽乾及大便燥結之時後改用蜜丸遂無斯弊

期頤餅 治老人氣虛不能行痰致痰氣鬱結胸次滿悶脇下作疼凡氣虛痰盛之人服之皆效兼治疝氣

生芡實

陸兩

生鷄內金

三兩

白麴

半斤

白沙糖

不拘多少

先將芡實用水淘去浮皮晒乾軋細過羅再將鷄內金中有瓦石糟粕去淨分量避足軋細過羅置盆內浸以滾水半日許再入芡實白糖白麴用所浸原水和作極薄小餅烙成焦黃色隨意食之然芡實鷄內金須自監視如法製好不可委之於坊間也

鷄內金鷄之脾胃也其中偶有瓦石銅鐵皆有消化痕跡脾胃之堅壯可知故用以補助脾胃大能運化飲食消磨瘀積食化積消痰涎自除再者老人痰涎壅盛多是下焦虛憊氣化不攝痰涎隨衝氣上泛芡實大能斂衝固氣統攝下焦氣化且與麥麴同用一補心一補腎使心腎相濟水火調和而痰氣自平矣

或問老人之痰既由於氣虛不行何不加以補助氣分之品答曰凡補氣之藥久服轉有他弊此方所用藥品二穀食一肉食復以沙糖調之可作尋常服食之物與他藥餌不同

且食之能令人飲食增多則氣虛者自實也

此方去芡實治小兒疳積痞脹大人癥瘕積聚

西人治老年之痰喜用阿摩尼亞其法阿摩尼亞散七厘或至十厘白沙糖化水送服日兩三次大能愈老人欬嗽多吐痰涎又方阿摩尼亞散一錢黃連膏半錢作二十粒每服一二粒日再服大能補人精神欬嗽有虛熱者服之甚宜

按阿摩尼亞西人取之有三法一在駱駝糞中一在獸骨中一在火山之麓所產石中與鹽強水相連西人設法令離開取出入藥或作散或作水散色白而氣濃功力補火補精神頭昏嗅之即時甦頭疼因身虛軟弱者亦宜嗅但病人未覺時不可令久嗅防壞鼻肉也其外用法豬油調和擦皮令紅熱能引炎外出與貼斑痧藥膏藥同意或用阿摩尼亞酒三四錢樟腦一錢熱油一二兩融和擦皮大有功力肢體因風濕交節作疼及喉病

宜擦  
頂間

並宜擦之收貯宜用玻璃瓶塞住瓶口勿透氣

西人又謂鹿茸爲峻補之藥因其中有阿摩尼亞峻補功力不在鹿茸而在阿摩尼亞也阿摩尼亞得火則飛去故服食鹿茸法應切片浸服若不知此理以火炙或湯煮阿摩尼

亞因火而飛服之即無效矣且鹿茸價昂真者難得以自他物中取出之阿摩尼亞代之則功力相同而價又甚廉貧者亦可服矣

按鹿角所生之處實爲督脈經過之處鹿之督脈最強故其角最大而長又甚速鹿茸爲角之胚胎是以善補督脈而督脈貫腦故又善補腦也人之腦髓屬陰腦神屬陽鹿茸中之阿摩尼亞能補人腦中之陽鹿茸中之赤血

鹿茸初生皆含赤色督脈之血所灌注也與膠即有膠

能補人腦中之

陰鹿茸經炙與煮阿摩尼亞或有飛去而其中滋養之料仍可補腦中陰分迨其陰分充足陽亦萌生所謂一陰一陽互爲之根也西人用藥多取目前捷效而不爲根本久遠之謀故其論鹿茸如此云云然既有此說炙與煮或亦鹿茸所忌生軋細服之亦可至其謂自他物中取出之阿摩尼亞可代鹿茸然止能代鹿茸之補陽也夫鹿茸初生原係血胞後漸成茸成茸之後猶含血液其兼能滋陰分可知陳修園曰朱紫坊黃姓之女年二十二歲始因經閉服行經之藥不效後泄瀉不止食少骨瘦如柴服四神八味之類瀉益甚而五更至天明數次便後帶血余主用金匱黃土湯以乾薑易附子每服加生鹿茸五錢意以先止其泄瀉便紅然後再調其經水連服八劑泄瀉如故而經水通矣又服五劑瀉

血俱止後服六君子湯加乾薑收功可知鹿茸入衝任督三脈大能補血非無情之草木所可比也觀修園此案則鹿茸之功用誠非西人所能盡知矣

西藥又有阿摩尼亞茴香精係阿摩尼亞與茴香之精液化合之黃液用之自一滴至十滴和於二百倍之餾水中服之亦善利痰又能治肺痿胃疼及小兒疹癰吐瀉諸證

### 治痰點天突穴法

附捏結喉法明礬湯麝香香油灌法

點天突穴以治痰厥善針灸者大抵知之而愚臨證體驗尤曲盡點法之妙穴在結喉項間高骨下宛宛中點時屈手大指指甲長須剪之以指甲貼喉指端着穴直向下用力勿斜向裏其氣即通指端當一起一點令痰活動兼頻頻撓動其指端令喉癢作嗽其痰即出

一婦人年二十許數日之前覺胸中不舒一日忽然昏昏似睡半日不醒適愚自他處歸過其村病家見愚喜甚急求診治其脈沉遲兼有閉塞之象唇瞤動凡唇動者爲有痰之徵脈象當係寒痰壅滯上焦過甚遂令人扶之坐以大指點其天突穴俾其喉癢作嗽約點半點鐘欬嗽十餘次吐出涼痰一碗始能言語又用乾薑六錢煎湯飲下而愈歲在甲寅客居大名之金灘鎮適有巡防兵自南樂移戍武邑道出金灘時當孟春天寒

兩且雪兵士衣裝盡濕一兵未至鎮五里許因凍甚不能行步其夥舁之至鎮昏不知人呼之不應用火烘之且置於溫暖之處經宿未醒聞愚在鎮曾用點天突穴法治愈一人求爲診治見其僵臥不動呼吸全無按其脈彷彿若動以手掩其口鼻每至呼吸之頃微覺有熱知猶可救遂令人扶起俾坐治以點天突穴之法兼捏其結喉約兩點鐘欬嗽二十餘次共吐出涼痰碗半始能呻吟亦飲以乾薑而愈

捏結喉法得之滄州友人張獻廷其令人喉癢作嗽之力尤速欲習其法者可先自捏其結喉如何捏法即可作嗽則得其法矣然當氣寒不通時以手點其天突穴其氣即通捏結喉必癢嗽吐痰後其氣乃通故二方宜相輔並用也

按西人謂凍死者若近火則寒氣內迫難救宜置寒冷室中或樹陰無風處將衣服脫除用雪團或冷水周身摩擦或將身置冷水中周身摩擦及四肢漸次柔軟行人工呼吸法此時摩擦更不宜間斷迨患者自能呼吸先被以薄衾繼用稍厚之被漸移入暖室

按此法必周身血肉凍至冰凝呼吸全無者方宜用之若凍猶不至若是之劇用其法者又宜斟酌變通究之其法雖善若果有寒痰杜塞必兼用點天突穴捏結喉法方能挽救



人工呼吸法即患者呼吸全無以法復其呼吸之謂也其法先將患者仰臥俾其頭及胸稍高啓其口將舌周遭纏以細布條緊結之防舌退縮及口之收閉救護者跪於頭之旁以兩手握患者之兩肘上提過頭俾空氣流入肺中以助其吸後須臾將兩肘放下緊壓於胸脇之際以助其呼

助其呼時更有人以兩手心按其胸及心窩更佳

如此往復行至患者自能呼吸而止此爲救急

之良方凡呼吸暴停者皆可用此方救之

生白礬長於治頑痰熱痰急證用之誠有捷效惟涼痰凝滯者斷不可用一婦人年二十餘因悲泣過度痰涎杜塞胃口其胃氣蓄極上逆連連乾嘔形狀又似呃逆氣至咽喉不能上達劇時渾身抖戰自掇其髮有危在頃刻之狀醫者用生薑自然汁灌之益似不能容受愚診視之其脈左手沉濡右三部皆無然就其不受生薑觀之仍當是熱痰杜塞其脈象如此者痰多能瘀脈也且其面有紅光亦係熱証遂用生白礬二錢化水俾飲之即愈此方愚用之屢次審知其非寒痰杜塞皆可隨手奏效即痰厥至垂危者亦能救愈嚴用和云中風不醒者麝香清油灌之曾治一人年二十餘因夫妻反目身軀忽然後挺牙關緊閉口出涎沫及愚診視已閱三點鐘矣其脈閉塞不全先用痧藥吹鼻得嚏氣通

忽言甚渴及詢之仍昏昏如故惟牙關微開可以進藥因憶嚴用和麝香清油灌法雖治中風不醒若治痰厥不醒亦當有效況此証形狀未必非內風掀動遂用香油二兩燉熟調麝香一分灌之卽醒 又礪砂四錢化水治痰厥可代白礬較白礬尤穩妥若治寒痰杜塞用胡椒三錢搗碎煎湯灌之可代生薑自然汁與乾薑湯

治癲狂方

蠶痰湯 治癲狂失心脈滑實者

生赭石 軋細二兩

大黃 壹兩

朴硝 陸錢

清半夏 三錢

鬱金 三錢

蠶痰加甘遂湯

治前證頑痰凝結之甚者非其證大實不可輕投其方即前方加甘遂

末二錢將他藥煎好調藥湯中服

凡用甘遂宜爲末水送服或用其末調藥湯中服若入湯劑煎服必然吐出又凡藥中有甘遂不可連日服之必隔兩三日方可再服不然亦多吐出又其性與甘草相犯用者須切記

又按甘遂性猛烈走竄後世本草稱其以攻決爲用爲下水之聖藥痰亦水也故其行痰

之力亦百倍於他藥曾治一少年癩狂醫者投以大黃六兩連服兩劑大便不瀉後愚診視爲開此方惟甘遂改用三錢病家謂從前服如許大黃未見行動今方中止用大黃兩許豈能效乎愚曰但服無慮也服後大便連瀉七八次降下痰涎若干癩狂頓愈見者以爲奇異彼蓋不知甘遂三錢之力遠勝於大黃六兩之力也

痰脈多滑然非頑痰也愚治此証甚多凡癩狂之劇者脈多瘀塞甚或六脈皆不見用開痰藥通之其脈方出以是知頑痰之能閉脈也

神明之功用原心與腦相輔而成愚於資生湯

在第一卷

定心湯

在第二卷

後曾發明之癩狂之証

乃痰火上泛瘀塞其心與腦相連竅絡以致心腦不通神明皆亂故方中重用赭石藉其重墜之力攝引痰火下行俾竅絡之塞者皆通則心與腦能相助爲理神明自復其舊也是以愚治此證之劇者赭石恆有用至四兩者且又能鎮甘遂使之專於下行不至作嘔吐也

癩者性情顛倒失其是非之明狂者無所畏懼妄爲妄言甚或見聞皆妄大抵此證初起先微露癩意繼則發狂狂久不愈又漸成癩甚或知覺全無蓋此證由於憂思過度心氣

結而不散痰涎亦即隨之凝結又加以思慮過則心血耗而暗生內熱痰經熱煉而膠黏益甚熱爲痰錮而消解無從於是痰火充溢將心與腦相通之竅絡盡皆瘀塞是以其神明淆亂也其初微露癲意者痰火猶不甚劇也迨痰火積而益盛則發狂矣是以狂之甚者用藥下其痰恆作紅色痰而至於紅其熱可知迨病久則所瘀之痰皆變爲頑痰其神明淆亂之極又漸至無所知覺而變爲癲證且其知覺欲無從前之憂思必減其內熱亦即漸消而無火以助其狂此又所以變爲癲也然其初由癲而狂易治其後由狂而癲難治故此證若延至三四年者治愈者甚少

西人於癲狂之證專責之腦氣筋謂人之腦中神明病久而累及腦氣筋以致腦氣筋失其常司其性情動作皆顛倒狂亂是以西人外治之法將病者先薙其髮以豬脬裝冰置其頭巔腦中之炎熱藉此可消腦氣筋之病者因此可愈矣

按腦氣筋亦名腦髓神經其在脊者名脊髓神經共四十三對每一對一主知覺一主運動散布於全體之內外以司全體之知覺運動爲其本源在腦故可統曰腦氣筋亦可統曰腦髓神經

人之神明原在心與腦兩處金正希曰人見一物必留一影於腦中小兒善忘者腦髓未滿也老人健忘者腦髓漸空也汪詡菴釋之曰凡人追憶往事恆閉目上瞪凝神於腦是影留於腦之明徵由斯觀之是腦原主追憶往事也其人或有思慕不遂而勞神想像或因從前作事差誤而痛自懊懣則可傷腦中之神若因研究理解工夫太過或有將來難處之事而思患預防躊躇太過苦心思索則多傷心中之神究之心與腦原徹上徹下共爲神明之府一處神明傷則兩處神俱傷腦中之神明傷可累及腦氣筋心中之神明傷亦可累及腦氣筋且腦氣筋傷可使神明顛倒狂亂心有所傷亦可使神明顛倒狂亂也曾治以少婦癩狂強灌以藥不能下咽遂俾以朴硝代鹽每飯食之病人不知月餘而愈誠以朴硝鹹寒屬水爲心臟對宮之藥以水勝火以寒勝熱能使心中之火熱消解無餘心中之神明自得其養非僅取朴硝之能開痰也

### 調氣養神湯

治其人思慮過度傷其神明或更因思慮過度暗生內熱其心肝之血消耗日甚以致心火肝氣上衝頭部擾亂神經致神經失其所司知覺錯亂以是爲非以非爲是而不至於瘋狂過甚者

龍眼肉 八錢

柏子仁 伍錢

生龍骨 搗碎伍錢

生牡蠣 搗碎伍錢

遠志 二錢不炙

生地黃 陸錢

天門冬 肆錢

甘松 貳錢

生麥芽 三錢

菖蒲 二錢

甘草 錢半

鏡面硃砂

研細三分用頭次煎藥湯兩次送服

磨取鐵銹濃水煎藥

此乃養神明滋心血理肝氣清虛熱之方也龍眼肉色赤入心且多津液最能滋補血分兼能保合心氣之耗散故以之爲主藥柏樹杪向西北稟金水之精氣其實採於仲冬飽受霜露且多含油質故善養肝兼能鎮肝水能養木金能鎮木又與龍骨牡蠣之善於斂戢肝火肝氣者同用則肝火肝氣自不挾心火上升以擾亂神經也用生地黃者取其能瀉上焦之虛熱更能助龍眼肉生血也用天門冬者取其涼潤之性能清心寧神即以開燥痰也用遠志菖蒲者取其能開心竅利痰涎且能通神明也用硃砂鐵銹水者以其皆能鎮安神經又能定心平肝也用生麥芽者誠以肝爲將軍之官中寄相火若但知斂之鎮之或激動其反應之力故又加生麥芽以將順其性蓋麥芽炒用能消食生用則善舒肝氣也至於甘松即西藥中之纈草其性在中醫用之以清熱開瘀逐痺在西醫則推爲安養神經之妙藥而兼能治霍亂轉筋蓋神經不失其所司則筋可不轉此亦足見安養神經之效也

此取西說以補中說所未備也惟甘松在中藥中醫者罕用若恐其陳蠹乏力可向西藥房中買纖草用之





# 衷中參西錄前三期合編第四卷

## 治大氣下陷方

升陷湯

治胸中大氣下陷氣短不足以息或努力乎吸有似乎喘或氣息將停危在頃

刻其兼證或寒熱往來或咽乾作渴或滿悶怔忡或神昏健忘種種病狀誠難悉數其脈象沉遲微弱關前尤甚其劇者或六脈不全或參伍不調

生箭菰 六錢

知母 叁錢

柴胡 壹錢五分

桔梗 壹錢五分

升麻 壹錢

氣分虛極下陷者酌加人參數錢或再加山萸肉

去淨核

數錢以收斂氣分之耗散使升者

不至復陷更佳若大氣下陷過甚至少腹下墜或更作疼者宜將升麻改用錢半或倍作二錢

大氣者充滿胸中以司肺呼吸之氣也人之一身自飛門以至魄門一氣主之然此氣有發生之處有培養之處有積貯之處天一生水腎臟先成而腎系命門之中

包腎之膜油連於脊椎自下上數七

處節有氣息息萌動此乃乾元資始之氣內經所謂少火生氣也此氣既由少火發生以徐徐上達培養於後天水穀之氣而磅礴之勢成績貯於膺胸空曠之府而盤據之根固是

大氣者原以元氣爲根本以水穀之氣爲養料以胸中之地爲宅窟者也夫均是氣也至胸中之氣獨名爲大氣者誠以其能撐持全身爲諸氣之綱領包舉肺外司呼吸之樞機故鄭而重之曰大氣夫大氣者內氣也呼吸之氣外氣也人覺有呼吸之外氣與內氣不相接續者即大氣虛而欲陷不能緊緊包舉肺外也醫者不知病因猶誤認爲氣鬱不舒而開通之其劇者呼吸將停努力始能呼吸猶誤認爲氣逆作喘而降下之則陷者益陷凶危立見矣其時作寒熱者蓋胸中大氣即上焦陽氣其下陷之時非盡下陷也亦非一陷而不升也當其初陷之時陽氣鬱而不暢則作寒既陷之後陽氣蓄而欲宣則作熱迨陽氣蓄極而通仍復些些上達則又微汗而熱解其咽乾者津液不能隨氣上潮也其滿悶者因呼吸不利而自覺滿悶也其怔忡者因心在膈上原懸於大氣之中大氣既陷而心無所附麗也其神昏健忘者大氣因下陷不能上達於腦而腦髓神經無所憑藉也其證多得之力小任重或枵腹力作或病後氣力未復勤於動作或因泄瀉日久或服破氣藥太過或氣分虛極自下陷種種病因不同而其脈象之微細遲弱與胸中之短氣實與寒飲結胸相似然診其脈似寒涼而詢之果畏寒涼且覺短氣者寒飲結胸也診其脈似

寒涼而詢之不畏寒涼惟覺短氣者大氣下陷也且即以短氣論而大氣下陷之短氣與寒飲結胸之短氣亦自有辨寒飲結胸短氣似覺有物壓之大氣下陷短氣常覺上氣與下氣不相接續臨證者當細審之

寒飲結胸詳第三卷理飲湯下

升陷湯以黃芪爲主者因黃芪既善補氣又善升氣且其質輕鬆中含養氣與胸中大氣有同氣相求之妙用惟其性稍熱故以知母之涼潤者濟之柴胡爲少陽之藥能引大氣之陷者自左上升升麻爲陽明之藥能引大氣之陷者自右上升桔梗爲藥中之舟楫能載諸藥之力上達胸中故用之爲嚮導也至其氣分虛極者酌加人參所以培氣之本也或更加荳蔻肉所以防氣之渙也至若少腹下墜或更作疼其人之大氣直陷至九淵必需升麻之大力者以升提之故又加升麻五分或倍作二錢也方中之用意如此至隨時活潑加減尤在臨證者之善變通耳

肺司呼吸人之所共知也而謂肺之所以能呼吸者實賴胸中大氣不惟不業醫者不知即醫家知者亦鮮並方書亦罕言及所以愚初習醫時亦未知有此氣迨臨證細心體驗始確知於肺氣呼吸之外別有氣貯於胸中以司肺臟之呼吸而此氣且能撐持全身振

作精神以及心思腦力官骸動作莫不賴乎此氣此氣一虛吸吸即覺不利而且肢體痿懶精神昏憤腦力心思爲之頓減若其氣虛而且陷或下陷過甚者其人即呼吸頓停昏然罔覺愚既實驗得胸中有此積氣與全身有至切之關係而尙不知此氣當名爲何氣涉獵方書亦無從考證惟金匱水氣門桂枝加黃芪湯下有「大氣一轉其氣乃散」之語後又見喻嘉言醫門法律謂五臟六腑大經小絡晝夜循環不息必賴胸中大氣斡旋其間始知胸中所積之氣當名爲大氣因憶向讀內經熱論篇有「大氣皆去病日已矣」之語王氏註「大氣爲大邪之氣也若胸中之氣亦名爲大氣仲景與喻氏果何所本且二書中亦未嘗言及下陷於是復取內經挨行逐句細細研究乃知內經所謂大氣有指外感之氣言者有指胸中之氣言者且知內經之所謂宗氣亦及胸中之大氣並其下陷之說內經亦嘗言之煌煌聖言昭如日星何數千年著述諸家不爲之大發明耶

今試取內經之文釋之靈樞五味篇曰「穀始入於胃其精微者先出於胃之兩焦以溉五臟別出兩行榮衛之道其大氣之搏而不行者積於胸中命曰氣海出於肺循喉咽故呼則出吸則入天地之精氣其大數常出入三入一故穀不入半日則氣衰一日則氣少矣愚

思肺懸胸中下無透竅胸中大氣包舉肺外上原不通於喉亦並不通於咽而曰出於肺循喉咽呼則出吸則入者蓋謂大氣能鼓動肺臟使之呼吸而肺中之氣遂因之出入也所謂天地之精氣常出三入一者蓋謂吸入之氣雖與胸中不相通實能隔肺膜透過四分之一以養胸中大氣其餘三分吐出卽換出臟腑中渾濁之氣此氣化之妙用也然此篇專爲五味養人而發故第言飲食能養胸中大氣而實未發明大氣之本源愚嘗思之人未生時皆由臍呼吸其胸中原無大氣亦無需乎大氣迨胎氣日盛臍下元氣漸充遂息息上達胸中而爲大氣大氣漸滿能鼓動肺膜使之呼吸卽脫離母腹由肺呼吸而通天地之氣矣

西人謂肺之呼吸延髓主之胸中大氣實又爲延髓之原動力

至大氣卽宗氣者亦嘗深考內經而得之素問平人氣象論曰胃之大絡名虛里出於左乳下其動應衣脈宗氣也按虛里之絡卽胃輸水穀之氣於胸中以養大氣之道路而其貫膈絡肺之餘又出於左乳下爲動脈是此動脈當爲大氣之餘波而曰宗氣者是宗氣卽大氣爲其爲生命之宗主故又尊之曰宗氣其絡所以名虛里者因其貫膈絡肺遊行於胸中空虛之處也

又靈樞客邪篇曰五穀入於胃其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脈而行呼吸焉觀此節經文則宗氣即爲大氣不待詮解且與五味篇同爲伯高之言非言出兩人而或有異同且細審以貫心脈而行呼吸之語是大氣不但爲諸氣之綱領並可爲周身血脈之綱領矣至大氣下陷之說內經雖無明文而其理實亦寓於內經中靈樞五色篇雷公問曰人無病卒死何以知之黃帝曰大氣入於臟腑者不病而卒死夫人之膈上心肺皆臟無所謂腑也經既統言臟腑指膈下臟腑可知以膈上之大氣入於膈下之臟腑非下陷乎大氣既陷無氣包舉肺外以鼓動其闢闢之機則呼吸頓停所以不病而猝死也觀乎此則大氣之關於人身者何其重哉

試再以愚所經驗者明之友人趙厚菴丁外艱時哀毀過甚忽覺呼吸之氣自胸中近喉之處如繩中斷其斷之上半覺出自口鼻仍懸顙門之上其下半則覺漸縮而下縮至心口胸中轉覺廓然過心以下即昏然罔覺矣時已仆於地氣息全無旁人代爲扶持俾盤膝坐片時覺縮至下焦之氣又徐徐上升升至心口恍然覺悟再升至胸覺顙門所懸之氣仍由口鼻入喉與上升之氣相續其斷與續皆自覺有聲彷彿小爆竹自此遂呼吸復

常後向愚述其事且問其故遂歷舉內經所論大氣數則告之厚菴恍然悟曰十年疑團經兄道破矣予向者誠大氣下陷也特是其大氣既陷而復能升者因其下元充實平時不失保養且正在壯年生機甚旺也此事與內經參觀胸中大氣之功用不昭然共見哉今並將愚生平治驗大氣下陷之案擇其緊要者列十餘則於左以備參觀

有兄弟二人其兄年近六旬弟五十餘冬日畏寒共處一小室中熾其煤火復嚴其戶牖至春初二人皆覺胸中滿悶呼吸短氣蓋因戶牖不通外氣屋中養氣全被煤火着盡胸中大氣既乏養氣之助又兼受炭氣之傷日久必然虛陷所以呼吸短氣也因自覺滿悶醫者不知病因竟投以開破之藥迨開破益覺滿悶轉以爲藥力未到而益開破之數劑之後其兄因誤治竟至不起其弟服藥亦增劇而猶可支持遂延愚診視其脈微弱而遲右部尤甚自言心中發涼少腹下墜作疼呼吸甚覺努力知其胸中大氣下陷已劇遂投以升陷湯升麻改用二錢去知母加乾薑三錢兩劑少腹即不下墜呼吸亦順將方中升麻柴胡桔梗皆改用一錢連服數劑而愈其處塾中教員黃蠡生滄州博雅士也聞愚論大氣下陷之理以爲聞所未聞遂將所用之方錄十餘紙詳加詮解徧寄其處之業醫者

或曰室中有爐火亦冬日衛生之道據此案觀之爐火不可令旺乎答曰非也按化學之理爐火旺則所出之氣爲養二分炭一分於人無損若不旺則所出之氣爲炭養參半轉有損於是屋中爐火之熱固不可過度然不可不旺也特是火非養氣不着人之呼吸亦須與不能離養氣惟戶牖能通外氣俾屋中之養氣足供爐火與人呼吸之用而有餘人處其間始能無病不但此也西人講衛生者恒移置病人於空氣最佳之處且細審其地點之空氣俾與所受之病各有所宜則病人居之自易調治吾中華衛生之道不講一有疾病恐體弱不能禁風必先致慎戶牖稍冷更熾其爐火厚其帷幕遇有急證險證眷屬戚友更多衛侍看護致令一室之中皆炭氣薰蒸無病者且將有病有病者何以能愈是以愚生平臨證見病人之室安置失宜必懇切告之至無論有病無病睡時喜以被蒙頭尤非所宜試觀中炭氣者其人恒昏不知人氣息欲無急移置當風之處得呼吸新鮮之空氣即漸甦醒不可悟衛生之理乎

一人年二十餘因力田勞苦過度致胸中大氣下陷四肢懶動飲食減少自言胸中滿悶其實非滿悶乃短氣也粗人不善述病情往往如此醫者不能自審病因投以開胸理氣



之劑服後增重又改用半補半破之劑兩劑後病又見重又延他醫投以桔梗當歸木香各數錢病大見愈蓋全賴桔梗升提氣分之力也醫者不知病愈之由再服時竟將桔梗易爲蘇梗升降異性病驟反覆自此不敢服藥遲延二十餘日病勢垂危喘不能臥晝夜倚壁而坐假寐片時氣息即停心下突然脹起急呼醒之連連喘息數口始覺氣息稍續倦極偶臥片時覺腹中重千斤不能轉側且不敢仰臥延愚診視其脈乍有乍無寸關尺三部或一部獨見或兩部同見又皆一再動而止此病之危已至極點因確知其爲大氣下陷遂放胆投以生箭<sub>去淨</sub>一兩柴胡升麻<sub>去淨</sub>肉桂<sub>去淨</sub>各二錢煎服片時腹中大響一陣有似昏憤甦息須臾恍然醒悟自此呼吸復常可以安臥轉側輕鬆其六脈皆見仍有雀啄之象自言百病皆除惟覺胸中煩熱遂將方中升麻柴胡皆改用錢半又加知母玄參各六錢服後脈遂復常惟左關參伍不調知其氣分之根柢猶未實也遂改用野台參一兩玄參天冬麥冬<sub>心帶</sub>各三錢兩劑全愈

或問喘者皆係氣上逆而不能下達此證係胸中大氣下陷何以亦作喘乎答曰人之胸中大氣實司肺臟之呼吸此證因大氣下陷過甚呼吸之機關將停遂勉強鼓舞肺臟努

力呼吸以自救其迫促之形有似乎喘而實與氣逆之喘有天淵之分觀此證假寐之時肺臟不能努力呼吸氣息即無其病情可想也設以治氣逆作喘者治此證以治此證之喘者治氣逆作喘皆凶危立見臨證者當細審之

按大氣下陷之甚者其努力呼吸迫促異常之狀與喘之據者幾無以辨然喘證無論內傷外感其劇者必然肩息內經謂喘而肩動者爲肩息大氣下陷者雖至呼吸有聲必不肩息蓋肩息者因

喘者之吸氣難不肩息者因大氣下陷者之呼氣難也欲辨此證可作呼氣難與吸氣難之狀以默自體驗臨證自無差謬又喘者之脈多數或有浮滑之象或尺弱寸強大氣下陷之脈皆與此成反比例尤其明徵也

一人年四十八素有喘病薄受外感即發每歲反覆兩三次醫者投以小青龍加石膏湯輒效一日反覆甚劇大喘晝夜不止醫者投以從前方兩劑分毫無效延愚診視其脈數至六至兼有沉濡之象疑其陰虛不能納氣故氣上逆而作喘也因其脈兼沉濡不敢用降氣之品遂用熱地黃生山藥枸杞玄參大滋真陰之品大劑煎湯送服人參小塊人參用塊之理

詳第一卷十  
本育真湯下

二錢連服三劑喘雖見輕仍不能止復診視時見令人爲其椎背言背常發緊

椎之則稍輕呼吸亦稍舒暢此時其脉已不數仍然沉濡因細詢此次反覆之由言曾努力搬運重物當時即覺氣分不舒遲兩三日遂發喘乃恍悟此證因陰虛不能納氣故難於吸因用力太過大氣下陷故難於呼其呼吸皆須努力故呼吸倍形迫促但用納氣法治之止治其病因之半是以其喘亦止愈其半也遂改用升降湯方中升麻柴胡桔梗皆不敢用以桂枝尖三錢代之又將知母加倍再加玄參四錢連服數劑全愈

按此證雖大氣下陷而初則實兼不納氣也升麻柴胡桔梗雖能升氣實與不納氣之證有碍用之恐其證仍反覆惟桂枝性本條達能引臟腑之真氣上行而又善降逆氣仲景苓桂朮甘湯用之以治短氣取其能升真氣也桂枝加桂湯用之以治奔豚取其能降逆氣也且治欬逆上氣吐吸也喘本經原有明文既善升降又善降逆用於此證之中固一無二之良藥也

或問桂枝一物耳何以既能升降又能降逆答曰其能升降者以其爲樹之枝原在上桂之枝又直上而不下垂且色赤屬火而性又溫也其能降逆者以其味辛且華於秋得金氣而善平肝木凡逆氣之緣肝而上者

逆氣上升者  
多由於肝

桂枝皆能鎮之大抵最良之藥其妙用

恆令人不測拙擬參赭鎮氣湯

在第二卷

後有單用桂枝治一奇病之案且詳論藥性之妙用

可以參觀

一人年二十餘動則作喘時或欬嗽醫治數年病轉增劇皆以爲勞疾不可治其脈非微細而指下若不覺其動知其大氣下陷不能鼓脈外出以成起伏之勢也投以升陷湯加人參天冬各三錢連服數劑而愈其父喜曰族人向有患此證者四年而亡今此子病已三年得遇先生而愈是果何處得此神方而能挽回人命也因其病久俾於原方中減去升麻爲末煉蜜作丸藥徐服月餘以善其後

一人年二十四胸中滿悶晝夜欬嗽其欬嗽時脇下疼甚診其脈象和平重按微弦無力因其脇疼又兼胸滿疑其氣分不舒少投以理氣之藥爲其脈稍弱又以黃芪佐之而欬嗽與滿悶益甚又兼言語聲顫動乃細問病因知其素勤稼穡因感冒懶食猶枵腹力作以致如此據此病因且又服理氣之藥不受其爲大氣下陷無疑遂投以升陷湯四劑其病脫然

按此證之形狀似甚難辨因初次未細詰問致用藥少有差錯猶幸迷途未遠即能醒悟

而病亦旋愈由斯觀之臨證者甚勿自矜明察而不屑瑣瑣細問也

一人年四十許失音半載漸覺咽喉發緊且常潰爛畏風惡寒冬日所着衣服至孟夏猶未換飲食減少寢成虛勞多方治療病轉增劇診其脉兩寸微弱毫無軒起之象知其胸中大氣下陷也投以升陷湯加玄參四錢兩劑咽喉即不發緊遂減去升麻又連服十餘劑諸病皆愈

一人年四十許每歲吐血兩三次如此四年似有一年甚於一年之勢其平素常常咳嗽痰涎壅滯動則作喘且覺短氣其脉沉遲微弱右部尤甚知其病源係大氣下陷投以升陷湯加龍骨牡蠣皆不用煨生地黃各六錢又將方中知母改用五錢連服三劑諸病皆愈遂減去升麻又服數劑以善其後

或問吐血之證多由於逆氣上干而血隨氣升此證既大氣下陷當有便血溺血之證何以竟吐血乎答曰此證因大氣陷後肺失其養勞嗽不已以致血因嗽甚而吐出也究之胸中大氣與上逆之氣原迥異夫大氣爲諸氣之綱領大氣陷後諸氣無所統攝或更易於上干且更有逆氣上干過甚排擠胸中大氣下陷者案詳第二卷參精鍊氣湯下至便血溺血之證由於

大氣下陷者誠有之在婦女更有因之血崩者

案詳第八卷 固衝湯下

又轉有因大氣下陷而經血倒

行吐血衄血者

案詳第八卷加 味麥門冬湯下

是知大氣既陷諸經之氣無所統攝而或上或下錯亂妄行有

不能一律論者

或問龍骨牡蠣爲收澀之品大氣陷者宜升提不宜收澀今方中重用二藥皆至六錢獨

不慮其收澀之性有碍大氣之升乎答曰龍骨牡蠣最能攝血之本源此證若但知升其

大氣恐血隨升氣之藥復妄動於升陷湯中加此二藥所以兼顧其血也且大氣下陷後

慮其耗散有龍骨牡蠣以收斂之轉能輔升陷湯之所不逮况龍骨善化瘀血

本經主 癥瘕

牡蠣

善消堅結

觀其治療 瘕可知

二藥並用能使血之未離經者永安其宅血之已離經者盡化其滯加

於升陷湯中以治氣陷兼吐血之證非至穩善之妙藥乎

按吐血證最忌升麻此證兼吐血服升陷湯時未將升麻減去者因所加之龍骨牡蠣原

可監制之而服藥之時吐血之證猶未反覆也若恐升麻有碍血證時亦可減去之多加

柴胡一錢

一人年四十餘小便不利周身漫腫自腰以下其腫尤甚上焦痰涎杜塞劇時幾不能息

欬嗽痰中帶血小便亦有血色遷延半載屢次延醫服藥病轉增劇其脈滑而有力疑是濕熱壅滯詢之果心中發熱遂重用滑石白芍以滲濕清熱佐以柴胡乳香沒藥以宣通氣化爲其病久不任疏通每劑藥加生山藥兩許以固氣滋陰又用藥汁送服三七末二錢以清其血分數劑熱退血減痰涎亦少而小便仍不利偶於診脈時見其由臥起坐因稍費力連連喘息十餘口呼吸始順且其脈從前雖然滑實究在沉分此時因火退滑實既減且有濡象恍悟此證確係大氣下陷遂投以升陷湯知母改用六錢又加玄參五錢木通二錢一劑小便即利又服數劑諸病全愈

一人年四十七欬嗽短氣大汗如洗晝夜不止心中怔忡病勢危急遣人詢方俾先用山

萸肉

去淨核

二兩煎服以止其汗翌日迎愚診視其脈微弱欲無呼吸略似迫促自言大汗

雖止而仍有出汗之時怔忡見輕仍覺短氣知其確係大氣下陷遂投以升陷湯爲其有汗加龍骨牡蠣

皆不用煨

各五錢三劑而愈

一人年二十臥病兩月不愈精神昏憤肢體痠懶亦不覺有所苦屢次延醫診視莫審病情用藥亦無效一日忽然不能喘息張口呼氣外出而氣不上達其氣蓄極之時肛門突

出約二十呼吸之頃氣息方通一晝夜之間如此者八九次診其脈關前微弱不起知其大氣下陷不能司肺臟呼吸之樞機也遂投以人參一兩柴胡三錢知母二錢一劑而呼吸順又將柴胡改用二錢知母改用四錢再服數劑宿病亦愈

按此證臥病數月氣分虧損太甚故以人參代黃芪且此時係初次治大氣下陷證升陷湯方猶未擬出也又按此證初得時當係大氣下陷特其下陷未劇故呼吸之間不覺耳人參黃芪皆補氣兼能升氣者也然人參補氣之力勝於黃芪黃芪升氣之力勝於人參故大氣陷而氣分之根柢猶未傷者當用黃芪大氣陷而氣分之根柢兼傷損者當用人參是以氣分虛極下陷者升陷湯方後曾註明酌加人參數錢也

一婦人年二十餘動則自汗胸脇滿悶心中怔忡其脈沉遲微弱右部尤甚爲其脈遲疑是心肺陽虛而詢之不覺寒涼知其爲大氣下陷也其家適有預購黃芪一包且證兼自汗升柴亦不宜用遂單用生黃芪一兩煎湯服後諸病皆愈有習醫者董生捷亭在座疑而問曰本經黃芪原主大風有透表之力生用則透表之力益大與自汗證不宜其性升而能補有澎漲之力與滿悶證不宜今單用生黃芪兩許而兩證皆愈並怔忡亦愈其義



何居答曰黃芪誠有透表之力故氣虛不能逐邪外出者用於發表藥中即能得汗若其陽強陰虛者誤用之則大汗如雨不可遏抑惟胸中大氣下陷致外衛之氣無所統攝而自汗者投以黃芪則其效如神至於證兼滿悶而亦用之者確知其爲大氣下陷呼吸不利而作悶非氣鬱而作悶也至於心與肺同懸胸中皆大氣之所包舉大氣升則心有所依故怔忡自止也董生聞之欣喜異常曰先生真我師也繼加桔梗二錢知母三錢又服兩劑以善其後

一婦人因臨盆努力過甚產後數日脇下作疼又十餘日更發寒熱其翁知醫投以生化湯兩劑病大見愈遲數日寒熱又作遂延他醫調治以爲產後瘀血爲恙又兼受寒於活血化瘀藥中重加乾薑數劑後寒熱益甚連連飲水不能解渴時當仲夏身熱如炙又復嚴裹厚被略以展動即覺冷氣侵膚後愚診視左脈沉細欲無右脈沉緊皆有數象知其大氣下陷又爲熱藥所傷也其從前服生化湯覺輕者全得芎藭升提之力也治以升陷湯將方中知母改用八錢又加玄參六錢一劑而寒熱已亦不作渴從前兩日不食至此遂能飲食惟脇下微疼繼服拙擬理鬱升陷湯後在二劑全愈

按產後雖有實熱若非寒溫外感之熱忌用知母而忌用玄參以玄參原爲治產乳之藥本經有明文也此證雖得之產後時已踰月故敢放胆重用知母

或問緊爲受寒之脈故傷寒麻黃湯證其脈必緊此證旣爲熱藥所傷何以其右脈沉緊答曰脈沉緊者其脈沉而有力也夫有力當作洪象此證因大氣下陷雖內有實熱不能鼓脈作起伏之勢故不爲洪而爲緊且爲沉緊也其獨見於右部者以所服乾薑之熱胃先受之也

按脈無起伏爲弦弦而有力即緊脈也若但弦則爲寒矣仲景平脈篇謂雙弦者寒偏弦者飲究之飲爲稀涎亦多係因寒而成也

一婦人年三十餘得下痿證兩腿痿廢不能屈伸上半身常常自汗胸中短氣少腹下墜小便不利寢不能寐延醫治療數月病勢轉增診其脈細如絲右手尤甚知其係胸中大氣下陷欲爲疏方病家疑而問曰大氣下陷之說從前醫者皆未言及然病之本源旣爲大氣下陷何以有種種諸證乎答曰人之大氣雖在胸中實能統攝全身今因大氣下陷全身無所統攝肢體遂有廢而不舉之處此兩腿之所以痿廢也其自汗者大氣旣陷外

衛之氣亦虛也其不寐者大氣既陷神魂無所依附也小便不利者三焦之氣化不升則不降上焦不能如霧下焦即不能如瀆也至於胸中短氣少腹下墜又爲大氣下陷之明徵也遂治以升陷湯因其自汗加龍骨牡蠣皆不用假各五錢兩劑汗止腿稍能屈伸諸病亦見愈繼服拙擬理鬱升陷湯數劑兩腿漸能着力然痿廢既久病在筋脈非旦夕所能脫然俾用舒筋通脈之品製作丸藥久久服之庶能全愈

一婦人產後四五日大汗淋漓數日不止形勢危急氣息奄奄其脈微弱欲無問其短氣乎心中怔忡且發熱乎病人不能言而領之知其大氣下陷不能吸攝衛氣而產後陰分暴虛又不能維繫陽分故其汗若斯之脫出也遂用生黃芪六錢玄參一兩山萸肉去淨核生杭芍各五錢桔梗二錢一劑汗減又服兩劑諸病皆愈從前六七日未大便至此大便亦通

一婦人年三十許胸中滿悶不能飲食醫者純用開破之藥數劑忽發寒熱脈變爲遲醫者見脈遲又兼寒熱方中加黃芪桂枝乾薑各數錢而仍多用破氣之藥購藥未服愚應其鄰家延請適至其村病家求爲診視其脈遲而且弱問其呼吸覺短氣乎答曰今於服

藥數劑後新添此證知其胸中大氣因服破氣之藥下陷時醫者在座不便另爲疏方遂謂醫曰子方中所加之藥極爲對證然此時其胸中大氣下陷破氣藥分毫不可再用遂單將所加之黃芪桂枝乾薑煎服寒熱頓已呼吸亦覺暢舒後醫者即方略爲加減又服數劑全愈

一婦人年二十餘資稟素羸弱因院中失火驚恐過甚遂覺呼吸短氣心中怔忡食後更覺氣不上達常作太息其脈近和平而右部較沉知其胸中大氣因驚恐下陷內經所謂恐則氣陷也遂投以升陷湯爲心中怔忡加龍眼肉五錢連服四劑而愈

一婦人年二十餘因境多拂鬱常作惱怒遂覺呼吸短氣咽乾作渴劇時覺氣息將停努力始能呼吸其脈左部如常右部來緩去急分毫不能鼓指內經謂宗氣貫心脈宗氣即大氣也此證蓋因常常惱怒致大氣下陷故不能鼓脈外出以成波瀾也遂投以升陷湯爲其作渴將方中知母改用六錢連服三劑病愈強半右脈亦較前有力遂去升麻又服數劑全愈

或問內經謂恐則氣陷前案中已發明之然內經又謂怒則氣逆也何以與此案中之理

相矛盾乎答曰內經所謂怒則氣逆者指肝胆之氣而言非謂胸中大氣也然肝胆之氣上逆有衝大氣亦上逆者故人當怒急之時恆有頭目眩暈其氣呼出不能吸入移時始能呼吸此因大氣上逆也有肝胆之氣上逆排擠大氣轉下陷者拙擬參耨鎮氣湯在第二卷下有治驗之案可考也況大氣原賴穀氣養之其人既常惱怒納穀必少大氣即暗受其傷而易下陷乎

門人高如璧曾治一人年三十餘因枵腹勞力過度致大氣下陷寒熱往來常常短氣大汗淋漓頭疼咽乾畏涼嗜睡遷延日久不能起牀醫者誤認爲肝氣鬱結投以鼈甲枳實麥芽諸藥病益劇診其脈左寸關尺皆不見右部脈雖見而微弱欲無知其爲大氣下陷投以升陷湯加人參三錢一劑左脈即見又將知母改用五錢連服數劑全愈

如璧又治一婦人年三十許胸中短氣常常出汗劇時覺氣不上達即昏不知人移時始甦睡時恆自驚寤診其脈微弱異常知其胸中大氣下陷甚劇遂投以升陷湯知母改用五錢又加人參黃肉去淨核各三錢連服數劑全愈

大氣下陷之證不必皆內傷也外感證亦有之一人年四十許於季春得溫證延醫調治

不愈留連兩旬病益沉重後愚診視其兩目清白無火竟昏憤不省人事舌乾如磋却無舌苔問之亦不能言語周身皆涼其五六呼吸之頃必長出氣一口其脈左右皆微弱至數稍遲此亦胸中大氣下陷也蓋大氣不達於腦中則神昏大氣不潮於舌本則舌乾神昏舌乾故問之不能言也其周身皆涼者大氣陷後不能宣布於營衛也其五六呼吸之頃必長出氣者大氣陷後胸中必覺短氣故太息以舒其氣也遂用野台參一兩柴胡二錢煎湯灌之一劑見輕兩劑全愈

按此證從前原有大熱屢經醫者調治大熱已退精神愈憊醫者謬爲不治病家亦以爲氣息奄奄待時而已乃遲十餘日而病狀如故始轉念或可挽回而迎愚診視幸投藥不差隨手奏效是知藥果對證誠有活人之功也

又按此證若不知爲大氣下陷見其舌乾如斯但知用熟地阿膠枸杞之類滋其津液其滯泥之性填塞膈胸既陷之大氣將何由上達乎愚願業醫者凡遇氣分不舒之證宜先存一大氣下陷理想以細心體察倘遇此等證庶可挽回人命於頃刻也

一人年三十餘於初夏得溫病醫者用涼藥清解之兼用枳實青皮破氣諸品連服七八

劑讞語不省人事循衣摸床周身顫動再延他醫以爲內風已動辭不治後愚診視其脈五至浮分微弱而重按似有力舌苔微黃周身肌膚不熱知其溫熱之邪隨破氣之藥下陷已深不能外出也遂用生石膏二兩知母野台參各一兩煎湯兩茶杯分二次溫服自午至暮連進二劑共服藥四次翌日精神清爽能進飲食半日進食五次猶肌而索食看護者不敢復與則周身顫動復發讞語疑其病又反覆求再診視其脈象大致和平而浮分仍然微弱恍悟其胸中大氣因服破氣之藥下陷雖用參數次至此猶未盡復故亟亟求助於水穀之氣且胃中之氣因大氣下陷無所統攝或至速於下行而飲食亦因之速下也遂用野台參兩許佐以麥門冬心帶三錢柴胡二錢煎湯飲下自此遂愈

或問子所治大氣下陷證有兩日不食者有飲食減少者此證亦大氣下陷何以轉能多食答曰事有常變病亦有常變王清任醫林改錯載有所治胸中瘀血二案一則胸不能着物一則非以物重壓其胸不安皆治以血腑逐瘀湯而愈夫同一胸中瘀血其病狀竟若斯懸殊故同一大氣之下陷也其脾胃若因大氣下陷而運化之力減者必然少食若大氣下陷脾胃之氣亦欲陷者或轉至多食曾治一少婦忽然飲食甚多一時覺飢不食

即心中怔忡醫者以爲中消證屢治不效向愚詢方疑其胸中大氣下陷爲開升陷湯方加龍骨牡蠣皆不用煨各五錢數劑而愈蓋病因雖同而病之情狀恆因人之資稟不同而有變易斯在臨證者細心體察耳

按此證與前證雖皆大氣下陷而實在寒溫之餘故方中不用黃芪而用人參因寒溫之熱最能鑠耗津液人參能補氣兼能生津液是以傷寒論方中凡氣虛者皆用人參能補氣兼能生津液是以傷寒論方中凡氣虛者皆用人參而不用黃芪也

右所列者皆大氣下陷治驗之案也然此證爲醫者誤治及失於不治者甚多略登數則於左以爲爛戒

庚戌秋在滄州治病有開藥坊者趙姓忽過訪言有疑事欲質諸先生問何疑曰予妹半月前來歸寧數日間無病而亡未知何故愚曰此必有病子蓋未知耳渠曰其前一日覺咽喉發悶診其脈沉細疑其胸有鬱氣俾用開氣之藥一劑翌日不覺輕頃惟自言不再服藥斯夕即安坐床上而逝其咽喉中發悶並不甚劇故曰無病也愚曰此胸中大氣下陷耳時行篋中有治大氣下陷諸案因出示之且爲剖析其理渠泫然流涕曰斯誠爲藥



誤矣

一人年三十餘呼吸短氣胸中滿悶醫者投以理氣之品似覺稍輕醫者以爲藥病相投第二劑遂放胆開破其氣分晚間服藥至夜如廁便後遂不能起看護者扶持至床上昏昏似睡呼之不應須臾張口呼氣外出若呵欠之狀如斯者日餘而亡後其兄向愚述之且問此果何病因歷舉大氣下陷之理告之其兄連連太息既自悔擇醫不慎又痛恨醫者誤人以後不敢輕於延醫服藥

一農家媼年五十餘因麥秋農家忙甚井臼之事皆自任之漸覺呼吸不利氣息迫促醫者誤認爲氣逆作喘屢投以納氣降氣之藥氣息遂大形迫促其努力呼吸之聲直聞戶外延愚診視及至診其脈左右皆無勉爲疏方取藥未至而亡此亦大氣下陷也其氣息之迫促乃肺之呼吸將停努力呼吸以自救也醫者又復用藥降下其氣斯何異韓昌黎所謂人落陷穽不一引手救反擠之者乎愚觸目傷心不覺言之過激然志在活人者自當深思愚言也

一諸生年五十六爲學校教員每講說後即覺短氣向愚詢方愚曰此胸中大氣虛而欲

陷爲至緊要之證當多服升補氣分之藥彼欲用燒酒燉藥謂朝夕服之甚便愚曰如此亦可然必須將藥燉濃多飲且常飲耳遂爲疏方用生黃芪四兩野台參二兩柴胡桔梗各八錢先用黃酒斤許煎藥十餘沸再用燒酒二斤同貯瓶中置甌中燉開每飯前飲之旬日而愈後因病愈置不復飲隔年一日步行二里許自校至家似有氣息迫切之狀不能言語倏忽而亡蓋其身體素胖艱於行步胸中大氣素有欲陷之機因行動勞苦而遂下陷此誠內經所謂大氣入於藏府不病而猝死者也方書有氣厥中氣諸名目大抵皆大氣下陷之證特未窺內經之旨而妄爲議論耳按內經原有氣厥二字乃謂氣厥逆上行非後世所謂氣厥也

或問案中所載大氣下陷證病因及其病狀皆瞭如指掌矣然其脈之現象或見於左部或見於右部或左右兩部皆有現象可徵且其脈多遲而又間有數者同一大氣之下陷也何以其脈若是不同乎答曰胸中大氣包舉肺外原與肺有密切之關係肺之脈診在右部故大氣下陷右部之脈多微弱者其常也然人之元氣自腎達肝自肝達於胸中爲大氣之根本其人或肝腎素虛或服破肝氣之藥太過其左脈或即更形微弱若案中左

部寸關尺皆不見左脈沉細欲無左關參伍不調者是也至其脈多遲而又間有數者或因陰分虛損或兼外感之熱或爲熱藥所傷乃兼證之現脈非大氣下陷之本脈也

或問人之胸中上不通咽喉下有膈膜承之與膈下臟腑亦不相通此中所積之大氣何以能主持人之全身答曰此理易解如浮針於缸中隔缸執磁石引之針即隨磁石而動無他其氣化透達也胸中大氣雖不與全身相通實息息與全身相通其氣化之透達亦猶隔缸之磁石與針也況人身之經絡原無處不相貫徹乎且其所以能主持全身者正賴其與他所不相通耳設有顯然隧道通於他處其氣即不能搏結胸中又何以主持全身乎

或問大氣下陷者常覺胸中發悶子謂非真發悶實呼吸不利而有似發悶耳然吾見患此證者其胸中恆滿悶異常不識果何理由答曰大氣之在胸中猶空氣之在瓶中若用機器將空中空氣提盡其瓶之薄脆者必被外氣排擠而破因內無空氣相抵故也至胸中大氣下陷其胸中空虛外氣必來排擠不勝其排擠之力即覺胸中偪窄而滿悶由是觀之仍非真滿悶也若真滿悶則胸多鬱氣而可受開破藥矣何以誤服破藥即凶危立

見乎况呼吸不利原自易覺發悶耳

或問人之胸中原多積血故王清任醫林改錯謂胸中爲血腑因製血腑逐瘀湯以治上焦瘀血諸證今子於胸中專推重大氣豈胸中之血於身無關緊要乎答曰臆中爲氣海內經原有明文臆中即胸中也

臆即膈也內經言臆中有指胸中言者有指心包言者以其皆在膈上也

此誠萬古不易之聖訓也王氏

醫林改錯一書皆從目力視驗而得但見胸中有形之積血不見胸中無形之積氣遂敢輕易內經氣海之名爲血腑夫血爲氣大配胸中無血之氣將無所留戀血之所關非不重究不如大氣之幹旋全身關於人者尤重也因王氏不知大氣故其書中未嘗言及此誠王氏之遺漏也愚著斯篇原以發前人所未發期吾中華醫學漸有進步恆於前人遺漏之處喜爲補綴之故於胸中大氣三致意焉不復論及胸中之血者誠以王氏之書徧行天下業醫者大抵皆熟悉其說無再庸爲之贅語也

或問李東垣補中益氣湯所治之證若身熱惡寒心煩懶言或喘或渴或陽虛自汗子所治大氣下陷案中類皆有之至其內傷外感之辨謂內傷則短氣不足以息尤爲大氣下陷之明徵至其方中所用之藥又與子之升陷湯相似何以其方名爲補中益氣但治中

氣之虛陷而不言升補大氣乎答曰大氣之名雖見於內經然素問中所言之大氣乃指外感之邪氣而言非胸中之大氣也至靈樞所言雖係胸中大氣而從來讀內經者恆目靈樞爲針經而不甚注意即王氏註內經亦但註素問而不註靈樞後人爲其不易索解則更廢而不讀至仲景傷寒金匱兩書惟金匱水氣門有大氣一轉其氣乃散之語他如難經千金外臺諸書並未言及大氣是以東垣於大氣下陷證亦多誤認爲中氣下陷故方中用白朮以健補脾胃而後來之調補脾胃者皆以東垣爲法夫中氣誠有下陷之自然不若大氣下陷之尤屬危險也間有因中氣下陷泄瀉日久或轉致大氣下陷者可仿補中益氣湯之意於拙擬升陷湯中去知母加白朮數錢若但大氣下陷而中氣不下陷者白朮亦可不用恐其氣分或有鬱結而芪朮並用易生脹滿也

按補中益氣湯所治之喘證即大氣下陷者之努力呼吸也若果係真喘桔梗尙不宜用况升麻乎愚少時觀東垣書至此心嘗疑之後明大氣下陷之理始覺豁然而究嫌其立言欠妥設醫者真以爲補中益氣湯果能治喘而於氣機上逆之真喘亦用之豈不足僨事乎此有關性命之處臨證者尙審辦之

或問大氣與元氣孰重答曰元氣者稟受先天爲胚胎之根基故道書尊之曰祖氣大氣肇始於先天而培養於後天爲身體之楨榦故內經尊之曰宗氣有如樹上之果元氣乃其樹之根也大氣乃其樹之身也根之關於果者至重身之關於果者亦非輕也

或問觀子所治大氣下陷諸驗案人之大氣有傷損者不難爲之補助矣若其元氣有所傷損不知亦有補法否耶答曰大氣傷損可補助者以其爲後天氣也藥物飲食及呼吸之空氣皆其補助培養之料也至元氣乃空中真氣之所凝結友人蘇明陽曰道家言真空則曰空之真詮純屬先天爲太極之朕兆非後天一切有形迹之物有空氣亦是所能補助也惟深於內典者常存此無念之正覺覺不在心若在心見則有念矣若天道之光明下濟易曰天道下濟而光明勿忘勿助久之能於

空中得真是爲補助元氣之正法愚不敢自命爲道中人何敢妄言哉

回陽升陷湯 治心肺陽虛大氣又下陷者其人心冷背緊惡寒常覺短氣

生黃芪 捌錢

乾 薑 陸錢

當歸身 肆錢

桂枝尖 叁錢

甘 草 壹錢

周身之熱力藉心肺之陽爲之宣通心肺之陽尤賴胸中大氣爲之保護大氣一陷則心肺陽分素虛者至此而益虛欲助心肺之陽不知升下陷之大氣雖日服熱藥無功也一

童子年十三四心身俱覺寒涼飲食不化常常短氣無論服何熱藥皆分毫不覺熱其脈微弱而遲右部兼沉知其心肺陽分虛損大氣又下陷也爲製此湯服五劑短氣已愈身心亦不若從前之寒涼遂減桂枝之半又服數劑全愈俾停藥日服生硫黃分許以善其後

服生硫黃法  
在第八卷

一人年五十餘大怒之後下痢月餘始愈自此胸中常覺滿悶飲食不能消化數次延醫服藥不外通利氣分之品即間有溫補脾胃者亦必雜以破氣之藥愈服病愈增重後愚診視其脈沉細微弱至數甚遲詢其心中常有覺涼之時知其胸中大氣下陷兼上焦陽分虛損也遂投以此湯十劑全愈後因怒病又反覆醫者即愚方加厚朴二錢服後少腹下墜作疼徹夜不能寐復求爲診治仍投以原方而愈

一婦人年四十餘忽然昏倒不語呼吸之氣大有滯碍幾不能息其脈微弱而遲詢其生平身體羸弱甚畏寒涼知其心肺陽虛寒痰結胸而大氣又下陷也然此時形勢將成痰厥取藥無及遂急用胡椒二錢搗碎煎兩三沸澄取清湯灌下須臾胸中作響呼吸頓形順利又用乾薑八錢煎湯一盅此時已自能飲下須臾氣息益順精神亦略清爽而仍不

能言且時作呵欠十餘呼吸之頃必發太息知其痰飲雖開大氣之陷者猶未復也遂投以回陽升陷湯數劑呵欠與太息皆愈漸能言語

或問心臟屬火西人亦謂周身熱力皆發於心其能宣通周身之熱宜矣今論周身熱力不足何以謂心肺之陽皆虛答曰肺與心同居膈上左心房之血脈管右心房之回血管皆與肺循環相通二臟之宣通熱力原有相助爲理之妙然必有大氣以斡旋之其功用始彰耳

按喻嘉言醫門法律最推重心肺之陽謂心肺陽旺則陰分之火自然潛伏至陳修園推廣其說謂心肺之陽下濟大能溫暖脾胃消化痰飲皆確論也

理鬱升陷湯 治胸中大氣下陷又兼氣分鬱結經絡湮淤者

生黃芪 陸錢

知母 三錢

當歸身 三錢

桂枝尖 錢半

柴胡 錢半

乳香 不去油三錢

沒藥 不去油三錢

脇下撐脹或兼疼者加龍骨牡蠣 皆不用煨 各五錢少腹下墜者如升麻一錢

一婦人年三十許胸中滿悶時或作疼鼻息發熱常常作渴自言得之產後數日勞力過



度其脈遲而無力籌思再三莫得病之端緒姑以生山藥一兩滋其津液雞內金二錢陳皮一錢理其疼悶服後忽發寒熱再診其脈無力更甚知其氣分鬱結又下陷也遂爲製此湯一劑諸病皆覺輕又服四劑全愈

一少女年十五臍下左邊起一癥瘕沉沉下墜作疼上連腰際亦下墜作疼楚時發呻吟劇時常覺小便不通而非不通也診其脈細小而沉詢其得病之由言因小便不利便時努力過甚其初腰際墜疼後遂結此癥瘕其方結時揉之猶軟今已五閱月其患處愈堅結每日晚四點鐘疼即增重至早四點鐘又漸覺輕愚聞此病因再以脈象參之知其小便時努力過甚上焦之氣陷至下焦而鬱結也遂治以理鬱升陷湯方中乳香沒藥皆改用四錢又加丹參三錢升麻錢半二劑而墜與疼皆愈遂去升麻用藥汁送服朱血竭末錢許連服數劑癥瘕亦消

或問龍骨牡蠣爲收澀之品兼脇下脹疼者何以加此二藥答曰脇爲肝之部位脇下脹疼者肝氣之橫恣也原當用瀉肝之藥又恐與大氣下陷者不宜用龍骨牡蠣以斂戢肝火肝氣自不至橫恣此斂之即以瀉之古人治肝之妙術也且黃芪有澎漲之力脹疼者

原不宜用有龍骨牡蠣之收斂以縮其澎湃之力可放胆用之無碍此又從體驗而知者也嘗治一少婦經水兩月不見寒熱往來脇下作疼脈甚微弱而數至六至詢之常常短氣投以理鬱升陷湯加龍骨牡蠣各五錢爲脈數又加玄參生地白芍各數錢連服四劑覺脇下開通瘀血下行色紫黑自此經水調順諸病皆愈蓋龍骨牡蠣性雖收澀而實有開通之力本經謂龍骨消癥瘕而又有牡蠣之鹹能軟堅者以輔之所以有此捷效也

醒脾升陷湯

治脾氣虛極下陷小便不禁

生箭芪 肆錢

白朮 肆錢

桑寄生 三錢

川續斷 三錢

萸肉 去淨核肆錢

龍骨 煨搗肆錢

牡蠣 煨搗四錢

川華薤 二錢

甘草 蜜炙二錢

內經曰飲入於胃游溢精氣上輸入脾脾氣散精上達于肺統調水道下輸膀胱是脾也者原位居中焦爲水飲上達下輸之樞機樞機不旺則不待上達而即下輸此小便之所以不禁也然水飲降下之路不一內經又謂肝熱病者小便先黃又謂肝壅兩脇也滿臥則驚悸不得小便且芍藥爲理肝之主藥而善利小便由斯觀之是水飲又由胃入肝而下達膀胱也至胃中所餘水飲傳至小腸滲出此又人所共知故方中用黃芪白朮甘草

以升補脾氣即用黃芪同寄生續斷以升補肝氣更用龍骨牡蠣莢肉萆薢以固澀小腸也又人之胸中大氣旺自能吸攝全身氣化不使下陷黃芪與寄生並用又爲填補大氣之要藥也

或問西人謂水入於胃被胃中微細血管吸去引入回血管過肝入心以布於周身自肺達出爲氣自膚滲出爲汗餘入膀胱爲溺何以西人之論小便與子所論者皆不同答曰水飲下行之道路原多端愚所論者其大概也然西人謂水飲由胃中微絲血管以達回血管即隨回血管以過肝入心夫既隨回血管入心必隨回血管入肺其氣化之餘必由肺降下與自脾達肺而降下者同循三焦脂膜下行可知且西人又謂內腎之中有回血管其管尾與溺管相接爲回血管之水飲透腎以達膀胱之路夫回血管中水飲若皆隨回血管過肝入心而回血管之循行未有自心下達腎者其中水飲何以復由回血管入腎是知水飲由回血管入腎者必其過肝之時未盡隨回血管入心而即隨肝經下行之回血管達腎可知由是觀之愚與西人所論者何嘗不同歸一致耶

或問西人謂小腸內皮有無數吸管能吸引小腸榨化食物之精液轉輸於心而爲血而

未嘗言其能將水飲滲出爲小便將勿水飲自小腸滲出之說不足憑歟答曰西人吸管之說固有迹象可憑而水飲自小腸滲出亦有徵驗可指試觀剖解物類者其小腸中水飲與食物參半至大腸則水飲全無若非自小腸滲出何以不入大腸乎蓋小腸將食物化爲精液必藉水氣醞釀而成迨津液成後被吸管吸去併入精液總管以轉輸於心而小腸中所餘之水亦即被小腸中微絲血管吸去達於與小腸相連之脂膜以及膀胱此自然之理也是知臟腑之妙用但以理推測不能盡得但據迹象考驗亦不能盡得欲爲中華醫學進化者貴合中西之法而細細研究也

或問黃芪爲補肺脾之藥今謂其能補肝氣何也答曰同聲相應同氣相求孔子之言也肝屬木而應春令其氣溫而性喜條達黃芪性溫而升以之補肝原有同氣相求之妙用愚自臨證以來凡遇肝氣虛弱不能條達一切補肝之藥不效者重用黃芪爲主而少佐以理氣之品服之覆杯之頃即見效驗曾治一少婦心中寒涼飲食減少坐時覺左半身下墜寢時不敢向左側服溫補兼理氣之藥年餘不效後愚診視左脈微弱不起知其肝氣虛也治以生黃芪八錢柴胡川芎各一錢乾薑三錢煎湯飲下須臾左側即可安臥又

服數劑諸病皆愈是知謂肝虛無補法者非見道之言也

或問本經謂桑寄生能治腰疼堅齒髮長鬚眉是當爲補肝腎之藥而謂其能補胸中大氣何也答曰寄生根不着土寄生樹上最善吸空中之氣以自滋生故其所含之氣化實與胸中大氣爲同類嘗見有以補肝腎而多服久服胸中恆覺滿悶無他因其胸中大氣不虛故不受寄生之補也且本經不又謂其治癰腫乎然癰腫初起服之必無效惟癰腫潰後生肌不速則用之甚效如此而言又與黃芪之主癰疽敗證者相同則其性近黃芪更可知矣

或問萆薢世醫多用以治淋夫淋以通利爲主蓋取萆薢能利小便也此方中用之以固小便其性果固小便乎抑利小便乎答曰萆薢爲固澀下焦之要藥其能治失溺別錄原有明文別錄者乃陶弘景集南北朝以前名醫所用之藥附載於本經之後用墨書之以別於本經之朱書故曰名醫別錄雖非本經其書誠可確信時醫因古方有萆薢分清飲遂誤認萆薢爲利小便之要藥而於小便不利淋澀諸證多用之嘗見有以利小便而小便轉癰閉者以治淋證竟致小便滴瀝不通者其誤人可勝道哉蓋萆薢分清飲之君萆

辨原治小便頻數溺出旋白如油乃下焦虛寒氣化不固之證觀其佐以縮小便之益智溫下焦之烏藥其用意可知特當日命名時少欠斟酌遂致庸俗醫輩錯有會心貽害無窮可不慎哉

治氣血鬱滯肢體疼痛方

升降湯 治肝鬱脾弱胸脇脹滿不能飲食宜與第五期衷中參西錄論肝病治法參看

野台參二錢

生黃芪二錢

白朮二錢

廣陳皮二錢

川厚朴二錢

生雞內金搗細二錢

知母三錢

生杭芍三錢

桂枝尖一錢

川芎一錢

生薑二錢

世俗醫者動曰平肝故遇肝鬱之證多用開破肝氣之藥至遇木盛侮土以致不能飲食者更謂伐肝即可扶脾不知人之元氣根基於腎而萌芽於肝凡物之萌芽皆嫩脆易於傷損肝既爲元氣萌芽之臟而開破之若是獨不慮損傷元氣之萌芽乎內經曰厥陰經肝不治求之陽明經胃金匱曰見肝之病當先實脾先聖後聖其揆如一故此方惟少用桂枝川芎以舒肝氣其餘諸藥無非升脾降胃培養中土俾中宮氣化敦厚以聽肝氣之自理實竊師內經求之陽明與金匱當先實脾之奧旨耳

按見肝之病當先實脾二句從來解者謂肝病當傳脾實之所以防其相傳如此解法固是而實不知實脾即所以理肝也兼此二義始能盡此二句之妙

一媼年近六旬資稟素弱又兼家務勞心遂致心中怔忡肝氣鬱結胸腹脹滿不能飲食舌有黑苔大便秘結十數日一行廣延醫者爲治半載無效而羸弱支離病勢轉增後愚診視脈細如絲微有弦意幸至數如常知猶可治遂投以升降湯爲舌黑便結加鮮地骨皮一兩數劑後舌黑與便結漸愈而地骨皮亦漸減至十劑病愈強半共服百劑病愈而體轉康健

按人之臟腑脾胃屬土原可包括金木水火諸臟是故肝氣宜升非脾土之氣上行則肝氣不升胆火宜降非胃土之氣下行則胆火不降

黃坤載曾有此論甚確

所以內經論厥陰治法有調

其中氣使之和平之語所謂中氣者指脾胃而言也所謂使之和平者指厥陰肝經而言也厥陰之治法如斯少陽之治法亦不外斯至仲景祖述內經繼往開來作傷寒論一書於治少陽寒熱往來有小柴胡湯方中用人參甘草大棗半夏以調理脾胃所謂調其中氣使之和平也治厥陰乾嘔吐涎沫有吳茱萸湯方中亦用人參大棗以調理脾胃亦所

謂調其中氣使之和平也且小柴胡湯中以柴胡爲君雖係少陽之藥而本經謂其主腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新細繹本經之文則柴胡實亦爲陽明之藥而兼治少陽也觀本經內經與傷寒金匱諸書自無疑於拙擬之升降湯矣

培脾舒肝湯

治因肝氣不舒木鬱尅土致脾胃之氣不能升降胸中滿悶常常短氣

於 朮三錢

生黃芪三錢

陳皮二錢

川厚朴二錢

桂枝尖錢半

柴胡錢半

生麥冬二錢

生杭芍四錢

生薑二錢

脾主升清所以運津液上達胃主降濁所以運糟粕下行白朮黃芪爲補脾胃之正藥同桂枝柴胡能助脾氣之升同陳皮厚朴能助胃氣之降清升濁降滿悶自去無事專理肝氣而肝氣自理況桂枝柴胡與麥芽又皆爲舒肝之妙品乎用芍藥者恐肝氣上升胆火亦隨之上升且以解黃芪桂枝之熱也用生薑者取其辛散溫通能渾融肝脾之氣化於無間也

從來方書中麥芽皆是炒熟用之惟陳修園謂麥芽生用能升發肝氣可謂特識蓋人之元氣根基於腎萌芽於肝培養於脾積貯於胸中爲大氣以斡旋全身麥芽爲穀之萌芽



與肝同氣相求故能入肝經以條達肝氣此自然之理無庸試驗而可信其必然者也然必生煮汁飲之則氣善升發而後能遂其條達之用也

又按麥芽具升發之性實兼消化之力化學家生麥芽於理石

即石舊

上凡麥芽根盤布之

處其石皆成微凹則其尤善消化可知故用麥芽生發肝氣者必與參芪諸藥並用而後有益無損

又按土爰稼穡稼穡作甘百穀味甘屬土故能補益而百穀之芽又皆屬木故能疏通然有入氣分血分之別甲生者陽其芽拆甲而出稻梁

俗名穀子

麥黍稷

亦名盧稷俗名高粱

諸芽是也爲其

屬陽故能疏通氣分乙生者陰其芽形曲似乙而出諸豆之芽是也爲其屬陰故能疏通血分金匱薯蕷丸用之以治血痺虛勞也

薯蕷丸中有大豆黃卷

### 金鈴瀉肝湯

治脇下掀疼

川棟子

搗伍錢

生明乳香

肆錢

生明沒藥

肆錢

三

稜三錢

莪

朮三錢

甘

草壹錢

劉河間有金鈴子散

即棟子之核

與玄胡索等分爲末服之以治心腹脇下作疼其病因由於熱

者甚效誠以金鈴子能引心包之火及肝胆所寄之相火下行又佐以玄胡索以開通氣

血故其疼自止也而愚用其方效者固多而間其不效者後擬得此方莫不隨手奏效蓋金鈴子佐以玄胡索雖能開氣分之鬱而實不能化氣所謂化氣者無事開破能使氣之鬱者融化於無形方中之乳香沒藥是也去玄胡索加三稜莪朮者因玄胡索性過猛烈且其開破之力多趨下焦不如三稜莪朮性較和平且善於理肝也用甘草者所以防金鈴子有小毒也此方不但治脇疼甚效凡心腹作疼而非寒涼者用之皆甚效驗

活絡效靈丹

治氣血凝滯心癰癥瘕心腹疼痛腿疼臂疼內外瘡瘍一切臟腑積聚經

絡湮淤

當歸 伍錢

丹

參 伍錢

生明乳香 伍錢

生明沒藥 伍錢

右藥四味作湯服若爲散一劑分作四次服溫酒送下腿疼加牛膝臂疼加連翹婦女瘀

血腹疼加生桃仁

帶皮尖作散服妙用

生五靈脂瘡紅腫屬陽者加金銀花知母連翹白硬屬陰者加

肉桂鹿角膠

若其偽可代以鹿角霜

瘡破後生肌不速者加生黃芪知母

但加黃芪恐失於熱

甘草臟腑內癰加三七

研細冲服 牛蒡子

一人年三十許當臍忽結癥瘕自下漸長而上其初長時稍軟數日後即硬如石旬日長

至心口向愚詢方自言凌晨冒寒得於途間時心中有驚恐憂慮遂覺其氣結而不散按此病因甚奇然不外氣血凝滯爲製此方於流通氣血之中大具融化氣血之力連十服劑全消以後用此方治內外瘡瘍心腹四肢疼痛凡病之由於氣血凝滯者恆多奇效鄰村高魯軒年近五旬資稟素羸弱一日訪友鄰村飲酒談讌徹夜不眠時當季冬復清晨冒寒步行旋里行至中途覺兩腿痠麻且出汗不能行步因坐涼地歇息至家遂覺腿疼用熱磚熨之疼益甚其人素知醫遂自服發汗之藥數劑病又增劇因服藥過熱吐血數口大便秘結延愚診視見其仰臥屈膝令兩人各以手托其兩腿忽歌忽哭疼楚之態萬狀脈弦細至數微數因思此證熱磚熨而益疼者逼寒內陷也服發汗藥而益疼者因所服之藥散肌肉之寒不能散筋骨之寒且過汗必傷氣血氣血傷愈不能勝病也遂用活絡效靈丹加京鹿角膠四錢另燉  
兌服明天麻二錢煎湯飲下托其左腿者覺自手指縫中冒出涼氣左腿遂愈而右腿疼如故因恍悟曰人之一身左陽右陰鹿名斑龍乃純陽之物故其膠入左不入右遂復用原方以虎骨膠易鹿角膠右腿亦出涼氣如左而愈禮有之左青龍右白虎用藥本此即建奇功古人豈欺我哉苟悟醫理之妙六經皆我註脚也

友人李景南左腿疼痛亦自服鹿角膠而愈隔數年右腿又疼再服鹿角膠分毫無效適有自京都來者贈以同仁堂藥坊虎骨酒飲之而愈愈後不知係何故後見愚所治高魯軒醫案不覺撫掌稱快

一少婦左脇起一瘡其形長約五寸上半在乳下半在肋皮色不變按之甚硬而微熱於他處延醫詢方調治兩月不效且漸大於從前後愚診視閱其所服諸方有遵林屋山人治白疽方治者有按乳癰治者愚曉病家曰此證硬而色白者陰也按之微熱者陰中有陽也統觀所服諸方有治純陰陽之方無治半陰半陽之方勿怪其歷試皆不效也用活絡效靈丹俾作湯服之數劑見輕三十劑後消無芥蒂

一婦人年五十許腦後發一對口瘡詢方於愚時初擬出活絡效靈丹方即書而予之連服十劑全愈

一婦人年五十餘項後筋縮作疼頭向後仰不能平視腰背強直下連膝後及足跟大筋皆疼並牽周身皆有疼意廣延醫者診治所用之藥不外散風和血潤筋通絡之品兩載無效病轉增劇臥不能起起不能坐飲食懶進後愚診視其脈數而有力微有弦意知其

爲宗筋受病治以活絡效靈丹加生薏米八錢知母玄參白芍各三錢連服三十劑而愈蓋筋屬於肝獨宗筋屬胃此證因胃腑素有燥熱致津液短少不能榮養宗筋夫宗筋爲筋之主故宗筋拘攣而周身牽引作疼也薏米性味冲和善能清補脾胃即能榮養宗筋又加知母玄參以生津滋液活絡效靈丹以活血舒筋因其脈微弦恐其木盛侮土故又加芍藥以和肝即以扶脾胃也

薏米主筋急拘攣本經原有明文活絡效靈丹中加薏米即能隨手奏效益歎本經之精當爲不可及

活絡效靈丹治心腹疼痛無論因涼因熱氣鬱血鬱皆效同里有一少年臍下疼甚劇醫者投以溫藥益晝夜號呼不止又延他醫以藥下之稍輕然仍晝夜呻吟繼又服藥數劑亦不見效適愚自津門旋里診其脈兩尺洪實詢其得病之由言夜晚將寢覺飢因食冷餅一塊眠起遂疼曉之曰此雖由於食涼物然其疼非涼疼乃下焦先有蘊熱又爲涼物所迫其熱愈結而不散也投以活絡效靈丹加龍膽草川棟子各四錢一劑而愈或問此證醫者曾用藥下之何以其下焦之鬱熱不隨之俱下答曰熱在大腸者其熱可

隨降藥俱下然又必所用之下藥爲鹹寒之品若承氣湯是也今其熱原鬱於奇經衝任之中與大腸無關衝任主血而活絡效靈丹諸藥品皆善入血分通經絡故能引龍膽棟子直入衝任而消解其鬱熱况其從前所服之下藥原非鹹寒之品是以從前不效而投以此藥則隨手奏效也

又鄰村一婦人年三十許心腹疼痛異常服藥不效勢近垂危其家人夜走五六里叩門求方適遇他出長子蔭潮爲開活絡效靈丹方授之亦一劑而愈自擬得此方以來數年之間治愈心腹疼痛者不可勝紀矣

### 活絡祛寒湯

治經絡受寒四肢發搐婦女多有此證

生黃

芪五錢

當

歸四錢

丹

參四錢

桂枝尖二錢

生杭芍三錢

生明乳香四錢

生明沒藥四錢

生

薑三錢

寒甚者加乾薑三錢

證寒在經絡不在臟腑經絡多行於肌肉之間故用黃芪之溫補肌肉者爲君俾其形體壯旺自能勝邪又佐以溫經絡通經絡諸藥品不但能祛寒且能散風此所謂血活風白

去也風寒既去血脈活潑其搖焉有不止者乎

健運湯 治腿疼臂疼因氣虛者亦治腰疼

生黃芪六錢 野台參三錢 當歸三錢 寸麥冬帶心三錢 知母三錢

生明乳香三錢 生明沒藥三錢 莪朮一錢 三稜一錢

此方減麥冬知母三分之一合數劑爲一劑軋細煉蜜爲丸名健運丸治同前證

從來治腿疼臂疼者多責之風寒濕痺或血瘀氣滯痰涎凝滯不知人身之氣化壯旺流行而周身痺者瘀者滯者不治自愈即偶有不愈治之亦易爲功也愚臨證體驗以來知元氣素盛之人得此病者極少故凡遇腿疼臂疼歷久調治不愈者補其元氣以流通之數載沉疴亦可隨手奏效也

振中湯 治腿疼腰疼飲食減少者

於白朮炒六錢 當歸身二錢 陳皮三錢 厚朴錢半 生明乳香錢半 生明沒藥錢半

土居中央分主四季人之脾胃屬土故亦旁主四肢一室女腿疼幾不能步治以拙擬健運湯前在而愈次年舊病復發又兼腰疼再服前方不效診其脈右關甚濡弱詢其飲食減

少爲製此湯數劑飲食加多二十劑後腰疼腿疼皆愈蓋此方重用白朮以健補脾胃脾胃健則氣化自能旁達且白朮主風寒濕痺本經原有明文又輔以通活氣血之藥不惟風寒濕痺開而氣血之痺而作疼者亦自開也

一媼年近七旬陡然腿疼不能行動夜間疼不能寐其家人迎愚調治謂脈象有力當是火鬱作疼及診其脈大而且弦問其心中亦無熱意愚曰此脈非有火之象其大也乃脾胃過虛真氣外泄也其弦也乃肝胆失和木盛侮土也治以振中湯加人參白芍山萸肉去淨核各數錢補脾胃之虛即以抑肝胆之盛數劑而愈

曲直湯 治肝虛腿疼左部脈微弱者

萸肉去淨核一兩 知母六錢 生明乳香三錢 生明沒藥三錢 當歸三錢 丹參三錢

服藥數劑後左脈仍不起者可加續斷三錢或更加生黃芪三錢以助氣分亦可覺涼者可減知母

脾虛可令人腿疼前方已詳其理深於醫學者大抵皆能知之至肝虛可令人腿疼方書罕言即深於醫學者亦恆不知曾治一人年三十許當大怒之後漸覺腿疼日甚一日兩



月之後臥牀不能轉側醫者因其得之惱怒之餘皆用舒肝理氣之藥病轉加劇後愚診視其左脈甚微弱自言凡疼甚之處皆熱因恍悟內經謂過怒則傷肝所謂傷肝者乃傷肝經之氣血非必鬱肝經之氣血也氣血傷則虛弱隨之故其脈象如斯也其所以腿疼且覺熱者因肝主疏泄中藏相火相火生於命門寄於肝膽肝虛不能疏泄相火即不能逍遙流行於周身以致鬱於經絡之間與氣血凝滯而作熱作疼所以熱劇之處疼亦劇也爲製此湯以荑肉補肝以知母瀉熱更以當歸乳香諸流通血氣之藥佐之連服十劑熱愈疼止步履如常

安東友人劉仲友年五十許其左臂常覺發熱且有酸軟之意醫者屢次投以涼劑發熱如故轉覺脾胃消化力減少後愚診之右脈和平如常左脈微弱較差於右脈一倍詢其心中不覺涼熱知其肝木之氣虛弱不能條暢敷榮其中所寄之相火鬱於左臂之經絡而作熱也遂治以曲直湯加生黃芪八錢佐荑肉以壯旺肝氣黃芪補肝氣之理詳前醒脾升陷湯下赤芍藥三錢佐當歸丹參諸藥以流通經絡服兩劑左脈即見起又服十劑全愈

或問西人謂脾居左肝居右今剖驗家精詳考察確乎不誤予猶拘守舊說謂肝仍主左

者何也答曰脾左肝右之說非始於西人淮南子早言之古籍猶在可考也然脾雖居左而其氣化實先行於右故脾脈診於右關肝雖居右而其氣化實先行於左故肝脈診於左關此陰陽互根剛柔錯綜之妙也蓋內經論臟腑以發明其氣化兼研究其性情爲宗旨至對於形迹之粗恆有簡略不詳者至於西人則但講形迹不講氣化且但言臟腑之功用而不言臟腑之性情其意見直謂臟腑毫無性情凡性之情發動皆關於腦部其理果可盡信乎內經曰肝者將軍之官謀慮出焉胆者中正之官決斷出焉蓋肝爲厥陰逆也陰盡陽生胆即爲肝中蘊蓄之陽膽汁中陽少陽之氣能暢達肝氣而決斷其謀慮故人之肝胆壯實者必勇敢果斷肝胆虛弱者必懼怯游移比鄰竇杏村之太夫人年六旬時忽得奇疾驚懼異常多人衛護仍驚懼至於抖戰口中連連吐出綠沫甚苦數日而終多醫研究皆謂胆破是非胆失其中正之官而驚懼如是乎由斯觀之吾之舊說不可輕疑西人之說不可概信也

或問曰聆子之論內經論臟腑之處誠可信矣至肝之氣化先行於左之說果有確徵可實指乎答曰人稟天地之靈秀以生人身亦小天地也欲明人身之氣化可先觀天地之

氣化夫天地一歲之氣化始於春一日之氣化始於朝春之氣化從東來

觀律管飛灰是其明機

朝之

氣化隨日自東上升春者一歲之木令朝者一日之木令也肝臟屬木具有生發之氣於一歲則應春於一日則應朝其氣化先行於左之理固可於春之東來日之東升比例而得也天地之東即人身之左也且即以此案論左脈之微弱如是投以補肝之劑而脈即旋起豈非肝與人身之左相關甚切乎

或又曰肝之氣化既先行於左矣而其所以居右者何也答曰人之膈上屬天膈下屬地地道上右其氣化自西而東也天道上左其氣化自東而西也觀於日在地中自西而東日在地外自東而西是明徵也肝居膈下猶木根埋藏地中以下襲水氣宜從地道上右之義故居於右也其氣化透膈貫絡有如木之條達滋長以上升養氣

化學家謂木能吸炭氣吐養氣

宜從天

道上左之義故其氣化先行於左試觀植物中籐蔓之類附物而生必自右向左盤旋而

上惟金銀藤之盤旋自左向乃植物之獨異者

亦猶肝居右而其氣化先行於左之理也

宜與第五期衷中參西錄報駁左肝右脾者書參觀

奉天本溪湖煤鐵公司科員王雲生年四十餘兩脇下連腿作疼其疼劇之時有如錐刺且尿道艱澀滴瀝不能成溜每小便一次須多半點鐘其脈亦右部如常左部微弱亦投

以曲直湯加生黃芪八錢續斷三錢一劑其疼減半小便亦覺順利再診之左脈較前有力又按原方略爲加減連服二十餘劑脇與腿之疼皆愈小便亦通利如常蓋兩脇爲肝之部位肝氣壯旺上達自不下鬱而作疼至其小便亦通利者因腎爲二便之關肝氣既旺自能爲腎行氣也

古方書有肝行腎之氣之語

按山茱萸得木氣最厚酸收之中大具開通之力以木性喜條達故也神農本經謂主寒濕痺諸家本草多謂其能通利九竅其性不但補肝而兼能利通氣血可知若但視爲收澀之品則淺之乎視山茱萸矣特是其核與肉之性相反用者須加審慎千萬將核去淨有門人張甲升亦有重用山茱萸肉治愈腿疼之案附載於加味補血湯

在第七卷

後可參觀再合之拙擬既濟湯來復湯

皆在第一卷

後所載重用萸肉治驗之案則山茱萸肉之功用不幾令人不可思議哉

乳香沒藥不但流通經絡之氣血諸凡臟腑中有氣血凝滯二藥皆能流通之醫者但知其善入經絡用之以消瘡瘍或外敷瘡瘍而不知用之以調臟腑之氣血斯豈知乳香沒藥者哉

## 熱性關節腫疼用阿斯必林法

西人治關節急性

也熱

癱麻質斯

疼腫

習用阿斯必林而愚對於此證亦喜用之更以中藥駕

馭之則其效愈顯奉天陸軍參謀長趙海珊之姪年六歲腦後生瘡漫腫作疼繼而頭面皆腫若赤遊丹毒繼而作抽掣日甚一日寢至周身僵直其目不能合亦不能瞬氣息若斷若續呻吟全無其家人亦以爲無藥可治待時而已閱兩晝夜形狀如舊時灌以勺水似猶知下咽因轉念或猶可治而彼處醫者又皆從前延請而屢次服藥無效者也其祖父素信愚因其向患下部及兩腿皆腫曾爲治愈其父受瘟病甚險亦昇至院中治愈遂亦昇之來院求爲診治其脈洪數而實肌膚發熱知其夾雜瘟病陽明府證已實勢雖垂危猶可挽回也遂用生石膏細末四兩以蒸汽水煮湯四茶杯徐徐溫灌之周十二時劑盡脈見和緩微能作聲又用阿斯必林瓦半仍以汽水所煎石膏湯分五次送下限一日夜服完服至末二次皆周身微見汗其精神稍明了肢體能微動從前七八日不食且不大便至此可少進食大便亦通下矣自此用生山藥細末二三錢煮作茶湯調以白蔗糖送服阿斯必林三分瓦之一日兩次若見有熱又間飲汽水所煮石膏湯又用蜂蜜調黃

連末少加薄荷冰敷其頭面腫處生肌散敷其瘡破處如此調養數日病勢皆減退可以  
能言其左邊手足仍不能動試略爲屈伸則疼不能忍細驗之關節處皆微腫按之亦覺  
疼知其關節之間因熱生炎也遂又用鮮茅根煎濃湯無鮮茅根藥房中乾者亦可用調以白蔗糖送服阿斯  
必林半瓦日兩次俾服藥後周身微似有汗亦間有不出汗之時俾關節中之炎熱徐徐  
隨發表之藥透出又佐以健補脾胃之藥俾其多進飲食如此旬餘左手足皆能運動關  
節處皆能屈伸以後飲食復常停藥勿服靜養半月行動如常矣

此證共用生石膏三斤阿斯必林三十瓦始能完全治愈愚用阿斯必林治急性關節腫  
疼者已多次爲此證最險故詳記之

茅根性涼中空稟初春生發之氣能使內熱外達透表而出又善利小便引內熱自水道  
出又味甘多液善滋養陰分二鮮飲及白茅根湯皆在第二卷曾詳論之

丁仲祐西藥實驗談謂東人治關節急性癱麻質斯亦多用阿斯必林兼引矢島國大郎  
之醫案以徵明之今並錄之於左以備參觀

光緒壬寅日本醫學報云矢島國大郎阿斯必林之效用既得諸家之報告知爲各醫家

所注目無庸再爲陳說但其應用之處與向來僂麻質斯劑及各種解熱劑其優劣如何尙待竭力研究之始能得其實際予自接阿斯必林有特效爲僂麻質斯之報告至今施用於患此證者計共二十三名中有急性患者十九名服之均呈效果餘之慢性者則無效而急性患者之十九名中有左之四例茲特報告之

第一例 根橋某次女年二十九歲在二年前右膝關節僂麻質斯歷二月而治愈距今二十日前復罹感冒右膝關節腫起而疼痛惡寒發熱而髀白關節及足跗關節亦波及而不便運動醫治不效疼寢加劇赴某醫會診之右脚各關節均紅腫而膝關節尤甚不能爲些微之運動如微觸之則疼痛難忍體溫在三十九度六分脈搏百二十至一分鐘間之脈數動而細弱聽其心臟有如吹氣之雜音舌白苔厚食量銳減故診定爲急性關節僂麻質斯舊時醫法內服撒里矢爾酸曹達每次一瓦一日三次或內服沃度劑及安知必林患處縛以塗沃度丁幾之布按法施治未見輕減予於是用阿斯必林二瓦和乳糖分爲三包一日分服膝關節則囑該會醫施以石炭酸水之冷濕布紮帶明日復往診視患者服藥後曾發汗疼亦消減半夜可睡眠於是復取阿斯必林二瓦每日作三次分服二日

後紅腫頓形淨退能爲輕微之運動自後連服二週間所患竟霍然愈

第二例 野澤某女年四十一歲其所患者爲右肩胛關節部腫起疼痛手指麻痺不能自由運動加以按摩法腫疼反增劇且更難運動乞予診治往診時患者適自浴出云有人言此證取雜草煎湯沐浴之當見輕而浴後運動稍覺自由診之則肩胛關節部及上膊各處腫起壓疼周身皆運動極難其外形若脫臼狀體溫在三十九度二分脈搏百零八至身神倦怠予恐其浴後體溫或一時昇騰有頃再診之仍爲三十九度二分遂診定爲急性關節癱麻質斯戒以發熱時不可久浴宜用溫臥法治之以撒里矢爾酸曹達每服一瓦日三次服二日疼稍減而無著明之變化反起充血性之頭疼耳鳴等證予於是取阿斯必林一瓦半和入乳糖分二包令每日二回分服翌日患處腫疼皆大減頭疼亦愈所患之肢能自徐徐上舉至頭部乃更用阿斯必林二瓦分三包與服翌日患者大喜來呼云今朝能自結帶矣後復服此劑二日而所患悉除

第三例 矢島某男年四十九歲業水車病前數日並無他患一日修繕水車試用於水中遂整日在水中作業迨至翌朝而左手腕關節部漸次腫疼乃以右手持左手來求診



診之則腫起疼痛殊甚殆不能接觸予因其勞動診定爲外傷性關節炎用局部消炎法命之靜養至次日惡寒發熱疼痛加甚不能外出熱至三十九度脈搏百二十至夜間難於安眠意其爲僂麻質斯治以撒里矢爾酸曹達三瓦苦丁二瓦和水一百瓦爲一日量三次服下患處用冷罨法繼續不斷次日仍無變化體溫依然三十八度八分出汗後惡寒加甚於是易以阿斯必林二瓦分爲三包給之次日大見平靜疼痛亦大爲減退惟運動尙覺疼痛腫起則減退淨盡仍令連服阿斯必林五日後遂全愈予故改診斷爲腕關節僂麻質斯

第四例 上田某女年二十五歲五年前產第一子其足遂患疼痛後復罹心臟病惟十日前並無他種原因可記迨患日覺左肩胛部疼痛勉強在室操作覺疼痛寢增且腫起遂難於運動診之其腫起自肩胛關節部蔓延至肩胛背部及上膊部惟疼痛止在關節部安靜時尙無劇熱三十八度脈搏百至心臟有雜音頸部及肘部有如淋巴腺之腫起遂診定爲肩胛關節僂麻質斯用阿斯必林一瓦分作三包爲一日之量外用沃度丁幾至一週日毫無變化腫疼依然予於是疑藥物之作用且疑其既往病歷中或有梅毒

故有腫起之線乃改方爲沃剝劑兼以撒里矢爾酸曹達一瓦令頓服日二次至一週日仍不愈且消化亦多障礙遂再改診定爲癱麻質斯以阿斯必林二瓦分三包作一日服每日如此且以障礙消化故兼用健胃的療法疼痛乃稍退減復漸次增其藥量爲二瓦服至三週間連前藥四週間而治愈由是知前用之量不合而患者亦爲慢性證且患者正乳其第二子晝間雖有人代爲抱持夜間仍自行提掣忍疼以盡襁褓之任故治療遂益形緩慢

丁仲祐曰阿斯必林之應用不過爲解熱治關節疼二端而已閱者每易滑過而不知所謂解熱者乃流行性感冒氣管支加答兒炎熱腫疼之輕者及一切熱性病皆可用之所謂治關節

疼者凡淋毒性關節癱麻質斯及一切神經疼頸寒乳癌疼子宮癌疼脊髓勞皆可用之

阿斯必林之原質性味形狀愚於參麥湯

在第三卷

下曾詳言之其善治流行感冒者以其能

入三焦

即包連臟腑之油膜第五卷小柴胡湯解下詳言之

外達腠理以發汗也其善治肺結核者以其能引肺中之毒

熱外透皮毛

肺主皮毛

以消散也其善治關節腫疼者以其涼散之性能使關節之鬱熱悉融

化也愚嘗歷試此藥用之得當奏效甚速然其力甚猛虛人服少半瓦即可出汗故其案

中於體質虛者必以健胃之藥輔之始效也

第 四 卷

氣血凝滯肢體疹痛方

熱性關節腫疹用阿斯必林法

五九

第  
四  
卷



2.41  
2.42

鹽山張錫純壽甫著

醫學衷中參西錄

前三期合編 下冊

建國廿四年六月安江清題



# 衷中參西錄前三期合編第五卷

## 傷寒方

麻黃加知母湯

治傷寒無汗

麻黃四錢

桂枝尖二錢

甘草一錢

杏

仁去皮炒二錢

知


母

先煮麻黃五六沸去上沫納諸藥煮取一茶鍾溫服覆被取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

麻黃湯原方桂枝下有去皮二字非去枝上之皮也古人用桂枝惟取稍尖嫩枝折視之內外如一皮骨不分若見有皮骨可分辨者去之不用故曰去皮陳修園之姪鳴岐曾詳論之

傷寒論太陽篇中麻黃湯原在桂枝湯後而麻黃證多桂枝證不過十中之一二且病名傷寒麻黃湯爲治傷寒初得之主方故先錄之

傷寒者傷於寒水之氣也在天有寒水之氣冬令之嚴寒是也在人有寒水之經足太陽膀胱之經是也外感之來以類相從故傷寒之證先自背受之背者足太陽所轄之部位



也是以其證初得周身雖皆惡寒而背之惡寒尤甚周身雖皆覺疼而背下連腿之疼痛尤甚其脈陰陽俱緊者誠以太陽爲周身外衛之陽陡爲風寒所襲逼其陽氣內陷與脈相併其脈當有力而作起伏疊湧之勢而寒氣之縮力凡物之體熱則漲寒則縮又將外衛之氣縮緊逼壓脈道使不得起伏成波瀾而惟現弦直有力之象甚或因不能起伏而至左右彈動故方中用麻黃之性熱中空者直走太陽之經外達皮毛藉汗解以祛外感之寒桂枝之辛溫微甘者偕同甘草以溫肌肉實腠理助麻黃托寒外出杏仁之苦降者入胸中以降逆定喘原方止此四味而愚爲加知母者誠以服此湯後間有汗出不解者非因汗出未透實因餘熱未清也佐以知母於發表之中兼寓清熱之意自無汗後不解之虞此乃屢經試驗而確知其然非敢於經方輕爲加減也

或問喘爲肺臟之病太陽經於肺無涉而其證多兼微喘者何也答曰胸中亦太陽部位其中所積之大氣原與周身衛氣息息相通衛氣既爲寒氣所束則大氣內鬱必澎漲而上逆衝肺此喘之所由來也又風寒襲於皮毛必兼入手太陰肺經挾痰涎凝鬱肺竅此又喘之所由來也麻黃能兼入手太陰經散其在經之風寒更能直入肺中以瀉其鬱滿



所以能發太陽之汗者不僅麻黃而仲景獨取麻黃爲治足經之藥而手經亦兼顧無遺此仲景製方之妙也

凡利小便之藥其中空者多兼能發汗篇蓄木通之類是也發汗之藥其中空者多兼能利小便麻黃柴胡之類是也太陽經病往往兼及於膀胱以其爲太陽之腑也麻黃湯治太陽在經之邪而在腑者亦兼能治之蓋在經之邪由汗而解而在腑之邪亦可由小便而解被後世自作聰明恆用他藥以代麻黃湯者於此義蓋未之審也

大青龍湯治傷寒無汗煩躁是胸中先有內熱無所發洩遂鬱而作煩躁故於解表藥中加石膏以清內熱然麻黃與石膏並用間有不汗之時若用此方將知母加重數錢其寒潤之性能入胸中化合而爲汗隨麻桂以達於外而煩躁自除矣

傷寒與溫病始異而終同爲其始異也故傷寒發表可用溫熱溫病發表必須辛涼爲其終同也故病傳陽明之後無論寒溫皆宜治以寒涼而大忌溫熱茲編於解表類中略取傷寒論太陽篇數方少加疏解俾初學知傷寒初得治法原異於溫病因益知溫病初得治法不同於傷寒至於傷寒三陰治法雖亦與溫病多不同然其證甚少若擴充言之則

凡因寒而得之霍亂痧證又似皆包括其中精微浩繁萬言莫罄欲精其業者取原書細觀可也

錢天來曰漢之一兩爲今之二錢七分一升爲今之二合半程扶生曰以古今量度及秬黍考之以一千二百黍之重實於黃鐘之龠得古之半兩今之三錢也合兩龠爲合得古之一兩今之六錢也十銖爲千黍之重今之二錢半也一銖爲百黍之重今之二分半也陸九芝曰傷寒方一兩準今之七分六厘一升準今之六勺七抄若麻黃湯麻黃三兩準今之二錢三分其三之一應得七分強承氣湯大黃四兩準今之三錢折半應得一錢五分按程氏之說古方分量過重陸氏之說古方分量又過輕惟錢氏之說其輕重似適宜陳修園則謂用古不必泥於古凡傷寒金匱古方之一兩可折爲今之三錢

陸氏又謂麻黃數分即可發汗大黃一二錢即可降下燥結此以治南方人猶可若治北方人則不然愚臨證體驗多年麻黃必至二錢始能出汗大黃必至三錢始能通結然猶是富貴中且不受勞碌之人至其人勞碌不避寒暑飲食不擇精粗身體強壯或又當嚴寒之時恆有用麻黃至七八錢始能汗者若其大便燥結之甚恆有用大黃至兩餘大便

始能通者究之用藥以勝病爲主此中因時因地因證因人斟酌咸宜自能愈病安可有拘執之見存於心中也哉

加味桂枝代粥湯 治傷寒有汗

桂枝尖 三錢

生杭芍 三錢

甘草 錢半

生薑 三錢

大棗 三枚 搗開

生黃芪 三錢

知母 三錢

防風 二錢

煎湯一茶鍾溫服覆被令一時許徧身縈縈微似有汗者益佳不可如水流漓病必不除禁生冷黏滑肉麵五辛酒酪及臭惡等物

桂枝湯爲治傷風有汗之方釋者謂風傷營則有汗又或謂營分虛損即與外邪相感召斯說也愚嘗疑之人之營衛皆爲周身之外廓衛譬則郭也營譬則城也有衛以爲營之外圍外感之邪何能越衛而傷營乎蓋人之胸中大氣息息與衛氣相關大氣充滿於胸中則饒有吸力將衛氣吸緊以密護於周身捍禦外感使不得着體卽或著體亦止中於衛而不中於營此理固顯然也有時胸中大氣虛損不能吸攝衛氣衛氣散漫不能捍禦外邪則外邪之來直可透衛而入營矣且愚臨證實驗以來凡胸中大氣虛損或更下陷

者其人恆大汗淋漓拙擬升陷湯

在第四卷

下載有數案可參觀也是知凡桂枝湯證皆因大

氣虛損其汗先有外越之機而外邪之來又乘衛氣之虛直透營分擾其營中津液外泄而爲汗也究之風寒原不相離即係傷風其中原挾有寒氣若但中於衛則亦能閉汗矣故所用桂枝湯中不但以祛風爲務而兼有散寒之功也

陳古愚曰桂枝辛溫陽也芍藥苦平陰也桂枝又得生薑之辛同氣相求可恃之調周身之陽氣芍藥而得大棗甘草之甘苦化合可恃之以滋周身之陰液即取大補陰陽之品養其汗源爲勝邪之本又啜粥以助之取水穀之津以爲汗汗後毫受傷所謂立身於不敗之地以圖萬全也按此解甚超妙而於啜粥之精義猶欠發揮如謂取水穀之津以爲汗而人無傷損他發汗藥何以皆不啜粥蓋桂枝湯所主之證乃外感兼虛之證所虛者何胸中大氣是也內經曰穀始入于胃其精微者先出于胃之兩焦以溉五臟而其大氣之搏而不行者積于胸中命曰氣海由斯觀之大氣雖本於先天實賴後天水穀之氣培養而成桂枝湯證既因大氣虛損致衛氣漫散邪得越衛而侵營故於服藥之後即啜熱粥能補助胸中大氣以勝邪兼能宣通薑桂以逐邪此誠戰則必勝之良方也乃後世

醫者忽不加察雖用其方多不啜粥致令服後無效病轉深陷故王清任醫林改錯深詆桂枝湯無用非無用也不啜粥故也是以愚用此方時加黃芪升補大氣以代粥補益之力防風宣通營衛以代粥發表之力服後啜粥固佳即不啜粥亦可奏效而又恐黃芪溫補之性服後易至生熱故又加知母以預爲之防也

按凡服桂枝湯原方欲其出汗者非啜粥不效趙初晴曰族姪柏堂二十一歲時酒後寐中受風徧身肌膚麻痺搔之不知疼癢飲食如常時淮陰吳鞠通適寓伊家投以桂枝湯桂枝五錢白芍四錢甘草三錢生薑三片大棗兩枚水三盃煎二盃先服一盃得汗止後服不汗再服並囑弗夜膳臨睡腹覺飢服藥一盃須臾啜熱稀粥一碗覆被取汗柏堂如其法祇一服便由頭面至足徧身繫繫得微汗汗到處一手搔之輒知疼癢次日病若失觀此醫案知欲用桂枝湯原方發汗者必須啜粥若不啜粥即能發汗恐亦無此功效或問桂枝湯證其原因既爲大氣虛損宜其陽脈現微弱之象何以其脈轉陽浮而陰弱乎答曰人之一身皆氣之所撐懸也此氣在下焦爲元氣在中焦爲中氣在上焦爲大氣區域雖分而實一氣貫注故一身之中無論何處氣虛脈之三部皆現弱象今其關前之

脈因風而浮轉若不見其弱而其關後之脈仍然微弱故曰陽浮而陰弱也如謂陰弱爲下焦陰虛則其脈宜兼數象而愚生平所遇此等證其脈多遲緩不及四至其爲氣分虛損而非陰分虛損可知即所謂嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱亦皆氣分怯弱之形狀也後世謂傷寒入足經不入手經治傷寒之方亦但治足經不治手經其說誠非也夫麻黃湯兼治手太陰經於前方後曾詳論之至桂枝湯兼治手太陽經唐容川論之甚詳其言曰膀胱主氣屬衛分小腸主火主血屬營分營生於心藏於肝而導之出者小腸也心火生營血循包絡下入肝膈散走連網而及小腸通體全生於連網之上小腸者心之府而連網者肝膈相連者也小腸宣心之陽從連網肝膈之中而外達腠理又外達肌肉是爲營氣與衛氣合以成其爲太陽之功用故邪在營分用甘棗補脾從脾之膏油外達以托肌肉之邪用芍藥行肝血從肝膈連網而外達肌肉以行營血之滯用生薑宣三焦少陽之氣從連網達腠理以散外邪而尤重在桂枝一味能宣心陽從小腸連網以達於外使營血充於肌肉間而邪不得留也然則此方正是和肌肉治營血之方正是小腸血分之方蓋膀胱屬水小腸屬火以火化水而後成太陽之功用若不知水火合化之理則此方

之根源不明也按連網即包連臟腑之網油脂膜亦即三焦也從前論三焦者皆未能確指爲何物獨容川所著醫經精義論之甚詳能發前人所未發其功偉矣

王叔和脈訣三焦與心包絡皆診於右尺後世多有詆其差謬者愚向亦嘗疑之後見容川所論三焦與腎系心始豁然所謂腎系者即絡腎之脂膜其根連於脊椎自下數第七節處此爲命門穴乃相火由生之處此油膜原與網油相連爲一體上爲膈膜更上爲心與肺相連之包絡由斯知心包絡與三焦亦皆發原於命門且心包絡與三焦臟腑相配又皆屬火故可與相火同診於右尺也叔和當日去古未遠此必有祕傳口授而後筆之於書也詳觀容川之論可明叔和之脈訣既明叔和之脈訣更知容川之論信而有徵矣

小青龍湯解

宜與第五期衷中參西錄第五卷歷序用小青龍湯治外感痰喘之經過及通變化裁之法參看

傷寒論曰傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

陳修園註云太陽主寒水之氣運行於皮膚出入於心胸今不運行出入以致寒水之氣汎溢而無底止水停於胃則乾嘔水氣與寒邪留戀而不解故發熱肺主皮毛水氣合之

則發熱而欬是發熱而欬爲心下有水氣之陰證然水性之變動不居不得不於未然之時先作或然之想或水蓄而正津不行則爲渴或水漬入腸間則爲利或逆之於上則爲噎或留而不行則爲小便不利少腹滿或如麻黃證之喘而兼證處顯出水氣則爲水氣之喘者以上諸證不必悉具但見一二證即是也以小青龍湯主之

又傷寒論曰傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之陳修園註云寒水之氣太陽所專司運行於膚表出入於心胸有氣而無形苟人傷於寒則不能運行出入停於心下無形之寒水化而爲有形之水氣水寒傷肺而氣上逆則爲欬而微喘病在太陽之表則現出標陽而發熱然水寒已甚標陽不能勝之雖發熱而仍不渴審證既確而以小青龍湯與服服湯已而渴者此寒去欲解而水猶未解也仍以小青龍湯主之再散其水氣而愈

修園此一節之註原係即經文而爲襯註逐字逐句補綴挑剔曲暢盡致可謂善解經文者矣

(附錄)小青龍湯原方



麻黃 去節三兩

芍藥 三兩

細辛 三兩

乾薑 三兩

甘草 三兩

桂枝 去皮三兩

五味子 半升

半夏 半升湯洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升若微利者去麻黃加薤花如雞子大熬令赤色古以麻字作炒字用若渴者去半夏加栝蘤根三兩若噎者逆哕去麻黃加附子一枚炮若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

按薤花今人罕用修園謂可以茯苓代之

（附錄）更定小青龍湯分量

麻黃 二錢

生杭芍 三錢

乾薑 一錢

甘草 錢半

桂枝尖 二錢

清半夏 二錢

五味子 錢半

細辛 一錢

此後世方書所載小青龍湯分量而愚略爲加減也喘者原去麻黃加杏仁愚於喘證之甚實者又恒加杏仁三錢而仍用麻黃一錢則其效更捷若兼虛者麻黃斷不宜用傷寒論小青龍湯無加石膏之例而金匱有小青龍加石膏湯治肺脹欬而上氣煩躁而喘脈

浮者心下有水是以愚治外感痰喘之挾熱者遵金匱之例必酌加生石膏數錢其熱甚者又或用至兩餘

喻嘉言曰桂枝麻黃法無大小而青龍湯有大小者以桂枝麻黃之變化多而大青龍湯之變法不過於桂麻二湯內施其化裁或增或去或饒或減其中神化莫可端倪又立小青龍一法散邪之功兼乎滌飲取義山澤小龍養成頭角乘雷雨而翻江攪海直奔龍門之義用以代大青龍而擅江河行水之力立法誠大備也因經叔和編次漫無統紀昌於分編之際特以大青龍爲綱於中麻桂諸法悉統於青龍項下擬爲龍背龍腰龍腹然後以小青龍湯尾之或飛或潛可彌可伏用大用小曲暢無遺居然仲景通天手眼馭龍心法矣昔有善畫龍者舉筆凝思而青天忽生風雨吾不知仲景製方之時其爲龍乎其爲仲景乎必有倏然雷雨滿盈大青龍湯倏然密雲不雨桂枝二越婢一湯倏然波浪奔騰小青龍湯以應其生心

之化裁者神哉青龍等方即擬爲九天龍經可也

又曰婁東胡貞臣先生昌所謂賢士大夫也夙昔痰飲爲恙夏日地氣上升痰即內動設小有外惑膈間痰即不行兩三日瘥後當膈尙結小瘥無醫不詢無方不考乃至夢寐懇

求大士治療因而聞疾思苦深入三摩地位薦分治病手眼今且仁智兼成矣昌昔謂膀胱之氣流行地氣不升則天氣常朗其偶受外感則仲景之小青龍一方與大士水月光中大圓鏡智無以異也蓋無形之感挾有形之痰互爲膠漆其當胸窟宅適在太陽經位惟於麻桂方中倍加五味半夏以滌飲而收陰加乾薑細辛以散結而分解合而用之令藥力適在痰飲綰結之處攻擊片時則無形之感從肌膚出有形之痰從水道出頃刻分解無餘而膈胸空曠不復叢生小瘥矣若泥麻桂甘溫減去不用則不成其爲龍矣將恃何物爲翻波鼓浪之具乎

寒溫中皆有痰喘之證其劇者甚爲危險醫者自出私智治之皆不能效惟治以小青龍湯或治以小青龍加石膏湯則可隨手奏效然寒溫之證兼喘者甚多而有有痰無痰與虛實輕重之分又不必定用小青龍湯也今將其證分列數條於左審證施治庶幾不誤一氣逆迫促喘且呻或兼肩息者宜小青龍湯去麻黃加杏仁熟者加生石膏

一喘狀如前而脈象無力或兼數者宜小青龍湯去麻黃加杏仁再加生石膏人參

一喘不至呻亦不肩息惟吸難呼易苦上氣其脈虛而無力或兼數者宜拙擬清燥湯

在後

一喘不甚劇呼吸無聲其脈實而至數不數者宜小青龍湯去麻黃加杏仁生石膏若脈更滑數者宜再加知母

一喘不甚劇脈洪滑而浮舌苔白厚胸中煩熱者宜用拙擬寒解湯在後汗之

一喘而發熱脈象確有實熱至數兼數重按無力者宜拙擬白虎加人參以山藥代粳米

湯在第六卷更以生地代知母加茅根作引

一喘而結胸者宜用傷寒論中諸陷胸湯丸或拙擬盪胸湯在第七卷以開其結其喘自愈

右所列喘證共七種合之後餽水石膏飲所主之喘證外感喘證之治法亦略備矣

至於麻黃湯證多有兼微喘者此爲業醫者所共知不必列於數條中也

小青龍湯爲治外感痰喘之神方其人或素有他證於小青龍湯不宜而至必須用小青龍湯之時亦不可有所顧忌徐靈胎曰松江王孝賢夫人素有血證時發時止發則微嗽又因感冒變成痰喘不能着枕日夜俯几而坐竟不能支持矣是時有常州名醫法丹書調治不效延余至余曰此小青龍湯證也法曰我固知之但體弱而素有血證麻桂諸方可用乎余曰急則治標若更喘數日殆矣且治其新病愈後再治其本病可也法曰誠然

病家焉能知之如用麻桂而本病復發則不咎病本無治而恨用麻桂誤之矣我乃行道之人不能任其咎君不以醫名我不與聞君獨任之可也余曰然服之有害我自當之但求先生不阻之耳遂與服飲畢而氣平終夕得安然後以消痰潤肺養陰開胃之方以次調之體乃復舊

按有血證者最忌桂枝不甚忌麻黃用此方時宜稍爲變通去桂枝留麻黃再加生石膏服之亦可愈病且妥善無他虞

又愚用小青龍湯凡遇脈虛者必預購補藥以備不時之需曾治一叟年六十三於仲冬得傷寒證痰喘甚劇其脈浮而弱不任循按問其平素言有勞病冬日恒發喘嗽愚再三躊躇勉強治以小青龍湯去麻黃加杏仁生石膏爲其脈弱俾預購補藥數種備用服藥喘稍愈再診其脈微弱益甚愚遂用龍骨牡蠣皆不用煨野台參生杭芍山萸肉去淨核爲方皆所素購也煎湯甫成此時病人呼吸俱微自覺氣息不續急將藥飲下氣息遂可接續愚將旋里囑再服藥數劑以善其後隔三日復來迎愚言病又反覆愚至見其喘促異常其脈尺部無根寸部有熱急用酸石榴一個連皮搗爛煮湯調白沙糖多半兩服之喘愈大

半又用所服原方去黃肉仍加酸石榴一個與藥同煎好再兌生梨自然汁半茶鍾服之喘遂大愈蓋石榴與黃肉同係酸斂之品而一則性溫一則性涼此時脈象有火故以酸石榴易黃肉而又加生梨汁之甘寒所以服之能效也

又門人高如璧曾治一外感痰喘其脈甚虛如璧投以小青龍湯去麻黃加杏仁又加野台參五錢生石膏八錢一劑而喘定繼用拙擬從龍湯在後亦加參與石膏病若失按如此調方以治外感之痰喘兼虛者誠爲穩善較愚之用補藥於小青龍湯後者可謂青出於藍矣

又長子蔭潮曾治一外感痰喘逆甚劇脈甚虛數諸醫因喘劇脈虛數皆辭不治蔭潮投以小青龍湯去麻黃加杏仁又加人參生石膏各一兩一劑病愈大半繼投以從龍湯去半夏加人參生石膏兩劑全愈

小青龍湯治外感挾水氣凡證由於外感痰飲者用之皆有捷效以痰飲即水之所結也一媼年六十餘得溫病三四日胸膈煩滿甚覺短氣其脈滑而有力投以小青龍湯加生石膏一兩胸次豁然仍覺表裏發熱繼投以大劑白虎加人參湯方中生石膏用三兩煎

湯一大碗分三次溫飲下盡劑而愈

外感之證皆忌用五味而兼痰嗽者尤忌之以其酸斂之力甚大能將外感之邪錮閉肺中而終身成勞嗽也惟與乾薑並用濟之以至辛之味則分毫無碍按五行之理辛可勝酸內經有明文也徐氏本草百種註中亦論之甚詳

肺具闢闢之力其闢闢之力適均且機關靈動活潑則呼吸自順陳修園曰乾薑以司肺之闢五味以司肺之闢細辛以發動其闢闢活動之機小青龍湯中當以此三味爲主故他藥皆可加減此三味則缺一不可可按五味能闢乾薑能闢其理易明至細辛能發動其闢闢之機其理甚遠蓋細辛味辛而細嚼之有酸收之意本經謂主欬逆上氣是此一藥不但味辛能闢而又能闢也其所以能發動闢闢之機者誠在於斯

細辛有服不過錢之說是言單服此一味也若入湯劑有他藥渣相混即用一錢不過有半錢之力若再少用即不能成功矣故用小青龍湯者細辛必以一錢爲度

麻黃能瀉肺氣以定喘桂枝能降肺氣以定喘外感痰喘多有兼氣虛者故不敢用麻黃瀉肺而易以杏仁助桂枝以降肺由是觀之若其氣分不虛而證又甚實不去麻黃亦可

或加杏仁減麻黃之半亦可況金匱小青龍加石膏湯治肺脹作喘原不去麻黃亦不加杏仁蓋加石膏即可以不去麻黃爲有麻黃所以不用杏仁若遇其氣分甚虛者雖加石膏亦宜以杏仁代麻黃而又加參也

愚用小青龍治外感痰喘屢次皆效然必加生石膏或七八錢或至兩餘若畏石膏不敢多用即無效驗堂姊丈褚樾濃體豐氣虛素多痰飲薄受外感即大喘不止醫治無效旬日喘始漸愈偶與愚言及若甚恐懼愚曰此甚易治顧用方何如耳金匱小青龍加石膏湯爲治外感痰喘之神方輔以拙擬從龍湯則其功愈顯若後再喘時先服小青龍加石膏湯若一劑喘定繼服從龍湯一劑其喘必不反覆若一劑喘未定小青龍加石膏湯可服至兩三劑若猶未全愈繼服從龍湯一兩劑必能全愈若服小青龍加石膏湯喘止旋反覆再服不效者繼服從龍湯一兩劑必效遂錄兩方贈之樾濃甚欣喜如獲異珍後用小青龍湯時畏石膏不敢多加雖效實無捷效偶因外感較重喘劇連服小青龍湯兩劑每劑加生石膏三錢喘不止而轉增煩躁遂放胆加生石膏一兩一劑喘止而煩躁亦愈由斯觀之即脈與證皆無熱象者亦宜加生石膏數錢以解麻桂薑辛之熱也



嘗視傷寒之方不但小青龍湯宜加石膏而他方亦多有宜加涼藥者仲景爲醫中之聖所著傷寒論一書弘博淵深開後人無限法門原不可輕加擬議特是天地之氣運數十年而一變仲景先成傷寒論小青龍湯一方加法甚多而獨不加石膏蓋其時無可加石膏之證也後著金匱則小青龍湯加石膏矣其時有其證可知相隔應不甚遠氣運即有變遷况自漢季至今一千六百餘年必執定古人之方以治今人之病不知少有變通是亦不善用古方也况傷寒論前原散佚經王叔和編次而成其中能保無舛訛乎是以愚於傷寒論一書其可信者尊之如本經內經間有不敢信者不得不存爲疑案以待質高明也

即如太陽一篇第二十五節云服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法按此證有過汗亡陰之象

徐氏洄溪醫案言過汗亡陰亡陽之分論之甚詳

其脈之洪大乃陽偏盛也桂枝之辛溫猶可用乎

第四十五節云太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之按此證麻黃湯主之謂用麻黃湯於未衄之前當發其汗時也然服麻黃湯後至於發煩目瞑劇

者且衄則其先早有伏熱可知設用麻黃湯時去桂枝勿使動其血分再加知母以清其伏熱其人不發煩目瞑血即可以不衄縱衄時不亦輕乎且今日寒溫諸證恆有因衄血過劇而憤事者又不可執定衄後即解也曾治一室女得溫病七八日間衄血甚多衄後身益熱且怔忡脈甚虛數投以大劑白虎加人參湯生石膏重用三兩煎湯一大碗分三次溫飲下熱遂退隔半日復衄血病家懼甚診其脈甚平和曰無須用藥即愈矣果須臾而愈此證若於初次衄後不急用白虎加人參湯清熱兼補其虛其身熱脈數心復怔忡之況狀猶堪再衄乎

第五十四節云傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜以桂枝湯按此謂用桂枝湯於未衄之前即可以不衄也徐靈胎曰外感風熱藥中誤用桂枝即可吐血衄血此誠確當之論曾治一媼年近六旬感冒風寒投以發表之劑中有桂枝一服而愈後數月又得感冒證兼有心中積熱自服原方竟至吐血由斯觀之此證既血熱有將衄之勢桂枝湯亦似難用縱有表證宜解擬用麻黃湯去桂枝加知母芍藥方爲穩妥

諸如此類竊疑非仲景原文即係仲景原文而當時人猶近古稟質渾穆雖經外感鏢耗其陰分不易虧損即偶有所損而其根柢仍固故治之者率可但治其外感不必多有所顧忌今人稟賦不及古人而人事又多遭損或吸烟或耽酒或縱慾及一切勞心勞力過度之事皆足傷人陰分故甫經邪熱鏢耗其陰分即有莫支之勢治之者宜時時顧其陰分無論或發表或和解或降下見有熱象可徵者即宜加涼潤之藥佐之若知母生石膏芍藥之類惟甘寒黏泥雖能滋陰而能錮閉外邪者不宜用也

### 從龍湯

治外感痰喘服小青龍湯病未全愈或愈而復發者繼服此湯

龍

骨不用煨  
壹兩搗

牡

蠣不用煨  
壹兩搗

生杭芍五錢

清半夏四錢

蘇

子

炒搗  
四錢

牛蒡子

炒搗  
三錢

熱者酌加生石膏數錢或至一兩

從來愚治外感痰喘遵傷寒論小青龍湯加減法去麻黃加杏仁熱者更加生石膏莫不隨手而愈然間有愈而復發再服原方不效者自擬得此湯後凡遇此等證服小青龍湯一兩劑即愈者繼服從龍湯一劑必不再發未全愈者服從龍湯一劑或兩劑必然全愈名曰從龍湯者爲其最宜用於小青龍湯後也

或疑方中重用龍骨牡蠣收澀太過以治外感之證雖當發表之餘仍恐餘邪未盡被此收澀之藥固閉於中縱一時強制不喘恐病根益深異日更有意外之變答曰若是以品龍骨牡蠣淺之乎視龍骨牡蠣者也斯可徵之以前哲之說

陳修園曰痰水也隨火而上升龍屬陽而潛於海能引逆上之火泛濫之水下歸其宅若與牡蠣同用爲治痰之神品今人止知其性澀以收脫何其淺也

徐靈胎曰龍得天地純陽之氣以生藏時多見時少其性雖動而能靜故其骨最黏澀能收斂正氣凡心神耗散腸胃滑脫之疾皆能已之又曰陽之純者乃天地之正氣故在人亦但斂正氣而不斂邪氣所以仲景於傷寒邪氣未盡者亦恒與牡蠣同用後之醫者於此義蓋未之審也又曰人身之神屬陽然非若氣血之有形質可補瀉也故治神爲最難龍者秉天地之元陽出入而變化不測乃天地之神也以神治神則氣類相感更佐以寒熱溫涼補瀉之法雖無形之病不難治矣又曰天地之陽氣有二一爲元陽之陽一爲陰陽之陽陰陽之陽分於太極既判之時以日月爲升降而水火則其用也與陰爲對待而不併於陰此天地並立之義也元陽之陽存於太極未判之時以寒暑爲起伏而雷雨則

其用也與陰爲附麗而不雜於陰此天包地之義也龍者正天地元陽之氣所生藏於水而不離乎水者也故春分陽氣上並泉冷龍用事而能飛秋分陽氣下並泉溫龍退蟄而能潛人身五臟屬陰而腎尤爲陰中之至陰故人之元陽藏焉是腎爲藏水之臟而亦爲藏火之臟也所以陰分之火動而不藏者亦用龍骨蓋借其氣以藏之必能自還其宅也按此論與前論皆妙甚果能細參其理則無疑於拙擬之從龍湯矣

邑鄭仁村年五十許感冒風寒痰喘甚劇服表散清火理痰之藥皆不效留連二十餘日漸近垂危其甥劉振緒愚外祖家近族表弟也年十四從愚讀書甚慧與言醫學頗能記憶聞其舅病革往省之既至則衣冠竟屬纊矣振緒用葶四錢生者布包大棗五枚揀開湯加五味

子二錢煎湯灌之豁然頓醒繼服從龍湯一劑全愈蓋此證乃頑痰鬱塞肺之竅絡非葶蘆大棗湯不能瀉之且喘久則元氣必虛加五味子二錢以收斂元氣並可藉葶蘆下行之力以納氣歸腎也以十四歲童子而能如此調方豈非有神助歟爲其事特異故附記於此且以知拙擬從龍湯固宜於小青龍湯後而服過發表之藥者臨時制宜皆可酌而用之不必盡在小青龍湯後也

縮水石膏飲 治胸中先有蘊熱又受外感胸中煩悶異常喘息迫促其脈浮洪有力按之未實舌苔白而未黃者

生石膏

札細二兩

甘草

三錢

麻黃

二錢

右藥三味用蒸汽水煎兩三沸取清湯一大碗分六次溫服下前三次一點鐘服一次後三次一點半鐘服一次病愈則停服不必盡劑下焦覺涼者亦宜停服僻處若無汽水可用甘瀾水代之

作甘瀾水法用大盆盛水以杓揚之揚久水面起有若干水泡旁有人執杓逐取之即甘瀾水

若以治溫病中似此證者不宜用麻黃宜用西藥阿斯必林一瓦融化於湯中以代之若僻處藥房無阿斯必林又可代以薄荷葉二錢

奉天車站經理礦務錢慕韓愚之同鄉也其婦人於仲冬得傷寒證四五日間喘不能臥胸中煩悶異常頻頻呼喚欲自開其胸診其脈浮洪而長重按未實舌苔白厚知其證雖入陽明而太陽猶未罷也

胸中屬太陽

此時欲以小青龍湯治喘則失於熱欲以白虎湯治其煩

熱又遺却太陽之病而喘不能愈躊躇再三爲擬此方取汽水輕浮之力能引石膏上升以解胸中之煩熱甘草甘緩之性能逗留石膏不使下趨以專其上行之力又少佐以麻黃解散太陽之餘邪兼藉以瀉肺定喘而胸中滿悶可除也湯成後俾徐徐分六次服之因病在上焦若頓服恐藥力下趨則藥過病所而病轉不愈也服至三次胸間微汗病頓見愈服至盡劑病愈十之八九再診其脈關前猶似浮洪喘息已平而從前兼有欬嗽未愈繼用玄參一兩杏仁皮去二錢薤仁牛蒡子各三錢兩劑全愈

### 葛根黃芩黃連湯解

傷寒論曰太陽病桂枝證反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之

唐容川曰此節提出桂枝證以別於上節麻黃證之太陽病也上二節是傷寒以見此一節是傷風風在肌肉陽明所司之界本能翕翕發熱若誤下之則熱邪內陷爲協熱下利與上節之必自利者不同何以知其與上節寒利不同哉蓋寒脈不數今以其脈數而欬至名之爲促所以促者因熱內陷而表未解故邪欲出而不得出是以促急也熱氣逆於

肺則喘熱氣蒸於肌腠則汗出此太陽陽明協熱下利之證故用葛根黃芩黃連湯治之陸九芝曰溫熱之與傷寒所異者傷寒惡寒溫熱不惡寒耳惡寒爲太陽主證不惡寒爲陽明主證仲景於此分之最嚴惡寒而無汗用麻黃惡寒而有汗用桂枝不惡寒而有汗且惡熱者用葛根陽明之葛根即太陽之桂枝也所以達表也葛根黃芩黃連湯中之芩連即桂枝湯中之芍藥也所以安裏也桂枝協麻黃治惡寒之傷寒爲根協芩連治不惡寒之溫熱其方爲傷寒溫熱之分途任後人審其病之爲寒爲熱而分用之尤重在芩連之苦不獨可降可瀉且合苦以堅之之義堅毛竅可以止汗堅腸胃可之止利所以葛根黃芩黃連湯又有下利不止之治一方面而表裏兼清此則藥借病用本不專爲下利設也乃後人視此方若舍下利一證外更無他用者何也

按用此方爲陽明溫熱發表之藥可爲特識然葛根發表之力甚微若遇證之無汗者擬加薄荷蟬退或更加連翹方能得清涼解熱之汗試觀葛根湯治項背几几強無汗惡風者必佐以麻桂可知也

或問薄荷蟬退之類既善解陽明經無汗之溫熱何以傷寒論方中皆不用答曰仲景用



藥多遵本經薄荷本經不載別錄亦不載當仲景時猶未列於藥品可知蚱蟬雖載於本經然古人止知用蟬不知用蛻較之蟬退以皮達皮之力必遠不如故仲景亦不用至連翹古惟知用根即麻黃連軹赤小豆湯中之連軹其發表之力亦必不如連翹故身發黃證仲景用之以宣通內熱而非用之以發表也

（附錄）葛根黃芩黃連湯原方

葛 根半斤

甘 草炙二兩

黃 芩三兩

黃 連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去滓分溫再服  
（附錄）後世用葛根黃芩連湯分量

葛 根四錢

甘 草炙壹兩

黃 芩壹錢伍分

黃 連壹錢伍分

不下利者去黃連加知母三錢無汗者加薄荷葉蟬退各錢半

小柴胡湯解

小柴胡湯本爲少陽之方而太陽陽明厥陰篇皆用之誠以少陽介於太陽陽明之間又與厥陰臟腑相連故三經中亦皆有小柴胡證也

太陽篇曰太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯陳修園註曰十日已去爲十一日正直少陰重主氣之期此言太少陰陽之氣表裏相通而太陽又得少陰之樞以爲出入也

又曰傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小柴胡湯主之陳修園註曰太陽之氣不能從胸出入逆於胸脇之間內干動於臟氣當藉少陽之樞轉而外出傷寒五六日經盡一週氣值厥陰可藉其中見之少陽而樞轉也

唐容川註曰內經云少陽爲樞蓋實有樞之境地可指足少陽胆經胆附於肝人皆知之至手少陽三焦經宋元以來皆不知爲何物致西人譏中國三焦之說爲妄談且謂人身有連網所飲之水由胃散出緣連網而下通膀胱此爲人身行水之道中書並未言及而不知內經早言之特不名爲連網而名爲三焦耳內經靈蘭秘典曰三焦者決瀆之官水道出焉此水道即西人所謂行水之道是三焦即連網也然西人知有連網而不知連網生於何處且止知其能行水至其微妙處西人仍不知按焦字古本作黠從采有層折可

辨也從韋以其膜象韋皮也從焦有縐紋如火灼皮也西人以連網形容之古聖只一鵝  
宇已如繪其形其根起於腎中腎系貫脊通髓名爲命門由命門生出膜油上生脇下兩  
大板油爲足少陽經之都會又生出臍下膜油中有細竅通於膀胱膀胱之後大腸之前  
膜中一大夾室女子名血室男子名精室道家名丹田乃氣血交會化生精氣孕育之所  
又有衝任二脈導血而下以入此導氣而上出於胸膜凡熱入血室衝氣上逆皆責於此  
是爲下焦最重之所從臍上至胸前鳩尾環肋骨至腰脊是爲中焦其膜根於腎系而發  
出如網與小腸胃腕相連有細竅通腸胃所謂秘別糟粕蒸津液也此膜上有脾居之脾  
氣發生膏油凡有膜網處其上皆生膜油凡化水穀皆是膏油膏油發力以薰吸之所謂  
脾主化食利水者如此再上生心下膈膜由膈膜透過上生心肺相連之系其系之近心  
處爲心包絡與三焦爲臟腑之配由內膜透出筋骨之外是生肥肉肥肉內瘦肉外一層  
網膜有紋理爲營衛外出之路名曰腠理乃三焦之表也邪在腠理出與陽爭則寒入與  
陰爭則熱故往來寒熱胸脇是膈膜連接之處邪在膈膜故胸脇苦滿足少陽胆火遊行  
三焦內通包絡火鬱不達故默默凡人飲水俱從胃散於膈膜下走連網以入膀胱凡人

食物化爲汁液從腸中出走網油以達各臟邪在膜油之中水不下行則不欲飲食不消化則不欲食心煩者三焦之相火內合心包也喜嘔者三焦爲行水之府水不下行故反嘔也或但合心火爲胸中煩而水不上逆則不嘔或三焦之火能消水則渴或肝膈中之氣迫湊於腹內網油之中則腹中痛或邪結於脇下兩大板油之中則脇下痞滿或三焦中火弱水盛水氣逆於心下膈膜之間而心下悸或三焦之府不熱則不消渴而邪在三焦之府居腠理之間則身有微熱或從膈膜中上肺致肺中痰火上衝咽喉則欬總之是少陽三焦膜中之水火鬱而爲病也統以小柴胡湯散火降水主之各隨其證之所見而加減之無不確切

又曰血弱氣衰腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之陳修園曰此言太陽之氣結於脇下而傷太陰陽明之氣亦當藉少陽之樞而轉出也

又曰傷寒四五日身熱惡風脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之唐容川註曰此證全與上節指九十  
七節相同只是未經誤下脈亦不浮弱是脾之膏油未傷而邪在膜網仍當清疏

理其膜網故用小柴胡湯

又曰傷寒陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之唐容川註曰陽脈屬氣分衛氣從膜網而出以達皮膚膜網不通利則衛氣難於外出故脈應之而澀陰脈屬血分血藏膏油中血滯油寒氣不得與血流通則血行氣阻而作痛所謂痛則不通也故先與小建中湯以溫其膏油建中者指中焦而言中焦之膏油既溫則血不凝滯而膜中之氣自通而不痛矣若油既溫和痛仍不瘥者是膏油血分通利而膜網之微細管竅不通利故陽氣不得出也復與小柴胡湯疏通其膜網則陽氣通暢而愈又曰婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之唐容川註曰邪在表裏之間只能往來寒熱而不發作有時惟瘧證邪客風府或瘧母結於脇下膜油之中衛氣一日一周行至邪結之處欲出不得相爭爲寒熱所以發作有時也夫衛氣者發於膀胱水中達出血分血爲營氣爲衛此證熱入血室在下焦膜網之中其血必結阻其衛氣至血結之處相爭則發寒熱衛氣已過則寒熱止是以發作有時與瘧無異原文故使二字明言衛氣從膜中出血結在膜

中故使衛氣不得達也用柴胡透達膜膈而愈知熱入血室在膜中即知瘡亦在膜中矣又曰傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此爲陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脈雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解陳修園註曰此言陽微結似陰雖見裏證而究與少陰之純陰結有辨

又曰傷寒五六日嘔而發熱者柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而硬痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯唐容川註曰柴胡證是表之腠理間病腠理是赤肉外之膜油若從外膜而入內膜聚於膈則爲陷胸蓋胸膈乃內膜之大者爲上下之界故邪入於內多與正氣結於此間正氣不升飲食亦停於膈是爲有形之水飲邪氣內陷並心包之火阻於胸膈則爲有形之痰血血生於心火火行則血行火阻則血阻血與水交結則化爲痰是爲結胸實證當奪其實用大陷胸湯但滿而

不痛則無血與水無凝聚成痰之實證只水火無形之氣塞於胸膈和其水火之氣而痞自解不必攻下有形之物也柴胡湯是透膈膜而外達腠理陷胸湯是攻膈膜而下走大腸瀉心等湯則和膜膈以運行之皆主膈膜間病而有內外虛實之分故仲景連及言之陽明篇曰陽明病發潮熱大便溼小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主之唐容川註曰此潮熱是如瘧之發作有時以胸脇結滿衝陽之氣上至結處即相交而發熱其但熱不寒者以其爲少陽陽明也

又曰陽明病脇下硬滿不大便而嘔舌上白苔者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解也唐容川註曰凡病在三焦膜膈中則舌色必白現出三焦之本色故丹田有熱亦云舌白苔丹田是下焦之膜中也此上病是胸前正當胃中之水散走之路陽明之熱合於此間則水不得入於膜中而反嘔出是爲上焦不通必用柴胡以透達胸膜則上焦得水道下行是以津液得下胃中水不留逆則因而和平內膜之水道既通則外膜之氣道自暢故身濺然而汗出解也

又曰陽明中風脈弦浮大而短氣腹部滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥

一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之少差外不解過十日脈續浮者與小柴胡湯唐容川註曰此節是發明首章太陽陽明少陽陽明之義故提出脈弦爲少陽經之眼目提出脈浮爲太陽經之眼目此下先言少陽陽明謂少陽三焦膜中水不得利則氣不化而氣短三焦之膜油布於腹中故腹部滿脇下是板油所居心下是膈膜所在故結而作痛久按之氣不通則膜中之氣結甚矣此皆少陽三焦膜中病也而陽明經脈之熱又夾鼻作乾膜與油連膏油是陽明所司膏油被蒸周身困頓故嗜臥遂發出膏油被蒸之黃色膜中水不利則小便難有潮熱者發作如瘧應正氣至邪結處而熱與上條潮熱同例膜中實胃中虛膜中氣逆入胃則噦隨少陽經上耳則前後腫刺之經脈已愈而其外各證不解又見脈浮有欲出於表之情故與小柴胡湯使達於外也

少陽篇曰本太陽病不解轉入少陽者脇下硬滿乾嘔不食往來寒熱尙未吐下脈沉緊者與小柴胡湯唐容川註曰此節言三焦有膜膜上有膏邪從太陽肌肉入於膏油而內着脅下居板油之內則脇下痛滿膏油主消食故不能食邪從皮毛而入於膜是爲腠理居陰陽之界故往來寒熱膜縫內氣逆於上則爲乾嘔脈沉者邪已內陷之象脈緊者正



與邪爭尙欲外出之象故以柴胡湯清利疏達而膜中油中之邪仍達出而解此即少陽爲樞之義也

厥陰篇曰嘔而發熱者小柴胡湯主之陳修園註曰此厥陰病從少陽之樞轉而治之也發熱應是寒熱往來

手少陽是三焦經足少陽是胆經從前因不知三焦爲何物並胆經亦不能確爲指出致小柴胡湯所主之病皆不發明其理即知爲借少陽之樞轉而所以能樞轉之理終渺茫自容川悟出三焦一經則手少陽之經明足少陽之經亦因之能明而內經太陽主開陽明主闔少陽爲樞之理始顯本此以釋小柴胡湯所主之病觸處貫通無事煩言而解故編中特詳錄之其有賸義未盡發者復參以管見列數則於左學者果盡明其理於治傷寒一道思過半矣

小柴胡湯雖兼主手足少陽而實注重足少陽何以知之因少陽提綱中明言不可發汗也蓋手少陽爲水道所出而小便與汗皆與水道相通是汗解爲手少陽之出路足少陽之大都會爲脇下板油此油外膜上緊連膈膜凡小柴胡證必脇滿喜嘔是邪藏板油之

中欲藉少陽上升之氣緣膜透膈而出也小柴胡湯是因其病機而越之

少陽提綱既戒發汗矣而一百零二節

此節與一百四十九節前半同故未錄

與一百四十九節二百三十節皆

言汗解者因誤下後脇下所聚之邪兼散漫於三焦包絡仍投以小柴胡湯以和解宣通之而邪之散漫者遂由手少陽外達之經絡作汗而解而其留於脇下者亦與之同氣相求借徑於手少陽而汗解故於汗出上特加一却字言非發其汗而却由汗解此是宣通其少陽聽其自汗而非強發其汗也

其汗時必發熱蒸蒸而振者有戰而後汗之意也蓋少陽之病由汗解原非正路而其留於脇下之邪作汗解尤難乃至服小柴胡湯後本欲上透膈膜因下後氣虛不能由上透出而其散漫於手少陽者且又以同類相招遂於蓄極之時而開旁通之路此際幾有正氣不能勝邪之勢故汗之先必發熱而振動此小柴胡方中所以有人參之助也是以愚用此方時於氣分壯實者恆不用人參而於誤服降藥後及氣虛者則必用人參也

少陽經所居之部位介太陽陽明之間此指手少陽而言三焦所屬之腠理也而其傳經之次第乃在陽明之後此指足少陽而言胆經所屬之板油也板油與包脾之膜油相近

故從此可傳太陰小柴胡證多兼欬其欬者欬吐黏涎也乃太陰濕氣經少陽之熱鍊鑠而成是以愚驗此證常以吐黏涎爲的而方中之參草大棗亦所以補助脾經斷其傳太陰之路也

小柴胡證喜嘔者不必作嘔吐也但常常有欲嘔之意即爲喜嘔是以愚治傷寒遇有鬱惡心而微寒熱往來者即投以小柴胡湯一劑而愈此傷寒論所謂傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉見也

容川謂三焦外通於腠理其說甚確內經脹論曰三焦脹者氣滿皮膚中輕輕然而不堅是明言三焦與腠理相通也又容川欲徵明三焦即西人所謂連網而引徵於內經三焦者決瀆之官數語然內經可徵三焦即是連網者不獨此數語也靈樞勇論謂勇士者三焦理橫怯士者三焦理縱夫理既明明可辨其橫縱則其理之大且顯可知而一身之內理之大且顯者莫連網若也此又三焦即連網之明徵之

(附錄)小柴胡湯原方

柴胡八兩

黃芩三兩

人參三兩

甘草三兩

半夏半升洗

生薑三兩切

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蕢實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蕢根四兩若腹中痛去黃芩加芍藥三兩若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫覆取微汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

(附錄)後世用小柴胡湯分量

柴胡八錢

黃芩三錢

人參三錢

甘草三錢

清半夏四錢

生薑三錢切

大棗四枚擘

陳修園曰少陽介於兩陽之間須兼顧三經故藥不宜輕去滓再煎者因其方爲和解之劑再煎則藥性和合能使經氣相融不復往來出入也古聖不但用藥之妙其煎法俱有精義

按去滓再煎此中猶有他義蓋柴胡有升提之力兼有發表之力去滓重煎所以去其發

表之力也然恐煎久並升提之力亦減故用至八兩而其三分之一折爲今之八錢也唐容川曰柴胡之力能透胸前之膈而仲景用柴胡以治少陽其義尤精少陽者水中之陽發於三焦以行腠理寄居胆中以化水穀必三焦之膜網通暢肝胆之木火清和而水中之陽乃能由內達外柴胡莖中虛鬆有白瓢通氣象人身三焦之膜網膜網有紋理與肌膚筋骨相湊故名腠理少陽木火鬱於腠理而不達者則作寒熱惟柴胡能達之以其鬆虛象腠理能達陽氣且味清苦能清三焦之火與胆中之火其兼治太陽陽明者則是通三焦之路以達其氣乃借治非正治也又曰柴胡須用一莖直上色青葉四面生如竹葉而細開小黃花者乃爲真柴胡是仲景所用者至於軟柴胡紅柴胡銀柴胡皆不堪用

### 通變大柴胡湯

治傷寒溫病表證未罷大便已實者

柴胡三錢

薄荷三錢

知母四錢

大黃四錢

此方若治傷寒以防風易薄荷

傷寒論大柴胡湯治少陽經與陽明府同病之方也故方中用柴胡以解在經之邪大黃以下陽明在府之熱方中以此二藥爲主其餘諸藥可加可減不過參贊以成功也然其

方宜於傷寒而以治溫病與表證不在少陽者又必稍爲通變而後所投皆宜也

或問其表果係少陽證固宜用柴胡矣若非少陽證既加薄荷防風以散表邪何須再用柴胡乎答曰凡表證未罷遽用降藥下之恆出兩種病證一爲表邪乘虛入裡傷寒論所載下後胸滿心下痞硬下後結胸者是也一爲表邪乘虛入裏且下陷傷寒論所謂下之利不止者是也此方中用防風薄荷以散之所以防邪之內陷用柴胡以升之所以防邪之下陷也

一人年二十餘傷寒六七日頭疼惡寒心中發熱欬吐黏涎至暮尤寒熱交作兼眩暈心中之熱亦甚其脈浮弦重按有力大便五日未行投以此湯加生石膏六錢芒硝四錢下大便二次上半身微見汗諸病皆見輕惟心中猶覺發熱脈象不若從前之浮弦而重按仍有力擬投以白虎加人參湯恐當下後易作滑瀉遂以生山藥代粳米連服兩劑全愈加味越婢加半夏湯

治素患勞嗽因外感襲肺而勞嗽益甚或兼喘逆痰涎壅滯者

麻黃二錢

石

膏煨搗三錢

生山藥五錢

寸麥冬

帶心四錢

清半夏

三錢

牛蒡子

炒搗三錢

玄

參三錢

甘草

一錢五分

大

棗三枚擘開

生

薑三片

傷寒論有桂枝二越婢一湯治太陽病發熱惡寒熱多寒少金匱論有越婢湯治受風水腫有越婢加半夏湯治外感襲肺致肺中痰火壅滯脹而作喘今因其人素患勞嗽外感之邪與肺中蘊蓄之痰互相膠漆壅滯肺竅而勞嗽益甚故用越婢加半夏湯以祛外襲之邪而復加山藥玄參麥冬牛蒡子以治其勞嗽此內傷外感兼治之方也

一叟年近七旬素有勞嗽初冬宿病發動又兼受外感痰涎壅滯胸間幾不能息劇時昏不知人身軀後挺診其脈浮數無力爲製此湯一劑氣息通順將麻黃石膏減半又服數劑而愈

或問子嘗謂石膏宜生用不宜煨用以石膏寒涼之中原兼辛散煨之則辛散之力變爲收斂服之轉可增病乃他方中石膏皆用生者而此獨用煨者何也答曰此方所主之病外感甚輕原無大熱方中用麻黃以祛肺邪嫌其性熱故少加石膏佐之且更取煨者收斂之力能將肺中痰涎凝結成塊易於吐出此理從用煨石膏點豆腐者悟出試之果甚效驗後遇此等證無論痰涎如何壅盛如何杜塞投以此湯須臾藥力行後莫不將痰涎結成小塊連連吐出此皆煨石膏與麻黃並用之效也若以治寒溫大熱則斷不可煨若

更多用則更不可煨也

煨石膏用於此方且止三錢自無妨碍然愚後來志願欲全國藥房皆不備煨石膏後有用此方者若改用生石膏四錢更佳

### 溫病方

#### 清解湯

治溫病初得頭疼周身骨節痠疼肌膚壯熱背微惡寒無汗脈浮滑者

薄荷葉四錢

蟬

退去足三錢

生石膏

搗細六錢

甘

草

一錢五分

傷寒論曰太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病若發汗已身灼熱者名曰風溫風溫爲病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡息必𦵿言語難出此仲景論溫病之提綱也乃提綱詳矣而後未明言治溫病之方及反覆詳細觀之乃知傷寒論中原有治溫病方且亦明言治溫病方特涉獵觀之不知耳六十一節云發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之夫此證既汗後不解必是用辛熱之藥發不惡寒證之汗即溫病提綱中所謂若發汗也

提綱中所謂若發汗是用辛熱之藥強發溫病之汗

其汗出而喘無大熱者即溫病提綱中所謂若發汗已身灼熱及後所謂自汗出多眠睡息必𦵿也睡而息𦵿醒則喘矣此證既用辛熱之藥誤發於前仲景恐醫者見其自汗再誤認爲桂枝湯證故特戒之曰不可更行桂枝湯而宜治以麻杏甘石湯此節與溫病提綱遙遙相應合讀之則瞭如指掌



是麻杏甘石湯誠爲治溫病初得之的方矣而愚於發表藥不用麻黃而用薄荷蟬退者曾於葛根黃芩黃連湯解在後詳論之茲不再贅

今者論溫病之書甚夥而鄭衛紅紫適足亂真愚本內經仲景間附以管見知溫病大綱當分爲三端今逐端詳論臚列於左庶分途施治不至錯誤

一爲春溫其證因冬月薄受外感不至即病所受之邪伏於膜原之間阻寒脈絡不能宣通暗生內熱迨至春日陽生內蘊之熱原有萌動之機而復薄受外感與之相觸則陡然而發表裡俱熱內經所謂冬傷於寒春必溫病者是也宜治以拙擬涼解湯在後熱甚者拙擬寒解湯在後有汗者宜仲景葛根黃連黃芩湯或拙擬和解湯在後加生石膏若至發於暑月又名爲暑溫其熱尤甚初得即有脈洪長渴嗜涼水者宜投以大劑白虎湯或拙擬仙

露湯在第六卷

一爲風溫猶是外感之風寒也其時令已溫外感之氣已轉而爲溫故不名曰傷寒傷風而名風溫即傷寒論中所謂風溫之爲病者是也然其證有得之春初者有得之春暮者有得之夏秋者當隨時序之寒熱參以脈象而分別治之若當春初秋末時令在寒溫之

間初得時雖不惡寒脈但浮而無熱象者宜用拙擬清解湯加麻黃一二錢或用仲景大青龍湯若當暑熱之日其脈象浮而且洪者用拙擬涼解湯或寒解湯若有汗者用拙擬和解湯或酌加生石膏

一爲濕溫其證多得之溽暑陰雨連旬濕氣隨呼吸之氣傳入上焦窒塞胸中大氣因致營衛之氣不相貫通其肌表有似外感拘束而非外感也其舌苔白而滑膩微帶灰色當用解肌利便之藥俾濕氣由汗與小便而出如拙擬宣解湯

在後

是也仲景之豬苓湯去阿

膠加連翹亦可用至濕熱蓄久陽明府實有治以白虎湯加蒼朮者其方亦佳而愚則用白虎湯以滑石易知母又或不用粳米而以生薏米代之至於冬不藏精春必溫病內經雖有明文其證即寓於風溫春溫之中蓋內虛之人易受外感而陰虛蘊熱之人尤易受溫病故無論風溫春溫兼陰虛者當其發表清解降下之時皆宜佐以滋陰之品若生山藥生地黃玄參阿膠生雞子黃之類均可酌用或宜兼用補氣之品若白虎湯之加人參竹葉石膏湯之用人參誠以人參與涼潤之藥並用不但補氣實大能滋陰也

右所論溫病乃別其大綱及其初得治法至其證之詳悉與治法之隨證變通皆備於後

之方案中至於疫癘乃天地之疢氣流行傳染與溫病迥異詳於第七卷中

方中薄荷葉宜用其嫩綠者至其梗宜用於理氣藥中若以之發汗則力減半矣若其色不綠而蒼則其力尤減若果嫩綠之葉方中用三錢即可

薄荷氣味近於冰片最善透竅其力內至臟腑筋骨外至腠理皮毛皆能透達故能治溫病中之筋骨作疼者若謂其氣質清輕但能發皮膚之汗則淺之乎視薄荷矣

蟬退去足者去其前之兩大足也此足甚剛硬有開破之力若用之退目翳消瘡瘍帶此足更佳若用之發汗則宜去之蓋不欲其於發表中寓開破之力也

蟬退性微涼味淡原非辛散之品而能發汗者因其以皮達皮也此乃發汗中之妙藥有身弱不任發表者用之最佳且溫病恆有兼癰疹者蟬退尤善托癰疹外出也

石膏性微寒本經原有明文雖係石藥實爲平和之品且其質甚重六錢不過一大撮耳其涼力不過與知母三錢等而其清火之力則倍之因其涼而能散也嘗觀後世治溫之方至陽明府實之時始敢用石膏五六錢豈能知石膏者哉然必須生用方妥煨者用至一兩即足僨事此編例言中曾詳論之又此方所主之證或兼背微惡寒乃熱鬱於中不

能外達之徵非眞惡寒也白虎湯證中亦恆有如此者用石膏透達其熱則不惡寒矣或問外感中於太陽則惡寒中於陽明則不惡寒而發熱時至春夏氣候溫熱故外感之來不與寒水相感召而與燥金相感召直從身前陽明經絡襲入而爲溫病後世論溫病者多是此說而傷寒論溫病提綱冠之以太陽病者何也答曰溫病初得亦多在太陽時其轉陽明甚速耳曾治一人年二十餘當仲夏夜寢因夜涼蓋單衾凍醒發懶仍如此睡去須臾又凍醒晨起微覺惡寒至已時已覺表裡大熱兼喘促脈洪長而浮投以清解湯方中生石膏改用兩半又加牛蒡子搗炒三錢服後得汗而愈由斯觀之其初非中於太陽乎然不專在太陽也人之所以覺涼者由於衣衾之薄其氣候究非寒涼故其中於人不專在太陽而兼在陽明且當其時人多蘊內熱是以轉陽明甚速也然此所論者風溫耳若至冬受春發或夏發之溫恆有與太陽無涉者故傷寒論溫病提綱中特別之曰風溫之爲病明其異於冬傷於寒春必病溫之溫病也又杏仁與牛蒡子皆能降肺定喘而杏仁性溫牛蒡子性涼傷寒喘證皆用杏仁而溫病不宜用溫藥故以牛蒡子代之

涼解湯

治溫病表裡俱覺發熱脈洪而兼浮者

薄荷葉 三錢

蟬 退 去足十二錢

生石膏 搗細一兩

甘草 一錢五分

春溫之證多有一發而表裏俱熱者至暑溫尤甚已詳論之於前矣而風溫證兩三日間亦多見有此證脈者此湯皆能治之得汗即愈

西人治外感習用阿斯必林

第一卷參麥湯第四卷曲直揚下皆論及此藥

法用阿斯必林一瓦和乳糖

可代以白蔗糖

服之得汗

即愈愚屢次試之其發汗之力甚猛外感可汗解者用之發汗可愈若此涼解湯與前清解湯皆可以此藥代之以其涼而能散也若後之寒解湯即不可以此藥代之蓋其發汗之力有餘而清熱之力仍有不足也

寒解湯

治周身壯熱心中熱而且渴舌上苔白欲黃其脈洪滑或頭猶覺疼周身猶有

拘束之意者

生石膏 搗細一兩

知母 八錢

連翹 一錢五分

蟬 退 去足十二錢五分

或問此湯爲發表之劑而重用石膏知母微用連翹蟬退何以能得汗答曰用此方者特恐其診脈不真審證不確耳果如方下所註脈證服之覆杯可汗勿庸慮此方之不效也蓋脈洪滑而渴陽明府熱已實原是白虎湯證特因頭或微疼外表猶似拘束是猶有一

分太陽流連未去故方中用石膏知母以清胃府之熱而復少用連翹蟬退之善達表者引胃中化而欲散之熱仍還太陽作汗而解斯乃調劑陰陽聽其自汗非強發其汗也况石膏性涼

本經謂其微寒即涼也

味微辛有實熱者單服之即能汗乎曾治一少年孟夏長途勞役

得溫病醫治半月不效後愚診視其兩目清白竟無所見兩手循衣摸床亂動不休讖語不省人事其大便從前滑瀉此時雖不滑瀉每日仍溏便一兩次脈浮數右寸之浮尤甚兩尺按之即無因此證目清白無見者腎陰將竭也手循衣摸牀者肝風已動也病勢之危已至極點幸喜脈浮爲病還太陽右寸浮尤甚爲將汗之勢其所以將汗而不汗者人身之有汗如天地之有雨天地陰陽和而後雨人身亦陰陽和而後汗此證尺脈甚弱陽升而陰不能應汗何由作當用大潤之劑峻補真陰濟陰以應其陽必能自汗遂用熟地玄參阿膠枸杞之類約重六七兩煎湯一大碗徐徐溫飲下一日連進二劑即日大汗而愈審是則發汗原無定法當視其陰陽所虛之處而調補之或因其病機而利道之皆能出汗非必發汗之藥始能汗也按寒溫之證原忌用黏泥滋陰甘寒清火以其能留邪也而用以爲發汗之助則轉能遂邪外出是藥在人用耳

一人年四十餘爲風寒所束不得汗胸中煩熱又兼喘促醫者治以蘇子降氣湯兼散風清火之品數劑病益進診其脈洪滑而浮投以寒解湯須臾上半身即出汗又須臾覺藥力下行至下焦及腿亦皆出汗病若失

一人年三十許得溫證延醫治不效遷延十餘日愚診視之脈雖洪而有力仍兼浮象問其頭疼乎曰然渴欲飲凉水乎曰有時亦飲凉水然不至燥渴耳知其爲日雖多而陽明之熱猶未甚實太陽之表猶未盡罷也投以寒解湯須臾汗出而愈

一人年三十餘於冬令感冒風寒周身惡寒無汗胸間煩躁原是大青龍湯證醫者投以麻黃湯服後汗無分毫而煩躁益甚幾至瘋狂診其脈洪滑異常兩寸皆浮而右寸尤甚投以寒解湯覆杯之頃汗出如洗而愈審是則寒解湯不但宜於溫病傷寒現此脈者投之亦必效也

一隻年七旬素有勞疾薄受外感即發喘逆投以小青龍湯去麻黃加杏仁生石膏輒愈上元節後因外感甚重舊病復發五六日間熱入陽明之府脈象弦長浮數按之有力而無洪滑之象此外感兼內傷之脈投以寒解湯加潞參三錢一劑汗出而喘愈再診其脈餘熱猶熾繼

投以白虎加人參以山藥代粳米湯

此條亦係傷寒

第一大劑分三次溫飲下盡劑而愈

一姪婦傷寒兩三日脈洪滑異常精神昏憤間作讖語舌苔白而其厚爲開寒解湯方有一醫者在座問方中之意何居愚曰欲汗解耳曰此方能汗解乎愚曰此方遇此證服之自能出汗若泛作汗解之藥服之不能汗也飲下須臾汗出而愈醫者訝爲奇異

門人高如璧曾治一媼年近七旬於春初得傷寒證三四日間煩熱異常又兼白痢晝夜滯下無度其脈洪滑兼浮如璧投以寒解湯加生杭芍三錢一劑微汗而熱解痢亦遂愈按用涼藥發汗自古有之唐志曰袁州天慶觀主首道士王自正傷寒旬餘四肢乍冷乍熱頭重氣塞唇寒面青累日不能食勢已甚殆醫者診之曰脈極細虛是爲陰證必服桂枝湯乃可及醫者去後方將煎桂枝湯若有語之者曰何不服竹葉石膏湯四顧無人惟小童在側自正惑焉急邀醫者還告之曰或教我服竹葉石膏湯何如醫者曰竹葉石膏湯與桂枝湯寒燠如冰炭君之疾狀已危不可再爲藥誤方酬答間復聞人語如前自正心悚然醫者去後即買竹葉石膏湯煎之又聞所告如初於是斷然曰神明三次告我是賜我再生之路也湯成即服其半先時身體重千斤倏而輕清唇亦漸暖咽膈通暢遂悉



服之少頃汗出如洗徑就睡平旦脫然自正爲人素謹飭常茹素與人齋醮盡誠故爲神明所佑如此按此雖陽證狀與陰證無異然當時若問其小便必黃熱短澀且必畏見沸湯是其明證也醫者不知辨此竟欲以桂枝湯強發其汗危哉幸邀神佑得服竹葉石膏湯大汗而愈此即拙擬寒解湯所謂調其陰陽聽其自汗也又按桂枝湯亦非治陰證之藥乃治傷風有汗之藥然桂枝下咽陽盛則斃叔和之言誠千古不易之論故傷寒無汗者誤服桂枝湯猶大熱煩渴變爲白虎湯證況內蘊實熱者乎

又洪吉人曰昔一名醫成化年新野疫癘有鄰婦臥牀數日忽聞其家如羊嘶聲急往視之見數人用被覆其婦牀下置火一盆令其出汗其婦面赤聲啞氣息幾斷因叱之曰急放手不然命殆矣衆不從乃強拽被其婦躍起倚壁而喘口不能言曰飲凉水否領之與水一碗一飲而盡始能言又索水復與之飲畢汗出如雨其病遂愈或問其故曰彼發熱數日且不飲食腸中枯涸以火蒸之是速其死也何得有汗試觀以火燃空鼎雖赤而氣不升沃之以水則氣四達矣遇此等證不可不知

按此案與案後之論皆妙是知用之得當凉水亦大藥也其飲凉水而得汗之理亦即寒

解湯能發汗之理也

又吳又可曰裏證下後脈浮而微數身微熱神思或不爽此邪熱浮於肌表裏無壅滯也雖無汗宜白虎湯邪可從汗而解若下後脈空虛而數按之豁然如無者宜白虎加人參湯覆杯則汗解按白虎湯與白虎加人參湯皆非解表之藥而用之得當雖在下後猶可須臾得汗況在未下之前乎不但此也即承氣湯亦可爲汗解之藥亦視乎用之何如耳又洪吉人曰余嘗治熱病八九日用柴葛解之芩連清之硝黃下之俱不得汗昏憤擾亂撮空摸牀危在頃刻以大劑地黃湯必係誤去桂附者重加人參麥冬進之不一時通身大汗淋漓惡證悉退神思頓清按此條與愚用補陰之藥發汗相似所異者又加人參以助其氣分也石所論者皆發汗之理果能匯通參觀發汗之理無餘蘊矣

石膏阿斯必林湯

治同前證

生石膏 札細二兩

阿斯必林 壹瓦

右藥二味先用白蔗糖沖水送服阿斯必林再將石膏煎湯一大碗待周身正出汗時乘熱將石膏湯飲下三分之二以助阿斯必林發表之力迨至汗出之後過兩三點鐘猶覺

有餘熱者可仍將所餘石膏湯溫飲下若藥服完熱猶未盡者可但用生石膏煎湯或少加粳米煎湯徐徐溫飲之以熱全退淨爲度不用再服阿斯必林也

阿斯必林前曾再三論之矣然此藥有優劣其結晶堅實粒粒若針尖形者服一瓦必能出汗若無甚結晶多半似白粉末者其發表之力稍弱必服至一瓦強或至一瓦半方能出汗用者宜視其藥之優劣而斟酌適宜方好

又此湯不但可以代寒解湯並可以代涼解湯若以代涼解湯時石膏宜減半

和解湯 治溫病表裏俱熱時有汗出舌苔白脈浮滑者

連翹五錢 蟬退去足十二錢 生石膏搗細六錢 生杭芍五錢 甘草一錢

若脈浮滑而兼有洪象者生石膏當用一兩

宣解湯 治感冒久在太陽致熱蓄膀胱小便赤澀或因小便秘而大便滑瀉兼治濕溫

初得憎寒壯熱舌苔灰色滑膩者

滑石壹兩 甘草貳錢 連翹叁錢 蟬退去足十叁錢 生杭芍四錢

若滑瀉者甘草須加倍

一叟年六十五得風溫證六七日間周身悉腫腎囊腫大似西瓜屢次服藥無效旬日之外求爲診視脈洪滑微浮心中熱渴小便澀熱痰涎上泛微兼喘息舌苔白厚投以此湯加生石膏一兩周身微汗小便通利腫消其半猶覺熱渴遂將方中生石膏加倍服後又得微汗腫遂盡消諸病皆愈按此乃風溫之熱由太陽經入於膀胱之府阻塞水道而陽明胃府亦將實也由是觀之彼謂溫病入手經不入足經者何其膠哉

滋陰宣解湯

治溫病太陽未解漸入陽明其人胃陰素虧陽明府證未實已燥渴多飲飲水過多不能運化遂成滑瀉而燥渴益甚或喘或自汗或小便秘溫疹中多有類此證者尤屬危險之候用此湯亦宜其方即宣解湯加生山藥一兩甘草改用三錢

此乃胃府與膀胱同熱又兼虛熱之證也滑石性近石膏能清胃府之熱淡滲利竅能清膀胱之熱同甘草生天一之水又能清陰虛之熱一藥而三善備故以之爲君而重用山藥之大滋真陰大固元氣者以爲之佐使且山藥生用則汁漿稠黏同甘草之甘緩者能逗留滑石於胃中使之由胃輸脾由脾達肺水精四布循三焦而下通膀胱則煩熱除小便利而滑瀉止矣又兼用連翹蟬退之善達表者以解未罷之太陽使膀胱蓄熱不爲外

感所束則熱更易於消散且蟬之性飲而不食有小便無大便故其蛻又能利小便而止大便也愚自臨證以來遇此等證不知凡幾醫者率多束手而投以此湯無不愈者若用於溫疹兼此證者尤爲妥善以連翹蟬退實又表散溫疹之妙藥也

一媼年近七旬素患漫腫爲調治月餘腫雖就愈而身體未復忽於季春得溫病上焦煩熱病家自剖鮮地骨皮煮汁飲之稍愈又飲數次遂滑瀉不止而煩熱益甚其脈浮滑而數重診無力病家因病者年高又素有疾病加以上焦煩熱下焦滑瀉惴惴惟恐不愈而愚毅然以爲可治投以滋陰宣解湯一劑瀉止煩熱亦覺輕繼用拙擬白虎加人參以山藥代梗米湯在第六卷煎汁一大碗一次止溫飲一大口防其再滑瀉也盡劑而愈

一室女感冒風熱偏身疹癰煩渴滑瀉又兼喘促其脈浮數無力愚躊躇再四亦投以滋陰宣解湯兩劑諸病皆愈按服滋陰宣解湯皆不能出大汗且不宜出大汗爲其陰分虛也間有不出汗者病亦可愈

滋陰清燥湯 治同前證外表已解其人或滑瀉或兼喘息或兼欬頻吐痰涎確有外感實熱而脈象甚虛數者若前證服滋陰宣解湯後猶有餘熱者亦可繼服此湯其方

即滋陰宣解湯去連翹蟬退

一婦人受妊五月偶得傷寒三四日間胎忽滑下上焦燥渴喘而且呻痰涎壅盛頻頻欬吐延醫服藥病未去而轉添滑瀉晝夜十餘次醫者辭不治且謂危在旦夕其家人惶恐迎愚診視其脈似洪滑重診指下豁然兩尺尤甚本擬治以滋陰清燥湯爲小產纔四五日不敢遽用寒涼遂先用生山藥二兩酸石榴一個連皮搗爛同煎汁一大碗分三次溫飲下滑瀉見愈他病如故再診其脈洪滑之力較實因思此證雖虛確有外感實熱若不先解其實熱他病何以得愈時屆晚三點鐘病人自言每日此時潮熱又言精神困倦已極晝夜苦不得睡遂於斯日復投以滋陰清燥湯方中生山藥重用兩半煎汁一大碗徐徐溫飲下一次只飲藥一口誠以產後脈象又虛不欲寒涼侵下焦也斯夜遂得安睡湯與滑瀉皆愈喘與欬亦愈其半又將山藥滑石各減五錢加龍骨牡蠣皆不用各八錢一劑愈而一室女傷寒過兩旬矣而瘦弱支離精神昏憤過午發熱欬而且喘醫者辭不治診其脈數至七至微弱欲無因思此證若係久病至此不可爲矣然究係暴虛之證生機之根柢當無損勉強投以滋陰清燥湯將滑石減半又加玄參熟地黃各一兩野台參五錢煎湯

一大碗徐徐溫飲下飲完煎滓重飲俾藥力晝夜相繼兩日之間連服三劑滑石漸減至二錢其病竟愈按此證始終不去滑石者恐當傷寒之餘仍有餘邪未淨又恐補藥留邪故用滑石引之下行使有出路也又按凡煎藥若大劑必案多煎湯數杯徐徐服之救險證宜如此而救險證之陰分虧損者尤宜如此也

陸軍第二十八師師長汲海峰之太夫人年近七旬身體羸弱穀食不能消化惟飲牛乳或間飲米湯少許已二年臥牀不能起坐矣於戊午季秋受溫病時愚初至奉天自錦州邀愚診視脈甚細數按之微覺有力發熱欬嗽吐痰稠黏精神昏憤氣息奄奄投以滋陰清燥湯減滑石之半加玄參五錢一劑病愈強半又煎渣取清湯一茶鍾調入生雞子黃一枚服之全愈愈後身體轉覺勝於從前

奉天大東關旗人號崧宅者有孺子年四歲得溫病邪猶在表醫者不知爲之清解遽投以苦寒之劑服後滑瀉四五日不止上焦燥熱閉目而喘精神昏憤延爲診治病雖危險其脈尚有根柢知可挽回俾用滋陰清燥湯原方煎汁一大茶杯爲其幼小俾徐徐溫飲下盡劑而愈然下久亡陰餘有虛熱繼用生山藥玄參各一兩以清之兩劑熱盡除大抵

醫者遇此等證清其燥熱則滑瀉愈甚補其滑瀉其燥熱亦必愈甚惟此方用山藥以止滑瀉而山藥實能滋陰退熱滑石以清燥熱而滑石實能利水止瀉二藥之功用相得益彰又佐以芍藥之滋陰血利小便甘草之變陰陽和中宮亦爲清熱止瀉之要品彙集成方所以效驗異常愚用此方救人多矣即勢至垂危投之亦能奏效

滋陰固下湯

治前證服藥後外感之火已消而渴與瀉仍未全愈或因服開破之藥傷

其氣分致滑瀉不止其人或兼喘逆或兼欬嗽或自汗或心中怔忡者皆宜急服此湯

生山藥

兩半

懷熟地

兩半

野台參

八錢

滑石

五錢

生杭芍

五錢

甘草

二錢

酸石榴

一個連皮搗爛

右藥七味用水五鍾先煎酸石榴十餘沸去滓再入諸藥煎湯兩鍾分二次溫飲下若無

酸石榴可用牡蠣

研

一兩代之汗多者加山萸肉

去核

六錢

按寒溫諸證最忌誤用破氣之藥若心下或胸脇疼痛加乳香沒藥棟子丹參諸藥腹疼者加芍藥皆可止疼若因表不解束其鬱熱作疼者解表清熱其疼自止若誤服檳榔青皮鬱金枳殼諸破氣之品損其胸中大氣則風寒乘虛內陷變成結胸者多矣即使傳經



已深而腸胃未至大實可降下者則開破與寒涼並用亦易使大便滑瀉致變證百出愚屢見此等醫者誤人心甚惻怛故與服破氣藥而結胸者製蠱胸湯在第七卷以救其誤服破氣藥而滑瀉者製此湯以救其誤究之誤之輕者可救誤之重者實難挽回於垂危之際也志在活人者不可不知其所戒哉

猶龍湯 治胸中素蘊實熱又受外感內熱爲外感所束不能發洩時覺煩躁或喘或胸脅疼其脈洪滑而長者

連翹一兩

生石膏搗細六錢

蟬退去足土二錢

牛蒡子炒搗二錢

喘者倍牛蒡子胸中疼者加丹參沒藥各三錢脇下疼者加柴胡川楝子各三錢

按用連翹發汗必色青者方有力蓋此物嫩則青老則黃凡物之嫩者多具生發之氣故凡發汗所用之連翹必須青連翹

此方所主之證即傷寒論大青龍湯所主之證也然大青龍湯宜於傷寒此則宜於溫病至傷寒之病其胸中煩躁過甚者亦可用之以代大青龍故曰猶龍也

一婦年三十餘胸疼連脇心中發熱服開胸理氣清火之藥不效後愚診視其脈浮洪而

長知其上焦先有鬱熱又爲風寒所束則風寒與鬱熱相搏而作疹也治以此湯加沒藥川棟子各四錢一劑得汗而愈

一叟年過七旬素有勞病因冬令傷寒勞病復發喘而且欬兩三日間痰涎湧盛上焦煩熱診其脈洪長浮數投以此湯加玄參潞參各四錢一劑汗出而愈

門人劉子韞曾治一人年四十外感痰喘甚劇四五日間脈象洪滑舌苔白而微黃子韞投以此湯方中石膏用一兩連翹用三錢一劑周身得汗外感之熱已退而喘未全愈再診其脈平和如常微嫌無力遂用拙擬從龍湯後在去蘇子加潞參三錢一劑全愈愚聞之喜曰外感痰喘小青龍湯所主之證也拙擬猶龍湯原以代大青龍湯今並可代小青龍湯此愚之不及料也將方中藥味輕重略爲加減即能另建奇功以斯知方之運用在人慧心者自能變通也

按連翹原非發汗之藥即諸家本草亦未有謂其能發汗者惟其人蘊有內熱用至一兩必然出汗且其發汗之力緩而長爲其力之緩也不至爲汪洋之大汗爲其力之長也晚睡時服之可使通夜微覺解肌且能舒肝氣之鬱瀉肺氣之實若但目爲瘡家要藥猶未識連翹者也

# 裏中參西錄前二期合編第六卷

傷寒溫病同用方

仙露湯

治寒溫陽明證表裏俱熱心中熱嗜凉水而不至燥渴脈象洪滑而不至甚實

舌苔白厚或白而微黃或有時背微惡寒者

生石膏

搗細三兩

玄

參二兩

連

翹三錢

粳

米五錢

右四味用水五鍾煎至米熟其湯即成約可得清汁三鍾先溫服一鍾若服完一劑病猶在者可仍煎一劑服之如前使藥力晝夜相繼以病愈爲度然每次臨服藥必詳細問詢病人若腹中微覺涼或欲大便者即停藥勿服候兩三點鐘若仍發熱未大便者可少少與服之若已大便却非瀉瀉而熱猶在者亦可少少與服

傷寒論白虎湯爲陽明府病之藥而兼治陽明經病此湯爲陽明經病之藥而兼治陽明

府病爲其所主者責重於經故於白虎湯方中以玄參之甘寒

本經言苦寒細嚼之質甘而微苦古今藥或有不同

易知母

之苦寒又去甘草少加連翹欲其輕清之性善走經絡以解陽明在經之熱也

方中粳米不可誤用糯米

俗名漿米

粳米清和甘緩能逗留金石之藥於胃中使之由胃輸脾

由脾達肺藥力四布經絡貫通糯米質黏性熱大能固閉藥力留中不散若錯用之即能誤事一叟年七十有一因感冒風寒頭疼異常徹夜不寢其脈洪大有力表裏俱發熱喜食涼物大便三日未行舌有白苔甚厚知係傷寒之熱已入陽明之府因頭疼甚劇且舌苔猶白疑猶可汗解治以拙擬寒解湯

在五卷第

加薄荷葉一錢

頭疼如故亦未出汗脈益洪

實恍悟曰此非外感表證之頭疼乃陽明經府之熱相併上逆而衝頭部也爲製此湯分三次溫飲下頭疼愈強半夜間能安睡大便亦通復診之脈象餘火猶熾遂用仲景竹葉石膏湯生石膏仍用三兩煎汁一大碗分三次溫飲下盡劑而愈

按竹葉石膏湯原寒溫大熱退後滌餘熱復真陰之方故其方不列於六經而附載於六經之後其所以能退餘熱者不恃能用石膏而恃石膏與參並用蓋寒溫餘熱在大熱鑱涸之餘其中必兼有虛熱石膏得人參能使寒溫後之真陰頓復而餘熱自消此仲景製方之妙也又麥冬甘寒黏滯雖能爲滋陰之佐使實能留邪不散致成勞嗽而惟與石膏半夏並用則無忌誠以石膏能散邪半夏能化滯也或疑炙甘草湯

亦名復脈湯

中亦有麥冬却

無石膏半夏然有桂枝生薑之辛溫宣通者以駕馭之故亦不至留邪彼惟知以甘寒退

寒溫之餘熱者安能援以爲口實哉

又按上焦煩熱太甚者原非輕劑所能療而投以重劑又恐藥過病所而病轉不愈惟用重劑徐徐飲下乃爲合法曾治一人年四十餘素吸鴉片於仲冬得傷寒兩三日間煩躁無汗原是大青龍湯證因誤服桂枝湯煩躁益甚迎愚診視其脈關前洪滑兩尺無力爲開仙露湯因其尺弱囑其徐徐飲下一次只飲藥一口防其寒涼侵下焦也病家忽愚所囑竟頓飲之遂致滑瀉數次多帶冷沫上焦益覺煩躁鼻如烟薰面如火炙其關前脈大於前一倍又數至七至知其已成戴陽之證急用人參一兩煎好兌童便半茶鍾將藥碗置涼水盆中候冷頓飲之又急用玄參生地知母各一兩煎湯一大碗候用自服參後屢診其脈過半點鐘脈象漸漸收斂至數似又加數遂急將候用之藥燉熱徐徐飲下一次飲藥一口閱兩點鐘盡劑周身微汗而愈此因病家不聽所囑致有如此之失幸而救愈然亦險矣審是則凡藥宜作數次服者慎勿頓服也蓋愚自臨證以來無論內傷外感凡遇險證皆煎一大劑分多次服下此以小心行其放胆乃萬全之策非孤注之一擲也溫病中有當日得之即宜服仙露湯者一童子年十六暑日力田於烈日之中午飯後陡

覺發熱無汗煩渴引飲診其脈洪而長知其暑而兼溫也投以此湯未盡劑而愈按此證初得而胃府之熱已實彼謂溫病入手經不入足經者何夢夢也

世醫以傷寒論有白虎湯方以石膏爲君遂相傳石膏性猛如虎而不敢輕用甚或終身不敢一用即用者亦多將石膏煨如石灰且只用二三錢吁如此以用石膏則石膏果何益乎嘗考傷寒金匱兩書用石膏之方甚多傷寒論白虎湯竹葉石膏湯皆用石膏一斤即古今分量不同亦約有今之五兩許雖分作三次服而病未愈者必陸續服盡猶一劑也金匱治熱癰瘡治暑治婦人乳中虛煩亂嘔逆皆用石膏千金用傷寒論理中湯治霍亂名爲治中湯轉筋者加石膏是石膏爲尋常藥餌諸凡有實熱之證皆可用者也又考神農本經石膏氣味辛微寒無毒夫既曰微寒則性非大寒可知既曰無毒則性原純良可知且又謂能治產乳是較他涼藥尤爲和平故雖產後亦可用也愚生平重用石膏治驗之案不勝記今略載數則於左以釋流俗之感

長子蔭潮七歲時感冒風寒四五日身大熱舌苔黃而帶黑孺子苦服藥強與之即嘔吐不止遂但用生石膏兩許煎取清汁分三次溫飲下病稍愈又煎生石膏二兩分三次飲

下又稍愈又煎生石膏三兩徐徐溫飲下如前病遂全愈夫以七歲孺子約一晝夜間共用生石膏六兩病愈後飲食有加毫無寒中之弊則石膏果大寒乎抑微寒乎

一媼年六旬得溫病脈數而有力舌苔黃而乾聞藥氣即嘔吐俾用生石膏六兩煎水一大碗恐其嘔吐一次止飲藥一口甫飲下煩躁異常病家疑藥不對證愚曰非也病重藥輕故耳飲至三次遂不煩躁閱四點鐘盡劑而愈

一媼年近七旬於正月中旬傷寒無汗原是麻黃湯證因誤服桂枝湯遂成白虎湯證而上焦煩熱太甚聞藥氣即嘔吐單飲所煎石膏清水亦吐出俾用鮮梨片蘸生石膏細末嚼咽之服盡二兩病遂愈

一人年三十餘素有痰飲得傷寒證服藥調治而愈後因飲食過度而復三四日間延愚診視其脈洪長有力而舌苔淡白亦不燥渴食梨一口即覺涼甚食石榴子一粒心亦覺涼愚舍證從脈投以大劑白虎湯爲其素有痰飲加半夏數錢有一醫者在座問曰此證心中不渴不熱而畏食寒涼以余視之雖清解藥亦不宜用子何所據而用白虎湯也愚曰此脈之洪實原是陽明實熱之證治以白虎湯乃爲的方其不覺渴與熱者因其素有

痰飲濕勝故也其畏食寒涼者因胃中痰飲與外感之熱互相膠漆致胃府轉從其化與涼爲敵也病家素曉醫理信用愚方兩日夜間服藥十餘次共用生石膏斤許脈始和平愚遂旋里隔兩日復來迎愚言病人反覆甚劇形狀異常有危在頃刻之虞因思此證治愈甚的何驟如此反覆及至見其痰涎壅盛連欬吐不竭精神恍惚言語錯亂身體顫動診其脈甚平和微嫌胃氣不暢舒愚恍悟曰前因飲食過度而復今必又戒飲食過度而復也其家人果謂有鑑前失所與飲食甚少愚曰此次無須用藥飽食即可愈矣其時已屆晚八鐘至明飲食三次病若失

石膏性本微寒而以治寒溫之熱百倍於他藥者以其味微辛陰中含陽而善發汗也然宜生用而不宜煨用煨之則辛散之力頓消轉能收斂外邪凝聚痰火使之不散

觀點豆腐者必用煨

石膏可知

用至一兩即足傷人用石膏者當切戒之至買此石膏時又當細心考察勿爲藥坊所欺致以煨者冒充生者例言中石膏條下言之甚詳可參觀

寒溫爲病中第一險證而石膏爲治寒溫第一要藥愚生平習用生石膏未嘗少有失誤而俗醫見愚重用生石膏之方病雖治愈亦駭爲鹵莽或目爲行險僥倖憶五年前族家



姪年七旬有三忽得癱瘓證迎愚診視既至見有醫者在座用藥一劑其方係散風補氣理痰之品甚爲穩善愚亦未另立方翌日脈變洪長知其已成傷寒證先時愚外祖家近族有病者訂於斯日迎愚其車適至愚將行謂醫者曰此證乃癱瘓基礎預伏於內今因因傷寒而發乃兩病偕來之證然癱瘓病緩傷寒病急此證陽明實熱已現於脈非投以白虎加人參湯不可君須放胆用之斷無差謬後醫者終畏石膏寒涼又疑癱瘓證不可輕用涼藥遲延二日病勢垂危復急迎愚及至則已夜半矣診其脈洪而且數力能搏指喘息甚促舌強直幾不能言幸喜藥坊即在本村急取白虎加人參湯一劑方中生石膏用三兩煎湯兩鍾分二次溫飲下病稍愈又單取生石膏四兩煮汁一大碗亦徐徐飲下至亭午盡劑而愈後癱瘓證調治不愈他醫竟歸咎於愚謂從前用過若干石膏所以不能調治吁年過七旬而癱瘓者愈者幾人獨不思愚用石膏之時乃挽回已盡之人命也且金匱治熱癱瘓有風引湯原石膏與寒水石並用彼謗愚者生平蓋未見金匱也又嘗治一少年素羸弱多病於初夏得溫證表裏俱熱延醫調治不愈適愚自他處治病歸經過其處因與其父素稔入視之其脈數近六至雖非洪滑鼓指而確有實熱舌苔微

黃雖不甚乾毫無津液有煎就藥一劑未服仍係發表之劑乃當日延醫所疏方其醫則已去矣愚因謂其父曰此病外感實熱已入陽明之府其脈象不洪滑者元氣素虛故也陽明府熱之證斷無發表之理况其脈數液短兼有真陰虛損之象尤忌發汗乎其父似有會悟求愚另爲疏方本擬用白虎加人參湯又思用人參即須多用石膏其父素小心過度又恐其生疑不敢服遂但爲開白虎湯方中生石膏用二兩囑其煎汁兩茶鍾分二次溫飲下服後若餘火不淨仍宜再服清火之藥言畢愚即旋里後聞其服藥後病亦遂愈遲十餘日大便又燥結兩腿微腫將再迎愚診治而其父友人有自謂知醫者言其腿腫係多服生石膏之過而孰知係服石膏猶少之過哉病家竟誤聽其言改延他醫投以大劑承氣湯服後其人即不語矣遷延數日而亡夫自謂知醫者不過欲炫己之長而妄指他人之短豈知其言之一出即足誤人性命哉於陰騭獨無所損哉

夫愚之被謗何足惜獨惜夫石膏之功用原能舉天下病熱之人盡登之清涼之域而愚學淺才疏獨不能爲石膏昭雪俾石膏之功用大顯於世每一念及曷勝扼腕因思傷寒論序中大意謂其宗族素蕃盛自建安紀年以來族人多患傷寒大抵委付凡醫恣其所

措以致戶口凋零遂感憤而作傷寒論故一百十三方中救誤治之方幾居其半夫仲景爲醫中之聖猶任其族人之患傷寒者爲庸醫所誤而不能以苦口爭何況於愚也又何怪乎愚用生石膏而遭謗也愚今師仲景感憤著書之意僭成醫學衷中參西錄一書於石膏治愈之案不覺語長詞複言之慨切非過爲石膏延譽也實欲爲患寒溫者廣開生路也天下後世之仁人君子覽斯編者必當有所興起也

神農本經藥性有寒有微寒微寒即後世所謂涼也石膏之性本經明言微寒不過爲涼藥中之一藥耳且爲石之膏而並非石質誠爲涼藥中極純良之品世俗醫者何至畏之若是能重用石膏一味即能挽回寒溫中垂危之大證此愚屢經試驗左所列案中已略舉一二即使石膏果係大寒而當陽明府熱方熾之時用生石膏五六兩煎湯一大碗一次止飲藥一口以火退爲度若覺微涼即便停止何至遽將人涼壞況愚用此方以救寒溫之熱其熱退至八九分石膏即可停止初不待其覺涼也又嘗思之寒溫中之實火直等燔柴之烈惟石膏則可比救燔柴之水設使人在燔柴中不能出救之者若不焦頭爛額急用水潑滅其火而復從容周旋徐爲調停則其人必爲忍人乃何以本屬可救之實

熱而竟以不敢重用石膏者誤之耶且愚於可重用石膏之證又得一確實徵驗其人能恣飲新汲井泉水而不瀉者即放胆用生石膏治之必愈此百用不至一失之法也

按重用石膏治病名醫之案甚夥今略載數條於左並今人之用石膏治驗之案數則連類記之以明愚之重用石膏原非一己之私見也

濮依雲曰家君於壬午夏病熱喜立日中且惡涼飲脈則皆伏羣醫咸謂三陰證慈未之敢信質於師陸九芝先生先生驚曰此溫熱之大證陽極似陰也誤用辛熱必殆乃迭進芩連膏黃熱象大顯石膏用至斤許熱乃漸退竊思此疾當畏寒脈伏時誰知其爲大熱者若非家君早令習醫受吾師至教篤信吾師之說必爲羣醫所誤矣

紀文達曰乾隆癸丑春夏間京中多疫以張景岳法治之十死八九以吳又可法治之亦不甚效驗有桐城一醫以重劑石膏治馮鴻臚星實之姬人見者駭異然呼吸將死應手輒痊踵其法者活人無算有一劑用至八兩一人服至四斤者雖劉守真之原病式張子和之儒門事親專用寒涼亦未敢至是實自古所未聞矣

按桐城醫者文達未詳其姓名友人劉仲華告愚曰此醫姓余名霖字師愚於乾隆間著

書名疫疹一得其間重用石膏方名清瘟敗毒散後道光間歸安江筆花著醫鏡內有治一時疫發斑用石膏至十四斤而斑始透蓋深得余師愚之法者

又曰吳門顧松圃名靖遠因父患熱病爲庸醫參附所誤發憤習醫寒暑無間者閱三十年嘗著有醫鏡十六卷惜無刊本近見陸定圃進士冷盧醫話載其治王繼功陽明熱證主白虎湯每劑石膏三兩兩劑熱頓減而徧身冷汗肢冷發呃別醫謂非參附不克回陽諸醫和之羣譁曰白虎再投必斃顧引仲景熱深厥亦深之文及喻嘉言陽證變陰厥萬中無一之說諄諄力辯諸醫固執不從投參附回陽斂汗之劑汗益多而體益冷反詆白虎之害微陽脫在旦暮舉家驚惶復求顧診仍主白虎湯連服兩大劑汗止身溫再以前湯加減數服而痊因著辨治論以爲溫熱病中宜用白虎湯並不傷人以解世俗之惑按此案服白虎湯兩劑後而轉熱深厥深者以方中所用三兩猶輕不能勝此病也若如前案中每劑用石膏半斤則無斯弊矣幸其持論不移卒能以大劑白虎湯挽回此證又幸患此證者必爲壯實之人其素日陰分無虧不然服參附一劑之後其病卽不可問矣豈猶容後日復用白虎湯哉

徐靈胎曰西濠陸炳若之夫人產後感風熱瘀血未盡醫者執產後屬虛寒之說用乾薑熟地治之汗出而身熱如炭唇燥舌紫仍用前藥余是日偶步田間看菜花近炳若之居趨迎求診余曰生產血枯火熾又兼風熱復加剛燥滋膩之品益火塞竅凶危立見非石膏則陽明之盛火不解遵仲景法用竹皮石膏等藥余歸而他醫至笑且非之謂自古無產後用石膏之理蓋生平未見仲景方也其母素信余立主服之一劑而甦明日炳若求診余曰更服一劑即全愈矣勿庸易方如言而愈觀此案則產後病寒溫者石膏亦所不忌也按金匱有竹皮大丸治婦人乳中虛煩亂嘔逆即此案所謂產後風熱也竹皮大丸中原有石膏故徐氏謂遵仲景之法而愚治產後寒溫之實熱則用白虎加人參湯以玄參代知母蓋退寒溫之實熱知母不如石膏而其性實寒於石膏當爲產後所忌故竹皮大丸中不用知母至玄參則宜於產乳餘疾本經有明文也用白虎湯之例汗吐下後皆加人參以其虛也產後較汗吐下後更虛故必加之方妥

又曰嘉興朱宗臣以陽勝陰虧之體又兼痰凝氣逆醫者以溫補治之胸膈否塞而陽道痿羣醫謂脾腎兩虧將恐無治就余於山中余視其體豐而氣旺陽升而陰不降諸竅皆

閉笑謂之曰此爲肝腎雙實證先用清潤之品加石膏以降其逆氣後以消痰開胃之藥滌其中宮更以滋腎強陰之藥鎮其元氣陽事既通五月後姜即懷孕得一女又一年復得一男觀此案則無外感而有實熱者石膏亦可用也俗醫妄談謂石膏能寒人之下焦令人無子何其言之謬耶

袁子才曰丙子九月余患瘧飲呂醫藥至日昃忽嘔逆頭眩不止家慈抱起坐覺血氣自胸膈起性命在呼吸間忽有徵友趙藜村來訪家人以疾辭曰我解醫乃延入診脈看方笑曰容易命速買石膏加他藥投之余甫飲一勺如以千鈞之石將腸胃壓下血氣全消未半孟沉沉睡去頭上微汗朦朧中聞家慈啣曰豈非仙丹乎睡須臾醒君猶在座問思西瓜否曰想甚即買西瓜曰憑君盡量我去矣食片許如醍醐灌頂頭目爲輕晚食粥次日來曰君所患者陽明經瘧呂醫誤爲太陽經以升麻羌活二味升提之將君妄血逆流而上惟白虎湯可治然亦危矣詳觀此案石膏之功用直勝金丹誠能挽回人命於頃刻也以此普濟羣生之藥醫者果何所畏懼而不肯輕用也

太醫院吏目楊榮春號華軒南皮人曾治一室女周身拘攣四肢不能少伸年餘未起牀

矣診其脈陽明熱甚華軒每劑藥中必重用生石膏以清陽明之熱共用生石膏四斤其病竟愈蓋此證必因素有外感之熱傳入陽明經醫者用甘寒滯泥之品錮閉其熱於陽明經中久而不散夫陽明主宗筋宗筋爲熱所傷而拘攣久之周身之筋皆病矣此錮閉之熱惟生石膏可清之內消兼逐之外出而他藥不能也

友人毛仙閣曾治一少婦產後十餘日周身大熱無汗心中熱而且渴延醫調治病勢轉增甚屬危急仙閣診其脈甚洪實舌苔黃而欲黑撮空摸牀內風已動治以生石膏三兩玄參一兩野台參五錢甘草二錢爲服藥多嘔取竹皮大丸之義加竹茹二錢煎湯一大碗徐徐溫飲下盡劑而愈觀此案則外感之熱直如燎原雖在產後豈能從容治療乎孫思邈曰智欲圓而行欲方胆欲大而心欲小世俗醫者遇此等證但知心小而不知胆大豈病人危急之狀漠不關於心乎

友人張少白曾治一閩姓叟年近七旬素有勞疾發則喘而且嗽於丙午冬感冒風寒上焦煩熱勞疾大作痰涎膠滯喘促異常其脈上部洪滑按之有力少白治以生石膏二兩以清時氣之熱因兼勞疾加沉香五錢以引氣歸腎且以痰涎太甚石膏能潤痰之燥不



行痰之滯故又藉沉香辛溫之力以爲石膏之反佐也一日連服兩劑於第二劑加清竹瀝二錢其病若失勞疾自此亦愈至今數年未嘗反覆觀此案則石膏之功用不幾令人不可思議哉然非其人感冒傷寒又孰能重用石膏爲祓除其勞疾哉

(附錄)湖北潛江紅十字分會張港義務醫院院長崔蘭亭

康

來函 壽甫老先生台鑑久

仰仁術普救蒼生眞乃醫中一大偉人也漢唐以來各家著述雖多恆係理想究少實驗是以前方有效有不效惟先生之著述則屢試屢驗今略舉用衷中參西錄中諸方隨手奏效數則敬呈台端丁卯仲夏國民革命軍第二十軍四師七旅旅長何君身染溫病軍醫以香薷飲藿香正氣散治之不效迎<sub>僕</sub>診視遵用衷中參西錄清解湯一劑而愈時因大軍過境溫病盛行以書中清解湯涼解湯寒解湯仙露飲從龍湯餽水石膏飲有嘔者兼用代赭石本此數方變通而用救愈官長目兵三千餘人共用生石膏一千餘斤並未債事先生之衷中參西錄眞乃世界救命之書而堪爲醫界開一新紀元也後學又自搜求兩方亦甚奇異一爲服食松脂法抱朴子內篇有上黨趙姓身患癩病歷年不愈後遇異人指示服松脂百日癩病全愈不但治病而且延年初不知松脂爲何物後參閱羣書

知松脂即是松香解毒除濕消腫止痛生肌化痰久服輕身延年辟穀不飢萬國藥方久  
欬丸係松脂甘草並用向曾患欬嗽百藥不效後每服松脂乾末一錢用涼茶送服月餘  
欬嗽全愈至今十年未嘗反覆精神比前更强壯觀此松脂實有補髓健骨之力又丁卯  
夏川鄂戰爭敝會出發至戰地救一兵士子彈由背透胸出由傷處檢出碎骨若干每日  
令食牛乳山藥數日飲食稍進口吐臭膿不能坐立後每日令服松脂兩次每次一錢三  
日後臭膿已盡傷口內另長新骨月餘傷口全平行步如常敝會送路費及路票回川來  
書道謝又一兵士李兆元過食生冷身體浮腫腹大如箕百藥罔效令每日服松脂三錢  
分三次服下五日全愈鄉村一男子患肝癰潰破醫治五年不愈潰穿二孔日出臭水碗  
許口吐膿血臭氣異常戊辰孟夏迎爲診治視其形狀危險萬分辭而不治再三懇求遂  
每早晚令服松脂一錢五日臭膿減少瘡口合平照前服之半月全愈又有患肺癰者服  
林屋山人犀黃丸不效而服松脂輒效者難以枚舉矣又一方家母年五十時患欬嗽百  
藥不效嚴冬時臥不安枕遇一老醫傳授一方係米殼四兩北五味三錢杏仁去皮炒熟  
五錢枯礬二錢共爲細末煉蜜爲丸梧桐子大每服二十九白糖開水送下吞服數日病

若失永不復發家母生於甲辰現年八十有六貌若童顏此丸不但止嗽而且延年以後用此丸療治欬嗽全愈者筆難悉述此二方皆爲尋常藥品而能愈此難愈之大證且又屢試屢效誠佳方也深望先生將此二方載於貴著或兼登各處醫報以公諸醫界則幸甚矣按此來函謂共用生石膏千餘斤治愈三千餘人未嘗少有錯誤是誠善用石膏者矣錄之足證愚喜重用生石膏以治寒溫實熱原非一偏之見且足證石膏必須生用始能有益無害活人千萬至所附載二方皆甚奇異試之有效因並錄之

按傷寒論陽明篇中白虎湯後繼以承氣湯以攻下腸中燥結而又詳載不可攻下諸證誠以承氣力猛倘或審證不確即足誤事愚治寒溫三十餘年得一避難就易之法凡遇陽明應下證亦先投以大劑白虎湯一兩劑大便往往得通病亦即愈即間有服白虎湯數劑大便猶不通者而實火既消津液自生腸中不致乾燥大便自易降下用玄明粉三錢加蜂蜜或柿霜兩許開水沖調服下大便即通若仍有餘火未盡而大便不通者單用生大黃末一錢若凉水調服生大黃末一錢可抵煮服者一兩蜜水調服通其大便亦可且通大便於服白虎湯後更無下後不解之虞蓋下證略具而脈近虛數者遽以承氣下之原多有下後不解者以其真

陰虧元氣虛也惟先服白虎湯或先服白虎加人參湯去其實火即以復其真陰培其元氣而後微用降藥通之下後又何至不解乎此亦愚百用不至一失之法也

又按重用石膏以退火之後大便間有不通者即可少用通利之藥通之此固愚常用之法而隨證制宜又不可拘執成見曾治一少年傷寒已過旬日陽明火實大便秘結投一大劑白虎湯一日連進二劑共用生石膏六兩至晚九點鐘火似見退而精神恍惚大便亦未通行再診其脈變爲弦象夫弦主火衰亦主氣虛知此證清解已過而其大便仍不通者因其元氣虧損不能運行白虎湯涼潤之力也遂單用人參五錢煎湯俾服之須臾大便即通病亦遂愈蓋治此證的方原是白虎加人參湯因臨證時審脈不確但投以白虎湯遂致病有變更幸迷途未遠猶得急用人參繼所服白虎湯後以成功誠以日間所服白虎湯盡在腹中得人參以助之始能運化是人參與白虎湯前後分用之亦無異於一時同用之也益歎南陽製方之神妙誠有令人不可思議者也吳又可謂如人方肉食而病適來以致停積在胃用承氣下之惟是臭水稀糞而已於承氣湯中單加人參一味雖三四十日停積之物於是方下蓋承氣藉人參之力鼓舞胃氣宿物始動也又可此論

亦即愚用人參於白虎湯後以通大便之理也

間有用白虎湯潤下大便病仍不解用大黃降之而後解者以其腸中有匿藏之結糞也曾治一媼年七十餘季冬得傷寒證七八日間延愚診視其脈洪長有力表裏俱熱煩渴異常大便自病後未行投以白虎加人參湯二劑大便遂通一日降下三次病稍見愈而脈仍洪長細審病情當有結糞未下遂單用大黃三錢煮數沸服之下結糞四五枚病遂見愈仍非脈淨身涼又用拙擬白虎加人參以山藥代粳米湯在服未盡劑而愈然此乃百中之一二也臨證者不可因此生平僅遇之證遂執爲成法輕視白虎而重視承氣也又按石膏用於外感之陽證雖不當其時亦無大患惟用於陰盛格陽眞寒假熱證則危不旋踵然此等證即誤用他涼藥其害亦同此非石膏之過而醫者審證不確之過也今錄古人治此等證驗案數則於左以備參觀庶不至誤用寒涼之藥以治陰證也

李東垣嘗治一陰盛格陽傷寒面赤煩渴脈七八至但按之則散用葷附湯加人參投之得汗而愈按陰盛格陽煩渴與陽證煩渴確有分辨陽證煩渴喜用大碗飲凉水飲後必輕快須臾陰盛格陽煩渴亦若嗜飲凉水而飲至口中又似不欲下咽不過一兩口而止

李士材曰休寧吳文哉傷寒煩躁面赤昏亂悶絕時索冷水其弟日休求余診視手揚足擲五六人制之方得就診其脈洪大無倫按之如絲余曰浮大沉小陰證似陽也與附子理中湯當有生理日休駭曰醫者十輩至不曰柴胡承氣則曰竹葉石膏今反用熱藥惡乎敢余曰溫劑猶生涼劑立危矣日休卜之吉遂用理中湯加人參四錢附子三錢煎成將藥碗置冷水中候冷與飲服後一時狂躁定矣再劑而神爽服參五斤而安文哉遺以書曰弟爲俗醫所誤既登鬼錄矣而兄翁拯全之大奇亦大幸也方弟躁熱之時醫以三黃湯入牛黃服之轉加悶絕舉室哀號惟候目瞑而已不意兄翁毅然以爲可活參附以投陰霜見覲荊妻穉子含淚歡呼父母生之而兄翁再生之大恩罔極莫可言喻敢誌巔末乞附案帙俾天下萬世知藥不可輕投命不可輕棄何莫非大仁人回春之澤哉按此案中有日時索冷水而不日時飲凉水蓋索者未必能飲也

喻嘉言曰徐國楨傷寒六七日身熱目赤索水到前復置不飲異常煩躁將門牖洞啓身臥地上展轉不快更求入井一醫急以承氣與服余診其脈洪大無倫按之無力謂醫者曰此用人參附子乾薑之證奈何認爲下證醫曰身熱目赤有餘之邪躁急如此再以人

參附子乾薑服之踰垣上屋矣予曰陽欲暴脫外顯假熱內有真寒以薑附投之尙恐不能勝回陽之任况敢用純陰之藥重劫其陽乎觀其得水不欲咽情已大露豈水尙不欲咽而可用大黃芒硝乎天地燠蒸必有大雨此證頃刻一身大汗不可救矣惟用薑附可謂補中有發並可以散邪退熱一舉兩得至穩至當之法何可致疑吾在此久坐如有差誤吾任其咎於是以附子乾薑各五錢人參三錢甘草二錢煎湯冷服服後寒戰戛齒有聲以重綿和頭覆之縮手不肯與診陽微之狀始著再與前藥一劑微汗熱退而安

右所錄醫案皆陰極似陽也然其證百中不一見愚臨證數十年亦未嘗見其證之少可知至陽極似陰外面雖見大寒之狀仍須投以大劑寒涼者愚曾治過數次前哲醫案中亦多有之今復登數則於左可與右列之案對觀庶可分辨陰陽於毫釐之間也

一人年五十周身發冷兩腿疼痛醫者投以溫補之藥其冷益甚欲作寒戰診其脈甚沉伏重按有力其舌苔黃厚小便赤澀時當仲春知其春溫之熱鬱於陽明而未發故現此假象也欲用白虎湯加連翹治之病人聞之駭然愚曰但預購生石膏四兩迨熱難忍時煎湯飲之可乎病者曰恐無其時耳愚曰若取鮮白茅根煎湯飲之則冷變爲熱且變爲

大熱矣病者仍不確信然欲試其驗否遂刮取鮮白茅根去淨皮細剉一大碗煮數沸取其湯當茶飲之有頃熱發若難忍須臾再診其脈則洪大無倫矣愚將所預購之四兩生石膏煎湯分三次溫飲下其熱遂消蓋茅根中空性涼能散故飲之能將鬱熱達於外也一婦人年二十餘得溫病咽喉作疼舌強直幾不能言心中熱而且渴頻頻飲水脈竟沉細異常肌膚亦不發熱遂舍脈從證投以拙擬寒解湯在第五卷得微汗病稍見愈明晨又復如故舌之強直更甚知藥原對證而力微不能勝病也遂仍投以寒解湯將石膏加倍煎湯兩鍾分二次溫飲下又得微汗病遂愈按傷寒脈若沉細多係陰證溫病脈若沉細則多係陽證蓋溫病多受於冬至春而發其病機自內向外有時病機鬱而不能外達其脈或即現沉細之象誤認爲涼必至誤事又此證寒解湯既對證見愈矣而明晨舌之強直更甚乃將方中生石膏倍作二兩分兩次前後服下其病即愈由是觀之凡治寒溫之熱者皆宜煎一大劑分數次服下效古人一劑三服之法也

喻嘉言曰黃長人犯房勞病傷寒守不服藥之戒身熱已退十餘日外忽然昏沉渾身戰慄手足如冰急請予至一醫已合就薑桂之藥矣予適見而駭之姑候診畢再三闢其差



謬病家自疑陰證言之不入只得與醫者約曰此病之安危只爭此藥一劑所用當否性命有關吾與丈各立担承倘至用藥差誤責有所歸醫者曰吾治傷寒三十餘年不知甚麼担承予笑曰吾有明眼在此不忍見人立就傾危若不担承待吾用藥病家方纔心安亟請用藥予以調胃承氣湯約重五錢煎成熟服半蓋厥漸退人漸甦仍與前藥服至盡劑人事大清忽然渾身壯熱再與大柴胡湯一劑熱退身安門人問曰病者云是陰證見厥先生確認為陽證而用下藥果應其理安在答曰凡傷寒病初得發熱煎熬津液鼻乾口渴便秘漸至發厥者不問而知爲熱也若陽證忽變陰厥者萬中無一從古至今無一也蓋陰厥得之陰證一起便直中真陰經唇青面白偏體冷汗便利不渴身倦多睡醒則人事了了與傷寒傳經之熱邪轉入轉深人事昏惑者萬萬不同也按喻氏案後之論甚明晰學者宜細觀之

張令韶曰予治一婦人傷寒九日發狂面白讖語不識人循衣摸牀口目瞤動肌肉抽搐遍身手足盡冷六脈皆無諸醫皆辭不治予因審視良久聞其聲重而且長句句有力乃曰此陽明內實熱鬱於內故令脈道不通非脫也若脈真將無則氣息奄奄危在頃刻安

得有如許氣力大呼疾聲久而不絕乎遂用大承氣湯啓齒灌下夜間解黑糞滿牀脈出身熱神清舌燥而黑更服小陷胸湯二劑而愈因思此證大類四逆若誤投之立死及死之後必以爲原係死證服之不效數也不知病人懷恨九原矣按此證易辨其決非四逆湯證徵以前案喻氏之論自能瞭然

李士材曰社友韓茂遠傷寒九日以來口不能言目不能視體不能動四肢俱冷衆皆曰陰證比予診之六脈皆無以手按腹兩手護之眉縐作楚按其跌陽大而有力知其腹有燥糞欲與大承氣湯病家惶懼不敢進予曰吾郡能辨是證者惟施笠澤耳延至診之與予言若合符節遂投以大承氣湯下燥糞六七枚口能言體能動若接手不及足者何以辨此證哉按傷寒論仲景原叙原有握手不及足之戒足上脈三部跌陽爲胃脈太淵爲腎脈太衝爲肝脈三脈之中又以跌陽爲要故其叙中跌陽與人迎並舉凡臨證其手上脈不見者皆當取其跌陽脈爲准不但寒溫之證爲然也

右所列醫案皆陽極似陰也其理惟劉河間論之最透其言曰畜熱內甚脈須疾數以其熱畜極甚而脈道不利反致脈沉細而欲絕俗未明造化之理反謂傳爲寒極陰毒者或

始得之陽熱暴甚而便有此證候者或兩感熱甚者通宜解毒如大承氣湯下之後熱稍退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者涼解散調之按此論發揮陽極似陰之理甚妙誠以河間生平治病主火故能體會至此至其所論用藥則不必拘

陰極似陽陽極似陰之外又有所謂戴陽證者其人面赤煩躁氣息甚粗脈象雖大按之無力又多寸盛尺虛乃下焦虛寒孤陽上越之危候頗類陰極似陽而與陰極似陽微有不同蓋陰極似陽乃內外異致戴陽證乃上下異致也愚曾治有戴陽證驗案仙露湯方後論藥宜分數次服者不可頓服曾引其案以爲炯戒茲不再贅而前人善治此證者喻嘉言獨推陶節庵立法甚妙用人參附子等藥收拾陽氣歸於下元而加蔥白透表以散外邪如法用之無不愈者然其法實本仲景特仲景未明言治戴陽證而節庵則明言治戴陽證耳嘉言何不祖述仲景而但知推重節庵也按傷寒論原有治戴陽證之方通脈四逆湯是也其方載少陰篇主少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥熱脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者方用炙甘草二兩生附子經藥坊製過而未拘者即是生附子非野間割取之生附子也大者一枚去皮破八片乾薑三兩強人可四兩右三味以水三升

煮取一升二合分兩次服面赤者加蔥九莖腹中痛者去蔥加芍藥二兩嘔者加生薑三兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脈不出者去桔梗加人參三兩按面赤即戴陽證於通脈四逆湯中加蔥九莖即治戴陽證之專方也蓋上竄之元陽原以下焦爲宅窟故用乾薑附子之大辛大溫直達下焦據其故壘張赤幟而招之然恐元陽當渙散之際不堪薑附之健悍故又專用甘草之溫和甘緩者以安養元氣變理陰陽且俾薑附得甘草之甘而熱力愈長得甘草之緩而猛力悉化洵乎節制之師掃盪餘寇即以招集流亡則元陽自樂還其宅也特是元陽欲還道途不無間隔故又用蔥白之溫通且取老陽之數多至九莖以導引介紹之則上至九天下至九淵一氣貫通毫無隔碍而元陽之歸還自速也至利止而脈不出者其下焦之元氣必虛故又加人參二兩以助元氣後日陶氏之方不過於此湯中並加蔥白人參何嘗出仲景之範圍哉

按治戴陽證用通脈四逆湯必須加蔥亦宜並加人參而蔥九莖可變爲蔥白九寸又按腹痛者加芍藥若以治溫病中之戴陽證雖不腹痛亦宜加芍藥曾治一少年素傷於烟色夏月感冒時氣心中發熱因多食西瓜遂下利清穀上焦煩躁異常急迎愚診視及至

已昏不知人其脈上盛下虛搖搖無根數至六至爲疏方用附子錢半乾薑二錢炙甘草三錢人參四錢葱白五寸生芍藥五錢又加龍骨牡蠣皆不用煨立參各四錢煎湯一大鍾頓飲之須臾甦醒下利與煩燥皆愈時有醫者二人在座皆先愚至而未敢出方見愚治愈問先生何處得此良方答曰此仲景方愚不過加藥三味耳諸君豈未之見耶遂爲發明通脈四逆湯之精義並謂其善治戴陽證二醫者皆欣然以爲聞所未聞云

又喻嘉言曰石開曉病傷風欬嗽未嘗發熱自覺氣迫欲死呼吸不能相續求予診之見其頭面赤紅躁擾不歇脈亦豁大而空謂曰此證頗奇全是傷寒戴陽證何以傷風小恙亦有之急宜用人參附子等藥溫補下元收回陽氣不然子丑時一身大汗脫然而死矣渠不以爲然及日落陽不用事忙亂不能少支忙服前藥服後稍寧片刻又爲牀側添同寢一人逼出其汗再用一劑汗止身安欬嗽俱不作詢其所由云連服麻黃藥四劑遂如此躁急然後知傷風亦有戴陽證與傷寒無別總因其人平素下虛是以真陽易於上越耳按此證由於連服麻黃四劑之後而服藥後猶設法逼出其汗豈服麻黃時未出汗乎獨不慮其元陽因服藥甫收斂又因出汗而浮越乎愚曾治有類此之證其病因亦類此

愚重用山萸肉

去淨核

一二兩加人參龍骨

不最

各數錢而愈其案詳拙擬來復湯

在第二卷

後可參視

石膏粳米湯

治溫病初得其脈浮而有力身體壯熱並治一切感冒初得身不惡寒而

心中發熱者若其熱已入陽明之腑亦可用代白虎湯

生石膏

札細貳兩

生粳米

貳兩半

右二味用水三大碗煎至米爛熟約可得清汁兩大碗乘熱盡量飲之使周身皆汗出病無不愈者若陽明腑熱已實不必乘熱頓飲之徐徐溫飲下以消其熱可也

或問外感初得即中有蘊熱陽明胃腑不至燥實何至遽用生石膏二兩答曰此方妙在將石膏同粳米煎湯乘熱飲之俾石膏寒涼之性隨熱湯發散之力化為汗液盡達於外也西人謂胃本無化水之能亦無出水之路而壯實之人飲水滿胃須臾水氣旁達胃中即空蓋胃中原多微絲血管能引水氣以入回血管

二管詳解在第二卷補絡補管湯下

由回血管過肝入心

以運行於周身由肺升出為氣由皮膚滲出為汗餘透腎至膀胱為溺石膏煎湯毫無氣味毫無汁漿直與清水無異且又乘熱飲之則敷布愈速不待其寒性發作即被胃中微絲血管吸去化為汗為氣而其餘為溺則表裏之熱亦隨之俱化此寒因熱用不使傷胃

之法也且與粳米同煮其冲和之氣能助胃氣之發達則發汗自易其稠潤之汁又能逗留石膏不使其由胃下趨致寒涼有碍下焦不但此也清水煎開後變涼甚速以其中無汁漿不能留熱也此方粳米多至二兩半湯成之後必然汁漿甚稠飲至胃中又善留蓄熱力以爲作汗之助也是以人之欲發汗者飲熱茶不如啜熱粥也

初擬此方時惟用以治溫病實驗既久知傷寒兩三日後身不惡寒而發熱者用之亦效丙辰正月上旬愚隨巡防營自廣平移居德州自邯鄲上火車自南而北復自北而南一晝夜繞行千餘里車窗多破風寒徹骨至德州同行病者五六人皆身熱無汗遂用生石膏粳米各十餘兩飯甑煮爛熟俾病者盡量飲其熱湯皆周身得汗而愈一時稱快

瀋陽縣知事朱靄亭夫人年五旬於戊午季秋得溫病甚劇時愚初至奉天靄亭係愚同鄉求爲診治見其以冰囊作枕復懸冰囊貼面之上側蓋從前求東人調治如此治法東人之所爲也合目昏昏似睡大聲呼之毫無知覺其脈洪大無倫按之甚實愚謂靄亭曰此病陽明腑熱已至極點外治以冰熱愈內陷然此病尙可爲非重用生石膏不可靄亭躊躇愚言遂用生石膏細末四兩粳米八錢煎取清汁四茶杯徐徐溫灌下約歷十點鐘將

藥服盡豁然頓醒後又用知母花粉玄參白芍諸藥少加連翹以清其餘熱服兩劑全愈  
霽亭喜甚命其公子良佐從愚學醫云

### 鎮逆白虎湯

治傷寒溫病邪傳胃腑燥渴身熱白虎證俱其人胃氣上逆心下滿悶者

生石膏

搗細三兩

知

母

兩半

清半夏

八錢

竹茹粉

六錢

用水五鍾煎汁三鍾先溫服一鍾病已愈者停後服若未全愈者過兩點鐘再溫服一鍾  
傷寒論白虎湯治陽明腑熱之聖藥也蓋外邪熾盛勢若燎原胃中津液立就枯涸故用  
石膏之辛寒以祛外感之邪知母之涼潤以滋內耗之陰特是石膏質重

雖煎作湯性亦下墜

知母味

苦苦降與重墜相併下行之力速胃腑之熱或難盡消且恐其直趨下焦而爲泄瀉也故  
又藉粳米之濃汁甘草之甘味緩其下趨之勢以待胃中微絲血管徐徐吸去由肺升出  
爲氣由皮膚滲出爲汗餘入膀胱爲溺而內蘊之熱邪隨之俱清此仲景製方之妙也然  
病有兼證即用藥難拘成方猶是白虎湯證也因其人胃氣上逆心下脹滿粳米甘草不  
可復用而以半夏竹茹代之取二藥之降逆以參贊石膏知母成功也

一婦人年三十餘得溫證始則嘔吐五六日間心下滿悶熱而且渴脈洪滑有力舌苔黃



厚聞其未病之先曾有鬱怒未伸因得斯證俗名夾惱傷寒然時當春杪一得即不惡寒乃溫病非傷寒也爲疏此方有一醫者在座係病家姻親非但延之治病且以視他醫之用方也疑而問曰此證因胃氣上逆作脹滿始將白虎湯方另爲更定何以方中不用開通氣分之藥若承氣湯之用厚朴枳實而惟用半夏竹茹乎答曰白虎湯用意與承氣迥異蓋承氣湯乃導邪下行之藥白虎湯仍托邪外出之藥故服白虎湯後多有得汗而解者間有服後未即得汗而大熱既消其飲食之時恆得微汗餘熱亦由此盡解若因氣逆脹滿恣用破氣之藥傷其氣分不能托邪外出將邪陷愈深脹滿轉不能消或更增劇試觀傷寒論多有因誤下傷其氣分成結胸成心下痞鞭證不可不知也再試觀諸瀉心不輕用破氣之品却有半夏瀉心湯又仲景治傷寒解後氣逆欲嘔有竹葉石膏湯半夏與石膏並用治婦人乳中虛煩亂嘔逆有竹皮大丸竹茹與石膏並用是半夏竹茹善降逆氣可知也今師二方之意用之以易白虎湯中之甘草粳米降逆氣而不傷正氣服後仍可托邪外出由汗而解而脹滿之證亦即消解無餘此方愚用之屢矣未有不隨手奏效者醫者聞言省悟聽愚用藥服後病人自覺脹滿之處如以手推排下行病亦遂愈

白虎加人參以山藥代粳米湯 治寒溫實熱已入陽明之府燥渴嗜飲凉水脈象細數者

生石膏搗細三兩

知母一兩

人參陸錢

生山藥陸錢

粉甘草三錢

右五味用水五鍾煎取清汁三鍾先溫服一鍾病愈者停後服若未全愈者過兩點鐘再服一鍾至其服法詳細處與仙露湯同

按傷寒法白虎湯用於汗吐下後當加人參究之脈虛者即宜加之不必在汗吐下後也愚自臨證以來遇陽明熱熾而其人素有內傷或元氣素弱其脈或虛數或細微者皆投以白虎加人參湯實驗既久知以生山藥代粳米則其方愈穩妥見效亦愈速蓋粳米不過調和胃氣而山藥兼能固攝下焦元氣使元氣素虛者不至因服石膏知母而作滑瀉且山藥多含有蛋白之汁最善滋陰白虎湯得此既祛實火又清虛熱內傷外感須臾同愈愚用此方救人多矣略列數案於左以資參考

一叟年近六旬素羸弱勞嗽得傷寒證三日昏憤不知人診其脈甚虛數而肌膚烙手確有實熱知其脈虛證實邪火橫恣元氣又不能支持故傳經猶未深入而即昏憤若斯也躊躇再四乃放胆投以此湯將藥煎成乘熱徐徐灌之一次止灌下兩茶匙閱三點鐘灌

藥兩鐘豁然頓醒再盡其餘而病愈矣

一叟年六旬素亦羸弱多病得傷寒證綿延十餘日舌苔黃厚而乾心中熱渴時覺煩躁其不煩躁之時即昏昏似睡呼之眼微開精神之衰憊可知脈象細數按之無力投以涼潤之劑因其脈虛又加野台參佐之大便忽滑瀉日下數次因思此證略用清火之藥即滑瀉者必其下焦之氣化不固先用藥固其下焦再清其上焦中焦未晚也遂用熟地黃二兩酸石榴一個連皮搗爛同煎湯一大碗分三次溫飲下大便遂固間日投以此方將山藥改用一兩以生地黃代知母煎湯成徐徐溫飲下一次止飲藥一大口閱八點鐘始盡劑病愈強半翌日又按原方如法煎服病又愈強半第三日又按其方服之盡劑而愈按熟地黃原非治寒溫之藥而病至極危時不妨用之以救一時之急故仲景治脈結代有炙甘草湯亦用乾地黃即今生地結代亦險脈也如無酸石榴時可用龍骨煨牡蠣煨各五錢代之

一叟年六旬餘素吸鴉片羸弱多病於孟冬感冒風寒其脈微弱而浮愚用生黃芪數錢同表散之藥治之得汗而愈間日因有緊務事冒寒出門汗後重感比前較劇病臥旅邸

不能旋里因延彼處醫者診治時身熱飲水病在陽明之府醫者因其脈微弱轉進溫補病益進更延他醫以爲上有浮熱下有實寒用附子吳茱萸加黃連治之服後齒齦盡腫且甚疼痛時覺煩躁頻頻飲水不能解渴不得已復來迎愚至診其脈細而數按之略實遂投以此湯加玄參六錢以散其浮游之熱一劑牙疼即愈煩躁與渴亦見輕翌日用原方去玄參將藥煎成調入生雞子黃三枚作三次溫飲下大使得通而愈

一人年二十資稟素弱偶覺氣分不舒醫者用三稜延胡等藥破之自覺短氣遂停藥不敢服隔兩日忽發喘逆筋惕肉動精神恍惚脈數至六至浮分搖搖按之若無肌膚甚熱上半身時出熱汗自言心爲熱迫甚覺怔忡其舌上微有白苔中心似黃統觀此病情狀雖陡發於一日其受外感已非一日蓋其氣分不舒時即受外感之時特其初不自覺耳爲其怔忡太甚不暇取藥急用生雞子黃四枚溫開水調和再將其碗置開水盆中候溫服之喘遂止怔忡亦見愈繼投以此湯煎汁一大碗仍調入生雞子黃三枚徐徐溫飲下自晚十點鐘至早七點鐘盡劑而病若失因其從前服藥傷氣俾用玄參一兩潞參五錢連服數劑以善其後

一童子年十七於孟夏得溫證八九日間呼吸迫促頻頻欬吐痰血相雜其欬吐之時疼連胸脇上焦微嫌發悶診其脈確有實熱而數至七至搖搖無根蓋其資稟素弱又兼讀書勞心其受外感又甚劇故脈象若是之危險也爲其胸脇疼悶兼吐血遂減方中人參之半加竹茹三七搗細沖服各二錢用三七者不但治吐血實又兼治胸脇之疼也一劑血即不吐諸病亦見愈又服一劑全愈

一農家孺子年十一因麥秋農家忙甚雖幼童亦作勞田間力薄不堪重勞遂得溫病手足擾動不能安臥讞語不休所言者皆勞力之事晝夜目不能瞑脈象雖實却非洪滑擬投以此湯又慮小兒少陽之體外邪方熾不宜遽用人參遂用生石膏兩半蟬退一錢煎服後諸病如故復來詢方且言其苦於服藥昨所服者嘔吐將半愚曰單用生石膏二兩煎取清汁徐徐溫飲之即可不吐乃如言服之病仍不愈再爲診視脈微熱退讞語益甚精神昏昏不省人事急用野台參兩半生石膏二兩煎汁一大碗分數次溫飲下身熱脈起目遂得瞑手足稍安仍作讞語又於原渣加生石膏麥冬各一兩煎汁二鍾分兩次溫飲下降大便一次其色甚黑病遂愈按此證若早用人參何至病勢幾至莫救幸即能省

悟猶能竭力挽回然亦危而後安矣愚願世之用白虎湯者宜常存一加人參之想也又按此案與前案觀之凡用白虎湯而宜加人參者不必其脈現虛弱之象也凡諗知其人勞心過度或勞力過度或在老年或有宿疾或熱已入陽明之府脈象雖實而無洪滑之象或脈有實熱而至數甚數者用白虎湯時皆宜酌加人參

又寒溫證表裏皆虛汗出淋漓陽明胃腑仍有實熱者用此湯時宜加龍骨牡蠣一童子年十六於季冬得傷寒證因醫者用發表藥太過周身時時出汗仍表裏大熱心中怔忡精神恍惚脈象洪數按之無力遂用此湯加龍骨牡蠣皆不各一兩煎汁一大碗分數次溫飲下盡劑而愈

又仲景治傷寒脈結代者用炙甘草湯誠佳方也愚治寒溫若其外感之熱不盛遇此等脈即遵仲景之法若其脈雖結代而外感之火甚實者亦用白虎加人參以山藥代粳米湯曾治一叟年六旬餘於孟冬得傷寒證五六日間延愚診視其脈洪滑按之亦似有力表裏俱覺發熱間作呻吟又兼喘逆然不甚劇投以白虎湯一劑大熱稍減再診其脈或七八動一止或十餘動一止兩手皆然而重按無力遂於原方中加人參八錢兼師炙甘

草湯中用乾地黃之意以生地代知母煎汁兩鍾分二次溫飲下脈即調勻且較前有力而熱仍如故從前方中生石膏二兩遂加倍爲四兩煎汁一大碗俾徐徐溫飲下盡劑而愈按治此證時愚習用白虎湯而猶未習用白虎湯加參也自此以後凡年過六旬之人即脈甚洪實用白虎湯時亦必少加人參二三錢

結代之脈雖並論究之結脈輕於代脈故結脈間有宜開通者曾治一叟年六十餘大便秘下血醫治三十餘日病益進日下血十餘次且多血塊精神昏潰延爲診視脈洪實異常至數不數惟右部有止時其止無定數乃結脈也其舌苔純黑知係溫病大實之證從前醫者但知治其便血不知治其溫病可異也投以白虎加人參以山藥代粳米湯將石膏改用四兩煎湯三鐘分三次溫飲下每次送服旱三七細末一錢如此日服一劑兩日血止大便仍滑瀉脈象之洪實減半而其結益甚且腹中覺脹詢其病因知得諸惱怒之後遂改用萊菔子六錢而佐以白芍滑石花粉茅根甘草諸藥一劑脹消脈之至數調勻仍稍有洪實之象滑瀉亦減再投以滋陰清燥湯

在第五卷

一劑瀉止脈亦平和

寒溫之證最忌舌乾至舌苔薄而乾或乾而且縮者尤爲險證而究其原因却非一致有

因真陰虧損者有因氣虛不上潮者有因氣虛更下陷者皆可治以白虎加人參以山藥代粳米湯蓋人參之性大能補氣元氣旺而上升自無下陷之虞而與石膏同用又大能治外感中之真陰虧損况又有山藥知母以濡潤之乎若脈象虛數者又宜多用人參減石膏一兩再加玄參生地滋陰之品煎汁三四茶鐘徐徐溫飲下一次止飲一大口防其寒涼下侵致大便滑瀉又欲其藥力息息上達助元氣以生津液飲完一劑再煎一劑使藥力晝夜相繼數日舌潤火退其病自愈一人年二十餘素勞力太過即覺氣分下陷一歲之間爲治愈三次至秋杪感冒時氣胸中煩熱滿悶燥渴引飲滑瀉不止微兼喘促舌上無苔其色鮮紅兼有砂粒延醫調治投以半補半破之劑意欲止其滑瀉兼治其滿悶也服藥二劑滑瀉不止後愚爲診視其脈似有實熱重按無力遂先用拙擬加味天水散在第三卷止其滑瀉方中生山藥用兩半滑石用一兩一劑瀉止繼服滋陰清火之劑數劑喘促亦愈火亦見退惟舌乾連喉幾不能言頻頻飲水不少濡潤胸中仍覺滿悶愚恍悟曰此乃外感時氣挾舊病復發故其脈象雖熱按之不實其舌乾如斯者津液因氣分下陷而不上潮也其胸中滿悶者氣分下陷胸中必覺短氣粗人不善言病情故漫言滿悶也



此時大便不行已五日遂投以白虎加人參以山藥代粳米湯一劑病愈十之七八而舌之乾亦減半又服一劑大便得通病覺全愈舌上仍無津液又用潞參一兩玄參兩半日服一劑三日後舌上津液滋潤矣

一童子年十三於孟冬得傷寒證七八日間喘息鼻煽動精神昏憤時作譫語所言者皆勞力之事其脈微細而數按之無力欲視其舌乾縮不能外伸啓齒探視舌皮有癍點作黑色似苔非苔頻飲凉水毫無濡潤之意愚曰此病必得之勞力之餘胸中大氣下陷故津液不能上潮氣陷不能扞火外出故脈道瘀塞不然何以脈象若是恣飲凉水而不滑瀉乎病家曰先生之言誠然從前延醫服藥分毫無效不知尙可救否曰此病按尋常治法一日止服藥一劑即對證亦不能見效聽吾用藥勿阻定可挽回遂治以白虎加人參以山藥代粳米湯煎汁一大碗徐徐溫飲下一晝夜間連進二劑其病遂愈

又按脈虛數而舌乾者大便雖多日不行斷無可下之理即舌苔黃而且黑亦不可下惟按右所載治法使其大便徐徐自通方爲穩善若大便通後而火猶熾舌仍乾者可用潞參一兩玄參二兩煮汁徐徐飲之以舌潤火退爲度若或因服藥失宜大便通後遂滑瀉

其虛火上逆舌仍乾者可用拙擬滋陰固下湯

在第五卷

去滑石加沙參數錢若其爲日既久

外感之火全消而舌乾神昏或呼吸之間常若氣不舒而時作太息者此大氣因服藥下陷病雖愈而不能自復也宜單用人參兩許煎湯服之或少加柴胡亦可

此證有案在第四卷升陷湯下宜參觀

若微有餘熱可加玄參佐之

寒溫下後不解醫者至此恆多束手不知傷寒論原有治此證的方即白虎加人參湯也其一百六十八節云傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之愚生平治寒溫未有下後不解者於仙露湯後曾詳論之然恆有經他醫下後不解更延愚爲診治者其在下後多日大便未行脈象不虛弱者即按傷寒論原方若在甫下之後或脈更兼虛弱即以山藥代粳米或更以生地代知母莫不隨手奏效蓋甫下之後大便不實驟用寒涼易至滑瀉而山藥收澀地黃黏潤以之代粳米知母實有固下之力而於脈之兼虛弱者則尤宜也况二藥皆能滋真陰下後不解多係陰分素虛之人陰分充足自能勝外感之餘熱也

寒溫之證過十餘日大熱已退或轉現出種種危象有宜單治以人參不必加人參於白

虎湯中者王宇泰曰余每治傷寒溫熱等證爲庸醫妄汗誤下已成壞證危在旦夕者以人參二兩童子小便煎之水侵冰冷飲之立效又張致和曾治一傷寒壞證勢近垂危手足俱冷氣息將斷用人參一兩附子一錢於石臼內煎至一碗新汲水浸之冰冷一服而盡少頃病人汗出鼻梁尖上涓涓如水蓋鼻梁應脾若鼻端有汗者可救以土在人身之中周徧故也

又愚曾治一溫證已過兩旬周身皆涼氣息奄奄確知其因誤治胸中大氣下陷遂用人參一兩柴胡二錢作湯灌之兩劑全愈此證詳案在拙擬升陷湯

在第四卷下可參觀

白虎湯加人參又以山藥代粳米既能補助氣分托邪外出更能生津止渴滋陰退熱洵爲完善之方間有真陰太虛又必重用滋陰之藥以輔翼之始能成功者一媼年過七旬於孟夏得溫證五六日間身熱燥渴精神昏憤舌似無苔而舌皮數處作黑色乾而且縮脈細數按之無力當此高年審證論脈似在不治而愚生平臨證明明見不可治之證亦必苦心研究而設法治之此誠熱腸所迫不能自己然亦往往多有能救者躊躇再四爲疏兩方一方即白虎加人參以山藥代粳米湯一方用熟地黃二兩生山藥枸杞各一兩

眞阿膠妙不

五錢煎湯後調入生雞子黃四枚二方各煎汁一大碗徐徐輪流溫服閱十點鐘盡劑而愈自言從前服藥皆不知覺此時則猶如夢醒視其舌上猶乾黑然不縮矣其脈至數仍數似有餘熱又用玄參二兩潞參一兩煎湯一大碗徐徐溫服一日一劑兩日大使得通再視其舌津液滿布黑皮有脫去者矣

隔數日其夫年與相等亦受溫病四五日間煩熱燥渴遣人於八十里外致冰一担日夜食之煩渴如故復迎愚診治其脈洪滑而長重按有力舌苔白厚中心微黃知其年雖高而火甚實也遂投以白虎加人參以山藥代粳米湯將方中石膏改用四兩連進兩劑而熱渴俱愈其家人疑而問曰此證從前日食冰若干熱渴分毫不退今方中用生石膏數兩連進兩劑而熱渴俱愈是石膏之性涼於冰遠矣愚曰非也石膏原不甚涼然盡量食水不愈而重用生石膏即愈者因石膏生用能使寒溫之熱有出路也西人不善治寒溫故遇寒溫實熱證最喜用水然多有不愈者至石膏生用性能發汗其熱可由汗解即使服後無汗亦可宣通內蘊之熱由腠理毛孔息息達出人自不覺耳按此證與前證年歲同受病之時亦同而一則輔以熟地枸杞之類以滋眞陰一則更加生石膏以清大熱此

乃隨病脈之虛實活潑加減所以投之輒效也

又按用熟地治寒溫恆爲醫家所訾然遇其人真陰太虧不能支持外感之熱者於治寒溫藥中放胆加熟地以滋真陰恆能挽回人命於頃刻曾治一室女資稟素羸弱得溫病五六日痰喘甚劇治以金匱小青龍湯加石膏一劑喘頓止時屆晚八點鐘一夜安穩至寅時喘復作不若從前之劇而精神恍惚心中怔忡再診其脈如水上浮麻不分至數按之即無此將脫之候也取藥不暇幸有預購山藥兩許急煎服之病少愈此際已疏方收藥方係熟地四兩生山藥一兩野台參五錢而近處藥房無野台參並他參亦鬻盡再至他處又恐誤事遂單煎熟地山藥飲之病愈強半一日之內按其方連進三劑病遂全愈按此證原當用拙擬來復湯

存第一卷

其方重用山萸肉以收脫而當時愚在少年其方猶未

擬出亦不知重用萸肉而自晨至暮共服熟地十二兩竟能救此垂危之證熟地之功用誠偉哉又此證初次失處在服小青龍湯後未用補藥愚經此證後凡遇當用小青龍湯而脈稍弱者服後即以補藥繼之或加人參於湯中恐其性熱可將所加之石膏加重又按張氏八陣趙氏醫貫馮氏錦囊皆喜重用熟地雖外感證亦喜用之其立言誠有偏

處然當日必用之屢次見效而後筆之於書張氏書中載有治一老年傷寒戰而不汗翌日屆其時猶有將汗之意急與一大劑八味地黃湯以助其汗服後遂得大汗悶數時周身皆涼氣息甚微汗猶不止精神昏昏復與原湯一劑汗止而精神亦復夫用其藥發汗即用其藥止汗運用之妙頗見慧心又趙氏書中謂六味地黃湯能退寒溫之實熱致貽後世口實然其言亦非盡不驗憶昔乙酉丙戌數年間之寒溫病熱入陽明府後凡於清解藥中能重用熟地以滋陰者其病皆愈此乃一時氣運使然不可筆之於書以爲定法也又馮氏所著本草謂熟地能大補腎中元氣此亦確論凡下焦虛損大便滑瀉服他藥不效者單服熟地即可止瀉然須日用四五兩煎濃湯服之亦不作悶熟地少用則作悶多用轉不悶少用則無效又善治勞嗽氣不歸根曾治一媼勞喘甚劇十年未嘗臥寢俾每日用熟地煎湯當茶飲之數日即安臥其家反懼甚以爲如此改常恐非吉兆而不知其病之愈也由是觀之熟地能補腎中元氣可知至陳修園則一概抹倒直視熟地爲不可用豈能知熟地哉寒溫傳裏之後其人下焦虛憊太甚者外邪恆直趨下焦作泄瀉亦非重用熟地不能愈歲在癸巳應試都門曾謁一部郎其家有女僕年三十餘得溫病十餘日勢至垂危將昇

於外問還有治否因爲診視其證書夜泄瀉昏不知人呼之不應其脈數至七至按之即無而却無大熱遂用熟地二兩生山藥生杭芍各一兩甘草三錢煎湯一大碗趁熱徐徐灌之盡劑而愈

又一童子年十四五傷寒已過旬日大便滑瀉不止心中怔忡異常似有不能支持之狀脈至七至按之不實醫者辭不治投以熟地生山藥生杭芍各一兩滑石八錢甘草五錢煎湯一大碗徐徐溫飲下亦盡劑而愈

至產後之證忌用寒涼而果係產後溫證心中燥熱舌苔黃厚脈象洪實亦宜投以白虎加人參以山藥代粳米湯而更以玄參代知母則尤妥善蓋愚於產後溫之輕者其熱雖入陽明之府脈象不甚洪實恆重用玄參一兩或至二兩輒能應手奏效若係劇者必白虎加人參以山藥代粳米湯而更以玄參代知母方能有效誠以石膏玄參本經皆明載其治產乳故於產後溫病之輕者可單用玄參至溫病之劇者不妨石膏玄參並用也然用石膏必須佐以人參因其時當產後其熱雖實而體則虛也不用知母者本經未載其治產乳不敢師心自用漫以涼藥治產後也

友人吳瑞五深通醫學尤篤信衷中參西錄諸方用之輒能奏效其姪文博亦知醫有戚家延之治產後病臨行瑞五囑之曰果係產後溫熱陽明胃府大實非用衷中參西錄中白虎加人參以山藥代粳米湯更以玄參代知母不可及至診之果係產後溫證病脈皆甚實文博遵所囑開方取藥而藥坊皆不肯與謂產後斷無用生石膏之理病家因此生疑文博辭歸病家又延醫治數日病勢垂危復求爲診治携藥而往如法服之一劑而愈寧嗽定喘飲 治傷寒溫病陽明大熱已退其人或素虛或在老年至此益形怯弱或喘或嗽或痰涎壅盛氣息似甚不足者

生懷山藥

兩半

甘蔗自然汁

一兩

酸石榴自然汁

六錢

生雞子黃

四個

先將山藥煎取清湯一大碗再將餘三味調入碗中分三次溫飲下約兩點鐘服一次若藥亦涼再服時須將藥碗置開水中溫之然不可過熱恐雞子黃熟服之即無效一周姓叟年近七旬素有勞疾且又有阿片嗜好於季秋患溫病陽明府熱熾盛脈象數而不實喘而兼嗽吐痰稠黏投以白虎加人參湯以生山藥代粳米一劑大熱已退而喘嗽仍不愈且氣息微弱似不接續其家屬惶恐以爲難愈且言如此光景似難再進藥最



曰勿須用藥尋常服食之物即可治愈矣爲開此方病家視之果係尋常食物知雖不對證亦無妨碍遂如法服之二劑全愈

### 蠶胸湯

治寒溫結胸其證胸膈痰飲與外感之邪互相凝結上塞咽喉下滯胃口呼吸不利滿悶短氣飲水不能下行或轉吐出兼治疫證結胸

薑 仁

新炒者貳兩搗

生赭石 研細二兩

蘇 子 炒搗陸錢

芒 硝 肆錢冲服

用水四盅煎取清汁兩鍾先溫服一鍾結開大便通行停後服若其胸中結猶未開過兩點鐘再溫服一鍾若胸中之結已開而大便猶未通下且不覺轉失氣者仍可溫服半鍾傷寒下早成結胸至溫病未經下者亦可成結胸至疫病自口鼻傳入遇素有痰飲者其疹癘之氣與上焦痰飲互相膠漆亦成結胸傷寒論陷胸湯丸三方皆可隨證之輕重高下借用特是大陷胸湯丸中皆有甘遂世俗醫者恆望而生畏至小陷胸湯性雖平和又有吳又可瘟疫忌用黃連之說存於胸中遂亦不肯輕用及遇此等證而漫用開痰破氣利濕之品若橘紅萊菔蒼朮白芥茯苓厚朴諸藥彙集成方以爲較陷胸諸湯丸穩而日病家服之以爲藥性和平坦然無疑不知破其氣而氣愈下陷利其濕而痰愈稠黏如此

用藥真令人長太息者也。愚不得已將治結胸諸成方變通彙萃之於大陷胸湯中取用芒硝於小陷胸湯中取用薤白又於治心下痞硬之旋覆代赭石湯中取用赭石而復加蘇子以爲下行之向導可以代大陷胸湯九少服之亦可代小陷胸湯非欲與傷寒論諸方爭勝也亦略以便流俗之用云爾

一媼年六十餘當孟夏晨飯之際忽聞鄉鄰有鬥者出視之見强者陵弱太甚心甚不平又兼飯後有汗受風遂得溫證表裏俱熱胃口杜塞腹中痛疼飲水須臾仍吐出七八日間大便不通其脈細數按之略實自言心中燥渴飲水又不能受從前服藥止吐其藥亦皆吐出若果能令飲水不吐病猶可望愈愚曰易耳爲開此湯加生石膏二兩野台參五錢煎湯一大碗分三次溫飲下晚間服藥翌晨大便得通而愈當大便未通時曾俾用山黃肉去淨核二兩煎湯以備下後心中怔忡及虛脫及大便通後微覺怔忡服之即安

一室女得溫病兩三日間痰涎鬱塞胸膈滿悶異常頻頻欬吐黏若膠漆且有喘促之意飲水停滯胃口間或吐出其脈浮滑問之微覺頭疼知其表證猶未罷也遂師河間雙解散之意於溫胸湯中加連翹蟬退各三錢服後微汗大便得通而愈

一室女於中秋節後感冒風寒三四日間胸膈滿悶不受飲食飲水一口亦吐出劇時恆以手自撓其胸其脈象滑實右部尤甚本擬用盪胸湯恐其聞藥味嘔吐盪胸湯中不用大黃者爲其氣濃味苦嘔吐者不待藥力施行即吐出然仍不如單用赭石更穩妥遂單用赭石兩半煎湯飲下頓飯頃仍吐出蓋其胃口皆爲痰涎壅滯

僅用赭石兩半藥不勝病下行不通復轉而吐出也又用赭石四兩煎湯一大碗分三次陸續溫飲下胸次雖通飲水不吐翌日脈變洪長其舌苔從前微黃忽改黑色遂重用白虎湯連進兩劑共用生石膏半斤大使得通而愈

一童子年十四歲得溫病六七日間胸膈痰涎壅滯劇時杜塞咽喉兩目上翻身軀後挺有危在頃刻之勢其脈關前洪滑有力其家固設有藥坊愚因謂其父曰此病雖劇易治耳用新炒萸仁四兩用新妙者取其氣香搗碎煮湯一大碗分兩次服下即愈矣蓋彼時盪胸湯猶未

擬出也其家人聞愚言私相計曰如此重病而欲用藥一味治愈之先生果神仙乎蓋譽之而實疑之也其父素曉醫理力主服之盡劑而愈隔數日其鄰家童子亦患此證用新炒萸仁三兩蘇子五錢亦一劑而愈

奉天鼓樓南連奉澡塘曲玉軒得溫病惡心嘔吐五日不能飲食來院求爲診治其脈浮

弦數近六至重按無力口苦心熱舌苔微黃因思其脈象浮弦者少陽陽明二經之氣化挾溫熱之氣上逆也按之無力者吐久不能飲食缺乏水穀之氣也至數近六至者熱而兼虛故逞此數象也因思石膏之性能清熱鎮逆且無臭味但以之煮水飲之或可不吐遂用生石膏細末兩半煎湯兩茶杯分二次溫飲下初次飲未吐至二次仍吐出病人甚覺惶恐加以久不飲食幾難支持愚曰勿恐再用藥末數錢必然能止嘔吐遂單用生赭石細末四錢俾以開水送下須臾覺惡心立止胸次通暢飢而思食遂食薄粥一甌覺下行順利從此不復嘔吐而心中猶覺發熱舌根腫脹言語不利遂用生石膏一兩丹參乳香沒藥連翹各三錢兩劑而愈

奉天大東關安靴舖安顯之夫人年四十許臨產雙生異常勞頓惡心嘔吐數日不能飲食精神昏潰形勢垂危羣醫辭不治延爲診視其脈洪實面有火色舌苔厚而微黃愚曰此產後溫也其嘔吐若是者乃陽明熱實胃腑之氣上逆也投以生赭石玄參

本經謂玄參主產乳

各

一兩一劑而嘔吐止可進飲食繼仍用玄參同白芍連翹以清其餘熱遂全愈

一味萊菔子湯

治同前證

萊菔子

牛者一兩熟者一兩

共搗碎煎湯一大茶杯頓服之

奉天烟酒公賣局科員許壽庵年二十餘得溫病三四日覺中脘鬱結飲食至其處不下行仍上逆吐出來院求爲診治其脈沉滑而實舌苔白而微黃表裏俱覺發熱不甚劇自言素多痰飲受外感益甚因知其中脘之鬱結確係外感之邪與痰飲相凝滯也先投以盪胸湯兩點鐘後仍復吐出爲擬此方一劑結開可受飲食繼投以清火理痰之品兩劑全愈按此證若服盪胸湯將方中赭石細末留出數錢開水送下再服湯藥亦可不吐其結亦必能開非萊菔子湯之力勝於盪胸湯也而試之偶效猶必載此方者爲藥性較盪胸湯尤平易臨證者與病家皆可放胆用之而無疑也若此方不效者亦可改用盪胸湯先將赭石細末送下數錢之法

鎮逆承氣湯

治寒溫陽明府實大便燥結當用承氣下之而嘔吐不能受藥者

芒

硝六錢

赭

石二兩研細

生石膏二兩搗細

潞黨參五錢

右藥四味用水四鍾先煎後三味湯將成再加芒硝煎一兩沸取清汁二鍾先溫服一鐘過三點鐘若腹中不覺轉動欲大便者再溫服餘一鐘

一鄰婦年二十餘得溫病已過十日上焦燥熱嘔吐大便燥結自病後未行延醫數次服藥皆吐出適愚自他處歸診其脈關前甚洪實一息五至餘其脈上盛於下一倍所以作嘔吐其至數數者吐久傷津液也爲擬此湯一劑熱退嘔止大便得通而愈

或問此證胃腑熱實大腸燥結方中何以復用黨參答曰此證多有嘔吐甚劇並水漿不能存者又有初病即嘔吐十數日不止者其胃氣與胃中津液必因嘔吐而大有傷損故用黨參補助胃中元氣且與涼潤之石膏並用大能滋胃中津液俾胃中氣足液生自能運轉藥力下至魄門以通大便也愚用此方救人多矣果遇此等證放胆投之無不效者一人年四十許二便不通嘔吐甚劇不受飲食倩人詢方疑係外感之熱所致問其心中發熱否言來時未嘗言及遂爲約略疏方以赭石二兩以止其嘔吐生杭芍一兩以通小便芒硝三錢以通大便隔日其人復來言服後嘔吐即止二便亦通此時心中發熱且渴如故旣曰如故是其從前原有熱渴之病陽明之腑證已實特其初次遣人未嘗詳言也投以大劑白虎加人參湯一劑而愈按此證亦鎮逆承氣湯證因其證兩次始述明遂致將方中藥品前後兩次分用之其病亦即前後兩次而愈矣

# 衷中參西錄前三期合編第七卷

## 瘟疫瘟疫方

青孟湯

治瘟疫表裏俱熱頭面腫疼其腫或連項及胸亦治陽毒發斑疹

荷

葉

一個用周連邊浮水者良鮮者尤佳

生石膏

搗細一兩

真羚羊角

二錢另煎兌服

知

母

蟬

退

去足七三錢

僵

蠶

二錢

金線重樓

切片二錢

粉甘草

錢半

易繫辭謂震爲萑葦荷生水中藕莖皆中空亦萑葦類也其葉邊平兜莖在中央更有震卦仰孟之象故能稟初陽上升之氣爲諸藥之舟楫能載清火解毒之藥上至頭面且其氣清郁更能解毒逐穢施於疫毒諸證尤宜也至於葉宜取其浮水者以水爲二分輕氣一分養氣化合而成浮水者貼水而生得水面輕氣最多故善發表如浮萍之生於水面而善發汗也

金線重樓一名蚤休一名紫河車草味甘而淡其解毒之功可仿甘草然甘草性溫此藥性涼以解一切熱毒尤勝於甘草故名蚤休言若中一切蠱毒或蝎螫蛇咬或瘡瘍用之而皆可早早止住古蚤與早原相通也古諺讚蚤休曰七葉一枝花深山是我家癰疽遇

着我一似手捻拏蓋此物七葉對生莖腰狀如蓮花一朵自葉中心出莖至巔開花一朵形扁而黃花上有黃絲下垂故又名金線重樓重樓者其葉與花似各作一層也其名紫河車草者蓋紫河爲初生之地點其處蕃多可採之盈車俗名爲草河車誤矣其形狀皮色皆如乾薑若皮不黃而微代紫色者其味必微辣而不甘含有毒性即不可用若無佳者方中不用此味亦可

羚羊角與犀角皆性涼而解毒然犀稟水土之精氣而生爲其稟土之精故能入胃以消胃腑之實熱爲其稟水之精故又能以水勝火兼入心中以消心臟本體之熱力而疫邪之未深入者轉因服犀角後心氣虛冷不能捍禦外邪致疫邪之恣橫竟犯君主之宮此至緊要之關係醫者不可不知羚羊角善清肝胆之火兼清胃腑之熱其角中天生木胎性本條達清涼之中大具發表之力與石膏之辛涼荷葉連翹之清輕升浮者並用大能透發溫疫斑疹之毒火鬱熱而頭面腫處之毒火鬱熱亦莫不透發消除也曾治一六歲孺子出疹三四日間風火內迫喘促異常單投以羚羊角三錢須臾喘止其疹自此亦愈夫疹之毒熱最宜表散清解乃至用他藥表散清解無功勢已垂危而單投以一味羚羊



角即能挽回其最能清解而兼能表散可知也且其能避蠱毒本經原有明文疫病發斑皆挾有毒癘之氣也

僵蠶乃蠶將脫皮時因受風不能脫下而僵之蠶因其病風而僵故能爲表散藥之嚮導而兼具表散之力是以痘疹不出者僵蠶最能表出之不但此也僵蠶僵而不腐凡人有腫疼之處恐其變爲腐爛僵蠶又能治之此氣化相感之妙也今坊間鬻者多用繅絲所剩之蠶充之其蠶能斂戢心火與僵蠶性正相反用此藥者當加審慎必色白而直且分毫無亂絲者乃爲真僵蠶又藥坊中恒誤僵蠶爲薑蠶而以薑水炒之甚非所宜蓋此藥經火炒後則發表之力頓減矣

疫與寒溫不同寒溫者感時序之正氣因其人衛生之道於時序之冷暖失宜遂感其氣而爲病其病者偶有一二人而不相傳染疫者感歲運之戾氣因其歲運失和中含毒氣人觸之即病內經刺法論所謂無問大小病狀相似者是也其病者挨戶挨村若徭役然故名曰疫且又互相傳染也內經本病論有五疫之名後世約分爲寒疫溫疫治溫疫世習用東垣普濟消毒飲治寒疫世習用巢穀世聖散子然溫疫多而寒疫少拙擬之清孟

湯實專爲治溫疫設也

病疫相傳染者以其氣自口鼻而入也其初瀰漫於上焦或煩熱頭疼外薄於營衛或身熱無汗與溫病初得者相似然溫病初得用辛涼解肌即可愈若疫病則必須兼用解毒之藥至其傳經已深所現之證有與寒溫相似者皆可用治寒溫之藥治之然始終宜佐以解毒之藥究之其變證多端萬言難罄方書中惟喻氏醫門法律陸氏世補齋論之甚詳今錄二家之說於左以備參考

喻嘉言曰聖王御世春無愆陽夏無伏陰秋無淒風冬無苦雨乃至民無夭札物無疵癘太和之氣瀰漫乾坤安有所謂瘟疫哉然而周禮儺以逐疫方氏掌之則瘟疫之由來古有之矣鄉人儺孔子朝服而致其誠敬蓋以裝演巨像爲儺人不過彷彿其形聖人以正氣充塞其間俾疫氣潛消迺育之實功耳古人元旦汲清泉以飲芳香之藥上已採蘭草以襲芳香之氣重滌穢也後漢張仲景著傷寒論欲明冬寒春溫夏秋暑熱之正自不能併入疫病以混常法然至理已畢具於脈法中夫四時不正之氣感之者因而致病初不名爲疫也因病致死病氣尸氣混合不正之氣斯爲疫矣以故雞瘟死雞猪瘟死猪牛

馬瘟死牛馬推之於人何獨不然所以饑饉兵凶之際疫病盛行大率春夏之交爲甚蓋溫暑濕熱之氣交結互蒸人在其中無隙可避病者當之魄汗淋漓一人病氣足充一室况連牀並榻沿戶闔境共釀之氣益以出戶尸蟲載道腐瑾燔柴掩席委壑投崖種種惡穢上瀾蒼天清淨之氣下敗水土物產之氣人受之者親上親下病從其類有必然之勢也如世俗所稱大頭瘟者頭面腮頰腫如瓜瓢者是也所稱蝦蟇瘟者喉痺失音頸筋脹大者是也所稱瓜瓢瘟者胸高脇起嘔汁如血者是也所稱疔瘡瘟者偏身紅腫發塊如榴者是也所稱絞腸瘟者腹鳴乾嘔水瀉不通者是也所稱軟腿瘟者便清泄白足里難移者是也小兒痘疹尤多以上疫證不明治法咸謬之世運良可傷悼大率瘟疫痘疹古昔無傳不得聖言折衷是以多人迷途曾不若俗見摸索病狀反可顧名思義昌幸微窺仲景一斑其平脈篇有謂係叔和所作者然其文甚古奧中云寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛痠所謂陽中霧露之氣故清邪中上濁邪中下陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相瀾內外

不通上焦拂鬱藏氣相薰口爛食斷也中焦不治胃氣上衝脾氣不能轉胃氣爲濁營衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經絡出入臟腑熱氣所過則爲癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣入內噎而出之聲嗌咽寒寒厥相逐爲熱爲擁血凝自下狀如豚肝陰陽相厥脾氣孤弱五液注下下焦不閭清便下重令便數難臍築湫痛命將難全凡二百六十九字闡發奧理全非傷寒中所有之事乃論疫邪從入之門變病之總所謂赤文綠字開天闢地之寶符人自不識耳篇中大意謂人之鼻孔通於天故陽中霧露之邪者爲清邪自鼻氣而上入於陽則發熱頭疼頸攣正與俗稱大頭瘟蝦蟇瘟之說符也人之口氣通於地故陰中水土之邪者爲飲食濁味自口舌而下入於陰則其人必先內慄足膝逆冷便溺妄出清便下重臍築湫痛正與俗稱絞腸瘟軟脚瘟之說符也然從鼻口所入之邪必先注中焦以次分布上下故中焦受邪因而不治則胃中爲濁營衛不通血凝不流其釀變即現中焦俗稱瓜瓢瘟瘡瘡證則又陽毒癰膿陰毒偏身青紫之類也此三焦定位之邪也若三焦邪瀰而爲一內外不通藏氣薰蒸上焦拂鬱則口爛食斷若衛氣前通者因熱作使游行經絡藏府則爲癰膿營氣

前通者因召客邪噓出聲噎咽寒熱擁不行而下血如豚肝然以營衛漸通故非危候若上焦之陽下焦之陰兩不相接則脾氣於中難以獨運斯五液注下下焦不闔而命難全矣傷寒之邪先行身之背次行身之前次行身之側由外廓而入瘟疫之邪則直行中道流布三焦上焦爲清陽故清邪從之上入下焦爲濁陰故濁邪從之下入中焦爲陰陽交界凡清濁之邪必從此區分甚者三焦相瀾上行極而下行極而上故聲噎咽塞口爛食斷者亦復下血如豚肝非定中上不及下中下不及上也傷寒邪中外廓故一表即散疫邪行在中道故表之不散傷寒邪入胃腑則腑滿便結故可攻下疫邪在三焦散漫不收下之復合治法未病前預飲芳香正氣藥則邪不能入此爲上也邪既入即以逐穢爲第一義上焦如霧升而逐之兼以解毒中焦如漚疏而逐之兼以解毒下焦如瀆決而逐之兼以解毒營衛既通乘勢追拔勿使潛滋

陸九芝曰內經五疫之至各隨其所值之年由伏而發其治盡於木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之五法蓋治疫獨講太少之五運與司天主客之六氣就寒溫兩面而言却是溫疫多而寒疫少故五運之有木火土金水半寒而半溫也六氣之有濕

寒寒濕風火火風燥火火燥也溫又多於寒也然正不得以溫多於寒而遂置寒疫於不問也周禹載於溫獨說春溫而於疫又獨說溫疫則既不解溫之無寒又不解疫之有寒故耳黃坤載則知有寒疫矣然於溫疫則曰無內熱無內熱何以謂之溫乎於寒疫則反用石膏用石膏何以謂之寒乎喻嘉言論疫專主三焦頗得治疫之法坤載於疫偏說六經夫疫之小者不分經絡疫之大者頃刻變生尙何六經傳徧之有只是仲景六經之藥不外溫清兩法以之分治兩疫亦爲甚合大抵以溫而疫則論中苓連梔柏之統於膏黃者可用也以寒而疫則論中吳萸蜀椒之統於薑附者可用也余獨舉運氣一方冠其首而又舉普濟消毒飲之治溫疫者以蓋清法舉如聖散子之治寒疫者以蓋溫法而禹載之惑可解坤載之混可別及嘉言治溫而用薑附即鞠通本之而用桂枝者皆可刪總而言之不傳染而有熱無寒者是曰溫傳染而有熱有寒者是爲疫不得以治寒疫者治溫疫更不得以治寒疫治溫病也

一婦人年四十許得大頭瘟證頭面腫大疼痛兩目腫不能開上焦煩熱心中怔忡彼家誤爲瘡毒竟延瘍醫治療醫者自出藥末敷頭面疼稍愈求其出方治煩熱怔忡彼言專

習外科不管心中之病時愚應他家延請適至其村求爲診治其脈洪滑有力關前益甚投以清孟湯將方中石膏改用二兩煎汁兩茶鐘分二次溫飲下盡劑而愈

一人年三十餘初則感冒發頤數日領下頸項皆腫延至膺胸漸腫而下其牙關緊閉惟自齒縫可進稀湯而咽喉腫疼又艱於下咽延醫調治服清火解毒之藥數劑腫勢轉增時當中秋節後淋雨不止因病勢危急冒雨驅車迎愚既至見其領下連項壅腫異常狀類時毒<sup>疔中有時毒證</sup>撫之硬而且熱色甚紅純是一團火毒之氣下腫已至心口自牙縫中進水半口必以手掩口十分努力始能下咽且痰涎壅滯胸中上至咽喉並無容水之處進水少許必換出痰涎一口且覺有氣自下上衝常作呃逆連連不止診其脈洪滑而長重按有力兼有數象愚謂病家曰此世俗所稱蝦蟆瘟也毒熱熾盛盤踞陽明之府若火之燎原必用生石膏清之乃可緩其毒熱之勢從前醫者在座謂曾用生石膏一兩毫無功效愚曰石膏乃微寒之藥本經原有明文如此熱毒僅用兩許何能見效遂用生石膏四兩清半夏四錢金線重樓三錢連翹蟬退各一錢煎服後覺藥停胸間不下其熱與腫似有益增之勢知其證兼結胸火熱無下行之路故益上衝也幸藥坊即在本村復急取生石

膏四兩赭石三兩又煎湯徐徐溫飲下仍覺停於胸間又急取赭石三兩萆仁二兩芒硝八錢又煎湯飲下胸間仍不開通此時咽喉益腫再飲水亦不能下病家惶恐無措愚曉之曰我所以亟亟連次用藥者正爲此病腫勢寢長恐稍遲緩則藥不能進今其胸中既貯如許多藥斷無不下行之理藥下行則結開便通毒火隨之下降而上焦之腫熱必消矣時當晚十點鐘至夜半覺藥力下行黎明下燥糞數枚上焦腫熱覺輕水漿可進晨飯時牙關亦微開服茶湯一碗午後腫熱又漸增撫其胸熱猶烙手脈仍洪實意其燥結必未盡下遂投以大黃四錢芒硝五錢又下燥糞兼有溏糞病遂大愈而腫處之硬者仍不甚消胸間撫之猶熱脈象亦仍有餘熱又用生石膏三兩金銀花連翹金線重樓各數錢煎汁一大碗分數次溫飲下日服一劑三日全愈

按此證二次用石膏赭石之時即宜加大黃芒硝

一人年二十餘得溫疫三四日間頭面悉腫其腫處皮膚內含黃水破後且潰爛身上間有斑點聞人言此證名大頭瘟其潰爛之狀又似瓜瓢瘟最不易治懼甚求爲診視其脈洪滑而長舌苔白而微黃問其心中惟覺煩熱嗜食涼物遂曉之曰此證不難治頭面之腫爛周身之斑點無非熱毒入胃而隨胃氣外現之象能放胆服生石膏可保全愈遂投



以青孟湯方中石膏改用三兩知母改用八錢煎汁一大碗分數次溫飲下一劑病愈強半翌日於方中減去荷葉蟬退又服一劑全愈

按發斑之證異於疹者以其發處不高以手拂之與膚平也其證有陽毒陰毒之分陽毒發斑係陽明毒熱傷血所致陰毒發斑或爲寒疫之毒或因汗吐下後中氣虛乏或因過服涼藥遂成陰證寒伏於下逼其無根之火上獨薰肺而發斑其色淡紅隱隱見於肌表與陽證發斑色紫赤者不同愚生平所治發斑皆係陽證至陰證實未之見其證之甚少可知然正不可因陰證者甚少而陰陽之際不詳辨也今採古人陽毒陰毒發斑治驗之案數條於左以備參觀庶幾胸有定見臨證時不至誤治也

呂滄洲云一人傷寒十餘日身熱而靜兩手脈盡伏醫者以爲壞證弗與藥余診之三部脈舉按皆無舌苔滑兩顙赤如火語言不亂因告之曰此子必大發赤斑周身如錦紋夫血脈之波瀾也今血爲邪熱所搏掉而爲斑外現於皮膚呼吸之氣無形可倚猶溝渠之水雖有風不能成波瀾也斑消則脈出矣及揭其衾而赤斑爛然與白虎加人參湯化其斑脈乃復常按發斑至於無脈其證可謂險矣即遇有識者細診病情以爲可治亦必謂

毒火鬱熱盤踞經絡之間以阻塞脈道之路耳而滄洲獨斷爲發斑則傷血血傷則脈不見是誠滄洲之創論然其言固信而有徵也憶己亥春嘗治一少年吐血證其人大口吐血數日不止脈若有若無用藥止其血後脈因火退轉分毫不見愚放胆用藥調補之竟得無恙

此證詳案在第二卷寒降湯下

夫吐血過多可至無脈以徵滄洲血傷無脈之說確乎可信此陽毒發斑也

許叔微治一人內寒外熱而發斑六脈沉細肩背胸脇斑出數點隨出隨隱旋更發出語言狂亂非讖語也肌表雖熱以手按之須臾冷透如冰與薑附等藥數服後得大汗而愈此陰毒發斑也

吳仁齋治一人傷寒七八日因服涼藥太過遂變身冷手足厥逆通身黑斑惟心頭溫暖乃伏火也診其六脈沉細昏沉不知人事亦不能言語狀似尸厥遂用人參三白湯加熟附子半枚乾薑二錢水煎服下待一時許斑色漸紅手足漸暖而甦醒後復有餘熱不清此伏火後作也以黃連解毒湯竹葉石膏湯調之而愈此陰毒發斑中有伏陽也

虞天民曰有內傷證亦出斑疹但微見紅此胃氣極虛一身之火遊行於外當補益氣血

則中有主而氣不外遊榮有養而血不外散此證尤當慎辨洪吉人解之曰按此證與陽毒發斑不同亦與陰毒發斑不同其方當用補中益氣湯加歸芍之類

瘟毒之病有所謂羊毛瘟者

亦名羊毛疹

其證亦係瘟疫而心中兼有撩亂之證若視其前後對

心處有小瘰

俗名疙疸

以針鼻點之其頂陷而不起其中即有白毛當以針挑出之若恐挑之

不淨可用發麪饅饅去皮雜以頭髮少蘸香油周身搓擦再審其證之虛實涼熱投以治疫病之藥即愈此證古書不載而今人患此證者甚多其白毛即周身之汗毛大抵因有汗受風閉其毛孔而汗毛不能外出因不外出所以作白色

若用黃酒和蕎麥麵擦之更好

護心至寶丹

治瘟疫自肺傳心其人無故自笑精神恍惚言語錯亂

生石膏

搗細二兩

人

參二錢

犀

角二錢

羚羊角

二錢

硃

砂研細三分

牛

黃研細一分

將藥前四味共煎湯一茶盅送服硃砂牛黃末

此證屬至危之候非尋常藥餌所能療治故方中多用珍異之品藉其實氣以解入心之熱毒也

瘟疫之毒未入心者最忌用犀角於前青孟湯下曾詳言之而既入心之後犀角又爲必須之藥

按瘟疫之毒隨呼吸之氣傳入原可入肺心與肺同居膈上且左心房之血脈管與右心房之回血管又皆與肺循環相通其相傳似甚易而此證不常有者因有包絡護於心上代心受邪由包絡下傳三焦爲手厥陰少陽臟腑之相傳此心所以不易受邪也愚臨證二十餘年僅遇一媼患此證爲擬此方服之而愈

清疹湯 治小兒出疹表裏俱熱或煩躁引飲或喉疼聲啞或喘逆欬嗽

生石膏 搗細一兩

知母 六錢

羚羊角 二錢

金線重樓 切斤錢半

薄荷葉 二錢

青連翹 二錢

蟬退 去足土錢半

僵蠶 二錢

用水煎取清湯一盅半分二次溫飲下以服後得微汗爲佳若一次得微汗者餘藥仍可再服若服一次即得大汗者餘藥當停服此藥分量係治七八歲以上者若七八歲以下者可隨其年之大小斟酌少用或將藥減半或用三分之一皆可

喉疼聲啞者可將石膏加重五錢合前得兩半若疹出不利者用鮮葦根活水一中更佳一大握去

節水煎沸用其水煎藥

疹證多在小兒想小兒臟腑間原有比毒又外感時令之毒氣而發則一發表裏俱熱若溫病初得之劇者其陽明經府之間皆爲熱毒之所瀰漫故治此証始則發表繼則清解其有實熱者皆宜用石膏至喉疼聲啞者尤爲熱毒上衝石膏更宜放胆多用惟大便滑瀉者石膏知母皆不宜用可去此二藥加滑石一兩甘草三錢蓋即滑瀉亦非涼證因燥渴飲水過多脾胃不能運化故也故加滑石以利其小便甘草以和其脾胃以緩水飲下趨之勢若其滑瀉之甚者可用拙擬滋陰宣解湯

在第五卷

既可止瀉又可表疹外出也然此

證最忌滑瀉恐其毒因滑瀉內陷即不能外出若服以上方而滑瀉不止可用生山藥兩許軋細煮作粥再將熟雞子黃兩三枚捏碎調粥中服之其滑瀉必止瀉止後再徐徐以涼藥清補之

羚羊角最爲治疹良藥於前青孟湯後曾論及之惜此藥今昂貴坊間且多以他角僞充若係整者其角上有節若螺紋而非若螺紋之斜繞至其角尖二寸許則無螺紋矣其中有木胎作蒼黃參半之色

其色似木非真木也

是爲眞者可剉取其周遭及角尖用時另煮兌藥中服

或與所煮他藥前後隨服皆可蓋以其藥珍重不欲以他藥渣溷之也若藥坊已切成片真偽亦可辨其真者片甚硬其中碎片甚多以其硬而脆故也其色有直白者有間帶蒼黃之色者即其近木胎處也且以火燃之無腥臭氣而轉有清郁之氣

角上之節有假作旋成者細審可辨

壬寅之歲曾訓蒙於邑之仁村愚之外祖家也季春夜半表弟劉銘軒叩門求方言其子

年六歲

於數日間出疹因其苦於服藥強令服即作嘔吐所以未來詢方今夜忽大喘不止

有危在頃刻之勢不知還可救否遂與同往視之見其不但喘逆迫切且精神恍惚肢體騷擾不安脈象搖搖而動按之無根知其毒火內攻而肝風已動也爲其苦於服藥遂但取羚羊角三錢幸藥坊即本村須臾藥至急煎成湯視其服下過二十分鐘即安然矣其疹從此亦愈其舅孫寶軒滄州名醫也翌日適來省視見愚所用羚羊角訝爲仙方

此證於青孟湯

下曾略言之

奉天北關友人朱貢九之喆嗣文治年五歲於庚申立夏後周身壯熱出疹甚稠秘脈甚洪數舌苔白厚知其疹而兼瘟也欲以涼藥清解之因其素有心下作疼之病出疹後食食鮮果前一日猶覺疼又不敢投以重劑遂勉用生石膏玄參各六錢薄荷葉蟬退各一

錢連翹二錢晚間服藥至翌日午後視之其熱益甚喉疼氣息甚粗鼻翹煽動且自鼻中出血少許有煩躁不安之意愚不得已重用生石膏三兩玄參麥冬心帶各四錢仍少佐以薄荷葉連翹諸藥俾煎湯二茶鐘分三次溫飲下至翌日視之則諸證皆輕減矣然餘熱猶熾而大便雖下一次仍係燥糞詢其心猶發熱脈仍有力遂於涼解藥中仍用生石膏一兩連服兩劑壯熱始退繼用涼潤清解之劑調之全愈

按此證初次投以生石膏玄參各六錢其熱不但不退而轉見增加則石膏之性原和平確非大涼可知也至其證現種種危象而放胆投以生石膏三兩又立能挽回則石膏對於有外感實熱諸證直勝金丹可知近世篤信西術者恆目石膏爲無用之物彼亦曾親自試驗若愚之放胆用生石膏乎蓋彼所謂石膏無用者不過用石膏四五錢極多或至一兩如此以治壯盛之火則誠無用矣若更用燬者則不惟無用而且足害人矣理詳例言石膏條下夫人非聖神何能出言皆是世人素重其人竟於其出言偶差者亦篤信之誤人即不可勝計愚願負當世哲學之名者其於出言之際尙自加審慎哉

又此證因心下素有疼病故石膏玄參初止用六錢若稍涉游移並石膏玄參亦不敢用

再認定疹毒宜托之外出而多用發表之品則翌日現證之危險必更加劇即後投以大劑涼藥亦不易挽回也目睹耳聞知孺子罹痘疹之毒爲俗醫藥誤者甚多故於記此案時而再四詳爲申明夫孺子何辜疾厄可憫孰任救人之責者尙其深思愚言哉

瘟疫之證雖宜用寒涼然須謹防其泄瀉若泄瀉則氣機內陷即無力托毒外出矣是以愚用大劑寒涼治此等證時必分三四次徐徐溫服下俾其藥力長在上焦及行至下焦其寒涼之性已爲內熱所化自無泄瀉之弊而始終又須以表散之藥輔之若薄荷連翹蟬退僵蠶之類則火消毒淨疹愈之後亦斷無他患矣至若升麻羌活之藥概不敢用友人劉仲華濟南博雅士也精通醫學曾治一孺子出疹剛見點即回醫者用一切藥皆不能表出毒氣內攻勢甚危急衆皆束手仲華投以傷寒論麻杏甘石湯一劑疹皆發出自此遂愈夫麻杏甘石湯爲汗後下後汗出而喘無大熱者之方仲華用以治疹竟能挽回人命於頃刻可爲善用古方者矣

用此方者當視其熱度之高低熱度高者石膏用一兩麻黃用一錢熱度低者石膏用一兩麻黃用二錢

前賢善治小兒者首推錢仲陽方書載有睦親宮十太尉病瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何臟腑一醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言疹在母腹中有毒錢氏曰若胃氣熱



何以乍涼乍熱若言在母腹中有毒屬何臟也醫曰在脾胃錢氏曰既在脾胃何以驚悸夫胎在腹中月至六七則已成形食母穢液入兒五臟食至十月滿胃腕中至生之時口有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汁壓之方下臍糞及涎穢也此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒入而成瘡疹未出五臟皆見病證內一臟受穢多者乃出瘡疹初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面腮赤頰赤嗽噴嚏此五臟證俱見呵欠頓悶肝也時發驚悸心也乍涼乍熱手足冷脾也面赤腮頰赤噴嚏肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故凡瘡疹乃五臟毒若出歸一證肝水泡肺膿疱心斑脾疹惟腎不食穢毒而無諸證瘡黑者屬腎由不慎風冷而不飽內虛也又用抱龍丸數服愈以其別無他候故未發出則見五臟證既出則歸一臟矣按此論實能將疹之由來闡發無餘蘊矣嘗讀趙疇初醫話稿謂斑疹之證恆有發於腸胃噎膈之間因肌膚間不見往往不知爲斑疹而誤治者愚初因無徵未能確信後見有猪病瘟死者剖解視之其臟腑間皆有紅點甚多由斯觀之斑疹內發而外不見之說確乎可信斯在臨證者精心考驗見有若發斑疹病狀而外不見斑疹亦甚用治斑疹之法治之也

瘧疾方

加味小柴胡湯

治久瘧不愈脈象弦而無力

柴胡三錢

黃芩三錢

知母三錢

潞參三錢

鱉甲醋炙三錢

清半夏二錢

常山酒炒錢半

草果一錢

甘草一錢

酒麴三錢

生薑三錢

大棗棹開兩枚

瘧初起者減潞參鱉甲熟甚者加生石膏五六錢或至一兩寒甚者加草果五分或至一錢神麴皆發不好故方中用酒麴

瘧邪不專在少陽而實以少陽爲主故其六脈恆露弦象其先寒者少陽之邪外與太陽併也其後熱者少陽之邪內與陽明併也故方中用柴胡以升少陽之邪草果生薑以祛太陽之寒黃芩知母以清陽明之熱又瘧之成也多挾痰挾食故用半夏常山以豁痰酒麴以消食也用人參因其瘧久氣虛扶其正即所以逐邪外出用鱉甲者因瘧久則脇下結有痞積方書名瘧母實由肝脾脹大消其痞積然後能斷瘧根株用甘草大棗者所以化常山之猛烈而服之不至瞑眩也

或問葉氏醫案其治瘧之方多不用柴胡其門人又有相傳之說謂不宜用柴胡治瘧若誤用之實足僨事其說果可信乎答曰葉氏當日聲價甚高瘧原小疾初起之時鮮有延之診治者迨至瘧久而虛證歧出恆有瘧邪反輕而他病轉重但將其病之重者治愈而瘧亦可隨愈此乃臨證通變之法非治瘧之正法也至於病在厥陰亦有先寒後熱出汗少愈形狀類瘧之證此係肝氣虛極將脫若誤認爲瘧用柴胡升之凶危立見此當重用山茱肉以斂而補之

觀第一卷來復湯後醫案自明其理

是以本經山茱萸亦主寒熱也葉氏門人所謂誤用柴

胡足僨事者大抵指此類耳

或問葉氏治瘧遇其人陰虛燥熱者恆以青蒿代柴胡後之論者皆讚其用藥得化裁通變之妙不知青蒿果可以代柴胡乎答曰瘧邪伏於脇下兩板油中乃足少陽經之大都會柴胡之力能入其中升提瘧邪透膈上出而青蒿無斯力也若遇陰虛者或熱入於血分者不妨多用滋陰涼血之藥佐之若遇燥熱者或熱盛於氣分者不妨多用清燥散火之藥佐之曾治一人瘧間日一發熱時若燔即不發瘧之日亦覺心中發熱舌燥口乾脈象弦長

凡瘧脈皆弦

重按甚實知其陽明火盛也投以大劑白虎湯加柴胡三錢服後頓覺心中

清爽翌晨瘧即未發又煎前劑之半加生薑三錢服之而愈又嘗治一人得溫病熱入陽明之府舌苔黃厚脈象洪長又間日一作寒熱此溫而兼瘧也然其人素有阿片嗜好病雖實而身體素虛投以拙擬白虎加人參以麥冬代知母山藥代粳米湯在第六卷亦少加柴胡兩劑而愈

或問太陽主皮膚陽明主肌肉少陽介於皮膚肌肉之間故可外與太陽併內與陽明併今言瘧邪伏於脇下兩板油中則在陽明之裏矣又何能外與太陽併內與陽明併答曰此段理解至精至奧千古未發今因子問愚特詳悉言之人身十二經手足各六其他手足同名之經原各有界限獨少陽經內經謂之游部所謂游部者其手足二經一脈貫通自手至足自足至手氣化游行而毫無滯碍也故方書論三陽之次第外太陽其內少陽又其內陽明是少陽在太陽之內陽明之外也此指手少陽而言乃肥肉瘦肉中間之脂膜以三焦三焦詳解在第五卷少柴胡湯解下爲府者也至其傳經之先後則由太陽而陽明由陽明而少陽是少陽不惟在太陽之內並在陽明之內也此指足少陽而言即兩脇下之板油以胆爲府者也瘧邪伏於其中其初發也由板油而達三焦由三焦而及肥肉瘦肉間之脂膜遂可

與太陽相併而爲表寒之證此太陽指太陽之經而言非指府也迨至瘡邪不能外出鬱而生熱其熱由肌肉而內陷緣三焦直達於胃三焦即膜油原與胃相連遂可與陽明相併而成裏熱之證此指陽明之府而言胃爲陽明之府非指經也若但認爲陽明之經相併其熱惟在於肌肉間何何以瘡當熱時脈現洪實不但周身發熱胃中亦覺大熱而嗜飲涼水乎蓋古籍立言間括經府未嘗指明後世方書又不明少陽爲游部之理而分手足少陽爲二經是以對於此等處未有一顯明發揮者

西人治瘡恆用雞納霜於未發瘡之日午間晚間各服半瓦白糖水送下至翌晨又如此服一次其瘡即愈

按雞納霜係用雞納樹皮熬煉成霜其樹生於南美洲其皮有紅者黃者金黃者煉霜以其皮金黃者爲上故又稱金雞納霜此藥又名規尼涅若製以硫酸名硫酸規尼涅製以鹽酸名鹽酸規尼涅性皆涼而鹽酸者較尤涼若治瘡宜用鹽酸者省文曰鹽規爲其爲樹皮之液煉成故能入三焦外達腠理而發汗腠理係皮裏之膜亦屬少陽方書有謂係肥肉瘦肉中間之膜者非是爲三焦爲手少陽之府原與足少陽一脈貫通故又能入脇下板油之中搜剔瘡邪之根蒂也

治瘧便方有單用密陀僧者然其藥製之不能如法輕率服之實與性命有關醫話稿曾載有醫案可考也即製之如法服之爲行險之道

### 霍亂方

#### 急救回生丹

治霍亂吐瀉轉筋諸般痧證暴病頭目眩暈咽喉腫疼赤痢腹疼急性淋

證霍亂之證西人所謂虎列拉也因空氣中有時含有此毒而地面積穢之處又釀有毒

氣與之混合

觀此證起點多在大埠不潔之處可知

隨呼吸之氣入肺由肺傳心胞

即心肺相連之脂膜

由心胞傳三焦

上焦心中焦

包脾連胃脂膜下焦絡腸包腎脂膜

爲手厥陰少陽臟腑之相傳然其毒入三焦其中人中氣充盛無隙可乘猶伏

而不動有時或飲食過量或因寒涼傷其脾胃將有吐瀉之勢毒即乘虛內襲盤據胃腸

上下不通遂揮霍撩亂而吐瀉交作矣吐瀉不已其毒可由腸胃而入心

胃大絡虛里小腸乳糜管皆與心相通其證間

有自心胞直傳心者多不及治

更由心而上竄於腦

心有四支血脉通腦

致腦髓神經與心俱病左心房輸血之力與右

心房收血之力爲之頓減是以周身血脉漸停而通體皆涼也其證多發於秋際者因此

毒氣釀成多在夏令入當暑熱之時周身時有汗此毒之伏於三焦者猶得隨汗些些

外出迨至秋涼汗閉其毒不得外出是以蓄極而動乘脾胃之虛而內攻也故治此症者

當以解毒之藥爲主以助心活血之藥爲佐以調陰陽奠中土之藥爲使爰擬方於左名之曰急救回生丹

硃砂頂高者壹錢五分 此藥爲水銀硫黃二原質合成此二原質皆善消毒菌化合爲硃砂又色赤入心能解心中竄入之毒且又重墜善止嘔吐俾服藥後不致吐出冰片叁分 真好冰片出於杉樹及加爾普斯科樹其次者係樟腦煉成此方中冰片宜用樟腦煉成者因樟腦之性原善振興心臟通活周身血脈尤善消除毒菌特其味稍劣煉之爲冰片味較清馥且經煉而其力又易上升至腦以清腦中之毒也

薄荷冰二分 此藥善解虎列拉之毒西人屢發明之且其味辛烈香竄無竅不通無微不至周身之毒皆能掃除矧與冰片又同具發表之性服之能作汗解使內蘊之邪由汗透出且與冰片皆性熱用涼無論症之因涼因熱投之咸宜也

西藥房名薄荷冰爲薄荷腦

粉甘草細末一錢 此藥最善解毒又能調和中宮以止吐瀉且又能調和冰片薄荷冰之氣味使人服之不至過於苛辣也

右藥四味共研細分作三次服開水送下約半點鐘服一次若吐劇者宜於甫吐後急服

之若於將吐時服之恐藥未暇展布即吐出服後溫覆得汗即愈服一次即得汗者後二次仍宜服之若服完一劑未全愈者可接續再服一劑若其吐瀉已久氣息奄奄有將脫之勢但服此藥恐不能挽回宜接服後急救回陽湯

方在後

已未秋奉天霍亂盛行時愚在奉天立達醫院擬得此方用之甚效適值警務處長蓮波王君任防疫總辦問愚有何良方救此危險之證因語以此方王君言若藥坊間配製恐不如法即煩院中爲製三十劑分於四路防疫所若果效時後再多製愚遂親自監視精製三十劑付之翌日來信言藥甚效驗又俾製五十劑又翌日來信言此藥效驗異常又俾製一百二十劑愚方喜此藥可以廣傳救人疾苦孰意翌日自京都購得周氏回生丹到此藥即停止矣因思自古治霍亂無必效之方此方既如此效驗若不自我傳徧寰區恐難告無罪於同胞遂將霍亂之病由與治法及用法之意詳書一紙登諸報章又將登報之文寄於直隸故城縣知事友人袁霖普而袁君果能用方救人若干推行徧於直隸山東諸州縣

(附記)直隸故城縣知事袁霖普來函論急救回生丹之效果



壽甫仁兄雅鑒前次寄來急救回生丹方不知何以斟酌盡善初故城開疫按方施藥六十劑皆隨手輒效後故城外鎮鄭家口開疫又施藥二百劑又莫不全活繼遂將其方刷印數百張直隸百餘縣山東數十縣每縣署寄去一張目下又呈明省長登北洋公報矣錫類推仁我兄之功德真無量哉

### 衛生防疫寶丹

治霍亂吐瀉轉筋下痢腹疼及一切痧症平素口含化服能防一切病

### 疫傳染

粉甘草

細末十兩

細

辛 細末兩半

香白芷

細末一兩

薄荷水

細末四錢

冰

片 細末二錢

硃

砂 細末三兩

先將前五味和勻用水爲丸如桐子大不宜日晒再用硃砂爲衣勿令餘膽裝以布袋雜以琉珠來往撞盪務令光滑堅實如此日久可不走氣味若治霍亂證宜服八十九丸開水送服餘證宜服四五十丸服後均宜溫覆取微汗若平素含化以防疫癘自一九至四五丸皆可此藥又善治頭疼牙疼含化心下脇下及周身關節經絡作疼氣鬱痰鬱食鬱呃逆嘔噦醒腦養神在上能清在下能溫種種利益不能悉數

〔附記〕奉天撫順縣瓢爾屯煤礦經理尙席珍君來函論衛生防疫寶丹之效果

壽甫仁兄偉鑒向在院中帶來衛生防疫寶丹二百包原備礦上工人之用後值霍亂發生有工人病者按原數服藥四十九病愈強半又急續服四十九遂脫然全愈後有病者數人皆服藥八十九中有至劇者一人一次服藥一百二十九均萬全治愈近處有此證者爭來購求此藥亦服之皆愈一方呼爲神丹二百包倏忽告盡乞於郵便再爲寄數百包來以救生命是所切盼

〔附記〕直隸故城縣知事袁霖普君來函論衛生防疫寶丹之效果

壽甫仁兄道鑒前接衛生防疫寶丹方弟照方配製不料時疫盛行各縣染此病者傷人甚夥弟除傳布各縣各鄉之外前後已配藥六大料救活病人已及千矣刻又陳請省長警務處長登之北洋公報使各縣皆得知之人之欲善誰不如我倘各縣均肯捨藥則救人無算矣弟雖費錢不少然私心竊慰愈徵我兄爲救世之人非偶然也翹首北望不勝欣頌兼爲羣黎致謝焉

按此二方後方較前方多溫藥兩味前方性微涼後方則涼熱平均矣用者斟酌於病因

涼熱之間分途施治可也後方若臨證急用不暇爲丸可製爲散每服一錢效更速

急救回陽湯 治霍亂吐瀉已極精神昏昏氣息奄奄至危之候

潞黨參 八錢

生山藥 一兩

生杭芍 五錢

山萸肉 去淨核八錢

炙甘草 三錢

赭石 研細四錢

硃砂 研細五分 先用童便半鍾燉熱送下硃砂繼服湯藥

以上二方皆爲治霍亂之要藥矣然彼以祛邪爲主此以扶正爲主誠以得此證者往往因治不如法致日夜吐瀉不已虛極將脫危在目前病勢至此其從前之因涼因熱皆不暇深究惟急宜重用人參以回陽山藥芍藥以滋陰山萸肉以斂肝氣之脫

此證吐瀉之始肝木助邪侮上吐瀉

之極而肝氣轉先脫

炙甘草以和中氣之瀉此急救回陽湯所以必需也用赭石者不但取其能止嘔

吐俾所服之藥不至吐出誠以吐瀉已久陰陽將離赭石色赤入心

赭石含養氣三分故能上行

能協同人

參助心氣下降

赭石具鐵質七分故能下降

而方中山藥又能溫固下焦滋補真陰協同人參以回腎氣之

下趨使之上行也用硃砂且又送以童便者又以此時百脈閉塞係心臟爲毒氣所傷將

熄其鼓動之機故用硃砂直入心以解毒又引以童便使毒氣從尿道瀉出而童便之性

又能啓發腎中之陽上達以應心臟也是此湯爲回陽之劑實門交心腎和陰陽之劑也服此湯後若身溫脈出覺心中發熱有煩躁之意者宜急滋其陰分若玄參生芍藥之類加甘草以和之煎一大劑分數次溫飲下此傷寒論太陽篇先用甘草乾薑湯繼用甘草芍藥湯之法也

門人高如璧曾治一少婦吐瀉一晝夜甚是困憊濃煎人參湯送服益元散而愈蓋獨參

湯能回陽益元散能滋陰又能和中

滑石甘草能和中以止吐瀉

解毒

甘草硃砂能解毒

且可引毒氣自小便出是以

應手奏效此亦拙擬急救回陽湯之意也

此證之轉筋者多因吐瀉不已肝木乘脾氣之虛而侮土故方書治轉筋多用木瓜以其酸能斂肝即所以平肝也然平肝之藥不必定用木瓜壬寅秋際霍亂流行曾單用羚羊角三錢治愈數人因羚羊角善解熱毒又爲平肝之妙藥也又曾有一人向愚詢治泄瀉之方告以酸石榴連皮搗爛煎湯服之後值霍亂發生其人用其方治霍亂初起之泄瀉者服之瀉愈而霍亂亦愈由是觀之石榴亦爲斂肝之要藥而斂肝之法又實爲治霍亂之要着也

霍亂之證有實熱者居多其真寒涼者不過百中之一二即百脈閉塞周身冰冷但其不欲覆被思飲凉水即不可以涼斷當先少少與以凉水若飲後病增重者其人雖欲復飲而不至急索者凉水可勿與也若飲後病不增重須臾不與有不能忍受之狀可盡量與之任其隨飲隨吐藉凉水將內毒換出亦佳方也曾遇有恣飲凉水而愈者問之言當病重之時若一時不飲凉水即覺不能復活則凉水之功用可知矣然凉水須用新汲井泉水方效無井泉水處可以冰水代之或吞服小冰塊亦佳

王孟英曰雞矢白散爲金匱治霍亂轉筋入腹之方愚仿其意擬得蠶矢湯治霍亂轉筋腹疼口渴煩躁危急之證甚效方用晚蠶砂木瓜各三錢生薏仁大豆芽如無可代以生麥芽各四錢

川黃連炒山梔各二錢醋炒半夏酒炒黃芩吳茱萸各一錢以陰陽水煎稍涼徐徐服之丁酉八九月間吾杭盛行霍亂轉筋之證有沈氏婦者夜深患此繼即音啞肢寒比曉其夫皇皇求爲救治診其脈弦細以澀兩尺如無口極渴而沾飲即吐不已腓堅硬如石其時疼楚異常因擬此方治之徐徐涼飲藥入口竟得不吐外以好燒酒令人用力摩擦轉筋堅硬之處擦將一時許其硬塊始漸軟散而筋不轉吐瀉亦減哺時復與前藥半劑夜

間居然安寐矣後治相類者多人悉以是法獲效

陸九芝曰霍亂一證有寒有熱熱者居其九寒者居其一凡由高樓大廈乘涼飲冷而得之者仲景則有理中四逆諸方後世亦有漿水大順復元冷香飲子諸方病多屬寒藥則皆宜熱若夫春分以後秋分以前少陽相火少陰君火太陰濕土三氣合行其令天之熱氣則下降地之濕氣則上騰人在氣交之中清氣在陰濁氣在陽陰陽反戾清濁相干氣亂於中而上吐下瀉治此者宜和陰陽分清濁以定其亂亂定即無不愈此則病非寒也而亦非盡用寒藥也即如薤白平陳胃苓等湯習用之劑亦皆溫通特不用薑附丁萸之大辛大熱者耳又有不吐不瀉而揮霍撩亂者則多得之飽食之後凡夏月猝然冒暑惟食填太陰亦曰飽食填息一證爲病最速爲禍最酷而人多忽之即有知者亦僅以停食爲言絕不信其爲閉證之急者閉則手足肢冷六脈俱伏甚則喜近烈日此乃邪閉而氣道不宣其畏寒也正其熱之甚也此等證只欠一吐法耳自吐法之不講本屬一吐即愈之病而竟不知用也此外更有四肢厥逆甚至周身如冰而竟不惡寒反有惡熱者此更是內真熱外假寒即厥陰中熱深厥深之象豈獨不可用四逆理中即薑湯米飲及五苓

散中之桂枝亦不可用而且宜苦寒之劑佐以挑痧刮痧等法刺出其惡血以泄熱毒者同治壬戌江蘇滬濱時疫盛行綿延而至癸甲余嘗以石膏苓連清而愈之者則暑濕熱之霍亂也以涼水調胆礬吐而愈之者則飽食填息之霍亂也其肢皆冷而其脈皆伏維時大醫競用丁萸桂附日誤數人而竟不知改圖豈不深可惜哉

右所錄二則皆於霍亂之證有所發明故詳誌之以備採擇

霍亂之證宜兼用外治之法以輔藥餌所不逮而外治之法當以針灸爲最要至應針之處若十宣中腕尺澤足三里陰陵承山太谿太倉太衝公孫等穴

約略舉之未能悉數

習針灸者大抵

皆知惟督脈部分有素髻穴刺同身寸之三分出血最爲治霍亂之要着凡吐瀉交作心中撩亂者刺之皆效諸針灸之書皆未言其能治霍亂世之能針灸者間有知刺其處者而或刺鼻準之尖或刺鼻柱中間又多不能刺其正穴兩鼻孔中間爲鼻柱內經王註謂此穴在鼻柱之上端則非鼻準之尖及鼻柱中間可知然刺未中其正穴者猶恒有效驗况刺中其正穴乎蓋此穴通督脈而鼻通任脈刺此一處則督任二脈可互相貫通而周身之血脈亦因之可貫通矣

量穴之法必用同身之寸而同身之寸針灸家恒以手中指中節爲準法不知此法惟量臂上之穴用之若頭上之穴橫量時以眼之長爲一寸豎量時以兩眉中間至鼻尖爲二寸身上之穴橫量時以兩乳頭中間爲八寸豎量時以當膈歧骨下至臍中爲八寸腿上的穴以足大指尖至與跟齊爲九寸然如此仍不能毫厘不差是在臨證者細相其人之形體而活潑斟酌可也

又宜佐以刮痧之法蓋此證病劇之時周身冰冷回血管之血液凝滯不行當用細口茶碗將碗邊一處少塗香油兩手執定其無油之處先刮其貼脊兩旁脊椎上亦可輕刮以刮處盡紅爲度蓋以臟腑之系皆連於脊而諸臟腑腧穴亦貼脊兩旁故以刮此處爲最要而刮時又宜自上而下挨次刮之可使毒氣下行次刮其胸與脇次刮其四肢曲處

委中

及腿內外胛至頭額項肩亦可用錢刮之又當兼用放痧之法將四肢回血管之血用

手趕至腿臂曲處用帶上下紮緊於尺澤委中兩旁回血管用扁針刺出其血以助其血脈之流通且又放出炭氣俾霍亂之毒菌從此輕減也

又宜佐以溫體之法用滾水煮新磚八個以熨腋下及四肢曲處及兩脚湧泉穴或水煮



粗厚之布乘熱疊數層覆於轉筋之處即不轉筋者亦可覆於少腹及腿肚之上涼則易之或以茶壺及水籠袋滿貯熱水以熨各處或醋炒葱白<sub>絲切</sub>或醋炒乾艾葉<sub>碎揉</sub>熨之或用手蘸火酒或燒酒急速擦摩其周身及腿肚發硬之處種種助暖之法不一臨證者隨事制宜可也

西人治霍亂用阿片丁幾<sub>也酒</sub>依的兒製纈草丁幾芳香丁幾<sub>即亞香淡酒善透竅通絡</sub>各十瓦薄荷油一瓦混和爲滴劑每半小時服十五滴至三十滴

又有注射之法樟腦依的兒各五瓦混溶於七十五倍之蒸餾水中加三十八度之溫以注射於兩臂尺澤穴以上之回血管或胸側或腹部之皮下蜂窩織內此方亦可於無病注射爲預防劑然預防者不必盡劑可用其三分之一或至一半

又方鹽酸莫兒比涅十分瓦之二蒸餾水十瓦<sub>藥水如此混和用時不止此數</sub>或一筒或半筒注於皮下如前

又方鹽酸歇魯因十分瓦之一蒸餾水十瓦或一筒或半筒注於皮下如前

又方炭酸那篤留謨一瓦食鹽<sub>煉淨無土垢者</sub>六瓦蒸餾水一千瓦注於皮下如前

嘔吐太甚者可用右列諸方注於當心窩之皮膚內腿筋轉者可用諸方注於腿肚之皮

膚

承山穴處

腹中疼甚者可用諸方作灌腸之劑又凡注於皮下者亦可注於回血管注於回

血管者亦可注於皮下然皆溫用不宜涼用

纈草即中藥甘松其功用詳載於加味補血湯

後在

下至依的兒製纈草丁幾乃纈草所浸

之酒一分混和以依的兒精五分其用量自十分瓦之三至一瓦爲虛脫狀態之興奮藥

依的兒爲由硫酸及酒精製出之精液其功用先能奮興後則麻醉爲哥羅仿謨

時蒙藥行手術

代用品對於一切虛脫狀態及昏倒用之立能奮興回蘇又於種種疼痛胃疼強劇之嘔

吐及痙攣證狀等一日用數次用量自五滴至二十五滴

依的兒一滴爲百分瓦之二

鹽酸莫兒比涅即莫兒比涅而製以鹽酸者也莫兒比涅省文曰鹽莫舊譯作嗎啡原係

由阿片中鍊出之精液每乾燥阿片十分含有莫兒比涅一分強以鹽酸製之爲色白中

性極苦之針狀結晶用量自千分瓦之一至百分瓦之一可爲奮興之藥若再多用則麻

醉其毒較阿片尤烈不可輕用小兒尤不宜輕用

鹽酸欬魯因係用鹽酸製欬魯因而成欬魯因者以莫兒比涅與鹽化亞含知爾加熱而

製之再以欬魯因溶解於鹽酸而製爲白色結晶性之粉末肺勞家用爲鎮欬定喘之要

品愈疼楚催眠睡善治毒管枝加答兒其用量一次千分瓦之一至千分瓦之五一日數次

炭酸那篤留謨係炭酸製炭酸留謨而成那篤留謨者爲金屬含鹽之藥品製以炭酸爲無色半透明之菱角結晶能振興胃中消化之機能治呼吸器中之加答兒胆汁排泄之障礙及胆道加答兒鬱積性黃瘰肝臟脹大祛痰止嘔通利大便愈糖尿病用其大量有特殊效丁仲祐謂此藥內服刺戟食管粘膜過甚往往誘起炎證可以重炭酸那篤留謨代之重炭酸那篤留謨即那篤留謨製以重炭酸其功用與炭酸那篤留謨相似較少刺戟之性每次用量一瓦至一瓦五分

西人對於緊要傳染之證皆亟亟以撲滅毒菌爲務然其撲滅之法惟知以毒攻毒而不知用化毒之藥使毒菌暗消於無形至於補正以勝毒尤非西人所能知也所謂以毒攻毒者右所錄之西藥是也遇身體狀實者服之幸可救愈若其身體本弱吐瀉又至極點有奄奄欲脫之勢非補正以勝毒與化毒之藥並用不可所謂補正者如拙擬急救回陽湯中人參山藥萸肉諸藥是也所謂化毒者如拙擬急救回生丹衛生防疫寶丹及急救

回陽湯中之硃砂是也蓋凡藥中珍貴之品皆有獨具之良能如硃砂珠黃犀麝之類是也其獨具之良能化學家無從實驗故西人皆不知用壬寅秋日霍亂流行執友毛仙閣之姪受此證至垂危衣冠既畢昇之牀上仙閣見其仍有微息遂研硃砂錢許和童便灌之其病由此竟愈又一女子受此病至垂危醫者辭不治時愚充教員於其處求爲診治亦用藥無效適有搖鈴賣藥者言能治此證亦單重用硃砂錢許治之而愈從此知硃砂善化霍亂之毒菌至己未在奉天擬得急救回生丹衛生防疫寶丹兩方皆重用硃砂治愈斯歲之患霍亂者若干益信其有善化霍亂毒菌之專長也若但以原質論硃砂之原質爲水銀硫黃今試以水銀硫黃二藥並用能治硃砂所治之證乎吾知其必不能也夫人命至重國粹宜保世之惟知重西醫者尙其深思愚言哉

內外中風方

搜風湯 治中風

防風 六錢

真遼人參

四錢月燉同服貧者可用野臺參七錢代之高麗參似不宜用

清半夏 三錢

生石膏 八錢

僵蠶 二錢

柿霜餅 沖服五錢

麝香 一分藥汁送服

中風之證多因五內大虛或秉賦素虛或勞力勞神過度風自經絡襲入直透膜原而達臟腑令臟腑各失其職或猝然昏倒或言語蹇澀或洩便不利或洩便不覺或兼肢體痿廢偏枯此乃至險之證中之輕者猶可遲延歲月中之重者治不如法危在翹足間也故重用防風引以麝香深入臟腑以搜風猶恐元氣虛弱不能運化藥力以逐風外出故用人參以大補元氣扶正即以勝邪也用石膏者因風蘊臟腑多生內熱人參補氣助陽分亦能生熱石膏質重氣輕性復微寒其重也能深入臟腑其輕也能外達皮毛其寒也能祛臟腑之熱而卽解人參之熱也用僵蠶者徐靈胎謂邪之中人有氣無形穿經入絡愈久愈深以氣類相反之藥投之則拒而不入必得與之同類者和入諸藥使爲嚮導則藥至病所而邪與藥相從藥性漸發邪或從毛孔出從二便出不能復留此從治之法也僵蠶因風而僵與風爲同類故善引祛風之藥至於病所成功也用半夏柿霜者誠以此證皆痰涎壅滯有半夏以降之柿霜以潤之而痰涎自息也

此證有表不解而寢生內熱者宜急用發汗藥解其表而兼清其內熱又兼有內風煽動者可與後內中風治法匯通參觀於治外感之中兼有熄內風之藥方爲完善

中風之證有偏寒者有偏熱者有不覺寒熱者拙擬此方治中風之無甚寒熱者也若偏熱者宜金匱風引湯加減

乾薑桂枝  
宜減半

若偏寒者愚別有經驗治法曾治一媼年五十許於仲

冬忽然中風昏倒呼之不應其胸中似有痰涎壅滯大碍呼吸診其脈微細欲無且遲緩知其素有寒飲陡然風寒襲入與寒飲凝結爲恙也急用胡椒三錢搗碎煎兩三沸取濃汁多半茶杯灌之呼吸頓覺順利繼用乾薑六錢桂枝尖當歸各三錢連服三劑可作呻吟肢體漸能運動而左手足仍不能動又將乾薑減半加生黃芪五錢乳香沒藥各三錢連服十餘劑言語行動遂復其常

若其人元氣不虛而偶爲邪風所中可去人參加蜈蚣一條全蝎一錢若其證甚實而閉塞太甚者或二便不通或脈象鬱澀可加生大黃數錢內通外散仿防風通聖散之意可也徐靈胎曾治一人平素多痰手足麻木忽昏厥遺尿口噤手拳痰聲如鋸醫者進參附熟地等藥煎成未服診其脈洪大有力面赤氣粗此乃痰火充實諸般皆閉服參附立危遂以小續命湯去桂附加生軍一錢爲末假稱他藥納之恐旁人之疑駭也三劑而有聲五劑而能言然後以養血消痰之藥調之一月後步履如初此案與愚所治之案對觀則

涼熱之間昭然矣又遺尿者多屬虛而此案中之遺尿則爲實是知審證者不可拘於一端也然真中風證極少類中風者極多中風證百人之中真中風不過一二人審證不確即凶危立見此又不可不慎也

### 逐風湯

治中風抽掣及破傷後受風抽掣者

生箭芪陸錢

當歸肆錢

羌活貳錢

獨活貳錢

全蝎貳錢

全蜈蚣大者兩條

蜈蚣最善搜風貫串經絡臟腑無所不至調安神經又具特長

因其節節有腦是以善理神經

而其性甚和平

從未有服之覺瞑眩者曾治一媼年六旬其腿爲狗咬破受風周身抽掣延一老醫調治服藥十餘日抽掣愈甚所用之藥每劑中皆有全蝎數錢佐以祛風活血助氣之藥彷彿此湯而獨未用蜈蚣遂爲擬此湯服一劑而抽掣即止又服一劑永不反覆又治一人年三十餘陡然口眼歪斜其受病之邊目不能瞬俾用蜈蚣二條爲末防風五錢煎湯送服三次全愈審斯則蜈蚣逐風之力原迥異於他藥也且其功效不但治風也愚於瘡癰初起甚劇者恆加蜈蚣於托藥之中莫不隨手奏效雖本草謂有墜胎之弊而中風抽掣服

他藥不效者原不妨用內經所謂有故無損亦無損也況此湯中又有黃芪當歸以保攝氣血則用分毫何損哉

加味黃芪五物湯

治歷節風證周身關節皆疼或但四肢作疼足不能行步手不能持物

生箭芪一兩

於朮五錢

當歸五錢

桂枝尖三錢

秦艽三錢

廣陳皮三錢

生杭芍五錢

生薑五片

熱者加知母涼者加附子脈滑有痰者加半夏

金匱桂枝芍藥知母湯治歷節風之善方也而氣體虛者用之仍有不效之時以其不勝

麻黃防風之發也今取金匱治風痺之黃芪五物湯加白朮以健脾補氣而即以遂痺

逐寒濕痺當歸以生其血活血自能散風方書謂血活風自去秦艽爲散風之潤藥性甚和平祛風而不傷血

陳皮爲黃芪之佐使而其裏白似肌肉外紅似皮膚筋膜似脈絡棕眼似毛孔又能引肌

肉經絡之風達皮膚由毛孔而出也廣橘紅其大者皆柚也非橘也本經原橘柚並稱故

用於藥中橘柚似無須分別他處柚皮不可入藥且名爲橘紅其實皆不去白誠以原不宜去也

加味玉屏風散

作湯服治破傷後預防中風或已中風而癱瘓或因傷後房事不戒以



致中風

生箭芪一兩

白朮八錢

當歸六錢

桂枝尖錢半

防風錢半

黃蠟三錢

生白礬一錢

此方原爲預防中風之藥故用黃芪以固皮毛白朮以實肌肉黃蠟白礬以護膜原猶恐破傷時微有感冒故又用當歸防風桂枝以活血散風其防風桂枝之分量特輕者誠以此方原爲預防中風而設故不欲重用發汗之藥以開腠理也自擬此方以來凡破傷後恐中風者俾服藥一劑永無意外之變用之數十年矣表姪高淑言之族人被賊用槍彈擊透手心中風抽掣牙關緊閉自牙縫連灌藥無效勢已垂危從前其莊有因破傷預防中風服此方者淑言見而錄之至此淑言將此方授族人一劑而愈又一人被傷後因房事不戒中風抽掣服藥不效友人毛仙閣治之亦投以此湯而愈夫愚擬此方原但爲預防中風而竟如此多效此愚所不及略者也蓋本經原謂黃芪主大風方中重用黃芪一兩又有他藥以爲之佐使宜其風證皆可治也若已中風抽掣者宜加全蜈蚣兩條若更因房事不戒以致中風抽風者宜再加真鹿角膠三錢

另煎服

獨活一錢半若脈象有熱者

用此湯時知母天冬皆可酌加

鎮肝熄風湯

治內中風證

亦名類中風即西人所謂腦充血證

其脈弦長有力

即西醫所謂血壓過重

或上盛下虛頭目時常

眩暈或腦中時常作疼發熱或目脹耳鳴或心中煩熱或時常噫氣或肢體漸覺不利或口眼漸形歪斜或面色如醉甚或眩暈至於顛仆昏不知人移時始醒或醒後不能復原精神短少或肢體痿廢或成偏枯

懷牛膝一兩

生赭石

一兩 軋細

生龍骨

五錢 搗碎

生牡蠣

五錢 搗碎

生龜板

五錢 搗碎

生杭芍

五錢

玄

參

五錢

天

冬

五錢

川楝子

二錢 搗碎

生麥芽

二錢

茵

陳

二錢

甘

草

錢半

心中熱甚者加生石膏一兩痰多者加胆星二錢尺脈重按虛者加熟地黃八錢淨莢肉

五錢大便不實者去龜板赭石加赤石脂

喻嘉言謂石脂可代赭石

壹兩

風名內中言風自內生非風自外來也內經謂諸風掉眩皆屬於肝蓋肝爲木臟於卦爲巽巽原主風且中寄相火徵之事實木火熾盛亦自有風此因肝木失和風自肝起又加以肺氣不降腎氣不攝衝氣胃氣又復上逆於斯臟腑之氣化皆上升太過而血之上注

於腦者亦因之太過致充塞其血管而累及神經其甚者致令神經失其所司至昏厥不省人事西醫名爲腦充血證誠由剖解實驗而得也是以方中重用牛膝以引血下行此爲治標之主藥而復深究病之本源用龍骨牡蠣龜板芍藥以鎮熄肝風赭石以降胃降衝玄參天冬以清肺氣肺中清肅之氣下行自能鎮制肝木至其脈之兩尺虛者當係腎臟真陰虛損不能與真陽相維繫其真陽脫而上奔並挾氣血以上冲腦部故又加熟地黃肉以補腎斂腎從前所擬之方原止此數味後因用此方效者固多間有初次將藥服下轉覺氣血上攻而病加劇者於斯加生麥芽茵陳川楝子即無斯弊蓋肝爲將軍之官其性剛果若但用藥強制或轉激發其反動之力茵陳爲青蒿之嫩者得初春少陽生發之氣與肝木同氣相求瀉肝熱兼舒肝鬱實能將順肝木之性麥芽爲穀之萌芽生用之亦善將順肝木之性使不抑鬱川楝子善引肝氣下達又能折其反動之力方中加此三味而後用此方者自無他虞也心中熱甚者當有外感伏氣化熱故加石膏有痰者恐痰阻氣化之升降故加胆星也

按內中風之證曾見於內經而內經初不名爲內中風亦不名爲腦充血而實名之爲煎

厥大厥薄厥今試譯內經之文以明之內經脈解篇曰肝氣當治而未得故善怒善怒者名曰煎厥蓋肝爲將軍之官不治則易怒因怒生熱煎耗肝血遂致肝中所寄之相火掀然暴發挾氣血而上衝腦部以致昏厥此非因肝風內動而遂爲內中風之由來乎

又內經調經論曰血之與氣並走於上此爲大厥厥則暴死氣反則生氣不反則死蓋血不自升必隨氣而上升上升之極必至腦中充血至所謂氣反則生氣不反則死者蓋氣反而下行血即隨之下行故其人可生若其氣上行不反血必隨之充而益充不至血管破裂不止猶能望其復蘇乎讀此節經文內中風之理明腦充血之理亦明矣

又內經生氣通天論曰陽氣者大怒則形絕血宛

即鬱字

於上使人薄厥觀此節經文不待

詮解即知其爲肝風內動以致腦充血也其曰薄厥者言其腦中所宛之血激薄其腦部以至於昏厥也細思三節經文不但知內中風即西醫所謂腦充血且更可悟得此證治法於經文之中不難自擬對證之方而用之必效也

特是證名內中風所以別外受之風也乃自唐宋以來不論風之外受內生渾名曰中風夫外受之風爲真中風內生之風爲類中風其病因懸殊治法自難從同若辨證不清本

係內中風而亦以祛風之藥發表之其臟腑之血必益隨發表之藥上升則腦中充血必益甚或至於血管破裂不可救藥此關未透誠唐宋醫學家一大障礙也迨至宋末劉河間出悟得風非皆由外中遂創爲五志過極動火而粹中之論此誠由內經諸風掉眩皆屬於肝句悟出蓋肝屬木中藏相火木盛火熾即能生風也大法以白虎湯三黃湯沃之所以治實火也以逍遙散疏之所以治鬱火也

防風赤不宜用 涼膈散雙解之所以治表裏之邪火也以六味湯滋之所以壯水之主以制陽光也以八味丸引之所謂從治之法引火歸源也

雖曰引火歸源而桂附終不宜用 細審河間所用之方雖不能絲絲入扣然勝於但知治中風不知分內外者遠矣且其謂有實熱者宜治以白虎湯尤爲精確之論愚治此證多次其昏仆之後能自甦醒者多不能蘇醒者少其於蘇醒之後三四日間現白虎湯證者恆十居六七因知此證多先有中風基礎伏藏於內後因外感而激發是以從前醫家統名爲中風不知內風之動雖由於外感之激發然非激發於外感之風實激發於外感之因風生熱內外兩熱相併遂致內風暴動此時但宜治外感之熱不可再散外感之風此所以河間獨借用白虎湯以瀉外感之實熱而於麻桂諸藥概無

所用蓋發表之藥皆能助血上行是以不用此誠河間之特識也吾友張山雷君<sub>江蘇嘉定人</sub>當世之名醫也著有中風辭詮一書發明內中風之證甚爲精詳書中亦獨有取於河間可與拙論參觀矣

後至元李東垣朱丹溪出對於內中風一證於河間之外又創爲主氣主濕之說東垣謂人之元氣不足則邪湊之令人猝倒僵仆如風狀夫人身之血原隨氣流行氣之上升者過多可使腦部充血排擠腦髓神經至於昏厥前所引內經三節文中已言之詳矣若氣之上升者過少又可使腦部貧血無以養其腦髓神經亦可至於昏厥是以內經又謂上氣不足腦爲之不滿耳爲之苦鳴頭爲之傾目爲之眩觀內經如此云云其劇者亦可至於昏厥且其謂腦爲之不滿實即指腦中貧血而言也由斯而論東垣之論內中風由於氣虛邪湊原於腦充血者之中風無關而實爲腦貧血者之中風開其治法也是則河間之主火爲腦充血東垣之主氣爲腦貧血一實一虛迥不同也<sub>治法詳後方下</sub>至於丹溪則謂東南氣溫多濕有病風者非風也由濕生痰痰生熱熱生風此方書論中風者所謂丹溪主濕之說也然其證原是痰厥與腦充血腦貧血皆無涉即使二證當昏厥之時間有挾痰者

乃二證之兼證非二證之本病也又按其所謂因熱生風之見解似與河間主火之意相同而實則迥異蓋河間所論之火生於燥故所用之藥注重潤燥滋陰丹溪所論之熱生於濕其所用之藥注重去濕利痰夫濕非不可以生熱然因濕生熱而動肝風者甚少矣

肝風之動多因有燥熱

是則二子之說仍以河間爲長也

又讀史記扁鵲傳所治虢太子尸厥證亦係內中風而實爲內中風之上盛下虛者觀其未見太子也而謂太子其耳必鳴其鼻必張其所以耳鳴鼻張者實因腦中氣血充盛之所排擠豈非上盛乎及其見太子也則謂上有絕陽之絡下有破陰之紐所謂上有絕陽之絡者即謂腦中血管爲過盛之氣血排劑將破裂也所謂下有破陰之紐者蓋謂其下焦陰分虧損不能吸攝其陽分是以其真陽上脫挾氣血而充塞腦部也觀扁鵲之所云虢太子之尸厥其爲內中風之上盛下虛者確乎無疑當時扁鵲救醒虢太子係用鍼砭法後亦未言所用何藥今代爲擬方當於鎮肝熄風湯中加斂肝補腎之品若方後所註加黃肉熟地黃者卽爲治此證之的方矣

按此證若手足漸覺不遂口眼漸形歪斜是其腦髓神經已爲充血所累其血管猶不至

破裂也。若其忽然昏倒移時復醒者，其血管或有罅漏出血不多，猶不至破裂甚劇者也。若其血管破裂甚劇，即昏仆不能復蘇矣。是以此證宜防之於預，當其初覺眩暈頭疼，或未覺眩暈頭疼，而其脈象大而且硬，或弦長有力，即宜服鎮肝熄風湯。迨服過數劑後，其脈必漸漸和緩，後仍接續服之，必服至其脈與常脈無異而後。其中風之根蒂始除。若從前失治，至忽焉昏倒而移時復蘇醒者，其肢體必有不遂之處。蓋血管所出之血，若黏滯其左邊，司運動之神經，其右邊手足即不遂；若黏滯其右邊，神經而左邊手足即不遂。

左邊神經管右半身  
右邊神經管左半身

若左右神經皆受傷損，其人恆至全體痿廢治之者，亦宜用鎮肝熄風湯服至脈象如常，其肢體即漸能動轉。然服過數劑之後，再於方中加桃仁、紅花、三七諸藥，以化其腦中瘀血，方能奏效。

又按此證自唐宋以來，渾名之曰中風治之者，亦不分其爲內、中、外，而概以風藥發之。誠爲治斯證者之誤點。至清中葉王勳臣出，對於此證專以氣虛立論，謂人之元氣全體原十分，有時損去五分，所餘五分雖不能充體，猶可支持全身而氣虛者，經絡必虛，有時氣從經絡虛處透過，併於一邊，彼無氣之邊即成偏枯。爰立補陽還五湯方，中重用黃芪。



四兩以峻補氣分此即東垣主氣之說也然王氏書中未言脈象何如若遇脈之虛而無力者用其方原可見效若其脈象實而有力其人腦中多患充血而復用黃芪之溫而升補者以助其血愈上行必至凶危立見此固不可不慎也前者邑中有某孝廉右手廢不能動足仍能行其孫出門遇一在津業醫者甫歸言此證甚屬易治遂延之診視所立病案言脈象洪實已成癰證無疑其方仿王氏補陽還五湯有黃芪八錢服藥之後須臾昏厥不醒矣夫病本無性命之憂而誤服黃芪八錢竟至如此可不慎哉五期衷中參西錄第三卷中有論腦充血之原因及治法且附有驗案數則其所論者實皆內中風證也宜與右所論者匯通參觀

劉鐵珊將軍

春玉

之守武昌也其忠肝義胆誓殉孤城雖古之張睢陽顏常山不斯過也丁

卯來津後其腦中常覺發熱時或眩暈心中煩躁不寧脈象弦長有力左右皆然知係腦充血證蓋其憤激填胸焦思積慮者已久是以有斯證也爲其腦中覺熱俾用綠豆實於囊中作枕爲外治之法又治以鎮肝熄風湯於方中加地黃一兩連服數劑腦中已不覺熱遂去川棟子又將生地黃改用六錢服過旬日脈象和平心中亦不煩躁遂將藥停服

又天津鈴鐺閣街于氏所娶新婦過門旬餘忽然頭疼醫者疑其受風投以發表之劑其疼陡劇號呼不止其翁在中國銀行司賬見同夥沈君閱五期衷中參西錄見載有腦充血頭疼諸案遂延愚爲之診視其脈弦硬而長左部尤甚知其肝胆之火上衝過甚也遂投以鎮肝熄風湯加龍胆草三錢以瀉其肝胆之火一劑病愈強半又服兩劑頭已不疼而脈象仍然有力遂去龍胆草加生地黃六錢又服數劑脈象如常遂將藥停服

(附錄)湖北天門崔蘭亭君來函 張港楊新茂糧行主任患腦充血證忽然仆地上氣喘急身如角弓兩目直視全家惶恐衆醫束手殮服已備迎爲診治遵先生五期建瓴湯原方治之一劑病愈強半後略有加減服數劑脫然全愈 按此鎮肝熄風湯實由五期中建瓴湯加減而成故附錄其來函於此俾醫界同人知此二方任用其一皆可治腦充血證也

或問中風無論內外其肢體恆多痿廢即其經絡必多閉塞而方中重用龍骨牡蠣獨不虞其收，之性益致經絡閉塞乎答曰妙藥皆令人不易測若但以收濇視龍骨牡蠣是未深知龍骨牡蠣者也神農本經謂龍骨能消癥瘕其能通血脈助經絡之流通可知後

世本草謂牡蠣能開關節老痰其能利肢體之運動可知是以金匱風引湯原治熱癰痼而方中龍骨牡蠣並用也曾治一叟年近六旬忽得痿廢證兩手脈皆弦硬心中騷擾不安夜不能寐每於方中重用龍骨牡蠣再加降胃之藥脈始柔和諸病皆減二十劑外漸能步履審斯則龍骨牡蠣之功用可限量哉又嘗治一媼年過七旬陡然左半身痿廢其左脈弦硬而大有外越欲散之勢按西法左半痿廢當右脈有力然問有脈有力與痿廢皆在一邊者投以鎮肝熄風湯又加淨萸肉一兩一劑而愈夫年過七旬痿廢鮮有愈者而山萸肉味酸性溫稟木氣最厚夫木主疏通神農本經謂其其逐寒濕痺後世本草謂其能通利九竅在此方中而其酸收之性又能協同龍骨牡蠣以斂戢肝火肝氣使不上衝腦部則神經無所擾害自不失其司運動之機能故痿廢易愈也且此證又當日得之即治其轉移之機關尤易爲力也統觀此二案可無疑於方中之用龍骨牡蠣矣

加味補血湯 治身形軟弱肢體漸覺不遂或頭重目眩或神昏健忘或覺腦際緊縮作疼甚或昏仆移時甦醒致成偏枯或全身痿廢脈象遲弱內中風證之偏虛寒者肝過盛生風肝虛極亦可生風此即西人所謂腦貧血病也久服此湯當愈

生煎芩一兩

當歸五錢

龍眼肉五錢

眞鹿角膠三錢另  
燉同服

丹參三錢

明乳香三錢

明沒藥三錢

甘松二錢

服之覺熱者酌加天花粉天冬各數錢覺發悶者加生鷄內金錢半或二錢服數劑後若  
不甚見效可用所煎藥湯送服麝香二厘取其香能通竅或眞冰片半分亦可若服後仍無甚效可

用藥湯送製好馬錢子二分

製馬錢子法詳後振頑丸下

腦充血者其腦中之血過多固能傷其腦髓神經腦貧血者其腦中之血過少又無以養  
其腦髓神經是以究其終極皆可使神經失其所司也古方有補血湯其方黃芩當歸同  
用而黃芩之分量竟四倍於當歸誠以陰陽互爲之根人之氣壯旺者其血分自易充長  
况人之腦髓神經雖賴血以養之尤賴胸中大氣上升以斡旋之是以內經謂上氣不足  
腦爲之不滿耳爲之苦鳴頭爲之傾目爲之眩所謂上氣者即胸中大氣上升於腦中者  
也因上氣不足血之隨氣而注於腦者必少而腦爲之不滿其腦中貧血可知且因上氣  
不足不能斡旋其神經血之注於腦者少無以養其神經於是而耳鳴頭傾目眩其人可  
忽至昏仆可知由此知因腦部貧血以成內中風證者原當峻補其胸中大氣俾大氣充

足自能助血上升且能斡旋其腦部使不至耳鳴頭傾目眩也是以此方不以當歸爲主藥而以黃芪爲主藥也用龍眼肉者因其味甘色赤多含津液最能助當歸以生血也用鹿角膠者因鹿之角原生於頭頂督脈之上督脈爲腦髓之來源故鹿角膠之性善補腦髓凡腦中血虛者其腦髓亦必虛用之以補腦髓實可與補血之藥相助爲理也用丹參乳香沒藥者因氣血虛者其經絡多瘀滯此於偏枯痿廢亦頗有關係加此通氣活血之品以化其經絡之瘀滯則偏枯痿廢者自易愈也用甘松者爲其能助心房運動有力以多輸血於腦且又爲調養神經之要品能引諸藥至腦以調養其神經也用麝香梅片者取其香能通竅以開閉也用製過馬錢子者取其能攣動腦髓神經使之靈活也

按甘松即西藥中之纈草此係東人之名西人則名爲拉底克斯瓦洛蘭內其氣香味微酸本經謂其治暴熱火瘡赤氣疥癢疽痔馬鞍熱氣別錄謂其治癰腫浮腫結熱風痺不足產後痛甄權謂其治毒風癰痺破多年凝血能化膿爲水產後諸病止腹痛餘疹煩渴大明謂其除血氣心腹痛破癥結催生落胞血暈鼻血吐血赤白帶下眼障膜丹毒排膿補痿西人則以爲興奮之品善治心臟麻痺霍亂轉筋東人又以爲鎮靜神經之特效藥

用治癩狂癰瘡諸病蓋爲其氣香故善興奮心臟使不至於麻痺而其馨香透竅之力亦自能開痺通瘀也爲其味酸故能保安神經使不至於妄行而酸化軟堅之力又自能化多年之癥結使盡消融也至於其能補痿能治霍亂轉筋者即心臟不麻痺神經不妄行之功效外著者也孰謂中西醫理不相貫通哉

鄰村龍潭莊高姓叟年過六旬漸覺兩腿乏力寢至時欲眩仆神昏健忘恐成痿廢求爲診治其脈微弱無力爲製此方服之連進十劑兩腿較前有力健忘亦見愈而仍有眩暈之時再診其脈雖有起色而仍不任重按遂於方中加野台參天門冬各五錢威靈仙一錢連服二十餘劑始愈用威靈仙者欲其運化參芪之補力使之靈活也

門人張甲升曾治一人年三十餘於季冬負重貿易日行百餘里歇息時又屢坐寒地後覺腿疼不能行步寢至臥床不能動轉周身筋骨似皆痿廢服諸藥皆不效甲升治以加味補血湯將方中乳香沒藥皆改用六錢又加淨荳肉一兩數劑後腿即不疼又服十餘劑遂全愈按加味補血湯原治內中風之氣血兩虧者而略爲變通即治腿疼如此效驗可謂善用成方者矣

## 小兒風證方

定風丹 治初生小兒綿風其狀逐日抽掣綿綿不已亦不甚劇

生明乳香

三錢

生明沒藥

三錢

硃

砂

一錢

全蜈蚣

大者一條

全

蝎

一錢

共爲細末每小兒哺乳時用藥分許置其口中乳汁送下一日約服藥五次

一小兒生後數日即抽綿風一日數次兩月不愈爲擬此方服藥數日而愈所餘之藥又治愈小兒三人 按此方以治小兒綿風或驚風大抵皆效而能因證制宜再煎湯劑以送服此丹則尤效宗弟相臣青縣之名醫也喜用此丹以治小兒驚風又恆隨證之涼熱虛實作湯劑以送服此丹其所用之湯藥方頗有可採爰錄其治驗之原案二則於左

（附錄）（原案一）己巳端陽前友人黃文卿幼子生六月頭身胎毒終未愈稟質甚弱忽肝風內動抽掣綿綿不休顙門微凸按之甚軟微有赤色指紋色紫爲爪形目睛昏而無神或歪脈浮小無根此因虛氣化不固致肝陽上衝腦部擾及神經也文卿云此證西醫已誤爲不治不知尙有救否答曰此證尙可爲聽吾用藥當爲竭力治愈遂先用定風丹三分水調灌下繼用生龍骨生牡蠣生石決明以潛其陽勾藤勾薄荷葉羚羊角

錯細末  
三分

以煨

其風生箭茈生山藥山萸肉西洋參以補其虛清半夏胆南星粉甘草以開痰降逆和中共煎湯多半杯調入定風丹三分頻頻灌之二劑肝風止又增損其方四劑全愈 按黃茈治小兒百病明載本經惟此方用之微有升陽之嫌然本經又謂其主大風肝風因虛內動者用之即能熄風可知且與諸鎮肝斂肝之藥並用若其分量止用二三錢原有益而無損也

(原案二)天津飯店聶姓幼子生七月夜間忽患肝風抽動喘息不知啼時當仲夏天氣亢旱燥熱察其風闌氣闌紋紅有爪形脈數身熱知係肝風內動急囑其乳母將小兒置床上不致懷抱兩熱相並又囑其開窗以通空氣先用急救回生丹

方見本書第七卷

吹入鼻中

以鎮涼其腦系遂灌以定風丹三分又用薄荷葉黃菊花勾藤勾梔子羚羊角以散風清熱生龍骨生牡蠣生石決明以潛陽鎮逆天竹黃牛蒡子川貝母以利痰定喘將藥煎好仍調入定風丹三分囑其作數次灌下勿擾其睡嗣來信一劑風熄而病愈矣 按此二證雖皆係肝風內動抽掣而病因虛實迥異相臣皆治以定風丹而其煎湯送服之藥因證各殊如此善用成方可爲妙手靈心矣



(附方)鮑雲韶驗方新編預防小兒臍風散方用枯礬蓬砂各二錢半硃砂二分冰片麝香各五厘共爲末凡小兒降生後洗過即用此末擦臍上每小兒換襁布時仍擦此末臍帶落後亦仍擦之擦完一料永無臍風之證按此方最妙愚用之多次皆效眞育嬰之靈丹也

### 鎮風湯

治小兒急驚風其風猝然而得四肢搐搦身挺頸痙神昏面熱或目睛上竄或痰涎上壅或牙關緊閉或熱汗淋漓

鈎藤鈎 三錢

羚羊角

一錢月  
燉兌服

龍胆草 二錢

青

黛 二錢

清半夏 二錢

生赭石 軋細二錢

茯

神 二錢

僵

蠶 二錢

薄荷葉 一錢

硃

砂

二分研  
細送服

### 磨濃生鐵銹水煎藥

小兒得此證者不必皆由驚恐有因外感之熱傳入陽明而得者方中宜加生石膏有因熱瘧而得者方中宜加生石膏柴胡急驚之外又有所謂慢驚者其證皆因寒與急驚之因熱者有冰炭之殊方書恆以一方治急慢驚風二證殊屬差謬慢驚之證惟莊在田福幼編辨之最精用方亦最妙其辨慢

驚風共十四條 一慢驚吐瀉脾胃虛寒也 一慢驚身冷陽氣抑遏不出也 一慢驚鼻風煽動眞陰失守虛火燒肺也 一慢驚面色青黃及白氣血兩虛也 一慢驚口鼻中氣冷中寒也 一慢驚大小便清白腎與大腸全無火也 一慢驚昏睡露睛神氣不足也 一慢驚手足抽掣血不行於四肢也 一慢驚角弓反張血虛筋急也 一慢驚乍寒乍熱陰血虛少陰陽錯亂也 一慢驚汗出如洗陰虛而表不固也 一慢驚手足痠癱血不足養筋也 一慢驚顙門下陷虛至極也 一慢驚身雖發熱口唇焦裂出血却不喜飲冷茶水進以寒涼愈增危篤以及所吐之乳所瀉之物皆不甚消化脾胃無火可知唇之焦黑乃眞陰之不足也明矣其證多得之吐瀉之餘久瘡久痢或痘後或因風寒飲食積滯過用攻伐之藥傷脾或稟賦本虛或誤服涼藥或因急驚而用藥攻降太過或失於調養皆可致此證也其治法先用逐寒蕩驚湯大辛大熱之劑衝開胸中寒痰可以受藥不吐然後接用加味理中地黃湯諸證自愈

(附方)逐寒蕩驚湯用胡椒薑肉桂各一錢丁香十粒共搗成細渣以灶心土三兩煮湯澄清煎藥大半茶杯

藥皆搗碎不可久煎肉桂又忌久煎三四沸即可

頻頻灌之接服加味理中地黃湯定獲奇效

按此湯當以胡椒爲君若遇寒痰結胸之甚者當用二錢而稍陳者又不堪用族姪陰舞六歲時曾患此證飲食下咽胸膈格拒須臾吐出如此數日昏睡露睛身漸發熱投以逐寒蕩驚湯原方盡劑未吐欲接服加味理中地黃湯其吐又作恍悟此藥取之鄉間小藥坊其胡椒必陳且止用一錢其力亦小遂於食料舖中買胡椒二錢炮薑肉桂丁香仍按原方煎服一劑而寒痰開豁可以受食繼服加味理中地黃湯一劑而愈又方中所用灶心土須爲變更凡草木之質多含鹹味草木燒化其鹹味皆歸灶心土中若取其土煎湯鹹味濃厚甚是難服且與脾胃不宜以灶壠內周遭火燎紅色之土代之則無鹹味其功效遠勝於灶心土

〔附方〕加味理中地黃湯用熟地五錢焦白朮三錢當歸黨參炙甘草故紙炒棗仁炒枸杞各

二錢炮薑去淨肉桂各一錢生薑三片紅棗三枚

核

炙草內桂各一錢生薑三片紅棗三枚

開

胡桃二個

仁

打碎爲引仍

用灶心土

代以灶心土

二兩煮水煎藥取濃汁一茶杯加附子五分煎水攪入量小兒大小分數

次灌之如欬嗽不止者加米殼金櫻子各一錢如大熱不退者加生白芍一錢泄瀉不止去當歸加丁香七粒隔二三日止用附子二三分蓋因附子大熱中病即宜去之如用附

子太多則大小便閉塞不出如不用附子則臟腑沉寒固結不開若小兒虛寒至極附子又不妨用一二錢此所謂神而明之存乎其人用者審之若小兒但瀉不止或微見驚搐尚可受藥吃乳便利者並不必服逐寒蕩驚湯止服此湯一劑而風定神清矣若小兒尙未成慢驚不過昏睡發熱或有時熱止或晝間安靜夜間發熱均宜服之若新病壯實之小兒眼紅口渴者乃實火之證方可暫行清解但果係實火必大便閉結氣壯聲洪且喜多飲涼水若吐瀉交作則非實火可知此方補造化陰陽之不足有起死回生之功倘大虛之後服一劑無效必須大劑多服爲妙方書所謂天弔風慢脾風皆係此證

按此原方加減治瀉不止者但加丁香不去當歸而當歸最能滑腸瀉不止者實不宜用

若減去當歸恐滋陰之藥少可多加熟地一二錢

又服藥瀉仍不止者可用高麗參二錢搗爲末分數次用藥湯送服其瀉必止

又安慢驚風不但形狀可辨即其脈亦可辨族姪蔭棠七八歲時瘧疾愈後忽然吐瀉交作時霍亂盛行其家人皆以爲霍亂證診其脈弦細而遲六脈皆不閉塞愚曰此非霍亂吐瀉帶有黏涎否其家人謂偶有帶時愚曰此寒痰結胸格拒飲食乃慢驚風將成之兆也投以逐寒蕩驚湯加味理中地黃湯各一劑而愈

又此二湯治慢驚風雖甚效驗然治此證者又當防之於預乃爲完全之策一孺子年五六歲秋夏之交恣食瓜果當飯至秋末其行動甚遲正行之時或委坐於地愚偶見之遂懇切告其家人曰此乃慢驚風之先兆也小兒慢驚風證最爲危險而此時調治甚易服藥兩三劑即無患矣其家人不以爲然至冬初慢驚之形狀發現嘔吐不能受食又不即治遷延半月病勢垂危始欲調治而服藥竟無效矣

又有狀類急驚而病因實近於慢驚者一童子年十一二咽喉潰爛醫者用吹喉藥吹之數日就愈忽然身挺四肢搐搦不省人事移時始醒一日數次診其脈甚遲濡詢其心中雖不覺涼實畏食涼物其呼吸似覺短氣時當仲夏以童子而畏食涼且微以脈象病情其爲寒痰凝結瘀塞經絡無疑投以傷寒論白通湯一劑而愈

### 痢風方

#### 加味磁硃丸 治痢風

磁

石

二兩能吸鐵者研極細水飛出切忌火煨

赭

石三兩

清半夏二兩

硃

砂一兩

右藥各製爲細末再加酒麴半斤軋細過羅可得細麴四兩炒熟二兩與生者二兩共和

藥爲丸桐子大鐵銹水煎湯送服二錢日再服

磁石爲鐵養二種原質化合含有磁氣其和異性相引同性相拒頗類電氣故能吸鐵煨之則磁氣全無不能吸鐵用之即無效然其石質甚硬若生用入丸散中必製爲極細末再以水飛之用其隨水飛出者方安或和水研之若拙擬磨翳散在第八卷之研飛爐甘石法更佳

又磁砂無毒而煨之則有毒按化學之理磁砂原硫黃水銀二原質合成故古方書皆謂磁砂內含真汞汞即水銀也若煨之則仍將分爲硫黃銀水二原質所以有毒又原方原用神麴而改用酒麴者因坊間神麴審發皆未能如法多帶酸味轉不若造酒麴者業有專門麴發甚精用之實勝於神麴也

磁砂丸方乃千金方中治目光昏耗神水寬大之聖方也李瀕湖解曰磁石入腎鎮養真陰使腎水不外移磁砂入心鎮養心血使邪火不上侵佐以神麴消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家媒合嬰兒姤女之理

按道家以腎爲嬰兒心爲姤女脾爲黃婆每當呼氣外出之時腎氣隨呼氣上升是嬰兒

欲有求於姪女也當此之際即藉脾土鎮靜之力引心氣下降與腎氣相會此所謂心腎相交即道家所謂黃婆媒合嬰兒姪女之理也然從前但知治眼疾而不知治癰風至柯韻伯稱此方治癰風如神而愚試之果驗然不若加赭石半夏之尤爲效驗也

此方所以能治癰風者因癰風之根伏藏於腎有時腎中相火暴動癰風卽隨之而發以致痰涎上湧昏不知人夫相火爲陰中之火與兩間之電氣爲同類夫電氣喜緣鐵傳遞磁石中含鐵質且能吸鐵故能伏藏電氣即兼能伏藏與電氣同類之相火也又相火之發動恒因君火之潛通有硃砂之寧靜心火則相火愈不妄動矣又電氣入土則不能發聲故喻嘉言謂伏制陰分之火當以培養脾土爲主蓋以土能制電即能制水中之火有神麴以溫補脾胃則相火愈深潛藏矣原方止此三味爲加赭石半夏者誠以癰風之證莫不氣機上逆痰涎上湧二藥並用既善理痰又善鎮氣降氣也送以鐵銹湯者以相火生於命門寄於肝胆相火之暴動實於肝胆有關此肝胆爲木臟卽爲風臟內風之煽動亦莫不於肝胆發軔鐵銹乃金之餘氣故取金能制木之理鎮肝膽以熄內風又取鐵能引電之理藉其重墜之性以引相火下行也

友人祁伯卿之弟患痢風百藥不效後得一方用乾熊胆若黃豆粒大一塊約重分半凉水少

許浸開服之冬月宜溫水浸開溫服數次而愈伯卿向愚述之因試其方果效

通變黑錫丹 治痢風

鉛 灰研細二兩 硫化鉛研細一兩 麥 麴炒熟兩半

右三味水和爲丸桐子大每服五六丸多至十丸用淨芒硝四五分沖水送服若服藥後大便不利者鉛灰硫化鉛皆能澀大便秘芒硝又宜多用

古方有黑錫丹用硫黃與鉛化合以治上熱下涼上盛下虛之證洵爲良方而猶未盡善者因其難以草木諸熱藥其性易升浮即不能專於下達向曾變通其方專用硫化鉛和熟麥麴爲丸以治痢風數日一發者甚有效驗乃服至月餘因覺熱停服旬餘病仍反覆遂又通變其方多用鉛灰少用硫化鉛俾其久服不至生熱加以累月之功痢風自能除根更佐以健脾利痰通絡清火之湯劑治法尤爲完善五期衷中參西錄七卷中有愈痢丹方宜參觀

取鉛灰法 用黑鉛數斤鎔化後其面上必有浮灰屢次鎔化即可屢次取之

製硫化鉛法用黑鉛四兩鐵鍋內鎔化再用硫黃細末四兩撒於鉛上硫黃皆着急用鐵



鍤拌炒之鉛經硫黃燒鍊結成砂子取出晾冷碾軋成餅者係未化透之鉛去之餘者再用乳鉢研極細

### 一味鐵養湯

治癰風及肝胆之火暴動或脇疼或頭疼目眩或氣逆喘吐上焦煩熱至一切上盛下虛之證皆可用其湯煎藥又兼能補養血分

方用長銹生鐵和水磨取其銹磨至水皆紅色煎湯服之  
化學家名鐵銹爲鐵養以鐵與養氣化合而成銹也其善於鎮肝胆者以其爲金之餘氣藉金以制木也其善治上盛下虛之證者因其性重墜善引逆上之相火下行相火爲陰中之火與電氣爲同類此即鐵能引電之理也其能補養血分者因人血中原有鐵銹日取鐵銹嗅之又有血腥之氣此乃以質補質以氣補氣之理且人身之血得養氣則赤鐵銹原鐵與養氣化合故能補養血分也西人補血之藥所以有鐵酒

一六歲幼女初數月一發癰風後至一日數發精神昏昏若睡未有醒時且兩目露睛似兼慢驚遂先用福幼編治慢驚之方治之而露睛之病除繼欲治其癰風偶憶方書有用三家磨刀水洗瘡法因思三乃木數可以入肝鐵銹又能鎮肝以其水煎藥必能制肝胆

上衝之火以熅內風乃磨水者但以水貯確中而煎藥者誤認爲藥亦在內遂但煎其水服之其病竟愈後知藥未服仍欲煎服愚曰磨刀水既對證藥可不服自此日煎磨刀水服兩次連服數日痢風永不再發

一人年三十許痢風十餘年不愈其發必以夜授以前加味磁硃丸方服之而愈年餘其病又反覆然不若從前之劇俾日磨濃鐵銹水煎湯服之病遂除根

族家嫂年六旬夜間忽然嘔吐頭疼心中怔忡甚劇上半身自汗其家人以爲霍亂證診其脈關前浮洪搖搖而動俾急磨濃鐵銹水煎湯服下即愈

友人韓釐廷曾治一人當惱怒之後身軀忽然後挺氣息即斷一日數次釐廷診其脈左關虛浮遂投以黃肉去淨核龍骨牡蠣皆不用煨白芍諸藥用三家磨刀水煎之一日連服二劑

病若失

西藥治痢風者皆係麻醉腦筋之品強制腦筋使之不發鮮能祓除病根然遇痢風之劇而且勤身體羸弱不能支持者亦可日服其藥兩次以圖目前病不反覆而徐以健脾利痰通絡清火之藥治之迨至身形強壯即可停止西藥而但治以健脾利痰通絡清火之

品或更佐以鎮驚

若硃砂  
磁石類

祛風

若蜈蚣  
全蝎類

透達臟腑

背麝香  
牛黃類

之品因證制宜病根自能祓除無餘

也爰將西藥之可用者開列於左

臭剝係貌羅謨與加留謨化合故亦名貌羅加留謨爲光白色方形結晶無臭氣有辛鹹味乃麻醉鎮痙藥在神經系統能呈鎮靜作用故爲神經諸病及癲癇病之特效藥至因神經不眠妊婦嘔吐男子夢遺等證用之皆效每服一瓦可漸加至三瓦久服傷脾胃昏人神智此藥宜與臭素安母紐謨臭素那篤留謨同用

三藥等分  
可服兩瓦

蓋三種皆爲鹽基同性之藥那篤留謨不損神智傷脾胃較甚安母紐莫不傷脾胃力則稍遜

抱水過魯拉兒爲無色透明斜系稜柱結晶有特異之香氣味微苦兼苛辣乃亞舍答兒亞爾垤菲篤之三格兒化合物長於催眠鎮痙功用與臭剝相近而其力實猛於臭剝且長於臭剝用之大量一次不過半瓦愚常用臭剝與臭素安母紐謨各兩瓦抱水過魯拉兒一瓦攪炒熟麥麵十瓦爲丸桐子大名之曰抱水三物丸每服十五六丸以治癲癇不睡夢遺甚效

## 肢體痿廢方

振類湯 治痿廢

生黃 莖

六錢

知

母

四錢

野臺參

三錢

於

朮

三錢

當

歸

三錢

生明乳香

三錢

生明沒藥

三錢

威靈仙

錢半

乾

薑

二錢

牛

膝

四錢

熱者加生石膏數錢或至兩許

第六卷仙露湯下有案可參觀

寒者去知母加烏附子數錢筋骨受風者加明

天麻數錢脈弦硬而大者加龍骨牡蠣

皆不用煨

各數錢或更加山萸肉

去核

亦佳骨痿廢者

加鹿角膠虎骨膠各二錢

同服

然二膠僞者甚多若恐其僞可用續斷兔絲子各三錢代

之手足皆痿者加桂枝尖二錢

痿證之大旨當分爲三端有肌肉痺麻木抑搔不知疼痛者其人或風寒襲入經絡或痰涎鬱塞經絡或風寒痰涎互相凝結經絡之間以致血脈閉塞而其原因實由於胸中大氣虛損蓋大氣旺則全體充盛氣化流通風寒痰涎皆不能爲恙大氣虛則腠理不固而風寒易受脈管澀滯而痰涎易鬱矣有周身之筋拘攣而不能伸者蓋人身之筋以宗筋爲主而能榮養宗筋者陽明也其人脾胃素弱不能化穀生液以榮養宗筋更兼內有蘊熱以鎔耗之或更爲風寒所襲致宗筋之伸縮自由者竟有縮無伸寢成拘攣矣有筋非拘

攀肌肉非痺木惟覺骨軟不能履地者乃骨髓枯涸腎虛不能作強也故方中用黃芪以補大氣白朮以健脾胃當歸乳香沒藥以流通血脈靈仙以祛風消痰恐其性偏走泄而人以參之氣血兼補者佐之乾薑以開氣血之痺知母以解乾薑人參之熱則藥性和平可久服而無弊其陽明有實熱者加石膏以清陽明之熱仿金匱風引湯之義也營衛經絡有凝寒者加附子以解營衛經絡之寒仿金匱近效朮附湯之義也至其脈弦硬而大乃內風煽動真氣不固之象故加龍骨牡蠣以熄內風斂真氣骨痿者加鹿膠虎膠取其以骨補骨也筋骨受風者加明天麻取其能搜筋骨之風又能補益筋骨也若其痿專在於腿可但用牛膝以引之下行若其人手足並痿者又宜加桂枝兼引之上行蓋樹之有枝猶人之有指臂故桂枝雖善降逆氣而又能引藥力達於指臂間也或問此方治痿之因熱者可加生石膏至兩許其證有實熱可知而方中仍用乾薑何也答曰金匱風引湯治熱癱瘓之的方原石膏寒水石與乾薑並用蓋二石性雖熱而味則淡其寒也能勝乾薑之熱其淡也不能勝乾薑之辣故痿證之因熱者仍可藉其異常之辣味以開氣血之痺也

振類丸

前證之劇者可兼服此丸或單服此丸亦可並治偏枯痺木諸證

人參二兩

於朮炒二兩

當歸二兩

馬錢子法製一兩

乳香一兩

沒藥一兩

全蜈蚣大者五條不用炙

穿山甲蛤粉炒一兩

共軋細過羅煉蜜爲丸如桐子大每服二錢無灰溫酒送下日再服

馬錢子即番本鼈其毒甚烈而其毛與皮尤毒然治之有法則有毒者可至無毒而其開通經絡透達關節之力實遠勝於他藥也今將製馬錢子法詳載於左庶後有用此方者如法製之而不至誤人也

法將馬錢子先去淨毛水煮兩三沸即撈出用刀將外皮皆刮淨浸熱湯中旦暮各換湯一次浸足三晝夜取出再用香油煎至純黑色擘開視其中心微有黃意火候即到將馬錢子撈出用溫水洗數次將油洗淨再用沙土同入鍋內炒之土有油氣換土再炒以油氣盡淨爲度

薑膠膏

用貼肢體受涼疼痛或有凝寒阻遏血脈麻木不仁

鮮薑自然汁一斤

明亮水膠四兩

右二味同熬成稀膏攤於布上貼患處旬日一換凡因受寒肢體疼痛或因受寒肌肉麻木不仁者貼之皆可治愈即因受風而筋骨疼痛或肌肉麻木者貼之亦可治愈惟有熱腫疼者則斷不可用

有人因寢涼炕之上其右腿外側時常覺涼且有時疼痛用多方治之不效語以此方貼至二十日全愈

又有人常在寒水中捕魚爲寒水所傷自膝下被水浸處皆麻木抑搔不知疼癢漸覺行動乏力語以此方俾用長條布攤藥膏纏於腿上其足跣足底皆貼以此膏亦數換而愈蓋此等證心中無病原宜外治鮮薑之辛辣開通熱而能散故能溫煖肌肉深透筋骨以除其凝寒痼冷而渙然若冰釋也用水膠者藉其黏滯之力然後可熬之成膏也若證因受風而得者擬用細辛細末攪於膏藥之中或用他祛風猛悍之藥攪於其中其奏效當更捷也

第七卷

霍亂方

急救回陽湯





# 衷中參西錄前三期合編第八卷

## 女科方

玉燭湯

治婦女寒熱往來或先寒後熱汗出熱解或月事不調經水短少

生黃芪 五錢

生地黃 六錢

玄參 四錢

知母 四錢

當歸 三錢

香

附醋炒 三錢

柴

胡一錢五分

甘草一錢五分

汗多者以茵陳易柴胡再加黃肉數錢熱多者加生杭芍數錢寒多者加生薑數錢

婦女多寒熱往來之證而方書論者不一說有謂陽分虛則頭午寒陰分虛則過午熱者夫午前陽盛午後陽衰而陰又寢盛當其盛時虛者可以暫實何以其時所現之病狀轉與時成反比例也有謂病在少陽則寒熱往來猶少陽外感之邪與太陽陽併則寒與陽明併則熱者而內傷之病原無外邪又何者與太陽陽明併作寒熱也有謂肝虛則乍熱乍寒者斯說也愚曾驗過遵本經山茱萸主寒熱之旨單重用山茱萸去淨核二兩煎湯服之立愈驗案在第一卷來復湯下然此乃肝木虛極內風將動之候又不可以蓋尋常寒熱也蓋人身之氣化原與時序之氣化息息相通一日之午前猶一歲之有春夏而人身之陽氣即感之發

動以敷布於周身婦女性多憂思以致臟腑經絡多有鬱結閉塞之處阻遏陽氣不能外達或轉因發動而內陷或發動不遂其發動排擠經絡愈加閉塞於是周身之寒作矣迨陽氣蓄極終當憤發而其憤發之機與抑遏之力相激相盪於臟腑經絡之間熱又由茲而生此前午之寒所以變後午之熱也黃芪爲氣分之主藥能補氣更能升氣輔以柴胡之軒舉香附之宣通陽氣之抑遏者皆暢發矣然血隨氣行氣鬱則血必瘀故寒熱往來者其月事恒多不調經血恒多虛損用當歸以調之地黃以補之知母元參與甘草甘苦化陰以助之則經血得其養矣况地黃知母諸涼藥與黃芪溫熱之性相濟又爲變理陰陽調和寒熱之妙品乎至方書有所謂日晡發熱者日晡者申時也足少陰腎經主令之候也其人或腎經陰虛至此而腎經之火乘時而動亦可治以此湯將黃芪減半地黃改用一兩有經閉結爲癥瘕阻塞氣化作寒熱者可用後理衝湯有胸中大氣下陷作寒熱者其人常覺呼吸短氣宜用拙擬升陷湯

在第四卷

方後治驗之案可以參觀

(附方)西人鐵銹雞納丸治婦女經血不調身體羸弱欬喘或時作寒熱甚效方用鐵銹沒藥火忌各一錢金雞納霜花椒各五分共爲細末煉蜜爲丸六十粒每服三粒至五粒按鐵

銹乃鐵與養氣化合而成人身之血得養氣而赤鐵銹中含養氣而又色赤似血且嗅之兼有血腥之氣故能榮養血分流通經脈且人之血中實有鐵銹以鐵銹補血更有以鐵補鐵之妙也金雞納霜加味小柴胡湯在第七卷下曾詳其藥之原質及其治瘧之功用此方中亦用之者爲其善治貧血且又能入手足少陽之經以調和寒熱也又佐以花椒者恐雞納霜之性偏於寒涼而以辛熱濟之使歸於和平也

東亞人有中將湯以調婦女經脈恆有效驗其方祕而不傳留學東亞者曾以化驗得之門人高如璧曾開其方相寄藥品下未有分量愚爲酌定其分量用之甚有功效亦與東人製者等今將其方開列於左以備選用

延胡索醋炒三錢當歸六錢官桂二錢甘草二錢丁香二錢山查核醋炒三錢鬱金醋炒二錢沙參四錢續斷酒炒三錢肉蔻赤石脂炒三錢去石脂不用苦參三錢懷牛膝三錢共十二味軋作粗渣分三劑每用一劑開水浸蓋盪中約半點鐘將其湯飲下如此浸服二次至第三次用水煎服日用一劑數劑經脈自調此方中涼熱補破澀滑之藥皆有愚所酌分量俾其力亦適相當故凡婦女經脈不調證皆可服之而以治白帶證尤效

理衝湯

治婦女經閉不行或產後惡露不盡結爲癥瘕以致陰虛作熱陽虛作冷食少勞嗽虛證各來服此湯十餘劑後虛證自退三十劑後瘀血可盡消亦治室女月閉血枯並治男子勞瘵一切臟腑癥瘕積聚氣鬱脾弱滿悶痞脹不能飲食

生黃芪三錢

黨參三錢

於朮二錢

生山藥五錢

天花粉四錢

知母四錢

三稜三錢

莪朮三錢

生雞內金黃者三錢

用水三鍾煎至將成加好醋少許滾數沸服

服之覺悶者減去於朮覺氣弱者減三稜莪朮各一錢瀉者以白芍代知母於朮改用四

錢熱者加生地天冬各數錢涼者知母花粉各減半或皆不用涼甚者加肉桂

搗細沖服

烏附

子各二錢瘀血堅甚者加水蛭

不用炙

二錢若其人堅壯無他病惟用以消癥瘕積聚者宜

去山藥室女與婦人未產育者若用此方三稜莪朮宜斟酌少用減知母之半加生地黃

數錢以濡血分之枯若其人血分雖瘀而未見癥瘕或月信猶未閉者雖在已產育之婦

人亦少用三稜莪朮若病人身體羸弱脈象虛數者去三稜莪朮將雞內金改用四錢因

此藥能化瘀血又不傷氣分也迨氣血漸壯瘀血未盡消者再用三稜莪朮未晚若男子

勞瘵三稜莖亦宜少用或用雞內金代之亦可初擬此方時原專治產後瘀血成瘕瘕後以治室女月閉血枯亦效又間用以治男子勞瘵亦效驗大有開胃進食扶羸起衰之功內經有四烏鯁魚骨一茹蘆丸原是男女並治爲調血補虛之良方此方竊師內經之意也

從來醫者調氣行血習用香附而不習用三稜莖蓋以其能破瘕瘕遂疑其過於猛烈而不知能破瘕瘕者三稜莖之良能非二藥之性烈於香附也愚精心考驗多年凡習用之藥皆確知其性情能力若論耗散氣血香附猶甚於三稜莖若論消磨瘕瘕十倍香附亦不及三稜莖也且此方中用三稜莖以消衝中瘀血而即用參朮諸藥以保護氣血則瘀血去而氣血不至傷損且參朮能補氣得三稜莖以流通之則補而不滯而元氣愈旺元氣既旺愈能鼓舞三稜莖之力以消瘕瘕此其所以效也

一婦人年三十餘瘕瘕起於少腹漸長而上其當年長者稍軟隔年即硬如石七年之間上至心口旁塞兩肋飲食減少時覺昏憤劇時昏睡一晝夜不飲不食屢次服藥竟分毫無效後愚爲診視脈雖虛弱至數不數許爲治愈授以此方病人自揣其病斷無可治之

理竟置不服次年病益進昏睡四日不醒愚用藥救醒之遂懇切告之曰去歲若用愚方病愈已久何至危困若斯然此病尙可爲甚勿再遲延也仍爲開前方病人喜信愚言連服三十餘劑磊塊皆消惟最初所結之病根大如核桃之巨者尙在又加水蛭不宜炙一錢服數劑全愈

一婦人年二十餘癥瘕結於上腕其大如橘按之甚硬時時上攻作疼妨碍飲食醫者皆以爲不可消後愚診視治以此湯連服四十餘劑消無芥蒂

方中雞內金既善消積又善爲胃引經

一媼年六旬氣弱而且鬱心腹滿悶不能飲食一日所進穀食不過兩許如此已月餘矣愚診視之其脈甚微細猶喜至數調勻知其可治遂用此湯將三稜莪朮各減一錢連服數劑即能進飲食又服數劑病遂全愈

奉天省議員孫益三之夫人年四十許自幼時有癥瘕結於下腕歷二十餘年癥瘕之積竟至滿腹常常作疼心中忤忤不能飲食求爲診治因思此證久而且劇非輕劑所能療幸脈有根柢猶可調治遂投以理衝湯加水蛭三錢恐開破之力太過參芪又各加一錢又加天冬三錢以解參芪之熱數劑後遂能進食服至四十餘劑下瘀積若干癥瘕消有

强半益三柳河人因有事與夫人還籍藥遂停止閱一載腹中之積又將復舊復來院求爲診治仍照前方加減俾其補破涼熱之間與病體適宜仍服四十餘劑積下數塊又繼服三十餘劑瘀積大下其中或片或塊且有膜甚厚若胞形此時身體覺弱而腹中甚鬆暢恐瘀猶未淨又調以補正活血之藥以善其後

隔數月益三又介紹其同邑友人王尊三之夫人來院求爲治癥瘕自言瘀積十九年矣滿腹皆係硬塊亦治以理衝湯爲其平素氣虛將方中參芪加重三稜莪朮減半服數劑飲食增加將三稜莪朮漸增至原定分量又服數劑氣力較壯又加水蛭二錢楞鷄俗名紅娘十枚又服二十餘劑屆行經之期隨經下紫黑血塊若干病愈其半又繼服三十劑屆經期瘀血遂大下滿腹積塊皆消又俾服生新化瘀之藥以善其後

一少年因治吐血服藥失宜瘀癥結於少腹在女子爲癥瘕在男子爲痞癥大如錦瓜按之甚堅硬其上相連有如瓜蔓一條斜衝心口飲食減少形體羸弱其脈微細稍數治以此湯服十餘劑瘀癥全消

人之臟腑一氣貫通若營壘連絡互爲犄角一處受攻則他處可爲之救應故用藥攻病

宜確審病根結聚之處用對證之藥一二味專攻其處即其處氣血偶有傷損他臟腑氣血猶可爲之輸將貫注亦猶相連營壘之相救應也又加補藥以爲之佐使是以邪去正氣無傷損世俗醫者不知此理見有專確攻病之方若拙擬理衝湯者初不審方中用意何如君臣佐使何如但見方中有三稜我朮即望而生畏不敢試用自流俗觀之亦似慎重及觀其臨證調方漫不知病根結於何處惟是混開混破恆集若香附木香陳皮砂仁枳殼厚朴延胡靈脂諸藥或十餘味或數十味爲一方服之令人臟腑之氣皆亂常有病本可治服此等藥數十劑而竟至不治者更或見有浮火虛熱而加苓梔芩實之屬則開破與寒涼並用雖脾胃堅壯者亦斷不能久服此其貽害尤甚也愚目擊此等方莫不直指其差謬聞者轉以愚好詆毀醫輩豈知愚心之憤惋有不能自己者哉

理衝丸 治同前證

水

蛭不用炙一兩

生黃芪 一兩半

生三稜 五錢

生我朮 五錢

當歸 六錢

知

母 六錢

生桃仁 帶皮尖六錢

右藥七味共爲細末煉蜜爲丸桐子大開水送服二錢早晚各一次



仲景抵當湯大黃蟅蟲丸百勞丸皆用水蛭而後世畏其性猛鮮有用者是未知水蛭之性也本經曰水蛭氣味鹹平無毒主逐惡血瘀血月閉破癥瘕積聚無子利水道徐靈胎註云凡人身瘀血方阻尚有生氣者易治阻之久則生氣全消而難治蓋血既離經與正氣全不相屬投之輕藥則拒而不納藥過峻又轉能傷未敗之血故治之極難水蛭最善食人之血而性又遲緩善入遲緩則生血不傷善入則堅積易破藉其力以消既久之滯自有利而無害也觀本經之文與徐氏之註則水蛭功用之妙爲何如哉特是徐氏所謂遲緩善入者人多不解其理蓋水蛭行於水中原甚遲緩其在生血之中猶水中也故生血不傷也着人肌肉即緊貼善入其遇堅積之處猶肌肉也故堅積易消也

水蛭破瘀血而不傷新血徐氏之論確矣不但此也凡破血之藥多傷氣分惟水蛭味鹹專入血分於氣分絲毫無損且服後腹不覺疼並不覺開破而瘀血默消於無形真良藥也愚治婦女月閉癥瘕之證其脈不虛弱者恆但用水蛭軋細開水送服一錢日兩次雖數年瘀血堅結一月可以盡消

水蛭蟲蟲皆爲破瘀血之品然愚嘗單用以實驗之蟲蟲無效而水蛭有效以常理論之

凡食血之物皆能破血然蟲蟲之食血以嘴水蛭之食血以身其身與他物緊貼即能吮他物之血故其破瘀血之功獨優至破瘀血而不傷新血者徐氏之註詳矣而猶有賸義蓋此物味鹹氣腐與瘀血氣味相近有同氣相求之妙至新血雖亦味鹹却無腐氣且其質流通似水水蛭之力在新血之中若隨水潑灑而毫無着力之處故不能傷新血也

本經水蛭文中無子二字原接上文主字一氣讀下言能主治婦人無子也蓋無子之病多因血瘀衝中水蛭善消衝中瘀血故能治之而不善讀本經者恆多誤解友人韓釐廷治一少婦月信不通曾用水蛭後有醫者謂婦人服過水蛭即終身不育病家甚是懊悔後釐廷聞知向愚述之愚曰水蛭主治婦人無子本經原有明文何醫者之昧昧也後其婦數月即孕至期舉一男甚胖壯

近世方書多謂水蛭必須炙透方可用不然則在人腹中能生殖若干水蛭害人誠屬無稽之談曾治一婦人經血調和竟不產育細詢之少腹有癥瘕一塊遂單用水蛭一兩香油炙透爲末每服五分日兩次服完無效後改用生者如前服法一兩猶未服完癥瘕盡消逾年即生男矣此後屢用生者治愈多人亦未有貽害於病愈後者

或問同一水蛭也炙用與生用其功效何如此懸殊答曰此物生於水中而色黑水色味鹹

味水氣腐氣原得水之精氣而生炙之則傷水之精氣故用之無效水族之性如龍骨牡蠣

龜板大抵皆然故王洪緒證治全生集謂用龍骨者宜懸於井中經宿而後用之其忌火可知而在水蛭爲尤甚特是水蛭不炙爲末甚難若軋之不細曬乾再軋或紙包置爐臺上令乾亦可此須親自檢點若委之藥坊至軋不細時必須火焙矣西人治火熱腫疼用活水蛭數條置患處覆以玻璃杯使吮人毒血亦良法也

方中挑仁不去皮尖者以其皮赤能入血分尖乃生發之機又善通氣分楊玉衡寒溫條辨曾有斯說愚疑其有毒未敢遽信遂將帶皮生挑仁嚼服一錢心中安然以後始敢連皮尖用之至於不炒用而生用者凡果中之仁皆含生發之氣原可藉之以流通既敗之血也徐氏本經百種註曰挑得三月春和之氣以生而花鮮明似血故凡血瘀血枯之疾不能調和暢達者此能入於其中而和之散之然其生血之功少而去瘀之功多者蓋挑核本非血類實不能有所補益若癥瘕皆已敗之血非生氣不能流通挑之生氣在於仁而味苦又能開洩故能逐舊而不傷新也夫既藉其生氣以流通氣血不宜炒用可知也

若入丸劑蒸熟用之亦可然用時須細心檢點或說給病家檢點恐藥坊間以帶皮之生杏仁僞充則有毒不可服矣

（附方）秘傳治女子乾病方用紅蛔螺

榆樹內紅蟲大如蠶

一個楞樹

此樹如樺而味吳俗名臭松

莢二個人指甲全的壯

年男子髮三根用樹莢夾蛔螺指甲以髮纏之將發麪饅頭如大橘者一個開一孔去中瓢俾可容藥納藥其中仍將外皮原開下者杜孔上木炭火煨存性爲細末用黃酒半斤燉開兌童便半茶鍾送服忌腥冷驚恐惱怒此方用過數次皆驗瘀血開時必吐衄又兼下血不必驚恐移時自愈以治經水一次未來者尤效

安衝湯 治婦女經水行時多而且久過期不止或不時漏下

白

朮炒六錢

生黃芪六錢

生龍骨搗細六錢

生牡蠣搗細六錢

大生地六錢

生杭芍三錢

海螵蛸搗細四錢

茜草三錢

川續斷四錢

友人劉幹臣其長郎婦經水行時多而且久淋漓八九日始斷數日又復如故醫治月餘初稍見輕繼又不愈延愚診視觀所服方即此安衝湯去茜草螵蛸遂仍將二藥加入一劑即愈又服一劑永不反覆幹臣疑而問曰茜草螵蛸治此證如此效驗前醫何爲去之

答曰彼但知茜草螵蛸能通經血而未見內經用此二藥雀卵爲丸鮑魚湯送下治傷肝之病時時前後血也故於經血過多之證即不敢用不知二藥大能固澀下焦爲治崩之主藥也海螵蛸爲烏賊魚骨其魚常口中吐墨水爲之黑故能補益腎經而助其閉藏之用友人孫蔭軒夫人曾患此證甚劇蔭軒用微火將海螵蛸煨至半黑半黃爲末用鹿角膠化水送服一次即愈其性之收澀可知茜草一名地血可以染絳內經名茹蘆即茹蘆根也蒲留仙聊齋誌異載有人欲烏其鬚或戲授以茜草細末其鬚竟成紫髯洗之不去其性之收澀亦可知也幹臣又問曰二藥既收澀若此而又能通經絡者何也答曰螵蛸可以礮物故能消瘀茜草色赤似血故能活血且天下妙藥大抵冷人難測如桂枝能升元氣又能降逆氣山萸肉能固脫又能通利九竅凡若此者皆天生使獨而不可以氣味形色推求者也曾遊東海之濱見海岸茜草蕃生其地適有膈上瘀血者俾剖取茜草鮮根煮汁日日飲之半月而愈

一婦人年三十餘夫妻反目惱怒之餘經行不止且又甚多醫者用十灰散加減連服四劑不效後愚診視其右脈弱而且濡詢其飲食多寡言分毫不敢多食多即泄瀉遂投以

此湯去黃芪將白朮改用一兩一劑血止而瀉亦愈又服一劑以善其後

一婦人年二十餘小產後數日惡露已盡至七八日忽又下血延醫服藥二十餘日不止診其脈洪滑有力心中熱而且渴疑其夾雜外感詢之身不覺熱又疑其血熱妄行遂將方中生地改用一兩又加知母一兩服後血不止而熱渴亦如故因思此證實兼外感無疑遂改用白虎加人參湯以山藥代粳米方中石膏重用生者三兩煎湯兩鍾分兩次溫飲下外感之火遂消血亦見止仍與安衝湯一劑遂全愈又服數劑以善其後

固衝湯 治婦女血崩

白 朮 炒一兩

生黃芪 六錢

龍 骨

煨 牡 蠣 八錢

牡 蠣 煨 八錢

黃 肉 去 淨 核 八錢

五倍子 藥 汁 送 服

生杭芍 四錢

海螵蛸 搗 細 四錢

茜 草 三錢

棕邊炭 二錢

五倍子 藥 汁 送 服

脈象熱者加大生地一兩涼者加烏附子三錢

從前之方龍骨牡蠣皆生用其理已詳於理衝丸下此方獨用煨者因煨之則收澀之力較大欲藉之以收一時之功也

一婦人年三十餘陡然下血兩日不止及愚診視已昏憤不語周身皆涼其脈微弱而遲

知其氣血將脫而元陽亦脫也遂急用此湯去白芍加野台參八錢烏附子三錢一劑血止周身皆熱精神亦復仍將白芍加入再服一劑以善其後

長子陰潮曾治一婦人年四十許驟得下血證甚劇半日之間即氣息奄奄不省人事其脈右寸關微見如水上浮麻不分至數左部脈皆不見急用生黃芪一兩大火煎數沸灌之六部脈皆出然微細異常血仍不止觀其形狀呼氣不能外出又時有欲大便之意知其爲大氣下陷也

大氣下陷詳第四卷升陷湯下

遂爲開固衝湯方將方中黃芪改用一兩早十一點鐘將藥

服下至晚三點鐘即愈如平時

後陰潮在京又治一血崩證先用固衝湯不效加柴胡二錢一劑即愈足見柴胡升提之力可爲治崩要藥

或問血崩之證多有因其人暴怒肝氣鬱結不能上達而轉下衝腎關致經血隨之下注者故其病俗亦名之曰氣衝茲方中多用澀補之品獨不慮於肝氣鬱者有妨碍乎答曰此證雖有因暴怒氣衝而得者然當其血大下之後血脫而氣亦隨之下脫則肝氣之鬱者轉可因之而開且病急則治其標此證誠至危急之病也若其證初得且不甚劇又實係肝氣下衝者亦可用升肝理氣之藥爲主而以收補下元之藥輔之也

（附方）傅青主女科有治老婦血崩方試之甚效其方用生黃芪一兩當歸一兩

酒洗

桑葉十

四片三七末三錢

藥汁送下

水煎服二劑血止四劑不再發若覺熱者用此方宜加生地兩許

溫衝湯

治婦人血海虛寒不育

生山藥八錢

當歸身四錢

烏附子二錢

肉

桂

去粗皮二錢後入

補骨脂

炒搗三錢

小茴香炒二錢

核桃仁二錢

紫石英

煨研八錢

眞鹿角膠

二錢另燉同服若恐其偽可代以鹿角霜三錢

人之血海其名曰衝在血室之兩旁與血室相通上隸於胃陽明經下連於腎少陰經有任脈以爲之担任督脈爲之督攝帶脈爲之約束陽維陰維陽蹻陰蹻爲之擁護共爲奇經八脈此八脈與血室男女皆有在男子則衝與血室爲化精之所在女子則衝與血室實爲受胎之處內經上古通天論所謂太衝脈盛月事以時下故有子者是也是以女子不育多責之衝脈鬱者理之虛者補之風襲者祛之濕勝者滲之氣化不固者固攝之陰陽偏勝者調劑之衝脈無病未有不生育者而愚臨證實驗以來凡其人素無他病而竟不育者大抵因相火虛衰以致衝不溫煖者居多因爲製溫衝湯一方其人若平素畏坐涼處畏食涼物經脈調和而艱於生育者即與以此湯服之或十劑或數十劑遂能生育者多矣



一婦人自二十出嫁至三十未育子女其夫商治於愚因細詢其性質稟賦言生平最畏寒涼熱時亦不敢食瓜果至經脈則大致調和偶或後期兩三日知其下焦虛寒因思本經謂紫石英氣味甘溫治女子風寒在子宮絕孕十年無子遂爲擬此湯方中重用紫石英六錢取其性溫質重能引諸藥直達於衝中而溫煖之服藥三十餘劑而畏涼之病除後數月遂孕連生子女益信本經所謂治十年無子者誠不誤也

### 清帶湯 治婦女赤白帶下

生山藥一兩

生龍骨

搗細六錢

生牡蠣

搗細六錢

海螵蛸

去淨甲四錢搗

茜草三錢

單赤帶加白芍苦參各二錢單白帶加鹿角霜白朮各三錢鹿角霜係鹿角沉埋地中日久欲腐掘地而得者其性微溫爲補督任衝三脈之要藥蓋鹿角甚硬埋久欲腐服之轉與腸胃相宜而易得其氣化也藥房鬻者多係用鹿角燬透爲霜其性燥不如出土者至謂係熬鹿角膠所餘之查者則非是

帶下爲衝任之證而名謂帶者蓋以奇經帶脈原主約束諸脈衝任有滑脫之疾責在帶脈不能約束故名爲帶也然其病非僅滑脫也若滯下然滑脫之中實兼有瘀滯其所瘀

滯者不外氣血而實有因寒因熱之不同此方用龍骨牡蠣以固脫用茜草海螵蛸以化滯更用生山藥以滋真陰固元氣至臨證時遇有因寒者加溫熱之藥因熱者加寒涼之藥此方中意也而愚擬此方則又別有會心也嘗考神農本經龍骨善開癥瘕牡蠣善消癰瘕是二藥爲收澀之品而兼具開通之力也又考軒岐內經四烏鯁魚骨一茹蘆丸以雀卵鮑魚湯送下治傷肝之病時時前後血烏鯁魚骨即海螵蛸茹蘆即茜草是二藥爲開通之品而實具收澀之力也四藥彙集成方其能開通者兼能收澀能收澀者兼能開通相助爲理相得益彰此中消息之妙有非言語所能罄者

一婦人年二十餘患白帶甚劇醫治年餘不愈後愚診視脈甚微弱自言下焦涼甚遂用此方加乾薑六錢鹿角霜三錢連服十劑全愈

又一媼年六旬患赤白帶下而赤帶多於白帶亦醫治年餘不愈診其脈甚洪滑自言心熱頭昏時覺眩暈已半載未起牀矣遂用此方加白芍六錢數劑白帶不見而赤帶如故心熱頭眩暈亦如故又加苦參龍胆草白頭翁各數錢連服七八劑赤帶亦愈而諸疾亦遂全愈自擬此方以來用治帶下愈者不可勝數而獨載此兩則者誠以二證病因寒熱

懸殊且年少者用此方反加大熱之藥年老者用此方反加苦寒之藥欲臨證者當知審證用藥不可拘於年歲之老少也

按白頭翁不但治因熱之帶證甚效也邑治東二十里有古城址基周十餘里愚偶登其上見城背陰多長白頭翁而彼處居人未之識也遂剖取其鮮根以治血淋溺血與大便下血之因熱而得者甚效誠良藥也是以仲景治厥陰熱痢有白頭翁湯也愚感白頭翁具此良材而千百年埋沒於此不見用因作俚語以記之曰白頭翁住古城陰埋沒英材歲月深偶遇知音來勸駕出爲斯世起疴沉

帶證若服此湯未能除根者可用此湯送服祕真丹

在第二卷一錢

按帶下似滯下之說愚向持此論後觀西法亦謂大腸病則流白痢子宮病則流白帶其理相同法用兒茶白礬石榴皮沒石子等水洗之若此證之劇者兼用其外治之法亦可又其內治白帶法用沒石子一兩搗爛水一斤半煎至一斤每溫服一兩日三次或研細作粉每服五分日二次亦可又可單以之熬水洗之或用注射器注射之按沒石子味苦而澀苦則能開澀則能斂一藥而具此兩長原與拙擬清帶湯之意相合且其收斂之力

最勝凡下焦滑脫之疾或大便滑瀉或小便不禁或男子遺精或女子崩漏用之皆效驗今之醫者多忽不知用惜哉又東人中將湯治白帶亦甚效玉燭湯下載有其方可採用若以治赤帶方中官桂丁香宜斟酌少用苦參宜多用

加味麥門冬湯 治婦女倒經

乾寸冬帶心五錢

野台參四錢

清半夏三錢

生山藥

四錢以代粳米

生杭芍三錢

丹 參三錢

甘 草二錢

生桃仁帶皮尖  
搗二錢

大

棗棗棗開三枚

婦女倒經之證陳修園女科要旨借用金匱麥門冬湯可謂特識然其方原治火逆上氣咽喉不利今用以治倒經必略爲加減而後乃與病證脗合也

或問金匱麥門冬湯所主之病與婦人倒經之病迥別何以能借用之而有效驗答曰衝爲血海居少腹之兩旁其脈上隸陽明下連少陰少陰腎虛其氣化不能閉藏以收攝衝氣則衝氣易於上干陽明胃虛其氣化不能下行以鎮安衝氣則衝氣亦易於上干衝中之氣既上干衝中之血自隨之上逆此倒經所由來也麥門冬湯於大補中氣以生津液藥中用半夏一味以降胃安衝且以山藥代粳米以補腎斂衝於是衝中之氣安其故宅

衝中之血自不上逆而循其故道矣。特是經脈所以上行者固多，因衝氣之上干實亦下行之路。有所壅塞，觀其每至下行之期而後上行可知也。故又加芍藥、丹參、桃仁以開其下行之路，使至期下行毫無滯碍。是以其方非爲治倒經而設，而略爲加減，即以治倒經甚效，愈以歎經方之函蓋無窮也。

按用此方治倒經大抵皆效，而間有不效者，以其兼他證也曾治一室女倒經年餘不愈，其脈象微弱，投以此湯服藥後甚覺短氣，再診其脈微弱益甚。自言素有短氣之病，今則益加重耳。恍悟其胸中大氣必然下陷，故不任半夏之降也。遂改用拙擬升陷湯。在第四卷連服十劑，短氣愈而倒經之病亦愈。

又一少婦倒經半載不愈，診其脈微弱而遲，兩寸不起，呼吸自覺短氣，知其亦胸中大氣下陷，亦投以升陷湯，連服數劑，短氣即愈，身體較前強壯，即停藥。不服其月經水即順，逾十月舉男矣。

或問倒經之證既由於衝氣胃氣上逆，大氣下陷者其氣化升降之機正與之反對，何亦病倒經乎？答曰：此理甚微，奧人之大氣原能斡旋全身爲諸氣之綱領，故大氣常充滿於

胸中目能運轉胃氣使之下降鎮攝衝氣使不上衝大氣一陷綱領不振諸氣之條貫多紊亂此乃自然之理也是知衝氣胃氣之逆非必由於大氣下陷而大氣下陷者實可致衝胃氣逆也致病之因既不同用藥者豈可膠柱鼓瑟哉

壽胎丸 治滑胎

兔絲子

炒燉四兩

桑寄生二兩

川續斷二兩

眞阿膠二兩

右藥將前三味軋細水化阿膠和爲丸一分重

乾足一分

每服二十丸開水送下日再服氣虛

者加人參二兩大氣陷者加生黃芪三兩

大氣陷證詳第四卷升陷湯下

食少者加炒白朮二兩涼者加炒補

骨脂二兩熱者加生地二兩

兔絲無根蔓延草木之上而草木爲之不茂其善吸他物之氣化以自養可知胎在母胞若果善吸其母之氣化自無下墜之虞且男女生育皆賴腎臟作強兔絲大能補腎腎旺自能陰胎也寄生根不着土寄生樹上又復隆冬茂盛雪地冰天之際葉翠子紅亦善吸空中氣化之物且其寄生於樹上亦猶胎之寄母腹中氣類相感大能使胎氣強壯故本經載其能安胎續斷亦補腎之藥而其節之斷處皆有筋骨相連大有連屬維繫之意阿

膠係驢皮所熬驢歷十二月始生較他物獨遲以其遲挽流產之速自當有效且其膠係阿井之水熬成阿井爲濟水之伏流以之熬膠最善伏藏血脈滋陰補腎故本經亦載其能安胎也至若氣虛者加人參以補氣大氣陷者加黃芪以升補大氣飲食減少者加白朮以健補脾胃涼者加補骨脂以助腎中之陽補骨脂善保胎修園會詳論之熱者加生地黃以滋腎中之陰臨時斟酌適宜用之無不效者

友人張潔泉善針灸其夫人素有滑胎之病是以潔泉年近四旬尙未育麟偶與談及問何以不治潔泉謂每次服藥皆無效驗即偶足月產下亦軟弱異常數日而殤此蓋關於稟賦非藥力所能挽回也愚曰挽回此證甚易特視用藥何如耳時其夫人受孕三四月遂治以此方服藥兩月至期舉一男甚強壯

按此方乃思患預防之法非救急之法若胎氣已動或至下血者又另有急救之方曾治一少婦其初次有妊五六月而墜後又有妊六七月間忽胎動下血急投以生黃芪生地黃各二兩白朮山萸肉去核龍骨搗服牡蠣搗服各一兩煎湯一大碗頓服之胎氣遂安將藥減半又服一劑後舉一男強壯無恙

# 安胃飲 治惡阻

清半夏

一兩溫水淘洗兩次  
去其氣味然後入煎

淨青黛三錢

赤石脂二兩

用作飯小鍋煎取清汁一大碗調入蜂蜜二兩徐徐溫飲下一次止飲一口半日服盡若服後吐仍未止或其大便秘結者去石脂加生赭石細札一兩若嫌青黛微有藥味者亦可但用半夏赭石

或問本經謂赭石能墜胎此方治惡阻而有時以赭石易石脂獨不慮其有墜胎之弊乎

答曰惡阻之劇者飲水一口亦吐出其氣化津液不能下達恆至大便秘結旬餘不通其

甚者或結於幽門

胃下口

欄門

大小腸相接處

致上下關格不通滿腹作疼此有關性命之證也夫病

既危急非大力之藥不能挽回況赭石之性原非開破其鎮墜之力不過能下有形滯腸

若胎至六七個月服之或有妨碍至惡阻之時不過兩三個月胎體未成惟是經血凝滯

赭石毫無破血之性是以服之無妨且嘔吐者其衝氣胃氣皆上逆藉赭石鎮逆之力以

折其上逆之機氣化乃適得其平內經所謂有故無損亦無損也愚治惡阻之證遇有上

腕固結旬日之間勺飲不能下行無論水與藥入口須臾即吐出羣醫束手謬謂不治而



愚放胆重用生赭石數兩煎湯一大碗徐徐溫飲下吐止結開便通而胎亦無傷拙擬參  
赭鎖氣湯在第二卷下載有詳案可考也

半夏辛溫下行爲降逆止嘔之主藥坊間皆製以白礬服之轉令人嘔吐清半夏其礬雖  
較少然亦必淘洗數次始無礬味特是既經礬煮又經淘洗致半夏降逆止嘔之力大減  
遇病之劇者恆不能勝病故必須以他藥輔之愚有鑑於此恆自製半夏用之法用生半  
夏數斤冷時用溫水浸之日換水二次熱時以井泉水日換水三四次約浸二十餘日試  
嚼服半粒覺辣味不甚猛烈乘濕切片曬乾囊裝懸於透風之處每用一兩煎湯兩茶鍾  
調入淨蜂蜜二兩徐徐咽之無論嘔吐如何之劇未有不止者蓋古人用半夏原湯泡七  
次即用初未有用白礬製之者也

西人治惡阻習用臭剝此藥之性質及用量皆詳於加味磁硃丸下在第七卷然愚嘗試之有  
效有不效大抵惡阻之輕者用之即效而其劇者徒用此藥仍不能止嘔吐也若用鐵養  
湯在第七卷送服則其效驗較大

大順湯 治產難不可早服必胎衣破後小兒頭至產門者然後服之

野黨參一兩

當 歸一兩

生 赭 石 札 細 二 兩

用衛足花子炒爆一錢作引或丈菊花瓣一錢作引皆可無二物作引亦可

或疑赭石乃金石之藥不可放胆重用不知赭石性至和平雖重墜下行而不傷氣血況有黨參一兩以補氣當歸一兩以生血且以參歸之微溫以濟赭石之微涼溫涼調和愈覺穩妥也矧產難者非氣血虛弱即氣血壅滯不能下行人參當歸雖能補助氣血而性皆微兼升浮得赭石之重墜則力能下行自能與赭石相助爲理以成催生開交骨之功也至於當歸之滑潤原爲利產良藥與赭石同用其滑潤之力亦愈增也

族姪婦臨盆兩日不產用一切催生藥胎氣轉覺上逆爲製此湯一劑即產下

一婦人臨產交骨不開困頓三日勢甚危急亦投以此湯一劑而產自擬得此方以來救人多矣放胆用之皆可隨手奏效

衛足花即葵花其子即冬葵子緣此花若春日早種當年即可結子而用以催生則季夏種之經冬至明年結子者尤效故名曰冬葵子今藥坊所鬻者皆以丈菊子爲冬葵子殊屬差誤孔子曰鮑莊子之智不如葵葵猶能衛其足誠以此花葉茂叢生自葉中出莖莖

下邊皆被葉衛護故亦名衛足花俗呼爲守足花音雖異而義則同有如促織北方亦呼爲趣織也又名一丈紅爲其莖高一丈而花色紅也其花如木槿葉如木芙蓉故高麗詠一丈紅詩有花與木槿花相似葉共芙蓉葉一般五尺欄杆遮不住猶留一半與人看之句結實大如錢作扁形其中子如榆莢至於丈菊莖長丈許幹粗如竹葉大如繅花大如盤盂單瓣黃色其花心成窠如蜂房迨中心結子成熟而周遭花瓣不凋枯一名迎陽花一名西番葵俗呼爲向日葵不知向日葵之名古人原屬之衛足花非屬之丈菊也司馬溫公詩曰四月清和雨乍晴南山當戶轉分明更無柳絮因風起惟有葵花向日傾夫丈菊原無宿根季春下種四月苗不盈尺而衛足花正開溫公詩中所謂葵花向日傾者確指衛足花無疑矣或謂羣芳譜謂丈菊花有毒能墜胎孕婦忌經其下子得花之餘氣自當長於催生答曰丈菊之花雖有墜胎之弊催生却有功效其子則用之無效惟治淋有效至於衛足之子用鍋炒爆其甲朝種之暮即生出土外物生之神速以此爲最故尤爲催生之妙品也且丈菊春種秋收不能經冬若以其花向日亦呼之曰葵則可而斷不可名之曰冬葵也

按葵菜古人推爲百菜之長以其宿根年年生長且又發生最早性甚耐旱即不堪種植之處種之無不蕃生其葉春夏秋三時皆可食且含汁黏滑又能養人八口之家有葵二畝荒年可以無饑葵之關乎民命者如此所以論荒政者以種葵爲要圖而馬踐園葵魯之民爲之經歲不飽也今人不知種之以備荒若果何故耶

和血熄風湯

治產後受風

當歸一兩

生黃芪六錢

眞阿膠不炒四錢

防風三錢

荊芥三錢

川芎三錢

生杭芍二錢

紅花一錢

生桃仁帶皮尖錢半搗

此方雖治產後受風而實以補助氣血爲主蓋補正氣即所以逐邪氣而血活者風又自去也血活風自去方書成語若產時下血過多或發汗過多以致發搐者此方仍不可用爲其猶有發表之藥也當滋陰養血以榮其筋熄其內風其搐自止若血虛而氣亦虛者又當以補氣之藥輔之而補氣之藥以黃芪爲最因黃芪不但補氣實兼能治大風也本經謂黃芪主大風一婦人產後七八日發搐服發汗之藥數劑不效詢方於愚因思其屢次發汗不效似不宜再發其汗以傷其津液遂單用阿膠一兩水融化服之而愈

一婦人產後十餘日周身汗出不止且發搐治以山萸肉去核生山藥各一兩煎服兩劑汗止而搐亦愈

東海漁家婦產後三日身冷無汗發搐甚劇時愚遊海濱其家人造寓求方其地隔藥房甚遠而海濱多產麻黃可以採取遂俾取麻黃一握同魚鰾膠一具煎湯一大碗乘熱飲之得汗而愈用魚鰾膠者亦防其下血過多因陰虛而發搐且以其物爲漁家所固有也一婦人產後發汗過多覆被三層皆濕透因致心中怔忡精神恍惚時覺身飄飄上至屋頂此虛極將脫而神魂飛越也延愚診視見其汗出猶不止六脈皆虛浮按之即無急用生山藥淨萸肉各一兩生杭芍四錢煎服汗止精神亦定翌日藥力歇而病又反覆時愚已旋里病家復持方來詢爲添龍骨牡蠣皆不用煨各八錢且囑其服藥數劑其病必愈孰意藥坊中竟謂方中藥性過涼產後斷不宜用且言此證係產後風彼有治產後風成方屢試屢驗慙思病家用之病家竟誤用其方汗出不止而脫夫其證原屬過汗所致而再以治產後風發表之藥何異鳩毒斯可爲發汗不審虛實者之爛戒矣

傳青主女科曰產後氣血暴虛百骸少血濡養忽然口緊牙緊手足筋脈拘搐類中風癰

瘵雖虛火泛上有痰皆當以末治之勿執偏門而用治風消痰方以重虛產婦也當用生  
化湯加參芪以益其氣又曰產後婦人惡寒惡心身體顫動發熱作渴人以爲產後傷寒  
也誰知其氣血兩虛正不敵邪而然乎大抵人之氣不虛則邪斷難入產婦失血過多其  
氣必大虛氣虛則皮毛無衛邪原易入不必戶外之風來襲體也即一舉一動風可乘虛  
而入然產後之風易入亦易出凡有外感之邪俱不必祛風况產後之惡寒者寒由內生  
也發熱者熱由內弱也身顫者顫由氣虛也治其內寒外寒自散治其內弱外熱自解壯  
其元氣而身顫自除也

按傅氏之論甚超特其雖有外感不必祛風二句不無可議夫產後果有外感原當治以  
外感之藥惟宜兼用補氣生血之藥以輔翼之耳若其風熱已入陽明之府表裏俱熱脈  
象洪實者雖生石膏亦可用故金匱有竹皮大丸治婦人乳中虛煩亂嘔逆方中原有石  
膏神農本經石膏治產乳原有明文特不宜與知母並用又宜仿白虎加人參湯之意重  
用人參以大補元氣更以玄參代知母始能托邪外出則石膏之寒涼得人參之溫補能  
逗遛胃中以化燥熱不至直趨下焦而與產婦有礙也拙擬仙露湯

在第六卷

後曾詳論之且

有名醫治驗之案可參觀

(附方) 醫林改錯治產後風有黃芪桃紅湯方用生黃芪半斤帶皮尖生桃仁三錢搗碎紅花二錢水煎服按產後風項背反張者此方最效

(附方) 俗傳治產後風方當歸五錢麻黃紅花白朮各三錢大黃川芎肉桂紫苑各二錢煎服按此方效驗異常即至牙關緊閉不能用藥者將齒拗開灌之亦多愈者人多畏其有大黃而不敢用不知西人治產後風亦多用破血之藥蓋以產後有瘀血者多此證用大黃以破之所謂血活風自去也况猶有麻桂之辛熱歸朮之補益以調變之乎

滋陰清胃湯

治產後溫病陽明府實表裏俱熱者

玄參兩半

當歸三錢

生杭芍四錢

甘草錢半

茅根二錢

右藥五味煎湯兩鍾分二次溫服一次即愈者停後服

產後忌用寒涼而溫熱入陽明府後又必用寒涼方解因此醫者恆多束手不知石膏玄參本經皆明載治產乳是以熱入陽明之重者可用白虎加人參以山藥代粳米湯在第六卷更以玄參代知母方後有案其稍輕者治以此湯皆可隨手奏效愚用此兩方救人多矣臨證

者當篤信本經不可畏石膏玄參之寒涼也况石膏玄參本經原皆謂其微寒並非甚寒涼之藥也

滋乳湯

治少乳其乳少由於氣血虛或經絡瘀者服之皆有效驗

生黃芪 一兩

當歸 五錢

知母 四錢

玄參 四錢

穿山甲 炒打二錢

六路通

大者三枚搗

王不留行

炒四錢

用絲瓜瓢作引無者不用亦可若用豬前蹄兩個煮湯用以煎藥更佳

消乳湯

治結乳腫疼或成乳癰新起者一服即消若已作膿服之亦可消腫止疼俾其

速潰並治一切紅腫瘡瘍

知母 八錢

連翹

四錢

金銀花 三錢

穿山甲 炒搗二錢

瓜

蒹切絲五錢

丹參

四錢

生明乳香

四錢

生明沒藥

四錢

在德州時有軍官張憲臣之夫人患乳癰腫疼甚劇投以此湯兩劑而愈然猶微有疼時慙患其再服一兩劑以消其芥蒂以爲已愈不以爲意隔旬日又復腫疼復求爲治療愚曰此次服藥不能盡消必須出膿少許因其舊有芥蒂未除至今已潰膿也後果服藥不



甚見效遂入西醫院中治療旬日後其瘡外破一口醫者用刀闢之以期便於敷藥又旬日內潰益甚滿乳又破七八個口醫者又欲盡闢之使通病人懼不敢治強出院還家復求治於愚見其各口中皆膿乳並流外邊實不能敷藥然內服湯藥助其肌肉速生自能排膿外出許以十日可爲治愈遂將內托生肌散後在作湯藥服之每日用藥一劑煎服二次果十日全愈

表姪劉子韞從愚學醫穎悟異常臨證疏方頗能救人疾苦曾得一治結乳腫疼兼治乳癰方用生白礬明雄黃松蘿茶各一錢半共研細分作三劑日服一劑黃酒送下再多飲酒數杯更佳此方用之屢次見效真奇方也若無松蘿茶可代以好茶葉

升肝舒鬱湯 治婦女陰挺亦治肝氣虛弱鬱結不舒

生黃 芪 六錢

當 歸 三錢

知 母 三錢

柴 胡 一錢五分

生明乳香 三錢

生明沒藥 三錢

川 芎 一錢五分

肝主筋肝脈絡陰器肝又爲腎行氣陰挺自陰中挺出形狀類筋之所結病之原因爲肝氣鬱而下陷無疑也故方中黃芪與柴胡芎藭並用補肝黃芪補肝之理詳第四卷醒脾升陷湯下即以舒肝而肝

氣之陷者可升當歸與乳香沒藥並用養肝即以調肝而肝氣之鬱者可化又恐黃芩性熱與肝中所寄之相火不宜故又加知母之涼潤者以解其熱也

一婦人年三十餘患此證用陳氏女科要旨治陰挺方治之不效因憶傅氏女科有治陰挺之方其證得之產後因平時過怒傷肝產時又努力太過自產門下墜一片似筋非筋似肉非肉用升補肝氣之藥其證可愈遂師其意爲製此湯服之數劑卽見消十劑全愈一室女年十五因胸中大氣下陷二便常覺下墜而小便尤甚乃誤認爲小便不通努力強便陰中忽墜下一物其形如桃微露其尖牽引腰際下墜作疼夜間尤甚劇時號呼不止投以理鬱升陷湯在第四卷將升麻加倍二劑疼止十劑後其物全消蓋理鬱升陷湯原與升肝舒鬱湯相似也

資生通脈湯

治室女月閉血枯飲食減少灼熱欬嗽

白朮炒三錢

生懷山藥一兩

生鷄肉金二錢黃色的

龍眼肉六錢

山萸肉四錢去浮核

枸杞果四錢

玄參三錢

生杭藥三錢

桃仁三錢

紅花錢半

甘草二錢

灼熱不退者加生地黃六錢或至一兩欬嗽者加川貝母三錢米穀二錢

去之

泄瀉者去

玄參加熟地黃一兩雲苓片二錢或更酌將白朮加重服後瀉仍不止者可於服藥之外

用生懷山藥細末煮粥攪入捻碎熟雞子黃數枚用作點心日服兩次瀉止後停服大便

乾燥者加當歸阿膠各數錢小便不利者加生車前子三錢

裝袋

地膚子二錢或將芍藥

善治陰虛

小便不利加重肝氣鬱者加生麥芽三錢川芎莪朮各一錢汗多者將莢肉改用六錢再加生

龍骨生牡蠣各六錢

室女月閉血枯服藥愈者甚少非其病難治實因治之不得其法也內經謂二陽之病發

心脾有不得隱曲在女子爲不月夫二陽者陽明胃腑也胃腑有病不能消化飲食推其

病之所發在於心脾又推其心脾病之所發在於有不得隱曲

凡不能自如者皆爲不得隱曲

蓋心主神脾主

思人有不得隱曲其神思鬱結胃腑必減少酸汁

化食賴酸汁歡喜則酸汁生者多憂思則酸汁生者少

不能消化飲食以

生血液所以在女子爲不月也夫女子不月既由於胃腑有病不能消化飲食治之者自

當調其脾胃使之多進飲食以爲生血之根本故方中用白朮以健胃之陽使之嚕動有

力

飲食之消亦仗胃有嚕動

山藥龍眼肉以滋胃之陰俾其酸汁多生雞內金原含有酸汁且能運化諸

補藥之力使之補而不滯血虛者必多灼熱故用玄參芍藥以退熱又血虛者其肝腎必虛故用萸肉枸杞以補其肝腎甘草爲補脾胃之正藥與方中萸肉並用更有酸甘化陰之妙桃仁紅花爲破血之要品方中少用之非取其破血欲藉之以活血脈通經絡也至方後附載因證加減諸藥不過粗陳梗概至於證之變更多端尤貴臨證者因時制宜耳滄洲城東曹莊子曹姓女年十六歲天癸猶未至飲食減少身體羸瘦漸覺灼熱其脈五至細而無力治以資生通脈湯服至五劑灼熱已退飲食加多遂將方中玄參芍藥各減一錢又加當歸懷牛膝各三錢服至十劑身體較前胖壯脈象亦大有起色又於方中加

樗雞

俗名紅娘虫

十枚服至七八劑天癸遂至遂減去樗雞再服數劑以善其後

奉天大南關馬氏女自十四歲月事已通至十五歲秋際因食瓜果過多泄瀉月餘方愈從此月事遂閉延醫診治至十六歲季夏病寢增劇其父原籍遼陽時充奉天兵工廠科長見愚所著衷中參西錄因求爲診治其身形瘦弱異常氣息微喘乾嗽無痰過午潮熱夜間尤甚飲食減少大便泄瀉其脈數近六至微細無力俾先用生懷山藥細末八錢水調煮作粥又將熟雞子黃四枚捻碎攪粥中再煮一兩沸空心時服服後須臾又服西藥

百布聖二瓦以助其消化每日如此兩次用作點心服至四日其瀉已止又服數日諸病亦稍見輕遂投以資生通脈湯去玄參加生地黃五錢川貝三錢連服十餘劑灼熱減十分之八飲食加多喘嗽亦漸愈遂將生地黃換作熟地黃又加懷牛膝五錢服至十劑自覺身體爽健諸病皆無惟月事猶未見又於方中加麝蟲

即上蟻虫背多微紋者其背光滑者非是

五枚楞鷄十枚

服至四劑月事已通遂去蟻虫楞鷄俾再服數劑以善其後

甘肅馬姓寓天津英租界安居里有女十七歲自十六歲秋際因患右目生內障服藥不愈憂思過度以致月閉自臘月服藥直至次年孟秋月底不愈其兄向爲陸軍團長時賦閑家居喜涉閱醫書見愚新出版五期衷中參西錄極爲推許遂來寓問詢求爲診治其人體質瘦弱五心煩熱過午兩頰色紅灼熱益甚心中滿悶飲食少許即停滯不下夜不能寐脈搏五至弦細無力爲其飲食停滯夜不能寐投以資生通脈湯加生赭石細研四錢熟棗仁三錢服至四劑飲食加多夜已能寐灼熱稍退遂去棗仁減赭石一錢又加地黃五錢丹皮三錢服約十劑灼熱大減又去丹皮將龍眼肉改用八錢再加懷牛膝五錢連服十餘劑身體寢壯健因其月事猶未通下又加麝蟲五枚楞鷄十枚服至五劑月事已

通然下者不多遂去楞鷄地黃加當歸五錢俾服數劑以善其後

眼科方

蒲公英湯 治眼疾腫疼或努肉遮睛或赤脈絡目或目睛脹疼或目疼連腦或羞明多

淚一切虛火實熱之證

鮮蒲公英

四兩根葉莖花皆用花開殘者去之如無鮮者可用乾者二兩代之

右一味煎湯兩大碗溫服一碗餘一碗乘熱薰洗

按目疼連腦者宜用鮮蒲公英二兩加懷牛膝一兩煎湯飲之

此方得之姻兄于俊卿言其令堂嘗患眼疾疼痛異常延醫調治數月不愈有高姓媼告以此方一次即愈愚自得此方後屢試皆效甚是奇異誠良方也夫蒲公英徧地皆有仲春生苗季春開花色正黃至初冬其花猶有開者狀類小菊其葉似大薊田家採取生啖以當菜蔬其功長於治瘡能消散癰疔毒火然不知其能治眼疾也使人皆知其治眼疾如此神效天下無瞽目之人矣

古服食方有還少丹蒲公英連根帶葉取一斤洗淨勿令見天日晾乾用斗子解鹽

即本經大

鹽晒於斗之中者出山西解池

一兩香附子五錢二味爲細末入蒲公英水內淹一宿分爲十二團用皮紙三

四層裹紮定用六一泥即蛭泥如法固濟竈內培乾乃以武火煨通紅爲度冷定取出去泥爲末早晚擦牙漱之吐咽任便久久方效年未及八十者服之鬚髮反黑齒落更生年少服之至老不衰由是觀之其清補腎經之功可知且其味苦又能清心經之熱所以治眼疾甚效者或以斯歟

### 磨翳水

治目翳遮睛

生爐甘石一兩

蓬

砂八錢

胆

礬二錢

薄荷葉三錢

蟬

退

帶全足去翅土三錢

右藥五味將前三味藥白搗細再將薄荷蟬退煎水一大鍾用其水和所搗藥末入藥鉢內研至極細將浮水者隨水飛出連水別貯一器待片時將浮頭清水仍入鉢中和所餘藥渣研細仍隨水飛出如此不計次數以飛淨爲度若飛過者還不甚細可再研再飛以極細爲度製好連水貯瓶中勿令透氣用時將瓶中水藥調勻點眼上日五六次若目翳甚厚已成肉螺者加真藏礪砂二分另研調和藥水中此方效力全在甘石生用然生用則質甚硬又恐與眼不宜故必如此研細水飛然後可以之點眼

### 磨翳散

治目睛脹疼或微生雲翳或赤脈絡目或目背潰爛或偶因有火視物不真

生爐甘石三錢

蓬硝二錢

黃連一錢

人指甲

五分鍋焙脆無翳者不用

右藥先將黃連搗碎泡碗內冷時兩三日熱時一日將泡黃連水過羅約得清水半茶鍾再將餘三味搗細和黃連水入藥鉢中研之如研前藥之法以極細爲度研好連水帶藥用大盤盛之白日置陰處晾之夜則露之若冬日微曬亦可若有風塵時蓋以薄紙俟乾貯瓶中勿透氣用時涼水調和點眼上日三四次若有目翳人乳調和點之若目翳大而厚者不可用黃連水研藥宜用蟬退帶金足去翅土一錢煎水研之蓋微茫之翳得清火之藥卽退若其翳已遮睛治以黃連成冰翳而不能消矣

明目蓬硝水

治眼疾暴發紅腫疼痛或眦多努肉或漸生雲翳及因有火而眼即發乾

昏花者

蓬硝五錢

芒硝

三錢

硝中若不明亮用水化開澄去其中泥土

右藥和凉水多半盅研至融化用點眼上一日約點三十次若陳目病一日點十餘次冬日須將藥碗置熱水中候溫點之

清腦黃連膏

治眼疾由熱者



黃連二錢爲細末香油調如薄糊常常以鼻聞之日約二三十次勿論左右眼患證應須兩鼻孔皆聞

目系神經連於腦腦部因熱生炎病及神經必生眼疾彼服藥無捷效者因所用之藥不能直達腦部故也愚悟得此理借鼻竅爲捷徑以直達於腦凡眼目紅腫之疾及一切目疾之因熱者莫不隨手奏效

益瞳丸 治目瞳散大昏耗或覺視物乏力

荳蔻肉去淨核二兩 野台參六錢 柏子仁炒一兩 玄參一兩 兔絲子炒一兩

羊肝一具切片焙乾

右藥共爲細末煉蜜爲丸桐子大每服三錢開水送下日兩次

一婦人年三旬瞳子散大視物不真不能針翳屢次服藥無效其脈大而無力爲製此丸

服兩月全愈

羊肝豬胆丸 治同前證因有熱而益甚者

羊肝一具切片曬乾冬月可用慢火焙乾

右一味軋細用豬膽汁和爲丸桐子大硃砂爲衣每服二錢開水送下日再服

按此方若用熊膽爲丸更佳而內地鮮熊胆不易得至乾者又難辨其真僞不如徑用豬膽汁爲穩妥也

西人治瞳子散大用必魯加兒必涅點之瞳子立時收縮然歷一日夜之後則收縮仍復散大日點一次旬日之外自能不散大矣

按必魯加兒必涅一名波路加便一名匹克邊其原質出拉西所產芸香料耶僕蘭日葉中若以鹽酸製之爲白色中性之結晶名鹽酸必魯加兒必涅其功用尤良能收縮平滑筋縮小瞳孔增加唾液分泌能泄瀉排除身體中蓄積之水分自小便出在耳科用於鼓室及迷路內有滲出物者而改良其所覺在眼科不但縮小瞳子且能退炎清熱然係猛悍之藥不可多用內服一次之極量爲百分瓦之二一日之極量爲百分瓦之五

溫水  
溶服

此爲至  
濃之液

用之

(附方)護眉神應散

治一切眼疾無論氣蒙火蒙肉螺雲翳或瞳人反背未過十年者皆見效方用爐甘石一兩煨透童便淬七次珍珠二顆大如綠豆以上者納通草中煨之珠

爆即速取出血琥珀三分真梅片二分半兩錢五銖錢俗名馬鎔錢開元錢各一個皆煨紅醋淬

七次共爲細末乳調塗眉上日二三

一室女病目年餘醫治無效漸生雲翳愚爲出方服之見輕停藥仍然反覆後得此方如法製好塗數次即見輕未盡劑而愈妙哉 按此方若加薄荷冰二分更效

瞳人反背之證最爲難治以其係目系神經病也蓋目系神經若一邊縱一邊縮目之光線必斜視物即不真若縱縮之距離甚大其瞳人即可反背治此證者當以養其目系神經爲主此方多用金石珍貴之品其中含有寶氣凡物之含有寶氣者皆善能養人筋肉使筋肉不腐爛目系神經即腦氣筋之連於目者以此藥塗眉上中有冰片之善通竅透膜者能引藥氣直達腦部以養目系神經目系神經之病者自愈而瞳人反背及一切眼疾亦自愈矣

（附方）治暴發眼便方其眼疾初得腫疼者用生薑三四錢食鹽一大撮同搗爛薄布包住蘸新汲井泉水擦上下眼皮屢蘸屢擦以擦至眼皮極熱爲度擦完用溫水將眼皮洗淨輕者一次即愈重者一日擦兩次亦可愈然擦時須緊閉其目勿令藥汁入眼中

(附案)晉書盛彥母氏失明躬自侍養母食必自哺之母病既久至於婢使數見捶鞭婢憤恨伺彥暫行取蟬螬炙飴之母食以爲美然疑是異物密藏以示彥彥見之抱母慟哭絕而復蘇母目豁然從此遂愈

又陸定圃曰余在曲江有將官以替離軍囑其子俾饒事供蟬螬須秘之防其父知旬日後目明趨庭申謝

按蟬螬生糞土中形狀如蠶

俗名地蠶

徧處皆有本經謂主目中淫膚青翳白膜其善治目翳

可知內障宜油炙服之外障宜取其汁滴目中

西人點眼藥水恆用皓礬和水爲之按皓礬一名硫酸亞鉛一名鉍磺養四其狀爲透映稜柱形結晶有苛烈不快之味乃亞鉛化合物中最通用之藥物其性微涼善收斂微有蝕腐作用每用一瓦融化以一百二十瓦之溫水作點眼藥能清火治目眦潰爛久之亦

能消翳

若用皓礬兩瓦加硼酸一瓦同融水點眼更佳

### 咽喉方

咀華清喉丹

治咽喉腫疼

大生地黃 切片一兩

蓬砂 研細錢半

將生地黃一片裹蓬砂少許徐徐嚼細嚥之半日許宜將藥服完

生地黃之性能滋陰清火無論虛熱實熱服之皆宜蓬砂能潤肺清熱化痰消腫止疼二藥並用功力甚大而又必細細嚼服者因其病在上煎湯頓服恐其力下趨而病轉不愈且細細嚼嚥則藥之津液常清潤患處也此方愚用之屢矣隨手奏效者不勝紀矣

咽喉之證有熱有涼有外感有內傷白喉忌表挾微一書此時盛行於世其所載之方與所載宜用宜忌之藥皆屬穩善惟其持論與方中所用之藥有自相矛盾處諄諄言忌表矣而其養陰清肺湯用薄荷二錢半豈非表藥乎至於他方中所用之葛根連翹亦發表之品也蓋白喉之證原亦溫病之類人之外膚肺主之人之內膚三焦主之蓋此證心肺先有蘊熱外感之邪又襲三焦而內逼心肺則心肺之熱遂與邪氣上併而現證於喉三焦色白故喉中作白色既有外邪原宜發表因有內熱實大忌用辛熱之藥發表惟薄荷連翹諸藥辛涼宣通復與大隊涼潤之藥並用既能散邪尤能清熱所以服之輒效也若其內熱熾盛外感原甚輕者其養陰清肺湯亦可用特其薄荷宜斟酌少用不必定用二

錢半也至謂其喉間腫甚者加煨石膏四錢微有可議夫石膏之性生則散煨則斂第一卷例言中論之甚詳熾盛之火散之則消斂之則實此又不可不知也況石膏生用原不甚涼故本經謂微寒又何必如此之小心乎今將其養陰清肺湯詳錄於左以備採用

（附方）養陰清肺湯

大生地一兩寸麥冬六錢生白芍四錢薄荷二錢半玄參八錢丹

皮四錢貝母四錢生甘草二錢喉間腫甚者加生石膏

原用煨石膏

四錢大便燥結者加清寧丸

二錢玄明粉二錢胸下脹悶加神麴焦山查各二錢小便短赤者加木通澤瀉各一錢知母二錢燥渴者加天冬馬兜鈴各三錢面赤身熱或舌苔黃色者加金銀花四錢連翹二錢

白喉之證間有服忌表訣微諸方不效而反加劇者曾治一貴州人孫搏九年二十肄業於奉天高等師範學校得白喉證屢經醫治不外忌表訣微諸方加減病日增重醫者諉謂不治後愚爲診視其脈細弱而數粘涎甚多須臾滿口即得吐出知係脾腎兩虛腎虛氣化不攝則陰火上逆痰水上泛而脾土虛損又不能制之

若脾土不虛不但能制痰水上泛並能制陰火上逆

故其咽喉腫疼粘涎若是之多也投以六味地黃湯加於朮又少加蘇子連服十劑全愈

咽喉之證熱者居多然亦兼有寒者不可不知王洪緒曰咽喉之間素分毫無病頃刻之間或疼或悶此係虛寒陰火之證用肉桂炮薑甘草各五分置碗內浸以滾水仍將碗置於滾水中飲藥一口徐徐嚥下立愈或用烏附之片塗以鮮蜜火炙透至黑取一片口含嚥津至片不甜時再換一片亦立愈按王氏之說咽喉陡然疼悶者皆係因寒然亦有因熱者或其人素有蘊熱陡然爲外感所束或勞碌過度或暴怒過度皆能使咽喉驟覺疼悶斯在臨證者於其人之身體性情動作之際細心考驗再參以脈象之虛實涼熱自無差謬若仍恐審證不確察其病因似寒而猶恐病因是熱可用蜜炙附子片試含一片以細驗其病之進退亦可

趙晴初曰雞蛋能去喉中之風余治一幼童喉風證與清輕甘涼法稍加辛藥時止時發後有人教服雞蛋頂上針一孔每日生吞一枚不及十枚病愈不復發

友人齊自芸曰平陽何漢卿遊戎患喉疼醫者治以苦寒之藥愈治愈甚漸至舌硬後有人教用棉子油煎生雞蛋煎至外熟裏仍微生日服二枚未十日遂大愈咽喉腫疼證有外治異功散方甚效其方用斑蝥一錢真血竭製乳香製沒藥上麝香全

蠲大玄參上梅片各分半將斑蝥去翅足糯米拌炒以米色微黃爲度去糯米用諸藥共研細瓶收貯勿令透氣遇有咽喉腫疼證將藥捏作小塊如黃豆粒大置在小膏藥上左腫貼右右腫貼左若左右俱腫均貼在結喉<sup>項間</sup>高骨<sup>旁</sup>軟處閱五六時即揭去膏藥有水泡用銀針挑破拭淨毒水能消腫止疼真救急之良方也

牙疳方

古方馬乳飲

治青腿牙疳

用青白馬乳早午晚隨擠隨服甚效如無青白馬雜色馬亦可若馬乳自他處取來可將碗置於開水盆中溫之

此方出於醫宗金鑑其原註云此證自古方書罕載其名僅傳於雍正年間北路隨營醫官陶起麟謂軍中凡病腿腫色青者其上必發牙疳凡病牙疳腐血者其下必發青腿二者相因而至推其原皆因上爲陽火炎熾下爲陰寒閉鬱以至陰陽上下不交各自爲寒爲熱凝結而生此證也相近內地亦間有之邊外雖亦有而不甚多惟內地人初居邊外得此證者十居七八蓋內地之人本不耐邊外嚴寒更不免坐臥濕地故寒濕之痰生於



下致腿青腫其病形如雲片色似茄黑肉體頑硬所以步履艱難也又緣邊外缺少五穀多食牛羊等肉其熱與濕合蒸瘀於胃中毒火上薰致生牙疳牙齦浮腫出血若穿腮破唇腐爛色黑即爲危候惟相傳有服馬乳之法用之頗有效驗云云

按此證愚未見過友人毛仙閣曾遇此證治愈其方愚猶記其大概爰列於左以備採用

金銀花 五錢

連翹 三錢

菊花 三錢

明乳香 四錢

明沒藥 四錢

懷牛膝 五錢

山查片 三錢

真鹿角膠

四錢搗爲細末分兩次用頭煎二煎湯藥送服

按此方若服之出汗即可見愈然方中連翹菊花發汗之力甚微恐服之不能出汗當於服藥之後再服西藥阿斯必林一瓦則無不出汗矣至汗後服第二劑時宜將菊花減半

### 敷牙疳散藥方

煨甘石 二錢

鏡面硃砂 二分

牛黃 五厘

珍珠 五厘

共研細日敷三次

### 牙疳敷簾黃法

己巳春閱滬上幸福醫學報載有時賢章成之言有誤用簾黃治愈走馬牙疳之事甚爲奇異茲特錄其原文於左以供醫界之研究

幸福報原文 丁卯三月余偕友數人偶至仁濟觀優有潘氏子年四歲患走馬牙疳起纔三日牙齦腐化門牙已脫數枚下唇已潰穿其勢甚劇問尙有可救之理否詢其由則在發癰之後實爲邪熱入胃毒火猖狂一發難遏證情危險告以止有白馬乳涼飲並不時洗之塗以人中白內服大劑白虎湯或有可救但勢已穿唇效否不敢必耳因書生石膏生知母生打寒水石象貝等爲方與之其時同遊者有老醫倪君景遷因謂之曰牛黃研末外摻腐爛之處亦可治遂彼此各散後數日則此兒竟已痊癒但下唇缺不能完因詢其用何物療治乃得速效若斯則曰用倪先生說急購籐黃屑而摻之果然一摻腐勢即定血水不流漸以結靨落痂止三日耳內服石膏等一方亦僅三服此兒獲愈誠二位先生再造之恩也云云因知鄉愚無識誤聽牛黃爲籐黃然以此一誤而竟治愈極重之危證開藥學中從古未有之實驗胡可以不誌也嘗考李氏綱目蔓草中曾載籐黃而功用甚略至趙恕軒本草綱目拾遺言之甚詳雖曰有毒而可爲內服之品且引粵誌謂其性最寒可治眼疾味酸澀治癰腫止血化毒斂金瘡能除虫同麻油白臘熬膏敷金瘡湯火等傷止疼収口其效如神而其束瘡消毒之用又甚多可知此藥竟是外科中絕妙

良藥而世多不知用者誤於李氏海藥本草有毒之兩字而張石頑更以能治蛙齒點之即落而附會爲毒損骨傷腎於是畏之甚於蛇蝎實不知石頑不可信今之畫家常以入口雖曰與花青並用可解其毒余以爲亦理想之談耳既曰性寒毒於何有然後知能愈牙疳正是寒涼作用且其味酸澀止血止疼收口除虫皆其能治牙疳之切實發明也按走馬牙疳之原因有內傷外感之殊得於由內傷者輕而緩由外感者重而急此幼童得於癰疹之後其胃中蘊有瘟毒上攻是以三日之間即腐爛如此幸內服石膏寒水石外敷簾黃內外夾攻皆中要肯是以其毒易消結痂亦在三日內也若當牙疳初起之時但能用藥消其內蘊之毒熱即外不敷藥亦可治愈曾治天津法租界竹遠里于氏幼童年六七歲身出癰疹旬日之外熱不退牙齦微見腐爛其家人懼甚恐成走馬牙疳急延愚爲診視脈象有力而微弦知毒熱雖實因病久者氣分有傷也問其大便三日未行遂投以大劑白虎加人參湯方中生石膏用三兩野黨參用四錢又加連翹數錢以托疹毒外出煎湯三茶鍾俾分三次溫飲下又用羚羊角一錢煎水一大茶鍾分數次當茶飲之盡劑熱退而病愈牙齦腐爛之處亦遂自愈

瘡科方

消瘰丸 治瘰癧

牡蠣 煅十兩

生黃芪 四兩

三稜 二兩

莪朮 二兩

朱血竭 一兩

生明乳香 一兩

生明沒藥 一兩

龍膽草 二兩

玄參 三兩

浙貝母 二兩

右藥十味共爲細末蜜丸桐子大每服三錢用海帶五錢洗淨切絲煎湯送下日再服瘰癧之證多在少年婦女日久不愈可令信水不調甚或有因之成勞瘵省其證係肝胆之火上升與痰涎凝結而成初起多在少陽部位或項側或缺盆久則漸入陽明部位一顆壘然高起者爲瘰數顆歷歷不斷者爲癧身體強壯者甚易調治曾治一少年項側起一瘰癧其大加茄上連耳下至缺盆求醫治癧言服藥百劑亦不能保其必愈而其人家貧傭刀爲人芸田不惟無錢買如許多藥即服之亦不暇然其人甚強壯飲食甚多俾於一日三餐之時先用飯湯送服煅牡蠣細末七八錢一月之間消無芥蒂又治一婦人在缺盆起一瘰癧大如小橘其人亦甚強壯無他病俾煮海帶湯日日飲之半月之間用海帶二斤而愈若身體素虛弱者即煮牡蠣海帶但飲其湯脾胃已暗受其傷蓋其鹹寒之

性與脾胃不宜也此方重用牡蠣海帶以消痰軟堅爲治瘰癧之主藥恐脾胃弱者久服有碍故用黃芪三稜莪朮以開胃健脾

三藥並用能開胃健脾第一卷十全育真湯下會詳之言

使脾胃強壯自能運化藥力

以達病所且此證之根在於肝胆而三稜莪朮善理肝胆之鬱此證之成堅如鐵石三稜莪朮善開至堅之結又佐以血竭乳香沒藥以通氣活血使氣血毫無滯碍瘰癧自易消散也而猶恐少陽之火熾盛加胆草直入肝胆以瀉之玄參貝母清肅肺金以鎮之且貝母之性善於療鬱結利痰涎兼主惡瘡玄參之姓名醫別錄謂其散頸下核開寶本草謂其主鼠瘻二藥皆善消瘰癧可知族姪女患此證治數年不愈爲製此方服盡一料而愈按方書謂牡蠣左顧者佳然左顧右顧辨之頗難此物乃海中水氣結成億萬相連或覆或仰積聚如山古人謂之蠪山覆而生者其背凸仍覆置之視其頭向左回者爲左顧仰而生者其背凹仍仰置之其頭亦向左回者爲左顧若不先辨其覆與仰何以辨其左右顧乎然瘰癧在左邊用左顧者佳若瘰癧在右邊用左顧者未必勝於右顧者也

血竭色赤味辣色赤故入血分味辣故入氣分其通氣活血之效實較乳香沒藥爲尤捷諸家本草未嘗言其辣且有言其但入血分者皆未細心實驗也然此藥僞者甚多必未

研時微帶紫黑若血乾之色研之紅如雞血且以置熱水中則鎔化須臾復凝結水底成塊者乃爲真血竭

消癰膏 消癰癰

生半夏一兩

生山甲三錢

生甘遂一錢

生馬前子 剪碎四錢

皂角三錢

朱血竭二錢

右藥前五味用香油煎枯去渣加黃丹收膏火候到時將血竭研細攪膏中鎔化和勻隨瘡大小攤作膏藥臨用時每藥一貼加麝香少許

友人之女年五歲項間起癰癰數個年幼不能服藥爲製此膏貼之全愈

凡膏藥中用黃丹必以火炒過然後以之熬膏其膠黏之力始大而麝香不早加入膏藥中者以麝香忌火也

化腐生肌散 治癰癰已潰爛者用此藥擦之他瘡破後者亦可用之

爐甘石 煨六錢

乳香三錢

沒藥三錢

明雄黃二錢

蓬砂三錢

礞砂二分

冰片三分

共研細收貯瓶中勿令透氣日擦患處三四次用此藥長肉將平時收口不速者可加珍

珠一分煨研細攪入其煨法詳護眉神應散後

西藥之防腐生肌者首推沃度仿謨以之和於十倍或二十倍之脂肪油中日塗瘡上二三次或作藥棉塞瘡孔其防腐生肌之力甚優

又治皮膚瘡瘍毒瘰火毒恆用海碘酒塗之兩三次即消海碘酒者用海碘沃剝等分而鎔以二十五倍之燒酒也

沃度仿謨一名黃碘爲有光澤黃色小葉形或小板形之結晶有燒臭味爲防腐生肌之要品係用沃度製成沃度即海碘也其原質存於海草中若昆布海帶海藻之類其形狀爲灰黑色菱角形小板形狀或葉狀之乾燥結晶有金屬樣光澤放特異之臭氣其性善變物質以之接觸於皮膚皮膚即變褐色二三日後作屑脫落故善消皮膚之毒

沃剝即沃度加留謨之省文一名沃度加里其原質存於海水海產動物植物或礦泉中其人工的製法於加里鹵液中溶解沃度同時其生成之沃度酸鹽以木炭還元之即成白色乾燥體形之結晶有特異之辛鹹味其功用近於沃度而無沃度之腐蝕性故宜與沃度同用

內托生肌散

治癰癤瘡瘍破後氣血虧損不能化膿生肌或其瘡數年不愈外邊瘡口

甚小裏邊潰爛甚大且有串至他處不能敷藥者

生黃芪 四兩

甘草 二兩

生明乳香 一兩半

生明沒藥 一兩半

生杭芍 二兩

天花粉 三兩

丹

參 一兩半

右七味共爲細末開水送服三錢日三次若將散劑變作湯劑須先將花粉改用四兩八錢一劑分作八次煎服較散劑生肌尤速

從來治外科者於瘡瘍破後不能化膿生肌者不用八珍即用十全大補不知此等藥若遇陽分素虛之人服之猶可若非陽分素虛或兼有虛熱者連服數劑有不滿悶煩熱飲食頓減者乎夫人之後天賴水穀以生氣血賴氣血以生肌肉此自然之理也而治瘡瘍者欲使肌肉速生先令飲食頓減斯猶欲樹之茂而先戕其根也雖瘡家陰證亦可用辛熱之品然林屋山人陽和湯爲治陰證第一妙方而重用熟地一兩以大滋真陰則熱藥自無偏勝之患故用其方者連服數十劑而無弊也如此方重用黃芪補氣分以生肌肉有丹參以開通之則補而不滯有花粉芍藥以涼潤之則補而不熱又有乳香沒藥甘草



化腐解毒贊助黃芪以成生肌之功况甘草與芍藥並用甘苦化合味同人參能雙補氣血則生肌之功愈速也至變散劑爲湯劑花粉必加重者誠以黃芪煎之則熱力增花粉煎之則涼力減故必加重而其涼熱之力始能平均相濟也至黃芪必用生者因生用則補中有宣通之力若炙之則一於溫補固於瘡家不宜也

林屋山人證治全生集黃芪甘草皆忌炙用集中載治一王姓媳頸內瘰癧數個兩腋惡核三個又大腿患一毒不作腫疼百日餘漸發大形大如斗按之如石皮現青筋常作抽疼經治數人皆稱曰癰余曰癰乃軟者世無石硬之癰而此是石疽也問可治否答曰初起時皆可消日久發大上現青筋紋雖按之如故然其根下已成膿矣如偶作一抽之疼乃有膿之證也上現青筋者其內已作黃漿可知如上現小塊高低如石巖者不治如現紅筋者其內已通血海不治倘生斑點即自潰之證若潰即放血三日內斃今患處現青筋者醫至半軟爲半功潰後膿濃厚可冀收功也遂外以鮮商陸搗塗內服陽和湯十日則一抽之疼止十三劑裏外作癢十六劑頂軟十八劑連根皆軟其頸項之瘰癧兩腋之惡核皆消止剩石疽高起內膿垂下令服參一錢因在筋絡之處先以銀針刺穿後以刀

關其口以紙釘塞孔內次日兩次流水斗許大劑滋補托裏則去人參倍增生黃芪連服十劑亦見愈適有伊戚亦外科家令其芫草換炙者服不三四圍發腫內作疼痛復延余治仍令照前方服二十劑外以陽和膏隨其根盤貼滿獨留瘡口且以布條緊束人問因何用膏貼又加布束答曰凡屬陰疽外皮活內膜生開深傷膜膜爛則無治所出之膿在皮裏膜外僅似空衝又不能以生肌藥放入故內服溫補滋陰活血之劑外貼活血溫暖膏藥加之以緊速使其皮膜相連易於膿盡且易於接連生肌果束後數日內膿濃厚加參服兩月收功

一人年二十餘因抬物用力過度腰疼半年不愈忽於疼處發出一瘡在脊梁之旁微似紅腫狀若覆盂大徑七寸瘍醫以爲腰疼半年始現此瘡其根蒂必深而難治且其內外發熱飲食懶進舌苔黃厚脈象滑數知其證兼外感實熱投以白虎加人參湯熱退能食數日又復虛汗淋漓晝夜不止遂用龍骨牡蠣皆不生杭芍生山藥各一兩爲方兩劑汗止繼治以清火消腫解毒之藥若拙擬消乳湯在去瓜蒌加金線重樓三七沖服之類更加鹿角霜錢許以引經惟消乳湯以知母爲君重八錢茲則所用不過五六錢外用五倍子

三七枯礬金線金樓白及爲末以束其根乳香沒藥雄黃金線金樓三七爲末以敷其頂皆用醋調之旬日瘡消三分之二其頂甚軟遂以烏金膏以雄黃炒巴豆仁至黑色研細名烏金膏調香油敷其軟處二日瘡破出稠膿若干將此內托生肌散改作湯劑投之外敷拙擬化腐生肌散在七八日間瘡口長平結痂而愈自言其瘡自始至終未嘗覺疼蓋因用藥節節得着也然徒精外科者又何能治此瘡乎

徐靈胎治瘡最重圍藥以圍藥束住瘡根不使毒勢散漫又能阻隔周身之熱力不貫注於瘡則瘡必易愈愚治此瘡所用束根之藥實師徐氏之意也

### 洗髓丹

治楊梅瘡毒蔓延周身或上至頂或下至足或深入骨髓無論陳新輕劇服之

皆有奇效三四日間瘡痂即脫落

### 淨輕粉

二錢炒至光色減去三分之二研細蓋此藥炒之則烈性少緩若炒之過度又恐無力火候宜中用其大片即淨輕粉

### 淨紅粉

一錢研細須多帶紫黑片者用之方有效驗

### 露蜂房

如拳大者一個大者可用一半小者可用兩個炮至半黑半黃色研細炮時須用物按之着鍋

### 核桃

十個去皮搗碎炮至半黑半黃色研細紙包數層壓去其油蓋油多即不好爲丸用

右諸藥用熟棗肉爲丸黃豆粒大曬乾分三次服之服時須清晨空心開水送下至午後方可飲食忌腥半月服後口含柳棍有痰涎即吐出愈多吐愈好睡時將柳棍橫含兩端各繫一繩兩繩之端結於腦後防睡着掉落又須將柳棍勤換即將藥服完仍須如此必待不吐痰涎時方可不含柳棍其藥日服一次若惡心太甚者亦可間日一服製此藥時須自經手將輕粉紅粉秤極准其秤當以庫秤爲定法輕粉須秤准後再炒

此方人多有疑其服之斷生育者非也輕粉雖烈煨之則烈性頓減紅粉雖性近輕粉而止用一錢且分作三日服之又有棗肉之甘緩以解毒核桃仁多用室十枚峻補腎經以防患配合得宜服之自有益無害此方愚用屢矣服後生男女者不勝紀也

楊梅之毒先中於精室之中其處在大腸之前膀胱之後有脂膜兩片相併在男子爲精室女子爲血室原男以化精女以繫胞之所此與下焦脂膜相連其毒即可由下焦蔓延於中焦上焦以外達於周身且下焦脂膜與腸相連其毒可由下焦而入腸中焦脂膜絡脾連胃其毒可由中焦脂膜入脾以達於胃或由與胃相連處直達於胃夫毒在腸胃可用降藥下之而其散漫於周身者不能下也且精室通腎腎原主骨而其毒之由腎入骨

者愈不能下也惟輕粉係水銀同礬石升鍊而成紅粉亦係水銀同礬石硝石諸藥升鍊而成其質本重墜故能深入其成於升鍊故能飛揚是以內決骨髓中通臟腑外達皮膚善控周身之毒涎借徑於陽明經絡自齒齦上齦屬足陽明下齦屬手陽明而出也蜂房乃蜂採取窠紙腐木與其口中毒涎黏結而成故仍能引人身之毒涎透出口齒且有以毒攻毒之妙用爲輕粉紅粉之佐使毒涎之出者愈多即內毒之消者愈速矣核桃乃果核最大者夫果之有核猶人之有骨是以骨稱骸骨其字旁皆從亥也核桃之核若是其大其仁且又潤而多脂性能補骨益髓可知且又善解疥癬之毒其能解他瘡之毒亦可知加於此藥之中補正兼以逐邪毒之深入骨髓者亦不難消除矣至於丸以棗肉取其甘緩之性能緩二粉之猛悍又能補助腸胃使不爲毒藥所傷也

服藥之後其牙齦必腫間有爛者因毒涎皆從此出故也然內毒既清外證不治自愈或用甘草蓬砂金銀花熬水漱之亦可

蜂房有三種有黃色大蜂其房上下恒作數層其毒甚大不宜用曾見有以之煎水漱牙疼者其牙齦遂皆潰爛脫牙十餘枚有黃色小蜂其房甚小房孔僅如綠豆雖無大毒而

力微又不堪用惟其蜂黃而兼紅大近寸許恒在人家屋中壘房俗呼爲馬蜂其房入藥最宜然其房在樹上者甚少若無在樹上之露蜂房在屋中者亦可用特稍宜加重耳

附錄服硫黃法

嘗觀葛樺川肘後方首載扁鵲玉壺丹係硫黃一味九轉而成治一切陽分衰憊之病而其轉法所需之物頗難備具今人鮮有服者愚臨證實驗以來覺服製好之熟硫黃猶不若徑服生者其效更捷蓋硫黃製熟則力減少服無效多服又有燥渴之弊服生硫黃少許即有效而又無他弊也十餘年間用生硫黃治愈沉寒錮冷之病不勝計蓋硫黃原無毒其毒也即其熱也使少服不令覺熱即於人分毫無損故不用製熟即可服更可常服也且自古論硫黃者莫不謂其功勝桂附惟徑用生者係愚之創見而實由自家徐徐實驗確知其功效甚奇又甚穩妥然後敢以之治病今邑中日服生硫黃者數百人莫不飲食加多身體強壯皆愚爲之引導也今略舉生硫黃治驗之病數則於左

一孺子三歲失乳頻頻滑瀉米穀不化瘦弱異常俾嚼服生硫黃如綠豆粒大兩塊當日滑瀉即愈又服數日飲食加多肌肉頓長後服數月嚴冬在外嬉戲面有紅光亦不畏寒

一叟年近六旬得水腫證小便不利周身皆腫其脈甚沉細自言素有疝氣下焦常覺寒涼愚曰欲去下焦之寒非服硫黃不可且其性善利水施之火不勝水而成水腫者尤爲對證爲開苓桂朮甘湯加野台參三錢威靈仙一錢一日煎渣再服皆送服生硫黃末二分十日後小便大利腫消三分之二下焦仍覺寒涼遂停湯藥單服硫黃試驗漸漸加多一月共服生硫黃四兩周身腫盡消下焦亦覺溫暖

一人年十八九常常嘔吐涎沫甚則吐食診其脈象甚遲濡投以大熱之劑毫不覺熱久服亦無效驗俾嚼服生硫黃如黃豆粒大徐徐加多以服後移時覺微溫爲度後一日兩次服每服至二錢始覺溫暖共服生硫黃四斤病始除根

一數月孺子乳汁不化吐瀉交作常常啼號日就羸瘦其啼時蹙眉似有腹痛之意俾用生硫黃末三厘許乳汁送服數次而愈

一人年四十許因受寒腿疼不能步履投以溫補宣通之劑愈後因食豬頭豬頭鹹寒與猪肉不同反覆甚劇疼如刀刺再服前藥不效俾每於飯前嚼服生硫黃如玉粒粒大服後即以飯壓之試驗加多後每服至錢許共服生硫黃二斤其證始愈

一叟年六十有一頻頻欬吐痰涎兼發喘逆人皆之爲勞疾未有治法診其脈甚遲不足三至知其寒飲爲恙也投以拙擬理飲湯在第三卷加人參附子各四錢喘與欬皆見輕而脈之遲仍舊因思脈象如此非草木之品所能挽回俾服生硫黃少許不覺溫暖則徐徐加多兩月之間服生硫黃斤餘喘與欬皆愈脈亦復常

一婦人年五旬上焦陽分虛損寒飲留滯作嗽心中怔忡飲食減少兩腿畏寒臥牀不起者已二年矣醫者見其欬嗽怔忡猶認爲陰分虛損復用熟地阿膠諸滯泥之品服之病益劇後愚診視脈甚弦細不足四至投以拙擬理飲湯加附子三錢服七八日欬嗽見輕飲食稍多而仍不覺熱知其數載沉疴非程功半載不能愈也俾每日於兩餐之前服生硫黃三分體驗加多後服數月其病果愈

按古方中硫黃皆用石硫黃而今之硫黃皆出於石其色黃而亮砂粒甚大且無臭氣者即堪服食且此物燃之雖氣味甚烈嚼之實無他味無論病在上在下皆宜食前嚼服服後即以飯壓之若不能嚼服者爲末開水送服亦可且其力最長即一日服一次其熱亦可晝夜不歇



## 解砒石毒兼解洋火毒方

初受其毒者在胃上脘用生石膏一兩生白礬五錢共軋細先用雞子清七枚調服一半即當吐出若猶未吐或吐亦不多再用生雞子清七枚調服餘一半必然湧吐吐後若有餘熱單用生石膏細末四兩煮湯兩大碗將碗置冰水中或新汲井泉水中俾速冷分數次飲下以熱消爲度若其毒已至中脘不必用吐藥可單用生石膏細末二三兩如前用雞子清調服酌熱之輕重或兩次服完或三次四次服完毒解不必盡劑且熱消十之七八即不宜再服石膏末宜仍如前煮生石膏湯飲之以消其餘熱若其毒已至下脘宜急導之下行自大便出用生石膏細末二兩芒硝一兩如前用雞子清調服毒甚者一次服完服後若有餘熱可如前飲生石膏湯此方前後雖不同而總以石膏爲主此乃以石治石以石之涼者治石之熱者愚用此方救人多矣雖在垂危之候放胆用之亦可挽救

## 治夢遺運氣法

語有之心病難醫少年夢遺之病所謂心病也故治此病者用藥頗難見功曾見方書載有人患此病百藥不效有僧教以自尾閥脊骨盡處將氣提起如忍大便之狀且聳肩縮頸如

用力頂重物其病遂愈

按人之腦髓神經循脊下行而後人有夢遺之患僧所云云彷彿若道家逆轉河車工夫是以有效然此僧特約略言之今若更能藉呼吸之外氣以運內氣之升降其法始備而以治此證尤驗欲行其法者當收視返聽一志凝神使所吸之氣下行歸根當其吸氣下行之時即以意默運真氣轉過尾閭循夾脊而上貫腦部略停一停又乘氣外出之機以意送此氣下歸丹田真氣之升降借助於呼吸之外氣而實與呼吸外氣之升降息息逆行丹經所謂巽風倒吹也如此呼吸如環督任流通氣化團結夢遺自除也

或問道書真詮謂通督任之法當默默凝神常照氣穴

丹經云凝神入氣穴

迨至元氣充滿自能衝開

督脈循脊上行至腦復轉而下行與任脈相通由是觀之當精勤內煉以聽督任之自通而非有所矯強於其間也今謂通督任之法如此果真能通督任乎若非督任真通何以謂小周天乎答曰道家有以氣通督任之法有以意通督任之法氣通督任者純憑先天內鍊工夫一毫不着後天迹象迨至日積月累元氣充足勃然而動衝開督脈以通任脈有水到成渠之妙誠有如子所云者然若此則金丹基礎已立功候不易到也至於意通

督任者即愚右所云云者是也此道家因向道者不能盡除其慾心致有夢遺之病乃設此意通督任之法遵而行之可以清心寡欲可以祕氣藏真雖係後天有迹象工夫以之修道規不足以之治病則有餘也亦名之小周天者美其名以動人之信仰而厚其篤行之力也

或問意通督任之法必藉呼吸之氣以升降矣至氣通督任者亦有藉於呼吸之氣否答曰子所問者乃道家至要至祕之處各丹書皆未明揭因非其人不欲傳也愚原門外漢何能道其精詳然可爲子約略言也方元氣之通督脈也恆在人不及防備之時其氣陡然起於虛危過尾闕透夾脊循督貫腦此時無所藉於呼吸亦不暇用其呼吸也迨積之又久此氣發動十餘次不能自通於任脈轉有蓄極下行之勢於斯知其火候已到默默靜候迨其氣又發動即可助以呼吸之氣立定天心之主宰藉巽風倒吹以默運法輪其氣自能由督脈而達任脈然此乃隨元氣自然發動之機而默爲輔相非有所矯強於其間也有志之士由此約略者而深求之自能得其精詳矣

夢遺之證若治以藥餌宜於臨睡時濃煎龍骨牡蠣湯送服抱水三物丸

附載於第七卷一味藥發湯後

二十

丸頗有效驗連服一月可以除根

（跋語）醫學衷中參西錄八卷鹽山張君壽甫著余與君素不識戊午榷稅瀋陽斯書由天地新學社出版印行購而閱之喜其所立各方附以論說醫案多有發前人所未發者洵醫中巨擘也會友人妻患癰疽數年未愈疊更多醫寢至食少疼劇纏綿牀褥者一月向余索方錄書中理衝湯方與之服十餘劑飲食日進疼止魂消病遂愈益信君之方誠歷試不爽確有心得者也以奉省良醫之少也謀之劉君海泉乃介天地新學社友人聘君來奉開辦立達醫院爲拯救一方疾苦計果治愈垂危之證多人聲譽大起今春斯書再版行印余任校讐之役爰將與君相知及用君方獲效之故綴數語於卷末

己未暮春宛平齊福田自芸敬跋於瀋陽榷稅公所

民國九年于役運城維新醫院院長姚君匯川出鹽山張壽甫先生所著衷中參西錄見贈曰此作醫中濟世慈航也受而讀之覺語語具有至理脈脈無不貫通遵古更與古爲新喜新更獨闢機緘欣忭之餘恨未一見其人戊辰春遊津沽聞人傳四大名醫壽甫先生其一追念曩事益用神往然猶未悉懸壺所在也及卜居東門內乃稍稍知中西匯通

醫社爲先生著書傳道之地斯社去謁居非遙久乃得知豈景仰不誠耶抑天之慳我緣耶喜極趨謁即日訂交慨自先君理亭公心精農軒玉札丹砂待用無遺翼不能肯構顧一行作吏遑遑交城平陸間俄而從戎俄而司侯醫國不稱並先人所傳醫人者亦俱墜焉寧不愧顏今邂逅先生於海角雖遲之又久終邀天假或者先人之澤之未泯歟夫醫理至微也中西得其一已不易况融會貫通更獨出己見先生誠醫界之偉人乎茲值先生重印衷中參西錄前三期將竣因綴數行於末以誌平素景仰之忱云

民國十八年秋晉城桐皋張鳳翼謹跋於天津特別市公安局

## 附記

醫學衷中參西錄價目及售法

- (一)前 三 期(處 方 學)二厚冊實價二元三角一次買五部者外贈一部
- (二)增廣第四期(藥物講義)一厚冊實價一元六角一次買五部者外贈一部
- (三)增廣第五期(醫 論)二厚冊實價二元三角一次買五部者外贈一部
- (四)第 六 期(醫案附詩草)一厚冊實價一元六角一次買五部者外贈一部
- (五)第 七 期(傷寒講義)一原冊實價一元六角一次買五部者外贈一部

以上均按實價不折不扣郵買者不加郵費(國外加二成)一次買全書一部者廉價  
八元四角一次買全書六部者外贈一全部

中西匯通醫社



## 緊要啟事

啓者先嚴壽甫府君所著醫學衷中參西錄皆由本醫社自行出版先後出書凡七期版權所有自不得任人翻印近來申地發現有翻印本字跡模糊紙料遠遜原書無恥之徒從中漁利除進行究查外特鄭重聲明此後凡敝處發行之書自前三期至第七期均蓋有鄙人張春生印章其有未經蓋章者即爲翻本請購者注意是幸

蓋章處



天津中西匯通醫社  
張陰生潮春 謹啓

## 附 識

吾師之衷中參西錄 民七初刊於奉天 民十八刊於天津 此次更版 爲第五次  
行銷海內 遠至歐美東瀛南洋高麗 已十餘萬帙矣 吾師逝世之明年 予旣與春  
生兄 及諸同學 編輯遺著 爲衷中參西錄第七期 今三期本又重印葢事 春兄  
囑予一言以記其事 予以爲書中大意 諸君子之序跋詳矣 予復何可言者 無已  
則書師言以自警乎 憶癸酉之春 師由東門內移居法租界之廣德新里 茅屋數椽  
僅可容膝 值雨絲繚紛之夜 一燈如豆 與師聚談 師曰 哲學科學 原是一  
道 中醫西醫 原是一理 中醫重氣化 西醫重試驗 氣化則流於虛玄 試驗則  
證諸真實 然虛之極必歸於實 真之極又莫不歸於玄 此自然之理 宇宙間萬事  
萬物 化生不息 由無而有 其終也由有而無 夫由無而有者 即科學物質不滅  
之證實也 由約而博 一本散爲萬殊也 由有而無者 佛說一切有形皆是幻之結  
果也 由博返約 萬殊仍歸一本也 西醫謂人之生也 方受胎時 七日而成小胚  
不過露珠一滴而已 所謂露珠 水也 氣也 無形生有形之始也 人之死也  
十五種原質 漸次變滅 化歸烏有 有形化無形之終也 人之目能視 口能言



轉動自如 思想靈敏 果何物使然 人乍死 而十五種原質猶是也 何以不能活  
潑玲瓏也 吾知雖科學至精 恐將無以證明確切 是科學有時而窮 中庸云 道  
也者 不可須臾離也 老子曰 道無可名 強名曰道 內經名之曰真 意謂萬物  
皆假 惟此爲真 真也道也 一而二 二而一者也 視之不見 聽之不聞 搏之  
不得也 虛無飄渺 不可想像也 故曰 真之極 復歸於玄也 方今舟車人力  
四海環通 東西文化 應互相容納 科學得哲學以深造 哲學賴科學以證實 將  
來道器合一 爲物不二 治古今中外於一爐 以哲學改造科學 以中醫溶化西醫  
俾世人打破門戶之見 共同研究 以圖進益 吾以衷中參西名書 意在斯乎  
意在斯乎 予聆師言 深爲憤興 乃自頻年以來 遭逢不偶 荊棘橫生 學業日  
荒 未能秉先師之遺訓 發揚光大 上慰先師在天之靈 撫躬自問 能無汗顏  
因於書成之日 略誌師言如上云

民國二十四年中秋節後三日深縣受業張堃方輿謹誌於天津時年三十

民國七年在奉天初版爲第一期  
 民國八年在奉天再版爲第二期  
 民國十三年在奉天三版爲第三期  
 民國十八年在天津四版爲前三期合編  
 民國二十四年在天津五版

鹽山張錫純壽甫著 定價每部實洋二元三角

長男 蔭潮 春生 校訂 孫銘勳參校  
 受業 高如璧 經廉

天津孫玉泉靜明  
 通縣高崇勳硯樵  
 深縣張堃方輿 重校  
 受業 天津李寶蘇允中



發行處 天津法租界大安里中西匯通醫社張蔭潮春生  
 代售處 各省各大書局  
 代印處 天津益世報館

