御纂醫宗金鑑刪補名醫方論

卷二十六

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
27 HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

ChL 7918.7638

獨參湯起至硃砂安神丸止

計二十五方



六十二卷

27

御纂醫宗金鑑卷二十六

刪補名醫方論卷一目錄

獨參湯
參附湯
生脈飲
保元湯
四君子湯
五味異功散
六君子湯

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

七味白术散
香砂六君子湯
當歸補血湯
佛手散
四物湯
聖愈湯
地骨皮飲
犀角地黃湯
四生丸

當歸六黃湯
黃耆建中湯
雙和飲
人參養榮湯
歸脾湯
妙香散
天王補心丹
酸棗仁湯
硃砂安神丸

御纂醫宗金鑑卷二十六

刪補名醫方論卷一

古醫方得人乃傳非人勿言故扁鵲倉公皆
稱禁方不輕授人誠重之也後漢張機著傷
寒雜病論始立衆方公之天下故建安以前
苦於無方元豐而後雖有局方漫無指歸不
可爲法今博集金匱千金外臺諸書及王好
古李杲劉完素朱震亨張從政薛已諸方之
佳者採錄成編然方論始於成無已近代則

有吳琨李中梓柯琴汪昂諸家於醫方雖各有發明但其間或有擇焉未精語焉未詳者復推其立方之意綜其簡要刪繁補闕歸於明顯名之曰刪補名醫方論以昭示來玆云

獨參湯

治元氣大虛昏厥虛微欲絕及婦人崩產脫血血暈

人參（分兩隨人隨證）

須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨證加減

集註　柯琴曰一人而係一世之安危者必重其權而專任之一物而係一人之死生者當大其服而獨用之故先哲於氣幾息血將脫之證獨用人參二兩濃煎頓服能挽回性命於瞬息之間非他物所可代也世之用者恐或補住邪氣姑少少以試之或加消耗之味以監制之其權不重力不專人何賴以得生乎如古方霹靂散大補丸皆用一物之長而取效最捷於獨參湯何疑耶

按若病兼別因則又當隨機應變於獨參湯中或加熟附補陽而回厥逆或加生地涼陰而止吐衄或加黃耆固表之汗或加當歸救血之脫或加薑汁以除嘔吐或加童便以止陰煩或加茯苓令水化津生治消渴泄瀉或加黃連折火逆衝上治噤口毒痢是乃相得相須以有成亦何害其爲獨哉如薛已治中風加人參兩許於三生飲中以駕馭其邪此眞善用獨參者矣

參附湯

治陰陽氣血暴脫等證

人參　附子　製

水煎服

註先身而生謂之先天後身而生謂之後天先天之氣在腎是父母之所賦後天之氣在脾是水穀之所化先天之氣爲氣之體體主靜故子在胞中賴母息以養生氣則神藏而機靜後天之氣爲氣之用用主動故育形之後

資水穀以奉生身則神發而運動天人合德二氣互用故後天之氣得先天之氣則生生而不息先天之氣得後天之氣始化化而不窮也若夫起居不慎則傷腎腎傷則先天氣虛矣飲食不節則傷脾脾傷則後天氣虛矣補後天之氣無如人參補先天之氣無如附子此參附湯之所由立也二藏虛之微甚參附量爲君主二藥相須用之得當則能瞬息化氣於烏有之鄉頃刻生陽於命門之內方名人參黃耆湯補氣兼止汗失血陰亡以附子易生地名人參生地黃湯固氣兼救陰寒濕厥汗以人參易白朮名朮附湯除濕兼溫裏陽虛厥汗以人參易黃耆名耆附湯補陽兼固表此皆參附湯之轉換變化法也醫者擴而充之不能盡述其妙

之最神捷者也若表虛自汗以附子易黃耆

生脈飲

治熱傷元氣氣短倦怠口渴出汗

人參　麥門冬

五味子

水煎服

註經云大氣積於胸中則肺主之夫暑熱傷肺肺傷則氣亦傷矣故氣短倦怠而喘欬也肺主皮毛肺傷則失其衛護故汗出也熱傷元氣氣傷則不能生津故口渴也是方君人參

以補氣卽所以補肺臣麥冬以清氣卽所以清肺佐五味以斂氣卽所以斂肺吳瑭云一補一清一斂養氣之道備矣名曰生脈以脈得氣則充失氣則弱李杲謂夏月服生脈飲加黃耆甘草名生脈保元湯令人氣力湧出更加當歸白芍名人參飲子治氣虛喘欬吐血衄血亦虛火可補之例也

保元湯

治男婦氣虛之總方也嬰兒驚怯痘家虛者最宜

黃耆三錢　人參二錢

甘草一錢　肉桂春夏二三分　秋冬六七分

右四味水煎服

集註柯琴曰昔東垣以此三味能瀉火補金培土爲除煩熱之聖藥鎭小兒之驚效如桴鼓魏桂巖得之以治痘家陽虛頂陷血虛漿清皮

薄發癢難灌難斂者始終用之以爲血脫須補氣陽生則陰長有起死回生之功故名之爲保元也又少佐肉桂分四時之氣而增損之謂桂能治血以推動其毒扶陽益氣以充達周身血內泣引之出表則氣從內托血外散引之歸根則氣從外護參者非桂引導不能獨樹其功桂不得甘草和平氣血亦不能緒其條理要非寡聞淺見者能窺其萬一也四君中不用白朮避其燥不用茯苓恐其滲也用桂而不用四物者以芎之辛散歸之濕潤芍之酸寒地黃之泥滯故耳如宜升則加升柴宜燥加苓朮宜潤加當歸宜利氣加陳皮宜收加芍宜散加芎又表實去者裏實去參中滿忌甘內熱除桂斯又當理會矣

按元氣者太虛之氣也人得之則藏乎腎爲先天之氣即所謂生氣之原腎間動氣者是也生化於脾爲後天之氣即所謂水穀入胃其精氣行於脈中之營氣其悍氣行於脈外之

衛氣者是也若夫合先後而言卽大氣之積於胸中司呼吸通內外周流一身頃刻無間之宗氣者是也總之諸氣隨所在而得名實一元氣也保元者保守此元氣之謂是方用黃耆保在外一切之氣甘草保在中一切之氣人參保上中下內外一切之氣諸氣治而元氣足矣然此湯補後天水穀之氣則有餘生先天命門之氣則不足加肉桂以鼓腎間動氣斯爲備耳

四君子湯

治面色痿白言語輕微四肢無力脈來虛弱者若內傷虛熱或飲食難化作酸須加炮薑

人參　白朮

茯苓　甘草　各二錢

加薑棗水煎服

加木香藿香葛根爲七味白朮散

加陳皮爲五味異功散

加陳皮半夏爲六君子湯

加藿香砂仁爲香砂六君子湯

集註　張璐曰氣虛者補之以甘參朮苓草甘溫益胃有健運之功具沖和之德故爲君子蓋人之一生以胃氣爲本胃氣旺則五藏受蔭胃氣傷則百病叢生故凡病久虛不愈諸藥不效者惟有益胃補腎兩途故用四君子隨證加減無論寒熱補瀉先培中土使藥氣四達則周身之機運流通水穀之精微敷布何患其藥之不效哉是知四君子爲司命之本也

吳琨曰夫面色痿白則望之而知其氣虛矣言語輕微則聞之而知其氣虛矣四肢無力則問之而知其氣虛矣觜來虛弱則切之而知其氣虛矣如是則宜補氣是方也四藥皆甘溫甘得中之味溫得中之氣猶之不偏不倚之人故名君子本方加木香藿香葛根名七味白朮散治小兒脾虛肌熱泄瀉作渴以木藿之芳香佐四君入脾其功更捷以葛根甘寒直走陽明解肌熱而除渴也

按本方加陳皮名五味異功散治氣虛而兼氣滯者再加半夏名六君子湯治氣虛而兼痰飲者再加砂仁藿香名香砂六君子湯治氣虛而兼嘔吐者此皆補中有消導之意也

香砂六君子湯

治氣虛痰飲嘔吐痞悶脾胃不和變生諸證者

人參一錢　白朮二錢

茯苓二錢　甘草七分

陳皮八分　半夏一錢

砂仁八分　木香七分

右生薑三錢水煎服

集註柯琴曰經曰壯者氣行則愈怯者著而爲病蓋人在氣交之中因氣而生而生氣總以胃

氣爲本若脾胃一有不和則氣便著滯或痞悶噦嘔或生痰留飲因而不思飲食肌肉消瘦諸證蜂起而形消氣息矣四君子氣分之總方也人參致冲和之氣白朮培中宮茯苓清洽節甘草調五藏胃氣既治病安從來然撥亂反正又不能無爲而治必舉大行氣之品以輔之則補者不至泥而不行故加陳皮以利肺金之逆氣半夏以疏脾土之濕氣而痰飲可除也加木香以行三焦之滯氣縮砂以通脾腎之元氣而膜鬱可開也君得四輔則功力倍宣四輔奉君則元氣大振相得而益彰矣

當歸補血湯

治男婦血虛似白虎證肌熱面赤煩渴引飲脈來洪大而虛重按則微

當歸二錢　黃耆一兩

水煎服

集註　吳琨曰血實則身凉血虛則身熱或以饑困勞役虛其陰血則陽獨治故諸證生焉此證純象白虎但脈大而虛非大而實爲辨耳內經所謂脈虛血虛是也五味之中惟甘能補

當歸味甘而厚味厚則補血黃耆味甘而薄味薄則補氣今黃耆多數倍而云補血者以有形之血不能自生生於無形之氣故也經言陽生陰長是之謂耳

佛手散

治妊娠胎動下血或因傷動子死腹中下血疼痛口噤欲死服此探之不損則痛止已損則立下及橫生倒生交骨不開產後血暈昏亂崩中金瘡去血過多等證

當歸二兩或三兩　川芎一兩

右剉粗末合均每服五錢水一盞酒半盞煎八分熱服未效再服

加敗龜版一具梳髮一團名開骨散

註　命名不曰歸芎而曰佛手者謂此方治婦人胎前產後諸疾如佛手之神妙也當歸川芎爲血分之主藥性溫而味甘辛以溫能和血甘能補血辛能散血也古人俱必以當歸君川芎或一倍或再倍者蓋以川芎辛竄捷於升散過則傷氣故寇宗奭曰不可單服久服用以佐當歸而收血病之功使瘀去新生血各有所歸也血既有所歸則血安其部而諸血病愈矣至妊娠胎動胎傷下血非血壅胎傷卽血亂妄下服此以探之血亂胎未動者因之而安也已動已損者血得順行則胎亦因之而順下也橫生倒生因用力太早或誤服催生之藥致氣逆血亂亦用此以調之產後崩中金瘡亡血昏冒亦用此以補之子死腹中腹痛欲死亦用此以逐之已上諸病皆血病而氣不虛者也若夫氣虛難產產後血

脫脣面黃白少氣煩亂動則昏冒若誤與此
反致立敗則必倍加人參速固無形之氣以
救有形之血也至於交骨難開加龜版梳髮
下輸陰道寒加薑桂熱加黃耆汗加桂枝揣
加荆穗又當以意消息加減可也

四物湯

治一切血虛血熱血燥諸證

當歸　熟地　各三錢
川芎　一錢五分　白芍　二錢酒炒

右四味水煎服

集註張璐曰四物爲陰血受病之專劑非調補眞陰之的方方書咸謂四物補陰遂以治陰虛發熱火炎失血等證蒙害至今又專事女科者咸以此湯隨證漫加風食痰氣等藥紛然

雜出其最可恨者不辨熱之虛實率加知母
黃蘗令人久服而庸工利其有劫病之能咸
樂用之殊不知四君子氣藥治上下失血過
多一切血藥置而不用獨推獨參湯童便以
固其脫者以有形之血不能速生無形之氣
所當急固也昔人有言見血休治血必先調
其氣又云四物湯不得補氣藥不能成陽生
陰長之功誠哉言也然此湯傷寒火邪解後
餘熱留於血分至夜微熱不除或合柴胡或
加桂枝靡不應手輒效不可沒其功也

柯琴曰經云心生血肝藏血故凡生血者則
究之於心調血者當求之於肝也是方乃肝
經調血之專劑非心經生血之主方也當歸
甘溫和血川芎辛溫活血芍藥酸寒斂血地
黃甘平補血四物具生長收藏之用故能使
營氣安行經隧也若血虛加參耆血結加桃
仁紅花血閉加大黃芒消血寒加桂附血熱
加芩連欲行血去芍欲止血去芎隨所利而

行之則又不必拘拘於四矣若婦人數脫其血故用以調經種子如遇血崩血暈等證四物不能驟補而反助其滑脫則又當補氣生血助陽生陰長之理蓋此方能補有形之血於平時不能生無形之血於倉卒能調陰中之血而不能培眞陰之本爲血分立法不專爲女科套劑也王好古治婦女不論內傷外感胎前產後隨證加二味於四物中名曰六合未免任意牽强

聖愈湯

治一切失血過多陰虧氣弱煩熱作渴睡臥不寧等證

四物湯加　人參

黃耆

一方去芍藥

右水煎服

集註　柯琴曰經云陰在內陽之守也陽在外陰之使也故陽中無陰謂之孤陽陰中無陽謂之

死陰朱震亨曰四物皆陰行天地閉塞之令
非長養萬物者也故四物加知藥久服便能
絶孕謂嫌於無陽耳此方取參者配四物以
治陰虛血脫等證蓋陰陽互爲其根陰虛則
陽無所附所以煩熱燥渴氣血相爲表裏血
脫則氣無所歸所以睡臥不寧然陰虛無驟
補之法計在培陰以藏陽血脫有生血之機
必先補氣此陽生陰長血隨氣行之理也故
曰陰虛則無氣無氣則死矣此方得仲景白
虎加人參之義而擴充者乎前輩治陰虛用
八珍十全卒不獲效者因甘草之甘不達下
焦白朮之燥不利腎陰茯苓滲泄礙乎生升
肉桂辛熱動其虛火此六味皆醇厚和平而
滋潤服之則氣血疏通內外調和合於聖度
矣

地骨皮飲

治陰虛火旺骨蒸發熱日靜夜劇者婦人熱入血室胎前發熱者

四物湯加　地骨皮

牡丹皮　各三錢

水煎服

集註　柯琴曰陰虛者陽往乘之發熱也當分三陰而治之陽邪乘入太陰脾部當補中益氣以升舉之清陽復位而火自熄也若乘入少陰

腎部當六味地黃丸以對待之壯水之主而火自平也乘入厥陰肝部當地骨皮飲以涼補之血有所藏而火自安也四物湯爲肝家滋陰調血之劑加地骨皮清志中之火以安腎補其母也加牡丹皮清神中之火以涼心瀉其子也二皮涼而不潤但清肝火不傷脾胃與四物加知蘗之濕潤而苦寒者不同也故逍遙散治肝火之鬱於本藏者也木鬱達之順其性也地骨皮飲治陽邪之乘於肝藏者也客者除之勿縱寇以遺患也二方皆肝家得力之劑

犀角地黃湯

治熱傷吐衄便血婦人血崩赤淋

生犀角　生地黃

白芍　牡丹皮

右四味先用三物水煎去滓入生犀汁熱服

註　吐血之因有三曰勞傷曰努傷曰熱傷勞傷以理損爲主努傷以去瘀爲主熱傷以清熱爲主熱傷陽絡則吐衄熱傷陰絡則下血是湯治熱傷也故用犀角清心去火之本生地

凉血以生新血白芍斂血止血妄行丹皮破血以逐其瘀此方雖曰清火而實滋陰雖曰止血而實去瘀瘀去新生陰滋火熄可爲探本窮源之法也若心火獨盛則加黃芩黃連以瀉熱血瘀胸痛則加大黃桃仁以逐瘀也

四生丸

治陽盛陰虛血熱妄行或吐或衄者

生地黃　生栢葉

生荷葉　生艾葉　各等分

右四味搗爛爲丸如雞子大每服一丸滾湯化服

集註　柯琴曰陰虛而陽無所附則火炎上焦陽盛則陽絡傷故血上溢於口鼻也凡草木之性生者凉而熟之則溫熟者補而生者瀉四味

皆清寒之品盡取其生者而搗爛爲丸所以全其水氣不經火煮更遠於火令矣生地多膏清心腎而通血絡之源栢葉西指清肺金而調營衛之氣艾葉芳香入脾胃而擅去瘀生新之權荷葉法震入肝家而和藏血攝血之用五志之火既清五藏之陰安堵則陰平陽秘而血歸經矣是方也可暫用以遏妄行之熱血如多用則反傷營蓋血得寒則瘀血不散而新血不生也設但知清火凉血而不用歸脾養榮等劑以善其後鮮有不綿連歲月而斃者非立法之不善妄用者之過耳

當歸六黃湯

治陰虛有火令人盜汗者

當歸　生地

熟地　黃者

黃芩　黃連

黃蘗

右水煎服

註　寤而汗出曰自汗寐而汗出曰盜汗陰盛則陽虛不能外固故自汗陽盛則陰虛不能中

守故盜汗若陰陽平和之人衛氣晝則行陽而寤夜則行陰而寐陰陽既濟病安從來惟陰虛有火之人寐則衛氣行陰陰虛不能濟陽陽火因盛而爭於陰故陰液失守外走而汗出寤則衛氣復行出於表陰得以靜故汗止矣用當歸以養液二地以滋陰令陰液得其養也用黃芩瀉上焦火黃連瀉中焦火黃蘗瀉下焦火令三火得其平也又於諸寒藥中加黃耆庸者不知以爲贅品且謂陽盛者不宜抑知其妙義正在於斯耶蓋陽爭於陰汗出營虛則衛亦隨之而虛故倍加黃耆者一以完已虛之表一以固未定之陰經曰陰平陽秘精神乃治此之謂與

集註　吳琨曰雜證盜汗與傷寒盜汗不同傷寒是半表半裏之邪未盡雜證則陰虛有火而已彼以和表爲主此以救陰爲急故以補陰之品佐瀉火之藥明者辨之

黃耆建中湯

治虛勞裏急悸衄腹中痛夜夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥諸藥不足諸證

黃耆　膠飴　白芍　甘草　桂枝　生薑　大棗

右七味水煎服

集註　喻昌曰虛勞而至於亡血失精津液枯槁難

爲力矣內經於鍼砭所莫治者調以甘藥金匱遵之而立黃耆建中湯急建其中氣俾飲食增而津液旺以至充血生精而復其眞陰之不足但用稼穡作甘之本味而酸辛鹹苦在所不用蓋舍此別無良法也然用法貴立微覺氣滯更當慮甘藥太過令人中滿也至於無過之地不獨嘔家不可用建中之甘卽大建中則大建其中之陽小建中則小小建立之義理中則燮理之義治中則分治之義補中溫中何莫非先中州之義緣傷寒外邪逼入於內法難盡用仲景但於方首以小之一字微示其意至金匱始盡建中之義後人引伸觸類製樂令建中湯十四味建中湯曲暢建中之旨學者心手之間所當會其大義也

雙和飲

治大病之後虛勞氣乏補血益氣不熱不冷溫而調之

白芍二錢　黃耆一錢半炙　甘草七分炙　中桂七分　當歸一錢　熟地黃一錢　川芎七分

生薑三片大棗二枚水二盞煎一盞溫服

註　此湯乃李杲以黃耆建中湯減飴糖合四物

之方也黃耆建中治虛勞不足是從脾胃中化生血氣此則直補陰血兼之溫養陽氣所以減飴糖之甘加純陰之品名曰雙和也地骨皮飲其意在涼血熱故佐二皮以清之聖愈湯其意在救血脫故佐參耆以補之雙和飲其意在溫養血氣故佐耆桂炙草以溫之經曰形不足者溫之以氣是也

人參養榮湯

治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等證若氣血虛而變見諸證弗論其病其脈但用此湯諸證悉退

人參　白朮
茯苓　甘草
黃耆　陳皮
當歸　熟地
白芍　桂心

遠志

右十二味加薑三片棗二枚水煎服

集註柯琴曰古人治氣虛以四君子治血虛以四物氣血俱虛者以八珍更加黃耆肉桂名十全大補宜乎萬舉萬當也而用之有不獲效者蓋補氣而不用行氣之品則氣虛之甚者幾無氣以運動補血而仍用行血之物則血虛之甚者更無血以流行故加陳皮以行氣而補氣者悉得効其用去川芎行血之味而補血者因以奏其功此善治者祇一加一減便能轉旋造化之機也然氣可召而至血易虧而難成苟不有以求其血脈之主而養之則營氣終歸不足故倍人參爲君而佐以遠志之苦先入心以安神定志使甘溫之品始得化而爲血以奉生身又心苦緩必得五味子之酸以收斂神明使營行脈中而流於四藏名之曰養榮不必仍十全之名而收效有如此者

歸脾湯

治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而不寐或心脾作痛嗜臥少食及婦女月經不調

人參　龍眼肉
黃耆　甘草
白朮
茯苓
木香　當歸
酸棗仁　遠志

薑三片水煎服

集註　羅謙輔曰方中龍眼棗仁當歸所以補心也參耆朮苓草所以補脾也薛已加入遠志又以腎藥之通乎心者補之是兩經兼腎合治矣而特名歸脾何也夫心藏神其用爲思脾藏智其出爲意見神智思意火土合德者也心以經營之久而傷脾以意慮之鬱而傷則母病必傳之子子又能令母虛所必然也其病則健忘怔忡怵惕不安之徵見於心也飲食倦怠不能運輸手足無力耳目昏眊之證

見於脾也故脾陽苟不運心腎必不交彼黃婆者若不爲之媒合則已不能攝腎氣歸心而心陰何所賴以養此取坎填離者所以必歸之脾也其藥一派滋心陰一養脾陽取乎健者以壯子益母然恐脾鬱之久思意不通故少取木香之辛且散者以暢氣醒脾使能速通脾氣以上行心陰脾之所歸正在斯耳

張璐曰補中益氣與歸脾同出保元並加歸术而有升舉胃氣滋補脾陰之不同此方滋

養心脾鼓動少火妙佐以木香少許調順諸氣暢和心脾世醫不諳此理反以木香性燥不用服之多致痞悶減食者以其補藥多滯不能輸化故耳

妙香散

治夢遺失精驚悸鬱結

山藥二兩　人參　黃耆　遠志　製　茯苓　茯神　一兩　桔梗三錢　甘草　辰砂一錢　另研　麝香一錢　木香二錢五分

爲末每服二錢酒下

集註　汪昂曰心君火也君火一動相火隨之相火寄於肝膽腎之陰虛則精不藏肝之陽强則氣不固故精脫而成夢矣山藥益陰兼能濟精故以爲君人參黃耆用以固氣遠志二茯用以寧神神寧氣固則精自守其位矣丹砂鎮心安魂二香開鬱通竅桔梗載諸心藥久留腸上甘草調和諸藥交和於中是方不以瀉火固濇立法但安神固氣使精與神氣相依而夢少精秘矣

按朱震亨云主秘藏者腎也司疎泄者肝也二藏有相火而其系上屬於心心君火也爲物所感則易於動心動則相火翕然隨之雖不交會精亦暗流而滲漏矣所以聖人祗是教人收心養性其旨深矣震亨此論至當其平生精力在補陰以制相火深得內經天以陽生陰長地以陽殺陰藏之旨近世醫者惟知陽生不知陰亦能生惟知陰殺不知陽亦能殺經雖每每指出陽脫陰脫陽絕陰絕皆令

人死奈志迷偏見者不回也卽此一證老年之人心有所動而相火衰不能翕然隨之雖有所夢而無所遺由此可知震亨用黃蘗一味少佐氷片名清心丸獨瀉相火而治中年相火盛夢遺心悸者屢用屢效也

天王補心丹

治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人參　酸棗仁　當歸　生地黃　麥冬　天冬　柏子仁　遠志　五味子　丹參　元參　白茯苓

桔梗

右爲末煉蜜丸如椒目大白湯下

集註　柯琴曰心者主火而所以主之者神也火盛則神困心藏神補神者必補其心補心者必清其火而神始安補心丹故用生地黃爲君取其下足少陰以滋水主水盛可以伏火此非補心之陽乃補心之神耳凡果核之有仁猶心之有神也清氣無如栢子仁補血無如酸棗仁以其神存耳參苓之甘以補心氣五味之酸以收心氣二冬之寒以清氣分之火心氣和而神自歸矣當歸之甘以補心血丹參之寒以生心血元參之鹹以清血中之火血足而神自藏矣更加桔梗爲舟楫遠志爲向導和諸藥入心而安神明以此養生則百體從令何有健忘怔忡津液乾涸舌上生瘡大便不利之虞哉

酸棗仁湯

治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁二升　甘草一兩

知母二兩　白茯苓二兩

川芎二兩

右五味以水八升煮棗仁得六升內藥煮取三升分溫三服

集註　羅謙輔曰經云肝藏魂人臥則血歸於肝又曰陽氣者煩勞則張罷曰肝者罷極之本又

極必傷肝煩勞則精絶肝傷精絶則虛勞虛煩不得臥明矣棗仁酸平應少陽木化而治肝極者宜收宜補用酸棗仁至二升以生心血養肝血所謂以酸收之以酸補之是也顧肝鬱欲散散以川芎之辛散使輔棗仁通肝調榮又所謂以辛補之也肝急欲緩緩以甘草之甘緩使防川芎疏泄過急此所謂以土葆之也然終恐勞極則火發傷陰陽旺陽分不行於陰而仍不得眠故佐知母崇陰水以制火茯苓利陽水以平陰將水壯而魂自寧火清而神且靜矣此治虛勞肝極之神方也

硃砂安神丸

治心神昏亂驚悸怔忡寤寐不安

硃砂另研　黃連各半兩　當歸二錢　生地黃三錢　甘草二錢

右爲細末酒泡蒸餅丸如麻子大硃砂爲衣每服三十丸臥時津液下

集註　葉仲堅曰經云神氣舍心精神畢具又曰心者生之本神之舍也且心爲君主之官主不

明則精氣亂神太勞則魂魄散所以寤寐不安淫邪發夢輕則驚悸怔忡重則癡妄癲狂也硃砂具光明之體色赤通心重能鎮怯寒能勝熱甘以生津抑陰火之浮遊以養上焦之元氣爲安神之第一品心若熱配黃連之苦寒瀉心熱也更佐甘草之甘以瀉之心主血用當歸之甘溫歸心血也更佐地黃之寒以補之心血足則肝得所藏而魂自安心熱解則肺得其職而魄自寧也

御纂醫宗金鑑刪補名醫方論

七十二卷

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

28

ChL 7918.7638

卷二十七

補中益氣湯起至五味子散止

計二十五方

28



刪補名醫方論卷二目錄

補中益氣湯
升陽益胃湯
升陽散火湯
補脾胃瀉陰火升陽湯
清暑益氣湯
清燥湯
白朮附子湯

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

葛花解醒湯
平胃散
枳术丸
資生丸
六味地黃丸
桂附地黃丸　附
知蘗地黃丸　附
八味地黃丸
資生腎氣丸
大補陰丸
封髓丹
虎潛丸
滋腎丸
瓊玉膏
龜鹿二仙膠
四神丸
二神丸
五味子散

御纂醫宗金鑑卷二十七

刪補名醫方論卷二

補中益氣湯

治陰虛內熱頭痛口渴表熱自汗不任風寒脈洪大心煩不安四肢困倦懶於言語無氣以動人參　炙甘草　當歸　陳皮　雲朮　黃耆　動則氣高而喘

升麻　柴胡

右八味加生薑三片大棗二枚水煎溫服

集註　柯琴曰仲景有建中理中二法風木內干中氣用甘草飴棗培土以禦木薑桂芍藥平木而驅風故名曰建中寒水內凝於中氣用參朮甘草補土以制水佐乾薑而生土以禦寒故名曰理中至若勞倦形衰氣少陰虛而生內熱者表證頗同外感惟李杲知其爲勞倦傷脾穀氣不勝陽氣下陷陰中而發熱製補中益氣之法謂風寒外傷其形爲有餘脾胃內傷其氣爲不足遵內經勞者溫之損者益之之義大忌苦寒之藥選用甘溫之品升其陽以達陽春升生之令凡脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆護皮毛而閉腠理不令自汗元氣不足懶言氣喘人參以補之炙甘草之甘以瀉心火而除煩補脾胃而生氣此三味除煩熱之聖藥也佐白朮以健脾當歸以和血氣亂於胸清濁相干用陳皮以理之且以散

諸甘藥之滯胃中清氣下陷用升麻柴胡氣之輕而味之薄者引胃氣以上騰復其本位便能升浮以行生長之令矣補中之劑得發表之品而中自安益氣之劑賴清氣之品而氣益培此用藥有相須之妙是方也用以補脾使地道卑而上行亦可以補心肺損其肺者益其氣損其心者調其營衛也亦可以補肝木鬱則達之也惟不宜於腎陰虛於下者不宜升陽虛於下者更不宜升也凡李杲治脾胃方俱是益氣去當歸白朮加蒼朮木香便是調中加麥冬五味輩便是清暑此正是醫不執方亦是醫必有方

趙獻可曰後天脾土非得先天之氣不行此氣因勞而下陷於太陰清氣不升濁氣不降故用升柴以佐參耆是方所以補益後天中之先天也凡脾胃不足喜甘而惡苦喜補而惡攻喜溫而惡寒喜通而惡滯喜升而惡降喜燥而惡濕此方得之矣

陸麗京曰此爲清陽下陷者言之非爲下虛而清陽不升者言之也倘人之兩尺虛微者或是腎中水竭或是命門火衰若再一升提則如大木將搖而撥其本也

升陽益胃湯

治脾胃虛怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱方退體重節痛口乾舌燥飲食無味大便不調小便頻數食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色不和

羌活　獨活　防風　柴胡　人參　白朮　茯苓　甘草

黃耆　白芍
半夏　黃連
澤瀉　陳皮
水煎服

集註吳琨曰脾土虛弱不能制濕故體重節痛不能運化精微故口乾無味中氣既弱傳化失宜故大便不調小便頻數也灑淅惡寒肺弱表虛也面色不樂陽氣不伸也是方半夏白术能燥濕茯苓澤瀉滲之二活防風柴胡能升舉清陽之氣黃連療濕熱陳皮平胃氣參者甘草以益胃白芍酸收用以和營而協羌活柴胡辛散之性蓋古人用辛散必用酸收所以防其竣厲猶兵家之節制也

按人參屬補不知君於枳朴中卽爲補中瀉也羌防輩爲散不知佐於參耆中卽爲補中升也近世之醫一見羌防輩卽曰發散不可輕用亦不審佐於何藥之中皆因讀書未明不知造化別有妙理耳

升陽散火湯

治脾陰血虛胃陽氣弱春寒不去及過食冷物抑遏少陽清氣鬱於脾土之中四肢發困熱肌熱筋骨間熱表熱如火燎於肌膚捫之烙手並宜服之

葛根
羌活
獨活
人參 已上各五錢
柴胡 三錢
白芍
甘草 三錢炙

防風二錢　甘草二錢生

右㕮咀如麻豆大每服秤五錢水二盞煎一盞去滓大溫服無時忌寒凉之物

集註吳琨曰經云少火生氣天非此火不能生物人非此火不能有生揚之則光遏之則滅今爲春寒不去遏鬱陽氣飲食冷物塡塞至陰以致升生之氣幾於息矣故用升麻柴胡羌活獨活葛根皆辛溫風藥以鼓動少陽生氣清陽既出上竅則濁陰自歸下竅而食物傳化自無抑遏之患芍藥味酸能瀉土中之木人參味甘能補中州之氣生甘草能瀉鬱火於脾從而炙之則健脾胃而和中矣李杲聖於脾胃者其治之也必主於升陽俗醫知降而不知升是撲其少火也安望其衛生耶若氣不虛本方除人參獨活加葱白名火鬱湯治同

補脾胃瀉陰火升陽湯脾胃一虛陽氣下陷陰火乘之時值夏令當從此治

治飲食傷胃勞倦傷脾脾胃一虛陽氣下陷陰

黃耆　蒼朮 泔浸炒

甘草 炙　羌活 一兩

升麻 八錢　柴胡 兩半

黃連 五錢 酒炒　黃芩 炒

人參 七錢　石膏 少許長夏微用過時去之

每服五錢薑棗煎服

集註　汪昂曰李杲云脾胃一傷陽氣日損脾胃之清氣下陷濁陰之火得以上乘是有秋冬而無春夏也惟以氣味薄之風藥升發陽氣佐以苦寒之品瀉陰中火則陰不病陽氣伸矣是方參耆朮草以補脾胃也佐羌活升柴以助陽升佐石膏芩連以瀉陰火假令不能食而瘦乃本病也右關鱼緩弱乃本鱼也或本鱼兼見弦鱼本證兼見四肢滿閉淋溲便難轉筋一二證此肝之脾胃病也當加風藥以瀉肝木鱼兼見洪大證兼見肌熱煩熱面赤一二證此心之脾胃病也當加瀉心火之藥鱼兼見浮濇證兼見短氣氣上喘咳痰盛皮澁一二證此肺之脾胃病也當加瀉肺及補氣之藥鱼兼見沉細證兼見善欠善恐一二證此腎之脾胃病也當加瀉腎水及瀉陰火之藥所以言此者欲人知百病皆從脾胃而生處方者當從此法加時令藥也

清暑益氣湯

長夏濕熱蒸炎四肢困倦精神減少身熱氣高煩心便黃渴而自汗脈虛者此方主之

人參　黃耆　甘草　白朮　五味子　神麯　青皮　升麻　乾葛　麥冬　黃蘗　澤瀉

廣橘皮　蒼术　錢半

當歸

薑三片棗二枚去核水煎服

集註　吳琨曰暑令行於夏至長夏則兼濕令矣此方兼而治之炎暑則表氣易泄兼濕則中氣不固黃者所以實表白术神麯甘草所以調中酷暑橫流肺金受病人參五味麥冬所以補肺斂肺清肺經所謂扶其所不勝也火盛則水衰故以黃蘗澤瀉滋其化源津液亡則口渴故以當歸乾葛生其胃液清氣不升升麻可升濁氣不降二皮可理蒼术之用爲兼長夏之濕也

程應旄曰人知清暑我兼益氣以暑傷氣也益氣不獨金能敵火凡氣之上騰而爲津爲液者回下即爲腎中之水水氣足火淫自却也

清燥湯

治痿厥之病腰以下痿軟不能動行走不正兩足欹側

黃連　已上各一分

柴胡　已上各二分

當歸身

豬苓

神麯　已上各二分

白茯苓

黃蘗　酒炒

麥冬

生地

炙甘草

人參

升麻　已上各三分

橘皮　白朮

澤瀉 已上各五分　蒼朮 一錢

黃耆 一錢五分　五味子 九枚

右㕮咀如麻豆大水二盞半煎一盞去滓空心溫服

註　清暑益氣湯與此方均治濕暑之劑清暑益氣湯治暑盛於濕暑傷氣所以四肢困倦精神減少煩渴身熱自汗脈虛故以補氣爲主清暑爲兼少佐去濕之品從令氣也此方治濕盛於暑濕傷形所以李杲曰六七月之間濕令大行子能令母實濕助熱旺而刑燥金絕其寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病作矣故以清暑變爲清燥佐瀉熱利濕之藥從邪氣也是方卽清暑益氣湯去葛根者以無暑外侵之肌熱也加二苓者專去濕也加黃連生地專瀉熱也二苓佐二朮利水燥濕之力倍連地佐黃蘗救金生水之功多中氣益則陰火熄而肺清矣濕熱除則燥金肅而

水生矣肺清水生則濕熱痿厥之病未有不
愈者也但此方藥味性偏滲瀉若施之於冬
春水竭髓枯骨痿或非濕熱爲病者反刼津
液其病愈甚則爲謬治矣

白术附子湯

治寒中腹脹滿作涎作清涕或多溺足下痛不
能任身履地骨乏無力喜睡兩丸多冷時作陰
陰而痛或妄見鬼狀夢亡人腰背胛眼腰脊皆
痛

白术　附子　炮去皮臍
蒼术　陳皮
厚朴　薑製　半夏　湯洗
茯苓　豬苓　去皮半兩

澤瀉　肉桂 四錢

右剉如麻豆大每服半兩水三盞薑三片同煎至一盞去滓食前溫服量虛實加減多少

註 李杲云脾胃之證有熱中有寒中熱中者是火乘土位之病則當上舉清陽下消陰火故用補中益氣瀉陰火升陽等湯寒中者水反侮土之病則當下伐水邪中燥脾濕故用二苓术澤蒼陳朴夏更用桂附壯陽勝寒流通血衄寒中之病自可愈也

按 李杲製此方施之於脾胃寒濕內盛脹滿多溺涎涕外盛足軟腰脊丸痛而氣不虛者宜矣若其人中氣已虛內外寒濕又盛水來侮土者總不若理中湯加附子蒼术茯苓爲愈也

葛花解醒湯

治酒客病

蓮花青皮三分去穰　橘皮去白　人參　木香五分　白茯苓　豬苓已上各錢五分　澤瀉　神麯炒　乾薑　白荳蔻仁　砂仁以上各五錢　白朮已上各二錢　葛花

右爲細末和均每服三錢白湯調下但得微汗酒病去矣不可恃此過飲頻服取汗損人天年

註酒爲水穀精液所化體濕性熱少飲則能調和氣血流暢陰陽內助中氣捍禦外邪若過飲無度輕則傷人脾胃重則損人神氣所以酒困之人昏暈煩亂乾嘔惡心飲食卽吐百體痠軟身熱頭疼嘈雜吞酸胸膈痞塞口燥舌乾手足顫搖心神恍惚不思飲食小便渾濁大便溏瀉此皆濕熱傷形與氣也

按李杲曰酒病者往往以大熱大寒下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣大熱則傷陰大寒則傷胃元氣消亡七神無依折人壽命不然則虛損之病成矣故製此方君葛花佐以辛香之品用神麴佐以快氣之品用苓澤佐以甘溫之品服後取汗是謂外解肌肉內清陽明令上下內外分消其患使胃中穢爲芳變濁爲清化泰然和矣

平胃散

治濕淫於內脾胃不能剋制有積飲痞膈中滿者

蒼术五勭米泔浸七日　陳皮去白　厚朴各三勭薑汁炒　甘草三十兩炙

右爲末每服二錢薑湯下日三服或水煎每服五錢

集註　柯琴曰內經以土運太過曰敦阜其病腹滿不及曰卑監其病留滿痞塞張仲景製三承

氣湯調胃土之敦阜李杲製平胃散平胃土之阜監培其阜者而使之平非削平之謂猶溫膽湯用涼劑溫緩而使之和非用溫之謂後之註本草者曰敦阜之土宜蒼术以平之阜監之土宜白术以培之若以濕土爲敦阜將以燥土爲阜監耶不審敦阜屬燥阜監屬濕之義因不知平胃之理矣二术苦甘皆燥濕健脾之用脾燥則不滯所以能健運而得其平第二术白者柔而緩蒼者猛而悍此取其長於發汗迅於除濕故以蒼术爲君耳不得以白補赤瀉之說爲二术拘也厚朴色赤苦溫能助少火以生氣故以爲佐濕因於氣之不行氣行則愈故更以陳皮佐之甘先入脾脾得補而健運故以炙甘草爲使名曰平胃實調脾承氣之劑與張潔古取金匱之枳术湯以爲丸枳實之峻重於厚朴且無甘草以和之雖倍白术而消伐過於此方昧者以术爲補而久服之不思枳實峻削而不宜多

服也

枳术丸

治胃虛濕熱飲食壅滯心下痞悶

白术二兩土蒸　枳實一兩麩炒

右爲細末荷葉煨陳米飯爲丸如椒目大白湯下

集註　李杲曰白术苦甘溫其苦味除胃中之濕熱其甘溫補脾家之元氣多於枳實一倍枳實味苦溫泄心下痞悶消胃中所傷此藥下胃所傷不能即去須一二時許食乃消化先補

虛而後化所傷則不峻厲矣荷葉狀如仰盂於卦爲震正少陽甲膽之氣飲食入胃營氣上行卽此氣也取之以生胃氣更以煨飯和藥與朮協力滋養穀氣而補脾胃其利大矣若用峻厲之藥下之傳變諸證不可勝數

資生丸

治婦人妊娠三月脾虛嘔吐或胎滑不固兼丈夫調中養胃饑能使飽飽能使饑神妙難述

人參三兩　茯苓二兩
雲朮三兩　山藥二兩
薏苡仁兩半　蓮肉二兩
芡實兩半　甘草一兩
陳皮二兩　麥蘗二兩
神麯二兩　白豆蔻八錢

桔梗　一兩　藿香　一兩
川黃連　四錢　砂仁　兩半
白扁豆　兩半　山查　兩半

右十八味爲細末煉蜜丸彈子大每服二丸米飲下

集註　羅謙輔曰此方始於繆仲醇以治妊娠脾虛及胎滑蓋胎資始於足少陰資生於足陽明故陽明爲胎生之本一有不足則元氣不足以養胎又不足自養故當三月正陽明養胎之候而見嘔逆又其甚者或三月或五月而墮此皆陽明氣虛不能固耳古方安胎類用芎歸不知此正不免於滑是方以參术茯草蓮芡山藥扁豆蓄苡之甘平以補脾元陳皮麴蘗砂蔻藿梗之香辛以調胃氣其有濕熱以黃連清之燥之既無參苓白术散之補滯又無香砂枳术丸之燥消能補能運臻於至和於以固胎永無滑墮丈夫服之調中養胃名之資生信不虛矣

六味地黃丸

治腎精不足虛火炎上腰膝痿軟骨熱痠痛足跟痛小便淋秘或不禁遺精夢洩水泛爲痰自汗盜汗亡血消渴頭目眩運耳聾齒搖尺衃虛大者

熟地黃 八兩　山茱萸 四兩

白茯苓 三兩　乾山藥 四兩

牡丹皮 三兩　澤瀉 三兩

右爲末煉蜜丸如桐子大空心淡鹽湯下

集註柯琴曰腎虛不能藏精坎宮之火無所附而妄行下無以奉肝木升生之令上絕其肺金生化之源地黃稟甘寒之性製熟則味厚是精不足者補之以味也用以大滋腎陰填精補髓壯水之主以澤瀉爲使世或惡其瀉腎而去之不知一陰一陽者天地之道一開一闔者動靜之機精者屬癸陰水也靜而不走爲腎之體溺者屬壬陽水也動而不居爲腎之用是以腎主五液若陰水不守則眞水不足陽水不流則邪水汎行故君地黃以密封蟄之本卽佐澤瀉以疏水道之滯也然腎虛不補其母不導其水之上源茯苓淡滲以導山藥涼補以培癸水之上源茯苓淡滲以導壬水之上源加以菜萸之酸溫藉以收少陽之火還以奉少陽之氣也滋化源奉生氣天癸居其所矣壯水制火特其一端耳

按五行皆一惟火有二君火相火也君火爲心

經之火君主一身之火也相火爲腎中之火宣布一身之火也使君火無相火則不能宣布諸火以奉生身之本相火無君火則不能君主諸火以制其妄行之災故李杲立內傷勞倦火乘土位之論以心火有餘用升陽氣瀉陰火硃砂安神等藥而未及心火之不足者歸脾養心等方也震亨立陽常有餘陰常不足之論以腎火有餘用補陰補天等藥而未及腎火之不足者以前人已有腎氣桂附地黃湯丸也依本方加附子肉桂名桂附地黃丸治兩尺鮎弱相火不足虛羸少氣王冰所謂益火之原以消陰翳者是也加黃蘗知母名知蘗地黃丸治兩尺鮎旺陰虛火動午熱骨痿王冰所謂壯水之主以制陽光者是也經云陰平陽秘精神乃治若陰陽偏勝則疾病叢生夫腎取象乎坎陽藏於陰之藏也不獨陰盛陽衰陽畏其陰而不敢附即陰衰陽盛陰難藏陽亦無可依雖同

爲火不歸原而其爲病則異也故於腎藥中加桂附壯陽勝陰使陽無所畏而自歸原矣加知蘗補陰秘陽使陽有所貯而自歸藏矣世人但知以桂附引火歸原不知以知蘗平陰秘陽舉世皆蒙其惑故震亨特立補陰之論以闢以火濟火之非而未達其旨者從而誹之良可歎也

八味地黃丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元衰憊臍腹疼痛夜多漩溺等證

熟地黃　八兩九蒸爲度搗膏
山萸肉　四兩
丹皮
肉桂
右八味爲末煉蜜丸如桐子大酒下十五丸

乾山藥　四兩
白茯苓
澤瀉　各三兩
附子　各一兩

曰再服

集註趙獻可曰君子觀象於坎而知腎中具水火之用今人入房而陽易舉者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也眞水竭則隆冬不寒眞火熄則盛夏不熱是方也熟地山藥澤瀉丹皮茯苓山萸皆濡潤之品所以能壯水之主肉桂附子辛潤之物能於水中補火所以能益火之原水火得其養則腎氣復矣

喻昌曰金匱用八味丸治腳氣上入少腹不仁即攻心之漸故用之以驅逐陰邪也其虛勞腰痛少腹拘急小便不利則因過勞其腎陰氣逆於少腹阻遏膀胱之氣化小便不能通利故用之溫養下焦以收腎氣也其短氣有微飲者飲亦陰類阻其胸中之陽自致短氣故用之引飲下出以安胸中也消渴病飲水一斗小便亦一斗此腎氣不能攝水小便恣出源泉有立竭之勢故急用以逆折其水也夫腎水下趨之

消證腎氣不上升之渴證非用是以蠲護封藏蒸動水氣舍此曷從治哉後人謂八味丸爲治消渴之聖藥得其旨矣

柯琴曰命門之火乃水中之陽夫水體本靜而川流不息者氣之動火之用也非指有形者言也然火少則生氣火壯則食氣故火不可亢亦不可衰所云火生土者卽腎家之少火遊行其間以息相吹耳若命門火衰少火幾於熄矣欲煖脾胃之陽必先溫命門之火此腎氣丸納桂附於滋陰劑中十倍之一意不在補火而在微微生火卽生腎氣也故不曰溫腎而名腎氣斯知腎以氣爲主腎得氣而土自生也且形不足者溫之以氣則脾胃因虛寒而致病者固痊卽虛火不歸其原者亦納之而歸封蟄之本矣崔氏加減八味丸以五味之酸收易附子之辛熱腎虛而不寒者宜之也千金方於八味外更加元參之鹹寒以助熟地而滋腎加芍藥之酸寒助丹皮

以滋肝總之爲桂附加鎖鑰耳以之壯水則有餘以之益火恐不足也濟生方加牛膝車前以治水腫倍茯苓以輔地黃山藥茱萸與澤丹車牛等列隨證加減允爲得法益陰腎氣丸於六味外加當歸五味柴胡以治目暗不見化裁愈妙矣

資生腎氣丸

治腎虛脾弱腰重腳腫小便不利腹脹喘急痰盛已成鼓證其效如神

熟地黃四兩　白茯苓三兩

山茱萸一兩　澤瀉一兩

牡丹皮一兩　車前子一兩

乾山藥一兩　牛膝一兩

肉桂一兩　附子五錢

右十味蜜和丸每服八十丸空心米飲下

集註李中梓曰經云諸濕腫滿皆屬於脾又云其本在腎其末在肺皆聚水也又曰腎者主水胃之關也關門不利故聚水而從其類也腫脹之病諸經雖有無不由於脾肺腎者蓋脾主運行肺主氣化腎主五液凡五氣所化之液悉屬於腎五液所行之氣悉屬於肺轉輸二藏以制水生金者悉屬於脾故腫脹不外此三經也然其治法有內外上下虛實不可不辨也在外則腫越婢湯小青龍湯證也在內則脹十棗丸神祐丸證也在上則喘葶藶大棗湯防巳椒目葶藶大黃丸證也在下則小便閉沉香琥珀丸疏鑿飲子證也此皆治實之法若夫虛者實脾飲此方證也

張介賓曰地黃山藥丹皮以養陰中之眞水山萸桂附以化陰中之眞氣茯苓澤瀉車前牛膝以利陰中之滯能使氣化於精卽所以治肺也補火生土卽所以治脾也壯水利竅卽所以治腎也補而不滯利而不伐治虛水

方更無有出其右者然當因此擴充隨證加減若其人因大病之後脾氣大虛而病水脹者服此雖無所碍終不見效每熟計之脾氣大傷誠非腎藥之所能治專用理中湯一兩加茯苓一兩命火衰者加附子兩足冷者加肉桂腹脹甚者加厚朴三大劑而足脛漸消十餘劑而腹脹退凡治中年之後脾腎虛寒者悉用此法蓋氣虛者不可復行氣腎虛者不可專利水溫補卽所以化氣塞因塞用之

妙顧在用之者何如耳古法治腫不用補劑而用去水等藥微則分利甚則推逐如五苓散五淋散五皮散導水茯苓湯之類皆所以利水也如舟車神祐丸濬川散禹功散十棗湯之類皆所以逐水也但察其果係實邪則此等治法仍不可廢也

大補陰丸

治陰虧火旺肺痿欬血骨蒸盜汗虛勞之證

黃蘗 鹽酒炒　知母 各四兩 鹽水炒

熟地 酒蒸　敗龜板 各六兩 酥炙

猪脊髓和煉蜜爲小丸日乾每服三錢淡鹽湯下

註

朱震亨云陰常不足陽常有餘宜常養其陰陰與陽齊則水能制火斯無病矣今時之人過慾者多精血既虧相火必旺眞陰愈竭孤

陽妄行而勞瘵潮熱盜汗骨蒸欬嗽咯血吐血等證悉作所以世人火旺致此病者十居八九火衰成此疾者百無二三震亨發明先聖千載未發之旨其功偉哉是方能驟補眞陰承制相火較之六味功效尤捷蓋因此時以六味補水水不能遽生以生脈保金金不免猶燥惟急以黃蘗之苦以堅腎則能制龍家之火繼以知母之清以涼肺則能全破傷之金若不顧其本卽使病去猶恐復來故又以熟地龜板大補其陰是謂培其本清其源矣雖有是證若食少便溏則爲胃虛不可輕用

封髓丹

治夢遺失精及與鬼交

黃蘗　砂仁

甘草

右蜜爲丸每服三錢

集註趙羽皇曰經云腎者主水受五藏六府之精而藏之又曰腎者主蟄封藏之本精之處也蓋腎爲堅藏多虛少實因肝木爲子偏喜疏泄每氣厥陰之火一動精卽隨之外溢況肝

又藏魂神魂不攝宜其夜臥鬼交精泄之證作矣封髓丹爲固精之要藥方用黃蘗爲君以其味性苦寒又能堅腎腎職得堅則陰水不虛其泛溢寒能清肅則龍火不至於奪揚水火交攝精有不安其位者乎佐以甘草以甘能緩急瀉諸火與肝火之內擾且能使水土合爲一家以妙封藏之固若縮砂者以其味辛性溫善能入腎腎之所惡在燥而潤之者惟辛縮砂通三焦達津液能內五藏六府之精而歸於腎腎家之氣內腎中之髓自藏矣此有取於封髓之意也

汪昂曰此方加天冬地黃人參名三才封髓丹用天冬補肺以生水地黃補腎以益精用人參補脾從飲食中化生水精也以藥有天地人之名而補亦在上下中之分使天地位育參贊居中故曰三才也喻昌曰加黃蘗以入腎滋陰砂仁以入脾行滯甘草以少變天冬黃蘗之苦俾合人參建立中氣以伸參兩

之權殊非好爲增益成方之比也

虎潛丸

治腎陰不足筋骨痿輭不能步履

龜板　黃蘗　各四兩

知母　熟地　各二兩

牛膝三兩五錢　芍藥一兩五錢

鎖陽一兩　虎骨一兩

當歸一兩　陳皮七錢五分

集註　王又原曰腎爲作强之官有精血以爲之强右爲末煮羯羊肉搗爲丸桐子大淡鹽湯下

也若腎虛精枯而血必隨之精血交敗濕熱風毒遂乘而襲焉此不能步履腰酸筋縮之證作矣且腎兼水火火勝爍陰濕熱相搏筋骨不用宜也方用黃蘗清陰中之火燥骨間之濕且苦能堅腎爲治痿要藥故以爲君虎骨去風毒健筋骨爲臣因高源之水不下母虛而子亦虛肝藏之血不歸子病而母愈病故用知母清肺原歸芍養肝血使歸於腎龜禀天地之陰獨厚茹而不吐使之坐鎮北方更以熟地牛膝鎖陽羊肉羣隊補水之品使精血交補若陳皮者疏血行氣滋又有氣化血行之妙其爲筋骨壯盛有力如虎也必矣道經云虎向水中生以斯爲潛之義焉夫是以名之曰虎潛丸

葉仲堅曰痿原雖分五藏然其本在腎其標在肺內經云五藏因肺熱葉焦發爲痿躄又曰陽氣內伐水不勝火則骨痿髓虛故足不任身骨痿者生於大熱也若視爲虛寒而投

以桂附多致不救是方以虎名者虎於獸中
稟金氣之至剛風生一嘯特爲肺金取象焉
其潛之云者金從水養母隱子胎故生金者
必麗水意在納氣歸腎也竈應北方之象稟
陰最厚首常向腹善通任脈能大補眞陰深
得夫潛之意者黃蘗味厚爲陰中之陰專補
腎膀之陰不足能使足膝中氣力涌出故痿
家必用二者爲君一以固本一以治標恐奇
之不去則偶之也熟地填少陰之精用以佐
竈板知母清太陰之氣用以佐黃蘗牛膝入
肝舒筋歸芍佐太陰之肝血有歸陳皮疏之氣血
以流骨正筋柔矣又慮熱則生風逗留關節
用虎骨所以驅之純陰無陽不能發生佐鎖
陽以溫之羊肉爲尤補之以味淡鹽湯下急
於入腎斯皆潛之爲義

滋腎丸　又名通關丸

治熱在下焦小便癃閉而口不渴者

黃蘗二兩酒炒　知母二兩酒浸炒

肉桂一錢

右爲細末熟水丸桐子大每服五十丸空心下

集註　李杲曰小便者足太陽膀胱所主生於肺金肺中伏熱水不能生是絕小便之源也渴而小便不通者肺氣不得降是也故用清燥金

之正化氣薄淡滲之藥瀉火而清肺滋水之化源也若熱在下焦而不渴是絶其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之素問云無陽則陰無以生無陰則陽無以化又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣無液癃秘是無陰則陽無以化也須用知蘗大苦寒之劑佐桂一錢爲引服之須臾前陰若刀刺火燒溺如湯泉而愈此證一在上焦氣分而渴一在下焦血分而不渴兩者之殊至易辨耳

柯琴曰水爲腎之體火爲腎之用人知腎中有水始能制火不知腎中有火始能致水耳蓋天一生水一者陽氣也即火也氣爲水母陽爲陰根必火有所歸斯水有所主故反佐以桂之甘溫引知蘗入腎而奏其效此相須之殷亦相制之理也

瓊玉膏

治虛勞乾欬

生地黃 四觔　白茯苓 十三兩

白蜜 二觔　人參 六兩

右以地黃汁同蜜熬沸用絹濾過將參茯爲細末入前汁和勻以磁瓶用綿紙十數層加箬葉封瓶口入砂鍋內以長流水沒瓶頸桑柴火煮三晝夜取出換紙紮口以蠟封固懸井中一日取起仍煮半日湯調服

集註　李中梓曰乾欬者有聲無痰火來乘金金極而鳴也此本元之病非漸漬難以成功若誤用苦寒祇傷脾土金反無母故丹溪以地黃爲君令水盛則火自息又損其肺者益其氣故用人參以鼓生發之元虛則補其母故用茯苓以培萬物之本白蜜爲百花之精味甘歸脾性潤悅肌且緩燥急之火四者皆溫良和厚之品誠堪寶重郭機曰起吾沉瘵珍賽瓊瑤故有瓊玉之名

龜鹿二仙膠

大補精髓益氣養神

鹿角　血者十觔　龜板　自敗者五觔

枸杞子　甘州者三十兩　人參　十五兩

右用鉛鐔如法熬膠初服酒化一錢五分漸加至三錢空心下

集註　李中梓曰人有三奇精氣神生生之本也精傷無以生氣氣傷無以生神精不足者補之以味鹿得天地之陽氣最全善通督脈足於

精者故能多滋而壽龜得天地之陰氣最具善通任衄足於氣者故能伏息而壽二物氣血之屬味最純厚又得造化之元微異類有情竹破竹補之法也人參益氣枸杞生精佐龜鹿補陰補陽無偏勝之憂入氣入血有和平之美由是精生而氣旺氣旺而神昌庶幾龜鹿之年矣故曰二仙

四神丸

治脾腎雙虛子後作瀉不思食不化食

肉果　二兩　補骨脂　四兩　炒

五味子　二兩　吳茱萸　二兩　炮

右爲末紅棗四十九枚生薑四兩切水煮棗熟去薑取棗肉搗和藥丸桐子大空心鹽湯下

二神丸　去茱萸五味　補骨脂

五味子散　去肉果補骨脂

集註　柯琴曰瀉利爲腹疾而腹爲三陰之都會一藏不調便能瀉利故三陰下利仲景各爲立方以主之太陰有理中四逆厥陰有烏梅白頭翁少陰有桃花眞武豬苓豬膚四逆湯散白通通鮓等劑可謂曲盡病情諸法備矣然祇爲一藏立法若三藏相關久留不瘥如子後作瀉一證猶未之及也夫雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也因陽氣當至而不至虛邪得以留而不去故作瀉於黎明其由有四一爲脾虛不能制水一爲腎虛不能行水故二神丸君補骨脂之辛燥補腎以行水佐肉果之辛溫補脾以制水九以薑棗又辛甘發生諸陽也一爲命門火衰不能生土一爲少陽氣虛無以發陳故五味子散君五味子之酸溫以收坎宮耗散之火使少火生氣以培土也佐吳茱萸之辛溫以順肝木欲散之勢爲水氣開滋生之路以奉春生也此四者病因雖異而見證則同皆水亢爲害二神丸是承

制之劑五味子散是化生之劑也二方理不同而用則同故可互用以助效亦可合用以建功合爲四神丸是制生之劑也制則生化久泄自瘳矣稱曰四神比理中八味二丸較速歟

按命門無火不能爲中宮腐熟水穀之用腎氣不固誰復司其閉藏之職故木氣纔萌不疏泄而亦疏泄矣雖是木邪干土亦實腎之侮脾也此際當脾腎雙補固濇平肝故以補骨脂溫腎肉果補脾五味子收濇吳茱萸瀉肝腎煖而氣蒸肝平而脾旺關門閉而水穀腐矣

御纂醫宗金鑑刪補名醫方論

卷二十八

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
29
OCT 11 1932

ChL 7918.7638

續命湯起至香薷飲止

計二十四方

29

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三目錄

續命湯
三生飲
稀涎千緡湯
秦艽升麻湯
防風黃耆湯
玉屏風散
黃耆五物湯

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

羌活愈風湯
清熱化痰湯
防風通聖散
九味羌活湯
活人敗毒散
柴葛解肌湯
升麻葛根湯
參蘇飲
藿香正氣散
神朮湯
麻黃加朮湯
桂枝附子湯
栝蔞桂枝湯
水解散
二聖救苦丹
天水散
香薷飲

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三

續命湯

治中風痱身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側

麻黃　桂枝

石膏　乾薑

杏仁 四十枚　川芎

當歸　人參

甘草 各三兩

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊愚凡坐汗出自愈不汗更服無所禁勿當風并治衄伏不得卧欬逆上氣面目浮腫

集註 趙良曰痱病者營衛氣血不養於內外故身體不用機關不利精神不治然是證有虛有實虛者自飲食房勞七情感之如內經所謂內奪而厥則爲痱痱之類是也實者自風寒暑濕感之虛不可以實治治之則愈散其氣血今此方明言中風痱是屬營衛之實邪也故用續命續命乃麻黃湯之變者加乾薑以開血受寒邪石膏以解肌受風邪當歸和血人參益氣川芎行血散風也其并治欬逆上氣面浮者亦以爲風寒所致也

三生飲

治卒中昏不知人口眼歪斜半身不遂并痰厥氣厥

南星一兩生用　川烏五錢去皮生用

附子五錢去皮生用　木香二錢

右每服五錢薑水煎加人參一兩

集註柯琴曰風爲陽邪風中無寒不甚傷人惟風中挾寒害始劇矣寒輕而在表者宜發汗以逐邪寒重而入裏者非溫中補虛終不可救

此取三物之大辛大熱者且不炮不製更佐以木香乘其至剛至銳之氣而用之非專以治風兼以治寒也然邪之所湊其氣必虛但知勇於攻邪若正氣虛而不支能無倒戈之患乎必用人參兩許以駕馭其邪此薛已真知確見立於不敗之地而收萬全之效者也若在庸手必謂補住邪氣而不敢用此謹熟陰陽毋與衆謀岐伯所以叮嚀致告耳觀其每服五錢必四服而邪始出今之畏事者用烏附分數必製熟而後敢用更以芩連監制之烏能挽回如是之危證哉古今人不相及信然本方去烏附即星香散治痰厥氣厥足矣

稀涎千緡湯

治風痰不下喉中聲如牽鋸或中濕腫滿

半夏十四枚大者　猪牙皂角一挺炙

甘草一錢　白礬二錢

右四味爲末用生薑自然汁少許冲溫水一

盞調末一錢灌之得吐痰涎卽醒

集註柯琴曰攻邪有汗吐下三法仲景於吐劑立

梔子豉瓜蒂二方所以導熱邪之上出逐寒

邪而外散也其有不因外感因醇酒厚味漸

積凝結變爲頑痰一旦乘虛上塞咽喉氣不
得通忽然昏仆目反直視喉中聲如牽鋸此
爲痰厥先輩所云怪證多屬於痰者此也非
用峻藥以攻之頑痰不能遽退故用生薑半
夏之辛以散之甘草之甘以涌之白礬之澁
以斂之牙皂之勇以開之此斬關奪門之勢
惟稟氣素實而暫虛者可用壅塞稍疏續進
他藥不可多用以傷元氣如平素虛弱者又
當攻補兼施六君子湯中加牙皂白礬末以
吐之則庶幾矣若誤作中風治之去生便遠

秦艽升麻湯

治風寒客胃口眼喎斜惡見風寒四肢拘急鉱脈浮而緊

升麻　葛根
秦艽　白芷
防風　桂枝
甘草　人參
芍藥　葱白

右十味水煎服

集註 李中梓曰至哉坤元爲五藏之主木勝風搖則倉廩之官受制脾主四肢故痿痺也口爲土之外候眼爲木之外候故俱病也升麻白芷皆陽明本藥故用爲直入之兵桂枝芍藥和其營衛防風秦艽驅散風邪葱根佐風藥發汗則無微不達又藉人參甘草補而和之則大氣周流而邪氣有不散者乎

防風黃耆湯

治中風不能言脈遲而弱者

防風　水煎服　黃耆　等分

集註 柯琴曰夫風者百病之長也邪風之至急如風雨善治者治皮毛故用防風以驅逐表邪邪之所湊其氣必虛故用黃耆以鼓舞正氣黃耆得防風其功愈大者一攻一補相須相得之義也唐柳太后中風不言許蔭宗造防

風黃者湯數十斛置床下蒸之身在氣中居次日便能語是以外氣通內氣令氣行而愈也經曰五氣入鼻藏於心肺上使耳目修明聲音能彰製此方者其知此義矣夫熏蒸之力尚能去病況服之乎今人治風惟以發散爲足法而禁用參耆豈知目盲不能視口噤不能言皆元氣不足使然耳誰知補氣可以禦風正勝而邪却之理耶神而明之存乎其人信哉

玉屏風散

治風邪久留而不散者自汗不止者亦宜防風　黃耆　白朮等分

右爲細末酒調服

集註　柯琴曰邪之所湊其氣必虛故治風者不患無以驅之無以禦之不畏風之不去而畏風之復來何則發散太過元府不閉故也腠者不知托裏固表之法徧試風藥以驅之

去者自去來者自來邪氣留連終無解期矣

防風徧行周身稱治風之仙藥上清頭面七竅內除骨節疼痹外解四肢攣急爲風藥中之潤劑治風獨取此味任重功專矣然衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔惟黃耆能補三焦而實衛爲元府禦風之關鍵且無汗能發有汗能止功同桂枝故又能除頭目風熱大風癩疾腸風下血婦人子藏風是補劑中之風藥也所以防風得黃耆其功愈大耳白朮健脾胃溫分肉培土卽以寧風也夫以防風之善驅風得黃耆以固表則外有所衛得白朮以固裏則內有所據風邪去而不復來此欲散風邪者當依如屏珍如玉也其自汗不止者亦以微邪在表皮毛肌肉之不固耳

黃耆五物湯

治風痺身無痛牛身不遂手足無力不能動履者久久服之自見其功

黃耆六錢　蜜炙　白芍藥三錢　酒炒
桂枝三錢　枝連皮　生薑三錢　外皮
大棗四枚　去核

水煎服

註經曰虛邪偏客於身半其入深者內居營衛營衛衰則真氣去邪氣獨留發爲偏枯其邪

氣淺者衄偏痛此謂虛邪賊風之中人也營衛虛則其入深久留發爲偏枯半身不遂也營衛實則其入淺即作經衄偏痛風痺病也八風五痺之病營衛實者則以續命湯換骨丹發其營衛之邪風痺偏枯之病是營衛虛則當以此湯補其營衛之虛也故君黃耆以補衛臣桂芍以補營佐薑棗補而兼通以和營衛也此方乃小建中湯之變制加黃耆減甘草飴糖者是其意在補外而不在補中也若左半身不遂則加當歸以補血右半身不遂則倍黃耆以補氣手軟倍桂枝足軟加牛膝筋軟加木瓜骨軟加虎骨元氣虛加人參陽氣虛加附子在臨證者消息之久久服之無不應也如外風邪盛則又當從事乎羌活愈風湯補而散之可也

羌活愈風湯

治年近四旬營衛不足肝腎虛弱風中經絡精神恍惚語言不清半身不遂手足麻木筋骨無力或手足枯瘦浮腫或手足筋攣不收一切風病稍愈之後調理俱宜此方及初覺大指次指麻木不用手足少力或肌肉微掣口眼跳動若不預防調治三年之內風病必生亦宜服之

羌活　甘草　炙

防風　黃耆

蔓荆子
川芎
枳殼
麻黃
甘菊花
枸杞
獨活
杜仲
柴胡

地骨皮
細辛
人參
知母
薄荷
當歸
白芷
秦艽
半夏 製

厚朴 薑製
防己 已上各二兩
黃芩
石膏
蒼术 各四兩
前胡 二兩

熟地黃
芍藥
白茯苓 各三兩
生地
官桂 一兩

右每服一兩水二盞煎一盞去滓空心溫服

如遇天陰加生薑三片臨卧再煎滓俱要食遠空心服

清熱化痰湯

治中風痰熱神氣不清舌强難言

人參　白朮

茯苓　甘草炙

橘紅　半夏

麥冬　石菖蒲

枳實　朮香

竹茹　黃芩

黃連　南星

水煎加竹瀝薑汁服

註中風有內生外中二因內生則因胃濁生痰志極動火外中則因形氣不固感召風邪所以內生者病必痰迷不語火發神昏外中者病必筋骨不用口眼歪斜單發者易治同發者難愈然此病之來必有先兆如大指次指麻木不仁或手足無力或肌肉微掣此營衛受邪外中之先兆也如上盛下虛頭眩脚軟神短忽忽言語失常此痰火將發內生之先

兆也醫方中預防外中內生之劑甚多皆不
若羌活愈風清熱化痰二方均以補正爲主
除邪次之故羌活愈風以十全大補湯爲君
劑清熱化痰以六君子湯爲君劑也羌活愈
風湯用人參芩草以補氣歸地芍藥以補血
黃耆桂枝以扶衛麻黃芎藭以調營濕盛則
筋骨痿軟故佐蒼朮防已以除之風盛則筋
骨拘勁故佐枸杜地黃以滋之病久氣必滯
故佐枳殼厚朴以行之風多從燥化故佐知

膏黃芩以清之更佐諸羌獨輩發散之品以
驅六經之風是風非汗不除也久病風邪之
人若一旬無汗須加麻黃微汗以和其表若
數日大便不利更加大黃微利以和其裏春
倍柴胡半夏夏倍知膏黃芩季夏倍防已术
芩秋倍厚朴加桂薤冬倍歸桂加附子此皆
通塞從時活變法也一氣一候亦然假如今
日風氣大來是風淫也則倍防風熱氣大來
是火淫也則倍黃芩濕氣大來是濕淫也則

倍蒼朮清氣大來是燥淫也則倍桂枝皮寒氣大來是寒淫也則加炮附子此又隨氣候加藥法也清熱化痰湯用參苓朮草以補氣木香枳實以利氣橘半南星以化痰黃芩黃連以瀉熱菖蒲通心麥竹淸心薑汁竹瀝通神明去胃濁則內生諸病自漸愈矣氣實減人參白朮者恐助熱也氣虛減木香枳實者恐傷氣也痰熱甚盛大便秘實者此方攻病力緩又當與礞石滾痰丸相兼服之大便利止再服恐過則傷正也若利後數日仍秘實者仍服之是又恐痰熱盛而助邪也其變通加減施治總在臨證者消息之難以盡述

防風通聖散

風熱壅盛表裏三焦皆實者此方主之

防風　川芎　芍藥　當歸　薄荷　大黃　連翹　麻黃　石膏　芒消 各半兩　桔梗 各一兩　黃芩　甘草 三兩　滑石 三兩

荆芥　白术

梔子　各二錢半　生薑三片

每服三錢

集註　吳琨曰防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荆芥薄荷清上藥也風熱之在顛頂者得之由鼻而泄大黃芒消通利藥也風熱之在腸胃者得之由後而泄滑石梔子水道藥也風熱之在決瀆者得之由溺而泄風淫於腑肺胃受邪石膏桔梗清肺胃

也而連翹黃芩又所以祛諸經之游火風之為患肝木主之川芎歸芍和肝血也而甘草白术所以和胃氣而健脾劉守眞長於治火此方之旨詳且悉哉亦治失下發斑三焦火實全方除消黃名雙解散解表有防風麻黃薄荷荆芥川芎解裏有石膏滑石黃芩梔子連翹復有當歸芍藥以和血桔梗白术甘草以調氣營衛皆和表裏俱暢故曰雙解本方名曰通聖極言其用之妙耳

九味羌活湯一名冲和湯

四時發散之通劑

羌活　防風

川芎　白芷

細辛　蒼术

黃芩　甘草

生地

加生薑三片葱白三莖水煎服

活人敗毒散

治傷寒溫疫風濕風眩拘踡風痰頭痛目眩四肢痛憎寒壯熱項强睛疼老人小兒皆可服

羌活　獨活
前胡　柴胡
川芎　枳殼
白茯苓　桔梗　梗
人參　各一兩　甘草　五錢

右爲細末每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫服或沸湯點服

煩熱口乾加黃芩

集註　趙羽皇曰東南地土卑濕凡患感冒輒以傷寒二字混稱不知傷者正氣傷於中寒者寒氣客於外未有外感而內不傷者也仲景醫門之聖立法高出千古其言冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷於寒觸冒之者乃名傷寒以失於固密而然可見人之傷寒悉由元氣不固膚腠之不密也昔人常言傷寒爲汗病則汗法其首重矣然汗之發也其出自陽

其源自陰故陽氣虛則營衛不和而汗不能作陰氣弱則津液枯涸而汗不能滋但攻其外不顧其內可乎表汗無如敗毒散羌活湯其藥如二活二胡芎蒼辛芷羣隊辛溫非不發散若無人參生地之大力者居乎其中則形氣素虛者必至亡陽血虛挾熱者必至亡陰而成痼疾矣是敗毒散之人參與冲和湯之生地人謂其補益之法我知其托裏之法蓋補中兼發邪氣不致於流連發中帶補眞元不致於耗散施之於東南地卑氣煖之鄉最爲相宜此古人制方之義然形氣俱實或內熱熾盛則更當以河間法爲是也

胡天錫曰非其時而有其氣惟氣血兩虛之人受之寒客營而風客衛不可用峻劑故稍從其輕者此羌活湯敗毒散所由立也九味湯主寒邪傷營故於發表中加芎地引而入血卽借以調榮用葱薑爲引使通體汗出庶三陽血分之邪直達而無所滯矣敗毒散主

風邪傷衛故於發表中加參芩枳桔引而達衛固托以宣通用生薑爲使使留連肺部則上焦氣分之邪不能干矣是方亦可用黃芩者以諸藥氣味辛溫恐其僭亢一以潤之一以清之也

柴葛解肌湯

治三陽合病頭痛發熱心煩不眠嗌乾耳聾惡寒無汗三陽證同見者

石膏　柴胡
羌活　白芷
黃芩　芍藥
桔梗　甘草
葛根

加薑棗水煎服

註　陶華製此以代葛根湯不知葛根湯祇是太陽陽明藥而此方君柴胡則是又治少陽也用之於太陽陽明合病不合也若用之以治三陽合病表裏邪輕者無不效也仲景於三陽合病用白虎湯主之者因熱甚也曰汗之則譫語遺尿下之則額汗厥逆正示人惟宜以和解立法不可輕於汗下也此方得之葛根白芷解陽明正病之邪羌活解太陽不盡之邪柴胡解少陽初入之邪佐膏芩治諸經熱而專意在清陽明佐芍藥斂諸散藥而不令過汗桔梗載諸藥上行三陽甘草和諸藥通調表裏施於病在三陽以意增減未有不愈者也若渴引飲者倍石膏加栝蔞根以清熱而生津也若惡寒甚無汗減石膏黃芩加麻黃春夏重加之以發太陽之寒若有汗者加桂枝以解太陽之風無不可也

升麻葛根湯

治陽明表熱下利兼治痘瘡初發

升麻　葛根

芍藥　甘草　炙

右四味水煎服

集註　柯琴曰此爲陽明初病解表和裏之劑可用以散表熱亦可用以治裏虛一方而兩擅其長也夫身熱汗自出不惡寒反惡熱是陽明之本證仲景未嘗立治表之方見陽明初起

汗出多而惡寒者便用桂枝湯及無汗而惡寒者則用葛根湯證同太陽而稱陽明者是陽明之表病自太陽傳來故治仍同太陽也此方治陽明自病不用麻桂者恐汗太過而亡津液反致胃燥也用升麻葛根發胃腑之陽以散肌肉之表熱芍藥甘草瀉脾經之火以解胃府之裏熱有汗則發無汗則止功同桂枝而已遠於薑桂且不須歠稀粥以助陽也胃實爲陽明之裏證仲景用承氣三方然陽明初病往往有移熱於脾而下利者內經所謂暴注下迫皆屬於熱也下利正是胃熱之兆故太陽陽明合病必自下利仲景用葛根湯以發兩陽之表熱卽所以治裏熱也此方卽倣其義去薑桂之辛熱以升麻代麻黃便是陽明表劑而非太陽表劑矣葛根稟性甘涼可以散表實協升麻以上升則使清陽達上而濁陰下降可知芍藥收斂脾陰甘草緩急和裏則下利自止可知治裏仍用表藥

者以表實下利而非裏實故也瘡瘍自裏達表出於少陰而發於太陽初起則內外皆熱故亦宜於涼散耳若無汗加麻黃有汗加桂枝渴熱加石膏咽痛加桔梗頭痛合芎芷散頭面腫合消毒飲有少陽證加柴芩火盛加芩連凡邪在三陽以此出入無不利也

參蘇飲

治感冒風寒頭痛發熱憎寒咳嗽涕唾稠黏胸膈滿悶脈弱無汗

人參八分　蘇葉八分
乾葛八分　前胡八分
陳皮八分　枳殼八分
茯苓八分　半夏八分
桔梗五分　木香五分
甘草五分　生薑五片

大棗一枚

右水煎熱服取汗

註風寒感冒太陽則傳經以太陽主表故用麻桂二方發營衛之汗也若感太陰則不傳經以太陰主肺故用此湯外散皮毛內宣肺氣也蓋邪之所湊其氣必虛故君人參以補之皮毛者肺之合也肺受風寒皮毛先病故有頭痛無汗發熱憎寒之表以蘇葉葛根前胡為臣以散之肺一受邪胸中化濁故用枳桔二陳以清之則咳嗽涕唾稠黏胸膈滿悶之證除矣加木香以宣諸裏氣加薑棗以調諸表氣斯則表裏之氣和和則解也以本方去人參加川芎以前胡易柴胡名芎蘇飲治氣實有火者頭痛甚亦加之喘嗽者加杏仁以降氣桑皮以瀉肺合四物名茯苓補心湯治氣血兩虛及新產之後虛損吐血感冒傷風咳嗽最相宜也

藿香正氣散

治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或霍亂吐泄或作瘧疾

藿香　桔梗

紫蘇　白芷

厚朴　大腹皮

半夏　茯苓

陳皮　甘草

右十味加薑棗水煎熱服

集註吳琨曰四時不正之氣由鼻而入不在表而在裏故不用大汗以解表但用芬香利氣之品以正裏蘇芷陳腹朴梗皆氣勝者也故能正不正之氣茯苓甘草則甘平之品所以培養中氣者也若病在太陽與此湯全無干涉傷寒鈹沉發熱與元氣本虛之人幷夾陰發熱者宜戒又金不換正氣散卽平胃散加半夏藿香凡受山嵐瘴氣及出遠方不服水土吐瀉下利者主之蓋平胃散可以平濕土而消瘴毕夏之燥以醒脾藿香之芬以開胃名曰正氣謂能正不正之氣也

神术湯

主治三時外感寒邪內傷生冷而發熱及脾瀉腸風

白术三錢　防風二錢

甘草一錢

右三味無汗用蒼术加葱白生薑有汗用白术生薑

集註　柯琴曰此王好古得意之方倣仲景麻桂二方之義而制爲輕劑也然此是太陰之劑可

以理脾胃之風濕而不可治太陽之風寒亦
不可以治陽明之表證與少陽之半表裏也
內經所謂春傷於風邪氣留連而洞泄至夏
而飧泄腸澼者宜之若冬傷於寒至春而溫
病者又非所宜也今人不知仲景立方之旨
祇恐麻黃桂枝之傷人也得此平和之劑恃
爲穩當不知營衛不和非調和脾胃者所可
代胃家之實者非補虛之品所能投肝膽之
相火往來少陰之水火相射者不得以燥劑
該攝也先明藥之理始得方之用能知方始
可用方而不執方若病在太陽先發陽明之
汗是引賊破家張潔古豈獨爲葛根道哉

麻黃加朮湯

治濕家身煩疼

麻黃三兩　桂枝二兩

甘草二兩炙　杏仁七十個

白朮四兩炒

右五味以水九升煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗

集註　程知曰此湯爲濕家表散法也身疼爲濕煩爲熱加白朮於麻黃湯中一以助其去濕

一以恐其過散此治濕之正法也發散方中加白朮又爲張潔古王好古二人開法門

桂枝附子湯

主治傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脈浮虛而澁者

桂枝四兩　附子三枚炮

甘草二兩　生薑三兩

大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

集註程知曰濕與風相搏流入關節身疼極重而無頭痛嘔渴等證脈浮虛者風也澁者寒濕

也風在表者散以桂甘之辛甘濕在經者逐以附子之辛熱薑棗辛甘行營衛通津液以和表蓋陽虛則濕不行溫經助陽散濕多藉附子之大力也

栝蔞桂枝湯

治太陽證備身體强几几然脈反沉遲此爲痙此湯主之

栝蔞根二兩　桂枝三兩

芍藥三兩　甘草二兩

生薑三兩　大棗十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃須歠熱粥發之

集註　喻昌曰傷寒方中治項背几几用桂枝加葛

根湯矣彼之汗出惡風其邪在表而此之太陽證罔不具備其邪之亦在於表可知也但以脈之沉遲知其在表之邪爲津液內竭所名不當從風寒之表法起見故不用葛根之發表解肌改用栝蔞根之味苦入陰擅生津液之長者爲君加之桂枝和營衛養筋脈而治其痙乃變表法爲和法也然既君以栝蔞根當增之桂枝爲臣當減之

水解散

治天行時氣初起頭痛壯熱等疫

大黃四兩　白芍二兩

黃芩　甘草炙

桂心　麻黃各三兩

右爲粗末每撮一兩水煎服汗下不再服

二聖救苦丹

川大黃生一觔　皂角四兩豬牙者去皮弦微炒

右爲末和勻水泛爲丸每服三錢無根水下

弱者減服

註

天行時氣卽四時不正之氣感而爲病者初不名疫也因病氣互相傳染老幼相似沿門闔境而共病之故曰天行時氣也然此疫氣從鼻而入一受其邪藏府皆病若不急逐病出則多速死急逐之法非汗卽下故古人治疫之方以下爲主以汗次之是爲病尋出路也此二方一以治春疫冬疫一以治春疫冬疫多寒春疫多熱多寒者宜水解散方中用麻桂芍草發營衛之汗大黃黃芩瀉瘟疫毒之邪多熱者宜救苦丹方中用皂角開竅而發表大黃瀉火而攻裏使表裏毒亦從汗下而出也二方審而用之治疫之大法可類推矣

天水散　一名益元散　一名六一散

治夏時中暑熱傷元氣內外俱熱無氣以動煩渴欲飲腸胃枯涸者又能催生下乳積聚水畜裏急後重暴注下迫者宜之

桂府滑石六兩水飛　甘草一兩

辰砂三錢

右爲細末新汲水一碗調服三錢

集註　柯琴曰元氣虛而不支者死邪氣盛而無制者亦死今熱傷元氣無氣以動斯時用參者

以補氣則邪愈甚甚用苓連以清熱則氣更傷
惟善攻熱者不使敗人元氣善補虛者不使
助人邪氣必得氣味純粹之品以主之滑石
禀土中冲和之氣行西方清肅之令秉秋金
堅重之形寒能勝熱甘不傷脾含天乙之精
而具流走之性異於石膏之凝滯能上清水
原下通水道蕩滌六府之邪熱從小便而泄
炙甘草禀草中冲和之性調和內外止渴生
津用以爲佐保元氣而瀉虛火則五藏自和
矣然心爲五藏主暑熱擾中神明不安必得
硃砂以鎮之則神氣可以遽復涼水以滋之
至於熱利初起裏急後重者宜之以滑可去
著也催生下乳積聚畜水等證同乎此義故
兼治之是方也益氣而不助邪逐邪而不傷
氣不負益元之名宜與白虎生脈三方鼎足
也

香薷飲

治暑熱乘涼飲冷陽氣爲陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩躁口渴腹滿吐瀉者

香薷　厚朴薑汁炒　白扁豆炒

水煎浸冷服

集註葉仲堅曰飲與湯稍有別服有定數者名湯時時不拘者名飲飲因渴而設用之於溫暑則最宜者也然胃惡燥脾惡濕多飲傷脾反

致下利治之之法心下有水氣者發汗腹中有水氣者利小便然與其有水患而治之易若先選其能汗能利者用之香薷芳香辛溫能發越陽氣有徹上徹下之功故治暑者君之以解表利小便佐厚朴以除濕扁豆以和中合而用之爲飲飲入於胃熱去而濕不留內外之暑悉除矣若心煩口渴者去扁豆加黃連名黃連香薷飲加茯苓甘草名五物加木瓜參耆橘朮名十味隨證加減盡香薷之用也然勞倦內傷必用清暑益氣內熱大渴必用人參白虎若用香薷是重虛其表而反濟其內熱矣香薷乃夏月解表之藥如冬月之麻黃氣虛者尤不可服今人不知暑傷元氣概用以代茶是開門揖盜也

御纂醫宗金鑑刪補名醫方論

九十二卷

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

30

ChL 7918.7638

卷二十九

黃連解毒湯起至外臺茯苓飲止

計二十九方



御纂醫宗金鑑卷二十九

刪補名醫方論卷四目錄

黃連解毒湯

三黃湯

二黃湯

三黃石膏湯

凉膈散

竹葉黃耆湯

清胃散

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

導赤散
五淋散
八正散
逍遙散
龍膽瀉肝湯
左金丸
瀉青丸
當歸龍薈丸
越婢加半夏湯
小青龍加石膏湯
清燥救肺湯
麥門冬湯
人參清肺湯
人參定喘湯
人參瀉肺湯
瀉白散
阿膠散
二陳湯

溫膽湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

外臺茯苓飲

黃連解毒湯

治一切陽熱火盛面赤口乾狂燥心煩錯語不眠大熱乾嘔吐血衄血及下後而便不實熱仍不已者

黃連　梔子　各等分

黃蘗　黃芩

水煎服

集註　汪昂曰寒極曰陰毒熱極曰陽毒是方名曰黃連解毒是君以黃連直解心經火毒也黃芩瀉肺經火毒黃蘗瀉腎經火毒梔子通瀉三焦火毒使諸火毒從膀胱出若大便實者加大黃名梔子金花湯利大便是使火毒從大小二便而出也蓋陽盛則陰衰火盛則水衰故用大苦大寒之藥抑陽而扶陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非實熱不可輕投

按　黃連解毒湯白虎湯三黃石膏湯大青龍湯皆治表裏俱熱證然大青龍湯治表實壯熱裏熱之淺在肌三黃石膏湯治表實壯熱裏熱之深在胃故一以石膏佐麻桂一以石膏佐麻豉均發太陽之表解陽明之裏也大青龍湯則更以杏草薑棗佐麻黃其意專發熱鬱之在肌也三黃石膏湯則更以芩連梔蘗佐石膏其意專瀉熱深之在胃也白虎湯治表熱在肌裏熱在胃所以不用麻桂以發太

陽專主石膏而清陽明也解毒湯治表熱在三焦所以亦不以麻桂發太陽表亦不以石膏清陽明裏而專以三黃瀉上下內外之實火也此皆太陽之邪侵及陽明而未入府成實者也若已入府成實則又當從事乎三承氣湯以下其熱也

三黃湯

治三焦實熱一切有餘火證大便祕結者

黃芩　大黃各等分

黃連

水煎服

二黃湯

治上焦火旺頭面大腫目赤腫痛心胸咽喉口舌耳鼻熱盛及生瘡毒者

黃芩　黃連

甘草 各等分

水煎食後服

註 三黃湯用黃芩瀉上焦火黃連瀉中焦火大黃瀉下焦火大便實者誠爲允當若大便不實者黃連解毒湯證也以大黃易黃蘗者因其下焦熱結未實也加梔子者使其熱不從大便出而從小便出也上中二焦實火用涼膈散若夫上焦實火則以此湯之大黃易甘草名二黃湯使芩連之性緩緩而下留連膈上張潔古以涼膈散減消黃加梔梗亦此義也雖同一瀉火之劑而其中上下緩急輕重之不同此皆加減轉換法也不可不知

三黃石膏湯

治傷寒陽證表裏大熱而不得汗或已經汗下過經不解六脈洪數面赤鼻乾舌燥大渴煩躁不眠譫語鼻衂發黃發疹發斑以上諸證凡表實無汗而未入裏未成實者均宜主之

石膏兩半　黃芩　黃連　黃蘗　麻黃七錢　梔子三十箇

淡豆豉一合

每服一兩加葱三根水煎熱服氣實者倍服

註　仲景於表裏大熱立兩解之法如大青龍湯治表裏大熱表實無汗故發汗汗出而兩得解也白虎湯治表裏大熱因表有汗不主麻桂因裏未實不主消黃惟以膏知甘草外解陽明之肌熱內清陽明之府熱表裏清而兩得解也若夫表實無汗熱鬱營衛裏未成實熱盛三焦表裏大熱之證若以大青龍湯兩解之則功不及於三焦若以白虎湯兩解之則効不及於營衛故陶華製此湯以三黃瀉三焦之火盛佐梔子屈曲下行使其在裏諸熱從下而出以麻黃開營衛之熱鬱佐豉葱直走皮毛使其在表之邪從外而散石膏倍用重任之者以石膏外合麻豉取法乎青龍是知解諸表之熱不能外乎青龍也內合三黃取法乎白虎是知解諸裏之熱不能外乎白虎也且麻豉得石膏三黃大發表熱而不礙動裏熱三黃得石膏麻豉大清內熱而不礙

外邪是此方擅表裏俱熱之長亦得仲景之心法者也若表有微汗麻黃減半桂枝倍加以防外疎裏有微溏則減去石膏倍加葛根以避中虛也

涼膈散

治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘諸風癮瘡胃熱發斑發狂及小兒驚急痘瘡黑陷

連翹四兩　大黃酒浸　黃芩酒炒　薄荷一兩　甘草二兩　梔子炒　芒消

右爲末每服三錢加竹葉生蜜煎

集註　汪昂曰此上中二焦瀉實火藥也熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘故以連翹黃芩竹葉薄荷散火於上而以大黃芒消之猛利蕩熱於中使上升下行而腸自清矣用甘草生蜜者病在腸甘以緩之也古方用涼膈散居多本方加菖蒲遠志名轉舌膏治心經蘊熱加青黛藍根名活命金丹治肝經風熱張潔古減去消黃加桔梗爲之舟楫浮而上行治上焦諸熱便不實者宜之不可以此方過瀉而輕

訾之也

竹葉黃耆湯

治消渴氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉　生地黃　各二錢

黃耆　麥冬

當歸　川芎

黃芩　甘草

芍藥　人參

半夏　石膏　各一錢

右水煎服

集註　柯琴曰氣血皆虛胃火獨盛善治者補瀉兼施寒之而不至損陽溫之而不至助火扶正而邪却矣四君子氣藥也加黃耆而去苓术者恐火就燥也四物湯血藥也倍地黃而用生者正取其寒也人參黃耆甘草治煩熱之聖藥是補中有瀉矣且地黃之甘寒瀉心腎之火竹葉助芩藥清肝膽之火石膏佐芩藥清脾胃之火麥冬同黃芩清肺腸之火則胃火不得獨盛而氣血之得補可知惟半夏一味温中辛散用之大寒劑中欲其通陰陽之路也岐伯治陰虛而目不瞑者飲以半夏湯覆杯則臥今人以爲燥而渴者禁用是不明陰陽之理耳

按　是方即竹葉石膏湯加生地當歸白芍川芎黃耆黃芩也彼則治傷寒解後煩渴少氣氣逆欲吐此則治消渴氣血虛胃火盛因其氣虛故加黃耆佐人參甘草以補氣因其血虛故加歸芎芍地以補血因其胃火盛故加黃

芩佐石膏以清胃火其煩渴則一故餘藥皆
同也於此二方推之用半夏之意自可知矣
故脾者爲胃行其津液也脾濕胃燥津液不
行得火則化痰得寒則成飲胃火清脾濕燥
其痰飲自除矣半夏消痰破飲使未化痰之
津液回清而已成痰之濁液自化非他藥所
可比倫也故二方於胃火盛燥渴中同用之

清胃散

治胃經濕熱齒齦腫痛或牽引頭腦或面發熱

升麻　甘草　生地黃　川黃連　牡丹皮　當歸

水煎服

集註　羅謙輔曰陽明胃多氣多血又兩陽合明爲熱盛是以邪入而爲病常實若大渴舌胎煩躁此傷氣分熱聚胃府燥其津液白虎湯主

之若醇飲肥厚炙煿過用以致濕熱壅於胃府逆於經絡而爲是病此傷血分治宜清胃方中以生地益陰涼血爲君佐之以丹皮去蒸而疏其滯以黃連清熱燥濕爲臣佐之以當歸入血而循其經與經仍用升麻之辛涼爲本經提使引諸藥直達血所則咽喉不清齒齦腫痛等證廓然俱清矣

導赤散

治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不利

生地　木通

甘草稍

右三味水煎服

註　赤色屬心導赤者導心經之熱從小腸而出以心與小腸爲表裏也然所見口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不利等證皆心熱移

於小腸之證故不用黃連直瀉其心而用生地滋腎涼心木通通利小腸佐以甘草稍取易瀉最下之熱蓋中之痛可除心經之熱可導也此則水虛火不實者宜之以利水而不傷陰瀉火而不伐胃也若心經實熱須加黃連竹葉甚者更加大黃亦釜底抽薪之法也

五淋散

治膀胱結熱水道不通淋澁艱痛或尿如豆汁或成砂石或如膏膿或小便血

赤苓（一錢五分）　赤芍（一錢）

梔仁（一錢）　當歸

甘草（各錢二分）

右五味加燈心水煎服

八正散

瞿麥　梔子

萹蓄　大黃
木通　滑石
車前子　甘草各一錢

加燈心一錢煎服　朱震亨方加木香一錢

註　通調水道下輸膀胱三焦之職也受藏津液氣化能出膀胱之職也若水道不輸則內蓄喘脹外泛膚腫三焦之病也若受藏不化則諸淋澁痛癃閉不通膀胱之病也經曰陰無陽無以生陽無陰無以化故陰陽偏盛皆不生化也陽盛陰虛而膀胱之氣不化爲病者通關丸證也陰盛陽虛而膀胱之氣不化爲病者腎氣丸證也此關乎氣化陰陽之爲病也經曰下虛則遺尿又曰膀胱不約爲遺尿經曰胞移熱於膀胱則癃又曰膀胱不利爲癃故虛而寒者藏而不能約實而熱者約而不能出也膀胱氣虛無氣以固則藏而不約不禁遺失之病生補中固眞湯證也膀胱氣熱壅結不行則約而不出淋澁癃閉之病生

八正五淋散證也此不全關乎氣化而又關乎虛寒實熱之爲病也八正五淋皆治淋澁癃閉之藥而不無輕重之別輕者有熱未結雖見淋澁尿赤豆汁砂石膏血癃閉之證但其痛則輕其病不急宜用五淋散單清水道故以梔苓清熱而輸水歸芍益陰而化陽復佐以甘草調其陰陽而用稍者意在前陰也重者熱已結實不但痛甚勢急而且大便亦不通矣宜用八正散兼瀉二陰故於羣走前陰藥中加大黃直攻後竅也丹溪方加木香者其意亦以氣化者與

逍遙散

治肝家血虛火旺頭痛目眩煩赤口苦倦怠煩渴抑鬱不樂兩脇作痛寒熱小腹重墜婦人經水不調脈弦大而虛

芍藥酒炒　當歸

白朮炒　茯苓

甘草炙　柴胡各二錢

引用煨薑三片薄荷少許煎服加味逍遙散即此方加丹皮山梔各五分炒

集註趙羽皇曰五藏苦欲補瀉云肝苦急急食甘以緩之蓋肝性急善怒其氣上行則順下行則鬱鬱則火動而諸病生矣故發於上則頭眩耳鳴而或爲目赤發於中則胸滿脇痛而或作吞酸發於下則少腹疼疝而或溲溺不利發於外則寒熱往來似瘧非瘧凡此諸證何莫非肝鬱之象乎而肝木之所以鬱其說有二一爲土虛不能升木也一爲血少不能養肝也蓋肝爲木氣全賴土以滋培水以灌溉若中土虛則木不升而鬱陰血少則肝不滋而枯方用白朮茯苓者助土德以升木也當歸芍藥者益榮血以養肝也薄荷解熱甘草和中獨柴胡一味以爲厥陰之報使一以升發諸陽經云木鬱則達之遂其曲直之性故名曰逍遙若內熱外熱盛者加丹皮解肌熱炒梔清內熱此加味逍遙散之義也

龍膽瀉肝湯

治脇痛口苦耳聾耳腫筋痿陰濕熱癢陰腫白濁溲血

龍膽草 酒炒
黃芩 炒
梔子 酒炒
澤瀉
木通
車前子
當歸 酒洗
柴胡
甘草
生地 酒炒

水煎服

註　脇痛口苦耳聾耳腫乃膽經之爲病也筋痿陰濕熱癢陰腫白濁溲血乃肝經之爲病也故用龍膽草瀉肝膽之火以柴胡爲肝使以甘草緩肝急佐以芩梔通澤車前輩大利前陰使諸濕熱有所從出也然皆瀉肝之品若使病盡去恐肝亦傷矣故又加當歸生地補血以養肝蓋肝爲藏血之藏補血即所以補肝也而妙在瀉肝之劑反作補肝之藥寓有戰勝撫綏之義矣

左金丸

治肝藏火實左脇作痛

黃連六兩　炒　吳茱萸一兩　湯泡

右爲末作丸

集註　胡天錫曰此瀉肝火之正劑肝之治有數種水衰而木無以生地黃丸乙癸同源是也土衰而木無以植參苓甘草劑緩肝培土是也本經血虛有火用逍遙散清火血虛無水用四物湯養陰至於補火之法亦下同乎腎而

瀉火之治則上類乎心左金丸獨用黃連爲君從實則瀉子之法以直折其上炎之勢吳茱萸從類相求引熱下行并以辛燥開其肝鬱懲其扞格故以爲佐然必本氣實而土不虛者庶可相宜左金者木從左而制從金也

瀉青丸

治肝火風熱不能安臥多驚多怒目赤腫痛及小兒急驚抽搐

龍膽草　山梔
大黃　酒蒸　川芎
當歸　羌活
防風

等分蜜丸竹葉湯下

註　龍膽草直入肝經以瀉其火佐梔子大黃使

其所瀉之火從大小二便而出是治火之標
也肝主風風能生火治肝不治風非其治也
故用羌活防風散肝之風卽所以散肝之火
是治火之本也肝之情欲散故用川芎之辛
以散之肝之質喜滋故用當歸之濡以潤之
是於瀉肝之中寓有養肝之意瀉肝者瀉肝
之病也養肝者悅肝之神也蓋肝木主春乃
陽升發動之始萬物生化之源不可傷也

當歸龍薈丸

治肝經實火頭運目眩耳聾耳鳴驚悸搐搦躁
擾狂越大便秘結小便澁滯或胸脇作痛陰囊
腫脹凡屬肝經實火皆宜服之

當歸一兩　黃連一兩　黃芩一兩　龍膽草一兩
梔子仁一兩　大黃五錢　蘆薈五錢　青黛五錢
木香二錢五分　黃蘗一兩

麝香 五錢 另研

集註 汪昂曰肝木爲生火之本肝火盛則諸經之火相因而起爲病不止一端矣故以當歸蘆薈龍膽草青黛直入本經氣血兩途先平其甚者而諸經之火無不漸平矣佐以黃芩瀉肺火黃連瀉心火黃蘗瀉腎火大黃瀉腸胃火梔子瀉三焦火備舉大苦大寒而直折之使上中下三焦之火悉從大小二便利出少加木香麝香者取其調氣開竅靈通周至也然非實火不可輕投

越婢加半夏湯

治欬而上氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者

麻黃六兩　石膏半斤

生薑三兩　甘草二兩

半夏半升　大棗十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去沫內藥取三升分溫三服

小靑龍加石膏湯

治肺脹欬而上氣煩躁而喘鉅浮者心下有水氣

麻黃三兩　桂枝三兩
細辛三兩　芍藥三兩
半夏半升　石膏三兩
乾薑三兩　五味子半升
甘草三兩

右九味以水一斗煮麻黃去沫內諸藥取三升強人服一升羸者減之日三服小兒服四

合

集註　喻昌曰前一方麻黃湯中以桂杏易石膏以鉅大有熱而加薑棗則發散之力微而且緩也後一方小靑龍湯中加入石膏以證兼煩躁雖宜汗散寒飲猶防助熱傷津也越婢方中有石膏半夏二物協力建功石膏淸熱藉辛熱亦能豁痰半夏豁痰藉辛涼亦能淸熱前麥冬湯方中下氣止逆全藉半夏入生津藥中此二方又藉半夏入淸溫劑中仲景加

減成方無非化裁後學矣

清燥救肺湯

治諸氣膹鬱諸痿喘嘔

桑葉三錢經霜者　石膏二錢五分炒　甘草一錢　胡麻仁一錢炒研　眞阿膠八分　人參七分　麥冬一錢二分　杏仁七分去皮尖炒黃　枇杷葉一片去毛蜜炙

右九味以水一碗煎六分頻頻二三次滾熱服

痰多加貝母梔蔞
血枯加生地
熱甚加犀角羚羊角或加牛黃

集註　喻昌曰按諸氣臌鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古今治氣鬱之方用辛香行氣絶無一方治肺之燥者諸痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法以痿嘔屬陽明以喘屬肺是則嘔與痿屬之中下而惟喘屬上矣所以亦無一方及於肺之燥也卽喘之屬於肺者非表卽下非行氣卽泄氣間有一二用潤劑者又不得其肯綮今擬此方名清燥救肺大約以胃爲主胃土爲肺金之母也其天冬知母能清金滋水以苦寒而不用至如苦寒降火之藥尤在所忌蓋肺金自至於燥所存陰氣不過一綫耳倘更以苦寒下其氣傷其胃其人尚有生理乎誠倣此增減以救肺燥變生諸證庶克有濟

柯琴曰古方用香燥之品以治氣鬱不獲奏

效者以火就燥也惟繆仲醇知之故用甘涼滋潤之品以清金保肺立法喻昌宗其旨集諸潤劑而製清燥救肺湯用意深取藥當無遺蘊矣

按經云損其肺者益其氣肺主諸氣故也然火與元氣不兩立故用人參甘草甘溫而補氣氣壯火自消是用少火生氣之法也若夫火燥膜鬱於肺非佐甘寒多液之品不足以滋肺燥而肺氣反爲壯火所食益助其燥矣故佐以石膏麥冬桑葉阿膠胡麻仁輩使清肅令行而壯火亦從氣化也經曰肺苦氣上逆急食苦以降之故又佐以杏仁枇杷葉之苦以降氣氣降火亦降而制節有權氣行則不鬱諸痿喘嘔自除矣要知諸膜鬱則肺氣必大虛若泥於肺熱傷肺之說而不用人參鬱必不開而火愈熾皮聚毛落喘咳不休而死矣此名之救肺涼而能補之謂也若謂實火可瀉而久服芩連苦從火化亡可立待耳

麥門冬湯

火逆上氣咽喉不利止逆下氣者主之

麥門冬　七升　半夏　一升

人參　三兩　甘草　二兩

粳米　三合　大棗　十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三服夜一服

集註喻昌曰此方治胃中津液乾枯虛火上炎治本之良法也夫用降火之藥而火反升用寒

涼之藥而熱轉熾者徒知與火熱相爭弗知補正氣以生津液不惟無益而反害之矣凡肺病有胃氣則生無胃氣則死胃氣者肺之母氣也本草有知母之名謂肺藉其清涼知清涼爲肺之母也又有貝母之名謂肺藉其豁痰豁痰爲肺之母也然屢施於火逆上氣咽喉不利之證而屢不應者名不稱矣孰知仲景妙法於麥冬人參甘草大棗粳米大補中氣以生津液隊中又增入半夏辛溫之味以開胃行津而潤肺豈特用其利咽下氣哉顧其利咽下氣非半夏之功實善用半夏之功也

人參清肺湯

治肺胃虛寒咳嗽喘急坐臥不安並治久年勞嗽吐血腥臭

人參　阿膠
骨皮　知母
烏梅　粟殼
炙草　杏仁
桑皮　各等分
加棗子煎服

人參定喘湯

人參　麻黃
阿膠　五味
粟殼　甘草
半夏麴各一錢　桑皮二錢
生薑三片水煎服

人參瀉肺湯

治肺經積熱上喘胸膈脹滿痰多大便澁

人參　黃芩
梔子　枳殼
薄荷　甘草
連翹　杏仁
桑皮　大黃
桔梗

水煎服

集註　王又原曰經云邪之所湊其氣必虛又肺爲嬌藏其不堪破耗也明矣自肺熱傷肺之說行曰保肺補肺衆共譁之曰清肺瀉肺藥與

和之豈知古人清肺瀉肺等湯而必皆以人參立名夫亦可曉然於肺氣之不可耗而人參之在所必用也肺體清而法天下濟而司降令一切渾濁不得上干者皆胸中之氣健運行而不息也若肺氣少弛則降下失令渾濁之氣遂逆上行此爲咳嗽爲喘急肺葉脹舉胸膈緊痛移熱大腸大便艱澁種種顯有餘之象實種種爲不足之徵故不問內傷外感爲熱爲寒要以人參保定肺氣爲主或佐骨皮知母阿膠滋之烏梅五味鬻粟殼斂之半夏麴生薑降之杏仁桑皮枳殼桔梗利之梔子黃芩連翹涼之麻黃薄荷發之大黃下之總恃人參之大力握樞而運已入之邪易出而將來之邪無從入也肺邪得諸藥以俱出而肺氣不隨諸藥以俱出也然則人參亦何嘗傷肺乃畏其用而不敢用耶又謂風寒咳嗽忌用五味子嗽用粟殼止嗽如神切肺如刀然此無本之言不知始自何出皆因不讀本

草不知藥之性味功能以譌傳譌也近世之醫亦不能辨惟識者察之

瀉白散

治肺氣鬱熱咳嗽而喘面腫身熱

桑白皮　地骨皮

甘草

水煎服

集註　季楚重曰經云肺苦氣上逆上逆則上焦鬱熱氣鬱生涎火鬱生熱因而制節不行壅甚為喘滿腫嗽白者肺之色瀉白瀉肺氣之有餘也君以桑白皮質液而味辛液以潤燥辛

以瀉肺臣以地骨皮質輕而性寒輕以去實
寒以勝熱甘草生用瀉火佐桑皮地骨皮瀉
諸肺實使金清氣肅而喘嗽可平較之黃芩
知母苦寒傷胃者遠矣夫火熱傷氣救肺之
治有三實熱傷肺用白虎湯以治其標虛火
刑金用生鮾散以治其本若夫正氣不傷鬱
火又甚則瀉白散之清肺調中標本兼治又
補二方之不及也

阿膠散

治肺虛有火嗽無津液咳而哽氣者

真阿膠 一兩　牛蒡子 二錢半炒
馬兜鈴 五錢炒　杏仁 七錢
炙甘草 五錢　糯米 一合

每服兩許水煎服

集註 程應旄曰痰帶紅線嗽有血點日漸成痿緣肺處藏之最高葉間布有細竅氣從此出入呼吸成液灌溉周身所謂水出高源也一受

火炎吸時徒引火升呼時並無液出久則肺竅俱閉喉間或癢或瘡六葉遂日焦枯矣今用阿膠爲君者消竅瘀也用杏仁大力子宣竅道也馬兜鈴者清竅熱也糯米以補脾母氣到則肺自輕清無礙矣

二陳湯

治肥盛之人濕痰爲患喘嗽脹滿

半夏三錢製　茯苓三錢

陳皮二錢去白　甘草一錢

右四味加薑三片水煎服

集註　李中梓曰肥人多濕濕挾熱而生痰火載氣而逆上半夏之辛利二便而去濕陳皮之辛通三焦而理氣茯苓佐半夏共成燥濕之功甘草佐陳皮同致調和之力成無已曰半夏

行水氣而潤腎燥經曰辛以潤之是也行水則土自燥非半夏之性燥也或曰有痰而渴宜去半夏代以貝母吳琨曰渴而喜飲小便利者易之不能飲水小便不利雖渴宜半夏也此濕爲本熱爲標所謂濕極而兼勝已之化非眞象也又東南之人濕熱生痰故朱震亨主之加枳實砂仁名枳實二陳湯其性較急也先哲云二陳爲治痰之妙劑其於上下左右無所不宜然祇能治實痰之標不能治虛痰之本虛痰之本在脾胃治者詳之

溫膽湯

治熱嘔吐苦虛煩驚悸不眠痰氣上逆

竹茹　枳實

半夏　甘草

陳皮　茯苓

生薑

右七味水煎服

集註　羅謙輔曰膽爲中正之官清靜之府喜寧謐惡煩擾喜柔和惡壅鬱蓋東方木德少陽溫

和之氣也若病後或久病而宿有痰飲未消胸膈之餘熱未盡必致傷少陽之和氣以故虛煩驚悸者中正之官以熇蒸而不寧也熱嘔吐苦者清靜之府以鬱炙而不諡也痰氣上逆者木家挾熱而上升也方以二陳治一切痰飲加竹茹以清熱加生薑以止嘔加枳實以破逆相濟相須雖不治膽而膽自和蓋所謂膽之痰熱去故也命名溫者乃謂溫和之溫非謂溫涼之溫也若謂膽家眞畏寒而怯而溫之不但方中無溫膽之品且更有涼胃之藥也

小半夏湯

嘔家本渴渴爲欲解今反不渴心下有支飲故也

半夏一升　生薑半斛

以水七升煮取一升半分溫再服

小半夏加茯苓湯

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者

半夏一升　生薑半斛

茯苓三兩

煎服如前

外臺茯苓飲

治心胸中有痰飲宿水自吐出水復心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓三兩　人參三兩

白朮三兩　枳實二兩

橘皮二兩半　生薑四兩

右六味水六升煮取一升八合分三服如人行八九里再進之

集註趙良曰嘔爲痰飲動中湧而出之嘔盡本當渴渴則可徵支飲之全去今反不渴是其飲尚留去之未盡也用半夏之辛溫生薑之辛散散其欲出之飲則所留之邪自盡矣半夏生薑皆味辛可治膈上痰心下堅嘔逆目眩然悸必心受水凌故加茯苓以去水伐腎邪安心神也後方加人參枳實橘皮此由上中二焦氣弱水飲入胃脾不能輸歸於肺肺不能通調水道以致停積爲痰爲宿水吐之則

下氣因而上逆虛與氣結滿不能食當補益中氣以人參白朮爲君茯苓逐宿水枳實破諸氣爲臣開脾胃宣揚上焦發散凝滯則陳皮生薑爲使也其積飲既去而虛氣塞滿其中不能進食此證最多

御纂醫宗金鑑刪補名醫方論

十三卷

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

ChL 7918.7638

卷三十

礞石滾痰丸起至托裏消毒散止

計二十四方



御纂醫宗金鑑卷三十

刪補名醫方論卷五目錄

礞石滾痰丸

指迷茯苓丸

金匱枳术湯

桂苓甘术湯

疏鑿飲子

葶藶大棗瀉肺湯

蘇葶定喘丸

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

舟車神祐丸
實脾飲
清脾飲
芍藥湯
溫脾湯
大黃附子湯
越鞠湯丸
四磨飲
備急丸
磁硃丸
石斛夜光丸
洗刀散
失笑散
獨聖散
大黃蠐螬丸
仙方活命飲
托裏消毒散

御纂醫宗金鑑卷三十

刪補名醫方論卷五

礞石滾痰丸

治實熱老痰之峻劑虛寒者不宜用

黃芩　八兩　大黃　八兩　酒蒸

沉香　五錢　礞石　一兩　焰消煆過　忌火　埋地內七日用

右四味爲細末水丸川椒大量人大小用之

用溫水一口送過咽卽仰臥令藥徐徐而下半日不可飲食勿起身行動言語待藥氣自

胃口漸下二腸然後動作飲食服後喉間稠黏壅滯不快此藥力相攻故痰氣泛上也少頃藥力至而漸逐惡物入腹下腸效如響應指逃茯苓丸　治中焦停痰伏飲

半夏二兩製　茯苓一兩

枳殼五錢　風化消二錢半

右四味薑汁糊爲丸

註經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾游者運行也溢者滲溢也輸者輸布也精氣者水化之精氣也言入於胃運行水化之精氣滲溢於腸胃之外而上輸布於脾也又曰脾氣散精上歸於肺言水之清者上升猶天之雨露也又曰通調水道下輸膀胱言水之濁者下降猶地之江河也此皆言水自濁化清由府輸藏自清分濁由藏輸府水之運行循環也又曰水精四布五經並行言水發源於脾周布四藏並行五經也此皆言水內養藏府外滋百骸水之變化精微也如是者何痰之有

若飲食失度不和於中水精不滲溢於外直下走大小腸而爲泄瀉矣若三焦失運氣不蒸化水之清者不升升水之濁者不降精化爲水則內停作脹外泛作腫上攻喘呼下蓄淋閟矣若上焦氣不清肅不能輸布留於胸中水之精者悉變爲濁陽盛煎灼成痰陰盛凝蓄爲飲也故治痰者以清火爲主實者逐之虛者化之治飲者以燥濕爲主實者逐之虛者溫之所以古人治飲有溫補之法而治痰則無之也王隱君製礞石滾痰丸治老痰一方用黃芩清胸中無形諸熱大黃瀉腸胃有質實火此治痰必須清火也以礞石之燥悍此治痰必須除濕也以沉香之速降此治痰必須利氣也二黃得礞石沉香則能迅掃直攻老痰巢穴濁膩之垢而不少留滾痰之所由名也若陽氣不盛痰飲兼作又非此方所宜當以指迷茯苓丸合而治之用半夏燥濕茯苓滲濕風消軟堅枳殼利氣別於二陳之

甘緩遠於大黃礞石之峻悍殆攻中之平劑
歟

金匱枳术湯

治心下鞕如大盤邊旋如杯水飲所作

枳實七枚　白术二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中
鞕即散

註　心下胃之上脘也上脘結鞕如盤邊旋如杯
謂時大時小水氣所作非有形食滯也用枳
實以破結氣白术以除水濕溫服三服則腹
鞕結開而鞕消矣李杲法仲景以此方倍白

術是以補爲主也此方君枳實是以瀉爲主也然一緩一急一補一瀉其用不同只此多寡轉換之間耳

桂苓甘术湯

治心下有痰飲胸脇支滿目眩又曰短氣有微飲當從小便去之桂苓甘术湯主之腎氣丸亦主之

茯苓 四兩　桂枝 三兩

白术 三兩　甘草 三兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

集註 趙良曰靈樞謂心胞絡之脈動則病胸脇支

滿者謂痰飲積於心胞其病則必若是也目眩者痰飲阻其胸中之陽不能布精於上也茯苓淡滲逐飲出下竅因利而去故用以爲君桂枝通陽輸水走皮毛從汗而解故以爲臣白朮燥濕佐茯苓消痰以除支滿甘草補中佐桂枝建土以制水邪也夫短氣有微飲此水飲停蓄呼吸不利而然也金匱並出二方妙義益彰呼氣之短用苓桂朮甘湯之輕清以通其陽陽化氣則小便能出矣吸氣之短用腎氣丸之重降以通其陰陰腎氣通則關門自利矣

按風水陽水也石水陰水也陽水多實陰水多虛陽水在上故多喘陰水在下故多滿所以治陽水用散用攻治陰水用溫用補然陰中必有陽此方治陰水之在陽而上者也腎氣丸治陰水之在陰而下者也於此推之陽中亦必有陰故有小青龍湯五苓散之治法也今舉世不分陰陽虛實皆以金匱腎氣湯治

之服之不效終不改轍每至吐血而死良可
嘆也

疏鑿飲子

治徧身水腫喘呼口渴大小便秘

羌活　秦艽

檳榔　大腹皮

商陸　茯苓皮

椒目　木通

澤瀉　赤小豆等分

加薑皮水煎服

註　經曰三焦者決瀆之官水道出焉若水飲阻

於內風寒束於外則三焦之氣化不行上焦之如霧中焦之如漚下焦之如瀆同為下焦之如瀆也以致水氣外泛皮膚作腫內停腹裏作脹上攻喘咳嘔逆下蓄小便不利種種諸證而治法總不外乎表裏也小青龍湯眞武湯越婢湯五苓散疏鑿飲子五方皆治有水氣兼表裏證之藥也小青龍湯治表裏寒實中有水氣眞武湯治裏寒中兼水氣二證俱內不作脹外不作腫故一以麻桂輩散寒以行水

一以薑附輩溫寒以制水也越婢湯治表裏實熱中有水氣五苓散治表裏虛熱中有水氣故一以麻黃石膏散膚之水清肌之熱以消腫也一以桂苓术澤解肌表熱利所停水以止吐也疏鑿飲子治表裏俱實不偏寒熱而水濕過盛遍身水腫喘脹便秘者故以商陸為君專行諸水佐羌活泰艽腹皮苓皮薑皮膚而散佐檳榔赤豆椒目澤瀉木通行在裏之水從二便而出上下

內外分消其勢亦猶神禹疏鑿江河之意也
至於越婢湯加半夏者因喘氣上逆用之降
逆也加附子者因汗出惡風散表固陽也小
青龍湯加石膏者因喘而煩燥用之兼清胃
熱也五苓散以术桂易滑石阿膠名豬苓湯
專清陰兼治水也眞武湯去生薑加人參名
附子湯專溫陽不治水也由此可知仲景用
方於羣溫劑中加以大寒之品大寒劑中加
以辛熱之品去桂枝加滑石則不走外去生
薑加人參則不治水其轉換變化神妙如此
拘拘之士不足語此也

葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰喘不得臥及水飲攻肺喘急者

葶藶一兩 苦

大棗十枚

以水五鍾先煮棗三鍾去棗內葶藶煮取一鍾半頓服弱者減服戒鹽醬

蘇葶定喘丸

治飲停上焦攻肺喘滿不得臥面身水腫小便不利者

苦葶藶子 研泥

南蘇子 研泥

各等分合均用棗肉爲小丸陰乾磁礶盛之
恐滲去油性減去藥力每服三錢於夜三更
時白湯下以利四五次爲度利多則減服之
利少則加服之次日身軟則隔一日或隔二
日服之形氣弱者先減半服之俟可漸加戒
鹽醬服之卽奏奇功如不嚴戒一切鹹物卽
對證用藥萬無一生

舟車神祐丸　又名淨府丸

治水腫水脹形氣俱實

黑牽牛四兩炒　大黃二兩酒浸
甘遂一兩麵裹煨　大戟一兩麵裹煨
芫花一兩醋炒　青皮一兩炒
橘紅一兩　木香五錢
檳榔五錢　輕粉一錢

右爲末水丸每服五分五更白滾水下大便
利三次爲度若一二次不通利次日仍服或
六分七分漸加至一錢若服後大便利四五
次或形氣不支則減其服三分二分俱可或

隔一二三日服一次以愈爲度甚者忌鹽醬百日

註　葶藶大棗湯蘇葶定喘丸舟車神祐丸三方皆治腫脹之劑然葶藶大棗湯治水停胸中肺滿喘急不得臥皮膚浮腫中滿不急者故獨用葶藶之苦先瀉肺中之水氣佐大棗恐苦甚傷胃也蘇葶定喘丸卽前方加蘇子以降氣氣降則水降氣降則輸水之上源水降則開水之下流也舟車神祐丸治水停諸裏上攻喘咳難臥下蓄小便不利外薄作腫中停脹急者故備舉甘遂大戟芫花牽牛大黃直攻水之巢穴使從大小二便而出佐青皮陳皮木香以行氣使氣行則水行腫脹兩消其尤峻厲之處又在少加輕粉使諸攻水行氣之藥迅烈莫當無微不入無窮不達用之若當功效神奇百發百中然非形實或邪盛者不可輕試苟徒利其有刦病之能消而旋腫用者愼之

實脾飲

治身重懶食肢體浮腫口中不渴二便不實

白朮 土炒　茯苓

甘草 炙　厚朴 薑炒

大腹子　草果仁

木香　木瓜

附子　乾薑

加薑棗煎服

氣虛者加人參

註　脾胃虛則土不能制水水妄行肌表故身重浮腫用白朮甘草生薑大棗以實脾胃之虛也脾胃寒則中寒不能化水水停腸胃故懶食不渴二便不實用薑附草果以溫脾胃之寒更佐大腹茯苓厚朴木香木瓜者以導水利氣蓋氣者水之母也土者水之防也氣行則水行土實則水治故名曰實脾也然此方導水利氣之力有餘陰水寒勝而氣不虛者固所宜也若氣少聲微則必以理中湯加附子數倍茯苓以君之溫補元氣以行水爲萬當也

按苓桂朮甘湯實脾飲腎氣丸皆治陽虛水氣之證苓桂朮甘湯治上焦陽虛不能輸布水留於上心下逆滿氣上衝胸故用苓桂朮甘之品扶陽通氣輸水道也實脾飲治中焦陽虛不能蒸化水漬於中外泛作腫二便通利故用薑附苓朮之劑培土溫中勝寒濕也腎氣丸治下焦陽虛不能行水小便不利肢體

浮腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也

清脾飲

治痰積成瘧無寒衣裏證者

青皮　厚朴

草果　半夏

柴胡　白朮

甘草　茯苓

黃芩

水煎服

註　瘧爲少陽病兼太陽表者麻桂各半湯汗之

兼陽明裏者大柴胡湯下之若不兼表裏或已汗下而仍作者當從少陽和解法也是方以小柴胡四君二湯合劑清少陽而顧及於脾故名曰清脾也減人參者以氣不虛也加草果厚朴氣味俱厚之品取以輸胃之積加青皮佐茯苓半夏用以破痰之原先哲云無痰不成瘧無積不成瘧此湯是也若夫氣虛者仍加人參氣實者更加檳榔熱多者加石膏汗多者加桂枝自當臨病斟酌也

##芍藥湯

治滯下赤白便膿血後重窘痛

芍藥二兩　當歸五錢　黃連五錢　黃芩五錢　檳榔三錢　木香三錢　甘草三錢

每服半兩水煎服痢不減加大黃

註　滯下起於夏秋非外因濕暑即內因生冷濕蒸熱鬱釀成初起府病久則傳藏府病易治

藏病難治府者何病在大腸則從金化故其色白病在小腸則從火化故其色赤所以赤痢多噤口以小腸近胃穢氣易於上攻而爲嘔逆不食也藏者何傳心則熱不休下利血水傳腎則利不止如屋漏水傳脾則水漿不入噦逆不食此湯治初病在府之方也用當歸白芍以調血木香檳榔以調氣血和則膿血可除氣調則後重自止芩連燥濕而清熱甘草調中而和藥若窘迫痛甚或服後痢不減者加大黃通因通用也

溫脾湯

主治錮冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去然後調治不可謂虛以養病也

厚朴二兩　乾薑二兩

甘草二兩　桂心二兩

附子二兩　大黃四錢

右㕮咀取一兩水二鍾煎六分頓服

集註　喻昌曰許叔微製此方深合仲景以溫藥下之之法其大黃止用四錢更爲有見夫錮冷

在腸胃而泄瀉矣卽溫藥中寧敢用大黃之猛重困之乎減五之一乃知許叔微之得於仲景深也仲景云病人舊微溏者梔子湯不可與服又云太陰病鯁弱便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也卽是觀之腸胃錮冷之泄瀉而可恣用大黃耶不用則溫藥恐不能制而洞下之勢或至轉增裁酌用之眞足法矣

大黃附子湯

主治脇下偏痛發熱其鯁緊弦此寒也以溫藥下之

大黃二兩　附子二枚炮

細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若强人取二升半分三服服後如人行四五里再進

集註　喻昌曰仲景治傷寒熱邪痞聚心下而挾陽

虛陰盛之證用附子瀉心湯之法矣其雜證
脇下偏痛發熱爲陽其脈弦緊爲陰是則知
陽中陰邪上逆也復立此溫藥下之一法然
仲景諄諄傳心後世領略者鮮金匱又別出
一條云其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不
移數脈弦者當下其寒脈緊而遲者必心下
堅脈大而緊者陽中有陰可下之讀者罔識
其旨詎知皆以溫藥下之之法耶其曰當下
其寒謂陽中有陰實之邪可下其金匱不躍
躍乎

張璐曰三承氣湯爲寒下之柔劑白散備急
丸爲熱下之剛劑附子瀉心湯大黃附子湯
爲寒熱互結剛柔並濟之和劑近世但知寒
下一途絕不知有溫下一法蓋暴感之熱結
可以寒下久積之寒結亦可寒下乎是以備
急等法所由設也然此僅可治寒實之結設
其人稟質素虛雖有實邪固結敢用剛猛峻
劑攻擊之乎故仲景又立附子瀉心湯用苓

連佐大黃以祛膈上之熱痞卽兼附子之溫以散之大黃附子湯用細辛佐附子以攻脇下寒結卽兼大黃之寒以導之寒熱合用溫攻並施此聖法昭然不可思議者也

越鞠湯丸

治一切濕痰食火氣鬱血諸鬱

香附　蒼术

撫芎　神麯

山梔仁

水煎服或作丸

註　夫人以氣爲本氣和則上下不失其度運行不停其機病從何生若飲食不節寒溫不適喜怒無常憂思無度使冲和之氣升降失常

以致胃鬱不思飲食脾鬱不消水穀氣鬱胸
腹脹滿血鬱胸膈刺痛濕鬱痰飲火鬱爲熱
及嘔吐惡心吞酸吐酸嘈雜噯氣百病叢生
故用香附以開氣鬱蒼朮以除濕鬱撫芎以
行血鬱山梔以清火鬱神麯以消食鬱此朱
震亨因五鬱之法而變通者也五藥相須共
收五鬱之效然當問何鬱病甚便當以何藥
爲主至若氣虛加人參氣痛加木香鬱甚加
鬱金懶食加穀蘗脹加厚朴痞加枳實嘔痰
加薑夏火盛加萸連則又存乎臨證者之詳
審也

四磨飲

治七情感傷上氣喘急胸膈不快妨悶不食

人參　檳榔

沉香　天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸放溫空

心服

集註　王又原曰經云聖人齊氣如持至寶庸人役物而反傷太和此七情隨所感皆能爲病然壯者氣行而愈弱者氣著爲病愚者不察一

遇上氣喘急滿悶不食謂是實者宜瀉輒投破耗等藥得藥非不暫快初投之而應投之久而不應矣夫呼出爲陽吸入爲陰肺陽清肅則氣下行腎陰寧謐則氣歸攝不復散而上逆矣若正氣既衰卽欲削堅破滯則邪氣難伏法當用人參先補正氣沉香納之於腎而後以檳榔烏藥從而導之所謂實必顧虛瀉必先補也四品氣味俱厚磨則取其氣味俱足煎則取其氣味純和氣味齊到效如桴鼓矣

備急丸

治寒氣冷食稽留胃中心腹滿痛大便不通者

大黃二兩　乾薑二兩

巴豆一兩　去皮研如脂

先搗大黃乾薑爲末內巴豆合搗千杵和蜜丸如豆大藏密器中勿洩氣候用每服三四丸煖水或酒下

金匱主中惡心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤如卒死者捧頭起灌令下咽須臾當差不

差更與三丸當腹中鳴卽吐利便差若口噤者須化開從鼻孔用葦管吹入自下於咽

集註 柯琴曰大便不通當分陽結陰結陽結有承氣更衣之劑陰結又製備急白散之方金匱用此治中惡當知寒邪卒中者宜之若用於溫暑熱邪速其死矣是方允爲陰結者立乾薑散中焦寒邪巴豆逐腸胃冷積大黃通地道又能解巴豆毒是有制之師也然白散治寒結在胸故用桔梗佐巴豆用吐下兩解法此則治寒結腸胃故用大黃佐薑巴以直攻其寒世徒知有溫補之法而不知有溫下之法所以但講寒虛不議及寒實也

按 世人之情惟知畏貧不知畏禍因其貧遺其禍病人之情亦多如是惟知畏虛不知畏病因其虛忘其病殊不知虛猶貧也病猶禍也虛而有病猶夫貧者有禍也去其禍而但貧猶可安也實而有病猶夫富者有禍也不去其禍而其富未可保也最可笑者近世之醫

臨診病家外飭小心中存不決且諉言虛不可攻縱使病去正氣難復病人畏懼自然樂從受病淺者幸而自愈設不愈者另延醫至詎病者先意難入攻病之藥尚未入口衆議咻咻致明通之士拂袖而去坐而待斃終不悟爲庸工之所誤也醫者久擅其術初心原爲自全恬不知恥負久之亦竟以爲養病爲能攻病爲拙而舉世之病者皆昧昧於治病也嘗考孫思邈以仲景麻黃桂杏甘草之還魂湯治卒中昏冒口噤握固李杲以仲景巴豆大黃乾薑之備急丸治卒中暴死腹痛滿閉下咽立效豈二人不知虛實耶蓋上工之醫未診病時並不先存意見亦不生心自全有是病但用是藥耳柯琴曰備急丸治寒結腸胃白散治寒結在胸於此又可知還魂湯治寒結在胸之表以散無形之邪氣也白散治寒結在胸之裏以攻有形之痰飲也備急丸治寒結在腸胃以攻不化之糟粕也

磁硃丸

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空中有黑花覩物成二體及內障神水淡綠色淡白色

又治耳鳴及聾

磁石二兩　辰砂一兩

神麯三兩生更以一兩水和作餅煮浮人前藥煉蜜爲丸

每服十丸加至三十丸空心米湯下

集註　王又原曰五藏六府之精皆上注於目則目之能視者氣也目之所以能視者精也腎爲

藏精故神水發於腎心爲離照故神光發於心光發陽而外映有陰精以爲守則不散而常明水發陰而凝靜有陽氣以爲布則洞悉而不窮惟心腎有虧致神水乾涸神光短少昏眊內障諸證所由作也磁石直入腎經收散失之神性能引鐵吸肺金之氣歸藏腎水硃砂體陽而性陰能納浮游之火而安神明水能鑒火能燭水火相濟而光華不四射與然目受藏府之精精裨於穀神麴能消化五穀則精易成矣蓋神水散大緩則不收賴鎮墜之品疾收而吸引之故爲救急之劑也其治耳鳴耳聾等證亦以鎮墜之功能治虛陽之奔耳

柯琴曰此丸治癲癎之聖劑蓋狂癡是心腎脾三藏之病心藏神脾藏意與智腎藏精與志心者神明之主也主不明則十二官危使道閉塞而不通形乃大傷即此謂也然主何以不明也心法離而屬火眞水藏其中若天

一之眞水不足地二之虛火妄行所謂天氣者蔽塞地氣者冒明日月不明邪害空竅故目多妄見而作此奇疾也非金石之重劑以鎮之狂必不止硃砂禀南方之赤色入通於心能降無根之火而安神明磁石禀北方之黑色入通於腎吸肺金之氣以生精墜炎上之火以定志二石體重而主降性寒而凉陰志同道合奏功可立俟矣神麴推陳致新上交心神下達腎志以生意智且食入於陰長氣於陽奪其食則已此內經治狂法也食消則意智明而精神治是用神麴之旨乎煉蜜和丸又甘以緩之矣

石斛夜光丸

治神水寬大漸散昏如霧露空中有黑花及覩物成二神水淡綠淡白色者

天門冬二兩　兎絲子七錢

人參二兩　茯苓二兩

甘菊花七錢　乾山藥七錢

麥冬一兩　熟地一兩

肉蓯蓉五錢　青葙子五錢

生地一兩　枸杞七錢

羚羊角 五錢 鎊　草決明 八錢

石斛 七錢　杏仁 七錢

蒺藜 五錢　川芎 五錢

甘草 五錢 炙　黃連 五錢

防風 五錢　枳殼 五錢

烏犀 五錢 鎊　牛膝 七錢五分

右爲細末煉蜜丸桐子大每服三五十丸溫酒鹽湯下

集註羅謙輔曰此方爲陽衰陰弱不能升精於目而設故目科與千金磁硃丸並重治證亦同然磁硃爲鎮墜藥此爲羙補藥鍼經曰五藏六府精氣皆上於目而爲之精故夫目之精明者陰陽合傳而爲精明者也若腎肝虛則陰弱不能斂精以升養神水於內脾肺虛則陽衰不能攝陰而浮散神光於外以致神水寬大覩物成二此其治法其營在肝其主在腎其合在脾能合腎脾之陰而使肝達之則必能歸精於兩眸而繼明如晝夜矣是方先

補腎肝以二冬二地兎絲枸杞五味牛膝蒞
蓉羣隊滋陰之品以之强陰塡精斂氣安神
養血此壯水之主亦所以生水也復以人參
炙草茯苓山藥培補中宮使調合陰陽也佐
之以蒺藜甘菊川芎枳殼防風行肝達氣青
葙決明子解結散滯黃連烏犀羚角清火瀉
熱然必取石斛之妙合脾腎者清而行之要
使升精歸明之用藏府合德專精致一耳其
以爲丸者補上治下利以緩利以久不利以

速也

洗刀散

治風熱上攻火眼赤痛驟生雲翳外障遮睛

防風 一錢　石膏 一錢

滑石 一錢　歸尾 一錢

赤芍 八分　羌活 八分

荆芥 五分　黄芩 五分

連翹 五分　川芎 五分

桔梗 五分　麻黄 五分

白朮 五分　大黄 五分

芒消五分　獨活五分
元參五分　木賊五分
菊花五分　白蒺藜五分
蟬退五分　草決明五分
薄荷四分　梔子四分
蔓荊子四分　細辛三分
甘草三分

加清茶葉五分水煎服

註曰之病內障者昏暗不明而不腫痛得之於內七情動中勞傷心腎也外障者赤腫而痛晴不昏暗得之於六淫所襲熱蘊經絡也故內障多虛外障多實子和曰眼無火不病非止內障正指外障而立言也外障赤腫而痛明者又非或散或下所能卽愈也洗刀散方者或散外邪或瀉內熱或併解之可立愈也既可以攻風熱又可以去雲翳是一方而兼其有風火上攻留而不散凝結雲翳掩其光擅其長也方中用防風通聖散全劑是主以

去風熱也倍歸尾赤芍是治風先治血血行風自滅也加羌獨活蔓荆子倍防風是祛風而專在太陽表也太陽之裏少陰也故又加細辛羌活走少陰加元參下安腎火是治表而顧及其裏也其加木賊蟬蛻草決明白蒺藜菊花者是佐諸祛風清熱之羣藥以消風熱驟壅之雲翳也

失笑散

治產後心胸絞痛欲死或血迷心竅不省人事

五靈脂　蒲黃　等分

每服三錢酒煎服

獨聖散　附

南山查肉一兩炒

水煎用童便沙糖和服

集註　吳于宣曰經云心主血脾統血肝藏血故產後瘀血停滯三經皆受其病以致心腹瘀痛

惡寒發熱神迷眩運胞膈滿悶凡茲者由寒凝不消散氣滯不流行惡露停留小腹結痛迷悶欲絶非純用甘溫破血行血之劑不能攻逐蕩平也是方用靈脂之甘溫走肝生用則行血蒲黃辛平入肝生用則破血佐酒煎以行其力庶可直抵厥陰之滯而有推陳致新之功甘不傷脾辛能散瘀不覺諸證悉除直可以一笑而置之矣至獨聖散用山查一味濃煎與沙糖童便同服者何也山查不惟消食健脾功能破瘀止兒枕痛更益以沙糖之甘逐惡而不傷脾童便之鹹入胞而不凉下相得相須功力甚偉名之曰獨聖誠不虛也

大黃䗪蟲丸

治五勞七傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑

大黃十兩　酒蒸
桃仁四兩去皮尖炒
杏仁四兩去皮尖炒
黃芩二兩炒
甘草三兩
芍藥四兩炒
地黃十兩
乾漆一兩炒
蝱蟲一兩五錢去翅足炒
水蛭百枚炙黃
蠐螬一兩五錢炒
䗪蟲一兩去頭足炒

右十二味爲末蜜丸如小豆大酒服五丸日

三服

集註李中梓曰勞傷之證肌膚甲錯兩目黯黑此內有瘀血者也瘀之日久則必發熱熱涸其液則血乾於經隧之間愈乾愈熱愈熱愈乾而新血皆損人之充養百骸光華潤澤者止藉此血血傷則無以沃其膚故甲錯也目得血而能視血枯則無以榮其目故黯黑也仲景洞見此證補之不可涼之無益而立此方經曰血主濡之故以地黃爲君堅者削之故以大黃爲臣統血者脾也脾欲緩急食甘以緩之又酸苦湧泄爲陰故以甘芍桃仁爲佐鹹走血苦勝血故以乾漆之苦四蟲之鹹爲使夫濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生今人遇一勞證便用滋陰之藥服而不效坐以待斃術豈止此耶

仙方活命飲　附薛巳治瘍通方

治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也

穿山甲　白芷

防風　皂角刺

乳香　沒藥

當歸尾　赤芍

花粉　貝母

陳皮　金銀花

甘草

右十三味用酒一碗煎數沸服

集註　羅謙輔曰此瘍門開手攻毒之第一方也經云營氣不從逆於肉理故癰疽之發未有不從營氣之鬱滯因而血結痰滯蘊崇熱毒爲患治之之法妙在通經之結行血之滯佐之以豁痰理氣解毒是方穿山甲以攻堅皂刺以達毒所白芷防風陳皮通經理氣而疏其滯乳香定痛和血沒藥破血散結赤芍歸尾以驅血熱而行之以破其結佐以貝母金銀花甘草一以豁痰解鬱一以散毒和血其爲潰堅止痛宜矣然是方爲營衛尚强中氣不虧者設若脾胃素弱營衛不調則有托裏消毒散之法必須斟酌而用此薛已所論千古不易之治也因附治瘍用方之法於後使學者服膺云

薛已曰治瘍之法若腫高熾痛者先用仙方活命飲解之後用托裏敗毒散漫腫微痛者

用托裏散如不應加薑桂若膿出而反痛氣
血虛也八珍散不作膿不腐潰陽氣虛也四
君加歸耆肉桂不生肌不收斂脾氣虛也四
君加芍藥木香惡寒憎寒陽氣虛也十全大
補加薑桂晡熱內熱陰血虛也四物加參耆
欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑自汗盜汗
五藏虛也六味丸料加五味子食少體倦脾
氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促咳嗽脾
肺虛也前湯加麥冬五味欲嘔少食脾胃虛

也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子
理中湯熱渴淋秘腎虛陰火也加減八味丸
大凡怯弱之人不必分其腫潰惟當先補胃
氣蓋瘡瘍之作緣陰陽虧損其膿既泄氣血
愈虛豈有不宜補者哉或疑參耆滿中間有
用者又加發散敗毒所補不償所損又或以
有疾不服補劑因而致誤者多矣可勝惜哉

托裏消毒散

人參　黃耆

白朮　茯苓

當歸　川芎

白芍　金銀花

白芷　甘草

連翹

水煎服

註　參耆朮苓草以益氣分歸芎芍以滋血分銀花白芷連翹以解毒

御纂醫宗金鑑刪補名醫方論

卷三十一

桂枝湯起至十棗湯止

計二十九方

卷三十一

T7910/7388
CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932
32
ChL 7918.7638
32

御纂醫宗金鑑卷三十一

刪補名醫方論卷六目錄

桂枝湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

桂枝二越婢一湯
越婢湯
麻黃杏仁甘草石膏湯
麻黃附子細辛湯
麻黃附子甘草湯
芍藥甘草附子湯
桂枝甘草湯
桂枝加芍藥大黃湯
桂枝加附子湯
桂枝加芍藥湯
桂枝加大黃湯
小建中湯
炙甘草湯
桂枝人參湯
葛根黃芩黃連湯
白虎湯
白虎加人參湯
豬苓湯

五苓散

茵蔯五苓散

桂枝去芍加苓术湯

十棗湯

御纂醫宗金鑑卷三十一

刪補名醫方論卷六

桂枝湯

治風寒在表鮓浮弱自汗出頭痛發熱惡風惡寒鼻鳴乾嘔等證及雜證自汗盜汗虛損虛瘧亦可用若鮓浮緊汗不出者酒客病風寒而汗出者禁用

桂枝三兩　芍藥三兩

生薑三兩　甘草二兩炙

大棗十二枚

右五味以水七升煮取三升服一升覆令微汗不可令如水流漓病必不除若服一升汗出病痊不必盡劑服已更歠稀粥一盞以助藥力

註

凡風寒在表鉅浮弱自汗出者皆屬表虛宜桂枝湯主之名曰桂枝也桂枝湯者君以桂枝辛温辛能散邪温從陽而扶衛芍藥酸寒酸能斂汗寒走陰而益營桂枝君芍藥是於發散中寓斂汗之意芍藥臣桂枝是於固表中有微汗之道焉生薑之辛佐桂枝以解肌表大棗之甘佐芍藥以和營裏甘草甘平有安內攘外之能用以調和中氣即以調和表裏且以調和諸藥矣以桂芍之相須薑棗之相得藉甘草之調和陽表陰裏氣衛血營並行而不悖是剛柔相濟以爲和也而精義在服後須臾歠熱稀粥以助藥力蓋穀氣內充不但易爲釀汗更使已入之邪不能少留將

來之邪不得復入也又妙在温服令一時許
漐漐微微似有汗是授人以微汗之法不可令
如水流漓病必不除禁人以不可過汗之意
也此方爲仲景羣方之冠乃解肌發汗調和
營衛之第一方也凡中風傷寒脈浮弱汗自
出而表不解者皆得而主之其他但見一二
證即是不必悉具故麻葛青龍發汗諸劑咸
用之也若汗不出麻黃證也脈浮緊者麻黃
脈也固不可與桂枝湯然初起無汗當用麻
黃發汗如汗解後復煩脈浮數者與下後脈
仍浮氣上衝者及下後下利止而身痛不休
者皆用此以解外何也蓋此時表雖不解膝
理已疏邪不在皮毛而在肌肉且經汗下津
液已傷故脈證雖同麻黃而主治當屬桂枝
矣粗工妄謂桂枝湯專治中風不治傷寒使
人疑而不用又謂專發肌表不治他病不知
此湯倍芍藥生薑加人參名桂枝新加湯用
以治營表虛寒肢體疼痛倍芍藥加飴糖名

小建中湯用以治裏虛心悸腹中急痛再加黃耆名黃耆建中湯用以治虛損虛熱自汗盜汗因知仲景之方可通治百病也

麻黃湯

治太陽風寒在表頭項强痛發熱身疼腰痛骨節痛惡風寒無汗胸滿而喘其脈浮緊或浮數者用此發汗雖有是證若脈浮而弱汗自出或尺中脈微與遲者俱不可用風寒濕成痺肺經壅塞昏亂不語冷風哮吼最宜

麻黃 三兩 去節　桂枝 二兩

甘草 一兩 炙　杏仁 六十枚 去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取二升半去滓溫服八合溫覆取微汗不須歠粥一服汗出停後服汗出多者溫粉撲之

註

凡風寒在表鉛浮緊數無汗者皆表實也宜麻黃湯主之名曰麻黃湯者君以麻黃也麻黃性溫味辛而苦其用在迅升桂枝性溫味辛而甘其能在固表證屬有餘故主以麻黃必勝之算也監以桂枝制節之妙也杏仁之苦溫佐麻黃逐邪而降逆甘草之甘平佐桂枝和內而拒外飲入於胃行氣於元府輸精於皮毛斯毛鉛合精湊湊汗出在表之邪必盡去而不留痛止喘平寒熱頓解不須歠粥而藉汗於穀也其不用薑棗者以生薑之性橫散於肌礙麻黃之迅升大棗之性泥滯於膈礙杏仁之速降此欲急於直達稍緩則不迅橫散則不升矣然則爲純陽之劑過於發散如單刀直入之將用之若當一戰成功不當則不戢而召禍故可一而不可再如汗後

不解便當以桂枝代之此方爲仲景開表逐邪發汗第一峻藥也庸工不知其制在溫覆取汗若不溫覆取汗則不峻也世謂麻黃專能發表不治他病不知此湯合桂枝湯名麻桂各半湯用以和太陽留連未盡之寒熱去杏仁加石膏合桂枝湯名桂枝二越婢一湯用以解太陽熱多寒少之寒熱若陽盛於內而無汗者又有麻黃杏仁甘草石膏湯以散太陰肺之邪若陰盛於內而無汗者又有麻黃附子細辛甘草湯以溫散少陰腎家之寒金匱要略以此方去桂枝千金方以此方桂枝易桂皆名還魂湯用以治邪在太陰卒中暴厥口噤氣絕下咽奏效而皆不溫覆取汗是知麻黃湯之峻與不峻在溫覆與不溫覆此仲景用方之心法豈常人所能得而窺耶

大青龍湯

治太陽風寒兩傷營衛同病傷寒之脈而見中風之證中風之脈而見傷寒之證二證俱不出汗而煩躁者用此兩解發汗雖有是證若脈微弱自汗出者不可服之服必亡陽

麻黃　六兩　去節
桂枝　二兩
杏仁　四十箇　去皮尖
甘草　二兩　炙
生薑　三兩　切
大棗　十二枚　擘
石膏　如雞子大　碎綿裹

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微汗汗出多者溫粉撲之一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

註何以知風寒兩傷營衛同病以傷寒之脈而見中風之證中風之脈而見傷寒之證也名大青龍湯者取龍興雲雨之義也治風不外乎桂枝治寒不外乎麻黃合桂枝麻黃二湯以成劑故爲兼風寒中傷者主之也二證俱無汗故減芍藥不欲其收也二證俱煩躁故加石膏以解其熱也設無煩躁則又當從事於麻黃桂枝各半湯也仲景於表劑中加大寒辛甘之品則知麻黃證之發熱熱全在表大青龍證之煩躁兼肌裏矣初病太陽卽用石膏者以其辛能解肌熱寒能淸胃火甘能生津液是預保陽明存津液之先着也粗工疑而畏之當用不用必致熱結陽明斑黃狂冒紛然變出矣觀此則可知石膏乃中風傷

寒之要藥得麻桂而有青龍之名得知草而有白虎之號也服後取微汗汗出多者溫粉撲之一服得汗停其後服蓋戒人卽當汗之證亦不可過汗也所以仲景桂枝湯中不用麻黃者是欲其不大發汗也麻黃湯中用桂枝者恐其過汗無制也若不愼守其法汗多亡陽變生諸逆表遂空虛而不任風陰盛格陽而更煩躁不得眠也

小青龍湯

治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者及雜病膚脹水腫證用此發汗而利水

麻黃三兩 去節
芍藥三兩
甘草三兩 炙
五味子半升
乾薑二兩
半夏半升 洗
桂枝三兩
細辛三兩

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升

若渴者去半夏加栝蔞根三兩

若噎者去麻黃加附子一枚炮

若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩

若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

若微利者去麻黃加薑花如雞子熬令赤色

按加薑花如雞子熬令赤色此必傳寫之譌蓋本草薑花卽芫花類也用之攻水其力甚峻五分可令人下行數十次豈有治停飲之微利而用雞子大之薑花者乎當改加茯苓四兩

註太陽停飲有二一中風表虛有汗五苓散證也一傷寒表實無汗小靑龍湯證也表實無汗故合麻桂二方以解外去大棗者以其性泥也去杏仁者以其無喘也有喘者加之去生薑者以有乾薑也若嘔者仍用佐乾薑細辛極溫極散使寒與水俱從汗而解佐半夏逐痰飲以淸不盡之飲佐五味收肺氣以斂

耗傷之氣若渴者去半夏加花粉避燥以生津也若微利與噎小便不利少腹滿俱去麻黃遠表以就裏也加附子以去噎散寒則噎可止加茯苓以利水則微利少腹滿可除矣此方與越婢湯同治水飲溢於表而爲膚脹水腫宜發汗外解者無不隨手而消越婢治有熱者故方中君以石膏以散陽水也小青龍治有寒者故方中佐以薑桂以消陰水也

葛根湯

治太陽陽明兩經合病頭項强痛背亦牽强鉱浮無汗惡風者及表不解下利而嘔者並宜服此發汗

葛根四兩　麻黃二兩去節

桂枝二兩　芍藥二兩

甘草二兩炙　生薑二兩切

大棗十二枚擘

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去

沫內諸藥煮取三升溫服一升覆取微似汗
不須歠粥餘如桂枝法將息及禁忌

註是方也卽桂枝湯加麻黃葛根麻黃佐桂枝
發太陽營衛之汗葛根君桂枝解陽明肌表
之邪不曰桂枝湯加麻黃葛根而以葛根命
名者其意重在陽明以嘔利屬陽明多也二
陽表急非溫服覆而取汗其表未易解也或
嘔或利裏已失和雖歠粥而胃亦不能輸精
於皮毛故不須歠粥也柯琴曰此證身不疼

腰不疼骨節不疼不惡寒是骨不受寒矣頭
項强痛下連於背牽動不寧是筋傷於風矣
不喘不煩躁不乾嘔是裏不病無汗惡風病
只在表若表病而兼下利則是表實裏虛矣
比麻黃青龍二證較輕然項强連背拘强更
甚於項强無汗不失爲表但脈浮不緊故不
從乎麻黃而於桂枝方加麻黃倍葛根以去
實小變麻桂之法也蓋葛根爲陽明主藥凡
太陽有陽明者則佐入太陽藥中凡少陽有

陽明者則佐入少陽藥中無不可也李杲定爲陽明經藥張潔古云未入陽明者不可便服豈二人未讀仲景書乎要知葛根桂枝俱是解肌和裏之藥故有汗無汗下利不下利俱可用與麻黃之專於發表者不同也

金匱治太陽病無汗小便反少氣上衝胷口噤不得語欲作剛痙

集註　喻昌曰傷寒項背八八無汗惡風者用葛根湯此證亦用之者以其邪在太陽陽明兩經之界兩經之熱併於胸中必傷肺金清肅之氣故水道不行小便少津液不布而無汗陽明之筋內結胃口外行胸中過人迎環口熱併陽明斯筋鰓牽引口噤不得語然剛痙無汗必從汗解況濕邪內鬱必以汗出如故而止故用此湯合解兩經之濕熱與風寒之表法無害其同也

桂枝麻黃各半湯

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃各半湯

桂枝一兩六銖　芍藥一兩

麻黃一兩去節　生薑一兩

甘草　一兩　炙
杏仁　二十四箇　去皮尖
右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫
內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

註　太陽病得之八九日有如瘧狀之寒熱熱多寒少者其人不嘔小便清白此裏和不受邪雖爲欲自愈然必審其如瘧狀寒熱一日二三度輕輕而發診其脈微而且緩則知邪衰正復表裏將和始爲欲愈也若脈微不緩正未復也更惡寒者邪未衰也雖不能自愈但已爲前之汗吐下虛其表裏故不可更發汗更吐更下也脈微惡寒表裏俱虛面色當白今色反赤是猶有表邪怫鬱不能得小汗出宣發陽氣故面赤身癢未欲解也宜桂枝麻黃各半湯小小汗之以和營衛自可愈也

桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

桂枝一兩十七銖　芍藥一兩六銖　甘草一兩二銖　生薑一兩六銖　大棗五枚擘　麻黃十六銖去節　杏仁十六箇去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服

註

服桂枝湯大汗出脈洪大不解若煩渴者則表邪已入陽明白虎湯證也今脈雖洪大而不煩渴則爲表邪仍在太陽故與桂枝湯如前法也若脈不洪大壯熱亦減惟寒熱如瘧日再發者雖屬輕邪然終爲微寒所持非汗出必不解也宜桂枝二麻黃一湯小發營衛之汗不用麻黃桂枝各半湯者蓋因已大汗出不欲其發營衛汗欲其和營衛汗也

桂枝二越婢一湯

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可更汗宜桂枝二越婢一湯

桂枝一兩六銖　芍藥一兩

甘草一兩三銖炙　石膏二十四銖

麻黃十六銖　大棗五枚擘

生薑一兩六銖切

右七味以水五升煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服本方

當裁爲越婢湯桂枝湯各飲一升今合爲一方桂枝二越婢一湯

註桂枝二越婢一湯即大青龍以杏仁易芍藥也名雖越婢輔桂枝實則大青龍之變制也去杏仁惡其從陽而辛散用芍藥以其走陰而酸收以此易彼裁而用之則主治不同也以桂枝二主之則不發汗可知越婢一者乃麻黃石膏二物不過取其辛涼之性佐桂枝二中和表而清熱則是寓微汗於不發之中亦可識也非若大青龍以石膏佐麻黃而爲發汗驅熱之重劑也桂枝二麻黃一湯治若形如瘧日再發者汗出必解而無熱多寒少故不用石膏之涼也桂枝麻黃各半湯治如瘧狀熱多寒少而不用石膏更倍麻黃者以其面有怫鬱熱色身有皮膚作癢是知熱不向裏而向表令得小汗以順其勢故亦不用石膏之涼裏也桂枝二越婢一湯治發熱惡寒熱多寒少而用石膏者以其表邪寒少肌

裏熱多故用石膏之涼佐麻桂以和營衛非
發營衛也令人一見麻桂不問輕重亦不問
溫覆不溫覆取汗不取汗總不敢用皆因未
究仲景之旨麻桂祇是營衛之藥若重劑溫
覆取汗則爲發營衛之藥輕劑不溫覆取汗
則爲和營衛之藥也

越婢湯

治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無
大熱者又治裏水一身面目黃腫其脈沉小便
不利故令病水假令小便自利此亡津液故令
渴也越婢加朮湯主之

麻黃六兩　石膏半觔
生薑三兩切　大棗十五枚擘
甘草一兩

惡風加附子一枚炮

右五味以水六升煮麻黃去沫內諸藥煮取三升分三服

集註　喻昌曰越婢湯者示微發表於不發之方也大率取其通調營衛麻黃石膏二物一甘熱一甘寒合而用之脾偏於陰則和以甘熱胃偏於陽則和以甘寒乃至風熱之陽水寒之陰凡不和於中土者悉得用之何也中土不和則水穀不化其精悍之氣以實營衛營衛虛則或寒或熱之氣皆得壅塞其隧道而不通於表裏所以在表之風水用之而在裏之水兼渴而小便自利者咸必用之無非欲其不害中土耳不害中土自足消患於方萌矣趙良曰五藏各一甘寒其陰陽獨脾胃居中而兩屬之故土不獨成四氣土亦從四維而後成不惟火生而已於是四方有水寒之陰即應於脾風熱之陽即應於胃飲食五味之寒熱凡入於脾胃者亦然一有相干則脾氣不和胃氣不清而水穀不化其精微以行營衛以

實陰陽也甘者土之本味所以脾氣不和和以甘熱胃氣不清清以甘寒麻黃之甘熱走手足太陰經連於皮膚行氣於三陰以祛陰寒之邪石膏之甘寒走手足陽明經達於肌肉行氣於三陽以祛風熱之邪既用其味甘以入土用其寒熱以和陰陽用其性善走以發越脾氣更以甘草和中緩急二藥相協而成功大棗之甘補脾中之血生薑之辛益胃中之氣惡風者陽虛故加附子以益陽風水者則加术以散皮膚間風水氣發穀精以宣營衛與麻黃石膏爲使引其入土也越婢之名不亦宜乎

按喻昌所論明析趙良之說能細剖其理開悟後學故兩錄之

麻黃杏仁甘草石膏湯

治溫熱內發表裏俱熱頭痛身疼不惡寒反惡熱無汗而喘大煩大渴脈陰陽俱浮者用此發汗而清火若脈浮弱沉緊沉細惡寒自汗出而不渴者禁用

麻黃四兩去節　杏仁五十枚去皮尖

甘草二兩炙　石膏半觔碎綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

集註　柯琴曰石膏爲清火之重劑青龍白虎皆賴以建功然用之不當適足以召禍故青龍以無汗煩躁得薑桂以宣衛外之陽也白虎以有汗煩渴須粳米以存胃中之液也此但熱無寒故不用薑桂喘不在胃而在肺故不須粳米其意重在存陰不必慮其亡陽也故於麻黃湯去桂枝之監制取麻黃之專開杏仁之降甘草之和倍石膏之大寒除內外之實熱斯湊湊汗出而內外之煩熱與喘悉除矣

麻黃附子細辛湯

治少陰病始得之反發熱脈沉三日無裏證者

麻黃一兩　附子一枚炮

細辛二兩

熱微者以甘草易細辛微發汗

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去沫內藥煮取三升去滓溫服一升日三服

集註　柯琴曰少陰主裏應無表證病發於陰應有

表寒今少陰始受寒邪而反發熱是有少陰之裏而兼有太陽之表也太陽之表鉅應不沉今鉅沉者是有太陽之證而見少陰之鉅也故身雖熱而鉅則沉也所以太陽病而鉅反沉便用四逆以急救其裏此少陰病而表反熱便於表劑中加附子以預固其裏夫發熱無汗太陽之表不得不開沉爲在裏少陰之樞又不得不固設用麻黃開腠理細辛散浮熱而無附子以固元陽則少陰之津液越出太陽之微陽外亡去生便遠惟附子與麻黃並用則寒邪雖散而陽不亡此裏病及表鉅沉而當發汗者與病在表鉅浮而發汗者逕庭也若表微熱則受寒亦輕故以甘草易細辛而微發其汗甘以緩之與辛以散之者又少間矣

桂枝加附子湯

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者此方主之

桂枝湯加附子一枚炮去皮破八片

煎服法同不須歠粥

集註　柯琴曰發汗太過陽無所止息而汗出不止矣汗多亡陽元府不閉風乘虛入故復惡風津液外泄不能潤下故小便難四肢者諸陽之本陽氣者柔則養筋開闔不得風寒從之

故筋急而屈伸不利也是方以附子加入桂枝湯中大補表陽也表陽密則漏汗自止惡風自罷矣汗止津回則小便自利四肢自柔矣汗漏不止與大汗出同而從化變病則異服桂枝麻黃後大汗出而大煩渴是陽陷於裏急當救陰故用白虎加人參湯服桂枝麻黃湯大汗出遂漏不止是陽亡於外急當救陽故用桂枝加附子湯要知發汗之劑用桂枝不當則陽陷於裏者多用麻黃不當則陽亡於外者多因桂枝湯有芍藥而無麻黃故雖汗大出而元府尚能自閉多不致亡陽於外耳

芍藥甘草附子湯

發汗病解反惡寒者虛故也此方主之

芍藥三兩　甘草二兩
附子一枚炮去皮破八片　炙

右三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

集註　柯琴曰發汗病解而反惡寒比未汗時更甚其陽虛可知矣夫太陽少陰爲表裏太陽之病本由少陰之虛不能藏精而爲陽之守也

今惡寒反見於發汗病解後是寒邪已從汗解太陽陽虛不能衛外而爲陰之使也則陽亡之兆已見於此若仍以桂枝湯攻表非以扶陽反以亡陽也故以芍藥收少陰之精氣甘草緩陰邪之上行附子補坎宮之少火但使腎中元陽得位在表之虛陽惡寒自解耳

桂枝甘草湯

治發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者

桂枝四兩　甘草二兩炙

右二味水三升煮取一升頓服

集註　柯琴曰汗出多則心液虛中氣餒故悸叉手自冒心心下悸欲得按則內有所依如此不自冒則外有所衛得按則內有所依如此不堪之狀望之而知其虛矣桂枝本營分藥得麻黃則令營氣外發而爲汗從辛也得芍藥

則收斂營氣而止汗從酸也得甘草則補中氣而養血從甘也故此方以桂枝爲君獨任甘草爲佐以補陽氣生心液甘溫相得斯氣血和而悸自平不須芍藥附子者以汗雖多而未至於陽亡不須芍藥者以汗已止而嫌其陰斂也

桂枝加芍藥加大黃湯

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝加芍藥湯方

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依桂枝湯法

桂枝加大黃湯方

即桂枝加芍藥湯方內更加大黃一兩

集註　柯琴曰腹滿爲太陰陽明俱有之證然位同而職異太陰主出太陰病則腐穢之出不利故滿而時痛陽明主內陽明病則腐穢燥而不行故大實而痛大實痛是陽明病不是太陰病仲景因表證未解陽邪已陷入於太陰故倍芍藥以益脾調中而除腹滿時痛此用陰和陽法也若表邪未解而陽邪陷入於陽明則加大黃以潤胃通結而除其大實痛此雙解表裏法也凡妄下必傷胃氣胃氣虛則陽邪襲陰故轉屬太陰胃液涸則兩陽相搏故轉屬陽明屬太陰則腹滿時痛而不實陰道虛也屬陽明則腹滿大實而痛陽道實也滿而時痛是下利之兆大實而痛是燥屎之徵故倍加芍藥小徵變建中之劑少加大黃微示調胃之方

小建中湯

治傷寒表未解或心悸而煩或腹中急痛而衄陽濇陰弦者

桂枝三兩　芍藥六兩
生薑三兩切　甘草二兩
膠飴一觔　大棗十二枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上火消解日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

註是方也卽桂枝湯倍芍藥加膠飴名曰小建中謂小小建立中氣以中雖已虛表尚未和不敢大補也故以桂枝湯仍和營衛倍芍藥加膠飴調建中州而不在傷寒之表也中虛建其意重在中虛而不歡稀粥溫服令汗蓋立營衛自和津液可生汗出乃解煩悸可除矣傷寒浮得鉅濇營衛不足也沉得鉅弦木入土中也營衛不足則表虛未入土中則裏急表虛裏急故亦以此湯主治也嘔家不可用恐甜助嘔也

炙甘草湯

治傷寒鈹結代心動悸者　又治肺痿咳吐多心中溫溫液液者

甘草四兩炙　生薑三兩切　桂枝三兩　麥門冬半升　麻子仁半升　大棗十二枚擘　人參一兩　阿膠二兩　生地黃一觔

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三

升去滓內膠烊消盡服一升日三服

集註　柯琴曰仲景於衄弱陰弱者用芍藥以益陰陽虛者用桂枝以通陽甚則加人參以生衄未有用地黃麥冬者豈以傷寒之法義重扶陽乎抑陰無驟補之法歟此以心虛衄結代發陳蕃莠之品必得人參桂枝以通陽衄生用生地黃爲君麥冬爲臣峻補眞陰開後學滋陰之路也地黃麥冬味雖甘而氣則寒非薑大棗以和衛營何以得入參桂枝以通陽衄生薑阿膠補血酸棗安神甘草之緩不使速下清酒之猛提於上行內外調和悸可寧而衄可復矣酒七升水八升祇取三升者久煎之則氣不峻此虛家用酒之法且知地黃麥冬得酒最良此證當用酸棗仁肺痿用麻子仁可也如無眞阿膠以龜板膠代之

桂枝人參葛根黃芩黃連二湯合論

太陽外證未解而數下之遂協熱而利利下不止表裏不解鉅微弱心下痞鞕者桂枝人參湯主之

桂枝人參葛根黃連二湯合論

太陽外證未解而數下之遂協熱而利利下不止表裏不解鉅微弱心下痞鞕者桂枝人參湯主之桂枝證醫反下之利遂不止其鉅促喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之

桂枝　四兩　甘草　四兩

人參　三兩　白朮　三兩

乾薑　三兩

水九升先煮四味取五升內桂更煮三升日

再服夜一服

葛根 半觔　黃連 三兩

黃芩 三兩　甘草 二兩炙

水八升先煮葛根減二升內諸藥煮二升分溫再服

集註 柯琴曰外熱不除是表不解下利不止是裏不解病因則同一以微弱之脈而心下痞鞕是裏虛實當從脈而是脈不足而證有餘一以脈促而喘反汗自出是脈有餘而證不足表裏虛實當從脈而辨證矣弱脈見於數下後則痞鞕爲虛故用理中之辛甘溫補止利消痞鞕又加桂枝以解表先煮四味後內桂枝和中之力饒而解肌之氣銳是於兩解中寓權宜法也桂枝證脈本緩誤下後而反促陽氣重可知邪束於表陽擾於內故喘而汗出利遂不止者是暴注下迫屬於熱也故君氣清質輕之葛根以解肌而止利佐苦寒清肅之芩連以止汗而除喘又加甘草以和中先煮葛根後內諸藥

解肌之力緩而清中之氣銳又與補中逐邪者殊法矣又曰上條鮌證是陽虛雖協熱於外而裏則虛寒下條鮌證是陽盛雖下利不止而表裏俱實同一協熱利同是表裏不解而寒熱虛實攻補不同前方理中加桂枝而冠桂枝於人參之上後方瀉心加葛根而冠葛根於芩連之首不名理中瀉心者總爲表未解故耳補中亦能解表涼中亦能散表補中亦能散瘀涼中亦能止利仲景製兩解方神化如此

白虎湯

治陽明證汗出渴欲飲水鮀洪大浮滑不惡寒反惡熱

石膏一觔碎綿裹　知母六兩

甘草二兩　粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

集註　柯琴曰陽明邪從熱化故不惡寒而惡熱熱蒸外越故熱汗自出熱爍胃中故渴欲飲水

邪盛而實故鮓滑然猶在經故兼浮也蓋陽明屬胃外主肌肉雖有大熱而未成實終非苦寒之味所能治也石膏辛寒辛能解肌熱寒能勝胃火寒性沉降辛能走外兩擅內外之能故以爲君知母苦潤苦以瀉火潤以滋燥故以爲臣用甘草粳米調和於中宮且能土中瀉火作甘稼穡寒劑得之緩其寒苦藥得之平其苦使沉降之性皆得留連於味也得二味爲佐庶大寒之品無傷損脾胃之慮也煮湯入胃輸脾歸肺水精四布大煩大渴可除矣白虎爲西方金神取以名湯秋金得令而炎暑自解矣更加人參以補中益氣而生津協和甘草粳米之補承制石膏知母之寒瀉火而土不傷乃操萬全之術者

白虎加人參湯

治太陽中熱汗出惡寒身熱而渴者暍是也

石膏一觔　知母六兩

甘草二兩　粳米六合

人參三兩

右五味以水如前煮服法

集註趙良曰汗出惡寒身熱而不渴者中風也汗出惡寒身熱而渴者中暍也其證相似獨以渴不渴爲辨然傷寒與中風皆有背微惡寒與

時時惡風而渴者亦以白虎人參湯治之蓋爲火爍肺金肺主氣者也肺傷則衛氣虛衛虛則表不足由是汗出身熱惡寒內經曰心移熱於肺傳爲膈膈消膈消則渴皆相火傷肺所致可知其要在救肺也石膏能治三焦火熱功多於清肺退肺中之火故用爲君知母亦就肺中瀉心火滋水之源人參生津益所傷之氣而爲臣粳米甘草補土以資金爲佐也

豬苓湯

治陽明病鮎浮發熱渴欲飲水少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者

豬苓　去皮　茯苓

阿膠　滑石

澤瀉　各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烊消溫服七合日三服

集註　趙羽皇曰仲景製豬苓一湯以行陽明少陰

二經水熱然其旨全在益陰不專利水蓋傷寒表虛最忌亡陽而裏熱又患亡陰亡陰者亡腎中之陰與胃家之津液也故陰虛之人不但大便不可輕動卽小水亦忌下通蓋陰虛過於滲利則津液反致耗竭方中阿膠質膏養陰而滋燥滑石性滑去熱而利水佐以二苓之滲瀉旣疏濁熱而不留其瘀壅亦潤燥是利水而不傷陰之善劑也故太陽利水用五苓者以太陽職司寒水故加桂以溫之是煖腎以行水也陽明少陰之用豬苓以二經兩關津液特用阿膠滑石以潤之是滋養無形以行有形也利水雖同寒溫迥別惟明者知之

五苓散附茵蔯五苓散

治衄浮小便不利熱微消渴者發汗已衄浮數煩渴者中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者

茯苓十八銖　豬苓十八銖

白朮十八銖　澤瀉一兩

桂半兩

右五味爲散以白飲和服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈

註是方也乃太陽邪熱入府水氣不化膀胱表裏藥也一治水逆水入則吐一治消渴水入則消夫膀胱者津液之府氣化則能出矣邪熱入之若水盛則水壅不化而水蓄於上膀胱之氣化不行致小便不利也若熱盛則水爲熱耗而水消於上膀胱之津液告竭致小便不利也水入吐者是水盛於熱也水入消者是熱盛於水也二證皆小便不利故均得五苓而主之然小便利者不可用恐重傷津液也由此可知五苓散非治水熱之專劑乃治水熱小便不利之主方也君澤瀉之鹹寒鹹走水府寒勝熱邪佐二苓之淡滲通調水道下輸膀胱並瀉水熱也用白朮之燥濕健脾助土爲之隄防以制水也用桂之辛溫宣通陽氣蒸化三焦以行水也澤瀉得二苓下降利水之功倍小便利而水不蓄矣白朮須桂上升通陽之效提氣騰津化渴自止也若發熱表不解以桂易桂枝服後多服煖水令汗出

愈是此方不止治停水小便不利之裏而猶解停水發熱之表也加人參名春澤湯其意專在助氣化以生津加茵蔯名茵蔯五苓散治濕熱發黃表裏不實小便不利者無不克也

桂枝湯去芍藥加茯苓白术湯

治服桂枝湯或下之仍頭項强痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去芍藥加茯苓白术湯主之

桂枝去芍藥加茯苓白术湯方

於桂枝湯方內去芍藥加茯苓白术各三兩餘依桂枝湯法煎服小便利則愈

註

服桂枝湯已汗也或下之已下也今仍有頭項强痛翕翕發熱無汗之表心下滿微痛小

便不利停飲之裏無汗表不解心下有水氣
當用小青龍汗之今無汗表不解有水氣心
下滿微痛小便不利而不用小青龍者以其
已經汗下表裏俱虛也故仍用桂枝湯以解
表去芍藥之酸收避無汗心下之滿加茯苓
之燥滲因水停小便不利也餘依桂枝湯法
煎服謂依桂枝湯法取汗也小便利則愈謂
飲病輸水道則愈也此方即桂苓甘朮湯而
有生薑大棗共意專在解肌利水次之故用
生薑大棗佐桂枝以通津液取汗也桂苓甘
朮湯不用生薑大棗而加茯苓其意專在利
水扶陽次之故倍加茯苓君桂枝於利水中
扶陽也故方後不曰依服桂枝湯方也

十棗湯

治太陽中風表解熱熇熇汗出而不惡寒裏有水氣小便不利嘔逆短氣心下至脇痞滿鞕痛者此治水之急方也

大棗十枚擘　甘遂　大戟　芫花熬各等分

右三味各別搗爲散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末强人一錢羸人服半錢平旦溫服若下少病不除者明日

再服加半錢得快下後糜粥自養

集註 柯琴曰仲景治水之方種種不同此其最峻者也凡水氣爲患或喘或欬或悸或嘔或吐或利病在一處而止此則水邪留結於中心腹脇下痞滿鞕痛三焦升降之氣阻隔難通此時表邪已罷非汗散之法所宜裏飲實盛又非淡滲之品所能勝非遐逐水至峻之品以折之則中氣不支束手待斃矣甘遂芫花大戟三味皆辛苦氣寒而稟性最毒併舉而用之氣味相濟相須故可夾攻水邪之巢穴決其瀆而大下之一舉而患可平也然邪之所湊其氣必虛以毒藥攻邪必傷及脾胃使無冲和甘緩之品爲主宰則邪氣盡而大命亦隨之矣然此藥最毒參朮所不能君甘草又與之相反故選十棗之大而肥者以君之一以顧其脾胃一以緩其峻毒得快利後糜粥自養一以使穀氣內充一以使邪不復作此仲景用毒攻病之法盡美又盡善也昧者

惑於甘能中滿之說而不敢用豈知承制之理乎

御纂醫宗金鑑刪補名醫方論

卷三十二

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

No. 33

ChL 7918.7638

大承氣湯起至茵蔯蒿湯止

計二十五方



二十三卷

33

刪補名醫方論卷七目錄

大承氣湯
小承氣湯
調胃承氣湯
更衣丸
麻仁丸
桃仁承氣湯
抵當湯丸

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

梔子豉湯
梔子豉加甘草湯
梔子豉加生薑湯
梔子厚朴湯
梔子乾薑湯
瓜蒂散
小陷胸湯
大陷胸湯丸
三物白散

大黃黃連瀉心湯
附子瀉心湯
甘草瀉心湯
生薑瀉心湯
半夏瀉心湯
旋覆代赭石湯
麻黃連軺赤小豆湯
梔子蘗皮湯
茵蔯蒿湯

御纂醫宗金鑑卷三十二

刪補名醫方論卷七

大承氣湯

治陽明病潮熱手足濈然汗出譫語汗出多門燥獨語如見鬼狀喘昌不能臥腹滿痛脈滑實又目中不了了睛不和又少陰病初得之口燥咽乾者自利清水色純青心下痛口燥舌乾者六七日腹脹不大便者

大黃四兩酒洗　厚朴半觔

枳實五枚炙　芒消三合

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃煮取二升去滓內芒消再上火微煮一二沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯

大黃四兩　厚朴二兩炙去皮

枳實三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服初服湯當大便不爾再服以利爲度得便卽止服

集註　柯琴曰諸病皆因於氣穢物之不去由於氣之不順也故攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯方分大小者有二義焉厚朴倍大黃是氣藥爲君名大承氣大黃倍厚朴是氣藥爲臣名小承氣味多性猛制大其服欲令大泄下也因名曰大味寡性緩制小其服欲微和胃氣也因名曰小且煎法更有妙義大承氣用水一斗煮枳朴取五升去滓內大黃

再煮取二升內芒消何哉蓋生者氣銳而先行熟者氣純而和緩仲景欲使芒消先化燥屎大黃繼通地道而後枳朴除其痞滿若小承氣以三味同煎不分次第同一大黃而煎法不同此可見仲景微和之意也

喻昌曰金匱治痙爲病胸滿口噤臥不着席脚攣急必齘齒可與大承氣湯乃死中求生之法也靈樞謂熱而痙者死腰折瘈瘲齒齘也茲所云臥不着席卽腰折之變文脚攣急卽瘈瘲齘齒加以胸滿口禁上中下三焦熱邪充斥死不旋踵矣在傷寒證腹滿可下胸滿則不可下然投是湯者須知所謂胸滿謂其邪尚在表故不可下此證入裏之熱極深極重匪可比倫況陽熱深極陰血立至消亡卽小小下之尚不足以勝其陽救其陰故取此湯以承領其一綫之陰氣陰氣不盡爲陽熱所刮因而得生者多矣可與二字甚活臨證酌而用之初非定法也既有下

之重傷其陰之大戒復有下之急救其陰之活法學者欲爲深造端在此矣

調胃承氣湯

治表解有汗裏熱不除胃因不和而不作解者

大黃 四兩 酒洗　甘草 二兩 炙

芒消 半觔

右三味以水三升先煮二味取一升去滓內芒消微煮令沸少少溫服之

註　三承氣湯之立名而曰大者制大其服欲急下其邪也曰小者制小其服欲緩下其邪也曰調胃者則有調和承順胃氣之義非若大小

專攻下也經曰熱淫於內治以鹹寒火淫於內治以苦寒君大黃之苦寒臣芒消之鹹寒二味並舉攻熱瀉火之力備矣更佐甘草之緩調停於大黃芒消之間又少少溫服之使共力不峻則不能速下而和也

更衣丸

治津液不足腸胃乾燥大便不通

硃砂五錢研如飛麵　蘆薈七錢研細生用

集註柯琴曰胃爲後天之本不及固病太過亦病滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒下

胃家實仲景製三承氣湯以下之三陽燥結然太過復有陽盛陰虛之別焉兩陽合明而而津液亡前賢又製更衣丸以潤之古人入厠必更衣故以此命名也硃砂以汞爲體性

寒重墜下達蘆薈以液爲質味苦膏潤下滋兼以大寒大苦之性味能潤燥結從上導下而胃關開矣合以爲丸兩者相須得效最宏奏功甚捷誠匪夷所思矣

麻仁丸　又名脾約丸

治腸胃燥熱大便秘結小便數多

麻子　二升　芍藥　半斛
枳實　半斛　大黃　一斛去皮
厚朴　一斛去皮　杏仁　一升去皮煎熬碾脂

集註　成無已曰約者約結之約又約束也經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸

於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并
行今胃强脾弱約束津液不得四布但輸膀
胱小便數而大便鞕故曰脾約麻仁甘平而
潤杏仁甘溫而潤經曰脾欲緩急食甘以緩
之本草曰潤可去燥是以麻仁爲君杏仁爲
臣枳實破結厚朴滌滿故以爲佐芍藥調中
大黃通下故以爲使

朱震亨曰既云脾約血枯火燔津竭理宜滋
陰降火津液自生何秘之有此方惟熱甚而
禀實者可用熱微而虛者愈致燥涸之苦矣

桃仁承氣湯

治血結胸中手不可近或中焦畜血寒熱胸滿
漱水不欲嚥善忘昏迷如狂者此方治敗血留
經通月事

桃仁五十個去皮尖　桂枝三兩
大黃四兩　芒消二兩
甘草二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消
更上火微沸下火先食溫服五合日三服當

微利

抵當湯並丸

治傷寒畜血併治癥瘕追蟲攻毒甚佳

水蛭三十個　熬　蝱蟲三十個　熬去頭足

大黃三兩　桃仁三十個　去皮尖

右四味爲散以水五升煮三升去滓溫服一升不下再服利爲度

水蛭二十個　熬　蝱蟲二十五個　熬去翅

桃仁二十個　去皮尖　大黃三兩

右四味杵分爲四丸以水一升煮一丸取七合服晬時當下血若不下更服

集註　柯琴曰膀胱爲水府血本無所容畜者也少腹者膀胱之室也熱結鞕滿當小便不利而反利者是病不在膀胱內而在少腹內也可知其隨經之營血因瘀熱而結於少腹之裏而非膀胱之裏也故小便雖利而鞕滿急結畜血仍瘀於少腹也熱淫於內神魂不安故發狂血瘀不行則營不運故鉅微而沉營不

運則氣不宣故沉而結也營氣不周於身則身黃消穀善饑者胃火熾盛也大便反易者血之濡也色黑者畜血滲入也善忘者血不榮智不明也此皆痰血之徵兆非至峻之劑不足以抵其巢穴而當此重任故立抵當湯蛭蟲之善飲血者而利於水蛭蟲之善吮血者而猛於陸並取水陸之善取血者以攻之同氣相求更佐桃仁之苦甘推陳致新大黃之苦寒蕩滌邪熱故名抵當也若熱雖盛而未狂少腹滿而未鞕宜小其制爲丸以緩治之若外證已解少腹急結其人如狂是轉屬陽明用調胃承氣加桃仁桂枝之行血者於其中以微利之胃和則愈矣此桃仁承氣爲治之緩也

梔子豉湯　附加減諸湯

治陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重煩躁心中憒憒怵惕懊憹目疼鼻乾不得臥

梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服

若少氣者加甘草二兩

若嘔者加生薑三兩

若下後心煩腹滿起臥不安者去香豉加厚朴四兩枳實四枚

若醫以丸藥下之身熱不去心中結痛去香豉加乾薑二兩

若身熱發黃者去香豉加甘草一兩黃蘗二兩

集註柯琴曰太陽以心腹爲裏陽明以心腹爲表蓋陽明之裏是胃實不特發熱惡熱目痛鼻乾汗出身重謂之表一切虛煩虛熱咽燥口苦舌胎腹滿煩躁不得臥消渴而小便不利凡在胃之外者悉是陽明之表也仲景製汗劑是開太陽表邪之出路製吐劑是引陽明表邪之出路製吐劑是引陽明之表宜汗不宜吐陽明之表當汗而反吐之便見自汗出不惡寒饑不能食朝食暮吐欲食冷食不欲近衣等證此太陽轉屬陽明之表法當梔子豉湯吐之陽明當吐而不吐反行

汗下溫鍼等法以致心中憒憒怵惕懊憹煩躁舌胎等證然仍在陽明之表仍當梔子豉湯主之梔子苦能涌泄寒能勝熱其形象心又赤色通心故主治心中上下一切證且形象腎又黑色入腎製而爲豉輕浮上行能使心腹之濁邪上出於口一吐而心腹得舒表裏之煩熱悉解矣所以然者急除胃外之熱不致胃家之實卽此梔豉湯爲陽明解表之聖劑矣熱傷氣者少氣加甘草以益氣虛熱相搏者多嘔加生薑以散邪若下後而心腹滿起臥不安是熱已入胃便不當吐故去香豉屎未燥鞕不宜復下故祛用梔子以除煩解也心中結痛知寒留於中也表熱裏寒故任梔子之苦以除熱倍乾薑之辛以逐寒而表熱自解裏寒自除然非吐不能達表故用此以探吐之此又寒熱並用爲和中解表之

劑矣內外熱熾肌肉發黃必須苦甘之劑以
調之蘗皮甘草色黃而潤助梔子以除內煩
而解外熱形色之病仍假形色以通之此皆
用梔豉加減以禦陽明表證之變幻也夫梔
子之性能屈曲下行不是上涌之劑惟豉之
腐氣上蒸心肺能令人吐耳觀瓜蒂散必用
豉汁和服是吐在豉而不在梔也梔子乾薑
湯去豉用薑是取其橫開梔子厚朴湯以枳
朴易豉是取其下泄似皆不欲上越之義雖
苦亦能作涌然非探吐不能吐也病人舊微
溏者不可與則梔子之性自明矣

瓜蒂散

治胸中痞鞕痰飲一切實邪及氣衝咽不得息者用此吐之

瓜蒂一分熬黃　赤小豆一分

右二味各別搗篩爲散已合治之取一錢匕以香豉一合熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加服得快吐乃止

註　胸中者清陽之府諸邪入胸皆阻陽氣不得

宣達以致胸滿痞鞕熱氣上衝燥渴心煩嘔噁欲吐鈹數促者熱鬱結也胸滿痞鞕氣上衝咽喉不得息手足寒冷欲吐不能吐鈹遲緊者寒鬱結也凡胸中寒熱與氣與飲鬱結爲病諒非汗下之法所能治必得酸苦湧瀉之品因而越之上焦得通陽氣得復痞鞕可消胸中可和也瓜蒂極苦赤豆味酸相須相益能除胸胃中實邪爲吐劑中第一品也而佐香豉粥汁合服者藉穀氣以保胃氣也服之不吐少少加服得快吐而卽止者恐傷胃中元氣也此方奏功之捷勝於汗下所以三法鼎立令人不知岐伯仲景之精義置之不用可勝惜哉

小陷胸湯

治心下痞按之則痛脈浮滑者

黃連一兩　半夏半升

栝蔞實一個大者

右三味以水六升先煮栝蔞實取三升去滓內諸藥煮取二升分溫三服

集註程知曰此熱結未深者在心下不似大結胸之高在上按之痛比手不可近爲輕脈之浮滑又緩於沉緊但痰飲素盛挾熱邪而內

結所以脈見浮滑也以半夏之辛散之黃連之苦瀉之栝蔞之苦潤滌之皆所以除熱散結於胸中也先煮栝蔞分溫三服皆以緩治上之法

程應旄曰黃連滌熱半夏導飲栝蔞潤燥合之以開結氣亦名曰陷胸者攻雖不峻而一皆直瀉其胸裏之實邪亦從此奪矣

大陷胸湯丸

主治傷寒發熱不發汗而反下之表熱乘虛入於胸中與不得爲汗之水氣結而不散令心下至少腹鞕滿而痛不可近其人身無大熱但頭汗出或潮熱燥渴脈沉緊者如水腫腸澼初起形氣俱實者亦可用

大黃六兩　芒消

苦葶藶子　杏仁　各半升

甘遂一錢　去皮

爲末

右五味以水先煮大黃杏蘆去滓內芒消煮一二沸內甘遂末溫服得快利止後服如未劇者加白蜜二合作丸如彈子大水煮一丸服過宿乃下如不下更服

集註　柯琴曰胸中者宗氣之所出故名氣海氣爲陽故屬太陽之部氣爲水母氣淸則水精四布氣熱則水濁而壅結矣水結於胸則津液不下無以潤腸胃故大便必燥不下輸膀胱故水道不通大黃芒消善滌腸胃之熱實此病在胸中而亦用以爲君者熱淫於內當治以苦寒且以潤腸胃之燥是實則瀉子之法補膀胱之寒亦制之以其所畏也任甘遂之苦辛所以直攻其水結然水結因於氣結必佐杏仁之苦溫以開其水中之氣氣行而水自利矣水結又因於氣熱必佐葶藶之大寒以淸其氣分之熱源淸而流自潔矣若胸中水結而未及中焦者當小其制而復以白蜜之甘以緩之使留戀於胸中過宿乃下但解

胸心之結滯而保腸胃之無傷是又以攻劑爲和劑也是方爲利水攻積之劑故治水腫痢疾之初起者甚捷然必視其人壯實可以一戰成功如平昔素虛弱與病久而不任攻伐者當念虛虛之戒矣

三物白散方

治傷寒寒實結胸無熱證者及胸膈寒實痰水內結等證

桔梗三分　貝母三分

巴豆一分去皮熬黑研如泥

右杵二味爲末內巴豆於臼中杵之以白飲和合服强人一錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一盃利過不止進冷粥一盃

註　是方治寒實痰水結胸極峻之藥也君以巴豆極辛極烈攻寒逐水斬關奪門所到之處無不破也佐以貝母開胸之結使以桔梗爲之舟楫載巴豆搜逐胸邪膈上者必吐膈下者必利使其邪悉盡無餘矣然惟知任毒以攻邪不量强羸鮮能善其後也故羸者減之不利進熱粥利過進冷粥蓋巴豆性熱得熱則行得冷則止不用水而用粥者藉穀氣以保胃也

大黃黃連瀉心湯

治傷寒表解心下痞按之不軟其脈關上浮者

大黃二兩　黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分温再服

註　痞鞕虛邪而用大黃黃連能不起後人之疑耶仲景使人疑處正是妙處蓋因後人未嘗細玩不得其法皆煎而服之大悖其旨矣觀乎用氣薄之麻沸湯漬大黃黃連須臾去滓

僅得其無形之氣不重其有形之味是取其氣味俱薄不大瀉下雖曰攻痞而攻之妙義無窮也

附子瀉心湯

治傷寒表解心下痞惡寒汗出者

大黃二兩　黃連一兩

黃芩一兩　附子一枚炮去皮別煮汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

註　心下鞕痛結胸也鞕而不痛心下痞也惡寒而復汗出非表不解乃表陽虛也故以大黃黃連黃芩瀉痞之熱附子溫表之陽合內外

而治之其妙在以麻沸湯漬三黃須臾絞去滓內別煮附子汁義在瀉痞之意輕扶陽之意重也

甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也

甘草 四兩　黃芩 三兩

黃連 一兩　乾薑 三兩

半夏 半升洗　大棗 十二枚擘

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

註　毋論傷寒中風表未解總不可下醫反下之因而成痞其人下利日數十行水穀不化腹中雷鳴者誤下胃中空虛也心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安者乘虛客邪上逆也醫見心下痞鞕謂下之不盡又復下之其痞益甚但此非結熱之痞亦非寒結之痞乃乘胃空虛客氣上逆陽陷陰凝之痞也方以甘草命名者取和緩之意用甘草大棗之甘溫補中緩急治痞之益甚半夏之辛破客逆之上從芩連瀉陽陷之痞熱乾薑散陰凝之痞寒緩急破逆瀉痞寒熱備乎其治矣

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭胁下有水氣腹中雷鳴下利者

甘草二兩炙　人參三兩　半夏半升洗　乾薑一兩　半　黃芩三兩　黃連一兩

生薑四兩切　大棗十二枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

註　傷寒汗出之後餘邪轉屬陽明心下痞滿鞕痛不大便者此其人胃素燥熱因而成實攻之可也今其人平素胃虛兼脇下有水氣卽不誤下餘熱乘虛入裏結成痞鞕不痛胃虛不能消化水穀則乾噫食臭也胃中寒熱不和則腹中雷鳴下利也名生薑瀉心湯者其義重在散水氣之痞也生薑半夏散脇下之水氣人參大棗補中州之土虛乾薑甘草以溫裏寒黃芩黃連以瀉痞熱備乎虛水寒熱之治胃中不和下利之痞未有不愈者也

半夏瀉心湯

治傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之但滿不痛心下痞者

半夏半升洗　黃芩二兩　乾薑三兩　人參三兩　甘草三兩炙　黃連一兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

集註　王又原曰傷寒五六日柴胡證具而以他藥下之成痞即用小柴胡湯以乾薑易生薑以黃連易柴胡彼以和表裏此以徹上下而必推半夏爲君者痞從嘔得來半夏之辛以破結而止嘔也

旋覆代赭石湯

治汗吐下解之後心下痞鞕噫氣不除

旋覆花三兩　人參二兩

代赭石一兩　半夏半升洗

生薑五兩切　甘草三兩炙

大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

集註　羅謙輔曰汗吐下解後邪雖去而胃氣已虧

矣胃氣既虧三焦因之失職清無所歸而不
升濁無所納而不降是以邪氣留滯伏飲爲
逆故心下痞鞕噫氣不除方中以人參甘草
養正補虛薑棗和脾養胃所以安定中州者
至矣更以代赭石之重使之斂浮鎮逆旋覆
花之辛用以宣氣滌飲佐人參以歸氣於下
佐半夏以蠲飲於上濁降痞鞕可消清升噫
氣自除觀仲景治少陰水氣上凌用眞武湯
鎮之治下焦滑脫不守用赤石脂禹餘糧固

之此胃虛氣失升降復用此法理之則胸中
轉否爲泰其爲歸元固下之法各極其妙如
此

麻黃連軺赤小豆湯

治傷寒表不解瘀熱在裏發黃者

麻黃二兩　赤小豆一升

杏仁四十枚去皮尖　生薑一兩切

大棗十二枚擘　甘草一兩炙

生梓白皮一升　連軺二兩

以上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日則盡

註　濕熱發黃無表裏證熱盛者清之小便不利

者利之裏實者下之表實者汗之皆無非爲病求去路也用麻黃湯以開其表使黃從外而散去桂枝者避其濕熱也佐薑棗者和其營衛也加連軺梓皮以瀉其熱赤小豆以利其濕同成表實發黃之效也連軺卽連翹根無梓皮以茵蔯代之成無已曰煎以潦水者取其味薄不助濕熱也

梔子蘗皮湯

治傷寒身黃發熱無表裏證者

梔子十五枚　擘　甘草一兩

黃蘗一兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

註　傷寒身黃發熱者若有無汗之表以麻黃連軺赤小豆湯汗之若有成實之裏以茵蔯蒿

湯下之今外無可汗表證內無可下裏證惟

有黃熱宜以梔子蘗皮湯清之可也此方之甘草當是茵蔯傳寫之誤也

茵蔯蒿湯

陽明病發熱但頭汗出身無汗小便不利渴飲水漿此爲瘀熱在裏身必發黃腹微滿者本方主之

茵蔯蒿六兩　梔子十四枚擘

大黃二兩

右三味以水二斗先煮茵蔯減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

集註柯琴曰太陽陽明俱有發黃證但頭汗出而身無汗則熱不外越小便不利則熱不下泄故瘀熱在裏然裏有不同肌肉是太陽之裏當汗而發之故用麻黃連翹赤小豆湯爲凉散法心胸是太陽陽明之裏當寒以勝之用梔子蘗皮湯乃清火法腸胃是陽明之裏當瀉之於內故立本方是逐穢法茵蔯蒿北方之氣經冬不凋傲霜凌雪偏受大寒之氣故能除熱邪留結率梔子以通水源大黃以調胃實令一身內外瘀熱悉從小便而出股滿自減腸胃無傷乃合引而竭之之法此陽明利水之聖劑也又曰仲景治陽明渴飲有四法本太陽轉屬者五苓散微發汗以散水氣大煩燥渴小便自利者白虎加參清火而生津鮎浮發熱小便不利者豬苓湯滋陰而利水小便不利腹滿者茵蔯蒿湯以泄滿令黃從小便出病情治法胸有成竹矣每思仲景利小便必用氣化之品通大便必用承氣之

品故小便不利者必加茯苓甚者兼用豬苓因二苓爲氣化之品而小便由於氣化也茲小便不利不用二苓者何本論云陽明病汗出多而渴者不可與豬苓湯以汗多胃中燥故也斯知陽明病汗出多豬苓湯復利小便故以推陳致新之茵蔯佐以屈曲下行之梔子不用枳朮以承氣與芒消之峻利則大黃但可以潤胃燥而大便之不遽行可知故必一宿而腹始減黃從小便去而不由大腸去仲景立法神奇匪夷所思耳

御纂醫宗金鑑刪補名醫方論

卷三十三

小柴胡湯起至白頭翁湯止

計二十方

三十三卷

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
34 OCT 11 1932

ChL 7918.7638

34

御纂醫宗金鑑卷三十三

刪補名醫方論卷八目錄

小柴胡湯
大柴胡湯
柴胡桂枝湯
黃芩湯
黃連湯
黃連阿膠湯
理中湯丸

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

乾薑附子湯
茯苓四逆湯
附子湯
四逆湯
通脈四逆湯
白通湯
白通加豬膽汁湯
眞武湯
當歸四逆湯
當歸四逆加吳茱萸生薑湯
吳茱萸湯
烏梅丸
赤石脂禹餘糧湯
白頭翁湯

御纂醫宗金鑑卷三十三

刪補名醫方論卷八

小柴胡湯

治傷寒五六日寒熱往來胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔口苦耳聾鈹弦數者此是少陽經半表半裏之證宜此湯以和解之

柴胡半觔　黃芩三兩

人參三兩　半夏半升

甘草三兩　生薑三兩

炙　切

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

若胸中煩而不嘔去半夏人參栝蔞根

若渴者去半夏加人參栝蔞實

若腹中痛去黃芩加芍藥

若脇下痞鞕去大棗加牡蠣

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓

若不渴外有微熱者去人參加桂枝溫覆取微似汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子乾薑

集註程應旄曰方以小柴胡名者取配乎少陽之義也至於制方之旨及加減法則所云上焦得通津液得下胃氣因和盡之矣何則少陽鈹循脇肋在腹陽背陰兩岐間在表之邪欲入裏爲裏氣所拒故寒往而熱來表裏相拒而留於岐分故胸脇苦滿神識以拒而昏困故嘿嘿木受邪則妨土故不欲食膽爲陽木

而居清道爲邪所鬱火無從泄逼炎心分故
心煩清氣鬱而濁則成痰滯故喜嘔嘔則木
火兩舒故喜之也此則少陽定有之證其餘
或之云者以少陽在人身爲遊部凡表裏經
絡之罅皆能隨其虛而見之不定之邪也據
證俱是太陽經中所有者特以五六日上見
故屬之少陽半表半裏兼而有之方是小柴
胡證方中以柴胡疏木使半表之邪得從外
宣黃芩清火使半裏之邪得從內徹半夏豁

痰飲降裏氣之逆人參補久虛助生發之氣
甘草佐柴芩調和內外薑棗佐參夏通達營
衛相須相濟使邪無內向而外解也至若煩
而不嘔者火成燥實而逼胸故去人參半夏
加栝蔞實也渴者燥已耗液而逼肺故去半
夏加栝蔞根也腹中痛木氣散入土中胃陽
受困故去黃芩以安土加白芍以戢木也脇
下痞鞕者邪既留則木氣實故去大棗之甘
而泥加牡蠣之鹹而耎也心下悸小便不利

者水邪侵乎心矣故去黃芩之苦而伐加茯苓之淡而滲也不渴身有微熱者半表之寒尚滯於肌故去人參加桂枝以解之也欬者半表之寒湊入於肺故去參棗加五味子易生薑爲乾薑以溫之雖肺寒不減黃芩恐乾薑助熱也總之邪在少陽是表寒裏熱兩鬱不得升之故小柴胡之治所謂升降浮沉則順之也

大柴胡湯

治熱結在內心下急嘔不止鬱鬱微煩柴胡證仍在者與大柴胡湯下之

柴胡 半斛　黃芩 三兩
半夏 半升　芍藥 三兩
枳實 四枚　大黃 二兩
生薑 五兩　大棗 十二枚擘

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

註　柴胡證在又復有裏故立少陽兩解法也以小柴胡湯加枳實芍藥者仍解其外以和其內也去參草者以裏不虛少加大黃以瀉結熱倍生薑者因嘔不止也斯方也柴胡得生薑之倍解半表之功捷枳芍得大黃之少攻半裏之效徐雖云下之亦下中之和劑也

大柴胡湯

柴胡桂枝湯

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結此太陽少陽併病也柴胡桂枝湯主之

柴胡	四兩	
人參	一兩 半	
半夏	二合半洗	
芍藥	一兩 半	
生薑	一兩半切	
桂枝	一兩 半	
甘草	一兩	
黃芩	一兩 半	
大棗	六枚擘	

右九味以水七升煮取三升去滓分溫服

集註　柯琴曰仲景書中最重柴桂二方以桂枝解太陽肌表又可以調諸經之肌表小柴胡解少陽半表亦可以和三陽之半表故於六經病外獨有桂枝證柴胡證之稱見二方之任重不拘於經也如陽浮陰弱條是仲景自爲桂枝證之註釋桂枝有壞病柴胡亦有壞病桂枝有疑似證柴胡亦有疑似證病如桂枝證而實非若脚攣急與胸中痞鞕者是已病如柴胡證而實非本渴而飲水嘔食穀嘔與但欲嘔胸中痛微溏者是已此條爲傷寒六七日正寒熱當退之時反見發熱惡寒諸表證更見心下支結諸裏證表裏不解法當表裏雙解之然惡寒微發熱亦微可知肢節煩疼則一身骨節不疼可知微嘔心下亦微結故謂之支結表證雖不去而已輕裏證雖已見而未甚故取桂枝之半以散太陽未盡之邪取柴胡之半以解少陽微結之證口不渴身

有微熱者法當去人參以六七日來邪雖未解而正已虛故仍用之外證雖在而病機已見於裏故方以柴胡冠桂枝之上爲雙解兩陽之輕劑也

黃芩湯

治太陽少陽合病自下利者若嘔者加半夏生薑

黃芩　甘草　芍藥各三兩　大棗十二枚擘　生薑三兩

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

嘔者加半夏生薑三兩

集註　程應旄曰此之合病者頭痛胸滿口苦咽乾

目眩或往來寒熱或衄大而弦半表之邪不
待太陽傳遞而卽合少陽裏氣失守所以下
利陽熱漸盛所以上嘔故用黃芩湯淸熱益
陰半裏淸而半表自解矣

柯琴曰太陽少陽合病是熱邪已入少陽之
裏膽火下攻於脾故自下利上逆於胃故兼
嘔也與黃芩湯酸苦相濟調中以存陰也熱
不在半表故不用柴胡今熱已入半裏故黃
芩主之雖非胃實亦非胃虛故不須人參以
補中兼嘔者故仍加半夏生薑以降逆也

黃連湯

治傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者

黃連三兩　乾薑三兩

甘草三兩　人參二兩

桂枝三兩　半夏半升

大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

集註　程應旄曰熱在胸中有煩躁鬱悶之證可知胃中反有邪氣以寒邪被格在下故也此證大寒熱俱有較之大青龍之寒熱已向近裏一層故其證不見之表裏際而祇見之上下際腹中痛者陰邪在胃而寒乃獨治於下也欲嘔吐者陽邪在胸而熱乃獨治於上也此爲上下相格治法亦寒熱並施而辛寒易以苦寒辛熱加以苦熱更以人參半夏以補宣中氣升降陰陽自此條而互及瀉心諸湯皆其法也

成無己曰濕家下後舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒是邪氣入裏而爲下熱上寒也

此傷寒傳裏而爲下寒上熱也

喻昌曰陰陽悖逆皆當和解法

黃連阿膠湯

治少陰病得之二三日以上心中煩不得臥

黃連四兩　黃芩一兩

芍藥二兩　雞子黃二枚

阿膠三兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

集註　柯琴曰此少陰病之瀉心湯也凡瀉心必藉

連芩而導引有陰陽之別病在三陽胃中不和而心下痞鞕者虛則加參甘補之實則加大黃下之病在少陰而心中煩不得臥者既不得用參甘以助陽亦不得用大黃以傷胃矣用芩連以直折心火用阿膠以補腎陰雞子黃佐芩連於瀉心中補心血芍藥佐阿膠於補陰中斂陰氣斯則心腎交合水升火降是以扶陰瀉陽之方變而爲滋陰和陽之劑也是則少陰之火各歸其部心中之煩不得臥可除矣經曰陰平陽祕精神乃治斯方之謂歟

理中湯丸

治中氣不運腹中不實口失滋味病久不食藏府不調與傷寒直中太陰自利不渴寒多而嘔等證

人參三兩　白朮三兩

甘草三兩　乾薑三兩

右四味搗篩爲末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四枚夜二枚腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四

物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服
一升日三服
若臍上築者腎氣動也去术加桂四兩
多吐者去术加生薑三兩
下多者還用术
渴欲得水者加术足前成四兩半
腹中痛者加人參足前成四兩半
寒者加乾薑足前成四兩半

腹滿者去术加附子一枚服湯後如食頃飲
熱粥一升許微自溫勿發衣被

集註程應旄曰陽之動始於溫溫氣得而穀精運
穀氣升而中氣贍故名曰理中實以燬理之
功予中焦之陽也若胃陽虛則中氣失宰膻
中無發宣之用六府無灑陳之功猶如釜薪
失焰故下致清穀上失滋味五藏凌奪諸證
所由來也參术炙草所以守中州乾薑辛以
溫中必假之以焰釜薪而騰陽氣是以穀入

於陰長氣於陽上輸華蓋下攝州都五藏六
府皆以受氣此理中之旨也若水寒互勝即
當脾腎雙溫加以附子則命門益土母溫矣
白朮補脾得人參則壅氣故臍下動氣吐多
腹滿者去朮也加桂以伐腎邪加生薑以止
嘔也加附子以消陰也下多者濕勝也還用
朮燥濕也渴欲飲水飲渴也加朮使飲化津
生也心下悸停水也加茯苓導水也腹中痛
倍人參虛痛也寒者加乾薑寒甚也

乾薑附子湯

下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔
不渴無表證脈沉微身無大熱者乾薑附子湯
主之

乾薑一兩　附子一枚去皮生用破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

茯苓四逆湯

傷寒厥而心下悸發汗若下之病仍不解煩躁
者茯苓四逆湯主之

茯苓 六兩　人參 一兩

甘草 一兩炙　乾薑 一兩

附子 一枚生用破八片

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

註 凡太陽病治不如法汗後復下或下後復汗誤而又誤變成壞病若其人陽盛而從熱化則轉屬三陽陽衰而從寒化則繫在三陰此二湯所治之煩躁皆壞病也煩躁雖六經俱有而多見於太陽少陰為太陽少陰者太陽為真陰之標少陰為真陽之本也未經汗下而煩躁多屬陽其脈實大其證渴熱是煩為陽盛躁為陰虛已經汗下而煩躁多屬陰其脈沉微其證汗厥是煩為陽虛躁為陰極也夫先下後汗於法為逆外無大熱內不渴嘔似乎陰陽自和而實妄汗亡陽所以虛陽擾亂於陽分故晝日煩躁不得眠盛陰偏安於陰分故夜而安靜脈沉微是真陽將脫而煩躁也用乾薑

附子壯陽以配陰薑附者陽中陽也生用則力更銳不加甘草則勢更猛是方比四逆爲峻救其相離故當急也先汗後下於法雖順若病不解厥悸仍然驟增晝夜煩躁似乎陰盛格陽而實腎上凌心皆因水不安其位挾陰邪而上乘是陽虛有水氣之煩躁也用茯苓君四逆抑陰以伐水人參佐四逆生氣而益陽參苓君子也兼調以甘草比四逆爲緩陰陽不急故當緩也一去甘草一加參苓而緩急自別仲景用方之妙如此

附子湯

治少陰病身痛手足寒骨節痛尸中和背惡寒

脈沉者

附子 二枚生用去皮破八片　茯苓 三兩

芍藥 三兩　人參 二兩　白朮 四兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升

日三服

註　少陰爲寒水之藏故傷寒之重者多入少陰

所以少陰一經最多死證方中君附子二枚者取其力之銳且以重其任也生用者一以壯少火之陽一以散中外之寒則惡寒自止身痛自除手足自温矣所以固生氣之原令五藏六府有本十二經絡有根絡自不沉骨節可和矣更佐白朮以培土芍藥以平木茯苓以伐水水伐火自旺旺則陰翳消木平土益安安則水有制制則生化此萬全之術其畏而不敢用束手待斃者曷可勝計耶

四逆湯

治絡脈沉厥逆等證

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服

强人可大附子一枚乾薑三兩

註　方名四逆者主治少陰中外皆寒四肢厥逆也君以炙草之甘温温養陽氣臣以薑附之

辛溫助陽勝寒甘草得薑附鼓腎陽溫中寒有水中煖土之功薑附得甘草通關節走四肢有逐陰回陽之力腎陽鼓寒陰消則陽氣外達而厥升手足溫矣

通厥四逆湯

治少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆厥微欲絶身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止厥不出者厥陰下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主之

乾薑三兩强人可四兩　甘草二兩炙　附子大者一枚生用去皮

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服其厥即出者愈

面色赤者加葱九莖
腹中痛者去葱加芍藥二兩
嘔者加生薑二兩
咽痛去芍藥加桔梗一兩
利止鯁不出者加人參二兩

註

論中扶陽抑陰之劑中寒陽微不能外達主以四逆中外俱寒陽氣虛甚主以附子陰盛於下格陽於上主以白通陰盛盛於內格陽於外主以通鯁是則可知四逆運行陽氣者也附子溫補陽氣者也白通宣通上下之陽氣者也通鯁通達內外之陽氣者也今鯁微欲絕裏寒外熱是腎中陰盛格陽於外故主之也倍乾薑加甘草佐附子易名通鯁四逆湯者以其能大壯元陽主持中外共招外熱反之於內蓋此時生氣已離亡在俄頃若以柔緩之甘草爲君豈能疾呼外陽耶故易以乾薑然必加甘草與乾薑等分者恐渙漫之餘薑附之猛不能安養元氣所謂有制之師也

若面赤者加葱以通格上之陽腹痛者加芍藥以和在裏之陰嘔逆者加生薑以止嘔咽痛者加桔梗以利咽利止鮾不出氣少者倶倍人參以生元氣而復鮾也

白通湯

治少陰病下利鮾微者與白通湯利不止厥逆無鮾乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯鮾暴出者死鮾微續者生

葱白 四莖　乾薑 一兩

附子 一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通加豬膽汁湯

葱白 四莖　乾薑 一兩

附子　一枚生用去皮破八片　人尿　五合

豬膽汁　一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內豬膽汁人尿和令相得分溫再服若無膽汁亦可

註是方也卽四逆湯減甘草加葱白也而名之曰白通者以葱白能通陽氣也減甘草者因其緩也加尿膽者從其類也下咽之後冷體既消熱性便發情且不違而致大益則二氣之拒格可調上下之陰陽可通矣

眞武湯

治少陰水氣爲患腹痛下利四肢沉重疼痛小便不利其人或咳或嘔或小便利而下利者用此加減

白朮　二兩

茯苓　二兩

白芍　二兩

大附子　一枚炮

生薑　三兩切

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

若咳者加五味子半升細辛乾薑各一兩
若小便利者去茯苓加乾薑二兩
若下利去芍藥加乾薑二兩
若嘔去附子加生薑足成半斛

註

小青龍湯治表不解有水氣中外皆寒實之病也眞武湯治表已解有水氣中外皆寒虛之病也眞武者北方司水之神也以之名湯者藉以鎮水之義也夫人一身制水者脾也主水者腎也腎爲胃關聚水而從其類倘腎中無陽則脾之樞機雖運而腎之關門不開水卽欲行以無主制故泛溢妄行而有是證也用附子之辛熱壯腎之元陽則水有所制矣生薑之辛散佐附子以補陽於主水中寓散水之意茯苓之淡滲佐白朮以健土於制水中寓利水之道焉而尤妙在芍藥之酸收仲景之旨微矣蓋人之身陽根於陰若徒以辛熱補陽不少佐以酸收之品恐眞陽飛越矣用

芍藥者是亟收陽氣歸根於陰也於此推之則可知誤服青龍致發汗亡陽者所以於補陽藥中之必需芍藥也然下利減芍藥者以其陽不外散也加乾薑者以其溫中勝寒也水寒傷肺則咳加細辛乾薑者散水寒也加五味子者收肺氣也小便利者去茯苓以其雖寒而水不能停也嘔者去附子倍生薑以其病非下焦水停於胃也所以不須溫腎以行水祇當溫胃以散水且生薑功能止嘔也

當歸四逆湯

手足厥冷脈細欲絕者主之若其人內有久寒

加吳茱萸生薑

當歸三兩　桂枝三兩

芍藥三兩　細辛二兩

通草二兩　甘草二兩

大棗二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

於前湯內加吳茱萸半觔生薑三兩

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓分溫五服

註　凡厥陰病則厥微而厥以厥陰爲三陰之盡陰盡陽生若受其邪則陰陽之氣不相順接故厥微而厥也然厥陰之藏相火遊行其間經雖受寒而藏不即寒故先厥者後必發熱所以傷寒初起見其手足厥冷厥細欲絕者不得遽認爲虛寒而用薑附也此方取桂枝湯君以當歸者厥陰主肝爲血室也佐細辛味極辛能達三陰外溫經而內溫藏通草其性極通善開關節內通竅而外通營倍加大棗即建中加飴用甘之法減去生薑恐辛過甚而迅散也肝之志苦急肝之神欲散甘辛並舉則志遂而神悅未有厥陰神志遂悅而厥微不出手足不溫者也不須參苓之補不用薑附之峻此厥陰厥逆與太少不同治也

若其人內有久寒非辛溫之品所能兼治則加吳茱萸生薑之辛熱更用酒煎佐細辛直通厥陰之藏迅散內外之寒是又救厥陰內外兩傷於寒之法也

吳茱萸湯

治厥陰病乾嘔吐涎沫頭痛者少陰證吐利手足厥冷煩躁欲死者陽明食穀欲嘔者

吳茱萸一升　人參三兩

生薑六兩　大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升溫服七合日三服

集註　羅謙輔曰仲景救陽諸法於少陰四逆湯必用薑附通脈四逆湯倍加乾薑其附子生用

附子湯又加生附至二枚所以然者或壯微陽使之外達或招飛陽使之內返此皆少陰眞陽失所故以回陽爲亟也至其治厥陰則易以吳茱萸而併去前湯諸藥獨用人參薑棗者蓋人身厥陰肝木雖爲兩陰交盡而一陽之健運失職以至少陰之眞陽浮露而吐利厥逆煩躁欲死食穀欲嘔種種叢生矣吳茱萸得東方震氣辛苦大熱能達木鬱直入厥陰降其盛陰之濁氣使陰翳全消用以爲君人參秉冲和之氣甘溫大補能接天眞挽回性命升其垂絕之生氣令陽光普照用以爲臣佐薑棗和胃而行四末斯則震坤合德木土不害一陽之妙用成而三焦之間無非生生之氣矣諸證有不退者乎蓋仲景之法於少陰則重固元陽於厥陰則重護生氣學者當深思而得之矣

烏梅丸

治厥陰病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不欲食食卽吐蚘又主久痢久瘕

烏梅　三百箇　細辛　六兩

乾薑　十兩　黃連　一觔

當歸　四兩　附子　六兩

蜀椒　四兩去汗　桂枝　六兩

人參　六兩　黃蘗　六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒浸烏梅一宿

去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內曰中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三稍加至二十丸禁生冷滑物臭食等

集註　柯琴曰六陰惟厥陰爲難治其本陰其標熱其體木其用火必伏其所主而先其所因或收或散或逆或從隨所利而行之調其中氣使之和平是治厥陰法也厥陰當兩陰交盡又名陰之絕陽宜無熱矣第其具合晦朔之理陰之初盡卽陽之初生所以厥陰病熱是少陽使然也火王則水虧故消渴氣上撞心心中疼熱氣有餘便是火也木勝則尅土故饑不欲食蟲爲風化饑則胃中空虛蚘聞食臭出故吐蚘也仲景立方皆以甘辛苦味爲君不用酸收之品而此用之者以厥陰主肝木耳洪範曰木曰曲直作酸內經曰木生酸酸入肝君烏梅之大酸是伏其所主也配黃蘗滋腎以除渴先其所

因也連蘗治厥陰陽邪則有餘不足以治陰邪也椒附辛薑大辛之品並舉不但治厥陰陰邪且肝欲散以辛散之也又加桂枝當歸是肝藏血求其所屬也寒熱雜用則氣味不和佐以人參調其中氣以苦酒浸烏梅同氣相求蒸之米下資其穀氣加蜜爲丸少與而漸加之緩則治其本也蚘昆蟲也生冷之物與濕熱之氣相成故藥亦寒熱互用且胸中煩而吐蚘則連蘗是寒因熱用也蚘得酸則靜得辛則伏得苦則下信爲治蟲佳劑久痢則虛調其寒熱酸以收之下痢自止

赤石脂禹餘糧湯

治久利不止大腸虛脫服理中丸而利益甚者

赤石脂一觔　禹餘糧一觔
揭碎　揭碎

集註　柯琴曰甘薑參朮可以補中宮元氣之虛而不足以固下焦脂膏之脫此利在下焦故不得以理中之劑收功矣然大腸之不固仍責在胃關門之不閉仍責在脾二石皆土之精氣所結實胃而濇腸急以治下焦之標者實

以培中宮之本也要知此證土虛而火不虛
故不宜於薑附若濕甚而虛不甚復利不止
者故又當利小便也

白頭翁湯

治厥陰熱利下重鮀沉弦渴欲飲水者

白頭翁 三兩　黃連 三兩

黃蘗 三兩　秦皮 三兩

右四味以水七升煮取三升去滓溫服一升
不愈更服一升

註

三陰俱有下利證自利不渴者屬太陰也自
利而渴者屬少陰也惟厥陰下利屬於寒者
厥而不渴下利清穀屬於熱者消渴下重下

利膿血此熱利下重乃火鬱濕蒸穢氣奔迫
廣腸魄門重滯而難出內經云暴注下迫者
是矣君以白頭翁寒而苦辛臣以秦皮寒而
苦澁寒能勝熱苦能燥濕辛以散火之鬱澁
以收下重之利也佐黃連清土焦之火則渴
可止使黃蘗瀉下焦之熱則利自除也治厥
陰熱利有二初利用此方以苦燥之以辛散
之以澁固之是謂以寒治熱之法久利則用
烏梅丸之酸以收火佐以苦寒雜以溫補是
謂逆之從之隨所利而行之調其氣使之平
也

御纂醫宗金鑑四診要訣

卷三十四

T7910/7388

55 CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

ChL 7918.7638

卷三十四

望色聞聲問證切脈診法



御纂醫宗金鑑卷三十四

編輯四診心法要訣目錄

望色聞聲問證切脈診法

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

御纂醫宗金鑑卷三十四

編輯四診心法要訣上

醫家造精微通幽顯未有不先望而得之者近世惟事切巧道使後之爲醫師者由是而不事望神大失古聖先賢之旨今採醫經論色診之文確然可法者編爲四言合崔嘉彥四言鉅訣名曰四診要訣實該望聞問切之道使後之爲醫師者由是而教爲弟子者由是而學熟讀習玩揣摩日久自能洞悉其妙則造精微通幽顯也無難矣

望以目察聞以耳占問以言審切以指參明斯診道識病根源能合色脈可以萬全

註　此明望聞問切爲識病之要道也經曰望而知之爲之神是以目察五色也聞而知之謂之聖是以耳識五音也問而知之謂之工是以言審五病也切而知之謂之巧是以指別五脈也神聖工巧四者乃診病要道醫者明斯更能互相參合則可識萬病根源以之療治自萬舉而萬當矣

五行五色青赤黃白黑復生青如環常德

註　此明天以五行人以五藏化生五色相生如環之常德也木主化生青色火主化生赤色土主化生黃色金主化生白色水主化生黑色心主化生赤色脾主化生黃色肺主化生白色腎主化生黑色肝主化生青色青赤兼化赤黃合一黃白淡黑白青淺碧赤白化紅青黃變綠黑赤紫成黑黃黧立

註　此明五色生尅順逆相兼合化之變色也五色相兼合化不可勝數而其大要則相生之順色有五相尅之逆色亦有五青屬木化赤屬火化黃屬土化白屬金化黑屬水化此五行所化之常色也如木火同化火土同化土金同化金水同化水木同化金木兼化木土兼化土水兼化水火兼化火金兼化此五行所化之變色也如青赤合化紅而兼青之色如赤黃合化紅而兼黃之色如黃白合化黃而兼白之色如白黑合化黑而兼白淡黑之色如黑青合化黑而兼青深碧之色皆相生變色不病之順也如白青兼化青而兼白淺碧之色如赤白兼化白而兼赤之紅色如青黃兼化青而兼黃之綠色如黑赤兼化黑而兼赤之紫色如黃黑兼化黃而兼黑之黧色皆相尅變色爲病之逆也醫能識此則可推五藏主病兼病吉凶變化之情矣

天有五氣食人入鼻藏於五藏上華面頤肝青心

赤脾藏色黃肺白腎黑五藏之常

註　此明色之本原出於天徵乎人五藏不病常色之診法也天以風暑濕燥寒之五氣食人從鼻而入風氣入肝暑氣入心濕氣入脾燥氣入肺寒氣入腎藏於人之五藏蘊其精氣上華於面肝之精華化爲色青心之精華化爲色赤脾之精華化爲色黃肺之精華化爲色白腎之精華化爲色黑也

藏色爲主時色爲客春青夏赤秋白冬黑長夏四季色黃常則客勝主善主勝客惡

註　此明四時不病常色之診法也五藏之色隨五形之人而見百歲不變故爲主色也四時之色隨四時加臨推遷不常故爲客色也春氣通肝其色當青夏氣通心其色當赤秋氣通肺其色當白冬氣通腎其色當黑長夏四季之氣通脾其色當黃此爲四時常則之色也主色者人之藏氣之所生也客色者歲氣加臨之所化也夫歲氣勝人氣爲順故曰客

勝主爲善人氣勝歲氣爲逆故曰主勝客爲惡凡所謂勝者當青反白當赤反黑當白反赤當黑反黃當黃反青之謂也

色脈相合青弦赤洪黃緩白浮黑沉乃平已見其色不得其脈得尅則死得生則生

註 此明色脈相合相反生死之診法也凡病人面青脈弦面赤脈洪面黃脈緩面白脈浮面黑脈沉此爲色脈相合不病平人之候也假如病人已見青色不得弦脈此爲色脈相反主爲病之色脈也若得浮脈是得尅色之脈則主死也得沉脈是得生色之脈則主生也其餘他色皆倣此

新病脈奪其色不奪久病色奪其脈不奪新病易已色脈不奪久病難治色脈俱奪

註 此以色脈相合於診病新久難易之法也脈奪者脈微小也色不澤也新病正受邪制故脈奪也邪已久故色不奪也久病受未久故色不奪也久病不進故脈不奪也若邪已久色奪也久病不進故脈不奪也若

新病而色衄俱不奪則正不衰而邪不盛也
故曰易已久病色衄俱奪則正已衰而邪方
盛也故曰難治
色見皮外氣含皮中內光外澤氣色相融有色無
氣不病命傾有氣無色雖困不凶
註　此以五色合五氣之診法也青黃赤白黑顯
然彰於皮之外者五色也隱然含於皮之中
者五氣也內光灼灼若動從紋路中映出外
澤如玉不浮光油亮者則爲氣色並至相生

無病之容狀也若外見五色內無含映則爲
有色無氣經曰色至氣不至者死凡四時五
藏五部五官百病見之皆死故雖不病命必
傾也若外色淺淡不澤而內含光氣映出則
爲有氣無色經曰氣至色不至者生凡四時
五藏五部五官百病見之皆生故雖病困而
不凶也
縞裏雄黃脾狀並臻縞裏紅肺縞裏朱心縞裏黑
赤紫艷腎緣縞裏藍赤石青屬肝

註　此明氣色並至容狀之診法也縞白羅也如白羅裏雄黃映出黃中透紅之色是脾之氣色並至之容狀也如白羅裏朱砂映出深紅正赤之色是心之氣色並至之容狀也如白羅裏黑赤映出黑中透赤紫艷之色是腎之氣色並至之容狀也如白羅裏藍赤映出藍中揚紅石青之色是肝之氣色並至之容狀也

青如蒼璧不欲如藍赤白裏朱鉚赭死原黑重漆炲白羽枯鹽雄黃羅裏黃土終難

註　此明四時百病五藏五部五官五色生死之診法也蒼璧碧玉也藍藍靛葉也經曰青欲如蒼璧之色即石青色生青色也不欲如藍靛葉色死青色也鉚血死血也赭代赭石即死血赭石之色死紅色也重也經曰赤欲如白裏朱即正赤色生紅色也不欲如鉚赭即死血赭石之色死紅色也重漆光潤紫色也炲地上蒼枯黑土也經曰黑

欲如重漆即光潤紫色生黑色也不欲如灼
即枯黑土色死黑色也白羽白鵝羽也枯枯
骨也鹽食鹽也經曰白欲如鵝羽即白而光
澤如鵝羽之色生白色也不欲如枯鹽即枯
骨食鹽之色死白色也經曰黃欲如羅裹雄
黃即黃中透紅之色生黃色也不欲如黃土
即枯黃土之色死黃色也
舌赤卷短心官病常肺鼻白喘胸滿喘張肝目皆
青脾病脣黃耳黑腎病深淺分彰

註
此以五色合五官主病虛實之診法也舌者
心之官也舌赤卷短者正虛也鼻者肺之官也
實也色淺紅滋潤者正虛也鼻白肺之病也色深赤焦卷者邪
鼻白肺之病也色淺白喘而不滿者正虛也
色深白喘而胸滿者邪實也目者肝之官也
目皆青肝之病也色深青者邪實也色淺青
者正虛也口脣者脾之官也脣黃脾之病也
色深黃者邪實也色淺黃者正虛也耳者腎
之官也耳黑腎之病也色深黑者邪實也色

淺黑者正虛也所謂深淺分彰者卽下之所謂淺淡爲虛深濃爲實分明彰顯也

左頰部肝右頰部肺額心頦腎鼻脾部位部見本色深淺病累若見他色按法推類

註　此以五色合五部主虛實賊微正五邪之診法也左頰肝之部也右頰肺之部也額上心之部也頦下腎之部也鼻者脾之部也本部見本色淺淡不及深濃太過者皆病色也假如鼻者脾之部位見黃本色則爲本經自病正邪也若見白色則爲子盜母氣虛邪也若見赤色則爲母助子氣實邪也若見青色則爲彼能尅我賊邪也若見黑色則爲我能尅彼微邪也所謂按法推類者謂餘藏準按此法而推其類也

天庭面首闕上喉咽關中印堂候肺之原山根候心年壽候肝兩傍候膽脾胃鼻端頰腎腰臍顴下大腸顴內小府面王子膀當顴候肩顴外候臂顴外之下乃候手位根傍乳膺繩上候背牙車下股

膝脛足位

註　此以上部候頭下部候足中部候藏府合五色主病之診法也闕中者兩眉之間謂之印堂中部之最高者故應候肺之疾也印堂之上名曰闕上闕上至髮際名曰天庭天庭爲上部之上故應候頭面之疾也闕上爲上部之下故應候咽喉之疾也山根者兩目之間即下極也在肺下之部故應候心之疾也年壽者下極之下即鼻柱也在心下之部故應候肝之疾也面傍者年壽之左右膽附於肝故應候膽之疾也鼻端者年壽之下謂之面王即準頭鼻孔也在肝下之部故應候脾之疾也鼻孔者即方上也脾胃相連故應候胃之疾也耳前之下謂之兩頰四藏居腹而皆一惟腎居脊而有兩故兩頰應候腎之疾也與腰臍對故又應候腰臍之疾也頰內高骨謂之兩顴之下在腎下之部故應候大腸之疾也顴內者即兩顴之內也小府者謂小腸

之府也小腸在大腸之上故應候之也準頭上至於庭皆謂之明堂準頭下至於頦皆謂之面王面王者卽人中承漿之部也膀胱者腎之府也子處者卽精室血海也皆居腎之下故面王應候子處膀胱之疾也此藏府上下內外之部位也五部以頦候腎者以水居極下且子處中通兩腎也以天庭候心者以火居極上故也以右頰候肺者以金位居右故也以鼻

候脾者以土位居中故也當顴者當兩顴骨之部也顴爲骨之本而居外部之上故應候肩之疾也肩接乎臂故顴骨之外應候臂之疾也臂接乎手故顴外之下應候手部之疾也根傍者山根兩傍兩目內皆之部也而居內部之上故應候膺乳胸前之疾也兩頰候腰腎頰外從頰骨上引曰繩骨故應候背之疾也頰外從頰骨下引曰牙車骨故應候股下膝脛足部之疾也此肢體上下內外之部

位也

庭闕鼻端高起直平顴頰蕃薇大廣豐隆骨骼明顯壽享遐齡骨骼陷弱易受邪攻

註　此明五官五部强弱壽夭之診法也天庭闕中至鼻之端皆高起直平面顴兩頰蕃薇耳門皆大廣豐隆去之十步皆見於外則爲骨骼明顯也其人不但不病且享遐齡之壽也若天庭顴頰耳門諸處骨卑肉薄則爲骨骼陷弱也其人不但不免於病且不壽也

黃赤風熱青白主寒青黑亦爲痛甚則痺攣悗白脫血微黑水寒痿黃諸虛顫赤勞纏

註　此以五色隨其所在五官五部內部外部上部下部主病之診法也黃赤爲陽色故爲病亦陽所以主風也熱也青白黑爲陰色故爲病亦陰所以主寒也痛也若黑甚在鉠則麻痺在筋則拘攣悗白者淺淡白色也主大吐衄下血脫血也若無衄吐下血則爲心不生血不榮於色也微黑者淺淡黑色也主腎病

水寒也痿黃者淺淡黃色也主諸虛病也兩顴深紅赤色者主陰火上乘虛損勞疾也

視色之銳所向部官內走外易外走內難官部色鮎五病交參上逆下順左右反貼

註此以五色傳乘官部之診法也色之尖處爲銳凡病相傳相乘當視其色之銳處所向何官何部則知起自何官何部傳乘何部何官生尅順逆自然明矣銳處向外是內部走外部則爲藏傳府府傳表易治之病也銳處向內是外部走內部則爲表傳府府傳藏難治之病也內走外走固有難易然更當以五部五官五色五鮎五病交相推參則又有微甚生死之別焉凡病色從下衝明堂而上額則爲水尅火之賊邪故逆也從上壓明堂而下頷則爲火侮水之微邪故順也反相反也貼危也男子以左爲主女子以右爲主男子之色自左衝右爲從自右衝左爲逆女子之色自右衝左爲從自左衝右爲逆者相反也

相反故危也前以內外部位分順逆後以上下左右分順逆不可不知

沉濁晦暗內久而重浮澤明顯外新而輕其病不甚半澤半明雲散易治搏聚難攻

註　此以五色晦明聚散別久重新輕之病易治難治之診法也色深爲沉主病在內若更濁滯晦暗主久病與重病也色淺爲浮主病在外若得光澤明顯主新病與輕病也若其色雖不枯晦亦不明澤主不甚之病也凡諸病之色如雲撤散主病將愈易治也搏聚凝滯主病漸進難治也上以內外上下左右分順逆此以淺深晦明聚散分順逆也

黑庭赤顴出如拇指病雖小愈亦必卒死脣面黑青五官黑起擦殘汗粉白色皆死

註　此明非常之色診人暴死之法也出如拇指謂成塊成條搏聚不散也黑色出如拇指於天庭赤色出如拇指於兩顴此皆水火相射之候故病者雖或小愈亦必卒然而死也病

者脣面青黑及五官忽起黑色白色如擦殘
汗粉之狀雖不病亦皆主卒死也
善色不病於義誠當惡色不病必主凶殃五官陷
弱庭闕不張蕃蔽卑小不病神强
註　此明見其色不見其病之診法也善色者氣
色并至之好色也其人於理當不病也惡色
者沉深滯晦之色也其人卽不病亦必主凶
殃也凶殃者卽相家所謂紅主焦勞口舌白
主刑罰孝服黑主非災凶死青主憂訟暴亡
之類也五官陷弱者謂五官骨陷肉薄也庭
闕不張者謂天庭闕中不豐隆張顯也蕃蔽
卑小者謂顴側耳門卑低不廣也此皆無病
而有不壽之形若加惡色豈能堪哉其有不
病者必其人神氣强旺素稱其形也
肝病善怒面色當青左有動氣轉筋脇疼諸風掉
眩痂病耳聾目視矇矇如將捕驚
註　此下五條皆明色病相合本藏自病虛實之
診法也怒者肝之志故病則好怒也青者肝

之色故病則面色當青也肝之部位在左故病則左脇有動氣而脇疼也肝主筋故病則轉筋也掉者動搖抽搐也眩者昏黑不明也肝主風故病則掉眩也疒主肝故病疒也肝與膽爲表裏故病耳聾也此皆肝實之病若肝虛則目視眩眩無所見以肝開竅於目也肝虛則膽薄故不時而有如人將捕之驚也

心赤善喜舌紅口乾臍上動氣心胸痛煩健忘驚悸怔忡不安實狂昏肓虛悲慼然

註

喜者心之志故病則好喜也赤者心之色故病則面色赤也心開竅於舌故病則舌赤紅也心主熱故病則口乾心煩也心之部位在上故病則臍上有動氣也胸者心肺之宮城也故病則心胸痛也健忘驚悸怔忡皆心神不安之病也熱乘心實則發狂昏肓也神怯心虛則悽然好悲也

脾黃善憂當臍動氣善思食少倦怠乏力腹滿腸鳴痛而下利實則身重脹滿便閉

註　黃者脾之色故病則面色黃也憂思者脾之志故病則好憂思也脾之部位在中故病則當臍有動氣也脾主味故病則食少也脾主四肢故病則倦怠乏力也脾主腹故病則腹滿腸鳴痛而下利也此皆脾虛之病也脾主腹腹脹滿便閉也肉故實則病身重腹脹滿便閉也

肺白善悲臍右動氣灑淅寒熱咳唾噴噎喘呼氣促膚痛胸痺虛則氣短不能續息

註　白者肺之色故病則面色白也悲者肺之志故病則好悲也肺之部位在右故病則右脇有動氣也肺主皮毛故病則灑淅寒熱膚痛也咳嗽唾痰噴噎流涕喘呼氣促皆肺本病也胸者肺之府也故病則胸痺而痛也肺虛則胸中氣少故喘咳皆氣短不能續息也

腎黑善恐臍下動氣腹脹腫喘溲便不利腰背少腹骨痛欠氣心懸如饑足寒厥逆

註　黑者腎之色故病則面色黑也恐者腎之志故病則好恐也腎之部位在下故病則臍下

有動氣也腎主水故病則水蓄腹脹腫滿喘不得臥也腎開竅於二陰故病則溲便不利也腎主骨腎與膀胱爲表裏故病則少腹滿背與骨俱痛也腎主欠故病則呵欠也腎邪上乘於心故病則心空如饑也諸厥屬下故病則足寒厥逆也

正病正色爲病多順病色交錯爲病多逆母乘子順子乘母逆相尅逆凶相生順吉

註　此以五色合五病順逆生死之診法也假如肝病色青是正病正色若反見他色是病色交錯也若見黑色爲母乘子相生之順也若見赤色爲子乘母相生之逆也若見黃色爲病尅色其病不加凶中順也若見白色爲色尅病其病則甚凶中逆也曰相尅逆凶者謂相生順吉者如相尅爲凶凶中順尚可也凶中逆必凶也曰相生順吉者如子乘母爲吉中小逆也如母乘子爲吉中大順也其餘四藏皆倣此

色生於藏各命其部神藏於心外候在目光晦神短了了神足單失久病雙失即故

註 此以色合二目之神診病生死之法也五色生於五藏各命其部而見於面神藏於心雖不可得而識然外候在目視其目光晦暗此爲神短病死之候也若目睛清瑩瞭瞭分明此爲神足不病之候也單失者謂或色或神主久病也雙失者神色俱失故主即死也

面目之色各有相當交互錯見皆主身亡面黃有救瘡瘍皆黃病愈睛黃發黃

註 此以色合二目之色診病之法也面目之色各有相當之色如面之色肝青心赤脾黃肺白腎黑目之色如睛瞳黑烏珠青白珠白兩皆紅也若目青目赤目白目黑與面色但有不同皆爲交互錯見病者皆主身亡也惟面色黃者爲土未敗五行有救皆不死也若傷寒兩目皆紅則爲發疹瘍之兆兩目皆黃則爲病將愈之徵若兩睛通黃則爲主發黃疸

之候也

閉目陰病開目病陽朦朧熱盛時瞑衄常陽絶戴眼陰脫目盲氣脫睚陷睛定神亡

註 此診目陰陽生死之法也凡病者閉目則爲病在陰也開目則爲病在陽也朦朧昏不了了非開目也則爲熱盛傷神也視而時瞑非開目也則爲衄血之常候也目上直視謂之戴眼則爲陽絶之候也視不見物謂之目盲則爲陰脫之候也目睚忽陷則爲氣脫之候也睛定不轉則爲神亡之候也

五色既審五音當明聲爲音本音以聲生聲生聲之餘韻音遂以名角徵宮商並羽五聲

註 此明五音乃天地之正氣人之中聲也有聲而後有音故聲爲音本音以聲生也聲之餘韻則謂之音非聲之外復有音也五色命乎五藏診人之病既已審矣而五音通乎五藏診人之病亦當明也角屬木通乎肝徵屬火通乎心宮屬土通乎脾商屬金通乎肺羽屬

水通乎腎也

中空有竅故肺主聲喉爲聲路會厭門戶舌爲聲機脣齒扇助寬隘銳鈍厚薄之故

註　此明聲音各有所主之診法也凡萬物中空有竅者皆能鳴焉故肺象之而主聲也凡發聲必由喉出故爲聲音之路也必因會厭開闔故爲聲音門戶也必藉舌爲宛轉故爲聲音之機也必資之於牙齒脣口故爲聲音之扇助也五者相須故能出五音而宣達遠近也若夫喉有寬隘寬者聲大隘者聲小舌有銳鈍銳者聲辨鈍者不眞會厭有厚薄厚者聲濁薄者聲清脣亦有厚薄厚者聲遲薄者聲疾牙齒有疎密疎者聲散密者聲聚五者皆無病之聲音乃形質之稟賦不同也以此推之在喉在會厭在舌在齒在脣之故當有別也

舌居中發喉音正宮極長下濁沉厚雄洪開口張喎口音商成次長下濁鏗鏘肅清撮口脣音極短

高清桑細透徹尖利羽聲舌點齒音次短高清抑揚咏越徵聲始通角縮舌音條暢正中長短高下清濁和平

註　此明五藏聲音不病之常之診法也經曰天食人以五氣五氣入鼻藏於心肺上使五色修明聲音能彰故五藏各有正聲以合於五音也如舌居中發音自喉出者此宮之正音也其聲極長極下極濁有沉洪雄厚之韻屬土入通於脾開口張喘音自口出者此商之正音也其聲次長次下次濁有鏗鏘清肅之韻屬金入通於肺撮口而發音自脣出者此羽之正音也其聲極短極高極清有柔細尖利之韻屬水入通於腎以舌點齒成音者乃徵之正音也其聲次短次高次清有抑揚咏越之韻屬火入通於心內縮其舌而成音者乃角之正音也其聲長短高下清濁相和有條暢中正之韻屬木入通於肝此五藏不病之常聲也喘者齒本肉也

喜心所感忻散之聲怒心所感忿厲之聲哀心所感悲嘶之聲樂心所感舒緩之聲敬心所感正肅之聲愛心所感溫和之聲

註 前以咽喉會厭舌齒口脣稟賦不同以別非病之音此又復以人之情感物成聲以明非屬也哀感於心者則其發聲必悲悽以嘶也悅以散也怒感於心者則其發聲必忿急而樂感於心者則其發聲必舒暢不迫也敬感於心者則其發聲必正直肅斂也愛感於心者則其發聲必溫柔以和也醫者於此比類而推不病之音自可識有病之音也

五聲之變變則病生肝呼而急心笑而雄脾歌以漫肺哭促聲腎呻低微色赶則凶

註 此以五聲變而生病之診法也五聲失正則謂之變變則病生也肝呼而聲急肝聲失正故知病生肝也心笑而聲雄心聲失正故知病生心也脾歌而聲漫脾聲失正故知病生

脾也肺哭而聲促肺聲失正故知病生肺也
腎呻而低微腎聲失正故知病生腎也所謂
色尅則凶者假如肝病呼急得相尅之白色
主凶也餘藏倣此

好言者熱懶言者寒言壯爲實言輕爲虛言微難
復奪氣可知譫妄無倫神明已失

註　此以聲音診病寒熱虛實生死之法也中藏
經曰陽候多語熱也陰候無聲寒也發言壯
厲實也發言輕微虛也若言聲微小不能出
喉欲言不能復言者此奪氣也譫言妄語不
別親疎神明失也皆主死候

失音聲重內火外寒瘡痛而久勞啞使然啞風不
語雖治命難嘔歌失音不治亦瘂

註　此明失音爲病不同之診也失音聲粗重乃
內火爲外寒所遏鬱於肺也若不粗重且瘡
爛而痛日久流連者是因勞啞使然也小兒
抽風不語大人中風不語皆謂之啞風雖竭
力治之而命則終難挽回以金不能制木也

謳歌失音者是因歌傷喉不治亦可痊也

聲色既詳問亦當知視其五入以知起止心主五臭自入爲焦脾香腎腐肺腥肝臊脾主五味自入爲甘肝酸心苦肺辛腎鹹腎主五液心汗肝泣自入爲唾脾涎肺涕

註此明五入問病之診法也肺主五聲肝主五色前已詳明而問之之道亦所當知也經曰治之極於一一者問其因而得其情也其要在視其五入即可以知病情之起止也假如心主五臭凡病者喜臭惡臭皆主於心此統而言之也若分而言之則自入喜焦病生心也入脾喜香病生脾也入肝喜臊病生肝也入肺喜腥病生肺也入腎喜腐病生腎也

主五味凡病者喜味惡味皆主於脾此統而言之也若分而言之則自入喜甘病生脾也入肝喜酸病生肝也入心喜苦病生心也入肺喜辛病生肺也入腎喜鹹病生腎也腎主五液凡病者多液少液皆主於腎此統而言

之也若分而言之則自入出而爲唾病生腎也入心出而爲汗病生心也入肝出而爲淚病生肝也入脾出而爲涎病生脾也入肺出而爲涕病生肺也其聲之微壯色之順逆法同推也

百病之常晝安朝慧夕加夜甚正邪進退潮作之時精神爲貴不衰者實困弱虛累

註

此以問知精神盛衰虛實之診法也凡病朝慧者以朝則人氣始生衛氣始行故慧也晝安者以日中則人氣長長則勝邪故安也夕加者以夕則人氣始衰邪氣始生故加也夜甚者以夜半則人氣入藏邪氣獨居於身故甚也此百病消長邪正進退之常也凡病來潮發作之時精神爲貴者以病至精神不衰則爲邪氣不能勝正正氣實也病至精神困弱則爲正氣不能勝邪正氣虛也

晝劇而熱陽旺於陽夜劇而寒陰旺於陰晝劇而寒陰上乘陽夜劇而熱陽下陷陰晝夜寒厥重陰

無陽晝夜煩熱重陽無陰晝寒夜熱陰陽交錯飲食不入死終難却

註　此以問知晝夜起居診病陰陽氣血生死之法也晝陽也熱陽也凡病晝則增劇煩熱而夜安靜者是陽自旺於陽分氣病而血不病也夜陰也寒陰也凡病夜則增劇寒厥而晝安靜者是陰自旺於陰分血病而氣不病也凡病晝則增劇寒厥而夜安靜者是陰上乘於陽分之病也凡病夜則增劇煩熱而晝安靜者是陽下陷於陰分之病也凡病晝夜俱寒厥者是重陰無陽之病也凡病晝夜俱熱者是重陽無陰之病也凡病晝則寒厥夜則煩熱者名曰陰陽交錯若飲食不入其人之死終難却也

食多氣少火化新痊食少氣多胃肺兩愆喜冷有熱喜熱有寒寒熱虛實多少之間

註　此以問知飲食之診法也食多氣盛此其常也若食多氣少非胃病火化即新愈之後貪

食而穀氣未足也食少氣少此其常也若食少氣多則必是胃病不食肺病氣逆兩經之病也喜冷者中必有熱喜熱者中必有寒虛熱則飲冷少實熱則飲冷多虛寒則飲熱多故曰寒熱虛實辨在多少之間也

大便通閉關乎虛實無熱陰結無寒陽利小便紅白主乎熱寒陰虛紅淺濕熱白泔

註　此以問知大小二便之診法也大便之利不利關乎裏之虛實也閉者爲實若內外並無熱證則爲陰結便閉也通者爲虛若內外並無寒證則爲陽實熱利也小便之紅與白主乎裏之寒熱也紅者爲熱若平素淺紅淡黃則爲陰虛也白者爲寒若平素白渾如米泔則爲濕熱所化也

望以觀色問以測情召醫至榻不盼不驚或告之痛並無苦容色鮮皆和詐病欺蒙

註　此以色合問診病眞僞之法也望色祇可以

知病之處非問不足以測病之情也凡病者聞醫至榻未有不盼視而驚起者也若不驚起而盼視者非無病必驕恣之輩也若病者或告之痛醫視其面并無痛苦容狀診其色脈皆利此乃詐病欺蒙醫士也

脈之呻吟病者常情搖頭而言護處必疼三言三止言蹇爲風噦嚥呵欠皆非病徵

註　此以聲合情診病眞僞之法也醫家診脈病者呻吟以其爲病所苦無奈之常情也凡欲言而先搖頭者是痛極艱於發聲搖頭以意示緩故也若以手護腹則爲裏痛護頭則爲頭痛但有所護之處必有所痛也持脈之時病人三言三止者謂欲言不言不言欲言如此者三也言蹇不能言者風病也若非言蹇風病而三言三止者是故爲詐病之態也或脈之而噦嚥呵欠皆非有病之徵以噦嚥者裏氣和呵欠者陰陽和故也舉此二事以診別其情之眞僞則其他可推廣矣

蓋意在使病者不能售其欺醫者不致爲其所欺而妄治也

黑色無痛女疸腎傷非疸血畜衄下後黃面微黃黑紋繞口角饑瘦之容詢必噎膈

註 此以色合問診病之法也黑色當主痛詢之無痛病或爲腎傷女勞疸也察之又非女疸其爲血畜於中顏變於外可知然血畜之黑則必或吐衄或下血而後卽轉黃色以瘀去故也面微黑黃者卽淺淡之黧色也視其壽帶紋短若纏繞口角亦非畜血卽相家所謂

膲蛇入口主人餓死更視其人有饑餓削瘦之容可知病不能食詢問必是噎膈也

白不脫血衄如亂絲問因恐怖氣下神失乍白乍赤衄浮氣怯羞愧神蕩有此氣色

註 此以色合情之診法也白者脫血虛色也察之并無脫血之證問之始知因恐怖也恐則血隨氣下故色白也怖則神隨氣失故衄如亂絲也乍白乍赤氣血不定之色也衄浮氣

怯神氣不安之象也問之始知中心羞愧有此氣色也羞則氣收故氣怯也愧則神蕩故脈浮也舉此情色二端一以診病一以診情他可類推總在臨病者神而明之也

眉起五色其病在皮燥及營變蠕動血脈可知眥目筋病脣口主肌耳主骨病焦枯垢泥

註　此以色合皮脈肉筋骨診病之法也凡眉間起五色主病在皮者以肺主皮毛也營變五色蠕然動主病在脈者以營行血脈也眥目起五色主病在筋者以肝主筋也脣口起五色主病在肌者以脾主肉也耳起五色主病在骨者以腎主骨也焦枯垢泥者乃枯骨不澤不能外榮也此下皆診病之雜法也

髮上屬火鬚下屬水皮毛屬金眉橫屬木屬土之毫腋陰臍腹髮直如麻毛焦死故

註　此明毛髮診病之法也髮屬心而上長故屬火也鬚屬腎而下長故屬水也通身之毛屬肺而生皮故屬金也眉屬肝而橫長故屬木

也腋下陰下臍中腹中之毫屬脾以應四維故屬土也凡毛髮雖屬五藏然皆血液所生故喜光澤若髮直如麻鬚毛焦枯皆死候也陰絡從經而有常色陽絡無常隨時變色寒多則凝凝則黑青熱多則淖淖則黃紅

註　此以色合絡脈之診法也絡有陰陽隨陰經之絡爲陰絡隨陽經之絡爲陽絡也陰絡深而在內陽絡浮而在外在內者不可得而見也惟從經常之色而治之故曰有常色也在外者可得而見則隨四時推遷變色而治之故曰陽絡無常也然陽絡之變色亦不外乎熱多則脈淖淖則色黃紅也

診色之寒熱也寒多則脈凝凝則色青黑也

胃之大絡名曰虛里動左乳下有過不及其動應衣宗氣外泄促結積聚不至則死

註　此明宗氣診病法也胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳之下動不應衣以候宗氣若動之微而不見則爲不及主宗氣內虛也

若動之應衣而甚則爲太過主宗氣外泄若三四至一止或五六至一止則主有積聚也若絕不至者則主死矣

鮎尺相應尺寒虛瀉尺熱病温陰虛寒熱風病尺滑痺病尺濇尺大豐盛尺小虧竭

註　此明診尺之法也尺者謂從關至尺澤之皮膚也經曰鮎急尺者皮膚亦急鮎緩尺之皮膚亦緩而少氣鮎大尺滑尺之皮膚亦滑鮎濇尺之皮膚亦濇故曰鮎尺相應也若診尺之皮膚寒則主虛瀉也診尺之皮膚熱則主病温也非病温則主陰虛寒熱勞疾也凡風病則尺之膚滑也痺病則尺之膚濇也氣血盛則尺之肉豐盛氣血虛則尺之肉虧竭也

肘候腰腹手股足端尺外肩背尺肉膺前掌中腹中魚青胃寒寒熱所在病生熱寒

註　此明肘臂之診法也肘上曰髆肘下曰臂髆臂之節曰肘臂內曰尺尺外曰臂肘上候腰

腹手主候股足臂主候肩背尺主候胸膺掌中主候腹中手大指本節後名曰魚或有青色或現青衄主候胃中寒也診其寒熱所在何處主病生寒熱也

診臍上下上胃下腸腹皮寒熱腸胃相當胃喜冷飲腸喜熱湯熱無灼灼寒無滄滄

註　此明診臍之法也臍之上主候胃也臍之下主候腸也臍之上下之腹皮寒熱則知胃腸有寒熱相當之病也胃中有病每喜冷飲腸間有病多喜熱湯是其徵也然與之飲熱不可過於灼灼之熱與寒不可過於滄滄之寒蓋恐其恣意有失惟當適其寒温之宜也

胃熱口糜懸心善饑腸熱利熱出黃如糜胃寒清厥腹脹而疼腸寒尿白飧瀉腸鳴

註　此明胃腸寒熱爲病之診法也胃中有熱則上發口糜心空善饑腸中有熱則瀉出之物亦熱色黃如粥胃中有寒面清冷厥則腹脹而疼腸中有寒則小便尿白飧瀉腸鳴也

木形之人其色必蒼身直五小五瘦五長多才勞心多憂勞事軟弱曲短一有非良

註 此下五條皆以各色合形之診法也木形之人其色合青貴乎如碧蒼之潤也身直者象木之幹直也五小者謂頭小手足小象木之巔枝也五瘦五長者謂身肢象木之條細而長也多才者象木之用隨斲成材也多才之人必勞於心也多憂者象木之性不能自靜也多憂之人必勞於事也若一有形質軟弱曲短皆非良材也

火形赤明小面五銳反露偏陋神清主貴重氣輕財少信多慮好動心急最忌不配

註 火形之人其色合赤貴乎明也五銳者謂頭上之尖銳也五反五露者謂額鼻面口象火之性也象火之性張顯外露也五官反外露偏陋皆火敗形若神清而明是爲得火之神則反主貴也重氣者象

火屬陽多氣也輕財者象火之性多散也少信者象火之性易變也多慮者象火之明燭物也好動者象火之用不靜也心急者象火之性急速也最已神痴氣濁色悖則爲不配皆敗形也

土形之狀黃亮五圓五實五厚五短貴全面圓頭大厚腹股肩容人有信行緩心安

註　土形之人其色合黃貴乎亮也五圓者象土之形圓也五實者象土之質實厚也五短者象土之形敦短也圓實厚短五者俱全各成一形皆爲土之正形則主貴也面圓頭大厚腹美肩美股皆土厚實之狀也容人有信行緩心安皆土德性之厚也

金形潔白五正五方五朝五潤偏削敗亡居處靜悍行廉性剛爲吏威肅兼小無傷

註　金形之人其色合白貴乎潔也五正五方者象金之形方正也五朝者金主骨骼貴內朝明堂也五潤者象金之藏於水也偏則不

方正削則骨露陷敗亡之形也居處靜悍者象金靜而悍也行廉性剛者象金性潔而剛也爲吏威肅者象金之性肅殺也兼小無傷者謂方正朝潤雖小無傷金之正形也

水形紫潤面肥不平五肥五嫩五秀五清流動搖身常不敬畏內欺外恭粗濁主廢

註　水形之人其色合紫貴乎潤色面肥不平者象水之面廣而有波也五肥者象水之形廣大也五嫩者象水之性滋潤也五秀五清者象水之質清澈也肥嫩之質發行常流動搖身象水之流動不居也常不敬畏者象水之性趨下不上也內欺外恭者象水之質內虛無實也若神氣粗濁皆主廢形也

貴乎相得最忌相勝形勝色微色勝形重至勝時年加感則病年忌七九猶宜愼恐

註　此明得其形不得其色之診法也假如木形之人法當色青是爲形色相得不病而貴之形也若見黃色或見白色是爲相勝主病而

最忌者也見黃色者則爲形勝色主病微見白色者則爲色勝形主病重也然其生病必至於勝木之時之年加感外邪則病也年忌者謂五形之人形色相勝者凡至七歲是爲年忌積九遞加至十六歲二十五歲三十四歲四十三歲五十二歲六十一歲皆年忌之年也當此之年加感爲病則甚故曰尤宜戒愼恐懼也

形有强弱肉有脆堅强者難犯弱者易干肥食少痰最怕如綿瘦食多火著骨難全

註　此明形肉生死之診法也五形之人得其純者皆謂之强得其駁者皆謂之弱强者加感之邪難犯弱者加感之邪易干也能食形肥者强也若食少而肥者非强也乃痰也肥人最怕按之如綿絮謂之無氣則主死矣食少而瘦者弱也若食多而瘦者非弱也乃火也瘦人最怕肉乾著骨謂之消瘦亦主死矣

形氣已脫鮓調猶死形氣不足鮓調可醫形盛鮓

小少氣休治形衰脈大多氣死期

註　此以形合脈診生死之法也經曰形氣已脫九候雖調猶死者謂形脫無以貯氣也形氣俱虛寸口脈調可醫者謂形氣未相失也形盛而肥脈小少氣者謂氣不能勝形也形衰而瘦脈大多氣者謂形不能勝氣也故皆主死也

頸痛喘疾目裏腫水面腫風水足腫石水手腫至腕足腫至踝面腫至項陽虛可嗟

註　此明形腫生死之診法也視其病者人迎頸脈大動主喘不得臥之疾也目裏上下腫者主有水氣之病也從面腫起者名曰風水陽水也從足脛腫起者名曰石水陰水也若手腫至腕足腫至踝面腫至項非水也乃陽氣虛結不還之死證也

頭傾視深背曲肩隨坐則腰痠轉搖遲回行則僂俯立則振掉形神將奪筋骨疲頹

註　此明形憊死候之診法也經曰夫五藏者身

之强也頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣腰者腎之府轉搖艱難腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能行則僂俯筋將憊矣骨者髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣凡此形神將奪務後動於人長大似僂其色黯黯

註　此明陰陽之人之情狀以別陰陽盛衰法也

太陰陰盛而過柔故貪而不仁也好入惡出陰性藏也下意貌親陰性卑柔也不隨時務陰喜靜也後動於人陰性遲也長大者陰盛之形也似僂者好曲身傴僂下意之態也其色黑黯黯陰盛之色也此太陰人之情狀也

少陰情狀小貪賊心喜失慍得傷害無恩立則險躁寡和無親行如伏鼠易懼易欣

註　少陰陰微而殘忍故貪小而賊心也喜失慍得陰性嫉妬也傷害無恩陰性殘忍也立則

險躁陰性危險也寡和無親陰性冷落也行如伏鼠陰性隱伏也易懼易欣謂如鼠之得失忻然而進懼然而退也此少陰人之情狀也

太陽情狀自大軒昂仰胸挺腹足高氣揚志大虛說作事好強雖敗無悔自用如常

註　太陽陽盛而過剛故自大軒昂仰胸挺腹足高氣揚也好志大者陽性好剛強也好虛說者陽性好誇張也作事好強雖事敗而不悔

者以其常好自用自是亦陽過剛果於斷也此太陽人之情狀也

少陽情狀諟諦自貴志小易盈好外不內立則好仰行則好搖兩臂兩肘常出於背

註　少陽陽微而明小故諟諦小察自貴小官志小易盈滿也好外交而不內附者陽之性外也立則好仰陽之性上也行則好搖陽之性動也兩臂兩肘常出於背者亦陽之性喜露而不喜藏也此少陽人之情狀也

得陰陽正平和之人無爲懼懼無爲忻忻婉然從
物肅然自新謙謙君子藹藹吉人

註　此明陰陽和平人之情狀也無爲懼懼者中心有所主而威武不能屈也無爲忻忻者外物不能惑而富貴不能淫也婉然從物者謂豁然而大公物來而順應也肅然自親者謂尊嚴以方外恭敬以直內也夫如是之人天必祐之人必愛之福祿綏之焉得不謂之謙謙君子藹藹吉人也哉明此五者其人之陰陽盛衰白可見矣下

編輯四診心法要訣

四言脈訣始自漢張仲景平脈法宋崔嘉彥衍之明李時珍刪補及李中梓又補其缺畧刪其差謬復加註釋固已文簡義該矣然猶有與經義不合者今皆刪去其未備者補之

脈爲血府百體貫通寸口動脈大會朝宗

註　經曰脈者血之府也周身血脈運行莫不由此貫通故曰百體貫通也難經曰十二經中

皆有動脈獨取寸口以決死生寸口者左右寸關尺手太陰肺經動脈也爲脈之大要會也故曰寸口動脈大會朝宗也

診人之脈高骨上取因何名關界乎寸尺

註　凡診人之脈令仰其手視掌後有高骨隆起即是關部脈也醫者覆手取之先將中指取定關部方下前後二指於寸尺之上病人長則下指宜疎病人短則下指宜密因其界乎寸尺二部之間故命名曰關

至魚一寸至澤一尺因此命名陽寸陰尺

註　從高骨上至魚際長一寸因此命名曰寸從高骨下至尺澤長一尺因此命名曰尺寸部候上故爲陽也尺部候下故爲陰也

右寸肺胸左寸心膻右關脾胃左肝膈膽三部三焦兩尺兩腎左小腸胱右大腸認

註　右寸浮候胸中沉以候肺左寸浮候膻中沉以候心右關浮候胃沉以候脾左關浮候膈膽沉以候肝兩尺沉俱候腎左尺浮候小

腸膀胱右尺浮候大腸膻膻中卽包絡也五藏皆一惟腎有二故曰兩尺候兩腎也然內經言府不及膽者以寄於肝也不及大小腸膀胱者以統於腹中也不及三焦者以寸候胸中主上焦也關候膈中主中焦也尺候腹中主下焦也此遵內經分配三部診脈法也至僞訣以大小腸配於寸上以三焦配於左尺以命門配於右尺其手厥陰包絡竟置而不言悉屬不經滑壽以左尺候小腸膀胱前陰之病右尺候大腸後陰之病可稱千古隻眼也浮外候府沉內候藏之說詳於卷末

命門屬腎生氣之原人無兩尺必死不痊

註　兩腎之中名曰命門命門居兩腎之中故兩尺屬之命門之少火卽腎間動氣是爲生氣之原也人若無兩尺脈則生氣絕矣病者必死不能痊也

關脈一分右食左風右爲氣口左爲人迎

註　陰得尺中一寸陽得寸內九分一寸九分寸

關尺脈三分分之一分也左關一分名人迎肝膽脈也肝膽主風故人迎緊盛主乎傷風右關一分名氣口脾胃脈也脾胃主食故氣口緊盛主乎傷食此創自叔和試之於診每多不應然爲後世所宗不得不姑存其說觀內經以足陽明胃經頸上之動脈爲人迎手太陰肺經高骨之動脈爲氣口足知其謬矣

脈有七診曰浮中沉上竟下竟左右推尋

註浮者輕下指於皮膚脈間所得之脈也沉者重下指於筋骨間所得之脈也中者不輕不重下指於肌肉間所得之脈也上者兩寸也竟者卽內經上竟上者胸喉中事也下者兩尺也竟者卽內經下竟下者少腹腰股脛足中事也左右者左右手脈也此七診者乃推尋取脈之法也非謂內經獨大獨小獨寒獨熱獨遲獨疾獨陷下七診之脈也

男左大順女右大宜男尺恒虛女尺恒實

註　天道陽盛於左地道陰盛於右故男左女右
脈大爲順宜也天之陽在南陰在北地之陽
在北陰在南陽道常饒陰道常虧故男寸恒
實尺恒虛女寸恒虛尺恒實也
又有三部曰天地人部各有三九候名焉額頰耳
前寸口岐銳下足三陰肝腎脾胃
註　此遵內經三部九候十二經中皆有動脈之
診法也三部謂上中下也曰天地人謂上中
下三部有天地人之名也部各有三九候名

焉謂三部各有天地人三而三之合爲九候
之名也額頰耳前謂兩額兩頰耳前也上部
天兩額之動脈當額厭之分足少陽脈氣所
行以候頭角者也上部地兩頰之動脈卽地
倉人迎之分足陽明脈氣所行以候口齒者
也上部人耳前之動脈卽和髎之分手少陽
脈氣所行以候耳目者也寸口岐銳謂寸口
之動脈手太陰脈氣所行以候肺者也中部

地乃手大指次指岐骨間合谷之動脈手陽明脈氣所行以候胸中者也中部人乃掌後銳骨下神門之動脈手少陰脈氣所行以候心者也下足三陰謂五里太谿箕門肝腎脾胃也下部天乃氣衝下三寸五里之動脈足厥陰脈氣所行以候肝者也下部地乃內踝後跟骨傍太谿之動脈足少陰脈氣所行以候腎者也下部人乃魚腹上越筋間箕門之動脈足太陰脈氣所行以候脾胃者也

寸口大會五十合經不滿其動無氣必凶更加疎數止還不能短死歲內期定難生

註　寸口動脈五十一止合於經常不病之脈也若四十動一止一藏無氣主四歲死三十動一止二藏無氣主三歲死二十動一止三藏無氣主二歲死十動一止四藏無氣主一歲死不滿十動一止五藏無氣若更乍數乍疎止而不能卽還則可期短死一歲之內必難生也

五藏本脈各有所管心浮大散肺浮濇短肝沉弦
長腎沉滑軟從容而和脾中遲緩

註　此言五藏各有所管之本脈必皆不大不小
從容而和始爲五藏不病之脈也

四時平脈緩而和勻春弦夏洪秋毛冬沉

註　此言四時各有應見之平脈必皆不疾不徐
緩而和勻始爲四時不病之脈也

太過實强病生於外不及虛微病生於內

註　外因六氣風寒暑濕燥火之邪脈必洪大緊
數弦長滑實而太過矣內因七情喜怒憂思
悲恐驚之傷脈必虛微細弱短濇濡乳而不
及矣

飲食勞倦診在右關有力爲實無力虛看

註　凡病外不因六氣內不因七情爲不內外因
內傷飲食勞倦也飲食傷胃勞倦傷脾故診
在右關飲食傷形爲有餘故右關脈有力勞
倦傷氣爲不足故右關脈無力也三因百病
之脈不論陰陽浮沉遲數滑濇大小凡有力

皆爲實無力皆爲虛經曰諸陽鼓按之不鼓
諸陰鼓按之鼓甚此之謂歟

凡診病鼓平旦爲準虛靜寧神調息細審

註　經曰常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經鼓未盛絡鼓調勻氣血未亂乃可診有過之鼓又曰診鼓有道虛靜爲寶言無思無慮以虛靜其心惟神凝於指下也調息細審者言醫家調勻自己氣息精細審察也

一呼一吸合爲一息鼓來四至平和之則五至無病閏以太息三至爲遲遲則爲冷六至爲數數則熱證轉遲轉冷轉數轉熱

註　醫者調勻氣息一呼鼓再至一吸鼓再至呼吸定息鼓來四至乃和平之準則也然何以五至無病乎人之氣息時長時短凡鼓三息必有一息之長鼓五息又有一息之長名爲太息如三歲一閏五歲再閏也言鼓必以四至爲平五至便爲太過惟正當太息之時始曰無病此息之長非鼓之急也若非太息正

合四至也至於性急之人五至爲平脈不拘
太息之例蓋性急脈亦急也若一息而脈三
至卽爲遲慢而不及矣遲主冷病若一息而
脈遂六至卽爲急數主熱病若一息僅得二至甚而一至則轉遲而轉冷矣
若一息七至甚而八至九至則轉數而轉熱
矣一至二至八至九至皆死脈也
遲數旣明浮沉須別浮沉遲數辨內外因外因於
天內因於人天有陰陽風雨暗明人喜憂怒思悲
恐驚

註浮脈法天候表之疾卽外因也沉脈法地候
裏之病卽內因也外因者天之六氣風（風淫末疾）
寒（寒淫陰疾）暑（暑淫心疾）濕（濕淫腹疾）燥（燥淫涸疾）火（火淫陽疾）是也
內因者人之七情喜傷心怒傷肝憂思傷脾
悲傷肺恐傷腎驚傷心也

浮沉已辨滑濇當明濇爲血滯滑爲氣壅
註此上六脈爲諸脈之提綱以浮沉統諸浮上
沉下之部位也以遲數統諸三至六至之至

數也以滑濇統諸滑流濇滯之形狀也脈象雖多然不屬部位則屬至數不屬至數則屬形狀總不外此六脈故爲諸脈之提綱也

浮脈皮脈沉脈筋骨肌肉候中部位統屬

註　皮脈取之而得者謂之浮脈筋骨取之而得者謂之沉脈此以上下部位而得名也凡脈因部位而得名者皆統乎浮沉故曰部位統屬也心肺俱浮以皮毛取之而得者肺之浮也以血脈取之而得者心之浮也故曰浮脈皮脈肝腎俱沉以筋平取之而得者肝之沉也以至骨取之而得者腎之沉也故曰沉脈筋骨肌肉在浮沉之間故曰候中也

浮無力濡沉無力弱沉極力牢浮極力革

註　浮而無力謂之濡脈沉而無力謂之弱脈浮而極有力謂之革脈沉而極有力謂之牢脈

三部有力其名曰實三部無力其名曰虛

註　浮中沉三部俱有力謂之實脈浮中沉三部俱無力謂之虛脈

三部無力按之且小似有似無微鈹可考

註　浮中沉三部極無力按之且小似有似無謂之微鈹

三部無力按之且大渙漫不收散鈹可察

註　浮中沉三部極無力按之且大渙漫不收謂之散鈹

惟中無力其名曰芤推筋着骨伏鈹可求

註　浮沉有力中取無力謂之芤鈹推筋着骨按之始得謂之伏鈹已上十鈹皆以部位而得名者故皆統於浮沉也

三至爲遲六至爲數

註　一呼一吸謂之一息一息三至謂之遲鈹一息六至謂之數鈹此以鈹之至數而得名也

凡鈹因至數而得名者皆統乎遲數也

四至爲緩七至疾鈹

註　一息四至謂之緩鈹一息七至謂之疾鈹

緩止曰結數止曰促凡此之診皆統至數動而中止不能自還至數不乖代則難痊

註　四至緩脈時而一止謂之結脈六至數脈時而一止謂之促脈結促之脈動而中止即能自還若動而中止不能自還須臾復動或十至或二三十至一止其至數不乖謂之代脈難痊謂不滿五十動而止合經難痊之死脈也已上五脈皆以至數而得名者故皆統於遲數也

形狀如珠滑溜不定往來濇滯濇脈可證

註　形狀如珠滑溜不定謂之滑脈進退維艱往來滯濇此以脈之形狀而得名也

凡脈以形狀而得名者皆統乎滑濇也

弦細端直且勁曰弦緊比弦粗勁左右彈

註　狀類弓弦細而端直按之且勁謂之弦脈較弦則粗按之且勁左右彈指謂之緊脈

來盛去衰洪脈名顯大則寬濶小則細減

註　上來應指而盛下去減力而衰謂之洪脈脈形粗大濶然謂之大脈脈形細減如絲謂之小脈即細脈也

如豆亂動不移約約長則迢迢短則縮縮

註 其形如豆亂動約約動搖不移謂之動脈來去迢迢而長謂之長脈來去縮縮而短謂之短脈已上八脈皆以形狀而得名者故皆統於滑濇也

浮陽主表風淫六氣有力表實無力表虛浮遲表冷浮緩風濕浮濡傷暑浮散虛極浮洪陽盛浮大陽實浮細氣少浮濇血虛浮數風熱浮緊風寒浮弦風飲浮滑風痰

註 浮陽脈主表風邪六氣外因之病皆從表入故屬之也浮而有力表實風病也浮而無力表虛風病也遲寒脈也故曰表冷緩濕脈也故曰風濕濡氣虛脈也氣虛則傷暑故曰浮濡傷暑也散氣散脈也氣散則虛極故曰浮散虛極也浮洪陽盛脈故曰陽盛也浮大陽實也細氣少脈氣少不充故曰氣少也濇血少脈血少枯滯故曰血虛也數熱脈也故曰風熱緊寒脈也故曰風寒弦飲

脈也故曰風飲滑痰脈也故曰風痰

沉陰主裏七情氣食沉大裏實沉小裏虛沉遲裏冷沉緩裏濕沉緊冷痛沉數熱極沉濇痺氣沉滑痰食沉伏閉鬱沉弦飲疾

註　沉陰脈主裏七情氣食內因之病皆由裏生故屬之也大有餘脈也故曰裏實小不足脈也故曰裏虛遲寒脈也故曰裏冷緩濕脈也故曰裏濕緊寒脈也故曰冷痛數熱脈也故曰熱極濇血滯脈故曰痺氣滑痰食脈故曰痰食伏痛甚不得吐瀉脈也故曰閉鬱弦飲脈也故曰飲疾

濡陽虛病弱陰虛疾微主諸虛散爲虛劇

註　濡爲陽分無力脈故主諸陽虛之病弱爲陰分無力脈故主諸陰虛之病微爲陰陽血氣不足脈故主諸虛散爲元氣散之脈故曰虛劇也

革傷精血半產帶崩牢疝癥瘕心腹寒疼

註　革內空之脈故主男子亡血傷精之病婦人

半產崩帶之疾牢內堅之虛故主諸痂癥瘕
心腹寒冷疼痛之病也

虛主諸虛實主諸實芤主失血隨見可知

註 虛爲三部無力虛故主諸虛實爲三部有力
虛故主諸實芤爲營空之虛故主失血然此
三虛皆隨所見之部位可知其上下內外之
病也

遲寒主藏陰冷相干有力寒痛無力虛寒

註 遲陰虛也藏屬陰故主之凡陰冷之病皆屬
之也有力爲寒實作痛無力爲寒虛痛也

數熱主府數細陰傷有力實熱無力虛瘡

註 數陽虛也府屬陽故主之凡陽屬之病皆屬
之也數爲陽盛細爲不足故曰傷陰有力爲
實熱無力爲虛熱數亦主瘡故曰虛瘡

緩濕脾胃堅大濕壅促爲陽鬱結則陰凝

註 緩脾胃虛又主濕濕邪故緩主濕邪脾胃之病
若搏指堅大則爲濕邪壅脹之病促爲陽盛
而鬱之虛結爲陰盛而凝之虛也

代則氣乏跌打悶絶奪氣痛瘡女胎三月

註　代者眞氣乏而求代之脈也若不因跌打氣悶暴病奪氣痛瘡傷氣女胎氣阻者而無故見之則必死也

滑司痰病關主食風寸候吐逆尺便血膿

註　滑陽脈陽盛爲痰故司痰病右關候胃故主痰食左關候肝故主風痰寸候上焦故主吐逆尺候下焦故主便血膿也

濇虛濕痺尺精血傷寸汗津竭關腸液亡

註　濇血少滯濇脈也六脈見之則主營虛受濕痺之病若兩尺見之則主傷精傷血之病兩寸見之則主汗多津傷之病兩關見之則主噎膈反胃液亡結腸之病也

弦關主飲木侮脾經寸弦頭痛尺弦腹疼

註　弦陰脈陰盛爲飲弦木脈木旺侮土土虛不能制濕故飲病生焉寸弦陰乘陽也故主頭痛尺弦陰乘陰也故主腹疼

緊主寒痛洪是火傷動主痛熱崩汗驚狂

註　緊寒實鱍故主寒痛洪熱實鱍故主火傷動爲陰陽相搏之陽鱍故主諸痛陽動主發熱主驚狂陰動主汗出血崩也

長則氣治短則氣病細則氣衰大則病進

註　長者氣之暢也故曰氣治短者氣之縮也故曰氣病小者正氣衰也大者邪病進也

鱍之主病有宜不宜陰陽順逆吉凶可推

註　病有陰陽鱍亦有陰陽順應則吉逆見則凶此以下至其死可測句凡二十七節詳分某

病見某鱍吉某病見某鱍凶也

中風之鱍却喜浮遲堅大急疾其凶可知

註　中風虛見虛鱍以浮遲爲順若反見堅大急疾爲逆決無生理

傷寒熱病鱍喜浮洪沉微濇小證反必凶汗後鱍靜身涼則安汗後鱍躁熱甚必難陽證見陰命必危殆陰證見陽雖困無害

註　此節皆言傷寒之順逆也傷寒熱病傳裏屬熱鱍以浮洪陽鱍爲吉若見沉微濇小陰鱍

是證與躁反故凶汗後邪解便當躁靜身涼若躁而熱所謂汗後不爲汗衰名曰陰陽交必難治矣陽證而見沉濇細微弱遲之陰躁則躁與證反命必危殆陰證而見浮大數動洪滑之陽躁雖躁與證反在他證忌之獨傷寒爲陰邪還陽將解之診病雖危困無害於命也

勞倦傷脾躁當虛弱自汗躁死不可却

註　勞倦傷脾躁當虛弱爲順也若自汗出而躁反躁疾則逆矣安得不死

瘧躁自弦弦遲多寒弦數多熱代散則難

註　瘧爲寒熱之病弦爲少陽之躁少陽主病寒熱往來凡寒熱之病多屬少陽半表半裏之界故瘧躁自應得弦象也遲多寒數多熱理自然也若得代散二躁邪尚未解正氣已衰命則難生矣

洩瀉下利沉小滑弱實大浮數發熱則惡

註　瀉痢裏虛宜見沉小滑弱之躁爲順若反見

實大浮數之脈則身必發熱而成惡候也

嘔吐反胃浮滑者昌沉數細濇結腸者亡

註　嘔吐反胃脾虛有痰也浮爲虛滑爲痰是爲順脈故曰昌也若沉數細濇則爲氣少液枯遂致結腸糞如羊屎死不可救矣

霍亂之候脈代勿訝舌卷囊縮厥伏可嗟

註　霍亂之診陽脈爲佳若見代脈因一時清濁混亂故脈不接續非死候也如脈伏不見四肢厥逆舌卷囊縮爲陰寒甚則有可嗟之變也

嗽脈多浮浮濡易治沉伏而緊死期將至

註　嗽乃肺疾脈浮爲宜兼見濡者病將退也若沉伏與緊則相反而病深矣不死何待

喘息擡肩浮滑是順沉濇肢寒切爲逆證

註　陽喘多實風與痰耳故脈以浮滑爲順陰喘多虛寒與虛也故脈沉濇四肢寒者均爲不治逆證

火熱之證洪數爲宜微弱無神根本脫離

註　熱證而得洪數乃正應也若見微弱證脈相反根本脫離藥餌不可施矣

骨蒸發熱脈數而虛熱而濇小必殞其軀

註　骨蒸者腎水不足壯火僭上虛數二脈是正象也若濇小之脈所謂發熱脈靜不可救耳

勞極諸虛浮軟微弱土敗雙弦火炎細數

註　虛證宜見虛脈若兩關脈弦謂之雙弦弦乃肝木乘脾故曰土敗勞證之脈右關見之是肝脈

之脈若見細數乃陰虛火盛上刑肺金便不

可治

失血諸證脈必見芤緩小可喜數大堪憂

註　芤有中空之象失血者宜爾也緩小亦爲虛脈順而可喜若數且大謂之邪勝故可憂也

畜血在中牢大却宜沉濇而微速愈者稀

註　畜血者有形之實證見牢大之脈脈證相宜

倘沉濇而微是挾虛矣既不能自行其血又

難施峻猛之劑安望速愈也

三消之脈數大者生細微短濇應手堪驚

註　渴而多飲爲上消消穀善饑爲中消渴而便數爲下消三消者皆燥熱太過惟見數大之脈爲吉耳細微短濇死不可救也

小便淋閉鼻色必黃實大可療濇小知亡

註　鼻頭色黃必患小便難六脈實大者但用攻病之劑必愈若逢濇小爲精氣不化死亡將及矣

癲乃重陰狂乃重陽浮洪吉象沉急凶殃

註　癲狂二證皆以浮洪爲吉取其病尚淺也若沉而急病已入骨雖有扁倉莫之能救矣

癇宜浮緩沉小急實但弦無胃必死不失

註　癇本風痰脈見浮緩自應然也若沉小急實是病深也或但弦無胃則肝之眞藏脈見矣安望其更生耶

心腹之痛其類有九細遲速愈浮大延久

註　九種心腹之痛皆宜遲細易於施療如浮而大是爲中虛邪盛不能收捷功也

疝屬肝病脈必弦急牢急者生弱急者死

註　肝主筋疝則筋急故屬肝也肝脈弦急是其常也疝係陰寒之咎牢主裏寒之脈亦其常也如且弱且急必有性命之憂矣

黃疸濕熱洪數便宜不妨浮大微濇難醫

註　濕蒸熱瘀黃疸生焉洪數浮大皆所宜也一見微濇虛衰已甚必食少瀉多無藥可療矣

腫脹之脈浮大洪實細而沉微岐黃無術

註　水腫脹滿有餘之證宜見有餘之脈浮大洪實是矣沉細而微謂之證實脈虛難言生矣

五藏爲積六府爲聚實强可生沉細難愈

註　積聚皆實證也實脈强盛是所當然沉細爲虛眞氣敗絕不可爲矣

中惡腹脹緊細乃生浮大爲何邪氣已深

註　中惡者不正之氣也緊細則吉浮大則凶也

鬼祟之脈左右不齊乍大乍小乍數乍遲

註　鬼祟犯人左右二手脈象不一忽大忽小忽數忽遲無一定之脈形也

癰疽未潰洪大脈宜及其已潰洪大最忌

註　未潰屬實洪大爲正脈也潰後則虛若仍見洪大則爲邪脈最所忌也

肺癰已成寸數而實肺痿之證數而無力癰痿色白脈宜短濇數大相逢氣損血失腸癰實熱滑數相宜沉細無根其死可期

註　肺癰而寸口數實知膿已成矣肺葉焦痿爲火傷也是以數而無力肺癰肺痿得白色者肺之本色得短濇者肺之本脈均相宜也若逢數大是火來尅金賊邪之診故氣損血失也腸癰實也滑數相宜沉細虛也證實脈虛死期將至矣

婦人有子陰搏陽別少陰動甚其胎已結滑疾而散胎必三月按之不散五月可別左男右女孕乳是主女腹如箕男腹如釜

註　此一節明女科胎前之脈也陰搏陽別者寸爲陽尺爲陰言尺陰之脈搏指而動寸陽之脈則不搏指廻然分別此有子之診也或手少陰心脈獨動而甚者蓋心主血血主胎故

胎結而動甚也動者謂往來流利之動而滑非厥厥搖動爲病之動也疾即數也滑而且數按之而散三月之胎也按之不散五月之胎也左爲陽故左疾爲男胎右爲陰故右疾爲女胎五六月後孕婦之乳房有核吮之有乳者則主有子也女胎腹形狀如箕之圓也男胎腹形狀如釜之上小而下大也

欲產離經新產小緩實弦牢大其凶不免

註　此一節明產中之脈也欲產脈離經者謂見離乎經常之脈也蓋胎動於中脈亂於外勢所必然也產後氣血兩虛見小緩之虛脈爲吉若見實大弦牢其凶不免矣

經脈病脈業已昭詳將絕之形更當度量

註　經常之脈主病之脈皆明於前矣而死絕之脈亦不可不察也分列於後

心絕之脈如捻帶鉤轉豆躁疾一日可憂

註　經曰脈來前曲後居如捻帶鉤曰心絕前曲者謂輕取則堅強而不柔後居者謂重取則

牢實而不動如持革帶之鉤全失冲和之氣

但鉤無胃故曰心死鉤卽洪脈也轉豆者卽

經所謂如循薏苡子纍纍然狀其短實堅強

眞藏脈也又曰心絕一日死

肝絕之脈循刃責責新張弓弦死在八日

註　經曰眞肝脈至中外急如循刃又曰脈來急

溢勁如新張弓弦曰肝死又曰肝絕八日死

脾絕雀啄又同屋漏覆杯水流四日無救

註　舊訣曰雀啄連來四五啄屋漏少刻一點落

若杯覆若水流皆脾絕也經曰脾絕四日死

肺絕維何如風吹毛毛羽中膚三日而號

註　經曰如風吹毛毛羽中膚皆狀其但浮而無胃氣也又曰

毛羽中人膚皆狀其但浮而無胃氣也又曰

肺絕三日死

腎絕伊何發如奪索辟辟彈石四日而作

註　經曰脈來如奪索辟辟如彈石曰腎死又曰

腎絕四日死舊訣云彈石硬來尋卽散搭指

散亂如解索正此謂也石卽沉脈也

命脈將絕魚翔鰕遊至如湧泉莫可挽留

註　舊訣云魚翔似有又似無鰕遊靜中忽一躍

經曰渾渾革至如湧泉綿綿其去如弦絕皆

死脈也

脈有反關動在臂後別由列缺不干證候

註　反關脈者脈不行於寸口出列缺絡入臂後

手陽明大腸之經也以其不順行於關上故

曰反關有一手反關者有兩手反關者此得

於有生之初非病脈也令病人側立其手診

之方可見也

岐黃脈法候病死生太素脈法陰陽貴清清如潤

玉至數分明濁脈如石糢糊不清小大貧富濇滑

窮通長短壽夭詳推錯綜

註　脈法倡自岐黃所以候病死生至楊上善爲

風鑑者流托名太素脈法以神其說每多不

驗然其中有近理可採者如論六陽六陰之

脈以清主貴以濁主賤清脈之狀似玉潤淨

至數分明濁脈之狀如石粗澁至數糢糊小

訂正素問脈位圖



脈主貧大脈主富濇脈主窮滑脈主通長脈主壽短脈主夭如質清脈濁貴中賤也質濁脈清賤中貴也清脈兼大貴而富也兼滑貴而通也兼長貴而壽也濁脈兼小賤而貧也兼濇賤而窮也兼短賤而夭也清脈兼小貴而貧也兼濇貴而窮也兼短貴而夭也濁脈兼大賤而富也兼滑賤而通也兼長賤而壽也詳推錯綜者卽詳推此質清脈清質濁脈濁質清脈濁質濁脈清錯綜等說之理耳

附訂正素問鉅要精微論一則備考

尺內兩傍則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中左外以候心內以候膻中前以候前後以候後上竟上者胸喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也

註　內外二字前人有以尺部一鉅前半部鉅後半部鉅爲訓者有以內側曰內外側曰外爲訓者皆非也蓋鉅之形渾然純一並不兩條亦不兩截若以前半部後半部爲是則視鉅爲兩截矣若以尺內側尺外側爲是則視鉅爲兩條矣故知二說皆非也熟玩通章經文自知其爲傳寫之訛豈有獨於脾胃則曰右外以候胃內以候脾者耶蓋外以候府內以候藏內經鉅書確然可考故當以外以候胃內以候脾之句爲正其尺外之外字當是裏字尺裏之裏字當是外字中附上左右之內外字皆當改之故不

循舊圖所列以符外候府內候藏之義也前以候前謂關之前寸也後以候後謂關之後尺也上竟上者謂上盡魚際也下竟下者謂下盡尺澤也

御纂醫宗金鑑運氣要訣

五十三卷

T7910/7388

36

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

ChL 7918.7638

卷三十五

太虛圖起至衝陽諸鉅派穴圖止



御纂醫宗金鑑卷三十五

編輯運氣要訣目錄

太虛圖

陰陽圖

太虛理氣天地陰陽詩

五行圖

五行生尅制化圖

五行質氣生尅制化詩

五運合藏腑十二經絡圖

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

六氣合臟腑十二經絡圖
運氣合臟腑十二經絡詞
主運圖
主運詞
主氣圖
主氣詞
客運圖
客運詞
客氣司天在泉間氣圖
客氣司天在泉間氣詞
五運節令圖
五運節令詞
六氣節令圖
運氣分主節令詞
五音太少相生圖
五音太少相生詞
五音主客太少相生詞
五運齊化兼化圖
五運齊化兼化詞
六氣正化對化圖
六氣正化對化詞
五運齊化兼化六氣正化對化圖詞

六十年運氣上下相臨圖
六十年運氣上下相臨謌
指掌圖
起主客定位指掌謌
天符圖
歲會圖
同天符同歲會圖
天符太乙天符歲會同天符同歲會謌
執法行令貴人謌

南北政圖
南政年鉅不應圖
北政年鉅不應圖
南北政年鉅不應謌
五運氣令微甚謌
五運平氣太過不及謌
運氣所至先後時謌
運氣亢害承制謌
六氣勝復謌

五行鬱極乃發論
天時地化五病二火論
五星所見太過不及論
五行德政令化災變論
五行地化蟲畜穀果有太過不及齊兼化論
運氣爲病論
五運客運太過爲病論
六氣客氣主病論
運氣當審常變論

附衝陽諸脈穴圖

御纂醫宗金鑑卷三十五

編輯運氣要訣

經曰夫五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也可不通乎又曰治不法天之紀地之理則災害至矣又曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣由是觀之不知運氣而爲醫欲其無失者鮮矣茲將內經運氣要語編成歌訣并列圖於前使學者一覽卽明其

大綱旨要之所在然後編求全經精義庶乎有得云

太虛圖



太虛者太極也太極本無極故名曰太虛素問天元紀大論曰太虛寥廓肇基化元萬物資始五運終天布氣真靈總統坤元九星懸朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸章

陰陽圖



來知德易經註曰對待者數流行者氣主宰者理即此三句而天地萬物無不包括其中矣

太虛理氣天地陰陽歌

無極太虛氣中理太極太虛理中氣乘氣動靜生陰陽陰陽陰陽之分爲天地未有天地氣生形已有天地形寓氣從形究氣曰陰陽即氣觀理曰太極

註　太者極其至大之謂也虛者空虛無物之謂也蓋極大極虛無聲無臭之中具有極大極至之理氣焉理氣未分而混沌者太虛也太虛曰無極者是主太虛流行之氣中主宰之理而言也太虛曰太極者是主太虛主宰之

理中流行之氣而言也故周子曰無極而太極者亦是以極無而推極有也蓋極無中無是而非理極有中無是而非氣不以極無之理而推極有之氣而推極無之理何以知有是氣也不以極有之氣而推極無之理何以知有是理也是則可知理氣以其分殊而言之二也以其渾合而言之一也有是理則有是氣有是氣則有是理名雖有二其實則一本無有無一二先後之可言也乘氣動靜生陰陽者謂太極乘氣機之動而生陽乘氣機之靜而生陰即周子曰太極動而生陽動而生陽靜而生陰而曰太極動不曰無極動而生陽靜而生陰蓋以無極專主乎理言理無動靜故也太極兼主乎氣言氣有動靜故也陰陽之分爲天地者謂陰陽流行相生不已積陽之清者爲天積陰之濁者爲地故周子曰分陰分陽兩儀立焉也未有天地氣生形者謂未有天地惟太虛中之一氣化生

天地之形也已有天地形寓氣者謂已有天地而太虛之氣即已寓於天地之形也是以天得之以資萬物之始地得之以資萬物之生也從形究氣曰陰陽者陰陽即理中流行之氣也即氣觀理曰太極者太極即氣中主宰之理也故周子曰陰陽一太極者是指氣之極者而言也太極本無極者是指理之極者而言也

按吳澄曰太極無動靜動靜者氣機也是以太極專主乎理言也朱子曰太極之有動靜是天命之流行也是以太極兼主乎氣言也又曰太虛者本然之妙也動靜者所乘之機也本然之妙即太極指其本然主宰是動是靜之妙之理也所乘之機即動靜指其天命流行乘動乘靜之機之氣也當依朱子爲是

五行生尅制化圖


水生木
木生火
火生土
土生金
金生水
水尅火
木尅土
火尅金
土尅水
金尅木
水制火
木制土
火制金
土制水
金制木
水子木
木子火
火子土
土子金
金子水

五行圖


水質寒氣布冬
木質風氣布春
火質暑氣布夏
土質濕氣布長夏
金質燥氣布秋

五行質氣生尅制化歌

天地陰陽生五行各一其質各一氣質具於地氣
行天五行順布四時序木火土金水相生木土水
火金尅制亢害承制生化生生化化萬物立

註　天地既立而陰陽即在天地之中陽動而變
陰靜而合生五行也天一生水地六成之地
二生火天七成之天三生木地八成之地四
生金天九成之天五生土地十成之是五行
各一其質也東方生木木之氣風南方生火

火之氣熱中央生土土之氣濕西方生金金
之氣燥北方生水水之氣寒是五行各一其
氣也在地曰木在天曰風在地曰火在天曰
熱在地曰土在天曰濕在地曰金在天曰燥
在地曰水在天曰寒是五行質具于地氣行
於天也木位東方風氣布春火位南方熱氣
布夏土位中央四維濕氣布長夏金位西方
燥氣布秋水位北方寒氣布冬是五氣順布
四時之序也即周子曰陽變陰合而生水火

木金土五氣順布四時行焉木生火火生土
土生金金生水水復生木是五行相生主生
養萬物者也木尅土土尅水水尅火火尅金
金尅木木復尅土是五行相尅主殺害萬物
者也相尅則死相制則生木亢害土土亢害
水水亢害火火亢害金金亢害木此尅其所
勝者也然我之所勝之子卽我之所不勝者
也我畏彼子出救母害不敢妄行承受迺制
制則生化則各恒其德而生化萬物無不具
也假如木亢太過土受害矣是我勝其我之
所勝者也土之子金承而制則我畏我之
所不勝自然承受迺制制則生化矣火亢太
過金受制矣金之子水承而制焉土亢太過
水受制矣水之子木承而制焉金亢太過木
受制矣木之子火承而制焉水亢太過火受
制矣火之子土承而制焉五行皆若此也此
所以相生而不害相制而不尅也而生生化
化萬物立命之道卽在於是矣此五行生尅

制化之理不可不知者也

五運合藏腑十二經絡圖



六氣合臟腑十二經絡圖



運氣合臟腑十二經絡謌

醫明陰陽五行理始曉天時民病情五運五行五氣化六氣天地陰陽生火分君相氣熱暑爲合人之藏腑經天干起運地支氣天五地六節制成

註　學醫業者必要明天地之生病之情由也人皆知天時之和不和民之生病之情由也人皆知五運化自五行五質五氣也而不知六氣化自天地陰陽六質六氣也六質者卽經曰木火土金水火地之陰陽也生長化收藏下應

之也六氣者卽經曰風暑濕燥寒火天之陰陽也三陰三陽上奉之也是以在地之火分爲君火相火在天之氣分爲熱氣暑氣爲合人之五臟六腑包絡十二經也天干陰陽合而爲五故主五運甲化陽土合人之胃己化陰土合人之脾乙化陰金合人之肺庚化陽金合人大腸丙化陽水合人膀胱辛化陰水合人之腎丁化陰木合人之肝壬化陽木合人之膽戊化陽火合人小腸癸化陰火合人之心相火屬陽者合人三焦相火屬陰者合人包絡此天干合人之五臟六腑十二經也

地支陰陽合而爲六故主六氣子午主少陰君火合人之心與小腸也丑未主太陰濕土合人之脾與胃也寅申主少陽相火合人之三焦包絡也卯酉主陽明燥金合人之肺與大腸也辰戌主太陽寒水合人之膀胱與腎也巳亥主厥陰風木合人之肝與膽也此地支之合人之五臟六腑十二經也天數五而

五陰五陽故爲十干地數六而六陰六陽故爲十二支天干之五必得地支之六以爲節地支之六必得天干之五以爲制而後六甲成歲氣備故一歲中運以七十二日五位分主之六氣以六十日六步分主之也

按十二經天干謂內云甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾鄉庚屬大腸辛屬肺壬屬膀胱癸腎藏三焦亦向壬中寄包絡同歸入癸方此以方位言天干所屬配合臟腑歲歲之常也今以五運言天干所化配合臟腑年年之變所以不同也十二經地支謂內云肺寅大卯胃辰宮脾巳心午小未中申胱酉腎心包戌亥焦子膽丑肝通此以流行言地支所屬配合臟腑日日之常也今以六氣言地支所化配合臟腑年年之變所以不同也讀者審之

主運圖



主運謌

五運五行御五位五氣相生順令行此是常令年不易然有相得或逆從運有太過不及理人有虛實寒熱情天時不和萬物病民病合人臟腑生

註　主運者主運行四時之常令也五行者木火土金水也五位者東南中西北也五氣者風暑濕燥寒也木御東方風氣順布春令是初之運也火御南方暑氣順布夏令是二之運也土御中央四維濕氣順布長夏之令是三

之運也金御西方燥氣順布秋令是四之運也水御北方寒氣順布冬令是五之運也此是天以五爲制分五方主之五運五氣相生四時常令年年相仍而不易也然其中之氣化有相得或不相得或從天氣或逆天氣或從天氣而逆地氣或逆天氣而從地氣故運有太過不及四時不和之理人有臟腑經絡虛實寒熱不同之情始召外邪令化而生病也天時不和萬物皆病而爲民病者亦必因其人臟腑不和而生也

主氣圖



主氣詞

主氣六位同主運顯明之右君位知退行一步相火治復行一步土治之復行一步金氣治復行一步水治之復行一步木氣治復行一步君治之

註　主氣者厥陰風木主春初之氣也少陰君火主夏二之氣也少陽相火主盛夏三之氣也太陰濕土主長夏四之氣也陽明燥金主秋五之氣也太陽寒水主冬六之氣也此是地以六爲節分六位主之六氣相生同主運五

氣相生四時之常令也顯明者正南之位當
君位也而君火不在位治之反退位于次以
相火代君火司化則當知卽經云少陰不司
氣化之義也正南客氣司天之位也司天之
右天之右間位也在主氣爲二之氣位是少
陰君火之位主行夏令之氣也故曰顯明之
右君火之位也君火之右退行一步乃客氣
司天之位也在主氣爲三之氣位是少陽相
火之位主行盛夏之令之氣也不曰復行而
曰退行者以臣對君之面承命司化不敢背
行故曰退行一步卽復行一步也復行一步
土氣治之乃客氣天之左間位也在主氣爲
四之氣位是太陰濕土之位主行長夏令之
氣也復行一步金氣治之乃客氣地之右間
位也在主氣爲五之氣位是陽明燥金之位
主行秋令之氣也復行一步水氣治之乃客
氣在泉之位也在主氣爲六之氣位是太陽
寒水之位主行冬令之氣也復行一步木氣

治之乃客氣地之左間位也在主氣爲初之氣位是厥陰風木之位主行春令之氣也復行一步君火治之即前君火之位治之也

客運圖


己丑運土初
庚寅運金初
辛卯運金初
壬辰運水初
癸巳運水初
甲午運火初
乙未運火初
丙申運土初
丁酉運土初
戊戌運火初
己亥運火初
庚子運土初
辛丑運土初
壬寅運木初
癸卯運木初
甲辰運土初
乙巳運土初
丙午運火初
丁未運火初
戊申運土初
己酉運土初
庚戌運金初
辛亥運金初
壬子運水初
癸丑運水初
甲寅運木初
乙卯運木初
丙辰運土初
丁巳運土初
戊午運火初
己未運火初
庚申運金初
辛酉運金初
壬戌運水初
癸亥運水初
甲子運木初
乙丑運木初
丙寅運火初
丁卯運火初
戊辰運土初
己巳運土初
庚午運金初
辛未運金初
壬申運水初
癸酉運水初
甲戌運木初
乙亥運木初
丙子運火初
丁丑運火初
戊寅運土初
己卯運土初
庚辰運金初
辛巳運金初
壬午運水初
癸未運水初
甲申運木初
乙酉運木初
丙戌運火初
丁亥運火初
戊子運土初
己丑運土初
庚寅運金初
辛卯運金初
壬辰運水初
癸巳運水初
甲午運木初
乙未運木初
丙申運火初
丁酉運火初
戊戌運土初
己亥運土初
庚子運金初
辛丑運金初
壬寅運水初
癸卯運水初
甲辰運木初
乙巳運木初
丙午運火初
丁未運火初
戊申運土初
己酉運土初
庚戌運金初
辛亥運金初
壬子運水初
癸丑運水初
甲寅運木初
乙卯運木初
丙辰運火初
丁巳運火初
戊午運土初
己未運土

黔音金

客運謌

五天蒼丹黔玄素天氣天干合化臨甲巳化土丙辛水丁壬化木乙庚金戊癸化火五客運起以中運相生輪陰少乙丁巳辛癸陽太甲丙戊庚壬

註五天者蒼天天之色青者也丹天天之色赤者也黔天天之色黃者也玄天天之色黑者也素天天之色白者也天氣者蒼天之氣木也丹天之氣火也黔天之氣土也玄天之氣水也素天之氣金也天干者甲乙丙丁戊巳庚辛壬癸也古聖仰觀五天五氣蒼天木氣下臨丁壬之方故識丁壬合化而生木運也丹天火氣下臨戊癸之方故識戊癸合化而生火運也黔天土氣下臨甲己之方故識甲巳合化而生土運也玄天水氣下臨丙辛之方故識丙辛合化而生水運也素天金氣下臨乙庚之方故識乙庚合化而生金運也此天氣天干合化加臨主運五位之客運也起以所化統主本年中運爲初運五行相生以

客氣司天在泉間氣圖

次輪取如甲已之年土運統之起初運土生金爲二運金生水爲三運水生木爲四運木生火爲五運餘四運皆倣土運起之乙丁已辛癸屬陰干爲五陰年主五少不及之運甲丙戊庚壬屬陽干爲五陽年主五太太過之運也

客氣司天在泉間氣此言地之陰陽正化對子午少陰君火天陽明燥金應在泉丑未太陰太陽治寅申少陽厥陰聯卯酉却與子午倒辰戌已亥亦皆然每歲天泉四間氣上下分統各半年

註　天干起運地支起氣此言地之陰陽正化對化加臨主氣六位之客氣也如子午之歲少陰君火治之起司天也陽明燥金在下起在泉也氣由下而升上故以在下之陽明起之陽明二陽二陽生三陽三陽太陽故太陽寒水爲客初氣卽地之左間也三陽陽極生一陰一陰厥陰故厥陰爲客二氣卽天之右間也一陰生二陰二陰少陰故少陰爲客三氣卽司天之氣也二陰生三陰三陰太陰故太陰爲客四氣卽天之左間也三陰陰極生一陽一陽少陽故少陽爲客五氣卽地之右間也一陽生二陽二陽陽明故陽明爲客六氣卽在泉之氣也丑未寅申之歲皆倣此法起之卯酉却與子午倒換辰戌却與丑未倒換

己亥却與寅申倒換謂卯酉之歲陽明燥金司天少陰君火在泉辰戌之歲太陽寒水司天太陰濕土在泉巳亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉彼此倒換也每歲司天在泉左右四間氣者即六氣分統上下本年司天統主上半年在泉統主下半年之統氣也

五運節令圖



六氣節令圖



運氣分主節令謌

大立雨驚春清穀立滿芒夏小大暑立處白秋寒霜立小大冬小從頭數初大二春十三日三運芒種十日甫四運處暑後七日五運立冬四日主

註　天以六爲節謂以二十四氣六分分之爲六氣之六步也地以五爲制謂以二十四氣五分分之爲五運之五位也二十四氣卽大寒立春雨水驚蟄主初之氣也春分清明穀雨立夏主二之氣也小滿芒種夏至小暑主三

之氣也大暑立秋處暑白露主四之氣也秋分寒露霜降立冬主五之氣也小雪大雪冬至小寒主終之氣也此主氣客氣分主六步之時也大寒起至春分後十二日主初運也春分十三日起至芒種後九日主二運也芒種十日起至暑處後六日主三運也暑處七日起至立冬後三日主四運也立冬四日起至小寒末日主五運也此主運客運分主五位之時也

五音太少相生圖



五音主客太少相生訣

主運角徵宮商羽五音太少中運取如逢太徵太商年必是少角少宮羽若逢太角宮羽年必是少商與少徵以客取主太少生以主定客重角羽

註　主運之音必始角而終羽者乃五音分主四時順布之常序也然陽年爲太陰年爲少者是五音四時太過不及之變化也如逢戊年太徵庚年太商之年則主運初運必是少角二運則是太徵三運必是少宮四運則是太商終運必是少羽也若逢壬年太角甲年太宮丙年太羽之年則主運初運則是太角二運必是少徵三運則是少商終運則是太羽也故曰太少皆以中運取此是以客之中運取主之五運太少相生之義也又以主之太少定客之五運太少相重之法以發明相加相臨太過不及之理也

五運齊化兼化圖



六氣正化對化圖



正司化令之實

對司化令之虛

五運齊化兼化六氣正化對化論

運過勝已乘衰勝已兼太過被尅不及助皆爲正化是平年氣寅午未酉戌亥正司化令有餘看子丑卯辰巳申歲對司化令不足言

註五運之中運統主一年之運也中運太過則旺勝已者則畏其盛反齊其化矣如太宮土運反齊木化太角木運反齊金化太商金運反齊火化太徵火運反齊水化太羽水運反齊土化也卽經所謂畏其旺反同其化薄其所不勝也中運不及則弱勝已者則乘其衰來兼其化矣如少宮土運木來兼化少角木運金來兼化少商金運火來兼化少徵火運水來兼化少羽水運土來兼化卽經所謂乘其弱來同其化所不勝薄之也中運戊辰陽年火運太過遇寒水司天則爲太過被制中運乙卯陰年金運不及遇燥金司天則爲同氣中運辛卯陰年水運不及則爲相生俱爲不及得助凡遇此類皆爲正化平和之年也

氣者六氣之客氣統一歲之司化之氣也如厥陰司己亥以厥陰屬木木生於亥故正化於亥對化於己也少陰司子午以少陰爲君火當正南離位故正化於午對化於子也太陰司丑未以太陰屬土居中主於西南未宮陽屬相火位甲於君火火生於寅故正化於寅對化於申也陽明司卯酉以陽明屬金酉爲西方金位故正化於酉對化於卯也太陽司辰戌以太陽爲水辰戌屬土然水行土中而戌居西北屬水漸王之鄉是以洪範五行以戌屬水故正化於戌對化於辰也是以寅午未酉戌亥爲正化正化者令之實主有餘也子丑卯辰巳申爲對化對化者令之虛主不足也

六十年運氣上下相臨圖



六十年運氣上下相臨詞

客運中運主一歲客氣天泉主半年氣生中運曰順化運被氣尅天刑言運生天氣乃小逆運尅司天不和愆氣運相同天符歲另有天符歲會叅

註　客運之初運即統主一歲之中運也經曰甲已之歲土運統之云云者是也客氣司天之三氣六氣即統主上半年在泉統主下半年之氣也經曰歲半以前天氣主之歲半以後地氣主之者是也六十年中運氣上下臨遇

則有相得不相得者也氣生中運者謂司天生中運也如癸己癸亥木生火也甲子甲午甲寅甲申火生土也乙丑乙未土生金也辛卯辛酉金生水也壬辰壬戌水生木也六十年中有此十二年天氣生運以上生下故名順化爲相得之歲也運被氣尅者謂司天尅中運也如己巳己亥木尅土也辛丑辛未土尅水也戊辰戊戌水尅火也庚子庚午庚寅庚申火尅金也壬寅壬申木生火也辛己辛亥水生木也庚辰庚戌金生水也丁卯丁酉金尅木也六十年中有此十二年天氣尅運以上尅下故名天刑爲不相得之歲也運生天氣者謂中運生司天也如癸丑癸未火生土也壬子壬午壬寅壬申木生火也辛己辛亥水生木也庚辰庚戌金生水也己卯己酉土生金也六十年中有此十二年運生天氣以下生上雖曰相生然子居母上故爲小逆而主微病也運尅司天者謂中運尅司天也如乙己乙亥金尅木也丙子丙午丙寅丙申水尅火也丁丑丁

未木尅土也癸卯火尅金也甲辰甲戌土尅水也六十年中有此十二年運尅天氣以下尅上故名不和亦爲不相得而主病甚也氣運相同者如運氣皆木丁己丁亥運氣皆火戊子戊午戊寅戊申運氣皆土巳丑巳未運氣皆金乙卯乙酉運氣皆水丙辰丙戌六十年中有此十二年運氣相同皆天符也雖曰同氣不無偏勝亢害焉其太乙天符歲會等年另詳在後

指掌圖



起主客定位指掌謌

掌中指上定司天中指根紋定在泉順進食指初二位四指四五位推傳司天卽是三氣位在泉六氣位當然主以木火土金水客以陰陽一二三

註　左手仰掌以中指上頭定司天之位中指根紋定在泉之位順進食指三節紋定初之氣位頭節紋定二之氣位中指上頭定三之氣位卽司天之位也第四指頭節紋定四之氣位二節紋定五之氣位中指根紋定六之氣位也主氣以木火土金水者五位卽在泉之位也故初之氣厥陰風木二之氣少陰君火三之氣少陽相火四之氣太陰濕土五之氣陽明燥金六之氣太陽寒水是名之者三陰三陽六氣加臨也故厥陰爲一陰少陰爲二陰太陰爲三陰少陽爲一陽陽明爲二陽太陽爲三陽是一生二二生三三

復生二陰極生陽陽極生陰六步升降之次每歲排取也以此定位主氣客氣燎然在握矣

天符之圖



天符者中運與司天相符也如丁年木運上見厥陰風木司天即丁己之類共十二年太乙天符者如戊午年以火運火支又見少陰君火司天三合爲治也共四年

歲會之圖



歲會者中運與年支同其氣化也如木運臨卯火運臨午火之類共八年

同天符同歲會圖



同天符同歲會者中運與在泉合其氣化也陽年曰同天符陰年曰同歲會如甲辰年陽土運而太陰在泉則爲同天符癸卯年陰火運而少陰在泉則爲同歲會共十二年

天符太乙天符歲會同天符同歲會謂
天符中運同天氣歲會本運臨本支四正四維皆
歲會太乙天符符會俱同天符與同歲會泉同中
運卽同司陰歲名曰同歲會陽年同天符所知

註

天符者謂中運與司天之氣同一氣也如木
運木司天丁己丁亥也火運火司天戊子戊
午戊寅戊申也土運土司天己丑己未也金
運金司天乙卯乙酉也水運水司天丙辰丙
戌也共十二年歲會者謂本運臨本支之位
也如木運臨卯丁卯年也火運臨午戊午年
也金運臨酉乙酉年也水運臨子丙子年也
此是四正土運臨四季甲辰甲戌己丑己未
也此是四維共八年太乙天符者謂天符之
年又是歲會是天氣運氣歲支三者俱會也
如己丑己未中運之土與司天土同氣又土
運臨丑未也乙酉中運之金與司天金同氣
又金運臨酉也戊午中運之火與司天火同
氣又火運臨午也共四年同天符同歲會者

謂在泉之氣與中運之氣同一氣也以陽年名曰同天符如木運木在泉壬寅壬申也土運土在泉甲辰甲戌也金運金在泉庚子庚午也以陰年名曰同歲會如水運水在泉辛丑辛未也火運火在泉癸卯癸酉癸巳癸亥也共十二年此氣運符會之不同人不可不知也右天符十二年太乙天符四年歲會八年同天符六年同歲會六年然太乙天符四年已同在天符十二年中矣歲會八年亦有四年同在天符中矣合而言之六十年中只得二十八年也

執法行令貴人謁

天符執法犯司天歲會行令犯在泉太乙貴人犯天地速危徐持暴死占二火相臨雖相得然有君臣順逆嫌順則病遠其害小逆則病近害速纏

註　邪之中人在天符之年名曰中執法是犯司天天氣天陽也陽性速故其病速而危也邪之中人在歲會之年名曰中行令是犯在泉

地氣地陰也陰性徐故其病徐而持也邪之中人在太乙天符之年名曰中貴人是犯司天在泉之氣天地之氣俱犯故其病暴而死也二火君火相火也雖同氣相得然有君臣順逆之嫌不可不知也君火君也相火臣也君火在上相火在下爲君臨臣則順順則病遠其害小也相火在上君火在下爲臣犯君則逆逆則病近其害速也

南北政圖



北政年虧不應圖



南政年虧不應圖



南北二政鉅不應歌天地之氣行南北甲己一運南政年其餘四運俱爲北少陰隨在不應占北政反診候不應姑存經義待賢參從違非失分微甚尺反陰陽交命難

註　天地之氣謂三陰三陽司天在泉左間右間之客氣也客氣行南政之歲謂之南政行北政之歲謂之北政南政之歲惟甲己一運其餘乙庚丙辛丁壬戊癸四運俱爲北政之年也少陰隨在不應占者謂少陰君火客氣隨在司天在泉左間右間加臨之位主占其鉅不應於診也應於診者卽經曰少陰之至其鉅鉤不應者謂鉅不鉤也南政之年少陰司天則主占兩寸不應在泉則主占兩尺不應厥陰司天其天左間則少陰主占右寸不應厥陰在泉其泉左間則少陰主占左尺不應太陰司天其天右間則少陰主占左寸不應太陰在泉其泉右間則少陰主占右尺不應此皆在客氣少陰之位也北政之年則反診

候其不應皆在客氣陽明之位如少陰司天則主占兩尺不應在泉則主占兩寸不應厥陰司天其天左間則少陰主占左尺不應太陰司天其天右間則少陰主占右尺不應厥陰在泉其泉左間則少陰主占右寸不應太陰在泉其泉右間則少陰主占左寸不應然南政十二年北政四十八年其南政候以正診北政候以反診應與不應之理熟玩經文總令人難解姑存經義以待後之賢者參詳

可也不應之部不應者則爲得其氣而和也不應之部反應者則爲違其氣而病也應左而右應右而左者則爲非其位應上而下應下而上者則爲失其位皆主病也而有微甚之別甚者即尺寸反陰陽交也謂少陰之脈當寸不應反見於尺當尺不應反見於寸是爲尺寸反子午卯酉年有之少陰之脈當左不應反見於右當右不應反見於左是爲陰陽交辰戌丑未寅申巳亥年有之皆主死故

曰命難也

五運氣令微甚歌

運識寒熱温涼正氣審加臨過及平六氣大來皆
邪化五運失和災病生微甚非時卒然至看與何
時氣化并更與年虛月空遇重感於邪證不輕

註　運五運也主四時在天則有寒熱温涼之正
令在地則有生長收藏之正化氣六氣也主
六步在主則有風熱火濕燥寒一定之常候
在客則有六氣加臨太過不及平和之異應
也凡五運六氣之來應時而至無微甚而和
者皆爲平氣也即應時而至或六氣大來或
五運微甚或至非其時或卒然而至皆邪化
失和不平之氣主害物病人也但看與何時
之氣化與病同并則當消息其宜而主治也
五運平氣太過不及
若犯之而病者更與不及之年廓空之月重
感於邪則其證必重而不輕也
木曰敷和火升明土曰備化金審平水曰靜順皆

平運太過木運曰發生火曰赫曦土敦阜水曰流衍金堅成不及委和伏明共甲監從革涸流名

註　太過被抑不及得助皆曰平運木名敷和敷布和氣生萬物也火名升明陽性上升其德明也土名備化土母萬物無不化也金名審平金審而平無妄刑也水名靜順體靜性順喜安瀾也甲丙戊庚壬陽年皆曰太過之運木名發生木氣有餘發生盛也火名赫曦炎陽光盛也土名敦阜敦厚高阜土尤盛也金名堅成堅剛成物金有餘也水名流衍水氣太過流漫衍也乙丁己辛癸陰年皆曰不及之運木名委和和氣委弱發生少也火名伏明火德不彰光明伏也土名卑監土氣不及化卑監也金名從革金氣不及從火革也水名涸流水氣不及涸其流也

運氣所至先後時謂

應時而至氣和平正化承天不妄行太過氣淫先時至侮刑我者乘我刑不及氣迫後時至所勝妄

行刑所生所生被刑受其病我所不勝亦來乘

註　應時而至謂交五運六氣之日之時正當其日其時而氣即至則爲正化平氣承天之令不妄行也如時未至而氣先至來氣有餘則爲太過名曰氣淫即邪化也刑我謂剋我者也我刑謂我剋者也假如木氣有餘剋我之金不能制我金反受木之侮則木盛而土受剋也必矣其年若見肝病爲正邪見肺病爲微邪見脾病則爲賊邪也餘時法此若時已至而氣未至來氣不足則爲不及名曰氣迫亦邪化也所勝謂我所勝即我剋者也所生我所生者也所不勝謂我所不勝即剋我者也假如木氣不及我剋之土無畏妄行則生我之水必受病也木衰金乘其衰亦來刑木爲病也其年若腎病爲實邪見心病爲虛邪見肺病則賊邪也餘時法此推此可知二經三經兼病之理矣

運氣亢害承制謂

運氣亢則皆爲害畏子之制敢不承因有承制則生化亢而無制勝病生勝後子報母讐復被抑屈伏鬱病成鬱極乃發因子弱待時得位自災刑

註　五運六氣太過而極則謂之亢亢則必害我所勝者也假如木亢極則必害我之所勝之土土之子金隨起而制木木畏承受其制則不敢妄刑彼母也此五行有此承制之道自相和順則生化不病矣假如木亢盛而無制則必生勝病勝病者肝受病者脾二經同病也有勝必有復有盛必有衰自然之道也木盛而後必衰土之子金則乘衰必復勝母之讐是則更生復病也復病者肺受病者肝二經同病也餘藏法此若木不及則被金遏抑屈伏不伸而木鬱之病生也然被鬱極而乃發者蓋以木氣不及不能令子火旺故不能復也所以必待其已之得位時而後乃發也雖發而不爲他害但自爲災病亦由本氣弱耳故方其未發之時與勝病同勝病者肺鬱病

者肝及其已發之時不復病肺惟病肝也餘藏法此此上文以太過釋勝不及釋鬱病非謂一歲之太過不及則分司之氣無勝復鬱病也凡太過妄行害彼而病者皆勝病也受害子終不能復鬱而發病者皆鬱病也不及被抑而病者亦鬱病也被鬱待子來報母讐而病者皆復病也推此餘皆可通也

六氣勝復歌

邪氣有餘必有復勝病將除復病萌復已又勝衰乃止有無微甚若權衡時有常位氣無必勝在天三復地終主客有勝而無復主勝客逆客勝從

註六氣有勝則必有復陰陽循環之道也勝病將除復病萌正進退之機也勝已而復復已又勝本無常數必待彼此氣衰乃止自然之理也有勝則復無勝則否勝微復微勝甚復甚猶權衡之不相過也然勝復之動時雖有常位而氣無必也氣無必者謂應勝之年而無勝也時有常位者謂勝之時在前司

天天位主之自初氣以至三氣此爲勝之常也復之時在後在泉地位主之自四氣以至終氣此爲復之常也所謂六氣互相勝復也若至六氣主客則有勝而無復也有勝而無復者以客行天令時去則已主守其位順承天命也主勝客則違天之命而氣化不行故爲逆客勝主則上臨下奉而政令乃布故爲從也

五運鬱極乃發歌

火土金鬱待時發水隨火後木無恒水發雹雪土飄驟木發毀折金清明火發曛昧有多少微者病已甚無刑木達火發金鬱洩土奪水折治之平

註　五鬱之發各有其時火鬱待三氣火時而發土鬱待四氣土時而發金鬱待五氣金時而發此各待旺時而發也水鬱不待終氣水時而每發於二氣三氣二火時者以水陰性險見陽初退卽進乘之故不待水旺而發也木鬱之發無一定之時者以木生風善行數變

其氣無常故木發無恒時也五發之時既已審矣然五發徵兆五氣微甚天時民病不可不知也水發之徵微者爲寒甚爲雹雪雹雪寒甚也土發之徵微者爲濕甚爲飄驟飄驟暴風雨也木發之徵微者爲風甚爲毀折毀折摧拔也金發之徵微者爲燥甚爲清明清明冷肅也火發之徵微者爲熱甚爲曛昧曛昧昏翳也多少者謂有太過不及也不及者病微太過者病甚微者病已謂本經自病也甚者兼刑謂兼我刑刑我者同病也如木氣甚我刑者土刑我者金土畏我乘來齊其化故三經兼見病也餘氣法此木達謂木鬱達之達者條達舒暢之義也凡木鬱之病風爲清斂也宜以辛散之以甘調之緩之以苦涌之平之但使木氣之發者發揚解散之義也凡火鬱之病爲寒束也宜以辛温發之以辛甘揚之以辛凉解

之以辛苦散之但使火氣發揚解散皆治火鬱之法也金泄謂金鬱泄之泄者宣泄疎降之義也凡金鬱之病燥爲火因也宜以辛宣之疏之潤之以苦泄之降之清之但使燥氣宣通疏暢皆治金鬱之法也水折謂水鬱折之折者逐導滲通之義也凡水鬱之病水爲濕瘀也宜以辛苦逐之導之以辛淡滲之通之但使水氣流通不蓄皆治水鬱之法也土奪謂土鬱奪之奪者汗吐下利之義也凡土鬱之病濕爲風阻也在外者汗之在內者攻之在上者吐之在下者利之但使土氣不致壅阻皆治土鬱之法也

天時地化五病二火歌

運氣天時地化同邪正通八五藏中五藏受邪生五病五病能該萬病形熱合君火暑合相蓋以支同十二經雖分二火原同理不無微甚重輕情

註　木火土金水五運之化不能外乎六氣風熱暑濕燥寒六氣之化亦不能出乎五行故運

雖有五氣雖有六而天之氣令地之運化皆同也邪化正化之氣皆通乎人之五藏之中正化養人邪化病人五藏受邪則生五藏之病五病能該萬病情形謂主客一定之病主客錯雜之病及勝復鬱病皆莫能逃乎五病之變猶夫天地化生萬物皆莫能逃乎五行之屬也五行惟火有二在地爲火在天爲熱爲暑以熱合少陰爲君火暑合少陽爲相火蓋以地有陰陽十二支同乎人之陰陽十二

經火雖有二理則一也故其德政令化災病皆同然不無熱微病輕暑甚病重之情狀也

五星歌

五星所見太過不及鎮土太白金不及減常之一二無所不勝色停勻太過北越倍一二畏星失色兼母云盛衰徐疾徵順逆留守多少吉凶分

註　天之垂象莫先乎五星五星者木火土金水之五星也木曰歲星居東方火曰熒惑星居南方水曰辰星居北方土曰鎮星居西南金

曰太白星居西方其主歲之星不大不小不芒不暗不疾不徐行所行道守所守度此其常也若五陰年是爲不及其星則減常之一不及之甚則減常之二其光芒縮主歲之星其色兼我所不勝之色而見也如木不及歲星青兼白色也火不及熒惑星紅兼黑色也土不及鎮星黃兼青色也金不及太白星白兼紅色也水不及辰星黑兼黃色也五陽年是爲太過其主歲之星北越謂越出本度而近於北也北乃紫微之位太乙所居之宮也故倍常之一太過之甚倍常之二其光芒盈主歲之星其色純正畏我之星失其本色而兼生我之母色也假如木太過畏木之星土星也失其本色之黃而兼生土之火赤色也蓋以木盛而土畏之必盜母氣爲助故兼母色見也土兼赤色土又生子餘星倣此凡星當其時則當盛非其時則當衰星遲於天爲順爲災病輕星速於天爲逆爲災病重稽留不

進守度日多則災病重稽留不進守度日少則災病輕故曰吉凶分也

五行德政令化災變歌

木德溫和政舒啟其令宣發化生榮其變烈風雲物飛其災摧扳殞落零

註　木主春故其德溫暖柔和也春氣發故其政舒展開啟也春氣升故其令宣發也春主生故其化生榮也春主風故其變烈風而雲物飛揚此風之勝也木勝不已則爲摧折扳殞散落飄零之災也

火德彰顯化蕃茂其令爲熱政曜明其變災烈水泉涸其災焦灼萎枯形

註　火主夏故其德彰著昭顯也夏主長故其化蕃秀茂盛也夏陽盛故其令熱也夏陽外故其政光明顯曜也夏主熱故其變炎光赫烈而水泉乾涸此熱之勝也火勝不已則爲萬物焦灼草萎木枯之災也

土德溽蒸政安靜其令雲雨其化豐其變陰埃震

驟注其災霖雨岸堤崩

註　土主長夏故其德溽蒸熱也土主靜故其政安靜也長夏氣濡故其令雲雨也土氣厚故其化萬物豐備也長夏主濕故其變陰晦烟埃震雷驟注暴雨此濕之勝也土勝不已則爲久霖搖雨潰岸崩堤之災也

金德清潔政勁切其化斂令露膏其變肅殺霜早降其災蒼乾草木凋

註　金主秋故其德清涼皎潔也秋氣肅故其政肅勁齊切也秋主收故其化斂收斂縮也秋主露故其令露膏萬物也秋主燥故其變肅寒早霜殺物此燥之勝也金勝不已則爲蒼枯草木凋零之災也

水德凄滄政堅肅其化清謐其令寒其變凜冽寒太甚其災氷雹霜雪連

註　水主冬故其德凄滄而寒也冬氣固故其政堅凝肅勁也冬主藏故其化清冷靜謐也冬主寒故其變凜冽寒氣太盛此寒之勝也水

勝不已則爲氷雪霜雹之災也

五行地化蟲畜穀果有太過不及齊兼化歌

木主化毛犬麻李火主羽馬麥杏饒土主化倮牛穠棗金主化介雞稻桃水主化鱗彘豆栗得氣皆育失蕭條太過齊化我剋我不及兼化剋皆苞

註　蟲者毛羽倮介鱗也鱗爲毛蟲之長而諸毛皆橫生故屬木也鳳爲羽蟲之長而諸羽皆翔升故屬火也人爲倮蟲之長而諸倮物皆具四肢故屬土也龜爲介蟲之長而諸介皆甲堅固故屬金也龍爲鱗蟲之長而諸鱗皆生於水故屬水也次則其畜犬其穀麻其果李皆木化也其畜馬其穀麥其果杏皆火化也其畜牛其穀穠其果棗皆土化也其畜雞其穀稻其果桃皆金化也其畜彘其穀豆其果栗皆水化也凡此五化之物得其氣之和則皆蕃育失其氣之和則皆蕭條而不育也太過齊化謂我所化之物與剋我者所化之物皆育也假如木太過毛蟲犬畜麻穀李果

木化之類育而介蟲雞畜稻穀桃果金化之類亦育蓋太過則氣盛所不勝者來齊其化也其餘太過之化倣此不及兼化謂剋我者我剋之者皆茂育也假如木不及剋我之金其蟲介其畜雞其穀稻其果桃皆化育也蓋不及則氣衰剋我者我畏之我剋者不畏我來兼其化也其餘不及之化倣此苞者茂也

運氣爲病歌

五運六氣之爲病名異情同氣質分今將二病歸爲一免使醫工枉費心

註　五運六氣之爲病雖其名有木火土金水風火濕燥寒之異而其實爲病之情狀則同也今將木運之病風氣之病火運之病暑氣之病土運之病濕氣之病金運之病燥氣之病水運之病寒氣之病總歸爲一病不使初學醫工枉費心思而不得其頭緒也

諸風掉眩屬肝木諸暴强直風所因支痛轢戾難轉側裏急筋縮兩脇疼

註　在天爲風在地爲木在人爲肝在體爲筋風氣通於肝故諸風爲病皆屬於肝木也掉搖動也眩昏運也風主動旋故病則頭身搖動目昏眩運也暴卒也强直筋病强急不柔也風性勁急風入於筋故病則卒然筋急强直也其四肢拘急疼痛筋轜短縮垂戾失常難於轉側裏急脇痛亦皆風傷其筋轉入裏病也

諸痛癢瘡屬心火諸熱昏瘖躁譫狂暴注下迫嘔酸苦膺背徹痛血家殃

註　在天爲熱在地爲火在人爲心在體爲衄熱氣通於心故諸火痛癢瘡之病皆屬於心火也熱微則燥皮作痒癢熱甚則灼膚作痛熱入經衄與血凝結淺則爲齲深則爲疽更深入之則傷藏府心藏神熱乘於心則神不明故昏冒不省人事也心主言熱乘於心則神不辨故瘖而不能言或妄言而譫語也火主動熱乘於身則身動而不寧故身躁擾動甚則

發狂也暴注者卒暴水瀉火與水爲病也下迫者後重裏急火與氣爲病也嘔吐酸苦火病胃也膺背徹痛火傷胸也血家殃者熱入於衄則血滿騰不上溢則下瀉而爲一切失血之病也

諸濕腫滿屬脾土霍亂積飲痞閉疼食少體重肢不舉復滿腸鳴飧泄頻

註　在天爲濕在地爲土在人爲脾在體爲肉濕氣通於脾故諸濕爲病皆屬於脾土也濕者內外故肉腫腹滿也飲亂於中故病霍亂也脾失健運故病積飲也脾氣凝結故病痞硬便閉而痛也脾主化穀病則食少也脾主肌肉濕勝故身重也脾主四肢四肢不舉亦由濕使然也脾主腹濕滯腹疾故腹滿腸鳴飧泄也

諸氣臌鬱痿肺金喘咳痰血氣逆生諸燥澁枯涸乾勁皴揭皮膚肩臂疼

註　在天爲燥在地爲金在人爲肺在體爲皮燥

氣通於肺故諸燥氣爲病皆屬於肺金也膹鬱謂氣逆胸滿膹鬱不舒也痿謂肺痿咳嗽唾濁痰涎不已也喘咳氣逆唾痰涎血皆肺病也凡澁枯涸乾勁皆燥之化也乾勁似乎强直皆筋勁病也故卒然者多風入而筋勁也久之者多枯燥而筋勁也皴膚皴澁也揭皮揭起也此燥之病乎外也臂痛肩痛也亦燥之病於經也

諸寒收引屬腎水吐下腥穢澈清寒厥逆禁固骨節痛癥瘕癩疝腹急堅

註在天爲寒在地爲水在人爲腎在體爲骨寒氣通於腎故諸寒氣爲病皆屬於腎水也收斂也引急也腎屬水其化寒斂縮拘急寒之化也熱之化吐下酸苦故寒之化吐下腥穢也熱之化水液渾濁故寒之化澄澈清冷也厥逆四肢冷也禁固收引堅勁寒傷於外則骨節痛也寒傷於內則癥瘕癩疝腹急堅痛也

五運客運太過爲病歌

風氣大行太過木脾土受邪苦腸鳴飧泄食減腹
支滿體重煩寃抑氣升雲物飛揚草木動搖落木
勝被金乘甚則善怒顛眩冒脇痛吐甚胃絶傾

註　上文統論主運主氣爲病此詳言五運客運
常主之病也歲木太過六壬年也或歲土不
及六己年也木太過則特强乘土土不及則
母弱而金衰無以制木而木亦來乘土故木
氣盛則風氣大行爲木太過之化在人則脾
土受邪爲病苦腸鳴飧泄食少腹滿體重煩
寃煩寃者謂中氣抑鬱不伸故也在天則有
雲物飛揚之變在地則有草木動搖之化木
勝不已而必衰衰則反被金乘有凋隕搖落
之復也故更見善怒顛疾眩冒脇痛吐甚之
肝脾病也胃絶傾者謂胃土衝陽之衄絶而
不至是爲脾絶故主命傾也

暑熱大行太過火肺金受邪喘咳痎氣少血失及
病瘧注下咽乾中熱多燔炳物焦水泉涸氷雨寒

霜水復過甚則譫狂胸背痛太淵鉅絕命難瘥

註　歲火太過六戊年也或歲金不及六乙年也火太過則火恃強而乘金金不及則母弱而水衰無以制火而火亦乘金故火氣盛則暑熱大行爲火太過之化在人則肺金受邪其爲病喘而咳嗽氣少不足息血失而顏色瘁及瘧疾注下火瀉咽乾中熱也在天則有燔炳炎烈沸騰之變在地則有物焦槁水泉涸之化火勝不已而必衰衰則反被水乘有雨氷雹早霜寒之復也故更見譫語狂亂胸背痛之心肺病也太淵肺鉅也肺金之鉅絕而不至是爲肺絕故主病難愈也

雨濕大行太過土腎水受邪腹中疼體重煩寃意不樂雨濕河衍涸魚生風雨土崩鱗見陸腹滿溏瀉苦腸鳴足痿痺痛並飲滿太谿腎絕命難存

註　歲土太過六甲年也歲水不及六辛年也土太過則土恃強而乘水水不及則母弱而木衰無以制土而土亦乘水故土氣盛則雨濕

大行爲土太過之化在人則腎水受邪其爲病四肢冷厥腹中痛體重煩寃意不樂也在天則有雨濕數至之變在地則有河衍涸澤生魚之化濕勝不已而必衰衰則反被木乘有風雨大至土崩鱗見於陸之復也故更見太谿腎厥也腎水之厥絶而不至是爲腎絶腹滿溏瀉腸鳴足痿痹痛飲滿之脾胃病也故曰主命難存也清燥大行太過金肝木受邪耳無聞脇下少腹目赤痛草木凋隕焦槁屯甚則胸膺引背痛胠脇何能反側身喘咳氣逆而乘血溢太衝厥絶命難生

註歲金太過六庚年也歲木不及六丁年也金太過則金恃強而乘木木不及則母弱而火衰無以制金而金亦乘木故金氣盛則清燥大行爲金太過之化在人則肝木受邪其爲病耳聾無聞脇下少腹痛目皆赤痛也在天則有清燥肅殺之變在地則有草木凋隕之化燥勝不已而必衰衰則反被火乘有蒼

乾焦槁之復也故更見胸膺引背脅肋疼痛
不能轉側喘咳氣逆失血之肝肺病也太衝
肝厥也肝木之厥絕而不至是爲肝絕故主
命難生也

寒氣大行太過水邪害心火熱心煩躁悸譫妄心
中痛天氷霜雪地裂堅埃霧濛鬱寒雨至甚則腫
咳病中寒腹滿溏鳴食不化神門厥絕死何言
註歲水太過六丙年也歲火不及六癸年也水
太過則水恃強而乘火不及則母弱而土
衰無以制水而水亦乘火故水氣盛則寒氣
大行爲水大過之化在人則心火受邪其爲
病心煩躁悸譫語妄言心中熱痛也在天則
有雨氷霜雪之變在地則有凍裂堅剛之化
寒勝不已而必衰衰則反被土乘有埃霧曚
鬱不散寒雨大至之復也故更見腫喘中寒
腹滿溏瀉腸鳴飲食不化之腎脾病也神門
心厥也心火之厥絕而不至是爲心絕故主
死也

六氣客氣主病歌

少陰司天熱下臨肺氣上從病肺心燥行於地肝應病燥熱交加民病生喘咳血溢及血瀉寒熱鼽嚏涕流頻瘡瘍目赤嗌乾腫厥心脇痛苦呻吟

註　上文統論主運主氣爲病此則詳言六氣客氣主之病也少陰君火司天子午歲也火氣下臨金之所畏故肺氣上從而病肺心也凡少陰司天則陽明燥金在泉故燥行於地而病肝也是則知燥熱交加民病喘咳血上溢血下泄寒熱鼽嚏流涕瘡瘍目赤嗌乾腫痛心痛脇痛皆其證也

太陰司天濕下臨腎氣上從病腎陰寒行於地心脾病寒濕交攻內外搖民病身重足腫霍亂痞滿腹脹膜肢厥拘急腳下痛少腹腰疼轉動屯

註　太陰濕土司天丑未歲也濕氣下臨水之所畏故腎氣上從而病腎陰也凡太陰司天則太陽寒水在泉故寒行於地而病心脾也是知寒濕內外交攻民病身重足腫霍亂痞

滿腹脹四肢厥逆拘急腳下痛少腹痛腰痛難於動轉皆其證也

少陽司天火下臨肺氣上從火刑金風行於地肝木勝風火爲災是乃因民病熱中欬失血目赤喉痺聾眩瞑瘡瘍心痛瞤瞤癒冒暴死皆因臣犯君

註　少陽相火司天寅申歲也火氣下臨金之所畏故肺氣上從而病肺也凡少陽司天則厥陰風木在泉故風行於地木勝則病在肝是則知風火爲災民病熱中欬而失血目赤喉痺耳聾眩瞑瘡瘍心痛瞤動癒瘛昏冒皆其證也暴死者是三之客氣相火加臨君火以臣犯君故也

陽明司天燥下臨肝氣上從病肝筋熱行於地心肺害淸燥風熱互交侵民病寒熱咳膿鬱掉振筋痿力難伸煩寃脇痛心熱痛目痛皆紅小便纁

註　陽明燥金司天卯酉歲也燥氣下臨木之所畏故肝氣上從而病肝筋也凡陽明司天則少陰君火在泉故熱行於地而病肺心也是

則知清燥風熱交侵民病寒熱而咳胸鬱膹滿掉搖振動筋痿無力煩寃抑鬱不伸兩脇心中熱痛目痛眥紅小便絳色皆其證也

太陽司天寒下臨心氣上從病鮌心濕行於地脾肉病寒濕熱內去推尋民病寒中終反熱癰疽火鬱病纏身皮瘴肉苛足痿軟濡瀉滿腫乃濕根

註　太陽寒水司天辰戌歲也寒氣下臨火之所畏故心氣上從而病鮌心鮌也凡太陽司天則太陰濕土在泉故濕行於地而病脾肉也是則知寒濕熱氣相合民病始爲寒中終反變熱如癰疽一切火鬱之病皮瘴痺而重著肉苛不用不仁足痿無力濕瀉腹滿身腫皆其證也

厥陰司天風下臨脾氣上從脾病生火行於地冬溫化風火寒濕爲病民耳鳴掉眩風化病支滿腸鳴飧瀉頻體重食減肌肉痿溫厲爲災火化淫

註　厥陰風木司天巳亥歲也風氣下臨土之所畏故脾氣上從而病脾也凡厥陰司天則少

陽相火在泉故火行於地而病溫也是則知風火寒濕雜揉民病耳聾振掉眩運腹滿腸鳴完穀不化之瀉體重食減肌肉痿瘦皆其證也

運氣當審常變歌

未達天道之常變反謂氣運不相應既識一定之常理再審不定變化情任爾百千雜合病要在天時地化中知其要者一言畢不得其旨散無窮

註　近世醫者皆謂五運六氣與歲不應置而不習是未達天道之常變也時之常者如春溫夏熱秋涼冬寒也日之常者早溫午熱暮溫夜寒也時之變者春不溫夏不熱暑不蒸秋不涼冬不寒也日之變者早溫午寒暮涼夜熱也但學醫者欲達常變之道當先識一定主客之理次審不定變化卒然之情然後知百千雜合之氣爲病俱莫能逃天時地化之理也雖或有不應亦當審察與天時何時地化何化人病何病相同即同彼時彼化彼病

而施治之乃無差謬此知其要者一言而終也爲醫者可不於運氣中一加意耶

衝陽諸脈穴位

衝陽穴在足跗上五寸去陌骨二寸骨間動脈太淵穴在掌後內側橫紋頭動脈中太谿穴在足內踝後五分跟骨上動脈陌中太衝穴在足大指本節二寸間動脈應手陌中神門穴在掌後銳骨端陌中

附衝陽諸脈穴圖



御纂醫宗金鑑傷寒心法要訣

六十三卷

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE

OCT 11 1932

37

ChL 7918.7638

卷三十六

傷寒傳經從陽化熱從陰化寒原委起

至陰毒止



34

御纂醫宗金鑑卷三十六

編輯傷寒心法要訣目錄

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

傷寒傳經從陽化熱從陰化寒原委
太陽風邪傷衛証
太陽寒邪傷營証
風寒營衛同病証
誤服三湯致變救逆
三陽受病傳經欲愈証
陽明表病証

陽明熱病脈證
陽明府病脈證
陽明慎汗慎清慎下
少陽脈證
少陽或病柴胡湯加減法
少陽禁汗禁吐禁下
少陽可吐可汗可下
三陽合病併病
三陰受病傳經欲愈脈證
太陰陰邪脈證
太陰陽邪脈證
太陰陽明表裏同病
少陰陰邪脈證
少陰陽邪脈證
少陰太陽表裏同病
厥陰陰邪脈證
厥陰陽邪脈證
少陰厥陰外熱裏寒脈證

兩感
汗下失宜致變壞證
表證
裏證
陽證
陰證
陽盛格陰
陰盛格陽
陽毒
陰毒

御纂醫宗金鑑卷三十六

編輯傷寒心法要訣

傷寒一證仲景於論中立三百九十七法一百
一十三方神明變化可謂既詳且盡矣其治
雜證也則有金匱要畧分門別類包舉該括
無非示人以規矩準繩欲其觸類傍通以應
變於無窮也但其辭旨古奧義蘊幽深條目
繁多未易領會人多苦之茲特撮其要旨編
爲詩訣俾學者便於熟讀默記融會貫通然

後再玩味全書則易讀易解有會心之樂而無望洋之歎矣由此登堂入室將見二千年來大法微言昭如日月不致塵封庶幾於斯道不無小補云爾

傷寒傳經從陽化熱從陰化寒原委六經爲病盡傷寒氣同病異豈期然推其形藏原非一因從類化故多端明諸水火相勝義化寒變熱理何難漫言變化千般狀不外陰陽表裏間

註　六經謂太陽陽明少陽太陰少陰厥陰也爲病盡傷寒謂六經爲病盡傷寒之變化也氣同爲天之六氣感人爲病同也病異謂人受六氣生病異也豈期然謂不能預先期其必然之寒熱也推其形藏原非一謂推原其人形之厚薄藏之虛實非一也因從類化故多端謂人感受邪氣雖一因其形藏不同或從寒化或從熱化或從虛化或從實化故多端不齊也明諸水火相勝義謂水勝則火滅火勝則水乾也化寒變熱理何難謂邪至其經

或從陰化爲寒或從陽變爲熱卽水火相勝從化之理何難明也漫言變化千般狀二句謂傷寒變化千般總不外乎陰陽表裏間也

太陽風邪傷衛脈證

中風傷衛脈浮緩頭項强痛惡寒惡風發熱汗自出鼻鳴乾嘔桂枝功

註

中風病名也傷衛謂風傷衛也脈浮緩謂中風脈也頭痛項强惡寒惡風發熱汗自出鼻鳴乾嘔謂中風證也桂枝功謂桂枝湯功能治中風虛邪也詳太陽上篇

太陽寒邪傷營脈證

傷寒傷營脈浮緊頭疼身痛惡寒風無汗而喘已未熱嘔逆麻黃湯發靈

註

傷寒病名也傷營謂寒傷營也脈浮緊謂傷寒惡寒惡風無汗而喘或已發熱或未發熱嘔逆謂傷寒證也麻黃湯發汗最靈也詳太陽中篇

風寒營衛同病衄證

中風浮緊偏身痛頭疼發熱惡寒風乾嘔無汗兼煩躁傷寒身重乍時輕浮緩嘔逆無汗喘頭疼發熱惡寒風惡寒痛寒傷營衛同病大青龍

註　中風謂風傷衛之病也頭疼發熱惡風惡寒乾嘔中風之證也浮緩今以中風之病而得傷寒之衄與證更兼不汗出之表實內熱之煩躁也傷寒謂寒傷營之病也身重不痛乍有輕時風傷衛之證也浮緩風傷衛之衄也嘔逆無汗而喘頭疼發熱惡寒惡風寒傷營之證也是以傷寒之病而得中風之衄與證更兼太陽無汗內熱之煩躁也而無少陰證謂無身重但欲寐之證也營衛同病謂風寒中傷營衛同病也二證皆無汗實邪故均以大青龍湯發之詳太陽下篇

誤服三湯致變救逆

傷寒酒病桂勿與嘔吐不已血膿鮮尺遲服麻致

漏汗惡風肢急小便難微弱汗風青龍發厥惕悸眩熱仍然身瞤振振欲擗地桂加附子眞武瘁

註　傷寒謂傷寒無汗之實邪也酒病謂病酒狀似中風也桂勿與謂皆勿與桂枝湯也誤與傷寒則表氣愈固裏氣更逆嘔吐不已也誤與酒病則濕熱內釀傷營吐血膿也此皆誤用桂枝湯之變證當隨其變證治之可也尺遲謂傷寒尺中脈遲也服麻謂服麻黃湯發汗遂致汗出不止名曰漏汗也肢急四肢拘急也小便難謂小便少而難也傷寒脈證當用麻黃湯發汗若見可發汗若誤發之則致漏汗惡風四肢拘急小便難等變證也當以桂枝加附子湯救逆可也微弱謂大青龍證脈微弱也汗風謂大青龍證自汗惡風也大青龍證脈不浮緊若浮緩而微弱反汗出是大青龍脈證未具也誤以大青龍發之致其人厥冷筋惕心悸頭眩熱仍不退身肉瞤動也振振欲擗地謂聳

動不已不能興起欲墮於地也此皆誤與大青龍湯發汗之變證當以眞武湯救逆可也

詳太陽篇

三陽受病傳經欲愈脈證

傷寒一日太陽病欲吐煩躁數急傳陽明少陽證不見脈靜身和爲不傳

註

傷寒一日太陽受病二日陽明受病三日少陽受病此其傳經之常也若初病頗欲吐煩躁脈數急者謂邪盛傳經而不解也二三日

陽明少陽證不見脈靜身無所苦者謂邪衰不傳欲自愈矣

陽明表病脈證

葛根浮長表陽明緣緣面赤額頭疼發熱惡寒而無汗目痛鼻乾臥不寧

註

太陽未罷又傳陽明太陽表邪怫鬱陽明肌熱爲陽明經表病也葛根表陽明謂葛根湯主治陽明表病也浮長謂陽明之表脈也緣面赤連額頭疼發熱惡寒無汗目痛鼻乾

臥不得寧皆謂陽明經之表證也用葛根湯解兩經之邪也詳陽明篇

陽明熱病脈證

白虎煩渴熱陽明汗出身熱脈長洪不惡寒兮反惡熱合柴兼見少陽經

註　太陽已罷而傳陽明不傳少陽亦未入府其熱漸深表裏俱熱爲陽明經熱病也白虎熱陽明謂白虎湯主治陽明熱病也脈長洪謂陽明之熱脈也煩躁口渴引飲汗出身熱不惡寒反惡熱皆謂陽明經熱病之證也用白虎湯解陽明表裏俱熱也陽明未罷又傳少陽亦陽明熱病也合柴謂白虎合小柴胡湯治陽明經熱兼見少陽經弦脈寒熱往來口苦耳聾目眩而嘔胸脇痛之病也詳陽明少陽篇

陽明府病脈證

胃實脈大府陽明大便難兮脾約同蒸蒸潮熱濈濈汗滿痛始可議三承

註　脈大府陽明謂熱邪入府陽明當脈大也曰胃實曰大便難曰脾約謂府病受邪之不同也脾約者太陽陽明也胃實者正陽陽明也大便難者少陽陽明也皆爲可下之證不無輕重之別然必蒸蒸潮熱身肢濈濈然汗出或滿或痛始可議其微甚以三承氣湯麻仁丸下之可也詳陽明篇

陽明愼汗愼清愼下

陽明表證反有汗桂枝加葛中風傳熱證無汗亡津液燥渴仍從白虎痊胃實汗熱原應下惡寒浮緩表爲先欲知定鞕識失氣不轉微濇下之寃舌滑尿白小便數便鞕休攻導自安小便數多知便鞕無苦數少是津還

註　陽明表證應無汗反有汗是從風邪傳來仍從表治宜用桂枝加葛根湯陽明熱證應有汗反無汗是或吐或汗或下亡其津液若無燥渴則從表治若有燥渴仍從熱治宜用白虎湯胃實自汗潮熱原應下之若有惡寒浮

緩之表宜先解表表解已乃可攻之欲知大便鞕定未定當少與小承氣湯轉失氣者已成定鞕當與大承氣湯攻之若不轉失氣者未成定鞕攻之必溏勿更與也若鮀微濇者亦不可下下之則冤死也舌滑尿白裏熱微也雖小便數大便鞕其熱遠在廣腸亦不可下用蜜煎豬膽導法自可安也凡小便數多知大便必鞕雖大便鞕而無或滿或痛之苦當審其小便日幾行日減數少是津液還於胃中愼不可攻不久必自大便出也詳陽明篇

少陽鮀證

往來寒熱胸脇滿鮀弦目眩而耳聾口苦默默不欲食心煩喜嘔少陽經或渴或欬身微熱或脇鞕痛腹中疼或悸不嘔尿不利舌胎滑白小柴宗

註　鮀弦謂少陽病鮀也往來寒熱胸脇滿目眩耳聾口苦默默不欲食心煩喜嘔少陽經主證也或渴或欬身微熱或脇鞕痛腹中疼或

悸不嘔尿不利舌胎滑白者皆少陽或有之證也均宜小柴胡湯主之隨證加減治之可也詳少陽篇

少陽病用柴胡湯加減法

胸煩不嘔去參夏加蔞若渴半易根腹痛去芩加芍藥心悸尿秘苓易芩脇下痞鞕棗易蠣不渴微熱桂易參款去參棗加乾味小柴臨證要當斟

註　少陽經主證宜小柴胡湯主治也其或有之證務要臨證斟酌加減可也若胸中煩而不嘔去半夏人參加栝蔞實若渴者以半夏易栝蔞根若腹中痛去黃芩加白芍若心下悸小便不利者加茯苓去黃芩若脇下痞鞕加牡蠣去大棗若不渴外有微熱者去人參加桂枝微汗之若款者去人參大棗加乾薑五味子義詳少陽篇小柴胡湯下

少陽禁汗禁吐禁下

少陽三禁要詳明汗譫吐下悸而驚甚則吐下利不止水漿不入命難生

註三禁謂少陽禁吐禁汗禁下也若誤發汗則生譫語若誤吐下則心悸而驚少陽經即有心下鞕不可下之甚則下利不止即有胸中滿不可吐吐之甚則水漿不入變成危候命難生也詳少陽篇

少陽可吐可汗可下

胸滿熱煩梔子豉瘕鞕衝喉瓜蒂平發熱烝寒肢煩痛微嘔支結柴桂寧鬱鬱微煩嘔不止心下痛鞕大柴攻誤下柴胡證仍在復與柴胡振汗生

註上言其禁恐失宜也此言其可貴變通也胸滿煩熱太陽少陽輕邪也宜梔子豉湯涌之胸滿瘕鞕氣上衝喉不得息者太陽少陽重邪也宜瓜蒂散吐之發熱惡寒四肢煩疼微嘔心下支結太陽少陽表證也宜柴胡桂枝湯微汗兩解之鬱鬱微煩嘔不止心下痛鞕少陽陽明表裏證也宜大柴胡湯緩攻兩解之誤下不致變逆柴胡證仍在者復與柴胡湯以和解之若解則必蒸蒸振汗出而解以

下後虛故也詳太陽傳歸併一經二陽合病滿

三陽合病併病

合病兩三經同病併病傳歸併一經二陽合病滿喘發自利葛根嘔半同太少利芩嘔加半明少弦負順長生滑數宿食大承氣三陽合病腹膨膨口燥身重而譫語欲眠合目汗蒸蒸遺尿面垢參白虎浮大汗下禁當應二陽併病汗不徹面赤怫鬱大青龍表罷潮熱手足汗便難譫語大承攻太少頭項痛眩冒心下痞鞕如結胸禁汗吐下惟宜刺

譫驚不食利多凶

註一經未罷又傳一經二經三經同病而不歸併一經者謂之合病二經三經同病而後歸併一經自病者謂之併病二陽謂太陽陽明也太陽則有頭痛發熱惡寒無汗陽明則有肌熱惡熱心煩不眠之證相合同病也滿喘謂二陽合病當下利不下利更加胸滿而喘宜麻黃湯發之自利謂二陽合病當有之證宜葛根湯也嘔半謂二陽合病不下利但加

嘔者宜葛根湯加半夏也同謂二證同用葛根一方也太少謂太陽少陽合病也太陽則有頭痛發熱惡寒無汗少陽則有寒熱往來口苦耳聾目眩胸脇痛之證相合同病也利芩謂太陽少陽合病當自下利宜與黃芩湯也嘔加半謂太陽少陽合病不自利但加嘔者宜黃芩湯加半夏也若不嘔利而見太陽少陽之證非合病也宜用柴胡桂枝湯兩解之明少謂陽明少陽兩經之證同見下利合病也弦負弦爲少陽木脈木勝則土負負則死也順長生長爲陽明土脈土盛則木不能災爲順順則生也滑數謂陽明少陽合病下利黏穢者脈必滑數是宿食也宜大承氣湯嘔酸苦者宜大柴胡湯三陽謂太陽陽明少陽合病也腹膨膨謂腹脹滿也口燥謂口中乾燥也身重謂身重難轉側也譫語謂妄亂言也欲眠謂喜睡也合目汗蒸蒸謂合目出熱汗也遺尿謂失尿不知也面垢謂面似有

油垢也此皆三陽熱盛津液枯竭之證設使
脈浮禁不可汗脈大亦不可下惟宜用白虎
加人參益氣生津清熱可也若未經汗下津
液未傷三陽合病輕證惟宜柴葛解肌湯清
解三陽可也二陽謂太陽陽明併病也汗不
徹謂邪在太陽發汗未徹又傳陽明也面赤
謂邪猶怫鬱於太陽陽明之表未併陽明之
府宜大青龍湯解兩經之熱也表罷謂太陽
證罷也潮熱手足汗大便難譫語謂已歸併
陽明府也宜大承氣湯攻陽明實熱也太少
謂太陽少陽併病也頭項强痛目眩昏冒心
下痞鞕如結胸證謂太陽少陽二經之證尚
未歸併其邪未定禁不可汗下惟宜刺大椎
肝腧肺腧以瀉其熱也若誤發汗則必發譫
語若誤吐下則必心煩而驚水漿不入下利
不止變此惡候命多凶也義詳合病併病篇

三陰受病傳經欲愈脈證

傷寒三日三陽盡熱微煩躁入陰傳其人能食而

不嘔厥小尿清爲不傳

註　傷寒三日三陽受邪爲盡三陰當受邪其人身熱雖微而煩躁者謂邪去陽入陰不解也若其人反能食而不嘔厥靜小小便清謂邪未入於陰爲不傳欲自愈也

太陰陰邪厥證

太陰陰邪沉遲厥吐食腹滿有時疼手足自溫利不渴理中湯主悸加苓腹滿去朮加附子吐多去朮加薑生雖吐下多還用朮渴欲得水倍朮寧欲作奔豚朮易桂乾薑寒倍參腹疼

註　太陰陰邪謂邪從陰化之寒證也厥沉遲太陰陰邪厥也吐食腹滿時痛太陰裏寒證也手足自溫邪入陰也自利不渴藏無熱也宜理中湯主之若心下悸加茯苓腹滿去朮加附子吐多去朮加薑生雖吐若下利多還用白朮若渴欲得飲水仍倍加朮若臍下欲作奔豚去朮易桂中寒倍加乾薑腹痛倍加人參詳太陰篇

太陰陽邪鉅證

陽邪嗌乾腹滿痛誤下時痛大實疼大承桂枝加芍大鉅弱芍大當審行

註　陽邪謂太陰邪從陽化之熱證也嗌乾謂咽乾太陰熱也腹滿痛太陰有餘證也誤下謂誤下邪陷太陰當分輕重也時痛謂腹有時痛有時不痛宜桂枝加芍藥湯和之大實痛謂腹大滿痛無時不痛宜桂枝加大黃湯下之若鉅弱卽之兼陽明胃實以大承氣湯下之若鉅弱卽當行大黃芍藥宜斟酌減之以其人胃氣弱易動也詳太陰篇

太陰陽明表裏同病

腹滿時減復如故此是寒虛氣上從腹滿不減不大便轉屬陽明乃可攻

註　腹滿時減減復如故謂腹時滿時不滿而減復如常此爲太陰寒邪寒虛之氣上逆之滿乃可溫之證也宜厚朴生薑甘草半夏人參湯腹滿不減謂常滿而滿終日不減或不大

便此爲轉屬陽明實熱內壅之滿乃可攻之證也宜大承氣湯詳太陰篇

少陰陰邪鮎證

少陰陰邪鮎沉細背寒欲寐口中和咽痛腹痛骨節痛厥利清穀四逆瘧

註　少陰陰邪謂邪從陰化之寒證也鮎沉細少陰陰邪之鮎也背寒謂背惡寒陽氣虛也欲寐謂但欲寐陰氣盛也口中和口中不乾燥也咽痛腹痛下利清穀寒盛於中也骨節疼痛四肢厥冷寒淫於外也宜四逆湯溫中散寒也詳少陰篇

少陰陽邪鮎證

少陰陽邪沉細數口燥咽乾大承湯少陰心煩不得臥黃連阿膠是主方

註　陽邪謂少陰邪從陽化之熱證也少陰病但欲寐陰邪則鮎沉細無力陽邪則鮎加數而有力矣始病即口燥咽乾水不上升熱之甚也宜大承氣湯急下之瀉陽救陰也少陰病

但欲寐二三日已上變生心煩不得眠是陽邪乘陰陰不能靜也宜黃連阿膠湯清陽益陰也詳少陰篇

少陰太陽表裏同病

少陰太陽表裏同病麻黃附子細辛湯若二三日無少陰厥沉反發熱麻黃附子細辛湯急溫裏證減辛加草用之良

註　少陰病厥沉爲陰寒之證當無熱今反發熱是兼有太陽表也宜麻黃附子細辛湯急溫而散之若二三日熱仍不解亦無裏寒吐利之證去細辛易甘草緩溫而和之詳少陰篇

厥陰陰邪厥證

厥陰陰邪微細厥膚冷藏厥躁難安囊縮舌短胎滑黑四逆當歸四逆先少滿痛厥薑黃入蚘厥靜而復時煩得食而嘔蚘聞臭煩因蚘動烏梅圓

註　厥陰陰邪謂邪從陰化之寒證也微細厥陰陰邪厥也厥謂四肢厥冷也膚冷謂肌膚冷也藏厥也躁難安謂煩躁無有安時也囊縮謂外腎爲寒收引縮入腹也婦

人則乳縮陰收也舌短謂舌縮短也胎滑黑謂舌胎不乾而色黑也四逆謂四逆湯也當歸四逆謂當歸四逆湯也先者謂先服當歸四逆湯也少滿痛謂少腹滿按之痛也厥謂厥冷也薑萸入謂少食而嘔蚘聞臭謂嘔因蚘生薑也蚘厥謂厥而吐蚘也靜而復時煩謂煩時止時煩也得食而嘔蚘聞臭而始嘔也嘔因蚘動謂煩因蚘動而始煩也烏梅圓蚘厥謂宜用烏梅丸也詳厥

陰篇

厥陰陽邪鮌證

陽邪熱厥厥而熱消渴熱氣撞心疼煩滿囊縮舌焦卷便鞭尚任大承攻四逆不分四逆散欵加薑味下利同悸加桂枝腹痛附下重薤白秘尿苓

註　陽邪謂厥陰邪從陽化之熱證也厥謂手足寒也厥而復熱熱而復厥是爲熱厥厥微熱微厥深熱深也消渴謂飲水多而小便少也熱氣上撞心疼是火挾木邪而逆也煩滿謂

少腹煩滿也囊縮謂外腎爲熱灼筋縮入腹也舌焦卷謂舌胎乾焦而卷也便鞕謂大便鞕尚可任攻宜大承氣湯四逆謂四肢厥冷也不分謂寒熱之厥疑似不分也宜四逆散疏達厥陰其厥不回再審寒熱可也或欬加生薑五味子下利亦加故曰同也心下悸加桂枝腹痛加附子瀉利下重加薤白秘尿不利加茯苓詳少陰厥陰篇

少陰厥陰外熱裏寒脈證

少陰裏寒外熱證面赤身反不惡寒厥利清穀脈微絕通脈四逆主之先利止參加脈不出葱入面色赤炎炎腹痛加芍咽桔梗嘔加聖藥用薑鮮

註　少陰裏寒外熱之證面赤不惡寒格陽外熱也四肢厥冷下利清穀脈微欲絕陰極裏寒也宜通脈四逆湯主之服四逆湯下利止脈仍不出加人參面色赤者加葱腹痛加芍藥咽痛加桔梗嘔加生薑詳少陰篇

兩感

一日太陽少陰病頭痛口乾渴而煩二日陽明太陰病滿不欲食身熱譫語三日少陽厥陰病耳聾囊縮厥逆寒水漿不入神昏冒六日氣盡命難全

註　兩感者藏府表裏同病也一日頭痛太陽也口乾煩渴少陰也二日身熱譫語陽明也腹滿不欲食太陰也三日耳聾少陽也囊縮而厥厥陰也傳經之邪其爲病也漸兩感之邪其爲病也速蓋因陽邪酷烈正不能禦所以三日後水漿不入六府之氣欲絕昏不知人五藏之神已敗而不即死者賴有胃氣未盡耳故又三日其氣乃盡而死張潔古製大羌活湯以羌獨芩連輩辛甘以散太陽之表苦寒以清少陰之熱散而施之於表裏不急者固爲得法也若夫一日則頭痛口乾煩渴二日則身熱譫語腹滿不欲食三日則耳聾囊縮而厥水漿不入昏不知人傳變如此迅速恐用大羌活湯平緩之劑反失機宜當遵仲景治有先後之說審其表裏孰急隨證治之猶或

可活故於此證初病一日表裏俱熱者依少陰病得之二三日口燥咽乾之法用大承氣湯重劑以瀉陽邪之烈表裏俱寒者依少陰病始得之反發熱脈沉之法用麻黃附子細辛湯以解陰邪之急二日表裏俱實者依陽明病譫語有潮熱腹滿時減減不足言之法用大承氣湯攻之表裏虛者依三陽合病腹滿身重面垢譫語之法用大劑白虎加人參湯清之三日表裏俱熱者依厥深熱亦深之法用大承氣湯下之表裏寒者依脈微欲絕手足厥寒之法用當歸四逆加吳茱萸生薑湯溫之緩則不及事矣其間頗有得生者後之學者其留意焉

汗下失宜致變壞證

太陽三日已發汗若下若溫鍼不解致逆成壞證觀其脈證犯何經難辨陰陽六經證重困垂危莫可憑惟用獨參煎冷服鼻上津津有汗生

註　太陽病三日已發汗不解若吐若下若溫鍼

苟或相當卽成解證如其不當不但病不解
或因而致逆變成壞證當觀其衄證知犯何
經之逆如汗後亡陽渴躁譫語下後寒中結
胸痞鞕吐後內煩腹滿溫鍼後黃衄驚狂之
類隨證治之可也甚或衄微欲絶神昏不能
言循衣摸床叉手冒心等重困垂危難辨陰
陽六經莫可憑之證此時此際惟用人參煎
湯徐徐冷服以待其機倘得鼻上津津有汗
則爲可生之兆也

表證

表證宜汗太陽經無汗發熱惡寒風頭項强痛身
體痛若出自汗表虛明

註　表證謂寒邪在表無汗發熱惡寒惡風頭項
强痛身體痛也太陽經主表故曰表證有是
證無汗者皆屬表實雖有是證若自汗出者
皆屬表虛未可輕汗卽有風邪祇宜桂枝湯
解肌可也表實無汗重者麻黃湯主之輕者
麻桂各半湯主之時有汗時無汗者桂枝二

麻黃一湯主之表實躁熱甚者三黃石膏湯主之微者大青龍湯主之不躁有熱者桂枝二越婢一湯主之以上表證不必悉具亦不論日之多寡但見有頭痛惡寒一二證卽爲表未罷雖有裏證當先解表表解已乃可攻之臨證者不可不詳辨也詳太陽篇

裏證

裏證宜下不大便惡熱潮熱汗蒸蒸燥乾譫語滿鞕痛便溏爲虛不可攻

註裏證謂熱邪內結不大便惡熱潮熱自汗蒸蒸口燥舌乾譫語腹滿鞕痛也陽明府主裏故曰裏證裏實者有脾約有胃實有大便難三者均爲可下之證然不無輕重之別三承氣湯脾約丸量其可者而與之庶乎無過也若便溏爲裏虛卽有是證不可攻也論中有急下數證不待便實而下之者是下其熱也非下其結也義詳陽明少陰篇

陽證

陽證身輕氣高熱目睛了了面脣紅熱煩口燥舌乾渴指甲紅兮小便同

註　陽證謂陽熱之證也不論三陰三陽凡見是證者均爲陽熱有餘也陽主動故身輕也陽氣盛故氣高而喘也陽主熱故口鼻氣熱也陽主寤故目睛了了而不眠也目睛不了了亦有熱極朦朧似不了了然必目赤多睡非若陰證之不了了而神短無光也陽氣熱故身熱面脣紅指甲紅也陽熱入裏故心煩口燥舌乾而渴小便紅也表實者三黃石膏湯發之裏實者三承氣湯下之表裏不實而熱盛者白虎解毒等湯清之可也詳三陽篇

陰證

陰證身重息短冷目不了了色不紅無熱欲臥厥吐利小便白兮爪甲青

註　陰證謂陰寒之證也不論三陰三陽凡見是證者均爲陰寒不足也陰主靜故身重也陰主寐故目不了了但欲臥也陽氣虛寒故息

短口鼻氣冷也陰淫於外故面無紅色四肢厥冷爪甲青也陰邪入內故嘔吐下利清穀小便清白也以上皆三陰寒證臨證者以附子四逆理中吳茱萸等湯擇其宜而與之可也詳三陰篇

陽盛格陰

陽盛格陰

陽盛格陰身肢厥惡熱煩渴大便難沉滑爪赤小便赤汗下清宜陰自完

註　經曰陽氣太盛陰氣不得相營也不相營者不相入也既不相入則格陰於外故曰陽盛格陰也其外證雖身肢厥冷煩似陰寒而內則煩渴大便難小便赤惡熱不欲近衣爪甲赤鮓沉滑一派陽實熱證汗下清三法得宜則陽得以消陰得以完全也表實無汗三黃石膏湯裏實不便三承氣湯熱盛無表裏證宜解毒白虎湯

集註　劉完素曰蓄熱內甚鮓須疾數以其極熱蓄甚而鮓道不利反致鮓沉細欲絕俗未明造

化之理反謂傳爲寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證候者或兩感熱甚者通宜解毒加大承氣湯下之後熱稍退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者凉膈散調之或失下熱極以至身冷厥微而昏冒將死若急下之則殘陰暴絶必死蓋陽後竭而然也不下亦死宜凉膈散或黃連解毒湯養陰退陽積熱漸以消散則心胸再暖而厥漸以生也

陰盛格陽

陰盛格陽色淺赤發熱不渴厥而煩下利尿清爪青白浮微通厥復陽還

註　經曰陰氣太盛陽氣不得相營也不相營者不相入也既不相入則格陽於外故曰陰盛格陽也色淺赤謂面色見浮淺之紅赤色也其外證面赤發熱而煩頗類陽熱其內則不渴下利清穀小便清白爪甲青白四肢厥冷厥浮微欲絶一派陰寒虛證宜通厥四逆湯

冷服之從其陰而復其陽也利止衄不出加倍人參下利無衄宜白通加豬膽汁人尿湯厥煩欲死宜吳茱萸湯

陽毒

陽毒熱極失汗下舌卷焦黑鼻煤烟昏噤發狂如見鬼咽疼唾血赤雲斑六七日前尚可治表裏俱實黑奴丸熱盛解毒裏實下表實三黃石膏煎

註

陽毒謂陽熱至極之證也失汗下謂應汗不汗應下不下失其汗下之時也熱毒炎炎不已故舌卷焦黑鼻內生煤烟也熱毒內攻乘心故神昏噤噤慄發赤色如錦雲之斑也六熱毒外薄肌膚故發赤色如錦雲之斑也六七日前謂日淺毒未深入故尚可治表裏俱實謂有是證無汗不大便者宜黑奴丸兩解之無表裏實證熱盛者宜黃連解毒湯兼燥渴者合白虎湯清之裏實不便者宜解毒承氣湯下之表實無汗者宜三黃石膏湯發之

陰毒

陰毒寒極色青黑咽痛通身厥冷寒重强身疼如被杖腹中絞痛若石堅或嘔或利或煩躁或出冷汗溫補先無汗還陽退陰汗急灸氣海及關元

註　陰毒謂陰寒至極之證也血衄受陰毒邪故面色青黑也陰毒內攻於裏故咽痛腹中絞痛也陰毒外攻於表故厥冷通身重强疼痛如被杖也獨陰無陽不化故陰凝腹若石之堅硬也或嘔吐或下利或煩躁或冷汗出皆陽虛不足或有之證均以溫補爲先宜四逆湯倍加人參若有是證其人無汗宜還陽散退陰散溫而汗之使寒毒散而陽伸也凡遇此證俱宜急灸氣海關元二三百壯隨服藥餌未有不生者也



御纂醫宗金鑑傷寒心法要訣

卷三十七

T7910/7388

38

ChL 7918.7638

卷三十七

表熱裏熱起至陰陽易止



合肥李氏藏書

御纂醫宗金鑑卷三十七

編輯傷寒心法要訣目錄

表熱裏熱陰熱陽熱

惡寒背惡寒辨

惡風

頭痛

項强

身痛

煩躁不眠懊憹

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

自汗頭汗
手足汗
潮熱時熱
讝語鄭聲
渴證
舌胎
胸脇滿痛
嘔證
往來寒熱如瘧寒熱
目眩耳聾
腹滿痛
吐證
熱利寒利
但欲寐
陰陽咽痛
氣上衝
饑不欲食
手足厥逆

少腹滿痛
神昏狂亂畜血發狂
循衣摸牀
太陽陽邪停飲
太陽陰邪停飲
少陰陽邪停飲
少陰陰邪停飲
喘急短氣
心下悸
戰振慄
呃逆噦噫
結胸
痞鞕
發黃
疹斑
衄血
吐血
大小便膿血

頤毒
狐惑
百合
熱入血室
食復勞復
房勞復陰陽易

表熱裏熱陰熱陽熱發熱無時熱翕翕發熱無休止之時若合熱赤外需麻桂內凉承燥乾煩渴爲陽熱厥利外熱屬陰經陽熱宜清白虎輩陰熱四逆與白通

註　發熱無時熱翕翕謂發熱無休止之時若合羽外覆之表熱也炊籠蒸內越之裏熱也表熱熱不在裏如炊籠蒸內越之裏熱也表熱熱不在裏

故尿白也裏熱故尿赤也外需麻桂謂表熱無汗宜麻黃湯有汗宜桂枝湯內涼承謂裏熱輕者宜涼膈散重者宜三承氣湯發熱兼厥口燥舌乾煩渴者爲陽經之熱也發熱兼厥冷下利清穀者屬陰經之熱也陽熱宜清白虎解毒輩也陰熱宜溫四逆白通湯也

按翕翕蒸蒸發熱俱有汗二證相類若以翕翕之表熱誤爲蒸蒸之裏熱下之則逆若以蒸蒸裏熱誤爲翕翕表熱汗之轉傷翕翕之汗熱雖同蒸蒸捫之自溫不似蒸蒸之汗熱捫之自有熱氣透手也其間或有疑似難辨又當審小便之白赤舌胎之潤燥自可決也

惡寒背惡寒辨

惡寒表裏陰陽辨發熱有汗表爲虛發熱無汗表實證實以麻黃虛桂枝無熱惡寒發陰裏桂枝加附頗相宜背寒口和陰附子口燥渴陽白虎需

註　惡寒一證有表裏陰陽之辨發熱惡寒發於陽表也有汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯無熱

惡寒發於陰裏也有汗宜桂枝加附子湯無
汗宜麻黃附子細辛湯背惡寒口和謂口中
不燥而和也陰謂屬少陰也宜附子湯背惡
寒口燥渴謂口中燥而渴也陽謂屬陽明也
宜白虎加人參湯

按陰陽二經惡寒雖同其身有熱無熱則異也
一則汗之二則溫之少陰陽明之背惡寒雖
同其口中和口中不和則異也一則溫之一
則清之惡寒雖屬輕微之證仲景立法可辨
他可類推矣

惡風

風寒相因相離少三陽俱有惡寒風惡風屬陽法
從表三陰惡寒無惡風

註　風寒二者大率多相因而少相離有寒時不
皆無風有風時不皆無寒故三陽俱有惡寒
惡風同見也惡風與惡寒均表病也法當從
表然風屬陽寒屬陰故三陰經證有惡寒而
無惡風也

頭痛

三陽頭痛身皆熱無熱吐沫厥陰經不便尿紅當議下尿白猶屬表未清

註　三陽謂太陽陽明少陽也頭痛身皆熱謂三陽頭痛身皆熱也三陽經頭痛法當從三陽治也厥陰頭痛則多厥而無熱嘔吐涎沫是厥陰挾寒邪上逆也宜吳茱萸湯溫而降之

三陽頭痛若不大便小便紅赤爲裏實熱法當議下宜承氣湯若小便清白卽不大便爲裏熱未實表尚未清法當先從表治也三陰經無頭痛惟厥陰有頭痛以其厥與督厥上會於巔也三陰經無發熱厥陰少陰亦有發熱謂之反發熱以其藏有相火陰盛格陽於外也

項强

項背八八强太陽厥浮無汗葛根湯有汗桂枝添葛入厥沉栝蔞桂枝方結胸項强如柔痙大陷胸丸下必康但見少陽休汗下柴胡去半入蔞良

註　項强太陽病也項背强太陽陽明病也凡凡拘强而甚之貌也鉅浮屬二陽之表鉅也若無汗是從傷寒傳來宜葛根湯有汗是從中風傳來宜桂枝加葛根湯鉅沉謂邪已入胸裏也宜栝蔞桂枝湯結胸謂結胸病也項强如柔痙謂項强背反張有汗如柔痙之狀也宜大陷胸丸但見少陽謂太陽少陽併病之項强休汗下謂邪入少陽不可更汗下也宜柴胡湯去半夏加栝蔞主之良好也栝蔞桂枝湯方在金匱要畧

身痛

身痛未汗表實證汗後身疼屬表虛桂加生薑參芍藥尺遲血少建中者少陰沉厥附子治厥陰汗利四逆醫風濕盡痛難轉側掣引煩疼桂附宜

註　身痛未汗屬表實證宜麻黃湯汗後身疼屬表虛證宜桂枝新加湯卽桂枝湯倍生薑芍藥加人參也曰桂加卽桂枝湯加此也尺遲血少建中者謂身痛尺中鉅遲是血少營氣

不足也雖未經汗不可發汗宜建中湯加黃耆以補營血也少陰謂身痛見少陰沉緊四肢厥冷也附子治謂宜附子湯治也厥陰謂身痛見厥陰厥逆汗出不止下利清穀也四逆湯醫也風濕謂風濕身痛也盡痛難轉側是濕則令人一身盡痛不能轉側掣引煩疼是風則令人筋緊牽引煩疼不寧也桂附宜謂宜以桂枝附子湯也

煩躁不眠懊憹

躁身不靜煩心擾不躁難眠作熱觀懊憹煩甚無冷病惟躁陰陽表裏看諸煩無論三法後便軟梔竹等湯煎便鞕白虎三承氣躁同陰見便屬寒

註　身爲熱動而不安謂之躁心爲熱擾而不寧謂之煩煩則擾於內躁則動於外故有心煩而無身煩有身躁而無心躁也大抵煩屬陽躁屬陰若懊憹心中反覆顛倒煩不得眠不與躁同見者皆無冷病當作熱觀也惟躁則不然當分表裏陰陽取治故太陽有不汗出

而煩躁謂之在表大青龍證也陽明有心下
鞕之煩躁謂之在陽白虎湯證也三陰有吐
利手足厥之煩躁謂之在陰四逆輩證也諸
煩謂煩不眠懊憹也無論三法後謂不論已
經未經汗吐下三法之前後也但大便不鞕
者以竹葉石膏溫膽梔子豉等湯主治可也
便鞕者量其熱之深淺以白虎三承氣湯主
治可也躁同陰見謂躁同三陰證見便屬陰
寒之躁宜四逆理中吳茱萸湯主治可也

自汗頭汗

自汗熱越多急下更兼熱利不休凶頭汗熱蒸不
得越黃濕水火血皆成風邪桂枝湯證也在陽明

註　自汗在太陽謂之風邪桂枝湯證也在陽明
謂之熱越白虎湯證也若大熱蒸蒸汗出過
多則宜調胃承氣湯急下其熱救其津也若
更兼發熱下利不休內外兩脫故凶也頭汗
出劑頸而還則爲熱不得外越上蒸於首也
或因黃鬱未發或因濕家誤下或因水結胸

蒸或因火劫熱迫或因陽明蓄血或因熱入血室皆令成之則當分門施治可也

手足汗

手足濈濈然汗出便鞕尿利本當攻寒中汗冷尿不利攻之固瘕瀉澄清

註　胃主四肢爲津液之主今熱聚於胃蒸其津液傍達於四肢故手足濈濈然汗出且小便自利胃中津液必乾大便必鞕本當攻也若中寒胃陽土虛脾不約束津液橫溢四肢猶如陰盛淫雨滂沱故汗出而冷也陽虛失運中寒不化故小便不利也今雖便鞕而手足汗出非爲熱越者比愼不可攻攻之必變生固瘕泄瀉澄清不止也

潮熱時熱

午後一發爲潮熱無休發熱汗蒸蒸時熱自汗無裏證先時與藥桂枝要稱

註　潮熱陽明府證也陽明王於申酉故潮熱發於午後如潮信之不失因名之曰潮熱可下

之證也無休發熱汗蒸蒸謂發熱無休止之時熱氣透手溱溱有汗名曰蒸蒸發熱亦屬陽明內實可下之證也時熱自汗者謂發熱時輕時重而有自汗也似潮熱而次數似蒸蒸而休止潮熱蒸蒸之熱則必兼有可下之證時熱時止之熱則必不兼可下之證故曰無裏證也因其無裏證熱而有汗知風邪留連在表不已故用桂枝主治然必先其發熱汗出之時與桂枝湯也蓋桂枝不爲時熱自汗者設而爲時熱自汗有表無裏證者設也此處重在無裏證非謂凡有時熱自汗皆可服桂枝湯也

譫語鄭聲

譫語爲實聲長壯亂言無次數更端鄭聲爲虛音短細頻言重復更呢喃同陽經見均屬熱同陰經見總爲寒陽無可攻當清解陰不能溫清補痊

註　言語心主之也心氣實熱而神有餘則發爲譫語譫語爲實故聲長而壯亂言無次數數

更端也心氣虛熱而神不足則發爲鄭聲鄭聲爲虛故音短而細只將一言重復呢喃也蓋神有餘則能機變而亂言神不足則無機變而祇守一聲也凡譫語鄭聲與陽經同見者均屬熱證可以攻之與陰經同見者總爲寒證可以溫之若雖與陽經同見而無可攻之證不可攻之當清解也與陰經同見而無可溫之證不可溫之當清補也

渴證

三法傷津胃燥乾陽往乘陰渴亦然渴欲飲水少少與莫使停留飲病干太陽五苓尿不利陽明白虎飲連連少陽證具心煩渴小柴去半粉加添

註　渴病多因或汗或吐或下三法傷其津液致令胃中乾燥故引飲也陽邪往乘三陰太陰則嗌乾少陰則口燥陽邪亦屬熱傷津液故曰渴亦然也三陰之渴治法詳於三陰經內凡渴欲飲水者當少少與之以滋胃乾胃和則愈若恣意與飲之

不但渴不能愈致水停留爲病也太陽之渴用五苓散者以水停下焦小便不利故也陽明之渴用白虎者以胃熱飲水連連不已也少陽寒熱往來等證已具心煩渴者用小柴胡湯以和解去半夏以避燥加花粉以生津液也

舌胎

舌心外候本澤紅紅深赤色熱爲輕外紅內紫爲熱重滑白寒表少陽經沉遲細緊藏寒結乾薄氣液兩虛空黃黑胎潤黃表熱淺焦乾刺裂熱深明黑滑若與三陰見水來尅火百無生

註

舌者心之外候色應紅澤爲無病也若初感內外紅深則爲有熱外紅內紫則爲熱甚舌胎滑白則爲表寒其胎漸厚則爲傳少陽經也熱者宜辛涼汗之寒者宜辛溫汗之在少陽者爲胸中有寒丹田有熱也小柴胡湯兩解之胸中指表也淺也丹田指裏也深也非直指胸中丹田謂半裏之熱未成半表之寒

猶在故舌白一證有寒有熱也若其胎滑厚與陰證鮎同見乃藏虛寒結以理中加枳實溫而開之若其胎乾薄與陽證同見乃氣虛液竭以白虎加人參清而補之若白胎漸變黃色此爲去表入裏其熱尚淺表不罷者宜三黃石膏湯已入裏者凉膈散如焦乾黑色或芒刺裂紋此爲裏熱已深宜梔子金花湯兼滿痛者大承氣湯紅火色也黑水色也與三陽證見爲熱極反兼勝己之化清之下之尚可治也若與三陰證見則爲水來尅火百無一生治者以生薑擦之其黑色稍退急用附子理中四逆輩救之可生

胸脇滿痛

邪氣傳裏必先胸由胸及脇少陽經太陽鮎浮惟胸滿過經不解有陽明乾嘔潮熱胸脇滿大柴加消兩解行心腹引脇鞕滿痛乾嘔尿秘十棗攻

註　邪氣傳裏必先自胸若鮎浮惟胸滿而不及脇者仍屬太陽表分也宜麻黃湯因胸及脇

而皆滿者屬少陽經也宜小柴胡湯若十餘日不解而胸脇滿兼乾嘔潮熱者是少陽兼有陽明也宜大柴胡湯加芒消兩解之若表已解心下及腹引脇滿鞕而痛乾嘔小便不利者是停飲內實也宜十棗湯攻之

嘔證

嘔病因何屬少陽表入裏拒故爲殃太陽之嘔表不解食穀欲嘔在胃陽太陰有吐而無嘔厥陰涎沫吐蚘長少陰嘔利有水氣飲嘔相因是水鄉

註

嘔病諸經皆有因何屬少陽也因表邪入裏裏氣拒格上逆作嘔故爲殃屬少陽也宜小柴胡湯心下鞕而煩或不大便宜大柴胡湯表不解之嘔屬太陽也宜柴桂湯食穀欲嘔屬胃陽陽明也屬中寒宜吳茱萸湯得湯更嘔屬表熱宜葛根加半夏湯嘔吐涎沫或嘔吐蚘屬厥陰也宜吳茱萸湯吐蚘者宜烏梅丸嘔而下利是有水氣屬少陰也宜眞武湯飲而嘔嘔而飲飲嘔相因不已是停水

也宜五苓散

往來寒熱如瘧寒熱相因小柴胡如瘧寒熱三

往來寒熱少陽證寒熱相因小柴胡湯除

五發太陽麻桂等湯除

註

寒而熱熱而寒寒熱相因不已故名曰往來

寒熱爲少陽主證宜小柴胡湯寒熱而有作

止之常一日一次或隔日一次謂之瘧屬雜

病也寒熱而無作止之常日三五發謂之如

瘧屬太陽經未盡之表邪也宜麻桂各半湯

若熱多寒少宜桂枝二越婢一湯若有汗宜

桂枝二麻黃一湯若無汗亦宜麻桂各半湯

此皆治太陽未盡之微邪法也

目眩耳聾

少陽目眩神自正諸逆昏亂不能生重暍耳聾濕

溫汗不語面色變身青

註

目眩者目黑不明也耳聾者耳無所聞也皆

少陽經主證非死候也其目之明其耳之聰

神自完整若因三法失宜致諸變逆壞證目

眩而神昏言亂乃神散氣脫之候故曰不能生也若因誤發濕溫家汗而不能言語耳聾無聞身青面色變者名曰重暍亦死證也

腹滿痛

腹滿時痛不足證腹滿大痛有餘名誤下邪陷太陰裏汗熱便鞕轉陽明

註　腹滿時痛爲不足桂枝加芍藥湯不愈用理中湯腹滿大痛爲有餘桂枝加大黃湯此皆誤下邪陷太陰之裏證也若潮熱自汗大便鞕則爲太陰之邪轉屬陽明也宜大承氣湯

吐證

中寒吐食不能食不渴而厥吐寒虛得食吐渴火爲逆飲吐相因水病居

註　中寒吐食謂中寒吐食不能食也凡不渴而厥吐是寒虛吐也宜理中吳茱萸輩凡渴而得食即吐是火吐也熱實宜黃連解毒湯熱虛宜乾薑黃連黃芩湯或竹葉石膏湯渴而飲飲而吐吐而復渴水逆病也宜五苓散

熱利寒利

熱利尿紅渴黏穢寒利澄清小便白理中不應宜固澁仍然不應利之瘥

註　自利不渴者屬太陰寒也下利欲飲水者以有熱故也此以渴辨寒熱也小便黃赤穢氣稠黏者皆熱利也小便清白澄徹清穀皆寒利也熱利有表證輕者升麻葛根湯重者葛根湯汗之有裏證輕者量以三承氣湯下之無表裏證輕者宜黃芩湯重者宜葛根黃連黃芩湯清之寒利宜理中湯溫而補之若服理中湯不應者此屬下焦滑脫宜赤石脂禹餘糧湯固澁仍然不應此爲清濁不分水走大腸宜五苓散或豬苓湯利之可瘥也

但欲寐

行陰嗜臥無表裏呼醒復睡不須驚風溫鮎浮熱汗出多眠身重息鼾鳴

註　行陰欲寐嗜臥少陰證也若欲寐嗜臥無表裏證身和鮎小知已解也然解後之睡呼之

則醒醒而又睡是陰氣來復非陰盛困陽不須驚也風溫亦欲寐多眠則有衄浮發熱汗出身重鼻息鼾鳴之別也

陰陽咽痛

咽痛乾腫爲陽熱不乾不腫屬陰寒陽用甘桔等湯治陰用甘桔附薑攢

註　咽痛一證寒熱皆有咽乾腫痛爲三陽熱證宜甘桔半夏苦酒豬膚等湯調治不乾不腫而痛爲三陰寒證宜四逆湯加桔梗主治也

氣上衝

氣撞吐蚘厥陰本無蚘陽表桂枝湯少腹急引燒裩散衝喉難息瓜蒂良

註　氣撞吐蚘謂厥陰本證也無蚘謂氣撞不吐蚘乃邪猶在陽表也宜桂枝湯少腹急引謂氣上衝喉胸滿難以布息乃寒實在胸也宜瓜蒂散

氣上衝更少腹引陰急痛乃陰陽易病也宜燒裩散衝喉難息謂氣上衝喉胸滿難以布息乃寒實在胸也宜瓜蒂散

饑不欲食

饑不欲食吐蚘厥下後不食屬陽明懊憹頭汗梔子豉厥緊心煩邪在胸

註　饑不欲食吐蚘厥謂厥陰本證也下後饑不能食屬陽明病則懊憹心中煩甚頭上汗出是熱在胃中宜梔子豉湯涌之厥陰病則吐蚘厥逆脈微今不微而緊更心煩者非寒虛邪是寒實邪而在胸中宜瓜蒂散吐之

手足厥逆

太陰手足溫無厥少陰厥冷不能溫厥陰寒厥分微甚熱厥相因辨淺深

註　太陰經無厥逆而有手足自溫少陰經有寒厥而無熱厥陰經有寒熱二厥寒厥者祇寒而不熱也熱厥者由熱而厥由厥而熱熱厥相因無休歇也當辨陰陽淺深以當歸四逆承氣等湯施治可也詳厥陰篇

少腹滿痛

少腹滿而按之痛厥逆尿白冷膀胱不厥血蓄小

便利小便不利水爲殃

註　少腹滿按之痛若四肢厥冷小便清白者是冷結膀胱宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯不厥冷小便自利者是血蓄膀胱宜桃仁承氣湯小便不利者是水蓄膀胱宜五苓散若大小便不利者是水熱蓄結宜八正散

神昏狂亂蓄血發狂

神昏胃熱重陽狂三黃三承白解湯蓄血發狂小便利少腹鞕痛屬太陽陽明蓄血大便黑其人如狂而喜忘桃仁承氣抵當治須識作汗奄然狂

註　神昏胃熱謂神昏是胃經熱極乘心也重陽狂謂熱入於陽則狂亂也三黃謂三黃石膏湯治神昏狂亂表實無汗者也三承謂三承氣湯治神昏狂亂表實不便者也白解湯謂白虎解毒湯治神昏狂亂無表裏證而熱極者也太陽蓄血發狂則少腹鞕痛小便自利若小便不利是水熱蓄也非血蓄也陽明血蓄如狂則喜忘大便黑若大便不黑是熱極

也非血蓄也蓄血輕者桃仁承氣湯重者抵當湯擇而用之可也然發狂證亦有陽盛陰虛之人作汗將解之時奄然發狂譏然汗出而解者當須識之不可以藥也

循衣摸床

循衣摸床有二因太陽火劫熱傷陰小便利生不利死陽明熱極熱彌深皆緣三法失成壞衄實堪下弱難禁虛實陰陽難辨處獨參六味可回春

註　循衣摸床危惡之證也一因太陽火劫取汗致陽盛傷陰陰若未竭則小便利多生陰若已竭則小便難多死一因陽明熱極汗吐下三法失宜致成壞證其熱彌深衄實者堪下則可治衄弱者不堪下則難治此已成危惡壞證往往陰陽虛實醫莫能辨無下手處當以大劑獨參六味乾生地黃湯時時與之每獲生也

太陽陽邪停飲

太陽陽邪有水逆消渴發熱汗出煩小便不利水

入吐鈹浮而數五苓攢

註　太陽陽邪有水逆消渴之病謂太陽中風有渴欲飲水水入卽吐者名曰水逆飲水多而小便少者名曰消渴發熱汗出風邪也煩熱也小便不利水入則吐飲停也浮數風熱鈹者是熱盛也以五苓散多服煖水令微汗出外解太陽內利停水則愈若不能飲煖水欲飲冷水可也詳太陽上篇

太陽陰邪停飲

太陽陰邪有水氣傷寒無汗熱烘烘主證乾嘔欬微喘外發內散小青龍小便不利少腹滿下利除麻共入苓噎麻易附喘加杏渴加花粉減半平

註　太陽陰邪有水氣謂太陽傷寒表不解發熱無汗兼有乾嘔而欬微喘飲病之主證宜以小青龍湯外發寒邪內散寒飲則可愈也或小便不利少腹滿或下利或噎或喘或渴此飲病或有之證亦以小青龍湯主之小便不

利少腹滿是水停下焦大便下利是水走大腸俱除麻黃共入茯苓專滲利也噎爲內寒之甚以麻黃易附子散內寒也喘氣上逆加杏仁以降逆也渴加花粉減去半夏以避燥生津也詳太陽下篇

少陰陽邪停飲

少陰陽邪有停飲六七日反不得眠下利而渴欬而嘔小便不利豬苓煎

註　少陰陽邪有停飲謂少陰陽邪熱證兼有停飲病也少陰病當欲寐至六七日反心煩不得眠是少陰熱也下利而渴欬嘔小便不利是水飲停也以豬苓湯去其熱而利其水可也詳少陰篇

少陰陰邪停飲

少陰陰邪有水氣腹痛四肢重沉疼小便不利自下利或欬或嘔眞武平欬加乾薑辛味共小便若利去茯苓嘔去附子生薑倍利去芍藥入乾薑

註　少陰陰邪有水氣謂少陰陰寒兼有水氣病

也飲病主證謂腹痛四肢沉重疼痛大便自利小便不利宜真武湯溫中利水也飲病或有之證或欬或小便利或嘔或下利欬加生薑細辛五味子小便若利去茯苓嘔去附子倍加生薑利去芍藥入乾薑也

喘急短氣

喘息喝喝喝數張口短氣似喘不擡肩促難布息爲實證短不續息作虛觀內因飲病或痰熱外因陰陽表裏看直視神昏汗潤髮鮀微肢厥命難全

註

喘息氣急喝喝而數張口擡肩欠肚者喘也短氣則似喘非喘而不張口擡肩也二證皆胸中氣病肺主氣故屬肺也無論喘急短氣若氣促壅塞不能布息爲有餘之實證若氣短空乏不能續息爲不足之虛證內因謂飲冷傷肺或因痰熱也外因謂形寒傷表表主皮毛肺之合也皮毛受邪其次及膚及肌及胸及腹入胃皆令病喘當審陰陽表裏從化主治可也喘急短氣兼直視神昏汗出潤髮

蚘微四肢厥冷皆死候也與三陰寒證同見是爲陰喘宜四逆加杏仁五味子虛者倍加人參與三陽熱證同見是爲陽喘宜白虎葛根黃芩黃連湯與太陽表證同見是爲表喘無汗者麻黃湯兼煩躁者大青龍湯有汗者桂枝加厚朴杏子湯與陽明裏證同見是爲裏喘宜大承氣湯兼結胸者宜大陷胸丸若兼水氣表實者小青龍湯表虛者及小便不利均宜五苓散加葶藶子裏實者宜葶藶大棗湯兼腹脇鞕痛者宜十棗湯裏寒者宜眞武湯若蚘微細尸鼻氣短喘乏而無陰陽表裏證此氣虛喘也宜保元湯加五味子杏仁若喘而唾痰稠黏喉間瀧瀧有聲此痰喘也重者宜瓜蒂散礞石滾痰丸輕者二陳加苦葶藶子蘇子之類也

心下悸

築築惕惕心動悸怔忡怔忡不自安飲多尿少爲停水厥冷汗後是虛寒

註心下築築惕惕怔怔忡忡謂悸病之狀也飲水多而小便少水停心下之悸也宜茯苓甘草湯或五苓散厥冷爲寒宜眞武湯汗後爲虛宜小建中湯或不因汗後是虛之甚也宜炙甘草湯

戰振慄

戰身聳動慄心懍振雖聳動比戰輕故振責虛因無力慄戰相交邪正爭此證若生三法後虛其中外逆而成不逆因和而作解正勝邪却戰汗平

註戰謂身抖聳動也慄謂心內發懍也振亦聳動比之於戰則無力也所以論中曰振振者皆責其虛也慄邪氣爲之也戰正氣爲之也邪正相交故爭也此證若生於汗吐下之後是虛其中外而致逆也若不致逆邪因以衰正因以和而作解則爲正勝邪却戰慄汗出而平也

呃逆噦噫

呃逆今名餲古名不似噦噦胃裏聲餲聲格格連

聲作原夫臍下氣來衝頰類噯噫情自異均屬氣
逆治能同虛熱橘皮竹茹治二便不利利之寧氣
不歸原宜都氣寒虛丁萸附理中痞鞕下利生薑
瀉痞鞕噫氣代赭功

註　今之名曰呃逆即古之名曰噦也噦者氣噎
結有聲也世有以噦爲呃逆者蓋不知噦噦
之聲聲從胃裏出口不似鴿之格格連聲氣
從臍下來自衝脈出口作聲也呃逆頰類噯
氣噫氣噯氣者因飽食太急比時作噯轉食
氣也噫氣者因過食傷食越時作噫食臭氣
也故曰情自異也但均屬氣逆爲病故曰治
能同也呃逆之病胃氣虛竭也兼熱者以橘
皮竹茹湯加柿蒂主之兼大便不利以三承
氣湯主之兼小便不利以二苓散湯主之兼
腎虛不能攝衝脈之氣歸原以都氣湯加牛
膝主之兼寒虛太陰手足溫以丁萸理中湯
主之少陰手足厥更加附子兼痞鞕下利以
生薑瀉心湯主之兼痞鞕噫氣以旋覆代赭

石湯主之

結胸

按之滿鞕不痛痞鞕而滿痛爲結胸大結從心至少腹小結心下按方疼熱微頭汗爲水結漱水不嚥血結名瘀衄未盡經適斷內實沉大審的攻抵當桃仁大小陷誤攻浮大命多傾不實浮滑小陷證藏結悉具躁煩凶

註　傷寒下之太早則成痞鞕中風下之太早則成結胸均爲表邪乘虛入裏鞕滿按之而痛爲結胸實邪也鞕滿按之不痛爲痞鞕虛邪也大結謂大結胸從心下至少腹鞕滿而痛手不可近者宜大陷胸湯攻之小結謂小結胸微結心下按之方痛不按不疼也宜小陷胸湯開之身有微熱頭自汗出兼有是證者爲水結胸也宜大陷胸丸攻之漱水不欲嚥兼有是證者爲血結胸也血瘀不成衄解或衄未盡或婦人經來適斷皆能成之宜抵當丸或桃仁承氣湯攻之內實證實可攻也沉

大鱉實可攻也審其的當則用抵當桃仁承氣大陷胸湯丸以攻之審若不內實鱉浮滑或鱉浮大是未的也乃小陷胸證不可攻也誤攻之定然凶也藏結謂狀如結胸舌胎白滑鱉浮而細也悉具謂結胸通腹兩脇皆鞕滿痛也此證加之煩躁凶死可知

痞鞕

陽證痞鞕爲熱痞大黃黃連瀉心寧汗出惡寒寒熱痞附子瀉心兩收功誤下少陽發熱嘔痞滿半夏瀉心能虛熱水氣痞下利心煩乾嘔腹雷鳴虛熱水氣生薑瀉痞急氣逆甘草靈桂枝表解乃攻痞五苓煩渴利尿通

註　傷寒下早則成痞鞕中風下早則成結胸此其常也然論中大抵從虛化者多爲痞鞕從實化者多結胸也陽證心下痞鞕爲熱痞宜下早亦有結胸中風下早未嘗無痞鞕傷寒大黃黃連瀉心湯若陽證汗出惡寒爲寒熱痞宜附子瀉心湯誤下少陽發熱而嘔心下

痞滿爲嘔逆痞宜半夏瀉心湯陽證誤下心下痞鞕下利心煩乾嘔腹中雷鳴脇下有水氣致小便不利爲虛熱水氣之痞宜生薑瀉心湯若有是證脇下無水氣其痞急益甚爲虛熱客氣上逆之痞宜甘草瀉心湯凡有痞者有無汗惡寒之表宜桂枝湯表解已乃可以大黃黃連瀉心湯攻痞也若有痞者與瀉心湯痞不解其人煩渴小便不利先以五苓散小便利後乃可與諸瀉心湯治痞也

發黃

濕熱發黃頭汗出小便不利渴陽明素有寒濕發汗後黃從陰化太陰經陽色鮮明陰色暗太陽血蓄併狂生表實麻翹赤小豆茵蔯裏實梔子清陰黃茵蔯四逆主便溏尿秘茵五苓環口黧黑桑汗死體若烟熏陽絕徵

註　陽明病應徧身有汗謂之熱越今頭汗出身無汗是熱不得越也渴而引飲小便不利是停水也熱與濕瘀從土而化外薄肌肉謂之

濕熱發黃也或其人素有寒濕爲表邪遏鬱或已成黃又經發汗傳入太陰從陰而化謂之濕寒發黃也陽明屬陽故其色明亮太陰屬陰故其色晦暗也太陽蓄血亦有發黃多與狂病併生法當從蓄血治也表實無汗發者宜麻黃連翹赤小豆湯汗之裏實不便者宜茵蔯蒿湯下之無表裏證熱盛者宜梔子蘗皮湯清之陰證發黃者宜茵蔯四逆湯溫之若大便溏小便秘發黃者宜茵蔯五苓散利之環口黧黑柔汗者陰黃死證也柔汗謂冷汗也身體枯燥如烟熏者陽黃死證也

疹斑

傷寒疹斑失汗下感而即出時氣然表邪覆鬱營衛分外泛皮毓疹斑疹白疹紅如膚粟斑紅如豆片連連紅輕赤重黑黑多死淡紅稀暗是陰寒未透升麻消毒治熱盛三黃石膏煎已透青黛消斑飲雙解疹疹法同前

註　傷寒發斑疹疹皆因汗下失宜外邪覆鬱內

熱泛出而成也惟時氣傳染感而卽出亦由疫之爲病烈而速也發於衞分則爲痧衞主氣故色白如膚粟也發於營分則爲疹斑營主血故色紅膚淺爲疹深重爲斑斑形如豆甚則成片連屬斑疹之色紅者輕赤者重黑者死此以熱之深淺驗死生也若其色淡紅而稀暗者皆因邪在三陽已成斑疹入裏邪從陰化或過服涼藥所致是爲陰斑陰痧陰疹法當從陰寒主治也斑出未透表熱輕者宜升麻葛根湯合消毒犀角飲治之表熱重者宜三黃石膏湯發之已透用靑黛消斑飲加減淸之痧疹初起表裏不淸用雙解散先通表裏餘法同前治之可也

衄血

陽明衄血血熱在裏太陽頭痛目瞤兆陽明漱水不嚥徵衄後身涼知作解不解升麻犀角淸末衄表實麻黃汗裏熱犀角苓連同

註　陽明衄血熱在裏也太陽衄血熱痓經也太

陽失汗則有頭痛目瞑之兆陽明失下則有
漱水不欲嚥之徵衄血之後身涼脈靜知作
解也若仍不解知衄未盡熱留於營也無汗
表熱宜升麻葛根合犀角地黃湯黃宜麻黃湯汗之裏熱宜犀
作衄未衄者表實宜
角地黃湯加苓連清之若表實裏熱者則又
當合二方兩解之
吐血
傷寒吐血多因逆下厥上竭少陰經三陽熱盛宜

清解血瘀胸滿痛當攻暴吐腐臭內潰死過多血
脫面無紅犀角桃仁宜揀用救脫聖愈及養榮
註傷寒吐血皆因失汗失下火逆以致邪熱熾
盛沸騰經血故也若血從口鼻耳目而出小
便難此爲強發少陰汗名曰下厥上竭爲難
治也三陽熱盛吐血宜升麻葛根合犀角地
黃湯熱甚加苓連清解可也若血瘀則胸滿
或痛當以桃仁承氣合犀角地黃湯攻之若
暴吐腐臭之血名曰內潰內潰者死若吐血

過多面脣無紅色名曰血脫救脫輕者以聖愈湯重者以人參養榮湯

大小便膿血

熱在膀胱小便血八正導赤利之佳熱瘀裏急下膿血黃連白頭與桃花

註　陽經之熱下注膀胱胱傷其營分熱少血多瘀成血蓄熱多血少熱廹血行血不得蓄而走下竅故尿血也以八正散導赤散利而清之陰經之熱轉廹陽明傷其營分瘀則血蓄喜忘如狂不蓄則便血熱腐則便膿便膿熱鬱裏急下重所必然也輕者宜黃連阿膠湯重者白頭翁湯清之滑脫者桃花湯濟之可也

頤毒

傷寒發頤耳下腫失於汗下此毒生高腫瘀紅痛爲順反此神昏命必傾毒伏未發衄亦隱冷汗淋漓肢若氷煩渴不便指甲紫頗似三陰了了輕

註　傷寒頤毒皆因汗下失宜毒熱挾少陽相火上攻而成也若其人陽氣素盛則高腫瘀紅

疼痛易於成膿故爲順也宜連翹敗毒散散之或其人陽氣素虛或服冷藥過多遏鬱毒熱伏藏在裏內攻神昏外毒漫腫肉色不變不疼木硬則命必危也毒伏未發之前往往似三陰亡陽之證厥隱不見冷汗淋漓肢冷若氷但身輕目晴了了煩渴不大便指甲紅紫爲異此毒發始臨治不可忽也

狐惑

古名狐惑近名疳狐蝕肛陰惑脣咽病後餘毒斑疹後癖疾利後也同然面皆赤白黑不一目不能閉喜貪眠潮熱聲啞糜腐穢氣能食堪藥治多全

註　狐惑牙疳下疳等瘡之古名也近時惟以疳呼之下疳即狐也蝕爛肛陰牙疳即惑也蝕咽腐齦脫牙穿腮破脣毒因傷寒病後餘毒與濕蠱之爲害也或生斑疹之後或生癖疾下利之後其爲患亦同也其證則面色目皆或赤或白或黑時時不一喜睡目不能閉潮熱聲啞腐爛之處穢氣熏人若胃壯能食堪

受攻病重藥或病之勢緩治多全也

百合

百合百脈合一病如寒似熱藥無靈飲食起居皆忽忽如神若鬼附其形脈數溺時輒頭痛溺時不痛漸漸風溺時快然但頭眩六四二十病方寧

註

百合病者謂傷寒過期留連不解不分經絡百脈悉合爲一病也如寒似熱諸藥無靈欲飲不能飲欲食不能食欲臥不能臥欲行不能行精神忽忽如神若鬼附其形體而莫知所適從也如脈數溺時輒頭痛者六十日乃愈若溺尿時頭不痛惟漸漸然惡風寒者四十日乃愈若溺時快然但頭眩者二十日乃愈故曰六四二十日病方寧也

熱入血室

婦人傷寒同一治胎產經來熱入室晝日明了夜譫妄小柴生地牡丹皮無汗加麻有汗桂汗後不解再加枝寒熱如瘧加麻桂中寒薑附不須疑渴熱白虎花粉葛瘀血桃仁承氣俱產後胎前雖多

證不外陰陽表裏醫

註　婦人傷寒與男子治法同也惟產後經來邪熱乘虛而入血室另有治法熱入血室之證晝日明了夜則譫語妄見鬼狀宜小柴胡湯加生地丹皮若無汗則爲表實加麻黃汗之有汗則爲表虛加桂枝解之若有發熱惡寒之表已經發汗雖無汗不加麻黃再加桂枝以解之不可復用麻黃也若有如瘧之寒熱加麻黃桂枝兩解之若厥而下利則爲中寒去黃芩加薑附不須疑也若發熱煩渴則爲裏熱去半夏合白虎或加花粉葛根胸脇少腹或滿鞕或作痛則爲瘀血宜合桃仁承氣湯攻之產後胎前雖有多證不能盡述總不外陰陽表裏之治在臨證者以意消息之耳

食復勞復

新愈藏府皆不足營衛腸胃未通和多食過勞復生熱枳實梔子大黃姜浮汗沉下小柴解燥嘔竹葉石膏合氣虛補中益氣主陰虧六味倍參多

註　新愈之後藏府氣血皆不足營衛未通腸胃未和惟宜白粥靜養若過食胃弱難消因復煩熱名曰食復若過勞役復生熱煩名曰勞復者宜枳實梔子豉湯汗之食復者宜枳實梔子豉加大黃湯下之勞復者宜枳實梔子豉湯以汗解之脈沉有裏者宜枳實梔子豉加大黃湯以下解之若無表裏證者宜小柴胡湯以和解之口燥煩渴喜嘔者宜竹葉石膏湯主之若內傷氣虛勞復者宜補中益氣湯主之若犯內事陰虧者宜六味丸乾地黃湯氣少者倍加人參湯主之

房勞復陰陽易

房勞復與陰陽易二病情異證則同病後犯色復自病病傳不病易之名男女俱主燒褌散少腹急痛引陰中身重少氣頭眩暈拘攣熱氣上衝胸

註　男女新愈交接因而復病名曰房勞復男女新愈交接病男傳不病之女病女傳不病之男名曰陰陽易即交易之義也犯是病者男

以女之褌褯女以男之褌褯燒灰白湯或酒
日三服之則愈少腹急痛牽引陰中身重少
氣頭目眩暈四肢拘攣熱氣衝胸是其證也

欽定四庫全書

欽定四庫全書 傷寒心法要訣

卷三十八

T7910/7388
CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932
ChL 7918.7638

卷三十八

類傷寒五證起至河間雨解利法止



御纂醫宗金鑑卷三十八

編輯傷寒心法要訣目錄

類傷寒五證
停飲　傷食　脚氣　虛煩
內癰
同傷寒十二證
冬溫　寒疫　瘟疫　溫病
熱病　風溫　溫瘧　濕溫
中暍　溫毒　風濕　痙病

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

易愈生證
難治死證
彙方
附河間兩解利法等

御纂醫宗金鑑卷三十八

編輯傷寒心法要訣

類傷寒五證

停痰　傷食　脚氣　虛煩　內癰

相類傷寒有五證頭疼發熱惡風寒停痰頭項不
强痛胸滿難息氣衝咽傷食惡食身無痛痞悶失
氣噫作酸脚氣脚膝脛腫痛或爲乾枯大便難虛
煩微熱無表裏內癰能食審疼緣肺癰喘欬胸引
痛唾黏腥臭吐膿涎胃癰當胃痛難近腸癰腫痛

少腹堅身皮甲錯腹中急便數似淋證中看

註　類傷寒五證初病之時皆與太陽表證相類一曰停痰但胸滿不得息氣上衝咽頭項不强痛與傷寒異耳一曰傷食但身無痛心下痞悶失氣噫氣作酸吞酸與傷寒異耳一曰脚氣但病起自脚脚膝兩脛腫痛或乾枯腫痛名曰乾脚氣大便鞕難與傷寒異耳一曰虛煩惟發熱而煩無表裏證與傷寒異耳一曰內癰其狀頗類傷寒但飲食如故有癰痛之處與傷寒異耳胸中隱痛或喘或欬吐唾腥黏是肺癰也當胃作痛手不可近是胃癰也少腹重痛便數似淋身皮甲錯是腸癰也

同傷寒十二證

冬溫　寒疫　瘟疫

春溫夏熱秋清涼冬氣冷冽令之常傷之四時皆正病非時有氣疫爲殃應冷反溫冬溫病應溫反冷寒疫傷瘟疫長幼相傳染須識歲氣汗攻良

註　冬病傷寒春病傷風夏病暑病秋病瘧疾皆

四時正令之常病也若春應暖而反寒夏應熱而反凉秋應凉而反熱冬應寒而反温此非其時而有其氣疫爲殃也冬應冷反温而病傷寒者名曰寒疫若一時之氣不正長幼皆病互相傳染名曰瘟疫凡治此病須識歲氣太過不及六淫勝復人之强弱藏之寒熱量其輕重或汗或攻輕以劉完素之雙解散重以李杲之二聖救苦丸隨證施治可也

温病　熱病

冬傷於寒春病温夏曰熱病早虧陰鮀浮頭疼發熱渴不惡寒兮是所因無汗河間兩解法有汗清下早當尋失治昏狂諸熱至無證隨經以意神

註　經曰冬傷於寒春必病温至夏爲熱病熱病者皆傷寒之類也名冬傷於寒謂冬傷正令微寒未即病也早虧陰謂冬不藏精之人或辛苦之人汗出內外失其固密在冬則早已損傷腎藏陰氣陽熱獨治所以至春一感微邪

即引內熱炎炎之勢不能已矣故病而即渴不惡寒也初病無汗有表證者從劉完素兩解湯治法可也有汗內熱盛者或清或攻急瀉其陽而救其陰若因循失治昏狂諸熱證至則緩不及事也無證謂表裏無證當隨六經以意消息治之自可通神也

風溫

風溫原自感春風誤汗灼熱汗津生陰陽俱浮難出語身重多眠息鼾鳴誤下直視失溲少被火發黃痴痙癡驚葳蕤桂枝參白虎一逆引曰再命終

註　冬傷於寒不即病者復感春寒名曰溫病復感春風名曰風溫風溫有汗不可汗也若誤汗之益助火邪則身熱如火自汗津津不止言語難出身重多眠鼻息鼾鳴也風溫陰陽俱浮不可下也若誤下之熱陷膀胱胱竭其津液則直視失溲小便少也風濕熱盛若誤以火熏蒸強汗火旺津亡則發黃色痴痙驚癎也風溫之證不可汗下主以葳蕤湯若鮓

虛汗多主以桂枝合人參白虎湯一逆引日再命終謂一逆尚可引日若汗而又下下而又火則爲再逆是促命期也

溫痙

溫痙得之冬中風寒氣藏於骨髓中至春邪氣不能發遇暑爍髓消肌形或因用力腠發泄邪汗同出故熱生衰則氣復寒後作證同溫熱治相同

註

經曰溫痙得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春陽氣尚微邪氣不能自出因值大暑爍腦髓消肌肉腠理發泄或有所用力邪氣與汗同出出則陰虛而陽盛故熱生也衰則氣復入入則陽虛而陰盛故後作寒也其證同溫熱治亦相同也

濕溫

濕溫復傷濕濕溫病身重胸滿及頭疼妄言多汗兩脛冷白虎湯加蒼术苓

註

溫病復傷於濕名曰濕溫其證則身重胸滿頭疼妄言多汗兩脛逆冷宜白虎湯加蒼术

茯苓溫濕兩治法也

中暍　溫毒　風濕

溫病中暍溫毒病證同溫熱熱尤炎傷濕汗出當風立風濕發熱重疼牽

註　中暍卽中暑也溫熱之病復中於暑名曰溫毒證治同乎溫熱但熱尤盛也傷濕之病復感於風名曰風濕其證發熱身重疼痛牽掣也治法已詳於身痛矣中暍詳在暑門

痙證

痙證反張搖頭噤項强拘急轉側難身熱足寒面目赤須審剛柔治法全

註　風濕寒之邪合而爲痙其證則背反張搖頭口噤項强拘急轉側難身熱足寒面色也須審剛柔治之可痊也風濕盛者則有汗爲剛痙均以小續命湯主之剛痙去附子柔痙去麻黃表實汗爲柔痙風寒盛者則無汗爲剛痙以小者去參附加羌活獨活裏實者去參附加芒消大黃甚者則以葛根湯桂枝加葛根湯發

之此治瘂之大畧也詳在瘂門

易愈生證

神清色澤亮音聲身輕膚潤鮀和洪忽然口噤難言躁鮀卽停伏戰汗寧飲多消散知釀汗能食鮀浮表還平子得午解陽來濟午得子解是陰從

註　易愈之病取於神則神清取於色則色澤取於聲則音長取於體則身輕取於皮則膚潤取於鮀則和洪皆一派不死之證故曰生證也若有如是之生證忽然口噤不語煩躁而甚六鮀停伏宜謹察之非變凶也乃邪正交爭生戰汗之候爲將愈之兆也凡傷寒渴者多陽證易愈若忽然飲多尋常消散無停知釀汗而作解也傷寒多不能食若忽然能食且鮀浮知胃和邪還於表而作解也若不卽解者陰陽未得其時也子時得之午時必解陽濟陰生而解也午時得之子時必解陰從陽化而解也

難治死證

傷寒死證陽見陰大熱不止厥失神陰毒陽毒六七日色枯聲敗死多聞心絕烟熏陽獨留神昏直視及搖頭環口黧黑腹滿利桑汗陰黃脾敗由肺絕厥浮而無胃汗出如油喘不休脣胎反青肢冷汗舌卷囊縮是肝憂面黑齒長且枯垢溲便遺失腎可愁水漿不入厥代散呃逆不已命難留大發風溫而成痙濕溫重暍促命終強發少陰動經血口鼻目出厥竭名汗後狂言不食熱厥躁陰陽交死形厥冷不及七八日虛脣冷而躁暫難寧此病名之曰藏厥厥而無厥暴出凶厥而下利當不食反能食者名除中

註

病有生死治有難易生病不藥可愈死病雖藥莫救何則以陰陽邪正有盛衰也正盛邪衰則生陰盛陽衰則死傷寒陽證見浮大數動滑之陽厥則易愈而生見沉微濇弱弦之陰厥則難治而死故陰病見陽厥者生陽病見陰厥者死也大熱不止邪盛厥失神正虛正虛邪盛故死也陰毒陽毒亢極不生化也

色枯聲敗內外兩奪也故均主死形若烟熏神昏直視搖頭者此陽邪獨留攻心而絕也環口黧黑腹滿下利不止桑汗陽黃者此爲脾絕也鮾但浮無胃汗出如油喘息不休者此爲肺絕也脣胎反青四肢冷汗舌卷囊縮爲腎絕也水漿不入生無所賴也鮾代散眞氣衰散也呃逆無休元氣不藏也誤發風溫之汗因而成瘂誤發濕溫之汗名曰重暍皆促人命也強發少陰汗動其經血從口鼻目出名曰下厥上竭以上皆死之候也汗後狂言不食仍復發熱不爲汗衰鮾躁疾者名曰陰陽交死之形也厥逆不回至七八日卽通身膚冷而躁無暫寧時者名爲藏厥爲陰邪盛極眞陽飛越也凡厥逆而甚者多無鮾服四逆白通等湯鮾微續者眞陽漸復也鮾暴出者回光反照也凡厥逆多下利當不能食今反能食名曰除中中者胃也除者去也謂

胃氣已去卽反能食亦無補於胃也故仲景曰除中者死凡諸病久不能食忽然大能食而卽死者亦此類也

彙方

桂枝湯

小建中湯

當歸建中湯

黃耆建中湯

桂枝加葛根湯

桂枝新加湯

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

桂枝加附子湯

芍藥甘草湯

桂枝甘草湯

桂枝芍藥草薑棗加飴當歸者曰建中加葛根湯加當歸四逆歸通細更加吳萸生薑用生加附子湯加附子去桂去芍兩名與

註　桂枝湯桂枝芍藥甘草生薑大棗也依本方倍芍藥加飴糖名小建中湯更加當歸名當歸建中湯更加黃耆名黃耆建中湯依本方加葛根名桂枝加葛根湯依本方倍芍藥加人參名桂枝新加湯依本方加當歸通草細辛名當歸四逆加吳茱萸生薑湯依本方加附子名桂枝加附子湯依本方去芍藥名桂枝甘草湯依本方去桂枝名芍藥甘草湯

桂枝去芍藥加茯苓白朮湯

苓桂朮甘湯

茯苓甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝去芍加苓朮甘去棗薑茯苓甘草生薑桂加棗除薑大棗湯

註　桂枝去芍藥加茯苓白朮湯即桂枝甘草生薑大棗茯苓甘草湯也依本方減去大棗生薑即苓桂朮甘湯也茯苓甘草湯即茯苓甘

桂枝生薑也依本方加大棗減生薑卽茯苓
桂枝甘草大棗湯也

葛根湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

葛根桂枝加麻葛合麻桂麻各半湯桂二麻一
減半桂二越一桂倍方

註　葛根湯卽桂枝湯加麻黃葛根也桂枝麻黃

各半湯卽桂枝湯麻黃湯二方合劑也桂枝
二麻黃一湯卽桂枝湯合減一半麻黃湯也
桂枝二越婢一湯卽越婢湯合加一倍桂枝
湯也

麻黃湯

大靑龍湯

越婢湯

越婢加附子湯

越婢加半夏湯

麻黃麻桂甘草杏加膏薑棗大青龍越婢大青減桂杏加附加半風水清

註　麻黃湯麻黃桂枝甘草杏仁也依本方加石膏生薑大棗名大青龍湯依大青龍湯減桂枝杏仁名越婢湯治風水病之肌熱者若陽虛惡寒加附子名越婢加附子湯喘欬上氣加半夏名越婢加半夏湯當清別而施治也

麻黃加术湯

三拗湯

麻杏石甘湯

麻黃加术風濕痛三拗去桂喘寒風加膏麻杏石甘劑外寒內熱喘收功

註　麻黃加术湯即麻黃湯加白术也治風濕在表身痛麻黃湯去桂枝名三拗湯治風寒表實而喘三拗湯加石膏名麻杏石甘湯治內熱表寒無汗而喘

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

麻黃附子細辛湯減辛加草甘草方兩感太陽少陰證能發表水裏寒涼

註　麻黃附子細辛湯卽此三味也去細辛加甘草名麻黃附子甘草湯不但能發兩感太陽少陰表裏寒之腫也

小靑龍湯

附子湯

眞武湯

桂芍乾薑辛半味麻黃甘草小靑龍附子朮附參苓芍眞武無參有薑生薑

註　小靑龍湯桂枝白芍乾薑細辛半夏五味子麻黃甘草也附子湯白朮附子人參茯苓白芍也眞武湯卽附子湯除去人參加生薑也

乾薑附子湯

白通湯

白通加人尿豬膽汁湯

四逆湯

通鯽四逆湯

茯苓四逆湯

理中湯

桂枝人參湯

附子理中湯

治中湯

薑附加葱白通劑更加尿膽治格陽加草四逆葱通鯽加參茯苓四逆方理中參朮乾薑草加桂桂枝人參湯加附名曰附子理加入青陳治中湯

註

乾薑附子名曰乾薑附子湯依本方加葱名曰白通湯更加人尿豬膽汁名白通加人尿豬膽汁湯依本方加甘草名四逆湯更加葱白名通鯽四逆湯依四逆湯方加人參茯苓名茯苓四逆湯溫中利水人參白朮乾薑甘草名理中湯依理中湯方加桂枝名桂枝人參湯依理中湯方加附子名附子理中湯依理中湯方加青皮陳皮名治中湯溫中理氣

五苓散

春澤湯

五苓甘露飲

蒼附五苓散

茵蔯五苓散

胃苓湯

五苓停水尿不利內蓄膀胱外太陽二苓澤朮桂分用虛渴加參春澤湯甘露寒水膏滑入蒼附內寒附子蒼茵蔯發黃小便澁食瀉合胃胃苓方

註　五苓散卽茯苓豬苓澤瀉白朮桂枝也治水停小便不利少腹滿則爲內蓄膀胱若不兼太陽頭痛惡寒發熱自汗之表則不用桂枝而用肉桂故曰桂分用也治諸虛飲渴加人參名春澤湯治水停內熱加寒水石滑石石膏名五苓甘露飲治水停內寒加附子蒼朮名蒼附五苓散治內瘀濕熱小便不利發黃加茵蔯名茵蔯五苓散治停水傷食泄瀉合平胃散名胃苓湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

枳實梔子豉湯

枳實梔子豉加大黃湯

梔子乾薑湯

梔子厚朴湯

梔豉加草加生薑枳實梔豉加大黃去豉梔子乾薑入枳朴梔子厚朴湯

註　梔子淡豆豉名梔子豉湯加甘草名梔子甘草豉湯加生薑名梔子生薑豉湯加枳實名枳實梔子豉湯依枳實梔子豉方加大黃名枳實梔子豉加大黃湯去豉加乾薑名梔子乾薑湯去豉加乾薑名梔子厚朴湯

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃連翹赤小豆梓皮杏草棗生薑梔子蘗皮茵蔯草茵蔯蒿湯茵梔黃

梔子蘗皮湯

茵蔯蒿湯

註　麻黃連翹赤小豆湯卽麻黃連翹赤小豆生梓白皮杏仁甘草大棗生薑也如無梓皮以茵蔯代之梔子蘗皮湯卽梔子黃蘗甘草也此方當有茵蔯蒿湯卽茵蔯梔子大黃也

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

旋覆代赭石湯

大黃黃連瀉心浸附子煮汁大連芩甘草芩連乾半棗半夏同上更加參生薑瀉心生薑入覆赭薑棗半甘參

註　大黃黃連瀉心湯卽大黃黃連滾湯浸而服也附子謂附子瀉心湯也附子煎汁大黃黃連黃芩浸而對服甘草瀉心湯卽甘草黃芩大棗也半夏瀉心湯卽同上

方加人參也生薑瀉心湯卽半夏瀉心方再加生薑也旋覆代赭石湯卽旋覆花代赭石甘草半夏大棗生薑人參也

十棗湯

白散方

調胃承氣湯

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

十棗芫花甘遂戟白散桔貝巴霜俱調胃大黃芒消草大陷去草入遂須爲丸更加杏蓴蜜小陷連半栝蔞實

註　十棗湯卽十枚大棗芫花甘遂大戟也白散卽桔梗貝母巴豆霜也調胃承氣湯卽大黃芒消甘草也大陷胸湯卽調胃承氣湯去甘草加甘遂些須也大陷胸丸卽大陷胸湯加杏仁苦蓴蘆子蜜也小陷胸湯卽黃連半夏栝蔞實也

小承氣湯

大承氣湯

麻仁丸

桃仁承氣湯

抵當湯丸

三一承氣湯

黃龍湯

小承大黃同枳朴加消卽是大承方麻仁小承杏芍桃仁調胃桂枝長抵當湯丸分微甚俱用桃

黃水蛭蝱蟲三承合一名三一加參歸桔黃龍湯

註　小承氣湯卽大黃枳實厚朴也依本方加芒消卽大承氣湯麻仁丸卽小承氣湯方加麻仁杏仁芍藥也桃仁承氣湯卽調胃承氣湯加桃仁桂枝也抵當湯丸分病之微甚俱用桃仁大黃水蛭蝱蟲四味也三承謂大承氣小承氣調胃承氣三方合爲一方名曰三一承氣湯依三一承氣方再加人參當歸桔梗名曰黃龍湯

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加芒消湯

柴胡桂枝湯

小柴芩半人參草大柴芩半枳芍黃小柴胡加芒消入合桂柴胡桂枝湯

註　小柴胡湯卽柴胡黃芩半夏人參甘草也大柴胡湯柴胡黃芩半夏枳實芍藥大黃也柴胡加芒消湯卽小柴胡湯方加芒消也柴胡桂枝湯卽桂枝湯小柴胡湯二方合爲一方也

豬苓湯

白虎湯

竹葉石膏湯

豬苓二苓膠滑澤白虎膏知甘草粳竹葉石膏除知母加參半竹麥門冬

註　豬苓湯卽豬苓茯苓阿膠滑石澤瀉也白虎湯卽石膏知母甘草粳米也竹葉石膏湯卽

白虎湯除知母加人參竹葉半夏麥門冬也

炙甘草湯

汗下煩悸小建治水悸茯苓甘草君虛悸肺痿炙甘草地阿桂酒麥酸參

註　汗下後虛煩而悸宜小建中湯治之心下悸若飲水多小便少謂之水悸宜茯苓甘草湯若因汗下後謂之虛悸宜炙甘草湯即炙草生地阿膠桂枝麥冬酸棗仁人參生薑大棗酒煎也肺痿用麻仁可也

桃花湯

赤石脂禹餘糧湯

黃芩湯

白頭翁湯

桃花乾薑石脂糯石脂禹糧固脫功黃芩甘草芍大棗連蘗秦皮白頭翁

註　桃花湯即乾薑赤石脂糯米也赤石脂禹餘糧湯即黃芩甘草白芍

糧湯即此二味也黃芩湯即黃連黃蘗秦皮白頭翁也

也

葛根黃連黃芩湯

乾薑黃連黃芩湯

黃連湯

黃連阿膠湯

葛根連芩湯甘草乾薑連芩湯人參連參桂草乾

半棗連膠芩芍卵黃新

註　葛根黃連黃芩湯人參也黃連湯即此二味加甘草也乾薑

黃連黃芩湯即此三味加人參也黃連湯即

黃連人參桂枝甘草乾薑半夏大棗也黃連

阿膠湯即黃連阿膠黃芩白芍雞子黃也

四逆散

吳茱萸湯

烏梅丸

柴芍枳草四逆散人參薑棗吳茱萸烏梅參歸連

藥細椒薑桂附苦酒需

註　四逆散即柴胡白芍枳實甘草也吳茱萸湯

即人參生薑大棗吳茱萸也烏梅丸即烏梅

人參當歸黃連黃蘗細辛川椒乾薑桂枝附子爲末苦酒爲丸也

傷寒附法

傷寒傳變大法已詳傷寒論註及心法要訣中矣然近世治四時傷寒者咸用河間兩解等法每多神效誠治斯證之捷法也今復採雙解散防風通聖散諸經驗名方編爲歌訣附於心法之後俾後之學者知所變通庶幾於傷寒一證經權常變有所遵循而無遺法云

雙解散完素解利初法

雙解通聖合六一四時溫熱正傷寒兩許爲劑葱薑豉汗下兼行表裏宣强者加倍弱減半不解連進自然安若因汗少麻倍入便鞕消黃加倍添

註　名曰雙解散者以其能發表攻裏即防風通聖散六一散二方合劑也河間制此解利四時冬溫春溫夏熱秋熱正令傷寒凡邪在三陽表裏不解者以兩許爲劑加葱薑淡豆豉

煎服之候汗下兼行表裏即解形氣强者兩半爲劑形氣弱者五錢爲劑若初服因汗少不解則爲表實倍加麻黃以汗之因便鞕不解則爲裏實倍加枳朴消黃以下之連進二三服必令汗出下利而解也今人不知其妙以河間過用寒凉仲景傷寒初無下法棄而不用深可惜也不知其法神捷莫不應手取效從無寒中痞結之變即有一二不解者非未盡法之善則必已傳陽明故不解也防風通聖散詳在後

河間解利後法

汗下已通仍不解皆因不徹已傳經內熱煩渴甘露飲甚用白虎解毒清有表熱煩柴葛解表實大熱三黃寧裏熱尿赤凉天水胃實不便大柴承

註　服雙解散汗下已通而仍不解者皆因汗之不徹或已傳經治之不及也若表已解而裏有微熱煩渴者用桂苓甘露飲以和太陽之裏若內熱太甚大煩大渴者用白虎湯

合黃連解毒湯以清陽明之裏若表未解又傳陽明身熱而煩用柴葛解肌湯以解兩陽之邪若表實無汗大熱而煩用三黃石膏湯以清表裏之熱若裏有熱尿赤而澁者用涼膈散合天水散以清利之若胃實潮熱不大便有微表者用大柴胡湯下之無表者三承氣湯下之桂苓甘露飲白虎湯大柴胡湯三承氣湯已詳傷寒要訣六一散涼膈散詳在雜病要訣

防風通聖散

防風通聖治風熱鬱在三焦表裏中氣血不宣經絡壅梔翹芩薄草歸芍消黃芍术膏滑石麻黃桔梗共防荆利減消黃嘔薑半自汗麻去桂枝增

註　此方治一切風火之邪鬱於三焦表裏經絡氣血不得宣通初感發熱頭痛膚疹傳經斑黃抽搐煩渴不眠便秘尿澁皆可服之功效甚奇用之自知其妙也

柴葛解肌湯

四時合病在三陽柴葛解肌柴葛羌白芷桔芩膏芍草利減石膏嘔半夏生薑

註　此方陶華所製以代葛根湯凡四時太陽陽明少陽合病輕證均宜以此湯增減治之增減者謂如無太陽證者減羌活無少陽證者減柴胡也即柴胡葛根羌活白芷桔梗赤芍石膏黃芩甘草也下利減石膏以避裏虛也嘔加半夏生薑以降裏逆也

黃連解毒湯

梔子金花湯

三黃石膏湯

陽毒熱極疹斑嘔煩渴呻吟譫語狂下後便軟熱不已連芩梔蘗解毒湯裏實便鞕當攻下梔子金花加大黃表實膏麻葱豆豉下利除膏入葛艮

註　陽毒熱極等證或下後便軟壯熱不已宜黃連解毒湯即黃連黃芩黃蘗梔子也若裏實便鞕當攻下者宜加大黃名梔子金花湯若表實無汗當發汗者宜加石膏麻黃淡豆豉

葱白名三黃石膏湯下利者減石膏加葛根
避裏不實也

消毒犀角飲

消毒犀角表疹斑毒壅咽喉腫痛難犀角牛蒡荆
防草熱盛加薄翹芩連

註　消毒犀角飲即消毒飲之防風荆芥牛蒡子
甘草加犀角也熱盛加連翹薄荷黃芩黃連
也

消斑青黛飲

消斑青黛消斑毒參虎柴犀梔地元黃連熱實減
參去苦酒加入大黃煎

註　消斑青黛飲即青黛參虎謂人參白虎湯即
人參石膏知母甘草柴胡犀角山梔生地元
參黃連用苦酒與水煎也熱甚便實者減去
人參加大黃可也

普濟消毒飲

普濟大頭天行病無裏邪熱客高巔芩連薄翹柴
升桔蟬蠶草陳勃蒡藍元

註　普濟消毒飲治天行傳染大頭瘟疫無裏可下者是其邪熱客於高巔即黃芩黃連薄荷連翹柴胡升麻桔梗殭蠶甘草陳皮馬勃牛蒡子板藍根元參也

連翹敗毒散

連翹敗毒散發頤高腫煩紅痛可除花粉連翹柴胡蒡荊防升草桔羌獨紅花蘇木芎歸尾腫面還加芷漏蘆腫堅皂刺穿山甲便燥應添大黃疏

註　連翹敗毒散治時毒發頤高腫煩紅疼痛之陽證也即連翹天花粉柴胡牛蒡子荊芥防風升麻甘草桔梗羌活獨活紅花蘇木川芎歸尾兩頤連面皆腫加白芷漏蘆腫堅不消加皂刺穿山甲大便燥結加酒炒大黃

都氣湯

橘皮竹茹湯

呃逆腎虛都氣湯六味肉桂五味方橘皮竹茹虛熱主橘竹參草棗生薑

註　都氣湯即六味地黃湯加肉桂五味子也橘

皮竹茹湯卽橘紅竹茹人參甘草大棗生薑也

葳猼湯

風溫浮盛葳猼湯羌麻葛芷青木香芎草石膏葳猼杏裏實熱甚入消黃

註　風溫初起六脈浮盛表實壯熱汗少者宜葳猼湯以發表風邪也卽羌活麻黃葛根白芷青木香川芎甘草石膏葳猼杏仁也裏實熱甚多汗者加芒消大黃以攻裏熱也

桂枝白虎湯

風溫虛熱汗出多難任葳猼可奈何須是鼾睡而燥渴方宜桂枝虎參合

註　風溫初起脈浮有力汗少壯熱宜與葳猼湯若脈虛身熱汗多難用葳猼湯者合與桂枝白虎加人參湯如不鼾睡口中和而不燥不渴身熱汗多脈浮盛者乃亡陽之證非風溫也卽桂枝白虎加人參湯亦不可用也

瀉心導赤各半湯

越經無證如醉熱鮾和導赤各半湯芩連梔子神
參麥知滑犀草棗燈薑
註越經病名也無證謂無表裏證也無表裏證
鮾和而身熱不解形如醉人者是越經證也
宜瀉心導赤各半湯治之卽黃連黃芩梔子
茯神人參麥冬知母滑石犀角甘草燈心生
薑大棗也
大羌活湯
兩感傷寒病二經大羌活湯草川芎二防二术二

活細生地芩連知母同
註兩感傷寒病名也二經謂一曰太陽少陰二
曰陽明太陰三曰少陽厥陰同病也張潔古
製大羌活湯治之卽甘草川芎防風防己蒼
术白术羌活獨活細辛生地黃芩黃連知母
也詳在傷寒要訣
還陽散
退陰散
黑奴丸

陰毒還陽硫黃末退陰炮烏乾薑均陽毒黑奴小麥疽芩麻消黃金竈塵

註　還陽散卽石硫黃末每服二錢新汲水調下良久寒熱汗不出再服之汗出愈退陰散卽炮變色川烏微炒乾薑等分爲末每服一錢鹽湯滾數沸服四肢不溫連服三次卽溫熱服若吐冷服亦可黑奴丸卽小麥成黑疽者名曰小麥奴黃芩麻黃芒消大黃釜底煤竈突烟梁上塵也爲末蜜丸重四錢新汲水下

服後若渴欲飲冷水者令恣意飲之須臾自當寒振汗出腹響微利而解也若不渴者恐是陰極似陽服之反爲害耳

九味羌活湯

九味羌活卽冲和四時不正氣爲疒潔古製此代麻桂羌防蒼細芷芎合生地草芩喘加杏無汗加麻有桂多胸滿去地加枳桔煩渴知膏熱自瘥

註　此湯卽冲和湯張潔古製此以代麻黃桂枝二湯卽羌活防風蒼朮細辛白芷川芎生地

甘草黃芩也喘加杏仁無汗加麻黃有汗加桂枝胸膈滿悶去生地加枳殼桔梗快膈氣也煩渴引飲加知母石膏熱自瘥也

十神湯

十神外感寒氣病功在溫經利氣殊升葛芎麻甘草芍薑葱香附芷陳蘇

註 此湯卽升麻葛根川芎麻黃甘草芍藥香附白芷陳皮蘇葉生薑葱白也能外發寒邪內舒鬱氣故曰寒氣病轂之他劑有溫經利氣之功殊也

人參敗毒散

荆防敗毒散

倉廩散

人參敗毒虛感冒發散時毒疹痢艮參芩枳桔芎草共柴前薄荷與獨羌時毒減參加翹蒡血風時疹入荆防表熱噤痢加倉米溫熱苓連實消黃

註 人參敗毒散治氣虛感冒時氣之病卽枳殼桔梗川芎茯苓人參甘草柴胡前胡薄荷獨

活羌活也時毒謂受四時不正之氣或腫兩腮兩頤或咽喉腫痛依本方減人參加牛蒡連翹治之時疹謂初病即有之疹血風謂遍身騷癢之疹俱依本方減人參加荊芥防風治之名荊防敗毒散表熱無汗噤口痢疾依本方加倉米治之名倉廩散溫病熱病熱甚俱加黃連黃芩里胃實便鞕俱加芒消大黃也

五積散

內傷生冷外感寒五積平胃半芩攢麻桂枳桔歸芎芍薑芷加附逐陰寒腹痛嘔逆吳萸入有汗除麻桂枝添虛加參朮除枳桔婦人經痛艾醋煎

註　五積散即蒼朮陳皮厚朴甘草半夏茯苓麻黃官桂枳殼桔梗當歸川芎白芍乾薑白芷也表重用桂枝裏重用官桂陰寒肢冷加附子腹痛嘔逆加吳茱萸有汗除去麻黃加桂枝氣虛加人參白朮除去枳桔婦人經痛加艾葉醋煎服之

升麻葛根湯

升葛芍草表陽明下利斑疹兩收功麻黃太陽無
汗入柴芩同病少陽經
註　升麻葛根白芍甘草卽升麻葛根湯也陽明
表邪不解或數下利及斑疹不透者均宜主
之若兼太陽無汗之表證入麻黃若兼少陽
口苦耳聾寒熱往來半表裏之證加柴胡黃
芩也

二聖救苦丹

初起時疫溫熱病救苦汗吐下俱全熱實百發而

百中大黃皂角水爲丸
註　此丹卽大黃四兩皂角二兩爲末水爲丸也
每服三錢無根水下弱者老者幼者量減服
之此藥施治於初起時疫傳染傷寒溫病熱
病熱盛形氣俱實者百發百中服後或汗或
吐或下三法俱全其病立解

溫膽湯

傷寒病後液津乾虛煩嘔渴不成眠乃是竹葉石
膏證膽經飲熱此方先口苦嘔涎煩驚悸半芩橘

草枳竹煎氣虛加參渴去半再加麥粉熱苓連

註　傷寒病後燥渴虛煩乃竹葉石膏湯證非溫膽湯證詳在傷寒要訣若少陽膽經飲熱則口苦嘔煩驚悸是溫膽湯證也即半夏茯苓橘皮甘草枳實竹茹也形氣俱虛或因汗吐下後及氣虛者均加人參渴去半夏加麥冬花粉以生津也有熱加黃芩黃連以清熱也

御纂醫宗金鑑雜病心法要訣

九十三卷

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

40

ChL 7918.7638

卷三十九

眞中風
類中風
傷風
痙病
痹證
痿證
腳氣



40

御纂醫宗金鑑卷三十九

編輯雜病心法要訣目錄

真中風
類中風
傷風
痙病
痹證
痿證
脚氣

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

御纂醫宗金鑑卷之三十九

編輯雜病心法要訣

中風總括

風從外中傷肢體痰火內發病心官體傷不仁與風從外中傷肢體痰火內發病心官體傷不仁與不用心病神昏不語言當分中絡經府藏更審虛實寒熱痰脫證撒手爲脾絕開口眼合是心肝遺尿腎絕鼾聲肺閉證握固緊牙關初以通關先取嚏痰壅不下吐爲先

註　風謂虛邪賊風從外而中傷人四肢軀體故

名曰中風痰火謂痰火從內而發病人心主之官故名曰痰火體中風邪輕則頑麻不仁重則癱瘓不用心病痰火輕則舌强難語重則痰壅神昏此證或內或外單病輕兼病重當細辨其中絡中經中府中藏及中經絡兼中府藏併細審其兼虛兼實兼寒兼熱兼痰與夫脫證閉證之淺深緩急而治之凡初中宜先用通關散取嚏有嚏可治無嚏多死口噤者用開關散擦牙軟之痰涎壅盛用諸吐法涌之若口噤不開湯藥不能下咽者則將應服之藥隨引調如麪茶含在不病人口內用葦管或筆管插入病人鼻孔使氣連藥吹之其藥自能入咽不可用金器撬之恐傷齒也

按中風一證分中血脈中府中藏始自李東垣中血脈者大秦艽湯中府者小續命湯中藏者三化湯然從未見有三化湯中藏之證惟金匱書中分爲四證曰絡曰經曰府曰藏其

說最爲的當可爲後世法蓋口眼喎斜肌膚
不仁邪在絡也左右不遂筋骨不用邪在經
也昏不識人便溺阻隔邪在府也神昏不語
脣緩涎出邪在藏也學者細閱諸家之論自
知不謬云爾

中風死候

寸口脈平卒中死生氣獨絶暴脫之五藏幾息呼
吸迟譬如墮溺豈能期脈來一息七八至不大不
小尚能醫大小浮晝沉夜死脈絶不至死何疑脫

證並見皆死候搥頭上竅氣長噓喘汗如油瘀拽
鋸肉脫筋痛髮枯直

註　寸口脈平謂寸關尺脈俱平之人忽然卒中
而死者皆因中邪太甚閉塞九竅天真之氣
不能與人之生氣相通則獨絶於內也譬如
墮跌溺水豈能預期其死耶脈來一息七八
至者不大不小雖困可治若大而無倫小而
如纖浮主晝死沉主夜死不可治也五藏脫
證若三藏四藏並見及搥頭上竅等證皆死

候也

通關散

開關散

熏鼻法

解語法

通關星皂細荷半開關烏梅氷片南巴油紙皂烟熏鼻竈尿舌下點難言

註　通關散南星皂角細辛薄荷生半夏爲末吹鼻有嚏可治開關烏梅氷片生南星爲末擦牙其噤可開巴豆油紙捲皂角末燒烟熏入鼻內人事自省取竈尿點在舌下言語自易

三聖散

瓜蒂散

全蠍散

五元散

巴礬丸

無汗吐宜防藜蒂有汗瓜蒂入蠍全重劑藜豆礬

皂膽痰壅吐以巴礬丸

註 痰涎壅盛無汗表實用三聖散卽防風蔥蘆瓜蒂吐之有汗裏實用瓜蒂散卽瓜蒂赤小豆或用全蠍散卽瓜蒂散加全蠍吐之此皆吐之輕劑也甚則用五元散乃蔥蘆赤小豆白礬皂角膽礬巴豆枯白礬吐之卽巴礬丸

烏藥順氣散

烏藥順氣實中絡喎斜頑麻風注疼麻黃枳桔烏蠶共白芷乾薑陳草芎

註 實中絡謂風邪中絡之人形氣實者也喎斜口眼歪斜也頑麻肌膚麻木也風注疼風氣攻注骨節疼也是方麻黃枳殼桔梗烏藥殭蠶白芷陳皮乾薑甘草川芎也

大秦艽湯

大秦艽湯虛中絡喎斜偏廢減參珍秦艽生地石膏共羌獨防芷細辛芩

註 虛中絡謂風邪中絡之人形氣虛者也偏廢謂半身不遂也減參珍謂八珍湯減去人參

加入秦艽生地石膏羌活獨活白芷防風細辛黃芩也偏廢是中經之證而亦可治之者以此方能養血榮筋爲久病風人調理之劑

換骨丹

中經氣實宜換骨喎斜癱瘓芷芎防氷麝硃香槐苦味仙人麻首蔓蒼桑

註

中經氣實謂風邪中經之人形氣實也癱左不用也瘓右不用也換骨丹白芷川芎防風氷片麝香硃砂木香槐角苦參五味子威靈仙人參麻黃膏何首烏蔓荊子蒼术桑皮也麻黃膏者以麻黃熬成膏和煎藥爲丸硃砂滾衣也

小續命湯

小續命湯虛經絡八風五痺總能全麻杏桂芍通營衛參草歸芎氣血宣風淫防風濕淫已黃芩熱淫附子寒春夏石膏知母入秋冬桂附倍加添

註

虛經絡謂風邪中經中絡之人形氣虛也八風中人爲病也五痺詳見痺

門要訣中

黃耆五物湯

黃耆五物虛經絡偏廢虛風無力癱心清語蹇因舌軟舌强神濁是火痰補衛黃耆起不用益營芍桂棗薑煎左加當歸下生牛膝筋瓜骨虎附經漆

註

黃耆五物湯治因虛召風中人經絡而病半身不遂者然審其人若舌强難言神氣不清則是痰火爲病不宜此方若心清語蹇舌軟無力難言者乃是營衛不足之病宜用此方經曰衛虛則不用營虛則不仁此方君黃耆而補衛以起不用臣桂枝白芍而益營以治不仁佐生薑大棗以和營衛也不仁不用在右者屬氣宜倍加黃耆在左者屬血則加當歸在下兩腿兩膝軟者則加牛膝骨軟不能久立者則加虎骨筋軟難於屈伸者則加木瓜周身或左或右經絡不宣通者則加炮附子有寒者亦加之此方屢試屢效者其功力專於補外所以不用人參補內甘草補中也

三化湯

搜風順氣丸

三化氣實風中府晉冒閉滿小承羌形氣俱虛及風燥搜風順氣自然康

註　氣實風中府謂風邪中府之人形氣實也晉冒閉滿謂二便阻隔腹滿脹也小承羌謂小承氣湯厚朴枳實大黃加羌活卽三化湯也若其人形氣俱虛則當以搜風順氣丸緩緩治之自然康也久病風之人大便多結燥謂之風燥或用續命湯汗過三化湯下過津液枯乾以致結燥凡病不論中經絡藏府但有二便阻隔形氣不足難堪攻下者均宜此法以搜六府之風通腸胃中之氣二便自利矣

牛黃清心丸

牛黃清心實中藏痰壅神晉不語言口眼喎斜形氣盛兩手握固緊牙關

註　牛黃清心丸治風邪中藏之人形氣俱實其

證痰涎壅塞神昏不能言語口眼喎斜形氣滿盛兩手握固牙關緊急之閉證皆可服之

參附湯

參附湯治虛中藏脣緩涎出不語言昏不知人身偏廢五脫證見倍參煎

註　參附湯卽人參附子也治風邪中藏之人形氣俱虛其證脣緩不收痰涎流出神昏不語身肢偏廢或與五藏脫證並見宜大倍人參先固虛脫次治風邪可也

千金還魂湯

經絡閉證卒中惡氣促神昏不識人無汗拘急身偏痛肉桂麻草杏還魂

註　經絡閉證謂風邪中經絡之閉證也氣促謂氣粗盛也無汗四肢拘急身體偏痛乃表邪固閉宜用肉桂麻黃甘草杏仁卽還魂湯以開之

奪命散

藏府閉證腹滿閉昏噤痰結在喉間危急湯藥不

能下奪命巴芷半夏南

註 藏府閉證謂風邪中藏府之閉證也腹滿閉謂腹滿二便閉也兼之神昏口噤不開結痰喉間不下宜用是方吐下之巴豆白芷半夏葶藶生南星也

三生飲

三生飲治中風寒厥逆沉伏涌氣痰星香烏附俱生用氣虛加參脫倍添

註 中風寒謂不論經絡藏府風邪中藏寒之人也厥逆謂四肢冷也沉伏謂六鮎沉伏也是方生南星生川烏生附子木香也惟寒盛氣實者宜之若氣虛者加人參虛極將脫者大倍人參始可用之而無倒戈之害也

祛風至寶湯

祛風至寶中風熱浮數面赤熱而煩通聖加蠍天麻細白附羌獨連蕖蠶

註 中風熱謂不論經絡藏府風邪中府熱之人也浮數謂六鮎浮數也熱而煩謂身熱心煩

也通聖謂防風通聖散方中加全蠍天麻細辛白附羌活獨活黃蘗黃連殭蠶也防風通聖散詳在傷寒門

青州白丸子

青州白丸中風痰喎斜癱瘓湧痰涎小兒驚痰爲妙藥白附烏星半夏九

註　中風痰謂不論經絡藏府風邪中表有痰飲之人也湧痰涎謂痰涎湧盛也是方生白附子生川烏生南星半夏法製爲丸也

羌活愈風湯

羌活愈風治外中手足無力語出難肌肉微掣不仁用大秦艽湯參再添宦桂黃耆杜防已知枳柴荷蔓菊前蒼麻半朴杞地骨調理諸風症可安

註　治外中謂風從外中之病也此病之來必有先兆如手足無力語言蹇澁時有肌肉微動牽掣大指次指麻木不用皆風邪外中之先兆也宜用此湯大秦艽湯參再添謂大秦艽湯方中再添人參宦桂黃耆杜仲防已知母

枳殼柴胡薄荷蔓荆子菊花前胡蒼术麻黃
半夏厚朴枸杞地骨皮也調理諸風更可堪
謂凡中風內邪將除外邪漸盡更服此藥調
理以行導諸經久則大風悉去清濁自分榮
衛自和矣

清熱化痰湯

清熱化痰治內發神短忽忽語失常頭眩腳軟六
君麥苓連菖枳竹星香
註　治內發謂痰火內發之病也此病之來必有
先兆如神短忽忽言語失常上盛下虛頭眩
腳軟皆痰火內發之先兆也宜用此湯卽人
參白术茯苓甘草橘紅半夏麥冬黃芩黃連
石菖蒲枳實竹茹南星木香也

地黃飲子

四肢不收無痛痱偏枯身偏不用疼其言不變志
不亂邪在分腠五物能甚不能言爲瘖痱奪厥入
藏病多凶地黃桂附蓉巴遠茵解冬味薄菖苓
註　風痱偏枯瘖痱三病皆屬外中而有微甚淺

深之別也風痺謂四肢不收身無痛處偏枯謂半身不遂身有痛處其言不變志不亂乃邪微淺病在分腠榮衛之間以黃耆五物湯能補榮衛而散風邪也甚者不能言志亂神昏則爲瘖痱乃腎虛內奪少陰不至而厥其邪已入於藏故曰病多凶也地黃飲子是治腎虛內奪之方是方熟地肉桂附子肉蓯蓉巴戟遠志山萸石斛麥冬五味子薄荷石菖蒲茯苓也

滌痰湯

滌痰內發迷心竅舌强難言參蒲星溫膽熱盛苓連入神昏便閉滾痰攻

註

內發謂痰火內發迷人心竅令人精神恍惚舌强難言也滌痰湯即人參菖蒲南星合溫膽湯也溫膽湯橘紅半夏茯苓甘草竹茹枳實也熱盛加黃芩黃連大小二便閉用礞石滾痰丸攻之可也

類中風總括

類中類乎中風證尸厥中虛氣食寒火濕暑惡皆
昏厥辨在喎斜偏廢間

註　類中風證皆名尸厥謂形厥而氣不厥也故
口鼻無氣狀類死尸而脈自動也中虛中氣
中食中寒中火中濕中暑中惡等證雖忽然
昏倒人事不省類乎眞中風病但不見口眼
喎斜偏廢不用等證自可辨也

獨參湯

參附湯

星香湯

三物備急丹

奪命散

尸厥無氣而鮓動或鮓微細有無間緣於病後氣血竭人參參附星香痰氣閉腹滿二便閉或腹急痛備急丹服後轉鳴吐下驗喉間痰結奪命先

註　尸厥之證有虛有實虛者以獨參湯虛兼寒者以參附湯虛兼痰者以星香飲加人參湯實者氣閉似死鮓動有力腹滿脹二便閉或腹急痛氣閉前後不通者以備急丹實兼痰者以奪命散

補中益氣湯

生鮓補精湯

芩半慾言生麥地歸茸

註　補中益氣湯治虛中之證即李杲所云內傷氣虛之人煩勞過度清氣不升忽然昏言也

慾言謂因房勞過度昏言也生脈飲卽人參麥冬五味子合熟地當歸鹿茸名曰生脈補精也

木香調氣飲

木香調氣實氣中暴怒氣逆噤昏痰風浮肢溫氣沉冷木藿砂蔻草丁檳

註　實氣中謂形氣俱實之人中氣也因暴怒氣逆忽然昏倒噤急也風浮肢溫氣沉冷謂中風之人脈浮手足溫中氣之人脈沉手足冷可別也是方木香藿香砂仁白蔻甘草丁香檳香也

八味順氣散

八味順氣散八味順氣虛氣中標本兼施邪正安參苓朮草扶元氣烏芷青陳利氣痰

註　虛氣中謂形氣俱虛之人中氣也宜用此標本兼施邪正相安之劑也

瓜蒂散

薑鹽湯

食中過飽感寒風或因怒惱塞胸中忽然昏厥肢不舉瓜蒂薑鹽探吐平

註　瓜蒂散挾痰者用之薑湯挾寒者用之鹽湯過食者用之探吐謂作此湯數鍾令病者飲一鍾隨用指探吐不吐再飲再探以吐通快爲度可立愈也

附子理中湯

附子理中療寒中腹痛拘急噤牙關有汗身寒或吐瀉附子參朮草薑乾無汗身寒加麻細陰毒川烏用生煎嘔吐丁香吳萸入鮓微欲絶倍參添

註　寒中之證卽腹痛諸證者是也宜用附子理中湯若無汗加麻黃細辛陰毒加生川烏嘔吐加丁香吳茱萸鮓微欲絶倍加人參陰毒寒極也詳在傷寒心法

涼膈散

涼膈火中神昏冒栀翹芩薄草消黃兼治一切胸膈熱便燥譫妄與斑狂

註　火中之證卽劉完素所云七情過極五志之

火內發則令人昏倒無知筋骨不用也

香薷飲

藿香正氣散

辰砂益元散

熨臍法

蒼术白虎湯

人參白虎湯

暑中須分陰與陽陰邪無汗似寒傷壯熱心煩或嘔瀉香薷扁朴二香湯更兼昏憒蒸蒸汗面垢喘渴證爲陽不省熨臍灌蒜水益元蒼參白虎湯

註

陰邪無汗似寒傷謂暑中陰邪似傷寒頭痛身痛惡寒無汗而更壯熱心煩或嘔或瀉也得之於受暑納涼寒外暑內宜香薷飲二香湯更兼精神昏憒蒸蒸自汗面垢喘渴則爲暑中陽邪得之於赤日長途中外有如上之證更兼昏憒不省者急以熱物熨臍蒜汁合水灌之即省繼以辰砂益元散氣實者蒼

术白虎湯氣虛者人參白虎湯選而用之可
也

滲濕湯

滲濕濕中內昏冒震亨濕熱熱生痰厚味醇酒生冷水胃苓香附撫砂連

註　濕中內謂濕從內生之病即朱震亨所云濕熱生痰昏冒之證得之於傷厚味醇酒生冷水物過節也滲濕湯即胃苓湯加香附撫芎砂仁黃連

除濕湯

除濕陰雨濕蒸霧臥濕涉水瘴山嵐頭身重痛便溏腫羌藁升柴防水煎

註　除濕湯即羌活藁本升麻柴胡防風蒼术治霧露及久臥濕地遠行涉水瘴氣山嵐其證頭身重痛甚而昏冒大便溏瀉皮膚浮腫也

調氣平胃散

調氣平胃療惡中廟塚忤惡卒然昏面黑錯忘蘇

合主次以木香平胃勻

註　蘇合主謂中惡之病以蘇合香丸爲主也次以木香平胃勻謂以中氣木香調氣散之方合平胃散之藥調理也

傷風總括

傷風屬肺咳聲重鼻塞噴嚏涕流清鼻淵腦熱不噴嚏濁涕穢久必鼻紅

註　傷風屬肺故噴嚏也鼻淵屬腦故不噴嚏也傷風寒邪故涕清也鼻淵熱邪故涕濁也鼻淵病久或有穢氣則熱深故腦衄鼻血也

參蘇飲治虛傷風實者茶調及頭疼芎芷薄草羌茶細荊防痰半熱膏清

川芎茶調散

註　參蘇飲方在咳嗽門治氣虛之人傷風之病若氣實者用川芎茶調散即川芎白芷薄荷甘草羌活茶葉細辛荊芥防風傷風頭痛者亦可用也有痰者加半夏清痰有熱者加石膏清熱可也

蒼耳散

蒼耳散治鼻淵病風熱入腦瞑頭疼涕流不止鼻塞熱蒼耳辛夷芷薄葱

註　鼻淵病屬風熱入腦故目瞑而頭疼涕流不止較之傷風爲甚焉鼻塞氣不利也熱鼻孔中熱也甚者孔熱而痛及其腦也蒼耳散即蒼耳子炒去刺研破一兩加辛夷三錢白芷薄荷各一錢葱三莖也

黃連防風通聖散

鼻淵初病施蒼耳黃連防風久病方孔痛膽調氷硼散鼻血犀角地黃湯

註　鼻淵風熱傷腦之病初病則風邪盛故用蒼耳散以散爲主久病則熱鬱深故用防風通

聖散加黃連以清爲主也熱氣湧涕傷其鼻孔成瘡故痛也宜以豬膽汁調氷硼散敷之熱蘊於腦傷及所過營血故衄也宜以犀角地黃湯涼之可也

瘛病總括

瘛病項強背反張有汗爲柔無汗剛生產血多過汗後潰瘡犬咬破風傷寒心法有汗爲柔瘛無汗

註　瘛病之證詳在傷寒發汗過多則爲爲剛瘛產後去血過多傷寒發汗過多則爲內因潰瘍破傷狗咬則爲外因皆風邪乘虛入太陽經而成此病也

瘛病死證

瘛證鈹散多應死反張離席一掌亡眼小目瞪唇

不語額汗如珠命必傷

註　反張離席一掌謂離席四五指許也眼小謂目睛緊小也目瞪謂眼珠不轉也

葛根湯

桂枝加葛根湯

小續命湯

桂枝加附子湯

當歸補血湯

大承氣湯

桃仁承氣湯

剛痙葛根湯發汗柔痙桂枝加葛艮若兼雜因小續命過汗桂枝加附湯傷血桂枝合補血裏實瘀血承氣方潰瘍十全加風藥破傷狗咬另參詳

註　剛痙用葛根湯卽桂枝湯加麻黃葛根柔痙用桂枝加葛根湯卽桂枝湯加葛根汗之雜因謂風寒濕雜揉爲病用小續命湯隨風寒濕輕重治之過汗表虛汗出不止因而成痙用桂枝加附子湯卽桂枝湯加附子也傷血

謂產後金瘡大傷血後用桂枝湯合補血湯
即當歸黃耆也裏實謂瘀病腹滿二便閉以
大承氣湯及產後惡露不盡少腹鞕急以桃
仁承氣湯下之潰瘍去膿血過多爲風所襲
者用十全大補湯加祛風之藥治之

破傷風

破傷亡血筋失養微傷風入火之端燥起白痂瘡
不腫濕流汚水緊牙關

註　破傷去血過多筋失所養經絡空虛風邪乘
之爲病即經曰風邪乘虛而入也爲風虛邪
宜桂枝湯合當歸補血湯治之夫傷重出血
過多而病風者常也然時有微傷淺損去血
甚少風邪乘之而病者以其人素熱因風而
然即劉完素曰熱甚風搏併於經絡也爲風
火邪宜防風通聖散加蠍尾治之凡此證不
論虛實風毒內蘊不發於外瘡口周圍燥起
白痂瘡不甚腫濕流汚黑之水牙關微緊不
似尋常活動皆破傷風之先兆也

防風通聖散加蠍尾方

全蠍散

左龍丸

瑇瑁大黃方

火盛通聖加蠍尾風盛全蠍左龍丸外因燒酒火

礮法犬風斑大酒同煎

註

破傷火盛者多陽明證用防風通聖散加蠍

尾治之風盛者多太陽證用全蠍散卽生蠍

尾七枚研末熱酒服之服後不解漸深入裏

用左龍丸卽野鴿糞江鰾殭蠶雄黃蜈蚣天

麻硃砂巴豆霜爲丸也方詳在丹溪心法諸

破傷風門內皆宜外用砂燒酒壺兩箇盛多

半壺燒酒先以一壺上火令滾無聲傾酒卽

按在破傷瘡口輪流提拔出汚黑血水滿則自落再

以次壺仍按瘡口輪流提拔以盡爲度其風

立愈犬咬風毒入腹成痙風者用斑蝥七枚

以糯米拌炒米黃去米爲末生大黃末一錢

合均黃酒一盞煎至半盞空心溫服取下毒

物弱者減半服之可也

痺病總括

三痺之因風寒濕五痺筋骨皶肌皮風勝行痺寒勝痛濕勝着痺重難支皮麻肌木皶色變筋攣骨重遇邪時復感於邪入藏府周同皶痺不相移

註　三痺之因風寒濕三氣雜合而成也其風邪勝者其痛流走故曰行痺寒邪勝者其痛甚苦故曰痛痺濕邪勝者其痛重着故曰着痺此爲病之因而得名曰三痺也又有曰五痺者謂皮皶肌筋骨之痺也以秋時遇此邪

爲皮痹則皮雖麻尙微覺痛癢也以夏時遇此邪爲肌痹則肌頑木不知痛癢也以春時遇此邪爲筋痹則筋攣節痛屈而不伸也以冬時遇此邪爲骨痹則骨重痠疼不能舉也曰入藏府者謂內舍五藏之痹也以皮痹不已復感於邪內舍於肺成肺痹也皺痹不已復感於邪內舍於心成心痹也肌痹不已復感於邪內舍於脾成脾痹也筋痹不已復感於邪內舍於肝成肝痹也骨痹不已復感於邪內舍於腎成腎痹也此皆以病遇邪之時及受病之處而得名曰五痹也所謂邪者重感於風寒濕之氣也周痹亦在血皺之中隨皺上下爲病故同皺痹但患有定處不似皺痹左右相移也近世曰痛風曰流火曰歷節風皆行痹之俗名也

周痹

周痹患定無歇止左右不移上下行似風偏廢隻

足手口眼無斜有痛疼

註　周痹或痛或腫或手或足患有定處痛無歇止或從止病及於下或從下病及於上而不似衆痹痛有歇止左右相移流走也周痹或兩手或兩足或隻手足或偏廢不仁不用而似中風但不口眼喎斜身有痛疼也

痹病生死證

痹在筋骨痛難已留連皮鮅易爲功痹久入藏中虛死藏實不受復還生

註　痹在筋骨則受邪深故痛久難已痹在皮鮅則受邪淺故易治也凡痹病日久內傳所合之藏則爲五藏之痹若其人中虛受邪則難治多死其人藏實而不受邪復還於外則易治多生假如久病皮痹復感於邪當內傳肺而爲肺痹若無胸滿而煩喘咳之證則是藏實不受邪餘藏倣此

痹入藏府證

肺痹煩滿喘咳嗽腎脹尻踵脊代頭脾嘔痞鞕肢

懈憊心煩悸噫恐時休數飲臥驚肝太息飲秘脹
瀉在腸究胞秘沃痛鼻清涕三焦胃附膽無憂

註　久病皮痹復感於邪見胸滿而煩喘咳之證
是邪內傳於肺則爲肺痹也久病骨痹復感
於邪而見腹脹尻以代踵足攣不伸脊以代
頭傴僂不直之證是邪內傳於腎則爲腎痹
也久病肌痹復感於邪而見嘔涎心下痞鞕
四肢懈憊之證是邪內傳於脾則爲脾痹也
久病鮾痹復感於邪而見心煩心悸嗌乾噫
氣有時則恐之證是邪內傳於心則爲心痹
也久病筋痹復感於邪而見喜飲小便數多
夜臥則驚太息之證是邪內傳於肝則爲肝
痹也久痹不已復感於邪藏實不受而傳府
者凡見喜飲小便秘不脹則瀉不瀉則脹之
證是邪內傳於大小腸則爲腸痹也凡見少
腹胞中按如沃湯狀而痛小便秘澁鼻流清
涕之證是邪內傳於膀胱則爲胞痹也三焦
之痹附於膀胱從水道也胃痹附於大小二

腸從傳化也膽爲清淨之府不受痺邪故曰無憂也

小續命湯

增味五痺湯

痺虛加減小續命痺實增味五痺湯麻桂紅花芷葛附虎羊耆草二防羌

註　痺虛謂氣虛之人病諸痺也宜用加減小續命湯風勝行痺倍防風寒勝痛痺倍附子濕勝著痺倍防已皮痺加黃耆或桂枝皮䘌痺加薑黃或加紅花肌痺加葛根或加白芷筋痺加羚羊角或加續斷骨痺加虎骨或加狗脊有汗減麻黃便溏減防已寒勝減黃芩加乾薑熱勝減附子加石膏加減治之痺實謂氣血實之人病諸痺也宜用增味五痺湯即麻黃桂枝紅花白芷葛根附子虎骨羚羊角黃耆甘草防風防已羌活也行痺以羌活防風爲主痛痺以麻黃附子爲主著痺以防已羌活爲主皮痺以黃耆桂枝皮爲主䘌痺以

紅花桂枝爲主肌痺以葛根白芷爲主筋痺以羚羊角爲主骨痺以虎骨爲主增味於五痺治之可也

木通湯

附子五苓散

蒼朮五苓散

三痺木通長流水濕加防已風羌防寒痺附麻分汗入胞腸五苓附子蒼

註三痺謂行痺痛痺着痺也宜用木通一味不兒水者二兩以長流水二碗煎一碗熱服取微汗不愈再服以愈爲度若其痛上下左右流走相移者加羌活防風以祛風邪其痛苦甚者有汗加附子無汗加麻黃以去寒邪其痛重著難移者加防已以勝濕邪其所應加之藥不可過三錢弱者俱減半服胞痺宜用五苓散加附子腸痺宜五苓散加蒼朮以利寒飲也五苓散方在傷寒門

三痺湯

獨活寄生湯

三痺十全無白朮牛膝續杜細獨防獨活加桑除者續入藏乘虛久痺方

註　三痺謂三痺湯卽十全大補湯無白朮加牛膝秦艽續斷杜仲細辛獨活防風也獨活謂獨活寄生湯依三痺湯方加桑寄生除去黃者續斷也此皆治五痺不已乘虛入藏反留連日久調理痺病之方也

黃耆益氣湯　麻痺

黃耆益氣虛皮痺皮麻不知癢與疼補中益氣加紅蘗味秋苓夏桂加冬

註　氣實麻木用小續命湯加麻黃治之氣虛麻木用黃耆益氣湯卽補中益氣湯加紅花黃蘗也秋加五味子夏加黃芩冬加桂枝皮

蠲痺湯

加味升陽散火湯

蠲痺冷痺身寒厥附歸耆草桂羌防肌熱如火名熱痺羚犀升陽散火湯

註　蠲痺湯即附子當歸黃耆炙草官桂羌活防風治痺病而身寒無熱四肢厥冷名曰冷痺也加味升陽散火湯即內傷門升陽散火湯加羚羊角犀角治痺病而肌熱如火名曰熱痺也

痿病總括

五痿皆因肺熱生陽明無病不能成肺熱葉焦皮毛痺發爲痿躄不能行心熱鈚痿脛節縱腎骨腰脊不能興肝筋拘攣失所養脾肉不仁燥渴頻

註　五痿心肝脾肺腎之痿也痿屬燥病故皆因肺熱而生也陽明者五藏六府之海主潤宗筋陽明無病則宗筋潤能束骨而利機關雖有肺熱不能成痿也肺熱葉焦陽明虛弱津液不化筋骨失養皮毛痺痿發爲痿躄不能

行也因而心氣熱爲鮫痿則脛節縱而不任地肺兼心病也因而腎氣熱爲骨痿則腰脊不能與舉肺兼腎病也因而肝氣熱爲筋痿氣熱爲肉痿則胃燥而渴肌肉不仁肺兼脾病也

痿痹辨似

痿病足兮痹病身仍在不疼痛裏分但觀治痿無風藥始曉虛實別有因

註痿痹之證今人多爲一病以其相類也然痿病兩足痿軟不痛痹病遍身肢節疼痛但觀古人治痿皆不用風藥則可知痿多虛痹多實而所因有別也

痿病治法

痿燥因何治濕熱遵經獨取治陽明陽明無故惟病肺胃壯能食審證攻挖涎小胃濕痰熱陽明積熱法三承胃弱食少先養胃久虛按證始收功

註痿屬燥病因何而用治濕熱苦燥之藥蓋遵

內經之治法獨取於陽明胃也故胃家無病雖有肺熱惟病肺而不病痿也是知病痿者胃家必有故也或濕熱或積熱或濕痰不論新久若胃壯能食當先審證攻之胃有濕痰用控涎丹攻之有濕熱者用小胃丹攻之有積熱者用三承氣湯攻之此治胃壯能食之法也若胃弱飲食減少氣血津液不足當先以補養脾胃爲主其有久病留連諸虛燥熱或攻下之後調理當審證治之始收全功也

加味二妙湯

加味二妙濕熱痿兩足痿軟熱難當防已當歸川萆薢黃蘗龜板膝秦蒼

註　熱難當謂兩足熱難當也膝秦蒼謂牛膝秦艽蒼朮也

清燥湯

虎潛丸

十全大補湯

加味金剛丸

時令濕熱清燥効陰虛濕熱虎潛靈久虛痿軟全
金主萆瓜牛菟杜蒺蓉
註清燥湯在內傷門虎潛丸有成方全金主謂
十全大補湯加味金剛丸久病氣血虛以十
全大補湯爲主筋骨痿軟以加味金剛丸爲
主加味金剛丸卽萆薢木瓜牛膝菟絲子杜
仲肉蒺蓉也

腳氣總括

腳氣風寒濕熱病往來寒熱狀傷寒腿腳痛腫熱
爲火不腫不熱是寒乾
註腳氣乃內有濕熱外感風寒相合爲病故往
來寒熱狀類傷寒兩腳腿痛腫熱如火者是
火盛也不腫不熱而痛者是寒盛也名曰乾

腳氣

腳氣死證

腳氣衄急少腹頑不三五日入心間嘔吐喘滿目

額黑恍惚讝妄命難全

註　脚氣衝急少腹頑木不知痛癢不過三五日內其邪必入心間若入心間嘔吐喘滿是爲脚氣衝心之證目額皆黑恍惚讝妄則是水來尅火之徵故曰命難全也

攢風散

羌活導滯湯

勝濕餅子

五積散

獨活寄生湯

脚氣表解攢風散麻桂杏草蓽烏良薑解導滯羌獨活防已當歸枳大黃濕盛重腫勝濕餅二丑蕎麥遂成方寒濕五積加附子寒虛獨活寄生湯

註　初病脚氣表實無汗用攢風散汗之卽麻黃桂枝杏仁甘草蓽薢炮川烏也裏實熱盛二便不利用羌活導滯湯下之卽羌活獨活防已當歸枳實大黃也濕盛重腫用勝濕餅子卽黑丑白丑頭末甘遂末各五錢蕎麥麪一

兩五錢水和作餅三錢煮熟空心茶清服逐之寒濕者用五積散加附子治之方在傷寒門寒虛者用獨活寄生湯補之方在痹門

當歸拈痛湯

當歸拈痛虛濕熱茵蔯四苓與羌防人參當歸升苓草苦參知母葛根蒼

註　濕熱腳氣而形氣虛者宜用當歸拈痛湯即茵蔯白朮茯苓豬苓澤瀉羌活防已人參當歸升麻黃芩甘草苦參知母葛根蒼朮也

加味蒼蘗散

加味蒼蘗實濕熱二活二朮生地黃知蘗芍歸牛膝草木通防已木瓜檳榔

註　濕熱腳氣而形質實者宜用加味蒼蘗散即羌活獨活蒼朮白朮生地黃知母黃蘗赤芍當歸牛膝甘草木通防已木瓜檳榔也

大防風湯

兩膝腫大而疼痛髀脛枯細鶴膝風大防風附羌牛杜十全大補減茯苓

註　兩膝腫大疼痛膝上至髀膝下脛足枯細但存皮骨兩膝狀若鶴膝故名鶴膝風也宜大防風湯卽防風附子羌活牛膝杜仲人參白朮炙草當歸川芎白芍熟地炙者肉桂也此病若得之於痢疾病後者名曰痢風亦用此方

D

御纂醫宗金鑑雜病心法要訣

卷四十

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

41

卷四十
內傷
虛勞
勞瘵
自汗盜汗
失血
消渴

ChL 7918.7638



十四卷

御纂醫宗金鑑卷四十

編輯雜病心法要訣目錄

內傷

虛勞

勞瘵

自汗盜汗

失血

消渴

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

御纂醫宗金鑑卷四十

編輯雜病心法要訣

內傷總括

內傷勞役傷脾氣飲食傷胃傷其形傷形失節溫涼過氣濕熱暑火寒中

註勞役傷氣傷元氣也飲食傷形傷胃府也傷氣宜補有熱中濕熱暑熱火鬱寒中之不同傷形宜消有飲食失節過於溫涼之不一也

內傷鮎大見氣口外感鮎大見人迎疼時痛與常痛惡寒溫解烈火仍熱在肌肉從內泛熱在皮膚捫內輕自汗氣乏聲怯弱雖汗氣壯語高聲手心熱兮手背熱鼻息氣短鼻促鳴不食惡食內外辨初渴後渴少多明

註　內傷外感鮎皆大內傷之鮎氣口大於人迎不似外感之鮎人迎大於氣口也內傷外感皆頭痛內傷之頭痛有時而痛有時不痛不似外感之頭痛常常而痛不休也內傷外感皆惡寒內傷之惡寒得就溫衣而卽解不似外感之惡寒雖近烈火而仍惡也內傷外感皆發熱內傷之發熱熱在肌肉以手捫之熱從內泛不似外感之發熱熱在皮膚以手捫之熱自內輕也內傷外感皆自汗內傷之自汗氣壯促語聲高也內傷外感手皆熱內傷之熱手心熱不似外感之熱手背熱也內傷外感皆鼻不和內傷之鼻息氣短而喘不似外感之鼻

息氣促而鳴也內傷外感皆不食內傷之不食口中無味不似外感之不食聞食則惡也

內傷外感皆渴內傷之渴初病即渴其飲甚少不似外感之渴三日後始渴其飲甚多也

補中益氣湯

補中益氣升陽清熱傷氣陷大虛洪頭痛表熱自汗出心煩口渴畏寒風困倦懶言無氣動動則氣高喘促聲保元甘溫除大熱血歸氣术補脾經佐橘降濁散滯氣升柴從胃引陽升陰火腎躁加地

蘗陽熱心煩安神寧

註補中益氣湯治內傷清陽下陷因勞役過度熱傷元氣故鮾虛大而洪也內傷頭痛時作時止也內傷表熱嘗自汗出也心煩氣虛惡煩勞也口渴氣陷不蒸化也畏寒畏風表氣虛失衛也困倦懶言中氣乏不周也動則氣喘上氣不足息也保元謂人參黃耆甘草名保元湯也臣當歸和脾血白术益脾氣佐橘皮降濁散胸中滯氣升柴升清從胃中引陽

也陰火時顯躁熱加黃蘗生地補水救陰陽熱晝夜心煩合硃砂安神丸瀉火安神

調中益氣湯

調中弦洪緩沉澁濕熱體倦骨痠疼氣少心煩忽肥瘦口沫食出耳鳴聾胸膈不快食無味二便失調飧泄血膿保元升柴蒼橘蘗去蘗加木亦同名

註　調中益氣湯亦治內傷清氣下陷濁氣上乘清濁相干而兼濕熱者故二便不調飧瀉膿血也此湯與補中益氣湯雖互相發明然其證鮮則不可不分別也內傷之病脾胃元氣一虛四藏失其調和所以五臟之鮮交相混見故肝弦心洪脾緩之鮮反見於上按之沉澁肺鮮而反見於下也身肢重倦氣不周也骨節痠疼血不榮也氣少中氣乏也心煩心血少也忽肥忽瘦者火乘土位上併陽分則血鮮上行而上盛故面赤紅而肥下併陰分則血鮮下行而上虛故面青白而瘦即今之虛損病人早則面青白瘦而惡寒午後則面

紅赤肥而發熱者是也口沫謂口中沃沫脾不散精也食出謂食入反出胃虛不納也耳鳴聾謂耳鳴耳聾陰火上衝也胸膈不快濁氣滯也飲食無味胃氣傷也二便不調謂大便時瀉不瀉小便時利不利脾濕不分也飧謂完穀不化之飧瀉脾虛濕不化也血膿謂大便後或見膿見血脾濕熱釀成也保元謂保元湯即人參黃芪炙草升麻柴胡蒼朮橘皮黃蘗也去黃蘗加木香亦名調中益氣湯以熱少氣不和者宜之也

升陽益胃湯

內傷升陽益胃湯濕多熱少抑清陽倦怠懶食身重痛口苦舌乾便不常灑灑惡寒屬肺病慘慘不樂乃陽傷六君白芍連澤瀉羌獨黃芪柴與防

註　內傷氣虛濕多熱少遏抑春生清氣不得上升脾胃之證宜服此湯其證倦怠懶食身重而痛口苦舌乾便不常謂大便不調小便頻數不如常也灑灑惡寒衛氣不足屬肺皮毛

之病也慘慘不樂面色不和乃陽氣傷而不伸也六君謂人參白朮茯苓炙草橘皮半夏也加白芍黃連澤瀉黃芪羌活獨活柴胡防風卽是升陽益胃也

補脾胃瀉陰火升陽湯

補中升陽瀉陰火火多濕少困脾陽雖同升陽益胃證然無瀉數肺陽傷補脾胃氣參耆草升陽柴胡升與羌石膏芩連瀉陰火長夏濕令故加蒼

註　內傷氣虛熱多濕少陰火困脾陽氣不得上升脾胃之證宜服此方此方所治雖同升陽益胃之證然無大便不調小便頻數灑灑惡寒肺病慘慘不樂陽傷之證也等湯加減法

內傷補中調中益胃等湯加減法

冬加薑桂草蔻益秋芍白蔻縮檳榔夏月氣衝芩連蘗春加風藥鼓清陽長夏沉困精神少人參麥味澤苓蒼肺熱咳嗽減參去春加金沸款冬芳夏加麥冬五味子秋冬連根節麻黃頭痛蔓荊甚芎入巔腦藁本苦細嚏沉重懶倦或嘔逆痰厥頭疼

半夏薑口乾嗌乾或表熱加葛生津清胃陽大便
燥濟元明粉血燥歸桃熟大黃痞脹香砂連枳朴
寒減黃連加炒薑胃痛草蔻寒益智氣滯青皮白
蔻香腹痛芍草芩桂審臍下痛桂熟地黃內外煩
疼歸和血脇下痛急草柴艮身重脚軟巳蒼蘗身
疼發熱藁防羌

註　冬加乾薑官桂草豆蔻益智助陽氣也秋加
白芍白豆蔻縮砂仁檳榔助燥收也夏月加
黃連黃芩黃蘗降陰火也或腹中氣上衝逆
屬陰火衝上雖非夏月亦加之春加風藥謂
羌活獨活防風藁本之類佐參者之品能鼓
清陽之氣上升也長夏身肢沉困精神短少
加人參麥冬五味子恐暑傷氣也加澤瀉茯
苓蒼朮去脾濕也肺中有熱咳嗽減人參遠
肺熱也春加金沸草欵冬花散肺風也夏加
麥冬五味子保肺氣也冬加連根節麻黃散
肺寒也頭痛加蔓荊子引太陽也痛甚加川
芎上行捷也巔痛腦痛加藁本入督脈也苦

頭痛加細辛走少陰也痰厥頭痛沉重懶倦或嘔逆痰涎加半夏生薑治痰逆也口乾嗌乾或表發熱加葛根生津解肌也大便燥澁加元明粉血虛燥加當歸血實燥加桃仁熱實燥加大黃心下痞脹氣不快加木香食不消加砂仁心下結熱加黃連心下結氣加枳實胃氣壅塞加厚朴如胃中寒或冬月減去黃連加炒乾薑胃痛加草豆蔻胃寒或唾沫加益智氣滿不快加白豆蔻青皮腹痛加白芍甘草審其有熱加黃芩有寒加官桂臍下痛加肉桂熟地黃腹內身外刺痛此屬血澁不足加當歸以活血也脇下痛或急縮加甘草柴胡以和肝也身重腳軟加防已蒼术黃蘗去濕熱在內也身痛發熱加藁本防風羌活疎風在表也

清暑益氣湯

清燥湯

長夏濕暑交相病暑多清暑益氣功汗熱煩渴倦

少氣惡食尿澁便溏行補中去柴加蘗澤麥味蒼
麴甘葛青濕多痿厥清燥地豬茯柴連減葛青

註　長夏之令暑濕炎蒸交相爲病暑多濕少爲
病其證則自汗身熱心煩口渴倦困少氣惡
食小便澁少大便稀溏宜清暑益氣湯卽補
中益氣湯去柴胡加黃蘗澤瀉麥冬五味子
蒼术神麴甘葛青皮也若濕多暑少爲病則
成痿厥之證腰以下痿軟難於轉動行走不
正兩足欹側宜清燥湯卽本方更加生地豬
苓茯苓柴胡黃連減去甘葛青皮也

升陽散火湯

火鬱湯

血虛胃弱過食凉陽鬱於脾散火湯肌膚筋骨肢
困熱捫之烙手熱非常羌獨芍防升柴葛人參二
草棗生薑火鬱加葱減參獨惡寒沉數發之方

註　二草炙甘草生甘草惡寒謂身雖有如是烙
手之熱而反惡寒脈來沉數則可知火鬱肌
裏宜以此方發之

白术附子湯

加味理中湯

內傷水來侮土病寒濕白术附子湯涎涕腹脹時多溺足軟無力痛爲殃腰背胛眼脊背痛丸冷陰陰痛不常蒼附五苓陳半朴虛宜理中附苓蒼

註　東垣內傷熱中之病用補中益氣湯寒中之病用白术附子湯寒中爲水來侮土寒濕之病其證內則腹脹多溺涎涕外則足軟胛脊腰背睪丸痛脾胃寒濕而氣不虛者宜用是方卽五苓散加蒼术附子陳皮半夏厚朴也若脾胃寒濕而氣虛者則宜用理中湯加附子茯苓蒼术是也

人參資生丸

資生脾胃俱虛病不寒不熱平補方食少難消倒飽脹面黃肌瘦倦難當

註　繆仲醇製資生丸方爲脾胃俱虛不寒不熱平補之藥其所治之證乃飲食減少過時不化倒飽脹悶面色痿黃肌肉漸瘦困倦無力

也方見諸書故不錄藥味

清胃理脾湯

清胃理脾治濕熱傷食平胃酌三黃大便黏穢小便赤飲食愛冷口舌瘡

註 清胃理脾湯卽平胃散加黃連黃芩大黃也酌三黃者謂有熱滯而不實者不可入大黃也傷食謂傷食病證如痞脹噯噦不食吞酸惡心噫氣之類更兼大便黏臭小便赤澁飲食愛冷口舌生瘡皆傷醇酒厚味濕熱爲病之證也

理中湯

理中治虛寒濕傷食少喜熱面青黃腹痛腸鳴吐冷沫大便腥穢似鴨溏

註 白朮附子湯治脾胃寒濕形氣實者也理中湯治脾胃寒濕形氣虛者也虛者其證食少喜食熱物面色青黃腹痛腸鳴吐冷涎沫大便腥穢不臭似鴨糞澄澈清溏也故宜此湯

消食健脾丸

胃强脾弱脾胃病能食不化用消食平胃炒鹽胡椒共麥蘗查麵白蒺藜

註　脾胃病中有胃强脾弱一證胃强所以能食脾弱不能消化宜服消食健脾湯丸助其消化用蒼朮陳皮厚朴甘草炒鹽胡椒山查神麵麥芽白蒺藜朮末蜜丸服之更節其飲食自然脾胃和而能健運矣

開胃進食湯

開胃進食治不食少食難化胃脾虛丁木藿香蓮子朴六君砂麥與神麵

註　此方治不思飲食少食不能消化脾胃兩虛之證方卽六君子湯加丁香木香藿香蓮子厚朴縮砂麥芽神麵也

平胃散

一切傷食脾胃病痞脹噦噯嘔不能食吞酸惡心並噫氣平胃蒼朴草陳皮快膈枳朮痰苓半傷穀二芽縮神麵肉滯山查麪蒸蔞滯熱苓連蘗大宜

註　傷食等證宜用平胃散卽蒼朮厚朴甘草陳

皮也快膈加枳實白朮有痰加半夏茯苓傷穀滯者加麥芽穀芽縮砂神麯傷肉滯者加山查傷麪滯者加萊菔有熱者加黃芩黃連黃蘗大黃酌而用之

葛花解醒湯

葛花解醒發酒汗懶食熱倦嘔頭疼參葛四苓白蔻縮神麯乾薑陳木青

註　傷酒宜用葛花解醒湯汗之汗出立愈其證頭痛懶食嘔吐身熱倦怠而煩似乎外感而實非外感皆因酒所致也方即人參葛花白朮茯苓豬苓澤瀉白蔻縮砂神麯乾薑陳皮木香青皮

秘方化滯丸

秘方化滯丸治不論寒熱一切氣滯積痛攻下之妙藥也即巴豆三稜莪朮青皮陳皮黃連半夏木丁香也此方出丹溪心法附餘

註　秘方化滯丸治不論寒熱一切氣滯積痛攻下之妙藥也即巴豆三稜莪朮青皮陳皮黃連半夏木香丁香也此方出丹溪心法附餘

書中屢試屢驗按證隨引量其老少虛實增損進退以意用之久久自得其效

虛勞總括

虛損成勞因復感陽虛外寒損肺經陰虛內熱從肺損皮毛灑寒嗽心損血腎損飲食勞倦自脾成時消瀉肝損脇痛懶於行少月經凝脾損食少肌瘦骨痿難久立午熱夜汗骨蒸蒸從下皮聚毛落損骨痿難久立午熱夜汗骨蒸蒸從下皮聚毛落死從上骨痿不起終恐懼不解則傷精怵惕思慮則傷神喜樂無極則傷魄悲哀動中則傷魂憂愁不已則傷意盛怒不止則傷志勞倦過度則傷氣氣血骨肉筋精極

註　虛者陰陽氣血榮衛精神骨髓津液不足是也損者外而皮毛肌肉筋骨內而肺心脾肝腎消損是也成勞者謂虛損日久留連不愈而成五勞七傷六極也因復感者謂不足之人陽虛復感外寒則損從皮毛肺始陰虛更生內熱則損從骨髓腎始內傷飲食勞倦則損從肌肉脾始此虛損成勞之因然其證有五一損皮聚毛落灑淅惡寒咳嗽肺勞也二損血衄虛少男子面無血色女子月經不通心勞也三損飲食減少肌肉消瘦大便溏瀉脾勞也四損兩脇引胸而痛筋緩不能行肝勞也五損骨痿不能久立午後發熱盜汗骨蒸腎勞也從下腎藏損起者損至皮聚毛落則死也從上肺藏損起者損至骨痿不能起於床則終也從脾藏損起者或至皮聚毛落或至骨痿不起皆死也虛損爲七傷之證一恐懼不解則傷精精傷則骨痿痿厥精時自下蓋五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰

虛陰虛則無氣無氣則死矣一怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色夭死於冬也一喜樂無極則傷鬼鬼傷則狂狂則意不存人皮革焦毛悴色夭死於夏也一悲哀動中則傷魄魄傷竟竟傷則狂妄不精不精則不正陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色夭死於秋也一憂愁不已則傷意意傷則悗亂四肢不舉毛悴色夭死於春也一盛怒不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俯仰屈伸毛悴色夭死於季夏也一勞倦過度則傷氣氣傷則火愈壯壯火則食氣故無氣以動喘乏汗出內外皆越則氣日耗氣日耗則死矣虛損爲六極之證一數轉筋十指爪甲痛筋極也一牙齒動手足痛不能久立骨極也一面無血色頭髮墜落血極也一身上往往如鼠走削瘦乾黑肉極也一氣少無力身無膏澤翕翕羸瘦眼無精光立不能定身體若痒搔之生瘡精極也一胸脇逆滿恒欲大

怒氣少不能言氣極也

按前人分七傷之證似多不經依內經改之庶後學易明也

虛勞死證

陰勞細數形盡死陽勞微革氣脫終枯白顴紅一側臥嗽啞咽痛咯星紅五藏無胃爲眞藏形肉雖存不久停一息二至名曰損一息一至行尸名大骨枯槁大肉陷動作益衰精髓空眞藏未見一歲死若見眞藏尅期凶喘滿動形六月死一月內痛引肩胸身熱破胭肉盡脫十日之內不能生眞藏脈見目眶陷目不見人頃刻傾若能見人神猶持至所不勝日時終

註陰虛之勞脈細數則必形消著骨而後死者陰主形也陽虛之勞脈微革則不待瘦盡忽然而脫者陽主氣也五藏之脈無和緩象爲無胃之眞藏脈即形肉雖存亦必不久於人世也一息二至損病之脈也一息一至行尸之脈也大骨顴肩股腰之大骨也大肉頭項

四肢之大肉也枯槁者骨痿不能支也陷下者肉消陷成坑也動作精神漸衰眞藏脈不見期一歲死若眞藏脈見遇所不勝之時日凶可期也若眞藏脈不見有是證者喘滿動形六月而死有是證者五藏內損痛引肩胸者一月而死有是證者肉盡之處皆枯燥破裂謂之破胴身熱不已十日內死眞藏脈見目眶下陷視不見人頃刻而死若能見人則神尚未去至所不勝之日時而死也

虛勞治法

後天之治本血氣先天之治法陰陽腎肝心肺治在後脾損之法同內傷

註　後天脾胃水穀生化榮衛故治法本乎氣血先天腎藏精氣生化之原故治法本乎陰陽在於後而脾藏虛損治法同內傷也

五藏虛損治法俱在內傷門

已載內傷故曰同內傷也

拯陰理勞湯

陰虛火動用拯陰皮寒骨蒸咳嗽侵食少痰多煩

少氣生脈歸芍地板貞薏苡橘丹連合草汗多不寐加棗仁燥痰桑貝濕苓半阿膠咳血骨熱深

註　此方即人參麥冬五味當歸白芍生地龜板女貞薏苡橘紅丹皮蓮子百合炙草也汗多不寐俱加棗仁咳而嗽痰加桑皮貝母嗽而濕痰加茯苓半夏咳嗽咯血加阿膠骨蒸熱深加地骨皮也

拯陽理勞湯

陽虛氣弱用拯陽倦怠惡煩勞則張表熱自汗身痠痛減去升柴補中方更添桂味寒加附瀉入升柴訶蔻香夏咳減桂加麥味冬咳不減味乾薑

註　此湯即人參黃耆炙草白朮陳皮肉桂當歸五味子也倦怠懶於動也惡煩勞動則氣張而喘乏也惡寒加附子洩瀉仍入升麻柴胡更加訶子肉蔻木香也夏月咳嗽減肉桂加麥冬五味子冬月咳嗽不減肉桂更加五味子乾薑也

六味地黃湯

都氣湯

七味地黃湯

生鮓地黃湯

桂附地黃湯

知蘗地黃湯

金匱腎氣湯

腎虛午熱形消瘦水泛爲痰津液傷咳嗽盜汗失精血消渴淋濁口咽瘡熟地藥萸丹苓澤加味勞嗽都氣湯引火歸元加肉桂水制陽光車牛桂附名腎附益火消陰翳知蘗壯水泛爲痰謂日食飲食所氣陽虛水腫淋濁方

註

午熱午後發熱也水泛爲痰謂日食飲食所化津液腎虛不能攝水泛上爲痰也盜汗謂不利也濁者尿之前後有濁液也口咽生瘡睡而汗出覺而即止之汗也失精遺精也消虛火炎也均宜六味地黃湯治之勞嗽加味渴謂飲水而即消渴仍不止也淋者尿淋漓謂加五味子名都氣湯也引火歸原加肉桂

名七味地黃湯火妄刑金加生鮈飲名生鮈
地黃湯也桂附謂加肉桂附子知蘗謂加知
母黃蘗車牛桂附謂加車前牛膝肉桂附子
名桂附知蘗腎氣等湯也

大補陰丸

滋陰降火湯

大補陰丸制壯火滋陰降火救傷金龜板知蘗地
髓劑二冬歸芍草砂仁苡加百味汗地骨血痰金
貝虛者參虛熱無汗宜散火有汗骨蒸亦補陰

註陰虛火旺無水以制宜用大補陰丸滋水制
火方卽龜板知母黃蘗生地爲末豬脊髓煉
蜜爲丸若火旺無制妄行傷金肺痿苡嗽宜
用滋陰降火湯救其傷金方卽大補陰丸加
麥冬天冬當歸白芍炙草縮砂苡甚加百合
五味子盜汗加地骨皮咯血加鼈金痰多加
川貝母氣虛加人參黃者凡虛熱如火烙手
無汗者爲火鬱宜升陽散火湯有汗者爲骨
蒸亦宜大補陰丸及滋陰六黃等湯也

保元湯

一切氣虛保元湯耆外參內草中央加桂能生命門氣瘡瘡灰陷與清漿

註　保元湯卽人參黃耆炙草也黃耆補表氣人參補裏氣炙草補中氣加肉桂能生命門眞氣且能治小兒瘡瘡灰白頂陷清漿

四君子湯

五味異功湯

六君子湯

七味白朮散

四獸飲

脾胃氣虛四君子鯁軟形衰面白黃倦怠懶言食少氣參苓朮草棗薑强氣滯加陳異功散有痰橘半六君湯肌熱渴渴藿朮葛虛瘧六君果梅薑

註　治氣虛兼氣滯不快依四君加陳皮名五味異功散治氣虛兼有痰飲依四君加橘紅半夏名六君子湯治氣虛肌熱渴瀉依本方加七味白朮散治氣虛久瘧藿香木香葛根名七味白朮散治氣虛久瘧

留連不愈依六君子湯加草菓烏梅生薑名四獸飲

芎歸湯

開骨散

一切血病芎歸湯產後胎前必用方氣虛難產參倍入交骨難開龜髮良

註　芎歸湯卽川芎當歸又名佛手散氣虛產難或時久傷氣依本方倍加人參臨產交骨難開依本方加整龜板二具本人梳下亂髮一團他人梳下之髮亦可名開骨散

四物湯

聖愈湯

六物湯

加味四物湯

地骨皮飲

調肝養血宜四物歸芎芍地酌相應氣虛血少參耆補氣燥血熱知蘗清寒熱柴丹炒梔子但熱無寒丹骨平熱甚苓連寒甚桂附止血茅蒲破桃紅

註　調肝養血宜四物湯即當歸川芎白芍熟地
黃酌相應謂補血用白芍熟地破血用赤芍
涼血用生地氣虛血少宜加參耆名聖愈湯
氣燥血熱宜加知蘗名六物湯血虛寒熱往
來宜加味四物湯即本方加柴胡丹皮炒梔
子也血虛惟發熱不惡寒宜地骨皮飲即本
方加地骨皮牡丹皮也血分熱甚依本方加
黃芩黃連寒甚加肉桂附子破血加桃仁紅
花止血加茅根蒲黃炒黑

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

一切氣血兩虛證八珍四物與四君氣乏色枯毛
髮落自汗盜汗悸忘臻發熱欬嗽吐衄血食少肌
瘦泄瀉頻十全大補加者桂榮去芎加遠味陳

註　氣虛四君子湯血虛四物湯氣血兩虛八珍
湯八珍者即四君四物也若有氣乏色枯毛
髮脫落自汗盜汗心悸健忘發熱欬嗽吐血

衄血食少肌瘦泄瀉等證則宜十全大補湯
卽八珍湯加黃耆肉桂也人參養榮湯卽十
全大補湯減去川芎更加遠志五味子陳皮
也
小建中湯
黃耆建中湯
當歸建中湯
雙和飲
虛勞腹痛小建中悸衄之血夢失精手足煩熱肢
酸痛芍草飴桂棗薑同衛虛加耆黃耆建榮虛當
歸建中名溫養氣血雙和飲三方減飴加地芎
註諸虛勞極裏急腹痛宜以小建中湯溫和脾
胃並治裏虛心悸衄下亡血夜夢失精手足
煩熱四肢痠痛血液虧損等證是方白芍藥
甘草飴糖中桂大棗生薑也若衛氣虛者加
黃耆名曰黃耆建中湯若裏不急腹不痛有
是證者則當以溫養氣血用雙和飲卽此三
方減去飴糖加入熟地川芎乃八珍湯減人

參白朮茯苓加黃耆中桂蓋以補陰血爲主也

補肝湯

補肝湯治肝虛損筋緩不能自收持目暗瞏瞏無所見四物酸棗草瓜宜加

註　補肝湯卽當歸川芎白芍熟地酸棗仁炙草木瓜也

加味救肺飲

加味救肺治肺損嗽血金家被火刑歸芍麥味參者草百花紫菀馬兜鈴

註　加味救肺飲卽當歸白芍麥冬五味子人參黃耆炙草百合款冬花紫菀馬兜鈴也

天王補心丹

天王補心心虛損健忘神虛煩不眠栢子味苓歸地桔三參天麥遠硃酸

註　是方卽栢子仁五味子茯苓當歸生地桔梗丹參人參元參天冬麥冬遠志硃砂酸棗仁

歸脾湯

歸脾思慮傷心脾熱煩盜汗悸驚俱健忘怔忡時
恍惚四君酸遠木歸者
註　悸心自跳動也驚目觸物駭也健忘言事易
忘也怔忡心衝動甚也恍惚心時不明也方
乃四君子加酸棗仁遠志木香當歸黃耆
人參固本湯丸
保元生鮝固本湯
固本肺腎兩虛病肺瘵於
參共保元生鮝脾同調
註　人參固本湯丸即人參天冬麥冬生地熟地
也依本方再加保元之黃耆炙草生鮝之五
味三方合一名保元生鮝固本湯同調謂同
調脾肺腎三經虛也
逍遙散
逍遙理脾而清肝血虛骨蒸煩嗽痰寒熱頰赤脇
不快婦人經病鮝虛弦者
丹肝熱添肝氣滯鬱陳撫附熱加吳萸炒黃連
註　是方即白术茯苓當歸白芍柴胡薄荷甘草

也肝氣熱依本方加炒梔子丹皮名加味逍
遙散肝氣滯加陳皮肝氣鬱加撫芎香附肝
氣鬱熱加吳茱萸炒川黃連惟薄荷只可少
許爲引不宜多用

瘈瘲總括

瘈瘲陰虛蟲乾血積熱骨蒸欬嗽痰肌膚甲錯目
黯黑始健不瀉下爲先

附

久病瘈疾而名曰瘲瘲者敗也氣血兩敗之
意也有陰虛乾血者有陰虛積熱者當以諸
補陰藥治之肌膚甲錯謂皮膚乾澁也目黯
黑者謂目黑無光也始健謂初病尚壯不瀉
謂久病不瀉也二者皆可以攻下爲先治也

瘈瘲治法

癆瘵至瀉則必死不瀉能食尙可痊初取利後宜詳審次服柴胡清骨煎虛用黃耆鼈甲散熱衰大補養榮參皮熱柴胡胡連入骨蒸青蒿鼈甲添陰虛補陰諸丸劑陽虛補陽等湯圓欬嗽自同欬嗽治嗽血成方太平丸

註　癆瘵之人病至大便泄瀉則必死矣若不瀉能食尙堪任藥攻治故可痊也初取利後審其熱之微甚人之强弱若熱甚人强宜用柴胡清骨散熱不甚人弱宜用黃耆鼈甲散熱微人弱宜用十全大補人參養榮等湯若皮外發熱加柴胡胡連骨內蒸熱加青蒿鼈甲午後陰虛發熱宜用補陰諸丸湯藥陽虛惡寒清瘦宜用補陽諸丸湯藥欬嗽不已同欬門方參而治之嗽血者宜用成方太平丸可也

大黃蟲丸

大黃青蒿煎

傳屍將軍丸

乾血大黃䗪蟲治積熱蒿黃膽便煎癸亥腰眼灸七壯後服傳屍將軍丸

註　大黃䗪蟲丸有成方大黃青蒿煎卽青蒿大黃豬膽汁童便煎癆瘵日久有生惡蟲身死之後多遭傳染甚至滅門名曰傳屍癆宜癸亥日灸兩腰眼各七壯後服傳屍將軍丸此方載丹溪心法書中

柴胡清骨散

清骨骨蒸久不痊熱甚秦知草胡連鱉甲青蒿柴胡地骨皮韭白豬脊髓豬膽汁童便也

黃耆鱉甲散

黃耆鱉甲虛勞熱骨蒸晡熱渴而煩肌肉消瘦食減少盜汗欬嗽出血痰生地赤芍柴秦草知耆菀骨半苓煎人參桂桔俱減半鱉甲天冬桑倍添

註　此方卽生地赤芍柴胡秦艽草知母黃耆地骨皮韭白豬脊髓豬膽汁童便也

紫菀地骨皮半夏茯苓人參桂枝桔梗鱉甲

天冬桑白皮也

自汗盜汗總括

自汗表陽虛惡冷陽實蒸熱汗津津盜汗陰虛分心腎心虛不固火傷陰分

註　無因汗出謂之自汗自汗謂表陽虛汗出則惡寒冷宜用後方若蒸蒸發熱汗出不惡寒則爲裏陽實宜以調胃承氣湯下之睡則汗出覺則汗止謂之盜汗盜汗爲陰虛當分心虛不固心火傷陰也

黃耆六一湯

玉屏風散

黃耆建中湯

自汗表虛黃耆草玉屏風散術耆防氣虛加參陽虛附血虛黃耆建中湯

註　黃耆六一湯即黃耆六錢甘草一錢也玉屏風散即黃耆白朮防風也二方皆治表虛自汗若氣虛加人參陽虛加附子可也若不惡寒不氣少則爲血虛不可用參附宜黃耆建中湯加黃耆皆也方在傷寒門

當歸六黃湯

酸棗仁湯

盜汗心火下傷陰歸耆二地蘗連芩心虛酸棗芍歸地知蘗芩耆五味參

註　當歸六黃湯治心火傷陰盜汗即當歸黃耆黃芩黃連黃蘗生熟地黃也酸棗仁當歸白芍生地知母虛不固盜汗即酸棗仁湯治心黃蘗茯苓黃耆五味子人參也

失血總括

九竅出血名大衄鼻出鼻衄腦如泉耳目出血耳目衄膚出肌衄齒牙宣內衄嗽涎脾唾腎咯心欬肺嘔屬肝精竅溺血膀胱淋便血大腸吐胃問

註　九竅一齊出血名曰大衄鼻出血曰鼻衄出血如泉曰腦衄耳出血曰耳衄目出血曰目衄皮膚出血曰肌衄齒牙出血曰齒衄又名牙宣此皆衄血隨所患處而命名也若從口出則爲內衄出血涎嗽出於脾唾出

於腎咯出於心款出於肺嘔出於肝吐出於胃溺血從精竅而出淋血從膀胱而出嘔吐之分嘔則有上逆漉漉之聲吐則無聲也

失血死證

失血身涼脈小順大疾身熱臥難凶口鼻湧出而不止大下潰腐命多傾

註 大疾脈大疾也臥難不能臥也大衄大下血出如湧泉不止內潰腐屍之氣則命傾也

失血治法

陽乘陰熱血妄行血犯氣分不歸經血病及府滲入濁由來藏病溢出清熱傷失血宜清熱勞傷理損自然平努卽內傷初破逐久與勞傷治法同

註 凡失血之證陽盛乘陰則血爲熱迫血不能安於脈中而妄行氣分不能回歸經脈也若血病傷及於府者則血滲入腸胃濁道上從咽出下從二便而出也血病傷及於藏者則血溢出胸中清道上從喉出下從精竅而出也夫血藏於藏內行於脈中軀殼之中不可

得而見也非有損傷不能爲病而損傷之道有三一曰熱傷宜以清熱爲主一曰勞傷宜以理損爲主一曰努傷初宜以破逐爲主久亦宜以理損爲主也

犀角地黃湯

熱傷一切失血病犀角地黃芍牡丹胸膈滿痛加桃大熱甚吐衄入芩連因怒嘔血柴梔炒唾血元參知蘗煎喀加二冬嗽二母涎壅促嗽鬱金丸

註　熱傷一切失血之病皆宜犀角地黃湯若胸膈滿痛是爲瘀血加桃仁大黃若吐血熱盛加黃芩黃連因怒致吐血及嘔血者加柴胡炒梔唾血元參知蘗煎喀加二冬母涎壅氣促陣陣急嗽帶冬嗽血加知母貝母涎壅氣促陣陣急嗽帶出血者宜鬱金丸方在後

鬱金湯

加味救肺飲加鬱金湯形衰無熱氣勞傷吐血救肺飲嗽血加調鬱金湯形衰無熱氣血弱人參養榮加麥良

註　救肺飲即虛勞門之加味救肺飲加調鬱金

末也若氣血虛弱不見火象宜用人參養榮湯加麥門冬也

芎歸飲

飽食用力或持重努傷衄絡失血湧吐宜上逆跌撲墮打有瘀行衄絡血歸芎嘔血漉漉聲

註　飽食用力或因持重努傷衄絡及嘔血跌撲墮打傷其用芎歸飲引血歸經衄絡令人大吐者亦皆宜之其有瘀血者或加大黃以下之或加桃仁紅花以破之或加鬱金黃酒以行之

參地煎

參地飼吐血不已熱隨血減氣隨亡氣虛人參爲君主血熱爲君生地黃也凡因熱傷飼吐血不已者則熱已隨血減然氣亦隨血亡也氣虛甚者當倍人參爲君血熱者宜倍生地爲

註　參地煎即人參生地

瀉肺丸

嗽血壅逆虛蘇子積熱痰黃瀉肺丸萋仁半貝金
葶杏三黃惟大有除添
註　嗽血痰壅氣逆形氣虛者蘇子降氣湯降之
方見諸氣門痰黃積熱形氣實者用瀉肺丸
下之卽栝蔞仁半夏浙貝母鬱金苦葶藶子
杏仁黃連黃芩大黃也惟大黃形氣實者加
之若形氣虛者或大便溏瀉則減去不用
保肺湯
保肺肺癰吐膿血白芨薏苡貝金陳苦梗苦葶甘
草節初加防風潰者參
註　保肺湯卽白芨薏苡仁貝母金銀花陳皮苦
桔梗苦葶藶甘草節也初起加防風潰後加
生黃耆人參
牛膝四物湯
尿血同出痛淋血尿血分出溺血名溺血精竅牛
四物淋血八正地金通
註　淋血溺血二證若尿與血同出而痛名曰淋
血尿與血分出名曰溺血溺血爲精竅之病

用四物倍加牛膝淋血爲尿竅之病用八正散加木通生地欝金治之

珀珠散

溺血諸藥而不效塊血竅滯莖急疼珀珠六一硃砂共引煎一兩整木通

註　溺血一證乃精竅爲病每因忍精不泄提氣採戰或因老年竭慾而成服諸藥不效者所溺之血成塊竅滯不利莖中急疼欲死者用珀珠散曰三服每服三錢引用整木通去粗皮黃色者煎湯調服其方即琥珀末一錢珍珠末五分硃砂末五分飛滑石六錢甘草末一錢合均分三服若其人大便結燥不通以八正散加牛膝欝金下之有熱尿澁以導赤散加牛膝欝金清之利後仍服此藥自有奇功

槐花散

便血內熱傷陰絡風合腸風濕藏瘍槐花側枳連炒穗風加秦防濕棟菴

註　便血二證腸風臟毒其本皆熱傷陰絡熱與風合爲腸風下血多濁均宜槐花散卽炒槐花炒側栢葉醋炒枳殼川黃連炒荊芥穗爲末烏梅湯調服腸風加秦艽防風臟毒加炒苦楝炒蒼朮若大腫大痛大便不通當以臟毒未潰之瘍治之非臟毒下血之病也

升陽去濕和血湯

便血日久涼不應升補升者蒼桂秦歸芍丹陳二地草熱加萸連虛人參

註　便血日久服涼藥不應宜升補用升陽去濕和血湯卽升麻黃耆蒼朮肉桂秦艽當歸白芍丹皮陳皮生地熟地生甘草炙甘草也有熱稍加吳茱萸炒川連虛加人參可也

消渴總括

試觀年老多夜溺休信三消盡熱乾飲多尿少渾赤熱飲少尿多清白寒

註　上消屬肺飲水多而小便如常中消屬胃飲水多而小便短赤下消屬腎飲水多而小便渾濁三消皆燥熱病也然試觀年老好飲茶者夜必多溺則休信三消皆熱而亦有寒者矣飲水多小便少而渾赤者屬熱是火盛耗水而渾也飲水少小便多而清白者屬寒是

火虛不能耗水也

消渴生死

三消便鞕若能食鮾大實强尙可醫不食舌白傳腫瀉熱多舌紫發癰疽

註　三消飲水多不能食若能食大便鞕鮾大强實者爲胃實熱下之尙可醫也若不能食濕多舌白滑者病久則傳變水腫泄瀉熱多舌紫乾者病久則發癰疽而死也

消渴治法

竹葉黃耆湯

便鞕能食鮾大强調胃金花斟酌當不食渴瀉白术散竹葉黃者不瀉方黃耆黃芩合四物竹葉石膏減粳薑氣虛胃熱參白虎飲一溲二腎氣湯

註　調胃謂調胃承氣湯金花謂梔子金花湯方俱在傷寒門酌其所當用可也不食而渴已屬胃虛兼之泄瀉胃虛無熱矣故用七味白术散方在虛損門若不食而渴亦不瀉者是雖虛而猶有燥熱也宜用竹葉黃耆湯卽黃

耆黃芩當歸川芎白芍生地竹葉石膏人參
炙草麥冬半夏也若氣虛胃熱盛者宜用人
參白虎湯若下焦虛寒飲一溲二者宜用腎
氣湯

御纂醫宗金鑑雜病心法要訣

卷四十一

T7910/7388

CHINESE JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

42

ChL 7918 7638

卷四十一
神病
癲狂癇
諸氣
遺精
赤白濁帶
痰飲
欬嗽
喘急哮吼
脹滿水腫



卷四十一

御纂醫宗金鑑卷四十一

編輯雜病心法要訣目錄

神病
癲狂癎
諸氣
遺精
赤白濁帶
痰飲

哈佛大學燕京圖書館珍藏

御纂醫宗金鑑卷四十一

編輯雜病心法要訣目錄

神病

癲狂癎

諸氣

遺精

赤白濁帶

痰飲

欬嗽

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

喘急哮吼

脹滿水腫

編輯雜病心法要訣

神之名義

形之精粹處名心中含良性本天眞天眞一氣精神祖體是精兮用是神

註　動植之物一有其形則形之至精至粹之處即名曰心動物之心者即中所賦虛靈不昧之靈性也植物之心者即中心之芽中含天之所賦生生不已之生意也

此形若無此心則形無主宰而良性生意亦無著落矣此心若無良性生意則心無所施用不過是一團死肉一枯草木之芽耳蓋人雖動物之貴而其中含良性與一切動物皆同本乎天眞也天眞之氣分而言之爲精氣神故曰以精爲體以神爲用也合而言之渾然一氣故曰天眞一氣精神之祖也

神之變化

神從精氣妙合有隨神往來魂陽靈並精出入陰靈魄意是心機動未形意之所專謂之志志之動變乃思名以思謀遠是爲慮用慮處物智因生

註　魂陽之靈隨神往來魄陰之靈並精出入蓋神機不離乎精氣精氣亦不雜乎精氣故曰妙合而有也故指神而言則神超乎精氣之外指精氣而言則神寓乎精氣之中意者心神之機動而未形之謂也志者意所專注也思者志之變動也慮者以思謀遠之謂也智者以慮處物之謂也此皆識神變化之用也

五藏神情

心藏神兮脾意智肺魄肝魂腎志精氣和志達生喜笑氣暴志憤恚怒生憂思繫心不解散悲哭哀苦悽然情內生懼恐求人伴外觸駭然響動驚

註　五藏所藏七神心藏神脾藏意與智肺藏魄肝藏魂腎藏精與志也五藏所生七情心生喜肝生怒脾生憂思肺生悲腎生恐也氣和則志達故生喜笑氣暴則志憤故生恚怒繫心不解散故生憂思悽心則哀苦故生悲哭內恐外觸非常事物故生恐懼驚駭也

神病治法

硃砂安神丸

內生不恐心跳悸悸更驚惕是怔忡善忘前言曰健忘如昏似慧恍惚名失志傷神心膽弱痰飲九氣火相乘清熱硃連歸地草餘病他門治法精

註　驚悸怔忡健忘恍惚失志傷神等病皆因心虛膽弱諸邪得以乘之也心氣熱者先用硃砂安神丸以清之其餘虛實諸邪則當與虛

損九氣癲癇痰飲等門合證揀方自有效法之處

仁熟散

恐畏不能獨自臥膽虛氣怯用仁熟栢仁地枸味萸桂參神菊殼酒調服者皆因氣怯膽虛也仁熟

註　恐畏不能獨自臥膽虛也仁熟散卽栢子仁熟地黃枸杞子五味子山茱萸桂心人參茯神菊花枳殼爲末老酒調服也

癲癇總括

經言癲狂本一病狂乃陽邪癲是陰癲疾始發意不樂甚則神癡語不倫狂怒兒狂多不臥目直罵詈不識親癇發吐涎昏噤倒抽搐省後若平人

註　李時珍曰經有言癲狂疾者又言癲疾爲狂者是癲狂爲兼病也邪入於陽者狂邪入於陰者癲蓋癲疾始發志意不樂甚則精神呆癡言語不倫而睡如平時以邪併於陰也狂疾始發多怒不臥甚則兒狂欲殺目直罵詈不識親疎而夜多不臥以邪併於陽也然俱

不似癇疾發則吐涎神昏卒倒無知口噤牙緊抽搐時之多少不等而省後起居飲食皆若平人爲別也癇雖分而爲五曰雞馬牛羊豬名者以病狀偶類故也其實痰火氣驚四者而已所以爲治同乎癲狂也

三聖散

青州白丸子

滾痰丸

遂心丹

礬礜丸

控涎丹

抱膽丸

鎮心丹

癲狂癇疾三聖吐風痰白丸熱滾痰痰實遂心氣礬礜痰驚須用控涎丹無痰抱膽鎮心治發灸百會自然安初發皂角灌鼻內涎多欲止點湯鹽註癲狂癇疾初起多痰者先以三聖散吐之風盛有痰者用青州白丸子熱盛有痰者用礜

石滾痰丸痰而形氣實者用遂心散甘遂硃砂豬心也痰而兼氣鬱者用礬鬱丸白礬鬱金也痰而兼驚者用控涎丹無痰神輕因而驚悸者用鎮心丹抱膽丸皆成方也癇病發時灸百會不拘壯數以甦爲止再發再灸以愈爲度初發用皂角汁灌鼻內其風涎即從鼻口中涕唾而出若甦後其涎不止以鹽湯服之自止

諸氣總括

寒氣　炅氣　喜氣　怒氣　勞氣　思氣　悲氣　恐氣　驚氣

一氣觸爲九寒炅喜怒勞思悲恐驚寒收外束腠理閉炅泄內蒸腠理通喜則氣緩虛極散勞耗思結氣難行怒氣逆上甚嘔血下乘脾虛飧瀉成恐則氣下傷精志驚心無倚亂怔忡悲消榮衛不散布壯行弱著病叢生

註　一氣流行不爲邪觸何病之有若爲寒觸外束皮膚腠理閉其氣收矣即寒病也炅火也

若爲火觸熱蒸汗出腠理開其氣泄矣卽暑病也若爲喜觸喜則氣和志達其氣緩矣素中虛極者緩則氣散卽暴脫也若爲勞觸勞則喘息且汗出其氣耗矣卽勞倦也若爲思觸心有所存氣留不行其氣結矣卽鬱氣也若爲怒觸怒則氣逆甚嘔血其氣上矣上極而下乘脾之虛則爲飧泄也若爲恐觸恐則精却傷精志其氣下矣若爲驚觸心無所依神無所歸慮無所定其氣亂矣怔忡心動不安之病也若爲悲觸心肺氣戚榮衛不散其氣消矣凡此九氣叢生之病壯者得之氣行而愈弱者得之氣著爲病也

諸氣辨證

短氣氣短不能續少氣氣少不足言氣痛走注內外痛氣鬱失志怫情間上氣氣逆蘇子降下氣氣陷補中宣臭甚傷食腸胃鬱滅食消導自然安

註　短氣者氣短而不能續息也少氣者氣少而不足之證氣痛者氣爲邪不能稱形也皆爲

阻氣道不通或在經絡或在藏府攻衝走注疼痛也上氣乃濁氣上逆下氣爲清氣下陷氣鬱者或得於名利失志或得於公私怫情二者之間也濁氣上逆蘇子降氣湯清氣下陷補中益氣湯甚者加訶子五味子然清氣下陷下氣不甚臭穢惟傷食下氣其臭甚穢乃腸胃鬱結穀氣內發而不宣通於腸胃之外鬱在胃者上噫氣也鬱在腸者下失氣也補中益氣湯方見內傷門

諸氣治法

寒熱熱寒結者散上抑下舉驚者平喜以恐勝悲以喜勞溫短少補皆同

註　寒者熱之麻黃理中是也熱者寒之白虎生鮫是也結者散之越鞠解鬱是也上者抑之蘇子降氣是也下者舉之補中益氣是也驚者平之鎮心妙香是也喜以恐勝悲以喜勝以情治情是也勞者溫之短氣少氣者補之保元四君是也

木香流氣飲

木香流氣調諸氣快利三焦榮衛行達表通裏開胸膈腫脹喘嗽氣爲疼六君丁皮沉木桂白芷香附果蘇青大黃枳朴檳蓬术麥冬大腹木瓜通

註　木香流氣飲調治一切諸氣爲病其功能快利三焦榮衛行達表通裏開胸膈之氣其水腫脹滿氣壅喘嗽氣痛走注內外疼痛並皆治之卽人參白朮茯苓炙草橘皮半夏丁皮沉香木香中桂白芷香附草果蘇葉青皮大黃枳殼厚朴檳榔蓬术麥冬大腹皮木瓜木通也

分心氣飲

分心氣飲治七情氣滯胸腹不流行正減芷朴通木附麥桂青桑檳殼蓬

註　分心氣飲治七情氣滯胸腹之病正者謂羣香正氣散也正減者謂卽羣香正氣散方減白芷厚朴加木通木香香附麥冬官桂青皮桑皮檳榔枳殼蓬术也

蘇子降氣湯

越鞠湯

蘇子降氣上攻下虛上盛氣痰壅喘咳涎嗽胸膈滿氣秘氣逆嘔鮮紅橘半肉桂南蘇子前朴沉歸甘草同鬱食氣血痰濕熱越鞠蒼梔麴附芎

註　蘇子降氣湯治下虛上盛氣壅上攻喘咳涎嗽胸膈滿悶氣秘便難氣逆嘔血即橘皮半夏肉桂南蘇子前胡厚朴沉香當歸甘草也

越鞠湯治六鬱食鬱氣鬱血鬱痰鬱濕鬱熱鬱即蒼朮山梔神麴香附撫芎也夫氣鬱之病若久必與血痰濕熱飲食相合故治鬱之方可治氣鬱也其氣實者加木香氣虛者加人參血實者加紅花血虛者加當歸痰多者加半夏濕多者加白朮熱多者加黃連飲多者加茯苓食多者加麥蘗在臨證者消息耳

四七湯

四七氣鬱生痰梅核吐咯結喉間調和諸氣平和劑半苓厚朴紫蘇煎快氣橘草香附入婦人氣

病效如僂惡阻更加芎歸芍氣痰濁帶送白丸

註　四七湯治七情過節七氣病生鬱結生痰如絮如膜疑結喉間咯之不盡嚥之不下名曰梅核氣日久不愈變生噎膈上吐涎沫下秘二便也宜用此平和之劑卽半夏茯苓厚朴紫蘇葉也胸腹中氣不快加橘皮甘草香附亦治婦人一切氣病婦人有孕喜吐者名曰惡阻更加川芎當歸白芍婦人肥白多痰氣鬱有白濁帶下者亦以本方送青州白丸子可也

鎮心丹

妙香散

驚實鎮心硃齒血驚虛妙香木麝香山藥茯神參耆草硃砂桔梗遠苓菖

註　心氣實病驚者宜用鎮心丹卽硃砂龍齒末等分豬心血爲丸實大丸每服三丸麥冬湯下心氣虛病驚者宜用妙香散加菖蒲卽木香麝香山藥茯神人參黃耆炙草硃砂桔梗

遠志茯苓石菖蒲也

遺精總括

不夢而遺心腎弱夢而後遺火之强過欲精滑清氣陷久曠溢瀉味醇傷

註　不夢而遺謂無所感於心而自遺則爲心腎虛弱不固也夢而後遺謂有所感於心相火煽而强迫之則爲二火之强不固也或過慾之人日慣精滑或清氣不足下陷不固或久曠之人精盛溢瀉或醇酒厚味火强不固皆爲是病也

龍骨遠志丸

坎離既濟湯

封髓丹

心腎虛弱硃遠志龍骨神苓菖蒲參久曠火旺地知蘗胃虛蘗草縮砂仁

註　龍骨遠志丸治心腎虛弱不夢而遺者卽龍骨硃砂遠志茯神茯苓石菖蒲人參也坎離既濟湯治夢而後遺火强久曠者卽生地黃蘗知母也若胃虛食少便溏則不宜生地知蘗恐苦寒傷胃故宜封髓丹卽黃蘗甘草縮砂仁也

補精丸

精出不止陽不痿强中過補過淫成久出血痛形羸死或發消渴或發癰陽盛坎離加龍骨實熱解毒大黃攻調補骨脂韭山藥磁石蒺蓉參鹿茸

註　精出不止陽强不倒名曰强中此病皆因過服房術中補藥或貪淫過慾而成也若不急治日久精盡陽强不化迫血而出疼痛不已

形羸而死或不即死亦必發消渴大癰也陽盛陰虛者宜大劑均坎離既濟湯加生龍骨清而補之形實熱盛者宜黃連解毒湯加大黃先攻其熱可也病後熱去調理宜補精丸即補骨脂韭子山藥磁石肉蓯蓉人參鹿茸也

濁帶總括

濁病精竅溺自清穢物如膿陰內疼赤熱精竭不及化白寒濕熱敗精成

註　赤多屬熱亦有濁帶日久精竭陽虛不及化白而屬寒者白多屬寒亦有敗精濕熱釀成腐化變白而屬熱者是則不可槩以寒熱論

赤白也

清心蓮子飲

萆薢分清飲

珍珠粉丸

濁熱清心蓮子飲寒萆菖烏益草苓濕熱珍珠炒薑栢滑黛神麴椿蛤同

註　赤濁帶下屬熱者宜用清心蓮子飲方在淋門白濁帶下屬寒者宜用萆薢分清飲即萆薢菖蒲烏藥益智甘草茯苓也赤白濁帶下屬濕熱者宜用珍珠粉丸即炒黑薑炒黃栢滑石青黛炒神麴炒椿皮蛤粉也

黑錫丹

黑錫上盛下虛冷精竭陽虛火上攻上壅頭痛痰氣逆下漏濁帶白淫精滑骨脂茴香葫蘆巴肉蔻桂附木金櫻沉香陽起巴戟肉硫鉛法結要研明

註　赤白濁帶下屬虛寒者及虛陽上攻頭痛喘嗽痰壅氣逆俱宜黑錫丹即補骨脂小茴香葫蘆巴肉蔻附子肉桂木香金櫻子沉香陽起石巴戟硫黃黑鉛也

痰飲總括

陰盛爲飲陽盛痰稠濁是熱沫清寒燥少粘連咯不易濕多易出風掉眩膈滿嘔吐爲伏飲支飲喘咳腫臥難飲流四肢身痛溢嗽引脇痛謂之懸痰飲素盛今暴瘦漉漉聲水走腸間飲留肺胸喘短渴在心下悸背心寒

註　飲則清稀故爲陰盛痰則稠濁故爲陽盛稠濁是熱痰屬心也沫清是寒痰屬腎也少而粘連咯不易出是燥痰屬肺也多而易出是

濕痰屬脾也搐搦眩暈是風痰屬肝也膈上痰滿嘔吐痰涎此飲留於膈間名曰伏飲也喘咳面腫不得臥此飲留於肺名曰支飲也飲流四肢身體重痛此飲留行於體名曰溢飲也咳嗽引脇疼痛此飲留於脇下名曰懸飲也素盛今瘦漉漉有聲水走腸間此飲留於腸胃名曰痰飲也凡飲留於胸肺則喘滿短氣而渴飲留於膈下則心下悸或背心寒冷也

二陳湯

燥痰湯

諸痰橘半茯苓草惟有燥者不相當風加南星白附子熱加芩連寒桂薑氣合四七鬱香附虛入參朮濕入蒼燥芩旋海天冬橘風消枳桔貝蔞霜

註　諸痰謂一切痰皆宜二陳湯治之即橘紅半夏茯苓甘草也因有苓半性過滲燥故與燥痰加黃芩黃連寒痰加乾薑肉桂氣痰加厚

朴蘇葉卽是合四七湯也因鬱生痰加香附
氣虛有痰加人參白朮卽六君子湯也濕痰
加蒼朮燥痰宜用燥痰湯卽枯黃芩旋覆花
海石天冬橘紅風化芒消枳殼桔梗貝母栝
蔞霜也

茯苓指迷丸

茯苓風消枳殼半痰飲平劑指迷丸寒實瓜蒂透
羅治熱實大陷小胃風痰飲平和之劑卽茯苓風化

註　指迷丸治一切痰飲平和之劑卽茯苓風化
芒消枳殼半夏也痰飲寒實者用瓜蒂散吐
之或用透羅丹下之熱實者在膈上用大陷
胸湯丸在三焦用小胃丹攻之

半夏茯苓湯加丁香湯

越婢加朮湯

流飲控涎茶桂治伏飲神佑半苓丁支飲葶藶懸
十棗溢飲越朮小青龍

註　留飲者謂一切飲留於上下內外也實者用
控涎丹攻之虛者用苓桂朮甘湯溫之伏飲

實者用神佑丸虛者用半夏三錢茯苓二錢
丁香一錢生薑三錢煎服治之卽半夏茯苓
湯加丁香也支飲用葶藶大棗湯懸飲用十
棗湯治之溢飲有熱者用越婢加朮湯卽麻
黃石膏甘草生薑大棗加蒼朮也有寒者用
小靑龍湯治之

欬嗽總括

有聲曰欬有痰嗽聲痰俱有欬嗽名雖云藏府皆
欬嗽要在聚胃關肺中胃濁脾濕嗽痰本肺失淸
肅欬因生風寒火鬱燥痰飲積熱虛寒久勞成

註　有聲無痰曰欬有痰無聲曰嗽有聲有痰曰
欬嗽內經雖云五藏六府皆令人欬而大要
皆在聚於胃關於肺也因胃濁則所遊溢之
精氣與脾濕所歸肺之津液皆不能淸水精
之濁難於四布此生痰之本爲嗽之原也肺

居胸中主氣清肅或爲風寒外感或爲痰熱
內干清肅有失降下之令因氣上逆而咳嗽
也久勞成謂久病欬嗽不已傷肺成勞也

參蘇飲

芎蘇飲

香蘇飲

茯苓補心湯

參蘇感冒邪傷肺熱寒欬嗽嘔痰涎氣虛用參實
減去二陳枳桔葛蘇前頭痛加芎喘加杏苓因熱
入麻乾寒虛勞胎產有是證補心四物量抽添

註參蘇飲治感冒風寒傷肺欬嗽嘔痰涎發
熱惡寒也卽人參蘇葉橘紅半夏茯苓甘草
枳殼桔梗前胡葛根也形氣虛者必用人參
若形氣實減去可也若頭痛依本方去人參
以前胡易柴胡加川芎名芎蘇飲若喘嗽依
本方去人參加杏仁名杏蘇飲若內有熱加
黃芩有寒加麻黃乾薑若虛勞之人及胎前
產後而有是病依本方合四物湯名茯苓補

心湯量其虛實寒熱加減可也

瀉心散

葶藶瀉白散

瀉白肺火鬱氣分喘欬面腫熱無痰桑骨甘草寒麻杏血分加苓熱甚連欬急嘔逆青橘半鬱甚失音訶桔添停飲喘嗽不得臥加苦葶藶效通仙

註　瀉白散即桑皮地骨皮甘草也治喘嗽面腫無痰身熱是爲肺經火鬱氣分若無汗是爲外寒鬱遏肺火加麻黃杏仁以發之若無外證惟面赤是爲肺經火鬱血分加黃芩內熱甚者更加黃連以清之欬急嘔逆者加青皮橘紅半夏以降之火鬱甚而失音者加訶子肉桔梗以開之若喘嗽面浮不得臥者是爲兼有停飲加苦葶藶以瀉之名葶藶瀉白散

清肺湯

清肺肺燥熱欬嗽二冬母草橘苓桑痰加蔞半喘加杏快氣枳桔斂味良

註　清肺湯即麥冬天冬知母貝母甘草橘紅黃

苓桑皮也有痰燥而難出加梔蔞子痰多加半夏喘加杏仁胸膈氣不快加枳殼桔梗久則宜斂加五味子

清燥救肺湯

喻氏清燥救肺湯肺氣虛燥鬱欬方參草麥膏生氣液杏枇降逆效功長胡麻桑葉阿膠潤燥血枯須加生地黃熱甚牛黃羚羊角痰多貝母與蔞霜

註　喻氏喻嘉言也枇杷葉也羚羊角犀角也蔞霜梔蔞霜也

透羅丹

瀉肺丸

寒實痰清透羅丹欬時涎壅氣出難巴杏大牽皂半餅熱實痰痰稠瀉肺丸

註　寒實痰盛涎清熱實痰盛稠黏皆能令人欬嗽嗽時痰涎頓壅氣閉難出寒實者用透羅丹即巴豆杏仁大黃牽牛皂角半夏共爲末蒸餅爲小丸量服方出丹溪心法附餘熱實者宜瀉肺丸方見失血門

人參瀉肺湯

積熱傷肺宜瀉肺喘嗽痰多粘色黃胸膈滿熱大便澀涼膈枳桔杏參桑

註　人參瀉肺湯卽涼膈散梔子連翹薄荷黃芩大黃甘草枳殼桔梗杏仁人參桑皮也

補肺湯

補肺虛寒喘嗽血皮毛焦枯有多年生鰕菀款桑皮桂鍾英糯米棗薑煎

鍾乳補肺湯

註　補肺湯卽人參麥冬五味子款冬花紫菀桑皮桂枝鍾乳石英糯米大棗生薑也

人參養肺湯

養肺平劑肺氣虛勞久喘嗽血腥宜參草杏阿知母棗烏梅罌粟骨桑皮

註　人參養肺湯爲治肺氣虛損久勞不寒不熱之平劑也其方卽人參炙草杏仁阿膠知母大棗烏梅罌粟殼地骨皮桑皮也

清寧膏

太平丸

欬嗽痰血清寧治甘桔麥地橘龍圓薏米川貝薄荷末血過於痰太平丸方諸書俱有

註　欬嗽痰少血多用太平丸方諸書俱有

瓊玉膏

杏酥膏

瓊玉膏治肺虛勞肺痿乾嗽欬涎滔生地膏蜜參苓末不虛燥蜜杏酥膏

註　瓊玉膏治虛燥先以生地煎膏後入煉白蜜人參茯苓末攪成膏杏酥膏治不虛而燥以杏仁霜孀酥油煉白蜜溶化合膏

喘吼總括

喘則呼吸氣急促哮則喉中有響聲實熱氣粗胸滿鞕虛寒氣乏飲痰清

註　呼吸氣出急促者謂之喘急若更哮中有聲響者謂之哮吼氣粗胸滿不能布息而喘者實邪也而更痰稠便鞕者熱邪也氣乏息微不能續息而喘者虛邪也若更痰飲清冷寒邪也

喘急死證

喘汗潤髮爲肺絶脈濇肢寒命不昌喘咳吐血不得臥形衰脈大氣多亡

註　氣多謂出氣多入氣少也

華蓋湯

千金定喘湯

葶藶大棗湯

外寒喘吼華蓋湯麻杏蘇草橘苓桑減苓加芩款半菓飲喘難臥棗葶方

註　外寒傷肺喘急用華蓋散即麻黃杏仁蘇子甘草橘紅赤茯苓桑皮也依本方減茯苓加黃芩款冬花半夏白菓名千金定喘湯治哮吼表寒之喘葶藶大棗湯治停飲不得臥之喘也

蘿皂丸

蘇子降氣湯

火鬱喘急瀉白散痰盛作喘蘿皂丸蔞仁海石星蘿皂氣喘蘇子降氣痊

註　面赤浮腫謂之火鬱之喘宜瀉白散痰盛聲

急謂之痰喘宜蘿皂丸無痰聲急謂之氣喘宜蘇子降氣湯方在諸氣門

五味子湯

黑錫丹

腎氣湯

人參理肺湯

氣虛咊麥參陳杏虛寒黑錫腎氣湯日久斂喘參桔味麻杏罌粟歸木香

註　五味子湯即五味子麥冬人參陳皮杏仁也

人參理肺湯即人參桔梗五味子麻黃杏仁罌粟殼當歸木香也黑錫丹方在濁帶門腎氣湯方在虛勞門

腫脹總括

衛氣並衄循分肉內傷外感正邪攻外邪客衄爲衄脹邪留分肉膚脹生

註　經曰衛氣之在身也常然並衄循分肉行陰陽相隨何病之有若其人內傷七情外感六氣飲食失節勞役過度則邪正相攻榮衛失和衛氣與風寒之邪客於衄中則爲衄脹衛氣與風寒之邪留於分肉則爲膚脹也

諸衄脹單腹脹膚脹鼓脹

脈脹筋起絡色變久成單腹末脫清膚脹鼕鼕初不鞕纏綿氣鼓脹膨膨

註　脈脹之證腹筋起絡色變久而不已則成單腹脹四末脫瘦清冷也膚脹之證鼕鼕然初不堅鞕纏綿不愈則成氣鼓脹滿膨膨急鞕也

腸覃石瘕

外邪干衛客腸外腸覃月事以時行外邪干營客胞內石瘕經閉狀妊盈

註　風寒之邪不客於脈中分肉而干衛氣深入客於腸外僻而內著日以益大狀如懷子月事仍以時行名曰腸覃或干營氣深入客於胞中惡血留止日以益大狀如懷子月事不以時下名曰石瘕此皆生於女子在男子則爲疝病也

水脹石水風水

皮厚色蒼多是氣皮薄色澤水濕成氣速安臥從上下水漸難眠咳喘徵石水少腹腫不喘風水面

腫脛足同石水陰邪寒水結風水陽邪熱濕凝

註　凡腫脹之病皮厚色蒼者皆屬氣也皮薄色澤者皆屬水也氣陽也陽性急故爲脹速每從上腫而漸下得以安臥邪在外也水陰也陰性遲故爲脹漸每從下腫而漸上更有咳喘不得臥之徵也石水之證少腹腫滿水在下故不喘也上腫曰風下腫曰水故風水之證面與脛足同腫也然石水屬陰邪故曰寒結也風水屬陽邪故曰熱濕凝也

脹滿水腫死證

腹脹身熱及失血四末清脫瀉數行腫起四肢後入腹利旋滿腫腹筋青唇黑臍突陰囊腐缺盆脊背足心平脈大時絕或虛濇腫脹逢之却可驚

註　腹脹身熱陽盛脹也若吐衄瀉血則陰亡矣四肢瘦冷陰盛脹也若數瀉不止則中脫矣先腫脹腹後散四肢者可治先腫四肢後歸入腹者不治腫脹之病多實服利下之藥旋消旋起則爲正不勝邪亦不治腹筋青漲高

起脹腫蒼黑臍腫突出陰囊腫腐缺盆脊背
腫平足心腫平則五藏傷皆不治也脈大而
時絕或虛濇細則氣血敗皆死脈也

木香流氣飲

膚脹鼓脹通身脹單腹鼓脹四肢平膚脹木香流
氣飲鼓脹加薑黃撫芎

註　膚脹皮膚脹也鼓脹經鼓脹也此二脹皆通
身脹也單腹脹四肢不脹鼓脹其脹如鼓此
二脹皆腹脹四肢不脹也膚脹宜用木香流
氣飲鼓脹亦用此湯更加薑黃撫芎也方在
諸氣門

厚朴散

下瘀血湯

單腹鼓脹分氣血氣實腸覃厚朴椰木枳壳青陳遂
大戟血實石瘕下瘀湯治之皆用厚朴散卽厚朴

註　單腹脹鼓脹當分氣血而治腸覃亦氣病也
故同氣實脹者一治之皆用厚朴椰木枳壳青陳皮甘遂大戟石瘕亦

血病也故同血實脹者一治之宜用下瘀血湯即大黃桃仁䗪虫甘遂也

寒脹中滿分消湯

熱脹中滿分消湯

氣虛脹病分寒熱中滿分消有二方寒脹參芪歸苓朴半夏吳萸連二薑升柴烏麻青蘗澤蓽澄草蔻益木香熱縮六君知猪澤枳朴芩連乾薑黃

註脹有虛實寒熱若脹而形氣虛少寒者宜用寒脹中滿分消湯即人參黃芪當歸茯苓厚朴半夏吳萸黃連乾薑生薑升麻柴胡川烏麻黃青皮黃蘗澤瀉蓽澄茄草豆蔻益智木香也脹而形氣虛少熱者宜用熱脹中滿分消湯即縮砂人參白朮茯苓炙草廣皮半夏知母猪苓澤瀉枳殼厚朴黃芩黃連乾薑薑黃也

水腫治法

上腫多風宜乎汗下腫多濕利水泉汗宜越婢加蒼朮利用貼臍琥珀丹外散內利疏鑿飲喘不得

臥蘇葶先陽水熱瀋濕神祐陰水實脾腎氣丸

註　從上腫者多外感風邪故宜乎汗從下腫者多內生濕邪故宜乎利水外散風水宜用越婢湯加蒼朮卽麻黃石膏甘草蒼朮也內利水濕宜用貼臍等法一以巴豆去油四錢水銀粉二錢硫黃一錢研勻成餅先用新綿一片布臍上內餅外用帛縛時許自然瀉下惡水待下三五次去藥以粥補住日久形贏隔一日取一次一餅可救三五人一以鮮赤商陸根杵爛貼臍上以帛縛定水自小便出一以田螺四個大蒜五個車前子末三錢研成餅貼臍中以帕縛之少時尿利卽愈或內服沉香琥珀丸卽苦葶藶子眞郁李仁防已沉香陳皮琥珀杏仁蘇子赤茯苓澤瀉麝香也若通身腫則當外散內利宜用疏鑿飲子兩解之若水盛上攻喘急不得臥則當先用蘇子葶藶丸以定喘卽此二味等分爲末棗肉丸陽水屬熱實者熱盛宜用大聖滌川散濕

盛宜用舟車神祐丸以下之二方在醫宗必讀陰水屬寒虛者脾虛不食便軟宜用實脾飲腎虛腔足冷硬宜用腎氣丸

疏鑿飲子

茯苓導水湯

水腫兩解疏鑿飲和劑茯苓導水湯疏鑿椒目赤小豆檳榔商陸木通羌活秦艽大腹皮茯苓皮澤瀉茯苓導水澤苓桑木香木瓜砂陳木蘇葉大腹麥檳榔

註

水腫外散內利兩解和者茯苓導水湯疏鑿飲即椒目赤小豆檳榔商陸木通羌活秦艽大腹皮茯苓皮澤瀉也外散內利兩解和者茯苓導水湯蘇葉大腹皮麥冬檳榔也

實脾飲

裏實自然尋濬祐裏虛實脾四君香木瓜附子大腹子厚朴草果炒乾薑投諸溫補俱無驗欲諸攻下又難當須行九補一攻法緩求淡食命多昌

註

裏實二便澁者宜用濬川散神祐丸裏虛二

便通者宜用實脾飲即人參白朮茯苓炙草
木香木瓜川附子大腹子厚朴草果炒乾薑
也腫脹之病屬虛寒者自宜投諸溫補之藥
而用之俱無効驗者虛中必有實邪也欲投
諸攻下之藥而又難堪然不攻之終無法也
須行九補一攻之法是用補養之藥九日俟
其有可攻之機而一日用瀉下之藥攻之然
攻藥亦須初起少少與之不勝病漸加之必
審其藥與元氣相當逐邪而不傷正始爲法
也其後或補七日攻一日攻一日補五日攻一日補
三日攻一日緩緩緩求之以愈爲度若能戒鹽
醬淡食百日多有生者

醫愈貪百日愈深
三日灸一日發來灸四日愈淺如盈
盛其勢如海水日灸一日漸正日灸一日漸

御纂醫宗金鑑雜病心法要訣

卷四十二

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

44

ChL 7918.7638

瘧疾
霍亂
嘔吐噦
翻胃噎膈
泄瀉
痢疾
黃疸
積聚
疝

合衆圖書館藏書

卷四十二

御纂醫宗金鑑卷四十二

編輯雜病心法要訣目錄

瘧疾
霍亂
嘔吐噦
翻胃噎膈
泄瀉
痢疾
黃疸

積聚

痞

御纂醫宗金鑑卷四十二

編輯雜病心法要訣

瘧疾總括

夏傷於暑舍營內秋感寒風并衛居比時或爲外邪束暑汗無出病瘧疾

註　經曰疾瘧皆生於風謂四時病瘧未有不因風寒外束暑邪內伏者也又曰瘧者風寒之氣不常也此言比時病瘧者也又曰夏傷於暑秋爲疾瘧又曰夏暑汗不出者秋成風瘧

謂夏傷於暑其邪甚者即病暑其邪微者則
舍於營復感秋氣寒風與衛并居則暑與風
寒合邪始成瘧病也其不即病傷寒者亦以
有暑邪預伏於營中也蓋有風無暑惟病風
有暑無風惟病暑必風暑合邪始病瘧也

日作問作

瘧隨經絡循伏脊深入脊內注伏衝橫連膜原薄
藏府會衛之時正邪爭得陰內薄生寒慄得陽外
出熱蒸蒸邪淺日作日會衛邪深間作衛遲逢

注

瘧氣之邪伏藏於營隨其經絡循脊脊之表
而下此初病邪淺傳舍之次也其邪深者則
入脊脊之內伏注於衝衄橫連諸經脂膜之
原內及藏府此邪漸深傳舍之次也衛氣者
一日一夜周於身每至明旦則出足太陽睛
明大會於風府腠理乃開開則所客營衛之
邪入邪入得陰內薄則生寒得陽外出則生
熱內外相薄邪正交爭而病乃作也病初邪
淺者衛行未失常度其邪日與衛會故日作

也病久邪深者衛行遲失常度其邪不能日與衛會故間日乃作也時有間二日間三日或至數日作者亦衛氣行愈遲會愈遲故作愈遲也

瘧晝夜作

衛不循經行衄外陽會晝發陰夜發邪退自然歸陽分病進每必入陰家

註　營氣循經而行衄中衛氣不循經而行衄外惟日行於三陽夜行於三陰故邪在三陽之淺者則晝發邪在三陰之深者則夜發病邪將退者夜發退爲晝發此爲去陰就陽則病欲已也病邪漸進者晝發進爲夜發此爲去陽入陰則病益甚也

瘧蚤晏作

衛氣平旦會風府邪傳日下一節間從頭循下故益晏下極復上蚤之緣

註　衛氣流行每日平旦循背腰日下傳脊之一節從頭項歷風府而邪氣中人

邪與衛會日晚故作日益晏也邪傳下極骶衝其氣復上行邪與衛會日蚤故作日益蚤也

瘧疾治法

瘧初氣實汗吐下表裏俱清用解方清解不愈方可截久瘧形虛補自當

註　瘧初氣實均宜汗吐下有表裏證汗下之胸滿嘔逆有飲者吐之表裏俱清宜用和解清解不愈表裏無證可用截藥止之久瘧形羸氣虛宜用補劑自當然也

桂麻各半湯

瘧初寒熱兩平者桂麻各半汗方療汗少寒多麻倍入汗多倍桂熱加膏

註　瘧病初起寒熱不多不少兩平者宜桂麻各半湯汗之汗少寒多熱少者倍麻黃湯汗之汗多寒少熱平者倍桂枝湯汗之熱多者更加石膏

麻黃羌活湯

桂枝羌活湯

麻黃羌活加半夏湯

白虎湯

白虎桂枝湯

柴胡白虎湯

柴胡桂枝湯

寒多寒瘧而無汗麻黃羌活草防尋熱多有汗爲風瘧減麻添桂嘔半均先熱後寒名溫瘧白虎汗多合桂君癉瘧但熱柴白虎牝瘧惟寒柴桂親

註

此皆諸瘧初起之汗法也先傷於寒後傷於風先寒後熱寒多熱少無汗謂之寒瘧宜用麻黃羌活湯卽麻黃羌活防風甘草也先傷於寒後熱熱多寒少有汗謂之風瘧宜用桂枝羌活湯卽桂枝羌活防風甘草也二證嘔者均加半夏先傷於風後傷於寒先熱後寒謂之溫瘧宜用白虎湯汗多合桂枝湯陽氣盛陽獨發則但熱而不寒謂之癉瘧宜用柴胡白虎湯卽小柴胡合白虎

湯也陰氣盛陰獨發則但寒而不熱謂之牝瘧宜用柴胡桂枝湯卽小柴胡合桂枝湯也

草果柴平湯

大柴胡湯

食瘧痞悶噫惡食草果小柴平胃宜瘧裏便鞕大柴下消檳果朴量加之

註　因食而病瘧者則痞悶噫氣惡食宜小柴胡合平胃散加草果清之凡瘧有裏不清便鞕者宜大柴胡湯加芒消厚朴草果檳榔下之

清脾飲

瘧疾已經汗吐下清解未盡寒熱方清脾白朮青朴果小柴參去入苓薑棗氣虛加參痰橘半飲多宜逐倍薑榔渴熱知膏天花粉食滯麥麴濕澤蒼

註　瘧疾已經或汗或吐或下表裏無證法當清解宜用清脾飲和之卽白朮青皮厚朴草果柴胡黃芩半夏甘草茯苓生薑也氣虛者加人參痰多者加橘紅倍半夏飲多者倍生薑加檳榔渴熱者加知母石膏天花粉食滯者

加麥芽神麴濕盛者加澤瀉蒼术

久瘧虛瘧勞瘧

久瘧氣虛脾胃弱四獸益氣等湯斟勞瘧鱉甲十全補熱除者桂入柴芩

註　久患瘧疾形氣俱虛脾胃弱不思食宜用四獸飲補中益氣等湯斟酌治之久病勞損氣血兩虛而病瘧疾者名曰勞瘧宜用十全大補湯倍加鱉甲熱盛者除去黃耆肉桂加柴胡黃芩也

柴胡截瘧飲

蜜佗僧散

諸瘧發過三五次表裏皆清截法先未清截蚤發不已已清不截正衰難截虛柴胡截瘧飲小柴梅桃檳常山截實不二佗僧散燒酒冷調服面南

註　凡瘧按法治之發過三五次表裏無證當先以截瘧藥截之若表裏未清截蚤則瘧疾必復發之不已表裏已清不截則正衰邪盛而難治也截不足人之瘧宜用小柴胡湯加常

山檳榔烏梅桃仁薑棗煎併滓露一宿次日發前一二時小溫服惡心以糖拌烏梅肉壓之截有餘人之瘧宜用不二飲全方或蜜佗僧細末大人七分小兒量之冷燒酒調面南如前法服之一服不愈再服必止戒鷄魚豆腐麵食羹湯熱粥熱物

瘧瘧瘧母

瘧瘧經年久不愈瘧母成塊結癖癥瘕形實控涎或化滯攻後餘法與前同

註瘧瘧經年不愈之老瘧也瘧母久瘧腹中成塊癖也形實宜用控涎丹以攻痰飲或用化滯丸以攻積滯攻後之餘法與前所治瘧法同也

桂枝麻黃柴胡四物去杏仁加桃仁湯

瘧在夜發三陰瘧桂麻柴物杏易桃鬼瘧尸注多惡夢恐怖蘇合效功高

註瘧在夜發名曰三陰瘧疾初熱宜用桂枝湯麻黃湯小柴胡湯四物湯方合劑以杏仁易

桃仁增損汗之汗解之後餘同前法鬼瘧亦多在夜發由尸氣注之比三陰瘧疾則夜多惡夢時生恐怖宜用蘇合香丸治之

霍亂總括

揮霍變亂生倉卒心腹大痛吐利兼吐瀉不出乾霍亂舌卷筋縮入腹難治

註　欲吐不吐欲瀉不瀉心腹大痛名曰乾霍亂又名攪腸痧若舌卷筋縮則卵陰入腹難治也

藿香正氣散

二香湯

甘露飲

霍亂風寒暑食水雜邪爲病正氣方霍蘇陳半茯苓草芷桔腹皮厚朴當歸轉筋木瓜吳萸入暑合香薷濕入暮暑熱六一甘露飲寒極烏附理中湯

註

霍亂之病得之於風寒暑食水邪雜揉爲病亂於腸胃清濁相干故心腹大痛吐瀉也藿香正氣湯卽藿香蘇葉陳皮半夏茯苓甘草白芷桔梗大腹皮厚朴也暑則吐多合香薷飲名二香湯濕則瀉多加藿朮暑熱甚者用辰砂六一散或五苓散加石膏滑石寒水石名甘露飲寒極肢厥脈伏者用炮川烏炮川附合理中湯

噎膈翻胃總括

三陽熱結傷津液乾枯賁幽魄不通賁門不納爲噎膈幽門不放翻胃成二證留連傳導瀼隘魄門應自濇於行胸痛便鞕如羊糞吐沫嘔血命難生

註三陽熱結謂胃小腸大腸三府熱結不散灼傷津液也胃之上口爲賁門小腸之上口爲幽門大腸之下口爲魄門三府津液既傷三門自然乾枯而水穀出入之道不得流通矣賁門乾枯則納入水穀之道路狹隘故食不

能下爲噎塞也幽門乾枯則放出腐化之道路狹隘故食入反出爲翻胃也二證留連日久則大腸傳導之路狹隘故魄門自應燥濇難行也胸痛如刺胃脘傷也便如羊糞津液枯也吐沫嘔血血液不行皆死證也

人參利膈丸

汞硫散

五汁大黃清燥熱丁沉君子理虛寒便秘壅遏應利膈吐逆不止汞硫先利膈小承參草木歸藿檳桃麻蜜丸汞一硫二研如塵老酒薑汁服卽安

註五汁謂五汁飲以清燥乾也大黃謂大黃湯卽大黃一味用薑汁炙大黃片變黑黃色量人强弱每服二三錢加陳倉米一撮葱白二莖煎去滓服以治熱結也丁香沉香加入四君子六君子理中湯內治虛寒也利膈謂利膈丸卽枳殼厚朴大黃人參甘草木香當歸藿香檳榔桃仁火麻仁蜜爲丸也汞硫謂汞硫散也

四君子湯

四物湯

二陳湯

二十四味流氣飲

氣少血枯四君物痰多氣滯二陳流餘者亦同嘔吐法竭思區畫待天休

註　氣少者宜四君子湯血枯者宜四物湯痰多宜二陳湯氣滯者宜二十四味流氣飲其餘之治法同嘔吐此病雖竭心思區畫亦不過盡人事以待天命也

嘔吐噦總括

有物有聲謂之嘔有物無聲吐之徵無物有聲噦乾嘔面青指黑痛厥凶

註　面色青指甲黑也中痛不止肢厥不回其凶可知也

小半夏湯

橘皮半夏湯

大半夏湯

黃連半夏湯

丁萸六均湯

嘔吐半薑爲聖藥氣盛加橘虛蜜參熱盛薑連便閉下寒盛丁萸薑六君

註　便閉謂大小二便閉而不行宜攻下也初吐切不可下恐逆病勢也

五汁飲

硫汞散

化滯丸

潤燥止吐五汁飲蘆薈甘蔗竹瀝薑嘔吐不下硫汞墜積痛作吐化滯良

註　五汁飲卽蘆薈錐勒薺甘蔗竹瀝薑汁也嘔吐者宜用重墜之藥以石硫黃二錢水銀一錢同研如煤色極細用老諸藥湯水到咽卽吐者宜用重墜之藥以石硫黃二錢水銀一錢同研如煤色極細用老酒薑汁調服稍點白滾湯亦可頓服之其藥卽不能吐出次日大便出黑色穢物諸湯水藥服之則不吐也如不大便黑色再服以大便利爲度吐而痛者乃積也宜化滯丸

諸泄總括

濕瀉　濡瀉　水瀉　洞瀉

寒瀉　飧瀉　脾瀉　腎瀉

濕勝濡瀉即水瀉多水腸鳴腹不疼寒濕洞瀉即寒瀉鴨溏清徹痛雷鳴完穀不化名飧瀉土衰木盛不升清脾虛腹滿食後瀉腎瀉寒虛晨數行

註　濡者水也洞者直傾下也鴨溏如鴨屎之溏澄徹清冷也痛腹痛也雷鳴腸鳴甚也不升上升也脾瀉脾虛也食瀉清謂清氣在下不上升也脾瀉脾虛也食瀉

飲食後卽瀉也晨數行每至蚤晨行瀉數次也

食瀉　胃瀉　飲瀉　痰瀉

火瀉　暑瀉　滑瀉　大瘕瀉

傷食作瀉卽胃瀉噫氣腹痛穢而黏渴飲瀉復渴飲瀉時瀉時止却屬痰火瀉陣陣痛飲冷暑瀉面垢汗渴煩滑瀉日久不能禁大瘕今時作痢看

註　過食作瀉名曰食瀉卽胃瀉也穢而黏所瀉之物臭而黏也渴而飲飲而瀉瀉而復渴渴而復飲而瀉也時或瀉時或不瀉屬痰瀉也陣陣謂瀉一陣痛一陣也大瘕瀉卽今時之痢疾病也

泄瀉死證

泄瀉形衰鮎實大五虛噦逆手足寒大孔直出無禁止下瀉上嗽命多難

註　五虛謂鮎細皮寒氣少水漿不入大便不禁也大孔謂肛門大孔不禁也

參苓白朮散

濕瀉胃苓分清濁寒瀉理中附子添飧瀉升陽益胃治倍加芍藥減黃連脾瀉參苓白朮散扁豆四君蓮肉攢薏苡山藥縮砂桔腎瀉二神四神丸

註　參苓白朮散卽扁豆人參白朮茯苓炙草蓮肉薏苡仁山藥縮砂桔梗也二神丸卽補骨脂肉豆蔻本方加吳茱萸五味子名四神丸

青六散

芍藥芩連葛根湯

八柱散

食瀉實下虛消導飲瀉實者神祐斟虛者春澤甘露飲痰瀉實攻虛六君火瀉草芍芩連葛暑瀉紅麴六一勻滑瀉八柱理中附粟殼烏梅訶蔻壽

註　食瀉形氣實者宜大承化滯等藥下之形氣虛者宜枳朮平胃等消導之神祐斟謂雖當用神祐先逐飲然亦斟酌不可過也春澤謂春澤湯也甘露飲謂五苓甘露飲也芍藥芩連葛根湯卽甘草芍藥黃芩黃連葛根也青六散卽六一散加紅麴也八柱散附子理中

湯加罌粟殼烏梅訶子肉蔻也

瀉心導赤散

茯苓車前子飲

苓桂理中湯

口糜泄瀉雖云熱上下相移亦必虛心脾開竅於舌口小腸胃病化職失糜發生地通連草瀉下參苓白术宜尿少茯苓車前飲火虛苓桂理中醫

註口瘡糜爛泄瀉一證古經未載以理推之雖云屬熱然其上發口糜下瀉卽止泄瀉方止口糜卽生觀其上下相移之情狀亦必純實熱之所爲也心之竅開於舌脾之竅開於口心脾之熱故上發口舌瘡赤糜爛胃主消化水穀小腸主盛受消化心脾之熱下移小腸胃府則運化之職失矣故下注泄瀉也口糜發時晚用瀉心導赤散滾湯淬服之卽生地木通黃連甘草稍也下泄瀉時蚤晚用參苓白术散糯米湯服之若小便甚少下利不止則爲水走大腸宜用茯苓車前子二味各等

分煎湯時時代飲利水導熱若服寒涼藥口
瘡不效則爲虛火上泛宜用理中湯加肉桂
大倍茯苓降陽利水降陽而口糜自消水利
泄瀉自止可並愈也

痢疾總括

大瘕小腸大腸瀉腸癖滯下古痢名外因風暑濕
蒸氣內因不謹飲食生冷痢傷氣赤傷血寒虛微
痛熱窘疼實墜糞前虛墜後濕熱寒虛初久稱
註大瘕瀉者裏急後重數至圊而不能便莖中
痛也小腸瀉者溲澁而便膿血少腹痛也大
腸瀉者食已窘迫大便色白腸鳴切痛也腸
癖者飲食不節起居不時陰受之則入五藏
膜脹閉塞下爲飧瀉久爲腸癖腹痛下血也

滯下者積汁垢膩與濕熱滯於腸中因而下也此皆古痢之名也然痢之爲病裏急後重下利膿血小便赤澁裏急者腹痛積滯也後重者下墜氣滯也小便赤澁者濕熱鬱滯也皆因外受風暑濕蒸之氣內傷生冷飲食過度而生也白痢自大腸來大腸與肺爲表裏肺主氣故屬傷氣也赤痢自小腸來小腸與心爲表裏心主血故屬傷血也寒閉痛甚寒開痛微痢開病減故痛微也虛者少氣氣無壅滯故亦痛微也熱者多實性急不得舒通故窘痛甚也後墜下廹肛門糞出墜止爲糞前墜乃滯也故曰實墜糞出更墜爲糞後墜非滯也故曰虛墜初痢多屬濕熱久痢多屬寒虛也

噤口痢　水穀痢　風痢　休息痢

熱痢　寒痢　濕痢　五色痢

噤口飲食俱不納水穀糟粕雜血膿風痢墜重圊清血休息時作復時停熱痢魚腦稠黏穢寒痢稀

瀉白清腥濕痢黑豆汁渾濁五色相雜藏氣凶

註　噤口痢者下利不食或嘔不能食也水穀痢者糟粕膿血雜下也風痢者似腸風下清血而有墜痛也休息痢者時發作時停止也五色痢者五色膿血相雜而下也若有藏腐屍臭之氣則凶

痢疾死證

水漿不入利不止氣少脈細皮膚寒純血噤口嘔藏氣身熱脈大命難全

註　下利不止水漿不入氣少脈細皮膚寒死於陽絕也下利純血噤口嘔逆藏氣身熱脈大死於陰絕也

倉廩湯

大黃黃連湯

初痢表熱宜倉廩裏熱衝心大黃連寒痢理中訶蔻縮附白桂赤不須言

註　初痢有表證發熱者不宜攻之法當先解其外用倉廩湯汗之裏熱盛上衝心作嘔噤口

者法當先攻其裏用大黃黃連好酒煎服攻之寒痢宜用理中湯加訶子肉蔻縮砂白多者加附子赤多者加肉桂也

芍藥湯

初痢內外無大熱芩連枳木芍歸榔桂草尿澁滑石倍利數窘痛入大黃

註　初痢外無表熱內熱不盛宜用芍藥湯卽黃芩黃連枳實木香芍藥當歸檳榔甘草肉桂少許也小便澁赤加滑石下利次數無度下墜痛甚入大黃也

香連和胃湯

參連開噤湯

貼臍法

痢疾下後調氣血宜用香連和胃湯黃芩芍藥香連草陳皮白朮縮砂當赤虛更加椿榆炒白虛參芩共炒薑噤口參連石蓮子貼臍王瓜藤散良

註　痢疾攻後病勢大減宜調氣血用香連和胃湯卽黃芩芍藥木香黃連甘草陳皮白朮縮

砂當歸也赤痢下血多虛者當澁之加炒椿根白皮炒地榆白痢日久氣虛者加人參茯苓炒乾薑以補之實而噤口堪下者以大黃黃連湯下之不堪下者內以人參黃連石蓮子煎湯徐徐服之下咽卽好外以貼臍王瓜藤散卽王瓜藤莖葉經霜者燒灰香油調納臍中卽有效也

眞人養藏湯

久痢寒熱烏梅治寒虛滑痢養藏湯參朮肉蔻歸朮肉蔻當歸訶子肉桂芍藥罌粟草木香

註　久痢藏有寒熱不分者宜用烏梅丸調和之寒虛滑脫者宜用養藏湯溫補之卽人參白朮肉蔻當歸訶子肉桂芍藥罌粟殼甘草木香也

香連平胃散

胃風湯

水穀調中益氣治濕痢香連平胃方虛濕風痢胃風治桂粟八珍減地黃

註　水穀痢者乃脾胃虛腐化不及宜調中益氣湯濕痢宜木香黃連合平胃散方濕而虛者宜用胃風湯卽肉桂粟米八珍湯減地黃也

五色痢休息痢治法

五色休息皆傷藏澁蚤滯熱蘊於中補之不應衄有力日久仍攻餘法同

註　五色休息二利皆因用止澁藥蚤或因滯熱下之未盡蘊於腸胃傷藏氣也用一切補養之藥不應則可知初病非止澁太蚤卽下之未盡也診其衄若有力雖日久仍當攻也其餘治法與諸痢同

疸證總括

面目身黃欲安臥小便渾黃疸病成已食如饑飽煩眩胃疸穀疸酒疸名女勞額黑少腹急小便自利審瘀生黃汗微腫皆濕熱陰黃重痛厥如氷

註　面目身黃但欲安臥小便黃渾此黃疸病已成也如已食如饑食難用飽飽則心煩頭眩此欲作胃疸胃疸者即穀疸也若已見黃色疸已成矣得之於胃有濕熱大饑過食也酒疸者得之於飲酒無度而發是病也女勞疸

者疸而額黑少腹急小便自利得之於大勞大熱與女交接也瘀血發黃亦少腹急小便自利但不額黑耳詳在傷寒門黃汗者汗出黃色染衣面目微腫得之於素有濕熱汗出入水浴之也此皆濕熱而成惟陰黃則屬濕寒陰黃者身重而痛厥冷如氷詳在傷寒門

疸病死證

疸過十日而反劇色若煙熏目暗青喘滿渴煩啖蒜面黧汗冷及天行

註

仲景曰黃疸之病當以十八日爲期治之十日以上宜差反劇爲難治也色若烟熏目神暗青陽黃死證也喘滿渴煩不已心胸如啖蒜刺痛黃毒入腹死證也面色黧黑冷汗槩槩陰黃死證也天行疫癘發黃名曰瘟黃死人最暴也

麻黃茵陳醇酒湯

茵陳蒿湯

梔子蘗皮湯

茵陳五苓散

表實麻黃茵陳酒裏實茵陳梔大黃無證茵陳梔子蘗尿少茵陳五苓湯

註　諸疸表實無汗者以麻黃茵陳無灰好酒煎服汗之裏實不便以茵陳梔子大黃下之無表裏證以茵陳梔子蘗皮清之小便短少以茵陳五苓散利之

胃疸湯

穀疸熱實宜乎下不實宜用胃疸湯茵陳胃苓減草朴連梔防已葛秦方

註　胃疸湯卽茵陳蒼朮陳皮白朮茯苓猪苓澤瀉黃連梔子防已葛根秦艽也

茵陳解醒湯

梔子大黃湯

蔓菁散

加味玉屏風散

酒疸虛茵解醒湯實用梔豉枳大黃黃汗一味蔓菁散石膏茵陳者术防

註　酒疸虛者用茵陳解醒湯卽葛花解醒湯加茵陳也實者用梔子大黃湯卽梔子淡豆豉枳實大黃也黃汗宜用蔓菁子一味爲細末每服二錢日三井華水調服小便白則愈或用加味玉屏風散卽石膏茵陳黃耆白朮防風也

石膏散

腎疸湯

女勞實者膏滑麥女勞虛者腎疸醫升陽散火減去芍

註　石膏散卽煆石膏飛滑石各等分每服二錢大麥湯調服腎疸湯卽升陽散火湯減去芍藥乃升麻蒼朮防風獨活柴胡羌活葛根人參甘草加入黃芩黃蘗神麴白朮茯苓豬苓澤瀉也

積聚總括

五積六聚本難經七癥八瘕載千金腸覃石瘕辨月事痃癖之名別淺深藏積發時有常處府聚忽散無本根癥類積痃瘕聚癖腸滿汁溢外寒因

註

五積六聚之名本乎難經五積者肥氣伏梁痞氣息賁奔豚也六聚者積之着於孫絡緩筋募原脊筋腸後輸鉅也七癥八瘕之名載千金方七癥者蛟蛇鱉肉髮虱米也八瘕者青黃燥血脂狐蛇鱉也腸覃者積在腸外狀

如懷子月事以時而下石瘕者積在胞中狀
如懷子月事不以時下故曰辨月事也瘕者
外結募原肌肉之間癖者內結隱僻脅脊腸
胃之後故曰別淺深也然積者屬藏陰也故
發有常處不離其部聚者屬府陽也故發無
根本忽聚忽散癥不移而可見故類積類瘕
也瘕能移有時隱故類聚類癖也積聚癥瘕
腸覃石瘕瘕癖之疾皆得之於喜怒不節則
傷藏飲食過飽則傷府腸胃填滿汁液外溢
爲外寒所襲與內氣血食物凝結相成也

積聚難證

積聚牢堅不軟動胃弱溏瀉不堪攻奔豚發作狀
欲死氣上衝喉神怖驚

註

積聚牢固不動堅硬不軟則病深矣胃弱食
少大便溏瀉不堪攻矣五積之中奔豚最爲
難治若更發作正氣虛不能支其狀欲死從
少腹起氣上衝喉神色驚怖皆惡候也

積聚治法

積聚胃强攻可用攻虛兼補正邪安氣食積癖宜
化滯溫白桃仁控涎丹

註　積聚宜攻然胃强能食始可用攻若攻虛人
須兼補藥或一攻三補或五補一攻攻邪而
不傷正養正而不助邪則邪正相安也凡攻
氣食積癖宜用秘方化滯丸方在內傷門攻
積聚癥瘕痕宜用溫白丸卽萬病紫菀丸方倍
川烏攻血積血瘕痕宜用桃仁煎卽桃仁大黃
各一兩蟅虫炒五錢朴消一兩共爲末先以
醇醋一觔用砂器慢火煎至多半鍾下末藥
攪良久爲小丸前一日不喫晚飯五更初溫
酒送下一錢取下惡物如豆汁鷄肝未下次
日再服見鮮血止藥如無蟅虫以蠐螬虫代之
然不如蟅虫爲愈也攻痰積宜用控涎丹方
在痰飲門

疝證總括

經云任脈結七疝主於肝肝經過腹環陰器任脈循腹裏之原疝證少腹引陰痛衝上衝心二便難厥吐痕癥狐出入潰膿癰秘木癩頑

註　經曰任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚痕聚者卽女子之疝也七疝主任者原以任脈起中極循腹裏也七疝主肝者蓋以肝經過腹裏環陰器也是以諸疝病無不由是二經故主之也疝病之證少腹痛引陰丸氣

上衝心不得二便者爲衝疝也少腹痛引陰丸肝之逆氣衝胃作吐者爲厥疝也少腹之氣不伸左右癥塊作痛者爲瘕疝也臥則入腹立則出腹入囊似狐之晝則出穴而溺夜則入穴而不溺者爲狐疝也少腹痛引陰丸也少腹不痛陰囊腫大頑硬者爲癭疝也

橫骨兩端約文中狀如黃瓜內有膿血者爲癰疝也少腹痛引陰丸小便不通者爲癃疝也

疝證同名異辨

血疝便毒潰魚口瘭癩氣墜筋卽疳水疝胞癉皆癰疝衝似小腸腰痛連

註有謂血疝者其證卽便毒魚口也瘭疝者其證卽癩氣也墜筋者卽偏墜也筋疝者卽下疳也水疝小便不通胞癉卽膀胱氣皆癃疝也衝疝證似小腸氣而更連腰痛也

諸疝治法

治疝左右分氣血尤別虛濕熱與寒收引痛熱多縱濕腫重墜虛輕然

註　疝病凡在左邊陰丸屬血分凡在右邊陰丸屬氣分凡寒則收引而痛甚熱則縱而痛微凡濕則腫而重墜而虛亦腫墜但輕輕然而不重也

當歸溫疝湯

烏桂湯

中寒冷疝歸芍附桂索茴楝澤萸苓外寒入腹川烏蜜肉桂芍草棗薑同

註　當歸溫疝湯即當歸白芍附子肉桂延胡索小茴香川楝子澤瀉吳茱萸白茯苓也烏桂湯即川烏蜂蜜肉桂白芍藥炙甘草生薑大棗也

烏頭梔子湯

外寒內熱烏梔炒水酒加鹽疝痛安癪疝不問新與久三層茴香自可痊

註　此茴香丸方在醫宗必讀

十味蒼蘗散

醇酒厚味濕熱疝不謹房勞受外寒蒼蘗香附青

益草茴索查桃附子煎

註　此散卽蒼朮黃蘗香附青皮益智甘草小茴香南山查元胡索楓斗桃仁附子也

茴楝五苓散

大黃皂刺湯

膀胱水疝尿不利五苓茴楝與葱鹽瘕鞭血疝宜乎下大黃皂刺酒來煎

註　大黃皂刺湯卽大黃皂刺各三錢酒煎服也

羊肉湯

血分寒疝女產後臍連陰脹痛疼羊肉一觔薑五兩當歸三兩水八升

奪命湯

衝疝厥疝痛上攻臍悸奔豚氣上行吳茱一味爲

君主肉桂澤瀉白茯苓

青木香丸

氣疝諸疝走注痛青木香附吳萸良巴豆拌炒川楝肉烏藥蘗澄小茴香

註　青木香丸卽青木香五錢酒醋浸炒吳茱萸

一兩香附醋炒一兩蕓澄茄五錢烏藥五錢
小茴香五錢巴豆仁二十一粒研碎拌炒川
楝肉五錢爲末合均葱涎爲小丸每服三錢
酒鹽任下立愈及能醫一切疝痛神效

茴香楝實丸

楝實狐疝一切疝楝肉茴香馬蘭薍三蕓二皮各
一兩仍宜急灸大敦安矣

註　茴香楝實丸治狐疝及一切諸疝卽川楝肉
小茴香馬蘭花薍花醋炒變焦色山茱蕓吳
茱蕓食茱蕓青皮陳皮各一兩爲末醋糊爲
小丸酒送二錢

按　大敦肝經穴在足大指甲後有毛處諸疝均
宜灸之卽安

御纂醫宗金鑑雜病心法要訣

卷四十三

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

43

卷四十三

頭痛眩暈
眼目
牙齒口舌
咽喉
肩背痛
心腹諸痛
胸脇痛
腰痛
小便閉癃
遺尿不禁
大便燥結

OhL 7918.7638



卷四十三

御纂醫宗金鑑卷四十三

編輯雜病心法要訣目錄

頭痛眩暈
眼目
牙齒口舌
咽喉
肩背痛
心腹諸痛
胸脇痛

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

腰痛

小便閉癃遺尿不禁

大便燥結

御纂醫宗金鑑卷四十三

編輯雜病心法要訣

頭痛眩暈總括

頭痛痰熱風濕氣或兼氣血虛而疼在右屬氣多痰熱左屬血少更屬風因風眩暈頭風痛熱暈煩渴火上攻氣鬱不伸痰嘔吐濕則重痛虛動增

註　頭痛屬痰屬熱屬風屬濕屬氣或兼氣虛血虛因風而痛謂之頭風必眩暈因熱而痛暈者則煩渴因氣鬱而痛暈者則志意不伸因

痰而痛暈者則嘔吐痰涎因濕而痛暈者則
頭重不起因虛而痛暈者動則更痛更暈也

頭痛眩暈死證

眞頭腦痛朝夕死手足厥逆至節青瀉多眩暈時
時冒頭卒大痛目瞀凶

註　眞頭痛痛連腦內手足青冷至肘膝之節朝
發夕死凡頭痛眩暈時時迷冒及頭目卒然
大痛目視不見或瀉多之後皆凶證也

華茇散

芎芷石膏湯

頭風喘鼻熱華茇濕盛瓜蒂入茶茗風盛日久三
聖散內服芎芷石膏菊羌藁苦加細
辛風防荊熱加梔翹芩薄草便秘尿紅消黃攻

註　一切頭風兼熱者以華茇散喘鼻即華茇一
味爲末用豬膽汁拌過喘之作嚏立愈一切
頭風兼濕者以瓜蒂松蘿茶二味爲末喘之
出黃水立愈頭風盛時發日久不愈則多
令人目昏以三聖散喘之方在中風門內用

芎芷石膏湯卽芎芷石膏菊花羌活藁本也

苦痛者加細辛風盛目昏加防風荆芥穗熱盛加梔子連翹黃芩薄荷甘草大便秘小便赤加消黃攻之自愈也

茶調散

清震湯

滾痰丸

人參芎附湯

風熱便利茶調散雷頭荷葉蒼與升痰熱滾痰芎作引虛寒眞痛附參芎

註　雷頭風痛頭面疙瘩耳聞雷聲宜清震湯卽荷葉蒼术升麻也人參芎附湯卽人參川芎川附也

芎犀丸

偏正頭風芎犀丸血虛四物薄羌天氣虛補中加芎細氣逆降氣黑鉛丹

註　血虛面少血色或久脫血也天天麻也降氣蘇子降氣湯也

芎麻湯

半夏白朮天麻湯

欲吐暈重風痰痛芎麻湯下白丸寧虛者六君者

乾蘘天麻麴蘘澤蒼同

註　麻天麻也白丸青州白丸子也虛者謂風痰

兼氣虛者宜半夏白朮天麻湯卽六君子加

黃耆乾薑黃蘘天麻神麴麥蘘澤瀉蒼朮也

荊穗四物湯

頭暈頭痛同一治血虛物穗氣補中氣血兩虛十

全補上盛下虛黑錫靈

註　頭暈之虛實寒熱諸證同乎頭痛一治法也

其有因血虛宜用荊穗四物湯卽當歸川芎

白芍熟地黃荊芥穗也氣虛宜用補中益氣

湯氣血兩虛宜用十全大補湯上盛下虛宜

用黑錫丹

眼目總括

目爲五藏六府精氣白筋黑骨精瞳血爲眥絡肉約束裹撷系屬腦項中經熱勝開因風入合邪上攻赤腫疼輕者外障生雲翳重者積熱頓傷睛

註　經曰五藏六府之精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼氣之精爲白眼筋之精爲黑眼骨之精爲瞳子血之精爲絡眥肉之精爲約束卽眼胞也裹撷筋骨血氣之精而與衇系上屬於腦後出於項中因經熱蒸開勝理

故風邪得以入之風熱之邪合上攻於目赤腫疼痛輕者則爲外障或暴生雲翳重者則積熱之甚陡然痛傷睛也

外障病證

火眼赤腫淚澁痛鞕腫多熱軟多風瞼粟爛弦鷄蜆肉努肉赤衄貫瞳睛血灌瞳人高突起旋螺尖起蠏睛疼拳毛風淚風痒極赤膜下垂黃膜衝

註　風熱上攻目赤腫痛多淚隱澁難開火眼也腫而硬者屬熱盛也宜先下之腫而軟者屬風盛也宜先發散兩瞼上下初生如粟漸大如米或赤或白不甚疼痛謂之瞼生風粟兩瞼粘睛赤爛痒痛經年不愈謂之爛弦風又名赤瞎瞼內如鷄冠蜆肉翻出視物阻礙痛楚羞明謂之鷄冠蜆肉此皆脾經風熱爲病也兩眥筋膜努出謂之努肉攀睛兩眥赤衄漸漸侵睛謂之赤衄貫睛兩眼混赤如朱痛如鍼刺謂之血灌瞳人兩眼痒痛忽然突起謂之突起睛高目中大痛忽生翳膜狀如旋

螺謂之旋螺尖起目中大痛忽然瞳睛努如蟹目謂之蟹睛疼痛又名損翳此皆肝心二經積熱也兩瞼燥急睫毛倒刺謂之倒睫拳毛兩目衝風淚出涓涓冬月尤甚謂之迎風流淚兩目連眥痒極不痛謂之風痒難任目中從下忽生黃膜侵睛疼痛謂之黃膜上衝目中從上忽生赤膜垂下遮睛謂之赤膜下垂又名垂簾翳此皆心肝脾三經風熱爲病也

內障病證

內障頭風五風變珠白黃綠不光明頭風痛引目牽引目疼時或白花紅花起同綠黑花爲黑風烏花不旋漸昏暗黃風雀目久金睛青風微旋不痒痛青花轉轉目昏蒙

註　內障之病每因頭風五風變成初病瞳珠漸漸變色睛裏隱隱似翳或白或黃或綠雖與不患之眼相似然無精彩光明射人病頭風

者發則頭痛引目無淚或左目或右目或先左目或後右目相注不定如坐暗室之中此頭風傷目之漸也緣風者頭旋兩角連鼻相牽引目疼痛時或見起白花紅花此緣風傷目之漸也黑風傷目之漸也烏風者亦同黑風但不旋暈而見烏花漸漸昏暗此烏風傷目之漸也黃風者久病雀目瞳睛金色此黃風傷目之漸也青風者頭微旋不痒不痛但見青花轉轉日漸昏蒙此青風傷目之漸也

菊花通聖散

洗刀散

暴發火眼通聖菊外障等證減加方風盛羌加防風倍熱盛加連倍消黃痛生翳膜多傷目洗刀更入細獨羌元參木賊白蒺藜草決蟬蛻蔓青箱

註　菊花通聖散即防風通聖散加菊花也洗刀散即本方更加細辛羌獨蔓荊青箱子等藥也

內外障治

外障無寒一句了五輪變赤火因生內障有虛心腎弱故如不病損光明火能外鑑水內照養神壯水自收功五風內變諸翳障眼科自有法能攻

註　外障目病子和曰不因火不病所以五輪變赤氣輪白睛火乘肺也肉輪目胞火乘脾也風輪黑睛火乘肝也水輪瞳人火乘腎也血輪兩眥火自甚也故能治火者一句便了也治火之法在藥則鹹寒吐之下之在鍼則神庭上星顱會前項百會刺之翳者可使立退痛者可使立消矣內障目病雖亦無寒然有虛也虛或兼熱亦屬虛熱故不赤腫疼痛如不病眼人但不精彩光明也心虛則神不足神者火也不能內照而失其光明也心虛者則養心神火內暗而外明故不能外鑑而失其光明也腎虛則精不足精者水也水外暗而內明故腎虛者則壯腎水自可收功於不明也其五

風內變諸翳如圓翳氷翳清翳澁翳散翳橫
翳浮翳沉翳偃月棗花黃心黑風等翳俱列
在眼科方書自有治法難以盡述此特其大
槩耳

牙齒口舌總括

牙者骨餘屬乎腎牙齦手足兩陽明齒長豁動爲腎憊牙疼胃火風寒蟲不怕冷熱爲風痛火腫喜冷得寒疼寒不腫蛀喜熱飲蟲牙蝕盡一牙生

註　牙齒者骨之餘屬乎腎也若無故齒長疎豁而動則爲腎衰憊也上牙齦屬足陽明下牙齦屬手陽明牙痛皆牙齦作痛惟寒牙痛則爲客寒犯腦多頭連齒痛爲寒邪也故喜熱飲不腫不蛀也餘者皆爲胃火邪風濕熱也

火牙疼多腫喜飲冷得寒則更疼者讐仇之意也蟲牙則一牙作痛蝕盡一牙又蝕一牙作痛也

骨槽風

牙疳瘡

骨槽齦頰腫硬疼牙齦腐爛出血膿牙疳腫硬潰血臭皆因痘疹瘴癖疾成

註

骨槽風者牙齦連頰硬腫疼痛牙齦腐爛出血膿也牙疳以骨槽潰後腫硬不消然出臭血而不出膿水也且皆痘疹瘴癖疾之後而成也

清胃散

清胃血分火牙痛生地歸連升牡饒氣分宜加荆防細積熱凉膈入升膏

註

胃火牙痛赤腫出血者則爲血分宜用清胃散即生地當歸黃連升麻牡丹皮也饒者倍加升麻丹皮也若腫痛牙齦不出血者則爲氣分宜加荆芥防風細辛以散其熱若腸胃

積熱腫痛爛臭宜用凉膈散加升麻石膏以下其熱可也

溫風散

溫風風牙歸芎細辛菱藁芷露蜂房寒牙痛加羌麻附半服含漱吐涎良

註　不甚腫痛不怕冷熱爲風牙痛宜用溫風散即當歸川芎細辛菱藁本白芷露蜂房也

不腫痛甚喜飲熱湯爲寒牙痛宜本方再加羌活麻黃川附子溫而散之二方俱服一半含漱一半連涎吐之自好也

一笑丸

玉池散

薰藥

諸牙椒巴飯丸咬玉池藁芷骨槐辛歸芎大豆升防草蟲牙蔥韭子烟薰均宜一笑丸即川椒七粒

註　諸牙謂諸牙痛也均宜用玉池散即藁本白芷地骨皮研勻飯爲丸綿裹咬痛爲末巴豆一粒去皮研勻飯爲丸綿裹咬痛處吐涎即止均宜用玉池散即藁本白芷地

骨皮槐花細辛當歸川芎黑豆升麻防風甘草煎湯熱漱冷吐蟲牙亦宜此咬漱更須用韭子或葱子置小爐中燒之擱在大水碗內覆以漏斗口向蟲牙痛處薰之其蟲極小皆落水碗之中累效

蕪荑消疳湯

牙疳雖有專科治然皆未曉累攻神能食便軟猶當下雄黃黃芩黃蘗二連芩

註　牙疳一病殺人最速雖有專科然皆未曉累攻之法累攻者今日攻之明日又攻之以腫硬消黑色變臭氣止爲度若不能食或隔一日或隔二三日攻之攻之後漸能食不必戒口任其所食雖大便溏仍量其輕重攻之自見其神若竟不思食難任攻下則死證也攻藥用蕪荑消疳湯卽雄黃蕪荑生大黃蘆薈川黃連胡黃連黃芩也

口舌證治

脣口屬脾舌屬心口舌瘡糜蘊熱深口淡脾和臭

胃熱五味內溢五熱淫木舌重舌舌腫大脣腫脣
瘡緊繭脣暴發赤痛多實熱淡白時痛每虛因
註　口舌生瘡糜爛名曰口糜乃心脾二經蘊熱
深也平人口淡故曰脾和口出氣臭則爲胃
熱不因食五味而口內溢酸味者乃肝熱淫
脾也苦味者心熱淫脾也甘味者本經熱自
淫也辛味者肺熱淫脾也鹹味者腎熱淫脾
也木舌謂舌腫硬不痛也重舌謂舌下腫似
舌也舌腫謂舌腫大也脣腫謂脣腫痛厚也

脣瘡謂脣腫潰裂成瘡也緊繭脣謂脣緊小
燥裂也以上之證皆屬心脾胃經蘊熱若暴
發赤腫痛甚多爲實熱宜以涼膈散梔子金
花湯急下其熱可即愈也若日久色淡瘡白
時痛不痛每屬虛熱宜清心蓮子飲知蘗四
物湯補中兼清可也或服涼藥久不愈者以
七味地黃湯冷服引火歸原不效甚者加附
子可立愈也

咽喉總括

胸膈風熱咽喉痛邪盛單雙乳蛾生熱極腫閉名喉痹語言難出息不通痰盛涎繞喉間響內外腫閉纏喉風喉痹纏喉皆危證潰後無膿腫閉凶

註　胸膈上有風熱則咽喉腫痛風熱之邪若盛則生單雙乳蛾在會厭兩傍高腫似乳蛾故名也熱極則腫閉湯水不下言語難出呼吸不通名曰喉痹若熱極更兼痰盛則痰涎繞於喉間聲響咽喉內外腫閉湯水不下名曰

纏喉風皆危病也或服藥或吹藥或鍼刺潰破出膿血則愈若潰後不出膿血仍然腫閉湯水不下則死矣

如意勝金錠

雄黃解毒丸

咽痛消毒凉膈散單雙乳蛾刺血痊喉痹纏喉勝金錠急攻痰熱解毒丸昏噤牙關湯不下從鼻吹灌度喉關吐下之後隨證治潰爛珍珠散上安

註　咽喉初起腫痛宜用消毒凉膈散卽防風荊芥牛蒡子梔子連翹薄荷黃芩甘草大黃芒消也單雙乳蛾則刺少商出血在左刺左在右刺右在左右也喉痹纏喉初起病勢未甚或狀如傷寒宜服如意勝金錠卽硫黃川芎臘茶火消薄荷生川烏生地黃各等分爲末葱白自然汁合爲錠重一錢薄荷湯磨化服甚者連進三次若痰涎壅盛喉間內外腫閉湯水難下病勢危急宜用雄黃解毒丸卽雄黃水飛鬱金細末各二錢半巴豆仁肥

白者十四粒微去油以成散爲度合均醋糊爲丸如菜豆茶清下七丸便利吐痰則愈若昏冒牙關噤急湯不能下將藥用醋化開十丸按中風門之法嗑入鼻內吐下則愈其後隨證調治可也若雖愈咽喉潰爛以珍珠散上之卽好

吹喉七寶散

咽喉諸證七寶散消皂礬雄硼二礬細研如塵取一字吹中患處效如神

註咽喉諸證謂咽喉腫痛單雙乳蛾喉痹纏喉也七寶散卽火消牙皂全蠍雄黃硼砂白礬膽礬也

肩背總括

通氣防風湯

通氣太陽肩背痛羌獨蓽草蔓防芎氣滯加木陳香附氣虛升柴參耆同血虛當歸白芍藥血瘀薑黃五靈紅風加靈仙濕二术研送白丸治痰凝

註　李杲羌活勝濕湯又名通氣防風湯治太陽經風濕肩背痛即羌活獨活蓽本甘草蔓荊子防風川芎也兼氣鬱滯痛者則常常作痛加木香陳皮香附也氣虛鬱痛者則時止時

痛加升麻柴胡人參黃耆也血虛鬱痛者則
夜甚時止加當歸白芍藥也血瘀鬱痛者則
夜痛不止加薑黃五靈脂紅花也風氣鬱盛
者痛則項肩强加威靈仙也濕氣鬱甚者痛
則肩背重加蒼术白术也痰風凝鬱者痛則
嘔眩用本湯研送青州白丸子也

心腹諸痛總括

心痛岐骨陷處痛橫滿上胸下胃脘當臍脾腹連
腰腎少腹小大腸脇肝蟲痛時止吐清水症即中
惡寒外干悸分停飲與思慮食即停食冷內寒水
停痰飲熱胃火氣即氣滯血瘀緣隨證分門檢方
治眞心黑厥至節難

註　岐骨陷處痛名心痛橫滿連胸名肺心痛下
連胃脘名胃心痛連臍名脾心痛連腰名腎
心痛連少腹名大腸小腸痛連脇名肝心痛

時止吐清水名蟲心痛中惡腹痛名痃痛寒邪外干名中寒痛悸而痛名悸心痛水停心下屬飲也思慮傷心屬傷也停食痛停水痛停痰痛胃火痛氣滯痛血瘀痛皆不死之證也當分門施治惟眞心痛面色黑四肢逆冷至節死證也

化滯丸

清中湯

攻濕積熱求化滯攻寒積水備急丹火痛二陳梔連蒌蟲用烏梅飲控涎註化滯丸成方也清中湯卽陳皮半夏茯苓甘草薑炒山梔黃連草豆蒌也

木香流氣飲

七情鬱結流氣飲思慮悸痛歸脾湯內寒理中外五積痃痛備急血抵當

小建中湯

木來乘土腹急痛緩肝和脾小建中血虛寒痛羊肉治氣虛理中加陳青

註　羊肉謂羊肉湯也

烏頭梔子湯

刲諸鬱痛烏梔子刲而復痛入元明已經吐下或虛久急痛欲死求鴉鳴爲主

註　諸鬱謂諸寒火鬱而痛也寒多炮川烏爲主熱多薑炒梔子爲主元明元明粉也鴉鳴謂以眞鴉片末或加麝香少許飯丸如桐子大每服三五丸引在本草名一粒金丹

胸脇總括

栝蔞薤白白酒湯

栝蔞薤白半夏湯

栝蔞薤白白酒湯胸痹胸背痛難當喘息短氣時咳唾難卧仍加半夏良

註　栝蔞薤白白酒湯卽栝蔞實小根菜水白酒煎也

顚倒木金散

胸痛氣血熱飲痰顚倒木金血氣安飲熱大陷小

陷治頑痰須用控涎丹

註　胸痛之證須分屬氣屬血屬熱飲屬老痰顛倒木金散卽木香金也屬氣鬱痛者以倍木香君之屬血鬱痛者以倍金君之爲末每服二錢老酒調下虛者加人參更效胸中有痰飲熱作痛者輕者小陷胸湯重者大陷胸湯丸治之若吐唾稠黏痰盛則用控涎丹

枳芎散

枳橘散

柴胡疎肝湯

加味逍遥散

左金丸

當歸龍薈丸

脇痛左屬瘀留血輕金芎枳草重攻右屬痰氣重逐飲片薑橘枳草醫輕肝實太息難轉側肝虛作痛引肩胸實用疎肝柴芍草香附枳陳與川芎肝虛逍遥加芎細陳皮生薑緩其中肝虛左金實龍薈一條扛起積食攻

註左屬瘀血輕謂瘀血輕者宜用枳芎散重攻謂瘀血重者宜以攻血之劑也枳芎散卽枳殼撫芎鬱金甘草也右屬痰氣重逐飲謂以控涎十棗逐痛之重者也枳橘散卽枳殼橘皮片子薑黃甘草醫痛之輕者也柴胡疎肝散卽柴胡白芍甘草香附枳殼陳皮川芎也逍遥散卽白术茯苓當歸白芍柴胡炙草薄荷少許加川芎細辛陳皮生薑也左金卽左金丸吳茱萸黃連也肝實火旺者當歸龍薈丸積食者以化滯丸積飲者以控涎丹

腰痛總括

腰痛腎虛風寒濕痰飲氣滯與血瘀濕熱閃挫凡九種面忽紅黑定難醫

註　腰痛之證其因不同有腎虛有風有寒有濕有痰飲有氣滯有血瘀有濕熱有閃挫凡患腰痛極甚而面色忽紅忽黑是爲心腎交爭難治之證也

安腎丸

腰痛悠悠虛不舉寄生青娥安腎丸胡盧骨脂川

棟續桃杏茴芩山藥鹽

註　寄生謂獨活寄生湯青娥丸即補骨脂杜仲核桃仁也安腎丸即胡盧巴補骨脂川楝肉川續斷桃仁杏仁小茴香茯苓山藥也鹽鹽湯爲引也

芜活勝濕湯

通經丸

腰痛屬寒得熱減五積吳萸桃杜安寒濕重著勝濕附內實通經硫麵牽風痛無常掣引足經虛當用寄生瘁經實非汗不能解續命湯加牛杜穿

註　五積散加吳茱萸桃仁杜仲芜活勝濕湯即防風通氣湯加附子也通經丸即硫黃黑牽牛頭末麥麪合丸煮浮起服方出本草小續命湯加牛膝杜仲炒穿山甲也

通氣散

活絡丹

氣滯閃挫通氣散木陳穿索草茴牽血瘀不移如錐刺日輕夜重活絡丹

註　通氣散卽木香陳皮穿山甲元胡索甘草小茴香白牽牛也活絡丹卽川烏草烏南星地龍乳香沒藥也加五靈脂麝香丸效

蒼蘗散

煨腎散

濕熱熱注足蒼蘗二妙牛杜已瓜苓腰如物覆濕痰畜煨腎椒鹽遂有功

註　蒼蘗散卽蒼术黃蘗牛膝杜仲防已木瓜川芎也煨腎散卽猪腰子剖開入川椒食鹽甘遂末濕紙裹煨熟酒食之

小便閉癃遺尿不禁總括

膀胱熱結爲癃閉寒虛遺尿與不禁閉卽尿閉無
滴出少腹脹滿痛難伸癃卽淋瀝點滴出莖中澁
痛數而勤不知爲遺知而不禁石血膏勞氣淋分
註膀胱熱結輕者爲癃重者爲閉膀胱寒虛輕
者爲遺尿重者爲不禁閉者卽小便閉無點
滴下出故少腹滿脹痛也癃者卽淋瀝點滴
而出一日數十次或勤出無度故莖中澁痛
也不知而尿出謂之遺尿知而不能固謂之

小便不禁

小便閉遺尿死證

嘔噦尿閉爲關格若出頭汗命將傾傷寒狂冒遺尿死尿閉細濇不能生

註 上爲嘔噦不入下爲小便不通則陰陽之氣關格若出頭汗則爲陽絕故命傾也傷寒狂冒屬陽邪盛遺尿屬陰不守若尿閉鮎細濇知陰亦竭故俱死也

治癃閉熨吐汗三法

陰陽熨臍蔥白麝冷熱互熨尿自行宣上木通蔥探吐達外蔥湯薰汗通

註 用蔥白一觔細剉入麝香五分拌勻分二包置臍上先以炭火熨斗熨之互相遞熨以尿通爲度包以冷水熨斗熨之互相遞熨以尿通爲度服諸藥不效或服藥卽時吐出或服攻下藥不利宜用宣上法以木通老蔥煎湯服頃時探吐再服再吐以尿通爲度服諸藥不效或身無汗宜用達外法以蔥湯入木桶內令病

人坐於杌上沒膞爲度匝腰繫裙以覆之少時汗出其尿自出欲尿時不可出桶卽於桶內溺之恐出桶氣收而尿又回也

小便不通

通關丸

熱實不化大便鞕癃閉八正木香痊陽虛不化多厥冷惡寒金匱腎氣丸陰虛不化發午熱不渴知藥桂通關氣虛不急滿倦怠懶言春澤煎

註　小便不通熱實者宜用八正散加木香陽虛者宜用金匱腎氣丸陰虛者宜用通關丸卽知母黃蘗肉桂少許也氣虛宜用春澤湯卽五苓散加人參也

八正散

石淋猶如麟結鎖是因濕熱煉膀胱一切熱淋八正扁通滑梔瞿草車黃

註　八正散卽扁蓄木通瞿麥梔子滑石甘草車前子大黃也

小薊飲子

血淋心遺熱小腸實熱仍宜下之良清熱小薊梔
滑淡歸藕通蒲草地黃

註　淡淡竹葉也藕節也蒲蒲黃也

海金沙散

鹿角霜丸

膏淋尿濁或如溺精溺俱出海草滑熱盛八正加
蓍术虛用秋苓鹿角佳

註　海海金沙也秋石也苓茯苓也鹿角鹿角
霜糯米糊爲丸也

加味八正散

氣淋肺熱難清肅八正石葦木葵沉肉傷氣虛不
能化五苓益氣自通神

註　八正散加石葦木香冬葵子沉香五苓合補
中益氣湯

補中益氣湯合五苓散

清心蓮子飲

勞淋內傷補中苓腎氣知蘗過淫成勞心清心蓮
地骨耆苓車麥草參苓

註　內傷勞脾用補中益氣湯合五苓散勞腎陽虛用金匱腎氣湯陰虛用知蘗地黃湯思慮勞心用清心蓮子飲是方卽蓮子地骨皮黃耆黃芩車前子麥門冬生甘草人參白茯苓也

琥珀散

痰淋七氣白丸子熱燥清熱用滋陰諸淋平劑琥珀木葵蓄通滑歸鬱金

註　七氣湯見諸氣門青州白丸子見類中風門滋陰通關丸也木木香也葵冬葵子也

桂附地黃丸

補中益氣湯加白果方

坎離旣濟湯加山萸肉五味子方

遺尿不禁淋尿白桂附補中白果煎補之不應或尿赤生地知蘗萸味攢

註　遺尿不禁及諸淋尿色白者皆屬寒虛寒者用桂附地黃湯加白果虛者用補中益氣湯加白果凡遺尿不禁諸淋尿色赤者或補之

不應者亦有熱虛用坎離既濟湯卽生地知母黃蘗加山萸肉五味子也

大便燥結總括

熱燥陽結能食數寒燥陰結不食遲實燥食積熱結胃食少先鞕後溏脾氣燥阻隔不降下血燥乾枯老病虛風燥久患風家候直腸結鞕導之宜

註　熱燥卽陽結也能食而脈浮數有力與三陽熱證同見者也寒燥卽陰結也不能食而脈沉遲有力與三陰寒證同見者也實燥卽胃實鞕燥也與腹滿痛同見者也虛燥卽脾虛少氣腹縮同見者也氣

燥卽氣道阻隔之燥也與噎膈反胃同見者也血燥卽血液乾枯之燥也與久病老虛同見者也風燥卽久患風病之燥也從風家治直腸結卽燥屎巨鞭結在肛門難出之燥也從導法治之

結燥治法

溫脾湯

握藥法

熱實脾約三承氣寒實備急共溫脾大黃薑附桂草朴寒虛硫半握藥不醫虛燥益氣消黃入血燥潤腸與更衣氣燥四磨參利膈風燥搜風順氣宜

註　溫脾湯卽大黃乾薑附子肉桂甘草厚朴也硫半丸卽硫黃半夏也握藥卽巴豆仁乾薑韭子艮薑硫黃甘遂白檳榔各五分爲末合均飲和分二粒先以花椒湯洗手麻油塗手心握藥移時便瀉欲止則以冷水洗手益氣卽補中益氣湯加大黃朴消潤腸丸卽當歸生地枳殼桃仁火麻仁各等分爲末蜜丸米

飲早服更衣丸即生蘆薈硃砂末等分飯丸
酒服四磨湯即人參烏藥沉香檳榔也參利
膈即人參利膈丸也搜風順氣即搜風順氣
丸也

御纂醫宗金鑑婦科心法要訣

卷四十四

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

4/5

ChL 7918.7638

調經
經閉

卷四十四

45

御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣目錄

調經門

婦科總括

天癸月經之原

婦人不孕之故

月經之常

月經異常

外因經病

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

內因經病
不內外因經病
血色不正病因
氣穢清濁病因
慾期前後多少病因
經行發熱時熱
經行寒熱身痛
經行腹痛
經行瀉吐
錯經妄行成吐衄崩
經水過多兼時下白帶
調經證治
四君子湯
異功散
六君子湯
香砂六君子湯
七味白术散
參苓白术散

歸脾湯
逍遙散
八珍湯
十全大補湯
雙和飲
人參養榮湯
理中湯
四物湯
桂枝四物湯
麻黃四物湯
柴胡四物湯
玉燭散
先期證治
芩連四物湯
地骨皮飲
膠艾四物湯
芩术四物湯
桃紅四物湯

當歸補血湯
聖愈湯
薑苓四物湯
佛手散
過期證治
過期飲
雙和飲
聖愈湯
人參養榮湯

經行發熱時熱證治
加味地骨皮飲
六神湯
逍遙散
經行寒熱身痛證治
羌桂四物湯
逍遙散
黃耆建中湯
經行腹痛證治

當歸建中湯
加味烏藥湯
琥珀散
大溫經湯
吳茱萸湯
經行吐瀉證治
參苓白术散
理中湯
七味白术散
香砂六君子湯
錯經妄行吐衄崩證治
三黃四物湯
犀角地黃湯
經閉門
血滯經閉
血虧經閉
血枯經閉
經閉久嗽成勞

婦人經斷復來
室女經來復止
師尼室寡經閉
血滯經閉證治
三和湯
吳茱萸湯
琥珀散
四物湯
血枯血虧經閉證治

六味地黃湯
玉燭散
養榮湯
十全大補湯
經閉久嗽成勞證治
劫勞散
婦人經斷復來證治
芩心丸
益陰煎

十全大補湯

八珍湯

逍遥散

歸脾湯

室女師尼寡婦經閉證治

大黃蠐螬丸

澤蘭葉湯

栢子仁丸

逍遥散

婦病難治

診看婦人須先問經期妊娠

御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣

調經門

婦科總括

男婦兩科同一治所異調經崩帶癥瘕嗣育胎前並產後前陰乳疾不相同

男婦兩科同其治也其異於男子者惟調經經閉帶濁崩漏癥瘕生育子嗣胎前產後諸病及乳疾前陰諸證不相

註　婦人諸病本與男子無異故同

同耳故立婦人一科以分門而詳治焉業是科者必先讀方脈心法諸書然後讀此自有豁然貫通之妙

天癸月經之原

先天天癸始父母後天精血水穀生女子二七天癸至任通衝盛月事行

註　先天天癸謂腎間之動氣乃稟自父母資其始也後天精血水穀之所化得之形成之後資其生也經曰女子二七而腎氣盛謂腎間動氣盛也二七而天癸至謂先天天癸水中之動氣至於女子胞中也衝爲血海任主胞胎衝任皆起於胞中所以任脈通太衝脈盛月事以時下故能有子也

婦人不孕之故

不子之故傷任衝不調帶下經漏崩或因積血胞寒熱痰飲脂膜病子宮

註　女子不孕之故由傷其任衝也經曰女子二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下

故能有子若爲三因之邪傷其衝任之脈則有月經不調赤白帶下經漏經崩等病生焉或因宿血積於胞中新血不能成孕或因胞寒胞熱不能攝精成孕或因體盛痰多胎膜壅塞胞中而不孕皆當細審其因按證調治自能有子也

月經之常

月經三旬時一下兩月並月三居經一年一至爲避年一生不至孕暗經

註

女子陰類也以血爲主其血上應太陰下應海潮月有盈虧潮有朝夕月經三旬一下與之相符故又謂之月水月信也女子月經一月一行者其常也或先或後乃其病也然亦有兩月一行謂之並月者有三月一行謂之居經者有一年一行謂之避年者有一生不行而依然能孕育謂之暗經者此所禀之不同而亦非病不須治也

月經異常

經期吐血或衄血上溢妄行曰逆經受孕行經曰
垢胎受孕下血漏胎名

註　婦女月經一月一下此其常也若經行而吐
血衄血上溢妄行者是謂逆經有受孕之後
月月行經而產子者是謂垢胎有受孕數月
其血忽下而胎不隕者是謂漏胎此皆月經
之異乎常者也

外因經病

天地溫和經水安寧凝熱沸風盪然邪入胞中任
衝損婦人經病本同叅

註　經曰天地溫和則經水安靜天寒地凍則經
水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則
經水波湧而隴起六淫之邪入於胞中則損
傷衝任故婦人經病本此同叅也如寒則血
凝熱則血沸風則血盪然波湧而大下亦猶
經水之被寒熱風而不得安瀾也

內因經病

婦人從人不專主病多憂忿鬱傷情血之行止與

順逆皆由一氣率而行

註　婦人從人凡事不得專主憂思忿怒鬱氣所傷故經病因於七情者居多蓋以血之行止順逆皆由一氣率之而行也

不內外因經病

血者水穀之精氣若傷脾胃何以生不調液竭血枯病合之非道損傷成

註　血者水穀之精氣也在男子則化爲精在婦人則化爲血上爲乳汁下爲月水若內傷脾胃健運失職飲食減少血無以生則經必不調亦有女子天癸既至踰期不得與男子合未期思與男子合與夫經正行時而合此皆合之非道亦致不調或過淫合多則液竭產多乳衆則血枯亦皆能損傷陰血致成經病也

血色不正病因

血從陽化色正紅色變紫黑熱之徵黃泔淡紅濕

註　血屬陰從陽化故其色以正紅爲正雖有經
病亦易爲治也若色變深紅紫黑乃熱之徵
也或黃如米泔乃濕化也淺淡紅白乃虛象
也更當審其有瘀有塊色黯色明以治之若
黯而紫黑兼見冷證多屬寒凝若明而紫黑
兼見熱證多屬熱結也

氣穢清濁病因

熱化稠黏臭必穢寒化清澈臭則腥內潰五
臟氣時下而多命必傾

註　凡血爲熱所化則必稠黏臭穢爲寒所化則
必清澈臭腥若是內潰則所下之物雜見五
色似乎膿血若更有臟腐敗氣且時下不止
而多者是危證也其命必傾矣

慾期前後多少

經來前後爲慾期前熱後滯有虛實淡少爲虛不
脹痛紫多脹痛屬有餘之慾期皆屬經病經來往
來者屬血熱若下血多色深

註　經來或前或後謂之慾期皆屬血熱若下血多色深
前赶日不足三旬者屬經病經來往

紅而濁則爲有餘之熱也經來往後退日過三旬
清則爲不足之熱也經來往後退日過三旬
後者屬血滯若色淺淡血少不脹痛者則屬
氣虛血少澁滯不足之病若色紫血多腹脹
痛者則屬氣實血多瘀滯有餘之病也

經行發熱時熱

經行發熱時潮熱經前血熱經後虛發熱無時察
客熱潮熱午後審陰虛

註　經行發熱時潮熱之病若在經前則爲血
熱之熱經後則爲血虛之熱發熱時熱多是
外感須察客邪之熱午後潮熱多屬裏熱當
審陰虛之熱也

經行寒熱身痛

經來寒熱身體痛當分榮衛與虛實有汗不脹衛
不足無汗而脹榮有餘

註　經來之時惡寒發熱身體疼痛者當分榮衛
虛實若發熱惡寒身痛不脹而有汗者屬衛
虛榮不足若發熱惡寒身脹痛而無汗者屬

榮實衛有餘也

經行腹痛

腹痛經後氣血弱痛在經前氣血凝氣滯腹脹血滯痛更審虛實寒熱情

註　凡經來腹痛在經前痛則爲氣血凝滯若因氣滯血者則多脹滿痛則爲氣血凝滯者則多疼痛更當審其凝滯作脹因血滯氣者則多疼痛更當審其凝滯作脹痛之故或因虛因實因寒因熱而分治之也

經行瀉吐

經行泄瀉是脾虛鴨溏冷痛乃寒濕胃弱飲傷多嘔飲食傷必痛吐其食也若鴨溏冷痛是寒濕也

註　經行泄瀉乃脾虛也若鴨溏冷痛是寒濕也經行嘔吐是胃弱也若嘔出涎飲則是傷飲若吐出食物則是傷食然傷食者多痛而吐食傷飲者不痛而嘔飲也

錯經妄行成吐衄崩

逆行吐血錯行崩熱傷陰陽絡妄行血多熱去當用補血少雖虛須主清

註　婦女經血逆行上爲吐爲崩血衄血及錯行下爲崩血者皆因熱盛也傷陰絡則下行爲崩傷陽絡則上行爲吐衄也若去血過多則熱隨血去當以補爲主如血少熱尙未減雖虛仍當以淸爲主也

經水過多兼時下白帶

註　經水過多淸稀淺紅熱有餘兼帶時下濕熱穢形淸腥穢冷濕虛多淸淺淡虛不攝稠黏深紅熱有餘兼帶時下濕穢乃氣虛不能攝血也若

稠黏深紅則爲熱盛有餘或經之前後兼赤白帶而時下臭穢乃濕熱腐化也若形淸腥穢乃濕痰寒虛所化也

調經證治

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

七味白朮散

參苓白术散

歸脾湯

逍遙散

八珍湯

十全大補湯

雙和飲

養榮湯

理中湯

補養元氣四君子參苓术草棗生薑異功加陳兼理氣虛痰橘半六君湯嘔吐香砂六君子渴瀉七味藿葛香脾瀉參苓白术散薏桔山蓮砂扁方思慮傷脾損心血歸脾者棗遠香減參加柴歸芍薄逍遙調肝理脾方合物八珍兼補血者桂十全大補湯去參苓术雙和飲去芎加陳養榮湯脾胃虛寒吐且瀉理中減苓加乾薑

註四君子湯補養元氣虛弱通用之方即八參茯苓白术炙草引用棗薑也異功散是於補氣中兼理其氣即四君子湯加陳皮也六君

子湯治脾虛痰飲卽四君子湯加橘紅半夏
也香砂六君子湯治胃虛嘔吐卽六君子湯
加藿香砂仁也七味白朮散治脾虛渴瀉卽
四君子湯加藿香葛根木香也參苓白朮散
治脾胃虛瀉卽四君子湯加薏苡桔梗山藥
蓮肉砂仁扁豆也歸脾湯治思慮損傷心脾
氣血卽四君子加當歸黃耆棗仁遠志木香
也逍遙散調肝理脾卽四君子湯減人參加
柴胡當歸白芍薄荷也八珍湯於補氣中兼
補其血卽四君子湯合四物湯也十全大補
湯大補氣血卽八珍湯加黃耆肉桂也雙和
飲平補氣血卽十全大補湯減人參茯苓白
朮也人參養榮湯於補氣中專養榮血卽十
全大補湯減川芎加陳皮也理中湯治脾胃
虛寒吐瀉卽四君子湯去茯苓加乾薑也
四物湯
桂枝四物湯
麻黃四物湯

柴胡四物湯

玉燭散

婦人血病主四物歸芎白芍熟地黃血瘀改以赤芍藥血熱易用生地黃表熱有汗合桂草表熱無汗合麻黃少陽寒熱小柴並陽明熱合調胃湯

註

四物湯乃婦人經產一切血病通用之方故主之也其方卽當歸川芎白芍藥熟地黃凡血瘀俱減白芍藥改用赤芍藥破之血熱俱去熟地黃易用生地黃涼之風感太陽衛分發熱有汗本方合桂枝湯以桂枝甘草解之名桂枝四物湯寒傷太陽榮分發熱無汗本方合麻黃湯以麻黃杏仁桂枝甘草發之名麻黃四物湯邪傳少陽半表半裏往來寒熱本方合小柴胡湯以柴胡黃芩半夏人參甘草和之名柴胡四物湯邪傳陽明裏熱便結本方合調胃承氣湯以大黃朴消甘草下之名玉燭散

先期證治

芩連四物湯

地骨皮飲

膠艾四物湯

芩术四物湯

桃紅四物湯

當歸補血湯

聖愈湯

薑芩四物湯

佛手散

芎歸湯

先期實熱物芩連虛熱地骨皮飲丹血多膠艾熱芩术逐瘀桃紅紫塊黏血少淺淡虛不攝當歸補血歸者先虛甚參者聖愈補熱滯薑芩丹附延逐瘀芎歸佛手散又名芎歸效若仙

註　經水先期而至屬熱而實者用四物湯加黃芩連四物湯屬熱而虛者用芩黃連清之名芩連四物湯屬熱而虛者用四物湯加地骨皮丹皮涼之名地骨皮飲血多無熱者用四物湯加阿膠艾葉止之名膠

艾四物湯血多因熱者用四物湯加黃芩白
朮和之名芩朮四物湯若血多有塊色紫稠
黏乃內有瘀血用四物湯加桃仁紅花破之
名桃紅四物湯先期血少淺淡乃氣虛不能
攝血也用當歸補血湯補之其方即當歸黃
耆也若虛甚者則當用四物湯加人參黃耆
補之名聖愈湯若血濇少其色赤者乃熱盛
滯血用四物湯加薑黃黃芩丹皮香附延胡
通之名薑芩四物湯逐瘀須用佛手散即四
物湯去生地白芍又名芎歸湯逐瘀血其效
如神也

過期證治

過期飲

過期血滯物桃紅附桂草木香通血虛期過無
脹熱雙和聖愈及養榮

註　經水過期不至因血氣凝滯脹痛者用過期
飲其方即四物湯加桃仁紅花香附桂朮肉
桂甘草木香木通也若過期不至並不脹痛

者乃無血可行是血虛也宜用雙和飲聖愈湯人參養榮湯

經行發熱證治

加味地骨皮飲

六神湯

經來身熱有表發內熱地骨加胡連經後六神加者骨逍遙理脾而清肝

註

經來發熱有表邪證者用前桂枝四物等湯發之若內熱者用地骨皮飲加胡連清之名加味地骨皮飲經後發熱乃血虛內熱用四物湯加黃耆地骨皮補而涼之名六神湯若脾虛肝熱用逍遙散理脾而清肝

逍遙散　方見前

經行身痛證治

羌桂四物湯

黃耆建中湯

經來身痛有表發無表四物羌桂枝經後血多黃耆建者桂芍草棗薑飴

註　經來時身體痛疼若有表證者酌用前麻黃四物桂枝四物等湯以發之若無表證者乃血鰋壅阻也宜用四物湯加羌活桂枝以疏通經絡名羌桂四物湯若經行後或血去過多者乃血虛不榮也宜用黃耆建中湯以補之其方即小建中湯桂枝白芍甘草薑棗飴糖加黃耆也

經行腹痛證治

當歸建中湯

加味烏藥散

琥珀散

經後腹痛當歸建經前脹痛氣爲殃加味烏藥湯烏縮延草木香香附榔血凝碍氣疼過脹本事琥珀散最良稜莪丹桂延烏藥寄奴當歸芍地黃

註　經後腹痛或去血過多乃血虛也宜用當歸建中湯補之其方即小建中湯加當歸也經前腹脹痛乃血氣凝滯若脹過於痛是氣滯其血也宜用加味烏藥湯開之其方即烏藥

縮砂延胡索甘草木香香附檳榔也若痛過於脹是血凝碍氣也宜用琥珀散破之其方即三稜莪朮丹皮官桂延胡索烏藥劉寄奴當歸赤芍生地黃也

大溫經湯

吳茱萸湯

胞虛寒病大溫經來多期過小腹疼歸芎芍草人參桂吳丹膠半麥門冬不虛胞受風寒病吳茱萸湯更加風藁細乾薑茯苓木減去阿膠參芍芎

註凡胞中虛寒一切經病皆因經水來多胞虛受寒所致或因受寒過期不行小腹冷痛者宜用大溫經湯即當歸川芎白芍炙草人參肉桂吳茱萸丹皮阿膠半夏麥門冬也若胞中不虛惟受風寒爲病宜吳茱萸湯依大溫經湯方更加防風藁本細辛乾薑茯苓木香減去阿膠人參白芍藥川芎即是吳茱萸湯也

經行吐瀉證治

經瀉參苓白朮散鴨溏清痛理中湯肌熱渴瀉七味散嘔飲香砂六君湯

註　經來泄瀉乃脾虛也宜用參苓白朮散鴨溏清澈冷痛乃虛寒也宜用理中湯肌熱渴瀉乃虛熱也宜用七味白朮散嘔飲痰水乃虛濕也宜用香砂六君子湯

經行吐衄證治

三黃四物湯

犀角地黃湯

經前吐衄為熱壅三黃四物大苓連經後吐衄仍有熱犀角地黃芍牡丹

註　經前吐血衄血乃內熱壅迫其血宜用三黃四物湯瀉之其方即四物湯加大黃黃芩黃連經後吐血衄血雖仍有熱亦不宜瀉但當用犀角地黃湯清之其方即犀角生地黃赤芍藥牡丹皮也

調經門彙方

四君子湯

人參　白术土炒
茯苓各二錢　甘草一錢
右剉薑棗水煎服
異功散
人參　白术土炒
茯苓各二錢　甘草五分炙
陳皮二錢
右剉加生薑水煎服
六君子湯

人參　白术土炒
茯苓　半夏
陳皮各一錢　甘草五分炙
右剉薑棗水煎服
香砂六君子湯即本方加藿香葉砂仁
七味白术散
人參　白术土炒
茯苓各一錢五分　甘草五分炙
藿香　木香

乾葛各一錢

右剉水煎服

參苓白术散

人參　白术土炒
茯苓　山藥炒
甘草　蓮肉去心
白扁豆各一錢五分　薏苡仁炒
砂仁　桔梗各八分

右爲細末每服二錢薑棗湯調服

歸脾湯

人參　黃耆炙
白术土炒　茯神
當歸　龍眼肉
遠志去心　棗仁各一錢炒
木香　甘草各五分炙

右剉薑棗水煎服

逍遙散

當歸酒洗　白芍酒炒

白茯苓　柴胡　各一錢
甘草　五分　炙　白术　一錢　土炒
右剉散水一盞半加薄荷煎服

八珍湯
人參　白术　土炒
茯苓　甘草
熟地　當歸
川芎　白芍　各等分
右加薑棗煎服

十全大補湯
人參　白术
茯苓　黃耆
當歸　熟地
川芎　各一錢
白芍　甘草　各五分　炙
肉桂
右薑棗水煎服

雙和飲　即十全大補湯去人參白术茯苓
人參養榮湯　即十全大補湯去川芎加陳皮

理中湯

白朮　人參

乾薑　甘草　各一錢炙

右剉水煎服

四物湯

熟地二錢

白芍二錢炒　川芎一錢

當歸二錢

右爲粗末水煎服

芩連四物湯　卽本方加黃芩黃連

芩朮四物湯　卽本方加黃芩白朮

桃紅四物湯　卽本方加桃仁紅花

羌桂四物湯　卽本方加羌活桂枝

柴胡四物湯

川芎　當歸

白芍　熟地　各一錢五分

柴胡　人參

黃芩　各二錢　甘草五分

半夏二錢製

右爲末每五錢水煎服

玉燭散

當歸　川芎
白芍　各二錢
甘草　各一錢
熟地　白芷
大黃　芒消

右剉每服八錢水煎食前服

地骨皮飲

當歸　生地　各二錢
白芍一錢　川芎八分
牡丹皮　地骨皮　各二錢

水煎服

膠艾四物湯

熟地　當歸
川芎　白芍
阿膠蛤粉炒成珠末　艾葉　各一錢
甘草五分炙

右剉水酒各半煎空心服

桂枝四物湯

當歸
川芎 各二錢
桂枝 三錢
薑棗煎服

麻黃四物湯

當歸
白芍
麻黃
熟地
白芍 三錢 炒
甘草 一錢 炒

桂枝四物湯

當歸
川芎 各二錢
桂枝 各一錢

杏仁二十粒
甘草一錢
薑棗煎服

當歸補血湯

當歸三錢
黃耆一兩 蜜炙

右水煎服

聖愈湯

熟地 酒拌蒸半日
白芍 酒拌
川芎
人參 各七錢五分
當歸 酒洗
黃耆 各五錢 炙

右水煎服

薑芩四物湯

當歸　熟地

赤芍　川芎

薑黃　黃芩

丹皮　延胡索

香附各等分製

水煎服

佛手散又名芎歸湯

川芎二兩　當歸三兩

右爲細末每服二錢水一盞酒二分煎七分

溫服

過期飲

熟地　白芍炒

當歸　香附各二錢

川芎一錢　紅花七分

桃仁泥六分　蓬莪朮

木通各五分　甘草炙

肉桂各四分　木香八分

右水二鍾煎一鍾食前温服

加味地骨皮飲

生地　當歸

白芍各二錢　川芎八分

牡丹皮　地骨皮各三錢

胡連一錢

右水煎服

六神湯

熟地　當歸

白芍　川芎

黃耆　地骨皮各等分

右咬咀水煎

小建中湯

白芍三錢炒　桂枝一錢

甘草八分炙

右薑棗水煎服

黃耆建中湯

黃耆　炙
白芍　二兩　炒
肉桂　各一兩
甘草　七錢　炙

右每服五錢薑棗水煎服日二三服

如虛甚者加附子

當歸建中湯

當歸　一兩
白芍　二兩　炒
肉桂　一兩
甘草　七錢　炙

右咬咀每服三錢加生薑棗水煎空心服

加味烏藥湯

烏藥
縮砂仁
木香
延胡索
香附　製
甘草
檳榔　各等分

右細剉每服七錢生薑三片水煎溫服

琥珀散

三稜　莪术
赤芍　當歸
劉寄奴　丹皮

熟地
烏藥
官桂

右前五味用烏豆一升生薑半觔切片米醋四升同煮豆爛爲度焙乾入後五味同爲末每服二錢溫酒調下空心午前服

延胡索各一兩

大溫經湯

吳茱萸湯泡
白芍
肉桂
丹皮
人參
當歸
川芎
阿膠碎炒
甘草各一錢炙
半夏二錢半製
麥冬二錢去心

右加生薑水煎食前服

吳茱萸湯

當歸
吳茱萸
丹皮
半夏製
麥冬各一錢
防風
細辛

藁本　乾薑
茯苓　木香
炙甘草　各一錢

水煎服

三黃四物湯

當歸　白芍
川芎　生地
黃連　黃芩
大黃

右剉水煎服

大黃量虛實用

犀角地黃湯

芍藥七錢半　生地半觔
犀角一兩　牡丹皮一兩去心淨酒浸
如無以川升麻代

右㕮咀每服五錢水煎服

有熱如狂者加黃芩二兩

經閉門

血滯經閉

石瘕寒氣客胞中狀如懷子不經行胞閉熱氣迫肺欬傷心氣血不流通

註

經曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉寒氣不得通惡血當瀉不瀉衄以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下此論經閉因寒氣客於下故病血瘕而不病肺勞也經曰月事不來者胞衄閉

也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上迫於肺心氣不得下通故月事不來也此論胞脈閉因熱氣攻於上故迫肺作欬病肺勞而不病血痕也

血癘經閉

二陽之病發心脾不月有不得隱曲血枯其傳爲風消息賁者死不能醫

註　二陽者陽明胃也女子有隱曲不得之情則心脾氣鬱不舒以致二陽胃病飲食日少血無以生故不月也血虛則生內熱愈熱愈虛肌肉乾瘦如風之消物故名曰風消也火盛無制心乘肺金金氣不行不能運布水精留於胸中津液悉化爲痰咳嗽不已日久成勞傳爲息賁則不能醫矣息賁者喘也

血枯經閉

脫血過淫產乳衆血枯漸少不行經骨蒸面白兩顴赤懶食消瘦咳嗽頻

註　失血過多面與爪甲之色俱淺淡黃白乃脫

血病也或因過淫精竭或因產多乳衆傷血

血枯經來漸少二三月後經閉不行以致證

見骨蒸肌熱面色枯白兩顴紅赤懶於飲食

皮乾消瘦咳嗽頻頻不已多成虛損之證

久嗽成勞

男勞已詳心法內女損陰血傳風消或因病後素

禀弱經閉咳嗽血風勞

註　男子虛勞治法已詳於雜病心法要訣虛勞

門內女子之勞多因損其陰血或因病後傷

其陰血或因素禀陰血不足然必見陰虧骨

蒸血枯經閉咳嗽日久不已之證始名曰勞

若不咳嗽則謂之虛不可謂之勞也風消者

古勞證名也女子曰血風勞者蓋以內經曰

勞風發於肺下是謂虛病之人感受風邪則

肺受之故始病必先咳嗽也若不先解風邪

而即補者未有不因久嗽不已而成勞者也

故曰血風勞也

婦人經斷復來

婦人七七天癸竭不斷無疾血有餘已斷復來審其故邪病相干隨證醫

註　婦人七七四十九歲時天癸竭地道不通當月水不下若月水不斷不見他證乃血有餘不可用藥止之若已斷或一年或三五年復來者當審其有故無故是何邪所干隨證醫治也

室女經來復止

室女經來復不來若無所苦不爲災必是避年未充足若見虛形命可哀

註　室女年幼氣血尚未充足有經來數月復又不來者若無他證所苦則不得謂之災疾必是避年或氣血未充若兼見虛損形狀則爲室女血枯經閉童勞多屬難治故曰命可哀也

師尼室寡經閉

師尼室寡異乎治不與尋常婦女同診其鮀弦出寸口知其心志不遂情調經若不先識此錯雜病

狀豈能明和肝理脾開鬱氣清心隨證可收功

註　師道姑也尼女僧也室未適夫之女也寡少而亡夫之婦也異乎治者謂不與尋常婦女同其治也如診其經與鮓弦出寸口則知其心志不遂情志之爲病也凡欲調婦女一切經病若不先識此因則不能明情志錯雜難名之病狀也治此證者當以和肝理脾開鬱清心隨證施治自可收功也

血滯經閉證治

三和湯

石瘕帶表吳茱萸攻理琥珀散最宜胞閉三和湯

四物消黃連薄草芩梔

註　寒氣客於胞中血留不行而成石瘕兼表證多者宜吳茱萸湯溫散之裏證多者宜琥珀散最宜胞閉三和湯

散攻之胞鮓閉上迫於肺心氣不得下通故

月事不來宜三和湯清之即四物湯合涼膈

散乃樸消大黃連翹薄荷甘草梔子黃芩也

如大便不實者去消黃

吳茱萸湯

琥珀散

四物湯 方俱見前調經門

血枯血虧經閉證治

六味地黃湯

胃熱爍血玉燭散失血血枯養榮湯地黃湯治房勞損萸藥苓丹澤地亘乳衆血枯經若閉須用十全大補方

註 經曰二陽之病發心脾女子不月二陽胃也胃熱甚則爍其血血海乾枯故月事不下宜以玉燭散泄其胃熱則經血自行若因素有吐衄之證或生育過多則血海乾枯及房勞過傷陰血乳衆傷其血液皆足以致經閉失血多者宜養榮湯主之房勞過者以六味地黃湯滋之即山萸山藥白茯苓丹皮澤瀉熟地黃也乳衆者以十全大補湯培補之

玉燭散

養榮湯

十全大補湯 俱見前調經門

經閉久嗽成勞證治

劬勞散

月水不行蒸潮汗食減咳嗽血風勞劬勞散用參苓芎歸地甘耆半味膠

註 經閉久嗽又見骨蒸潮熱盜汗自汗飲食減少之證則爲之血風勞宜用劬勞散即人參茯苓白朮當歸生地甘草黃耆半夏五味子阿膠也

婦人經斷復來

芩心丸

益陰煎

經斷復來血熱甚芩心醋丸溫酒吞益陰知蘗龜生地縮砂炙草棗薑尋血多熱去傷衝任十全大補與八珍暴怒憂思肝脾損逍遙歸脾二藥斟

註 婦人七七四十九歲後天癸不行若止而復來無他證者乃血有餘不得用藥止之若因血熱者宜芩心丸用黃芩心末二兩醋丸溫

酒送下或用益陰煎卽知母黃蘗龜板生地
縮砂炙草也若血去過多熱隨血去衝任虛
損其血不固者宜十全大補湯八珍湯若因
怒氣傷肝肝不藏血憂思傷脾脾不攝血者
宜於逍遙散歸脾湯二方斟酌用之

十全大補湯

八珍湯

逍遙散

歸脾湯 俱見前調經門

室女師尼寡婦經閉證治

大黃蠐螬丸

澤蘭葉湯

柏子仁丸

室女經閉多血結大黃蠐螬桃杏仁蝱蛭蠐螬甘
草芍乾漆生地及黃芩不足澤蘭歸草芍柏子仁
丸用柏仁熟地澤蘭牛卷續相兼久服自然行師
尼寡婦逍遙散附蘭丹地鬱梔芩

註 室女經閉多有氣血凝結者宜用大黃蠐蟲

丸破血行氣其經自通方用大黃䗪蟲桃仁杏仁䗪蟲水蛭蠐螬甘草白芍乾漆生地黃芩蜜丸服若其人虛弱不任攻下則用澤蘭葉湯即澤蘭葉當歸甘草白芍也兼服栢子仁丸方用栢子仁熟地澤蘭葉牛膝卷栢續斷丸服煎丸並進久久其血自行至於師尼寡婦經閉之證多屬鬱熱宜用逍遙散加香附澤蘭葉丹皮生地鬱金黑梔黃芩以和肝理脾清心開鬱其經自通也

逍遙散 方見前調經門

婦病難治

諺云婦病不易治蓋以幽居情鬱疑執拗不喜望聞問諱疾忌醫術莫施

註 寇宗奭曰寧治十男子莫治一婦人謂婦人之病多不易治也蓋以婦人幽居情鬱憂恚愛憎多疑所懷不遂性執偏拗診時又不令醫師觀形望色聞聲問病富貴之家居奧室之中處幃幔之內且復以帕蒙手既不能行

望色之神又不能盡切脈之巧未免詳問問之覺繁反謂醫學不精往往並藥不信不知問非易事非精於醫者必不能問也夫望聞問切四者欲去其三即是神醫亦無由施其術也此古今之通患謂之曰婦人不易治不誠然哉

診看婦人須先問經期妊娠

未診婦人女子病先問經期與有無妊娠不詳誤藥非細事疑似難明昧所因

註

未診婦人女子之病必先問經期與有無妊娠若不詳細審問倘用藥誤觸之則所關匪細多變生他證疑似難明豈不昧其病之所因哉

經閉門彙方

三和湯

當歸　川芎

大黃　朴消

白芍　地黃

黃芩　梔子
連翹　薄荷
甘草 各等分

右剉每服八錢水煎服

六味地黃湯

熟地 八錢
山藥 各四錢　丹皮
澤瀉　茯苓 各三錢

右清水煎服

劬勞散

白芍 六兩　黃耆 四兩 炙
甘草 炙　人參 去蘆
當歸 去蘆酒洗　熟地 洗淨焙乾
五味子　阿膠 各一兩 炒珠

右㕮咀每服三錢水一盞生薑七片棗三枚煎至九分溫服無時日三

芩心丸

用黃芩心枝條者三兩米泔浸七日炙乾又浸又炙如此七次

右爲末醋丸如桐子大每服七十丸空心溫酒送下日進二服

益陰煎

生地三錢　知母　黃蘗各二錢　龜板四錢醋炙　縮砂仁　甘草各一錢炙

右剉水煎服

大黃䗪蟲丸

大黃　赤芍　生地　桃仁　杏仁　乾漆　甘草　䗪蟲　蝱蟲　蠐螬　黃芩各等分

右末煉蜜丸每服丸數量虛實增減

澤蘭葉湯

澤蘭葉三兩　當歸　白芍各一兩　甘草五錢

右爲粗末每服五錢水二盞煎一盞溫服

栢子仁丸

栢子仁炒另研　牛膝酒洗

卷栢各五錢　澤蘭葉

續斷各二兩　熟地三兩五錢酒浸半日石臼內杵成膏

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三十丸

御纂醫宗金鑑婦科心法要訣

五十四卷

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

46

ChL 7918.76

卷四十五

崩漏

帶下

癥瘕積痞痃癖疝

腫脊

御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣目錄

崩漏門

崩漏總括

崩漏證治

荆芩四物湯

加味四物湯

膠艾四物湯

琥珀散

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

八珍湯
十全大補湯
益氣養榮湯
補中益氣湯
益胃升陽湯
調經升陽除濕湯
失笑散
地榆苦酒煎
帶下門

五色帶下總括
帶下證治
吳茱萸湯
補中益氣湯
六君子湯
六味地黃湯
歸脾湯
四物湯
清白散

四君子湯
導水丸
萬安丸
威喜丸
固精丸
加味四物湯
逍遙散
癥瘕積痞痃癖疝諸證門
癥瘕積聚痞瘀血蠱總括
癥瘕證治
大七氣湯
食癥證治
烏藥散
血癥證治
血竭散
痞證治
助氣丸
積聚證治

開鬱正元散
瘀血血蠱證治
桃奴散
失笑散
玉燭散
痣癖疵證總括
痣癖證治
葱白散
疝病證治

當歸散
治諸積大法
嗣育門
胎孕之原
男女完實
種子時候
分男女論
雙胎品胎
衁見有子

胎男女論
辨別孕病
分經養胎
受孕分房靜養
安胎母子二法
胎前用藥三禁
安胎審宜調治

御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣

崩漏門

崩漏總括

淋瀝不斷名爲漏忽然大下謂之崩紫黑塊痛多屬熱日久行多損任衝脾虛不攝中氣陷暴怒傷肝血妄行臨證審因須細辨虛補瘀消熱用清

註　婦人經行之後淋瀝不止名曰經漏經血忽然大下不止名爲經崩若其色紫黑成塊腹

脇脹痛者屬熱瘀若日久不止及去血過多而無塊痛者多係損傷任衝二經所致更有憂思傷脾脾虛不能攝血者有中氣下陷不能固血者有暴怒傷肝肝不藏血而血妄行者臨證之時須詳審其因而細細辨之虛者補之瘀者消之熱者清之治之得法自無不愈

崩漏證治

荆芩四物湯

崩漏血多物膠艾熱多知栢少芩荆漏濇香附桃紅破崩初脹痛琥珀攻日久氣血衝任損八珍大補養榮寧思慮傷脾歸脾治傷肝逍遙香附青

註

崩血漏血去血過多者宜用膠艾四物湯補之如屬熱多者宜用知蘗四物湯清之熱少者宜用荆芩四物湯和之若漏血濇少此屬血滯宜用四物湯加香附桃仁紅花破之若崩血初起脹痛此屬瘀凝宜用琥珀散攻之崩漏日久氣血已虧衝任傷損者宜用八珍

湯十全大補湯人參養榮湯量補其損傷若
因思慮傷脾者宜用歸脾湯補之恚怒傷肝
者宜用逍遙散加炒香附青皮平之

膠艾四物湯
四物湯
琥珀散
八珍湯
十全大補湯
人參養榮湯
歸脾湯
逍遙散 方俱見前調經彙方內
補中益氣湯
益胃升陽湯
氣陷補中益氣舉保元升柴歸术陳益胃升陽加
苓麴腹痛加芍嗽減參
註 崩漏日久脾傷食少中氣下陷不能載血者
宜用補中益氣湯益胃升陽湯升舉之補中
益氣湯卽人參黃耆甘草保元湯加升麻柴

胡當歸白朮陳皮也益胃升陽湯卽補中益氣湯加黃芩神麴也若腹痛者宜加白芍藥有熱者用黃芩無熱者用肉桂調之咳嗽者肺熱也減人參

調經升陽除濕湯

夾水水瀉不甚弱調經升陽除濕湯者草升柴歸蒼朮羌獨藁本蔓荊防

註

崩漏下血夾水或日水瀉一二次形氣不甚弱者宜用調經升陽除濕湯其方卽黃者甘草升麻柴胡當歸蒼朮羌活獨活藁本蔓荊子防風也以風藥先勝其濕若形氣虛弱者則當加人參陳皮合補中益氣湯補中勝濕可也

失笑散

地榆苦酒煎

殺血心痛失笑散蒲黃五靈脂定疼崩血不已防滑脫地榆苦酒煎止崩

註

崩血心腹痛甚者名曰殺血心痛乃血滯不

散宜用失笑散其方即蒲黃五靈脂也先定其痛痛止然後隨證治之若崩血補之仍然不止者當防其滑脫宜用地榆一兩醋煎露一宿次早溫服立止止後隨證治之名地榆苦酒煎

崩漏門彙方

補中益氣湯

黃耆　人參　甘草　各一錢　炙　白朮

當歸　陳皮　各七分　升麻　柴胡　各三分

右剉薑棗水煎服

益胃升陽湯

黃耆二錢　人參一錢　有嗽去之　神麴一錢五分　炒　白朮三錢　當歸　酒洗　陳皮　甘草各一錢　炙　升麻　柴胡　各五分　生黃芩二錢　秋涼不用

右爲麤末每服三錢或五錢如食添再加之
如食減只服三錢或更減之不可多服水煎
去滓熱服

升陽除濕湯

黃耆　蒼朮
羌活 各一錢五分　防風
藁本　升麻
柴胡　甘草 各一錢炙
獨活五分　蔓荊子七分

右咬咀水五大盞煎至一大盞去滓稍熱服
空心服畢待少時以蚤膳壓之

失笑散

五靈脂　蒲黃 各等分

右爲末先用釅醋調二錢熬膏入水一盞煎
至七分食前熱服良驗

地楡苦酒煎

地楡一兩

醋煎露一宿次晨溫服立止止後隨證調治

之　苦酒卽醋也

帶下門

五色帶下總括

帶下勞傷衝與任邪入胞中五色分青肝黃脾白主肺衄血黑腎赤屬心隨入五臟兼濕化治從補瀉燥寒溫更審瘡膿瘀血化須別胞膀濁與淫

註　帶下者由於勞傷衝任風邪入於胞中血受其邪隨入藏氣濕熱濕寒所化故色青者屬肝爲風濕色赤屬心爲熱濕色黃屬脾爲虛濕色白屬肺爲清濕色黑屬腎爲寒濕也其

從補從瀉從燥從濕從寒從溫則隨證治之

更審其帶久淋瀝之物或臭或腥穢乃敗血所化是胞中病也若似瘡膿則非瘀血所化是內癰膿也若如米泔兼尿竅不利乃膀胱白濁病也若尿竅通利從精竅出或如膠黏乃胞中白淫病也

帶下證治

邪入胞中吳茱萸赤黏連梔青防梔白主益氣黑六味黃淡六君或歸脾

註帶下因六淫之邪入於胞中者宜吳茱萸湯若色赤色黃而濁黏者熱也色黃者加黃連梔子色青者加防風梔子若色白色黑而清稀者虛寒也色白者用補中益氣湯色黑者用六味地黃湯色黃而淡者宜六君子湯或加味歸脾湯分證調治可也

吳茱萸湯

補中益氣湯

六味地黃湯

六君子湯

歸脾湯 方俱見首卷彙方

加味四物湯

胞中冷痛乃寒濕四物附子桂薑宜臭腥兼合知
藥用久滑升柴龍牡貽日久滑脫者加升麻柴胡舉之龍骨牡蠣赤
石脂澀之

註 帶下而胞中熱痛乃熱濕也今胞中冷痛乃
寒濕也宜四物湯加川附子炮薑官桂服之

四物湯 方見前調經門彙方內

清白散

帶下濕熱清白散四物薑炭草蘗椿赤榆荊芩濕
二术滑加龍牡久合君

註 帶下五色帶下也皆濕熱所化宜用清白散
其方即四物湯加薑炭甘草黃蘗椿皮也色
赤加地榆荊芥黃芩濕加蒼术白术滑加龍
骨牡蠣久則合四君子湯也

四物湯

四君子湯 俱見前調經門彙方內

導水丸

萬安丸

帶下有餘皆濕化少腹脹疼汚水綿導水犁滑苓軍熱萬安牽椒茴木寒

註 五色帶下皆從濕化若少腹脹痛汚水綿綿屬濕熱者宜用導水丸其方卽犁牛滑石黃芩生軍治熱有餘也屬濕寒者宜用萬安丸其方卽牽牛胡椒小茴香木香治寒有餘者

也

威善丸

固精丸

瘀化瘡膿濁淫病虛實寒熱酌其宜威喜蠟苓固精菟韭味桑苓龍牡脂

註 帶下有因瘀血所化或瘡瘍膿出及白濁白淫者皆帶下類也其虛實寒熱當酌其宜藥用威喜丸卽黃蠟茯苓也固精丸卽菟絲子韭菜子五味子桑螵蛸茯苓龍骨牡蠣赤石

脂也

帶下門彙方

清白散

當歸
白芍 炒
生地
貝母 各一錢
甘草 各五分

右剉生薑三片水煎服

黃蘗 鹽水泡
樗根皮 酒炒
川芎
炮薑

導水丸

牽牛 頭末
滑石 水飛
黃芩
川大黃

右末蒸餅爲丸量虛實服

萬安丸

牽牛 頭末
胡椒
木香
小茴香 各等分 焙

右末水泛爲丸量虛實服

威喜丸

白茯苓四兩去皮作塊用猪苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出晒乾不用猪苓
黃蠟四兩

右以茯苓爲末煉黃蠟爲丸如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐咽服以小便清爲度忌米醋只喫糠醋忌動氣

固精丸

牡蠣煅粉　菟絲子酒蒸焙
韭子炒　龍骨
五味子　白茯苓

桑螵蛸酒炙　白石脂各等分

右爲末酒糊丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下

癥瘕痃癖諸證門

癥瘕積聚痞瘀血血蟲蟲總括

五積六聚分藏府七癥八瘕氣血凝癥積不動有定處瘕聚推移無定形痞悶不宣氣壅塞未成堅塊血瘀名蓄久不散成血蟲產後經行風冷乘

註

五藏氣積名曰積飲食名曰聚故聚有六證難經有心肝脾肺腎五藏之積而無六聚蓋以積爲血病而聚爲氣病也故李杲有五積丸方治法巢氏病源載七

癥八瘕但有八瘕名證而無七癥病形其他方書亦不概見大抵又以癥爲氣病而瘕爲血病也夫病皆起於氣必氣聚而後血凝不必過泥於黃青燥血脂狐蛇鱉等名但以牢固不移有定處者爲癥推移轉動忽聚忽散者爲瘕爲聚可也故曰癥者徵也言有形可徵也瘕者假也言假物成形也若夫痞者痞悶不通氣道壅塞之謂也瘀血者血瘀腹中未成堅塊也蓄之既久必成血蠱矣凡此諸證皆由新產之後經行之時不知謹避以致風冷外襲邪正相搏結於腹中而成也

癥瘕證治

大七氣湯

婦人一切癥瘕病上下攻疰七氣湯藿香益智稜莪术甘桔青陳肉桂香

註　婦人一切癥瘕隨氣上下攻築疼痛者宜大七氣湯其方即藿香葉益智仁京三稜蓬莪术甘草桔梗青皮陳皮肉桂心木香也

食癥證治

烏藥散

經行產後食生冷臟氣相搏結塊形牢固不移日漸長開滯消積溫散行烏藥散烏桃莪朮木香當歸青桂心

註　婦人經行產後貪食生冷之物與臟氣互相搏聚結成堅塊牢固不移日漸長大者治宜開滯消積用烏藥散即烏藥桃仁莪朮木香當歸青皮桂心以溫散之自愈

血癥證治

血竭散

乘臟虛兮風冷干飲食內與血相搏因成血癥堅牢固脇腹脹痛熱而煩少食多恣頭汗出血竭歸芍蒲桂延

註　婦人產後經行之時臟氣虛或被風冷相干或飲食生冷以致內與血相搏結遂成血癥牢固不移脇腹脹痛內熱心煩食少善忘但頭汗出者宜用血竭散即血竭當歸赤芍蒲

黃桂心延胡索也

痞證治

助氣丸

三焦痞滿胸膈悶氣不宣通助氣清白术三棱蓬莪术枳殼檳榔香與陳

註　婦人胸膈痞悶謂之痞由於氣壅不宣所致宜助氣丸即青皮白术三棱莪术枳殼檳榔也

積聚證治

開鬱正元散

積聚通用正元散芩术青陳麴麥延香砂海粉查

甘桔痰飲食積血氣搏

註　五積六聚乃痰飲食積氣血搏結而成通用開鬱正元散其方即茯苓白术青皮陳皮神麴麥芽延胡索香附砂仁海粉山查甘草桔梗也用以健脾消食化痰滲飲理氣和血則積聚未有不愈者矣

瘀血血蠱證治

桃奴散

腹中瘀血未成形面黃發熱腹脹疼產後經來風冷客血室之內有瘀停產後惡露失笑散經閉瘀凝玉燭攻血蠱桃奴貑鼠糞延桂砂桃附五靈

註　婦人產後經行之時傷於風冷則血室之內必有瘀血停留未成堅塊故不名癥瘕也其人必面色萎黃臍腹脹痛內熱晡熱若產後惡露不行者宜失笑散若經閉不通瘀血凝聚者宜玉燭散瘀血不行蓄之既久必成血蠱宜用桃奴散卽桃奴貑鼠糞延胡索桂心砂仁桃仁香附五靈脂也貑鼠糞一名兩頭尖卽雄鼠屎桃奴卽桃樹上未成不落之乾桃子也

失笑散　方見首卷崩漏

玉燭散　方見首卷彙方內

痃癖疝證總括

臍旁左右一筋疼突起如弦痃證名僻在兩肋名曰癖高起如山疝病稱必引少腹腰脇痛三證皆

由風冷成或作或止因寒發痛時方見不痛平

註　婦人臍之兩旁有筋突起疼痛大者如臂小者如指狀類弓弦者名曰痃癖在兩肋之間者名曰癖若小腹牽連腰脇疼痛高起者謂之疝名雖有三其實皆因風冷客於胞中而然故其發作皆因再受風冷發則痛痛則見不痛則平復如初也物也

痃癖證治

葱白散

婦人痃癖腹肋痛風冷與氣血結而成葱白四物參苓枳桂朴薑香青莪稜茴香麴麥苦楝子葱鹽煎服訶黃斟

註　婦人痃癖腹肋疼痛者皆因風冷與氣血搏結而成宜用葱白散溫散之其方即四物湯加人參茯苓枳殼肉桂厚朴乾薑木香青皮莪术三稜茴香神麴麥蘗苦楝子葱白食鹽煎服也大便結燥去鹽加大黃如大便自利加訶子

四物湯 方見首卷彙方內

疝病證治

當歸散

婦人疝病氣攻冲脇腹刺痛當歸芎藭甲吳萸桃仁芍桂榔青木大黃蓬

註 婦人疝病攻衝刺痛多因風冷寒濕客於胞門血室故其病皆屬厥陰肝經宜當歸散卽當歸川芎藭甲吳茱萸桃仁赤芍肉桂檳榔青皮木香大黃蓬莪朮也

治諸積大法

形虛病盛先扶正形證俱實去病急大積大聚衰其半須知養正積自除

註 凡治諸癥積宜先審身形之壯弱病勢之緩急而治之如人虛則氣血衰弱不任攻伐病實宜先攻其病也經云大積大聚衰其半而止蓋恐過於攻伐傷其氣血也羅天益曰養正積自除可謂得經旨者矣

癥瘕積痞血蠱門彙方

大七氣湯

三稜　莪茂　各煨切

青皮　去穰　陳皮　去白

木香　藿香

益智仁　桔梗

肉桂　甘草　各七錢半　炙

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

烏藥散

烏藥　莪茂

桂心　當歸　炒

桃仁　青皮

木香　各等分

右爲末每服二錢熱酒調下

血竭散

眞血竭　如無紫礦代　當歸

赤芍　蒲黃

延胡索

右等分研細頻篩再研取盡爲度每服一錢用童便合好酒半大盞煎一沸溫調下方產下時一服上牀良久再服其惡血自循經下行不致衝上免生百病

助氣丸

京三稜　蓬莪茂　二味各用濕紙包灰火中煨透　切片各二觔

青皮　去白

白术　各十五兩

陳皮　去白

枳殼　麩炒去穰

檳榔

木香　各十兩

右爲末糊丸桐子大每服五十丸滾水下

開鬱正元散

白术　陳皮

青皮　香附

山查　海粉

桔梗　茯苓

砂仁　延胡索

麥芽 炒
神麯 各等分 炒
甘草 炙

右剉每服一兩生薑三片水煎服

桃奴散

桃奴 炒
雄鼠糞 炒 兩頭尖者是
延胡索
肉桂
五靈脂
香附 炒

砂仁
桃仁 各等分

右爲末每服三錢酒調下

葱白散

當歸
熟地
赤芍
川芎
人參
茯苓
枳殼
肉桂
厚樸
乾薑
木香
青皮
莪茂
三稜
茴香
神麯

麥芽　苦楝子　各等分

右末加葱白三寸食鹽五分煎服三錢

大便結燥去鹽加大黃便自利加訶子

當歸散

當歸　川芎　各二錢
鱉甲　三錢　醋炙
桃仁　十五粒
肉桂　各一錢　吳茱萸
青皮　各八分　赤芍
檳榔
木香

莪茂　川大黃　各七分

右爲末每服一錢水一盞入乾燕脂一錢同煎六分服食後

嗣育門

胎孕之原

天癸先天生身氣精血後天化成形男子二八天癸至屬陽應日精日盈女子二七天癸至屬陰應月血月通男女媾精乃有子乾道男成坤女成

註　天癸乃父母所賦先天生身之眞氣也精血水穀所化後天成形之本也男子二八先天腎氣盛天癸至與後天所生之精會合而盈然男子屬陽陽應日故精盈而日舉也女子

二七先天腎氣實天癸至與後天所生之血
會合而盛然女子屬陰陰應月故血盛而月
下也所以至期男女媾其先天眞氣後天精
血陰陽會和乃能有子也當此陰陽會合時
陽盛自然成男是乾道成男也陰盛自然成
女是坤道自然成女也

男女完實

精通必待三十聚天癸二十始適人皆欲陰陽完
實後育子堅壯壽偏增

註男子十六而精通必待三十而娶女子十四
而天癸至必待二十而嫁者皆欲陰陽完實
然後交而孕孕而育育而其子必堅壯長壽
也今未笄之女天癸始至已近男色則陰氣
早瀉未完而傷未實而動所以雖交而不孕
孕而不育育而其子必脆弱不壽也

種子時候

男子聚精在寡慾交接乘時不可失須待絪蘊時
候至樂育難忍是眞機

註　聚精之道惟在寡慾交接女子必乘其時不可失之遲早蓋婦人一月經行一度之後必有一日網蘊之時氣蒸而熱如醉如痴有欲交接不可忍之狀乃天然節候是成胎生化之眞機也

分男女論

精血先後分男女或以奇偶少多分或以子宮左右定是皆不曉箇中因欲識此中眞消息乾道陽男坤女陰

註　分男女之說先賢有以血先至裹精則成男精先至裹血則成女精血散分並裹則爲駢胎品胎之原者有以月水盡後一三五日成男二四六日成女與夫經水斷後一二日成男四五日成女者有以受氣於左子宮成男受氣於右子宮成女者皆各執一見殊爲不曉此中因也蓋獨男獨女之胎可以日數論駢胎品胎或男或女亦可以日數論乎稽之史載一產三子四子有半男半女或男多女

少男少女多者則一三五日爲男二四六日爲女之說不可憑矣抑豈有一日受男而二日復受女之理乎丹田命門也在男子曰精室在女子曰子宮形如合鉢並無兩岐可分曰左右則是有兩子宮矣此說尤屬不經然則何以定之亦惟以會合天人陽盛乾道成男陰盛坤道成女斯足爲確論耳

雙胎品胎

古以雙胎精氣盛不成男女或兼形陰陽變常駭氣盛事之所有理難明

註　古以雙胎乃精氣有餘岐而分之血因分而攝之故也若男同孕者剛日陽時也女同孕者剛日陰時或柔日陽時也其他或有不成男女男不可爲父女不可爲母與男女之兼形者又皆陰陽變常駭氣所感事之所有理之所無莫可稽考者也

鮎見有子

少陰動甚知有子陰搏陽別尺寸憑但搏不滑胎三月搏而滑石五月形

註 少陰督衄動甚者有子衄也但當憑其兩尺陰衄搏指有力兩寸陽衄不搏指而別於兩尺斯爲有子衄無疑也其但搏不滑者主三月之胎搏而滑者主五月之胎也

胎男女辨

上小下大女腹箕中正圓高男腹釜右疾爲女左疾男胎氣鍾於陰陽主

註 上小下大如箕之形蓋以女胎面向母腹其足膝抵腹故有是形也中正圓高如釜之形蓋以男胎面向母背則背脊抵腹故有是形也右手屬陰衄疾爲女左手屬陽衄疾爲男是胎氣鍾於陰則右盛主女鍾於陽則左盛主男也

辨別孕病

孕病不分須診乳五月之後乳房升何以知其母子吉身雖有病衄和平

註　婦人經水不至不分是孕是病者五個月之後以孕婦乳房辨之若乳房升大有乳者是胎若乳房不大無乳者是病也凡孕婦有病其險可知亦何以知其母子俱吉惟診其脈象和平則雖有病知均吉無慮也

分經養胎

分經養胎不足憑無所專養論不經形始未分無不具陰陽之道漸分形

註　巢元方曰妊娠一月名胚胎足厥陰脈養之二月名始胎手心主脈養之當此時血不流行形象始化四月始受火精以成氣足太陰脈養之六月始受成血脈手少陽脈養之五月金精以成筋足陽明脈養之七月始受木精以成骨手太陰脈養之八月始受土精以成膚革手陽明脈養之九月始受石精以成毛髮足少陰脈養之十月五藏六府關節人神皆備又有推巢元方養胎之說謂四時之令

必始於春所以一月二月間是足厥陰少陽木也三月四月間手厥陰少陽火也五月六月間足太陰陽明土也七月八月間手太陰陽明金也九月十月間足少陰太陽水也惟手少陰太陽二經無所專養者以君主之官無爲而已此說更爲不經夫男女交接精血聚而成胚此孕形之始也雖未分身軀藏府而其理無不具也猶太極渾然包羅萬象而陰陽之一氣氤氳浸漸化生而成子母分形自然而然如草木成熟殼脫蒂落也

受孕分房宜靜養謹戒食味使脾安調其喜怒防驚恐愼厥起居避風寒

註　受孕之後分房靜養恐動相火致生胎毒謹戒飲食五味使其脾胃調和母之氣血易生子之形成必育內調七情外避風寒起居安順不持重用力不安逸多睡不登高涉險則母無病子亦安矣

安胎母子二法

安胎之道有二法母病胎病要詳分母病動胎但治母子病致母審胎因

註　安胎之道有二法母病胎病當詳分而施治也凡因母病以致胎動者但療其母母安則胎自安或因胎病有所觸動以致母病者但宜安胎胎安則母自愈矣

胎前用藥三禁

胎前清熱養血主理脾疎氣是爲兼三禁汗下利小便隨證虛實寒熱看

註　丹溪曰胎前當清熱養血爲主恐傷陰血也理脾脾健則氣血易生疎氣氣順則氣血調和理脾疎氣兼以清熱養血則胎自安矣三禁者汗下利小便也蓋恐過汗亡陽傷氣過下亡陰傷血利小便傷津液也然又當隨證詳審表裏虛實寒熱以施其治不可過峻也

安胎審宜調治

形瘦不宜過熱品體盛補氣恐動痰安胎芩朮爲

要藥佐以他藥任抽添火盛倍芩痰倍术血虛四物氣四君杜續膠艾胎不穩氣盛蘇腹枳砂陳

註　形瘦之人多火過用溫熱則傷陰血肥盛之人多痰過於補氣恐壅氣動痰白术消痰健脾條芩清熱養陰二味爲安胎要藥若有他證則以藥佐之或減白术加條芩或加白术減條芩任其抽添如火盛則當倍芩以清火痰盛則當倍术以消痰血虛則合四物湯以補血氣虛則合四君湯以補氣胎不安穩更佐以杜仲續斷阿膠艾葉以安之若氣盛胎高則加紫蘇大腹皮枳殼砂仁陳皮以舒之

四物湯

四君子湯　方俱見首卷彙方內

嗣育門彙方

加味地黃丸

治婦人經水不調必不能受孕即使受之亦不全美宜常服此方

熟地　四兩

山萸肉

山藥 各二兩　牡丹皮
白茯苓 各一兩五錢　澤瀉
香附 各一兩
童便浸三次

右爲末煉蜜丸如梧子大每服七十丸白沸湯送下

滌痰湯

治婦人肥盛者多不受孕以身中有脂膜閉塞子宮也以此湯送後丸藥

當歸 一兩　茯苓 四兩
川芎 七錢五分　白芍藥
白朮 土炒　半夏 製
香附米　陳皮
甘草 各一兩

右作十貼每貼薑三片水煎吞後丸子

滌痰丸

白朮 二兩 土炒　半夏麴
川芎　香附米 各一兩
茯苓 各五錢
神麴 炒

橘紅 四錢　甘草二錢

右爲末粥丸每服八十丸

如熱者加黃連枳實各一兩

大補丸

治婦人瘦弱多由血少不能受孕宜常服此方

天冬 去心　麥冬 去心

菖蒲　茯苓

人參　益智仁

枸杞子　地骨皮

遠志肉

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十丸

菟蓉菴蕳絲子丸

此方不寒不熱助陰生子

肉菟蓉一兩三錢　覆盆子

蛇牀子　川芎

當歸　菟絲子各一兩二錢

白芍藥一兩　牡蠣鹽泥固煆

烏鯽魚骨 各八錢　五味子
防風 各六錢　條芩 五錢
艾葉 三錢

右爲末煉蜜九如桐子大每服三四十九鹽湯下早晚皆可服

調經九

理氣養血調經種子

香附　川杜仲 八兩
大川芎　薑汁炒
白芍藥

當歸 去尾　懷生地
陳皮　小茴香 酒炒
延胡索 畧炒　肉蓯蓉 酒炒
舊青皮 麩炒　台烏藥 炒
枯黃芩 酒炒　烏鯽魚骨 以上各四兩 酥炙

右十四味稱足眞正好醋和麪打糊爲丸如梧桐子大每服百丸空心好酒送下

一方無陳皮地黃有人參黃耆各二兩

T7910/7388

47

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE

OCT 11 1932

ChL 7918.7638

御纂醫宗金鑑婦科心法要訣

卷四十六

胎前諸證

六十四卷

47

御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣目錄

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

胎前諸證門

胎前總括

惡阻總括

惡阻證治

保生湯

加味六君湯

加味溫膽湯

胞阻證治
加味平胃散
延胡四物湯
加味膠艾四物湯
蜜消湯
膠艾四物湯
加味芎歸飲
導赤散
五苓散
子腫子氣子滿脬腳皺腳證治
茯苓導水湯
子煩證治
知母飲
子懸胎上逼心證治
紫蘇飲
子癇證治
羚羊角散
釣藤湯

子嗽證治
枳桔二陳湯
桔梗湯
轉胞證治
舉胎四物湯
阿膠五苓散
子淋證治
加味五淋散
激經胎漏尿血總括

激經胎漏尿血證治
阿膠湯
黃耆湯
銀苧酒
加味四物湯
胎不安小產墮胎總括
胎不安小產墮胎證治
加味聖愈湯
加味佛手散

十聖散
加味芎藭湯
益母丸
墮胎下血不止證治
瘀血不出證治
獨參湯
胞生丹
子死腹中證治
佛手散
平胃散
辨子母存亡
胎兼癥瘕
胎不長證治
子痫證治
子啼腹內鐘鳴證治
黃連煎
藏燥證治
甘麥大棗湯

鬼胎總括

腸覃石瘕證治

香棱丸

胎前母子盛衰

御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣

胎前諸證門

胎前總括

妊娠胎前病惡阻胞阻腫滿氣煩懸癇噦轉胞與子淋激經胎漏胎不安小產死胎胎不長子瘖臟燥鬼胎連餘病當參雜證治須知刻刻顧胎原

註　此言妊娠胎前有惡阻胞阻子腫子滿子煩子懸子癇子噦轉胞子淋激經胎漏胎動不

安小產墮胎子死腹中胎萎不長子瘡臟燥
鬼胎等證皆當一詳辨熟記其餘胎前傷
寒傷食瘧痢痢霍亂泄瀉當於雜證門中參考
治之但須時刻保護胎原不致誤犯爲要也

惡阻總括

惡心嘔吐名惡阻擇食任意過期安重者須藥主
胃弱更分胎逆痰熱寒
註
婦人受孕月餘之後時時嘔吐者名曰惡阻
若無他病擇食者須隨其意而與之輕者過
期自然勿藥而愈重者須以藥治之當以胃
弱爲主更審其或因胎氣阻逆或痰飲阻逆
與夫兼熱兼寒而分治之

惡阻證治

保生湯

胎氣阻逆惟嘔吐無他兼證保生湯砂术香附烏
陳草量加參枳引生薑

註
惡阻有因胎氣阻逆者乃受胎後胞門閉塞
藏氣內阻挾胎氣上逆於胃故令惡心嘔吐

也若平素胃虛所致雖無痰飲寒熱相兼而
亦有惡阻證者宜用保生湯即砂仁白术香
附烏藥陳皮甘草也引用生薑者以止其嘔
也若氣弱者量加人參氣實者量加枳殼
加味六君湯
痰飲惡阻吐痰水煩眩加味六君湯枇杷藿香旋
縮枳熱秘芩軍寒桂薑
註
惡阻因於痰飲者其吐必多痰水且心煩頭
目眩暈必其人平素胃虛中停痰飲也宜用
加味六君湯於六君湯內加枇杷葉藿香旋
覆花縮砂枳殼若胃熱便秘加黃芩大黃以
利之胃寒喜熱加肉桂乾薑以温之
六君湯 方見首卷
加味温膽湯
熱阻惡食喜涼漿心煩憒悶温膽湯橘半茯甘與
枳竹更加芩連蘆麥薑
註
惡阻因於胃熱者必嘔吐心中熱煩憒悶喜
飲涼漿也宜用加味温膽湯其方即陳皮半

夏茯苓甘草枳實竹茹名溫膽湯更加黃芩黃連蘆根麥門冬引生薑也

胞阻總括

妊娠腹痛名胞阻須審心腹少腹間傷食心胃胎腰腹少腹胞寒水尿難

註　孕婦腹痛名爲胞阻須審其痛或上在心腹之間者多屬食滯作痛或下在腰腹之間者多屬胎氣不安作痛若在少腹之間者則必因胞血受寒或停水尿難作痛也

胞阻證治

加味平胃散

延胡四物湯

心胃痛多傷食滯蓄朴陳甘果枳麴便秘加軍倍甘草胎動延胡四物宜

註　孕婦心胃作痛者多因傷食停滯宜平胃散即陳皮厚朴蒼术甘草也加草果枳殼神麴以消之若更大便秘結日久則加消黃以攻之然必倍甘草以緩其峻性庶不傷胎若腰

腹作痛胎動下血則當用四物湯君以延胡以定痛而保胎也

四物湯 方見首卷

加味膠艾四物湯

蜜消湯

腹腰痛甚防胎墮膠艾四物杜酒葱外邪宜加羌獨活內熱便秘蜜消攻

註 胞蒂繫於腰凡腹腰痛者須防胎墮宜用膠艾四物湯加杜仲大豆淋酒葱白以定痛而保胎若因外感風寒之邪則加羌活獨活以散之若內熱大小便閉者則用蜂蜜芒消煎湯以攻之經曰有故無隕是也

膠艾四物湯 方見首卷

加味芎歸飲

導赤散

五苓散

胞血受寒少腹疼參吳膠艾草歸芎尿澁熱甚導赤散木通生地甘草靈水盛陽虛五苓效术澤肉

桂茯豬苓

註　少腹作痛者乃胞中之血受寒也宜加味芎歸飲温之其方即人參吳茱萸阿膠薤艾炙甘草當歸川芎也若因尿澁而痛則是膀胱水病熱甚則以導赤散清利之其方即生地木通甘草也若水盛陽虛不化則以五苓散滲利之其方即茯苓白朮澤瀉豬苓肉桂也

子腫子氣子滿脬脚皺脚總括

頭面四肢腫子腫自膝至足子氣名腫脹喘滿曰子滿但脚腫者脬皺稱

註　頭面偏身浮腫小水短少者屬水氣爲病故名曰子腫自膝至足腫小水長者屬濕氣爲病故名曰子氣子滿脬脚皺脚皮薄者屬水名曰脬脚大凡水病故名曰子氣偏身俱腫腹脹而喘在六七箇月時者名曰子滿但兩脚腫而膚厚者屬濕名曰皺脚皮薄者屬水名曰脬脚大凡水之爲病多脹滿喘促氣之爲病多脹滿喘促屬肺脹滿屬脾也以其人素有水氣濕邪故受孕有腫滿之證兒未成形被水浸漬其胎每致

損壞成形尚可調治故在五六月後有是證者多有生育者也

子腫子氣子滿脫脚皺脚證治

茯苓導水湯

妊娠腫滿與子氣水氣濕邪脾肺間水氣浸胎喘難卧濕氣傷胎脹難堪均宜茯苓導水治香瓜檳腹四苓攢桑砂蘇陳脹加枳腿脚防已喘葶添

註

妊娠水腫脹滿子氣皺脚脫脚等證皆由水氣濕邪傷於脾肺爲病也若水氣盛而浸胎則必喘而難卧若濕氣盛而傷胎則脹滿難堪皆宜用茯苓導水湯治之方用木香木瓜檳榔大腹皮白朮茯苓豬苓澤瀉桑皮砂仁蘇葉陳皮以和脾肺而利水濕脹甚者加枳殼以破結腿脚腫者加防已以利下濕喘者加苦葶藶以泄上水也

子煩證治

知母飲

孕婦時煩名子煩胎熱乘心知母瘥子芩知麥芩

耆草犀熱參虛膏渴煎

註孕婦別無他證惟時時心煩者名曰子煩田胎中鬱熱上乘於心也宜用知母飲卽子芩知母麥冬茯苓黃耆甘草熱甚者加犀角氣虛加人參口渴加石膏煎服

子懸胎上逼心證治

紫蘇飲

胸膈脹滿子懸名喘甚由胎上逼心紫蘇飲用歸芎芩陳腹蘇甘虛入參

註孕婦胸膈脹滿名曰子懸更加喘甚者名曰胎上逼心倘宜紫蘇飲卽當歸川芎白芍陳皮大腹皮蘇梗葉甘草虛者加人參煎服

子癎證治

羚羊角散

釣藤湯

暴仆抽搐不識人須臾自醒子癎名羚羊角散防獨杏五加棗草薏苡仁茯苓木香羚羊角抽搐釣藤湯寄生人參茯神歸桔梗口喎肢廢中風成

註　孕婦忽然顛仆抽搐不省人事須臾自醒少頃復如好人謂之子癎乃肝心二經風熱所致宜用羚羊角散卽防風獨活杏仁酸棗仁五加皮甘草薏苡仁茯苓木香羚羊角也抽搐甚者用釣藤湯乃釣藤桑寄生人參茯神當歸桔梗也若口眼喎斜半身不遂則已成中風廢證當參風門治之

子嗽證治

枳桔二陳湯

桔梗湯

妊娠咳嗽名子嗽陰虛痰飲感風寒痰飲二陳加枳桔風寒桔梗湯可安紫蘇桔梗麻桑杏赤苓天冬合貝前久嗽陰虛宜清潤麥味地黃湯自痊

註　妊娠咳嗽謂之子嗽久每致傷胎有陰虛火動痰飲上逆有感冒風寒之不同因痰飲者用二陳湯加枳殼桔梗治之因感冒風寒者用桔梗湯卽紫蘇葉桔梗麻黃桑白皮杏仁赤茯苓天冬百合川貝母前胡也若久嗽

屬陰虛宜滋陰潤肺以清潤之用麥味地黃湯治之

六味地黃湯 方見首卷

轉胞證治

舉胎四物湯

阿膠五苓散

飲食如常煩不卧不得小便轉胞稱舉胎救急丹溪法四物升麻參朮陳服後探吐吐再服不應阿膠入五苓

註 妊娠胎壓胞系子尿不得小便飲食如常心煩不得卧者名曰轉胞宜用丹溪舉胎法令穩婆香油塗手舉胎起則尿自出以暫救其急然後以四物湯加升麻人參白朮陳皮煎服服後以指探吐吐後再服再吐如此三四次則胎舉而小便利矣如不應則是有飲用五苓散加阿膠以清利之

四物湯 方見首卷

子淋證治

加味五淋散

子淋頻濁窘澁疼五淋振等

地澤車前滑石木通尋

註　孕婦小便頻數窘澁點滴疼痛名曰子淋宜

五淋散卽黑梔赤茯苓當歸白芍黃芩甘草

加生地澤瀉車前子滑石木通以清熱而利

水則小便自通矣

激經胎漏尿血總括

妊娠經來名激經胎漏下血腹不疼若是傷胎腹

必痛尿血漏血要分明

註　婦人受孕之後仍復行經者名曰激經爲血

有餘若孕婦無故下血或下黃汁豆汁而腹

不痛者謂之胎漏若其胎已傷而下血者其

腹必疼孕婦又有尿血一證腹亦不痛然與

胎漏之證又不同蓋尿血出於溺孔漏血出

自人門三者俱下血而各不同治者不可不

詳辨也

激經胎漏尿血證治

阿膠湯

黃耆湯

銀苧酒

加味四物湯

激經無病不須治子大能食經自停胎漏下血多因熱四物阿膠梔側芩或下黃汁豆汁樣黃耆糯米苧根銀若是尿血膀胱脫熱四物血餘共茅根

註

激經無他證相兼者不須用藥其胎壯子大能食其血而經自停若胎漏下血多屬血熱宜阿膠湯清之其方即四物湯加阿膠黑梔側栢葉黃芩也或漏下黃汁或如豆汁甚多者其胎乾枯必倚而墮宜用黃耆湯即黃耆二兩糯米一合煎服或銀苧酒即苧麻根紋銀煎酒服若尿血則是膀胱脫血熱宜四物湯加血餘白茅根以涼之

四物湯 方見首卷

胎不安小產墮胎總括

氣血充實胎自安衝任虛弱損胎原暴怒房勞傷

肝腎疾病相干跌撲顛五月成形名小產未成形象墮胎言無故至期數小產須愼胎爲慾火煎

註　孕婦氣血充足形體壯實則胎氣安固若衝任二經虛損則胎不成實或因暴怒傷肝房勞傷腎則胎氣不固易致不安或受孕之後患生他疾干犯胎氣致胎不安者亦有之或因跌撲築磕從高墜下以致傷胎墮胎者亦有之然小產墮胎亦自有別五七月已成形象者名爲小產三月未成形象者謂之墮胎以上小產墮胎皆出有因若懷胎三五七月無故而胎自墮至下次受孕亦復如是數數墮胎則謂之滑胎多因房勞太過慾火煎熬其胎因而不安不可不愼者也

胎不安小產墮胎證治

加味聖愈湯

加味佛手散

十聖散

加味芎藭湯

益母丸

胎傷腹痛血未下聖愈湯加杜續砂下血腹痛佛手散膠艾杜續术芩加十全續縮減芩桂因病傷胎十聖誇跌撲芎藭調益母怒勞逍遙地黃隹

註

妊娠胎傷若腹痛不下血者宜用聖愈湯加杜仲續斷砂仁安之若下血腹痛者宜用佛手散加阿膠蘄艾杜仲續斷白术條芩安之若因母病以致傷胎欲墮者宜十聖散卽十全大補湯減茯苓肉桂加續斷砂仁若因跌撲築磕傷胎欲墮者宜芎藭湯調益母丸服之芎藭湯卽川芎當歸也若暴怒房勞傷肝腎以致胎動不安者宜逍遙散地黃湯治之

聖愈湯

佛手散

逍遙散

地黃湯 方俱見首卷

墮胎下血不止血瘀不出證治

獨參湯

胞生丹

墮胎暴下血不止面黃唇白獨參湯惡血不出凝脹痛胞生益母酌相當

註　妊娠胎墮後血暴下不止面黃唇白者名脫榮宜用獨參湯峻補其氣以生其血所謂無形能生有形也若惡血瘀滯不行腹脇脹痛者宜於胞生丹益母丸酌其虛實緩急相當而用之

胞生丹　見產後彙方

子死腹中總括

子死腹中須急下舌青腹痛冷如氷時久口中穢氣出寒熱峻緩詳斟平

註　凡一應傷胎子死腹中者須當急下勿使上奔心胸然必驗其舌青面赤肚腹脹大腹冷如氷久之口中有穢氣出者方可議下然猶必審其人之虛實寒熱或宜寒下熱下峻下緩下隨其宜而施之

子死腹中證治

佛手散

平胃散加芒消方

下胎緩劑佛手散峻劑平胃加芒消宜熱宜寒須細審產婦虛實莫溷淆或宜寒下或宜熱下須細細詳審而投之蓋以產母之虛實或緩或峻不可溷淆輕率以致誤也

註　孕婦子死腹中宜下者緩下用佛手散峻下用平胃散加芒消或宜寒下或宜熱下須細

佛手散　方見首卷

辯子母存亡

妊娠一切垂危候母子存亡可預推面赤舌青必子死面青舌赤母命危面舌俱青口吐沫子母俱亡二命虧

註　凡妊娠一切凶危之候欲知母子存亡者當於孕婦面舌之色定之若面赤舌青則其子必死面青舌赤則其母必亡若面舌二者俱見青色口角兩邊流涎沫者則子母二命俱不能保也

胎兼癥瘕

妊娠有病當攻下衰其大半而止之經云有故而無殞與病適當又何疑

註　凡孕婦素有癥瘕舊疾或有新病應攻下者但攻其大半餘俟其自消不可盡攻經云有故無殞言藥雖峻有病則病受之不能傷胎也攻其大半與病相當又何疑於有妊必不可攻之說耶

胎不長證治

八珍湯

六君子湯

胎萎不長失滋養氣血不足宜八珍脾虛胃弱六君子穀化精微氣血生胎萎不長由於妊母稟賦虛

註　妊娠五六個月胎萎不長者宜用八珍湯若脾虛胃弱者宜用六君子湯但使飲食强壯俾水穀運化精微則氣血日生而胎自長矣

六君子湯 方俱見首卷

子瘖證治

子瘖聲啞細無音非謂絶然無語聲九月胎盛阻其衇分娩之後自然通

註 妊娠九月孕婦聲音細啞不響謂之子瘖非似子啞絶然無語也蓋少陰之衇絡於舌本九月腎衇養胎至其時胎盛阻遏其衇不能上至舌本故聲音細啞待分娩之後腎衇上通其音自出矣

子啼腹內鐘鳴證治

黃連煎

腹內鐘鳴與兒哭子啼之證出偶然空房鼠穴土能治黃連煎湯亦可捐

註 孕婦腹內有鐘聲或嬰兒在內啼哭者名曰子啼古書雖載其證然不經見或偶然有之古方用空房中鼠穴土同川黃連煎湯名黃連煎飲之自愈

臟燥證治

甘麥大棗湯

臟燥無故自悲傷象若神靈大棗湯甘草小麥與大棗方出金匱效非常

註　孕婦無故時時傷悲哀痛象若神靈憑依者名曰臟燥宜用金匱甘麥大棗湯服之其方即甘草小麥大棗三味煎服其效非常也

鬼胎總括

邪思情感鬼胎生腹大如同懷子形豈緣鬼神能交接自身血氣結而成

註　鬼胎者因其人思想不遂情志相感自身氣血凝結而成其腹漸大如懷子形狀古云實有鬼神交接其說似屬無據婦人石瘕腸覃二證亦俱如懷孕之狀由氣血凝結而成則可知其必無是理矣

腸覃石瘕證治

香棱丸

腸覃石瘕氣血分寒客腸外客子門二證俱如懷子狀辨在經行經不行石瘕吳茱萸湯最效腸覃香

棱丸若神丁木茴香川楝子青皮廣茂與三棱

註　經云寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫瘕而內着惡氣乃起瘕肉乃生始如雞卵稍以益大如懷子狀按之則堅推之則移月事以時下石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當下不下衄以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下由經文觀之二證雖皆如懷子狀腸覃氣病而血不病故月事以時下石瘕先氣病而後血病故月事不來也石瘕宜吳萸湯腸覃宜香棱丸卽木香丁香茴香川楝子青皮廣茂三棱醋煮麪糊爲丸也

吳茱萸湯　方見首卷

胎前母子盛衰

母盛子衰胎前病母衰子盛產後殃子母平和無衰盛坦然分娩不須忙

註　此言觀孕婦與所懷之胎有盛衰之辨也若

娠母氣血壯盛而胎元弱者胎前必多病若孕婦衰弱而胎元壯實則產後其母必多病若子母俱和平無偏盛偏衰則胎前產後均平安無疾可坦然無憂也

胎前有餘詳不足產後不足審有餘產後惟多虧損病胎前子母盛衰知

註

古云胎前無不足產後無有餘此言其常也然胎前雖多有餘之證亦當詳察其亦有不足之時產後雖多不足之病亦當詳審其每挾有餘之證也欲知產後常多虧損之故於胎前子母盛衰求之可預知也

胎前門彙方

保生湯

人參　甘草　各二錢半

白朮　香附子

烏藥　橘紅　各五錢

右劑每服三錢薑五片煎服

加味六君湯

人參　白朮 土炒
茯苓　陳皮
半夏 各一錢五分 製　甘草 五分 炙
藿香葉　枇杷葉 各一錢 炙
縮砂仁　枳殼 各八分 炒

右剉加生薑煎服

加味溫膽湯

陳皮　半夏 製
茯苓 各一錢　甘草 五分 炙

枳實　竹茹
黃芩 各一錢　黃連 八分
麥冬 二錢　蘆根 一錢

右剉薑棗煎服

加味平胃散

厚樸 薑汁炒　蒼术 米泔浸炒
陳皮　甘草 炙
人參 各一錢

右爲末每服三錢加薑煎服

延胡四物湯

當歸　川芎

白芍　熟地　各七錢五分

延胡索二兩　酒煮

右剉水煎服

加味膠艾四物湯

當歸　熟地

阿膠　白芍　各二錢

杜仲一錢五分　川芎

靳艾各八分

右加葱白三寸大豆淋酒煎服

蜜消煎

蜂蜜　芒消

右煎溶化服

加味芎歸飲

川芎二錢　當歸五錢

人參一錢　吳茱萸五分

阿膠二錢　靳艾八分

甘草五分
炙

右剉水煎服

導赤散

生地三錢　木通二錢
甘草稍一錢

燈心一團煎服

五苓散

白术
土炒

茯苓
猪苓
澤瀉　各二錢半

桂三分

右剉作一服水煎服

茯苓導水湯

茯苓　椒椰
猪苓　縮砂
木香　陳皮
澤瀉　白术
木瓜　大腹皮
桑白皮　蘇梗　各等分

右加薑煎服

脹加枳殼

喘加苦葶藶子

腿腳腫加防已

知母飲

知母　麥冬

甘草 各五錢　黃耆

子芩　赤芩 各七錢五分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入

竹瀝一合溫服

紫蘇飲

當歸　川芎

白芍 各二兩　陳皮

蘇莖葉　大腹皮 各一兩

甘草 五錢　人參 量虛實用

炙

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎至一

盞去滓服日進二服

有熱加黃芩竹茹

心煩加羚羊角

有食加神麴山查

羚羊角散

羚羊角鎊　獨活

酸棗仁　五加皮

防風　薏苡仁

杏仁　當歸酒浸

川芎　茯神各五分去木

甘草　木香各二分

右㕮咀加生薑五片水煎服

釣藤湯

釣藤鈎　當歸

茯神　人參各一兩

苦桔梗一兩五錢　桑寄生五錢

右爲粗末每服五六錢水二盞煎至一盞去滓温服無時忌猪肉菘菜

煩熱加石膏二兩半

臨產月加桂心一兩

枳桔二陳湯

陳皮　半夏
茯苓 各二錢　甘草 五分 炙
枳殼　桔梗 各一錢

右剉薑煎服

桔梗湯

天冬 去心　赤芩 各一錢
桑皮　桔梗
紫蘇 各五分　麻黃 三分 去節

貝母
甘草 各二分 炙

右剉加生薑水煎服

一方有杏仁無貝母

舉胎四物湯

當歸　白芍
熟地　川芎
人參　白朮 各二錢
陳皮　升麻 各一錢

右剉水煎服

麥味地黃湯

熟地四錢　山萸肉二錢

山藥二錢　澤瀉

茯苓　丹皮各一錢五分

麥冬二錢　五味子十三粒

右剉水煎服

五淋散

赤芍　山梔子各二錢

赤茯苓一錢二分　當歸一錢

子芩六分　甘草五分

右水煎服

阿膠湯

阿膠炙燥　熟地焙

艾葉微炒　芎藭

當歸切焙　杜仲去粗皮炙剉

白朮各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半棗三枚擘破同

煎至八分去滓食前温服

黄耆湯

糯米一合　黄耆二兩

川芎一兩

右細剉水二大盞煎至一盞温服一方無川芎

銀苧酒

苧麻根二兩　紋銀五兩

剉

清酒一盞

右以水二大盞煎至一大盞去渣分温二服

十聖散

人參　黄耆

白朮　熟地黄

砂仁各五分　甘草炙

當歸　川芎

白芍各一錢炒　川續斷八分

右剉水煎服

獨參湯

用好人參二兩或四兩

右水煎徐徐服

益母丸

益母草 五月五日或六月六日採之陰乾忌鐵器

右一味以石器碾爲細末煉蜜丸彈子大每用一丸童便好酒各半研化服之

六味地黃丸

熟地 八兩 蒸曬九次　山藥 四兩

茯苓 三兩 乳拌　山萸肉 四兩 酒浸

丹皮 三兩　澤瀉 三兩

煉蜜爲丸如梧桐子大每服三錢

桂附地黃丸 卽六味地黃丸加肉桂附子

黃連煎

黃連

右一味煎湯調空房中鼠穴內土服

甘麥大棗湯

甘草 三兩　小麥 一升

大棗 十枚

右以水六升煮取三升温分三服亦補脾氣

香棱丸

木香　丁香　各半兩

枳殼　麩炒　三棱　酒浸一夕

莪茂　細剉每一兩用巴豆三十粒去殼同炒待巴豆黃色去巴豆不用

青皮　炙　川楝子肉

蘘香　各等分　炒

右爲末醋煮麵糊丸如桐子大硃砂爲衣每服三十丸薑鹽湯送下或温酒下無時

御纂醫宗金鑑婦科心法要訣

卷四十七

產後諸證

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

ChL 7918.7638

48



七十四卷

御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣目錄

生育門

臨產

產室

擇收生婆

驚生

試胎弄胎

坐草

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

臨盆
交骨不開
開骨散
盤腸生
補中益氣湯
十全大補湯
革蘇貼法
酥油潤法
難產

產後門
胞衣不下證治
奪命散
產門不閉證治
十全大補湯
血暈證治
清魂散
佛手散
醋漆薰法

惡露不下證治
失笑散
聖愈湯
惡露不絕證治
加味十全大補湯
佛手散
頭疼證治
芎歸湯
八珍湯

心胃痛證治
大巖蜜湯
玉燭散
腹痛證治
失笑散
香桂散
異功散
少腹痛證治
延胡索散

吳茱萸湯
五苓散
脇痛證治
延胡索散
四君子湯
八珍湯
腰痛證治
佛手散
加味六味地黃湯
偏身疼痛證治
趁痛散
加味四物湯
腹中塊痛證治
延胡索散
吳茱萸湯
筋攣證治
加味四物湯
八珍湯

傷食嘔吐證治

六君子湯

二陳湯

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

氣喘證治

參附煎

二味參蘇飲

浮腫證治

枳术湯

小調中湯

小調經散

茯苓導水湯

發熱證治

加味四物湯

加味異功散

六君子湯

生化湯
四物湯
十全大補湯
八珍湯
當歸補血湯
參附湯
寒熱證治
柴胡四物湯
生化湯
更生散
自汗頭汗證治
當歸六黃湯
黃耆湯
參附湯
中風證治
十全大補湯
瘂病證治
加味八珍湯

瘈瘲抽搐證治

加味八珍湯

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

八珍湯

二陳湯

御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣

生育門

臨產

妊娠臨產要安詳腹內如覺動轉疼痛須要安胎轉靜待生時不用忙

註　妊娠月足臨產腹痛仰卧時時緩步使兒身轉詳莫自慌亂舒體仰卧時時緩步使兒身轉正靜以待之至其生育之時自然順生不用

忙也

產室

產室寒溫要適時嚴寒酷熱總非宜夏要清涼冬要煖病者醫人俱要知

註　產室之內四時俱要寒溫適中若太熱太寒均不相宜夏月必須清涼勿令炎熱致產母中暑暈迷倘有其事不妨少與涼水以解之冬月必須溫煖勿令寒冷以致血凝難產當多備火爐使產母腰背下身就火烘之此臨產之家及醫人皆當知之者也

擇收生婆

臨產穩婆須預擇老成歷練又精明無故莫教使手法寬心寧耐待時生

註　臨產之家必用收生婆須預先擇老成歷練明白經事之人無故切勿令其先使手法如試水探漿等事但囑令寬心寧耐以待生時可也

驚生

人語喧譁產母驚心虛氣怯號驚生急須止靜休
嘈雜產母心安胎自寧

註　產房之內不可多人人多則語聲喧譁產母
之心必驚驚則心氣虛怯至產時多致困乏
號曰驚生有如此者須急急摒出只留服役
一二人使寂靜而無嘈雜之聲則母心始安
安則其胎亦寧靜矣

試胎弄胎

月數未足腹中痛痛定如常名試胎臨月腹痛腰
不痛或作或止名弄胎二者均非正產候但須寧
靜莫疑猜

註　妊娠八九個月時或腹中痛痛定仍然如常
者此名試胎宜養血以安其胎若月數已足
腹痛或作或止腰不痛者此名弄胎不宜輕
動二者均非正產之時切勿躁擾疑惑惟宜
寧靜以待其時

坐草

坐草須知要及時兒身未順且遲遲若教產母用

力早逼胎不正悔難追

註　凡產婦坐草最要及時不可太早若兒身未順寧可遲遲寬心以待倘坐草太早非正產之時妄使產母用力往往逼胎不正遂至橫倒者有之雖悔無及矣

臨盆

兒身轉順頂當門胞漿已破腹腰疼中指跳動穀道挺迸臨盆用力送兒生

註　凡兒之生自有其時時至則兒身轉順頭頂正當產門胞漿大來腰重腹痛穀道挺迸產母中指中節跳動此方爲正產之時方可臨盆用力送兒自順生矣

交骨不開

交骨不開須細審或因不足或初胎總宜開骨通陰氣佛手龜板婦髮灰若因不足加參妙一服能令骨立開

註　產婦交骨不開有因氣血不足者有因初次胎產者二者均宜用開骨散通其陰氣其方

即佛手散加敗龜板與生過子女婦人頭髮也氣血不足者加人參服之可使其骨立開

盤腸生

盤腸未產腸先出已產嬰兒腸不收頂貼萆麻服升補腸乾潤以奶酥油

註　妊娠婦人有盤腸生者臨產之時其腸先拖出及兒已產下其腸有仍不收者須以萆麻仁搗爛貼於頂心內服升補之劑如補中益氣湯或八珍十全大補等湯加升麻以升補之其腸自收矣

補中益氣湯

十全大補湯　方俱見首卷

難產

難產之由不一端胎前安逸過貪眠驚恐氣怯用力早胞破血壅血漿乾

註　妊娠難產之由非只一端或胎前喜安逸不耐勞碌或過貪眠睡皆令氣滯難產或臨產驚恐氣怯或用力太早則產母困乏難產或

胞傷血出血壅產路或胞漿破早漿血乾枯皆足以致難產臨産詳證之工不可不審也

產後門

胞衣不下證治

胞衣不下因初產用力勞乏風冷凝下血過多產路澁血入胞衣腹脹疼急服奪命没竭散勿使冲心喘滿生諭令穩婆隨胎取休驚產母莫教聞

註　產婦胞衣不下者或因初產用力困乏風冷相干致血瘀凝或因下血過多血枯產路乾澁或血入胞衣脹滿疼痛皆能使胞衣不下均當急用奪命散即没藥血竭二味爲散也

免致上攻心胸脹滿喘急爲害不小且宜諭令穩婆隨胎取下莫使產母聞之恐被驚則愈難下也

產門不閉證治

產門不閉由不足初產因傷必腫疼不足十全大補治甘草湯洗腫傷平

註　凡產後玉門不閉者多由氣血不足所致亦有因初產傷重者必腫而疼也氣血不足者用十全大補湯治之因傷腫痛者濃煎甘草湯洗之其腫傷自平

十全大補湯　方見首卷

血暈證治

清魂散

產後血暈惡露少面脣俱白乃屬血脫不須疑虛用清魂荊芥穗人參芎草澤蘭隨腹痛停瘀佛手散醋漆薰法總和宜

註　產後血暈有因惡露去少內有停瘀上攻迷暈者面脣必赤色有因去血過多血脫而暈

者面脣必色白血弱者宜用清魂散即荆芥穗人參川芎甘草澤蘭葉也若停瘀腹痛者用佛手散二者俱宜頻燒乾漆及用火燒鐵釘淬醋不時薰之

佛手散 方見首卷

惡露不下證治

惡露不下是何因風冷氣滯血瘀凝若還不下因無血面色黃白不脹疼風冷血凝失笑散去多聖愈補而行

註 產後惡露不下有因風冷相干氣滯血凝而不行者必腹中脹痛有因產時去血太多無血不行者面色必黃白腹必不疼以此辨之

血凝者用失笑散逐而行之無血者用聖愈湯補而行之

失笑散

聖愈湯 方俱見首卷

惡露不絕證治

惡露不絕傷任衝不固時時淋漓行或因虛損血

不攝或因瘀血腹中停審色汚淡臭腥穢虛補實攻要辨明虛用十全加膠續瘀宜佛手補而行

註　產後惡露乃裹兒汚血產時當隨胎而下若日久不斷時時淋漓者或因衝任虛損血不收攝或因瘀行不盡停留腹內隨化隨行者當審其血之色或汚濁不明或淺淡不鮮或臭或腥或穢辨其爲實爲虛而攻補之虛宜十全大補湯加阿膠續斷以補而固之瘀宜佛手散以補而行之

十全大補湯

佛手散　方俱見首卷

頭疼證治

產後頭疼面黃白無表無裏血虛疼惡露不行兼腹痛必因瘀血上攻冲逐瘀芎歸湯最效虛用八珍加蔓荊

註　產後頭疼若面色黃白無寒熱身痛之表證又無便秘之裏證則是因產後去血過多血虛頭痛也若惡露不行兼腹痛者乃屬瘀血

上攻之痛也去瘀以芎歸湯補虛以八珍湯加蔓荆子

八珍湯 方見首卷

心胃痛證治

大巖蜜湯

心痛厥逆爪青白寒凝大巖蜜溫行四物去芎加獨活薑桂茱萸草遠辛因食惡食多嘔吐麵麥香砂入二陳大便燥結小便赤兼熱飲冷玉燭攻

註 產後心胃痛若四肢厥逆爪甲青白乃風冷寒凝氣血滯澁宜用大巖蜜湯溫以行之即生地當歸赤芍獨活乾薑桂心吳茱萸甘草遠志細辛也若因飲食停滯中脘作痛必惡食嘔吐宜二陳湯加神麵麥芽木香砂仁若大便結硬小便赤澁渴欲飲冷者乃內有實熱也宜玉燭散攻之

玉燭散 方見首卷

腹痛證治

香桂散

去血過多血虛痛去少壅瘀有餘疼傷食惡食多脹悶寒入胞中見冷形血虛當歸建中治瘀壅失笑有奇功傷食異功加查麴胞寒香桂桂歸芎

註　產後腹痛若因去血過多而痛者爲血虛痛若因惡露去少及瘀血壅滯而痛者爲有餘疼若因傷食而痛者必惡食脹悶若因風寒乘虛入於胞中作痛者必見冷痛形狀血虛宜當歸建中湯血瘀宜失笑散傷食宜異功散加山查神麴胞寒宜香桂散卽佛手散加桂心也

當歸建中湯

失笑散

異功散方俱見首卷

少腹痛證治

延胡索散

少腹痛微名兒枕硬痛尿利血瘀疼尿澁淋痛蓄水證紅腫須防癤疝癰兒枕瘀血延胡散歸芍蒲桂琥珀紅蓄水須用五苓散癤疝吳萸溫散行

註　產後少腹痛其痛若微乃產時血塊未淨名兒枕痛若少腹堅硬小便利者爲瘀血痛少腹硬而小便不利淋瀝脹痛者乃蓄水作痛若堅硬紅腫而痛者須防成癰疽瘡之證因兒枕瘀血者宜延胡索散卽當歸赤芍蒲黃肉桂琥珀紅花也因水蓄者宜五苓散若將成癰疽瘡者當以吳茱萸湯温散之

吳茱萸湯　方見首卷

五苓散　方見三卷

脇痛證治

脇痛瘀滯犯肝經左血右氣要分明血用延胡散可治氣宜四君加柴青去血過多屬虛痛八珍加桂補其榮

註　產後脇痛因氣血瘀滯干犯肝經在左多屬血在右多屬氣血宜延胡索散氣宜四君子湯加柴胡青皮若因去血過多而痛者爲虛痛宜八珍湯加肉桂以補其榮血自愈

八珍湯方俱見首卷

腰痛證治

腰疼下注兩股痛風冷停瘀滯在經佛手散加獨活桂續斷牛膝桑寄生血多三陰傷氣血地黃桂附續杜壽

註　產後腰疼下注兩股皆痛者乃產時風冷乘之瘀血滯於肝經宜用佛手散加獨活肉桂續斷牛膝防風桑寄生以温散而行之若因去血過多三陰經氣血虧損者則當用六味地黃湯加肉桂附子續斷杜仲以温補之

佛手散

六味地黃湯方俱見首卷

偏身疼痛證治

趁痛散

產後身疼榮不足若因客感表先形趁痛散用歸耆术牛膝甘獨蘿桂心血瘀面唇多紫脹四物秦艽桃没紅

註　產後偏身疼痛多因去血過多榮血不足或

因風寒外客必有表證二者俱宜用趁痛散
即當歸黃耆白朮牛膝甘草獨活薤白桂心
也若面唇紫色身脹痛者必是停瘀所致宜
用四物湯加秦艽桃仁沒藥紅花以行之

四物湯 方見首卷

腹中塊痛證治

產後積血塊冲疼多因新產冷風乘急服延胡散
可逐日久不散血瘕成更有寒疝亦作痛吳萸溫
散不須攻

註產後腹中有塊堅硬攻痛多因新產之後風
冷乘虛而入以致瘀血凝結宜服延胡索散
以逐之若遲久不散必結成血瘕矣又有寒
疝之證亦在少腹中攻築而痛此屬寒氣滯
澁宜用吳茱萸湯溫散其寒自愈不必攻也

吳茱萸湯 方見首卷

筋攣證治

產後筋攣雞爪風血虧液損復乘風無汗養榮兼
散邪四物柴瓜桂釣藤有汗八珍加桂枝黃耆阿

膠大補榮

註　產後筋衄拘攣疼痛不能舒展俗名雞爪風皆由產後血液虛敝損不能榮筋又被風乘故令拘攣疼痛也無汗者宜於養榮之中兼祛外邪用四物湯加柴胡木瓜桂枝釣藤若有汗者宜八珍湯加桂枝黃耆阿膠以大補其榮血可也

四物湯

八珍湯 方俱見首卷

傷食嘔吐證治

產後傷食心下悶惡食嘈雜吞吐酸六君查麵香砂共嘔逆痰涎二陳煎

註　產後過食肉麵傷於飲食者必心胸飽悶惡聞食氣懊憹嘈雜吞酸吐酸宜用六君湯加山查神麵香附縮砂以補而消之若更嘔逆痰涎兼飲宜二陳湯加減調治

六君子湯 見三卷

二陳湯 見首卷

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

產後呃逆胃虛寒丁香白蔻伏龍肝桃仁吳萸湯

冲服不應急將參附添熱渴面紅小便赤竹茹乾

柿橘紅煎

註　產後呃逆皆因氣血兩傷脾胃虛寒中焦之氣厥而不順所致宜服丁香豆蔻散卽丁香白豆蔻伏龍肝爲末也用桃仁吳茱萸煎湯冲服如不效當以參附湯峻補之若發熱面紅小便赤色屬熱實者宜用竹茹乾柿橘紅煎服之名茹橘飲

氣喘證治

二味參蘇飲

產後氣喘爲危候血脫氣散參附煎敗血上攻面紫黑二味參蘇奪命亦殛

註　產後氣喘極危證也因下血過多榮血暴竭衛氣無倚孤陽上越宜驟補其氣用參附煎

湯不時飲之若因惡露不行敗血上攻於肺而喘者必面色紫黑宜奪命散下瘀瘀去喘自定虛者參蘇飲即人參一兩爲末蘇木二兩煎湯冲服也

浮腫證治

枳术湯

小調中湯

產後腫分氣水血輕浮脹滿氣之形水腫喘嗽小便澁皮如熟李血之情氣腫枳术湯最效水腫茯苓導水靈血腫調中歸芍木茯陳煎冲小調經歸芍珀麝辛桂没理氣調榮瘀血行

註　產後浮腫由於敗血乘虛流入經絡血化爲水故令浮腫然有氣腫水腫之別不可不辨也若輕虛浮腫心胸脹滿者因素有水飲所作名曰氣分也宜用枳术湯即枳實白术煎湯服之若喘嗽小便不利者則爲水腫宜茯苓導水湯利之若皮如熟李或偏身青腫者則爲血分宜小調中湯治之其方即當歸白

芍藥白朮茯苓陳皮煎湯冲小調經散服之

即當歸赤芍琥珀麝香細辛肉桂心沒藥也

茯苓導水湯 方見三卷

發熱總括

產後發熱不一端內傷飲食外風寒瘀血血虛與勞力三朝蒸乳亦當然陰虛血脫陽外散攻補温涼細細參

註

產後發熱之故非止一端如食飲太過胸滿嘔吐惡食者則爲傷食發熱若蚤起勞動感受風寒則爲外感發熱若惡露不去瘀血停留則爲瘀血發熱若去血過多陰血不足則爲血虛發熱亦有因產時傷力勞乏發熱者三日蒸乳發熱者當詳其有餘不足或攻或補或用涼藥正治或用温熱反治要在臨證細細參考也

發熱證治

加味四物湯

加味異功散

生化湯

產後發熱多血傷大法四物加炮薑頭疼惡寒外感熱四物柴胡葱白良嘔吐脹悶傷食氣異功查麵厚朴薑脾不化食六君子瘀血腹痛生化湯當歸川芎丹參共桃仁紅花炮乾薑

註　產後發熱多因陰血暴傷陽無所附大法宜四物湯加炮薑從陰引陽爲正治若頭疼惡寒而發熱者屬外感不當作傷寒治惟宜用四物加柴胡葱白服之若嘔吐脹悶屬傷食若倦怠氣乏者屬傷氣宜用異功散加山查神麵厚朴生薑治之若因脾虛不能化食而停食發熱者宜六君子湯若因瘀血發熱者必兼腹痛宜用生化湯即當歸川芎丹參桃仁紅花薑炭也

六君子湯

異功散

四物湯　方俱見首卷

勞力發熱用十全氣血兩虛八珍痊血脫躁熱補

血效虛陽外越參附前煎

註　產後發熱因產時用力勞乏者宜十全大補湯氣血兩虛者八珍湯去血過多血脫煩躁乾渴面赤而熱者宜當歸補血湯若陰血暴脫孤陽無附而外越發熱者急進參附湯遲則必大汗大喘是陽欲亡雖藥必無救矣

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯　方俱見首卷

寒熱總括

寒熱往來遞更換乍寒乍熱時寒寒熱似瘧按時發壯熱憎寒畏寒不同其證亦異當先明辨之

註　產後寒熱名既不同其證亦異當先明辨之如曰寒熱往來者謂寒去熱來熱去寒來遞相更換也曰乍寒乍熱者謂有時寒有時熱寒熱無定時也曰寒熱似瘧者謂或先寒後熱或先熱後寒一定不移至其時而始作也曰壯熱憎寒者謂其身既壯熱而復時時畏

寒也

往來寒熱陰陽格時熱時寒榮衛乖寒熱似瘧瘀兼食壯熱憎寒帶表推

註　產後血氣虛損陰陽不和則寒熱往來陰陽相乘榮衛不調則時寒時熱敗血不散飲食停滯則寒熱似瘧汗出遇風則壯熱憎寒有諸內自形諸外辨之既明然後治無不愈矣

寒熱證治

往來寒熱陰陽格柴胡四物各半湯榮衛不和乍寒熱歸芍芎參甘草薑寒熱似瘧瘀兼食生化柴胡查麴良憎寒壯熱更生散歸地芎參荊穗薑

註　產後陰陽不和往來寒熱者宜柴胡四物湯若榮衛不調乍寒乍熱者用憎損四物湯其神麴若感受風寒憎寒壯熱者宜更生散即方即當歸白芍川芎人參甘草乾薑也若停瘀兼食寒熱似瘧者用生化湯加柴胡山查當歸熟地川芎人參荊芥穗乾薑也

柴胡四物湯　方見首卷

自汗頭汗總括

產後陰虛陽氣盛微微自汗却無妨頭汗陰虛陽上越周身大汗是亡陽

註　產後血去過多則陰虛陰虛則陽盛若微微自汗是榮衛調和故雖汗無妨若周身無汗獨頭汗出者乃陰虛陽氣上越之象也若頭身俱大汗不止則恐有亡陽之慮矣

自汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

虛熱上蒸頭汗出治用當歸六黃湯黃芩連蘗炒黑用歸耆生熟二地黃自汗黃耆湯牡蠣耆术芩甘麥地防大汗不止陽外脫大劑參附可回陽

註　產後亡血陰虛陽熱上蒸頭上汗出至頸而還者宜當歸六黃湯即黃連黃芩黃蘗當歸黃耆生地熟地也內芩連蘗三味俱炒黑用若自汗太甚宜黃耆湯即牡蠣粉黃耆白术茯苓甘草麥冬熟地防風也若陰血大脫孤

陽外越大汗不止非大劑參附不能回陽也

中風證治

產後中風惟大補火氣風痰未治之十全大補爲主劑臨證詳參佐使宜

註　產後氣血大虛雖患中風惟宜大補卽有火熱風痰氣閉亦當未治總以十全大補湯主之臨證詳參其火氣風痰而佐使之

十全大補湯　方見首卷

痙病證治

加味八珍湯

新產血虛多汗出易中風邪痙病成口噤項强身反折八珍者附桂防風搖頭氣促寒不止兩手撮空莫望生

註　產後血氣不足藏府皆虛多汗出腠理不密風邪乘虛襲入遂成痙證手三陽之筋結於頷頰風入頷頰則口噤陰陽經絡周環於身風中經絡則頭項肩背强直如角弓反張之狀產後患此皆屬虛象惟宜用八珍湯加黃

者附子肉桂大補其陰陽少佐防風以治之
若見頭搖喘促汗出不止兩手撮空者則爲
眞氣去邪氣獨留必死之候故曰莫望生也

八珍湯方見首卷

瘈瘲抽搐證治

加味八珍湯

陰血去多陽氣熾筋無所養致抽搐發熱惡寒煩
又渴八珍丹地釣藤鈎抽搐無力戴眼折大汗不
止命將休

註

產後血去太多陽氣熾盛筋無所養必致瘈
瘲抽搐發熱惡寒心煩口渴不宜作風治惟
當氣血兼補用八珍湯加丹皮生地釣藤鈎
治之若無力抽搐戴眼反折大汗不止者則
爲不治之證故曰命將休也

八珍湯方見首卷

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

產後不語分虛實痰熱乘心敗血衝氣血兩虛神鬱胃實少虛多要辨明虛用八珍簫菖志痰熱星連入二陳敗血衝心七珍散芎地辛防硃蒲參

註

產後不語須分虛實治之有痰熱乘心者有敗血衝心者有氣血兩虛而鬱胃神昏者大抵產後屬虛者多而實者少也虛宜八珍湯加釣藤菖蒲遠志痰熱宜二陳湯加膽星黃連敗血冲心宜七珍散卽川芎生地細辛防風硃砂菖蒲人參也

八珍湯方見首卷

二陳湯方見三卷

御纂醫宗金鑑婦科心法要訣

卷四十八

T7910/7388

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
OCT 11 1932

ChL 7918.7638

卷四十八

產後諸證

49

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣目錄

驚悸恍惚證治
茯神散
加味歸脾湯
妄言見鬼發狂證治
妙香散
小調經散
虛煩證治

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

人參當歸湯
當歸補血湯
失笑散
發渴證治
參麥飲
加味四物湯
竹葉歸耆湯
四物湯
欬嗽證治
旋覆花湯
麥味地黃湯
加味佛手散
六味地黃湯
衄血證治
人參澤蘭葉湯
痢證總括
痢疾證治
槐連四物湯

芍藥湯
眞人養藏湯
四物湯
十全大補湯
人參敗毒散
香連丸
加味四物湯
四物湯

瘧疾

加味生化湯
加味二陳湯
藿香正氣湯
生化湯
二陳湯

蓐勞虛羸總括

蓐勞虛羸證治

三合散
六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養勞湯

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散

大便秘結

小便淋閉

加味四物湯

四物湯

小便頻數不禁淋瀝

黃耆當歸散

加味地黃湯

補中益氣湯

六味地黃湯
大便出血
加味芩連四物湯
芩連四物湯
歸脾湯
補中益氣湯
敗血成癰
加味生化湯
生化湯

產後虛實宜審

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣

驚悸恍惚證治

茯神散

加味歸脾湯

產後血虛心氣弱驚悸恍惚不安寧養心須用茯神散參耆地芍桂茯神琥珀龍齒歸牛膝憂思歸脾砂齒靈

註　產後血虛心氣不守神志怯弱故令驚悸恍

惚不寧也宜用茯神散其方乃人參黃耆熟地白芍桂心茯神琥珀龍齒當歸牛膝也若因憂愁思慮傷心脾者宜歸脾湯加硃砂龍齒治之

歸脾湯 方見首卷

妄言見鬼發狂證治

妙香散

產後譫狂見鬼神敗血冲心小調經心虛悶亂妙香散二茯參耆遠志辰甘桂木麝山藥末歸地煎調效若神

註 產後敗血冲心狂亂見鬼譫言妄語者宜服小調經散若因心血虛神不守舍而悶亂者則用妙香散即茯苓茯神人參黃耆遠志辰砂甘草桔梗木香麝香山藥爲散以當歸熟地煎湯調服即愈其效如神

虛煩證治

人參當歸湯

產後血虛煩短氣人參當歸湯最良參麥歸芍熟

地桂瘀血衝心失笑方去血過多煩躁甚須用當歸補血湯

註　產後血虛心煩短氣者宜人參當歸湯卽人參麥冬當歸白芍熟地肉桂也若因敗血冲心者宜服失笑散若去血過多煩而躁者乃亡血證也宜當歸補血湯

當歸補血湯

失笑散　方俱見首卷

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

氣虛津短參麥飲血虛四物粉麥煎渴甚竹葉歸耆效參朮歸耆竹葉甘

註　產後氣虛津液不足而渴者宜參麥飲卽人參麥冬五味子也血虛而渴者宜四物湯加花粉麥冬若渴甚子解者用竹葉歸耆湯其方乃人參白朮當歸黃耆竹葉甘草煎服也

四物湯方見首卷

欬嗽證治

旋覆花湯

麥味地黃湯

加味佛手散

產後欬嗽感風寒旋覆花湯荊穗前麻杏半苓赤芍藥五味甘草棗薑煎虛火上炎冲肺嗽麥味六黃滋化源瘀血入肺佛手散加入桃紅杏貝延

註　產後欬嗽若因起動太蚤感冒風寒者用旋覆花湯即荊芥穗前胡麻黃杏仁半夏茯苓赤芍藥五味子甘草旋覆棗薑也若因陰虛火炎上肺而嗽者宜六味地黃加麥冬五味子名麥味地黃湯滋其化源若因瘀血上冲入肺而嗽者宜佛手散加桃仁紅花杏仁川貝母延胡索以破其瘀其嗽自愈

佛手散方俱見首卷

衄血證治

六味地黃湯

人參澤蘭葉湯

產後口鼻黑而衄胃絕肺敗藥難醫參蘭丹膝生熟地童便多冲冀萬一

註　產後惡露不下虛火載血上行溢出鼻竅不循經衄變黑色見於口鼻爲熱極反兼水化故曰胃絕肺敗藥難醫也或用人參澤蘭葉湯即人參澤蘭葉丹皮牛膝生地熟地煎湯多冲童便飲之間有得生者然亦希冀於萬一者耳

痢證總括

產後痢名產子痢飲食生冷暑寒干裏急後重有餘病日久滑脫不足看赤黃稠黏多是熱清澈鴨溏定屬寒寒熱温清調補澁虛實新久要詳參

註　產後痢者名產子痢多因飲食不調貪食生冷或起居不慎衝寒受暑所致若腹中疠痛裏急後重者屬有餘之證若日久虛寒滑脫者屬不足之證痢色黃赤稠黏多屬於熱清稀澄澈如鴨糞者則屬於寒治之之法熱者

清之寒者温之冷熱不和者調之虛者補之實者瀉之虛實新久之間宜細心詳參也

痢疾證治

槐連四物湯

芍藥湯

眞人養藏湯

熱痢槐連四物效冷熱有餘芍藥湯芍藥苓連歸木草枳桂墜梹痛大黃虛寒滑脫參朮桂芍藥訶蔻廣木香甘草粟殼名養藏日久十全大補良

註熱者清之故熱痢宜槐連四物湯即四物湯加槐花黃連以清熱而堅腸也冷熱不和者調之故宜芍藥湯即白芍藥黃芩黃連當歸木香甘草肉桂梹榔加生大黃也若虛寒滑脫則宜温補而固澁之宜眞人養藏湯即人參白朮白芍藥肉桂肉豆蔻訶子木香甘草罌粟殼同煎服也若日久不止氣血大虛宜十全大補湯補之

四物湯

十全大補湯 方俱見首卷

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

有表痢用敗毒散羌獨枳梗共柴前參苓芎草薑葱引暑濕成痢用香連血滲大腸成血痢四物膠榆餘鯽添

註 外感風寒成痢者宜人參敗毒散卽羌活獨活枳殼桔梗柴胡前胡人參茯苓川芎甘草薑葱引也若因暑濕致痢宜香連丸卽黃連木香爲丸也若敗血滲入大腸成血痢者宜四物加阿膠地榆血餘烏鯽魚骨服之

四物湯 方見首卷

瘧疾

加味生化湯

加味二陳湯

藿香正氣湯

產後瘧多因瘀血榮衛不和熱又寒生化湯中加

柴甲痰食二陳查朴添外感不正正氣散陳半苓
术蘇朴甘腹皮桔梗藿香芷引加薑棗一同煎

註　產後患瘧多因瘀血停留榮衛不和故寒熱
往來也宜用生化湯加柴胡鱉甲服之若因
痰飲食積者宜二陳湯加山查厚朴若果外
感風寒方可用藿香正氣散治之其方即陳
皮半夏茯苓白术蘇葉厚朴甘草大腹皮桔
梗藿香白芷也

二陳湯　方見三卷

蓐勞虛羸總括

產後失調氣血弱風寒外客內停瘀飲食過傷兼
勞怒不足之中挾有餘寒熱往來臍腹痛懶食多
眠頭暈迷骨蒸盜汗痰嗽喘面黃肌瘦力難支蓐
勞先須調脾胃後調榮衛補其虛

註　產後氣血兩虛起居不慎風寒外襲瘀血內
停更或飲食厚味過傷憂勞忿怒乃不足之
中挾有餘之證致生寒熱往來臍腹脹痛懶
進飲食喜眠卧起則頭暈昏迷骨蒸潮熱盜

汗自汗痰喘咳嗽面色萎黃肌肉削瘦氣力難支名爲蓐勞醫治甚難凡欲療斯疾者必當先調理其脾胃使飲食強健能勝藥力然後調其榮衛補其虛損始能痊愈

蓐勞虛羸證治

三合散

扶脾益胃六君子穀化精微氣血強能食漸覺精神爽調衛和榮三合良八珍去术小柴共隨證加減效非常病退虛羸補氣血八珍十補養榮方

註產後蓐勞治法當先扶脾益胃宜六君子湯加減用之使脾胃強壯能食能消則後天水穀之氣化生精微氣和其榮血宜三合散即漸爽然後調其衛氣八珍湯去白术加小柴胡湯乃人參柴胡黃芩半夏甘草也隨證加減治之如寒熱往來膿腹脹痛則去人參黃芩生地加延胡桃仁如懶食喜睡頭眩則去柴胡加黃耆縮砂陳皮如骨蒸盜汗自汗則去川芎柴胡加鱉甲

地骨皮牡蠣如痰喘咳嗽則去人參柴胡加
麥冬川貝母百合如面黃肌瘦乏力則去柴
胡川芎加黃耆倍用人參臨證消息之服後
如諸證已痊惟覺虛羸者則以八珍十全養
榮等方培補之

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養榮湯　方俱見首卷

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

產後亡血更血崩血脫氣陷病非輕十全大補膠
升續棗仁山萸薑炭尋若因暴怒傷肝氣逍遙梔
地白茅根瘀停少腹多脹痛佛手失笑效如神

註　產後陰血已亡更患崩證則是血脫氣陷其
病非輕當峻補之宜用十全大補湯加阿膠
升麻續斷棗仁山萸炮薑炭以升補其脫陷

可也若因暴怒傷肝血妄行者宜逍遙散加
黑梔生地白茅根以清之若因內有停瘀者
必多小腹脹痛當用佛手散失笑散以補而
逐之

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散 方俱見首卷

大便秘結

產後去血亡津液胃燥腸枯大便難飲食如常無所苦不須妄下損眞元量其虛實通利導血旺津回聽自然

註 產後去血過傷其津液多致胃燥腸枯故令大便秘結若飲食如常無脹滿之苦者不宜輕下反傷元氣惟宜量其虛實用諸導法待血旺津回大便自然順利也

小便淋閉

加味四物湯

產後淋閉腹脹痛熱邪挾血滲胞中四物蒲黃桃仁膝滑石甘草木香通

註　產後熱邪挾瘀血流滲胞中多令小便淋閉宜四物湯加蒲黃瞿麥桃仁牛膝滑石甘草稍木香木通治之

四物湯　方見首卷

小便頻數不禁淋瀝黃者當歸散

加味地黃湯

產後小便數且白腎虛不固自遺尿因產傷胞多淋瀝頻數補中益氣宜胞傷黃者當歸治參者朮芍草當歸不禁六味加桂附益智螵蛸補骨脂

註　產後氣虛下陷多令小便頻數而色白腎虛不固小便自遺因產時穩婆不慎傷其胞脬多致小便淋瀝氣虛頻數者宜補中益氣湯升舉之傷胞淋瀝者宜黃耆當歸散補之其方即黃耆當歸人參白朮白芍甘草也引用豬草胞同煮服腎虛遺尿不禁者宜六味地

黃湯加肉桂附子名桂附地黃湯更加益智仁桑螵蛸補骨脂治之

補中益氣湯

六味地黃湯 方俱見首卷

大便出血

加味芩連四物湯

產後便血大腸熱四物芩連酒炒黑地榆阿膠荊穗炒蜜製升麻棕櫚灰脾虛不攝歸脾效氣虛下陷補中宜

註產後大便出血有因大腸經熱者宜芩連四物湯黃芩黃連俱酒炒黑用更加地榆阿膠荊芥穗微炒蜜製升麻棕櫚皮灰治之若因脾虛不能攝血者宜歸脾湯中氣下陷者補中益氣湯

芩連四物湯

歸脾湯

補中益氣湯 方俱見首卷

敗血成癰

加味生化湯

榮氣不從逆肉理敗血留內發癰疽只用生化加連翹銀花甘草乳沒宜切勿敗毒施過劑致令潰腐必難醫

註　產後氣血兩虛榮氣不從逆于肉理或敗血留內結成癰疽者只宜用生化湯加連翹金銀花甘草節乳香沒藥治之切不可用寒涼敗毒之藥恐潰後腐爛必難醫治

產後虛實宜審

震亨產後惟大補從政莫作不足看二說須合形證鮓攻補虛實仔細參詳

註　朱震亨云產後氣血兩虛惟宜大補雖有他證以未治之張從政云產後慎不可作諸虛不足治之二說各有偏處當合形證鮓三者

產後門彙方

開骨散

當歸五錢　龜板三錢

醋炙研

川芎二錢　婦人髮一團

水煎服

奪命散

没藥　血竭各等分

右研爲細末纔產下便用童便細酒各半盃調一二錢良久再服其惡血自下

行便不衝上免生百疾

清魂散

澤蘭葉　人參各二錢

川芎五錢　荆芥穗一兩

甘草二錢　炙

右爲末用温酒熱湯各半盃調一錢灌之下咽眼卽開氣定卽醒

大巖窒湯

當歸　熟地

白芍各二錢　乾薑

肉桂各一錢　吳茱萸

獨活　遠志炙

細辛
右水煎服
香桂散
當歸　甘草　各八分　炙
川芎　各等分
右爲末酒調服
延胡索散
當歸　肉桂
生蒲黃　赤芍
桂心

琥珀
延胡索　各等分
右以好醋浸一宿焙乾爲末每服二錢酒調
趁痛散
當歸　官桂
白朮　黃耆
獨活　牛膝
生薑　各五錢　甘草　炙
薤白　各三錢半　桑寄生五錢
紅花

右咬咀每服五錢水煎服

丁香豆蔻散

公丁香　白豆蔻仁

伏龍肝各等分

右爲末生薑湯點服

茹橘飲

竹茹　橘紅各三錢

乾柿一枚

水薑煎服

參附湯

人參一兩　附子五錢炮

右作一服薑棗水煎徐徐服

去人參加黃耆名耆附湯

二味參蘘飲

人參一兩爲末　蘘木二兩

右以蘘木煎湯冲人參末服

枳术湯

枳實二兩炒　白术二兩土炒

水薑煎服

小調中湯

茯苓　當歸

白芍　陳皮各一錢

白朮一錢五分

右作一劑煎湯服

小調經散

白芍　當歸

沒藥　琥珀

桂心各一錢　細辛

麝香各五分

右爲細末每服五分薑汁温酒各少許調服

更生散

當歸　生地

川芎　人參各二錢

荆芥穗三錢　乾薑八分

炮

水煎服

當歸六黃湯

當歸
黃耆 各二錢 炙
黃蘗 炒黑
黃連 各一錢 炒黑
右水煎服

黃耆湯
黃耆 三錢 炙
白朮 二錢 土炒
麥冬 二錢
熟地 自製
生地
黃芩 炒黑
牡蠣粉 二錢
茯苓 一錢
熟地 三錢

防風 一錢
甘草 七分 炙
右加浮小麥一合煎服

七珍散
人參
生地
石菖蒲
細辛 一錢
川芎 各一兩
辰砂 各五錢 另研
防風
右爲細末每服一錢薄荷煎湯調服

茯神散

茯神一兩 去木　人參

黃耆 炙　赤芍

牛膝　琥珀

龍齒各一錢五分 研　生地一兩五錢

桂心 五錢　當歸二兩

右爲末每服三錢水煎服

妙香散

甘草五錢 炒　遠志 製去心

山藥 薑汁炙　茯苓

茯神 去木　人參

黃耆各一兩 炙

辰砂三錢 另研　麝香二錢 另研

木香一錢五分　桔梗各五錢

右爲細末每服二錢當歸熟地煎湯調下

參麥飲

人參　麥冬

右水煎服

人參當歸湯

人參
熟地
白芍　各二錢
桂枝一錢
右剉水煎服

竹葉歸耆湯
人參
當歸
竹葉二十片
白朮土炒
黃耆各二錢炙
甘草五分炙
麥冬
五味子三分

右剉水煎服

旋覆花湯
旋覆花
赤芍藥
荊芥穗
半夏麴
前胡
甘草炙
茯苓
五味子
杏仁去皮尖麩炒
麻黃各等分
右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至七分去滓食前溫服有汗不宜用

人參澤蘭葉湯

人參 五錢　澤蘭葉
丹皮　牛膝 各二錢
生地 三錢　熟地 五錢
藕節五枚煎冲童便服

槐連四物湯

當歸　川芎
赤芍藥　生地
槐花　黃連 各一錢 炒

御米殼五分 去蒂蜜炙
右剉水煎服

芍藥湯

芍藥 炒　當歸
黃連 各半兩 炒　檳榔
木香　甘草 各二錢 炙
桂二錢五分　黃芩 三錢 炒

右每服半兩水煎如不減加大黃此證又有因中氣虛弱脾氣鬱結者治當審察

眞人養藏湯

人參　白芍藥各二錢　白朮
肉桂　內豆蔻　訶子各一錢煨
木香　甘草
罌粟殼各八分

右剉薑棗煎服

人參敗毒散

羌活　獨活
柴胡　前胡各一錢五分
枳殼　桔梗
人參　茯苓各一錢
川芎八分　甘草五分

右剉薑葱煎服

香連丸

黃連十二兩淨　吳茱萸十兩去枝梗

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯炖一日同炒至黃連紫黃色去茱用連爲末

每末四兩入木香末一兩淡醋米飲爲丸梧
桐子大每服二三十丸滾湯下久痢中氣下
陷者用補中益氣湯下中氣虛寒者加薑桂

藿香正氣散

藿香 一錢五分　桔梗
大腹皮　紫蘇
茯苓　白朮 炒
白芷　半夏麴
陳皮　厚朴各一錢
甘草五分 炙

右剉加薑棗水煎服

三合散

當歸　白芍
茯苓　熟地各一兩
柴胡　人參各一兩五錢
黃芩　半夏 製
甘草各六錢　川芎一兩

右爲粗末每服一兩水一鍾半煎服日三

黃耆當歸散

人參　黃耆　白芍各三錢　白朮土炒　當歸　甘草八分

右剉薑棗水煎服

桂附地黃湯

熟地四錢　山萸肉　山葯各二錢　丹皮　澤瀉　茯苓各一錢五分　附子製　肉桂各一錢

右剉水煎服

囲生丹

錦紋大黃一觔爲末　蘇木三兩打碎用河水五碗煎汁三碗聽用

大黑豆三升水浸取殼用絹袋盛殼同豆煮熟去豆不用將殼晒乾其汁留用

紅花三兩炒黃色入好酒四碗煎三五滾去渣取汁聽用

米醋九觔陳者佳

將大黃末一觔入淨鍋下米醋三觔文火熬

之以長木筯不住手攪之成膏再加醋三勉
熬之又加醋三勉次第加畢然後下黑豆汁
三碗再熬次下蘇木汁次下紅花汁熬成大
黃膏取入瓦盆盛之大黃鍋耙亦鏟下入後
藥同磨

人參　當歸酒洗
川芎酒洗　香附醋炒
延胡索酒炒　蒼术米泔浸炒
蒲黃隔紙炒　茯苓

桃仁各一兩去皮尖油　川牛膝五錢酒洗
甘草炙　地榆酒洗
川羌活　廣橘紅
白芍各五錢酒炒　木瓜
青皮各三錢去穰炒　乳香
沒藥各二錢　益母草三兩
木香四錢　白术三錢米泔浸炒
烏藥二兩五錢去皮　艮薑四錢
馬鞭草五錢　秋葵子三錢

熟地一兩酒浸九次蒸曬如法製就三稜五錢醋浸透紙裹煨
五靈脂五錢醋煮化焙乾研細山萸肉五錢酒浸蒸搗
右三十味并前黑豆殼共晒爲末入石臼內下大黃膏拌勻再下煉熟蜜一觔共搗千杵取起爲丸每丸重二錢七八分靜室陰乾須二十餘日不可日晒不可火烘乾後只重二錢有零鑠蠟護之卽蠟丸也用時去蠟殼調服

御纂醫宗金鑑婦科心法要訣

卷四十九

T7910/7388

50

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE

OCT 11 1932

ChL 7918.7638

卷四十九

乳證

前陰諸證

雜證

50

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣目錄

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

湧泉散

乳汁自湧證治

兔懷散

麥芽煎

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

乳癰吹乳乳巖妬乳乳懸總括
乳癰證治
消毒飲
加味消毒飲
益氣養榮湯
吹乳證治
栝蔞散
外敷法
乳巖證治

十六味流氣飲
青皮甘草散
十全大補湯
八珍湯
歸脾湯
妬乳乳懸證治
鹿角散
連翹散
芎歸飲

前陰諸證門
陰腫證治
龍膽湯
薰洗法
騰熨法
陰痛證治
加味逍遙散
乳香四物敷法
逍遙散

四物湯
陰癢證治
桃仁雄黃膏
逍遙散
龍膽瀉肝湯
陰挺證治
蛇床洗法
藜蘆敷法
逍遙散

龍膽瀉肝湯

陰瘡證治

加味四物湯

四物湯

加味逍遙散

補中益氣湯

陰痔證治

烏頭薰法

逍遙散

歸脾湯

補中益氣湯

陰冷證治

溫中坐藥

桂附地黃丸

陰吹證治

膏髮煎

十全大補湯

交接出血證治

加味歸脾湯
桂心釜墨散
雜證門
熱入血室
加味小柴胡湯
刺期門法
清熱行血湯
血分水分總括
血分證治

加味小調經散
水分證治
茯苓導水丸
夢與鬼交證治
加味歸脾湯
歸脾湯
梅核氣證治
半夏厚樸湯
血風瘡證治

加味逍遙散
益氣養榮湯
臁瘡證治
桂附地黃丸
人參敗毒散
補中益氣湯
六味地黃丸
足跟痛證治
六味地黃丸

八珍湯

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

產後血虛乳汁少四物花粉不留行木通豬蹄湯熬服葱白煎湯乳房淋

註　產後乳汁不行因去血過多血少不行者宜四物湯加花粉王不留行木通豬蹄熬湯煎

藥服外用葱白煎湯時時淋洗乳房以通其氣

湧泉散

氣鮾壅塞乳脹痛湧泉散用白丁香王不留行天花粉漏蘆殭蠶豬蹄湯

註　產後乳汁不行因瘀血停留氣鮾壅滯者其乳必脹痛宜用湧泉散即白丁香王不留行花粉漏蘆殭蠶豬蹄湯煎服也

乳汁自湧證治

兎懷散

麥芽煎

產後乳汁暴湧出十全大補倍參者食少乳多欲迴乳兎懷紅花歸芎膝無兒食乳乳欲斷炒麥芽湯頻服宜

註　產後乳汁暴湧不止者乃氣血大虛宜十全大補湯倍用人參黃耆若食少乳多欲迴其乳者宜兎懷散即紅花歸尾赤芍牛膝也若無兒食乳乳者用麥芽炒熟熬湯作茶

飲之

乳證總括

乳房忽然紅腫痛往來寒熱乳癰成乳被兒吹因結核堅硬不通吹乳名妬乳細長垂痛乳懸稱潰乳巖凶乳頭生瘡名乳癌也若乳兒之時乳被兒口

註　婦人乳房忽然紅腫堅硬疼痛增寒壯熱頭痛者此欲成乳癰也若乳兒口中氣吹以致乳管不通結核者名曰吹乳更有乳內結核如圍棋子不腫不痛但堅硬不

散日久內潰者謂之乳巖其證甚凶若乳頭生小細瘡痛者爲妬乳若瘀血上攻乳房忽然細小下垂長過於腹此名乳懸惟產後有之

乳癰證治

消毒飲

乳癰初起消毒飲青芷歸柴浙貝蠶花粉艮花甘草節寒熱荊防羌獨添膿成皂刺穿山甲潰後益氣養榮煎

註　乳癰乃陽明厥陰二經風熱壅盛初起宜服消毒飲卽靑皮白芷當歸柴胡浙貝母殭蠶花粉金銀花甘草節也若兼增寒壯熱者加荆芥防風羌活獨活以解散之若服後不消其膿已成者宜加皂角刺穿山甲以穿發之若潰後氣血虛者宜益氣養榮湯培補之他如潰久膿清不斂又須急服大劑參耆桂附益氣養榮湯方見前首卷彙方內矣

吹乳證治

栝蔞散

外敷法

吹乳結核栝蔞散乳没歸甘用酒熬更加皂刺名立效已成膿潰未成消外敷星夏蠶芷刺草烏爲末蜜葱調

註　吹乳結核不散者當早消之久則成癰宜用栝蔞散卽栝蔞實乳香没藥當歸甘草酒熬服也若服後不散者加皂角刺名立效散膿

成者潰未成者消外用南星半夏殭蠶白芷
皂角刺草烏爲末用葱汁合蜜調敷

乳巖證治

十六味流氣飲

青皮甘草散

乳巖鬱怒損肝脾流氣飲歸芍參耆芎防蘇芷枳
桔草檳榔烏樸桂通隨外熨木香生地餅青皮甘
草服無時潰後不愈須培補十全八珍或歸脾

註　乳巖之證初起結核如圍棋子大不痛不癢
五七年或十餘年從內潰破嵌空玲瓏洞窾
深陷有如山巖故名乳巖皆緣抑鬱不舒或
性急多怒傷損肝脾所致宜速服十六味流
氣飲其方即當歸白芍人參黃耆川芎防風
蘇葉白芷枳殼桔梗甘草檳榔烏藥厚樸官
桂木通外以木香生地搗餅以熱器熨之且
不時以青皮甘草爲末煎濃薑湯調服戒七
情遠葷味解開鬱怒方始能愈若潰後久不
愈惟宜培補其氣血或十全大補湯八珍湯

歸脾湯選用之

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯方俱見首卷

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

妬乳甘草鹿角散雞子黃調炙敷之連翹散防升元芍斂射消黃甘杏宜瘀血上攻乳懸證芎歸湯飲更薰臭不應草麻貼頂上乳收卽去莫遲遲

註　乳頭生瘡謂之妬乳宜鹿角散敷之卽鹿角甘草爲末雞子黃調銅器內炙敷之內服連翹散卽防風升麻元參白芍白斂射干芒消大黃甘草杏仁也若產後瘀血上攻兩乳細長下垂過腹者謂之乳懸宜濃煎芎歸湯不時飲之以其餘藥薰臭則瘀散乳卽上升如不上者更以草麻仁搗貼頂心收卽去之

芎歸飲　卽佛手散方見首卷

乳證門彙方

消毒飲

青皮　白芷
當歸　柴胡
浙貝母　殭蠶
花粉　金銀花
甘草節各等分

右剉水煎服

栝蔞散

栝蔞　乳香
沒藥　當歸
甘草各等分

右爲末酒煎服加皂角刺名立効散

十六味流氣飲

當歸　白芍
人參　黃耆各二錢
川芎　防風
蘇葉　白芷

枳殼　桔梗　各一錢
甘草　檳榔　各五分
烏藥　厚樸
官桂　木通　各八分
右剉每服五錢水煎服

青皮甘草散

青皮　甘草　各一錢
右爲末煎濃薑湯調服

鹿角散

鹿角　甘草　各等分
右爲末雞子黃調銅器內炙敷之

連翹散

防風　元參　各二錢
白斂　芒消
大黃　射干　各一錢
升麻五分　白芍　一錢
甘草五分　杏仁　二十粒
右剉薑水煎服

加味四物湯

當歸　白芍
熟地　川芎
花粉　王不留行炒
木通各二錢

右豬蹄熬湯煎藥服

湧泉散

白丁香　王不留行
花粉　漏蘆各一錢

右豬蹄湯煎服

兔懷散

紅花　赤芍
歸尾　牛膝各二錢

右剉水煎服

麥芽煎

麥芽三兩

右一味水煎作茶飲

前陰諸證門

陰腫證治

龍膽瀉肝湯

薰洗法

騰熨法

婦人疝痘兩拘痛玉門腫脹墜而疼濕熱龍膽瀉肝治導赤車前澤瀉芩當歸梔子龍膽草氣虛下陷補中升艾防大戟熬湯洗枳實陳皮炒熱騰

註　婦人子戶腫脹墜痛及兩拘疼痛者謂之疝

疫乃肝心二經火盛濕熱下流所致宜服龍膽瀉肝湯其方卽導赤散生地木通甘草再加車前子澤瀉黃芩當歸黑梔子龍膽草也若因中氣素虛下陷重墜者用補中益氣湯以升擧之外用蘄艾防風大戟熬湯薰洗更以枳實陳皮二味爲末炒熱騰之其腫自消而痛自定也

陰痛證治

加味逍遙散

乳香四物敷法

陰中痛名小戶嫁痛痛極手足不能舒內服加味逍遙散四物乳香揭餅敷

註　婦人陰中作痛名小戶嫁痛痛極往往手足不能伸舒由鬱熱傷損肝脾濕熱下注所致宜內服逍遙散加丹皮梔子外以四物湯料合乳香揭餅納陰中其痛卽定

逍遙散

四物湯　俱見首卷

陰癢證治

桃仁雄黃膏

濕熱生蟲陰戶癢內服逍遙龍膽方桃仁膏合雄黃末雞肝切片納中央

註　婦人陰癢多因濕熱生蟲甚則肢體倦怠小便淋漓宜服逍遙散龍膽瀉肝湯外以桃仁研膏合雄黃末雞肝切片醮藥納戶中其蟲一聞肝腥皆鑽肝內吮食將肝提出其病即愈

逍遙散　方見首卷

龍膽瀉肝湯　方見前陰腫條

陰挺證治

蛇床洗法

蒸蘆敷法

陰挺下脫即癩疝突物如蛇或如菌濕熱腫痛溺赤數氣虛重墜便長清氣虛補中青梔入濕熱龍膽瀉肝尋外蒸蛇床烏梅洗豬油蒸蘆敷自升

註　婦人陰挺或因胞絡傷損或因分娩用力太

過或因氣虛下陷濕熱下注陰中突出一物如蛇或如菌如雞冠者卽古之癩疝類也屬熱者必腫痛小便赤數宜龍膽瀉肝湯屬虛者必重墜小便清長宜補中益氣湯加青皮梔子外用蛇床子烏梅熬水薰洗之更以豬油調黎蘆末敷之無不愈者

逍遥散　方見首卷

龍膽瀉肝湯　方見前陰腫條

陰瘡證治

加味四物湯

蟨蝕成瘡濃水淋時疼時癢若蟲行少腹脹悶溺赤澹食少體倦晡熱蒸烁四物柴梔丹膽草潰腐逍遥墜補中

註　婦人陰瘡名曰蟨由七情鬱火傷損肝脾氣血凝滯濕熱下注久而蟲生蟲蝕成瘡濃水淋漓時疼時癢若蟲行少腹脹悶溺赤頻數食少體倦內熱晡熱經候不調赤白帶下種種證見宜分治之腫痛者用四物湯加柴

胡栀子龍膽草若潰爛出水而痛者用加味逍遥散若重墜者用補中益氣湯

加味逍遥散　方見前陰痛條

四物湯

補中益氣湯　方俱見首卷

陰痔證治

烏頭薰法

陰中突肉名陰痔或名茄子疾俗稱黃水易治白難治烏頭存性醋熬薰內服逍遥與龍膽補中歸脾酌量行

註　婦人陰中有肉突出者名曰陰痔俗稱茄子疾也流黃水者易治流白水者難治用烏頭燒存性釅醋熬薰內服逍遥散補中益氣湯歸脾湯量其虛實酌而行之

逍遥散

歸脾湯

補中益氣湯　方俱見首卷

陰冷證治

溫中坐藥

陰冷風寒客子臟桂附地黃丸最宜遠志乾薑蛇床子吳萸爲末裹納之

註　婦人陰冷皆由風寒乘虛客於子臟久之血疑氣滯多變他證且艱於受孕宜多服桂附地黃丸外以遠志乾薑蛇床子吳茱萸研細綿裹納陰中日二易

桂附地黃丸　方見首卷

陰吹證治

膏髮煎

胃氣下泄陰吹喧金匱方用膏髮煎豬膏亂髮同煎服導從溺去法通元氣虛下陷大補治升提下陷升柴添

註　婦人陰吹者陰中時時氣出有聲如穀道轉矢氣狀金匱謂由穀氣實胃氣下泄用膏髮煎即豬膏亂髮服也導病從小便而出其法甚奧若氣血大虛中氣下陷者宜十全大補湯加升麻柴胡以升提之

十全大補湯 方見首卷

交接出血證治

加味歸脾湯

桂心釜墨散

交接出血傷心脾伏龍肝末入歸脾千金桂心釜底墨酒服方寸匕相宜

註 婦人每交接輒出血者由傷損心脾二經也

宜用歸脾湯加伏龍肝煎服或用千金方中桂心釜底墨二味爲末酒冲服方寸匕自愈

前陰諸證門彙方

龍膽瀉肝湯

生地 二錢　木通

車前子 各一錢　澤瀉

五分

黃芩 各二錢　當歸 二錢

黑梔仁　龍膽草 各一錢

生甘草 五分

右燈草一團水煎服

洗方

防風 三錢
大戟 一錢
右熬湯薰洗

騰方

枳實
右爲末炒熱騰之

敷方

四物湯 一料
乳香 一錢
右搗餅納戶中其痛卽定

靳艾 一團

廣皮 各等分

桃仁雄黃膏

桃仁 五錢 研膏
雄黃 三錢 末
右二味研勻用雞肫肝切片蘸藥納戶中其蟲卽鑽入肝而癢自止

陰挺洗法

敷方

蛇床子 五錢
右二味熬湯乘熱薰洗

烏梅 九枚

藜蘆 爲末

右用豬脂油調敷自收

陰痔薰法

烏頭

右用釅醋熬薰自消

溫中坐藥方

遠志　乾薑

吳茱萸　蛇床子　各等分

右爲末綿裹納戶內一日二次換

膏髮煎

婦人亂髮一團

右用豬膏熬化服之小便利則愈

桂心釜墨散

桂心　釜底墨　各等分

右二味爲末酒服方寸匕

雜證門

熱入血室

加味小柴胡湯

熱入血室經適斷邪熱乘虛血室潛寒熱有時如瘧狀小柴胡加歸地丹

註　金匱云婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之此言邪熱未盡值經來乘虛入於血室之間而潛藏之

故令血結而寒熱有時如瘧狀也血室肝主之肝與膽爲表裏膽因肝受邪而病寒熱故用小柴胡湯主之也加當歸生地丹皮者所以清血分之熱也

小柴胡湯　方見首卷柴胡四物湯註中

熱入血室經適來晝日明了夜譫妄無犯胃氣上二焦熱隨血去自無恙

註　金匱云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼狀此爲熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈也此言熱雖入於血室然經行不斷則熱不留結勿謂譫妄遂以消黃犯其胃氣刺傷榮血小柴和解犯上二焦但俟其熱隨血去病必自愈傷寒論曰血自下下者愈此之謂也

刺期門法

清熱行血湯

熱入血室成結胸下血譫語頭汗出二者皆當刺期門隨其實取泄而去清熱行血桃紅丹靈脂地

草穿山赤

註　金匱云婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼胸脇滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之又云陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之濈然汗出者愈此二條一言適來即斷血結在裏爲實證一言陽明病亦有熱入血室但下血頭汗出爲不同故爲熱入血室亦由肝實故均謂當刺期門也不能刺者以清熱行血湯治之其方即桃仁紅花丹皮五靈脂生地甘草穿山甲赤芍也合四證觀之大抵有寒熱如瘧之證方可用小柴胡否則或不藥自愈或刺期門而清熱行血以隨其實而瀉之此仲景心法也不得概以小柴胡治之也

血分水分總括

經水先閉後病腫任衝寒濕血壅經先發水腫後經閉水溢皮膚泛濫行血分難醫水易治二者詳

參要辨明

註　婦人經水先閉後病腫者乃寒濕傷於衝任血壅經隧也名曰血分若先病腫而後經閉者乃土不制水水邪泛濫溢於皮膚也名曰水分血分難治水分易治二者須當詳辨

血分證治

加味小調經散

血分血壅不能行四肢浮腫病非輕但使經通腫自散紅丹膝入小調經經散加紅花丹皮牛膝治之

小調經散　方見三卷浮腫

水分證治

先腫後閉名水分停飲膀胱氣不行水消腫退經自至茯苓導水效通神

註　水分腫乃水飲內停膀胱之氣化不行水溢皮膚故令浮腫經閉也此但宜治水水消腫

退其經自通用茯苓導水丸治之

茯苓導水湯方見胎前門子腫條

憂與鬼交證治

加味歸脾湯

獨笑獨悲畏見人神虛夜憂鬼邪侵歸脾湯調辰砂珀定志清心魂魄寧

註婦人七情內傷虧損心脾神無所護鬼邪干正魂魄不寧故夜憂鬼交獨笑獨悲如有對忤是其候也宜用歸脾湯調辰砂琥珀末服之則志定心清魂魄安而無邪憂矣

歸脾湯方見首卷

梅核氣證治

半夏厚樸湯

婦人咽中如炙臠或如梅核結咽間半夏厚樸湯最效半樸蘇茯薑引煎

註千金方云咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下即所謂咽中如有炙臠也俗名梅核氣蓋因內傷七情外傷寒冷所致宜用金匱

半夏厚樸湯主之卽半夏厚樸蘇葉茯苓生薑煎也

血風瘡證治

加味逍遥散

徧身瘡瘍如丹毒癢痛無時搔作瘡血風風濕兼血燥加味逍遥連地方愈後白屑肌膚强血虛不潤養榮湯

註婦人血風瘡證徧身起瘡瘍如丹毒狀或癢或痛搔之則成瘡由風濕血燥所致宜用加味逍遥散加黃連生地如瘡結痂而愈復起白屑肌膚强硬者乃血少不潤也宜服益氣養榮湯方見前陰痛條益氣養榮湯方見首卷

臁瘡證治

桂附地黃丸

憂思鬱怒肝脾損濕熱生瘡長兩臁外屬三陽爲易治內屬三陰治每難初起紅腫敗毒散濃水淋

漓補中煎晡熱陰虛宜六味食少畏寒桂附丸

註婦人憂思鬱怒傷損肝脾或飲食不調損其胃氣則濕熱下注更被寒濕外邪所客則必兩臁生瘡外臁足三陽經尚屬易治若生於內臁屬足三陰經每多難愈初起紅腫宜人參敗毒散潰後濃水淋漓宜補中益氣湯若更晡熱是爲陰虧宜兼服六味地黃丸若食少體倦畏寒則爲眞陽不足宜服桂附地黃丸即六味地黃丸加肉桂附子也

人參敗毒散方見產後痢條

補中益氣湯方見首卷血崩條

六味地黃丸方見首卷

足跟痛證治

督脈發源腎經過三陰虛熱足跟疼六味地黃滋眞水腫潰流膿用八珍

註足跟乃督脈發源之地足少陰腎經從此所過若三陰虛熱則足跟疼痛宜用大劑六味地黃丸料煎服以峻補其眞水若痛久不愈

腫潰流膿者宜服八珍湯以大補其氣血

雜證門彙方

半夏厚樸湯

半夏　厚樸
蘇葉　茯苓　各二錢

右生薑煎服

清熱行血湯

桃仁一錢　紅花一錢
丹皮　五靈脂

生地　各二錢　甘草五分
穿山甲　赤芍　各一錢

右水煎服

八珍湯　方見首卷