

前言

我省中医在中国共产党和人民政府正确的领导、教育下，在党的中医政策光辉照耀下，政治思想觉悟有了不断的提高，对「团结中西医」的方针的正确性有了进一步的認識，因而積極地参加了我省衛生建設事業，在衛生医療、防疫、愛國衛生運動等工作上都起到了很大的作用。同時还有不少的中醫師們，在熱誠擁護党和政府「發掘祖國寶貴醫學文化遺產」的偉大号召下，紛紛把自己多年寶藏的秘方、驗方貢獻了出來，這對於繼承和發揚祖國醫學遺產，保障人民健康亦將起很大的作用。

本書是根據我廳一九五六年和一九五七年先後編印的「中醫驗方秘方彙集」第一、二兩輯的內容，重加整理，并新增加了一些內容，交由广西人民出版社出版，以期得到更加广泛地交流和推广。在整理時，除对原方的个别文字略加更改，使讀者更易明白外，尽量保存原方治療經驗的內容；对于經過實驗而確收療效的，都加有按語，以資証實；至于少數在中医書籍中已熟見的驗方，一概未予列入。這點希貢獻者鑒諒。

本書中的秘方驗方，大都是貢獻者自己使用有效后公開出來的，讀者如能斟酌处方和它的適應症，加以靈活运用，是可以收到相当效果的。若从中医「辨症論治」的觀點來看，它并不是一本「万病皆治」的医書，但在臨床方面，它可以作为研究和参考之用。

最后，我們謹向本書驗方秘方的貢獻者，付出了辛勤勞動的審編者，特別是我省中医藥研究所和省中医院醫師同志們，致以衷心的感謝！

目錄

一、內科門 三五二方

時疫類(九方)·····	(一)
咳嗽、哮喘類(三一方)·····	(三)
白喉類(三方)·····	(九)
瘧疾類(二九方)·····	(九)
痢疾類(三四方)·····	(一四)
破傷風類(六方)·····	(二〇)
氣滯、積聚、腸胃病類(五〇方)·····	(二一)
黃病類(二八方)·····	(三〇)
腫脹類(二四方)·····	(三六)
虛癆類(七方)·····	(四一)
虛損類(二九方)·····	(四二)

風痹類(二一方)·····	(四七)
癰癤類(八方)·····	(五二)
失血類(二一方)·····	(五四)
淋病類(三三方)·····	(五六)
疝病類(九方)·····	(六一)
內科其他類(二〇方)·····	(六二)

二、婦科門 一〇五方

調經類(二七方)·····	(六六)
胎前類(五方)·····	(六九)
產后類(四四方)·····	(七〇)
崩帶類(二八方)·····	(七七)
婦科其他類(二一方)·····	(八一)

三、儿科門 五一方

初生類(九方)	(八四)
驚風類(一四方)	(八五)
麻疹類(一四方)	(八八)
疳疾類(五方)	(九一)
儿科其他類(九方)	(九二)

四、外科門 三三四方

接筋駁骨類(一二方)	(九五)
跌打損傷類(二四方)	(九七)

癰毒疔瘡類(八〇方)	(一〇二)
癰癤類(一九方)	(一一四)
皮膚病類(二六方)	(一一九)
口腔病類(五〇方)	(一二三)
鼻病類(一〇方)	(一三二)
喉病類(二四方)	(一三三)
眼病類(五三方)	(一三八)
耳病類(一五方)	(一四七)
痔漏類(一八方)	(一四九)
癩瘋類(三方)	(一五五)

一 內科門

時疫類

治霍亂方

處方：麻瘋樹（又名鬼桐油）酌量。

用法：取皮或嫩蕊，搗爛用開水沖服。

來源：合浦龐福生。

又方

主治：霍亂手足抽搐，嘔吐或瀉不止。

處方：蜘蛛二只（去內臟）

制法：鹽水制，用瓦焙干，研成粉末，放瓶內，使不洩氣。

用法：好酒沖服。成人重症，用二只或三只量，二小時服一次，服后病症減輕，未全愈者，可再服理中湯加寸冬、天冬。二至五歲的小兒，酒少許加沖開水，用一分或二分，二小時服一次。

來源：中醫進修班。

又方

處方：甘草一錢 白芷一錢 細辛五分 薄荷冰

二厘 梅片二分 硃砂五分

用法：將各藥共研成細末，開水送下，成人二次，小兒四次分服。

來源：柳江縣陽高照。

又方

處方：苦羊藤五錢 山芝麻五錢

用法：用水煎服。

來源：田東招興林。

又方

處方：老紅薯菜叶（干久了的）一兩

用法：清水兩碗，煎至半碗服。

來源：宜山專署衛生科。

又方

主治：上吐下瀉，瀉出物如米湯，腹不痛，鳴响如雷（即霍亂弧菌傳染病）。

处方：真川連 二兩四錢 酒炒黃芩 二兩四錢

老干姜 二兩四錢 真川貝（去心） 六錢

車前 六錢 荊芥穗 三錢 真廣皮 三錢 炒

麥芽 三錢 藁朮 六錢 丁香 三錢 砂仁

（去壳） 三錢

制法：右十一味須用地道藥材，秤准分兩，研成

細末，用荷葉自然汁（必須用鮮荷葉汁，

切勿用蜜或其他物），依法配制為丸，每

料分為二百丸。

用法：成人一丸，小兒半丸，開水送服，病重的

繼服一次即愈，忌葷腥。

來源：昭平縣蕭時彩。

編者按：中醫古書所載和通俗所說的霍亂症，

多以嘔吐、瀉下和腹中絞痛的急性胃腸炎

症稱為霍亂，實與傳染病——嘔吐米泔樣

的液体，病者無腹中劇痛感覺——不同，

如果遇到這種症狀的患者，應速報知衛生

機關處理。

治絞腸痧方（又名干霍亂）

处方：猪苓 六錢 茯苓 五錢 澤瀉 四錢 桂枝尖

二錢 白芍 三錢 炙草 一錢

用法：用水煎服。

來源：何國叔。

治感冒方

主治：四時感冒、傷風，發熱、惡寒頭痛，咳嗽

流涕，身骨疼痛等症。

处方：紫皮麻

用法：將該藥的葉莖切碎，微蒸晒干候用。每用

一撮，以水三碗煎取二碗，分二次服，兒

童及體質虛弱者減半，在冬寒時可加生薑

二片同煎。

說明：此藥莖高三、四尺，樹皮呈紅褐色，秋天

開小黃花，結紅色小實，葉大如銅錢，橢

圓形，有用作制沙紙原料的。

來源：合浦陳明璣。

治溫病奇方

主治：溫病大熱，煩渴，譫語，自汗（不自汗亦

可）的白虎湯症及犀角地黃湯症等，均可

使用。

处方：燕子巢（窩）一個或半個（取多年的巢，

越老越好） 雞蛋白

用法：將燕子巢打碎，放入鷄蛋白（不要黃）適量，調勻后搓成團。令病人臥床，將藥團放在額上，用手沿額際輕輕帶動，至二十分鐘后，即將藥團壓扁，置病人胸間處，病人心覺輕快，此時切不可將藥除去，任病人充分睡眠，醒后其病若失。如藥已被吸收干燥，可再加蛋白調勻，如前法施用。如此三兩次，病霍然而愈。

來源：柳州市新中聯合診所吳敏。

咳嗽、哮喘類

治小兒百日咳方

处方：兜鈴 三錢 杏仁 二錢 浙貝 二錢 阿膠 錢
半 牛子 錢半 糯米 一錢 百合 二錢 甘
草 一錢 花粉 錢半

用法：用水煎服。

來源：馬金柱。

編者按：此方適應于久咳咯血時期。

又方

处方：柚子壳 一二兩 蜜糖 一二兩

用法：將柚子的外皮去掉，用內白層煎水，蜜冲糖服，數次可愈。

來源：蔣崇甫。

又方

处方：北胡 四錢 党參 二錢 黃芩 錢半 半夏 二錢
正橘皮 一錢 竹茹 三錢 川朴 二錢
炙草 一錢 生姜 一錢 大棗 二枚

用法：用水煎服。

來源：中醫進修班何國權。

又方

处方：百部 三錢 百合 三錢 白果（去壳后下）
二錢 甘草 錢

用法：水二百毫升，煎至一百毫升，一日分三次服，連服三至五劑。

來源：忻城防疫站韋建中。

治百日咳方

处方：初期用荷葉 二張 紅囊大柚子皮炭 五錢

用法：煎水冲白糖服（一日量）。

又方（后期適用）

处方：生姜八錢 猪肺四兩

用法：搗爛后，加入茶叶五錢，用水煎服。

來源：中医進修班黎广才。

又方

处方：（一）馬兜鈴二錢 前胡二錢 川古二錢

（打）桔梗三錢 桃仁（去皮）錢半

杷叶（去毛）錢半 白芨二錢 紫苑二錢

貝母錢半 葶藶三錢 薄荷錢半

（二）天冬二錢 麥冬三錢 石斛二錢

（鹽水炒）麻仁三錢 黃柏二錢

（鹽水炒）百步三錢 丹皮三錢

生地三錢 川朴二錢 薄荷錢半

用法：煎服。

（三）党參三錢 北芪二錢 川貝錢半

冬花二錢 百合二錢 杞子二錢

紅棗三錢 橘紅錢半

用法：同蒸猪肺吃，可加鹽油。

來源：樓顯文。

又方

主治：百日咳遷延不愈，日漸瘦弱，咳痰帶血有

童子癆現象者。

处方：

（一）生地二錢 阿膠錢半 麥冬三錢 元參錢

半 茅根錢半 百部二錢 百合二錢 甘

草一錢

用法：淨水煎服。

（二）麻黃錢半 杏仁錢半 石羔三錢 百部錢

半 紫苑一錢 桔梗錢半 銀花錢半 牛

蒡子錢半

用法：煎服（用于加答儿期）。

（三）麻黃一錢 杏仁錢半 石羔三錢 川貝一

錢 百合錢半 京芍錢半 丹皮一錢 銀

花錢半 甘草一錢 薑壳錢半。

用法：煎服（用于痊癒期），如有內熱，加黃芩

一錢。

來源：秦家泰。

又方

处方：葶藶（去皮）三兩 大蘇三錢（爛搗）

川貝末三錢 麥芽糖二錢半

用法：用水半碗，置飯面蒸熟，另用青金草錢半，

煎水兌服，一日分三次服。

來源：蔣裕光。

又方

处方：四君子湯加麥冬、五味子。

用法：水煎，服二劑后，加沙參、牛子、銀花、

連翹。

來源：張映南。

又方

处方：北胡二錢 黃芩二錢半 川貝一錢 百部

二錢 兜鈴二錢 葶藶錢 薏仁二錢 淮

通二錢 麥冬錢半 甘草錢 生檸檬叶四

錢

用法：用水煎服。

來源：平南城廂區郭麟玉。

又方（陣咳期）

处方：天冬二錢 麥冬錢半 桔紅錢半 薏仁錢

半 百部三錢 川連錢

用法：用水煎服。

來源：石龍縣王敬修。

編者按：百日咳患者，多系十歲以下的小兒

（至多不過十五、六歲以下的兒童），每次咳嗽時，常至噎逆不能回氣，或伏地作嘔，必至痰出乃止。此症宜用清潤化痰順氣藥劑，緩緩調治，不能速效。四君子湯加麥冬五味，是可以的，但白朮、茯苓、黨參三味，總以慎用為好。

治肺炎症方

处方：魚星草，不拘多少，煲鴨蛋服，數次可愈

來源：蔣崇甫。

又方

处方：麻黃一錢 杏仁四錢 甘草錢半 石羔八

錢 細茶葉三錢

用法：用水煎服（小兒減半）。

來源：羅崇興。

又方

处方：果子狸胆一尺

用法：開水蒸熟后，以竹瀝水沖服。
來源：熊壽。

又方

主治：肺炎發高熱、喘息、微咳、自汗（初起時亦有无汗者）、胸痛、面赤、中午時，兩頰潮紅，舌苔白，脈洪數，嚴重時，神昏譫語。咳出的痰常帶粉紅色，或綉色。

處方：麻黃三錢 杏仁四錢 生石膏八錢 桑皮

三錢 黃芩三錢 丹皮二錢 甘草二錢

銀花二錢

用法：煎服，每天一服，重症二服，約連服五六

劑全愈

來源：中醫進修班。

治肺膿腫方

主治：肺膿腫，吐膿，或咯出腥臭難聞的痰涎，

患部腫脹等。

處方：好阿膠二錢（后下） 小金叉三錢（先燉）

熟地三錢 瓜蒌壳三錢 白芍六錢 甘草

一錢 龍利花二錢 川貝一錢（沖服）

用法：煎服（成人量），有膿而多兼成团的，加

山甲錢半，煩悶不能入眠時，易熟地為生地，加麥冬三錢。

來源：李漢基。

又方

處方：決明草四錢 牛旁子三錢 淨蓮召三錢

浙貝母四錢 白桔梗二錢 金銀花三錢

用法：用水煎服。

來源：柳江縣楊高照。

治哮喘方

主治：氣喘、咳或不咳、有痰每月必發。

處方：正川貝六錢 京夏八錢 茯苓七錢 青翠

雀（煨）四只 干檸檬五錢

用法：共研成細末，以陳皮五分，煎湯送下，每服一錢。

來源：平南縣李仲武。

又方

處方：大婆筋根一兩 猪瘦肉一兩

用法：煎湯，連同猪肉服下。

來源：昭平縣曾繁浩。

又方

主治：遠年哮喘、咳嗽。

處方：噴鷄蛇頭（由頸上砍斷）

用法：瓦上用火煨枯，研末沖服。

來源：荔浦縣歐社香。

又方

處方：茯苓八錢 菖蒲七分 白菓（去壳）五錢

五味三錢 遠志七分 只壳二錢 炙草二錢

杏仁三錢 貝母二錢 桂枝（去皮）

一錢 桔梗三錢 冬花三錢

用法：煎服。

來源：余慶年。

治乳哮喘方

（每月發一、二次氣喘喉鳴）

處方：檸檬木叶生切一兩

用法：納入豬大腸內，紮緊兩頭，水煲兩小時，

連大腸服食。

來源：平南縣韋烈明。

又方

處方：黃肚蟾蜍一只（去腸雜）

用法：以川貝末二錢，納入腹中，紅泥封固，

火煨存性，研成細末，蜜煉為丸。每丸一

錢，每服一九。臨發時開水送服。

來源：平南縣龔國村。

治老年夜咳痰多方（虛火痰咳）

處方：千張紙切碎三錢 白蜜五錢

用法：放飯上蒸服，每日分三次服。服藥一日后

輕松，二日后咳減，三日后不咳，服七日

全愈。愈后以五味異功湯代茶飲。

（附）五味異功湯：黨參三錢 白朮三錢

茯苓三錢 陳皮錢 炙草錢

來源：忻城縣樊紹雄。

治咽干胸脹吐痰方（支氣管擴張）

處方：白芨流浸膏一、二毫升，兜鈴流浸膏六

用法：毫升，一日分三次服，每隔四小時服一

次。

來源：永福縣人民醫院王燮。

治慢性支氣管炎咳嗽方

處方：天花粉 五錢 黨參 四錢 蜜糖 一兩

用法：煎服（三至五歲量）。

來源：何國權。

編者按：此方只宜于虛燥症。

治支氣管性哮喘方

處方：紅背落地生根叶 六錢 羊角菜根（圓叶的）

四錢

用法：煲豬肺食，老年六、七次，小兒三、四次即愈。

來源：賴立矩。

治習慣感應性哮喘方

（即支氣管哮喘）

處方：（一）煨牙皂 二錢半 麻黃 五錢 射干 五

錢 款冬花 三錢 北辛 二錢 法半夏 二錢

桂枝 三錢 干姜 三錢 常山苗 二錢 紫苑

四錢 白菓肉 五錢 白前 五錢 白芥子 三

錢 絲瓜絡 四錢

用法：共研成細末，大人日服四錢，小兒酌減。

平時須服至病退即止，若在潛伏期，需連服三旬，若口干舌黃，則去桂枝、干姜。

（二）草烏 五錢 輕粉 七錢 白芥子 五錢

南星 一兩 麻黃 四錢 松香 六錢 白芷 四

錢

用法：研成細末，煉蜜搗勻成膏，分為三餅，十日一餅，敷于背部第三胸椎間，用布縛定，三旬為止。

又針灸療法

取穴：肺俞、膏肓針三分，灸二壯；天突、膻中各灸三壯。

用法：在每次治療前，先行針灸，隔五天或十天針灸一次，最少三至五次。

來源：橫縣。

治熱咳、声嘎、口干方

處方：大海子 八只 砂糖 二兩

用法：共同煎服。

來源：田陽蒙宝山。

治肺蓄水方

主治：肺蓄水，胸脇脹滿，喘咳，端坐呼吸，不得眠，脈搏沉數（九十——一百）。

處方：麻黃五分 葶藶三錢 桑白三錢 前胡二

錢 北杏三錢 苡仁八錢 茯苓五錢 甘

草一錢 生姜二錢

用法：用水煎，分早、晚二次服，服至愈為度，

若泄瀉停服。

來源：北海市中醫聯合診所陳希濂。

白喉類

治白喉方

處方：梅片五分 熟礬砂錢半 口米砂五分 石

羔一錢 煨青黛一錢 甘草一錢 中白一

錢 元明粉錢半 川蓮粉七分

用法：共研成細末，用竹筒吹入喉內，如糜爛嚴重時，加珍珠一分。

來源：丘基民、蘇廷芳。

又方

處方：糯稻桿根五錢 麥冬五錢 沙參三錢 石

斛二錢 薄荷錢半 薏仁四錢

用法：將水煎好后，加雞蛋一枚拌服。

來源：博白縣劉秀芝。

治喉症雙單蛾白喉方

處方：蝸牛（連壳炕干）三、四只 烏梅（去核）

二只 大梅片三分

用法：將上藥放在飯內搗溶，制成丸藥二個，每含一丸。

來源：合浦龐福生。

瘡疾類

治慢性瘡疾方

處方：何首烏一錢 黃牛肉半斤 姜、酒各數錢

用法：煎湯服，一至三次即可見效。

說明：（一）此方能治一切虛弱的慢性瘡疾；（二）

姜酒可視患人體質情況，酌情加減；（三）

為了合于口味，湯內可加鹽、油醬料。

(四) 初起或急性期，則不適應。
來源：何國叔。

又方

主治：久瘡症狀輕微，惟身體衰弱，胃虛消化不良，脾臟腫大，呈極度貧血現象的。

處方：防黨 五錢 炙草 一錢 首烏 四錢 歸身 三錢

北芪 五錢 白朮(土炒) 五錢 鰾甲
(炒打) 四錢 常山 三錢 陳皮 五分

用法：煎服。

來源：陸川中醫研究組。

又方

處方：紅棗 五錢 樟腦 三錢

用法：制成丸藥，在病未發作前，用鼻嗅之，嗅二日即愈。

來源：陸川甯文洲。

又方

處方：山甲珠 三錢 鰾甲 一兩 青蒿 二錢 骨皮

四錢 靈仙 三錢 莪朮 三錢 淮山 四錢
麥芽 七錢 茯苓 五錢 首烏 六錢 狗脊 四錢

錢 黃丹 五錢 (后下)。

用法：煎服。孕婦忌服。

來源：柳州市新中聯合診所吳敏。

治瘡疾疱羔方

處方：硃砂 五錢 雄黃 一兩 麻黃 一兩 斑蝥虫

七十只 (去头、去翅)

用法：共研成細末，用瓷瓶收貯。用時，取少許放在膏藥(不論甚么膏藥)中心，貼背部第三骨節。不論間日瘡、三日瘡，在發作前三至五小時貼有效，對不能服食藥物的

小兒或嘔吐者，尤有特殊的療效。

治瘡疾方

處方：鬼羽箭 五錢 片糖 二錢

用法：用水三碗，煎取碗半，分四次溫服，連服二天全愈。

來源：欽縣李烈英。

又方

主治：慢性瘡疾，如間日瘡或三日瘡。

处方：蜀漆 五錢 尖檳 三錢 柴胡 三錢半 川

仲 三錢半 靈仙 三錢

用法：水煎溫服，如果上午發作，則加黃芩三錢半 下午發作，加首烏三錢半。

來源：陸川蔡英明。

又 方

处方：生香付 四兩 樟腦 一兩

用法：研成細末，配制成丸，如粟米大，在未發作前二小時，塞入病人鼻孔（男左女右）。

來源：周禧堂。

又 方

处方：白古月 七粒 辣椒叶 三錢

用法：將藥搥爛，在未發作前，掩包脉門，男左女右。

來源：田东聯合診所賴立矩。

又 方

处方：生蘿菜根 四兩

用法：淡酒煎，在瘡未發前半小時服。如不能飲酒，可用水煎，沖酒服。

來源：石龍縣陳廷仁。

又 方

处方：棉花木（根、莖、叶均可）

用法：水煎，在瘡未發前一小時，乘熱徐徐服，服至發熱汗出。

來源：桂平縣曹紹山。

又 方

处方：尖檳 三錢 枯礬 錢 牛膝 二錢 龍骨 三錢

烏梅 三只 草果（去壳） 二只 柴胡 三錢

靈仙 錢半

用法：水煎，在未發作前一、二小時服，一日三次，服後即吐。

來源：蒼梧縣劉叔平。

又 方

处方：鬼面符叶 一兩

用法：將藥搥爛，用滾水沖酒一杯，在瘡未發前半小時服。不愈再服。

來源：蒼梧縣許為蓮。

又方

处方：青蒿二錢 川朴三錢 柴胡二錢 黃芩

二錢 法夏二錢 茯苓二錢 白芍二錢

常山叶二錢（酒制） 烏梅五只 甘草五分

用法：水煎，未發作前半小時服。不愈再服。

來源：蒼梧縣許為蓮。

又方

处方：常山四錢 烏梅二錢 鱉甲四錢 白芍二

錢 青皮二錢 柴胡三錢

用法：水煎，連服二、三劑。

來源：蒼梧縣黎善廷。

又方

处方：桃叶七張（搗溶） 辣椒二只（搗溶）

雄黃二分（研末）

用法：在未發作前一小時，敷患者脈門（男左女

右），先敷桃叶，次敷雄黃，后敷辣椒，

用布包好，約半小時解去，其病自愈。

來源：蒼梧縣楊福賢。

又方

处方：辣椒叶 生鹽

用法：將各藥搥爛，敷在手部脈門上（男左女

右），病發前半小時敷。

來源：南丹縣李國春。

又方

处方：辣椒四錢 生姜四錢 蒜头五錢

用法：共搥爛，在未發前敷脈門處（男左女右），

連續施治三日可愈。

來源：石龍縣中醫進修班。

治小兒久患瘧疾方

主治：久患瘧疾，面色黃白，肌肉微浮，大便溏

泄，手足常冷，食慾不振。

处方：桂枝 生姜 甘草 紅棗 地龍 各等分

用法：用水煎服，連服三劑，過一星期后，再服

一、二劑，則可全愈。

來源：邕寧縣康民聯合診所青史芸。

治小儿瘧疾方

处方：黑棗(去核)二枚 陀僧粉

用法：將陀僧粉加入黑棗內共服。服后，并用古月粉放在膏藥心上，分成二貼，一貼第三胸椎處，一貼第一腰椎處，在瘧前二小時貼之。

來源：富鍾縣衛協會一分會嚴啓超。

治瘧疾脾臟腫大方

处方用法：(一)內服方：鰾甲 五錢 三稜 三錢

莪朮 三錢 當歸 五錢 白芍 三錢 川芎 三錢

錢 白朮 三錢 (土炒) 木香 二錢

用水四百毫升煎至二百毫升，一日二次分服，連服三至五劑。

(二)外敷方：紅臭椿樹皮椿成粉，

以蕎麥粉一斤和水混合，炒熱制餅外敷，每次敷五至八小時，連敷三、五次。

來源：忻城縣防疫站韋建中。

治久瘧脾臟腫大，消化不良方

处方：鰾甲 三錢 首烏 四錢 川朴 三錢 草果 二錢

錢 廣皮 錢 山查 二錢 神曲 二錢 麥芽

二錢 法夏 二錢 黃芩 二錢 柴胡 二錢

青皮 錢 常山 三錢 三稜 二錢 莪朮 二錢

用法：用水煎服。

來源：石龍縣中醫進修班。

治久瘧血氣虛弱方

处方：歸片 三錢 淮山 三錢 甲珠 三錢 炙芪 三錢

錢 白朮 三錢 首烏 三錢 云苓 三錢 常

山 三錢 砂仁 錢半 川芎 錢 廣皮 錢半

防黨 錢半 炙草 錢半 柴胡 錢半 生姜 二

片 大棗 二枚

用法：水煎，病發前一小時服。

來源：石龍縣中醫進修班。

嗅氣截瘧方

处方：紅黃 錢半 古月 一錢 大艾硝 三錢 吳萸

二錢

用法：共研成粉末，每日分三、四次，每次放少

許粉在掌心，極力摩至發熱，用鼻頻嗅之，有特殊功效。

來源：岑溪梁偉豪。

治瘧丹

处方：陀僧七分 雄黃 五錢 辰砂 二錢

用法：共研成細末，每日三次，每次二分，隔四小時服一次，用開水送下。

來源：岑溪鄧星南。

治瘧疾針灸療法方

取穴：大椎 陶道 間使 后谿

用法：以麥粒、大艾炷各灸三壯。直接灸或隔姜灸均效。須在未發作前二小時施灸。

來源：蒼梧縣黎國義。

又 方

取穴：大椎，灸五壯。

來源：昭平縣蕭時彩。

又 方

未發前取穴：長強、大椎、大杼、陶道、合谷風池、太陽、手朮抑制法。

在發冷時取穴：長強、大椎、大杼、百會、興奮

重刺激，立即停止。

在發熱時取穴：合谷、曲池、太陽、湧泉、手朮

抑制法。

來源：忻城防疫站中醫韋建中。

又 方

取穴：大椎、陶道、間使、后谿。

用法：未發作前二、三小時施治，針治三至五次即愈。惡性瘧甚至昏厥時，加灸百會三至五壯；脾臟腫大，加針脾俞、痞根，手朮中等度的刺激，捻運至痠感甚遠為度，另在大椎、陶道二穴，臥針三十分鐘，起針后加灸各三壯，如用綠豆大艾炷放穴上，直接灸或隔姜灸均可。

來源：蒼梧縣。

痢疾類

治痢疾方

处方：鳳尾蕨一兩 紅虫花根一兩 紅勒莧菜根
三兩 蜜糖二兩 決明菜根二兩

用法：煲水冲蜜糖服。
來源：羅崇興。

又方

处方：萊服子二兩 車前子一兩

用法：以水一斤，煎取六兩頓服，症狀虛弱的加

灶心土少許。

來源：農寶光。

又方

处方：矢頭婆（即紅花虱麻頭）

用法：煎水服。紅痢冲黃糖，白痢冲白糖，紅白

痢兼有，則用黃糖、白糖各半冲服。

來源：昭平縣五區聯合診所叶引之。

又方

处方：木棉花蒂四錢

用法：水煎服。

來源：賴立矩。

又方

处方：川連二錢 萊服子三錢 車前二錢 槐花

四錢 甘草一錢 白头翁三錢 銀花三錢
大黃三錢 松蘿茶二錢
用法：用水一碗半，煎至小半碗頓服。
來源：桂平縣梁鑑華。

又方

处方：棉茵陳 土茵陳 蒼朮各一兩 蜜糖二錢

用法：濃煎，蜜糖冲服。

來源：岑溪縣孔策謙。

又方

处方：大黃一兩 蒼朮七錢五分 山查炭七錢

姜活五錢 杏仁二錢半 薑撥五錢

用法：研成細末，開水送服，成人每服八分，老

人小兒減半。

來源：百色縣歐堃。

又方

处方：藤兒草 黑腳蕨

用法：煎水飲。

來源：蒼梧。

又方

主治：桿菌性痢疾的初期，症見赤白，里急后重，腹痛。

处方：銀花五錢 連翹三錢 枳實錢半 槐花五錢 火麻仁一兩 黃芩三錢 川黃連三錢

(炒黑)

用法：用水煎服。

來源：丘基民。

治紅白痢方

处方：馬齒莧半斤 蜜糖一兩

用法：清水煎，馬齒莧，冲蜜糖服。

來源：李伯才。

編者按：本方為民間普遍使用，并見于本草綱目及驗方新編。

又方

处方：老茶葉

用法：將茶葉煲濃汁，冲蜜糖服一、二次即止
(蜜糖須占茶葉的三分之一)。

來源：周喜堂。

又方

处方：赤石脂四錢 枯凡二錢 川連四錢 白芍

四錢 牡蠣四錢 甘草二錢

用法：共研成細末，成人每服三錢，小兒每服二錢，飯前用粥水調服。

來源：田東黃正甫。

又方

处方：黑脚半边旗蕨四兩 羊帶龜四兩 灯蓋菜

二兩

用法：煎水服，一日四次分服，每次冲蜜糖一匙羹。

來源：黎广才。

又方

处方：包谷須

用法：煎水服，紅痢用紅須，白痢用白須。

來源：全縣。

又方

处方：鳳尾草二兩 蜜糖一兩

用法：將鳳尾草煎水，冲蜜糖服。
來源：博白刘惠寧、合浦陈明璣。

又方

处方：旱蓮草一兩 椿樹皮一兩
用法：煎服，小兒減半。
來源：中医進修班朱耀。

又方

处方：豆豉姜一兩 檳榔炭三錢 地于五錢

用法：共用水三碗，煎取一半，加蜜糖冲服。
來源：宜山專署衛生科。

又方

处方：來服子四兩
用法：新病用生，久病用炒，煎水服。
來源：鎮都縣農學儒。

又方

处方：苦瓜叶
用法：煎水，兌蜜糖服。

來源：桂林羅繼壽。

又方

处方：川蓮錢半 云苓三錢 銀花三錢 大黃三錢
黃芩三錢 元胡二錢 檳榔二錢 肉
蔻三錢 广木香錢 地榆二錢
用法：水煎服后，次日以广榔粉，冲服白糖服。
來源：田东縣黃榮亮。

又方

处方：鳳尾蕨（生牆脚或大樹根，約高六、七寸）
半斤或十兩 白糖一兩 生鉄樹叶二張
用法：用水煎，分三次微溫服。
來源：南寧謝舍我。

治紅白兩種痢疾日久不愈方

处方：當歸二錢 蒼朮二錢 淮山二錢 白芍二錢
（酒炒）白朮錢半 胡連錢半 川朴二錢
广木香錢半 檳榔錢半 黃連錢 粟
壳錢 烏藥二錢 （如肛門脹、腹痛時加
香附錢半 蘿卜子錢半炒 生甘草錢）
用法：每日服一剂，三至五剂可愈，小兒減半。

來源：全縣唐華卿。

治初痢方

主治：壯實人初患痢疾，里急后重，日十余次。

處方：紅頭烏臼木強二兩 檳榔三錢

用法：用水煎服。

來源：桂平縣楊啓榮。

編者按：紅頭烏臼木強乃峻瀉藥，須減用為宜。

治久痢方

處方：當歸四錢 阿膠三錢 黑豆五錢 木香一錢

黃蓮六分 甘草一錢 蜜糖一兩

用法：煎水，沖蜜糖服，腹痛時，加白芍二錢共

同煎服。

來源：蔣裕光。

又方

處方：烏梅（去核淨肉）一兩 鴉胆子（去壳去油，

淨肉）一兩 柯子兩半（去核，研成粉末）

用法：將前二味搗成膠狀后，加柯子粉適量，制

丸如菉豆大，每日服二至三次，用龍眼肉

包丸吞服，開水送下，一日量不得超過一

錢，小兒或虛弱者酌減。
來源：陸川梁爵平。

又方

主治：白痢年久不愈。

處方：苦玉桂二錢

用法：用水一碗半，煎取半碗，蜜糖沖服。

來源：廣东南海顏煜強。

治久痢脫肛方

主治：久痢體弱，大便脫肛。

處方：防黨一兩 黃耆一兩 只壳三錢

升麻二錢

用法：用水煎服。

來源：蒙山縣黃漢斌。

治小兒久痢脫肛方

（成人藥量酌加）

處方：信前胡錢半 陳只壳錢半 大鯢甲二錢

敗龜板錢半 尖檳榔錢 火麻仁錢

槐角錢半 大粉草錢

用法：用水煎服，二、三劑即愈。

來源：平樂縣王績成。

治熱痢方

處方：生雷公根 四兩

用法：搗成自然汁，加生鹽八錢，沖開水兩碗，二小時分服。

來源：貴縣二區保安中醫聯合診所丘壽祺。

治血痢方

處方：魚腥菜

用法：六歲小兒用魚腥菜葉七張，開水洗淨，用木杵搥溶成液體，沖白糖一錢，一次服，連服二至三次即愈。

來源：合浦梁裕燃。

治噤口痢方

處方：白竹壳菜（即車前草）一條 雷公根 二兩

青蕨（即鳳尾草）二兩 野菊 二兩 赤小豆 八錢

用法：共煎服，如小便少，加草谷子根一兩，腹痛加毛桃木葉三錢，服后症減輕，繼服下方。

處方：鴨腳木皮一兩 丹竹茹 七錢 高粱粟 六錢

米一兩

用法：共炒，加水煎滾，去渣服食。

來源：陸川。

治癒后痢方

處方：蕎頭須

用法：煲粥服。

來源：欽州李烈英。

治急性痢疾方（菌痢虫痢均治）

處方：銀花 五錢 槐花 五錢 杭菊 五錢 赤芍 八錢
甘草 八錢 綿茵陳 五錢 川連 八錢 黃芩 七錢

用法：共研成細末，密貯候用，每服一錢至錢半，開水拌勻服，每三至四小時服一次。

來源：南寧李熾南。

治慢性痢疾方（菌痢虫痢均治）

處方：黨參 五錢 茯苓 五錢 白朮 五錢 甘草 五錢
廣皮 五錢 廣木香 六錢 檳榔 六錢 川連 七錢 椿白皮 八錢

用法：共研成細末，密貯候用，每服一錢，開水

拌勻服，每隔四小時服一次。
來源：南寧李熾南。

破伤風類

治破伤風方（小兒臍風）

主治：破伤風面目發黃，牙齦及上顎發現有白點一、二處或數處，（俗稱馬牙）用針刺破除去瘀血。面如獅子形，四肢攣彎，腹壁緊張，吮乳口松，大便不通，小便短黃。

处方：

赤芍 六分 川芎 九分 花蕊石 六分 黃芩 九分

連召 六分 薄荷 四分 丑牛 六分

大王 九分 只壳 四分 尖板 七分 黃柏 九分

用法：用水煎至合度，以棉或潔布蘸葯水，擦入口內，使其吞下。

來源：常文英。

又方

处方：千里奔（即驃蹄）

用法：將千里奔煨炭，用童便和酒沖服一錢，每

日服二次。
來源：貴縣代表。

又方

处方：熟南星、防風 各二兩

用法：研至最幼，每次服二錢五分，隔六小時服一次，用溫酒送服，兩次愈。此方屢經試驗，应效神速。

來源：梧州黃海平。

又方

处方：（一）老鼠仔 六只 玉真散（見中國醫學

大辭典）

制法：將初生未開眼的老鼠仔，用三花酒一斤，浸約一年之久。將玉真散研成細末。

用法：每服老鼠酒二兩，沖玉真散三錢，小童減量。服后，并用馬前子粉、紅花、歸尾、乳香粉各二兩。生姜、生葱各四兩，共同搗爛后，用酒煮，外擦病人胸部、腰部和四肢，如冷再煮熱，多擦几次。待病情好轉，再用生南星、白芷、防風、姜活、白付各一錢，煎水服，每天服一次。

來源：柳州梁錫恩。

(附) 玉真散方：白芷一兩 南星一兩 姜汁
制天麻一兩 姜活一兩 防風一兩 白
附子十二兩

又方

處方：蟬蛻一兩二錢

用法：研成細末，納入布袋內，用適量的水煎，
加酒少許沖服，一日分三次服，服三、五
天愈。

說明：本方曾治愈兩病例，均經醫院診斷為破傷
風，一例服藥三天全愈，一例服藥四天病
減，八天全愈，始終守服此方。

來源：貴縣羅榜雄。

編者按：此方出自醫學正傳，余无言金匱新義
和實用混合外科學各論亦云特效。

治初生小兒臍風

處方用法：(一) 外敷方：麝香五厘 冰片五分
雄黃三分 共研成細末，用蜜糖一兩，微
煮三分鐘，將藥末和蜜糖調勻，敷于布，
貼臍上。

(二) 內服方：炒全虫三只 僵蚕三条
勾藤錢 虫退五个 防風錢 胆星錢 甘
草五分 灯心引水煎服。

來源：恭城縣張仁悌。

氣滯、積聚、腸胃病類

治各種氣痛方

處方：北胡 皂角 五靈脂 沒藥 各等分

用法：共研成細末，用好酒調服，若不能飲酒，
用開水加酒少許沖服，成人每服二錢，小
兒酌減，孕婦忌服。

來源：平南縣陳節平。

治婦人心胃氣痛方

處方：元胡二錢半 香附三錢 良姜三錢 甘草錢

用法：用水煎服。

來源：田東縣吳文熊。

治心氣痛方 (肝硬變及胃炎)

處方：老辣椒根二兩 生雞一只

用法：煲湯服。
來源：蒼梧縣周福三。

治肋下痞塊方

处方：干漆二錢 麥芽二錢 山查二錢 神曲錢
半 三稜二錢 莪朮二錢 川仲二錢 川
斷二錢 枳壳三錢 枳實三錢 香附二錢
元胡二錢 五靈脂二錢 寄奴二錢 不留
行二錢 田七二錢
用法：清水煎服。
來源：賴立矩。

治胃脘痛方

处方用法：(一)湯藥：歸身三錢 防党三錢
白朮三錢 熟附二錢 肉桂錢 川椒二錢
烏梅三只 白芍二錢 炙草二錢 細辛錢
半 黃連錢 黃柏二錢 水煎服，每灸一
次，服藥一劑。
(二)針灸：直接灸胃脘三壯，上脘五
壯，內關三壯，足三里三壯，公孫三壯，
章門三壯。
來源：貴縣區錦光。

治老年腹痛方

处方：瓦楞子一兩 白凡四錢
用法：研成細末，以面為丸，每服三、四錢，小
兒減半，開水送下。
來源：荔浦縣區祉香。

編者按：此方慢性胃病作痛有效，制成藥散比
藥丸好，白凡宜煨成枯凡，否則容易引
起嘔吐，反增重胃病，每服二錢即可。

治老年胃氣痛方

处方：山羊血二錢 穿山甲血二錢 广木香二錢
用法：共研成細末，用酒沖，每服一錢。
來源：田東縣聯合診所賴立矩。

治干霍亂方（又名絞腸痧）

主治：欲吐不吐，欲瀉不瀉，爪甲青紫，舌苔黃
或白，腹中絞痛異常，脈沉伏。
处方：竹烟筒屎如黃豆大，生竹茹三錢
用法：用生竹茹煎水，沖烟屎服。（孕婦嬰兒忌
服）
來源：蒼梧縣冀雨生。

治胃痛方

处方：石螺壳（火煨） 牡蠣（煨） 各等分

用法：每服二、三錢，開水送下。

來源：蒼梧縣劉貴華、石龍縣胡文。

又方

主治：胃酸過多，慢性胃潰瘍或十二指腸潰瘍。

处方：花生油

用法：每日晨起漱口后，即食兩羹匙至四羹匙，

半小時后，始可飲食，服一星期后見效，

繼服可全愈。

來源：南寧市陳魯五。

又方

主治：除胃下垂及胃癌外，一般胃病均效。

处方：党参五錢 白朮七錢 茯苓五錢 甘草三

錢 廣皮四錢 法夏四錢 香附八錢 砂

仁四錢 厚朴四錢 枳壳四錢 檳榔四錢

廣木香四錢 黑丑四錢 大黃四錢 五靈

脂四錢 川連三錢 黃芩三錢 姜皮錢

牡蠣五錢

用法：共研成細末，每日早、午、晚飯后服，每

服一錢，開水拌勻服下。

又方

处方：只實錢半 甘草錢半 北胡二錢 白芍六

錢 茯苓三錢 必甲一兩

用法：用水煎服，孕婦忌服（成人量）。

來源：羅崇興。

又方

处方：樟木薯六錢至一兩

用法：用水煎服。

來源：羅崇興、橫縣盧盈軒。

編者按：該方宜于胃寒胃痛，熱症慎用。

又方

处方：五靈脂二錢 蒲黃錢半 丹參三錢半 延

胡錢半 白芍三錢 金鈴子二錢 烏藥

錢半 海螵蛸五錢

用法：煎服。

來源：省中醫進修班。

又方

处方：正川椒一錢

用法：用水一碗，煎至半碗溫服。

來源：梁濟川。

編者按：本方宜于胃寒攣痛。

又方

主治：胃酸過多及胃神經痛。

处方：牡蛎六錢 肉桂二錢 胡椒二錢 丁香二錢

甘草二錢

用法：共研成細末，開水送服，每日三次，隔四

小時服一次，每次服三錢。

來源：楊春暉。

又方

主治：慢性胃潰瘍，或十二指腸潰瘍，時覺痛

脹、發燒、吐血或腐黑糞。

处方：枳殼三錢 靈脂四錢 元胡四錢 歸身五

錢 廣香三錢 丹參兩半 川大黃三錢

尖板炭五錢 原苓八錢 甘草三錢 苦參

五錢 赤芍五錢 銀花五錢 郁金一錢

用法：共研成細末，開水沖服，每日三次，每次

二錢。

來源：省中醫進修班。

治胃酸缺乏方

主治：胃酸缺乏，以致胃口不開，口干、常感咽

中津乏，嗜食酸味，身體日形削瘦。

处方：白芍三錢 木瓜三錢 烏梅三錢 石斛三錢

蓮米三錢 淮山三錢 麥芽三錢

用法：用水煎服。

來源：德保縣唐啓源。

治胃酸過多方

处方：煨瓦弄子三兩 海螵蛸（去甲）三兩

用法：研成細末，每服一錢半，開水送下。

來源：柳州新中醫聯合診所吳敏。

治胃潰瘍痛嘔吐酸水方

处方：代赭石三錢 乳香三錢 沒藥三錢 牡蠣

四錢 滑石四錢 川貝四錢

用法：用水煎服。

來源：石龍縣胡文。

治吐瀉腹內絞痛方

處方：白樟樹子一兩

用法：水煎溫服。

來源：石龍縣覃修敬。

治急性腸炎方

處方：川連錢半 黃芩二錢 青皮二錢 枳殼二錢

錢 豬苓錢半 澤瀉錢半 青蒿一錢 知母錢半 大黃二錢

用法：用水煎服。

來源：臨桂縣唐樂善。

治呃逆方

主治：橫隔膜痙攣，氣上冲，喉間有聲。

處方：馬刀豆核

用法：燒灰存性為末，冲開水服。

治老人呃逆方

處方：麻雀數只

用法：煲粥或蒸熟食之。

來源：梁仲名。

治膈食方

主治：寒性膈食，朝食暮吐，暮食朝吐，甚則飲食不下。

處方：陳皮錢半 阿黃五分

用法：水煎陳皮，冲阿黃服。

來源：平南縣陳云屏。

又方

處方：柿蒂三錢 甘草二錢 生刀豆四錢

用法：水煎服。

來源：百色縣鄧永裕。

治吐瀉方

主治：日久吐瀉致傷津液，諸藥不效。

處方用法：白凡五錢，石柱參一兩，研成細末，

米糊為丸，每丸重一錢，每服一丸。重症

服三丸，并用車前子一錢，灯心一錢，水

煎送下，如服后吐出，繼續再服，服至不

吐為度。

來源：石龍縣陳廷仁。

又方

处方：木瓜炒黃四兩（如无木瓜，可用木瓜木皮）
用法：水煎服。

治腹痛經驗方

处方：歸身三錢 木香二錢 吳萸七分 白芍三錢
砂仁二錢 元胡錢半 枳殼二錢 台烏二錢 炙草一錢

用法：煎服。

來源：馬金柱。

治急慢性胃炎方

主治：胃時作痛，舌黃苔，胃部有熱辣感，不欲食，食而不下。

处方：覆花三錢 赤芍三錢 只壳錢半 尖板炭二錢 大黃一錢 苦參三錢 玄胡錢半 丹參八錢 川朴一錢 广木香一錢（細末冲服）竹茹錢半

用法：水煎數次，溫服。

來源：關瑜安。

治急性腸炎方

处方：老茶葉三錢 石榴皮三錢 川黃連三錢
用法：用水一碗半，煎至大半碗，分二次服。
來源：广东台山朱儒。

治慢性胃炎方

主治：胃脘瀰漫性痛，或脹滿，吐清涎，食慾不振，病劇時，微有背痛，大便失調，常溏洩。

处方：（附子理中丸、合枳實丸加味）即附子五錢（體壯可用烏頭）黨參七錢 白朮六錢 干姜五錢 蒼朮五錢 吳萸五錢 黃皮核一兩（胃酸过多的去黃皮核，加瓦楞子一兩）

用法：共研成細末，加飯為丸，如梧桐子大。每天服三次，每次服十至二十丸，空心服下，服半月可愈，也有服一個月或數個月才愈的。

來源：秦家泰。

又方

处方：玄胡二錢 蘆根二錢

用法：煎服，熱症加金鈴子一錢，寒症加吳萸五分至一錢，干姜五分。

來源：陳德馨。

針灸治慢性胃炎方

处方：足三里 內關 中脘

說明：常灸可斷根，如果是急性則針之。

來源：同上。

又方

主治：嘔吐、腹痛。

处方：勞宮双二壯 伏兔双二壯 督俞一壯（第

六胸椎底橫開二橫指） 膈俞八壯（男左女右） 京門二壯（男左女右）

說明：本灸法曾治愈五十例，腸胃流行性的感冒甚效，灸后一小時內，禁吃米湯及甜滯的東西。

來源：陸川丘基民。

治腸胃炎方

主治：吐瀉腹痛，一日數次或十次，糞色淡綠。

处方：樟腦一錢 紙炮硝一錢（即紙炮內的硝

藥，如无硝藥，可用火葯代替）

用法：用二茶杯水，共煎至一杯服。

來源：蔣裕光。

編者按：本方只適宜于寒性者。

治肚痛方

处方：蛤蜊二、三只 紅藍叶一兩

用法：把紅藍叶洗淨晒干，加鹽油炒，再加水煮熟，肉与湯服完即愈。

來源：陸川蔡英明。

又方

处方：艾叶五錢 射香 雄黃 硫黃各少許

用法：將各葯研碎，用紙卷成一條，肚痛時燃着，用生姜一片，蓋在臍門烘之，肚內即雷鳴，痛即止。

來源：鎮都縣農學儒。

治胃病方

（無論急慢性胃炎、胃潰瘍、胃下垂或新患久患）

处方：素馨花 三至五錢 甘草 三錢

用法：煎服，當茶飲（一天量）。

來源：梁文岐。

（附注）禁食酸辣及難消化的食物。

治胃 變方

处方：北胡 二錢 白芍 三錢 京半夏 二錢 黃芩

三錢 川連 一錢 干菴 一錢 吳萸 一錢

甘草 七分

用法：用水煎服，如身體虛弱，可加黨參、白朮。

來源：盧宗慶。

編者按：此方用于胃酸過多症，似較適宜。治嘔吐呃逆不止，胃氣將絕，不納水谷，病勢危急，諸藥不效方。

处方：高樑粟 二兩 遠年灶心土

用法：用水煎后，澄清，去渣頻服，不論寒熱虛實均可服用。

來源：謝鵬翔。

治心氣痛

（胃病）數十年不愈方

处方：鉄儿樹汁

用法：用上藥加米粉為丸，如黃豆大，痛時服一丸即愈。

說明：鉄儿樹是本地草名，狀如仙人掌，樹身起楞如方形，滿身有刺，割取其汁用之。

來源：富鍾縣陳救民。

又方

处方：荔枝核 木香

用法：將荔枝核晒干炒黃，同木香共研成細末服之，婦女最效。

來源：浦北。

治水瀉屢服藥不止方

处方：午時茶一包 白凡 六分

用法：清水煎服。

說明：午時茶能解毒，白凡味酸能收斂，亦能殺菌，本方有止瀉、殺菌作用。

來源：廣東順德梅景傳。

治泄瀉不止，食物不化，肚腹疼痛方（虛寒合用）

处方：黑沉香 錢半 广木香 一錢 公丁香 二錢

川椒 二錢 好玉桂 一錢 干姜 錢半 砂仁

二錢 白朮 三錢（土炒） 紅飯豆 四錢

大棗 三只（去皮核）

用法：共研成細末，加水做成团，煨熱，開水送下，小兒減半。

來源：博白周錫河。

治屙嘔良方

处方：路桃花根 二兩

用法：水煎服立愈。

來源：广东台山朱儒。

說明：此藥常生在路边，花形如桃花，果实外壳密生細刺，常粘着馬尾上，其果实裂開時分四房，如不分四房者不是。

治水瀉方（初起者）

处方：澤瀉 川朴 車前 各等分

用法：羌汁炒后，研成細末，用滾水調服，每次大人服二錢，小兒按年齡照減。

來源：百色林熙春。

治肚瀉方

处方：藿香 二錢 猪苓 三錢 粉葛 二錢 川連 錢

半 茯苓 三錢 榴皮 二錢 蒼朮 二錢 澤

瀉 二錢 吳萸 一錢 木香 錢半

用法：水浸平藥面，煎至小半碗，大人一次服，小兒分三次，隔二小時服一次。

來源：柳江縣陽高照。

治蘭尾炎方

主治：右腹盲腸部有压痛，右腳不能伸，或嘔便溏。

处方：省紅藤 九錢 敗醬草 三錢 土苡米 四錢半

紫草根 三錢 冬瓜仁 九錢 桃仁 四錢半

用法：用水煎，分三次服（一日量），連服二日。

第三日再服下藥：紅藤 三錢 冬瓜仁 三錢

丹皮 錢半 桔梗 錢半 土苡米 四錢 茯苓

三錢 甘草 二錢 紫草根 二錢 綿陳 三錢

川朴花 錢半（用水煎服）

來源：省中医進修班。

又方

处方：柴胡二錢 白芍三錢 只實半錢 甘草半

錢 桃仁二錢 大黃二錢

用法：煎服（未化膿期）。

來源：寧善才。

治血積血龜症方（即腹中腫塊）

处方：桃仁二錢 歸尾二錢 三棱三錢 蒲黃二

錢 靈脂二錢 紅花二錢 川朴二錢 莪

朮二錢 枳實二錢 生軍二錢 皮硝二錢

用法：清水煎服。

來源：田東謝吉興。

黃病類

治黃胖病方

处方：辰砂三錢 烏棗四兩（去核）

用法：共研成細末，煉蜜為丸，若黃色太深，可

加青凡六錢（煨枯）。

來源：常文英。

又方

处方：蒼朮一兩（炒焦） 棉陳五錢（炒焦） 白凡

五錢（煨枯至自行脫鍋為度） 大棗四兩

（去核去皮搗爛） 青凡五錢（煨枯）

制法：共研成細末，合棗肉為丸，如玉米大，用

紙包好，置地下三夜打地氣。

用法：每日吞服二次，每次四九，服前可食少許

食品，忌咀嚼。

來源：余慶年。

（附注）愈后須忌食南瓜、水豆腐、豬紅、糯

米等，否則虽愈亦可復發。

又方

处方：青凡八兩 甘遂五錢 大戟五錢 苡仁一

兩 茵陳一兩 蒼朮一兩 百草霜一兩

茴香五錢 歸身一兩 枯凡二兩 酸醋四

兩 附子一兩。

制法：青凡、酸醋煨枯，研成細末，同其他各藥

粉混和，米糊為丸，如綠豆大。

用法：每日早、晚、飯前，服二九，以后逐日加

一九，至五九為止。忌食甘草，孕婦禁

用。

來源：關瑜安。

又方

主治：黃疸、心音跳動甚急，耳鳴、面白，萎黃浮腫。

處方：生地四錢半 蒼朮三錢半 茵陳七分半

黃柏二錢 歸身三錢半 青凡五錢 煨肉

桂一錢 烏棗五錢（去核） 百草霜二錢

用法：共研成細末，麵糊為丸，如麻子大。早、

晚用開水沖服三錢，屢試屢驗。

來源：江漢光。

又方

主治：面黃貧血，心臟衰弱，四肢少力，稍勞動則心跳，甚則舌白，指甲微凹。

處方：茵陳七錢 蒼朮四錢 青凡四錢（煨）

大棗一兩二錢（去皮核蒸） 元肉一兩二

錢（蒸） 牛七四錢 百草霜五錢 歸身

五錢 北芪五錢

用法：共研成細末，用粘米飯制成小丸，每日

早、晚服三錢。

來源：丘基民。

又方

主治：黃疸、濕疸、面色暗淡蒼白，或面黃目黃，體力日漸衰弱，食欲減退，喜溫暖惡

寒冷。

處方：茵陳一兩 白朮八錢 蒼朮六錢 青凡八

錢 鐵屑八錢（即鐵匠打鐵時落下的）

辰砂一錢 槿粉二兩 黃柏六錢

用法：除槿粉外，其余各藥共研成細末，將槿粉

放入鍋內煮熟，入藥為丸，如花生米大。

每日早、晚服，二星期服完，禁食生冷瓜

果。

來源：恭城衛生院金榮憲。

又方

主治：面黃貧血，心悸亢進，身倦嗜臥，頭眩，耳鳴，眼花，食欲不振，或手足浮腫。

處方：茵陳二錢 澤瀉二錢 澤蘭二錢 卷柏錢

半 蒼朮二錢 蓮肉二錢 肉桂一錢 白芷

二錢 香附二錢 紅花二錢 川芎二錢

木香二錢 茯苓二錢 青凡一兩 煨白凡

一兩 白芍二錢

用法：共研成細末，煉蜜為丸，如菉豆大，每天早晚服二十九至三十九，每天依次遞增，一、二劑即愈。

說明：服丸過量則頭暈，休息數小時即好，服后三天見效，男女均宜用。

來源：梧州中醫學會李仲稻。

治黃腫病方

主治：肌黃膚腫（或不腫），面黃肌瘦，食少，心悸，耳鳴，倦怠，稍有勞則心悸，耳鳴尤甚。

處方：青凡五錢 雄黃三錢 硃砂三錢 月石三錢

錢 金砂三錢 蒼朮三錢 茵陳三錢

（如腫，加蜣螂三只）

用法：男加地龍，女加髮灰一撮，麻油一酒杯，糯米粉如手指大，加水將各藥搗勻，少少煮熟，用酒一斤四兩浸之，勿令洩氣。第一天先令患者食雄雞肉或湯，第二天起，每天早、晚飯前將藥煎溫服，一至二杯，服完病未愈，再服一料。愈后，食欲已增，可服補藥蓮脾湯等，以資調養。

來源：石龍縣陳廷仁。

治陰黃疸方

處方：生黃姜一二兩

用法：水煎服，二、三日即愈，孕婦忌用。

來源：賓陽縣。

治加答兒性黃疸方

處方：洗手菓樹皮半斤

用法：用水煎服，連服一周即愈。

來源：大新。

治婦女萎黃方（黃胖病同）

處方：黃精一兩 白凡三錢 歸身三錢 青凡二錢

錢 海金砂二錢 熟地五錢 茵陳三錢

黑棗十枚

用法：將上藥浸酒服。

來源：關瑜安。

治黃胆方

處方：生芋頭六兩（去皮）

用法：生食，食后，如喉痒難過，則用白醋解

之。

來源：融安縣謝保琨。

又方

处方：茅根二兩 綿茵陳五錢 滿天星一兩

用法：將上藥加豬肉煲食，輕症二、三劑可愈。

來源：羅芝齡。

又方（全身面目俱黃）

处方：生黃姜四兩 瘦豬肉一兩

用法：水煎溫服取微汗，每日服一次（小兒則用

黃姜一兩），重者三服，輕者一、二服即愈。

來源：石龍縣陳廷仁。

又方

处方：茵陳五錢

用法：水煎常飲。

來源：石龍縣胡文。

治走胆黃方

主治：手足酸麻，面色焦黃。

处方：瓜蒌根三錢 勾藤錢半 枝子三錢 茵陳

三錢 虫退十只 紅花錢半 胆草五錢

用法：煎服，另用一劑作洗滌。

來源：陽朔。

治黃病方

主治：肌肉黃腫，食欲不振，心跳，脚軟，頭

暈，耳鳴，舌淡紅，脈細澀。

处方：青凡二兩（醋煨成炭） 茵陳二兩 蒼朮

二兩 川朴二兩 川瓜二兩 砂仁二兩

大棗八兩

用法：右六味共研成細末，以棗肉為丸，每服

二、三錢，日服三次，輕症半料，重症一料可愈。

來源：蒼梧縣黎善廷。

又方

处方：土茵陳四錢 白凡二錢 青凡二錢 歸身

五錢 石柱參錢半 海金砂三錢 口米砂

錢半 百草霜二錢 北芪四錢 黃精五錢

熟地錢半 大棗一兩

用法：酒浸或為丸，早、晚空心服。

來源：蒼梧縣蒙卓廷

又方

處方：茵陳一兩 蒼朮一兩 硃砂一兩 生青凡

四錢 生白凡四錢 海金沙一兩 牛膝一

兩 續斷五錢 百草霜五錢

用法：紅黑棗適量，去皮核為丸，如黃豆大，每服錢半至二錢。

來源：南寧黎劍俠。

又方

處方用法：歸身五錢 硃砂二錢 北芪五錢 黃

柏三錢 黃精五錢 甘草三錢 枯凡四錢

青凡(煨)二兩 大棗半斤 蜜煉為丸，辰

砂二錢為衣，早晚空心服，每服一錢至二錢。

來源：蒼梧縣龍蔚文。

治婦人黃腫經閉方

主治：經閉，遍身黃腫，心悸，耳鳴，肢軟。

處方：姜黃四錢 姜皮四錢 土茵陳四錢

香附四錢 酒制青凡二錢 金砂三錢

大棗四兩

用法：各藥共研成細末，加棗肉為丸，如黃豆大，每服六至八丸，每日早、晚服。

來源：荔浦縣。

治婦人黃病方

主治：肌肉黃腫，食少，心悸，肢倦，頭暈，耳鳴，舌淡紅而滑，脈細澀。

處方用法：陳皮錢半 茵陳五錢 蒼朮二錢 歸

身四錢 砂仁錢半 百草霜錢 白朮

三錢 白芷錢 紅礬一兩 (白凡、青

凡加醋煮熟，即是紅凡)

用法：共研成細末，以大棗肉五兩搗溶蒸熟為丸，每晚臨睡前服二錢，用米湯送下。

來源：蒼梧縣李挺生。

編者按：以上治黃病各方，均古方書所載，不過出入一兩味藥而已，每方組成，都脫不了青凡或白凡，以治黃胖病為主(即貧血萎黃病)。農村中患嚴重勾虫病的農民，多出現黃胖症，即明戴思恭所說的農民黃疸病，用這類處方，有一定的療效。年來各地，用三凡丸治晚期血吸虫病，就是从

這類方劑產生出來的。

治婦人黃胖病方

處方：皂凡二兩 黑棗半斤

用法：黑棗去核，將皂凡放在棗內包固，用茶油四兩煮透，待干后，再用雙酒二斤浸七日，早、晚飲時，各服二杯，酒盡病愈。

源來：蒼梧縣童景賢。

編者按：此方出于醫部全錄。

治瘀血黃疸方

處方：當歸三錢 桃仁三錢 赤芍三錢 靈脂三錢

錢 川芎一錢 紅花一錢 只壳一錢 烏藥二錢 丹皮二錢 元胡二錢 香附二錢 甘草二錢 茵陳三錢

用法：水煎服。

來源：石龍縣中醫進修班。

治女勞疸方

用法：生地八錢 丹皮二錢 澤瀉四錢 淮山三錢 于肉二錢 茯苓三錢 茵陳三錢

用法：水煎服。

來源：石龍縣中醫進修班。

治黃汗方

處方：茵陳八錢 防己四錢 云苓四錢 甘草三錢

錢 黃芪六錢

用法：水煎服。

來源：石龍縣中醫進修班。

治因感溫熱后，入水沐浴，引起

黃疸方

處方：野同蒿（即旋覆花草）四兩 沙牛肉四兩

用法：水煎，食牛肉。

來源：石龍縣胡文。

黃疸藥酒方

處方：蒼朮五錢 茵陳五錢 青凡五錢 茯苓五錢

錢 百草霜五錢 紅棗一兩 黑棗一兩

用法：右七味，浸酒三斤，約十天可服，每次在早上飲一至二兩，服后休息片時。

來源：北流陳旭初。

腫脹類

治腎臟炎水腫方

(頭面先腫，至四肢、腹部及陰囊有水波形)

处方：(一)用豹牙狼(取水边的根藤叶并用)

荔枝木叶(盖影水面的)

用法：共煲水浴身。

(二)炒枝四錢 茵陳四錢 滑石三錢

黃柏三錢 防己五錢 赤小豆五錢 杏仁

錢半 川棟子一錢 黑丑三錢 木通錢

半 車前三錢 扁蓄三錢 瞿麥 赤茯苓

四錢

用法：水煎服。

來源：丘基民。

編者按：此方宜于急性期。

治全身腫方

处方：蟾蜍一只 巴豆七粒

制法：將巴豆塞入蟾蜍口內，用綫縫口，納入小

瓦器內，用坭封固，埋入土中七日后取出，用谷壳煨過，取出候用。

用法：必須由頭至足，由左至右，依序分服，不可一次服完，開水沖服。

來源：陸川金山培。

治周身風水腫、氣腫方

处方：萊菔子一錢 蟾蜍一只

用法：將萊菔子放入蟾蜍口內，用瓦煨成炭，以米糊為丸，如菉豆大，每日服一次，每次十五粒。

來源：陸川黃金萸。

治身脚浮腫方

处方：干柚子皮

用法：將上藥燒炭，放清水浸之，再用此水煮飯食即消。

來源：田東滕二姑。

治腹水病方

处方：上蓮下柳二錢 黃桑筋根五錢 獨脚烏柏一兩 山枝子三錢 黃蘭花三錢 老桑根

一兩 金銀花 五錢 白茯苓 五錢 黃草 五錢

用法：用水煎，分二次服，每天一次，約服十多天，即完全消退。忌食鹽、油四天，吃煮熟的紅豆、蒜子和陳皮，也很有效。

來源：柳州周生。

治腹水膨脹、堅硬及普通水腫方

處方：紅帽頂

用法：以紅帽頂根梗四斤，煎熬濃縮為膏狀，約三百西西，每天用開水送服二次，每次二十西西，服完即愈。

說明：該藥高二、三尺，葉對生，橢圓形如掌大，有緣鋸齒狀，夏天開多簇鮮艷花于樹頂故名，多生于荒地、園邊等。

來源：合浦陳明璣。

治水腫方

處方：扁豆 花生米 大蒜頭 各半斤（打） 黃糖 二兩

用法：將上藥加水十斤，以文火熬濃汁一碗（扁豆炒黃）頓服，先吃汁，后吃渣，每日一

服，不可間斷，三、五服即愈。忌禁咸味，秋石也不能沾，否則就會復發。除單腹鼓外，不管什麼水腫都有效。

來源：桂平縣七區聯合診所黃澤森。

又 方（本方除單腹腫外，其餘不論心臟性、腎臟性、營養不良性等均有有效）

處方：（一）川加皮四錢 小木通四錢 枳殼二錢

大腹皮三錢 黑牽牛三錢 陳皮錢半

檳榔二錢 云苓皮四錢 台烏二錢 椒目二錢

燈心五錢 苦地胆四錢 歸身三錢

小茴二錢 生薏仁五錢 土姜黃三錢

姜皮二錢

用法：用水五碗，煎至大半碗時，溫服。

處方：（二）制香附三錢 歸身四錢 台烏三錢

淮牛七二錢 廣木香錢半 燈心五子 苦地胆四錢

用法：

用水三碗，煎至大半碗時溫服。

處方：（三）狗脊三錢 澤蘭三錢 黑牽牛五錢

郁金三錢 杜仲五錢 牛七三錢 台烏三錢

生薏仁五錢 早蓮草五錢 白藜五錢

小茴 三錢 鷄內金 三錢 山甲 二錢 枳實 三錢 女貞 三錢 沙苑 三錢 木通 三錢 灯心 五子 苦地胆 三錢 歸身 五錢

用法：用水五碗，煎到大半碗時溫服。

處方：（四）（緊皮丸）麗參 二錢（如无以党參代之）澤瀉 一錢 大生地 一錢 麥芽 一錢

法夏 二錢 莪朮 五錢 青皮 一錢 建曲 一錢 木通 一錢 車前一錢 川朴 六錢

陈皮 五錢 茅朮 一兩 赤苓 一錢 云苓 三錢 北芪 一兩 故紙 一兩 歸身 一兩 紅

棗 六枚

用法：共研末，用洋面煮糊為丸，如梧子大，每服四十丸，早晚溫水送下。

處方：（五）茅朮 八分 川麝香 五厘 白朮 八分

（名開鹽方）

用法：研末，用鯽魚兩條，去腸臟，加食鹽（一兩）入藥末，共置魚腹中，用紙包固。煨熟后，再用新瓦焙干研末，隔一二宿后，每晚用開水送服一錢。

說明：1. 以上五方，先服第一方兩劑，以后接服第二方、第三方，这样周而復始地輪流互服九劑，可告愈。愈后，再服第四方，服

后神氣充足，故叫水腫善后方。待神氣充足后，再服第五方。2. 使用上方時，須令病者戒除食米七天，以白皮番茄代餐，酒、色、鹽、醬犯之即發。在未服開鹽方前，以秋石代鹽，大忌暈腥、黏滯、生冷、酸濕等物，宜食旱芹菜、黑芝麻、荸薺等。

來源：貴縣十五區梁啓春。

又方

處方：花生 二斤 蒜頭 八兩（不去衣） 辣椒干 二兩

用法：用淨水數碗，熬至極爛，將花生連汁服食，日服三次，忌食粥飯（熬時不要放油鹽）。

來源：北流陳旭初。

又方

處方用法：獺骨為散，沖開水服。

來源：百色縣鄧永裕。

又方（水腫、氣腫均效）

處方：生蒲公英 四兩 土苡米 二兩

用法：用水四碗，煎至一碗時，兌下酸醋，分四次服。連服數天，即可全愈。若肚皮硬時，可加葫蘆五錢共煎。

來源：平樂縣羅運普。

說明：如水腫則尿多，氣腫則屁多。

治血臃經驗方（對婦人更有效）

處方（一）：莢朮二斤 生鹽四兩 葱頭四錢

糯米粉四兩

用法：先將莢朮、葱頭共同搗溶后，加生鹽、糯米粉拌勻蒸熟，罨患者腫腹部，用布扎好，繼續三天，每天一次。第一天覺微癢，突起如黃豆大的血粒；第二天則更癢，顆粒如指頭大，其時腹消一半；第三天再罨不癢，腹腫可全消。但須在第二天兼服下述第二方。

處方（二）：大黃四錢 阿膠三錢 血竭一錢

金土鱉二錢 紅花錢半 漢防己二錢 桃

仁三錢

用法：煎一次服完。

來源：徐建文。

治惡液質性水腫方

（因長期飢餓，至全身浮腫、足部尤甚者）

處方：黑豆一斤 燒酒一斤

用法：將黑豆（半斤），炒熟后，加水、酒各半

（共約一斤），煮滾后，早晚各服一次，

連服數日可全消。酒、豆可隨患者食量。

來源：貴縣保安中醫聯診所丘壽祺。

治一般水腫方

處方：面粉半斤 大蒜二兩

用法：好醋調成塊，煎熟后服下。忌食鹽。

來源：石龍縣中醫進修班。

治風水方

處方：麻黃三錢 茯苓六錢 炙草二錢 桂枝三錢

錢 澤瀉三錢 防己三錢

用法：水煎服。

來源：石龍縣中醫進修班。

治石水腫方

處方：茯苓三錢 防黨五錢 白朮二錢 附子三錢

錢 生姜三片

用法：水煎服。

來源：石龍縣中醫進修班。

治腹脹方（全部肚子腫脹）

處方：黃鱔魚五兩 大蒜頭一枚

用法：酒一杯，共煮熟，食之即消。

來源：劉緝熙。

又方

處方：大肚蜘蛛、嫩黃皮木叶。

用法：將大肚蜘蛛用新瓦焙干，研成細末，再用

黃皮叶煲水沖服。

來源：桂平黃澤森。

（附說）曾治愈初生小兒、卵腹均脹者多人。

治遍身浮腫、腹脹方

處方：赤小豆五錢 腹皮四錢 茯苓四錢 秦皮

二錢 商陸三錢 木通三錢 姜活一錢

澤瀉三錢 郁李仁三錢 尖櫚一錢

用法：水煎服。

來源：容縣鄔东材。

治腹水方（下肢浮腫、小便不利）

處方：苦參十五兩，清水四千毫升煎至一千毫升，過濾后，按前法再煎兩次，然后將三次藥液共同混合，濃縮成五百毫升。分五日服，每日服一百毫升，分三次服，服至全消為止。禁忌食鹽，愈后仍忌三十天。

來源：忻城縣何雪松、許翰華。

治皮膚水腫方（慢性腎臟炎）

處方用法：（一）无娘藤（又名天吊藤）煎水，

先熏后洗。（二）用老蒜梗或老蒜皮煎

水，先熏后洗。（三）大風叶煎水，先熏

后洗。

來源：宜山專區醫院宋世端。

治陽水腫方

處方：商陸三錢 淮通五錢 只實錢半 車前五

錢 尖櫚二錢 茯苓皮一兩 姜活二錢

广木香錢半 腹皮五錢 川朴錢半 西芫

五錢 大黃八錢 桑白一兩 瀉叶三錢

飯豆一兩

用法：水煎服，忌食鹽及生冷油膩的食物。

來源：田東縣黃榮亮。

治氣腫水腫方

處方用法：千年健，草果仁，滑石，生扁蓄各取一兩，研成細末，放入香蕉內吃食。

來源：扶綏縣林秀稿。

治腫脹方（腹部脹大如鼓，四肢削瘦）

處方：肉蓯蓉 二兩 香附 六錢 神曲 六錢 山渣 四錢 麥芽 六錢 青凡（煨） 一兩二錢 紅

棗 四兩（去核）

用法：共末，飯制為丸，每丸五分，每服六丸，日服二次。

來源：德保縣唐啓源。

虛癆類

治肺癆及五癆七傷方

處方：川貝母 四錢 制半夏 四錢 冬虫草 四錢 明白凡 四錢 羅漢菓 四錢 知母 四錢

廣陳皮 四錢 西洋菜 四錢 仙鶴草 四錢

用法：共研成細末，用生竹筒一枝，將藥末放入竹筒內，塞好竹筒口，以黃泥包滿竹身，然後用火炭煨，約五個小時後，取出放地面，使吸收地氣一夜，再將竹筒破開，取出粘于竹筒內的藥粉（不粘竹的不要，取時，要輕手慢取），用糯米糊為丸。每服一錢或二錢。

來源：廣东南海顏煜強。

治肺癆病方

處方：冬虫草 三兩 正川貝 四兩 生阿膠 三兩

用法：共研成細末，煉蜜為丸，每丸重一錢半，早晚各服一丸。

來源：廣東台山朱儒。

止咳血症方

處方：側柏炭 三錢 云苓 四錢 桔梗 四錢 茅根 五錢 竹茹炭 一兩 藕節 五錢 川連 二錢 柏仁 二錢 人中白 五錢 煨棕炭 三錢

用法：清水煎服。

來源：田東黃正甫。

治肺癆咳嗽吐血或吐痰方

处方：魚腥草四兩 檸檬叶一兩 貝母四錢 橘紅四錢。

用法：淨水兩碗半，煎至碗半時沖蜜糖，分兩次服。

來源：柳城縣。

治久咳音啞驗方

处方：黨參三錢 白朮三錢 茯苓五錢 甘草三錢 陈皮四錢 桔梗五錢 紫苑三錢 百步一兩 荊芥三錢 胡桃核一兩 杏仁四錢 川貝三錢 蘇梗三錢 冬花四錢 白糖四兩 生姜五錢

用法：用水煎，分數次服。

來源：武鳴縣中西醫聯合診所謝子亭。

編者按：胡桃核須打破去壳，才能煎出味來。

治勞症方

处方：松木寄生六錢 蘇木三錢 漆木寄生五錢 山杞子根一兩 桃子木寄生六錢 牛奶木

寄生五錢 烏柏木寄生八錢

用法：清水三碗，煎至二碗服。

來源：昭平縣黃明元。

治肺癆咳嗽方

处方：杉木寄生五錢 松木寄生五錢 桐木寄生五錢 紫荊木寄生五錢 桑寄生五錢 猪仔笠一兩

用法：清水三碗，煎至一碗，去滓溫服。

來源：柳州第二門診部周生。

虛損類

治抽筋縮陽方

处方：（一）簷前雨水滴过的老舊火磚（生有青苔的）半斤 生姜头四兩（搗碎） 酒餅七只

用法：先將火磚打碎，炒至黃色，用酒淬過，再加生姜酒餅同炒，用酒淬濕，以手巾布二條，分為兩包：一包從后腦向背擦至腰下，另一包從額向胸腹擦至臍下，其陽物即出。

处方并救急法：(二)当陽物縮入時，用嘴來含

陽物，使不縮入，繼以雄黃微炒冲酒服。

处方灸法：(三)將患者陽物乘机拉出，在陽莖

根有窩处灸三壯，百会一壯，腿头骨(即兩股骨起处，圓骨上尖端)左右一壯，以臍对过之脊骨中央旁開二寸(即腎俞穴)各二壯，尾椎骨二壯。

來源：陸川縣羅金山培

治男子縮陽，女子縮陰方

处方：吳萸一兩

用法：將藥炒出白烟時，用水冲服。

來源：田东謝吉兴、昭平王鴻琛。

又方

处方：(一)吳萸三兩 蓮須一斤

用法：共搗爛，炒敷肚臍，分二包輪流換敷，兼服下方。

处方：(二)党参五錢 白朮三錢 附子一兩

干姜五錢 玉桂六錢

用法：煎湯碗余，一小時內分二次服完。

來源：賀縣袁啓詳。

又方

处方：天生礬五分

用法：冲酒服。

來源：富鍾縣衛協會嚴啓超。

又方

处方：生鷄公一只

用法：將鷄破開，敷患者肚臍，并用吳萸煎水服有效。

來源：昭平王鴻琛。

治縮陰方

处方：熟附二錢 干姜錢半 石柱參一錢 巴戟

肉錢半 貢朮二錢 川茴一錢(鹽炒) 炙

草一錢

用法：用水煎服，另用生鷄一只，剖去內臟，乘熱縛于胸前。

來源：玉林縣周玉堂。

治男子陽物不舉方

处方：陽起石五錢(酒炒) 鍾乳石五錢 葫蘆芭

五錢(鹽水炒) 淫洋藿 三錢 蛤蚧 三錢

(鹽水炒) 炙草 二錢 硫黃 五錢 (用布

包好，用菲菜和豬腸煲，煲后，除去菲菜和豬腸)

用法：共研成細末，煉蜜為丸。在頭兩天內，每日服二次，每次服六錢，以后每服三錢。

此方还可治縮陽症，但以陽虛為宜。

來源：陸川韋善祥。

治虛火陽物強起方

處方：(一) 南蛇油

用法：將油點涂生殖器底下，連涂三夜立效。

處方：(二) 芒硝 三錢

用法：用細末擦，陽物即垂。

來源：陸川縣羅金山培。

治縮陽方

處方：病人額門的頭髮燒存性，沖水服即出。

來源：賓陽縣。

又方

主治：男子腎陽虛損，陽具突然向腹部縮入。

處方：(一) 硫黃末 二錢 五加皮酒 (酌量)

用法：隨患者的酒量，將硫黃末一次沖服，至自覺陽具正常為度。如服一次未止，可繼續服至見效，如无加皮酒的，可買五加皮四兩，以酒二份，水一份煎沖服。如陽具盡者，服上藥后，另用艾灸長強穴十余壯，使其伸出，再繼續服下方三、五劑。

處方：(二) 熟地 八錢 萸肉 五錢 淮山 五錢

云苓 三錢 丹皮 三錢 澤且 三錢 玉桂 二錢 熟附 三錢 陽起石 三錢 仙茅 三錢

用法：煎服，并無復發。

來源：平南安安聯診所何昭正。

又方

處方：火藥散

用法：鳥槍用的火藥二、三錢，好酒三、四兩沖服，約五分鐘左右，陽物即出。

來源：橫縣徐建文、昭平王鴻琛。

治夜臥失眠驗方

處方：白芍 二兩 雞肝 一只

用法：將白芍煎好去渣后，再把雞肝搗爛，共煎

溫服。

來源：博白李慶英。

治強陰流精不止方

處方：葑子一兩 故紙一兩

用法：研成細末沖服，每服三錢。

來源：陸川池國英。

治遺精及精流不止方

處方：黑棗四只 硃砂一錢

用法：用茶葉包好，煨熱一次服完，最多兩劑便愈。

來源：賓陽縣。

治夢遺精滑久不愈方

處方：麥冬三錢 桂枝一錢 煨牡蠣五錢 煨龍

骨五錢 金英肉三錢 蓮須一兩 絲弁錢半

杞子三錢 歸身錢半 大棗五枚 炙草二錢

用法：加灯心引水八杯，煎取三杯，一日三服。

來源：武鳴縣危玉珠。

治脫肛方

處方：蚯蚓二条（无白圈者佳，寒症炒用，熱症

免炒）升麻錢半

用法：把蚯蚓搗爛，与升麻同蒸猪肉食，數次即愈。

來源：陸川梁爵平。

編者按：此方經兴安縣兩金僑族自治區衛生所進行實驗，計七名脫肛患者，服此方后，有五名全愈。其中一例，僅服藥一次，即告全愈。

又方

主治：大腸脫出甚久而干燥。

處方：冰糖一斤 木耳一斤

用法：共煲，分二天服完，不吃其他食物，食后即用麻油涂脫出部分，并用左手攀住病人的肩，右手拿蕉叶將腸托回。此后還可用猪腸四兩，古月一兩共同煲食，可永不復發。

來源：陸川金山培。

又方

主治：脫肛久出不收，長有四寸，症屬氣弱者。

处方：(一) 枳壳兩半 龍骨一兩

用法：水煎服，連服三剂后，再服下方。

处方：(二) 防党一兩 黃芪一兩 白芍八錢

小甘草五錢

用法：水煎服，連服二剂。

來源：雷越民。

治久痢脫肛及產后子宮下墜方

处方：草麻嫩叶數張 (如用草麻子則二三錢) 土

牛七一兩 (又名倒鈎草) 白礬五錢

用法：將草麻、土牛七共同搥溶，敷前頂顛門

处，并將白礬細末，用開水冲洗患处，然

后將脫物托回，待脫物安定后，可將头上的

的敷藥除去。

來源：宜山覃慶芬。

治小腸氣方

处方：野芋头花 (亦名狼毒花，五月間才有) 適量

小茴五錢

用法：將花陰干后，与小茴、瘦肉煲水，作茶

飲。

來源：宜山專署衛生科。

治神經衰弱方

(如用腦過疲，头昏目眩)

处方：正西党三錢 正茯神三錢 杭麥冬二錢

炙远志二錢 北五味一錢 酸棗仁三錢

炒龜板三錢 广陈皮錢半 鹿角霜三錢

炙甘草錢半 生姜三錢 大棗三枚

用法：水煎服，輕症服五六剂，稍重者服十剂。

來源：資源縣黃建中。

治男人腎虧腰痛方

处方：熟地一兩 麥冬三錢 (去心) 萸肉四錢

白朮八錢 五味二錢 杜仲五錢

用法：用酒水各半，將藥煎过，分二次服。

來源：田陽縣何煜輝。

治腎虛盜汗方

主治：睡熟汗出，欲寐，倦怠乏力，脈緩。

处方：黑豆二兩 蓮肉二兩 浮小麥一兩 紅棗

一兩 磁石一兩

用法：水煎服。

來源：平南縣黎汪涵。

治病后虛弱方（濕腫亦有效）

主治：病后虛弱，倦怠，服補藥不見效者。

處方：鯉魚一尾，蒜頭適量（去外衣）

用法：鯉魚去內臟，將蒜頭納入腹內，加鹽、油調味蒸食。連食五、六條鯉魚甚效。

來源：桂林楊啓榮。

治陰虛陽強頭痛，夜不成寐方

處方：龜板二兩（鹽炒） 知母三錢 黃柏三錢

（鹽炒）元參五錢 熟地八錢 牛漆四錢

用法：清水煎服。

來源：玉林縣蒲塘北市中醫聯診所。

治老人夜尿多方

處方：肉桂心錢半 北茴香一錢 桑螵蛸三錢

韭菜子三錢 淮山藥三錢 覆盆子三錢

用法：焙干研成細末，臨睡時，開水送服一錢。

來源：靖西縣丁懋西。

說明：治小兒遺尿，除去肉桂、茴香。

治小便多方

處方：豬尿胞一個 糯米胡椒六、七粒

用法：共同煮爛，吃豬尿胞。

來源：資源縣。

治遺精針灸療法

處方：三陰交（針），氣海（灸），中極灸約二

十分鐘出針。

來源：柳州中医院第二門診部。

又 法

取穴：腎俞、志室各灸三小壯，灸三四次。

來源：蒼梧縣黎國義。

治陽痿針灸療法

取穴：腎俞、關元、中極各灸三壯，灸五七次。

來源：蒼梧縣黎國義。

風 痺 類

治半身不遂及風癱梅毒等症方

處方：錦軍二兩半 姜蚕二兩 穿山甲二兩半

歸尾 五兩 蜈蚣 二十條 (去头足) 斑蝥

二錢 (糯米炒黃，至烟尽為度)

用法：共研成細末，每日早、晚飯前，服二錢，分三十六天服完。

來源：容縣李西風。

治牙關緊閉外用方

主治：口眼歪斜，角弓反張，牙關緊閉，周身僵硬，痰喘。

处方：生川烏 生野胡椒根 細辛 各少許

用法：共研成細末，撬開牙齒，擦上下頷骨。

來源：覃慶芬。

治關節痛及腰痛不能轉側方

主治：周身筋骨作痛，脉沉有汗者。

处方：北芪 三錢 全虫 一錢 白朮 三錢 白薇 錢

半 扁豆 四錢 原荅 四錢 陈皮 二錢 川

朴 二錢 土苡 一兩 尖板炭 一錢 虎脛骨

一錢 甘草 二錢

用法：用水煎服，每日一劑。

來源：關瑜安。

治風濕脚痛藥酒方

处方：蚕砂 八錢 正鹿膠 五錢 牛七 三錢 歸尾

八錢 白茄根 五錢 秦艽 五錢 鱉甲 七錢

松節 四錢 黃精 五錢 虎骨 一兩 川獨活

四錢 潞党 一兩 靈仙 三錢 寄生 五錢

川杞子 四錢 甘草 四錢 川草薢 八錢。

用法：浸四十度酒五斤，孕婦忌服。

來源：郁林龐顯初。

治周身及四肢痛方 (以手按之痛甚，

中医叫痛皮症)

处方：木通 二兩

用法：用水煎服。

來源：广东順德梅景傳。

治老年風濕骨痛方

处方：牛甘果虫 一兩

用法：浸酒服。

來源：田东賴立矩。

治腰閃挫痛方

处方：蓮梗四錢 灵仙二錢 狗脊二錢 白芍五錢

碎補二錢 海桐皮二錢

用法：水煎服，另加外用方如下：

处方：硼砂水飛淨（或硼酸粉亦可）

用法：用灯芯點眼角，头尾共四點，淚尽痛止。

來源：北海岑明。

治鶴膝風方

处方：蒼朮四兩 枸杞子二兩五錢 茄根二兩

歸身一兩 牛七一兩 龜板一兩 防風一兩

兩 藜蘆一兩 独活一兩 草薢一兩 姜

活一兩 蚕砂一兩 松節一兩 虎骨一兩

用法：共用好酒浸服，服后，將渣研成細末，煉

蜜为丸。每服三錢，飯前開水冲服，輕者

一剂愈，重者兩剂可愈。

來源：陸川苏廷芳。

治双單鶴膝風方

处方：广木香五分 歸身一錢 防風五分 北辛

五分 藁本一錢 沒藥一錢 附片一錢（炒）

川烏五分 薄荷錢半 碎補一錢 玉桂兩

半

用法：共研成細末，另用鵝油四兩、猪油四兩、

麻油五兩（沒有麻油的，可用牛油）混合

后，將藥末放入搗勻，过二晝夜后，以文

火熬之。待熬成羔時，即加牛酥（牛反葛

時，嘴角出的白沫，以草紙抹取不許，晒

干焙酥，研成的粉末）搗勻，冷后待用。

用時，每次蘸羔二錢，置于掌心，再按摩

患处，使之發熱为止。随后，用鶴嘴蘭

花，煨末一錢，令患者用開水冲服，再用

被盖臥，約半小時，患处外部，就会自然

滲出黃色黏液，如此則愈。

來源：博白刘海东。

又方

处方：五味一兩 芒硝一兩 生姜半斤（取汁）

酒糟四兩 黃糖一兩 皂角一兩

用法：先將五味、皂角共研成粉末，再与酒糟、

黃糖、芒硝、姜汁等共搗勻，用酒炒熱敷

患部。如果过干，可加姜汁濕之，忌食酸

辣物。

來源：博白温子明。

又方

處方：紅草麻根瓢 一兩 五爪楓水叶 兩半 走馬

楓叶 兩半 枸杞菜 五錢 落地金錢 五錢

(又名捕蠅草，狗跡草)

用法：共搗溶，用酒炒，敷患處。

來源：博白縣鄭承湘。

又方

處方：山枝子 一兩 白芥子 五錢 苦杏仁 三錢

川椒 三錢 吳萸 三錢 古月 二錢 乳香 一

錢 沒藥 一錢

用法：共研成粉末，用糯米飯拌勻，溫敷患處，

一宿后可消愈(不用忌口)。

來源：博白縣麥德彰。

又方

處方：(一)白鳩孫草 四兩 鵝兒不食草 四兩

(二)蒼朮 三錢 白芷 錢半 雄黃 錢半

輕粉 錢半 五倍子 錢半 皂角 錢半 防風

一錢 靈仙 錢半 川足 三條 虫退 三錢

硫黃 錢半 川芎 錢半 北辛 一錢 麻黃 一

錢 姜活 錢半 天麻 一錢 半夏 錢半

用法：將落地沉香木根燒紅一端，用六層草紙貼

患處，再用燒紅的落地沉香木根灸之，患

者如覺痛則移去，痛止再灸。灸后用第一

方，以水半斤蒸取四兩，涂患處。再用第

二方，研成粉，用草紙卷成藥箭，熏之即

愈。

來源：博白縣劉桂泉。

治中風方

主治：神昏卒倒，四肢抽搐，口流涎沫，身青

黑。

處方：金鎖匙 五錢 黑墨草 錢半 蛇胆陈皮 二分

用法：右二味用水煎后，沖蛇胆陈皮末服。

來源：平南縣何玉波。

又方

主治：卒倒不省人事，痰涎壅塞，喉間作响。

處方：牛黃 四厘 白凡 四分 卜荷 錢半

用法：共研成粉末，用開水沖服。

來源：平南縣石泰。

治半身不遂針灸療法

取穴：百會 肩髃 曲池 合谷 環跳 陽陵泉

絕骨 崑崙各灸三壯

用法：第一天灸無病一邊的手和足，第二天灸患病一邊的手和足，輪流灸治，以十二次為一療程。

來源：蒼梧縣黎國義。

治腰骨痛方

處方：牛膝三錢 杜仲三錢 木瓜二錢 白芍二

錢 小茴一錢 元胡錢半 姜活錢半 乳香一錢 沒藥一錢

用法：酒水各半煎服。

來源：荔浦縣曾繁清。

治歷節風關節疼痛方

處方：馬胎四兩 風藤二錢 靈仙二錢 天麻二

錢 當歸三錢 草節二錢 虎骨二錢 姜活錢半 川瓜錢半 牛膝錢半 全蠍錢半 熟地三錢 川芎三錢 胆星二錢 松節二錢

用法：水煎，沖酒一杯服。

來源：嚴在貴。

治肩胛痛方

主治：右肩胛作痛，沿至頭上，手不能舉，脈沉。

處方：麻黃三錢 白芍三錢 北芪三錢 烏頭二

錢 稿本二錢 炙草三錢

用法：用水煎服。

來源：平南縣黎汪涵。

編者按：此方即金匱烏頭湯加稿本，有效。

治身骨痛方

主治：身骨麻痛，氣候變常，久旱久雨則發。

處方：萆撥五錢

用法：研成細末，一日分三次服，酒沖服。外用

松節油、樟腦、冬綠油等分擦。

來源：平南縣黎汪涵。

顏面神經麻痺電針療法

取穴：攢竹、四白、地倉、頰車、合谷、肋穴、風池、太陽、睛明、瞳子髎、人中、承

漿。

說明：（一）在針治一個療程（十次）后使用之，

否則会引起不良反應。

（二）隔日針電一次，十次為一療程，治

療三個療程，可以減輕或全愈。

（三）如受涼，昨天得病，今天針灸，可

邊針灸，邊以姜汁送服陳李濟蘇合

丸一粒，可收立竿見影之效。如產

后引起，可多灸地倉、頰車，耐心

治療方效。

（四）肋穴可針不可電，尤以風池、睛

明、人中更不宜電。

來源：省人民中醫院黃榮浩。

癲 癇 類

治定期癲病方

主治：癲病卒然昏倒，不省人事，喉中有痰鳴，吐涎、抽搐、脈弦緊、有時口、眼歪斜等。

處方：正牛黃 五分 胆草 三錢半 天竹黃 四錢

制南星 四錢 姜蚕 三錢 全蝎 錢半 防風

二錢半 天麻 三錢半 菖扶 二錢 勾藤 三

錢 法夏 三錢 雄黃 五分 廣皮 二錢 白

花蛇 四錢

用法：共研成細末，煉蜜為丸，如梧子大，每日

四錢，小兒酌減。并針灸十三鬼穴。（見

針灸大成）

來源：梁濟川。

治癰症方

處方：口米硃砂 三錢 甘遂 三錢

用法：共研成細末，每次用五分，蒸豬心食，直

到愈時為止。

來源：余慶年。

編者按：此方出濟生方，名遂心丹，制服法和

本方略有所出入。

治癲症方

處方：沉香 五錢 琥珀 一錢 正硃砂 五錢 云苓

一兩 制南星 二錢 川射 二分 淡秋石 五

錢。

用法：面粉為丸，每次八分，每日兩次，服完藥

丸，隔三天后，可再服如下藥湯：太原朮三錢，熟棗仁四錢，炒麥牙一兩，遠志三錢，歸頭四錢，黃芪五錢，香附五錢，茯苓一兩，炙草一錢，北麗參錢半（淨水煎服）
來源：謝承教。

治癲狂驗方

處方：（一）西党三錢 茯神三錢 龍齒二錢

（挫煨）茯苓二錢 遠志五錢（用

甘草湯泡去骨）建菖三錢 硃砂

錢半（分二次沖服）舌生芒刺或舌

尖紅加黃連八分 血虛加當歸三錢

有痰加半夏 甘草 橘紅各二錢

（二）正沈香五錢 錦文大黃八兩（酒浸

透）實条苓八兩 青礞石一兩（打

碎，加朴硝一兩，同入瓦罐內，用

鹽、坭封固，煨至黃金色為度）。

用法：第二方四味，共研成細末，煉蜜為丸，以硃砂四錢為衣，每日早晚服二次，每次服三錢，姜湯送下。

第一方用水煎服，三、五日間服一劑，病發一年以內的，服完藥丸一料可

愈，二年內的，服完丸藥二料可愈。孕婦忌服丸藥。

說明：第一方乃加味安神定志丸，改作湯劑，水煎調硃砂服。第二方即礞石滾痰丸，前人文獻均有記載，本人用以治療情志郁抑，憂思驚懼等刺激而致神經失常之癲狂病，每奏奇效。在湖南已治十余病例，于桂林又治五、六病例，均獲全愈。

來源：桂林陳和風。

又方

處方：大黃六錢 黃芩六錢 制礞石二錢 川連

四錢 桃仁四錢 茯神五錢 石菖蒲四錢

胆星三錢 沉香二錢 口米硃砂三錢 牛黃

二分 珍珠一分

用法：將前八味藥用水煎，沖硃砂末、牛黃末、珍珠末、沉香末服。

來源：平南縣林梓才。

治羊癲方

主治：卒然昏倒，不省人事，痰涎壅塞，口流唾沫，兩目上視，須臾漸復常態，每年發十

处方：

余次，或月發數次，甚則日發數次。

皂凡一兩（煨至紅色，要煨透）硃砂三錢
魚肚膠一兩（加面炒至黃色）鉛粉一兩
（炒至黃色）

制法：

共研成細末，以粘米粉少許，煮糊為小丸。

用法：

早晚空心服九錢半，十歲左右兒童減半，

停藥三日，服藥一日，服完九藥一料后，

停藥三個月，服九藥五料，病可根治。如

服九藥后，有便秘不納食者，以熟附子

四錢 炒白朮一兩 米炒北芪三兩，清水

煎服三、五劑，則大便通暢進食。病愈

后，宜繼服麗參二、三次，忌食無鱗魚及

寒涼生冷與糖類生痰物，并忌房事二年。

說明：

本方宜于衰弱病者，壯盛者不宜。

來源：

賀縣人民醫院林紹純。

治小兒癇病方

处方用法：

燒鮮蘆根滴下的水，（如取竹瀝法）

沖川貝末服。

來源：

癲癇病電針療法

取穴用法：

（一）癲癇發作后，用毫針刺激，

等到有適當的痠麻感覺后，
在針上加電二十分至三十分
鐘。

（二）取穴：大椎、心俞、間使、丰
隆。

（三）隔日針電一次，以十次為一療
程，一般一至二個療程，可減
輕發作，以致全愈。

（四）開電以病人感到麻脹舒適為
度，不要太強，以八度至九度
或七度半為宜。

（五）如舌強或發作后頭暈，可針啞
門，輕刺十分至十五分鐘，灸
上星（間接灸）五分鐘。

來源：省人民中醫院黃榮活。

失血類

治吐血良方

处方：雄磺精粉二錢半

用法：冷水（沸后）冲服。

來源：隆安陸長頤。

又方

处方：菲菜汁半碗，童便半碗冲服。

來源：田东黄有松。

又方

处方：紅絲綫草四兩（即茜根）

用法：用童便搗合，榨水半碗，服下即止后，仍

用此藥和猪肉煎食几次，病无復發。

來源：田东黄荣亮。

治吐血或咳血方

处方：生黑墨草（即旱連草）

用法：洗淨，杵溶榨汁一杯，二度米水二杯，墨

磨水半杯，混合頓服。

來源：田陽蒙宝山。

治吐血不止經驗方

处方：歸身二錢（炒黑）花蕊石五分（煨成末）

杏仁錢半 牛七炒三錢 茜根錢半 生地

五錢 丹皮二錢

用法：上藥共水和童便少許，服之立效。

來源：百色縣龐顯初。

又方

处方：銅錢二十至三十枚 白馬蹄半斤

用法：煲水服，如熱加生地一兩

來源：陸川林道驥。

復方三里神效散

主治：胃潰瘍嘔血，肺結核咯血，均可治療。本

方有收縮血管、止血及清涼、消炎之妙，

但愈后仍須進行根本治療。

处方：山枝七錢 丹皮六錢 蒲黃六錢（以上三

味，均須炒黑）柯子六錢（去核）蘆根一

兩 茅根二兩 甘草三錢

用法：以水四碗，煎取二碗，分二次服，隔六小

時服一次，一、二日即愈。

來源：柳州新中中医聯合診所吳敏。

治崩血鮮紅症良方

处方：檳榔叶一兩 熊胆樹皮（即九重皮）二兩

用法：以淨水一大碗，煎取半碗，一次服完，服二劑即愈。

來源：宜山專區衛生科。

治便血久而不愈者驗方

處方：火麻仁一兩

用法：水煎服，數次即愈。屢試屢驗。

來源：博白中西醫聯合診所周廷維。

治咯血方（無論肺血胃血均治）

處方：生地二錢 麥冬三錢 沙參三錢 玉竹三錢

仙鶴草五錢 大棗五枚 枇杷叶二錢

生田七末一錢

用法：研末，用水煎，沖田七服。

來源：靖西縣丁懋修。

治吐血方

處方：白芨一兩 生藕汁一碗

用法：分二次和服。

來源：平南縣黎汪涵。

淋病類

治砂淋方

主治：尿道有砂石栓塞，排尿困難，極其痛苦。

處方：砂牛虫十只（可隨症加減）

用法：焙干，研成細末，用赤小豆一兩，文火五錢，桃仁錢半，煲水沖服。二、三小時後

即小便，排出砂石而愈。

來源：陸川梁育仁。

又方

處方：生芥菜一、二斤

用法：將芥菜煎水頻飲，痛止砂出而愈。

來源：蒼梧周裕信。

又方（膀胱結石）

處方：蜂蟻十一只

用法：焙干，研成細末，沖服。

來源：賓陽。

又方

处方：滑石粉一兩 炮山甲粉四錢

用法：用溫開水白糖沖調二次分服。

來源：邕寧康民聯合診所青史芸。

又方

处方：赤小豆一兩 澤瀉五錢 桃仁三錢 砂牛

虫十只（焙干，研成細粉）

用法：煎湯沖砂牛虫粉服，二劑后，即由小便排

出砂石。

來源：謝德龍。

治血淋症方

主治：血淋小便閉塞。

处方：朱苓三錢 茯苓三錢 文瀉三錢 茵陳四錢

香付三錢 木通四錢 白芍三錢 小茴二

錢 烏附三錢 玉桂心二錢（另包沖服）

用法：水煎服。

來源：樓顯文。

治尿血方

处方：乳香三錢 牛七三錢 淡豉五錢（漂過）

用法：煎服。兼花柳病者不效。

來源：陸川盧宗慶。

治小便出血方

处方：（一）草谷根、白糖。

用法：煲水沖服。（用于走路時致病者）

处方：（二）小馬鞭草二兩 竹壳菜二条

用法：煲水服。（適用於一般病人）

來源：陸川。

又方

主治：寒熱，小便下血，刺痛。

处方：琥珀二錢 木通三錢 歸身二錢 扁蓄三

錢 郁金二錢 滑石四錢 通草二錢 桃

仁一錢 紅花一錢 瞿麥三錢 海金沙三

錢 苦參三錢

用法：水煎服。

來源：蒼梧縣黃煒章。

治痧癰症小便不出方

处方：菲菜六兩

用法：上藥搗溶取汁，用冷水二碗，冲服即愈。

來源：广东罗定王达聰。

編者按：此症当是沙气內熱症的小便不通。

治小便失禁、頻數，每日夜多至七八十次，脾腎將絕，眼色无神方

处方：党参四錢 智仁二錢半 北茴香錢半（鹽

水炒）白朮三錢 北芪三錢（米炒）云苓

二錢半 故紙二錢（鹽水炒）炙草錢半

用法：先用肉桂水浸鷄肝一只，新瓦焙干，同上藥煎服。

來源：田东吳文熊。

治小便窿閉方

处方：正射香三分 梅片一錢

用法：共研成粉，放臍中間，另將煨熱的芋头搗爛成餅，敷在臍上，用軟布扎緊，二十分鐘即通，若是砂淋閉塞者，即將陽莖搓拉，其砂即出。

來源：陸川盧毓瑞。

治砂淋方

处方：腊籬蛙（又名上樹蛙或上竹蛙）一个 白

鹽二錢

用法：冲開水服。

來源：沈立昌。

又方

处方：生車前草三兩 綠豆粉三兩 油麻二兩

籬笛竹三兩 桃仁四十九只

用法：共同搗溶，冲開水服，砂即出。

來源：昭平縣余作年。

又方

处方：牛七二錢 乳香二錢

用法：酒水各半，煎冲頭髮灰一錢服，未服藥前，先服冬瓜湯一次。

來源：南寧黎劍俠。

治砂淋及白濁小便不通方

处方：螻蛄五只 甘蔗梢一段

用法：螻蛄置新瓦上，覆以食鹽，煨至無煙，冷后取出，去鹽研末，蕉梢連外衣煨熟，去外衣打碎，用水煎，送螻蛄末服。

來源：岑溪縣梁植佳。

治膀胱小結石方

處方用法：谷雨茶四兩，川足一條，濃煎服。

來源：富鍾縣衛協會吳卓彥。

治膀胱大結石方

處方用法：金錢草一斤，水煎盡量服。

來源：富鍾縣衛協會。

治砂淋白濁方

處方：海金沙二錢 淮通二錢 車前二錢 猪苓二錢 澤瀉二錢 滑石二錢 水煎地猪五錢

用法：搗溶以藥湯沖服。

來源：

治白濁淋症方

處方用法：五加皮、杉木漿二味，煲猪瘦肉空腹

服。

來源：昭平縣李紀春。

又方

處方：水蓮藕（草藥）

用法：熱淋煲水服，寒淋加猪肉煲服。

來源：昭平縣會慶貞。

治白濁方

處方：樟木漿五錢 杉木漿五錢

用法：加白糖開水沖服，每天服二次，每隔六小時服一次。這是強壯人的量，虛弱者酌減。

取樟木漿及杉木漿法，如農民取松脂法。

來源：馮超漢。

治血淋方

處方：生綠豆一合打 鐵樹叶三張

用法：搗溶，以滾水煎出味，加蜜沖服。

來源：容縣何瑞猷。

治尿血淋秘割痛方

處方：金錢草一兩 魚腥草一兩 車前草五兩

用法：清水濃煎分三次服。
來源：

治小便閉塞不通方

處方：黃牛木蕊（又名狗牙木蕊）二兩

用法：搥溶，沖開水服，如不通，用稻禾頭洗淨
坭，煲水，沖少許蜜糖服。

來源：容縣姚靜江。

又方

處方：筋魯強 車前草

用法：煲水，沖蜜糖服。

來源：容縣姚靜江。

又方

處方：萆仁四錢 貝母二錢 冬葵子二錢 茯苓

三錢 黃柏錢半 知母二錢 肉桂心一錢

用法：水煎服（孕婦忌服）。

來源：蒼梧縣黎善庭。

又方

處方：瞿麥 青苔 生嫩包粟心 各等分

用法：用水煎服。

又方

處方：桃仁七錢 白蒺藜五錢

用法：同猪小肚燙食，可加鹽調味。

來源：富鍾縣衛協會。

治小便熱閉方

處方：車前子二錢 枝子二錢 銀花二錢半 知

母二錢 滑石三錢 桃仁錢半

用法：用水煎服。

來源：荔浦縣曾繁清。

治小便癰閉方

處方：血余炭錢半 地龜虫七只

用法：春爛以酒水各半浸透，去渣服。

來源：蒼梧縣鄭建文。

治小便不通少腹脹痛方

處方用法：淡豆豉二十一粒，加葱白（去淨沙
坭，不要用水洗）搥成餅，填肚臍內
即通。

來源：資源縣楊文藻。

治小便淋澀脹痛方

主治：小腹脹痛煩悶，小便欲便不便，陽物龜頭刺痛。

處方：山枝仁四錢 歸身三錢 白芍三錢 土茯苓四錢 鮮茅根三錢 石葦三錢 灯心一

用法：水碗半，煎成小半碗頓服。

來源：桂平縣梁鑑華。

疝病類

治疝氣痛方

處方：桑螵蛸十個

用法：煨存性研末，用開水一次沖服。虛寒人加酒一杯。

來源：平南縣黎汪涵。

治膀胱疝氣方

處方：桂枝三錢 小茴一錢 吳茱萸一錢 打川

練子二錢 川椒四錢 腹皮二錢 青皮二錢 葱頭六個

用法：用水煎后，乘熱熏之，溫度適合則洗。

來源：容縣溫述憲。

治狐疝方

主治：陰狐疝氣，偏有大小，時時上下。

處方：絲瓜絡三錢 廣陳皮錢半

用法：將右二味藥研成細末，一日分三次服，開水送下。

來源：

治寒疝小腸氣腫痛方

處方：春砂壳錢半 石菖蒲二錢 硃砂六分（飛過）

用法：將右三味藥研成細末，以黃皮木寄生（如无黃皮木寄生，用黃皮核亦可），搗取其汁和藥末，酒水各半沖服。

來源：蒼梧縣鍾振朝。

治睪丸腫大方

處方：白凡二兩 甘草一兩 雄黃一兩

用法：煲水浸洗，病自消。

來源：容縣駱鶴松。

又方

處方：雞內金 三錢

用法：焙干，研成細末，開水沖服。

來源：百色縣鄧永裕。

治陰囊腫大方

處方：打額草 三兩 桃仁 五錢

用法：用水煎服

來源：平南縣陳其芳。

又方

處方：白胡椒 五錢 有尿豬小肚 一個

用法：將白胡椒納入有尿豬小肚內，將口紮固，

以水四碗，煎成大半碗服。若新病有痛者，先以桑螵蛸十個，煨存性研末，用開水或酒沖服，再繼服豬小肚方。

來源：平南黎汪涵。

又方

處方：石蓮子 五錢 冰片 五分

用法：用開水調勻，涂患處。
來源：百色縣歐堃大。

內科其他類

治盜汗外敷藥方

主治：病后體弱盜汗。

處方：五味子 五錢

用法：將五味子搗溶后，加開水少許，拌成餅狀，敷于臍上，用帶紮至不見出汗為止。

來源：熊燾。

防疫注射，過敏反應的療法

主治：因注射防疫針后，而引起的發熱，惡寒，頭痛，全身關節疼痛，體溫達三十九度以上的。

處方：人參（可用黨參代） 敗毒湯（見中國醫學大辭典）

用法：煎服。

來源：吳敏。

誤食大茶藤及癩菌中毒急救方

处方用法：將薤菜根搥溶，取其自然汁灌下。

（冬月用根）。

來源：平南縣陳奇、昭平縣謝月震。

治食野菌中毒，腹絞痛，脚轉

筋，瀉不止方

处方用法：生石膏粉二兩，開水沖服。

來源：石龍縣潘之光。

治食大茶根中毒方

处方：鷄兒筋蕋（黑口筋，又名桂林筋）一兩半

用法：將右藥嚼碎，放入患者口內，以開水送下，或吐或不吐即愈。

來源：桂平縣梁鑑華。

治食大茶藤中毒急救方

处方：五爪金龍二兩

用法：煲水灌下。

來源：平南縣莫克量。

治誤食生木薯中毒方

处方：生杉木蕊

用法：水煎服。

來源：昭平縣謝月震。

治吃木薯中毒急救方

处方用法：生鷄一只，縊死（勿殺出血）去淨毛雜，切粒煮，吃羹肉即愈。如患者已失知覺，昏迷不省時，可將鷄湯灌下，俟片刻便醒，再食湯肉即愈。

來源：上林縣譚兆枏。

治誤食信石方

处方：松木蕊

用法：水煎冷服。

來源：昭平縣陳宏昌。

治食木薯中毒方

处方：綠豆

用法：水煎服。

來源：石龍縣潘之光。

治斑痧方

处方：榕胆木皮一兩 鷄谷根一兩（即淡竹叶根）絲茅藎一兩（即茅根）鷄儿苦晚二錢半

用法：水煎，分二次服。

來源：容縣甘旺區賴少奇。

滌痧丸方

主治：痧症腹痛，心氣痛，吐瀉，血崩，白帶等。

处方用法：千年石灰（即老石灰）濾淨沙泥，晒干為丸，如梧桐子大。每服五十丸，用開水送服，婦人崩帶，用酒送服。

來源：

治夾色伤寒方

主治：夾色伤寒，頭痛眼花，腰脹，指甲青黑，重則腰強發狂。

处方：龍眼木叶 荔枝木叶 大牛奶木叶 木柚木叶（此叶只用二至三張，多則大汗）

用法：水煎服，虽人事不省，牙關緊閉，撬開灌下，亦能治愈。忌食塘角魚一星期。

又方

主治：男女因疲勞性交而得病。症狀：全身壯熱，口干而渴，身骨疼痛，目珠現紅絲，失治致成危險。

处方：桃子樹四兩（春用蕊、夏用枝、秋用皮、冬用根）

用法：水兩碗，煎至一碗，沖酒一杯溫服，覆被取汗，汗后再服一劑，忌食米三、五天。

來源：平樂縣羅運普。

治陽具腫大剧痛方

（不是睪丸病）

处方：荔枝三錢 砂參一兩 土苡五錢 茯苓五錢

用法：水煎服。

治性交陰戶出血不止方

主治：性交陰腔內受傷，出血不止。

处方：山枝炭二錢

用法：水煎沖血余灰末一錢服用。

來源：平南縣覃鍾波。

治中風中寒，卒倒不省人事，面色青白，口鼻氣順，口眼歪斜方

處方：生姜自然汁

用法：滴入眼角內，將渣擦身上。

來源：平南縣方義生。

治足筋牽痛方

處方：豬腳一只 生土薏四兩

用法：先煲豬腳，后入土薏，俟豬腳爛熟，分二

次服食。

治嚙語方

處方：山枝一兩 淡豉八錢 虫退二錢

用法：水煎，睡前服，連服三帖全愈。

來源：平南縣黎汪涵。

治二便不通方

處方：皂角

用法：燒灰存性，研成細末，用米湯送服三、四

次。

來源：資源縣楊文藻。

二、婦科門

調經類

治婦人月經失常，或前或后，或多或少，或經期前后腹痛，或經血暗淡不鮮等症方

處方：芙蓉花的根槲斤半 阿膠珠五錢 白毛烏肉雞一个（如无，可用普通未開啼的雄雞仔）

用法：先用水二斤，与芙蓉根槲濃煎，去渣取湯約十兩，后加上阿膠、雞肉，再以文火隔水燉一小時，分兩次飯后服。每月經后，連服二、三剂，兼服五味異功散，即党参，白朮，茯苓各二錢，甘草、陈皮各一錢，水煎服，連服四个月后即愈。

來源：邕寧縣康民聯合診所青史芸。

通經丸方

主治：婦女經閉腹痛，結塊如癥等。

處方：三棱一兩 莪朮一兩 赤芍一兩 苏木二兩

當歸二兩 刘寄奴二兩 炮川山甲二兩

芫花三錢 紅花三兩

用法：共研成細末，以米醋汁糊为丸，如梧子大，每用開水送服二錢。

來源：田陽縣黃晨光。

編者按：久病及身体十分虛弱者慎用。

治閉經方

處方：东叶根兩半（又名月桂花）

用法：煲猪肉食三、四次即通，通經后，应服補血調經藥，并減少房事。

來源：河池縣梁智雄。

治婦人少女血虧，經期不通，面黃肌瘦，食慾不振方

處方：大麻四至六兩（普通用作打草鞋的黃麻，用干的）

用法：把大麻截段，每段寸許炒黑，加升麻五錢，歸身八錢，黃芩三錢（酒炒），用清水四碗共同煎成藥汁一碗，空腹一次服完。

病久者多服一次。

來源：田陽縣黃公敏。

治婦女經閉方

處方：草棉花根 二兩

用法：上藥和豬小肚煲食，隔三天服一次，輕者三劑可通。

來源：陸杏林。

又方

處方：紅棗樹皮根

用法：煎水當茶飲，三、五個月可愈。

來源：賓陽。

又方

處方：當歸 二錢 石菖蒲 二錢 香附 二錢 車前

子 錢半（鹽水炒）

用法：同煎服。

治婦女月經不調方

主治：月經不調或先后不對，或經水黑瘀成塊，腰脹耳鳴，心跳脚倦面黃。

處方：白朮 一兩 蒼朮 六錢 歸身 八錢 茯苓 一

兩 朱苓 六錢 姜活 五錢 海金砂 四錢

文且 四錢 川芎 四錢 砂仁 二錢 茵陳 八

錢（酒炒） 香附 五錢 元胡 五錢 紅花 四

錢 澤蘭 六錢 淮山 八錢

制法：共研成細末，另加制青凡、白凡各三兩，

以姜汁燒酒同煮干，煨至紅色為度，合共藥粉煉蜜為丸，如綠豆大。

用法：每日二次，早晚每服三錢，以粥湯送下。

來源：岑溪黎廣才、岑進璇。

治婦女經閉面黃方

處方：蒼朮 一錢 茯苓 一錢 桃仁 錢半（炒） 茵

陳 一錢 川仲 錢半（鹽水炒） 川芎 一錢

米芩 一錢 巴戟肉 錢半 絲餅 一錢 酒芍

一錢 砂仁 五分 黑棗 一只（去核） 秦艽

一錢 青凡 一錢（煨）

用法：酒浸服。

來源：陸川池國英。

編者按：上二方主治血虛黃腫經閉。

治婦女閉經方

处方用法：田基黃莖，煲豬腳吃即效。
來源：寨砂區衛協會。

又方

处方：夜明砂四兩（炒） 桑螵蛸一兩（炒）
用法：二味共研末，用酒沖服，每服二錢。
來源：昭平縣余作年。

又方

处方：棉花核一兩 四季葱頭二兩 蒲黃錢半
桃仁一錢

用法：用水煎服，連服三劑可通。

來源：昭平縣覃棠和。

久年閉經，嗅神經障礙，針

灸療法

取穴：三陰交 中極 關元 氣海 迎香（針）

關元（灸）

病例：曾治一婦人閉經七年，鼻不聞香臭，施治一次全愈。

來源：柳州中医院第二門診部陳三榮。

觀音身的針灸療效

（二十一歲未通過經）

第一天取穴：針中極，關元，橫骨，下曲骨（奇穴）。艾條灸氣海，命門，子宮（奇穴）无反应。

第二天取穴：針闕門（奇穴）三陰交，關元，中極，下曲骨，血海，灸法同第一天。当晚發生性機能異常亢進反应。

第三天取穴：照上穴針灸。

第四天：下腹部微微作痛，及微脹感，照上穴針灸，并服溫經湯助之（即吳茱萸三錢 當歸一錢 川芎一錢 白芍一錢 炒黨參一錢 桂枝一錢 阿膠珠一錢 丹皮一錢 炙草一錢 生姜錢半 半夏二錢 麥冬二錢 水煎服）

第五天：經水即來。

來源：玉林蒲塘中醫聯合診所楊愈華。

治經來腹痛方

处方用法：落地楊梅二兩，煲雞蛋二只，加酒一杯，去渣服。服后即愈，勝過一切止痛

藥，再服斷根。

來源：平南縣黎汪涵。

說明：落地楊梅多生于園地，其叶細小，其子如黃豆大，色紅似楊梅實。

治逆經方（經从口鼻出）

處方：歸身 錢半 生地 二錢 黃芩 二錢 酒芍 錢

半 黑枝 錢半 丹皮 一錢 川芎 錢半

用法：清水煎服。

來源：田東縣周家濟。

又方

處方：生地 二錢 歸身 二錢 郁金 錢半 降香 一

錢 百草霜 二錢（冲服）

用法：清水煎服。

來源：田東縣周家濟

胎前類

保胎方

主治：妊婦習慣性小產，能安胎保胎。

處方：杜仲 四兩（將糯米粥去水取渣，拌蒸晒

干）淮山 三兩（微炒，留出粉一錢，打糊成丸）續斷 一兩（鹽水炒）歸身 一兩

用法：共研成細末，另加大棗肉三兩同搗，用淮山粉打糊為丸，每日早、晚飯前服一次，每次二錢，開水送下。

來源：平南縣安安聯合診所何昭心。

治妊娠下血驗方

處方：苧麻叶（嫩的） 一兩五錢 雞蛋 四只

用法：共同煮服，能安胎、止痛、血停。

來源：省中醫進修班第二班羅崇興。

編者按：本草綱目（商務印書館版）卷十五草之四第四十一頁，有用苧麻根煎湯，治妊娠胎動，下黃汁如膠的記載，又四十二頁載苧麻叶，氣味同根。

治妊娠惡阻腹痛嘔逆方

處方：半夏 二錢 陈皮 一錢 茯苓 二錢 歸身 二錢 白芍 三錢 砂仁 七分 只壳 錢半 甘草 一錢 生姜 一片

用法：用水煎服。

來源：蒼梧縣童景賢。

治妊娠水腫方

主治：妊娠四肢浮腫，按之成印，口渴，小便黃。

處方：白朮三錢 云苓三錢 豬苓三錢 澤瀉三錢

知母三錢 玉竹三錢

用法：用水煎，分二次服。

來源：南寧范仲節。

治妊娠咳嗽遺尿方

處方：當歸三錢 西黨三錢 生芪三錢 焦朮

五錢 陳皮錢半 醋炒升麻錢半 炙草

錢半 桑螵蛸五錢 益智仁五錢 (若遺

尿帶紅，加骨皮二錢)

用法：清水煎服。

來源：全縣胡鍾璉。

產后類

治難產方

處方用法：麥芽四兩，水十二兩，煎取半斤頓

服。

來源：南寧范仲節。

又方

處方：虫退十只 蛇退二錢 (煨) 龜板一兩

歸身五錢 川芎三錢

用法：水煎服。

來源：岑溪縣孔箴謙。

又方

主治：難產三四日不下者。

處方：禾稈六兩。

用法：用水三碗，煲取一碗服，半小時即產下。

來源：省中醫進修班第二班農寶光。

又方

處方：反倒草根 威靈仙 芭蕉仔薯 各一兩 生

益母草一兩

用法：水酒各一碗，煎溫服。

來源：鎮都縣農學儒。

治產后血崩方

处方：地榆一兩 酸醋二兩

用法：用水煎服。

來源：石龍縣中醫進修班。

編者按：此方出自余无言金遺釋義：地榆一兩

酸醋半斤煎服，治經崩及經水淋漓不止。

又方

处方：良姜五錢（生用）

用法：搗溶，加雞蛋二只搗勻，以酸醋煮熟食。

來源：石龍縣中醫進修班。

治產后流血不止方

处方：扁柏叶三錢

蓮蓬二錢

絲瓜苗或絲瓜絡

二錢

用法：清水煎服。

來源：百色縣鄧永裕。

治小產血崩方

处方：石柱參二錢

白朮三錢

歸身三錢

黑荆

芥錢 北芪五錢

熟地三錢

田七七分

貢膠二錢（炒）

用法：水煎服。

來源：玉林縣張炎言。

治小產腹痛，流血不止方

处方：黃芪三錢

白朮三錢

黨參三錢

歸身

三錢

川芎二錢

干姜錢半

龜板七錢

桃仁十粒

蒲黃三錢

（炒黑）

荆芥二錢

（炒黑）

側柏二錢

（炒黑）

用法：用水煎服。

來源：百色縣梅景傳。

治產后子宮下墜方

处方：北芪一兩

歸身五錢

益智仁三錢

花旗

參二錢

升麻錢

用法：用水煎服，二、三劑即效。

來源：玉林縣黃業純。

又方

处方用法：酸醋三斤，用瓦煲煎熱，乘熱坐蒸醋

氣，子宮即縮入，另用生姜一兩，七

醋適量，煎服三、五日。

來源：田東縣吳文熊。

治子宮下墜方

處方用法：將水魚（鰲）頭頸晒干，研成細末，用南蛇油搽子宮脫出部分，并蒸食水魚一個即愈。

來源：蒼梧縣黃伯賢。

治女人子宮下墜不收方

處方：棕樹強四兩 猪肉四兩。

用法：煲食几次即愈。

來源：宜山專署衛生科。

治婦人產后血虛，勞動過度，

子宮或直腸脫出方

處方：（一）正猪肚木叶 澁砂叶 田基黃 各半握

用法：共搗爛，醋煮取汁食，食后，臥床休息。

處方：（二）大北芪五錢 金邊土必三錢 阿黃二錢

用法：煲鷄食即愈。

來源：岑溪徐益羣。

治婦人子宮脫出驗方

處方：澤蘭叶一兩 枯礬一兩

用法：先用澤蘭叶煎水三碗，薰洗患處數次，后用枯礬煎水三碗，洗數次即愈。

來源：柳城縣。

治產婦生產用力過度，子宮脫出不收方

處方用法：白芨二錢，煲猪尿袋食，食二、三次可愈。

來源：昭平縣覃棠和。

治產后胞衣不下方

處方：砂姜粉三錢（生的用一兩）

用法：用水酒冲服。

來源：羅崇興。

又方

處方：山甲七片（炒末）

用法：將藥末同鷄肉煲服即下。

來源：林裕和。

又方

处方：歸身一兩 滑石一兩 川芎五分 黑蒲黃

一錢

用法：共煲水服立效。

來源：陸川。

又方

处方：牛七五錢 歸身一兩 冬葵子一錢 花蕊

石三錢 滑石六錢 川芎三錢

用法：共煎服。

來源：同上。

又方

处方：歸片五錢 川芎三錢 牛七二錢 瞿麥二

錢 滑石二錢 急性子五分 无名異五分

用法：用水煎服。

來源：岑溪梁慶照。

又方

处方：箭猪毛半段

用法：燒灰，冲酒服。

來源：宜山專署衛生科。

又方

处方：无名異一兩 鴨蛋白一只

用法：將无名異研成細末，与蛋白冲開水飲下。

來源：岑溪韋益和。

又方

处方：荆芥炭三錢 川芎五錢 益母草一兩 乳

香一兩 沒藥一兩 歸身一兩

用法：先用水冲服麝香一分，繼服上方（麝香減

用或不用亦可）。

來源：昭平。

又方

处方：无名異三兩

用法：打碎煎水，服之即下。

來源：博白縣刘海东。

治胞衣不下方

处方用法：生青蒿一撮，搗取自然汁一杯，生姜

來源：自然汁一杯，熱酒一杯，和勻服卽下。
賀縣人民醫院林治純。

又方

主治：產后胎衣不下，四肢厥冷，脈搏似有似无，面色蒼悴，不能語。

處方：（一）雙頂大歸身 半斤 川芎 五錢

（二）蓮蓬 二个 生蓮叶 二張

（三）石柱參 三錢 歸身 二兩 川芎 四錢

熟地 二兩 白芍 五錢（炒）

用法：用水煎，先服第一方，一次服完，再服第二、三方，每方二次分服。

來源：合浦縣梁裕燃。

又方

處方：歸身 一兩 川芎 五錢 黃芪 一兩 无名異

二兩。

用法：煎后去渣，沖酒一杯，溫服卽下。

來源：博白縣梁紹文。

治死胎不下方

處方：黃花母（又名狗糞菜，斷腸草）

用法：煲水薰陰部，死胎卽下。
來源：蒼梧。

治難產、橫產、逆產、死胎或胞衣不下方

處方：龜板 必甲 歸身 山甲片 川芎 各五錢

用法：將藥研成細末，每服五錢，難產水煎服，死胎及包衣不下酒煎服。

來源：桂平黃澤森。

編者按：此方卽佛手散加山甲、必甲二味，系桂平黃毅云的祖傳秘方，用之必效。但系每味五錢，用水煎服后，隨量飲酒，不用研末，如系死胎，并加茶葉二錢同煎服。

治產后流血过多方

處方：生龍眼樹叶 一握

用法：煎服可止

來源：賓陽縣。

治婦人產后，血下不止方

處方：金櫻子 薏苡 二兩（炒黃）

用法：與雞肉煮食立止。

來源：陸川呂慕陶。

治小產后，下血塊盈盆方

處方：田七二、三錢

用法：將田七研成細末，和酒燉服即止（不飲酒者水亦可），燉杯須用紙蒙蓋，不使水蒸氣混入藥內。

來源：田陽黃公敏。

產婦暈倒方（虛暈或見血而暈）

處方：（一）（外治）酸醋半斤 黃糖四兩（或

菲菜亦可）

用法：放在燒紅的鐵口上，使產婦吸入藥氣即醒。

處方：（二）（內服）生姜錢半（炒黃）生艾尾

三條 灯草三條 鏊底黑（去灰）

用法：用一只雞的血加行酒二杯，和上藥同煎熟，再加水碗半煮沸，給患婦服即愈。

來源：陸川潘樹明。

治產后中風、口禁，手足抽筋及角弓反張，或血暈不省人事，四

肢強直方

處方：荊芥穗三錢

用法：研成細末，用水酒各半，灌之即醒。

來源：（一）博白衛協會，（二）陳洪源。

治婦人產后中風經驗方

處方：附子四錢 桂枝三錢 白芍二錢 甘草一錢

用法：煎服。

來源：博白縣梁英祥。

治產后氣血虛、不省人事方

處方：黨參六錢 菖蒲二錢 川芎三錢 細辛一

錢 歸片六錢 附子二錢 干姜四錢

用法：煎服。

來源：鎮都縣農學儒。

治小產或墜胎流血不止方

處方：鹿角霜二錢（末粉）

用法：沖開水服立效（月經不止亦效）。

來源：欽縣李烈英。

治產后小便不禁，兩足不能屈

伸方

主治：產后兩足如木，不能屈伸，小便不禁，尿如泉湧。

处方：（一）人參錢半 炙芪錢 升麻錢半 益

智仁錢半（去壳） 桑螵蛸三錢 龍

骨三錢 牡蠣三錢

（二）人參錢半 白朮三錢 陈皮二錢

茯苓二錢 炙芪三錢 川仲四錢

川斷四錢

用法：以上兩方，輪流用水煎服，服五日可愈。

來源：容縣陳漢明。

治婦人產后腹痛方

处方：干絲瓜壳

用法：燒酒燉服。

來源：田東陳榮武。

治婦人產后氣虛，大小便不通，

肚子脹方

处方：黃芪一兩 當歸八錢 川芎三錢 牛七三

錢 田七錢半

用法：用水煎服。

來源：馬山縣譚仲潮。

治婦人產后各部浮腫方

处方：顛茄子（叶莖如真茄形而有刺，其花如龍

胆紫色，夏季開花，其果生青而熟黃，形

圓而長）

用法：取熟果剖開晒干，蒸半小時取出再晒，如

此六次，每四兩顛茄，可浸酒一斤，每次

服三錢，日服一次，不及三日即愈。服后

患者感覺身發微癢則愈，再无其它付作

用。

來源：博白縣宋壽堂。

治產后發熱方

主治：產后發熱、口苦、惡露不下者。

处方：荊芥炭一錢 歸身三錢 川芎一錢 生地

三錢 丹皮錢半（酒炒） 生蒲黃錢半 北

胡二錢 荷葉二錢 杏仁二錢

用法：清水煎湯，童便沖服。

來源：省中醫進修班第二班關瑜安。

崩帶類

治婦人血崩驗方

处方：山粘子干 血余

用法：共煨存性（約五錢），酒水冲服，痛止血停。

來源：省中医進修班第二班罗崇兴。

又方

主治：婦人血崩，脉搏浮芤，汗出如水，不省人事，牙關緊閉。

处方：花旗参二錢（米炒） 新艾三錢（炒黑） 全

歸兩半（炒黑） 姜炭三錢 阿膠五錢（炒

珠） 炙草錢半

用法：煎服，如汗未止，可加白朮、北芪、附子。

來源：陸川陳毓周。

編者按：如无花旗参，可以党参六錢代。

又方

处方：阿膠珠四錢 祈艾二錢 熟地炭五錢 芥

穗錢半（炒黑） 烏梅三錢 姜炭三錢 續斷三錢 米芪一兩 花旗参二錢

用法：煎服。

來源：陳洪源。

又方

处方：松木筆十五條 地粘藤二兩 百草霜四錢

用法：共炒黑，煲服即止。兼用灸法，灸脚蹠紅

白肉交界處，左右脚各一壯。

來源：陸川周達材。

又方

处方：旱蓮草五錢（炒黑） 蒲黃四錢 荊芥三錢

百草霜三錢 蓮蓬壳二錢 側柏炭三錢

雞蛋兩個

用法：雞蛋兩個，去白留黃，打溶在碗內，另煎上藥冲湯服。

來源：柳江縣陽高照。

又方（針灸湯藥合治法）

（一）用灯草蘸油燒大敦穴三壯。穴在兩足大趾外側甲縫正中。

(二) 湯藥：熟地一兩 白朮一兩 (土炒)

生黃芪三錢 當歸五錢 (酒炒) 黑

姜二錢 人參二錢

用法：清水煎服，每天一劑，連服五劑，可不再發。

(三) 用舊葵扇燒灰，和酸醋服下，血崩即止。

來源：百色縣王以仁。

又方

處方：烏欖木皮四兩

用法：焙干，煲水服。

來源：陸川呂慕陶。

又方

處方：大紅花三錢 (晒干) 老松節五錢 棉花核

炭三錢 棕衣炭三錢

用法：共同煎水服。

來源：岑溪林甫卿。

又方

處方：松節厚皮一片 棕衣炭五錢 好醋四錢

用法：把松木皮側邊刮成粉，和棕衣炭、好醋共

同煎服。

來源：岑溪黎廣才。

又方

處方：白木耳一錢

用法：隔水和冰糖七錢蒸服。

來源：博白中醫聯合診所劉惠寧。

又方

處方：陳棕灰五錢 王麻灰五錢 葵扇灰五錢

黃狗頭灰二錢 灶心土一兩。

用法：開水沖服極效。

來源：博白縣劉文甫。

又方

用法：姜黃炭錢半 (中藥店有賣)，用酒煎服，

止血后，繼服補血劑。

來源：宜山專署衛生科。

又方

處方：葵扇一把 棕繩五錢 蓮蓬五個 (上三味

共煨灰）扁柏四錢（炒黑） 歸身四錢（炒黑）

用法：清水煎服。

來源：田東黃鉅昭。

又方

處方：桑螵蛸炭（按患者起經后的年齡每歲一個計用）歸身五錢 川芎四錢 白芍三錢

地黃五錢

用法：用適量的水煎后，分兩次溫服，每隔三小時一次。

來源：南寧中醫學會陳魯五。

又方（艾灸法）

用艾炷如小指頭大，隔生姜片灸百會穴（在頭正頂陷中）三至十壯。

來源：省中醫院黃汝紹。

治婦女血崩方

處方：蜘蛛網絲半斤

制法：用瓦焙酥成炭。

用法：用酒沖服。

來源：容縣鍾俊三。

又方

處方用法：將枯稔子十只（在樹上枯的），地榆三錢，共同研成細末，以雞肉二兩蒸服。血止后，再用田七二錢，研成細末，分二次煮雞蛋服，愈后，服補中益氣湯一、二劑。

來源：橫縣閉岐山。

又方

處方：當歸一兩 黑蒲黃五錢 川芎六錢 元胡四錢（酒炒） 黨參八錢 黑芥穗三錢

用法：用清水煎，分二次服。

來源：田陽縣何煜輝。

又方

處方用法：四季青葉（又名鬼面符，又名山大紅）搗爛，黃糖沖開水服即止。

來源：蒼梧縣龍蔚文、黃敏生。

又方

處方：北芪六錢 白朮二錢 防風二錢 歸身

四錢 白芍 三錢

用法：用水煎服。

來源：童景賢。

又方

處方：益母草 一兩 (炒黑) 百草霜 三錢

用法：用水煎服。

來源：昭平縣李英金。

又方

處方：雞冠花(連根) 二兩

用法：水煎，沖酒服。

來源：昭平縣張品昌。

又方

處方：生地 六錢 歸頭 六錢 白芍 五錢 阿膠

一兩 木耳炭 一兩 棕根炭 八錢 艾葉炭

三錢

用法：用水煎服。

來源：盧澤乾。

治白帶方

處方：杉木漿(晒干)

用法：用水或酒沖服一錢即愈。

來源：富鍾縣陳博羅。

編者按：據兴安縣兩金瑤族自治區衛生所陳輝

昌同志彙報，此方曾在十七名白帶患者中進行過臨床試驗，結果完全全愈，療效達百分之百。

又方

處方：白吊着根 四兩 雞肉 六兩。

用法：煲湯服，并食雞肉。

來源：省中醫院黃汝紹。

又方

處方用法：山粘子干煲雞肉，食一、二次即愈。

來源：陸川盧宗慶。

治濕熱白淫(婦女陰戶流出

如鼻涕樣的液体)方

處方：苧麻根 四兩

用法：去黑皮搗溶，開水沖服。

來源：平南縣莫克量。

治远年白帶方

处方：党参 三錢 北芪 三錢 当歸 四錢 石斛 錢

半 桑螵蛸 錢 煨龍骨 二錢 牡蠣 四錢

赤石脂 三錢 川芎 錢半

用法：用水煎服。

來源：桂林寧少松。

治房劳过度，經流紅白數十日不止，周身疼痛，或有癥瘕。

处方：鹿茸 錢 鹿膠 四錢 參須 錢半 肉桂 錢

龜板 三錢 肉蓯蓉 四錢 杞子 四錢 歸身

四錢 小茴香 錢 丁香 錢 紫石英 二錢

巴戟 四錢

用法：共研成細末，煉蜜為丸，每服三至四錢，

日服三次，開水送下。

來源：玉林縣福綿衛生所周召羣。

妇科其他類

治陰挺方

处方：京柿樹根

用法：煲猪尿袋服。

來源：昭平縣馮少文。

又方

处方：北芪 一兩 升麻 錢半 川芎 五錢 歸身 五

錢 鰲頭（水魚的头） 二只

用法：水煎服。

來源：玉林縣蒲塘北市中医联診所。

治妇人陰挺或長或短驗方

处方：白螺獅壳 八錢（存性） 南星 二錢 制半

夏 三錢 北柴胡 三錢 甘草 錢半 淮山 三

錢

用法：共研成細末，以面為丸，早、晚用開水送

服二至三錢。

來源：百色縣龐顯初。

治陰挺病灸療法

主治：妇人產后或其他原因，氣血衰弱，陰道翻出。

处方：第一次：百会、气海灸、關元、中極

針。

第二次：百會、腎俞、氣海灸、關元溫針、上髎，中極刺。

第三次：灸法同上，天樞、歸來、關元、八髎、針灸起紅暈。

附說：經第一次針后好轉，第二第三次后全愈。

來源：鬱林蒲塘診所楊愈華。

治婦人陰戶發白虫方

處方：阿魏五分 鮮雞一只

用法：共搗爛，用布袋裝住，塞入陰戶，半點鐘內取出，用清水浸漂，即見白虫走出。

來源：陸川韋善祥。

治婦人陰戶內外發炎癢痛方

處方：五倍子五錢 白礬五錢 蛇床子五錢 蒼朮三錢 黃柏三錢

用法：共同煲水，用軟布洗之，數次即效。

來源：陸川蔡英明。

治婦人前陰泄糞方

主治：婦人前陰出糞，熱氣沖胸，頭重眼花。

處方：大黃四錢 丹皮五錢

用法：用水煎服。

來源：

編者按：此方治陰戶出屎，用大黃、丹皮泄

熱，逐瘀，實症為宜。查六科准繩，治交腸前陰出糞，用五苓散、調氣散、各一錢加阿膠一錢而愈。丹溪治槽粕出前陰，便溺出后竅，用四物加海金沙、木香、檳榔、木通、桃仁而愈，一从行濕、調氣、化水，一从活血、行氣、通利。方意頗不齟齬，而此方用泄熱、逐瘀法亦自有理，但非虛症所宜。

治交腸病（即產婦前陰出屎）

處方：歸身六錢 川芎四錢

用法：煎服。

來源：陸川鍾鎮乾。

治婦人生血龜方（即癥瘕）

處方：穿山甲片（煨）一兩 劉寄奴五錢

用法：共研成細末，用好酒沖服，數劑即愈。

來源：沈立昌。

通乳驗方

主治：婦人乳腺不通，乳汁稀薄，氣血虛弱。

處方：黃耆五錢 歸身六錢 川芎錢半 木通二錢

王不流行三錢 豬脚一只

用法：煎服，服後覆臥十分鐘，乳汁自然有。

來源：梧州中醫學會李仲稻。

治乳卸方

主治：乳頭垂下一、二尺。

處方：柴胡三錢 白芍二錢 歸身三錢 白朮二錢

甘草錢 卜荷錢 防風三錢 姜活二錢

茯苓二錢

用法：共水煎服，另以蓖麻子三十六粒搗溶，入

川射一分，調勻敷頭頂心，俟乳縮上，即

馬上洗去。

三、兒科門

初生類

治小兒面黑色方

處方：葱頭四錢 雞蛋二只

用法：滾水打溶，候適溫洗之甚效。

治小兒頭心凹方（即落地鎖）

處方：地鱉虫，硬骨草茹三条 薤菜頭三条 竹

壳菜一条

用法：共煲水二小杯服。

治小兒患七朝鎖方

處方：田藍叶（即染布藍叶）三張 草漂消一只

虫退三只 硬骨草茹三条 松木干柴心三

片 牽網黑蜘蛛三只 八百斤油墨三分

壳板米三只 箭猪毛三寸 拘杞（菜生

的）二錢

用法：共煲水服。

治小兒牙關閉方

灸法：用艾灸腦后、枕骨左右各一壯，肩井窩左右各一壯。

治小兒三朝七朝鎖方

處方：（小紅丸）巴豆三粒（去油）雄黃七分

虫退一錢 全蝎一錢

用法：共研成細末，和飯練成十丸，硃砂為衣，有鎖時服五粒，風毒即吐，不吐由大便出。

珠麝小紅保嬰丸

主治：風痰閉竅，兩目反白，手足抽搐，角弓反張，氣促痰喘。初生兒服之，可免臍風生鎖，并兼治花柳梅毒、爛瘡等。

處方：巴豆六只（煨去油）雄黃九分 胆星七分

神砂九分 川大黃九分 黑丑九分 姜虫

七分 天麻七分 北辛三分 正京夏七分

琥珀五分 牛黃三分 射香三分 珍珠三

分 馬腦九分。

用法：如无馬腦，即用金包鉄蛇胆一只代之，加

入上藥（不可加減為要）共研成細末，用好漂面煉為丸，如菉豆大，硃砂為衣，凡急時以滾水沖服三丸，痰多者加竹瀝、姜汁沖服。无鼻水者，加地鱉虫十余只，開水沖服。初生儿每朝服三粒，連服三朝，以金錢風五分，川連五分，甘草七分，勾藤七分，灯草共煲水沖服。

來源：陸川潘樹明。

小紅丸方

主治：小兒七朝鎖，先服可免后患。

處方：巴豆三錢（連壳稱后，去壳去油）牽牛三錢 胆星二錢 雄黃三錢 硃砂一錢。

用法：共研成粉末，煉蜜為丸，如菉豆大，每服三粒，以勾藤一錢煲水送下。如系散劑，則每服六厘。

來源：陸川蘇廷芳

臍風散

處方：枯凡二錢 硼砂五錢 硃砂三分 冰片五厘 射香五厘

用法：共研成細末，撒在小兒肚臍及陰囊陽物

處，須連撒十四朝乃效。

來源：陸川蘇廷芳。

灸鎖法

灸法：穴位：百會一壯 眉头穴各一壯 承漿一壯 臍旁四離五分處共四壯 肚中一壯、用蒜米貼住，以黍米大的艾炷灸。

來源：陸川蘇廷芳。

驚風類

治小兒驚風方

處方：川連錢半 全蝎一錢 白芍錢半 天麻錢半 竹王一錢 西秦艽一錢 防風五分。

口米砂五分（沖服）胆星一錢 牛王一分 川射一分 熊胆一分（以上三味沖服）。

用法：用水煎，分數次服（亦可制散分服）。

附說：有時發現痰湧吐涎沫，呼吸困難，即用通關散吹入鼻孔。通關散方：皂角五錢，細辛一錢，共研成細末，可用五十次。

來源：桂平李漢基。

又方

處方：竹黃二錢 防風二錢 僵蚕二錢 牛黃五分 白附子一錢 胆星二錢 蟬退二錢 全蝎二錢 血珀五分 射香三分 金箔十張 硃砂五分 冰片二分。

用法：共研成細末，每服七厘，開水送下。

又方

處方：竹瀝水一茶杯 姜汁一小杯 蚓水一碗

用法：竹瀝水法，將單竹砍下一節，分作二截，兩端用磚架起竹筒，下面用火燒之，在無節的一端，用碗乘之。生姜搗汁，蚓煲水，將上藥沖和飲之。

來源：黎廣才。

又方

處方：川古二錢 柴胡錢半 黃芩錢半 白芍一錢 虫退一錢 防風錢半 竹叶一錢 薄荷七分 地龍五分

用法：煎服。

來源：樓顯文。

又方

處方：蘇叶錢半 薄荷三錢 粉葛三錢

用法：淨水煎好，另用古搭屎五分（即偷油婆屎，又名臊甲子屎）沖服。

來源：樓顯文。

又方

處方：勾藤二錢 薄荷七分 甘草七分 柴胡二錢 竹叶二錢 木通二錢 連翹二錢 虫退十只 地骨皮二錢 灯心一撮

用法：用水煎服，熱重加川連一錢，風重加全虫二錢。

來源：田東黃鉅昭。

風痰至宝散

主治：小兒驚風抽搐，兩目直視痰拥津門，神昏遺尿。

處方：蟬退三錢 僵蚕錢半 半夏曲錢半 双勾二錢 硃砂錢半 蜂房一錢（煨黑）龍齒六錢 珍珠三分 牛黃三分 琥珀五分 胆星二錢 白附一錢 云苓二錢 皂夾一

錢 防風三錢 茯神二錢 竺黃二錢 橘
紅一錢 薄荷一錢 天麻錢半 全蝎一錢
礞石三錢 冰片三分 射香三分 甘草一錢
用法：研末和勻，每服一錢，開水沖服。
來源：貴縣梁啓春。

治慢驚風方

處方：石柱參五分（另沖服） 熟附片一錢 勾
藤二錢 漂白朮錢半 春砂仁錢半 蟬退
一錢 云茯苓錢半 硃砂五分 炙草一錢
建曲一錢
用法：煎服。
來源：（待查）

又方（水瀉肚痛）

處方：良姜子
用法：研成細末，沖開水服二、三分。
來源：田東林文堅。

治小兒急驚風方

處方用法：（一）內服方：防風三錢 虫退二錢
黃連錢 白芍三錢 甘草錢 水二百毫升

煎至一百毫升，每日服三至五次。
（二）外用方：麝香五厘 胡椒五粒 共
研成細末，撒在普通膏藥上，貼臍部。
（三）針灸法：十宣 少商 合谷 人中
頰車 下關 手足三里 百會 十宣刺出
血，其餘各穴抑制法。
來源：忻城縣防疫站韋建中。

又方

處方用法：丹竹瀝二兩 老陳皮二錢 童便五錢
將陳皮水煎成一兩，沖竹瀝童便灌服，虽
抽搐至二十四小時未停，服后即止。
來源：蒼梧縣洗桂在。

又方

處方用法：白頸蚯蚓不拘多少（芭蕉樹下挖的更
好），洗淨搗成醬，沖開水服。服至小便
利，痙攣即止，体温也同時下降。
來源：何雪松、許翰華。

治小兒驚風抽搐昏迷不省方

處方：淡全虫五分 虫退二只 白芍錢 天竹黃

八分 天麻 五分 姜活 五分 白僵蚕 三条
防風 八分 升麻 五分

用法：用水煎服。

來源：莫煒章。

治小儿驚癇方

主治：小儿手足抽搐，角弓反張，言語无倫，口流痰涎。

处方：僵蚕 二錢 全蠍 一錢 口米砂 一錢 輕粉 五分 天麻 一錢 南星 一錢 川連 七分

用法：共研成細末，開水送服，每次服五分，日服三次。

來源：蒼梧縣童景賢。

麻痘類

夏枯草預防麻疹

用法：按年齡體質，每次可服五錢至二兩，泡茶吃，一日吃三次，吃一日可防一星期，過一星期又吃一日，每月吃三天。每年春天、夏天、冬天各吃一個月，即每年吃三

個月，每月吃三天，便可不受麻疹感染。連吃三、四年，即終身不出麻。

來源：柳江縣韋行芳四代祖傳，由柳江縣藍顯章介紹。

編者按：據藍醫師在本省第二屆中醫代表大會上經驗交流的報告，在一九五六年四、五月間，柳江縣鄉間麻疹流行，他負責九個屯的麻疹防治工作，其中一個叫木吉屯的，全屯一至十六歲未出過麻疹的孩子一百九十五人，正在感染出麻的五十九個，他用夏枯草煎湯，給尚未出的內服預防，除木吉屯外，其餘各屯，均普遍服食，只少數已發熱，出現前驅期的不能防止，但發疹也輕了，其餘均收到很好的預防效果，計三百多個接受預防的小孩有效率兒達百分之百。已出麻的，用涼血疏表解毒方劑加入夏枯草治療，共治輕重程度不同的患孩八十三個，完全得救，沒有一個死亡。

預防麻疹方

处方：銀花蕊 五錢 夏枯草 五錢 甘草 三錢 紫

草二錢

用法：清水碗半，煎成半碗，分二次或三次溫服，若麻疹流行時，每月服一劑，連服三劑，可以預防。

來源：柳州黃宗榮。

治麻疹方

主治：麻疹初起發熱、淚出、涕流、咳嗽。

處方：升麻一錢 干葛三錢 防風二錢 京芥

二錢 連翹二錢 虫退錢半 木通錢半

紫草茸二錢 牛子二錢

用法：水二碗，煎至大半碗服。

來源：貴縣區錦光。

治小兒麻疹，收后身熱不退，

声啞氣喘方

處方：薏仁二錢 川貝一錢 炒黃芩錢半 牛子

二錢半 石膏二錢 川連六分 木通六分

地骨皮二錢 杏仁二錢 甘草五分

用法：用水煎服。

來源：平南縣黃混源。

治麻后声啞，或高歌狂叫，以致声啞方

處方：玄參四兩 鷄蛋黃一枚

用法：水兩碗，煎成半碗，沖鷄蛋黃，一日分二次服。

來源：臨桂縣黃振廷。

治痘毒解毒方

處方：北芪二錢半 黨參二錢 銀花二錢 紫草

三錢 黃柏三錢 生地三錢 紅花二錢

白芷五分 升麻五分 歸尾二錢 防風

二錢 甘草二錢

用法：煎服。

來源：樓顯之。

治天花、水痘、麻疹方（有時發痘

毒或疔多起，如在腋窩底的淋巴腺、或鼠蹊、股溝等处。頭尖而小者為疔，頭圓而大如癰瘡者為痘毒）

處方（一）：豆付渣四兩 芭蕉根頭二兩 番薯

二兩 臭黃一兩

用法：共搗爛、攪勻敷患處，須留頂心一小孔，以資排毒。

處方（二）：番薯一個，將番薯煨熟，加臭黃末一錢，攪勻，在疔或痘毒紅腫極時敷用。

來源：田陽黃定華。

治麻疹、肺炎、咳嗽方

處方：南杏二錢 連翹三錢 生地三錢 桔梗二錢 黃芩二錢 桑葉三錢 甘草錢半 前胡二錢 川貝二錢 荷葉三錢

用法：水煎分三次服，五歲以下者酌減。

來源：黎廣才。

治麻疹良方

處方：石羔二兩 赤芍六錢 枳殼六錢 荆芥八錢 牛蒡子六錢 川貝四錢 地骨八錢 薄荷六錢 桔梗八錢 陳皮六錢 干葛一錢 桑白一錢 歸尾一錢 紅花三錢 甘草四錢

用法：共研成細末，每服三錢，開水送下。

來源：馬金柱。

又方

處方：野山麻兩半

用法：煎服兩劑，第一劑分三次服，每四小時服一次；第二劑分六次服，每三小時服一次。

附注：該藥多生在深山高嶺地，叶色碧綠粗厚，如姆指大，夏日開單性潔白小花，中秋結實，如花生米大，果紅而有長柄，其味甘甜。功能治麻疹、猩紅熱及并發的肺炎，或一般炎症。有解毒、消炎、清血、活血及鎮咳、化痰作用，微兼利尿。

來源：中醫進修班秦鏡宇。

治麻疹后痢疾方

處方：黃芩三錢 白芍三錢 萊菔子三錢 川朴一錢 黃蘗骨一錢（燒炭細末）

用法：將藥煎水，沖黃蘗骨粉服。黃蘗骨用水浸過晒干為佳，要根部的更妙。

來源：（不明）

又方

處方：地丁二錢 黃芩二錢 槐花二錢 白芍

二錢 連翹 錢半 銀花 錢半 炭甘草 錢半

用法：煎服。

來源：黎廣才。

治麻疹后痢疾白色方

处方：牛子 錢半 白芍 二錢 葛根 二錢 甘草

一錢 竹叶 五分 連翹 錢半

用法：水煎成二羹，分二次服。

來源：陸仁宇。

治麻疹險症色黑暗方

处方：雄黃 錢半 炮甲 二錢 冰片 二分 射香 一分

用法：共研成細末，取小兒堅硬糞便陰干，燒存性，與上藥共末，裝入瓶內密封候用。二至五歲用四分至一錢。

來源：賓陽曾宜敬。

疳疾類

治小兒疳積方

处方：馬鬃蛇（該動物似蛤蚧蛇，一日三變其

色）

用法：燒存性，研末沖服，或蒸猪肉食。

來源：馬山縣譚仲潮。

又方

主治：面黃肌瘦，食不消化。

处方：君肉 三兩 鷄內金 一兩 石決明 二兩 正

辰砂 五錢 蘆甘石 一兩 云苓 二兩 雷丸

一兩 滑石 一兩 海螵蛸 一兩 水仙子 一

兩

用法：共研成細末，每次以藥末五分沖粥服，重症每日服二次，輕症每日服一次，如疳積上眼，以鷄肝伴藥末二分蒸服。

來源：柳州辛日生。

又方

处方制法：青礬一至三斤，去淨沙泥雜質，納瓦鍋內封固，上下四周圍以炭火，自晨至晚，猛燒，以質浮紅如硃色為度，取出去火毒。

用法：每次用一至二分，和鷄肝，或魚肉，或肉類蒸食，和粥拌食亦可，但須早、晚續

服，不可間斷。

來源：馮業昌祖傳秘方，容縣蕭訓明介紹。

肥儿方

主治：凡小儿肌瘦，或病后失調。

处方：生干漆六錢（炒去烟尽） 白茯苓三錢 白

朮三錢 台党三錢 甘草三錢。

用法：共研成粉末，每次二至五分，蒸猪肉或猪肝，早、晚兩次分服，服半个月則見效。如小儿兼疳積時，应加使君肉、雷丸等藥。

來源：河池縣梁智雄。

眼疳散方

处方：石决明二錢（煨透） 夜明砂三錢（水洗去

坭，取上浮的晒干） 海螵蛸二个（去壳焙

黃） 川滑石二錢（煨透） 苏雄黃七分 正

硃砂七分 正冰片六分

用法：共研成細末，不見水，鷄肝全一只，用竹刀破開數片，將藥粉摻勻合同，苧麻繩紮緊，用二次淘米水一碗，放瓦缸慢慢煮熟后全食。

來源：田陽蒙宝山。

儿科其他類

治白絛虫良方

处方：榧子三錢 生南瓜子四錢 板榔三錢

用法：用水煎服，極有效。

來源：百色王以仁。

又方

处方：板榔五錢 雷丸三錢

用法：用水煎服，三剂即排出。

來源：宜山專署衛生科。

治小儿諸病后，數年不能言語驗

方

处方：雄雞一只 鳴蟬十只 九節菖蒲五錢 北

麗參二錢 麥冬四錢 桔梗四錢 广木香

二錢 甘草三錢

制法：先取雄雞一只，用繩拌死，去毛干淨，用刀切下雞头一个，約二寸多長再砍碎，用

文火焙干，研为細末，又用生鳴蟬十只，均去头足，亦用文火焙干研末，然后与上述各藥混合均匀，焙干后，再研成細粉，以等量的蜜糖練为丸，如黄豆大。

用法：每日服三次，每次十粒，四小時服一次，開水送服，連服十多天，即能語言說話。

來源：柳城宜山專署衛生科。

治小兒先天梅毒，身体皮膚發

紅，腫爛流黃水方

处方：雞蛋五只（去白）乱頭髮一球（如雞蛋大）

用法：先用茶麩水洗淨頭髮后，同雞蛋黃煎成油。用時，先用細茶煎膿水，洗患處，洗后要拭干，將藥油涂上，一日二、三次，旬日即愈。

來源：張正臣。

治小兒陰囊氣腫方

处方：蛤母（即田雞）四只（去头及內臟）烏豆四兩。

用法：煲食一、二次即愈。

來源：官紫清。

解胎毒方

处方：勾藤一錢 虫退三只（去头足）薄荷一錢 甘草一錢 川連五分 大黃一錢 木通五分 麥冬一錢 淡竹叶一錢

用法：用水煎服二、三剂。

說明：此方俗名開口茶，初生即服，可預防臍風。

來源：吳卓彥。

治小兒胎毒濕瘡方

处方：老松香二兩（微炒）黃丹一兩（炒）鉛粉五錢（炒）青黛一兩 枯凡二兩 髮灰一至二錢

用法：共研成細末，濕則干搽，干則用麻油涂。

說明：成人在田中耨草，脚脛發生大囊瘡，兩脚浮腫、癢痛、出血等症，均可用本方医治，隨用隨效。

來源：吳卓彥。

治小兒陰莖紅腫方

处方用法：麻黃二兩 蒲黃一兩 大黃一兩 山

梔一兩 銀花一兩 甘草一兩 煲水洗。

治小兒頸骨軟方

處方用法：南星、附子、艾絨、半夏四味等分，研成細末后，用酒和生薑汁調勻成餅，貼大椎骨上，片刻頭即能舉。

來源：百色縣朱少武。

四、外科門

接筋駁骨類

接骨方

处方：田七一錢 血竭一錢 半夏錢半 南星

錢半 歸尾錢半 川烏一錢 紅花錢半

續斷二錢 麝香二分 自然銅二錢 川仲

二錢 乳香五分 沒藥五分 鬧楊花七分

加皮一錢 雄黃一錢 陀僧錢半

用法：共研成末，和酒熱敷患處，用布包好，對時去藥即愈。

來源：韋志榮。

治骨折斷方

处方用法：漢桃叶二斤，搗爛，酒炒，敷患處。

每天炒敷三次，每二天換藥一次，連敷三服，七天即愈。

來源：凌樂縣人民医院李才魁。

治骨碎方

处方用法：活蟹一个搥如泥，生姜四兩，醋一盅，老酒一碗，共搗勻濾汁煎滾服，藥渣炒熱敷患處，外以杉木皮夾住，對時即須除去，否則新骨橫生。如骨節破裂而不折斷時，只飲藥汁，不敷藥渣亦可。

來源：橫縣云中燕。

接筋駁骨方

处方：自然銅二兩 血竭一兩 乳香六錢 沒藥

六錢 紅花六錢 歸尾六錢 杜仲五錢

續斷五錢 川瓜六錢 田七三錢 土鱉五

錢 加皮四兩 琥珀五錢 香附五錢 西

紅花二錢

用法：共研成細末，另加鳳凰兒四只（即屈頭雞仔），螃蟹四只，白露蛤五只，搥溶和藥末酒調敷患處，對時將原藥取下，用酒蒸熱再敷，日日如此，七天全愈。

來源：平南刘彩龍。

治小儿骨折駁骨方

处方用法：將香膠樹叶、生鹽、槌爛煨暖，包骨

折处，日換藥一次，以愈為度。

來源：昭平縣陳雄昌。

治骨折，駁骨方

处方用法：螃蟹五只，五加皮適量，搗溶，酒

炒，敷伤处，（如骨折，須先施正骨手

術，隨敷藥，以杉樹皮包紮）一點鐘后，

即將藥取下，每天敷一次，以后每天敷

藥，但較上天早一點鐘，須敷三日。

來源：昭平縣陳清廉。

治骨断方

处方用法：（一）外敷方：杉木炭四兩（研末），

黃糖四兩。將黃糖放鍋內溶化后，下炭末

攪勻成膏，攤在布上，施正骨手術后，包

伤处，以杉木皮夾住，用綁帶紮定，連包

至十天可愈。

（二）內服方：自然銅二錢，广木香

四錢，牛膝二錢，白芨二錢，刘寄奴三

錢，碎補三錢，續斷三錢，水煎對酒，和

白糖冲服，連服三剂。

來源：昭平縣羅運普。

駁骨方

处方：大茶藥（又名苦晚藤） 根皮（有毒忌近

口） 生雞一只

用法：共搗爛，放酒數兩，共炒熱。經正骨处置

后，將藥敷在患处的全部，外用杉木皮包

紮固定，大人敷六至十二小時，小兒減

半。嗣后，如淤血不散，可用一柱香，山

慈菇，千斤拔，小羅傘各等分，舂至糜

爛，和酒炒熱敷患处，敷的時間多少不

限，酌情处理。

來源：昭平縣邱祖明。

治跌打折骨或脫臼方

处方用法：將山枝仁、大黃、黃柏研末，調三花

酒蒸熱，溫敷患处。如伤勢重，先施正骨

手術。用生雞仔一个縊死（不可放血）去

毛，剖腹，去腸臟，納藥末雞肚內，隔水

蒸至雞糜爛，去头足翼及骨，同藥末槌

溶，敷伤处，头、足、翼、湯水分數次內

服，輕伤的單用山枝仁，加田七亦效。痛

甚則加鳳仙花（白花的）莖叶。

來源：忻城縣何雪松、許翰華。

治駁骨善后方

主治：肢骨重伤折断，初接合后，伤部炎症已解，如伤四肢，或痿重不能举，举则沉痛乏力。

处方用法：大肉蟹二只，油鹽蒸熟，食蟹肉及汁，并好酒隨量送下。日食二只，連服六、七日神效。

來源：柳州尹祖明。

接筋駁骨方

处方用法：生鷄仔一只，連毛屎搥爛。五倍子一兩，碎補一兩，生地二兩，半夏一兩，共研末。以生酒糟一盅，同藥搥勻。炒熱敷患處，對時換藥。敷藥時，先用手術取正骨位，外以杉木皮包紮，七日有效。

來源：荔浦縣黃云忠。

治斬斷筋方

处方用法：細榕木叶燒灰，木耳燒灰，芥菜籽各

等分，共末。開熱酒送下。

來源：韋志榮。

跌打損傷類

拔鐵釘和子彈入肉方

处方：吸鉄粉（即磁石）一兩 乳香五錢 蓖麻子一兩 鷓鴣肫皮一兩 推車虫六只 硃一兩 銀

用法：共研成細末，用猪油四兩，合成膏，敷患處，一、二日可出。

來源：桂林縣陳治安。

拔砲彈方

处方用法：先以土狗虫（即螻蛄）七只，搗爛，敷傷口，使傷口放大，然后用推車虫（即姜蠅）五只（如要傷口放大，則用拉糞球的，如要傷口收縮，則用推糞球的）搗爛，敷傷口。

來源：百色縣鄧永裕。

治跌打青腫疼痛

處方：鉞兒草（又名金錢草）

用法：搗爛敷患處。

說明：鉞兒草，葉圓如錢（故又名金錢草）對

生，邊有鋸齒，葉面皺，蔓生滿地，節節布地生根，野外濕地及園中濕地皆有。治一切瘡毒，可煎水洗之，若小便澀痛，用干藥五錢水煎服；砂淋，石淋，則用干藥一兩水煎服。小兒風邪身熱，酌減分量煎服。

來源：阮金樓祖傳方。

治跌打損傷方

處方：生川烏 三錢 生南星 二錢半 生草烏 三錢

生半夏 三錢 生紅花 二錢半 生歸尾 二錢

半 生白芷 二錢 細辛 一錢 乳香 錢半

沒藥 錢半

用法：共研成細末，用茶油開，涂數次即愈。

來源：韋志榮。

治跌打吐血方

處方：田七 三錢 血竭 三錢 无名異 三錢 防風

三錢 白芨 五錢 桃仁 四錢 紅花 三錢

歸尾 三錢 蘇木 一兩 側柏 四錢 槐花炭

四錢

用法：水煎，加童便沖服（孕婦忌服）。

來源：平南任森。

治跌傷全身骨痛方

處方：丁香 五錢 木香 五錢 血竭 五錢 大黃 五

錢 紅花 五錢 當歸頭 一兩 蓮肉 一兩

白茯苓 一兩 丹皮 二錢半 甘草 錢半 白芍

一兩 兒茶 五錢

用法：研成細末，煉蜜為丸，每丸三錢，每服一

丸，單酒送下。

來源：容縣林暢華。

治跌打膀胱生殖器流血不止方

處方用法：五叉牛奶叶（滑叶的生用一兩槌溶，

干的用四錢研末），百草霜五錢，燒草的錢底黑，川田七四分，研成細末，用滾水燂出味。服后，將患者仰睡，墊高臀部，含燒酒一兩，勿使患者知，突向其頭面噴

去，使患者一驚，血即漸止。
來源：容縣何瑞猷。

治跌打腫痛方

处方：田七三錢 莪朮四錢 白芷四錢 歸尾四

錢 血竭三錢 大黃四錢 法夏三錢 乳
香三錢 沒藥四錢 梔子五錢 阿魏三錢
桂枝三錢 蘇木五錢 木鱉三錢 破石五
錢 防風三錢 海桐皮三錢

用法：共研成細末，以姜汁、生鹽、面粉煮成
糊，先用射香一分，酒開擦患處，隨即乘
熱將藥敷之。

來源：平南吳東源。

治跌打積瘀腫痛方

处方：生地一兩 紅花一兩 歸尾二兩 白芷一

兩 三稜五錢 莪朮五錢 碎補五錢 川烏
五錢 良姜五錢 乳香五錢 沒藥五錢

用法：以好酒三斤浸之，擦患處，飲亦可。

來源：吳東源。

跌打還魂丹方

主治：跌傷、打傷、刀傷、斷筋斷骨甚至失氣不
省人事

处方：自然銅三錢 活土鱉三錢（如无干的亦可）

乳香二錢 血竭二錢 射香四分 朱砂二
錢 巴豆五分（去油）

用法：共研成細末，貯玻璃瓶封固，勿洩氣。接
筋骨和消腫，以酒調敷患處；止血，以藥
末撒傷口；重傷不省人事，以藥末三錢，
童便與酒沖服。

來源：石龍縣陳廷仁。

治跌打消腫方

处方：韭菜頭四兩 生姜二兩 沙姜一兩 葱頭
二兩

用法：搗爛，用酒炒熱，敷患處。

來源：橫縣云中燕。

跌打消腫止痛方（熱性瘡瘍亦可）

处方用法：鳳仙花（又名指甲花）莖葉（白花的
才有效），鮮、干（要陰干不可日晒）均
可用（干的效力較弱）。搗溶后，用酒調
敷患處（瘡瘍不可用酒）。

來源：忻城縣許翰華。

治跌打方

處方用法：仆重伤，不省人事以黃泥在臍外周圍筑成圓堤，注重便臍中。待童便漸干，人漸苏醒（如童便不干則症危難救）時，即將白糖二兩，田七末二錢，用童便及酒沖服。加狗狸胆更妙。

來源：莫大業。

治刀伤止血生肌方

處方：鳳尾草一味

用法：洗淨搗爛，敷傷處。

來源：昭平縣陳清廉。

治刀伤不埋口方

處方：焦頭一味

用法：搗爛敷傷口，去其刀鏽。

來源：昭平縣余作年。

治跌打黑腫方

處方用法：三七五錢，浸酒二兩，擦黑腫處，并

可飲用一部分。

跌打藥粉：乳香三錢 沒藥三錢 丑牛三錢 小茴三錢 肉桂二錢 杜仲四錢 共末。調酒擦痛處。

來源：昭平縣黃明元。

治打伤前陰，出血不止方

（吐血亦效）

處方：側柏叶四錢 祈艾二錢 阿膠錢半 五倍子四分 茜根六分

用法：用水煎服。

來源：岑溪縣莫燕卿。

治打伤溺管，小便不通方

處方：甲珠一錢 柴胡二錢 瓜蒌一錢 桃仁十五枚 紅花一錢 歸尾三錢 大黃三錢 田七二錢 茜草根三錢

用法：用水煎服。

來源：岑溪莫燕卿。

治跌打暗傷方

處方：當歸四錢 川芎二錢 桃仁二錢 紅花三錢

牛漆四錢 白芷二錢 沒藥三錢 乳香三錢
 澤蘭二錢 血竭三錢 血余五分 蘇木五錢 澤瀉三錢 杏仁三錢 歸尾三錢

用法：水煎燒酒沖服。

說明：內部上焦受傷，服藥后，瘀血由口吐出；下焦受傷，瘀血由小便或大便排出。外部腫痛搽之，亦能消腫止痛。如跌仆重傷，筋骨未折斷，虽口噤人事不省，內服外搽，可以回生。妊婦忌服。

來源：上林縣盧建中。

治跌打內傷，不省人事方

處方：生地一兩 生軍三錢 木耳五錢 蘇木六錢
 田七一錢 土鱉三錢 乳香三錢 血竭二錢 歸尾二錢 然銅一兩 甘草二錢

用法：水煎，分兩次服。

來源：石龍縣胡文。

治血方

處方用法：酸梅子（去核）、白凡，槌溶敷傷口，血即止。
 來源：石龍縣刁恆昌。

治跌打重傷（少林寺）方

（虽已氣絕，打去一牙灌之，亦能復活）。

處方：當歸五錢 澤瀉五錢 紅花三錢 桃仁三錢

丹皮三錢 蘇木二錢 川芎三錢

用法：酒、水各半煎服。（头部傷加藁本一錢；手部傷加桂枝一錢；腰部傷加杜仲二錢；脇部傷加白芥子一錢）

來源：吳卓彥。

跌打藥酒方

處方：自然銅三錢 血竭四錢 川烏三錢 玉金三錢 姜活錢半 碎補二錢 土鱉二錢
 川斷三錢 澤蘭二錢 乳香二錢 沒藥二錢 桃仁錢半 蘇木錢半 田七錢半

用法：好酒浸擦傷處，或水煎沖酒服。

（附註）按傷部加藥法：頭頂傷加蒿本二錢，

升麻錢，或加川芎、白芷各二錢；頸喉傷加桔梗、元參各二錢；鼻傷加細辛、荊芥各二錢；乳部傷加蒲黃錢半，姜黃二錢；心窩傷加桃仁、紅花各二錢；腰骨傷加川仲、故紙各二錢；手部傷加桂枝二錢；脚

部伤加川瓜、牛膝各二錢。
來源：(漏寫姓名)

埋口藥散方

處方：龍骨 白芷 赤石脂 乳香 沒藥、鷄內
金各等分

用法：研成細末，摻傷口。

來源：(漏寫姓名)

癰毒疔瘡類

治癰毒紅腫赤痛方

處方：芙蓉叶 野谷花叶 芋叶 (數量不拘)

用法：共搗爛，敷患處。

來源：省中医進修班蔣崇甫。

治癰瘡代刀藥方

處方：臥沙虫二至六個

用法：將虫搗爛，放在已成熟的瘡頂上，即自穿孔而排出膿毒。(沙地上如有小窩凹陷，即此虫隱伏之處，可用草心或竹嫩苗插入

窩中，其虫被引而出)
來源：橫縣李恆光。

治乳瘡、对口瘡、背花瘡方

處方：木虫粉 石蕊 竹黃 大梅片 雄黃 旱
烟桿烟屎

用法：共開茶油搗。

來源：田东林文堅。

治乳癰驗方

處方：假菸叶 適量 雀麻根一兩 鷄蛋四只 黃
糖少許

用法：假菸叶与黃糖共搗溶，外敷患處。雀麻根与鷄蛋煲水內服。未成膿者即消散，已穿破膿瘍者能生肌埋口。

禁忌：妊娠婦人忌服，外敷則可。結核性乳病无效。

來源：省中医進修班第二班羅崇興。

又方 (起初者)

處方：麥牙二兩 白糖四兩 (一日量)

用法：先用淨水煎麥芽三十分鐘，后冲白糖，当

茶飲。不論乳管通塞与否，都应用手術挤出乳汁，并外加用熱敷方法。

來源：梁文歧。

又方

处方：白芷二錢（制） 積壳二錢 青皮二錢

只貝二錢 香附二錢（制）

用法：煎服，如患者的身体瘦弱，可將原方每味減少錢半。并灸天井穴、肘尖、乳对、背部三穴各二壯。

來源：曾伯炎。

又方

处方用法：（一）独活三錢，煲水服。（二）花粉三錢，乳香二錢，沒藥二錢，共研成細末，用開清水調勻，擦患处。

來源：南海鄧雨年。

又方

处方：大黃四錢 蒲黃三錢 赤芍二錢 花粉二錢
銀花三錢 黃柏二錢

用法：共研成細末，用清茶調藥，敷患处。滾水、

火伤亦可治。

來源：柳江縣陽高照。

又方

处方：元參一兩 蒲公英一兩 銀花八錢 蒲黃

五錢 白芷二錢

用法：用水煎后，加酒少許服，并將藥渣搗爛，敷患处，最重不过三服即愈。若已潰爛，則加北芪五錢。

來源：富鍾縣廖香圃、何孚民。

又方

处方：木棉樹內皮

用法：搗爛，加酒，熱敷患处。其他未化膿的紅腫瘡癤亦可敷用。

來源：賓陽石龍。

又方

处方：木通二兩 生蒲公英四兩

用法：共同搗爛，包患处。

來源：田东招兴林。

又方（初起用）

处方：生桃子叶二兩 瓜蒌仁兩半（去壳）

木鱉子兩半（去壳）

用法：共搗爛，用米醋調勻，敷患处。

來源：黃晨光。

又方

处方：生烟嫩叶 黃糖

用法：搗爛后，用叶包好煨熱，敷患处，每日數換即愈。

來源：賀縣劉瑞麟。

又方（郁滯性者、哺乳婦常患症，患

時，紅腫熱痛異常，苦不可耐）

处方：麥芽二錢 王不流行四錢 通草五錢 葱

頭白二十个（扑爛）

用法：用水三碗，煎取碗半，一日三次分服。并以葱頭渣乘熱燙患部。快則一劑愈，最多不过三至五劑愈。已潰破，加黃芪五錢，白芷一錢，但見效已大遜。

來源：省中医院黃汝紹。

治乳癰方

处方：（一）蒲公英；（二）平樂縣陳后儒方加生鹽少許；（三）蒼梧縣碩卿方加葱頭三只。

用法：搗溶，敷患处。

來源：容縣李昌才。

又方

处方：木芙蓉根（去青）五錢

用法：用燒酒一燉杯服。

來源：橫縣閉岐山。

治乳房痛方

处方用法：天花粉磨醋，涂患处。

來源：全縣吳玉生。

治乳癰初起方

主治：婦人乳癰初起，紅腫疼痛。

处方：蒲公英三錢 野菊花三錢 金銀花三錢 紫背天葵三錢 紫花地丁三錢

用法：用水煎服。

來源：玉林縣倪濟丞。

治婦人乳癰方

處方：川射香一分 大梅片一錢 雄黃三分 巴

豆肉七粒（去油）

用法：研成細末，另以飯舂爛作餅，將藥末放餅上中心，貼于眉头上，左乳患瘡貼左眉上，右乳患瘡貼右眉上，瘡消則揭去，久貼恐起泡。

來源：賀縣人民医院林治純。

治乳房痛方

處方：生志肉三錢

用法：研成細末，調蜜糖服。

來源：全縣吳玉生。

治婦人乳瘡方

處方用法：鴨仔菜入黃糖少許，搥溶，敷患處。

來源：荔浦縣歐祉香。

治婦人乳脹痛方

處方用法：桐油木叶，搥爛，敷患處。

來源：環江縣譚家進。

治癰瘡方

處方：独脚柏烏（又名石蜆蟾） 屈頭鷄（有人

叫屈頸鷄）

用法：將上藥加酒糟共搥，用菜叶包固，用火煨熱，貼患處，拿軟布紮好，每天換藥二次（夜間照貼），三日可愈。此方能化毒、消膿、治療癰初發及一切无名腫毒，均有奇效。

來源：昭平縣五區聯合診所叶引之。

治癰疽附骨方

主治：生于身体某部，延年潰爛，常流黃水。

處方用法：先用雞蛋一只，油鹽少許，煎好敷患處，靜息不動，約五點鐘后，用大茶根煲水洗。

來源：陸川鍾振乾。

治炸腮（即耳下腺炎或腮腺炎）

處方：用紫草茸二兩

用法：煲水，每日一服，連服三天即愈。如有并

發睪丸炎的，可加入大柴胡湯煎服。

來源：中醫進修班第二班羅崇興。

治脚底生石蹇方

處方：野芋頭、樟腦

用法：將野芋頭切片（約厚二分），放樟腦于芋片上，燒燃樟腦半分鐘，乘熱貼患處，以感熱為度，如无熱的反應，則依法再貼即愈。

來源：陸川縣第七區清民聯診所蔡英明。

又方

處方用法：用火磚一小塊，紅燒置于銅盆內，以銅盆盛酸醋，能浸到磚塊一小半為度，另取酸洋桃放在磚面上，將脚的患部踏在酸洋桃面上，一連幾次即愈。

來源：田東吳文恣。

治頭面無故癢腫如斗方

處方：蟬退三錢 防風四錢 荊芥三錢 薄荷四錢
姜活二錢 歸身五錢 甲珠三錢 白芷三錢 秦艽三錢 川芎三錢 蒼耳子三錢

生姜三錢

用法：煎服后，將藥渣再煎洗頭，數劑即愈。

來源：賀縣中西聯合診所劉瑞麟。

治睪丸偏腫驗方

處方：雪豆根一兩 水田蟹十只

用法：煲水服。

來源：防城廖澄甫。

治睪丸腫脹方

處方：刀豆子 墨魚骨

用法：熬水服。

來源：永福王燮。

又方

處方：南蛇藤核

用法：將藥打碎，用開水攪勻，涂患處，能起止痛消腫之效。

來源：農學儒。

治大頭瘟方

處方：乳香二錢 末藥二錢 白芷二錢

用法：研成細末，用狗胆茶油調勻，擦頭部即愈。

來源：賓陽縣。

治对口瘡方

处方：銅錄錢 正黃丹錢 生地二錢 生鱔魚一條

用法：搥爛，敷患處。

來源：平南任森。

治馬口疔方

处方用法：苦瓜搥爛，用生鷄血攪勻，涂患處。

如无苦瓜，可用苦瓜核（種子）。

來源：容縣覃達川。

又方

处方用法：完整的螳螂繭（即桑螵蛸）燒灰，調

茶油，涂患處。

來源：平南縣李德芬。

治馬口環瘡方

处方用法：桑螵蛸用瓦焙研末，共田螺肉搗爛，

敷患處。

來源：容縣黃美軒。

治对口瘡方

处方：雄黃五分，生半夏一兩

用法：研末，用醋調勻，敷患處。

來源：全縣吳玉生。

治疔瘡方

处方用法：樟樹上蚕巢四個，生綠豆錢，野菊花叶一楂，共搗溶。未潰用醋調敷，已潰用糯米漿調敷。

來源：富鍾縣衛協會。

又方

主治：鼻部起疔瘡，麻木癢痛，三小時后頭面俱腫。

处方：銀花四錢 紫花地丁五錢 知母四錢 野

菊花四錢 桔梗三錢 明凡二錢

用法：用水煎服，如初起，有寒熱時，先服荊防敗毒散加連翹取微汗，再服此方。

來源：平南縣李德賢。

又方

主治：左手脉門生疔瘡，白头坚硬，疼痛異常。

处方：銀花四錢 野菊花三錢 蒲公英三錢

地丁三錢 天葵三錢

用法：用水煎后，冲酒服。

來源：平南縣梁偉文。

又方

处方用法：壁虎三只，加梅片少許，搗敷患处。

又方

处方用法：假芥蘭加梅片，黃糖，搗敷患处。

处方來源：省中医院尹月球。

治馬嘴疔和反唇疔方

主治：疔瘡發于口唇人中穴，或承漿穴，或左右

口角，初起如豆大，紅赤微痛，漸漸嘴唇腫大，以致口不能張，身熱惡寒，若不急治，危險性很大。

处方用法：雄雞冠血涂患处，隔二、三小時再涂即愈，若不愈，再以蜆子肉与春花木叶搥溶，

調涂患处，干則再涂，晝夜不停，連續涂藥一天，即紅退腫消，三、四天可全愈。

來源：貴縣楊玉先。

治疗毒方

主治：疔毒每生头面、手脚、指等处，疼痛甚剧，重者或致脫骨伤筋，瘡未老而瘡头先白，黑黃不等，破流黃水血液，初起略癢，發寒熱，症類伤寒。

处方用法：先以菊花八錢，甘草三錢，用水煎服，另用雄黃錢，巴豆錢，蟬酥錢，以飯搗为丸，放疔头上，每日換丸一粒，兩晝夜即拔尽疔毒自愈。

（附注）該藥有腐蝕作用，敷時用天仙子包圍肌肉，露出瘡頂，丸藥只放瘡頂上，以免腐蝕好肉。

來源：陽朔縣梁子拔。

治一切紅腫瘡癤和各种惡毒疔

瘡方

处方：七叶一枝花塊根三兩 白菊花叶四兩 芙蓉花叶二兩 芙蓉花叶二兩

用法：研成細末，調凡士林涂患处。（先將生白菊花叶、生芙蓉花叶搥溶，加七叶一枝花塊根末，調敷尤效）

來源：忻城縣何雪松、許翰華。

治对口瘡方（口疔亦可用）

处方：生馬薺 生鹽

用法：搥爛，敷患处。

來源：昭平縣周運成、黃福梅。

又方

处方：生南星 生半夏 天仙子

用法：搥爛，敷患处。

來源：昭平縣韓慎忠。

治疗瘡針灸療法

处方用法：身柱一穴（位在第三胸椎之下），針三分。

來源：昭平縣蕭時彩。

治疗毒方

处方：銀花 五錢 菊花 一兩 紫花地丁 四錢 青

天葵 三錢 蒲公英 五錢

用法：用水煎服，外用酸梅果（去核），入白糖搥溶，敷患处。

來源：石龍縣盧富卿。

又方

处方：桑螵蛸 五錢（煨） 生壁虎 四只 黃糖 適量

用法：搥溶，搽患处。

來源：石龍縣陳斌儀。

治人中疔方

处方用法：雄雞冠血點之即愈。

來源：石龍縣胡文。

治疗毒初起方

处方：白凡 三錢 葱頭 七個

用法：酒煎，分二次服，服至汗出為度。

來源：石龍縣劉保平。

治癰疽、疔瘻、瓜瘡方

主治：寒熱癰疽、疔瘻、瓜瘡潰爛，日久不愈。

处方：蓖麻子五兩（研末） 白鹽一錢 醋六兩
用法：用瓦鉢煮成膏狀，涂患处。
來源：平樂縣玉續成。

治腹部或脚部生大癰毒方

处方：葱头半斤
用法：發熱加生鹽，不發熱加好酒，搥溶，敷患
處，一夜即消。

來源：石龍縣劉保平。

治一切癰疽、瘡癤方

处方：地丁一兩 芙蓉叶一兩 黃柏五錢
用法：共研成細末，冷開水調敷，或用百分之五
十凡士林調敷。

來源：平樂縣馬金標。

治癰毒腫痛方

处方：紅蕊烏柏叶 生鹽
用法：搥爛，敷患处。
來源：昭平曾慶貞。

治无名腫毒、瘡疥并生肌止血方

处方用法：紅茹蕒一枚，切片放尿缸浸四十天，
取出晒干研末，瘡疥腫毒，用醋調如泥涂
之；生肌止血，則加血竭，鷄內金，熟石
羔末和勻搽之。
來源：容縣黎元驥。

治脚叉潰爛出水（如沙虫脚）方

处方：龍骨三錢 甘石三錢 海螵三錢 枯凡一
錢 青黛一錢 射香二分
用法：共研成細末，撒患处，如无潰爛和不流液
水時，加冰片三分。

來源：平樂縣馬金標。

治瘡毒腫痛方

处方：獨脚烏柏 假苦瓜 苧麻根 顛茄子根
用法：搗敷。
來源：富鍾縣衛協會。

治蛇眼、蛇头、蛇肚諸瘡（生于 手指）方

处方：雄黃三分 硫黃三分 輕粉四分 青黛二

分 大黃 錢半 蟾酥 一分 冰片 四分 人
言 二分 川連 五分 獨活 一錢 三仙丹 五
分

用法：共研成細末，調鷄蛋清或豬胆汁，敷患
處。

來源：平南縣何賦。

治掌心瘡方

處方：紅花一錢 歸尾一錢 生地二錢 川足一
條（去頭足） 黃糖少許

用法：搗敷患處。

來源：玉林譚文卿。

治大瘡方

處方：花粉一兩 石蟾蜍一兩 木鱉子一兩

用法：搗爛，加酒餅或酒糟調敷。

來源：昭平縣董貴財。

治蛇头指方

處方：葱头二兩 雄黃五錢

用法：搗爛，敷患處，即時消腫止痛。

來源：桂平縣曾玉希。

治手指蛇头方

處方用法：蜈蚣一條 冰片五分 樟腦一錢 雄

黃一錢 共研末，鷄蛋一個打穿一孔，將
藥末入蛋內，套在患指上。

來源：荔浦曾繁清。

治小兒爛头瘡方

主治：小兒患爛头瘡，極癢，搔后出血、潰瘍或
流黃水，纏綿經年不愈。

處方用法：（一）硫黃六錢 松脂一兩 另加入適
量茶油，煮成軟膏，搽患處。

（二）皮烟 黃丹 樟腦 輕粉 松脂
枯凡 五倍子 各等分，研末，用茶
油調涂患處。

來源：蒼梧縣易培初。

治小兒头上生爛瘡方

處方用法：（1）馬前子、管仲、煨炭研末，開麻
油涂患處。

（2）先以銀花、白凡煲水，洗淨濃
汁，隨即用紅辣椒、百草霜各等

來源：富鍾縣衛協會。

分，共研末，開茶油涂之。

治小兒爛頭胎毒方

主治：小兒爛頭，膿水浸淫，極癢，虽搔至皮破血流，仍癢不止，纏綿難愈者。

處方：1. 老虎頭蓋骨一具，煨存性，純淨芝麻油適量

2. 石榴皮 五錢 五倍子 五錢 枯凡 三錢

用法：先用第二方煎濃湯，洗淨患處，然后用老虎頭蓋骨末，調麻油如糊，涂患處。

來源：鍾兆麟。

治小兒千層瘡方

處方用法：甘欖核燒灰研末，開茶油涂患處。

來源：昭平縣陳雄昌。

治头上白泡瘡方

主治：初起紅色顆粒，痕癢，嗣后變白，濃水流

出，蔓延滿頭。
處方：黃連 錢半 黃芩 錢 黃柏 八分 大黃 錢
梅片 五分 松木雞 一只 燒存性

用法：右六味研末，先以九里明金銀花煲水，洗

淨膿汁，隨即用藥末調茶油涂之。

來源：昭平縣張廣輝。

治過腰蛇（又名過腰綫）方

主治：腰部帶圍處，起小粒瘡，脹痛搔癢，繞過腰腹一周者死。

處方用法：山猪箭燒灰存性，加梅片三分研末，用茶油調搽患處。（須由兩頭搽回中間，不可由中間搽出兩頭。）

來源：平南縣郭麟玉、盧炎光。

治纏腰丹（俗名過腰蛇）方

處方：康青 錢 青黛 錢 銅綠 錢 血竭 錢 雄黃

錢半 梅片 四分 枯凡 錢 松香 錢半

用法：共研成細末，調茶油涂患處。須由兩頭涂回中間，不可由中間涂出兩頭。

來源：玉林盧伯南。

治生担肩疽方

處方：冰片 錢 生百脚虫
用法：共搗溶，敷患處。

來源：全縣吳玉生。

治瘡内生蛆方（牛疽瘡亦效）

處方用法：節節花搗爛，雙酒浸透，抓汁入瘡內，殺死蛆虫，瘡即愈，內服亦可。

來源：昭平縣蕭時彩。

治腮腺炎方

處方：木鱉核四枚（去壳） 南星錢 半夏錢

用法：共研成細末，用醋調涂患處，干時再涂。

來源：德保縣唐啓源。

治腮腺炎、淋巴腺結核腫痛、

及諸毒瘡方

處方用法：七叶一枝花一份 黃金古二份（即金

古攪）冷水磨敷即消。

（說明）瘡已發紅，用水磨涂，如未發紅，則用醋磨涂之。

治骨疽、淋巴腺結核、潰

瘍、漏管方

處方用法：（1）老年石灰研成細末，調桐油涂患

處。

（2）蛤蚧、龜板、防黨、冬虫夏草，煎服或制散服。

（3）煨龍骨、五倍子、煨石羔、七叶一枝花等四味研成細末，用黃蜡制成羔，調涂患處。

來源：忻城縣何雪松、許翰華。

治肌肉紅腫疼痛方

處方：藤黃三錢 樟腦錢半

用法：用酒精（二兩）溶解后，搽患處。（忌食）

來源：田東縣吳文熊。

治无名腫毒方

處方：鬧楊花粉 七叶一枝花 黃金古 血

見愁

用法：共研成細末，調凡士林，敷患處。

來源：省中医院尹月球。

治腸癰方（蘭尾炎）

處方：烏藥五錢 白朮四錢 丹參七錢 川只壳

四錢 浙貝四錢 蘇木八分 郁金五錢

油朴三錢 瓜瓣三錢

用法：水煎服。

來源：全縣石補天。

生肌止痛方

主治：諸瘡爛肉生肌、定痛、排膿、解毒、止癢、殺虫

處方：石羔一兩 甘草水飛五、七次 辰砂三錢

血竭五錢 龍骨錢 白芷錢 冰片三分

文蛤粉五錢 硼砂三錢 寒水古二錢

用法：研成細末，作散用，或用茶油調涂患處。

來源：容縣楊開森。

瘰癧類

消癧丸

處方：毛虫（即斑蝥虫，用米伴炒黃去頭足）

血竭硃砂各二錢

用法：共研成細末，以飯為丸，每丸重一分，每日服一丸。輕症服一料可愈，久病最多服三料可愈。

來源：此方乃蒼梧縣廣平區廣平鄉治癧醫師唐某

授與其女翠英秘方，余得自其女傳授，曾治愈十余病例。蒼梧縣黎善庭。

治瘰癧方

處方：川射五分 黃丹二兩 蟾酥五錢 天生黃

二錢 乳香三錢 沒藥三錢 四六片錢

白芨二兩 夏枯草五錢 錦紋大黃二兩

牡蠣兩 正川貝五錢

用法：共研成細末，用好醋調敷患處，每日上午

七時敷藥至下午七時除去，夜眠不敷。

來源：容縣黃中達。

又方

處方：元參四錢 銀花五錢 夏枯草五錢 牡蠣

三錢 甘草三錢

用法：用水煎服。

來源：石龍縣劉保平。

又方

處方：地丁一兩 銀花一兩 皂角刺五分 甘草

一錢

用法：用水煎，每日服一劑。
來源：余慶年。

又方

处方：鳳仙草（又名手甲花）數斤

用法：搗取其自然汁，熬蒸成膠狀，再用干布涂
蒸貼之，至癰散為止。

來源：曾正芳。

又方

（一）內服方

处方：月季花蕊兩半 芫花一兩 正沉香五錢

用法：共研成細末，酒糊為丸，如黃豆大，每服
三分，連服十天後，每天服錢半，另加鯽
魚一條、海帶一兩，煲水送服，瀉下為
效，如未瀉下時，可繼續服藥九錢半，至瀉
為止。

（二）外治方

处方：紅芽大戟二錢 大甘遂二錢 白芥子一錢

麻黃四錢 生南星錢半 僵虫錢半 半夏

錢半 膝黃錢半 白醋二錢 芒硝錢半

白凡三錢 蜂糖二兩 另馬前子五錢（生

末和白醋浸一夜）

用法：共研成細末，調醋與蜂糖，搗患處即愈。

如未破爛用此方，已破爛者用上內服方。

來源：博白衛協會。

又方

处方（一）：白降丹二錢 梅片三分 射香一分

畔婆虫七只（產在沙泥畔成窩的）山芋头
少許

用法：先將畔婆虫用瓦焙干後，與各藥研成細
末，再用山芋头少許，煨熟去皮，與藥粉
制餅如黃豆大，再用時，將藥餅一粒放在
普通膏藥中心（市上有售），密貼于癰上，
三日夜至癰出為止，如癰核多者，可照法
多用几張貼之。后加用下方：

处方（二）：銀花 荆芥 薄荷各等分

用法：煲水洗患處，如痒加地丁。

來源：岑溪覃浩光。

治遠年癰癰方

处方：白凡一兩 青凡一兩 胆凡六錢 月石一

兩 蘆甘石一兩 正粒辰砂六錢 牙蛸一

兩 生鹽一錢 水銀六錢 (須用錫末制死水銀)

用法：將上藥制成升丹。將升丹一粒放在拔毒膏藥中間(市上有賣，經過消毒的)，貼在結核頂上；四十八小時后，將膏藥換升丹一粒，仍照前貼四十八小時，此時，癰瘰上必起一小泡，但仍照前法繼續再貼，直至小泡流出毒水后，用苾酸根煲水洗，以免毒水流至肌肉腐爛；第三次換藥再貼，癰核必出，用苾酸根水洗淨后，撒埋口生肌藥散于患处，就易收口。

制升丹用具：七星鑊一個，滑底大碗一個，沙紙八張剪成八寸長二寸大，煨石羔四斤研末，風爐一個，炭四斤，火磚二只，索一條。

制丹預備：一、先放水銀于鑊底，二、其他藥品放于水銀面，三、將碗翻蓋于鑊中，四、用些少沙紙圍塞海碗底，五、放石羔粉于大海碗周圍，以微高于鑊邊為度，六、放清水堅實石膏，七、用砂紙條封固大碗底至鑊邊，約數十層，八、將火磚置于鑊底，再用麻索連鑊耳固定，九、太陽晒干。

制丹操作：先用文火，后用武火，以二小時為

度，須注意不使洩氣(如有氣出，須用石羔糊)。待升得和冷凍后，將碗取出，碗內的結晶体即升丹。將升丹細末，加面粉各半混合為丸，如菉豆大。

禁忌：凡熱毒食物及有核的菜不可食，忌房事三個月。

來源：梁濟川。

治療癰針灸療法

穴位：百勞二穴(位在項大椎穴直上二寸，外開一寸)，每灸七壯，過七日再灸七壯，連灸三次即愈。

來源：昭平縣蕭時彩。

治療癰腫痛方

处方：牛銀二錢(去毛)生南星二錢 白凡三錢
用法：共研成細末，涂患处。
來源：百色縣歐堃。

治板癰方

处方：大田螺肉五只(去壳取肉，用綫串晒干)

切片，面粉煨燥，取出末粉）硃砂一錢
雄黃三分 白信石一錢（煨過）梅片五分
硃砂五分

用法：共研成細末，以口液開涂患处，外用薄紙貼上，干即潤濕，七日變紅，如未變紅，再用前法涂之，過十四日其核爛落后，用膿茶洗淨，再貼生肌玉紅膏。（生肌玉紅膏方出金鑑外科）

來源：陸川梁爵平。

治鼠蹊部方（淋巴腺腫痛）

處方：熟豬膏少許

用法：放在大榕樹叶上，用炭烤熱，熨患处，每日二、三次立愈。

來源：陸川李正華。

治五瘤病方（不紅腫）

處方：海帶五錢 海藻五錢 枯草三錢 海蛤三錢 昆布三錢

用法：用水煎服，連服十二劑，外加太茶藥根，羊角扭，石榴寄生茶，共糯米飯搗爛，敷三次即愈。

來源：博白衛協會。

摘出淋巴結核方

處方：蚰蜒虫 銅錢

用法：搗爛，敷淋巴結核。

來源：富鍾縣陽春暉。

治淋巴結核方

處方：松香一兩 銅錄兩半 木鱉子仁一兩 蓖

麻仁一兩 生草烏四錢 生半夏四錢 生

甘草四錢 生乳香四錢 生川烏四錢

用法：將藥混合，搗成羔，每敷一貼，每隔四、五日換一次，約一、二月消散。

來源：賓陽縣。

治瘰癧良方（又名大頸或脹頸）

主治：男女頸部腫脹，呼吸喘促，步行更劇。

處方：海帶六錢 海藻三錢 雄海馬四錢 海石

三錢 昆布三錢 川貝三錢 法夏三錢

連翹三錢 牛子三錢 茯苓三錢 陳皮錢半

炙草錢半 干野辣椒根二錢半 枯草三錢

用法：用清水兩碗，煎取大半碗，飯后溫服，一

次服完。

(說明)野辣椒根，叶形和家种的辣椒叶相似，子如銅紐扣(嫩的青色，老的如褐色)，忌食鹽三星期。

來源：宜山專署衛生科。

又方

處方：海帶三錢 昆布三錢 夏枯草花三錢 海

藻三錢 射干九錢 海蛤三錢 青皮三錢

海螵蛸三錢 海金砂三錢 廣皮三錢 川

貝三錢 半夏三錢 廣木香三錢 川木香

三錢 青木香三錢 川朴三錢

用法：共研成細末，加水制成丸，每服五錢，早

晚二服。

來源：陽朔。

治甲狀腺腫大方(即瘰癧)

處方：海帶四錢 海草三錢 海石三錢 海螵蛸

三錢 昆布三錢 烏藥三錢 木香二錢

桔梗三錢

用法：煎服，如初期未滿一年，可用手按患部，

軟的連服數劑可愈。

禁忌：服藥后，忌食魚腥和熱燥性食物。

來源：蔣崇甫。

治頸癰方

主治：頸部痰火癰癰，堅硬未穿破的。

處方：(一)大黃二兩 茶油一斤 老石灰五錢

(炒)乳香四錢(去油) 沒藥四錢 黃蜡

三兩

用法：先將大黃切碎，放入茶油內，用銅器以慢

火熬至滴水成珠，去掉大黃的渣，次將老

石灰、乳香、沒藥研末，煮片刻后，再加

入黃蜡攪成膏，放在鷄皮紙上貼之，然后

再服下方。

處方：川貝母四兩(去心蒸) 元參四兩(蒸)

海藻二兩 牡蠣四兩(煨后，用醋浸透取

出) 桔梗二兩

用法：研成細末，煉蜜為丸，每重一錢，每日早

晚飯后，用開水沖服，每次三丸，輕者一

劑可愈，重者兩劑可愈。

來源：平南何昭正。

皮膚病類

治濕癬、手足糜爛似麻瘋

处方：風子一錢 床子一錢 水銀五分 樟腦三分

分 文蛤一兩 硫黃一兩 狼毒一兩 射

香三厘 錫粉三分

用法：清油煮成稀膠狀，用山姜頭蘸藥擦之。

來源：丘有明。

治毛根癬方

处方：雄黃三錢 錫粉一錢

用法：共研成細末，用煤油開成稀膏，以鴨毛蘸

涂患處，最好能剃光头髮。

來源：陸川呂典祺。

治爛頭癩方

处方：樟腦 硫黃 青凡各三錢

用法：共研成粉末，茶油開，用鼻嗅，每夜嗅十分鐘，一連三夜后，用石灰水洗身。

來源：寧文洲。

治牛皮癬方

处方：大芋头仔

用法：煨熟后，与生蒜米搗爛，敷患處。

來源：陸川蘇廷芳。

治油蟊方（即陰囊濕疹）

处方：白糖四兩

用法：用水四斤煲白糖，滾后，趁熱汽熏患處，

候水溫冷適度，再洗患處，繼續熏三次即愈。

來源：陸川呂培茂。

治濕癬方

处方：坡芝麻根 黃麻子 鴨脚木皮 烏李強根

（忌鐵器，不可隔夜用）

用法：各藥等分，用酸醋煲水，洗一、二次即愈。

來源：陸川金山培。

治疥癬方

处方：大楓子三十六只（去壳） 樟腦五分 水銀

用法：搗爛，擦患處。
五分。

治頑癬方

處方：月石 兩半 硫黃 五錢 樟腦 三錢 白芷 七

錢 松香 兩半 老白灰 二兩（水飛） 陀僧
一兩 川連 七錢

用法：研成細末，以煤油或樟油調開，擦患處，

三、五次自愈。

來源：平南縣安安聯合診所何昭心。

治濕疹方

主治：小兒頭面生白小泡，發癢流黃水，潰破或
流膿等。

處方：文蛤 二錢 樟腦 一錢 輕粉 錢半 五倍子

一錢 花椒 錢半 梅片 五分

用法：共研成細末，以油調涂，涂藥前，先用細
茶煎汁，洗淨拭干患處。

來源：臨桂縣蔣傳家。

又方

處方：孵過鷄仔的蛋壳

用法：燒炭存性，用茶油外涂。
來源：賓陽縣。

治小兒頭生濕疹方

處方：密陀僧 白芷

用法：共研成細粉，先用淡鹽水洗淨患部，將藥
末搽上，每日一次，一、二日可愈。

來源：張正臣。

治金錢癬方

處方：洋桃菓 草決明子 各等分

用法：先將決明子研末，后放洋桃菓，共同搗
爛，涂患處。

來源：同上。

治白癬風方

處方：白鱧魚油

用法：用竹將患處括松后，涂魚油數次即愈。
來源：陸川。

治汗斑方

處方用法：（一）硼砂和酸醋開涂患處。

(二) 梔水涂患处。

(三) 生黃瓜去皮，蘸硼砂粉涂患处。

(四) 天仙子炒黑，開梔水涂患处
(此法不痛)。

來源：陸川蘇廷芳。

治疥瘡方

主治：突然全身抓癢，繼則日益加劇，全身起疹

瘡，如手指頭大，全身頭面如瘡。

處方：雞血藤膠 五錢 蒼耳子 五錢 歸身 三錢

(酒炒) 白芍 三錢 (酒炒) 川芎 三錢

秦艽 五錢 冬桑葉 三錢 青皮 一錢

用法：用水煎服，一兩劑即愈。

編者按：此症似蕁麻疹，俗名風团。

治皮膚血燥方

處方：楊桃木叶

用法：煲水洗。

來源：貴縣姜德才。

治紫斑症方

一妇人患紫斑症，突然發現舌上有紫色腫塊，出血不能進食，全身騷癢，并有黑斑，便中帶黑血等症。曾用西藥治療無效，后用下方治愈。

處方(一)：連召一兩 黑枝 五錢 歸尾 三錢

生軍 五錢 石羔一兩 川連 錢半 犀角八

分 薄荷 三錢 甘草 五錢

用法：用水煎服，每天一劑，二劑即愈。

處方(二)：明雄一錢 冰片 錢半 硼砂一錢

用法：研成細末，撒布口腔患处。

來源：興安縣第五區衛生所陳麟祥、卿榮華。

治面及鼻部起紅斑點，如涂脂

色，非常癢痛方

處方：地夫子 三錢 蛇床子 三錢 白芷 二錢 硫

黃(燒過) 梅片 四分

用法：共研成細末，用酒開，涂患处。

來源：柳城縣中醫聯合診所朱耀。

治頑癬方(牛皮癬)

處方：火硝 硫黃 樟腦等分 (各自研末，才合

攪攪勻，以防爆炸)。

制法：用米湯調和，以藥棉漬透，將藥棉攤成薄片鋪沙紙上（每片鋪沙紙一張），重疊累累，以石板重壓陰干。

用法：將藥棉按癬的大小剪好，敷于癬上，以火燃燒，連續燒四、五次即愈。

（說明）用冷米湯浸藥棉，剪藥棉時，須注意大小適宜，勿使燒到好肉。

治癩瘡方

处方：大楓肉 三錢 江子肉 三錢 華撥 錢半 樟

腦 錢半 吳萸 錢半 硫黃 四錢

用法：共研成細末，先將茶油涂濕掌心，置藥末于掌心內，兩掌合搓，以鼻吸其氣，并用手摩患處，每晚洗浴一次，不旬日而愈。若用藥后，癩瘡反多時，則是內毒外發，其愈尤速。

來源：（漏姓名）

治麻癩方

处方用法：了哥王根皮煎濃湯，內服外洗，一、二个月可愈。了哥根皮一斤，清水五斤，煎至一斤，每次飲一至二兩，初飲不宜

多，以飲后头不昏為度，內服每日二次，外洗每日二、三次。

來源：宜山專區醫院宋世端。

編者按：本方在廣東中醫雜誌上曾有發表。

治漆疹方

主治：皮膚發癢起紅疹，蔓延遍身，皮如虫行，

抓破黃水流出，變成濕癬。

处方用法：烏柏樹煎水，洗數次即愈。如頑固不愈，則用硫黃燒烟，熏一、二次后，再以

烏柏樹煎洗即愈。

來源：宜山專區醫院宋世端。

又方

处方：海藻一兩 昆布一兩

用法：水煎頻洗。

來源：張幼加。

治慢性濕疹方

处方用法：（一）外涂方：水楊梅叶晒干，研末（一斤），加梅片六錢，以凡士林適量調成軟膏，外涂。

(二) 洗方：水楊梅 九里明 杉箕

篤 三角炮 水煎洗

來源：省中医院尹月球。

治皮膚燥癢

主治：身脚起紅點，睡暖時即發癢。

處方：黃茅草 茶麩 地膚子

用法：煲水洗即愈。

來源：昭平縣余作年。

治周身似虫行，面色或黑或紅方

處方：生煙骨 蒼耳子 地夫子 老茶麩 干木

油

用法：煲水洗身。

來源：昭平縣余作年。

治丹毒、流火、赤遊方

處方：生軍四錢 青黛三錢 皮硝五錢

用法：將生軍、青黛研成細末后，加皮硝同研，以鷄蛋白混合打勻涂患部，干則以清水潤之，丹毒多者，多屬嬰兒，須刺出惡血，然后涂藥。

來源：吳卓彥。

口腔病類

治口內起泡或起白蜡方

處方：柿霜一分五厘 竹黃一分五厘 硃砂一分

梅片一分 硼砂一分 青黛一分 牛黃五厘

用法：研成細末，擦入口內。

來源：李集中。

治小兒口腔糜爛或白點方

處方：馬牙硝二分 枯凡二分 青黛三分 梅片

二分 人中白二分 熟硼砂二分

用法：研成細末，先用開水洗淨口內污涎，以藥末涂口內。

來源：桂平縣梁鑑華。

治口腔爛方

處方：蚯蚓一兩 貓頭骨一具

用法：煨炭研末，涂患处。

來源：石龍縣中醫進修班。

治小兒白蜡方（口腔起白膜如蜡狀）

處方：殭蚕八分 月石三分 青黛二分 上梅片二分

用法：研成細末，每日撒涂患處四、五次，如煩熱便秘，加元明粉三錢 唇舌發紅，加川連三分。

來源：郭麟玉。

治牙床赤爛方

處方：石羔 樟腦

用法：共研末，擦患處。

來源：全縣唐榮章。

治牙痛方

處方：南蛇皮

用法：煨成細末，調茶油點牙內，痛即止。

來源：百色陳三記。

又方

處方：細辛 山慈姑各一兩

制法：浸双酒一斤。

用法：以脫脂棉一团，如黃豆大，浸藥酒，放入痛牙咬住。

來源：环江縣李榮圖。

又方

處方：生地 樟腦 月石

用法：搗成膏，貼牙齦上，即時止痛。

來源：荔浦曾繁清。

又方

主治：風火牙痛。

處方：（一）：防風 石羔 鶴虱各一兩

用法：淨水煎湯，頻頻含漱。

處方：（二）：當歸二錢半 生地三錢 京芥三錢

錢 甘草錢半 生石羔六錢 川連二錢

丹皮二錢半 防風三錢

用法：煎服。

來源：常文英。

又方

處方：白欖六、七只 鷄肉一、二兩

用法：用水煎服。

又方

处方：旱蓮草 五錢 瘦豬肉

用法：煎濃汁，吃一半，以一半含漱，對牙痛有效，但治虫牙痛較差。

來源：宜山專署衛生科。

治口腔炎牙痛方（紅腫發熱，流涎膠，面頭腫等）

处方：調胃承氣湯加防風 二錢 石膏 五錢至一兩

用法：煎服。

來源：鍾春麗。

治虫牙痛方（齲齒痛）

处方：牙硝 枯凡 硼砂 辰砂 各等分

用法：研成細末，以藥棉包裹，塞患處，每日數次，至愈為度。

來源：常文英。

又方

处方：北辛 三錢 白芷 三錢

用法：煎湯，含口內五分鐘，痛止則吐出。

來源：蘇廷芳。

又方

处方：沒石子 三錢

用法：研成粉末，塞入痛牙內，其痛自止。

來源：盧宗慶。

又方

处方：五靈脂 三錢 五倍子 三錢 骨碎補 三錢

白薇 三錢 北細辛 錢半

用法：清水三碗，煎取兩碗，含口中，至不能忍時吐出，再如前法含幾次即效。

來源：田陽黃公敏。

治虛火牙痛方

处方：生地 七錢 大黑豆 四兩 牛七 三錢

用法：共煎服，此湯要久煎，輕度的三服可愈，重的要多服才能收效。

來源：蘇廷芳。

牙痛丹

处方：樟腦一兩 薄荷冰一錢

制法：置瓦鍋中，四周用白糖圍住，覆蓋瓷碗一個，外以石羔粉封固，用文火昇煉約半小時，候冷取出，加梅片五分調勻，研末，便成丹。

用法：以藥少許點患處，如牙齦出血，加蟾酥配伍丹一錢 蟾酥一分。

來源：容縣韋瓊玉。

立止牙痛丹

(無論何項牙痛均有效)

处方：防風 姜活 細辛 華撥 雄黃 各一錢

冰片二錢

制法：研成粉末，加入雄黃冰片攪勻，取瓷杯一個，以杯內光滑，杯身稍扁的為宜，用棉紙封好如鼓狀，置藥于杯口棉紙上，以火燒之，藥末自燃如燭火，待燒近杯口棉紙時，急將燒成炭末的藥粉刮去，切不可燒破棉紙，待冷后取去棉紙，杯內即有一層藥丹，用銅刀刮下，放入瓶中固封候用。

用法：先令患者用鹽水漱口，以藥棉拭干淨，如虫蛀有洞，把牙丹放入洞內，无洞的擦牙

根部亦可。放丹后，用筷子在痛牙上一壓，痛立止。

來源：防城縣張正臣。

治牙齒出血不止方

处方：信石一分 (煨至起白烟為度) 紅棗五只 (燒炭)

用法：研成細末，涂患處。

來源：陸川。

治熱氣齦肉腫方

处方：八角

用法：將八角咬出香氣，含于腫處近旁，几次見效。

來源：田陽黃公敏。

治牙齦蝕爛、出血方

处方：老虎爪筋 (草藥)

用法：枝、梗、叶同用，煲濃水乘熱熏之，數次即愈，如不怕苦，待稍冷后，含口中，一次可愈。

來源：富鍾縣嚴啓超。

治齒縫出血方

处方：狗屎都二兩（即狗尾草根）

用法：煲濃汁含漱服。

來源：梁智雄。

治坏疽性口腔炎（俗名走馬牙疳）方

处方：白砒石二分 大棗一枚 梅片四分 辰砂

五分 川連三分 枯礬五分

用法：將大棗去核，用白砒石放入棗內封好，置火炭煨紅（白烟出尽为止），再与上述藥研成細末，以小竹子卷上消毒棉花球，蘸藥粉輕涂患处，數日可全愈。

來源：周信良。

治走馬牙疳方

处方：射香 冰片 儿茶 雄黃 馬勃 秋石

硼砂 青黛 各等分

用法：研成細末，撒在牙上。

來源：全縣。

又方

处方：甘欖核

用法：燒炭研末，用茶油調涂。

來源：昭平余作年。

治小兒口疳方

处方：冰片五分 雄黃五分 青黛四分 白凡

四分 硼砂五分

用法：共研末，撒口內。

來源：（漏寫姓名）

治小兒鵝口方

主治：初起時，口腔、舌或喉頭發紅，三、四天後，轉成白點或結白塊，流涎，六、七日舌口痛，不欲哺乳，呼吸促。

处方：亭力子二錢 川連一錢 雄黃二分 人中

白五分 雞內金一只 青黛二分 京梅片

一分

用法：研成細末，每天放三、四次入口腔，如其喘甚，气管發炎，啼哭不哺乳，即內服下方。

处方：連翹一錢 牛子一錢 銀花一錢 川連

一錢 甘草一錢 花粉一錢 薄荷五分

石斛二錢 生地一錢

用法：用水煎，一日數次分服。

來源：李漢基。

又方

主治：初生小兒，舌及口內生白膜者。

處方：冰片四分 硼砂一分 薄荷二分 青黛

三分 中白四分 射香五厘 珍珠三厘

用法：研成細末，吹入口內。

來源：陳肇勳。

治初起鵝喉方

處方：金針根（又名黃花菜根）五、六條

用法：將菜根給病者生嚼，吞菜根水（只要吞得一些下喉即通），再用四、五条煎水

服。

來源：百色朱少武。

治舌腫滿口方

處方：雞冠血 生蒲黃 干姜 等分

用法：研末擦之，即消。

來源：田東滕二姑。

治口炎方

處方：烏柏莖半斤 火硝五錢

制法：先將烏柏莖的外粗皮削去，洗淨后切成片，以淨水三斤，放砂鍋內煮之，濃縮至水約二斤，停火后入火硝，搗勻，濾去渣即成黃色藥水，退火一宿可用。

用法：成人以類含漱，幼嬰可將棉球蘸藥水頻頻洗滌。妊婦忌用。

（說明）烏柏又名土黃連，是木本植物，生在石山上，高三、四尺，莖的外層有黃黑色的粗皮，里層色黃，叶生于頂端，邊成鋸形。

來源：臨桂縣七區茶桐愛羣聯合診所褚中付。

治喉頭炎症方

主治：發于喉間兩邊，紅腫障礙疼痛，水米難吞，俗謂雙單吊鵝，又有中吊鵝，忽覺喉中有物阻碍，即生一血泡，血泡塞住咽喉即死。

處方：生扑茹頭（即狼毒梗）黃糖一兩

用法：將糖研碎，用扑茹頭蘸糖點去血泡，泡破出血消散，續點數次，消炎去惡，吐出白

清膠口涎，不數分鐘即好。

針灸法：在患者拇指內甲根少商穴，刺出血全愈。

來源：陸川周維霖。

治喉頭急性血泡方（又名搶食泡）

处方：地龜虫（大人十二只，小兒七只）

用法：用瓦焙干，研成粉末，滾水冲服即愈。

（附注）該虫又名地卑虫，色褐，身能屈卷，生在墊物的磚底下。

來源：陸川鍾鎮乾。

治吊鵝方

处方：鵝兒不食草（又名老鼠跡）一把

用法：放碗內舂爛，再加開水，含口內三、四分鐘后吞下，半小時可愈。

來源：陸川鍾鎮乾。

治一切喉症

处方：紅倒拐根（又名馬鞭草） 痴頭婆根 畏草根（本草名稀薺草） 狗腳跡（又名云肩草）

用法：以上各味用鹽，水煎加鹽少許服。

來源：岑溪梁慶照。

治咽喉腫痛，食物不能下方

处方：（一）山豆根 錢半 中白 錢半 桔梗 二錢

銀花 二錢 草節 二錢 天冬 二錢 川連 錢半

薄荷 二錢 黃芩 錢半

用法：用水煎服后，再用下方：

处方：（二）牛王粉 人中白 枚片 薄荷冰

川連 蜈蚣

用法：研成細末，用竹筒把藥粉吹入口內即愈。

处方：（三）黃欖木叶 森木叶 田螺 沙糖

用法：共搗爛，敷喉腫處。

來源：岑溪慶連。

治喉中潰爛方

处方：（一）人中白 三錢（煨） 元明粉 三錢

姜虫 三錢 輕粉 二分 玄參 三錢

黃芩 二錢 錦王 二錢

处方：（二）龍骨 三錢 冰片 三分

用法：將第一方加生蜜為丸，如指頭大，每次含一丸，有連續不斷的津液化下，腐肉自

去，然后再將第二方研成粉末，用竹筒吹入喉內即愈。

來源：岑溪陳炯。

治鵝喉并口舌爛方

处方：羚羊角五分 犀角五分 川連八分 青黛

四分 硼砂二分 梅片一分 粉草八分

牛黃二分 琥珀三分 川貝一錢 珍珠二分

用法：共研成細末，吹入口內。

來源：平南呂松南。

治喉部痛症方

处方：（一）金古欖三錢 射干一兩

用法：用水煎服一小杯，服后漱口，經數次后，再用下方：

处方：（二）生鹽五分 炭灰四分 枯礬五分

梅片五分 硃砂三分

用法：共研成細末，吹入喉內。

來源：中醫進修班朱耀。

治小兒口腔糜爛、難以吮乳方

处方：絲瓜絡一條（煨炭） 辰砂一錢

用法：研成粉末，摻入口腔內，每日三、四次，數日即愈。

來源：張正臣。

治小兒重舌方

处方：黃瓜米

用法：煨炭點患處，如病已重，赤紅甚，先用針刺破，再行點上。

來源：余達全。

治出重舌驗方

主治：舌底下多出一條肉牙，象舌一樣，未出前

頸喉略痛，發現后痛更甚，且語言難出，脈洪大有力，如過二十四小時有生命危險。

处方用法：重冠雄雞冠的血，零點五公分，點入患處特效。

說明：點后，不用另食其他藥品。

來源：宜山專署衛生科。

又方

处方：（一）鉄樹叶四張，搗爛冲蜜調敷之。

处方：(二) 山慈菇，冰片共末，以黑肉雞血涂

之。

來源：上林鄭重才。

又方

处方：紅棗(去核) 青凡

用法：將紅棗破開，納入青凡，焙干后，研成粉末，撒敷重舌上，即時全愈。

來源：博白縣劉海東。

又方

处方：大虫舌(又名山發藥，叶如虎舌，背紅面

青，有絨毛)。

用法：煲水含之，約時許即愈。

來源：博白縣宋壽堂。

治突然嘶啞、不能言語方

处方：正犀角 人乳 白糖

用法：先將米水半碗磨犀角，后將人乳半杯和白糖二兩沖服，連服四天可愈。

來源：合浦廉洲聯合診所陳明璣。

治雙單鵝喉方

处方：枯礬五分 洗手果子一錢

用法：將洗手果子燒成炭，共研成細末，吹入喉內。

來源：黃鉅昭。

又方

处方：生白礬末三錢 大梅片一錢

用法：共研成細末，調勻，吹入喉內三、四次便愈。

來源：招興林。

治口腔炎及喉頭炎兼潰瘍症方

处方：西瓜霜一兩 硼砂五錢 煨冰片三錢 橄

欖五錢(煨) 雄黃一錢 白凡二錢(煨)

用法：共研成細末，吹入口內。

(說明) 西瓜霜制法，即將扑硝放滿入西瓜內陰干，候其出硝，取出用之。

來源：岑溪縣劉正海

鼻病類

治鼻淵方

主治：鼻淵鼻塞不通，流出粘膿、惡臭。

處方：當歸三錢 黑枝三錢 柴胡一錢 貝母一錢

元參一兩 辛荑二錢

用法：煎水服，連服二、三劑有效。

來源：關瑜安。

又方

主治：鼻流清黃色、臭不可聞。

處方（一）：辛夷 姜活 川芎 甘草 蒿本

木通 升麻 細辛 白芷 各三錢

用法：共研成細末，用清茶送服，如不愈時，可

用藿香四兩，豬胆十枚合成丸，煎蒼耳子

湯送下，仍未愈時，再用下方：

處方（二）：生地四錢 阿膠二錢 台參錢半

炙草三錢 白芍二錢 牛子三錢 麥冬三錢

用法：水煎服。

來源：張映南

治鼻衄方

處方：生地（炭）三錢 側柏（炭）二錢 芥炭二錢

藕節五錢 走馬胎二錢 北胡（炭）錢半

炭枝二錢 蘆草根一兩

用法：用水煎服，連服數劑即愈。

來源：岑溪李少甫。

又方

處方：金邊吊蘭一把

用法：搗爛，沖滾水服即愈。

來源：岑溪祝守明。

又方

手術：用冷水敷胸部第七肋處，右鼻孔出血敷右

胸部，左鼻孔出血敷左胸部，同時用麻繩

綁中指第三節，如右則綁右，左則綁左，

若兩鼻皆出血，則兩側胸皆敷，左右手中

指皆綁。

來源：邕寧縣。

治鼻出血，常流不止，或止后又來血方

处方：生地（炭）四錢 側柏叶 三錢 炭枝 二錢

棕櫚（炭）二錢 赤石脂 二錢 百草霜 三錢
荷叶 三錢 蓮須 二錢

用法：水煎去渣，分二次服。

來源：岑溪吳白云。

治鼻孔生肉条，突出孔外方

处方：桑漂蛸焙干

用法：研成粉末，吹入鼻內即愈。

來源：博白刘海东。

治鼻衄方

处方：生藕節 七个 生蓮叶 一兩 生地 五錢

用法：水煎服，如血熱過盛，加茅根三錢。

來源：盧兆暄。

又方

处方：西瓜根 一兩 雞蛋 一只

用法：用水煮服。

來源：（漏寫姓名）。

治鼻血不止方

处方：麥冬 六錢 生地 六錢

用法：用水煎服。

來源：資源縣楊文藻。

喉病類

治双單蛾方

处方：馬螳螂窩（即桑螵蛸） 三只 箭猪毛 二条

指甲兩片

制法：右三味燒灰，共研成細末。

用法：用鵝翎管或竹管將藥末吹入喉內，如喉腫

塞，可从鼻吹入。

來源：柳城縣張健雄。

又方

主治：双單蛾腫脹、疼痛，飢食不能嚥下。

处方：生南星或生半夏（每次不得超过一錢）

用法：二者任用其一，磨醋少許嚥服。

來源：荔浦縣黃燕彪。

編者按：本方綱目已有記載。

又方

處方：手指甲（燒灰） 生鹽少許

用法：共研成細末，用鵝翎管或竹管將藥末吹入喉中，咽喉通后，隨用童便吞送。

來源：東蘭縣杜國藩。

又方

處方：手指甲（用刀刮下） 人中白 各等分

用法：放在瓦上焙干，研末，吹入喉內。

來源：昭平縣曾熾南。

又方

處方：桑螵蛸

用法：燒炭研末，吹入喉內。

來源：昭平縣馮少文。

又方

處方：人中白一錢 川連一錢 硼砂一錢 木必子六只（煨存性） 梅片三分 熊胆一分

用法：共研成細末，吹入喉內。

來源：平南縣叶奕周。

又方

處方：大梅片二分 木必子四只（煨炭）

用法：研末，吹喉內。

來源：平南縣楊策球。

治雙單鵝喉，嚥食不下方

處方：牛黃二分 梅片二分 硼砂二分 雄黃一分

牙硝二分 硃砂一分 熊胆二分 青黛一分

白姜蚕一分 儿茶八分 射香一分 全蠍二分

胆凡一分 胆草二分

用法：共研成細末，以少許吹入喉中。

來源：平南縣李松南。

治雙單蛾及一切喉症方

處方：生地四錢 山豆根三錢 桔梗三錢 銀花三錢 甘草一錢

用法：水二大碗，煎取五分，分三次溫服。服后用熟鹽一小杯，置于手心內，合掌頻頻摩擦，約半小時蛾破痛止，咯出毒血，即服

上方一、二劑，以清喉毒。

來源：南寧謝舍我。

編者按：本方白喉不宜輕用。

治喉痛方

主治：內外喉腫痛，喉中痰聲如鋸，飲食困難。

處方：黃柏二錢半（鹽炒） 知母三錢（鹽炒）

元參三錢（鹽炒） 黃芩三錢（酒炒） 山梔

三錢 山豆根三錢 木通錢半 生地二錢

半 防風錢半 石膏二錢（另研沖服）

射干二錢半 桔梗二錢 甘草二錢 荊芥

錢半 殭蠶二錢 薄荷一錢

用法：用清水兩碗，煎至半碗，沖石膏粉，少少嚥服。

來源：上林縣盧建中。

編者按：白喉症的痰聲如鋸，不能用。

治咽喉腫痛

主治：咽喉腫痛，口張不大，食物難進。

處方：玄參二錢 桔梗二錢 生地二錢 姜活二

錢 防風二錢 射干二錢 山慈菇錢半

麥冬錢半 細辛一錢 山豆根錢半 薄荷

錢 甘草錢

用法：用清水兩碗，煎成大半碗服。

來源：全縣唐華卿。

治喉腫痛方

處方：（加味養陰清肺湯）元參八錢 生地一兩

丹皮三錢 浙貝打三錢 蔓仁打三錢 白

芍四錢 麥冬三錢 薄荷后下錢半 甘草

二錢 葛根三錢（兒童減半）

并用：（口含丸藥）洗手果核（煨取肉一兩）

烏梅五錢 甘草五錢 京梅片八分 研成

細末，蜜丸如梧桐子大

用法：加味養陰清肺湯，水煎溫服，每日服二次。丸藥每次含嚥一、二粒，每日含嚥三、四次。

說明：主治咽喉腫痛，小舌吊，兩核腫大，嚥睡

疼痛，脈象浮緊，每分鐘搏動七十至八十

次。喉劇痛時，脈象搏動反減退，（每分

鐘五十—六十次）舌苔薄白，小便淡，大

便結，痰粘色白帶黃，眼白有紅筋。如

口氣臭加知母三錢，大便結加錦軍三錢，

發熱加生石膏四錢，體弱者去石膏，腎熱

加鹽水炒知母，大熱加犀角片二錢（先煎），虛熱者加小金釵三錢（先煎）。
來源：梁伯樂。

治喉毒方（喉頭紅腫疼痛）

處方：木樨木根 酸藤木根 金古欖 梅片

二分

用法：先來木樨木根、酸藤木根各等分，煲水漱口。去痰毒后，用金古欖、梅片兩味，研末，吹入喉內。

來源：平南縣劉瑞光。

又方

處方：山豆根 七分 黃芩 七分 几茶 七分 川連

五分 薄荷 三分 桔梗 三分 元參 三分

熟礬砂 三分 雄黃 三分

用法：研成細末，吹入喉內。

來源：平南縣李松南。

又方

處方：山豆根 三錢 礬砂 二錢半 人中白 二錢

青黛 二錢半 雄黃 一錢 梅片 八分

用法：研成細末，吹入喉內。
來源：蒼梧縣莫煒章。

又方

處方：人中白 三錢 人中黃 一錢 射干 錢半

青黛 三錢 礬砂 三錢 梅片 三分

用法：共研細末，吹入喉內。

來源：蒼梧縣盧品珩。

治喉頭炎，嚥物疼痛及雙單蛾方

處方：金鎖石（按即金鎖匙）一至二錢

用法：將藥含口中，時時嚥下藥液。如昏迷不省，牙關緊閉，可將藥研末，从鼻吹入。

來源：宜山專區醫院宋世端。

治咽喉生瘡方

主治：咽喉生瘡，吞物、咳痰時疼痛，嘶不能言。

言。

處方：京夏一兩 元醋半斤 雞蛋清 五个

用法：京夏、元醋同煎，和以雞蛋清，分溫含緩

緩嚥下。

來源：平南縣黎汪涵、玉林縣莫業文。

編者按：即略改变仲景半夏苦酒湯的制法。

治白喉并喉痛方

主治：喉生白膜，語言不出，神色變異。

處方：犀角地、黃湯加麥冬、知母，用水煎服。

用法：先用刀傷木叶、刀甩草煎水，加食鹽少許，含漱數次，膜去，舌軟，声出即服上方。

來源：玉林縣莫業文。

治白喉方

處方：生地三錢 川貝研粉二錢 蜂蜜五錢 茅

根三錢

用法：用清水煎，冲川貝粉服。

來源：臨桂縣黃振廷。

又方

處方：蛇胆汁

用法：開水調勻后，用鴨毛蘸涂患处，并可服用一些。

來源：中医学會廖忠。

治鎖頸蛇方（或叫過頸蛇）

處方：獨脚烏柏金鎖匙（即一斗金）

用法：浸酒服，并搽患处。

（說明）頸項或头部紅腫突起，如蛇圍繞頸項或头部。

來源：昭平縣黃福梅。

又方

處方：山胡椒

用法：研成細末，用酒調勻，涂患处。

治各种喉病方

處方：紅棗（煨炭）五只 枯凡錢 正梅片二分

川麝香一分 川連錢 牛黃一分

用法：共研成細末，貯瓷瓶密封，用時吹藥末入喉中。

來源：南寧黎劍俠。

編者按：白喉不宜輕用。

眼病類

治眼科脫膜散

處方：南蛇胆二分 硃砂七分 金薄二十張 川

連七分 梅片四分 射香六厘 珊瑚三分

瑪瑙三分 血珀四分 珍珠三分 月石五

分 紅黃精四分 甘石粉二錢 手指甲一

分

用法：共研細末，用人乳汁開滴入眼。

來源：陳榮階。

治痘入眼，眼生白膜，白點方

處方：（一）烏梅錢半 細辛錢半 枯凡一錢

木賊錢半 蘇梗錢半 生鹽一兩 胆凡一

錢 枸杞根錢半 細針二口

用法：用水一小罐，將藥置于水內，先用綫穿針

耳，然后吊入藥罐內，令煎至針不見時，

即將藥水射洗或點入眼，每日二、三次，

每次洗后約半小時，再用下方散點：

處方：（二）珍珠一分 胆凡三分 琥珀五分

丹头五分 母丁香三分 梅片三分

用法：研成細末，按上方洗眼后，先用新鮮人乳

汁點眼（用灯草點，初胎婦人為佳），然

后再將藥末散入眼內。如此每日周而復始

地交併使用，數次即可消除。

來源：田陽黃定華。

治眼充血方

主治：眼紅、流淚、疼痛。

處方：生地五錢 紅花一錢 山枝三錢

用法：用水浸至飽和，將藥搥溶如醬狀，使患者

仰臥，把藥敷在眼的周圍，只在眼的中央

留一小孔。

（禁忌）忌食香、燥和辛辣物，避免強光及烟火

刺激，除敷藥外，最好帶上有色眼鏡。

治眼上膜方

主治：眼球有翳如云一樣，及紅腫疼痛、畏光。

處方：蟬退一兩（成人量）

用法：置蟬退入小袋內，加淨水，約煎三十分

鐘，當茶飲。

（說明）从眼上膜時起，按患病的天數來決定服

藥劑數，如患病十天，就須服藥十劑，如屬實症，可兼服清涼消炎的藥，如龍胆瀉肝湯之類。久病如屬虛症，兼服補劑，總之以蟬退為主藥，外用山枝、黃連泡水，每日多洗數次更好。

來源：以上二方梁文岐。

治眼上膜方

處方：石決三錢（煨） 蛇退二錢（洗焙干煨）
魚古三錢（水飛三次） 虫退一錢（洗焙干） 射香五厘 白梅片一錢 口硃砂（水飛三次） 石燕三錢（煨）

用法：研成細末，用豬肝或雞肝蒸食，每次食五厘。

來源：岑溪縣高智年

編者按：魚古即海螵蛸。

治赤眼方

處方和用法：用上好熟烟浸水，去水后，另用坑通紙蓋住赤眼，將濕烟隨即敷上紙面，即發癢，赤眼自愈。

（附注）涂藥時，以仰臥為佳，直至烟干為度。

來源：陸川陳祖文。

治眼紅熱癢爛方（并治癰癩）

處方：杏仁二錢 打北味一錢 烏梅三只 川椒一錢 枯凡錢半 胆凡錢半 洋針七口

用法：共煲水洗。

來源：張德光。

治眼毛倒插方

處方用法：用生雞冠，刺出其血，取血和陽起石粉，擦眼胞，眼毛即起。

來源：陸川金山培。

治远近目疾、睫毛倒生、赤腫、搔癢、流淚、紅筋遮睛、疳積入眼及麻后眼疾方

處方：歸身三錢 赤芍二錢 石決明四錢 蒙花三錢 夜明砂三錢 川芎二錢半 姜活錢半 虫退二錢 疾黎一兩 粉甘草錢半。

用法：研成細末，飯后，用二流淘米水冲服，每次三錢。

來源：田东吳文熊。

治目膜方

处方：欖核

用法：將欖核磨鯽魚血，滴入眼內。

來源：羅仁清。

又方

处方：枸杞叶

用法：把枸杞叶搗汁，浸古銅錢一宿，取汁扫膜

三次即脫。

來源：玉林覃立成。

治眼赤紅痛，流淚出眵，見

光不得，視物蒙隴方

处方：退云儿（即白灯蓋菜） 茹菇儿（即田中

雀菇菜） 川連二錢（細末）

用法：搥細敷之，或加熊胆少許，人乳汁和勻，

合眼敷上，藥熱再換數次即愈。

來源：岑溪馮英記。

治眼边起粒，潰爛流出黃脂水

汁，搔痒，眉毛脫落，蔓延

周圍，內有細虫方

处方：覆盆子叶一錢 干姜（炭）五分 生白凡一

分 枯凡一分

用法：研末，以蜜調成膏，用軟布攤開貼患处一

夜，其虫即出。再用下方：蘆甘石一兩

（煨水飛過），飛丹五錢，枯凡二錢，珍珠

一分，銅綠二錢，研末，先用京芥、老茶

叶煲水，洗患处，后將藥散敷之即愈。

（附注）蘆甘石是眼科要藥，須選擇正羊腦甘

石，先以黃泥漿浸泡，節燒三枝香時間）

取出后，再用童便浸過七日，取出晒干研

末用瓷罐存放。用時再加珍珠一分，射香

一分，大梅片二分，熊胆二分。

來源：岑溪羅厚生。

治面黃骨瘦，膜翳上眼方

主治：病后元氣虛弱，或因傷食消化不良，面黃

骨瘦，膜翳上眼，視物畏光，將成內障。

处方：肉蓯茸（去皺皮，酒浸一夜，焙干）一兩

磁石（燒紅醋淬七次，研末，飛過）二兩

巴戟（去心）一兩 志肉一兩 熟地（焙

干) 一兩 石斛 一兩

用法：共研成細末，練蜜為丸，如綠豆大，每日早晚飯前，用溫酒或鹽湯水送下二十九丸。

來源：岑溪羅厚生。

治小兒疳症，頭生瘡久不愈，眼生白膜方

處方：鬧羊花

用法：燒存性，研末，用羊肝蒸食或同粥食，每天五分至一錢，食到好為止。

來源：邕寧李兆談。

治疳眼上膜方

處方：熟礬砂 一錢 元明粉 一錢 (煨) 雷丸

二錢 君肉 二錢 木賊 一錢 正硃砂 一錢

用法：研成粉末，蒸豬肝食，一歲者每服三分，如无豬肝用水送服亦可。

治眼上膜方

處方：甘石粉末 二錢 生月季花叶 一兩 食鹽

五分 正梅片 二分

用法：先將月季花叶和食鹽搗幼，再加入甘石粉

搗勻，敷于眼周圍，再將梅片末撒于藥面。

又方

處方：生食鹽 五錢 清水 八兩

用法：放入鍋內熬至水干后，將剩下的鹽(一分)開人乳滴入即愈

又方 去膜

處方：蝸牛(用瓦焙干) 冰片 豬胆 一只

用法：將蝸牛、冰片研末，用胆汁浸藥粉，以灯心草點藥入眼膜，治痘花入眼亦效。

來源：博白衛協會。(以上四方均是)

治眼風特效方

處方：鑽骨風(如小指，長約三、四寸為宜)

用法：將鑽骨風的一端燃燒后，用粗紙(約五、六層)包滅其火，另用生姜一片如銅錢大，貼在風眼最痒处(貼時，將眼睛閉上)，再將鑽骨風燃包的一端，乘熱放在姜片上，如法二次，即使最痒的風眼，定獲全愈。

來源：恭城縣衛生院金榮憲。

治眼翳膜的胆剂

主治：結合膜炎及角膜炎，引起翳膜者。

处方：山狗熊胆 貓头鷹胆 赤熊胆

用法：第一晚臨睡時，先用山狗熊胆，大如小米粒，溶于普通茶水，以潔淨鴨毛扫入眼內；第二晚用貓头鷹胆一小粒，開人乳汁點眼內；第三晚又取赤熊胆一小粒，用清水溶解后點眼。約三天左右，內膜即行消散。

來源：扶綏縣第六联診所周信良。

治小儿疳積眼疾方

处方：天星子炒（即紅扭扣） 草决明 桑叶

海硝 熟石羔 熟礬砂 各五錢

用法：共研成細末，每服錢半，蒸豬肉（不放鹽）或粥米調服。

來源：田东黃錫波。

治小儿疳積眼上膜方

处方：蒼朮 八兩 雷丸 二兩

用法：共煲一日一夜，除去蒼朮，將雷丸晒干研末，蒸雞肝食，每次食二錢。

來源：田东謝吉兴。

治小儿眼睛生白膜方

处方：羊胆 蜜糖

用法：煲食，連食三、四天即愈。

來源：田东李紹基。

治沙眼方

处方：夜明砂 三錢 鳳凰壳 六只 草决明 三錢

虫退 三錢

用法：用米醋煎藥洗眼，每天二次，七天愈。

來源：貴縣曾清泉。

編者按：鳳凰壳即孵出雞仔的蛋壳。

治熱眼方

处方：江中蜆 十只 食鹽 一錢 雷公根 酌量

用法：先將食鹽放入蜆內，使其出水，再將該水和雷公根搥爛，取自然汁澄清，點眼角，并扫眼周圍二、三日即愈。

來源：博白縣衛协会。

治夜盲症方

处方：夜明砂二錢（炒焦） 石決明二錢 柄貓草一錢。

用法：研成細末，蒸豬肝食一、二次即愈。

來源：龍兆榮。

又方

主治：夜盲黃昏時，看不見東西。

处方：黃精三錢 果杞二錢 石決明三錢（煨）

夜明砂二錢 柄貓草一錢 豬肝或羊肝五兩。

用法：共煲，加鹽調味，溫服二、三劑即愈。柄

貓草自取生用。

來源：陸川沈柏台。

又方

处方：茯苓三錢 絲餅三錢 志肉二錢 莢肉

二錢 谷精二錢 蒺藜二錢 蟬退七分

桑寄生三錢 北味二錢 海螵蛸三錢（漂淡）

用法：共水二碗，煎至半碗，早晨空腹溫服，連

服三劑。

來源：岑溪賴成祺。

又方

处方：蟬退二錢 木賊二錢 石決明二錢 夜明砂二錢 當歸三錢

用法：共研成細末，用豬肝或雞肝蒸食。

來源：柳城縣宜山專署衛生科。

又方

处方：熟棗仁三錢 杞子二錢 白朮錢半 茯苓

二錢 淮山三錢 龜板四錢 豬肝一兩

石斛錢半 歸身錢半

用法：共煎水服。

來源：博白劉秀芝。

又方

处方：蒼朮 谷精 夜明砂 望月砂 石決明

各二錢

用法：研成細末，蒸豬肝服。

來源：宋壽堂。

治眼膜方

处方：珍珠 瑪瑙 空青 海螺（煨） 乳金 乳

銀燕石（煨） 梅片 各等分

用法：研成細末，點眼。

來源：馬山縣譚仲潮。

又方

处方：紅邊水蛭二条 蜜糖一兩

用法：將水蛭置蜜內，浸溶后，點眼。

來源：南寧市中医学会陈魯五。

治上白膜方

处方：石決明三錢 虫退三个

用法：研成細末，冲開水一次服。

來源：沈立昌。

治云翳遮眼方

处方：蘆甘石一錢 白丁香（即麻雀糞）二分

珍珠一分 正梅片一分 火硝三分 銀包

鉄蛇胆 兩只

用法：研成細末，先用硼酸水洗淨眼，后用灯草

蘸人乳點藥末，从眼角漬入眼內，合眼片時。

來源：平南縣梁伯岐。

治小兒疳積眼上膜方

处方：夜明砂一錢 木賊一錢 草決明一錢 石

決明 錢半 虫退一錢 海螵蛸二錢 千層

紙 錢半

用法：研成細末，每次約用一錢，蒸豬肝食。

來源：平南縣李敬春。

脫膜藥水

主治：小兒眼上膜，蒙瞶不見物。

处方：明白凡一錢（研末） 川連一錢（研末）

蒸溜水一兩

制法用法：共放玻璃罇內搖勻，半點鐘后，用沙

布濾過，吸入滴筒內，每日滴三次，兩、

三天后翳膜可脫清。

來源：平南縣梁伯岐。

編者按：白明凡占全藥量十分之二，似嫌过重，如滴入眼內，会刺痛难受，可減少明凡量，或多加蒸溜水冲淡，如不覺十分刺

痛，不妨仍照原量使用。

治疳積目翳方

处方：石決明 三錢 雄黃 二錢 冰片 一錢 蘆甘

石 二錢 海螵蛸 二錢 硃砂 一錢 滑石 五錢

用法：蘆甘石以童便泡三天，好醋炙過，與諸藥共研細末，每次用藥末二錢，蒸雞肝食。

來源：石龍縣盧富卿。

又方

处方：川連 三錢 神曲 三錢 蕪荑 三錢 麥芽 三錢

用法：共研成細末，每次服一錢，米湯送下。

來源：石龍縣盧富卿。

又方

处方：蘆薈 錢半 砂仁 一錢 胡連 二錢 淮山

三錢 水仙子 二錢 君肉 三錢 蕪荑 錢半

山查 三錢 扁豆 三錢 神曲 三錢 蓮米 三錢

錢 白朮 二錢 夜明砂 二錢 苡米 三錢

(炒)

用法：共研末，蒸瘦肉食，或以開水米湯調服。

來源：石龍縣黃正忠。

治小兒疳積雞盲眼方

(入夜目不見物)

处方：蘆甘石 二錢 硃砂 五分 石決明 五錢 海

螵蛸 三錢 夜明砂 三錢 內金 二錢 滑石 三錢 冰片 五分

用法：研成細末，每次用一錢，蒸雞肝食。

來源：田東縣吳文熊。

治雞盲眼及小兒疳積眼，羞明不

開，甚至有一、二月不開者

处方：文蛤 威靈仙 谷精 明雄黃 夜明砂

各五錢

用法：研末，每次用五分，取雞肝剖開，將藥末

納入雞肝內，盛碗中，安飯面蒸熟服之，

重者吃七次，輕者吃二、三次可愈。眼開

后，目中虽有白翳，亦漸能自消。

來源：環江縣人民醫院鄧振廷。

治雞盲眼方

处方用法：鯢魚（即草魚）腸去屎煮食可愈。
來源：蒼梧縣劉貴華。

又方

处方：百草霜二錢
用法：用豬肝煮熟，蘸百草霜服。
來源：（漏寫姓名）

治上下眼邊發炎，癢而流淚方

（風弦爛眼）

处方：防風錢 荆芥錢 姜活錢半 胆凡錢 生地錢半 雞冠花二錢
用法：水大半碗，煎成一茶杯為度，用白布一小塊，滾水洗淨，蘸藥水洗眼，洗五、七次可愈，洗時微有刺激，但无妨碍。
來源：桂平縣梁鑑華。

治風眼癢痛方

处方：胆凡錢 銅綠一錢 紅棗五錢 荆芥錢 黃連錢 黑棗五錢
用法：用水煎洗眼極效。
來源：玉林縣田能成。

治風火眼方

处方用法：冰片一味，用紙或棉包置眼外，開眼令藥氣侵入眼內。俟眼淚流出即漸愈。忌食葱蒜、牛肉、辣椒、生姜及一切燥熱食物，并忌風吹、烟熏。
來源：宜山專區醫院宋世端。

治一切炎性眼疾方

（營養缺乏性的眼病无效）

处方：雀兒麻木強（又名了哥王，俗名鷄兒苦晚）四兩 白醋一斤 銅器一兩
制法：共置鍋內，用蒸溜法蒸取蒸溜水，再用古錢一文燒紅投下，經濾過，瓶貯候用。

用法：將藥水點眼。

來源：蒼梧縣聶毓梅。

治瞳人反背失明方

处方：筋莧菜強四兩 谷精二錢
用法：共豬肝煲食，服十多日可愈。
來源：橫縣閉岐山。

治青盲眼（青光眼）針灸療法

取穴用法：命門穴平灸五壯或七壯，穴位在背部正中綫第十四椎，与臍相对。

來源：昭平縣肖時彩。

治老人眼蒙方

处方用法：牛胆一个，用黑豆納入胆內，以滿为度，陰干。每晨服黑豆二至三粒。

來源：桂林羅繼寿。

治眼疾方

主治：疳、痘、熱、風、有云、无云、痛或不痛等眼疾均效。

处方用法：細叶榕樹脂五錢，冲開水或蒸猪瘦肉食。

來源：蒼梧縣鄭建文。

耳病類

治小儿耳淫方（耳流膿水）

主治：耳膿流出耳外，周圍蔓延小粒瘡毒。

处方：雄黃錢 五倍子錢 蘆甘石錢 黃丹錢

梅片五分 胭脂兩帖（燒） 康青五分

用法：研成細末，吹入耳內。

來源：平南縣李集中。

治耳流膿方

处方：射香五厘 川連二錢 梅片五分 三仙丹

五分

用法：研成細末，先用醋洗淨耳內膿汁，將藥末二分吹入耳內。

來源：平南縣任森。

又方

处方：灯草灰 黃丹 枯凡

用法：共研成末，吹入耳內。

灯草灰制法：將灯草納滿竹筒內，泥封筒口，以火煨之，視竹筒成炭，即取出剖開，取灯草灰以配伍。

來源：荔浦縣曾繁清。

治耳內流膿血方

处方：蛇蛻一条 橄欖核三个

用法：煨炭加冰片少許，共研成細末，先用硼酸水將耳內膿血洗淨，再將藥末吹入耳內。

來源：南寧楊翊。

治耳中流膿或耳外潰爛方

處方：枯凡 三分 冰片 一分

用法：研成細末，吹入耳內，若耳外潰爛，用藥摻之。

來源：宜山專區醫院宋世端。

治耳爛方

處方：川連 二錢 蛇皮 二錢 枯凡 二錢 雞內金 一錢

用法：制成散，用茶油開涂患處。

來源：平南縣任森。

治耳停方

處方：石蛤骨

用法：炙酥，研成細末，用淡鹽水洗淨耳內膿汁，吹入耳中。貓頭骨炙酥研末，吹之亦可。

來源：容縣鍾承揪。

治急性耳炎方

處方：土木通 一錢 木鱉仁 三粒 吳萸 五分 蜈蚣 一條 細辛 五分 雄黃 五分

用法：研成細末，調雙料酒滴入耳內，二小時滴一次。

來源：莫維新。

耳聾兼眼蒙針灸療法

取穴：翳風 听宮（針）

來源：柳州第二門診部陳三榮。

（附注）曾用本方針治一男子，年四十多歲，耳聾眼蒙，六天為一療程，已稍見事物，并能聞打鐵聲，此后，停治一個療程，再針一療程而愈。

治耳流膿方

處方：輕粉 五錢 硼砂 五錢 枯凡 五錢 冰片 三錢 黃丹 五錢

用法：共研成細末，先用酸楊桃一、二只搾水，用藥棉洗淨耳內膿汁，再用藥棉拭干，將藥粉吹入耳內。

來源：（漏寫姓名）

治耳道炎方

处方用法：紅毛鷄肝全一个，以火焙干，正梅片、黃丹共細末（等量）。先用單米酒洗淨耳內膿液，后用竹筒吹藥粉入耳內，二至三次必愈。

來源：梁濟川。

又方

处方：（一）生天葵四兩（干的八兩）

（二）冰片二分 蒲黃一錢 中白五分
青黛五分 枯凡三分 甘草五分 文蛤七分

用法：將天葵煎水，滴洗耳內，用棉花拭干后，再將第二方研成細末，用小竹筒吹入耳內。

來源：陸川。

又方

主治：耳內發炎流膿。

处方：白凡一錢（炒至微紅） 蛛蜘蛛壳二十个（炒）

用法：將白凡入蜘蛛壳內，研成末粉，先用双氧粉開水，洗淨耳內膿汁后，將藥粉吹入耳內即愈。

來源：陸川叶宗輝。

又方

处方：（一）：簷口蜘蛛三只 地龜虫數只 枚
片二分

用法：先將蜘蛛、地龜虫煨炭后，加入梅片，共研成細末，用竹筒吹入耳內即愈。

处方：（二）：蝦鉗草 水藍青（即青黛）

用法：搗爛，以双酒攪勻，取汁涂耳內。

來源：岑溪祝守明。

又方

处方：沒石子（煨存性） 枯凡少許

用法：研成細末，調茶油涂之，涂前須先將膿液洗淨。

來源：富鍾縣衛協會一分會嚴啓超。

痔漏類

治痔瘡方

处方：槐花四兩 白凡四兩 刺猾皮三張（燒存）

性)

用法：研成細末，將藥末放入約三寸長的豬腸內，兩端扎好，用砂鍋煲爛熟，取出加炒米粉四兩，搓成丸，如黃豆大，早、晚每服五錢開水送下。

來源：羅崇興。

又方

处方：川連三錢 刺猬皮三錢（煨） 黑枝三錢

鴉胆子七錢（去淨壳油）

用法：共研成細末，以飯為丸，如綠豆大，每服六丸，用紅薯叶包空心服。

來源：陸川縣清民聯診所蔡英明。

又方（內外痔均可）

处方：苦參 夏枯草各一兩

用法：用水煎，內服外洗各半。

來源：余慶年。

又方

处方：田螺數只 梅片適量

用法：將活田螺洗淨泥，置碗內，以梅片撒入螺

掩內，使其吐出自然水，用涂患处。

治血痔方

处方：生大黃一兩

用法：用水煎服。

來源：歐堃。

治內痔瘡下血不止方

处方：金針菜二兩 黃糖兩半

用法：煲水空心服。

來源：陸川縣。

治內痔方

处方：苦參二兩 夏枯草二兩 仙鶴草一兩 川

芎三錢

用法：水煎服，三劑即愈。

來源：容縣林光蘭。

治痔瘡初起方

处方：有刺莧菜四兩

用法：煎水服，几天可愈。

來源：桂林陳治安。

治外痔瘡方

处方：田螺一个 冰片一分

用法：將冰片放入田螺內，候田螺化水，磨生川烏擦痔上，十天即愈。

來源：宜山專署衛生科。

又方

处方：苦参二兩 黃柏八錢 京芥四錢 白芷一錢

用法：用水三碗，煎至碗半，去渣，乘熱分二次洗患部，每日早、晚各洗一次。初起及輕症，洗兩、三天即愈。頑重症，洗一星期或更多几天即愈。計近百个左右的臨床經驗，治愈率在百分之九十以上。

來源：省中醫院黃汝紹。

治腸風下血，肚不痛方

处方：鴉胆子六粒（去壳）

用法：用圓肉包好，開水吞服，連服二次，直至血停不服。

來源：柳江縣陽高照。

大便下血方

处方：白肉鴉胆子五粒（去油打成霜） 赤石脂

錢 血余灰五分 地榆炭錢

用法：研成細末，以飯為丸，如綠豆大，用圓肉包裹，以米湯送下，每服七粒，服一、二次愈，經治四十多个病例，療效很好。

來源：蒼梧黃敏生。

治大便下血方

处方：槐角五錢 黑芝麻一兩

制法：將上藥納入豬大腸內，扎兩頭煲熟。

用法：去藥渣，食大腸。

來源：蒼梧縣許為蓮。

治內外血痔方

处方：湓蛇（又名坭蛇）一條

制法：先將蛇洗去坭，用竹刀去皮血、內臟，不要着水，以杉木板為砧，將蛇放于砧上搥之，使骨刺入砧內，加瘦豬肉三、四兩，制成肉丸，置盅內燉熟后，再加些水，再燉三、四小時。

用法：連湯及肉丸服，服三、四次極效。
來源：容縣陳志華。

治內外痔方

處方：坭蛇（又名逆蛇）一條（約重半斤，愈大愈好）

制法：（一）去皮及內臟，放水煮熟，將肉拆出撕幼，加瘦猪肉、紅棗、香信、磨菰等，以鹽油調味，和原湯餐食，連食數條有效。
（二）將蛇去皮及內臟，用低溫慢慢烘干，（不要烘焦）研末為粉，或制成藥膏，開水送服亦可。

說明：蛇忌煙煤，制時不要混染煙煤。

來源：蒼梧縣劉叔平。

治內外痔瘡良方

處方：細蓉樹寄生_{八兩}

用法：用清水二斤，煎至半斤，取一碗，分二次服。服后在剩余的藥水內加皮硝一兩，再煎滾熏患處，日熏三、四次，二、三日即愈。

來源：田陽李吉卿。

治外痔肛門周圍炎方

處方：榕樹吊根_{二兩} 扑硝_{三兩}

用法：用水二、三斤煎滾，適溫時，用大便球灌洗，一日洗二次，七日愈。

來源：吳卓彥。

治療痔核驗方

（脫痔代刀散的處方和制法）

處方：第一組：水銀_{五錢} 白凡_{二錢} 牙硝_{三錢} 月石_{二錢}

第二組：白砒（即信石或名人言）_{五錢}

第三組：蟾酥_{三錢}（用砂炒）煨胆凡_{二錢}

煨青凡_{三錢}（胆凡、青凡煨后合末）梅

片_{二錢} 烏梅_{四個}（煨成炭）硃砂_錢

制法：（一）先將第一組藥品研成細末，放在新

瓦鍋內，用新碗蓋上（鍋要比碗大），用石羔粉或黃坭末密封后，加火昇之，即將升上碗肚的粉末取出，置瓶內备用。

（二）將第二組藥（信石）放進另一新瓦鍋內，依照第一組制法處理。

（三）將第三組藥品研成細末。

(四) 第一組藥用一錢，第二組藥用二錢，第三組藥照定量全數加入配劑，成為一料，足夠治療一患者之用。

(五) 燒火法：要很好地掌握火候，使其時大時小，如波浪式地起伏，持續三點又三十分鐘左右，到最后一爐火時，令其自行滅息，約燒香三枝左右，即將瓦鍋取下，待冷卻后，將密封石羔或黃坭除去，打開盜碗，碗內有一層粉末，刮下來，即為升藥。

(說明) 第一、第二兩組藥品在未升制前，叫做生藥，一經升制之后，即稱熟藥，若配制多量脫痔代刀散時，可根據上面份量比例增加，即各藥量的主要點：重在熟藥后的分量。升制前的藥分量沒有一定標準，可以隨時加減。

用藥次序：依數年來的臨床体会，共分為三個治療：

(一) 涂脫痔代刀散：當進行涂脫痔代刀散之前，必須確定痔核範圍及位置，然后用棉花蘸些黃連甘草水（系用等量煎成的），塞在痔核下邊（即肛門括約肌的部

位），以免藥粉損傷好的肌肉，再用棉花蘸點黃連甘草水抹洗痔核，以期清潔而濕潤，涂藥易于粘着，每日一次，用藥零點五至一公分。如果初次涂，又遇內痔，必須患者大便后，痔核脫出來時，即進行涂藥，一連進行便后涂藥二天后，（每日一次）痔核自然腫大脫出來了，這樣連續涂藥五至七天后，痔核即進入成熟期，將要枯脫了，不過涂藥時須要留意一點，那就是要把藥散涂到痔核的根部，方能促其快枯，而且涂完藥散后，仍須用棉花蘸甘草水，把整個痔核周圍包住，裹以砂布，加上膠布条（丁字帶更好），然后令患者靜臥床中。

(二) 浸藥水期：連續涂藥五至七天，痔核已呈褐黑色，而實硬，且壓亦不知痛，顯然証明痔核已經成熟，不須再涂藥散，即用下面的中藥水四至五磅，浸洗肛門，每日浸洗兩次，每次十至二十分鐘，一連浸洗五、六天，痔核即完全枯脫了。浸洗藥方如下：

金銀花 五錢 土茯苓 五錢 九里明 五錢

川大黃 五錢 黃芩 三錢 紅花 二錢 歸尾 三錢 槐花 八錢 甘草 二錢 白凡 二錢 共煲水四、五磅，每日洗二次。

(三) 埋口生肌及休养：患者的痔核枯脫后，其傷口經常流出些血液來，這時候主要的處理是生肌埋口，依據過去的臨床觀察，一面給予外洗藥，一面給些消炎散外塗，另給內服藥。

1. 消炎粉：熟石羔粉一兩，甘草五錢，梅片三錢，先將甘草煲水二、三兩，然後將甘草水倒入石羔粉內，調勻晒干，再與梅片研成粉末，每次用二、三錢，用黃連甘草調水塗瘡口，每日二、三次。

2. 內服藥：
第一部分：體弱的人用補中益氣湯加減。

生黃芪 三錢 黨參 三錢 槐花 二錢 地榆 三錢 銀花 二錢 甘草 錢半 歸尾 二錢 茯苓 三錢

第二部：體壯的人用如下的消炎劑：
銀花 二錢 連翹 二錢 黃芩 二錢 淮山 三錢 熟地 三錢 茯苓 三錢 槐花 三錢 甘

草 一錢

如果大便秘結，用緩瀉藥，如小承氣湯加減：

大黃 三錢 川朴 二錢 枳殼 錢半 火麻仁 五錢 甘草 一錢 生地 三錢

如果併發腸炎或發生尿閉症，可用槐花湯與五苓散加減：

槐花 四錢 地榆 三錢 枳殼 一錢 茯苓 三錢 澤瀉 二錢 朱苓 三錢 白朮 錢半 滑石 五錢 甘草 錢半

用藥反應：此方法在下藥時，有些病人有反應現象，有大小便急的感覺和疼痛，（是由于病人的健康問題和過於敏感的關係，而後引起這些現象）但服些止痛劑后，症狀即減輕或消失了（有些病人很快消失，有些病人疼痛時間較長些，但大部分是沒有這種現象的。這些反應也是根據下藥得宜，和配劑方法得當與否所致）。

治療效果：依據五年來的臨床觀察，其療效量是很驚人的。據不完全統計，大約有百分之九十五得到完全治療之功，僅有百分之五，須于第二次復發后，再照上法用藥治

療，便能全部獲得根治。从一九五二年十二月起至一九五六年三月止，在五年当中，先后治療一五八人。在这許多病例中，有些是二十多年的疾患，有些是會到各大医院治过的，有些是有瘻管或脫肛等併發症的，形形色色，複雜異常，但一經治療后，均能獲得完滿成果。

來源：广西廖平農場衛生所中医師凌如海。

癩 瘋 類

治癩瘋驗方

症狀：头面脚部浮腫膚黑，起水球，眼珠紅，遍身癢。肌肉之間，竟有虫行感，眉毛脫光，手足麻木。

处方：（一）內服方：

甲方：大黃 八錢 郁金 三錢 白花蛇 五錢
皂刺 六錢 白丑 八錢 蒼朮 四錢
乙方：白花蛇 三錢 蚯蚓 四錢 細辛 錢
白芷 四錢 天麻 三錢 赤芍 三錢
蔓荊 三錢 當歸 三錢 靈仙 三錢

丙方：苦參 五錢 沙參 四錢 大黃 三錢
皂刺 三錢 白菊 二錢 首烏 五錢
菖蒲 二錢 蒺藜 三錢 生地 三錢
川連 一錢 桔梗 二錢 全虫 三錢
白豆蔻 二錢 西党 二錢 黃芪 二錢
甘草 錢半 蚯蚓 五錢 黃芩 二錢
升麻 五分 連翹 二錢 蘇木 二錢

（二）外嗅藥条方：水銀 四錢 硫黃 一錢

樟腦 二錢 冰片 二錢 雄黃 一錢
麝香 一分

制法：外嗅藥条制法：右六味共乳細末，加小麻油一兩，再乳至不見水銀為度，將藥涂于草紙上，卷成藥条。

用法：藥条用法：將藥条燃燒，置于灯罩內，口含清水，用鼻吸取藥条的煙入肺部，由肺通达皮毛，驅逐惡物毒虫，每日嗅吸一次至二次。

內服方用法：甲方水煎服三剂后，瀉下黃水膿血

惡物小虫，照方加苦參一兩，獨活三錢，蒼耳子五錢，服六剂，頭面浮腫已消一半，再照方續服五剂，頭面浮腫左手麻木已去十分之九，右手麻木亦減半，兩腳浮腫消去十分之八，麻木也減去十分之四，復照方連服二十剂，左眼尚有微紅，上眼皮尚有微腫，兩手指微有麻木，兩腳麻木減半，頭面腳部浮腫消失。惟左眼仍有微紅微癢，手腳還有微麻痛，小便黃，大便尚有膿血。改換乙方，用水煎服三剂后，再換丙方，用水煎服五剂，症狀完全消失。

治癰瘋方

处方：

- (1) 當歸頭一錢二分五 川芎一錢二分五
防風一錢二分五 全蝎一錢二分五
(去足尾，用熱水泡至無咸味，陰干) 大楓子二兩六(去壳)
荊芥一錢二分五 原麝香四分 姜活二錢七分五 苦參二錢七分五
虫退一錢五分五 (取上段)
(2) 當歸身一錢二分五 秦艽一錢二分

五續斷一錢二分五 天麻一錢二分五
五 林烏片一錢二分五 (即芭蕉根的細小部分，用竹刀切片，晒干) 蘇薄荷一錢二分五 蒺藜一錢二分五
蒼朮一錢二分五 陳茶葉一錢二分五
五 靈仙一錢二分五 姜活一錢二分五
五 川草烏二錢七分五 明雄三分
分 大楓子二兩六(去壳) 原麝香四分 胡麻一錢二分五 (研細)
川芎一錢二分五 防風一錢二分五
苦參二錢七分五 虫退一錢二分五
(取中段)

- (3) 歸當尾一錢二分五 蒼朮一錢二分五
川芎一錢二分五 蒺藜一錢二分五
靈仙二錢七 荊芥一錢二分五
姜活二錢七 苦參二錢七 蘇薄荷一錢二分五 大楓子二兩六(去壳)
原麝香四分 全虫一錢二分五 (去足尾，泡淨咸味，陰干) 虫退一錢二分五 (取下段) 防風一錢二分五

制法：當歸須整枝的，分成三部分，第一方用

头，第二方用身，第三方用尾。虫退也是要完整的，去小足，分为上、中、下三段，第一方用上段，第二方用中段，第三方用下段。大枫子须择油足的，其余各药均另研成末（筛出粗头，大枫子壳留作煎汤熏蒸用）。制第一方时，先将当归头舂之，次舂虫退上段，并将大枫子慢舂，俟舂糜烂后，将各药末配合，用陈仓米作饭舂为丸。第二、第三两方均照此法配制，但第二方当归则用归身，第三方当归则用归尾，虫退第二方则用中段，第三方则用下段，煮陈仓米饭及舂药，均忌铁器。

用法：第一方分成十四份，每日早晚服一份，开水送下，七天服完。服三料后（二十一天），即将制药筛出，留下的粗头，和大枫子壳，用水煎汤极滚，置木盆内，盆上架一板橈，病人坐橈上，用蓆围密，乘热熏之，使手足出汗，俟汤适温后洗之。再服第一方一料（七天）后，接服第二方，

服法分量亦如第一方那样进行，七天服完。第二方服完后，又接服第三方，服分量亦如前法，服药至此阶段，病虽大愈，仍须如前法熏蒸取汗，轮服丸药。

禁忌：忌食量、腥、生冷、食盐、咸味六十三天。惟有莲藕、白糖、白米饭、稀粥可食外，其余食物均忌。又须提前忌口七天，才能开始服药。

来源：贵县李煥成。

又方

主治：遍身麻木搔痒，久之，手指筋抽，眉毛脱落，面颊耳目红浮，甚则手足腐爛。

处方：苍朮二两 熟地二两 苍耳子二两 元参二两 車前二两 銀花十两 蒲公英四两 白芥子二两 甘草二两

用法：研末，蜜为丸，每早服一兩，開水送下。

来源：平南縣李倣周。