Ch'en Hao

傷科補要

四冊

R OCT '50

Ch'IEN, Hsüe-Ch'ang

Shang K'o fou-yao (« chüan)

Important additions to the Study of Disorders. With 20 plates.

Se CKIHTTT. 3310-

Foreword of 1818

WB-

48

FRENCH BOOKSTORE
PEIPING (CHINA)
北平法文圖書館

455151

Annex
W'o
700
C533c
1818
pt. 1

ARMY MEDICAL LIBRARY
WASHINGTON, D. C., U. S. A.

45515/

雄

嘉慶戊寅春鐫

偷桃

上海錢秀昌著

虹口竹塘書堂藏板

序

良醫出而不患天札醫酋而書成重矣哉內科之書汗牛充棟

而可綿心傳病者賴醫酋而詎不

者賴書以精其業術書詎不

外科之書伏於內者淺延膝理深居膏肓之書亦夥矣見且夫傷疾之良者易施視盲其視毫毛而理而徵鬯之若所謂術難而

誤著書者推闡精蘊各家故其書層出而不窮其書者次之若傷也者由發為其癰疽深淺重輕至其可按視而名之不多得外為其也術或稍易焉書之

見矣其以是與余司民社有年者
在民有健鬨而兎卧塔然死
下血之每鬨人舁垂急呼
不忍正糢糊氣息纔屬顧
視急醫蓋傷惻

剛毅者抵法孤其子寡
兩家均焉幸而寡其婦
賴焉當是時兩軽重失
當是之命懸於藥救故
醫或淺深不良莫可挽
違節醫之

嘗之微妙上海精醫院思得其書呈其書曰是書補要余善之又以傷科室而不成者而讀而珍而生詣嗟乎築室之

謀之多師古說而聚訟也習焉而科不極解者非焚其所見而偏主其似是而不知之矣誤之之梦之也内矣

學者之心目

讀之而義焉今而世多書者非獨著而刪煩而有是也

貫滙諸家參互其
精辨之詳鮮不失
傷科書傳於
書不得無轉勝
多見是

而無非所謂得其要也
析而後醫良益歷而試
歷而有所親得何敝而
補之缺補而能要創
善之故欣然濡筆而爲

之余說也肱三以尤序

吾嘗見世聞古醫書者解顱理腦破腹
折足者醫皆斷其骨而復得而余不可
接以楊木臥百日耳步履不異恒豈古醫
之奇者其遺

術然悍在傷科與爲
者責而忘親馴悍也
吾見其書玉札而化
求其牛溲而察之者
傷科也矧之者有民
而風之思之

長嘉之乎吾願而書之傳而祝而術





季春無傳也已慶己巳

知上海縣事

蘇昌阿撰

序

儒近者說使之遠者來

儒之道無所不通醫兩家者流其為道仁而已矣仁者以天地萬物為一體其欲人之疾痛猶己之疾痛也是故見人之疾痛雖不相識不相關不相能不相好惡不相與謀不相為謀而惻怛憐憫之心自然發見於面目之間而其救人之急也如己之饑溺雖貴賤貧富遠近親疏貴賤貧富遠近親疏貴賤貧富遠近親疏

漢之前言

古今百外而承訛之弊莫甚於校讐之家前人之書而承訛之弊莫甚於校讐之家前人之書而承訛之弊莫甚於校讐之家前人之書

仁術更非諸疾而比門生死之間轉移瞬息
觀內經靈樞經脈論者哉予雅亦學醫而好
中年書此以自警庶幾毋
易鬥毆身傷急命忽
不可挽救所誤一朝
悔及親者

迎暑署中手携
示予亲饮
览学子综百代
读朱子家训
入泮后付同人
命者

为恻然者久之今岁
松溪钱先生伤科
识睽千秋而读
奇而
门为

觀夫天地之生人也稟
天之意也方書有定而實
有不定者莫若醫藥與方醫
之中則死者生矣故曰醫法也能神明其意
立法人
矣哉
之命即所以補天地之感醫之為用大
受病風寒暑濕

同究一轍俠也

大抵失其調養所致醫者不難次第奏功矣偏病施方門非諸疾可比辛扈言如操舟遇風濤鬧頭揆柁存亡繫腱之間寸脈切寺向粤西峰偶值江河行舟不能移爲其仁術民間匪

目有光明乞命著箕無矢朽謂非仁
之貧言功利溥耶更閔枯溪應今
貶賤不能自存者必極其急急以儒
者之道行當着特善着書而已亭
之術其實貴行也

嘉慶癸酉夏日

練庶子科舉人現任福建知縣李安縣事

水朱茂常拜撰


毅陽傷身命懸呼吸欲永一良醫挽救
不期得目擊手筆佗之屬不再見也幸未喪
鵑情形使我心惻恒嘆扁
訪溪峰大尹來申江滬有
老錢君肴精治傷科輯而成
扶顛名噪一時予雖未諳醫
理編持

無觀古人編科條未或約繁
或識度簡略不詳及閱是編分門別
思精明且更繪象考形俾穴部眉
所度麁廑不頻寡頻寡
謂素而瞭如指掌誠
居者之資也
治道行者


制器
用
何
可同
日
語哉
郘
慶
度壬申
春三月
賜進
士出身
前任
廣西知
府南
李山左張箕東拜撰

拙者之利也其
神蓋
淺
鮮
學功
者所









凡例

一凡治傷先須認明穴部若穴不明治則有悞故繪總穴人圖及靈樞經骨度全圖以便學者參考

一人身骨部長短有尺寸故繪抄靈樞經骨度繪出以爲准

一人之穴部總多一穴有幾名之呼難以辨別故照洗冤錄人圖繪閱有致命處易於分別

一凡人之脫骱斷骨其骨骱包於肉裏外視難明恐有差悞故照骨圖繪明可辨其骱之形其骨之狀

臨症時雖於肉裏能洞悉其形狀學者仍能再於枯
髏上細細辨別更詳
治傷制器具以輔手法之成功應用之器具亦繪
圖形使學者依樣立法
週身名位骨圖甚多恐難熟記故錄其一
一篇學者誦而熟之則了然心目矣
治傷須明其脈理與症合參庶不誤耳茲敘其畧
若要精微須詳脈訣
三十六則參正骨心法之精義合平日試驗之眞

傳分爲條則使學者熟讀可括症治諸法之要

凡三十六則內應用諸方俱以經驗奈名總眾記憶良難渾括爲歌易于成誦臨用時某症某方某藥燎然心目如其湯液藥味加減分兩多寡全在醫者隨症之輕重酌量可也

所編歌括其中平仄韵脚不叶者因限其湯名藥名難以更易也

未附諸方抄集傷科各家之秘雖未經試驗不敢擅刪以備明眼之採擇

又附急救良方以便一時之取用并廣學者之心

胸可行方便

參訂門人

陸雨田蒼虬　寶山

戴御天雲樵　上海

王沛寰雲舟　上海

殷維三蔭堂　上海

羅星海琴圃　南滙

趙東序省菴　南滙

戴上珍秋橋　上海

後未神思夕 卷

傷科補要卷一

總目

卷一

人圖穴部

器具圖法

周身名位骨度註釋

卷二

傷科脉訣

治三十六則

卷三
治傷湯頭歌括
卷四
附錄總方
又附急救良方

傷科補要卷一

上海錢秀昌松泉氏編輯
男 丹書杏園
婿何錦華鶴汀 同較

卷一目次
人身正面穴圖
人身合面穴圖
人身側面穴圖
骨度正面全圖
骨度背面全圖


攀索疊磚圖
器具總論
脫骨格圖
照洗寃錄屍格圖
應刺穴圖
靈樞經骨度尺寸部
周身骨度背面尺寸圖
面部骨度正面尺寸圖
頭部骨度側面全圖

腰桂圖
杉板圖
杉籬圖
抱膝圖
周身名位骨度註釋
傷科脉訣

器具總論

跌撲損傷雖用手法調治恐未盡得其宜以致有治如未治之苦則未可云醫理之周詳也爰因身體上下正側之象製器以正之用輔手法之所不逮以冀分者復合欹者復正高者就其平陷者升其位則危證可轉於安重傷可就於輕再施以藥餌之功更示以調養之善則正骨之道全矣

人身正面穴圖



人身正面穴圖 南翔石夏珍刻

人身背面穴圖




人身側面穴圖



南翔石夏珍刻

修禾要

骨度正面全圖



骨度背向全圖


骨枕
完骨
完骨
髮際項
肩端
肩髃
肩髃
肩端
臑
臑
腋後胁
腋後胁
肘
肘
臂
臂
腕
腕
背膂
背膂
腰膂
腰膂
尾骶
髀樞
髀樞
髀骨
髀骨
髀骨
髀骨
外輔膝
外輔膝
膕
膕
膝
膝
外踝
跟
外踝
跟


骨度側面全圖



南翔石夏珍刻

修禾記 先一

骨度正向尺寸圖



南翔布夏珍刻

骨度背面尺寸圖


骨共廣九寸
耳後當完
中指本節至末節四寸半
一尺二寸半
不見者四寸
肘至腕長
腕至中指本節長四寸
柱骨行膝中
要圍四尺二寸
膝腘至跗屬一尺六寸
跗屬至地長三寸
膝下至外踝一尺六寸

靈樞經骨度尺寸

頭部

項髮以下至脊骨長二寸半椎骨後髮際以下至頭骨三節長一尺二寸

按頭部折法以前髮際至後髮際折爲一尺二寸如髮際不明則取眉心直上後至大杼骨折作一尺八寸此爲直寸橫寸法以眼內角至外角

結喉以下至缺盆中長四寸而此以巨骨上陷中言卽天突處

胸腹部

骨度尺寸

缺盆以下髃骨之中長九寸

胸圍四尺五寸

兩乳之間廣九寸半當折入寸爲當

兩樞長八寸天樞足陽明穴名在

髃骨長六寸半橫骨橫長六寸半毛際下

天樞以下至橫骨橫長六寸半

日橫骨

接此古數以今用上下穴法參較多有未合宜從後胸腹折爲當

兩脾之間廣六寸半此當兩股之中橫骨兩頭之處俗名髀縫

按胸腹折法直寸以中行爲之自鈌盆中央穴起至岐骨際上中庭穴止折作八寸四分自鼽骨上岐骨際下至臍心折作八寸臍心下至毛際曲骨穴折作五寸橫寸法并依此以兩乳相去折作八寸胸腹橫直寸法并依此

背部

脊骨以下至尾骶二十一節長三尺脊骨脊骨也脊骨外小骨而內巨

腰圍四尺二寸

骨度尺寸

按背部折法自大椎至尾骶通折三尺上七節各長一寸四分一厘共九寸八分七厘第十四節與臍相平下七節各一寸六分一厘共一尺一寸二分六厘第廿一節各一寸二分一厘共二尺九寸八分二厘共二尺九寸九分六厘不足四厘者有零未盡也直寸依此橫寸用中指同身寸法脊骨內澗一寸凡云第二行俠脊一寸半三寸論脊者皆除脊一寸外淨以寸半三寸半也故在二行當爲二寸在三行當爲二寸半也

側部

自柱骨下行腋中不見者長四寸柱骨頸項根骨也

腋以下至季脇長一尺二寸季脇小腸也

季脇以下至髀樞長六寸大腿骨也

之下少陽環跳穴處也

髀樞下至膝中長一尺九寸膝骨上廉下至內輔骨上廉長二尺八寸骨際曰廉

橫骨上廉下至內輔之上廉長二尺八寸骨際曰廉

內輔之上廉以下至下廉長三寸半上廉下廉可摸而得

曰內輔外曰外輔

髀樞以下至膝中骨合縫

內輔下廉下至內踝長一尺三寸

內踝以下至地長三寸

四肢部

肩至肘長一尺七寸

肘至腕長一尺二寸半

腕至中指本節長四寸半

本節以下至末長四寸

膝髕以下至外踝長一尺六寸

膝髕以下至跗屬長一尺二寸

臂之節曰肘之腕節

髕以下至外踝長一尺六寸

膝髕以下至跗屬足而也

掌本節後指之後節

者凡兩踝前後脛掌所交之處皆爲踒之屬也

踒屬外踝以下至地長三寸

足長一尺二寸廣四寸半

按骨度乃靈樞經骨度篇大略過小者則不及此亦言數也然骨之大者則太過其則耳若周身手足折量之法用前中指同身寸法爲是同身寸量法詳刺灸書中

應刺穴圖



應刺之法詳於第二十六則內

照洗寃錄屍格圖

仰面致命共十六處

偏左

偏右

顖門

竅左右

額角

兩太陽穴左右

兩耳左右

胸膛

胸脇

兩乳左右

心坎

臍腹

臍肚

腎囊婦人產門女子陰戶

仰面不致命

眉叢左右

兩眼胞左右

兩眼睛左右

兩耳輪左右

兩耳垂左右

眉左右

兩腮頰左右

兩耳左右

鼻上下梁準
牙齒吳吾
肩甲左右
手腕左右
手指甲縫左右
兩腨左右
兩腳跗左右
兩腳跗面左右
兩腨左右
兩脇左右
兩腨左右
兩手心
兩手指
兩曲腁左右
兩胯左右
兩膝左右
兩腳腕左右
十趾
兩耳
一合商致命共六處
腦後
一
八中
上下唇
鼻竅
食氣
兩
桑
兩
十趾
兩
十趾
兩
脊背脊

兩後脇左右　腰眼左右　髮際一合面不致命　項頸　兩臂膊左右　十指甲左右　兩肘左右


兩手腕左右　兩手背左右　兩臂左右　兩曲腨左右　兩後肋左右　兩髀左右　十趾甲縫左右

兩膕心左右　兩腿肚左右　兩踝骨左右　十趾肚左右

修禾有罗

老

圖像穴部


左額角
左太陽
左天庭
左眉
左耳
左耳輪
左耳竅
左耳垂
左眼睛
左眼胞
左鼽準
左鼻竅
左顴顬
左頰
左下脣溝
咽喉
左血盆
左肩甲
左乳
左肋
左脇
小腹
左腋肘
左臂
左掌
左手心
左五指
左五指肚
左五指甲縫
左臁肢
左膝
左腿
左脛
左脚腕
左脚面
左五趾甲
左五趾
右額角
右太陽
右眉
右耳
右耳輪
右耳竅
右耳垂
右眼胞
右眼睛
右顴顬
右頰
右鼻竅
人中
右下脣溝
右肩甲
右血盆
食氣竅
齒舌
右頷頰
胸膛
右乳
右肋
右脇
右腋肘
右臂
右掌
右手心
右五指甲縫
右五指甲
右五指
右臁肢
右膝
右腿
右脛
右脚腕
右脚面
右五趾甲
右五趾
心
坎
肚
腹
臍
男子
腎子
腎囊
莖物
婦人産門
女子陰戶
門

照檢骨格圖

致命 一仰面頂心左右兩太陽穴左右鼻梁骨上下口骨左右頰車骨左右頷子骨即胸前骨係排連看看

致命 不致命 致命 不致命 致命 不致命

一合商

致命左右腦後骨

致命左右乘枕骨

致命兩耳根骨左右

致命兩腮骨左右

致命兩頰骨左右

致命兩顴骨左右

致命兩眉骨左右

致命兩目外眥骨左右

致命兩目內眥骨左右

致命兩目睛骨左右

致命兩目上網骨左右

致命兩目下網骨左右

致命兩目珠骨左右

致命兩目下骨左右

致命兩目外骨左右

致命兩目內骨左右

致命兩目上骨左右

致命兩目中骨左右

致命兩目後骨左右

致命兩目前骨左右

致命兩目

致命不頂顎骨第一節　致命不第四節　致命不脊背骨第一節　致命不第四節　致命不脊背骨第一節　致命不第五節　致命不二節兩旁橫出者髖骨　致命不第二節　致命不第五節　致命不第二節　致命不兩肋骨共二十四條即鈒骨婦人多四條　致命不第三節　致命不第六節　致命不第二節　致命不第七節　致命不第四節　致命不腰眼骨第一節　致命不第五節　致命不第二節　致命不第四節　致命不骨格　致命不第三節　致命不第六節　致命不第一節　致命不第五節　致命不第二節　致命不第四節　致命不第一節

治不致命

一 腰骨後右左


治不致命

尾蛆骨男子九竅婦人六竅

外科必要 卷一 檢骨圖

頂心
顱門
右額角
額顱骨
右太陽骨
右眉稜骨
右耳竅
右眼眶
右顴骨
右頰車
右顋頰
左顋頰
左頰車
左顴骨
左眼眶
左耳竅
左眉稜骨
左太陽骨
鼻梁
左額角
口骨上下
結喉
左肩井臆骨
左血盆骨
左飯匙骨
左橫膈骨
右橫膈骨
右飯匙骨
右血盆骨
右肩井臆骨
頷頰骨
齒骨上下
右胁膊骨
左胁膊骨
龜子骨即胸前三骨
心坎骨
右肘骨
右臂骨
右掌骨
右手踝
右大指本節
右小節餘指多中節俱倣此
腕骨連踝
右外踝
左肘骨
左臂骨
左掌骨
左手踝
左大指本節
左小指餘指多中節俱倣此
右胁前骨
右膝蓋
右脛骨
右腓骨
右足內踝
右足跟骨
右跌骨
右本節小節
右足掌骨
肢骨
左胁前骨
左膝蓋
左脛骨
左腓骨
左足內踝
左足跟骨
左跌骨
左本節小節
左足掌骨大趾小趾俱無中節
肢骨

南翔石頁珍刻


腦後
額角後
左耳根
右耳根
項頸骨毒節
乘枕
乘枕
琵琶骨
琵琶骨亦名髀骨
左臂下俱根前
右臂下俱根前
髖骨
脊骨六節
肋骨節數骨左右共二十四條
脊骨七節
腰間骨五節
右胯後
左胯後
尾蝴骨
左腿骨下俱根前
右腿骨下俱根前
足外踝
足外踝

攀索蠻甑用法圖

攀索蠻甑用法圖

攀

攀索

上蠲

蠲甎


甎者以繩掛於高處用手攀索者以繩掛於高處用手攀索而上也

甎者以磚六塊分左右各蠲置三塊兩足踏於其

用法詳於第十五則內

腰枉圖

腰柱用法圖



腰桎

短桎以患處爲度俱白側面鑽孔以繩聯貫之

凡腰間閃挫結氣者以常法治之若腰節骨被傷錯斜偏僂者用醋調定痛散敷於腰桎


筍脊肉破裂筋


上視患處將桎排列於脊骨兩旁務令端正再用氈

艾做成薄褥覆於桎上以御風寒用寬長布帶繞向

腹前緊緊紮裹內服藥餌調治自愈

木板圖　杉籬圖







木板杉籬用法圖



木板

法先以白布條纏於傷處至二三重後將板附於外再用杉籬裹於外也

上下其用詳於第十六則內


杉籬

之形以杉木爲之酌其根數記其長短濶狹曲直凸凹

杉籬者複逼之器也量患處之

名
後於每根兩頭各鑽一孔以繩聯貫之有似於籬故
爲裹於杉板之外取其堅勁不致斷骨之走動耳

抱膝圖



抱膝用法圖



抱膝

抱膝

於抱膝者用絲弦箍作圈較膝蓋骨稍大些以布條遶
圈上作四足之形箍於膝上用法詳於第二十二則內

頭者人之首也凡物獨出之首皆名曰頭腦者頭骨之髓也俗名腦子顛者頭頂也頭頂之骨曰顛頂骨也小兒初生未閉名囟門已閉者顱前之骨也天靈蓋後合之骨面者凡前曰面凡後曰背居頭之前故曰面也顏者眉目間名也額顱前髮際之下兩眉之上名曰額一曰顙也頭角額兩旁棱處之骨也顴者目胞者一名曰睞目裏即

上下兩目外衛之胞也。目綱者。邊又名曰睫。司目開闔也。目眥者。眼角也。以其大而圓。故又名大眥也。目內眥者。乃近鼻之內眼角也。以其小而尖。故稱曰銳眥也。目珠者。睛入腦之系也。目睛外眥者。乃近鬢前之骨也。上曰眉稜骨。下即上下目胞之兩臉骨。目下之骨也。上曰顴骨。下即顴骨之外。即顴骨者。目窠骨者。目下之眶骨。顴骨內。下連上牙床者。頰骨也。兩孔之界骨。名曰鼻旁間近鼻柱。下至鼻盡之處。名曰準頭。準頭兩旁。即山根也。鼻梁。即山根下至鼻盡之處。名曰鼻之竅也。兩孔之界骨。名曰鼻骨。鼻骨者。目下之眶骨。顴骨內。下連上牙床者。頰骨也。兩孔之界骨。名曰鼻旁間近

生門牙之骨也。顴者。兩旁高起之大骨也。
呼爲腮。口旁頰前肉之空軟處也。耳者。司聽之竅也。
敝者。耳門也。耳郭者。耳輪也。頰。耳前顴側兩旁之
稱也。曲頰者。頰之骨也。曲如環形。受頰車骨也。總載諸齒。能咀食物。故名
者。司言也。頰車者。下牙床骨也。車人中者。鼻柱之下。脣之上。穴名水溝。口
之端也。吻者。口之四周也。頤者。頷下把斂
食之竅也。脣者。口之下脣至頷者。頷之上。兩側肉之空軟處也。齒者。口斷
頻。車人中者。鼻柱之下。脣之上。穴名水溝。口
也。頤者。頷下把斂
後。頤之下也。頷者。頷下結喉

所生之骨也。俗名曰牙。有門牙。牙。虎牙。槽牙。之別。舌者。司味之竅也。舌本者。舌之根也。懸雍垂者。張口視喉之管之上竅。口之上二孔。司分氣之竅也。會厭者。覆喉管之上竅。上下盡根也。頭顙者。額也。頭顙肥人則隱於肉內。多不見也。胸膺者。缺盆下腹之上。有骨之處也。肺之系也。結喉者。喉之前也。喉嚨者。喉之道也。胃之系也。咽者。飲食之路也。居咽喉之後。喉者。通聲息之道路也。居咽者。似皮似膜。發聲音之戶也。咽則開。嚥食則閉。故爲聲音飲食之路也。

鷹骨。在胸前兩旁高處也。一名胸骨。俗名護心骨也。

頭骨。在頭蓋之骨。

胸膛。胸膛骨者。胸之前也。

髑髏。髑髏者。胸之後也。

乳兒者。乳兒者。人以乳兒者。

鳩尾者。鳩尾者。即蔽心骨也。

乳根。乳根者。乳之下。胸肉有起兩肉也。俗名乳頭。

膺骨。膺骨者。鷹上突骨名也。

骨。骨者。在胸骨之下。岐骨之間。膈者。膈俗名羅膈。膈者。膈之下曰腹。腹俗名肚。

膜。膜也。俗名羅膈。膈者。膈之下曰腹。腹俗名肚。

少腹。少腹者。人之初生胞帶之處也。毛際者。毛際之凹也。前相合共結之凹也。前後兩陰之所

小腹。小腹者。小腹下橫骨間叢毛之際也。下橫骨者。橫骨。俗名盆骨。篡者。

橫骨。橫骨者。兩股之前。

闇。闇者。兩股相合共結之凹也。前後兩陰之

傷。傷者。兩陰屏翳穴。會陰者。陰陽氣之所

科。科者。周身名位骨度

也。
中天丸者。男子前陰之兩丸也。上橫骨。在喉前宛
膺上鈌盆之外。俗名髃子骨。小灣橫骨旁。
缺穴之外。俗名髃子骨也。內接橫骨。外接肩
解者。肩端之骨節解處也。髃骨之上棱骨也。
即肩頭。其外曲卷上翅骨。肩後之骨。在背
肉肉。臂肉。
名肱。臑。肱。臂。
鉠板。子骨。臂者。上身兩大支之通稱也。一名
肩胛。俗名髆。髆之末。成片骨也。亦名肩
臑。曰肱。俗

曰臑骨。肘下之骨。曰臂骨。臂附上之骨。
者臂骨。上短細偏外。正骨居下。長大偏內。俱下接腕
上短細偏外。正骨居下。長大偏內。俱下接腕
掌骨接交處。以其宛屈故名也。當外側之
曰高骨。一名銳骨。亦名踝骨。
掌之樂骨。合湊成掌。非塊然一骨也。
掌外側之上。隴起。其形如魚。故謂之魚也。手
所以持物也。手心者。即掌之表也。
指骨者。手指之本也。第一大指。名巨指。在外
節在掌第二名食指。又名大指之次指。三節在外本

節在掌第三中指名將指次指無名指又名小指之次指也三節在外本節在掌其節交接處皆有碎骨筋膜聯絡爪甲者指之甲也足同臑者臂骨之兩叉者白肉也脈者岐骨手足同臑者凡骨之兩叉者皆名岐骨肢窩脈處高起要白肉也脈者肩之下脇之上際俗名肢窩脇肋者脈下至肋骨盡處之統謂統脇肋之單條骨之總又名曰肋者脇之單條骨之總又名曰肋俗名軟肋脇者脇下無肋骨空軟

處也。腦後骨者。俗呼腦枸。枕骨者。腦後骨之下。隴起者是也。其骨或耑或稜或圓不一。完骨者。耳後之稜骨也。名曰完骨。在枕骨下兩旁之稜骨也。頸項者。頸之總名也。又曰頸者。莖之側也。項者。莖之後也。脖項。頸項者。頭之莖骨。肩骨。肩骨上際之骨。俗名天柱骨也。項骨者。頭後莖骨之上。三節圓骨也。背者。後身大椎以下。腰以上之通稱也。脊梁骨。夾脊骨兩旁肉中凹。脊骨者。即脊骨十四椎下。

十五椎間。尻上之骨也。其形中凹。上寬下窄。方

圓二三寸許。兩旁四孔。下接尻骨上際也。
兩旁踝骨上之肉。也。醫者。胂兩
腰骨。下十七椎。八椎。十八椎。二十椎。二十一椎。五
節之骨也。上四節紋之旁。左右各四孔。骨形內凹如
瓦。長四五寸許。上寬下窄。末節更小。如人參蘆形。名
尾閭。一名骶端。一名橛骨。名窮骨。在肛門後。其骨
上外兩旁。形如馬蹄。附着兩踝骨上端。俗名髂骨。肛
者。大腸下口也。下橫骨踝骨。骨楗骨者。下橫骨。在少腹
下。其形如蓋。故名蓋骨也。其骨左右二大孔。上兩分

出向後之骨。張扇下小許。附着於尻骨之上。形如馬蹄之處。名曰踝骨。下兩分出向前之骨。末如楗。在於髀內。名曰楗骨。與尻骨成鼎足之勢。爲坐之主骨。其骨兩面名曰髖。俠髖之曰名曰機。也。婦人俗名大胯又名髀樞。外接股之髀骨也。卽環跳穴處。此一骨有五名也。股者。下身兩大支之通稱也。俗名大腿。小腿中節上下交接處名曰膝。膝上之骨曰膕骨。膝下之骨也。膝下之骨曰脛骨。脛之大骨也。髀骨也。上端如杵。接於髀樞下端如鎚。接於脛骨者。膝上

也。脁骨者。俗名膝蓋骨也。其骨下
又名髕骨。脁骨形粗。膝外突出之骨
細。膝內側之小骨也。伏兎者。髀骨前膝之上
俯兎。故曰伏兎。膝解者。膝之節解也。膹賓骨者。膝上蓋
骨也。連骸者。膝外側二高骨也。膕國者。膝後屈處。俗名
腿凹也。腨者。下腿肚也。一名腓腸。俗名小腿肚。踝骨
者。脁骨之下。足附之上。兩旁突出之高骨。在外爲外
踝。在內爲內踝也。足背也。一名足趺。俗稱腳面。跗骨者。足
骨者。下體所以趨步也。俗名腳。跗

之帛也足心者即踵之中也跟骨者踝後根之骨也趾者足之指也其數五名大趾第二趾名大趾第二趾之次趾第三趾名中趾第四趾名小趾第五趾居外之次趾第五趾居外之次趾第四趾名小趾者名小趾之本節後內側與手指節同其大趾之本節後爲三毛者足大趾爪甲後爲三毛橫紋爲聚毛踵者足下而着於地之謂也俗名腳底板

脈訣

傷科之脈。確鑿蓄血之症。洪大難握。蓄血諸症。脈必現芤。緩小可喜。沉濇而微。速愈者稀。失血之脈。在中牢大。却宜沉濇而微。浮芤緩濇。元氣必虛。失血者宜若數且大。邪勝難醫。蓄血脈微。症相反。峻猛難施。左手三部洪大而實。內傷蓄血。或沉或伏。外感風寒。風痰之惡六脈糢糊。吉凶難摸。左右手疎乍數。傳變莫度。沉滑而緊。痰瘀之作。浮滑且數。有神雖危。不哭和平。

重傷痛極。何妨代脈。可以醫療。不須驚愕。欲知其要。

細心習學。

FRENCH BOOKSTORE
PEIPING (CHINA)
北平法文圖書館

Army
W 8
700
C533r
1818
pt. 2

ARMY MEDICAL LIBRARY
WASHINGTON, D. C., U. S. A.

+55151

傷科補要

目錄

第一則 金鏡論治傷法論
第二則 治傷三十六則目錄
第三則 跌打損傷內治論
第四則 辛險之證不治論
第五則 從高墜下傷
第六則 顯頂骨傷
第七則 囟門骨傷

第八則 鼻樑骨斷附目傷

第九則 唇口玉堂傷

第十則 傷耳

第十一則 咽喉傷

第十二則 腹傷腸出

第十三則 手法論

第十四則 髖子骨附胸脇傷

第十五則 背脊骨傷

第十六則 接骨論治

第十七則 脫下頦附失顎
第十八則 髑骨齗失
第十九則 曲脇秩齗
第二十則 手腕齗
第二十一則 髀齗骨
第二十二則 大腱骨膝蓋骨
第二十三則 骭骨腳踝跗骨
第二十四則 受傷著寒及懷孕而傷
第二十五則 受傷感瘧疫論

第二十六則 損傷出血吐血

第二十七則 胸腹脇肋痛悶

第二十八則 腹痛腰痛

第二十九則 杖傷夾棍傷

第三十則 藥箭傷

第三十一則 諸咬傷

第三十二則 湯火傷

第三十三則 救自縊法

第三十四則 救溺水

第三十五則 運燻灸倒囘法灸癆化瘀法附
第三十六則 應刺諸穴

上海錢秀昌松溪氏編輯
男 丹書杏園
婿何錦華鶴汀仝較

第一則 金鎗論治

夫金瘡者。乃刀斧劍刃之所傷也。故名曰金瘡。金瘡蓋木乃春令。春則萬物始生。故春屬震。乃東方甲木之氣也。金瘡之色。最喜者淡紅。故吉而多凶少。最惡者紫黑。故少吉而多凶。但金屬肺。患金瘡者。則

忌忿嗽嘔噦。宜避風爲妥。夫風屬巽木。肝木旺生之氣也。瘡屬庚金。肺之候也。如瘡口被風邪所客。則火反鬱。而庚金肺之行令。變生諸症。甚則憎寒壯熱。口噤目斜。身體强直。角弓反張。危在旦夕。救之不及者。此也。

瘡屬庚金。肺金。而苞肺成破傷風矣。致瘡口浮腫。潰爛流膿。淺深。脈象之虛實。年歲之老少。稟賦之厚薄。若胃氣益旺。飲食如常。陽氣之元。陽氣旺則陰血易生。尤須戒怒絶慾。怒則逆裂。變生餌肉。慾則瘡口腐爛。易損新肌。所賴

隨經而治轉危爲安矣。凡金瘡初治。輕者當出血之。時用止血熬封固住。傷口。急止其血。如無所犯。後若腫潰。去其前藥。再塗玉紅膏。外蓋陀僧。膿血飛摻如聖金刀散。用止血絮紮。

痛生肌。初服八珍湯。過後面黃瞼黑。不可攻瘀。宜服八珍湯。若傷口腫潰。膿流膿。用甘葱煎洗淨。再摻金鎗鉄

無後患。凡服湯藥。
憎寒壯熱。頭痛等象。視其脈浮無力。則病在陽明。宜桂枝湯。
之。若脈長有力。則病在少陽。宜柴胡湯和解之。
若傳變入裏。則不治矣。或式金瘡變易。各有治法。或居於邊疆。偶爲刀箭
所傷。非得勝之藥。安能治之乎。
虎鈐經曰。人爲兵器所傷出血者必口渴甚。不可妄與熱湯及熱酒。須乾
食肥膩之物。取其解渴而已。斯無妨害。即熱粥亦不宜多飲。多則血沸出不止。其所忌葢有八焉。

怒二忌喜笑三忌高聲四忌勞力五忌汗出
羹粥飲七忌過酒八忌酸鹹此九忌
者亦有不可治者大凡有九曰傷腦曰傷
脉曰傷大小腸曰傷五臟此九者皆死又有
四腦破髓出及咽喉中沸聲兩目直視并痛難治者
處經日出血不止前赤後黑或肌肉腐爛寒凝堅實
其瘡難愈有此四者皆不可療更按其脉之
小和緩者生若浮洪數大急疾者死如失血過多急
宜入參補氣即經所謂陽生陰長之義耳

夫跌打損傷墜墮爲凶。內損肉縫凶血過多。皮開肉綻凶血過多者。宜補而行之。更察其所傷上下輕重淺深之異。經絡氣血多少之殊。先逐其瘀而後和營止痛。自無不效。內經云。形傷則痛。氣傷則腫。又曰先腫而後痛者形傷氣也。先痛而後腫者氣傷形也。凡打撲閃錯。或惱怒氣滯血凝。腫痛或因叫號積。或因重物壓着。或因跌倒。或因車馬所傷。上有憑據。不有悞。若皮不破而瘀血停

血氣損傷或過服剋伐之劑或外敷寒涼之藥致氣血凝結者宜活血順氣之法去損傷雜證不及備載

但分門瞭類詳列於後學者宜盡心焉

八。跌打損傷之證。惡血留內。則不分何經。皆以肝爲主。蓋肝主血也。敗血必歸於肝。其痛多在脇肋小腹。或登高墜下撞打等傷。心腹胸中。停積瘀血。或氣瘀路也。宜疏肝調血行經爲主。王好古曰。輕夜重變症多端。醫者不審其原。不切脉之虛實。不分經絡臟腑。妄投藥劑。枉死者多矣。故臨症時。須察脉之虛實。審症輕重。

藥配君臣佐使。治分老幼強弱。卽從上中下三焦分

別部位若瘀在上而吐血者宜犀角地黃湯在下者抵當湯桃仁承氣湯在下者抵當湯虛人宜佐以四物湯若瘀散而復元通氣散調之或傷處青腫堅實痛難轉側脉濇而滯者防其氣瘀上冲宜投參黃散逐瘀又宜活血湯或受傷日久纏綿醫者敗血堅凝宜服紫金丹逐瘀又祛傷散疏通爲要候其色淡血和痛止爲度或有牙關緊閉用通關散吹入鼻中取嚏投寶臘丸或奪命丹如口開納藥者可治不納藥者危須忌濕地當風坐臥忌食生冷硬物忌服寒温

藥餌恐其血疑難化遺留後患也凡視重傷衣服遍觀傷之重輕穴之致命與否察色聞聲脉探虛實如六脉和緩者生九候不調者死陰囊內有腎子者可治如入小腹者不治如牙關閉急用撬之若能甦醒再投黎洞丸或可挽回醫者須細心審察不可草率誤人

第四則至險之證不治論

九或散吹鼻取嚏可也或氣管損傷氣管損傷氣塞不通醫將二指撚正其管全斷者不治若稍連續者可治

至險之症有氣管全斷者二指撚正其管用通關門骨破髓出者不治若內臟不穿髓不出者可治或天柱骨斷額冷脉絶者死或顱骨破髓出者不治若內膜不穿髓不出者可治或食飽受傷及跌損內臟者不治若過得三日可治或耳後壽台骨破血流不止者難治胸口大痛青色裹心腎子掛出者可治腎子入小腹者不治或腰眼重破腎子掛出者死兩乳重傷痛極呼吸不得者難治

傷寒。傷內腎離位。或笑或哭者立死。
泄糞。傷內腎離位。或笑或哭者立死。孕婦足踢小腹。
收眼開者不治。口如魚口。鼻吹沫纏風者不治。
傷不分陰陽者難治。或跨物失足。騎傷陽物。
孔出血繼則玉莖腫脹。小便點滴不通。堅實者。
先于七日內不治。又有八忌。一忌傷腦髓出。二忌傷
臂中跳脈。三忌傷小腹膀胱。四忌傷海咽喉瘖聲如鋸物。七忌瘧
內臟。六忌傷氣海。五忌傷
處兩目直視。八忌血出不止。先赤後黑。肌肉腐爛。

殲不堪犯此八者難治凡鬪毆時向上打爲順氣平順爲塞氣倒捕打爲逆氣逆則血逆逆塞則氣閉逆則上沖是以傷有平塞爲逆氣入血隨氣轉氣順則血順不辨危在須臾又有五絕之論一治二扳拳其指甲俱黑者可治不還原者不治三若脚趾與手指甲俱黑者亦死四陽物縮入於肺者縱未即死二七難過左脇之證顯撲損傷入

耳多下傷透至內者。腸傷斷者。腹下傷入內者。證候繁
者。傷破陰子者。老人左股壓碎者。血出盡者。肩內
後傷透於內者。胍不實者。已上諸證。不必用藥。

凡人從高墜下傷第五則從高墜下傷其兩太陽及胷前脊下如何從高墜下傷五臟不省人事氣塞不通者看若動則可救急用通關散吹鼻中如有噎活血湯逐瘀生新若遲則不救或有從高倒墜天柱骨折傷頭低不起用端法治之或傷面仰頭不能垂或筋長骨錯或筋整法治之或傷而聚筋強頭垂不起者用推端續整四法治之臨症時

須問其或翻車墜馬或高處墜下或打重跌倒再問
或思食不思食若四肢無傷精神不減或能坐起行
動者輕或昏睡不語或疼痛呼號瘀聚凝結腫硬筋
脹者重投三黃寶臘丸服接骨紫金丹敷萬靈膏熨
定痛散手法詳後

顛頂骨傷

第六則　顛頂骨男子三十字縫女子十字縫。一名天靈蓋。位居至高內函腦髓以統全體。或跌打碰撞等傷。幸然而死。身體強直。口鼻尚有出入之氣。心口溫熱。跳動者可救。惟宜屈膝（盤坐）先將醋調混元膏敷於頂上。再將草紙捲點燃。着令煙氣熏其口鼻。或炭或鐵燒紅淬入醋內。使熱氣薰其口鼻。引五臟血脈之氣逼和。待其口中呻吟有聲。用童便調入麝散。或黎洞丸亦可。俟其氣轉陽回。外用手法按摩心胸兩腋下。

並托其手臂。頻頻揉摩兩手脉穴。
頻頻揉摩則心血來復。命脉流通。
骨紫金丹。外用散瘀和傷湯。洗去前藥。換敷
或大便乾燥。乃是內存瘀血。服加減蘇子桃仁
湯。或耳聾者。用導氣通瘀錠。塞耳中。食宜素粥。切戒煩惱怒忌。
油膩麵食。臥宜淨室。勿令人喧擾。若重傷已死者。用
白布纏頭。以木棍輕輕拍擊足心。再提髮令其頸端
直。舒其筋絡。外敷混元膏。內服紫金丹。如外皮未破。
而骨已碎。內膜已穿。血向內流。聲啞不語。面青唇黑

者不治。昏悶不知覺者不治。或頂骨塌陷驚動腦髓七竅出血。身挺僵厥。縊死。血流不止者可治。用止血繫封固。先止其血。服補氣養血湯宜避風寒戒怒違色候其結痂。膿用甘葱煎洗去封藥摻鐵扇散蓋玉紅膏。服疏風養血湯照法洗換。待其結痂全愈。

顱骨者即嬰兒頂骨未合時軟而跳動之處名顱門第七則顱門骨傷

或跌打損傷骨縫雖縫尚未震動腦髓其頭面浮光眼腫鼻大唇翻舌硬睡臥昏沉肉雖腫而皮未破瘀血內蓄者宜扶起正坐以慈汁調定痛散敷於傷處用粗紙蘸醋貼于藥上燒鉄熨斗烙紙上以傷處覺熱疼口中有聲爲度去藥貼換用和傷湯洗之自然腫消痛止或皮破血出不止用止血紮封固內服和營養衛湯若潰爛流膿用甘怠煎

洗去前藥。摻生肌散。貼玉紅膏。宜避風寒。忌食發物。

火酒若皮破血流。不止。骨陷筋翻。必損腦髓。氣息無聲。則危篤難醫。若破傷風法治之。山角骨也。凌雲骨在前髮際下。頭頂兩旁稜骨也。左右天賢骨者。即兩額角也。睛明骨。即目窠四圍目眶骨也。眉稜骨。其下曰顴骨。即額顱也。左右照前凶骨。即兩傷法治之。可也。然臨症之權衡。用藥之巧妙。神而明之。存乎其人。

鼻樑第八則 鼻樑骨斷附目傷

鼻樑骨下至準頭。傷而出血血可治。外將止血定痛散敷之。內服接骨紫金丹。或傷開孔竅。或鼻破歪落。用整端法。用藥敷貼可也。若骨破口鼻洩血不治。中血堂即鼻內頗下脆骨空處也。若傷之血流不止。神氣昏迷者。宜塞鼻鼻中用冷水調不止。神氣昏迷者。宜塞鼻鼻中用冷水調紫金丹塞於鼻內。服人參紫金丹。如血瘀淋漉頭頂。視其人如氣虛。內服蘇子桃仁湯。若血流不止。飲食不進。氣虛目閉面黃者。八日而死。或睛明骨傷。眼珠掛落者。先將收珠

散。

舊絹織銀針蘸井花水。將藥點眼珠上。及點血筋上。用調理可愈。

溫湯挪上。服還睛湯二三劑。又服明目地黃湯。

唇。敷止血生肌散。蓋玉紅膏。內服用雞子內軟去袋吞。將斷而未落者。合刀誤割其吞。將止痛生肌散。蜜調敷吞上。頻頻添換。使患人仰臥。不動其吞則易愈。又有玉堂。在口上內上腭。薄粥灌喉。不動其頭頸也。若觸刺者。惟膿而空竅。則血流不止。以致鼻目皆腫。滿面青紫。神倦

而已。若傷正中之孔。上通於竅。即名上含。含。其竅即頭額也。若觸刺傷其左右者。惟膿

犯

頭暈痛連腦髓若傷及會厭與上橫骨重則不能言
痛連心膈昏迷沉重者險急用膩粉冰片細研吹於
患處以止其血服接骨紫金丹再用蠣黃血竭煎湯
日漱口二三十次如飲食難進以柿霜玉露霜牛奶
或奶油或粉粥麵粥等物以涼潤將息得法可愈

耳者。第十則 傷耳

司聽之竅也。耳門名曰耳蔽。耳輪名曰郭。

跌打落或上脫下粘。或下脫上連。須撚正。用封藥敷貼。

貼若全脫落。急用綴法。將兩耳相對。用藥貼之。

竹夾子。在上橫縛可全。又有玉梁骨。即耳門骨。其處上即曲頰。下即頰車。兩骨之合鉗也。內通腦髓。亦關靈明。

遥湯薰洗貼。混元膏若傷重。內動腦髓。及傷靈明。昏沉不省。若平素氣血皆虛者。不治。

靈明。即流血。服接骨紫金丹。外用八仙逍

地閣骨即兩車相夾之骨又名頰俗名下巴骨也上載牙齒傷之飲食不進目閉神昏心熱神亂效活絡丹再嚼化人參紫金丹搽固齒散外貼萬靈膏息風寒冷物或牙齒傷動者用蒺藜根燒存性爲末揩之或以固齒散揩之亦佳

第十一則　咽喉傷

咽喉者。乃氣息之路也。或被傷自刎。其症迅速。急則可救。遲則血脫額冷。氣絶不治。乘其氣未絶而身未冷。急用油線縫合。摻止痛散。將止血紮止其血。蓋玉紅膏又將長肉膏。長四五寸。濶二三寸。橫貼連及好肉處。不使封藥脫落。外用布條纏頸高枕仰臥。使項屈不伸。刀口易合。宜處密室避風。使呼吸舒徐。用人參川米生姜。煎湯時時飲之。後有膿水流出。解去前藥。用甘葱湯洗淨。摻生肌散。

揉玉紅膏又外貼長肉膏防護風邪冬天三
治月餘可愈如大便閉結不可妄攻服麻仁丸至急
者用膽導法無損其元按內景圖云喉在前主出咽
在後主納喉系堅空連接肺本爲氣息之路通諸藏乃氣化之要道也咽系柔空下接胃本爲飲食之路水穀歸胃下通諸腑乃轉運之關津也
爲飲食之路水穀歸胃下通諸腑乃轉運之關津也
若傷之豈不至險乎治者須心手相應不差毫髮乃
無悞也而先看其刀彎者其痕深其刀直者其痕淺

傷科補要　卷二

若左手持刀而刎者深。右手持刀而刎者深。兩刃勒者淺。如喉脘破而有出入之氣。封藥吸進必喘咳。先用雞子內軟衣。蓋於破脘之上。再將口封之。則不喘矣。如單脘破者。月餘而瘉。雙脘破者。兩月餘而瘉。照法治之。可也。

如鏃破大小腸。致糞汁與腸出。膜穿者。腸必逐條而散也。則不治。若膜未穿破。雖險可治。又有油膜突出者。亦可治。不可傷其膜。蓋玉紅膏。無其膜宜敷收斂外可傷犯。一人將醋和冷水。不太深。恐傷其肉。其腸自收。用油線縫合。不可令病者知覺。急用布纏腰數轉。須避風

散。搽玉紅膏。外蓋長肉膏。又用

修和。
邪切。
再服戒膩怒高聲。恐有崩裂之患。初服舒腸活血湯。
用溫湯挪上。油線縫合。搽玉子入珍湯。調理月餘可愈。
理之。劑可愈。或陰囊皮破。腎子掛出。
凡皮肉穿破之症。失血過多。營衛已虛。或被風邪襲入經絡。漸傳入裏。寒熱交作。
吐涎。速投萬靈丹。或大神效活絡丹。以玉眞散敷於患處。
得膿撥腫。身溫有汗。爲效。若前症不退。傷口不高。乍傷口反爲底陷。其毒內攻。其危甚

醒乍昏時發時止口噤不開語聲不出終屬死症

第十三則　手法論

夫接骨入骱者所賴其手法也。兩手安置其筋骨仍復於舊位也。其傷有輕重。而手法有所宜。其疼遲速及遺留之殘疾。皆關乎手法之所施也。人身有十二經筋絡羅列。必知其部位。識其機體。而後生於內手隨心轉法從手出。或拽或捋之離而復合。或推之就而復位。或正其斜。或完其闕。或骨有截斷

作才五
碎斷似斜斷。骼有全脫半脫。筋有弛縱卷攣。翻轉離合。
在其四末受傷。痛苦入心。若元氣素壯。敗血易消。刻
方爲手法也。傷有關性命者。如七竅上逼腦。髓高近
心君。愈元氣素弱。一旦被傷。勢必難支。若手法再誤。知其若
期可愈之。自悉其內內。以手捫之。所施不
萬難挽回。尤當愼之。醫者心明手巧。知其病情。善用
手法。治之多效。若草率不較。悞人非淺。雖筆之於書。
乃活法多端。難以盡述。須得口傳心授。臨症多而活
法變。庶無悞耳。

髑子骨附胸脇第十四則

外接肩骨。骨橫臥於兩肩前缺盆之外。兩端肩解。或擊打偏墜傷斷者。用手法先拔整其兩端肩端向內合之。勿使搓動。服接骨紫金丹。外敷定痛散。貼萬靈膏。下至胸骨。骨一名膺骨。俗名胸膛。其兪骨。即髑骨。一名膺骨。又名臆骨。俗名軟兩脇。脇統脇肋之總。名曰肷。岐骨者。即兩烏骨端相接之處。下至肋骨盡處名脇。脇下小肋名季脇。俗名軟肋。即鳩尾骨也。蔽心骨。即鳩尾骨也。其質係脆骨。

在胸下岐骨之間。鳥骨者。即胸下邊肋也。傷者。從前面撞打跌仆者重。從後面來者輕。用手法按摩之。肋骨斷者。用布纏縛救轉。服接骨紫金丹。外用定痛。散瘀之。貼萬靈膏。若內蓄瘀血腫痛。傾僂難仰者。服紫金丹。或大便實者。參黃散下之。若受傷日久。胸骨高起。肌肉削瘦。內有邪熱瘀血。痞氣膨悶。睛藍體倦。痰喘咳嗽者。服紫金丹。若傷重。內干胸中心肺兩臟。嘔吐血水。呃逆戰慄者。危在旦夕。不治。

之氣。昏迷目閉。坎上橫骨。又名人字骨。從下而上。若第一節傷

者。此穴近第二節傷者。則成內癰乎肺。脇諸傷。必吐血咳嗽。之劑以收功。痰火勞怯。左乳傷。發咳嗽。黃實膩丸。右乳傷。發呃逆。凡胸前背後重傷。久可酌用之。再服理肺

背者。自後身大椎骨以下。腰以上之通稱也。一名脊骨傷

骨。名膂骨。俗呼脊樑骨。其形一條居中。上載兩肩。內繫藏府。其兩旁諸骨。

節。骨節端。上盡尻骨之端。

附接橫疊而彎。合於前。則爲胸脇也。腰骨者。卽脊骨之下。

之十四椎。十五椎。十六椎也。尾骶骨。卽尻骨也。其形

上寬下窄。上承腰脊諸骨。兩旁各有四孔。

共末節名曰尾閭。一名骶端。一名撅骨。俗

名尾椿也。或跌打傷者。瘀聚凝結。脊筋隴起。當先柔

令其和軟。內服紫金丹。敷患處。定痛散。燒紅鉄烙熨之。

貼混元膏。若骨縫叠出。俯仰不能疼痛難忍者。兩手攀索。兩足踏鞾上。每足下叠一塊。令病人面向鞾身。又各抽去鞾一塊。令病人自能起。

踏定將後腰拿住。各抽去鞾一塊。令病人面向鞾身。又各抽去鞾一塊。令病人自能起。

硬使患者兩手攀索。兩足踏鞾上。每足下叠三塊。其足一着地。使氣舒瘀散。陷者能起。

去一塊。如是者三。其足一着地。使氣舒瘀散。陷者能起。

曲者可直。再將腰拿住。緊縛之。勿令空得。但宜不可側睡。

踏定將後腰拿住。各抽去鞾一塊。令病人面向鞾身。又各抽去鞾一塊。令病人自能起。

仰臥。不可側睡。脊骨正而患除。服接骨紫金丹如胸陷不直者。亦用此法。或氣門傷則氣塞不通。口噤反張。身強如死。過不得三個時辰。若氣從大便出者立

斃。凡遇此症。不可慌張。候其氣息有無。如無氣者。爲倒揷拳所傷。令患人盤坐。揪其髮伏我膝上。背心。使氣從口出。得甦。服黎洞丸。尾閭若蹲坐。敲擊其必連腰胯。服黎洞丸。再服接骨紫金丹。貼萬應膏。

傷海底穴。血必上冲。當時耳內响聲大震。人必昏暈。先服護心丸。再服紫金丹。

接骨之斷者使已斷之骨合攏一處。和其形勢。徐徐接之。使斷者復歸於舊位。完安者復平。皆賴乎手法也。或皮肉不破者。骨若全斷動則聽聽有聲。斷動則無聲。或有零星敗骨在內動則漸漸之聲。後必潰爛流膿。其骨已無生氣。必脫離肌肉。其色必黑。小如米粒。大若指頭。若不摘去。潰爛經年。急宜去淨。如其骨尚未離肉。不可生

割。恐傷其筋。俟其爛脫。然後去之。治法先用煎湯薰洗。將其斷骨拔直相對。拔摩平正。如舊。先用布條縛緊。又將糕厘木板修圓挪之。又將布條纏縛。再將杉離環抱外邊。取其緊勁挺直。使骨縫無離綻脫走之患。內服接骨紫金丹。兼調理用地黃湯。四五日後。放挪復看。如其走失。仍照前法。二三月間換挪數次。百日可痊。凡人斷臂與斷膊。斷腿與斷髀。挪法相同。治分上下。或筋斷者。難續。蓋筋因柔軟。全斷則縮於肉裏。無形體相得。隨機變化可也。

用巧之處也。若斷而未入筋養血湯可愈。

第十七則　脫下頷附失頸

下頷齒者。即牙車相交之骨也。若脫則飲食言語不便。由腎虛所致。其骸曲如環形。與上頰合鉗最難上也。先用寬筋散煎湯薰洗。次用布條裹醫者二母指入

口餘指抵住下頦捺下推進其骱有响聲。
上也。服補腎壯筋湯。夫人之筋攣熱則筋縱。筋失營養。伸舒不便。感冒風寒。以患失頸。頭不能轉。使患人低坐。用拔摩法頻頻揉摩。一手拔其頭。一手扳其下頦。緩緩伸舒。令其正直。服疏風養血湯可也。

第十八則　髑骨骼失

髑骨者。肩端之骨。即肩胛骨也。其曰含納臑骨上端。其處名肩端之骨。即肩胛骨與臑骨合縫處也。俗名天窗骨。

名肩頭。其下附於脊骨成片如翅者。其骼若坐一人抱住其身。將手扳直。脫手不能舉。使患人低坐。一人抱住其身。將手扳直。法酌其重輕。待其筋舒一手捏其肩。抵住骼內有響聲者。乃復其位矣。用布帶落活其跨下。

抜出骼內有響聲者。乃復其位矣。用布帶落活其跨下。用推拿頭齊力動其骼。

服舒筋活血湯。凡上骼時。骼內必有響聲活動者。其骼未上也。不可悞入。

已上若無響聲活動者。其骼未上也。不可悞入。

肘骨上接者肱膊中節上下支骨交接處也。俗名鵝鼻骨。

上接臑骨。其骸形體長大連肘尖者爲臂骨。其在上而細者爲轉骨。叠並相倚下接於腕骨。其骸若出一手

提住骸頭一手拿其脉窩。先令直扳下。骸內有聲响。

將手曲轉捲着肩頭。肘骨合縫。其骸上矣。服生血補髓湯或紫金丹。

腕骨。第二十則　手

枚。湊以成掌。非塊然一骨也。其側高骨。俗名龍骨。能宛屈上下。故名腕。俗名虎骨。其大小六著地。只能傷腕。若手掌兩手指着地。其骱一必開。兩手揉摩其指。翻貼於臂者。腕縫手扳其指掌。掬轉有聲。活動。其骱復位。仍扳摩其筋。必令調順。然命脉之所。服覧筋散。須防着寒。得免酸疼之患。凡人手指有三節。其骱發出者。俱可扳直捏

修和也。
正。屈伸活動。服和營止痛湯。其法相同。不必逐髃論
第二十一則 髀髑髃骨
髀骨。即髑骨也。又名髑骨。其外向之凹。形似臼。以納髀骨之上端。如杵者也。名曰機。又名樞。即環跳穴處也。俗呼髀骱。若由之則難上。因其膀大肉厚。手
在不住故也。必得力大者三四人。使患側臥。一人抱

住共身一人担膝上拔下一手挈其骸頭迭進一手將大膀曲轉使膝近其腹再令舒直其骸有响聲者已上。再將所翻之筋向前歸之。加味健步虎潛丸。服生血補髓湯再服也愼之。

大腱骨。

接於髀骨。

大腿骨。其下有膝蓋骨。

覆於髀骨之端。本活動物也。內面之筋。上過髀骨至兩脇。下過髀骨至足背。內經曰。膝乃筋之府。若傷之。上連腰屈疼痛。下移脛子重傷。後硬步履斜行。或膝蓋離位。向外側者。則陳等湯治黃病之藥收功。若黃病。服紫金丹。再菌

內筋腫脹。斜錯。按住其膝。一手以復其位。服補筋湯。其骱出者。一手拔住其膀。上下挽住其膝。一手拔直。將膝曲轉。抵着豚骨。兩骨相接。其骱有聲者。上也。服生血補髓湯。若膝蓋骨破圖法。將手擠圓。用絲弦條作箍。布條縛之。生線四根。如抱膝骨。餘服接骨紫金丹。若箍定其骨。膀下縛住。屈臥月餘。骨破足。不可治矣。

脇骨。在脇下至踝骨脇骨之下。足跗之上。兩旁突出者。一手撳住其腳踝骨。一手拔住腳後根拔直。再用手法。按摩其筋結之處。必令端直。再

第二十三則

脇骨腳踝骨跗骨

骨。即膝下踝上下腿骨也。俗名臁膝骨。其形粗。在後名成骨。其形細。俗名勞堂輔骨。其形細。俗名核骨。其

也。在內名內踝。俗名合骨。在外爲外踝。俗名外踝根拔直。

骸。出者。一手撳住腳後跟。一手拔住腳前。令其復位。其骸有聲。轉動如故。再用布帶

縛之。木板夾定。服舒筋活血湯。一二日後。解開視之。

偷有未平。再用

服健步虎潛丸。愈後若遽行勞動。致骸骨之端復出腫大。痠聚凝結。步履無力。頗費調治。必待氣血通暢。始可行動。若脚指同法治之。趾骸失與手指力足趾本節之骨也。

一名足跌。俗稱脚面其骨傷不一。輕者僅傷筋肉易治。重則骨縫參差難治。先以手輕輕挼摩。令其骨合筋舒。洗八仙逍遙湯。貼萬靈膏。內服健步虎潛丸。及補筋丸可也。

一名背也。

共受傷不一。輕者僅傷筋肉易治。重則骨縫參差難治。先以手輕輕挼摩。令其骨合筋舒。洗八仙逍遙湯。貼萬靈膏。內服健步虎潛丸。及補筋丸可也。

凡人得寒祛其丹。遲延日久。則氣滯血凝。筋脉拘緊。手足攣拳。必致不治。急服大劑神效活絡丹。冀其漸漸疏通。或可挽回。若婦人懷孕受傷。不可妄投傷藥。恐損胎元。反爲不美。宜服安胎和氣飲。稍加祛瘀生新之劑。使氣血和而痛自止矣。

第二十四則

受傷着寒及懷孕而傷跌撲鬪毆。內傷其血。復輕生投水。外着寒邪。內得血而入深。未有能生者也。治法先治於寒。血

凡受傷感瘂瘂發不甚重傷。越四五日。腹中絞痛。胸悶噁惡。或肢麻木。或骨節疼痛。脈象或浮或伏。與症不合。指甲紫兩腿灣有青筋。必是瘂穢之毒宜刮宜放。宜先服散瘂之藥。不可服傷藥與姜酒熱湯等物。若犯之則禍不旋踵矣。治法。吹人馬平安散吃蟾酥丸。又服再造紫金丹。俟瘂退後再投祛瘀生新之藥。始無妨碍。

又有傷症兼疫症者。先治其疫。而後治傷。庶可兩痊。

予臨症時。常遇之。故特補出。

放痧穴道歌

放痧有的穴　百會印堂尋　兩太陽當刺
歌　喉旁雙點破　兩乳下針　舌根旁頭放　曲脉左右分　趾頭微出血
曰　十指尖頭刺　兩足取　腿灣刺青筋　忌服姜湯酒　還須治絕根

第二十六則　吐血

傷損之症或患諸竅出血者此肝火熾盛血熱錯經妄行也用加味逍遙散加味四君子湯中氣下陷補中益氣湯元氣內脫用獨參湯加炮薑附子血蘊於內而嘔血者四物湯加柴芩煩勞太過或憤怒氣逆或過服寒毒等藥致傷陽絡則吐血衄血便血傷陰絡則血積血塊肌肉青黑腑臟腑虧損經隧失職急補脾肺二臟自愈或嘔吐黑血者因打撲傷損敗血流入胃脘色如豆汁

從嘔而出。出血過多。脈洪大而虛。重按全無。血虛發熱。用當歸補血湯。或筋惕肉瞤。此亡血也。加薑附。不止者。亡血脫也。用獨參湯。凡血脫之症。脈虛者可療也。實者難治。

傷損之症。胸腹痛悶。怒所致。喜手摸者。肝經血滯也。用四物湯。柴胡山梔。如畏摸者。肝火傷脾。用四君子湯。加柴胡山梔桃仁紅花。若胸脇悶痛。加味逍遙散。若胸腹悶痛。飲食少思。肝脾氣俱傷也。用四君子湯。加味歸脾湯。若脇肋脹痛。大便通和。喘咳吐痰。肝火侮肺也。用小柴胡湯。加青皮山梔。若胸腹脹

痛。散內經云肝藏血。血虛宜清肝養血次壯脾胃。伐虛者益虛。滯者益滯。祸不旋踵矣。

便不通喘咳吐血者乃血瘀停滯。用當歸導滯散。脾統血蓋脾屬木。木勝侮土。脾氣

傷氣四物湯補而行之。腹痛腰痛

損腹痛。大便不通。按之痛甚。瘀血內蓄。用加味承氣湯。既下而痛不止。按之仍痛者。瘀未盡也。用加味四物湯補而和之。下而胸脇反痛。肝血傷也。四君者。胃氣傷也。六君子湯加肉果補胃脂下後寸足俱冷。腎憒汗出者。

參朮下後。惡寒發熱者。氣血傷也。八珍湯下後嘔吐。

物湯加參朮下後。惡寒發熱者。氣血傷也。六君子湯加當歸。

也。四物湯加參朮下後。惡寒發熱。陰血傷也。四君子湯加味承

陽氣虛寒也。用參附湯。

脾腎虛寒甚也。急用大劑參附湯。以圖僥倖。

盛。唇青體冷者。虛極壞症也。

或少腹引陰莖作痛者。乃瘀血不行。肝經火鬱所致。

用小柴胡湯。加大黃黃連山梔。待其痛勢已定。再宜養腰痛脊痛。因瘀血留太陽經所致。服地龍散治之。

若惕認寒症。投以熱藥。重則必危。輕則損目。若

凡服人受杖後腿必蓄瘀紫黑甚則氣瘀攻心而死。速用白蘿蔔搗爛罨之或用大黃末童便調塗之或用眞綠豆粉微炒鷄子清調敷或用葱熨法熨散其瘀亦可。或用鳳仙花連根葉搗爛敷生肌散蓋之或用大黃末童便調塗之乂法用針刺去其毒血腫痛潰爛流膿用甘葱煎洗淨捻用膏內服化瘀散。

若銀針杖後隔四五日

生肌散蓋玉紅膏逐日洗換○服理氣養營之劑調治○

凡浸入人受灰棍之後一出衙門即用熱童便一盆將足浸之如便冷燒熱浸至童便面上起白油面者其傷始出後不潰爛再用肥皂搗如浮泥入鷄子清和勻塗患處紮緊一夜或用何首烏搗骨碎再投接骨紫金丹可無患矣○

毫亦可內服逐瘀定痛散另

有交廣蠻夷。用燋銅作箭鏃甚毒。人若中箭。名爲射工。一時不得。即灌人糞汁。並外敷之。非此不能解毒。甚毒急用煎湯洗去毒氣。敷花藥石散。又蓋玉紅膏。

肉。便悶死。急飲金汁。外亦金汁。

也。又一葛氏方。用藍靛汁一椀飲之。外亦用藍靛汁外敷。

用大豆猪羊血。內服外敷。解毒亦效。又法須防毒氣攻心。急投護心丹。

傷口即將麻油灌之。用黃連管仲

若箭頭入骨。不可拔者。用蜣螂乳香等分。射干少許爲末。敷上。微痒可拔。或蜣螂巴豆敷之。候極痒可以拔出。○人尿洗之。或連管仲湯洗之。敷花蕊石散。貼陀僧膏。又有鐵珠入肉。敷礞鉄散。或割開皮。撲之。○撲則珠入管內而出。○又有鉛彈入肉。以入傷處。其鉛卽化。隨水銀而出。用麻油洗淨。○膏收之功。

凡被人咬傷。或病人咬者。毒氣攻心而死。先脫指節。或尿洗之。如痛極。用蘇油紙燃火焰薰之。或急用人尿入瓶內。手指浸之。時須忍痛。以河水揑淨血水爲主。用生虎骨刮末。之亦可。若潰爛流膿。用木鱉子煎湯洗淨。摻生肌散。初咬之時。須忍痛。以河水揑淨血水爲主。用生虎骨刮末。之亦可。若潰爛流膿。用木鱉子煎湯洗淨。摻生肌散。或刮肉庶瘡易斗。

蓋玉紅膏收功。

瘋犬咬傷。

犬因五臟受毒而成瘋犬。故一生之證也。初被咬時。急就咬處刺出毒血。以口含漿水。吮洗傷處。或以扶法扶之。或以人尿淋洗拭乾。即以核桃半邊之殼。以人糞填滿。罨在患處。上着艾火灸之。殼焦糞乾再易。灸至百壯。以玉真散吐津調敷。次日再灸。漸灸至三五百壯爲度。於初灸時。即服扶危散。逐惡物血片。從小便中出。若毒物血片填塞茎中。致小水澀滯。痛而如淋者。即服琥珀碧玉散以通利之。被咬之人。須心

有紅髮一根。速當拔去。又法用萱。豉研末。香油調敷。

九九如彈子大。常揩抆所咬處。揩開看。鼓九內黃氣已出。易毛方止。

毛茸茸然。此係毒氣。未效。始終禁忌必當慎重。終身忌食狗肉鱟蜞赤豆。

悲不效。始終禁忌飲酒三年內忌食一切毒物及房事。可常食杏仁。以防其毒。若治遲。犬毒入心。煩亂

百日內忌見麻物。

腹脹。口吐白沫者。用虎頭骨爲末。酒調二錢服之。若發狂吼喚人聲。似虎聲。眼神露白者逆。

終始犯禁忌者不救。若有貓咬傷者。用薄荷汁塗

之見效。

煩嘔悶者。用馬齒莧搗爛敷之。如潰爛者。照前法治之。

之熊虎狼牙爪傷人皮肉成瘡者。初宜葛根濃煎服三鍾。外洗十數度。或煮生鐵有味洗之。又用青布急捲爲繩。燃着。納竹筒中。注瘡口薰之。出毒水。次宜用五靈脂末。酒調一二碗。使氣不隨血走。以繩紮傷處兩頭。若昏昏欲睡。少時咬處出黃水。水盡則腫消。以雄黃末摻之。口

內服三鍾。外洗十數度。或煮生鐵有味洗之。

急捲爲繩。燃着。納竹筒中。注瘡口薰之。出毒水。次

獨窠栗子。生嚼爛。塗瘡口。効。

蛇咬傷者。即時飲好

醋一二碗。使氣不隨血走。

困倦。宜用五靈脂末。酒調

服之。少時咬處出黃水。水盡則腫消。以雄黃末摻之。口

合而愈。　蜈蚣咬傷者。即取雄鷄倒掛少時。以手指蘸口內雞涎。抹搽傷處。其痛立止。甚者生雞血。乘熱飲之。立效。　蠍螫傷取大蝸牛一個。搗爛塗之。其痛立止。一時不得蝸牛。即螯處擦去毒水。急用青藥烘熱貼之。亦止。

凡湯火傷人。最忌浸冷水中。恐防火毒攻心。有立斃之禍。亦不宜服冷食寒涼之物。急服護心丹。或服童便護其心。使火毒不內攻。外用無灰酒洗淨。拔其火毒。可用黃連末桐油調敷。或豬毛煆存性研末。加輕粉調敷。或鷄子清調大黃末敷之。或蚌粉摻之。或麻油調敷。或鷄子清調大黃末敷之。或蚌粉摻之。內服玄妙散解毒可也。若花砲火藥烘燎者。治法相同。

凡急救自縊法

自縊者不可割斷其繩一人抱起解結放下置平坦處仰卧一人坐於頭前將兩膁踏其肩上捩住其髮要用力扳緊不可使其頭垂下一人用二指捏正其喉咙脘凡縊則氣不得通耳所以先正其喉咙脘必扁故氣不得通耳一人以手撫摸其胸腹散於兩鼻孔內看可得嗤則生一人將其手足屈伸活動待一個時辰呼吸之氣出入。其人必甦。即磨再造紫金丹。灌其口內。再得一二口再得一二人用蘆管吹其兩耳不可住口。

此法無不活者。即身雖僵冷。亦可救也。

第三十四則 救溺水

凡人溺水者。撈起之時。急撬開其口。橫啣竹筯一隻。使將溺人腹橫覆牛背上。兩邊使人扶住。慢慢牽牛緩緩行動。腹中之水。從口并大便流出。將生姜汁和蘇合

用筆管吹兩耳。又將皂角末置筆管中吹其鼻內。或生半夏末亦可。再用

月日

丸灌之如無牛以有力之人。
背上。微微動搖。
腹覆於鍋底亦可。如冬月。急將濕衣解脫。更
鹽炒熱布包熨臍或將被褥鋪地。用灶內熱
褥上。將溺人覆臥。其肚下墊綿枕一個。再將熱灰渾
身蓋之。再用綿被蓋之。不可使灰迷其眼口。使其出
水。避醒後。宜服姜湯熱酒。按灰性最能拔水。
時尚有微氣。胸前溫煖令速脫濕衣換乾服。
足搶人肩上。將溺人背貼於人背搶走。吐水即活。

外用運燻灸倒四法宿傷可用新傷不可用。

血未歸經。恐其瘀血攻心之患也。運法。凡最輕之傷。

先用瓜皮散。次用麥麩一升。胡葱一把。酒藥和勻。

炒香附一升。同入鍋內炒熱。以袱醋烹之。蓋定。

熱布包。運動患處。冷即換易。待其患處。汗出如油可

也。燻法。凡宿傷在皮裏膜外。雖服行藥。不能除根。服

瓜皮散。次用蒸得打葦。陳小麥艾葉二味。用

鍋滾透。入小口缸內。橫板上。再

將單被蓋身其汗立至不可閃開恐汗卽止病根不清也

灸法或瘧疾鬼擊血在骨節中恐其發毒散用生炭燒紅地上安若氣虛之體不可用此

凡倒法病人不能言不能食無法可治不得已要使惡物吐出之先服硫黃散再調理可愈

射散將患人卧被上每邊兩人牽被倒動使人滾轉反側吐出惡物服藥可用用蠟丸香揚爛先置臍中再灸臍法若膀胱傷小便秘結

將飛鹽蓋臍上。如銅錢厚薄。上用艾火灸二三壯。即內。通去。射可也。化痞癖法。凡人蓄血成痞。或在腹中。服藥難消。用飛麵量痞之大小。圈。圍四圍作圈。使惡物無從逃避。內置朴硝滿。圈恐其乃痞消之驗。落。以腳條縛之。又襯紙二三十重。將熨斗盛火熨之。側邊卸患處有响聲。斯運燻灸倒之法。恐患弱人。凡之太過。必致氣促厥逆之虞。醫者愼不善服藥。不得已而用之。亦不可輕使。若元氣虛

第三十六則　論應刺諸穴

素問經絡刺論曰人有所墮墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之絡厥陰之脈下傷少陰之絡刺足跗上動脈不已刺三毛各一病見血立已左刺右右刺左刺之前血脈出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹腨下三結交者陽明太陰也腨者有所擊墮惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之絡厥陰之脈下傷少陰之絡刺足跗上動脈不已刺三毛各一病見血立已左刺右右刺左刺之前血脈出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹腨下三結交者陽明太陰也腨者有所擊墮惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之絡厥陰之脈下傷少陰之絡刺足跗上動脈不已刺三毛各一病見血立已左刺右右刺左刺之前血脈出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹腨下三結交者陽明太陰也腨者有所擊墮惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之絡厥陰之脈下傷少陰之絡刺足跗上動脈不已刺三毛各一病見血立已左刺右右刺左刺之前血脈出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹腨下三結交者陽明太陰也腨者有所擊墮惡血

靈樞經　卷二　第三十六則　論應刺諸穴

素問經絡刺論曰人有所墮墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之絡厥陰之脈下傷少陰之絡刺足跗上動脈不已刺三毛各一病見血立已左刺右右刺左刺之前血脈出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹腨下三結交者陽明太陰也腨者有所擊墮惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之絡厥陰之脈下傷少陰之絡刺足跗上動脈不已刺三毛各一病見血立已左刺右右刺左刺之前血脈出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹腨下三結交者陽明太陰也腨者有所擊墮惡血

靈樞經　卷二　第三十六則　論應刺諸穴

素問經絡刺論曰人有所墮墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之絡厥陰之脈下傷少陰之絡刺足跗上動脈不已刺三毛各一病見血立已左刺右右刺左刺之前血脈出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹腨下三結交者陽明太陰也腨者有所擊墮惡血

在內。
臟腑病形篇曰。
而不下。積於脇下則傷肝。法當先瀉怒氣。
則肝可以無傷。
留血矣。又曰。有所墜墜。惡血在內。
素問脉要精微論曰。肝堅而長。色不青。當病
墜。若因血在脇下。令人喘逆。
浮微而濇。然當金匱要畧曰。寸口脉
被刀斧所傷。亾血。若汗出設不汗出者。
亾血故也。又論曰。
肝脉搏堅而色不變。

靈樞經邪氣
大怒。氣上
勿積於肝。
則脇下無
以破惡血。

必有擊墮之事。因胸內無破。嘔逆。依經鍼刺然谷足跗。或三毛等穴出血。或飲利藥。使惡血開行。當自愈也。若脈浮微而濇。當知亾血過多。依劑而調之。則病已矣。

ARMY MEDICAL LIBRARY WASHINGTON, D. C.

FRENCH BOOKSTORE
PEIPING (CHINA)
北平法文圖書館

Annex
W 8
700
C535s
1818
pt. 3

ARMY MEDICAL LIBRARY
WASHINGTON, D. C., U. S. A.

455/51

止血玉紅膏
三黃寶蠟丸
八珍湯
金鎗鐵扇散
羌活湯
柴胡湯
如聖金刀散
陀僧膏
黎洞丸
甘葱煎
和營養衛湯
承氣湯
犀角地黃湯

桃仁承氣湯
四物湯
參黃散
紫金丹
通關散
開牙散
萬靈膏
混元膏
散瘀和傷湯

抵當湯
復元通氣散
復元活血湯
祛傷散
奪命丹
紫金丹
接骨丹
定痛散
八厘散
蘇子桃仁湯

導氣通瘀錠
疎風養血湯
止血定痛散
收珠散
明目地黃湯
健脾養胃湯
還晴湯
人參柴金丹
生肌散
補氣養血湯
代痛散
舒腸活血湯
麻仁丸
八仙逍遙湯
止痛生肌散
大神效活絡丹
收膜散
玉眞散

地黃湯
寬筋散
舒筋活血湯
和營止痛湯
補筋湯
桂溫經湯
麻馬平安散
八珍益氣湯
再造紫金丹
四君子湯～

壯筋養血湯
壯筋湯
補髓湯
虎潛丸
健步丸
補筋和氣飲
安胎丸
蠐螬酥油遊散
加味逍遙散
補中益氣湯

百合固金散
加味補血湯　附古
加味歸脾湯
當歸導滯散
聖愈湯
當歸龍薈散
地黃滋腎丸
加味承氣湯
護心定痛散
逐瘀和血湯
花蕊石散
碧玉散
扶危飲
玄妙琥珀散
蘇合丸

硫射散

瓜皮散

勝金丸散

痲黃散

增訂科補要卷之三

上海錢秀昌松溪氏編輯

男丹書杏園

婿何錦華鶴汀仝較

湯頭歌括

止血黑絨絮

止血先將黑絮封
元參茜草寄奴同
五蛤綠礬京墨濃
旱蓮搗汁馬蘭冲
百草霜研入社醋
大黃芩柏烏梅等
煎來收得眞元色
血沸逢之立斷紅

治初傷時血流不止將絮封上其血立止

元參　茜草　寄奴　大黃

黃芩　黃柏　烏梅　五蛤

以上等分煎三次去渣留淨汁再用

旱蓮汁　馬蘭汁　皂礬

百草霜　京墨

同煎滾時入礬墨草霜綿絮收乾二汁與社醋

同煎濃用好綿絮將絮收之

如聖金刀散

聖金刀用二礬　生梔二味煉爲丹

歌

三七

白　松香三共研成末治金瘡出血不止或濕爛流膿搬於患處能止血燥濕

松香七錢　生礬

末磁礶收貯

枯礬各二兩　共研為極細

紅膏

紫草共生甘

麻油加血竭

乳没

玉紅

歸地　象皮

煎收須用白黃占

止血兼收濕水乾

阿膠珠 紫苡苡 仁兩 仝歸 三兩
乳香三兩 沒藥二兩 甘草 錢
右藥用麻油 斛半煎枯去渣再入
黃占 兩 白占三兩
以上共煎至滴水不化成膏聽用
血竭 錢
象皮三兩 生地 兩
合歡皮三兩

陀僧膏 歌
流注癆瘵瘤趺蹼傷 陀僧歸乳沒 苦參銀 黝赤脂艮
桐香油共兒茶竭 百草霜 矽錦大黃

此膏專貼諸般惡瘡流注瘰癧跌蹉損破金刃惡等證用之

傷科補要 卷二 三

傷陀僧三兩研末 赤石脂三兩研末 乳香 沒藥各三錢去油研 百草霜三兩筋研 孩兒茶三錢研 南赤芍三兩 全當歸三兩 苦參 黃 銀 血竭各三錢研 桐油一斤 香油一斤 大黃半斤 川 烏一兩

右藥先將赤芍當歸苦參大黃入油內煤枯熬至滴水不散再下陀僧末用槐柳枝攪至滴水將欲成珠將百草霜細細篩入攪均再將羣藥及銀黝

滴水將欲成珠將百草霜細細篩入攪均再將羣藥及銀黝

孩兒茶研末 百草霜筋研末 沒藥去油研末 南赤芍三兩 全當歸三兩 苦參 黃 銀 血竭各三錢研 桐油一斤 香油一斤 大黃半斤 川 烏一兩

右藥先將赤芍當歸苦參大黃入油內煤枯熬至滴水不散再下陀僧末用槐柳枝攪至滴水將欲成珠將百草霜細細篩入攪均再將羣藥及銀黝

飾入攪極勻傾入水盆內衆手扯千餘下再收入
磁盆內常以水浸之

三黃寶蠟丸

歌曰

三黃寶蠟古來傳　天竺籐雄劉寄全
歸尾兒茶麒麟竭　水銀水粉共爲研
硃砂琥珀同元朮　乳戟調和化蠟丸

跌打諸傷皆可服

跌打損傷及破傷風並傷力成痨女人產後惡露不盡致生怪證痰血奔心瘀迷心竅危

力傷成怯亦能痊

在旦夕重者一錢輕者三分用無灰酒送下立刻
全生如被鳥銃打傷鉛子在內危在傾刻一時汗出卽愈
吃酒數杯睡一時汗出卽愈如敷將香油熱化少許鷄翎掃患處服藥後忌凉水生冷燒酒無功
許鷄翎掃患處服藥後忌凉水生冷燒酒無功
忌此酒則藥無功
天竺黃三兩 雄黃二兩 篠竹黃 四兩隔湯燉數次去沫
劉寄奴 騏驎竭各三兩 歸尾一兩五錢 硃砂 紅花芽大戟三兩、去骨
兒茶 乳香去油 廣香各三錢 琥珀 輕粉
水銀同輕粉研不見星

黎洞丸

內備用

滾湯生定將藥投入不住手攪勻取出收藏磁罐

以上各稱足分兩各研爲末如無眞天竺黃以眞膽星三兩代之再用好黃蠟二十四兩鍊淨

雄黃天竺黃籐

阿魏還同乳沒稱

黎洞丸中牛膝血竭參三七大黃

治跌打損傷瘀血奔心昏暈不省及一切無名腫毒昏困欲死等證

京牛黃　冰片　麝香　各二錢五分　阿魏
雄黃　各一兩
天竺黃　大黃
篠黃　兒血竭　乳香　三七
以上十三味共爲細末將篠黃化開爲丸如芡實大若乾稍加白蜜外用蠟皮封固內服用無灰酒送下外敷用茶滷磨稠粘塗之忌一切生發物

歌　八珍四物四君勻地芎芎歸治血眞

曰　參朮苓甘能補氣調和營衛有奇勳

治失血過多之後氣血兩虛服此以調營衛

生地　當歸

入參　白芍

朮　茯苓

甘草

以上俱以河水煎服分兩隨症輕重

甘葱煎

歌　甘葱二味煮成湯洗諸般膿水瘡

曰　換貼膏時先淨洗庶無穢氣藥相當

治諸瘡有膿水者洗淨用藥

甘草　大黃　胡葱

以上二味煎濃湯候温可洗患處

金鎗歌　金鎗鐵扇散

金鎗鐵扇散　松栢降材香

乳沒　明礬　象皮　和末鑲

治破傷流血及潰爛收濕拔毒生肌

乳沒香二兩　松栢香二兩

明礬二兩　象皮二兩

老材香二兩即苦楮材煎之陳久愈也黃

和

營養衛湯

歌

和營養衛用參芪

曰

荃朮陳

甘加薑棗

此方氣血並補調理之劑

人參

黃芪

白朮

防風

當歸

陳皮

甘草

雲苓

白芍

桂枝

加姜棗煎服

右藥共爲極細末磁瓶收貯

每服斯宜

血虛之症及桂枝

羌活湯

歌曰羌活防風湯　細辛愉白芍

治太陽經等症破傷風邪在表服之康

羌活　防風　細辛

甘芍蕖本當

白芍　川芎　當歸

地榆

甘草

加生薑黑棗煎服

承氣湯

柴胡湯

歌曰 柴胡湯解表 半夏黃芩共 甘草與人參 柴胡湯治少陽半表半裏之症

歌曰 承氣朴芒硝 枳實大黃邀 治陽明症燥實便閉不通 急下獨功超

大黃枳實湯

用水煎服 枳實 芒硝 厚朴 大黃

柴胡　八分　參

甘草

加姜棗煎服古方用人參如力艱者可以黨參

代之

犀角地黃湯

犀角地黃芍藥丹皮

斑黃陽毒皆堪治

或益柴芩總伐肝

白芍

犀角

治上焦蓄血胃火上沖而吐及斑黃陽毒等症

生地

湯歌

桃仁承氣五般奇　河水煎服

歌　桃仁承氣　甘草硝黃併桂枝

曰　熱結膀胱小腹脹　如狂畜血最相宜

治中焦蓄血小腹滿如狂等症

桃仁去皮尖研　大黃芒硝　甘草　桂枝

抵當湯　以上河水煎服

歌曰抵當水蛭及蠐螬
蓄瘀逢之頃刻化
治下焦蓄瘀不解服此能散瘀若體弱莫輕攻
宜四物加味可也
水蛭　蠐螬
桃仁　大黃
用河水煎服如不下再服二煎

四物湯
歌曰四物地芎與歸芍
血家百病此方通
八珍合入四君子
氣血雙療功獨崇

養生地當歸白芍川芎血通用之劑

復元活血湯治墮傷瘀血流注氣木茴香

歌曰復元通氣木茴香山甲青陳貝母良

白芷漏蘆甘草共瘀消氣暢不爲殃

治氣滯不舒瘀結作痛木茴香茴香川山甲青皮甘草

陳皮白芷貝母漏蘆

水調服

參黃散

參歸湯

治體實重傷逐瘀下降疏通之要藥

大黃四兩　厚朴二兩　枳實一兩

桃仁三兩　歸尾三兩　赤芍一兩五錢

穿山甲五錢　鬱金二兩　胡索二兩

三七大黃君

赤芍紅花山甲片

柴胡引用爲佐使

實體初傷用酒製

朴實桃仁歸尾臣

鬱金胡索桂甘青

桃仁 柴胡 紅花 大黃 甘草

用陳酒煎服

復 歌曰 桃核承氣治損傷積血能祛瘀生新

柴胡 花粉 當歸 山甲 俱

治損傷瘀血湯 柴胡 桃核 紅花 大黃草

花粉 當歸 山甲 俱

復元活血湯 柴胡 甘草 青皮二兩

共爲細末酒調送下

損傷瘀血酒煎祛

紫金丹

歌曰

消腫療疥止痛能去骨節經絡之宿傷

沒藥一兩　血竭五錢　降香一兩　松節一兩　蘇木一兩　乳香一兩　龍骨五錢　土狗一兩　即螻蛄　自然銅二兩　川烏一兩

右爲極細末糯米粥湯搗和爲丸硃砂爲衣

祛傷散

共爲極細末糯米粥湯搗和爲丸硃砂爲衣

歌祛傷散輔配均加
曰羌獨芎牛堪作使
二烏製入兼甘草
經絡之傷酒服佳

能通經活絡散寒去瘀疏散之藥

川斷二兩五錢　羌活二兩
全歸二兩　獨活二兩
川芎五錢　牛膝二兩
細辛四錢　肉桂三錢
草烏五錢　紅花五錢
甘草五錢

共爲細末熟酒冲服

通關散

歌曰

通關散皂末
冰射蟾酥及
吹鼻得嚏通經之要藥

五錢

白芷細辛三錢

細末

吹鼻得嚏病痊

研

奪命丹

奪命丹中地鱉虫

歌曰

奪命丹中地鱉虫
射香二分
蟾酥五分
白芷細辛三錢
冰片三分
共爲極細末收入磁瓶內
每用
兒茶乳没自然銅

曰紅花歸尾桃仁竭
治一切重傷險症臟腑蓄血瘀危急之候服此能通
開竅歸尾三兩桃仁二兩
兒茶五錢乳香一兩
紅花五錢大黃二兩
射香五分
共爲細末用黃明膠熟化爲丸硃砂爲衣每用
一丸陳酒磨冲服

碎補將軍硃射紅
地鱉虫一兩五錢
自然銅二兩
骨碎補一兩

開牙散

歌曰　開牙用烏梅
冰射同研末
治牙關緊閉藥不得入
烏梅肉　冰片

右藥將烏梅嚼爛冰射細研合塗牙上卽開
香

接骨紫金丹

歌曰　接骨然銅地鱉虫
地龍龍骨射香同
滑石調和乳没功

治一切骨碎損斷服之能續

地龍一兩　龍骨三兩　射香券

川烏一兩 炮去皮臍 滑石四兩 水飛酯炒 地鱉虫三兩

乳香一兩五錢 沒藥一兩五錢 鹿角霜三兩

赤石脂三兩 醋炒

右爲極細末用鹿角膠烊化搗和爲丸如彈子大硃砂爲衣陳酒化下

萬靈膏

歌曰

萬靈膏共蛇床煎

透骨鶴筋二草仙

然銅乳沒牛兩錢

赤芍紅花芎歸竭

丁香根　與茅山术
革薢鹿茸　虎脛射
治跌打損傷消痰散毒舒筋活血止痛接骨如神
兼去麻木風痰寒濕疼痛等證

鶴筋草　透骨草
丁香根　血竭
赤芍二兩　紅花二兩
五茄皮　石菖蒲
秦艽　蛇床子
肉桂　木香
蒼术各錢　醋淬　川牛膝

當歸　酒洗　自然銅　醋淬七次
半兩錢一枚
沒藥各一兩
川芎八錢

川附子 製 半兩
虎脛骨 一對 炙香 二錢
右除血竭沒藥射香三味各研細末另包外共
二十三味先將香油十觔微火煨浸三日然後
將羣藥入油內熬黑爲度去渣加黃丹五觔再
熬將至滴水成珠離火俟少時藥溫將血竭沒
藥射香下入攪勻取起出火氣

定痛散

定痛散 二烏并乳没 薤葉 各三錢

曰
以敷傷處即能止痛但皮肉破者不用
川烏蠶
草烏蠶
乳香一兩
白龍一兩

蟾酥去川椒
酯揚敷如失

混元膏
蟾酥燒酒煉化少許
共爲末醋調敷患處

曰
治打撲損傷骨碎筋翻瘀血凝聚消青紫腫痛
梔子大黃升雄射

歌
混元膏用羔羊血
沒藥遍蘆白芨甘
紅花白龍一兩
沒藥遍蘆白芨甘

八

厘散

歌

曰

治跌打損傷接骨散瘀

蘇木麵一錢

沒藥三錢

半兩錢一錢

羚羊血蠡

大黃二錢

生梔子二錢

共爲細末用酒醋熬成膏敷於頂上

白斂三錢

乳香三錢

漏蘆三錢

升麻三錢

白及蠡

甘草二錢

紅花三錢

入厘然銅半兩錢

乳香沒藥同蘇木

紅花木

血竭調和酒服痊

散瘀和傷湯　治一切碰撞損傷瘀血積聚

自然銅　紅花　丁香　番木鱉一錢油煤炒　共爲細末黃酒温服或童便調亦可

散瘀和傷水醋煎　治一切碰撞損傷瘀血積聚

紅花　木鱉　共生甘草各三錢　原油煤炒　生慈鬚二兩　生甘草各五錢　骨碎補

加減滅蘇子桃仁湯

歌

蘇子　麥冬　歸芍　加減陳皮仁

麥冬

治瘀血內聚心經瘀熱大腸干燥者

蘇子三錢　蘇木一錢　紅花一錢　桃仁炒

當歸各二錢　酒洗

橘紅各三錢

赤芍

竹茹

水五碗煎滾入醋二兩再煎十數滾薰洗患處

一日數次

蘇子湯

紅花　加減陳皮水煮嘗

導氣通瘀錠　水二鍾煎一鍾渣二鍾煎八分溫服

歌曰

通氣導瘀錠　通氣導瘀錠射慈涎蜜

元竒方

治耳聾也可療

巴豆共盤蝥用不去油巴豆一箇盤蝥三箇射香少許以慈涎蜂蜜和捻如雷勿得驚懼待二十一日耳中有膿水流出方可去錠

補氣養血湯

歌曰　補氣養血湯　四君四物裏
氣血自然康

治氣血兼補之劑

人參　白朮　甘草　白茯　川芎

生地　當歸　白芍　黃芪

黃芪　肉桂

蹉風養血湯　以河水煎服

歌曰蜈風羌養血湯

荊芥治破傷失血後調養之劑

治芎藭秦艽薄

荊芥共羌活防風

曰白芷川芎

芎藭秦艽

川芎當歸

紅花花粉當歸

花粉紅花當歸

紅花用河水煎服

生肌散

生肌歌珠粉珀

龍骨象皮冰

曰 治痘穿潰損爛生肌收斂 輕粉 兒茶竭

眞珠 琥珀 黃連共成

龍骨 象皮

輕粉 兒茶

血竭 共研細末磁瓶收用

歌 定痛散 止血定痛用當歸 乳沒桃仁 續斷隨

曰 烏藥荆防同白芍 木通甘草 共陳皮

治失血傷煸難忍者用之

當歸二兩　乳香二兩　沒藥二兩

川斷二兩　烏藥八錢　荊芥五錢

白芍二兩五錢　木通五錢　甘草五錢

右藥共爲細末酒調服

人參紫金丹

歌曰

人參紫金血竭丁　沒藥同沒藥

碎補加皮五味全　荊芥防風歸芩甘

氣虛血脫服之痊　仁兩

此丹提補元氣健壯脾胃止渴生津增長精神和

通筋血散跌仆閃撞而氣虛者最宜服之

八珍參三錢 丁香二兩 五加皮三兩 甘草八錢

茯苓二錢 當歸二兩 骨碎補二兩 血竭二兩

五味子二兩 沒藥二兩 酒漫去油

共爲細末煉蜜爲丸每服三錢早晚沒黃酒化服或童便化服亦可

收珠散

收珠散血竭 冰片乳香方

沒藥同爲助 星眸復舊光

治眼珠落出者點之

血竭二錢　冰片三分　乳香　四錢　去油　沒藥　四錢　去油

右藥共爲極細末磁瓶收貯

還睛湯

歌曰　還睛湯固本　枸杞蒺藜入　白茯苓人參　二冬二地存

治目傷睛暗者可以還光

人參　天冬　麥冬　雲苓　枸杞　生地　肉蒺藜　熟地黃

明目地黃湯

右方用河水煎服

歌曰明目地黃湯澤瀉山萸枸杞兼甘菊茯苓山藥丹皮石決當歸白蒺藜

生地　澤瀉　茯苓

萸肉　枸杞　甘菊

山藥　丹皮　當歸

調理傷目之劑極效

右藥用河水煎服

石決明　白蒺藜　丹皮

健脾養胃湯

歌曰健脾養胃术參茂苓兼澤瀉山藥茯苓白术陳皮歸芍調理脾胃之劑中宮健運邪無虞

八珍湯

白术茯苓人參白芍陳皮黃芪歸身川芎小茴山藥

雲苓澤瀉

止痛生肌散

右方用河水煎服

八

仙逍遙湯

曰

歌

入仙逍遙湯

苦參芎椒合

荆防黃栢當

甘草牡丹蒼

歌

止痛生肌散象皮

兒茶乳沒石膏煨

曰

黃丹三七均爲末

刀斧諸傷搽效奇

能長肉生肌收口

象皮二兩

兒茶三錢

石膏二兩

黃丹三錢

芸爲細末摻傷口上

三七五錢

乳香五錢

沒藥五錢

崩洗跌仆損傷腫硬疼痛及一切冷振風濕筋骨
血肉肢體疲痛諸證

防風　荊芥　川芎
當歸　黃柏　茅朮
川牛膝　各二錢　蒼朮　牡丹皮
椒各二錢　苦參五錢

大神效活絡丹　治瘋癱

歌曰　神效活絡治瘋癱
共入白布袋內紮口水煎沸滾薰洗患處

曰　烏白二蛇全蝎灸
四十八味煉成丹
姜蚕龜板地龍乾

硃砂乳沒眞天竺
血竭松香碎補遠
白薇芎歸苓术葛
羌防麻桂細辛闢
天麻烏藥青皮藿
黑附丁香虎脛端
何首元參連白芷
黃芪熟地大黃須
威靈草蔻牛黃射
犀角沉香赤芍安
冰片生甘和鼠糞
拘攣諸痺盡可餐

此丹宣暢氣血通利經絡並風濕諸痺口眼喎斜
半身不遂行步艱難筋骨拘攣手足疼痛等證
白花蛇 酒浸焙 烏梢蛇 酒浸焙
麻黃去節 防風

各等分甘草
官桂
草豆蔻
元參
天麻
霍香
白芷
川連
黃芩
遼細辛
赤芍藥
硃殭蠶
薰勞炒
天竺黃
乳香
油
丁香
黑附子
白蔻仁
炒
骨砕補
當歸
酒浸
沉香
各一兩
威靈仙
各三兩五錢酒浸
犀角
全蠍
去毒
葛根
於白朮
去炒

麻仁丸

治血燥便閉潤腸養血之劑

麻仁 芍藥各錢 枳實 大黃各五錢 厚朴 杏仁各三錢 蜜丸 白水送下

歌曰

桃核承氣麻仁芍 歸尾大黃並枳朴 蜜丸白水常嘗

歸尾 大黃 麻仁 羌活 瓜兒血竭各錢 藥香五錢 地龍五錢七分 淨松香五錢

兩頭尖 川芎各二兩 京牛黃 片腦各錢半

共爲細末煉蜜爲丸金箔爲衣每丸重一錢以

蠟皮封裹溫酒化送隨上下食前後服

桃仁
收膜散
歌
曰
烏梅一兩
核
蛣五錢
若遇油膜來突出
綠礬三錢
醋調敷上立收
右以總藥爲末煉蜜爲丸白湯送下
收膜散
五蛣綠礬佐使隨
醋調敷上立收囘

舒腸活血湯
芎
歌
舒腸活血索歸芎
桃核將軍大腹青

曰 續斷 紅花 并枳壳 木通利水卽安寧

治 腹傷腸出節 等症

川芎 歸身 桃仁 大腹皮

青皮 紅花 續斷 延胡索

枳殼 木通 大黃

水煎温服

萬靈丹

歌 萬靈芎朮蝎歸芎 石斛天麻荆芥雄

曰 羌細辛麻黃甘草芎 二烏何首及防風

治破傷風重症發汗通經解一切毒

芽朮米泔炒 八兩　全蝎 石斛

川芎 羌活 防風 荆芥

細辛 川烏 湯泡去皮 姜汁煮 草烏 製熟

雄黃六錢 研 當歸 麻黃

右爲細末煉蜜爲丸每 服藥一兩分作四 丸一兩

作六丸一兩作九丸三等做下以備年 歲老壯

病勢緩急取用預以硃砂六錢研細水 飛爲衣

磁瓶收貯

玉眞散

歌曰 玉眞散風用芷星風
熱酒一鍾敷服後
破傷風症奏神功
羌附天麻好和同

代痛散

歌曰 代痛蟾酥
乳香沒藥多
治破傷風瘡口潰瀾諸證
南星 防風
羌活 白芷
右爲末每服二錢熱酒
調一鍾敷患處

曰烏同何肖

敷傷處便覺痲木其痛可止

生川烏五錢

何首烏一兩

乳香一兩

蟾酥三錢
炎酒煉化

共爲末用燒酒調敷或薑汁亦可

敷洗痛如無

草烏五錢
生用

地黃湯

歌地黃濟

曰淮藥共丹皮

治陰虛怯弱肝腎不足之證

地黃湯六味

熟地山萸濟

瀉茯苓利

熟地黃　山萸肉　淮山藥
白茯苓　牡丹皮　建澤瀉
以河水煎服

壯筋養血湯
歌曰　壯筋養血芍歸芎
紅花生地同
白芍當歸　川斷
治傷筋絡調理之劑
牛膝丹皮杜仲炒
續斷紅花生地
筋舒血活自然鬆

洞水煎服

杜仲 寬筋散 羌活 防風 芍藥 和甘草 續斷 桂枝 當歸 川芎 白芍 熟地 人參 黃芪 甘草 白朮 茯苓 陳皮 半夏 生薑 大棗 水煎服

寬筋散羌防芍藥和甘草續斷桂枝當歸川芎白芍熟地人參黃芪甘草白朮茯苓陳皮半夏生薑大棗水煎服

歌曰

寬筋散止痛 羌活二兩 防風二兩 芍藥二兩五錢 當歸二兩五錢 川芎二兩 白芍二兩 熟地二兩 人參一兩 黃芪一兩 甘草一兩 白朮一兩 茯苓一兩 陳皮一兩 半夏一兩 生薑三片 大棗四枚 共爲末陳酒調下

補腎壯筋湯歌

杜仲續斷桂枝當 筋舒痛自良

舒筋活血湯

歌曰 茄皮茯苓續斷 杜仲芍青方 黃牛熟地當 獨活當歸續斷青

補腎壯筋湯

治腎經虛損常失下頦 熟地 當歸 牛膝 山茱萸 杜仲 白芍

雲苓 川斷

青皮 五加皮

用河水煎服

歌

曰治羌活當歸續斷防風荊芥獨活牛膝茄皮杜仲青皮杜仲牛膝枳殼紅花紅花枳殼又通經

曰失骸後調理之劑

生血補髓湯

用河水煎服

歌曰

生血補髓湯芍地芎蕓當杜仲茄牛膝

和營止痛湯

治上骸後補虛之劑

當歸 用河水煎服 續斷 生地 杜仲 茄皮 芍藥 川芎 牛膝 黃芪 紅花

蘇木桃仁續斷同

歌曰 烏藥陳皮共乳沒 木通甘草輔成功 活血通經止痛去瘀生新之劑

赤芍　歸尾
陳皮　乳香
烏藥　沒藥
右藥以河水煎服
桃仁　續斷
木通　甘草
川芎　蘇木
健步虎潛丸
歌曰
健步虎潛丸　首烏虎脛堅
鎖陽參术地　薑附威靈仙
龜鹿膠黃蘗　羌牛杜仲全
當歸同白芍　煉蜜共爲丸

崙治跌打損傷血虛氣弱下部腰胯膝腿疼痛痠
軟無力步履艱難服此藥至一百日舒筋止痛活
血補氣健旺精神

龜膠 蛤粉炒成珠　鹿角膠 製高上　虎脛骨 酥油炙　何首烏 黑豆拌蒸晒各九次

川牛膝 酒洗晒乾　杜仲 姜汁炒斷絲　銷陽 酒洗晒乾　威靈仙 酒洗

當歸 酒洗晒乾　黃蘗 酒洗晒乾鹽水拌少許酒炒　人參 壽

大川附子 一兩五錢　白芍 微炒　雲白木 各一兩 炒

童便鹽水各一椀生薑二兩切片同煮日令極熟水乾再添鹽水煮畢取出入川黃連五錢甘

右藥共爲細末煉蜜和丸如桐子大每服二錢空心淡鹽湯送下

補筋湯

草五錢同煮長珀色明亮可用

冬日淡黃酒送下

歌曰

補筋歸地芍

乳沒白芷雲苓

紅花酒煮吞

碎補丁陳入

白芷藥各二兩

紅花

陳皮二兩

治跌撲傷筋血脉壅滯宣腫青紫疼痛等證

當歸二兩 熟地黃

乳香 白茯苓

骨碎補各一兩

湯歌

補筋丸

歌曰

治筋翻筋攣筋脹筋粗筋聚骨錯血衄血崩漏帶濕宣腫

青紫疼痛等證

没藥三錢　丁香五錢

右方用水酒煎服

山藥牡丹皮

蛇床絲子肥

參茯木瓜歸

筋傷可挽回

補筋丸熟地

蓮蕊蕊蓉膝

茄皮沉丁木

煉蜜爲丸服

好沉香　丁香　川牛膝
白蓮蕊蕊　肉從蓉　兎絲子
熟地黃　牡丹皮　宣木瓜　各二兩
八參　廣木香　各一錢　五茄皮　枳殼
共爲未煉蜜爲丸如彈子大每服三錢用無灰酒送下

麻桂溫經湯
歌
麻桂溫經湯治寒
紅花白芷細辛滄
桃仁赤芍薑葱八
湯歌

安

治傷後着寒通經活絡去瘀

麻黃　桂枝

細辛　桃仁

赤芍　紅花

用河水煎服

白芷　甘草

安胎和氣飲

歌　安胎和氣飲

曰　歸芍地黃湯

治孕婦受傷　白术條芩入

當歸　白芍　砂仁炙爲末冲

生地　川芎

條芩　白朮　人馬平安散　用河水煎服

歌曰　人馬平安散治痧砂仁

治一切痧暑穢惡之氣着人觸鼻即安　火硝金箔梅花片　西黃元廳共硼砂

西黃一錢五分　廳香一錢五分　飛淨硃砂一錢　描鼻痊

梅花冰片二錢　金箔百張　硼砂二錢

共研爲細末　硃砂二兩

湯散

蟾酥丸

歌曰蟾酥烊化共爲丸
雄大二黃宜配合
茅朮硃砂丁射廿
二麻重用治瘧痙
治一切瘧癘等惡氣中人臟腑服之卽愈

射香三錢　丁香六錢　大黃斎
茅朮三兩　麻黃三兩六錢　天麻三兩六錢
蟾酥丸錢　甘草三兩四錢　雄黃三兩六錢
硃砂三兩六錢

右藥共研細末將燒酒化烊蟾酥爲丸硃砂爲衣

再加糯米糊和爲丸如不敷

再造紫金丹

歌曰　再造大戟雄黃配　金丹元射冰蛤共千金　西黃文蛤外着硃砂血染新　治一切穢惡瘧暑之毒山嵐瘴氣閉塞臟腑經絡　昏迷不醒嘔吐等症

元麝一兩乳鉢　冰片一兩乳鉢　西黃七分半　文蛤七兩乳鉢　硃砂七錢五分　雄黃五兩　千金霜五兩　茅菇七兩

右藥共研極細末飯搗和爲丸硃砂爲衣

加味逍遙散

歌曰加味逍遙遙歸芍荷
丹皮河水山梔服
肝火平時血自和

柴胡白朮茯苓扶
治肝經火鬱胸脇悶痛曰晡發熱
柴胡當歸
白芍薄荷
茯苓山梔
白朮丹皮

四君湯參朮

歌曰四君湯用治中焦
右藥共爲末白滾湯送下
四君湯參朮茯苓甘草煎

補
曰　氣弱人宜服
此治氣虛怯弱扶元固衛
白朮　人參
右藥以河水煎服
補中益氣湯
歌　補中益氣芪朮陳
曰　虛勞內傷功獨擅
木香蒼朮易歸朮
治虛勞內傷中氣下陷
調中益氣暢脾神
陽生陰長全
甘草
升柴參草當歸身
亦治虛陽外感因
調中益氣暢脾神

百合散

以河水煎服

柴胡　升麻

黃芪　人參　當歸

犀角　丹皮

白朮

甘草

百合歌曰芩棁側栢生軍芥芎歸赤芍地黃便調和立可痊

形體實者宜之

治打撲傷損敗血流入胃脘色如茳汁從嘔而出

犀角　鬱金　丹皮　黃連

當歸　川芎　赤芍　生地

百合　側栢葉　荊芥　黃芩

梔子　大黃

共爲末陳酒或童便調服

加味芎歸湯

歌

加味芎歸湯

曰

當歸同白朮　川芎百合良

治傷損嘔血形體虛弱　荊芥水煎常

當歸　川芎

百合　白朮

當歸補血湯

歌

當歸補血芎歸芍
乳没翹防獨與羌
氣虛參芪術芪嘗
亦號當歸補血湯

古方僅用歸芪者
治出血過多脉浮洪大重按全無血虛發熱者宜

右方以河水煎服

荆芥

黄蓍

之

當歸

川芎

芍藥

羌活　獨活　連翹　防風

乳香　沒藥　生地　杜仲

續斷　人參　白朮　白芷

用河水煎服

聖愈湯治筋傷肉瞤血亾過多之證

聖愈湯芎歸

歌曰

血亾并肉瞤　筋惕服斯宜

參芪二地隨

參芪二地湯散

川芎　當歸

生地　熟地

右方用河水煎服

加味歸脾湯

歌曰　加味歸脾參朮芪茯神遠志棗仁歸

木香梔子丹皮草龍眼煎加薑棗隨

治胸腹不利食少無窮脾氣鬱結

人參　茯神

棗仁　梔子

當歸　丹皮

當歸導滯散

右藥水煎

歌

當歸導滯散

曰

歸用二錢半

治腹脹胸痛大便不通喘咳吐血及血瘀停滯

大黃

當歸

射香

射香少許君羣

加味承氣湯

共爲細末磁罐收貯

歌

加味承氣湯

大黃朴實當

地龍散

水煎服

大黃 芒硝 紅花 甘草

治損傷蓄血腹痛大便不通

大黃 芒硝 枳實 厚朴

蓄瘀立時康

曰 芒硝紅甘草

歌 地龍桃仁和國老

曰 蘇木桃仁和國老

治腰痛眷痛因瘀血留太陽經

官桂麻黃赤芍當

太陽留血水煎嘗

地龍　官桂　蘇木各九分　麻黃七分

歸尾二錢五分　桃仁九個　黃柄　甘草三錢五分

共爲細末水調服

護心丸

歌

護心丸內用牛黃

曰

木耳灰研蜜煉服

治湯火之患毒氣攻心及瘀血上沖昏暈等症

牛黃一錢　血竭四錢　辰砂　飛爲衣

乳香　沒藥各二錢

木耳灰二兩

血竭辰砂乳沒方

攻心之患不須防

化瘀散

歌曰化瘀大黃乾漆桃仁朴和甘草赤芍歸鬚飲卽消青皮調

共研爲末煉蜜爲丸

川芎枳殼二兩攻一切蓄瘀作痛

赤芍歸鬚各一兩厚朴一兩

青皮二兩

川芎二兩

大黃三兩

乾漆五錢

桃仁二兩

枳實一兩五錢

甘草五錢

紅花二兩

治杖後瘀毒上攻一切蓄瘀作痛

川芎枳殼各一兩

赤芍歸鬚各一兩

青皮二兩

川芎二兩

大黃三兩

乾漆五錢

桃仁二兩

枳實一兩五錢

甘草五錢

紅花二兩

右藥共爲細末煉蜜爲丸

逐瘀定痛散

歌曰逐瘀歸鬚索五靈
乳香赤芍共桃仁
治灰棍後瘀血不散
赤芍一兩五錢　歸尾三兩
乳香　胡索三兩
桃仁二兩　紅花二兩
甘草五兩　五靈脂三兩
川山甲二兩

定痛和血湯

陳酒調服

花蕊石散 治夾棍後調理之劑

花蕊乳香歌 定痛湯和血

花蕊石散 治夾棍後調理之劑

水酒各半煎服

花蕊乳香沒藥羌活歌 紅花乳沒歸尾及桃仁

柴蘇朴芷細辛當 蒲黃五靈脂

秦艽 川斷

桃仁 蒲黃

乳香 沒藥 紅花 當歸

曰

治一切瘡口濕爛腫痛等處摻之

烏頭蘇降蛇含石

檀射星龍輕粉方

烏頭蘇降蛇含石各一兩 紫蘇五錢 白芷三兩

厚朴五錢 辛四錢 乳香五錢 羌活五錢

草烏三錢 龍骨五錢 沒藥五錢

當歸一兩 檀香三錢 蘇木五錢

南星三錢 輕粉三錢 蛇含石五錢

共爲細末敷掺傷處 射香三分

碣鐵散 湯散

歌曰 碣鐵石研末 水仙根搗汁和塗瘡上

調治鐵珠入肉不出 水仙根

碣鐵石 水仙根搗爛絞汁和塗

將碣鐵石爲細末再將水仙根搗爛絞汁和塗

患處

扶危散 拔日加添糯米炒

滑石雄黃元射少 扶危散內主盤蟲

酒吞瘋犬毒能消 拔日加添糯米炒

治瘋犬咬毒逐惡物血并從小便而出

盤蟇按日數個用之如犬咬七日用七個去足加糯米同炒焦黃色去米用蝕

滑石二兩 雄黃一錢 射香三分

共研細末每服酒下一錢不飲酒者米湯調下

琥珀碧玉散

琥珀 碧玉散生甘

滑石能調六腑宣

灯心湯下溺如泉

青黛 煎研和同琥珀

灯心湯下溺如泉

治服扶危散後毒物血片塡塞莖中小水澁痛如

淋者

曰

歌

玄妙歌

山梔炒黑陳皮桔梗甘草花粉元參

此方能解湯火之毒

黃連 桔梗 甘草 黃芩

陳皮 元參 黑山梔

用河水煎温服

共研細末每服三錢燈心湯下

滑石兩 琥珀五錢

青黛八分

芩連花粉共元參

甘草和中藥不争

蘇合丸

歌曰

治一切惡毒之氣中人關竅不通者服之能通關辟邪鮮毒

蘇合香一兩　元射香三分　安息香三錢　薰陸香三錢

廣木香三錢　水沉香五錢　母丁香五錢　白朮五錢

冰片三分　犀角三錢　附子一兩

煉蜜爲丸　硃砂爲衣　外蠟爲壳

瓜皮散

歌曰 瓜皮散二味 炒脆牛皮膠

爲末酒調服 汗淋病自消

治傷後發汗瓜皮牛皮膠等分

爲細末酒調服

冬瓜皮

勝金散

歌曰 勝金散降香 共末酒調服

地鱉及歸鬚

遍身疼痛除

能消痰降氣

降香蠶　鯽魚鬚一兩

地鱉虫　蠶

硫射

共爲細末酒調下

散

歌　硫射硫黃及射香

不能言語此方良

曰　服之卧

吐出痰涎無禍殃

此藥能吐去惡物

硫黃　射香　共爲末滾水冲服

蚯蚓蠶散

ARMY MEDICAL LIBRARY WASHINGTON D.C. U.S.A.

歌曰蝨蝨散用牡丹皮二味兼和乾漆灰
專治宿傷蓄瘀凝結能化瘀爲水
若遇宿傷酒飲下瘀消痛止最相宜

蝨蝨二兩牡丹皮二兩乾漆灰五錢

夏天將半身上飽血蝨虫陰乾爲末和乾漆灰丹皮漆灰

酒沖服

傷科補要卷三終

FRENCH BOOKSTORE
PEIPING (CHINA)
北平法文圖書館

Surg
W 8
700
C533s
1818
pt. 4

ARMY MEDICAL LIBRARY
WASHINGTON, D. C., U. S. A.

455/5

傷科補要

附錄各家秘方

目次

疎血丸
塞鼻丹
通痛膏
麝香散
定痛膏
白膠香散
補損接骨仙丹
續筋丸
止痛散
烏龍膏
正骨紫金丹
止血定痛生肌散
太乙膏
補損續命丹
回陽玉龍膏

八寶丹
四症神方
桃花散
金瘡方
洞蠻方
行軍散
回生丹
鷄鳴散
川芎湯
蔓荆湯
七厘散
神仙保命丹
退花散
入仙散
閃氣散
一粒金丹
君臣散
桂枝湯
杜仲湯

杏仁湯
車前湯
射香膏
八厘寶
陰紅湯
虎骨散
和傷湯治血湯
透骨丹
桔梗湯
海桐皮湯
藥酒方
楊梅花散
血竭散
象皮膏
活血丹

急救良方目錄

救凍死
救中暍
救厭
救驚斃
解砒毒
解蟹螯蚕莞青毒
解巴豆毒
治菌毒
解草烏頭毒
解輕粉毒
治吞金

解藥再蠱金石毒
解煤黃薰毒
治骨硬
解火酒酔死
誤吞銅鐵金銀
治諸骨硬
消吞頭髮
諸蟲入耳
鍼針入肉

解水銀入耳
解飲餲毒
解魚鮓毒
誤吞麥芒
治稻芒糠穀硬
誤吞水蛭
誤吞水銀
諸刺入肉

解百物毒　中酒毒　解一切食毒　食牛馬中毒　解花椒毒　解諸菜毒　解鴆毒　解蘆毒　解杏仁毒　解漆毒　飲食中毒　解麪毒　中蠅毒　食斑蝥毒　解蒸餅毒　解半夏毒　解雄黃毒　解服丹毒　食鱖魚龜鱉蝦蟹自死禽獸等毒

上海錢秀昌松溪氏編輯

附錄各家秘方

正骨紫金丹

治跌打撲墜閃錯損傷並一切疼痛瘀血凝聚

丁香　木香　瓜兒血竭　兒茶

紅花各二兩　當歸頭　蓮肉

白芍各二兩　丹皮二錢　甘草三錢

疎血丸

此藥止血開胃

百草霜三錢　好阿膠 鱉炒焦珠 藕節

茅根　當歸各一兩 酒洗

共爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五錢早晩

亦可

共爲末煉蜜爲丸每服三錢童便調下或黃酒

老酒送下

烏龍膏

此膏治跌打損傷筋斷骨折腫硬青紫

百草霜三錢　白及五錢　白飲三錢

丹部　錢　乳香三錢　沒藥五錢　麝香一分

炒　陳粉子　炒

隔年者佳

糯米一兩

炒

共爲細末醋熬爲膏

塞鼻丹

此丹治跌打損傷鼻中流血不止神氣昏迷牙齒

易斗浦夏　卷四　附方　一一

補
珠砂　麝香
川烏　草烏
乳香三錢　皂角
共爲細末用獨頭蒜泥爲丸以絲棉包裹塞於
鼻中
止血除痛辟風續筋骨生肌肉
川烏梅肉
二味各一錢
地黃苗　地
赤芍藥各五錢
水煎取汁　生艾汁三合
青蒿
蒼耳苗

右藥以五月五日七月七日午時修合以前藥末凡有

定痛散　治打撲傷損動筋折骨跌磕木石壓傷腫痛

芙蓉葉三兩　紫荊皮　獨活　南星生

白芷　各五錢

右藥共爲末加馬齒莧一兩搗極爛和藥末一

白膠香散

治皮破筋斷

共爲末裝白布袋內紮口煎滾薰洗

鐵線透骨草　赤芍藥各二錢

川椒三錢

甘草六分

牡丹皮　鶴虱

升麻各一錢

當歸　荊芥

防風

止痛消腫活血通經辟風驅寒

止痛散

處用生葱汁老酒和炒煖敷

補損續筋丸

治跌打撲墜骨碎筋斷肉破皮疼痛不息

當歸酒洗　錢　川芎　炒　熟地　各三錢
廣木香　牡丹皮　乳香去油　沒藥　各五錢
骨碎補　肉蓯蓉　紅花　硃砂　五錢
瓜兒血竭　丁香　一錢　虎骨　三兩　酥油炙
古銅錢　叁　人參　一兩

共爲細末煉蜜爲丸每服三錢黃酒童便化服

補損接骨仙丹

治證同前

當歸　川芎
澤瀉　靈脂
補骨脂　五加皮
防風　各五錢
乳香　去油淨
沒藥　去油淨
血竭　各一錢
熟地
地骨皮
白芍
廣木香

右剉一處用夜合花樹根皮五錢同入大酒壺內加燒酒同煮一炷香取出温服

治傷損等證失血過多或因尅伐致血氣耗損惡

寒發熱煩躁
乳香去油淨　沒藥去油淨　龍骨叁錢
黃丹五錢飛過　麝香白芷二錢五分　軟石膏二兩煅去火毒　樟腦少許
共爲細末磁罐盛之每以
掺患處止痛生肌
同陽玉龍膏
崙敷跌打損傷氣虛寒冷
草烏二錢炒　南星一兩煨　軍薑一兩煨　白芷一兩
炒
肉桂五錢
共爲末葱湯調搽熱酒亦可

太乙膏

治傷口不收貼之生肌長肉以絲棉濾淨再入爭

香蘇油　當歸　生地　生甘草

三味入油內煠枯去渣再入爭

鍋熬至滴水不散入炒飛黃丹入兩又用漫火

熬至滴水成珠取起少傾入白蠟黃蠟各一兩

微火再熬取起少定入去油淨乳香沒藥各五

錢攪勻收磁罐內過三宿可貼

保命丹

治跌打損傷

巴霜一錢　黑丑一錢
硃砂一錢　去油　射香二分

共爲末酒漿爲丸綠豆大金箔爲衣壯人服五分虛人三分小兒二分俱陳酒送下

八寶丹

治一切破傷出血時卽以此藥封之

琥珀　川連　龍骨
茶　輕粉　鳳凰衣
血竭各一錢

四

七

珠子三分　氷片三分

其爲細末摻傷口上生肌神效

厘散

散瘀定痛

乳香　没藥各去油　淨一錢

巴霜去油

自然銅　煅　硃砂

半夏各一錢

歸尾二錢

血竭

症神方

其爲末每服七厘老酒下

服藥之後週徧一身若遇傷處漸漸有聲病人自

覺藥力徃來
乳香　沒藥　蘇木
松節各二兩　川烏五錢　自然銅二兩煅
蛭五錢　血竭五錢　生龍骨五錢　土狗十个
共研細末每服五錢陳酒調下隨症上下食前後服

神仙保命丹
治跌打損傷癱瘋發背
冰片五錢　射香
白芷

川山甲　蛤粉（煅）兩　乳香
自然銅二兩　大黃四兩　沒藥
桃仁　蘇木　五靈脂
赤芍　木香　五、茄皮
青皮　無名異　甜瓜皮（炒）各二兩
千金子去油淨四兩　地鱉蟲（焙）一升　山茨根五錢
硃砂五錢　共爲末蜜丸彈子大硃砂爲衣再用金箔爲外
衣晒干入磁瓶內封固不可泄氣每服老酒下

桃花散

風化石灰半升　大黃八兩五錢

切片同炒灰色變紅放地上去火毒篩去大黃

研細摻傷處絹紮血止後葱湯洗淨換玉紅膏

卽長肉收斂忌房事發物

退風散

治破傷風不省人事角弓反張

防風一錢　荊芥五分　薄荷七分

僵蠶炒淨五分

八行

平時將雌雄雞血對相晒乾研末敷患處即收口

治杖打極重瘀血沖心不治即死急服八厘好酒送下

半夏 姜汁炒　巴豆霜　當歸　乳香

白芷一錢　天麻一錢　麻黃一錢　當歸一錢

加生姜煎服

甘草五分　炙

金瘡方

沒藥　硼砂　血竭　土鱉虫

洞蠻方　細末　等分共爲細末

治跌撲損傷拳泛嘔逆筋骨疼痛

牛膝　黃芩　骨碎補　自然銅　乳香　沒藥　大黃

兒茶　血竭二錢　乳香　雄黃　冰片三錢　阿魏

天竺黃　麝金

共爲細末煉蜜丸如綠豆大硃砂爲衣每服二丸好酒送下

閃氣散

治閃氣傷脇肋疼痛

射香一錢　雄黃一分

共爲細末入藥瓶內每遇閃氣者將藥點在眼

潭內睡一瘡即愈

同生丹

治極重損傷垂危等症

五加皮一兩五錢　當歸身五錢

木瓜一兩三錢　黃芪一兩

牛膝一兩五錢　川芎一兩

蘇木五錢　鹿角膠一兩

炒

甲二兩

自然銅二兩入錢煅骨碎補一錢

另放自然銅其各藥共爲細末和均用老米飯打糊爲丸分作六十丸每丸辰砂爲衣每服酒磨一丸

一粒金丹

治週身疼痛諸藥不效者服此除根

當歸一錢

地龍一錢

尚

治週身筋骨疼痛諸藥不效者服此除根

乳香一錢

沒藥一錢

射香三錢

眞京墨一錢炒去烟

白松香一兩

五靈脂一錢

當歸一錢

草烏一分

鷄鳴散　治胸腹蓄血　尾羢仁錢　大黄一兩

治酒煎鷄鳴時服至天明攻下瘀血卽愈　桃

君臣散　治跌打損傷　紅花

肉桂一兩　歸尾

丹皮　生地　烏藥　赤芍

桃仁各五錢　川芎各三錢　毛蒼朮各二錢　羌活各三錢　花粉二錢　川膝斷　杜仲　赤芍皮　甘草　羌活　防風　當歸　陳皮

川芎各三錢　治頭面傷湯　右爲細末入瓶內臨用酌服

黃荊子　花粉　生地　白芷　防風　羌活　赤芍皮　川芎各三錢

桂枝加姜三片水煎服

桂枝湯

凡傷手或傷臂用之

桂枝　枳殼

香附　生地

防風　赤芍

各等分童便陳酒煎服

獨活　陳皮

紅花

胡索

蔓荆湯

凡眼目損傷用之

杜白芷　生地
當歸　川芎
各等分水酒各一鐘煎
白术　蔓荆子　紅花
服

杜仲湯
凡腰脊傷痛用之
肉桂　烏藥
杜仲　生地
胡索　歸尾
丹皮　赤芍
桃仁

童便酒煎服
川斷各一錢

杏仁湯

跌打肚腹疼痛用之

杏仁三錢　生大黃五錢

甘草三分　桃仁二錢

童便老酒煎服　歸尾一錢

桔梗湯

凡跌跻損傷大小便不通

桔梗三錢　紅花

猪苓　澤瀉各三錢

大黃二兩　蘇木

芒硝各五錢　歸尾五錢

桃仁 四錢

車前加薑二片煎湯

凡大小便不通者用之

車前子 枳壳 歸尾

木通 桔梗 大黄 芒硝各一錢

海桐皮湯

凡足傷用之

射香膏

凡跌打骨碎皮破等用之

蘇木　紅花　白芷　牛膝各一錢　歸尾一兩　防風

海桐皮　獨活　五茄皮　川斷　牡丹皮　生地　廣陳皮　姜黃　童便酒煎食遠服　赤芍藥　當歸尾　川牛膝　防風　內桂　秦艽　茄皮　靈仙各一錢

荊芥　川斷　生地
麻黃　黃柏　苦參
丹皮　肉桂　獨活
大黃　　　　桃仁
　　　　　　髮灰　各五錢

用麻油一觔將大黃紅花等藥浸內夏天二日冬天四日入銅鍋熬藥枯黑色濾絹去渣入薑葱汁各二碗又熬再濾過入冰片一錢又熬再濾過入鍋加黃占四兩淨百草霜二兩同熬膏取起下細藥射香一錢乳香沒藥各一兩同射

藥酒方

治跌打損傷筋骨疼痛

參三七　紅花　生地黃　川芎

當歸身　烏藥　落得打　乳香

五加皮　防風　川牛膝　乾薑

牡丹皮　肉桂　延胡索　姜黃

海桐皮各五錢

入絹袋放瓶內用酒五觔隔湯煮三炷香爲度

研入膏內攤貼

八厘　半晚服

治痛極難忍服之覺寬但宜遊風

川芎　草烏　各二錢

蟾酥五分　南星四錢

以酒浸晒乾爲末再將芎藁絞汁并浸晒乾

研細酒下八厘

楊花散

劃開肉上敷之麻木

附方

南星二錢　草烏二錢
　　姜汁炒

共爲末黃麻子根蕈麻子根芋苧葉三味打汁拌

陰紅湯

南星四味晒乾再研極細聽用

凡婦人損傷用

阿膠　髮灰

血竭散

等分酒煎加童便服

凡跌打血流口出

沒藥

虎骨散

治跌打損傷愈後筋不能伸

黃荊子一兩　川續斷六錢

海桐皮六錢　雞血藤

犬骨節　虎骨節

各等分以酒煮服

象皮膏

各等分以酒炙爲末陳酒服

血竭　髮灰

各等分童便酒煎服

茅根　韭根

龍骨　秦艽六錢

治跌打斷骨破傷

大黃兩　川芎

紅花錢　川連錢

肉桂錢　白芨錢

用麻油一　觔先將藥片入鍋內用柳枝攪勻俟

藥渣枯色以麻布絞去藥渣又黃占白占各三

兩白芨白蘞末同熬滾至滴水不化頭入淨水

缸內將膏在水中稔長一塊分作五塊漸入大

鍋內熔化膏入帶水氣油花滾泛滿鍋看藥泛

當歸　生地各兩

甘草錢　荆芥三錢

白蘞錢　冰片一錢

紅黃色漸漸化盡其膏如鏡面可以照人將膏滴水試老嫩貼手不粘爲度如老加麻油如嫩加冰片百草霜一兩攪勻再入後藥

地鱉虫二兩　血竭五錢
海螵蛸三錢　眞珠三錢
人參三錢　乳香五錢去油
共研極細末並入膏內攪勻

和傷治血湯

治損傷瘀血腹脹內壅紅腫暗青瘀痛昏悶欲死

附方

傷最重者服之

山甲 炒爲末 歸尾

靈仙 茄皮各二錢

沒藥 粉各五分

桃仁 打碎四十九粒 大黃五錢

水酒各一碗煎好臨服加童便一盃服後瀉出

瘀血爲效後再服活血丹調理痊愈

若打蹼者後服此藥自活

花粉

川芎

甘草三分

生地

乳香

血竭二分

氣閉已死者先用通關散見中風門吹入鼻中有嚏

活血丹

治跌撲損傷神藥

劉寄奴 花頭 桃仁 麥炙 加皮

地鱉虫 用酒浸晒乾各四錢 紅花 當歸 酒洗

牛膝 酒洗 牡丹皮 香附 各三兩 童便浸炒

青皮 蘇木 枳實

降香末 山稜 醋炒 各二兩 凌霄花

威靈仙 梹榔 各二兩 乳香 去油

大黃 八兩 煮乾

透

右如法製度爲極細末每服二錢壯者三錢陳酒送下核桃四五枚過口

治撲打損傷深入骨髓或隱痛或天陰則痛或年遠四肢沉重無力此藥主之眞神方也

闢楊花子 二兩火酒浸炒三次焙乾 童便浸三次焙乾 乳香

眞血竭各叁錢

各爲末稱准和均再加朝香一分再研磁鉢收貯封固每服三分壯者五六分不必用夜飯准

要黃昏睡好方服藥酒可盡醉送下葷用猪肉過口素用萱花菜腐過口服後避風有微汗出爲效

忌房事酸寒茶醋等物及諸般血虛弱者間五六日一服壯實者間三日一服

救中暍急救良方類
暍卒暍
爛搗生薑絞汁和漿以灌死者旋以刀鐍掘開一穴入水擣之取
中暍卒倒急扶入涼處解衣服以扇扇之或以冷水噀面即活
熱痧不省人事者與冷水吃即死可急取灶間微
醒不宜便與冷物吃
暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以
布巾衣服蘸熱湯覆臍下及氣海間續以湯淋布
急救

帛上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉猝無湯處掬道上熱土於臍上熱土於臍端以多爲佳冷則頻換後與解暑毒藥或道塗無湯處卽掬熱土於臍上仍撥開作窩子令衆人旋溺於中以代熱湯亦可取效

凡中暑如已迷悶嚼大蒜瓣冷水送下如不能嚼用水研灌之立醒路中倉卒無水渴甚急嚼生葱二寸許和津同咽可抵飲水二升

救凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖袋

盛熨心上冷卽換之候目閉以温酒及清粥稍稍與之若不先温其心便以火炙則冷氣與火爭必先

又用毡或蓐荐捲之以索繫定放在平穩處令二人相對踏令滾轉往來如扞毬法候温卽活冬月溺水之人及被凍極之人雖纖毫人事不知但胸前有微温皆可救倘或微笑必爲急掩其口鼻如不掩則必大笑不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑不可救藥

救厥

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮搗碎陳皮搥碎用水三升煎一碗温服

厥

足跟及足大拇趾頻頻呼其名及唾其面再灌以薑湯必活

厥不醒者移動小臥處徐喚之即醒夜間厥者原有燈即存燈無燈者不可用燈照

又用筆管吹兩耳及取病人頭髮二七莖撚撚成

繩刺入鼻中

又研韭菜汁半盞灌鼻中冬月用根亦可得嚏

又灸兩足大拇趾聚毛中三七壯聚毛乃足趾向上生毛處

又方皂角末如豆許吹兩鼻內得嚏則氣通三四

日者尚可救

厭死者若身未冷急以酒調蘇合丸灌之即活

救中惡客忤猝死者或先病及睡臥間忽然而絕

凡中惡也用韭黃心於男左女右鼻內刺入六七

勿斜埋要

寸令目開血出即活

視上唇內沿有如粟米粒以針挑破

又用皂角或生半夏末如大豆許吹入兩鼻

又用羊屎燒烟熏鼻中

又綿浸好酒半盞手按令汁入鼻中及捉其兩手

勿令驚須臾即活

又灸臍中百壯鼻中吹皂角末或研韭汁灌耳中

又用生菖蒲研汁一盞灌之

可活

救驚斃

驚怖死者以温酒一兩盞灌之即活

救驚馬蹼猝死

卒暴隨擷藥倒及鬼魘死若口中肉未冷急以酒調蘇合香丸灌入口若下候去可活

解砒毒

砒霜服下未久者取鷄疋一二十個打入碗內攪再灌吐盡便愈但服砒已入腹則不能吐出急救用黑鉛四兩重一塊

者用井水於石上磨出黑水旋磨旋灌砒消則愈

卽先吐出之後亦宜服鉛水以解餘毒方無後患

中砒霜毒急取熱鴨血灌之立解又糞清灌之亦解又用

解鹽汁飲之亦可用熱豆豉濃煎湯飲之亦解又方以豆鼓

篇十

巴豆毒用熱豆腐漿灌之亦效

中巴豆毒下痢不止者以大豆一升煮汁飲之

又巴豆畏大黃連蘆笋菰黎蘆各煎冷服皆

能止泄

又用芭蕉葉搗自然汁服之即止

解盤蚤莞青毒用豬膏大豆汁或鹽汁藍汁服之或用鹽湯煮豬

用黑豆汁服之並瘥用肥

皂水灌之再以鵝翎紋喉數次令吐即活

膏巴豆飲之又或用大小

治菌毒

四明溫台間山谷多產菌然種類不一食之間有

中毒往往致殺人蓋蛇虺毒氣所薰蒸也有僧教

掘地以冷水攪之令濁少頃取飲皆得全活其方

解毒 自見本草楓樹菌食之笑不止俗言笑菌是也

解毒 誤食毒蕈至吐利即採生金銀花嚼之可解

解毒 草烏頭毒 用飴糖黑豆冷水解之

解射岡毒 用甘草汁或小豆葉浮萍薺苨汁冷水解之 薺苨又名

甜桔梗河南人呼爲杏葉沙參能解百藥之毒

解輕粉毒

用黑鉛五斤打壺一把盛酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲數盃溺時以瓦盆接之當有粉汁出不痛乃已

半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲數盃溺時以瓦盆接之當有粉汁出不痛乃已

毒在骨節不能以新汲冷水用擦卓布洗水灌之使吐即解

出服砒霜以新汲冷水灌之使吐即解可解

中冰片毒飲以鹽滷將用擦卓布洗水灌之使吐即解

救服鹽滷將用擦卓布洗水灌之使吐即解

或多飲豆腐漿亦可

治吞金

中黃金毒者食麑鴿肉中白銀毒者以黃連甘草
解之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能柔金
羊脂薤子皆能柔銀吞金銀入腹中當服食前品
則易出

柔
又
服金者用眞輕粉細水調下能金從大便而出

解藥毒
蟲金石毒

治一切藥毒及金石諸毒用一石蠏以熟水

磨服

解水銀入耳

以黃金枕耳邊自出若水銀入肉令人筋攣以金物熨之水銀乃出蝕金其病即瘥

解煤薰毒

飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向風吹便能醒轉

解飲饌毒

凡中飲饌之毒不知何物即煎甘草湯薺苨湯飲之便治

治骨硬

橄欖　野葛根　狗涎水

或醋煎或墨仙加

砂糖服

解河魨毒

中河魨毒者以金汁解之或糞清或以香油吞吐可

俱可

解火酒醉死

浸髮貼腐飲葛根湯氣汗水或漿豆湯

誤吞麥芒

以鴨涎水飲之

誤吞銅鐵金銀
多食肥肉以利便或食乾飯以逼送不宜飲水或食錢者多食茨菇以化之
誤吞針者以不切韭菜同蚕豆煮食或以茶面粉又對其眼在針兩頭戴出冬月水鷄桑樹下上掘取
諸骨鯁喉用苧麻根杵爛丸如彈子大將所鯁物急救
諸骨硬

治

消

煎湯化下

一方魚骨鯁用細茶五倍子等分爲末吹入咽喉立愈

一方以犬弔一足取其涎徐嚥之卽消

又方用白蔓花根搗爛取汁徐徐咽之不可着牙齒

鯁稻芒糠穀鯁

鯁稻芒糠穀者將鴟弔一足取其涎徐咽下卽

易斗浦醫

誤吞水蛭

治吞水蛭食蚤即愈試以活蛭投蚤中即化爲水

消治吞鐵物用餳糖半斤濃煎艾汁調和服之

治吞髮繞喉不可取出將自己頭髮作灰白湯調服可消

治吞鐵釘鐵金銀等物但多食肥羊脂肥肉等味可隨大便而下

一方吞錢者燒炭末白湯調服數匙即出　或服蜜升許

急救

屢驗一書云井中生蛭以白馬骨投之即無試之亦驗大蛭即蝦蟆蝗也雖死爲害不小治以前法無不應驗

諸蟲蟲入耳

百蟲入耳用藍汁灌之或葱汁尤良或豬肉少許炙香置耳孔邊亦出或用細蘆管入耳口吸之

蟲隨出

蜒蚰入耳以鹽少許揉入耳內即化爲水

蛾蚰入耳以雞肉置耳邊自出凡蟲毒入腹作脹

飲好酪二升諸蟲化爲水而壽亦消

誤吞水銀

用黃泥作丸涼水送下其水銀混入泥中可從大便而出或飲生羊血亦可解

鐵針

便下入肉

鐵鍼鋸誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣流走

凡鐵鍼鋸誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣流走向心窩胸膛者險急速用烏鴉翎數根灸焦黃研細末酒調服一錢或二錢俱可外用神聖膏貼之三五次其針自出前法用在一二日間效

解

誤食毒草或中靈毒

板藍根 洗淨晒乾四兩

貫衆 㕮

青黛 研

生甘草 各㕮

諸

刺入肉

諸刺入肉外傷之證也輭淺者以針撥出硬深者

撮螻蛄塗之少時即出如刺已出而仍作痛者再

以螻蛄塗之即愈

百物毒

末攤紙上如錢許貼之每日二換

神聖膏用車脂羣油不拘多少即研如膏調磁石

飲食中毒

凡中飲食毒而覺煩熱脹滿者急用苦參三兩苦酒一升半煮半沸陸續飲之吐出毒食即瘥或以水煮亦得或用犀角湯亦可解

中酒毒

石爲末煉蜜爲丸如桐子大另以青黛爲衣即名解毒丸如稍覺精神恍惚即是誤中諸毒急取十五丸嚼爛用新汲水送下或用水浸蒸餅

解

飲酒中毒者經日不醒是也謂之中酒用黑豆一

升煮汁温服一盞不過三盞即愈

解麵毒

只以蘿蔔生啖之或搗汁服之麥麪性熱蘿蔔能

解其性　或用大蒜嚼食之亦善解麵毒

解一切食毒

凡一切飲食之毒及飲酒不知所傷何毒卒急無

藥可解者亦用薺苨甘草剉細煎濃停冷卒去渣分

作三服或加蜜少許煎服與前飲餲方同

中蟹毒

凡食蟹中毒用紫蘇葉濃煎汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之亦可或擣蒜汁飲之或用冬瓜汁或食冬瓜亦可或擣藕汁或擣荸薺汁飲之俱可解

食牛馬中毒

粉甘草擂無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死

食斑鳩毒

方淡豆豉擂人乳服之即解

葛粉二合水調服可解薑湯調服亦解

解花椒毒

冷水飲之即解或地漿水更妙

解諸菜毒

食後多腹脹者是中諸菜毒也以醋解之

解半夏毒

生薑搗汁飲之有中此毒口不能言倒地將死者

黎蘆毒

速用薑汁灌之須臾自甦

解藜蘆毒者用雄黃爲末温酒調服一錢

一方用葱煮汁服

雄黃毒

漢防已煎湯飲之　有用雄黃搽瘡或薰陰囊受

毒用防已煎湯洗數數次愈

解杏仁毒

藍子研水服則解

解服丹毒

地漿服之爲上急救

一方用蚌肉食之良

解漆毒

一州牧以生漆塗囚眼囚眼四郎旨一村叟見而憐之語以蟹搗汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言覓得一小蝲蛑用之目睛果愈畧無損

紅斑爛瘡取生蝲蛑黃塗之不數次即愈

解食鱔魚龜鼈鼉蝦蟆自死禽獸等毒

一方用杉木煎汁洗之

豆豉一合新汲水煎濃熬溫服之可解

FRENCH BOOKSTORE
PEIPING (CHINA)
北平法文圖書館

W O
700
C533s
1818