

景宋本備急灸方

景宋本備急灸方



景宋本備急灸方

景東本簡急灸方


錢德培署




富士川本

上

8





景宋本備
急灸方


增刻鍼灸擇日
編集



富士川游寄贈

十辨同心蘭室藏版

余十有三歲而失所怙母氏
為愛踰四十無所成自謂膝
樂有足以盡此身者忽抱終天之
恨淚涸而痛不定試為陳之母氏
素患頸風歲十數作二必嘔痰加
以昏眩因得默齋撫軒父烏



辛茶方於是作少踈雖作亦見愈
近時烏附不易得每聞入京有便
必以買川烏為先或它出亦預合
數服以進前數年或鼻塞不通或
脾弱無味隨證審方儲材合劑或
丸或散朝搆暮成未嘗敢求諸市



肆然頭風則年餘不作矣矧又飲
食頗快但覺肺力微怯歲旦家常
茹素飯則盡挽羹亦稱美薌薌私謂
吾母今年七十而胃府如此眉壽
何疑者越八日忽有小红粟粒發
右耳旁次日右頰右目頗腫命醫

視之用藥敷貼膿毒漸出謂可徐
二抽減謹重太過專守頭面不可
妄施針砭之說有令灸三里穴下
抽者醫持不可未幾其腫愈堅似
瘡而根則大名癰而反無膿外不
熱而內不疼旬日後始寤甚矣吾

母至謂鄉曰汝抄方嗜藥胡為不
曉此證倉忙中罔知所措更醫亦
云無策母氏神識了然以至不救
日月不居俄至車哭客有携示蜀
本灸經與竹馬灸法者備述剋驗
內有鬚疽丁瘡乃知咸有灸法而

竹馬一法則諸證無不治痛哉痛
哉何嗟及矣鄉平時每患風在頭
目猶謂老人脫有隱疾可以延壽
幸而頭風已痊又孰知危證之竊
發喜未幾而痛因極哉此所以仰
天槌心而嘔血也世有此方吾不

蚤得而見之吾母不存而其方則
存其方存而後之人有蚤得而見
之者庶幾乎吾母雖無及而猶及
人也遂與烏宰茶方併刊以傳焉
吾母山陰博古石氏也淳祐乙巳
五月朔孤學鄉貢進士孫炬卿序



序

韓昌黎曰善醫者不視人之瘠肥察其脉
之病否而已矣脉不病雖瘠不害脉病而肥
者死矣然世有癰疽發背之疾其起也漸
其甚也烈人往往忽於微芒而昧於不自覺一
旦發暴盛腫猝不及治若再誤於庸醫靡
有不戕其生者至如窮鄉委巷藥石求
奇疾乍嬰徒嗟束手余愧不知醫人每念
及此未嘗不愀焉傷之貴陽陳衡山齋尹
嗜古篤學尤喜搜石渠金匱之書曾於



扶桑都市得南宋孫炬卿舊刻團練使張公渙所著備急灸法一卷以畀余曰此灸法中國不甚曉見蓋以古失其傳耳食者習焉不察每易忽之苟得此編按圖點穴如法注灸則消患未然化報為易其方藥味甚多見功甚速誠為濟世救人之寶筏余嘗攷鍼灸科居十三科之一宋熙寧元年間特置提舉判官設科以教之當時已行如砂其應效有可想見者細繹此卷覺男女老少之里穉

內外雜症無不可療其中騎竹馬灸法之良更他人所未及論抱朴子云百家之言與經一揆譬操水者器雖小而救火同焉程施灸者術雖殊而救疾均焉况返死回生孰如灸法之神且速耶良友鍼砭之投以承自秘爰將原本並余所得鍼灸擇日編一併付梓俾廣流傳六以副衡山瀉世深心此二考流傳東瀛垂教百載幾矣知者今復歸之中國徧起沉疴庶知廣陵散猶在人間也

光緒十六年歲次庚寅仲夏上杭羅嘉杰
少畊氏識於日本橫濱理解



十辦同心蘭室藏版

備急灸法

寶慶丙戌正月望

杜一鍼防禦壻樵李聞人

耆年述



古人云凡爲人子而不讀醫書是謂不孝則夫有方論而不傳諸人者
寧不謂之不仁乎然方書浩博無慮萬數自非夙昔究心未易尋檢
本朝名醫團練使張渙著雞峯普濟方外又立備急一卷其方皆
單行獨味緩急有賴者張公之用心其可謂切於濟人者矣僕自
幼業醫凡古人一方一技悉講求其要居鄉幾四五十載雖以此養
生亦以此利人僕今齒髮衰矣每念施藥惠人力不能逮其間惠
而不費者莫如針艾之術然而針不易傳凡倉卒救人者惟灼艾
爲第一今將已試之方編述成集鋟木以廣其傳施之無疑用之

有効返死廻生妙奪造化其有稍涉疑難之穴見諸圖畫使抱疾遇患者按策可愈庶幾少補云

諸發等證

附石癰

腸癰

丁瘡

附骨疽

皮膚中毒風

卒暴心痛

轉胞小便不通

霍亂

轉筋

風牙疼

精魅鬼神所淫

夜魘不寤

卒忤死

俗謂鬼打衝惡也

溺水

自縊

急喉痺

鼻衄

婦人難生

小腸氣


一切蛇傷

犬咬

狂犬咬毒

屈指量寸法例

以薄竹片或以蠟紙條量手中指中節橫文取上下截齊斷爲一寸男左女右



諸發等證 一

葛仙翁刻石江陵府紫極宮治發背發肩發髭發鬚發助及一切惡腫法已上數種隨其所發處名之也其源則一故灸法亦一本然數種中死人速者發背也其候多起於背胛間初如粟米大或痛或痒色赤或黃初不以為事日漸加長腫突滿背疼痛徹心數日乃損人至此則雖盧扁不能治矣惟治之於初皆得全生其餘數種皆依法早治百無一死凡覺有患便用大蒜切片如錢厚如無蒜用淨水和泥捻如錢樣用之貼在瘡頭上如瘡初生便有孔不可覆其孔先以菹豆大艾炷灸之勿令傷肌肉如蒜焦更換待痛稍可忍即漸放炷大又可忍便除蒜灸之數不拘多少但灸至不痛即住若

十辨同心蘭室藏版

住灸後又腫又痛即仍前灸之直候不腫不痛即住每患一箇瘡或灸三百壯五百壯至一二千壯方得愈者亦有灸少而便愈者若患三五箇瘡並須各各依法灸之灸後不腫不痛則愈矣男女同法孫真人治石癰亦如此法灸之石癰者其腫發至堅如石有根故名之也灸之石子當碎出即愈

此係當頭用大蒜灸法議論互見後竹馬灸法中

腸癰 二

孫真人治腸癰法云腸癰之證人多不識治之錯則殺人其證小腹重而硬以手抑之則小便如淋狀時時汗出而惡寒一身皮膚皆甲錯腹皮鼓急甚則轉側聞水声或繞臍生瘡或臍孔

膿出或大便下膿血凡有此證宜速灸兩肘尖各百炷炷如粟豆大則大便當下膿血而愈依圖取穴

圖形

男女同法




丁瘡 三

黃帝岐伯孫真人治丁瘡法丁瘡者其種甚多初起皆一點突如丁蓋子故名之發於手足頭面者其死更速惟宜早灸凡覺有此患便灸掌後四寸兩筋間十四炷依圖取穴

男左女右

圖形



附骨疽 四

黃帝岐伯孫真人治附骨疽亦如治丁瘡法灸之其附骨疽者無故附骨而成膿故名之多發於四肢大節筋間虛人及產婦偏發腿胫間其候先覺痺重或痺疼或只烘烘然肌熱動搖不便按之應骨酸痛經日便覺皮肉漸急洪腫如肥人狀多作賊風風腫治之因循多致死凡有此患宜早灸之依丁瘡圖子取穴灸之男左女右

圖子見前丁瘡門


皮膚中毒風 五

張文仲孫真人姚和衆治皮膚中毒風法毒風之病其候忽然

遍身痛痒如蟲齧痒極搔之皮便脫落爛壞作瘡凡有此患急灸兩臂屈肘曲骨間各二十一炷依圖取穴

男女同法 即曲池穴是也

圖形




卒暴心痛 六

甄權治卒暴心痛欲逆欲死者灸掌後三寸兩筋間左右各十四壯依圖取穴

男女同法

圖形



轉胞小便不通 七

葛仙翁徐嗣伯治卒胞轉小便不通煩悶氣促欲死者用鹽填臍孔大艾炷灸二十一炷未通更灸已通即住

男女同法

霍亂 八

葛仙翁治霍亂已死諸般符藥不効者云此法特異起死回生不在方藥大抵理趣精玄非凡俗所知急灸兩肘各十四炷炷如菽豆大依圖取穴

男女同法

此灸穴與前項孫真人治腸癰穴同

圖形已見前腸癰門

霍亂轉筋 九

孫真人治霍亂轉筋及卒然無故轉筋欲死者灸足兩踝尖各三炷炷如菉豆大轉筋在股內灸兩內踝尖轉筋在股外灸兩外踝尖踝者即俗稱脚塊子是也

男女同法

風牙疼 十

葛仙翁陶隱居治風牙疼不可忍不能食者灸足外踝尖三炷炷如菉豆大患左灸右患右灸左


男女同法

足踝備載明堂灸經

精魅鬼神所淫 十一

華佗治精魅鬼神所淫癲邪狂欲諸般符藥不効者用細索併兩手大指縛之灸三炷每炷着四處半在肉上半在甲上一處不着則不驗灸之當作鬼神語詰問其畧即解脫之令去其人遂甦依圖取法 男女同法

圖形



夜魘不寤 十二

葛仙翁陶隱居孫真人治魘死法云凡夜魘者皆本人平時神氣不全卧則神不守舍魂魄外遊或為彊邪惡鬼所執欲還未得身如死尸切忌火照火照則魂魄不能歸體只宜暗中呼喚其有燈光而魘者其魂魄雖由明出亦忌火照但令人痛齧其踵及足大指甲側即活

痛齧即重咬踵即脚跟也

皂莢末吹入兩鼻亦良經一二更不活者灸兩足大指上各七炷炷如菉豆大依圖取法婦人札脚者此穴難求宜灸掌後三寸兩筋間各十四壯此穴即前項甄權治卒暴心痛穴也各依前圖取之

圖形



卒忤死法 十三

扁鵲孫真人治卒忤死法

忤死即今人所謂鬼打衝惡尸厥也

急以皂角末吹入兩鼻

即活若經時不活急灸掌後三寸兩筋間各十四炷此穴即前穴甄權灸心痛者是也圖子見前訖如身冷口噤者灸人中三炷炷如粟米大依圖取法 男女同法

圖形



溺水 十四


葛仙翁孫真人救溺水死用皂角末吹入穀道中皂角無但解開衣服灸臍孔三五十壯水從穀道中出即活此法治溺水經一宿猶可活又孫真

人玄冬日落水冷凍身強直口眼閉尚有微氣者用竈灰二斗鍋內炒令煖以布三五重煖裹熱灰熨其心頭灰若冷可即換熨得心煖氣通目轉口開以溫薄粥令稍稍嚥仍依前法灸之即活若不先熨煖其心便向火爐逼之則身中冷氣與火氣爭即死切宜戒之

自縊 十五

太倉公孫真人救自縊死法云凡救自縊者極須按定其心勿便截繩當抱起解之其心下尚溫者先用皂莢末吹入兩鼻用舊氈一片蓋其口鼻令兩人用竹筒極吹兩耳即活又扁鵲法用梁上細塵少許入四箇竹筒內令四人各執一箇同時吹兩鼻兩耳用力極吹更灸手足大指橫紋中各十炷即活依圖取穴如婦人乳足者只灸兩手大指上二穴


圖形



急喉痺 十六

孫真人甄權治急喉痺舌強不能言須臾不治即殺人宜急於兩手
小指甲後各灸三炷炷如紫豆大依圖取穴 男女同法

圖形




鼻衄 十七

徐文伯治卒然鼻中血出不止病名鼻衄用細索如左孔衄縛右足右孔衄縛左足各小指兩孔俱衄則俱縛兩足各小指如婦人扎脚者縛膝腕若衄多不止者握手屈大指灸骨端上三炷炷如粟米大依圖取法

男女同法
右衄灸左
左衄灸右


圖形



婦人難生 十八

張文仲治橫產手先出者諸般符藥不効急灸右脚小指尖三炷炷如菽豆大如婦人扎脚先用鹽湯洗脚令溫氣脉通疏然後灸立便順產

圖形



小腸氣十九

孫真人甄權治卒暴小腸疝氣疼痛欲死法灸兩足大指上各七炷炷如菉豆大

此穴即是前葛仙翁陶隱居孫真人治魘死穴也依圖取穴灸之可即愈

圖子見前治魘死門

一切蛇傷二十

孫真人治一切毒蛇咬法急於新咬處灸十四炷則毒不行如無艾處只用紙撚熱之極痛即止

又夏月納涼露卧忽有蛇入口挽不出者用艾灸蛇尾即出如無艾火處用刀或磁礮周匝割蛇尾截令皮斷乃捋之皮脫肉脫即出

又方割破蛇尾入蜀椒三二顆即出

治犬咬廿一

歧伯孫真人治凡犬咬法即令三姓三人於所咬傷處各人灸一炷即愈

治狂犬所咬廿二

孫真人治狂犬咬法春末夏初太多狂獠其時咬傷人至死者世皆忽之不以為事其被咬人則精神失守發為狂疾諸般符藥治療莫過於灸便於所咬處灸百炷自後日灸一炷不可一日闕灸滿百日方得免禍終身勿食犬肉蚕蛹食之毒發即死又特忌初見瘡較痛止自言平復此最可畏大禍

即至死在旦夕若被咬已經三四日方欲灸者視瘡中有毒
血先刺出之然後灸

右諸灸法皆救倉卒患難所有人神血支血忌及大風大雨病人
本命並不避忌務發敬信心疾速檢用得此本能多多轉授他人
庶幾與我同志也

騎竹馬灸法

治發背腦疽腸癰牙癰四肢下部一切癰疽疔瘡魚臍鬼箭瘰癧
等或曾腹不測風痺腫瘤緊硬赤腫惡核癰癰發妳之屬先令病
人凭几曲手男左女右看臂腕節中間有一偃孔令把臂相對者
以朱點定了有圖在後第一次用挺直其臂如持弓之直却見先來用朱點定

偃孔處正在臂節橫紋上就以篋自橫紋貼肉量至中指肉尖而止不

過指爪有圖在後第二

次用屈中拍側看中節有兩斜橫縫就用篋獸定截斷

此是一寸湏量橫紋各一則乃各一寸也

有圖在後第三

次用竹扛一條兩卓子前

後閣起以氈褥被帛等藉定令穩令病人脫去襯衣解開袴帶騎定
竹扛用身壁直靠尾間骨坐于竹扛上兩足懸虛俱不要着地懸身

正直要兩人左右扶定勿斜側僵曲要以尾間骨正貼在竹扛上却就竹扛上門初頭自臂腕量至中指肉尖竹篾子自尾間骨量上背脊之心盡其所厭之篾而止却用前所厭橫紋二寸則子橫安篾盡處用朱點定兩頭是穴相去各一寸也有圖在後第四各灸五壯或七壯艾炷及三分闊以紙軸艾作炷十分緊實方可用壯數不可灸多不問癰生何處已破未破並用此法灸之無不安愈蓋此二穴心脈所起忽遇點穴近瘡或正在瘡上不問遠近只要依法灸之切莫生疑凡癰疽只緣心火流滯而生灸此二穴心火即時流通不

過三日可以安愈可謂起死救危有非常之功屢施屢驗蓋素問云諸痛痒皆屬於心又云榮血不調逆於肉理則生癰疽榮者血也衛者氣也心能行血心既留滯則血為之不行故逆於肉理而生癰腫灸此二穴心火

調暢血脈自然流通勝於服藥多矣火罷謹口味戒房事依法將理

依前法一灸七壯了經半日許灸瘡內流水甚多 覺火氣遊走周遍

一身蒸蒸而熱再視正瘡豐腫已消減五六分至第二日五更艾火

盛行咽喉焦枯口舌乾燥小便頗澀四肢微汗略覺煩燥當是艾

火流通使然遂投乳香菴豆托裏散方在後兩匙頭許專防托毒氣不

入心及國老膏一服方在後良久諸證漸漸釋去視其瘡腫豐已消第

三日果安愈矣但灸瘡豐發異常如虫行狀流清水四五日方定此誠

可謂活人良法也仍服五香連翹湯方在後此以疎散鬱毒之氣其則轉

毒散方在後或凡黃元以防毒內攻方在後更在識輕重緩急分陰分陽

而服藥或膠醋熨散或膏藥塗貼如外科常法治之醋熨法在後

先曲手看臂腕節中間有一偃孔便是臂節橫紋端的中心
令對坐把臂之人以朱點定

第一

圖形



次用挺直其臂如持弓之直却見先來用朱點定偃孔
處正在臂節橫紋上就以竹篾自橫紋貼肉量上至中指
肉尖而止不過指爪

第二

圖形



次用屈中指側看中節屈處有兩斜紋此是量寸法所用
兩頭各一寸之則以薄篾量三寸折斷篾

第三

圖形



次解衣袴等用身壁直靠尾間骨坐于竹杠上兩足
懸虛俱不着地要兩人扶坐以尾間骨正貼在竹杠上
却就尾間骨上用初頭竹篾子量上脊背之心蓋所量
之篾而止用朱點定了却用前所量三寸則子橫安點
處兩頭是穴

次用紙軸艾令實切爲艾炷身壁直坐即安艾炷難
安時微用津唾占粘之畧才曲身其穴便差切不可
曲身

第四

圖形



江西傳得元本云余既躬獲異効深願家家自曉人人自理不陷
枉亡亦仁人之用心也每恨嬰此疾者輕委庸人束手待斃余目
睹耳聞不知其幾人矣此灸法流傳數十載但人每意其淺近而
忽之且以其灸法之難或疑而已之今親獲異効尋窮其原如秦
緩視晉侯之疾確然知其有膏之上膏之下然攻達之難藥石所
不至寥寥千載至唐而孫真人出焉始洞徹表裏垂法萬世以膏
育穴起人之羸疾世皆稱驗惟癰疽之酷方論甚多皆不保其全
活今予發明騎竹馬灸法之良其殆孫真人發明秦緩膏育之絕
學庶幾脫人於虎口之危而奔人之急當如拯溺救焚也膏育之
灸固為良法癰疽之灸尤為効驗膏育但能灸背穴於未危之先

而騎竹馬灸實能脫人之危於將死之際故不得不委曲而備論之
蓋此二穴正在夾脊雙關流注之所凡人榮衛周流如環無端一呼
脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸一日一夜一萬三千
五百息晝夜流行無有休息故一日一夜脈行周身共計八百千
丈此即平人常經之數唯癰疽之疾血氣流滯失其常經況人一
身榮衛循度如河水之流其夾脊雙關乃流注之總路如河之正道
也皆自尾閭穴過又復通徹百骸九竅大絡布達膏腠無所不周
灸法云凡癰疽只緣心火留滯素問云諸痛痒瘡皆屬於心又云
榮血不調逆於肉理則生癰腫今此二穴所以爲効者使心火通
流周遍一身蓋妙在懸一身騎於竹扛之上則尾閭雙關流注不

得俟灸罷二穴移下竹扛其艾火即隨流注先至尾閭其熱如蒸
又透兩外腎俱覺蒸熱移時復流足湧泉穴自下而上漸漸周遍
一身竒功異効蓋原於此也且遍搜百家議論皆以癰疽發背之
患爲最慘如治法則專以當頭灼艾爲先儻一日二日三四五日灼
艾者尚不保其全活至十日已後雖當頭灸之無及也然此法似
未盡善惟騎竹馬灸法雖經日危甚不問癰生何處已破未破
一例灸之無不全愈此法最爲間易而効驗異常真神仙垂世無
窮之惠也但恨得之之晚慨念平昔覩其長往者哽然在念今遇
此良法躬獲大驗豈敢私秘欲廣其傳冀同志之士見而勿哂或
好生君子轉以濟人其幸尤甚

又云余三十餘年每見患癰疽發背之疾甚多十中僅得一二活者惟是着灸早則猶有可治之理儻始末不能灼灸則瘡勢引蠱內攻臟腑甚則數日而致於不救要之富貴驕奢之人動輒懼痛聞說火艾嗔怒叱去是蓋自暴自弃之甚者苟不避人神能忍一頃之灸便有再生之理自當堅壯此心向前取活以全膏體不致枉天豈不誠大丈夫歟

又云癰疽發背要須精加審度療之於未危之先庶收萬全之効勿以勢緩而忽視勿以勢急而惶惶其勢既見不問其他便先要隔蒜當頭灸之使毒發越於外則不致內攻殺人之速也其患處當頭得灸便成瘡口良久火艾既透則瘡口滋潤或出惡水痛勢

亦定兼服五香連翹湯縱使未能頓減其勢亦少緩矣更以騎竹馬法灸之則隨即見効若得疾已過七日則不須用蒜當頭灸之只用騎竹馬法灸之仍服五香連翹湯甚則轉毒散立見功效此所謂要識輕重緩急也

又云余親以灸法灸人甚多皆獲奇効如遇灸穴在所發之疽相近則其灸罷良久便覺艾火流注先到灸處其効尤速若離所發疽邊則不甚覺其火氣流注灸瘡亦發遲然癰疽在左則左邊灸瘡先發在右則右邊灸瘡先發蓋艾火隨流注行於經絡使然也灸者宜預知此意不須疑惑但要依法灸之使毒散越不致內攻便有向安之望

又云嘗究癰疽之作皆積微而至著及其熱之驟也如山源之水
一夕暴漲不能小決使導乃築塞之勢則大決傷人必多矣勢既
奔衝治之宜急苟徒以猛烈之藥外塗肌肉閉塞毛竅使毒氣無
所從出是謂閉門捕賊必有傷主之害也法當自外以火艾引泄
毒氣然後分陰陽而服藥可也分陰陽服藥說備載紹興官庫所
刊李迅與明州醫家所刊李世英癰疽方論

菰豆乳香托裏散方

托毒氣不入心

菰豆粉一兩 乳香 半兩

右為末和勻生甘草水調下

國老膏方

使毒氣不入內

十辨同心蘭室藏版

甘草

大者二兩細劉長流水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓再用綸瀝過銀石器內慢火熬成膏以瓦器收貯

每服二匙和酒調服白湯調下亦得微利為度

五香連翹湯方

疎散鬱毒之氣

木香

三分不見火

沉香

三分不見火

連翹

全者去蒂三分

射干

三分

升麻

三分

木通

三分去節

黃芪

三分揀無文附者生用

丁香

半兩揀去枝不見火

乳香

半兩別研

大黃

微炒半兩劉

甘草

半兩生用

麝

真者一錢半別研

獨活

三分買老菴活用

桑寄生

三分難得真者缺之亦可

右十四味為麁末和勻每服三大錢水一盞煎至七分去滓服併滓煎用銀器煎藥入銀一片同煎亦得

轉毒散方

利去病根不動元氣

車螯

紫背光厚者以鹽泥固濟煨通紅候冷淨取末一兩

甘草

一兩生用

輕粉

半錢

右一處為細末每服四錢匕濃煎瓜蒌一箇去皮煎酒一椀調下五更服甚者不過二服

礬黃元方

專托毒不攻內

白礬

一兩為末

黃蠟

半兩溶開和白九末

右旋為元如菉豆大每服五十元用溫酒和些煎熟麻油送下不以時候

醋熨法

未成膿熨之則散已成膿熨之則出

牛皮膠鈔中畧入水溶釋攤刷皮紙上中心開一圓竅如此作數片却以膠紙貼瘡上就以竅子出了瘡頭以

出毒氣用好醎醋以小鍋煮在面前令沸用軟布手巾

段兩條蘸醋更互熨之

用竹夾子夾上

須乘熱蒸熨數百度就

膠紙上團團熨不住手紙破再換如痒愈熨切不可
痒而止如有膿從竅中流更自熨歇落熨三五日不
妨時暫歇熨時更以好拔毒膏藥貼之仍出竅子以
泄毒氣其熨時直候瘡上有血水來痒止痛止然後住
熨或要住熨而膠粘於背可煎貫衆湯洗之即脫一面
熨了一面看陰陽證隨證用藥

此法甚簡而功甚大委有神

驗切不可忽醎醋即米醋也

路斯驚藤酒

李氏方云病癰疽人適有僻居村疇及無錢收買高貴藥材只得急服路斯驚藤酒不問已灸未灸連服數劑并用盪法方在後候其疽破即以神異膏方在李氏集驗皆疽方論貼之亦屢用取効應發眉發頤發背但是癰發盡量多服無不取効前後用此醫田夫野老百發百中

蘇沈良方云路斯驚藤一名忍冬草葉尖圓蔓生葉背有毛田野籬落處處有之兩葉對生春夏開葉梢尖面色柔綠葉微薄秋冬即堅厚色深而圓得霜則葉卷而色紫開花極芬芳香聞數步初開色白數日則變黃每枝黃白相間

故一名金銀花花間曳紫數莖如絲故一名老公鬚一名金銀股冬間葉圓厚似薜荔故一名大薜荔花氣可愛似末利瑞香輩古人但以為補藥今以治疽奇驗

路斯驚藤

嫩苗葉五兩不得犯鐵器用木槌搥碎

甘草


一兩生用剉為麤末

右二味同入瓦器內用水二盃文武火緩緩煎至一盃入好無灰醕酒一大盃同煎十數沸瀝去滓分為三服微溫連進一日一夜喫盡病勢重者連進數劑既去可作補藥必然無慮傷脾服至大小腸通利為度

路斯驚藤圖形

又名甜藤

蠶散癰疽法



鷺鷥藤取葉不拘多少入砂盆內爛碾入無灰醖酒少許
調和稀稠得所塗蠶患處四圍中心留一大穴以洩毒氣
早晚換蠶不可間斷

治頭腦上癰腫川芎通氣散

天花粉

洗淨為細末

川芎

不見火為細末

川山甲

頭項上甲炒為細末

右等分每服五錢重用瓜蔓一箇取子并肉研細入無灰
醖酒一椀涇之漚去滓重湯煎熟却將此酒來調藥食後
稍空服連進數劑并用前方鷺鷥藤酒每椀加川芎末
三錢重調下與通氣散更互服之及急刺去髮用前方蠶
法大凡癰疽服藥須是作急連進方能救療

水大... 三... 餘... 天... 欲... 早... 隨... 醫...
水大... 三... 餘... 天... 欲... 早... 隨... 醫...

十辨同心蘭室藏版

竹閣經驗備急藥方

石氏常服治頭風烏辛茶

川烏一隻生去皮 高麗細辛二錢 茶芽二錢

右咬咀作三服每服水兩大盞姜十片煎至七分臨發後連進或嘔痰即愈

近見挑谿居士劉信甫所刊事證方中有麝香散茶芽湯大略相似但用川烏草烏不同耳近時川烏既難得

今併載以資速辨

麝香散治頭風及偏正頭痛夾腦風連眉骨項頸徹腮頂疼痛不可忍者累有神驗

草烏

一兩用大者炮裂去皮尖
剉如豆大入鹽炒黃色

高麗細辛

二兩

草茶

四兩
略研

右三味共為細末每服一大錢入麝香少許蠟茶清調下
茶芽湯治偏正頭疼惡心嘔吐不止者

生草烏

半兩去
皮尖

高麗細辛

半兩

茶芽

一兩

右為麈尾每服四錢水二盞慢火煎至六分去滓溫服一
服取効

小托裏散順氣進食排膿去毒

香白芷

山藥

白茯苓

桔梗

瓜蒌根

甘草

右等分共炒為末每服二大錢北棗一箇生姜三片水一

盞煎至六分空心服

人有患癰疽者每以十補托裏散為第一藥然數年以
來人參與銀同價當歸又數倍之非富貴之家安得入
口偶得此方頗便貧者本出劉涓子鬼遺論余幼子八
九歲時右腿因閃肭生膿不_凡針砭曾服有効

瓜蒌酒治一切癰疽

大甘草

半兩為麈
末生者

沒藥

二錢
半研

大瓜蒌

黃熟者一箇去皮連子
切碎俗所謂杜瓜是也

右三件用無灰酒三升熬至半碗放溫服之再進不妨欲
大便略通加皂角刺七枚同煎

此治腋下忽有硬核壅腫不可下臂久則生膿及婦人

妳癰男子便毒最驗瓜萋最通乳脉婦人有妳乳不通者服之乳至如泉

治腿髀間生腫毒名曰便毒

大甘草

地榆

地骨皮

一名枸杞其根即是取生者洗去泥用之尤驗

右三味等分剉了和勻分作三服每服水一碗煎至七分先將生烏豆一掬嚼細圍瘡四邊令周匝留瘡口用大葱白槌扁與瘡長短相似安於瘡口上煎藥熟即將藥滓乘熱覆蓋於烏豆及葱白之上將手護定恐藥滓撒落仍乘熱服藥却將第二服藥候藥熟即掃去前藥滓及葱豆別爵豆用與葱白如前法第三服即就藥滓用片帛縛定坐

臥任便其瘡未結者立消已結者易破已破者瘡口易合須空心連服三次神驗

治髭癰人有摘鬚誤斷忽鬚根赤腫生膿甚者殺人取桑樹上耳爛嚼盪敷一夜鬚根可出腫亦退

治紫癰風

榆樹皮燒存性細研爲末糟茄蘸擦一二次即除

治脫囊曾有小兒發熱作驚啼哭不已視其外腎則紅腫囊皮脫去曾用之神驗

朱陵土

此是燒人地上赤土約是人尸腰間所臨之處不拘多少取研爲細末

右用水調鷲毛刷付土乾則嫩肉已生於裏矣

治喉閉膿血脹塞喉中語聲不得命在須臾

用真鴨觜膽礬為細末將筋頭捲少綿子在上先在米醋中打濕然後蘸前藥末令人撐患人口開將筋頭藥點入喉中腫處其膿血即時吐出所患即愈如不能開口者只用生姜一塊如栗子大剉一小孔入巴豆肉一粒在內更用麻油小半盞安沙盆中將生姜磨盡為度竟以姜油灌入喉中即時吐出膿血其効尤速若喉中未生毒方覓難進食便以葉下紅葉同甘草少許入蜜些子並皆爛搗如泥用綿子裹如圓眼大外以線繫定令線要長直入喉中以風涎出盡為度

膽礬絕難得真者只用薄荷一握皂角一挺同搗真汁滴入即破尤為簡便

治湯火所傷

釀米醋將多年舊窗紙蘸濕輕輕貼其上自然腫消

治蜂虻叮

山上蕨萁葉不拘多少燒存性研細末輕粉麻油敷

治一切毒蛇所傷

於所傷處先用頭繩縛定不可令毒氣流行急用香白芷半兩研細末以麥門冬洗淨連根葉濃煎湯調前藥末服之却急討芭楊葉一小籃爛搗又加生姜二十文再搗

如泥將酒一椀許逗起絞取藥汁兩椀先將一椀更入酒半椀許令熱和藥汁一椀服之其滓盪所傷處外以絹帛縛定如過一二時如前法再服一椀不三四遍即愈屢用有功

治眼目暴腫疼痛出血

春夏之月人患此者謂之天絲毒治法取不可不審余居江之南有小兒忽兩眼腫起疼痛出血或令贖藥局中眼藥薰洗者徑成青盲旁復有一人如此偶田夫相教曰我有一草藥正治此證亟取而用之毒涎從口中流出次日即平復

鹽漆樹葉

不拘多少搞爛成膠和面和眼壅洗仍却以滓汁盪眼上

鷹鵠鵲鵲之類春夏多食毒蛇拋糞空虛間或懸在樹梢遇風飄揚細如絲塵人有當之者則為天絲毒此方固嘗傳得今始信為神妙

治腎臟風凡陰囊濕痒臂腕髀旁指縫肘頭生瘡搔起白花

不可住手者皆此證也

旌德草烏

肆兩不去皮

右分作四堆每堆入鹽一兩先取河水一椀不要江溪井水却將第一堆同水入鉢內煮乾又將河水一椀入第二堆同添再煮乾又將河水草烏如前法至第四堆候水乾次第煮者欲要生熟得宜取

出切片子先用麻油少許抹銚內却將草烏片炒黃色
地上出火毒研爲細末又入好土硃一兩米醋糊爲元如
梧桐子大每服四十元空心食前酒下如覺麻人則減元
數不覺麻人則增元數盡此一料則疾去矣

治小兒悞吞銅錢入腹者

羊脰炭

即炭中極小堅
硬擲地有聲者

右爲細末米飲調下少頃炭即裹錢隨糞出來累有神効
亦治諸般鯁及小兒悞吞棊子者

治久患脾寒寒熱不已或一日或間兩三日或半年或三年
者無不剋驗

朴硝

二錢用烏盞
於火上鎔釋

右用熱酒一盞候朴硝釋時傾在酒內乘熱於當日身上
寒凜凜發作時服之鬪發一次更不再作

治男子婦人小便卒不通方妊婦有臨月患此者累得効

裹茶藟

一兩燒灰
存性研

滑石

半兩
細研

右同礪勻每服壹貳錢用膈茶少許沸湯點入生麻油二
三滴服

治一切發背癰疽延開不已須用圍住方

台烏

研爲
細末

右用蜜水調傅四邊早晚換傅則毒腫不開旋斂於中

其効捷甚

治一切赤腫癰毒初發便貼無有不散

黃頭漿粉

炒十分黑
色壹兩

黃蘗皮

半兩炙

右為細末用芭蕉油調傳

東陽陳氏專施此藥

治一切瘡癰已潰未潰皆可貼

五倍子

壹兩

白礬

貳錢

右為細末用井花水調傳

治下血不止及腸風臟毒敗證灸法

量臍心與脊骨平於脊骨上灸赤壯即止如再發即再灸赤壯永除根本

治噎疾灸法

脚底中指中節灸赤壯男左女右

治男子遺精白濁起止不可者灸法

先點丹田穴更向上去些小灸赤壯

臍下寸為丹田

治湯火所傷又神驗於前者

或用竈底黃土或用無名異皆為細末用冷水調傳痛

即定無痕痕人家尤易取辦

治一切嗽疾不問新舊熏喉法

款冬花

約壹分

鵝管石

約壹分

雄黃

約壹分
之半

右為極細末用無雄烏鷄子清調

頭次生下
者是無雄

次將白紙一方以

所調藥刷一半候乾捲成小筒將一半無藥處撚定於無
灰火上燒濃煙直安入近喉處閉口使煙氣衝入覺必要嗽
須略忍住便以冷茶清呷數口此用先辦隨即噦出痰數口無不
差者閉口熏壺時更記牢捻鼻孔莫令壺出

治脚氣風濕氣貫法四肢疼痛

四味理中湯去人參加紅曲為細末熱酒調服

治臂痛指弱此由伏痰在內中腕停滯四肢屬脾脾血相搏伏苓圓

赤伏苓壹兩半夏叁兩枳實半兩風化朴硝壹分

右為細末薑汁糊為元梧桐子大每服三十元薑湯下余以前
紅麴理中湯併下効尤速

十辨同心蘭室藏版

治髀間發腫此因敗精滯氣加以陰濕名曰髀毒及腎癰未
散自腰以下一切腫毒咸治之

燄硝壹錢重

通臨安買盆硝有鋒芒者
草店中味鹹者不可用

右為細末用熱酒調極空心服之放微溫不可太溫不可
便喫熱食恐作吐查小便微疼時是毒從小便出去一
溺便安查未退再進一服無不効者毒作而腫甚如蒸餅
大者亦洩去且不用破又不動元氣士大夫有服之累効者

治從高墜下顛撲閃肭專能散血疎氣

黃熟茄種連皮肉薄切紅瓦上焙干入糖麩收貯臨時研為
末入乳香少許酒調下能飲者以醉為度

雖氣欲絕者急
擊牙灌入

治刀傷竹木刺破專能止血定疼

三葉豆又名衛客籠五六月採取晒干為末摻患處



近秋方生子葉厚若有
微毛大率似柿葉與籬
豆猫兒豆相似而非不
可誤用

此二方桃源張寺丞面授累試有效不可忽之

治赤眼及睛疼多淚暴赤腫者一宗方

宣藥雄黃解毒元量虛實下○貼藥蛇莓草

春間生紅莓
子不可食者

洗淨搗爛攤青紗上盒眼如冰又泡真北棗取肉滲以腦子

或薄荷煎貼太陽亦並用青紗體襯如當三錢大○搐鼻
藥鬱金真焰硝各少許略入腦子○洗藥四物湯加防風
黃連杏仁赤芍藥○服藥三黃散用黃芩黃連赤芍藥龍
膽草大黃漢防已木香等分為細末食後溫酒調下○點藥
帶皮生姜一塊鋤筋蕩成小穴入蜜攪勻點之蓋血得熱
則散專用腦子醫家所忌虛證者當先補腎別有方法
貼一切腫毒凡欲結癰癰之未成者

用酸米醋一盞皂角一條鎚碎同煎至七分以成片牛皮膠
同浸梔櫟中令軟隨大小貼赤腫上
治腰疼甚至不可擡舉者

名委中穴



治風蛀虫牙

籬上雀梅藤収于刀上取油瀝將小白蟾窠煮濕成元塞

患處一塞一定

治妳癰

車螯殼

右燒成粉為末米飲下生用尤妙

兩脚曲腓內摺絡中間尋
兩筋之中取穴兩脚齊灸
三壯即愈仍倚物立定取
穴并灸若痛發時灸尤驗

