和家氏傷寒論　乳

修琴堂藏書
第110號 傷寒論

和家氏傷寒論

Kana-OA
4° 448062-1
Wake-shi shōkanron. 1.

傷寒論者漢張仲景所以爲錄歷家著之也、故於醫書無出於此右焉、而無有五者和
者雖使捲入之說以爲難也、亦後諸注家疑異出、求精却失其者無不尠矣、捲入諸注大意
并源本經是以張氏之意蓋亦難窺也、然此本注者亦家傑者也、慨然見于此、蓋爲本經
捲入注釋之文、或削去、或低去、或傳書、張氏之旨一目瞭焉、俾諸君不失其要得也、若者我
輒有一家傳、猶遺漢土、幸以時出二本、攜乃與一本於其葉於和泉氏、之久秘義之不出、
迹來斷然爲志乎世、實疾醫家之陶寶也、余出入于好生黨有年矣、之人之所不之、謂序
於余、余銘此乃書之流、喜之人之切之于采、諸謂不少之難來、以定其言云

寶政元年臘月之吉

仙臺　桂園逸士井上澈　撰

傷寒卒病論

集論曰

余每覽越人入虢之訪望齊侯之色未嘗不慨然歎其才秀也怪當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末忽棄其本華葉其外而悴其內皮之不存毛將安附焉

哀乎趨世之士又馳競浮華不固根本
卒然遭邪風之氣嬰非常之疾患及禍
至而方震慄降志屈節欽望巫祝告窮
歸天東寺受敗賣百年之壽命持至貴
之重器委付□醫而恣其所措咄嗟嗚
呼厥身已斃神明消滅變爲異物幽潛
重泉徒爲啼泣痛夫舉世昏迷莫能覺
悟不惜其命若是輕生彼何榮勢之云

STAATS-
BIBLIOTHEK
PREUSSISCHER
KULTURBESITZ
BERLIN
(448062)

哉而進不能愛人知人退不能愛身知
己遇災值禍身居厄地蒙々昧々憃若遊魂
忘軀徇物危若氷谷至於是也余宗族
素多向餘二百建安紀年以来猶未十
稔其死亡者三分有二傷寒十居其七
感往昔之倫喪傷横夭之莫救乃勒求
古訓博采衆方註撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚
藥録并平脉辨證經爲傷寒卒病論雖未能盡

愈諸病庶可以見病知源若能尋余所集思過半矣

夫天布五行以運萬類人稟五常以有五藏經絡府俞陰陽會通玄冥幽微變化難極自非才高識妙豈能探其理致哉上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶

及倉公下此以往未之聞也觀今
之醫不念思求經旨以演其所知
各承家技終始順舊省疾問病務
有口給相對斯須便處陽菜（菜）按寸
不及尺握手不及足人迎趺陽之
部不參動數発息不滿五十短期
未知決診（診）九候（候）曾無髣髴明堂闕
庭盡不見察所謂窺管而已夫欲

視死別生實爲難矣孔子云生而
知之者上學則亞之多聞博識知
之次也余宿尚方術請事斯語

漢長沙守南陽張機著

晉大醫令王叔和撰次

傷寒例

凡春（陰陽大論云）氣溫和夏氣暑熱秋氣漸冷冬□冰冽此則四時正氣之序也（註）冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷寒觸冒之者乃名傷寒其例其以傷寒爲毒者以其最成殺厲之氣之氣皆能爲病中□而即於傷四時病熱名曰傷寒

中寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也

註 是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸寒所致非時行之氣也

凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫

此非其時而有其氣

註 是以一歲之中長幼之病多相似者也

例 此則時行之氣也

夫欲候知四時正氣爲病及時行疫氣之法皆當按年曆日之九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰解而爲雨水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便涼從霜降以後至春分以前寒冽凡有觸冒霜露體中寒即

病者謂之傷寒也九月十月寒氣
尚微爲病則輕十一月十二月寒
冽已嚴爲病則重正月二月寒漸
將解爲病亦輕此以冬時不調適
有傷寒之人即爲病也冬有非節
之暖者名爲冬溫冬溫之毒與傷
寒大異冬溫復有先後更相重沓
亦有輕重爲治不同證如後章

從立春節後其中無暴大寒又不
冰雪而有人壯熱爲病者此屬春
時陽氣發於冬時伏寒變爲温病
從春分以後至秋分節前天有暴
寒者皆爲時行寒疫也
三月四月或有暴寒其時陽氣尚
弱爲寒所折病熱猶輕
五月六月陽氣已盛爲寒所折病

變則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病變亦輕

病與溫及暑病相似但治有殊耳

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名爲二十四氣然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而大過者皆成病氣也

但天地動靜陰陽鼓擊者各正一
氣耳
是以彼春之暖爲夏之暑彼之秋
之忿爲冬之怒是故冬至後一陽
夕升一陰夕降也夏至之後一陽
気下一陰気上也斯則冬夏二至
陰陽合也春秋二分陰陽離也陰
陽交易人變病焉此君子春夏養

陽秋冬養陰順天地之剛柔也小
人觸冒必嬰暴疹須知毒烈之氣
留在何經而發何病詳而取之是
以春傷於風夏必飧泄夏傷於暑
秋必病□秋傷濕冬必咳嗽冬傷
於寒春必病溫此必然之道可不
審明之

傷寒之病逐日淺深治法方治今世

人傷寒或始不早治或治不對病或
日數久淹困乃告醫醫人又不依次
第而治之則不中病皆亟臨時消息
製方無不效也今搜採仲景舊論録
其證候診脉聲色對病□方有神驗
者擬防世急也
凡土地温凉高下不同物性剛柔食
居亦異是故黄帝興四方之問岐伯

攀四治之能以訓後賢開其未悟者
臨病之工宜須兩審也
凡傷於寒則爲病熱熱雖甚不死若
兩感寒而病者必死若更感異氣變
爲他病者當依後壞病證而治之
尺寸俱浮者大陽受病也當一二
日発以其脉上連風府故頭項痛
腰脊強

於府可下而已

若兩感於寒者一日大陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與大陰俱病則腹滿身熱不欲食讝語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病

五日發以其脉布胃中絡於嗌
腹滿而嗌乾
尺寸俱沉者少陰受病也當五六
日發以其脉貫腎絡於肺繫舌本
故口燥舌乾而渴
尺寸俱微緩者厥陰受病也當六
七日發以其脉循陰器絡於肝故
煩滿而囊縮此三陰皆受病已入

尺寸俱長者陽明受病也當二三
日發以其脉夾鼻絡於目故身熱
目疼鼻乾不得臥
尺寸俱弦者少陽受病也當三四
日發以其脉循胷絡於耳故胷胷
痛而耳聾此三經皆受病未入於
府者可汗而已
尺寸俱沈細者大陰受病也當四

則榮衛不行藏府不通則死矣其兩感於寒更不傳(加)經不知異気者至七日大陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹滿如故則思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大気

皆去病人精神爽慧也若過十三日以上不聞寸尺陷者大危若脉陰陽俱盛重感於寒者變成溫瘧陽脉浮滑陰脉濡弱者更遇於風變爲風溫陽脉洪數陰脉实大者更遇溫熱變爲溫毒溫毒爲病最重也陽脉濡弱陰脉弦堅者更遇溫気變爲溫疫以此冬傷於寒発爲

溫病脉之變證方治如說

凡人有疾不時即治隱忍冀差以成痼疾小兒女子益以滋甚時気不和便當早言尋其邪由及在腠理以時治之罕有不愈者患人忍之數日乃說邪気入藏則難可制此爲家有患備慮之要

凡作湯茶不可避晨夜覺病須臾即

宜便治不等早晚則易愈矣如或差
遲病即傳變雖欲除治必難爲力服
藥不如方法縱意違師不須治之
凡傷寒之病多從風寒得之始表中
風寒入裏則不消然未有溫覆而當
不消散者擬欲攻之猶當先解表乃
可下之若表已解而內不消雖非大
滿猶生寒熱□□□□□□□則病不除

若表已解而內不滿大滿有燥屎自
可除下之雖四五日不能爲禍也若
不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂
利煩燥諸變不可勝數輕者困篤重
者必死矣
大實堅

凡兩感病俱作治有先後發表攻裏
本自不同而執迷妄意者乃云神丹
甘遂合而飲之且解其表又除其裏

言巧似是其理实違夫智者之舉錯
也當審以愼愚者之動作也必果而
速安危之變豈可詭哉世上士但務
彼翕習之榮而莫見此傾危之敗惟
明者居然能護其本近取諸身夫何
遠之有焉
夫陽盛陰虛汗之則死下之則愈
陽虛陰盛汗之則愈下之則死矣

夫如是則神丹安可以誤發甘遂
何可以妄攻虛盛之治相背千里
吉凶之機應若影響豈容易哉況
主枝下咽陽盛即斃兼氣入胃陰
盛以亡死生之要在乎須臾視身
之尽不暇計日此陰陽虛実之交
錯其候至微発汗吐下之相反其
禍至速而醫術淺狹懵然不知病

源爲治乃誤便病者殞沒自謂其
分至今寃魂塞於冥路死屍盈於
曠野仁者鑒此豈不痛歟
凡發汗溫服湯菜其方雖言日三服
若病劇不解當促其間若與病相阻（可半日中尽三服）
即便有所覺病重者一日一夜當晬
時觀之如服一劑病證猶在故當復
作本湯服之至有不肯汗出服三劑

乃解 註 若汗不出者死病也

凡得時気病至五六日而渇欲飲水
飲不能多不當與也何者以腹中焚
尚少不能消之 ○便更與作病也 例 至七八
日大渇欲飲水者猶當依證而與之
與之令不足勿極意也 言能飲一斗与五升 若飲而腹滿
小便不利若喘若噦不可與之也若
飲水忽然大汗出是爲自愈也

凡得病反能飲水此爲欲愈之病其不曉病者但聞病飲水自愈小渴者乃強而與飲之因成其禍不可復數也

凡得病厥脉動數服湯藥更遲脉浮大減小初躁後靜此皆愈證也

凡治温病可刺五十九穴

又身之穴三百六十脊五其三十

穴灸之有害七十九穴刺之爲灸
其中髓也
又脉四損三日死平人四息病人
脉一至名曰四損脉五損一日死
平人五息病人脉一至名曰五損
脉六損一時死平人六息病人脉
一至名曰六損脉盛身寒得之傷
寒脉虛身熱得之傷暑脉陰陽俱

盛大汗出不解者死脉陰陽俱虛
煩不止者死脉至乍數乍疎者死
脉至如轉索其日死讝言妄語身
微煩脉浮大手足温者生逆冷脉
沉細者不過一日死矣
此以前是傷寒煩病證候也

傷寒所致

辨大陽病　痓濕暍　註此三種宜應別

論以為與傷寒相似故此見之

大陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓

大陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔痓

大陽病發熱脉沈而細者名曰痓

大陽病發汗太多致痓

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面
赤目脉赤獨頭面摇卒口噤背反張者
痓病也
大陽病関節疼痛而煩脉沈而細者名
中濕
濕痺之候其人小便不利大便反
但當其利小便
濕家之爲病一身尽痛發熱身色如薰

黄

湿家其人頭汗出背強欲得被覆向火

若下之早則噦胷滿小便不利舌上如（丹田有熱胃中有）

胎（寒）渴欲得水而不能飲口燥渴也

湿家下之額上汗出微喘小便利

者死若下利不止者亦死

問曰風湿相搏一身尽疼痛法當（値天陰雨未止）

汗出而解醫曰此可汗汗之病不

愈者何也荅曰発其汗汗大出者
但風気去湿気在是故不愈也
若治風湿者発其汗微々□似欲汗出
者風湿俱去也
湿家病身上疼痛発熱面黄而喘頭痛
鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無
病在頭中寒湿故鼻塞
病内藥鼻中則愈
病者一身尽痛発熱日晡所劇者此名

風濕（註）此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

大陽中熱者喝是也其人汗出惡寒身熱而渴也

大陽中暍者身熱疼重而脈微弱（註）此亦以夏月傷冷水水行皮中所致也

大陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身則熱口開前板齒燥

若発汗則悪寒甚加温針則発熱甚
下之則淋甚

辨大陽病

大陽之爲病脉浮頭項強痛而悪寒
大陽病発熱汗出悪風脉緩者名爲中
風
大陽病或已発熱或未発熱必悪寒體
痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

傷寒一日大陽受之脈若靜者爲
不傳頗欲吐若躁煩脈數急者爲
傳也

傷寒二三日陽明少陽證不見者
爲不傳也

大陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病
若發汗已身灼熱者名風溫
風溫爲病脈陰陽俱浮自汗出身重多

眠睡鼻息必鼾語言難出
若被下者小便不利直視失溲若被
火者微發黃色劇則如驚癎時瘛瘲
若火熏之一逆尚引日再逆促命期
病有發熱惡寒者發於陽也無熱
惡寒者發於陰也發於陽者七日
愈發於陰者六日愈以陽數七陰
數六故也

大陽病頭痛至七日以上自愈者
以行尽其經故也若欲作再經者
針足陽明使經不傳則愈
大陽病欲解時從巳至未上
風家表解而不了者十二日愈
病人身大熱反欲得衣者熱在皮膚
寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者
寒在皮膚熱在骨髓也

大陽中風脉陽浮而陰弱嗇々惡寒淅々惡

陽浮者熱自発陰弱者汗自出

風翕々発熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

桂枝去皮三両　芍藥三両　甘草炙二両　生薑切三両　大棗擘十二枚

右五味㕮咀三味以水七升微火煑取三升去滓適寒温服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助菜力温覆令一時許遍身漐々微似有汗者益佳

不可令如水流離病必不除若一服
汗出病差停後服不必盡劑若不汗
更服依前法又不汗後服小促其間
半日許令三服尽若病重者一日一
夜服周時觀之
服一劑尽病證猶在者更作服若汗
不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉
麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

大陽病項背強几々汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

葛根四兩　芍藥三兩　生薑切三兩　甘草炙二兩　大棗擘十二枚　桂枝三兩

右六味以水一斗先煮葛根減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服

一升覆取微似汗不須歠粥餘如桂
枝法將息及禁忌

大陽病下之後其氣上衝者可與桂枝
湯註若不上衝者不可與之 方用前法

大陽病三日已發汗若吐若下若溫針
仍不解者此為壞病註桂枝不中與之也觀其脉證知
犯何逆隨證治之

桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱

汗不出者不可與之也常須識此勿
令誤也

若酒客病不可與桂枝湯得湯則
嘔以酒客（客）不喜甘故也

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳又服
桂枝湯吐者其後必吐膿血也

大陽病發汗遂漏不止其人惡風小便
難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子

陽主之

桂枝（去皮）三兩　芍藥三兩　甘草（炙）二兩　生薑（切）三兩　大棗（擘）十枚　附子（炮去皮破尼）一枚

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升註本云桂枝湯今加附子例將息如前法

大陽病下之後脉促胷滿者桂枝去芍藥陽主之若微惡寒者桂枝去芍藥加附子陽主之

桂枝去芍藥湯方

桂枝（去皮）三兩　甘草（炙）二兩　生薑（切）三兩　大棗（擘）十二枚

右四味、以水七升煮取三升、去滓溫服一升。（註）本云桂枝湯今去芍藥例將息如前法

桂枝去芍藥加附子湯

前方加附子（炮去皮破八片）一枚

右五味、以水七升煮取三升、去滓溫

服一升註本云桂枝湯今去芍藥加附子例將息如前法
大陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒
熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日
二三度發註脉微緩者爲欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱
虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也經以其
不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黄各
半湯
桂去皮枝一兩十六銖芍藥生姜切甘草炙

麻黄去節各一兩　大棗擘四枚　杏仁陽積去皮尖及雙仁者二十四枚

右七味以水五升先煑麻黄一兩沸

去上沫内諸葉煑取一升八合去滓

温服六合（註）本云圭支湯三合麻黄湯三合併為六合頓服

例　將息如上法

大陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府

却與桂枝湯則愈服桂枝湯大汗出脉

洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧一

日再発者汗出必解宜桂枝二麻黄一湯

桂枝去皮切一両十六銖　芍薬一両六銖　麻黄去節去皮尖十六銖
生姜一両十六銖擗　杏仁十六銖去皮尖　甘艸一両二銖炙
大棗擘五枚

右七味以水五升先煮麻黄一二沸去上沫内諸薬煮取二升去滓温服一升日再服

(註)本云桂枝湯今麻黄湯一分合為二升分再

服今合為方例將息如上法

脫桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪
大者白虎加人參湯主之

大陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者（此無陽也）
不可大發汗宜桂枝二越婢一湯脫桂
枝陽或下之仍頭項強痛翕々發熱無汗
心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加
茯苓白朮湯主之

桂枝二越婢一湯

桂枝（去皮） 芍菜 麻黄 甘艸（炙） 各十八銖

大棗（擘）四枚 生姜（切）一兩二銖 石膏（擘綿裹）二十四銖

右七味以水五升煮麻黄一二沸去上沫内諸菜煮取二升去滓温服一升

註 本云當裁爲越婢湯圭支湯合之飲一升今合爲一方圭支湯二分越婢湯一分

桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥三兩　甘艸炙二兩　生姜切　白朮

茯苓各三兩　大棗擘十二枚

右六味以水八升煮取三升去滓溫

服一升小便利則愈註本云主支陽今主支加

茯苓白朮

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒

脚攣急反與主支陽註欲攻其表此誤也經得

之便厥咽中乾躁吐逆者作甘艸乾姜

陽與之若厥愈足温者更作芍药甘艸
湯與之若胃気不和讝語者少與調胃
兼気陽若重発汗復加焼針得之者同
逆陽主之

甘艸乾姜湯方

甘艸炙 兩
乾姜 兩

右二味以水三升煮取一升五合去
滓分温再服

問曰證象陽且按法治之而增劇厥逆咽中乾燥兩脛拘急而譫語師曰言夜半手足當温兩脚當伸後如師言何以知之荅曰寸口脉浮而大浮爲風大爲虛風則生微熱虛則兩脛攣病形象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子温經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽

明内結讝語煩乱更飲甘艸乾姜
陽夜半陽気還両足當熱胵尚微
拘急重與芍茱甘艸湯爾乃脛伸
以承気湯微溏則止其讝語故知
病可愈

庚申小春十日以高麗新寫本校正一通　水雲老人球

辨大陽病

大陽病項背強几々無汗惡風葛根湯主之

葛根四兩　麻黃去節三兩　桂枝去皮二兩　生姜切三兩　甘艸炙二兩　芍藥二兩　大棗擘十二枚

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取似汗餘如桂枝法將

息及禁忌 註 諸湯菜皆倣之

大陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

大陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

葛根四兩　麻黃三兩去節　甘艸二兩炙　芍藥二兩　桂枝二兩去皮　生姜三兩切　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右八味以水一斗先煑葛根麻黄減二升去白沫内諸葉煑取三升去滓温服一升覆取微似汗

大陽病桂枝證醫反下之利遂不止喘（脉促者表未解也）而汗出者葛根黄連黄芩湯主之

葛根半斤　甘艸炙二兩　黄芩三兩　黄連三兩

右四味以水八升先煑葛根減二升

內諸藥煮取二升去滓分温再服

大陽病頭痛発熱身疼腰痛骨節疼痛
惡風無汗而喘者麻黄湯主之

麻黄三兩 去節 桂枝二兩 去皮 甘草一兩 炙 杏仁七十箇 去皮尖

右四味以水九升先煮麻黄減二升
去上沫内諸藥煮取二升半去滓温
服八合覆取微似汗不須歠粥餘如

桂支法將息

大陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

大陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

大陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩燥者大青龍湯主之若脈微

弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆（此為逆也）筋惕肉瞤

大青龍湯方

麻黃六兩（去節）　桂枝二兩（去皮）　甘州二兩（炙）

四十枚　生姜三兩（切）　大棗十枚（擘）　石膏（碎雞子大）

杏仁（去皮尖）

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸菜煮取三升去滓溫服一升取微似汗（註）汗出多者溫粉粉之□□服汗

者停後服（註）若復服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時大無少陰症者

青龍湯主之

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎小便不利小腹滿或喘者小青龍湯主之

麻黃（去節）　芍藥　細辛　乾姜（洗）　甘艸（炙）

桂枝（去皮）　各三兩　五味子半升　半夏半升

右八味以水一斗先煑麻黄減二升
去上沫内諸茶煑取三升去滓温服
一升
若渴者去半夏加括蔞根三両若微
利去麻黄加蕘花如一雞子（憝令夫色）若噎者
去麻黄加附子（炮）一枚若小便不利少
腹満者去麻黄加茯苓四両若喘者
去麻黄加杏仁（去皮尖）半升（註）且蕘花大治利麻黄主喘今

此語反之疑非仲景意

傷寒心下有水気欬而微喘発熱不渇服湯已渇者此寒去欲解也

小青龍湯主之

大陽病外證未解脉浮弱者當以汗解

宜桂枝湯

大陽病下之微喘者表未解故也桂枝

加厚朴杏子湯主之

圭支去皮三両　甘艸炙二両　生姜切三両　芍茱

三兩　大棗擘十枚　厚朴炙去皮二兩　杏仁去皮尖五十枚

右七味以水七升微火煮取三升去滓温服一升覆取微似汗

大陽病外證未解不可下欲解外者宜桂枝湯

大陽病先発汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故在外當須解外

則愈宜桂枝湯

大陽病脉浮緊無汗発熱身疼痛八九日不解表證仍在（註）此當発其汗服若已微除也（經）其人発煩目瞑劇者必衄（衄乃愈）所以然者陽気重故也麻黄湯主之

大陽病脉浮緊発熱身無汗自衄者愈

二陽併病大陽初得病時発其汗汗先

出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡
寒（註）太陽病證不能者不可下之爲逆（經）如此可以小発
汗設面色緣々正赤者陽気拂鬱（註）若発汗不
徹不足陽気拂鬱（經）不得越（註）當汗不汗其人躁煩○不知痛處乍
在腹中乍○四肢按之不可得（經）其人短気但坐更
発汗則愈（註）何以知汗出不徹以脉濇故知也（經）若（闕文）
脉浮數者法當汗出而解若下之身
重心悸者不可発汗當自汗出乃解

在表當解之薰之

以汗出不徹故也

所以然者尺中脉微此裡虚須表裡
実津液自和便自汗出愈
脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之
假令尺中遲者不可發汗何以知然
以榮気不足血少故也
脉浮者病在表可發汗宜麻黄湯
脉浮而数者可發汗宜麻黄湯
病常自汗出者此爲榮気和榮気和

者外不諧以衛気不共榮気諧和故
爾以榮行脉中衛行脉外復発其汗
榮衛和則愈宜桂枝湯
病人藏無他病時発熱自汗出而
不愈者此衛気不和也先其時発
汗則愈宜桂枝湯
傷寒脉浮緊不発汗因到衄者麻黄湯
主之

傷寒不大便六七日頭痛在熱者
與羔気湯其小便清者知不在裏
仍在表也當須発汗若頭痛者必
衄宜桂枝湯
傷寒発汗已解半日許復煩脉浮數
者可更発汗宜桂枝湯
凡病若発汗若吐若下若亡津液如
此者陰陽自和則必自愈

発汗後身疼痛脉沈遅者桂枝加芍
菜生薑各一両人参三両新加湯主
之

発汗後喘家不可更行桂支湯汗出
而喘無大熱者可與麻黄杏仁甘艸
石膏湯

麻黄（去節）四両　杏仁（去皮）五十個　甘艸（炙）二両　石膏（碎綿裹）半斤

右四味以水七升煑麻黄減二升去上沫内諸菜煑取二升去滓温服一升

発汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者圭支甘艸湯主之

桂枝去皮 罒 甘艸炙 二兩

右二味以水三升煑取一升去滓頓服

発汗後其人臍下悸者欲作奔豚

茯苓圭支甘艸大棗湯主之

茯苓半斤　圭支去皮四両　甘艸炙二両　大棗擘十五枚

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升内諸菜煮取三升去滓温服一升日三服

作甘爛水法取水二斗置大盆内

以杓揚之水上珠子六千顆相
逐取用之
発汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘
州人參湯主之
厚朴(去皮)半斤 生薑(切)半斤 半夏(洗)半升 甘州
二兩 人參二兩
右五味以水一斗煮取三升去滓温
服一升日三服

傷寒若吐若下後心下逆滿気上衝胸
起則頭眩脉沈緊発汗則動經身爲振々
搖者茯苓桂支白朮甘艸湯主之発汗
病不解又悪寒者虚故也
悪寒者芍薬甘艸附子湯主
之発汗若下之病仍不解煩燥者茯苓
四逆湯主之發汗後悪寒者虚故也不
悪寒但熱者實也當和胃氣與調胃承
氣湯

茯苓圭支甘艸湯方

茯苓四兩　桂支去皮三兩　白朮　甘艸炙各二兩

右四味以水六升煑取三升去滓分

溫三服

芍菜甘艸附子湯

芍菜　甘艸炙各三兩　附子炮去皮破八片一枚

右三味以水五升煑取一升五合去

滓分溫三服

茯苓四逆湯方

茯苓兩　人參一兩　附子一枚　甘艸炙
二兩　乾薑二兩

右五味以水五升煮取三升去滓溫
服七合日三服

調胃承氣湯方

芒硝半升　甘艸炙　大黃兩
去皮清酒洗

右三味以水三升煮取一升去滓內

芒硝更煑一両沸頓服（註）加減方非疑仲景方

大陽病発汗後大汗出胃中乾燥煩不得眠欲得飲水者少々與飲之令胃気和則愈若脉浮小便不利微熱消渇者五苓散主之

発汗已脉浮數煩渇者五苓散主之

猪苓（去皮）十八銖　澤瀉一両六銖　白朮十八銖

茯苓十八銖　桂枝（去皮）半両

右五味持爲散以白飲和服方寸匕
日三服多飲煖水汗出愈如法將息

傷寒汗出而渴者五苓散主之小渴者

茯苓甘艸湯主之

茯苓二兩　桂去皮支二兩　甘艸炙二兩　生姜切三兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

中風発熱六七日不解而煩渇欲飲水（有表裏證）

水入口吐者五苓散主之（名曰水逆）

未持脉時病人叉手自冒心師因

教試令欬而不欬者此必両□聾

無聞也所以然者重以発汗虚故

也

発汗後飲水多必喘以水灌之亦

喘

發汗後水菜不得入口爲逆若更發汗必吐下不止發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者梔子甘艸豉湯主之若嘔者梔子生姜豉湯主之

梔子豉湯方

梔子十五箇擘 香豉綿裹四合

右二味以水四升先煮梔子得二升

半內豉煑取一升半去滓分爲二服
溫進一服得吐者止後服
梔子甘草豉湯方
梔子擘十枚　甘草炙二兩　香豉綿裹四合
右三味以水四升先煑梔子甘草取
二升半內豉煑取一升半去滓分二
服溫進一服得吐者止後服
梔子生姜豉湯方

梔子（擘）（古箇）　生姜（五兩）　香豉（綿裹）（罨）

右三味以水四升先煑梔子生姜取二升半內豉煑取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

発汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子

厚朴湯主之

梔子十罌（擘）厚朴四兩（去皮）枳實四枚（浸水矣令黃）

右三味以水三升半煑取一升半去

滓分二服溫進一服得吐者止後服

傷寒醫以丸菜大下之身熱不去微煩

者梔子乾薑湯主之大下之後復發汗（之津）

小便不利者勿治之得小便利必自愈

下之後復発汗必振寒脉微細註所以然者
以内外俱虚故也經下之後発汗晝日煩燥不
得眠夜而安静不吃不渇無表證脉沈
微身無大熱者乾姜附子湯主之

梔子乾姜湯方

梔子十箇擘 乾姜一両

右二味以水三升半煮取一升半去
滓分二服温進一服得吐者止後服

凡用抱子湯病人舊微濕者不可
與服之
乾姜附子湯方
乾姜二兩　附子一枚　生用去皮切片
右二味以水三升煮取一升去滓頓
服
大陽病發汗汗出不解其人仍發煩心
下悸頭眩身瞤動振々欲擗地者玄武湯

主之

咽喉乾燥者不可發汗

淋家不可發汗發汗必便血

瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痙

衄家不可發汗汗出則必額上陷脈

急緊直視不能眴不得眠

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰

疼與禹餘糧丸

病人有寒復發汗胃中冷吐蚘

本發汗而復下之此爲逆也若先

發汗治不爲逆本先下之而又汗

之此爲逆若先下之治不爲逆

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼

痛者急當救裏後身疼痛清便自調者

急當可救表救裏宜回逆湯救表宜圭

枝湯

病発熱頭痛脉反沈者□□若不差
身體疼痛當救其裏宜桂枝湯
大陽病先下而不愈因後発汗其人因
致冒
冒家汗出自愈所以然者汗出表和
故也裡未和然後復下之
大陽病未解脉陰陽俱停下之必先振

惡汗出而解註但陽脉微者汗出而解但陰脉微者下之而解經若欲下之宜調胃兼氣湯

大陽病發熱汗出者此榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默々不欲飲食心煩喜嘔或脇中煩而不嘔或渴或腹中痛或胸下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴

胡湯主之

柴胡半斤　黄芩三兩　人參三兩　半夏洗半升　甘草炙一兩　生薑切各三兩　大棗擘十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煮取三升温服一升日三服若胸中煩而不吐者去半夏人參加栝樓實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半加栝樓根四兩若腹

中痛者去黄芩加芍藥三兩若胸下
痞鞕去大棗加牡蛎四兩若心下悸
小便不利者去黄芩加茯苓四兩若
不渴外有微熱者去人參加桂支三
兩温覆微汗愈若欬者去人參大棗
生薑加五味子半升乾姜二兩
血弱氣盡腠理疎邪氣因入與正氣
相搏結於胸下正邪分爭往來寒熱

休作有時嘿々不欲飲食藏府相違其
病必下邪高病下故使吐也小柴胡
湯主之
服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之
得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足
温醫二三下之不能食而胸下滿痛
面目及身黄頸項強小便黄者與柴
胡湯後必下重

本渴飲水而呕者柴胡湯不中與
也食穀者噦

傷寒四五日身熱惡風頸項強胁下滿
手足温而渴者小柴胡湯主之

傷寒陽脉濇陰脉弦□□（法當腹中急痛）先與小建中
湯不差者小柴胡湯主之

小建中湯方
桂枝（去皮）三兩 甘州（炙）兩 大棗（擘）十枚 芍藥

六兩　生姜切三兩　膠飴升

右六味以水七升煮取三升去滓內飴更上微火消解溫服一升日三服

吒家不可用建中湯以甜故也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却復發

發汗出而解

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯

主之

大陽病十過經餘日反二三下之後四五日

柴胡證仍在者先與小柴胡湯呕不止

心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡

湯下之則愈

柴胡半斤　黄芩三兩　芍藥三兩　半夏洗

半升　生姜切五兩　枳實炙　大棗擘十二枚

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎溫服一升日三服（註）一方加大黃二兩

若不加恐不爲大柴胡湯

傷寒十三日不解胸脇滿而吧日晡所發潮熱已而微利（註）此本柴胡下之而不得利今反潮熱者實也利者知醫以丸藥下之非其治也

經先宜服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之

柴胡二兩十銖　黃芩一兩　人參二兩

甘艸炙一兩　生姜切一兩　半夏洗本云五枚二十銖　大棗擘

四枚　芒硝二兩

右八味以水四升煑取二升去滓內

芒硝更煎微沸分溫再服註不解更作

傷寒十三日不解時讝語過經者以有熱也

當以湯下之

若小便利者大便當鞕而反下利脉

調和者知醫以丸菜下之非其治也
若自下利者脉當微厥今反和者此
爲內実也調胃兼気湯主之

大陽病不解熱結膀胱其人如狂血自（血自下者愈）
下其外不解者尚未可攻當先解其外
外解已但小腹急結者乃可攻之宜桃
核兼気湯

桃仁（去皮尖）五十箇　大黄四兩　桂枝（去皮）三兩　甘草

二兩 芒硝 一兩

右五味以水七升煮取二升半去滓
內芒硝更上火微沸下火先食温服
五合日三服 註當微利

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利
讝語一身盡重不可轉側者柴胡加龍
骨牡蛎湯主之 註本云柴胡湯今加龍骨等

又方

柴胡四兩　龍骨　黃芩　生姜切

鉛丹　人參　桂支　茯苓各一兩半

半夏洗二合半　大黃二兩　牡蛎一兩半

大棗擘六枚

右十二味以水八升煮取四升內

大黃切如碁子更煮一兩沸去滓

温服一升

傷寒腹滿讝語寸口脈浮而緊
肝乘脾也名曰縱刺期門

傷寒発熱嚊々悪寒大渴欲飲水其
腹必滿自汗出小便利其病欲解
此肝乘肺也名曰横刺期門

大陽病二日反躁反熨背而大汗出大熨
入胃胃中水竭躁煩必發讝語㊟十餘日振
慄自下利者皆為欲解經故其発汗從腰以下不得

汗欲小便不得反嘔欲失溲足下悪風
大便鞕 註 小便當數而反不數及不多 經 大便已頭卓
數気下流故也
然而痛其人足心必熱
大陽病中風以火劫発汗邪風被火熱 冬其常度尚
相薫灼
血気流溢其身必発黄 註 陽盛則欲飲陰虚則小便鞕
陰陽俱虚竭身体則枯燥 經 但頭汗出劑頸而還腹
滿微喘口乾咽爛或不大便反則譫語
甚者至喘手足躁擾捻衣摸床 註 小便利者

傷寒脉浮醫以火迫劫(亡陽)之必驚狂臥起不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龍骨救逆湯主之

桂枝(去皮)三兩　甘草(炙)二兩　生姜(切)三兩　大棗(擘)十枚　牡蛎(熬)五兩　蜀漆(洗去腥)三兩　龍骨四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一

外註本云桂枝湯今去芍加蜀漆牡蛎龍骨
形作傷寒其脉不弦堅而弱弱者必
渴被火必譫語弱者發熳脉浮者解
之當汗出愈
大陽病以火熏之不得汗其人必躁必
到經不解
清血名爲火邪
火邪脉浮熳甚而反此爲実今以虛治
必咽燥吐血

微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲（追虛追實）煩逆血散脉中火気雖微内攻有力（焦骨傷筋）血難復也

脉浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺欲（火逆）自（之也）解者必當先煩乃有汗而解（註）何以知之脉浮知汗出解

燒針令其汗針處被寒挾起而赤者必

発奔豚（気從小腹上衝心者）灸其挾上各一壯與桂枝加桂湯（註）更加桂枝二両也本云桂枝湯今加圭五両所以加圭者以能治奔豚気也

火逆下之因燒針煩燥者桂枝甘艸龍骨牡蛎湯主之

桂枝（去皮）一両　甘艸（炙）二両　牡蛎（熬）二両　龍骨二両

右四味以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

太陽傷寒者加温針必驚也

大陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒不發熱（脈浮上）細數者以醫吐之過也（此爲小逆也）

一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲冷食朝食夕吐以醫吐之所致也

大陽病吐之但大陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此爲吐之内煩也

病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者此以発汗令陽気微膈気虚脉乃數也數爲客熱不能消穀以胃中虚冷故吐也

大陽病十餘日（遍經）心下温々欲吐而胸中痛大便反糖腹微滿鬱々微煩先此時自極吐下者與調胃兼気湯（註）若不爾者不可與○但欲胸中痛微糖者此非柴胡湯證以吃故知極吐也

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反
不結胸其人發狂者以熱在下焦小腹
當鞕滿小便自利者下血乃愈(註)所以然者以
大陽隨症熱熱在裏故也(經)抵當湯主之
水蛭 熬 去翅足熬 虻蟲 各三十箇 桃仁 去皮尖 二十箇 大黃 酒洗 三兩
右四味以水五升煮取三升去滓溫
服一升不下更服
大陽病身黃脉沉結小腹鞕小便自利 小便不利者爲無血也

其人如狂者（血證諦也）抵當湯主之

傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利（爲有血也）者當可下之宜抵當丸（不可餘茱）

水蛭（熬）二十箇　䗪虫（去翅足之熬）二十箇　桃仁（去皮尖）二十五箇　大黃三兩

右四味擣分四丸以水一升煑一丸取七合服之晬時當下血（若不下者更服）

[illegible]天陽病小便利者以飲水多必心

STAATS-BIBLIOTHEK PREUSSISCHER KULTURBESITZ BERLIN

下懸心便少者必苦裏急也

和氏備寫論

坤

修琴堂藏書
第 傷寒論 110 號

Roma - OA

4° 448062 - 2

辨大陽病　結胸

問曰病在結胸有藏結其狀如何
荅曰按之痛寸脉浮弱脉沉名曰
結胸也何謂藏結荅曰如結胸狀
飲食如故時々下利寸脉浮關脉小
細沉緊名曰藏結舌上白胎滑者
難治
藏結無陽症不往来寒熱其人反

大塚藏書

靜舌上胎滑者不可攻也

病發於陽而反下之熱入因作結胸

病發於陰而反下之因作痞也

所以成結胸者以下之太早故也

結胸者項亦強如柔痙狀下之則和

宜大陷胸丸

結胸證其脉浮大者不可下下之則

死結胸證悔是煩燥者亦死

STAATS-
BIBLIOTHEK
PREUSSISCHER
KULTURBESITZ
BERLIN

(448062)

太陽病脉浮而動数（注）浮則為風数則為熱動則為痛数則為虚（経）頭痛発熱微盗汗出而反悪寒者表未解也醫反下之動数変遅膈内（胃中空虚客気動膈）拒痛短気躁煩心中懊憹陽気内陷心下因鞕則為結胸大陷胸湯主之若不大結胸但頭汗出餘處無汗剤頸而還小便不利身必発黄也宜大陷胸丸

大陷胸湯方

大黄去皮六兩　芒硝一升　甘遂二錢

右三味以水六升先煮大黄取二升去滓内芒硝煮一兩沸内甘遂末温服一升得快利止後服

大陷胸丸方

大黄半斤　葶藶子熬半升　芒硝半升

杏去皮尖熬黑仁半升

右四味擣篩二味内杏仁芒硝合研

如腊和散取如彈丸一枚別搗甘遂
末一錢匕白蜜二合水二升煮取一
升温頓服之一宿乃下如不下更服
取下為效禁如藥法

傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下
痛按之石鞕者大陷胸湯主之

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者
與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也
無大熱者此為水結在胸脇也

出者大陷胸湯主之

大陽病重発汗而復下之不大便五六日舌上燥而渇日晡所小有潮熱発心胸大煩従心下至少腹鞕満而痛不可近者大陷胸湯主之少結胸者正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之

黄連一両　半夏半升洗　栝蔞実大者一枚

右三味以水六升先煮栝蔞実取三

升去滓內諸菜煑取二升去滓令溫

三肢

大陽病二三日不能臥但欲起心下必

結脉微弱者（此本有寒飲也）反下之若利止必作結胷

未止者四五日復下之此作協熱利也

大陽病下之其脉促不結胷者（此爲欲解也）□□□

□□□

脉浮者必結胷脉緊者必咽痛脉弦

者必兩脅拘急脉細數者頭痛未止
脉沉緊者必欲吐脉沉滑者協熱利
脉浮滑者必下血

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若
灌之其熱被劫不得去弥更益煩肉上
粟起意欲飲水反少渴者服文蛤散若
不差者与五苓散寒實結胸無熱證者
與三物小陷胸湯(註)白散亦可服

文蛤散

文蛤 兩

右一味爲散以沸湯和一方寸匕服湯用五合

白散

桔更 三分

巴豆 一分 去皮去熱黑研如脂

貝母 三分

右三味爲散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢匕羸者

減之病在膈上必吐在膈下必利
不利進獖粥一杯利過不止進冷
粥一杯

五苓散

身獖皮粟不解欲引衣自覆者若以
水潠之洗之益令獖劫不得出當汗
而不汗則煩假令汗出已腹中痛與
芍藥三兩如上法

太陽與少陽併病頸項強痛或眩
冒時如結胸心下痞鞕者當刺太
椎第一間腦俞肝俞慎不可發汗
發汗則讝語脉弦五日讝語不止
當刺期門
婦人中風發熱惡寒經水適來得
之七八日熱除而脉遲身涼胸脅
下滿如結胸狀讝語者此為熱入

血室也當刺期門隨其實而取之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時
經水適斷者其血必結故使如瘧狀發
作有時小柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了
暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血
室無犯胃気及上二焦必自愈

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微

吐心下支結外證未去者柴胡桂支湯主之

桂枝 去皮 一兩 半 黃芩 一兩半 人參 一兩半 甘草 炙 一兩半 半夏 洗 二合半 芍藥 一兩半 大棗 擘 六枚 生薑 切 一兩半 柴胡 四兩

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升 註 本云人參湯作如上支法加半夏柴胡黃芩復如柴胡法今用人參作各半劑

傷寒五六日已発汗而復下之胸滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者（疑未解也）柴胡桂枝乾姜湯主之

柴胡半斤　桂枝（去皮）二兩　乾姜二兩　栝蔞根四兩　黄芩二兩　牡蛎（熬）二兩　甘草（炙）二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服初服微煩後服汗出便愈

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脉細者

此爲陽微結必有表復有裏也脉沉亦有裏也

註 汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脉雖沉緊不得爲少陰病所以然者少陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也

經

可與小柴胡湯設不了々者得屎而解

傷寒五六日嘔而発熱者柴胡湯證具而以他菜下之柴胡證仍在者復與柴胡湯必蒸々而振却発熱汗出而解若心

此雖已下之不爲逆也

下滿而鞕痛者大陷胸湯主之但滿而（此爲結）
不痛者（此爲痞）柴胡不中與之宜半復瀉心湯

半復（洗）半升　黃芩　乾姜　人參
甘中（炙）各三兩　黃連一兩　大棗（擘）十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再
煎取三升溫服一升日三服

太陽少陽併病而反下之成結胸心下
鞕下利不止水漿不下其人心煩□□

脉浮而緊復下之緊反入裏則作痞
按之自濡但氣痞耳

大陽中風下利嘔逆(註表解者乃可攻之)經其
人漐漐汗出発作有時頭痛心下痞鞕滿
引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者十
棗湯主之
芫花熬 甘遂 大戟
(此表解裏未知也)

右三味等分各別搗爲散以水一升半先煑大棗肥者十枚取八合去滓内莓末（註）強人服一錢匕羸人者服半錢（經）溫服（平旦服）之若下少病不除者明日更服（加半錢）得快下利後糜粥自養

大陽病醫発汗遂発熱惡寒因復下之心下痞（註）無陽則陰獨表裏但虛陰陽気並竭（經）復加燒針因胸煩（註）面色青黄膚瞤者難治今色微黄手足溫者易愈（經）

心下痞按之濡其脉浮者大黄黄連瀉
心湯主之心下痞而復惡寒汗出者附
本以下之故
子瀉心湯主之心下痞與瀉心湯痞不
解其人渴而口燥煩小便不利者五苓
散主之註一方云忍之一日乃愈

大黄黄連瀉心湯方

大黄二兩　黄連　黄芩各二兩

右三味以麻沸湯二升漬之須臾絞

去滓分温再服

附子浮心湯方

大黄二兩 黄連一兩 黄芩一兩 附子炮去皮

破別煮取汁二枚

右四呆切三味以麻沸湯二升漬之

須臾絞去滓内附子汁分温再服

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕

乾噫食臭脅下脊水気腹中雷鳴下利

者生姜浮心湯主之

生姜切四兩　甘中炙三兩　人參三兩　乾姜

兩　黃芩三兩　半夏洗半升　黃連一兩

大棗擘十二枚

右八味以水一斗煑取六升去滓再

煎取三升溫服一升日三服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十

行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾

呃心煩不得安醫見心下痞謂病不尽復下之其痞益甚此非結熱 註但以胃中虛客気上逆故便鞕也 經 甘中泻心湯主之

甘中炙四兩 黃芩三兩 乾姜三兩 半夏洗半升 大棗十二枚 黃連一兩

右六味以水一斗煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服 註 附子瀉心湯本云加附子半夏瀉心湯甘中瀉心湯同體別名耳生姜

瀉心湯本去理中人參黃芩湯去桂枝木加黃連并浮肝法

傷寒服湯菜下利不止心下痞鞕服浮心湯已復以他菜下之利不止醫以理中与之利益甚 註 理中者理中焦此利在下焦 經 赤石脂禹餘粮湯主之 註 復不止者當利其小便

赤石脂碎一斤 太一禹餘粮碎一斤

右二味以水六升煑取二升去滓分溫三服

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九
日心下痞鞕胷下痛氣上衝咽喉眩
冒經脉動惕者久而成痿

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫
気不除者旋復代赭湯主之

旋復花三兩　人參三兩　生姜五兩
代赭一兩　甘草(炙)三兩　半夏(洗)半升　大棗(擘)
十二枚

麥冬 茅以水一斗煮取六升去滓再
煎取三升溫服一升日三服
喘家下後不可更行桂支湯若汗出
而喘無大熱者可与麻黃杏子甘草
石膏湯
大陽病外證未除而数下之遂協熱而
利下不止心下痞鞕表裏不解者桂支
人參湯主之

桂支（別切）四兩　甘草（炙）四兩　白朮三兩　人參三兩　乾姜三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取二升去滓溫服一升（註）日再夜一服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者不（表未解也）可攻痞當先解表表解乃可攻痞（註）解表宜桂枝人參湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

傷寒發狹汗出不解心中痞鞕吐而
下利者□□□□□之
病如桂支證頭不痛項不強寸脉微
浮胸中痞鞕気上衝喉咽不得息者
（此爲胸中有寒飲也）當吐之瓜蒂散
瓜蒂（熬黄）一分　赤小豆一分
右二味各別擣篩爲散已合治之取
一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮

作稀糜去滓取汁和散温頓服之不吐者少々加得快吐乃止（註）諸凶血虚家不可

共瓜蒂散

病脅下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死

傷寒若吐若下後七八日不解（註）熱結在裏

【經】表裏俱熱時々惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水数升者白虎加人參湯主之

知母六兩　石膏碎斤　甘草炙二兩　人參二兩　粳米六合

右五味以水一斗煑米熟湯成去滓溫服一升日三服

註此方立夏後立秋前乃可服立秋後不可服正月二月三月尚凜冷亦不可與服之与之則吧利而腹痛○諸亡血虛家亦不可与得之則腹痛下利者但可溫之當愈

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

傷寒脉浮發熱無汗經其表不解者不可与白虎湯
經渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

大陽少陽併病心下鞕頸項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞愼勿下之

大陽与少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生姜湯主之

黄芩湯

黄芩三両　芍薬二両　甘草炙二両　大棗擘十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升註日再夜一服

黄芩加半夏生姜湯

黄芩三両　芍薬二両　甘草炙二両　大棗擘十二枚　半夏洗半升　生姜切一両半

右六味以水一斗煑取三升去滓温
服一升 註 日再夜一服

傷寒胷中有熱胃中有邪気腹中痛欲
吐吐者黄連湯主之

黄連三両 甘中炙三両 乾姜三両 桂枝去皮
三両 人参二両 半夏洗半升 太棗擘十二枚

右七味以水一斗煑取六升去滓温
服 註 昼三夜二疑非中景法 昼三夜二

傷寒八九日風濕相搏身体疼煩不能
自轉側不吐不渴脉浮虛而濇者桂枝
附子湯主之若其人大便鞕(臍下心下鞕)小便不利
者去桂加白朮湯主之

桂枝附子湯

桂枝(去皮)四両
附子(炮去皮破)三枚
生姜(切)三両
大棗(擘)十二枚
甘草(炙)二両

右五味以水六升煮取二升去滓分

温三服

去桂加白术湯

附子三枚（炮去皮破）　白术四兩　生姜切三兩　甘草炙二兩　大棗擘十二枚

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服

初一服其人身如痺半日許復服之三服都盡其人如冒狀勿怪此以附

子米併走皮內逐水氣未得除故使
之耳口法當加桂四兩註朮一方二法以大便
鞕小便不利去桂也以大便不鞕小便不利當加生附子三枚處弱家
恐多也
及產婦宜減服之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近
之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不
欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之
甘草二兩炙 附子二枚炮去皮破 白朮二兩 桂枝去皮

四兩

右四味以水六升煮取三升去滓溫
服一升日三服（註）初服得微汗則解能食汗出止
復煩者將服五合恐一升多者宜服六七合爲妙

傷寒脉浮滑白虎湯主之

知母六兩　石膏碎一斤　甘草炙二兩　粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓

温服一升日三服

傷寒解而後脉結代心動悸炙甘中湯

主之

甘草炙四兩　生姜切三兩　人參二兩　生地

黄一斤　圭支去皮三兩　阿膠二兩　麦門冬去心

半升　麻仁半升　大棗擘三十枚

右九味以清酒七升水八升先煑八

味取三升去滓内膠烊消尽温服一

升日三服 一名復脉陽

脉按之未緩時一止復来者名曰
結又脉来動而中止更来小數中
有還者又動名曰結陰也脉来動
而中止不能自還因而復動者名
曰代陰也得此脉者必難治

辨陽明病

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

陽明之爲病胃家實是也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病

發汗若下若利小便此亡津液胃
中乾燥因轉屬陽明不更衣內實
大便難者此名陽明也
問曰陽明病外證云何答曰身熱
汗自出不惡寒反惡熱也
問曰病有得之一日不發熱而惡
寒者何也答曰雖得之一日惡寒
將自罷即自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居
中主土也萬物所歸無所復傳始
雖惡寒二日自止此爲陽明病也
本大陽初得病時發其汗汗先出不
徹因轉屬陽明也
傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出
濈然者是轉屬陽明也
傷寒三日陽明脉大

傷寒脉浮而緩手足自温者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便雖者爲陽明病

傷寒轉繫陽明者其人濈然微汗出也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿

小便難也

陽明病若能食名中風不能食名中寒

陽明病若中寒者不能食小便不利手足濈然汗出又大便初鞕後溏(註)

(註)所以然者以胃中冷水穀不別故也

陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕如有熱狀奄然發

狂□□□□濈然汗出而解（註）汗出而解

者此水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈

陽明病欲解時從申至戌上

陽明病不能食攻其熱必噦（註）所以然者

以其人本虛攻其熱必噦

胃中虛冷故也

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭

眩必小便難雖下之腹滿如故（註）所以

然者脉遲故也

陽明病法多汗反無汗其身如蟲
行皮中狀者此以久虛故也
陽明病反無汗而小便利二三日
嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不
欬不嘔手足不厥者頭不痛
陽明病但頭眩不惡寒故能食而
欬其人咽必痛若不欬者咽不痛
陽明病無汗小便不利心中懊憹(懊憹)者

身必發黃

陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃

陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

陽明病口燥但欲漱水不欲燕者此必衄

陽明病本自汗出醫更重發汗病已

差尚微煩不了者以亡津液胃中乾
燥故令大便鞕（此必大便鞕也）（註）當尚其小便日幾行若本
小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液
當還入胃中故知不久必大便也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之
陽明病心下鞕滿者不可攻之攻
之利遂不止者死利止者愈
陽明病面合赤色不可攻之必發

燥色黃者小便不利也

陽明病不吐不下心煩者可与調胃承氣湯

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱手足濈然汗出者大承氣湯主之（有潮熱者非欲解可攻裏也）（汗出者此大便已鞕也）

若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可与承氣湯若腹大滿不

通者可与小柴胡湯微和胃氣勿令
至大泄下

大柴氣湯

大黄四兩（酒洗）　厚朴半斤（炙去皮）　枳實五枚（炙）　芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓内大黄更煮取二升去滓内芒硝更上微火一二沸分温再服（註得下）

餘勿服

小柔氣湯

大黃四兩　厚朴二兩　炙去皮　枳實三枚　炙者

右三味以水四升煮取一升二合去

滓分温二服　註　初服湯當更衣不更衣者盡飲之若

更衣者勿服之

陽明病潮熱大便微鞕者可与小柔氣

不鞕者不可与之

湯

若不大便六七日恐有燥屎欲知之
法少与小柴氣湯湯入腹中轉矢氣
者此有燥屎也乃可攻之若不轉矢
氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之
攻之必脹滿不能食也欲飲水者与
水則噦其後發熱者必大便復鞕而
少也以小柴氣湯和之不轉失氣者
慎不可攻也

夫實則讝語虛則鄭聲(註)鄭聲重語也

直視讝語喘滿者死下利者亦死

發汗多若重發汗者亡其陽讝語

脉短者死脉自和者不死

傷寒若吐若下後不解不大便五六日

以上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒

獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循

脉弦者生濇者死微者但發潮熱

衣摸牀惕惕而不安微喘直視讝語者

大兼氣湯主之 註 若一服利則止後服

陽明病其人多汗以津液外出胃中
燥大便必鞕鞕則讝語小兼氣湯主
之若一服讝語止者更莫復服

陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小
兼氣湯主之

因与兼氣湯一升腹中轉氣者更
服一升若不轉氣者勿更与之明

日又不大便脉反微濇者裏虛也
爲難治不可更与兼氣湯也
陽明病讝語有潮熱反不能食者
胃中必有燥屎五六枚若能食者
但鞕耳宜大承氣湯下之
陽明病下血讝語者此爲熱入血
室但頭汗出者刺期門隨其實而
瀉之濈然汗出則愈

汗出讝語者以有燥屎在胃中也須
下者過經乃可下之下之若早語言
心乱以表虚裏実故也宜大承気湯
傷寒四五日脉沈而喘満而反発其
汗津液越出大便為難表虚裏実久
則讝語
三陽合病腹満身重難以転側口不仁
面垢讝語遺尿発汗讝語□□□□下之

則額上生汗手足逆冷若自汗出者白
虎湯主之

二陽併病大陽證罷但發潮熱手足漐
汗出大便難而譫語者下之則愈宜大
柴胡湯

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘
發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗
則躁心憒憒反譫語若加温針必怵惕煩

躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動
膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之
若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參
湯主之若渴欲飲水小便不利者猪苓
湯主之
（脈浮發熱）

陽明病汗出多而渴者不可与猪
苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利
其小便故也

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者回
逆湯主之
若胷中虛冷不能食者飲水則噦
脉浮発熱口乾鼻燥能食者則衄
陽明病下之其外有熱手足温（小結胸）心中懊
憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主
之
陽明病発潮熱大便溏小便自可胷脅

滿不去者柴胡湯主之

陽明病胷下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可与小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解

陽明病中風脉弦浮大而短氣腹都滿胷下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黄小便難有潮熱時々噦耳前後腫刺之小差外不解病

過十日脉續浮者與小柴胡湯脉但浮
無餘症者與麻黄湯註若不尿腹滿加噦者不治
此爲津液內竭
陽明病自汗出若発汗小便自利者
雖鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜
煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁
皆可爲導
蜜煎方
食蜜七合

右一味於銅器內微火熬當須凝如
飴狀攪之勿令焦著候可丸併手捻
作挺令頭銳大如指長二寸許當熟
時急作冷則鞕以內穀道中以手急
抱欲大便時乃去之已試甚良
疑非仲景意
又大猪膽一枚瀉汁和少許淡醋以
灌穀道內如一食頃當大便出宿食
惡物甚効

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可発汗宜桂枝湯

陽明病脉浮無汗而喘者発汗則愈宜麻黄湯

陽明病発熱汗出者（此為熱越）不能発黄也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渇引（此為瘀熱有裏）水漿者身必発黄茵蔯蒿湯主之

茵蔯蒿六兩　梔子（擘）十枚　大黄二兩（去皮）

右三味以水一斗二升先煮茵蔯減六升內二味煮取三升去滓分三服小便當利（註）尿如皂荚汁狀色正赤一宿腹滅黃從小便去也

陽明證其人喜忘（所以然者本有久瘀血故令喜忘）大便反易而其色必黑者宜抵當湯下之

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥

屎者宜大柴氣湯註若有燥屎者可攻腹微滿初
頭鞕後必溏者不可攻之

病人不大便五六日繞臍痛煩燥發
作有時者此有燥屎故使不大便也
病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡
所發熱者屬陽明也脉實者宜下之
脉浮虛者宜發汗下之与大柴氣湯
發汗宜桂枝湯

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛
有此有燥屎也宜大承氣湯
（雖然者本有病食故也）

病人小便不利大便乍鞕乍易時有
微溏喘冒不臥者有燥屎也宜大
承氣湯

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之

註得湯反劇者屬上焦也

太陽病脉緩浮弱其人發熱汗出復
（寸關尺）

惡寒不吧但心下痞者此以醫下之
也如其不下者病人不惡寒而渴小
便數者大便必鞕不更衣十日無所
苦也渴欲飲水少少与之但以法救之
渴者宜五苓散

渴者此轉屬陽明也

脉陽微而汗出少者爲自和也汗
出多者爲大過陽脉實因發其汗
汗出多者亦爲大過大過者爲陽

絶於裏亡津液大便因鞕也
脉浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相
搏胃氣生熱其陽則絶
趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則
小便數浮濇相搏大便則難其脾
爲約麻子仁丸主之

麻子仁二升　芍藥半斤　枳實去皮半斤
大黄去皮一斤　厚朴去皮炙一尺　杏仁去皮尖熬一升

右六味蜜和丸如梧桐子大飲服十
丸日三服（註）斷加以知爲度

大陽病之日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃
也調胃兼氣湯主之

傷寒吐後腹脹滿者与調胃兼氣湯
大陽病若吐若下若発汗後微煩小
便数大便因鞕者与小兼氣湯和之

得病十三日脉弱無大陽柴胡證煩躁心下鞕至四五日雖能食以小柴氣湯少々与之微和之令小安至六日与柴氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不受食但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大柴氣湯

傷寒六七日目中不了睛不和無表裏證大便難身微熱者急下之宜大

此爲実也

羕氣湯

陽明病発熱汗多者急下之宜大

羕氣湯

発汗不解腹滿痛者急下之宜大

羕氣湯腹滿不減減不足言當下之宜大羕氣湯

其脉不負者爲順也

陽明少陽合病必下利（註）負者失也互相尅

其脉不負者爲順也

賊名爲負也

論脉滑而数者有病食也當下之宜大承氣湯

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮数者可下之假令已下脉数不解合熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脉数不解而下不止必協熱便膿血也

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以
寒濕在裏不解故也以爲不可下也
□□□□□□□□註於寒濕中求之
傷寒七八日身黃如橘子色小便不利
腹微滿者茵蔯蒿主之
傷寒身黃發斑者梔子蘗皮湯主之
肥梔子十五箇　甘草一兩炙　黃蘗二兩
右三味以水四升煮取一升半去滓

分温再服

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軺
赤小豆湯主之

麻黃二兩 去節
連軺二兩 連翹根是之
杏仁四十箇 去皮尖
赤小豆一升 大棗十二枚 擘
生梓白皮一升 切
生姜二兩 切
甘草二兩 炙

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸
去上沫內諸葉煮取三升去滓分温

三股

註 半日股盡

辨少陽病

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

少陽病兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽

此屬胃胃不和煩而悸

少陽不可發汗發汗則讝語胃和則愈

本大陽病不解轉入少陽者宜下韓滿

乾嘔不能食往来寒熱尚未吐下脉沉緊者与小柴胡湯

若已吐下発汗温針讝語柴胡證罷此爲壞病㊟知犯何逆以法治之

三陽合病脉浮上關上大但欲眠睡目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽去入陰故也

傷寒三日三陽爲尽三陰當受邪
其人反能食而不吐此三陰不受
邪也
傷寒三日少陽脉小者欲已也
少陽病欲解時從寅至辰上

辨大陰病

大陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕

大陰中風四肢煩疼脉陽微陰濇而長者爲欲愈

大陰病欲解時從亥至丑上

大陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

大陰病脉浮者少可發汗宜桂枝湯自利不渴者屬大陰其藏有寒故也

當温之（註）宜服四逆輩

傷寒脉浮而緩手足自温者繫在大陰當発身黄若小便自利者不能発黄□□□□至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止（註）脾家實腐穢當去故也

本大陽病醫反下之因爾腹満時痛者桂枝加芍茱湯主之大実痛者主支加大黄湯主之

属大陰也

桂枝加芍藥湯

桂枝去皮三兩　芍藥六兩　甘草二兩炙　大棗擘十二枚　生薑切三兩

右五味以水七升煮取三升去滓温分三服（註）本云桂枝湯今加芍藥

桂枝加大黃湯

桂枝三兩去皮　大黃二兩　芍藥六兩　生薑切三兩　甘草二兩炙　大棗擘十二枚

右六味以水七升煮取三升去滓温
服一升日三服

大陰為病脉弱其人續自便利設
當行大黄芍藥者宜減之以其人
胃氣弱易動故也

辨少陰病

少陰之為病脉微細但欲寐也

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六
偏少陰也
日自利而渴者虛故引水自救若小
便色白者少陰病形悉具(註)小便白者以下焦
虛有寒不能制水故令色白也

病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽
也此偏少陰法當咽痛而復吐利

少陰病欲而下利讝語者被大氣却故也小便必難以強責少陰汗也

少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗

少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱濇者復不可下之

少陰病脉緊至七八日自下利脉

暴微手足反温脉緊反去者爲欲
解也雖煩下利必自愈
少陰病下利若利自止惡寒而蹉
臥手足温者可治
少陰病惡寒而蹉時自煩欲去衣
被者可治
少陰中風脉陽微陰浮者爲欲愈
少陰病欲解時從子至寅上

少陰病吐利手足不逆冷反發熱
者不死脈不至者灸少陰七壯
少陰病八九日一身手足盡熱者
以熱在膀胱必便血也
少陰病但厥無汗而強發之必動
其血未知從何道出或從口鼻或
從目出者是名下厥上竭為難治
少陰病惡寒身蜷而利手足逆冷

者不治

少陰病吐利躁煩四逆者死

少陰病下利止而頭眩時自冒者死

少陰病四逆惡寒而身蜷脈不至不煩而躁者死

少陰病六七日息高者死

少陰病脈微細沈但欲臥汗出不

煩自欲吐至六七日自利復煩躁
不得臥寐者死
少陰病始得之反發熱脈沉者麻黄細
辛附子湯主之
麻黄二兩去節 細辛二兩 附子一枚炮去皮破六片
右三味以水一斗先煮麻黄減二升
去上沫内諸藥煮取三升去滓温服
一升日三服

少陰病得之二三日麻黄附子甘艸湯

微発汗 註 以二三日無裏證故微発汗也

麻黄去節二兩　甘艸炙二兩　附子炮去皮破八片一枚

右三味以水七升先煑麻黄一兩沸

去上沫内諸菜煑取三升去滓温服

一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得

臥者黄連阿膠湯主之

黄連四兩　黄芩二兩（一云三挺）　芍藥二兩　雞子黄二枚　阿膠三兩

右五味以水六升先煮三物取二升去滓内膠烊尽小冷内雞子黄攪令相得温服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背悪寒者附子湯主之

附子（炮去皮破八片）二枚　茯苓三兩　人參二兩　白朮

四兩 芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升去滓一

升日三服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者

附子湯主之

少陰病下利便膿血者桃花湯主之

赤石脂一斤 一半全用一半篩末

乾姜一兩 粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓內

赤石脂末方寸匕日三服 温服七合 註若服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

少陰病下利便膿血者可刺

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

吳茱萸一升 人參二兩 生姜切 大棗擘 十枚

右四味以水七升煮取二升去滓温
服七合日三服

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯
主之

猪膚一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加
白蜜一斤白粉五合熬香和令相得
温分六服

少陰病二三日咽痛者可与甘艸湯不
差与桔梗湯
甘草湯方
甘艸二両
右一味以水三升煮取一升半去滓
温服七合日三服
桔梗湯方
桔梗二両 甘艸二両

右二味以水三升煮取一升去滓溫
分再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不
出者半夏苦酒湯主之

半夏十枚（洗破如棗核）
雞子一枚（去黃內上苦酒着雞子殼中）

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼
置刀環中安火上令三沸去滓少少含
嚥之不差更作三劑

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

半夏（洗）　桂枝（去皮）　甘草（炙）

右三味等分各別擣篩已合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煮七沸內散兩方寸匕更煮三沸下火令小冷以嘰之（註）半夏有毒不當散服

少陰病下利白通湯主之

葱白四莖　乾姜一兩　附子一枚　生去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分

温再服

少陰病下利脉微者與白通湯利不止

厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯

主之（註）服湯脉暴出者死微續者生

葱白四莖　乾姜一兩　附子　生去皮破八片

人尿五合　猪膽汁一合

右五味以水三升煮取一升去滓內
膽汁人尿和令相得分温再服（註）若無
膽亦可用

少陰病二三日不已至四五日腹痛小
便不利四肢沉重疼痛自下利（自下利者此為有水気也）其人或
欲或小便利或下利或嘔者玄武湯主
之

茯苓三兩　芍藥三兩　白朮三兩　生薑切

三兩　附子一枚

右五呆以水八升煑取三升去滓温

服七合日三服

若欬者加五味子半升細辛一兩乾

姜一兩若小便利者去茯苓若下利

者去芍菜加乾姜二兩若吧者去附

子加生姜足前爲半斤

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆

脉微欲絶身反不惡寒其人面色赤或
腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者
通脉回逆湯主之
甘草二両 炙 附子大者一枚 生用去皮破八片
乾姜三両 強人可喎両
右三味以水三升煮取一升二合去
滓分温再服
其脉即出者愈面色赤者加葱九莖
腹中痛者去葱加芍薬二両嘔者加

生姜二兩咽痛者去芍藥加桔更一
兩利止脉不出者去桔梗加人參二
兩 註 脉病皆与方相應者乃服之
四逆
少陰病其人或欬或悸或小便不利或
腹中痛或泄利下重者四逆散主之
甘草炙 枳實破水漬炙乾 柴胡 芍藥
右四味各等分擣篩白飲和服方寸
匕日三服

欬者加五味子乾姜各五分等主下利悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚炮令折泄利下重者先以水五升煮薤白三莖煮取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

豬苓　茯苓　阿膠　澤瀉
各兩

右五味以水四升先煮四物取二升
去滓內阿膠烊尽温服七合日三服
少陰病得之二三日口燥咽乾者急
下之宜大承氣湯

少陰病自利清水色純青心下必痛口
乾燥者可下之宜大承氣湯

少陰病六七日腹脹不大便者急
下之宜大羌氣湯

少陰病脉沉者急温之宜回逆湯

甘艸炙二兩　乾姜一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煑取一升二合去
滓分温再服

強人可大附子一枚乾姜三兩

少陰病飲食入口則吐心中温欲吐復

不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中实當吐之
也若膈上有寒飲乾吐者不可吐也當
温之宜四逆湯

少陰病下利脉微澁吐而汗出必
數更衣反少者當温其背上灸之

辨厥陰病

厥陰之爲病氣上撞心心中疼熱飢而
(消渴)
不欲食食則吐(吐蚘)下之利不止

厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲
未愈

厥陰病欲解時從丑至卯上

厥陰病渴欲飲水者少與之愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

傷寒先厥後發熱而利者必自止
見厥復利
傷寒始發熱六日厥反九日而利
凡厥利者當不能食今反能食者
恐爲除中食以索餅不發熱者知
胃氣尚在必愈恐暴熱未出而復
去也後三日脈之其熱續在者□
期之旦日夜半愈所以然者本發

熱六日厥反九日復発熱三日并
六日亦爲九日与厥陰相應故期
之旦日夜半愈後三日脉之而脉
数其熱不罷者此爲熱氣有餘必
發癰膿也

傷寒脉遲六七日而反与黄芩湯
徹其熱脉遲爲寒今与黄芩湯復
除其熱腹中應冷當不能食今反

能食此名除中必死

傷寒先欬後発熱下利必自止而
反汗出咽中痛者其候爲痺発熱
無汗而利必自止若不止必便膿
血便膿血者其喉不痺

傷寒二三日至四五日欬者必発
熱前熱者後必欬欬深者熱亦深
欬微者熱亦微欬應下之而反発

汗者必口傷爛赤

傷寒病厥五日熱亦五日設六日

當復厥不厥者自愈厥終不過五

日以熱五日故知自愈

凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥(註)

厥者手足厥冷者是

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人

躁無暫安時者非爲蚘厥也(註)蚘厥者其(此爲蔵厥)

人當吐蚘論令病者靜而復時煩（註）此爲藏寒蚘上入其膈故煩論須臾復止得食而嘔又煩其人當自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之（註）煩者蚘聞食臭出又主久利

烏梅三百枚　細辛六兩　乾姜十兩　黃連十六兩　當歸四兩　附子炮去皮十兩　蜀椒出汗四兩　桂枝去皮六兩　人參六兩　黃檗六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏

梅一枚去核蒸之五斗米下飯熟搗
成泥和菜令相得內臼中与蜜杵二
千下丸如梧桐子大先食飲服十丸
日三服稍加至二十丸禁生冷滑物
臭食等

傷寒欬少厥微指頭寒嘿嘿不欲食
煩躁數日小便利色白者此欬除
也欲得食其病爲愈若厥而嘔胷

發煩滿者其後必便血

病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

傷寒発熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多者其病當愈四日至七日熱不除者必便膿血

傷寒厥四日熱反三日復厥五日

其病爲進寒多熱少陽氣退故爲進也

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁多欲飲厥不還者死

傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

傷寒發熱下利至甚厥不止者死

傷寒六七日不利便發熱而利其

人汗出不止者死有陰無陽故也

傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此亡血下之死発熱而厥七日下利者爲難治

傷寒脈促手足厥逆者可灸之

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

手足厥寒脈細欲絶者當歸四逆湯主之

之

若其人內有久寒者宜當歸回逆加吳

茱萸生姜湯

又方

當皈三兩　桂枝去皮三兩　芍菜三兩

細辛三兩　甘草炙二兩　通艸二兩

大棗擘一法十二枚二十五枚

右七味以水八升煑取三升去滓

温服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生姜湯

當歸三兩　芍藥三兩　甘草（炙）二兩

通草二兩　桂枝（去皮）三兩　細辛三兩

生姜（切）半斤　茱萸二升　大棗（擘）二十五枚

右九味以水六升清酒六升和煮

取五升去滓分温五服

大汗出熱不去内拘急四肢疼又

下利厥逆而惡寒者四逆湯主之
大汗若大下利而厥冷者四逆湯主
之

病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胷
中心下滿而煩飢不能食者病在胷
中當須吐之瓜蒂散

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯
苓甘艸湯却治其厥不爾水漬入胃

必作利也

傷寒六七日大下後脉沉(寸)而遲手足厥逆与回逆湯下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者(爲難治)屬麻黄升麻湯

麻黄(去節)二兩半　升麻一兩一分　當皈一兩一分

知母十八銖　黄芩十八銖　萎蕤(一作菖蒲)十八銖

芍菜六銖　天門冬(去心)六銖　桂支(去皮)六銖

茯苓六銖　甘草炙六銖　石膏六銖　碎綿裹
白朮六銖　乾姜六銖

右十四味以水一斗先煮二麻黃一
兩沸去上沫內諸藥煮取三升去
滓分溫三服相去如炊三斗米頃
令尽汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣
少腹者此欲自利也

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆
吐下若食入口即吐乾姜黄芩黄連人
參湯主之

乾姜　黄芩　黄連　人參　各三兩

右四味以水六升煑取二升去滓分
温再服

下利有微熱而渴脈弱者令自愈

下利脈數有微熱汗出令自愈設

復緊爲未解
下利手足厥冷無脈者灸之不温
若脈不還反微喘者死小陰負趺
陽者爲順也
下利寸脈反浮數尺中自濇者必
清膿血
下利脈沉弦者下重也脈大者爲
未止脈微弱數者爲欲自止雖發

欬不死

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

下利脈沉而遲其人面少赤身有

微欬下利清穀者必發熱(胃)汗出而

解

病人必微厥所以然者其面戴陽下

虛故也

下利脈數而渴者令自愈設不差

以清膿血以有熱故也
下利後脈絶手足厥冷脈時脈還
手足温者生脈不還者死
傷寒下利日十餘行脈反實者死
下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通
脈四逆湯主之
熱利下重者白頭翁湯主之
白頭翁二兩　黄蘗二兩　黄連二兩

桑皮二兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫
服一升不愈更服一升

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其
裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表
宜桂枝湯

下利欲飲水者以有熱故也白頭
翁湯主之

下利讝語者有燥屎也宜小柴胡兼氣
湯
下利後更煩按之心下濡者爲虛
煩也宜攻之攻之宜梔子豉湯
嘔家有癰膿者不可治吐膿尽自
愈
吐而脈弱小便復利有微熱見厥
者難治宜四逆湯主之

乾呕吐涎沫頭痛者吳朱萸湯主之

嘔而発熱者小柴胡湯主之

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者其人外氣怫鬱復与之水以発其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

傷寒噦而腹滿視其前後知何部

不利利之即愈

譬厥陰病　霍乱

問曰病有霍乱何答曰嘔吐而利
此名霍乱

問曰病発熱頭痛身疼悪寒吐利
者此屬何病答曰此名霍乱鸝乱
自吐下又利止復発熱也

傷寒其脉微濇本是霍乱今是傷

寒却四五日至陰經上轉入陰必
利本吐下利者不可治也欲以大
便而反失氣仍不利此屬陽明也
便必鞕十三日愈所以然者經尽
故也下利後當便鞕鞕則能食者
愈今反不能食到後經中頗能食
復過一經能食過之一日當愈不
愈者不屬陽明也

吐利悪寒脉微而復利（利止亡血也）回逆加人参湯

主之

甘中（炙）二両　附子（生去皮破八片）一枚　乾姜一両半

人参一両

右四味以水三升煮取一升二合去

滓分温再服

吐利頭（霍乱）痛発熱身疼痛熱多欲飲水者

五苓散主之寒多不用水者理中丸主

之

人參　乾姜　甘草炙　白朮各三兩

右四味擣篩蜜和爲丸如雞子黃許

大以沸湯數合和一丸研碎溫服之

註　日三四夜一服

腹中未熱益至三四丸然不及湯湯

法以四物依兩數切用水八升煑取

三升去滓溫服一升日三服

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四
兩吐多者去朮加生姜三兩下多者
還用本悸者加茯苓二兩渴欲得水
者加朮足前成四兩半腹中痛者加
人參足前成四兩半寒者加乾姜足
前成四兩半腹滿者去朮加附子一
枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微
自溫勿發揭衣被吐利止而身痛不

休者當汗息和解其外宜桂枝湯 小和之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥

冷者四逆湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清

穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈

微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯主之

甘草二兩 炙 乾薑三兩 強人可四兩 附子大者一枚 生去皮破八片

豬膽汁各
右四味以水三升煮取一升二合去
滓內豬膽汁分温再服（其脉即来）（註）無豬膽以羊膽代之
吐利発汗脉平小煩者新虗不勝穀氣
故也

辨陰陽易差後勞復病

傷寒陰陽易之為病其人身體重少
氣少腹裏急或引陰中拘攣熇上衝
胸頭重不欲擧眼中生花膝脛拘急
者燒裩散主之

婦人中裩近隠處取燒作灰

右一味水服方寸匕日三服小便即
利陰頭微腫（註）此為愈矣婦人病取男子裩燒服

大病差後勞復者枳實梔子湯主之

枳實三枚炙　梔子十四箇擘　豉一升包綿

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗

若有宿食者內大黃如博碁子五六枚服之愈

傷寒差以後更發煩小柴胡湯主之

脈浮者以汗解之脈沉實者以下

解之

大病差後從腰以下有水氣者牡蛎沢

泻散主之

牡蛎熬　沢泻　蜀漆煖水洗去醒　葶藶子熬

商陸根熬　海藻　括蔞根各等分

右七味異擣下篩爲散更於旧中治

之白飲和服方寸匕日三服小便利

止後服

大病差後喜唾久不了々宜理中丸（胷上有寒當以丸藥溫之）

傷寒解後虛羸少氣逆欲吐竹葉石膏湯主之

竹葉二把　石膏　半夏洗半升

麦門冬去心一升　人參二兩　甘艸炙二兩

粳米半升

右七味以水一斗煑取六升去滓內粳米煑米熟湯成去米溫服一升日

三服

病人脉已解而日暮微煩以病新差
人強与穀與胃氣尚弱不能消穀故
令微煩損穀則愈

凡療治之方有言恒之理奥毒藥之代
機又経旨之所秘多傳方文字傳法□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□