

目次

第一章 內科

第一节 传染病及地方病

一、麻 疹	1
二、脑膜炎	2
三、百日咳	3
四、白 喉	4
五、狂犬病	5
六、破伤风	6
七、肝 炎	6
八、霍 乱	8
九、克山病	9
十、大骨节病	9
十一、甲状腺肿	10

第二节 消化系統疾病

一、胃脘作痛	12
二、吞 酸	32
三、反胃、噎膈、呃逆	36
四、胃潰瘍（胃痛）	39
五、吐 血	40
六、黃疸病	43
七、单腹胀、臌胀	43
八、积 聚	49

九、腹痛	51
十、痢疾	54
十一、腹瀉	56
十二、便血	57
十三、腸痛（闌尾炎）	60
十四、脫肛	60
十五、絞腸痧	62

第三节 呼吸系統疾病

一、感冒性咳嗽	62
二、痰飲咳嗽	65
三、內傷咳嗽	70
四、咳血	70
五、肺結核	74
六、肺癰（肺膿瘍）	78
七、胸肋疼	80

第四节 泌尿系統疾病

一、小便閉	81
二、遺尿症	83
三、淋濁症	85
四、小便尿血	88
五、水腫	90
六、消渴病（糖尿病）	95

第五节 神經系統疾病

一、中風不語（腦溢血）	96
二、半身不遂、口眼歪斜	98
三、神經衰弱	100
四、高血壓	103

五、癲狂癇症	104
六、头 痛	106
七、风湿性关节炎	107
八、牙 痛	109
九、抽麻筋	109

第二章 外 科

第一节 外科疾病

一、疔瘡痛疽	112
二、疔 疮	117
三、鼠疮瘰癧 (淋巴腺結核)	122
四、漏疮 (骨結核)	123
五、膿 疮	125
六、痔 疮	126
七、燙火伤	128
八、冻 疮	130
九、疝 气	130
十、睪丸炎	131

第二节 皮肤系統疾病

一、疥癬疮	134
二、黃水疮	136
三、癩疹 (蕁麻疹)	137
四、腎囊风 (阴囊湿疹)	139
五、腋臭症	140
六、蛇盘疮 (带状疱疹)	141
七、脚 气	142

第三章 妇 产 科

第一节 調 經

一、經血不調	143
--------------	-----

二、年老經断复来 (子宫癌).....	145
三、崩漏带下.....	147
四、經 閉.....	154
五、不孕症.....	156

第二节 胎 产

一、胎前諸症.....	158
二、无乳、乳房癰疽.....	160
三、产後下血过多.....	164
四、产後血暈.....	165
五、产後腹痛.....	166
六、产後風.....	166
七、产後杂病.....	167
八、妇科杂病.....	169

第四章 儿 科

一、急慢惊風类.....	174
二、小儿夜啼.....	175
三、小儿咳嗽.....	176
四、吐 瀉.....	176
五、消化不良.....	177
六、胎毒及疳症.....	179

第五章 五 官 科

一、耳 病.....	182
二、鼻 病.....	182
三、咽喉病.....	184
四、口腔病.....	185
五、眼 病.....	186

第一章 內 科

第一节 傳染病及地方病

一、麻 疹

治溫疹 咳嗽 喘息 煩熱 神昏譫妄者

謝景新

处方：广角一錢 羚羊角五分 銀花三錢 連召二錢 桔梗二錢

黃芩二錢 甘草二錢 花粉二錢 牛蒡子二錢

用法：水煎服。

治小兒麻疹發表方

晴宇县 于希敏

处方：紫草三錢 黑參三錢 元芩三錢 大力三錢 蟬退三錢

甘草一錢 防風三錢 芥穗三錢 玉金二錢 姜蚕二錢

用法：水煎服。

注：此方劑量，可按年齡大小，酌情減量。

治疹子咳嗽喘息方

安安县 薛長鳳

处方：犀角一錢五分 生芍三錢 生石膏三錢

用法：水煎服。

治疹后余毒不解，邪熱不退，并見衄血症

前郭尔罗斯蒙古族自治县 馬志超

处方：生地五錢 丹皮三錢 白芍三錢 銀花三錢 犀角三錢

姜虫三錢 全退四錢 甘草二錢 青叶三錢

用法：水煎服。

治疹子初起

前郭尔罗斯蒙古族自治县 刘永利

处方：銀花三錢 連召三錢 赤芍三錢 紫草三錢 牛蒡子三錢
全退三錢 竹叶一錢 前胡二錢 桔梗二錢 山查一錢
枳壳一錢 防风一錢 薄荷五分 木通五分 甘草五分
紅花一錢 地丁四錢

用法：共为粗末，每服三錢，姜茶引，水煎服。

禁服：辛物硬物。

治麻疹合并肺炎喘促方

前郭尔罗斯蒙古族自治县 馮应华

处方：杏仁一錢 桑皮一錢 天冬一錢 丁力一錢 石膏八分
紋軍五分 黄芩一錢

用法：水煎服（三岁以下小孩量）。

二、脑 膜 炎

治結核性腦膜炎头痛剧烈、大渴、眩暈方

农安县 邵培森 輝南县 高光瑞

处方：生石膏四兩 知母三錢 粳米一把 甘草二錢 全虫三錢
全退三錢 大蜈蚣二条 寸冬五錢 生地一兩 元参一兩

用法：水煎服。

病例：郭××女，17岁，自觉症状：头痛剧烈、口渴、眩暈，
检查所見：体温摄氏38.5度，顏面潮紅，舌有厚黄苔，
頸項僵直，剧烈呕吐，球結膜充血，大便难，小便
黄，脉搏沉实有力，克尼氏反应(+)經用本方，两剂
而愈。

治流行性腦脊髓膜炎及三叉神經痛偏頭痛方

敦化县 苑 旭 东

处方： 菩本六錢 白芷三錢 川芎三錢 防风三錢 細辛七分
蒼耳四錢 菊花四錢 甘草二錢

用法： 水煎服。

治腦膜炎方

郭 明 江

处方： 胆星一錢 薄荷二錢 鈎藤二錢 琥珀一錢 南星二錢
归尾二錢 小黃一分五厘 台射一分 梅片一分 青叶一錢
蜈蚣一條 全虫 三个

用法： 共为細面，蜜为丸，一至二月小儿服一分，三至四月
小儿服二分。

三、百 日 咳

治百日咳鼻衄，顏面浮腫者

九台县 錢 福 川

处方： 川軍 川貝 半夏 南星 全退各等分 姜黃加倍

用法： 共研細末，一周歲小儿每日五分，六周歲以下的兒童不
超过一錢，可根据病情增减，每日两次，加糖服之。
輕者四、五次；重者六、七次即愈。

治百日咳方

双辽县 刘 云 圈

处方： 川貝一两 花粉 一两 白果五錢 朱砂五分 梅片五分

用法： 共为細面，量儿大小用之。初患表热用苏叶湯送下。

治百日咳方

怀德县 刘 明 汉

处方： 冬花 白芨各等分。

用法：共为細末，一周岁每次服二分，三至六周岁每次服三分，每四小时服一次，白水送下。

治百日咳方

許 鳳 飞

处方：生姜汁半杯 白蜜两食匙

用法：沸水冲，分三、四次服。

治百日咳方

樟 甸 县

处方：百部一斤

用法：水三斤，将百部熬取浓汁半斤，用布濾过去渣，加白糖或紅糖半斤，再微熬攪匀，每日服三次，每次一茶匙。五六岁可用本量，小儿酌减

治百日咳方

蛟河县 王 英

处方：鷄胆一个

用法：滿一周岁小儿均三次用，加白糖服，每日三次。

四、白 喉

治白喉方

藏寶县 馬 德 芳

处方：犀角一錢五分 生地三錢 白芍三錢 丹皮二錢 瓜蒌三錢
牛蒡子三錢

用法：水煎任意飲之，尽剂而愈。

治白喉方

張 殿 閣

处方：白矾一錢 猪脂油不拘多少。

用法：将油煎开去渣，再将白矾研面，和入油內再熬。溫服。

五、狂 犬 病

治狂犬病方

长春 刘 柏 令

处方：白茯苓五錢 刘寄奴五錢 大黃五錢 連召一錢 台射二分
斑蝥七个去头足用粳米炒黃色去米 木驚子三个去壳，用陈土
炒黃去土。

用法：共为細末，入台寸研勻，每服三錢，无酒为引。孕妇忌服。

驗例：曾用此方治疗二十三个病例，均收效，愈后均无复发。

注：此症患者头顶有紅发一至二根，急速拔去，而后服此药，在七日
内者服一次即可，七日后可連服二、三次，待服至小便无血色时停药。

治瘋狗咬伤方

东丰县 张 景 良

处方：人參三錢 茯苓三錢 甘草三錢 枳壳三錢 桔梗二錢
柴胡三錢 前胡二錢 川芎三錢 大活三錢 川芎三錢
薄荷二錢 生薑三錢 生地榆一兩

用法：水煎服，由服药日起，每七天服一剂，共服三剂。

禁忌：終身忌食狗肉，蚕蛹等，忌房事一百天。

驗例：系祖传驗方，三世治疗百余例，治疗效果良好。

治瘋狗咬方

长春中医学院 程 万 生

处方：雄黃七分 甲片七分 川軍七分 全虫二个 寸香五厘
冰片一分

用法：共为細面，每服五分，无酒送下。孕妇忌服。

六、破 伤 风

治破伤风方

孔 范 昌

处方：乳香五錢 沒藥五錢 麻黃五錢 炙馬前五錢

用法：为末，白酒調敷之（外用）。孕妇忌服。

治破伤风方

孔 范 昌

处方：当归二錢 川羌二錢 茅朮二錢 蒼耳二錢 薄荷一錢

赤芍二錢 防风二錢 天麻三錢 全虫二錢 細辛七分

用法：黃酒四兩，水煎服，避风三日。

治破伤风方

敦化县 王寶义

处方：蟬退一两

用法：共研細末，每服五錢，同时用元酒冲服朱砂五分。孕妇忌服。

治破伤风方

前郭尔罗斯蒙古族自治县 馬 志一題

处方：白附子八兩 白芷六錢 南星六錢 天麻六錢 川羌六錢
防风六錢

用法：共为細末，每服二錢，元酒送下，亦可敷患处。

禁忌：孕妇忌服。

七、肝 炎

治傳染性肝炎方

处方：茵陳一两 元柏三錢

用法：水煎服，小孩可加糖。

治肝炎方（專治濕熱陽性黃疸）

海龍縣 王炳臣

處方：茵陳四錢 滑石三錢 陳皮三錢 赤苓三錢 山梔二錢
龍胆三錢 大黃一錢五分 干姜五分 澤夕三錢 連召三錢
豬苓三錢 甘草一錢 鹽柏二錢

用法：燈竹為引，水煎服。孕婦忌服。

治肝硬化有腹水，脈沉伏有力方

延吉市 劉延令

處方：醋柴胡二錢 半夏一錢五分 甘草二錢 元苓二錢 桂枝二錢
焦朮三錢 茵陳七錢 茯苓三錢 炒車前三錢 馬鞭草二錢
廣木香一錢 廣玉金一錢五分 通草一錢 陳皮二錢

用法：用水600毫升，煎至300毫升，分二次早晚溫服。

禁忌：食鹽和冷食。孕婦忌服。

治肝炎方

磐石鎮

處方：（1）茵陳八錢 焦查五分 元參三錢 白芍六錢
雙花一兩 莪朮一錢 連召二錢 桃仁一錢 內金三錢 澤
夕三錢 牽牛一錢

用法：水煎服。

（2）當歸四錢 白芍四錢 牡蠣三錢 元參三錢 連
召三錢 苓皮三錢 桃仁二錢 大貝二錢 鱉甲三錢 莪
朮一錢 雙花四錢 內金三錢 玉金一錢五分 枳實二錢
白朮三錢

用法：水煎服。

八、霍 乱

治霍乱方

处方：土桂心八錢 母丁香一两二錢 硫黃五錢 生香附一两八錢
射香四分

用法：共研細面，每日三分，納臍窩中，外用膏藥封貼。孕婦忌服。

治霍乱轉筋方

乾安县 張 明 勛

处方：吳萸三錢 木瓜三錢

用法：水煎服之。

治霍乱吐瀉心荒、不語、脈氣閉塞方

敦化县 修 子 明

处方：猪牙皂三錢五分 广藿香二錢 白芷二錢 陈皮二錢 貫
仲二錢 薄荷二錢 生甘草二錢 桔梗二錢 木香二錢
防风二錢 法夏二錢 細辛二錢五分 明雄黃三錢五分 朱
砂二錢五分 枯礬一錢五分

用法：共為細面，先用三分吸入鼻孔內收嚏，再用溫水送服一錢。孕婦忌服。

治霍乱吐瀉方

东丰县 吳 占 山

处方：冰片二錢 朱砂三兩 粉草一斤 細辛一两五錢 白芷一两
薄荷冰四錢

用法：共為極細面，用水為丸如梧桐子大晾干（不宜晒），再用朱砂為衣，每服45丸。

禁忌：生冷油膩。

治霍乱腹疼方

海龙县 楊淑賢

处方：白矾二錢研面

用法：开水凉冲服。

九、克山病

治克山病方（吐黄水病）

穆甸县 王学青

处方：川軍一錢炙褐色 皂角五分炙褐色存性

用法：共为細面，均三次服，一日量。孕妇忌服。

驗例：我县在1942年流行一次克山病，死亡率很高，用此方治愈率达80%。

治克山病方

延吉市 楊洪厚

处方：山梔子十四个 淡豆豉三錢 甘草二錢

用法：共为細面，每服一錢，姜湯送下。

禁忌：手足厥逆者勿服。

十、大骨节病

治大骨节病方

輝南县 余占元

处方：炙馬前二两 淨地龙一两 麻黄五錢 乳香五錢 沒药五錢

甲珠五錢 紅花五錢 川烏五錢 草烏五錢 当归五錢

用法：共为細末面，糊丸黄豆大，每服六丸。孕妇忌服。成人量剂。

驗例：用此方治好40余例，效果显著。

治大骨节病方

临江县 赵亚凡

处方：当归五钱 杜仲五钱 川芎三钱 白芷三钱 羌活三钱
姜黄三钱 红花三钱 川乌三钱 草乌三钱 紫草三钱
木瓜三钱 桂枝三钱 牛膝三钱 甘草三钱 马尿稍
根一两 拉拉秧子一两

用法：为粗末，酒 500 毫升泡 7 日，每日早晚各服一酒盅。

注：此方酒量，根据浸泡情况，可以酌增。孕妇忌服。

治大骨节病方

磐石县

处方：炙马前二两 杜仲一两五钱 牛膝一两 生地一两 防
风一两 牛蒡子一两 麻黄二两 川乌六钱 木瓜六钱
乳香五钱 没药五钱 甘草五钱 血竭三钱

用法：共为细末，蜜丸一钱重，每服一丸，早晚服，无酒送
下。孕妇忌服。

十一、甲状腺肿

治粗脾方

怀德县 陈朋云

处方：海螺四钱 海带三钱 海藻三钱 海螵蛸三钱 海粉三钱
夏枯草三钱 白芷二钱 昆布二钱 川芎二钱 大贝二钱
柴胡二钱

用法：水煎服。

治大气脖子方

磐石县

处方：海藻一两 海带一两 昆布五钱 西归五钱 川芎二钱
红花一钱五分

用法：用好白酒二斤泡七日，每日早晚各服1—2盅。

治粗脖子方

樟 甸 县

处方：海带一两 海藻一两 海蛎一两 昆布一两 海粉一两
白芷五钱 川芎五钱 木香一钱

用法：共为末，蜜丸一钱重，每服一丸。

治粗脖子方

樟 甸 县

处方：海藻二钱 海沉三钱 昆布七钱 海蛎七钱 川貝二钱
陈皮四钱 明雄黄二钱

用法：用元酒或白酒煮服。孕妇忌服。

治地方性甲状腺肿方

德惠县 刘 毅 三

处方：海藻二两 昆布二两 广木香六钱 砂仁六钱

用法：共为细末，每服二钱，每日早午晚各服一次，白水下。

验例：此方系我县医院陈新堂大夫之验方，对甲状腺肿治愈率在90%以上，效果最明显者。德惠县医院会计马凤珠同志，患此病曾用碘化钙注射，及内服碘剂均无效，后用此方服一付，显著好转，数付痊愈。

第二节 消化系統疾病

一、胃脘作痛

香砂胃痛散

邹振声

主治：一切新久胃痛效方（治愈数十名）。

处方：錦紋軍一两 朴硝七錢 吳萸五錢 二丑五錢 附子三錢 肉桂三錢
炮姜三錢 枳实三錢 榔片三錢 砂仁三錢 紫蔻三錢
干漆三錢 公丁香三錢 文朮四錢 广木香二錢 甘草二錢

用法：砂仁、紫蔻、吳萸、二丑用姜湯泡一昼夜去湯，慢火焙干，同余藥共为末。每日一次，每服二錢，开白水下。

禁忌：孕妇忌服，忌食生冷油膩难消化食物。

三粒心痛丸

柳河县 王 玉 書

主治：胃寒痛、食水痛

处方：丁香三錢 木香三錢 雄黃三錢 白胡椒三錢 灵脂三錢
紅花三錢 豆霜一錢

用法：共为細末，水泛，豆大小丸。一日二次，每服三粒，开白水下，輕者服一、二次愈，重者二、三日收效。

禁忌：有火的胃热痛忌服，忌硬粘食物。孕妇忌服。

一粒丹

农安县 张 济 民

主治：胃上下攻痛。

处方：郁金三錢 广木香三錢 豆霜一錢 朱砂一錢

用法：共为細末，蜜丸，均二十丸，每服一丸，淡姜湯或开白水
水下，急痛者酒下。

禁忌：孕妇忌服。

止痛丸

舒兰县 董树貞

主治：一切急慢新久胃疼。

处方：黑丑一两 灵脂一两 草蔻一两 砂仁五錢 神曲五錢
麦芽五錢 山查肉五錢

用法：共为細末，蜜丸三錢重，每服一丸姜湯下。孕妇忌服。

千金五香丸

綏化县 吕效临

主治：胃脘疼痛，急慢性胃炎，疼痛劇烈以及急性腸炎腹痛
痢疾等。

处方：毛茛菇四錢 五倍子三錢 雄黃二錢 千金霜二錢 西紅
花二錢 降香二錢 檀香二錢 紅芽大戟三錢 沉香一錢
伽南香一錢 梅片一錢 东牛黃一分 台射一分

用法：共为細末，江米糊为小丸，菡豆大，朱砂为衣（千金
霜必須去淨油，否則发生呕吐）。

成人每服二十丸，一日二至三次，白水送下。

禁忌：孕妇忌服。

八仙丹

乾安县 高万邦

主治：胃脘痛，心腹劇痛。

处方：木香一两 枳壳一两 枳实一两 公丁一两 豆霜一两
紅花一两 雄黃一两 毕澄茄一两

用法：共为細末，水泛为丸菡豆大，每服15丸，溫开水下。

禁忌：冷水凉物。孕妇忌服。

舒胃丸

洮安县 张景阳

主治：新久急慢胃痛，郁积胀满疼痛，以寒症为宜。

处方：香附一两 红曲四两 酒军四钱 枸杞四钱 紫蔻三钱
沉香三钱 砂仁三钱 木香三钱 陈皮三钱 草拨三钱
厚朴三钱 肉蔻三钱 焦榔三钱 良姜三钱 均青三钱
甘草三钱 枳壳二钱 草蔻二钱 清夏二钱 真桂二钱
荜香二钱 白芍二钱 公丁二钱

用法：共为细末，蜜丸三钱重，每服一丸，白开水下。

禁忌：胃燥内热者勿用。孕妇忌服。

加味宽胸利膈丸

长岭县 董庆富

主治：各种胃脘疼痛膨闷胀满。

处方：川军二两 神曲二两 枳壳一两 榔片一两 苍朮五钱
焦查五钱 沉香五钱 黑丑五钱 砂仁五钱 果仁五钱
青皮五钱 麦芽五钱 香附五钱 陈皮五钱 莱菔子五钱
藿香五钱 桔梗五钱

用法：共为细末，蜜丸三钱重，每服一丸，开白水送下。孕妇忌服。

九气拈痛丸

靖宇县 陈伯彦

主治：各种气郁胃疼痛、腹痛方。

处方：香附一两 灵脂一两 文朮一两 榔片一两 陈皮一两
当归一两 良姜八分 青皮八分 枳壳六分 木香五分
草果仁五分 郁金四分 元胡四分 炮姜四分 豆霜四分

用法：共为细末蜜丸，每服一钱半，开白水下。孕妇忌服。

保和丸

长春 刘品芳

主治：胃痛胃胀满膨闷及腰疼。

处方：川军一钱 姜黄一钱 豆霜一钱 君子肉三钱 木香三钱
儿茶二钱 马前子（炙黑）二钱

用法：共为细末，醋丸菉豆大，朱砂为衣，每服五至七丸，白开水下。

禁忌：忌冷水及凉食物。孕妇忌服。

胃痛特效丸

山东 孟 继 升

主治：一切胃脘疼痛，食痛、血痛、气痛。

处方：二丑一两二钱 灵脂六钱 香附六钱

用法：共为细末，面醋丸，豆粒大，每服三钱，白水下。

禁忌：生冷。孕妇忌服。

胃痛药酒

怀德县 冷 振 远

主治：胃寒痛。

处方：干姜三钱 紫蔻三钱 当归三钱 附子三钱 陈皮三钱
南茴三钱 川芎三钱 贡桂三钱 山柰三钱 良姜三钱
公丁香三钱 佛手三钱 枳实三钱 均青四钱 白酒三斤

用法：缝细白布袋纳上药入白酒罈中，浸5—7日，再放锅内煮三至五沸后去药袋。

每服一、二酒盅，一日一至三次酌用。

禁忌：生冷之物。孕妇忌服。

化铁丹

新站 齐 连 荣

主治：胃痛胃脘痛。

2
处方：木香三錢 丁香三錢 沉香三錢 青皮一錢半 陈皮一錢五分
烏梅一個 巴豆八個 古月三十二個

用法：共為細末，枣肉丸菉豆大，成人每服七至十一丸（按巴豆應去油用霜）。

禁忌：腥冷食物。孕婦忌服。

五虎擒羊丹

白城縣 檀 瑞 林

主治：胸中胃脘疼痛屬寒者。

处方：官桂八錢 榔片八錢 良姜八錢 炮姜八錢 鹽茴八錢
酒軍八錢 枳實六錢 吳萸六錢 干姜六錢 黑附子六錢
香附六錢 紫薏仁六錢 砂仁六錢 三稜六錢 莪朮六錢
川朴四錢 廣木香三錢

用法：共為細末，白面糊為桐子大小丸，每服二至三錢（舊分量），燙開元酒送下。孕婦忌服。

如患此症年久有郁熱，當用梔子仁五錢煎水送下，或用梔仁研細末與藥丸等分（舊秤三錢），元酒送下。

三益丸

白城縣 檀 瑞 林

主治：胃虛脹滿者。

处方：焦朮六錢 云苓四錢 黨參四錢 蓮子四錢 山藥四錢
陳皮四錢 神曲四錢 麥芽四錢 藿香四錢 查肉三錢
扁豆三錢 芡實三錢 砂仁三錢 苡米三錢 薏仁二錢
桔梗二錢 炙草二錢

用法：共為細末，蜜丸二錢七分，每服一丸，一日服一次，開白水下。

禁忌：油膩生冷及里實而不虛者。孕婦忌服。

加減二氣丹

白城縣 檀 璠 林

主治：胃痛屬於寒者及腎寒腰膝冷痛等症。

處方：硫黃一兩 炮姜一兩 吳萸二錢 丁香二錢 甘草三錢
大茴香(鹽水炒黃)一斤 生甘草一兩

用法：先以硫黃(選純黃色無夾石的)與一兩的生甘草入磁盆內加適量的水煮半日，煮掉臭腥毒，去甘草，用冷水淘淨晾乾，研極細末，與余藥五味之末合研。

每服二錢有良效。

禁忌：生冷及一切禽獸血(鴨蛋能解硫黃毒)。孕婦忌服。

開胃丸

雙陽縣 高 靜 軒

主治：急慢性胃痛。

處方：古月一兩 米壳一兩 川椒一兩 肉桂一兩 干姜三錢
良姜三錢

用法：共為細末，面糊小丸。每服三錢，開白水或酒下。

禁忌：生冷食物。孕婦忌服。

痛心靈

雙陽縣 高 靜 軒

主治：九種胃病暴痛。

處方：古月三錢 全虫三錢 木香三錢 朱砂二錢 豆霜一錢

用法：共為細末，面糊小丸朱砂衣，每丸五分重，成人每服一丸，黃酒下。

禁忌：冷水涼物。孕婦忌服。

胃痛立效丸

崔 興 雨

主治：寒性胃疼痛、吞酸、脹滿、停寒、停氣、停食。

处方：酒軍三錢 元胡三錢 青皮三錢 焦榔三錢 香附三錢
 沒藥三錢 良姜三錢 赤芍三錢 紫薤三錢 廣木香三錢
 乳香二錢 枳殼二錢 靈脂二錢 炮姜二錢

用法：共為細末，蜜丸三錢重。每服一丸，紅糖水送下。

禁忌：生冷硬物。孕婦忌服。

胃病奇效丸

敦化县 杜先坤

主治：胃痛不可忍者服之立效。

处方：糖靈脂一兩 紅棗二兩（去核） 黑飢三分 伏龍肝三錢 百草霜三錢

用法：共為細末，調丸（紅棗煮脹以後去皮核用，用糖靈脂不用五靈脂），每服一錢五分黃酒下，痛重者二錢。孕婦忌服。

九種拈痛丹

東丰县 吳占山

主治：九種胃痛。

处方：烏藥四錢 靈脂三錢 文朮三錢 郁金三錢 榔片三錢
 陳皮三錢 姜黃三錢 當歸四錢 元胡三錢 木香二錢
 良姜二錢 炙草二錢 果仁一錢五分

用法：共為細末，蜜丸三錢重（或以原分量水煎服之），每服一丸。孕婦忌服。

禁忌：生冷。孕婦忌服。

救急丸

懷德縣 卜秀

主治：胃寒氣疼痛。

处方：歸尾一兩二錢 桂枝一兩二錢 公丁香一兩二錢 乳香一兩二錢
 郁金一兩二錢 元胡一兩二錢 良姜八錢 廣木香八錢
 草拔四錢

用法：共为細末，蜜丸三錢重，每服一丸，开白水送下。

禁忌：生冷。孕妇忌服。

即止胃疼丸

敦化县 苗 凤 梧

主治：胃疼。

处方：榔片二錢 豆霜二錢 君子肉二錢 枳实二錢 广木
香二錢 熬甲二錢 云琥珀一錢

用法：共为細末，蜜小丸，每服一錢，开白水送下。

禁忌：孕妇忌服。

桃灵丹

鎮賚县

主治：胃疼、腹痛、瘀血作痛。

处方：桃仁五錢 五灵脂五錢

用法：微炒为末，面醋为丸，小豆粒大，每服二十丸，酒下。孕妇忌服。

四物胃痛丸

樟 甸 县

主治：胃痛胀滿，攻冲难忍者

处方：二丑八錢 香附五錢 灵脂四錢 元胡三錢

用法：共为細末，蜜丸二錢重，每服一丸，开白水送下。孕妇忌服。

起疴丸

鎮賚县 刘 广 远

主治：胃腹痛年久不愈者。

处方：川烏四两 山梔二两 元明粉二两

用法：共为末，蜜丸三錢重，飯后服，一日二次，連服七天有效。孕妇忌服。

治胃脘疼痛效方

刘喜亭

处方：广木香三錢 盆沉香三錢 公丁香三錢 炙乳香三錢 明沒藥三錢 眞麝香一分

用法：共为細末，每服二錢，飯后三十分鐘服，日服二次。孕婦忌服。

胃痛散

长岭县 郝玉帶

主治：治九种胃痛，除对虫痛、悸痛无效外，余均有效。

处方：广木香六錢 桃仁六錢 青皮五錢 元胡五錢 陈皮五錢 沉香三錢 乳香三錢 沒藥三錢 灵脂一錢

用法：共为細末，每服三錢，姜水送下。

禁忌：孕婦忌服。

活郁止痛散

鎮賚县 赵集春

主治：胃痛及胸腹痛均有功效。

处方：青皮六錢 厚朴六錢 莪朮五錢 榔片五錢 砂仁五錢 三稜四錢 桃仁四錢 血竭四錢 核桃三錢

用法：共为細末，每服二錢，开白水送下，一日二次。

少胜散

鎮賚县 何成志

主治：胃脘痛。

处方：古月二錢 良姜二錢 雄黃二錢 豆霜二錢

用法：共为細末，每服五分，白酒下。孕婦忌服。

錦功丹（一）

德惠县 李文亚

主治：胃痛（属于热痛者）。

处方：川錦紋一斤 枳榔一两 梔子一两 广木香五錢 枳壳五錢

用法：用后四味煎水浸泡川軍，再将川軍阴干为末（气逆上反加丁香沉香各四錢，吐食上攻加砂仁白蔻各四錢，面积加神曲五錢），每服一錢。

禁忌：妊娠忌服。

錦功丹（二）

德惠县 李文鼎

主治：胃痛（属于寒痛者）。

处方：川錦紋一斤 申姜四两 丁香二两 砂仁一两 盐振擲一两

用法：川軍用童便白酒煮阴干与余药共为細末，每服一錢。

禁忌：妊娠忌服。

舒胃散

敦化县 张春堂

主治：胃痛（属于寒痛者）。

处方：官桂五錢 良姜五錢 郁金五錢

用法：共为細末，每服二錢，白酒送下。

禁忌：胃内有热者忌用。孕妇忌服。

溫香散

靖宇县 白玉章

主治：胃脘痛寒痛

处方：广木香三錢 降香三錢 沉香三錢 乳香三錢 藿香三錢
丁香三錢 小茴香三錢 肉桂三錢 炮姜三錢 胡椒三錢
良姜三錢 朱砂三錢

用法：将前十一味用陈醋泡透晒干，共为細末。每服二錢，烧酒紅糖为引。

禁忌：痛而有热者勿用。孕妇忌服。

消化散

靖宇县 白玉章

主治：胃脘郁痛，积痛

处方：三稜九錢 莪朮九錢 木香九錢 乳香九錢 沒藥九錢
朱砂六錢 雄黃六錢 榔片六錢 礞砂六錢 神曲六錢
黑升六錢 大黃六錢

用法：共为細末，每服三錢，燒酒白開水均可，每日早晚各服一次。

禁忌：孕婦忌用。

三香散

鎮賚县 姚忠良

主治：胃脘痛，寒痛。

处方：丁香四錢 藿香四錢 干姜四錢 朱砂三錢 古月二錢
木香一錢

用法：共为細末，每服三錢。孕婦忌服。

加減吳萸散

長春 李春華

主治：胃腸絞結痛甚，串疼，頭痛。

处方：吳萸二兩 半夏五錢 木香五錢 川軍五錢

用法：共为細面，每服五至七分，一日二至三次。

禁忌：孕婦忌服。

如愈散

東丰县 張旭東

主治：胃痛，胃脘痛均效。

处方：醋青皮二兩 醋靈脂二兩 川練子二兩 八角大茴二兩
元胡一兩半 良姜一兩半香油炒 沒藥一兩半 榔片一兩半
廣木香一兩 盆沉香一兩 砂仁五錢 陳皮六錢

穿山甲二兩 野鷄素子一個（如无，用鷄內金亦可）木鱉子一兩二錢

用法：除木鱉子外共為粗末，再入木鱉子去皮切片，同粗末炒至焦黃色，去木鱉子，再研為細末。

用法：每服一錢，食鹽一粒為引，白水送服，能飲酒者飲一盃酒。孕婦忌服。

胃安散

農安縣 邵培澤

主治：胃痛、胃脘停郁有寒作痛。

處方：香附 公丁香 吳萸 良姜各等分

用法：共為細末，每服二錢，白水送下，如胃痛上攻甚者，四肢厥冷嘔吐。脈沉細者，可用燒酒和藥燒一分鐘再服。孕婦忌服。

禁忌：熱性痛勿用，此方對胃癌、消化性潰瘍無效。

八味止痛散

瞻榆縣 主成林

主治：胃脘寒郁作痛久不愈者。

處方：廣木香一錢 枳殼一錢 古月一錢 雄黃一錢 紅花一錢
良姜一錢 公丁一錢 豆霜一錢

用法：共為細末，每服五分，早晨或痛時服，白開水下。孕婦忌服。

乳沒止痛散

吉林市 劉景和

主治：婦人胃脘痛。

處方：乳香三錢 沒藥三錢 木香三錢 南茴三錢

用法：共為細末，每服一錢。

消胀散

魏 楠 成

主治：胃内胀满不暢，不能消化。

处方：鷄内金一两 沉香三錢 砂仁三錢 川朴三錢 元胡三錢

用法：共为細末，每服一錢，姜湯送下。

消炎散

霍 國 賢

主治：急慢性胃炎。

处方：川軍五錢 香附五錢 十开蔻四錢 榔片四錢 砂仁四錢
广木香五錢 二丑八錢

用法：共为細末，每服三分至五分。孕妇忌服。

灵夏散

徐 海 庭

主治：胃痛。

处方：灵脂三錢 良姜三錢 西归三錢 文朮三錢 元胡三錢
木香一錢

用法：共为細末，每服二錢，白水送下。孕妇忌服。

安胃散

朱 士 华

主治：胃脘痛。

处方：青皮二錢 灵脂二錢 川棟二錢 甲珠二錢 太茴二錢
元胡一錢半 良姜一錢半 沒药一錢半 榔片一錢半 广木
香一錢 沉香一錢 砂仁五分

用法：共为粗末，将木鳖子一两二錢淨肉切片同药末炒黃色，去木鳖将前药为細末。每服一錢，淡盐湯下。孕妇忌服。

舒肝健胃丸

长白县 赵 金 璞

主治：肝气不舒、胃中作痛及胸部疼。

处方：酒芍二两 肉桂一两 沉香五钱 紫蔻五钱 槟榔五钱
砂仁五钱 厚朴五钱 枳实五钱 广木香五钱 藿香五钱
橘红五钱 元参五钱 吴萸三钱 酒军三钱 皂角二钱
良姜五钱 甘草三钱

用法：共为细末，炼蜜为丸，每丸重二钱五分，每服一丸，清水送下，重者日服二丸。孕妇忌服。

内金散

主治：胃病闷胀攻冲、吞酸反胃呕吐、噎气不消、胀满肋痛，一切消化不良者。

处方：内金一两 三仙九钱 大黄五钱 苏打五钱 莱菔三钱
枳壳三钱 木通三钱 红参三钱 官桂三钱

用法：共为细末，每服二钱，白水送下。孕妇忌服。

治寒郁气滞胃疼方

顏 照 群

处方：红蔻三钱 白蔻三钱 五爪橘三钱 榔片四钱 苏打
片一两五钱 薄荷冰少許

用法：共为细末，每服一钱。

化滞丸

孙 耀 先

主治：胃病一切郁热疼痛停食均治。

处方：巴豆霜一钱 黄连三钱 半夏三钱 三稜二钱 莪朮二钱
木香二钱 陈皮一钱 青皮一钱 丁香一钱

用法：共为细末，蜜丸，每服三分至五分。孕妇忌服。

可止胃痛散

李永春

主治：九种胃痛。

处方：木香四錢 乳香四錢 沒藥四錢 儿茶四錢 灵脂四錢
良姜四錢

用法：共为細末，每服一錢五分至二錢，元酒为引。

胡椒灵脂散

前郭尔罗斯蒙古族自治县 馬志超

主治：胃气痛、胀滿嘈杂痞悶，食水停滯或呕吐酸水。

处方：木香二錢 雄黃二錢 紅花二錢 豆霜二錢 枳壳二錢
公丁香四分 灵脂四分 胡椒四分

用法：共为細末，每服三分，白水送下。

禁忌：孕妇忌服。

桂香散

农安县 呂仁生

主治：胃寒痛。

处方：官桂三錢 香附三錢 吳萸三錢 良姜三錢

用法：共为細末，每服三錢，元酒調服。孕妇忌服。

簡易舒痛方

农安县 刘国刚

主治：胃痛。

处方：荔枝核（微炒）八錢 广木香一两

用法：共为細末，每服一錢，白酒冲服。

立止寒痛散

通化市 王延峰

主治：胃寒痛及腹內胀滿急性寒症。

处方：硫黃一两 广木香五錢 川附子五錢 黃桂心五錢 白朮

月三錢 牙皂三錢

用法：共為細末，每服二錢，溫開水送下。

禁忌：生冷腥物。孕婦忌服。

胃痛散

九台縣 鄭竹溪

主治：胃痛。

處方：良姜二錢 榔片二錢 焦三仙六錢

用法：共為細末，每服二錢至三錢，開白水下。

開羊花散

劉天順

主治：寒氣胃痛。

處方：广本香九錢 白蔻四錢 藜拔四錢 石榴四錢 梔子一錢
邊桂一錢 開羊花一錢

用法：共為細末，每服二錢，白開水下，一日二次。孕婦忌服。

治胃寒痛方

東丰县

處方：枣仁一两五錢 远志一两 茴香一两 藿香五錢 丁香三錢
貢桂三錢 吳茱三錢 砂仁三錢 果仁三錢 肉蔻三錢
紫蔻三錢 琥珀二錢 朱砂二錢 灵脂二錢 木香二錢
沉香二錢 冬季加古月五錢

用法：共為細末，每服三錢，開白水下，若見四肢厥逆加燒酒引服。

禁忌：熱痛忌用，新病慎用。孕婦忌服。

茴香散

農安縣 趙萬昌

主治：胃痛。

處方：神曲三錢 南茴二錢 萊菔子二錢 檳榔一個

用法：共为細末，每服三錢，开水送下。

治胃痛方

怀德县 冷 振 远

处方：光香附五錢 均青四錢 酒軍四錢 烏药三錢 油朴三錢
萊服子三錢 枳壳三錢 榔片三錢 三稜三錢 神曲三錢
广皮三錢 沉香三錢 蔻仁三錢 砂仁三錢 甘草三錢
公丁二錢 木香二錢 桂心二錢五分

用法：共为細末，每服二錢。

禁忌：凉硬之物。孕妇忌服。

洩热散

怀德县 邹 洪 迅

主治：胃脘胀滿疼痛。

处方：桃仁五十粒 大黃四兩 甘草二兩 芒硝（火炒）二兩

用法：共为細末，每服二錢至四錢。

禁忌：生冷硬物。孕妇忌服。

九痛散

九 台 县

主治：九种胃痛。

处方：紅花一兩 枳壳一兩 灵脂一兩 木香三錢 丁香三錢
豆霜三錢 古月三錢 明雄三錢

用法：共为細末，每服一錢姜引。孕妇忌服。

治胃疼方

怀德县 张 道 芳

处方：丁香二錢 木香二錢 乳香二錢 良姜五分 儿茶五分

用法：共为細末，每服二錢，一日二次，女用烧酒、男用黃
酒冲服。

禁忌：孕妇忌服。

治急、慢性胃炎，胃酸过多，消化不良，胃溃疡及小儿食积症。

农安县 陈 亚 东

处方：藿香三两 川朴三两 甘草三两 白芍三两 陈皮三两
滑石三两 苍朮三两 羌活一两八钱 硫酸镁一两五钱 重
碳酸钠一斤

用法：共为细末，每服三钱，如有便秘时，在第一次服时加硫酸镁（泻利盐）一钱五分，小儿酌减。每日三次，饭后服，酒引开水下。孕妇忌服。

安胃止痛散

九台县 王 敬 礼

主治：胃寒痛、食痛、气痛。

处方：酒芍五钱 吴茱三钱 桂心三钱 良姜三钱 姜朴三钱
超沉三钱 紫蔻三钱 枳壳三钱 水红子三钱 古月二钱

用法：共为细末，每服二钱，早午晚各服一次，鲜姜水或烧酒送下。孕妇忌服。

保愈散

德惠县 刘 毅 三

主治：胃痛、胃痉挛、急慢性胃炎兼呕吐者。

处方：香附四钱 广木香三钱 青皮三钱 乌药三钱 官桂二钱
川附子二钱 良姜二钱 榔片二钱 潮脑一钱

用法：共为细末，每服五分至一钱，温凉开水送下。

禁忌：切忌热开水冲服，过热则药力挥发而效减。孕妇忌服。

治胃疼属寒性效方

孙 振 芳

处方：丁香二钱 藿香二钱 红花二钱 蔻仁二钱 砂仁二钱

良姜二錢 白朮二錢 元胡二錢 枳壳二錢 豆霜五分

用法：共為細末，每服五分至七分即可。孕婦忌服。

止痛丹

舒蘭縣 董 樹 貞

主治：胃痛。

處方：香附五錢 大黃四錢 川附子三錢 元胡二錢 木香二錢
榔片二錢 良姜二錢 枳實一錢 陳皮一錢

用法：共為細末，每服二錢至三錢，良姜酒送下。孕婦忌服。

胃痛散

懷德縣 陳 顯 云

主治：一切寒郁氣滯胃疼痛有效。

處方：黃桂四錢 靈脂四錢 老薤仁四錢 廣皮四錢 石榴皮四錢
山奈四錢 茴香四錢 良姜三錢 萸撥三錢 訶子三錢
紅花并三錢 白朮三錢

用法：共為細末，每服三錢紅糖為引，白開水下，一日二次。

禁忌：生冷物。孕婦忌服。

潞黨散

德惠縣 張 道 芳

主治：胃疼。

處方：潞黨參二錢 川芎二錢 檳榔二錢 烏藥二錢 郁金二錢
盤沉二錢 木香三錢 良姜三錢 香附一錢

用法：每服二錢酒引下。

禁忌：孕婦忌服。

沉射散

農安縣 張 鴻 祥

主治：胃痛。

处方：乳香三錢 川軍二錢 米壳二錢 枳實一錢五分 木香一錢
沉香一錢 元胡一錢 川連一錢 公丁五錢 豆霜五分
雄黃二分 牛黃一分 台射五厘

用法：共為細末，每服五分。

禁忌：孕婦及虛弱者慎用。

胃痛散

伊通縣 楊希文

主治：胃脘疼痛，胸膈脹滿，五積六聚作痛。

处方：香附一兩 黑丑二兩 靈脂五錢 榔片五錢 三稜五錢
文朮五錢 川軍五錢 沉香三錢 廣木香三錢 砂仁三錢
紫蔻三錢

用法：共為細末，每服一錢。

禁忌：孕婦忌服。

群香散

靖宇縣 白玉璋

主治：胃脘痛。

处方：廣木香 降香 沉香 乳香 藿香 丁香 茴香 肉桂 炮姜 胡椒 良姜 朱砂各等分

用法：除朱砂外，用陳醋泡透晒干為末，再將朱砂合研。
每服二錢，白酒紅糖為引。孕婦忌服。

和胃開郁丸

延吉市 李雲樞

主治：胃痛牽動脇肋痛。

处方：香附一兩 榔片一兩 厚朴一兩 枳壳一兩 黑丑一兩
川軍一兩 赭石一兩 內金一兩 紫蔻一兩 陳皮一兩
青皮一兩 水紅子一兩 甘草六錢 茅朮五錢 三稜五錢
文朮五錢 廣木香五錢 焦查五錢 神曲五錢 麥芽五錢

元明粉五錢 灵脂五錢

用法：共为細末，蜜丸三錢或二錢重，每服一丸，姜水送下。

孕妇忌服。

消寒去郁散

范家屯 张 祥

主治：胃疼痛。

处方：硫黄 冰片 紅矾 白矾 枯矾 雄黄 七厘散各等分

用法：共为細末，每服約一、二耳勺，白酒送下。

禁忌：七日內不許吃小米飯和黃面饅頭。孕妇忌服。

二、吞 酸

百消丸

范家屯 卜 秀

主治：气滯心胃，脹滿不消，或刺痛者。

处方：黑丑一两 香附一两 神曲一两 山楂一两 山藥一两

灵脂一两 焦朮二两 青皮一两 麦芽一两 萊菔子一两

枳榔五錢 頁桂五錢 防风五錢 枳实五錢 陈皮五錢

川連五錢 沉香五錢 川芎五錢 当归五錢 烏朮五錢

厚朴五錢 法夏五錢 羌活五錢 黄芩五錢 木香五錢

郁金五錢 茯苓五錢 甘草三錢

用法：共为細末，炼蜜为丸三錢重，白朮面为衣，每服一丸，姜水送下。

禁忌：生冷硬物及陈醋。孕妇忌服。

三仙丹

长春 高 士 賢

主治：膨悶脹飽，停食不化及胃部作痛，五积六聚等症。

处方：二丑各五錢 茵陳五錢 蒼朮五錢 三稜四錢 莪朮四錢

青皮三錢 陳皮三錢 木香三錢 全蝎三錢 天虫三錢
皂角三錢 紋軍一兩

用法：共為細末，每服二錢，茶水送下。

禁忌：孕婦及體質虛弱者忌服。

舒郁理氣散

李 云 階

主治：胃中郁滯不暢。

處方：焦朮五錢 云苓四錢 青皮四錢 厚朴三錢 廣皮三錢
枳殼三錢 焦榔三錢 內金三錢 炙軍三錢 焦查三錢
麥芽三錢 神曲三錢 萊菔子三錢 蔻仁二錢 桔梗二錢
香附二錢 元胡一錢半 良姜一錢五分

用法：共為細末，每服二錢。

治胃病消化不良，膨悶脹滿方

和龍縣 富 樹 蓮

處方：廣木香三錢 砂仁七個 紫蔻七個 公丁香七個 杏仁七個
白朮七個 巴豆霜七個 大棗肉七個

用法：共為細末，將大棗煮熟去核，合藥末搗為丸如豆大，
每服五丸白水下。

禁忌：忌生冷物。孕婦忌服。

治膨悶脹滿方

吉林市 高 洪 志

處方：白蔻二兩 青皮三錢 山查三錢 草果三錢

用法：共為細末，每服二錢，每晚臨睡前服之，用蘿卜熬水
送下。

治燒心方

吉林市 劉 洪 志

處方：廣木香三錢 榔片三錢 枳殼三錢 草果仁三錢

用法：共为細末，每服二錢，蘿卜熬水送下。

治膨悶胀飽方

九台县上河灣 塔 裕 修

处方：青皮三錢 查肉三錢 草果仁三錢 白蔻二錢

用法：共为細末，每服二錢，蘿卜熬水送下。

治食物停滯方

处方：山楂肉八兩 薏米四兩 山藥四兩 糯米四兩 茯苓二兩
蓮肉二兩 白糖一斤

用法：共为細末，蜜丸三錢重，每服一丸。孕婦忌服。

治胃中停郁消化不良，噯心吐酸等症

撫松縣 包 云 程

处方：吳萸四錢 赭石三錢 砂仁三錢 川連二錢

用法：共为細末，勻六次，開白水下。孕婦忌服。

治急慢性胃炎消化不良 噯氣痞滿，胃酸過多，嘔吐
以致氣滯停水，或陣發性痙攣痛等症。

四平市 楊 青 山

处方：黨參二錢 胆草二錢 川朴二錢 陳皮二錢 半夏二錢
茯苓四錢 白芍三錢 蘆根三錢 黃連一錢半 干姜一錢半
甘草一錢 竹茹一錢

有冷熱兼表者加桂枝粉葛；陰虛發熱者加鱉甲、青蒿；
嘔逆者加赭石復花；寒多重用干姜；熱多重加黃連；
便秘加大黃枳實；氣滯者加木香。孕婦忌服。

用法：水煎服。

腹胃靈

鎮賚縣 荆 樹 范

主治：腹胃疼痛或脾胃不和，胸滿作脹，或氣上攻，打咯反

胃，飲食減少等症。

处方：人参五錢 白朮五錢 茯苓五錢 厚朴五錢 砂仁五錢
烏藥五錢 神曲五錢 麦芽五錢 十開蔻五錢 草果仁五錢
香附五錢 當歸七錢 川芎四錢 桔紅四錢 蒼朮四錢
榔片五錢 白蘧四錢 石斛四錢 薏米四錢 半夏三錢
枳壳三錢 蘇梗三錢 沉香二錢 甘草三錢 白酒三斤
白糖二斤 青皮五錢 木香三錢

用法：先用白水三斤將藥泡一宿，再將白酒入內再泡，使藥力下來，再用白布擠出藥水，把白糖投入與藥水均勻，每次服二至三盅。孕婦忌服。

治胃熱吞酸方

九台县 王 東 林

处方：沙參三錢 延胡二錢 焦梔二錢 棟子二錢 桔紅二錢
知母二錢 麥冬二錢 桔梗二錢 法夏二錢 竹茹二錢
川芎一錢五分 甘草一錢

用法：水煎服三次，早晚服之。孕婦忌服。

治胃酸过多方

吉林市 邓 維 漢

处方：蒼朮二錢 厚朴二錢 石決二錢 廣皮二錢 海粉二錢
牡蠣二錢 甘草一錢

加減法：有熱加焦梔二錢 有濕寒加吳萸一錢 生姜一錢五分

用法：水煎服三次。

治胃酸过多症及慢性胃炎方

長春中醫學院 任 觀 學

处方：平胃散加甘松三錢 佛手二錢 生龍骨五錢 煅牡蠣四錢
黃連一錢

用法：水煎服三次。

驗例：經治一百六十多例，均收到良好效果，其中重症，用此方不过六剂而痊癒。

三、反胃、噎膈、呃逆

治幽門狹窄反胃方

長春中醫學院 張維禮

處方：人參二錢 白朮二錢 茯苓二錢 甘草二錢 清夏二錢
當歸二錢 焦梔二錢 陳皮三錢 砂仁一錢五分 木
香一錢五分 油朴一錢五分

用法：引用鮮姜三片，水煎，服三次。孕婦忌服。

治噎膈反胃方

通化市 迟广田

處方：赭石醋炙三錢 木香一錢 郁金三錢 陳皮二錢 莢蓉二錢
白芍二錢 內金二錢 清夏一錢五分 桃仁一錢 甘草一錢

用法：共為細面，每服一錢，早晚各服一次，白水送下。孕婦忌服。

加減法：煩躁者加石羔五錢 便瀉者減之。

治噎膈反胃方（幽門狹窄，大便干燥者）

舒蘭縣 郎玉群

處方：生赭石七錢 生山藥四錢 天冬四錢 黨參三錢 花粉三錢
紅花一錢 土虫一錢 桃仁二錢 漢三七二錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治噎膈反胃效方

處方：桃仁三錢 杏仁三錢 麻仁三錢 核桃仁三錢

用法：共為細末，用蒲公英根子洗淨，搗後取汁投入藥末三錢，為一付，白水送下。孕婦忌服。

治噎膈方

前郭旗 高 恩 清

处方：檳榔七个焙 核桃仁七个 甘草末二錢 公鴿糞七个焙 紅花二錢
大黃三錢 紅粘谷三錢 黃酒一斤 海蜇五兩 甘草二錢

用法：將各藥為面，把黃酒、海蜇入沙鍋內熬化，將藥投入
熬成稀羔狀，再入白糖攪勻即妥。每次服一至二匙，
不可多服，多則吐血。

禁忌：怒氣、房事。

治噎膈方

懷 甸 縣

处方：大黃二兩 青皮五錢 陳皮五錢 三棱五錢 桃仁四錢
公丁香三錢 烏藥三錢 礞石三錢 莪朮三錢 川朴三錢

用法：共為細面，蜜丸三錢重，早晚各服一丸，白水送下。
孕婦忌服。

治嘔吐、反胃、轉食方

孫 海 金

处方：鮮姜一斤（切碎搗爛）紅糖一斤

用法：將二藥裝入磁罈內，封好口埋在房門坎底下，二十一
天時取出。每次用量三至四錢，引用黃土坑內黃土七
錢，白糖七錢，紅姑娘七个，大蘿卜七片，煎水送下，
日服兩次。

治轉食方

懷德縣 陳 鵬 云

处方：鷄內金一个 核桃仁十六个 胡椒七粒 紅棗肉七个
紅糖三錢

用法：共為細面，黃酒為丸二錢重，每服一丸，黃酒送下。

治飲食不下，膈食方

德寧縣 仇 長 庚

處方：硫黃二錢 水銀一錢

用法：共研黑如墨，每服五分至一錢，黃酒、姜汁送下。

注：此方為醫宗金鑑內科雜症門噎膈反胃總括之承疏散，因此藥毒性猛烈，應謹慎使用。孕婦服忌。

治食不下噎膈方

九台縣 王 振 榮

處方：胡蘿卜切片、香油二斤

用法：用香油炸胡蘿卜片，隨意食之。

驗例：本人曾患此病，經食過二斤香油炸胡蘿卜片即愈。

治噎膈反胃，嘔吐方

長白縣 丁 明 閣

處方：香附三錢 陳皮三錢 柿蒂三錢 檳榔三錢 茯苓三錢
枳殼二錢 厚朴二錢 紫蔻二錢 沉香二錢 砂仁二錢
人參二錢 白朮二錢 甘草二錢

用法：引用生薑三片，水煎服三次。

治呃逆膈膈貳方

前郭爾羅斯蒙古族自治縣 高 恩 清

處方：蒼朮三錢 厚朴三錢 陳皮三錢 梔子三錢 萊菔三錢
核桃仁三錢 焦榔三錢 烏藥三錢 香附三錢 炙草二錢
果仁二錢 砂仁二錢 建曲四錢 李仁四錢 醋炙酒軍
炭一錢

用法：姜棗為引，水煎服三次。

治呃逆打膈貳方

長嶺縣 郝 玉 春

處方：川貝三錢 當歸三錢 大黃三錢 杏仁三錢 白芥子三錢

蘇子二錢 清夏二錢 腹皮二錢 焦梔二錢 甘草二錢
酒芩二錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治逆氣打膈貳方（膈肌痙攣）

處方：枳殼二錢 蘇梗二錢 丁香二錢 青皮二錢 當歸二錢
焦查二錢 烏藥二錢 白蘘二錢 半夏二錢 甘草二錢
瓜蒌四錢 茯苓四錢 沉香一錢五分 郁金一錢 木香一錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

加減法：屬寒者加吳萸、熱者加竹茹。

四、胃潰瘍（胃痛）

治消化性潰瘍方

九台县 姜 瑛 春

處方：蜜銀花二錢五分 枸杞果二錢五分 寸冬二錢 黃芪二錢
公英二錢 連翹二錢 焦枳櫛二錢 沙參二錢 建曲二錢
君子肉二錢 地丁一錢 枳實一錢 甘草一錢 煨三七
面九分（均三包）

用法：水煎服三次，每次沖三七面一包，隨藥服下。

治胃潰瘍方

吉林師大 周 蘭 澤

處方：海螵蛸五錢 煨三七五錢 沒藥三錢

用法：共為細面，每服一錢，一日二次白水送服。

治胃潰瘍方

琿春縣中醫院

處方：當歸五錢 浙貝五錢 烏賊骨三錢 茴香二錢五分 靈

脂二錢 延胡二錢 乳香一錢五分 沒藥一錢五分

用法：共為細面，每服一錢，早晚各服一次。

驗例：經用此方，歷經兩周逐漸好轉，療效達百分之八十以上。

治胃潰瘍方

崔向榮

處方：人參二錢 白朮二錢 甘草二錢 陳皮二錢 薏仁二錢
茯苓三錢 半夏三錢 海螵蛸三錢 浙貝一錢五分 百
合五錢

用法：先為煎劑服之，至收效後按此方配成散劑，每次服一錢五分，一日三次。孕婦忌服。

治胃潰瘍方

處方：銀花一兩二錢 浙貝一兩 當歸一兩 郁金五錢 黃連五錢
丹皮五錢 生地五錢 三七三錢 生雞蛋殼內白皮三十個

用法：共為細面，每服一錢，白水送服。孕婦忌服。

治胃潰瘍方

李子芳

處方：當歸三錢 熟地三錢 白芍三錢 黃芩三錢 黃連三錢
黃柏三錢 丹皮三錢 川芎二錢 薏仁四錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

加減法：大便困難，加大黃三錢。

五、吐 血

治吐血方

新站結核病院 荆樹蘭

處方：茅根三錢 毛狗三錢 藕節三錢 犀角三錢 生地三錢

元參三錢 蘇梔三錢 三七二錢(為面均三包)

用法：水煎服三次，每次沖三七面一包裝下。孕婦忌服。

治大吐血方（嘔逆，湯藥不下，入口即吐）

長齡縣 趙 支 功

處方：人參一兩 赭石面五分

用法：人參煎湯冷卻後，加入赭石面涼服之吐即止，如不嘔逆者不加赭石。孕婦忌服。

治吐血方

處方：生地五錢 知母三錢 柴胡三錢 川貝三錢 銀花三錢
黃芩三錢 桑皮二錢 山梔二錢 黃連二錢 桔梗二錢
花蕊石二錢 甘草二錢

用法：水煎服三次。

治吐血方

臨江 李 宝 芬

處方：紅棕炭三錢 白芨三錢炒 白芷三錢炒

用法：共為細末，每服三錢，黃酒沖服。

治吐血方

范 垂 功

處方：熟地一兩 蒲黃炒黑一兩 漢三七四錢 血余炭一錢

用法：共為細面，每服三錢，白水送服。

治一切內傷性吐血方

處方：川貝六錢 白芨三錢 茅根二錢 以上為末 鷄子二十個
白糖六錢

用法：上藥共分十分，每日早晚各服一分，開白水沖服。
孕婦忌服。

治脾虛吐血方

塘字县 王 連 生

处方：炙芪二兩五錢 人參一兩 炮姜五錢 焦朮五錢 附子四錢
炙草四錢

用法：姜枣为引水煎服，另用老薏仁四錢，以姜汁炒为末，
分成八分，加白糖少許，用湯藥冲服。孕妇忌服。

治吐血、便血、子宮出血方

鹿 逸 仙

处方：鹿胶三錢 三七炭一錢

用法：共为細末，用开水冲服。

治吐血方

嶺南縣 趙 集 春

处方：百合二錢 生地二錢 川貝二錢 焦梔二錢 寸冬二錢
阿膠二錢 归尾一錢 赤芍一錢 炒蒲黃一錢 熟地一錢
丹皮一錢 川芎一錢 桃仁一錢 犀角一錢

用法：水煎服。孕妇忌服。

治吐血方（男子大口吐血）

公主岭 侯 英 华

处方：人中白三錢 三七一錢

用法：共为細面，每服二錢，白水冲服。

治胃吐血方

处方：月石一兩研成細面

用法：大蘿卜切成薄片，將月石面撒在蘿卜片上，用鍋蒸烂
食之，一次食尽。

驗例：一患者苗某，突然大口吐血成碗，服此方一剂痊愈，
此外，治疗十数名亦痊愈。

六、黃疸病

治黃疸方

德惠縣 李文雅

處方：茵陳五錢 黃連三錢 黃芩三錢 山梔三錢 甘草三錢
青羊胆一個

用法：水煎服，用藥汁沖羊胆汁服下。

治黃疸方

農安縣 郭老太太

處方：赤小豆一粒 瓜蒂三錢 胆矾七分

用法：共研細面，每用少許吹于鼻孔內，以鼻流出黃水，眼
出黃泪，小便黃尿為效。

治黃疸方

梨樹縣 李金山

處方：苦丁香三錢 黃瓜蒂三錢

用法：共為粗末，加艾葉用紙將藥卷一柱狀，點一端令烟薰
鼻。

七、單腹脹、臌脹

加減廩虫丸

榆樹縣 曹 瑛

主治：肝硬變，干血癆。

處方：大黃二兩五錢 土虫一兩 黃芩二兩 桃仁四兩 杏仁四兩
赤芍二兩 廩虫一兩五錢 干漆一兩（般） 生地一斤
水蛭一百個 鱉蟾一百個 甘草三兩

用法：共为細面，蜜小丸如黄豆大，每服五丸，开白水送服下。

禁忌：孕妇禁服。

治肝硬变、虫症、大肚子病方

王 玉 書

处方：大黄三两 蜈蚣三十条 鷄子十个

用法：将鷄子打入盆內，把二药末投入攪匀，放置鍋內蒸熟，趁热为丸，如黄豆大小丸，每服五丸，白水送下，一日二次。孕妇忌服。

消胀湯

德惠县 李 文 雅

主治：单腹胀。

处方：紅参三錢 白朮三錢 茯苓三錢 茅朮三錢 寸冬三錢
泽泻三錢 厚朴三錢 桑皮三錢 赤茯苓五錢 木通二錢
陈皮二錢 木香一錢

用法：水煎服，用慢火长煎，每剂煎三次，早晚各服一次。

消臌散

德惠县 李 文 雅

处方：一切鼓胀，单腹胀，血壅胀等症。

处方：鮮車前草一斤 水熬成羔晒干 白丑五錢 蜜便浸泡 甘遂二錢
白面裹煨 赤茯苓一两 土水浸泡 白茯苓二两土炒 桑皮一两
泽泻一两

用法：共为細面，每服一錢，白水送下。孕妇忌服。

化坚湯

白城市 周 龙 驤

主治：肝硬化（肝肿压痛，腹胀浮肿等症）

处方：甲珠六錢 当归四錢 牡蠣四錢 龟板三錢 鳖甲三錢

白芍三錢 知母三錢 姜虫二錢 全退二錢 甘草二錢
覆虫二錢

用法：添水三碗，煎至一碗，每日早晚溫服。孕婦忌服。

虛臌即愈湯

內蒙 孟 靖 字

主治：氣虛臌症（腹脹如鼓，頭面四肢皆腫）。

處方：白朮一兩 茯苓一兩 薏米一兩 山藥五錢 車前一錢
油桂一錢 炙草一錢

用法：水煎適當，不要太久，早晚溫服。

禁忌：生冷硬物。孕婦忌服。

干蟾散

主治：單腹脹，血蠱脹。

處方：干蟾三個 甘遂六分（將甘遂插在豆腐上，用砂鍋煮開半小時取出，焙干為面）紅花一錢五分

用法：共為細面，分為三次用，一日一次或二、三日服一次。

注：按體質強弱情況用量，此藥性猛烈，服后有瀉下惡物及水樣便，但覺體虛時，可服補藥，如養榮丸等。

禁忌：甘草，辣物等。孕婦忌服。

治臌脹方

舒蘭縣 楊 寶 山

處方：紅人參三錢 白人參一錢五分 千金子四錢

用法：共為細面，每服一錢，開白水服下。

附例：此方臨床上有奇效，不可多服。

治水鼓症方

东丰县 李增新

处方：大戟一斤 紅枣三斤

用法：水煮一昼夜，取枣晒干，任意食之。孕妇忌服。

注：此方药性猛烈，按体质强弱情况，可酌情使用。

治水臌症方

榆树县 王凤山

处方：大麦芒子二两 白茯苓一两 白朮二两 赤小豆二两（紅小豆）

用法：水煎服，分几次服之。

驗例：服一剂即有腹内雷鳴泻水，再服二剂即将水泻尽而癒。

治臌胀方

鎮賚县 李云峰

处方：甲：偏于气者用

人參三錢 木香二錢 赤茯苓三錢 青皮三錢 陈皮三錢
腹皮五錢 榔片三錢 三棱二錢 莪朮二錢 焦白朮三錢
香附三錢 苏梗三錢 木瓜三錢 木通二錢 沉香二錢
半夏二錢 大黃三錢 甘草二錢

用法：随症加减，水煎服之。孕妇禁忌。

加減法：① 水肿甚者，小便少或腎子肿大，先用螻蛄焙干为面，黃酒冲服有效。

② 腹脹甚时，加枳什、草果仁去人參。

③ 气短咳嗽加寸冬、双皮。

④ 腰腹肿滿或大小便不通、加蜂蜜二、三两与药同时服下有效。

⑤ 小便涩滯不通、气不虛者，加黑丑二錢。

⑥ 头面肿甚者，加大葱带根七棵为引。

乙：偏于水者。

茯苓皮一两 灯心五钱 通草五钱 泽泻五钱 猪苓三钱
腹皮六钱 防己五钱 木瓜五钱 榔片三钱 甘草二钱

用法：随症加减，水煎服之。

加减法：① 大便干燥不通时，加蜂蜜每次二、三两。

② 膀胱喘时，加葶藶二钱。

③ 没有其他合并症，用甲乙两方轮流治之。

验例：此方一般治疗，效果良好。

治水鼓方

怀德县 王 登 朝

处方：甘遂四钱 商陆四钱 二丑各二钱半 半生半熟

用法：共为细面，用蕎面做成面条，均两次服，三天吃一次。

禁忌：忌盐十八天。孕妇忌服。

验例：用此方治疗二十余例

注：药性毒烈猛烈，成人慎用。

治水鼓胀方

李 潘 泉

处方：甘遂二钱 商陆一钱五分

用法：甘遂用陈醋浸泡煨炒成淡黄色，同商陆共研细面，将白面二、三两与药混合一处，做成面条，用白水煮沸，外加蒜瓣五枚，盐五粒，在早晨空腹时一次吃之，绝食一日。

服后作用：利二便，大便时多数泻水，少数，也有恶心或作吐等作用。

禁忌：忌盐三个月。孕妇忌服。

驗例：屢用有驗，少數復犯。

注：正氣不足體虛之人，應慎用。

消臌散

海龍縣 馬 獻 圖

主治：男婦老幼臌脹症。

處方：龍衣二兩 芫花二兩 大戟二兩 甘遂二兩 百草霜二兩
南星二兩 二丑二兩 紅棗肉二兩 榔片二兩 全虫一錢五分

用法：共為細面，成人每服一錢，白水送下。孕婦忌服。

注：須根據體質情況，酌情應用。

治氣實水臌脹滿方

乾安縣 鞠 維 恒

處方：巴豆霜三錢 莢朮一兩 杏仁一兩 川椒一兩 枳實一兩
大茴香一兩 官桂一兩 陳皮一兩 青皮一兩 干姜一兩
川芎一兩 二丑一兩 良姜一兩

用法：共為細面，每服三錢（大人量），服時用飛羅面對半，用大棗包着吃。孕婦忌服。

治氣實水臌症方

乾安縣 鞠 維 恒

處方：巴豆霜一錢五分 輕粉二錢六分 硫黃一錢

用法：將三味藥，研成羔做餅，把藥餅放在新的棉花片上，藥餅面朝上，棉花面貼在肚臍上，一小時左右，大便就能瀉水樣油物，瀉三、五次後，可喝小米粥補之。不可內服

治大肚子病效方

德惠縣 張 道 芳

處方：廣木香三錢 廣砂仁四錢 檳榔四錢 紫皮蒜半斤去皮

用法：三味藥共為細面，用豬胃一個洗淨，把藥和蒜全裝入豬胃內，煮熟食之，服後見效。

治气厥方

双阳县 赵 维 春

处方：黑丑一两 神曲六钱 木香二钱

用法：共为细末，每服一钱，桑皮为引，白水送下。孕妇忌服。

八、积 聚

荡积汤（沈氏尊生方）

延吉市 朴 龙 丰

主治：五积六聚，诸般痞块。

处方：当归一钱 半夏一钱 白朮一钱 陈皮一钱 枳实一钱
山查一钱 香附一钱 厚朴一钱 砂仁一钱 海粉一钱
瓦楞一钱 鳖甲一钱 阿魏一钱 木香一钱 为面均三
包。

用法：水煎服三次，每次冲木香面一包送下。

禁忌：忌生冷硬物。孕妇忌服。



化癥汤

通化县 成 益 庆

主治：一切癥积坚硬疼痛者。

处方：当归五钱 莪朮五钱 川芎三钱 赤芍三钱 生地三钱
三棱三钱 桃仁三钱 干漆三钱 香附三钱 红花二钱
大黄二钱 枳实二钱 乌药二钱 官桂二钱 益智二钱
甘草一钱

用法：每剂煎三次，每次用水六百毫升，煎至二百毫升，每隔六小时服一次。

注：体虚气弱者慎用。孕妇忌服。

胃宁金丹

怀德县范家屯 卜 秀

主治：一切积聚，食积，肉积，茶积，虫积，寒积，气积，酒积，胃胀满阻塞等症。

处方：麦芽二两 苍朮一两 枳实一两 茯苓一两 生姜一两
神曲二两 法夏七钱 赤苓七钱 黄连七钱 白螺壳七钱
泽泻七钱 川芎七钱 草蔻五钱 藜子五钱 吴茱五钱
黄芩五钱 砂仁五钱 青皮五钱 白朮三钱 陈皮三钱
榔片三钱 香附三钱 甘草二钱 厚朴二钱 木香五钱
莪朮二钱

用法：共面蜜丸三钱重，每日早晚两次，每次一丸白开水服下。孕妇忌服。

治胃部胀满郁积不化疼痛难忍

处方：二丑二两 蒲黄一两 香附一两 灵脂一两 雄黄五钱

用法：共为细末，陈醋糊小丸，雄黄为衣，每服二钱，白水送服。孕妇忌服。

治积聚攻胃疼痛，小腹有血块胀痛方

通化市 王 延 峰

处方：香附醋制四两 海粉二两 桃仁一两 白朮一两

用法：共为细面，醋糊为小丸，每服三钱，淡醋汤送下。孕妇忌服。

治一切积聚症方（气、血、寒、食、水）

安安县 姚 学 清

处方：归尾四钱 赤芍四钱 榔片四钱 枳壳四钱 枳实四钱
干漆四钱 木香四钱 山楂四钱 牛膝四钱 延胡四钱
灵脂四钱 干姜四钱 吴茱二钱 三棱二钱 莪朮二钱
藜子八钱 腹皮八钱 芒硝八钱 黑丑三两 纹军三两

用法：共为細面，醋糊小丸，每服三錢，早晚各服一次，白水送下。孕妇忌服。

治痞积攻胃，臌滿疼痛，消化不良方

处方：炒黃連八錢 厚朴五錢 吳萸三錢 黃芩二錢 白朮二錢
茯苓二錢 茵陳一錢五分 砂仁一錢五分 人參一錢 澤瀉
一錢 川烏五分 川椒五分 巴豆霜五分 桂枝五分 炒干姜五分

用法：共为細面，蜜小丸如梧桐子大，初服两小丸，一日加一丸，加至大便瀉泻时，再一次服两丸。

加減法：春夏时加黃連五錢。

治大肚癖疾效方

延吉市 景 春 阳

处方：全虫五錢 斑猫三錢 大黃四錢（半生半熟） 蜈蚣三条

用法：共为細面，每服一錢，黃酒送下。

經驗：服后不久，大便下脓血样物，小便下白浊稠涕样物，或痛疼难忍，过一会儿就好了，小儿体弱者慎用，如服后体虛者，須服补剂以养之。

九、腹 痛

治寒性腹痛，胃痛方

梅河口 张 永 富

处方：肉桂一錢 吳萸一錢 清夏一錢 茴香一錢 良姜一錢
炮姜一錢 附子一錢 烏药一錢 木香一錢 杜仲一錢
砂仁一錢 官桂一錢 白果一錢 棟子一錢 香附一錢
白薤一錢 沉香一錢 草果仁一錢

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

治腹痛方

前郭旗 馬志超

处方：良姜三錢 青皮二錢 川棟子二錢 靈脂二錢 大茴香二錢
甲珠二錢 延胡一錢五分 榔片一錢五分 沒藥一錢五分
沉香一錢 砂仁一錢 丁香五分

用法：共為細面，每服三錢，黃酒送下。

治腹痛方

懷德縣 鄒洪迅

处方：平胃散三錢 加藿香面一錢 木香一錢 射香七厘

用法：均兩次，開白水服下。孕婦忌服。

治腹寒痛攻胃痛方

蛟河縣 高鳴九

处方：延胡四錢 靈脂三錢 官桂三錢 炮姜三錢 香附三錢
乳香三錢 沒藥三錢 枳殼三錢 茴香三錢五分 沉香二錢
酒芍二錢 木香一錢五分 甘草一錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治腹鳴起包暴痛，响后痛止，脈見沉迟方

長嶺縣 廖錫林

处方：麻黃一兩 附子三錢 細辛一錢 桂枝一錢五分 甘草二錢
生姜二兩 大棗十個

用法：水煎服三次。

治腹膜炎方

乾安縣 韓國福

处方：生白芍二兩 生甘草一兩

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治結核性腹膜炎方

吉林師大 周 蘭 澤

處方：柴胡二錢 貢白朮二錢 茯苓二錢 半夏一錢五分 猪
苓一錢五分 澤瀉一錢五分 山查肉一錢五分 三棱一錢五分
莪朮一錢五分 人參一錢 黃連一錢 甘草八分

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治脾虛泄瀉腹痛方

延吉市 孫 秀 峰

處方：姜虫三錢 白朮三錢 茯苓三錢 丁香三錢 青皮三錢
肉蔻三錢 藿香三錢 砂仁三錢 山藥三錢 紫蔻二錢
官桂二錢

用法：共面蜜丸三錢重，每服一丸白水服下。孕婦忌服。

治反胃嘔吐虛寒腹痛方

延吉市 孫 秀 峰

處方：木香五錢 紫蔻五錢 郁金五錢

用法：共為細面，每服一錢，姜水送服。

治因感風寒小腹作痛或虛冷腹痛，陰疝作痛方

樺 甸 縣

處方：沉香一錢 香附三錢 良姜三錢 油桂三錢 白酒一斤

用法：將四味藥共為粗末，布袋裝好，放入酒瓶中浸三日
后，即可應用，每日早晚各飲一盅。孕婦忌服。

治胃寒腹痛消化不良方

汪清縣 金 薰 松

處方：油桂二兩 華拔一兩 沉香五錢 丁香五錢 木香五錢
砂仁五錢 白蔻五錢 草果仁五錢 草蔻五錢 川椒三錢
胡椒一錢 冰片七分 另加重曹二兩

用法：共為細面，不見火，蜜丸黃豆粒大，每服六丸，開白

水服下。孕妇忌服。

十、痢疾

治初得赤白急性痢疾方

长春中医学院 张 煥 久

处方：当归三两 白芍三两 萊菔子一两 榔片二錢 枳实三錢
車前子三錢 甘草二錢

用法：水煎服三次。

治赤白痢疾腹痛里急后重及太便秘滞方

长春中医学院 张 煥 久

处方：生山查肉 焦山查肉 車前子炒各等分

用法：共为細面，成人每服三錢，紅白糖为引，开白水服下。

治痢疾初起方

前郭旗 高 恩 清

处方：莢連七分 酒芩三錢 厚朴三錢 当归三錢 生药三錢
榔片三錢 地榆三錢炒 山查三錢 枳壳二錢 桃仁二錢
紅花一錢五分 木香一錢

用法：水煎服三次。

治赤白痢疾，里急后重，便如脓血烂肉， 痛如刀刺方

长春中医学院 程 万 生

处方：生桑皮一两 烏梅八錢 人參三錢 黑豆五錢 大枣十六枚
紅糖五錢（白痢白糖，气虛者生桑皮酌减）

用法：水煎服三次。

治赤痢良方

处方：当归一两五錢 白芍一两五錢 枳壳二錢 厚朴二錢 滑石二錢 炙甘草二錢 煎子一錢 木香一錢

用法：水煎服三次。

治赤白痢疾，里急后重方

洮南 杜中和

处方：当归五錢 白芍五錢 厚朴三錢 車前三錢 黄芩二錢 枳实二錢 煎子二錢 黄连二錢 山查二錢 甘草二錢 木香一錢

用法：水煎服三次。

治赤白痢疾方

双江县 楊峰屹

处方：酒芍四錢 厚朴四錢 黄芩四錢 当归三錢 山查三錢 枳壳三錢 黄连三錢 大黄三錢 榔片二錢五分 清夏二錢 甘草一錢五分 吳茱一錢

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

治久痢方（慢性痢疾）

長春中医學院 宋选卿

处方：柿蒂五錢 姜連三錢 烏梅肉三錢 訶子肉三錢

用法：共为細面，每服二錢，紅痢紅糖引，白痢白糖为引，一日早晚各服一次。

治赤白痢疾方

靈寶县 刘汗閣

处方：当归五錢 大黄二錢 赤木三錢 紅花三錢 桃仁三錢 三棱三錢 莪朮三錢 赤芍三錢 附子三錢 榔片三錢 猪苓三錢

用法：共为細面，每服三錢，紅痢紅糖、白痢白糖为引，开白水送服。孕妇忌服。

十一、腹 瀉

治腹瀉方

前郭旗 馬 志 超

處方：党參三錢 白朮三錢 赤苓三錢 豬苓三錢 澤瀉三錢
茅朮四錢 薏米四錢 山藥四錢 肉桂一錢 車前三錢
肉蔻三錢煨 炮姜一錢 炙草二錢

用法：水煎，服三次。孕婦忌服。

加減法：大便糟粕者加神曲三錢

體熱者加酒芍三錢

腹鳴者加腹皮三錢

腹脹滿者加草果仁一錢五分 蘇梗三錢

治氣虛脾弱消化不良，腹中雷鳴，泄瀉不愈方

洮南 杜 中 和

處方：白朮四錢 赤苓四錢 炙芪四錢 澤瀉三錢 党參三錢
扁豆二錢 陳皮二錢 炙草二錢 豬苓一錢五分 肉蔻一錢
升麻一錢 姜棗各一錢

用法：水煎服三次。

治腹瀉方（水樣便）

昌圖縣 孫 桂 芝

處方：白朮一兩 車前五錢

用法：水煎服三次。

治大便溏瀉脈數者方

安圖縣 關 云 武

處方：牡蠣一兩五錢（搗碎）

用法：水煎服三次。

十二、便 血

治大便下血方

农安县 葛 树 棠

处方：椿皮四两 烏药三錢 香附三錢 油桂三錢 良姜三錢

用法：共为細面，每服三錢，白开水送服，每日早晚各服一次。孕妇忌服。

治腸出血方

于 远 航

处方：椿皮四两 黑豆四两 蜂蜜四两 赤参三錢 蓮須三錢
大枣七个

用法：水煎服三次。

治腸風下血方

海龙县 馬 献 图

处方：生山药五錢 生白芍五錢 花蕊石煅五錢 槐角四錢
甘草三錢 三七二錢

用法：共为細末，每服二錢，白水送服。

治大便下血方

邵 宗 仁

处方：槐花炭一两 樗皮炭二两 柏叶炭三錢 牡蠣煅三錢 酒
苓二錢 荆芥炭二錢 阿胶一錢五分 枳壳一錢

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

治腸風下血方

榆树县 曹 瑛

处方：椿皮四两 麦芽四两 元肉二两 鴨胆子五錢 青靛黑
豆一把（适量）

用法：水煎服三次。

治腸風下血方

長春中醫學院 周青山

處方：椿皮炭四錢 陳皮四錢 腹皮四錢 青皮三錢 紅糖五錢
紅棗三個

用法：水煎服三次。

治便血方

高宜民

處方：椿皮二兩 紅糖二兩

用法：水煎服三次。

治大便下血方

長嶺縣 趙支功

處方：椿皮五錢 地榆五錢 槐角五錢 元肉三錢 鴨胆子仁五分

用法：將前三味煎湯，沖服元肉包鴨胆子仁服下。孕婦忌服。

加減法：如便濁血，肛門痛者，加黃芩三錢。便清血，肛門不痛者，加入參二錢 升麻五分。

驗例：治療十三例，均收療效。

治大便下血方

吉林省中醫研究所 李振鰲

處方：椿皮二兩 白芍三錢 當歸三錢 黃連一錢五分 地榆一錢五分

用法：共為細面，每服二錢，白水服下，白糖為引。

治腸風下血，中氣下陷日久不愈方

農安縣 張洪藩

處方：赤參三錢 槐花三錢 椿皮一兩 烏梅肉一錢 大棗十個

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

加減法：如有心中煩者，可在第一劑原方中加豆豉一錢五分

治便血方

吉林市 邓 维 滨

处方：当归(炒)二錢 生地炭二錢 黄芩(炒)二錢 阿胶二錢 白芍(炒)二錢 地榆三錢 棕炭三錢 白朮三錢 姜連一錢五分 荆芥炭一錢五分 升麻(蜜制)一錢五分 川芎一錢

用法：水煎服三次。

治驗：便前或便后出鮮紅血者，或因痔疾便血皆效，又治产后便血及妊娠期便血，并有安胎清热之功用。

治大便下血方

大安县 王 連 魁

处方：槐花 地榆 貫仲炭各等分

用法：共为細面，每服三錢，黄酒为引。孕妇忌服。

治大便出血方

鎮賚县 赵 象 春

处方：熟地一两 当归一两 地榆三錢 木耳三錢

用法：水煎服三次。

注：便前出血者治疗效果最好。

內痔丸

敦化县 岳 天 泰

主治：便后出血

处方：熟地五錢 当归五錢 地榆五錢 槐角一两 酒軍一两
地龙三錢 紅花三錢 桃仁三錢 椿皮一两

用法：共为細面，蜜丸二錢重，每服一丸，白水送服。
孕妇忌服。

十三、腸痛（闌尾炎）

治闌尾炎初期效方

农安县 王 功 章

处方：銀花二兩 紋軍一兩（有用二兩者可根据病情決定）
敗醬草八錢 桃仁五錢 當歸四錢 薏仁四錢 連翹四錢
薏米三錢 朴硝三錢 丹皮二錢 甘草二錢 枳壳二錢
桔梗二錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治闌尾炎方

金 世 和

处方：銀花一兩 公英一兩 當歸一兩 牛膝五錢 地榆五錢
甘草一錢五分 乳香一錢五分 沒藥一錢五分

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治闌尾炎方

处方：麻仁三錢 杏仁三錢 白芍二錢 枳實二錢 川朴二錢
大黃二錢 李仁二錢

用法：水煎服三次。

驗例：余用此方治此症數例，收良效。

十四、脫 肛

治脫肛方

柳河縣 薛 万 群

处方：紅參三錢 黃芪五錢 川芎二錢 升麻二錢

用法：水煎服三次。

治气虚脱肛效方

九台县 张 兴 圃

处方：黄芪三两 防风一钱

用法：水煎服三次。

治脱肛方

磐石县

处方：黄芪一两 人参三钱 当归三钱 川芎二钱 升麻二钱
甘草二钱

用法：水煎服三次。

治脱肛腹泻久治不愈方

怀德县 刘 忠 元

处方：黄芪二两 滑石一两 鯨魚首一个（焙干）

用法：共为细面，每服四钱一五钱，早晚各服一次，白水送服。

治脱肛方

桦甸县

处方：防风二钱 瓜蒌二钱 米壳二钱 蛇床子二钱 榴皮二钱
鸡冠花五钱 茜草根三钱 生卷柏三钱

用法：共为细面，每服二钱白酒调服。

治脱肛方

磐安县

处方：五倍子三钱 白矾一块

用法：水煎趁热洗之，洗时，须用一块干净布垫手托之。

十五、絞腸痧

治絞腸痧方

张荣久

处方：藿香四錢 蚕砂四錢 枳实四錢 灵脂六錢 香附三錢
 元胡三錢 乳香三錢 沒药三錢 厚朴三錢 白芍三錢
 竹茹三錢 紫蔻二錢五分 蒲黄二錢

用法：引用生姜三片，水煎服。

驗例：此方为榆树县名医赵正德之有名經驗特效方，我用此方治疗絞腸痧患者有效。

治阴症絞腸痧心腹急痛方

蛟河县 荆树兰

处方：桃仁五錢 生灵脂五錢 元胡一两 乳香四錢 沒药七錢
 用法：共为細末，醋糊为小丸，每服二十至三十丸醋下或酒下，姜湯下，酌情选用。服孕妇忌。

第三节 呼吸系統疾病

一、感冒性咳嗽

治感冒发热咳嗽喘息及大叶性肺炎方

吉林师大 周兰泽

处方：蜜麻黄三錢 蜜杏仁二錢 生石膏二錢 甘草 錢半
 百合三錢 浙貝母二錢 麦門冬二錢

用法：水煎服，一日三次。

驗例：1 羅××年十五岁患此病，服方三剂而愈。

2 任××年八岁患此病，經余診治服此方治愈

治肺热咳嗽，痰稠色黄，气喘舌干，痰中帶血方

农安县 李 尚 泽

处方：糖瓜蒌 通草 薏米 活水蘆根 經霜桑叶各等分

用法：根据病情輕重用藥量。孕妇忌服。

治冬天咳嗽方

农安县 李 士 杜

处方：干姜一两 川貝一两 杏仁一錢

用法：共为細面，每服一錢，开白水冲下。孕妇忌服。

化痰湯

敦化县 王 雅 臣

主治：肺炎。

处方：前胡二錢 連召一錢 甘草三分 桔梗一錢半 杏仁五分
蕤仁一錢 黄芩二錢 桑皮二錢 玄參一錢 生石羔二錢半
黄連三分 寸冬一錢 蘆根为引

用法：水煎服，日服三次。

驗例：治愈数例。

治肺炎方

鎮賚县 崔 德 蘭

处方：朱砂五分 西藏紅花五分 犀角五分 生石羔一錢 川
貝一錢 知母一錢

用法：共为細面，二岁至四岁小儿每服五分，根据年齡适当
增減，开白水冲下。

止咳丸

九台县 李 即 棠

主治：伤风咳嗽及肺火咳嗽等症。

处方：米壳一錢 白芥子一錢 石羔(生)一錢 川貝一錢 五味一錢 蕤仁一錢 杏仁一錢 麻黃一錢 甘草一錢

用法：共为細面，炼蜜为丸三錢重，早晚各服一丸，开白水送下。

驗例：經用此方有效。

治风寒咳嗽方

前郭旗 馬 志 超

处方：麻黃三錢 海浮石三錢 百部三錢 側柏叶三錢 杏仁三錢 甘草三錢

用法：共为細面，均七付，每付用酒一盅，姜水冲服。

治利湿止嗽方

刘 海 珍

处方：方歌：利湿止嗽方絕难，猪苓桔泽各三錢，
葶藶一味五錢药，葶藶仙人三錢半，
二錢半 陈蕤苏杏，錢半甘风水熬煎。
(仙人头即是蘿卜栽子)童便为引。

驗例：治男人久嗽不止肺經伤水 脉来浮弦吐沫白涎，非痰之样，此因肺湿而嗽，当痰嗽治而不愈，治以下气利湿而嗽即止，治已患三年咳嗽不止者，此方治愈。

治咳嗽方

公主岭市 李 子 复

处方：加皮三錢 甘草二錢 海浮石三錢 柏叶炭四錢 麻黃二錢 射干二錢

用法：水煎服三次。

驗例：此方試用有效。

二、痰飲咳嗽

治妇女产前、后及老年咳嗽

东辽县 关宝才

处方：川貝三錢 茯苓二錢 山藥一錢

用法：共为細面，用鷄蛋两个打开合药面一同放在碗內，攪匀后用开白水冲熟。两次服之，服时可加白糖，一日早晚两次，此方服一周为一个疗程。

驗例：經治疗病例很多，效果良好。

止嗽金丹

前郭尔罗斯蒙古族自治县 孔群麟

主治：無論远年近日劳伤咳嗽均效。

处方：麻黃三錢 杏仁五錢 天冬五錢 蘇子三錢 百合五錢
清夏五錢 海浮石三錢 沙參五錢 竹葉三錢 甘草三錢
川貝五錢

用法：共为細面，成人量每服二錢，引用蜂蜜少許或白糖均可。

驗例：临床应用有效。（孕妇忌服。）

治肺病咳嗽方

郑家屯 李大娘

处方：鮮敗醬（苦麻菜代花者）阴干

用法：共为細面，蜜为丸三錢重，每次一丸，白水送服。

止嗽湯

敦化县 高鳴九

主治：气虛咳嗽。

处方：紅參二錢 黃芪四錢 川貝三錢 黃芩二錢 川芎二錢
百合三錢 五味三錢 知母三錢 竹茹三錢 紫苑三錢

麦冬三錢 甘草一錢

用法：水煎服三次。

驗例：治疗十五余例，效果很好。

注：五味一般用量五分至錢半，但此方的五味用量可以酌情使用。

肺癆丸

敦化县 馬 貢 一

主治：年老冬天咳嗽喘促有痰夜臥不安者。

处方：南粟壳四兩 五味五錢 杏仁五錢 枯白矾三錢 川貝一兩
蜜麻黃五錢 海浮石五錢

用法：共为細面，蜜为丸，每丸二錢重，每次一丸，白水服下。

禁忌：辛辣等物。

驗例：临床应用有特效。

治咳嗽方

公主岭市 陈 香 崙

处方：糖瓜蒌一兩 枳实三錢 法夏三錢 薤白三錢

用法：水三盃将药煎好空心服，早晚各一次。孕妇忌服。

驗例：李春山男52岁咳嗽三十余年，用此方三剂痊愈。

治年老咳嗽及久咳喘息者

怀德县 吳 占 雍

处方：白果二錢 川貝二錢 元肉二錢 麻黃一錢半 桔梗二錢
柏叶二錢 甘草二錢 杏仁二錢 海浮石二錢

用法：水煎服三次。

禁忌：虛癆性肺热咳嗽禁用。

止咳糖浆

白城市 周 龙 麟

主治：肺热咳嗽，痰涎壅盛，交冬即发，夜臥不安 气短兼

喘。

处方：杏仁五錢 前胡五錢 浙貝五錢 桔梗五錢 桑叶八錢
橘紅五錢 大力六錢 苏叶五錢 百部四錢 远志四錢
粉草三錢 麻黃四錢 栗壳四錢（用水煎汁）

用法：白糖三斤蜂蜜三斤，合藥汁共熬成浓汁为度。每服四錢，开白水冲服。

驗例：白城县器材庫工人侯增潤男45岁，曾患此病数載，冬犯夏愈，气短咳嗽，夜臥不寢，食少胸滿，經服此藥后，症狀大減，連服两付而愈。

治咳嗽方

前郭旗 高 恩 清

处方：川貝一錢 薏仁一錢 砂仁一錢

用法：共为細面，每服二錢，白糖水冲服。

治咳嗽不止方

敦化县 苑 旭 东

处方：生姜汁半茶盃 蜂蜜两匙 放茶盃內

用法：用滾开水冲服，三、四次可愈。

治肺腎虛寒，水气为痰或年老阳虛，咳嗽喘急方

敦化县 徐 伯 阳

处方：当归三錢 熟地五錢 陈皮二錢 清夏二錢 茯苓二錢
炙甘草一錢五分

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

治咳嗽喘息方

公主岭市 王 鳳 岐

处方：人參一錢 琥珀一錢 朱砂一錢 川貝二錢 白芨二錢

用法：共为細面，每次服一錢，一日三次，开白水冲服。

注：有安神鎮靜作用。

治年久痰喘咳嗽方

处方：麻黄二两 杏仁一两 甘草一两 川贝五钱 大萝卜五斤

用法：将萝卜切碎榨汁熬成膏，合药一起为丸，每丸二钱重，早晚各服一丸，开白水服下。

治咳嗽气促，痰涎稠粘，咯不易出，并兼便秘方

刘志学

处方：黄芩三钱 寸冬三钱 柿霜三钱 月石二钱 百部草一钱五分
生石膏二钱 纹军二钱 明雄一钱 礞石一钱 川贝三钱
桔红三钱 桔梗二钱 胆星二钱

用法：共为细面，一至二岁小儿每服二至三分，开白水冲服。孕妇忌服。

验例：一般咳嗽与麻疹后咳嗽用之皆效。

治一般年老体弱咳嗽喘促方

舒兰县 战永清

处方：麻黄三钱 桂枝三钱 杏仁炙三钱 炙马前一钱（切片去皮）核桃仁三钱 冬虫草一钱 鹿茸一钱

用法：共面蜜丸一钱重，每次服一丸，开白水送下，早晚各服一丸。孕妇忌服。

验例：此方有效，许多老乡都自己来所购买。

注：此方药性属于温热之品，冬季咳嗽有效，而在春季复发者不宜用之。

治咳嗽喘急方

前郭旗 吴军青

处方：茅根三钱 海浮石五钱 麻黄三钱 柏叶三钱

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

治痰喘咳嗽方

磐石县

处方：百部二錢 薏米一两 麻黄一錢 杏仁二錢 甘草三錢

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

安嗽化痰湯

通化市 陈 芝 秀

主治：咳嗽喘息，气短多痰哮喘等症。

处方：当归三錢 党参三錢 黄芪五錢 白朮三錢 陈皮三錢

川貝三錢 柴胡三錢 薏仁三錢 川羌活二錢 枳壳三錢

萊菔三錢 冬花二錢 香附二錢 梔子二錢 黄芩三錢

加減法：痰多者加清夏、前胡各二錢，喘甚者加茯苓、桔梗各三錢

用法：水煎服，也可以配制丸药服之。

敷痰喘方

磐石县 郑 寶

主治：痰喘咳嗽气短。

处方：白芥子一两五錢 清夏三錢 輕粉二錢

用法：共为細面，用蜂蜜調敷天突穴（肺俞穴），天柱等穴。

治肺热痰喘咳嗽，吐白沫痰方（并兼治一般的癲狂病）

吉林市 常 春 林

处方：大黄四錢 山梔五錢 生石膏五錢 冰片三錢 黃連五錢

胆星三錢 玉金五錢 雄黄五錢 黄芩五錢 朱砂二錢

用法：共为細面，每次服五分，三小时服一次，开白水冲服。孕妇忌服。

三、内伤咳嗽

治肺虚咳嗽五劳七伤气短方

樟 甸 县

处方：白公鷄一支 川貝面七錢 白糖二兩 生黃芪二兩

用法：將三味藥入鷄肚內煮熟，在吃時將黃芪取出，其餘者兩次吃完。

治肺虚伤力咳嗽方

鎮賚县 何 东 儒

处方：人參三錢 川貝三錢 紫菀三錢 朱砂三錢 狗肺一个

用法：共為細面，將狗肺子（母狗肺為佳）用涼水洗淨竹板刀切成小片，用新瓦盆焙干研成細面，和上藥面配合一處，煉蜜為丸，每丸二錢半重，每次一丸開白水服下。

加減法：如果出虛汗時加黃芪五錢。

治劳伤咳嗽方

洮安县 張 景 阳

处方：萊菔子五兩 五味三錢 白果四錢 桑皮五錢 川貝四錢
冬花三錢 豆腐皮一斤 白芨五錢 清夏四錢 冰糖四兩
白糖四兩

用法：共為細面，冰糖另研面，將冰糖和白糖與藥一處拌勻，每服三錢，開白水沖服。孕婦忌服。

四、咳 血

治内伤咳嗽吐血方

義 榮 久

处方：天冬一錢半 寸冬一錢半 生地四錢 熟地二錢 知母二錢

貝母二錢 紅花一錢半 桑皮三錢 白芷一錢半 杏仁二錢
白芍二錢 黃膠一錢半 甘草一錢半

用法：水煎服三次，另外煮紅皮雞蛋至个蛋皮穿數孔投藥壺內煮一會兒，喝一次藥吃一個雞蛋。

驗例：此方是十年來的經驗方，治愈不少傷力咳嗽吐血的病人。楊占海，男20岁，农人，患此病身体衰弱，气虛无力，盜汗顏面蒼白，食欲不振消瘦，兩顴發赤，脉搏弦数，干咳或欬出黃痰帶血，胸腔刺痛。經余用此方兩劑而愈。
注：根据此方藥味組成和臨床經驗，可以大量推广試用。

咳血方

柳河县 李景春

主治：咳痰帶血，心肺俱熱。

处方：柴胡三錢 黃連二錢半 骨皮三錢 天冬五錢 生芍三錢
甘草二錢 酒芩三錢 生地二錢半 熟地二錢半 枸杞三錢
黃芪五錢

用法：水煎服，早晚各服一次。

治肝郁肋痛咳嗽吐血方

处方：川貝三錢 薏仁四錢 茅根三錢 藕节三錢 地榆炭四錢
青皮三錢 玉金二錢 丹皮三錢 黃膠三錢 生地炭四錢
桑皮二錢 木香一錢 斗苓二錢

加減法：心熱加犀角二錢 山梔二錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治咳嗽吐血方

柳河县

处方：川貝三錢 漢三七一錢 白芨一錢 藕节一錢半 朱砂一錢半
琥珀五錢

用法：共为細面，每服二錢，白糖水冲服。

治少年咳嗽帶血兼滑精方

權 旬 县

处方：生地四錢 茯苓二錢 山藥四錢 萸肉二錢 丹皮二錢
寸冬二錢 川貝三錢 牡蠣五錢 澤瀉五錢 龙骨三錢
当归三錢 女貞三錢 百合二錢

用法：水煎服，食前三十分鐘服之。

禁忌：腥冷物、忌房事。孕婦忌服。

备注：滑精止后，去龙骨牡蠣，數劑即癒。

治咳嗽氣短，痰沫帶血方

前郭旗 高 恩 清

处方：黃膠一錢半 斗苓五錢 牛蒡子三錢 炙甘草二錢 杏仁三錢
糯米三錢 寸冬三錢 川貝二錢 桑皮四錢 桔梗三錢
百合三錢 五味一錢半 藕節四錢 茅根三錢 生地四錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

勞傷失血方

前郭爾羅斯蒙古族自治縣 高 恩 清

主治：吐血、咳血、衄血等症。

处方：犀角一錢半 生地四錢 丹皮三錢 酒芍三錢 当归三錢
焦山梔三錢 藕節三錢 生柏叶三錢 血見愁三錢 生荷叶三錢

用法：水煎服三次。

治衄血、吐血方

延吉市 李龍文

处方：黃芪炭二錢 五味子二錢 甘草四錢

加減法：大量吐血時，加浮小麦一两 桑皮三錢。

用法：水煎服三次。

治咳嗽吐血，失汗风寒等症

樟 甸 县

处方：麦冬五錢 黄芩一錢 桔梗二錢 生地一两 金絲草五錢
茅根三錢 貝母二錢 姜黃三錢 丹皮三錢 甘草三錢

用法：水煎涼服。孕婦忌服。

治吐血及咳嗽痰中帶血方

鎮賚县 王 維 良

处方：紅糖一两 鵝管石三錢 陈皮一两炒黃色。

用法：將鵝管石陈皮研成細末，和紅糖混合一起。白水冲服，每服一錢半至二錢。

治傷力咳嗽吐血效方

長嶺县 王 化 周

处方：黃芪一两 白朮三錢 廣皮三錢 升麻二錢 柴胡四錢
人參三錢 當歸四錢 甘草三錢 寸冬三錢 天冬三錢

用法：共為細面，每服三錢白水服下。

宁嗽膏

前郭尔罗斯蒙古族自治县 周 志 超

主治：咳嗽吐血帶血及哮喘等症。

处方：川貝三錢 白朮二錢 杏仁二錢 白糖六錢 核桃仁六錢
蜂蜜六錢

用法：前藥共為細面，合蜂蜜白糖拌在一起熬膏，每次服二錢，白開水冲服。

治咳嗽吐血方

周 鑑 第

处方：白朮一两 白果五錢 川貝五錢 人參一錢 鹿茸一錢

用法：共为細面，每服二錢，白开水服下，早晚各一次。

治內伤咳嗽吐血胸痛，痰有惡臭方

梨树县 辛 滿 真

处方：桑叶三錢 川貝二錢 桔紅二錢 元參二錢 甘草二錢
沒藥二錢 銀花五錢 大黃一錢半 酒芩一錢 汉三七一錢

用法：水煎服八分碗，煎服三次。

驗例：石岭乡，寇文举患內伤咳嗽吐血胸痛，經服本方一剂見效，三剂痊愈，效果90%以上。

五、肺 結 核

治肺結核效方

长春中医学院 王 启 明

处方：1、銀花一斤 元參八兩 寸冬四兩 花粉一兩 茯苓一兩
白芍八錢 甘草五錢

用法：水煎服，尽量飲之，不拘次数。但若多服有腹瀉副作用，在应用上可以酌情用之。

2、銀花六兩 元參三兩 花粉一兩 公英一兩 元芩七錢
桔梗五錢 党參三錢 甘草五錢

用法：水煎服。

注：以上二方先服第一方兩、三剂后，再服第二方数剂，根据病情可輪換服用。

驗例：家父从孙毅杰大夫得方，曾給家兄治过肺結核并吐血，經服此方治愈数年未发，因此方藥的剂量較大一般不敢多用，有腹瀉的副作用，因而停止不用，如在临床应用上，根据患病体質强弱，可以酌情减量。

治开放性肺結核咳嗽帶血方（并治男女老幼諸般咳嗽氣喘）

樓 甸 县

处方：白芨五錢 桑皮五錢 百合五錢 白果三錢 川貝三錢
寸冬三錢 桔梗三錢 甘草三錢 菠薐根一斤

用法：將菠薐根用水洗淨炕干，合上藥一處共為細面，煉蜜為丸二錢重，每日三次服之，每次一丸，白水送下。

禁忌：烟酒。

治肺結核方

处方：洋參一錢 匣砂一錢 三七一錢 川黃連一錢 川貝一錢
琥珀一錢

用法：共為細面，煉蜜為丸如小豆大，每服十五丸，早空心服之。

禁忌：辛辣之物。

百部膏

主治：慢性肺結核，慢性氣管炎。

处方：百部三斤

用法：水煎兩次去渣再加入飴糖（糖稀）十斤，熬至稠粘時為度。每次服五錢，早晚開水沖服。

治肺結核吐血方

扶余县 賈 俊 卿

处方：1. 汗三七二錢 生地二錢 茅根二錢 双皮二錢 川軍二錢
丹皮二錢 黃芩二錢 知母二錢 犀角二錢 藕節二錢
銀花二錢 川貝二錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

2. 川貝二兩 銀花四錢 知母三錢 清半夏五錢 元
參二兩 連召三錢 茯苓三錢 百部三錢 牡蠣二兩
花粉三錢 朱砂二錢 甘草二錢五分 山慈茹五錢

用法：共為細面，每服一錢五分，白水服下。孕婦忌服。

治肺結核方

薛

处方：胎盤（紫河車）一具

用法：將胎盤洗淨後，用瓦焙干研成細面，一日兩次或三次服均可，黃酒服下。每次一錢至錢半。

注：選擇健康產婦胎盤為佳。

白芨杷葉丸

長春中醫學院 陳國范

主治：肺結核咳血、有熱均效。

处方：白芨一兩 川貝五錢 杷葉五錢 阿膠五錢 生地五錢

用法：共為細面，蜜大丸二錢重，早晚各服一丸，開白水服下。

治肺結核或慢性咳嗽痰中帶血日久不癒方

王德發

处方：白芨一兩 大生地八錢 柿霜七錢 川貝母七錢 白糖五錢

用法：共為細面，每服二錢，一日兩次，用開白水服下。

驗例：本人使用此方多年，治成年和老年人一般用之都有良效。如咳血過多者少加黃芩為末，合藥服之。

治肺結核咳血、胸中有熱或不咳血而吐痰粘濁、胸中熱者

王忠忱

处方：百合三錢 川貝二錢 三七一錢

用法：共为細面，一日量分三次服，白糖为引，飯后服下。

驗例：效果良好。

治肺結核咯血方

吉林市 邓維漢

处方：花蕊石一两 醋炙三次 三七三錢 川軍二錢

用法：共为細面，每次服量八分，一日两次，重者一日三次，白水服下。

驗例：肺結核初起，咳嗽而咯血者，或日久咯血及大咯血不止者，服后均能收到止血良好疗效。

治結核病盜汗方

吉林市 邓維漢

处方：山萸肉七錢 白朮五錢 生牡蠣五錢

用法：水煎服，一日三次服之。

驗例：凡是肺結核及虛弱性病而有盜汗日久不愈者，服此方二至三剂即收效；亦能起到强壮收斂止汗作用。在临床上应用有百分之九十以上疗效。

治肺結核及气管炎方

怀德县 刘惠元

处方：川貝二两 杏仁四两 冰糖五两

用法：共研細面，每次服一錢半，每日早晚两次，在每次服时用鷄子一个冲服。

治肺結核方

沈阳市 楊振芝

处方：川貝面一錢 鮮菠菜一斤

用法：將菠菜搗爛，用白紗布搾汁，与川貝面混合一起，用一个鷄蛋清入內攪勻，一日三次服下。

治淺潤性肺結核，肺炎，氣管炎方

長春市 邱 尚 富

處方：紫皮蒜一斤 白糖五兩 川貝面五錢

用法：將紫皮蒜剝去皮，放置在砂鍋內添三碗水，煮成粥狀，再把白糖和川貝面投入鍋內，再煮幾個開便妥，每次服二錢至三錢。

治肺結核咳嗽氣促，呼吸困難方

樟樹縣 宮 桂 榮

處方：黃瓜子四兩

用法：共為細面，每服三錢，白水送下。

驗例：本人患此病，經服此方治愈。

六、肺癰（肺膿瘍）

治肺癰：咳嗽吐膿血痰有臭氣方

吉林師大 周 蘭 澤

處方：白芨面二錢 漢三七面二錢 薏米二兩五錢

用法：先將薏米煮成粥狀，再投入三七面和白芨面攪勻，均三至四次服之。孕婦忌服。

驗例：一例金××男二七歲，汪清縣中學教師，患此病，咳嗽，吐膿血痰有惡臭，發高熱，側胸有刺痛，經醫院治療數次未愈，經余診治，用此方半料，其病痊愈。

又一例，王××女，三十五歲住石岷，初患肺結核，經西醫治療，注射鏈霉素百余支，其病轉愈。在五四年忽然吐膿血痰有惡臭味，經余診治，急用此方加蛤蚧面五錢，服一付其病痊愈。

治肺癰、肺痿、吐膿血痰有惡臭味方

賓林市 高 洪 志

处方：蛤蚧一對（新鮮的最好） 川貝二兩 黃蜡二兩 蜂蜜二兩
黃酒四兩

用法：用黃酒將蛤蚧浸透，用瓦焙干，和上藥共研細面，再將黃蜡、蜂蜜共合一處，丸成綠豆大小丸，每服三錢，一日三次服下。

百合固金湯加減

通化县 成 森 庚

主治：肺癰方

处方：銀花五錢 寸冬三錢 玄參三錢 黃芩三錢 白芷二錢
百部二錢 天冬三錢 當歸三錢 赤芍三錢 黃芪五錢
生地三錢 桔梗三錢 貝母三錢 甘草一錢半

用法：每劑熬三次，用水600毫升煎成200毫升，每日服三次，每隔六小時服一次。

驗例：金××男45歲農民住通化县西江鄉，患肺癰病一年余，症狀：時常咯出暗黑臭味膿血痰，每日吐出二、三次，面色萎黃，肌肉消瘦，氣喘不能臥，發高烧體溫在攝氏39度以上，病勢危急，經用本方二十七劑痊愈。

治肺癰、胸肋痛、咳嗽不止吐膿血或吐泡沫痰方

懷樹縣 王 永 純

处方：知母五錢 貝母二錢 天冬一錢 寸冬一錢 苡仁五錢
五味一錢 甘草八分 桔梗八分 斗苔八分 百合八分
阿膠八分（虛者加入參）

用法：水煎服三次，在每次服時加飴糖一匙。孕婦忌服。

七、胸 肺 疹

治渗出性胸膜炎方

延吉县 郑 范 鑑

处方：泽泻三钱 猪苓三钱 车前子三钱 知母一钱 贝母一钱
银花一钱 皂角刺一钱 当归一钱 赤芍一钱 甘草一钱

用法：水煎服三次。

治湿性肋膜炎方：（肺结核亦效）

邵 向 安

处方：桑叶五钱、桔梗五钱 苡米五钱 瓜蒌皮五钱 芦根五钱
通草二钱 川贝一钱五分（此分量是旧制）

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

病例：此方治一切急慢湿性肋膜炎，无论痛的如何剧烈，服之即可减轻疼痛，继之痊愈，有时只用桑叶芦根苡米萆皮四味亦效，如肺结核咳嗽重，川贝可加至三钱。

治湿性胸膜炎方

吉林师大 周 兰 萍

处方：银花四钱 当归三钱 甲珠三钱 皂针三钱 乳香三钱
桔红二钱 花粉二钱 南沉二钱 黄芪二钱 川朴二钱
南星一钱半 甘草二钱 清夏二钱 蜈蚣面五分

用法：水煎服三次，在服药前先服蜈蚣面。孕妇忌服。

病例：李××女41岁，患此病经医院治疗抽水，愈后复发，在五五年经我所诊治，用此方服七剂病痊愈，其它病例不一一例举。

治化脓性肋膜炎方

陈宏仁

处方：银花三钱 连召二钱 乳香一钱五分 没药一钱五分 柴胡三钱 玉金二钱 桔梗二钱 桃仁二钱 无芩一钱 广皮二钱 甘草一钱

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

验例：此方对化脓性肋膜炎有特效。在三年前刘贵印患此病，经省立医院确诊后，治疗半年，未愈，经用此方治疗，服六七剂痊愈。

治湿性肋膜炎方

王敬礼

处方：七爪桔三钱 广木香一钱 朴花三钱 瓜蒌七钱 焦榔片二钱 醋青三钱 醋柴三钱 乳香炒二钱 没药炒二钱 苡米三钱 二丑一钱五分 汉三七面一钱均三包

用法：水煎服三次，每次服送三七面一包，随药服下。孕妇忌服。

验例：张××年40岁，患此病肋痛胸痛转侧困难牵引肩痛，经医院注射治疗未效，经我诊断患者脉搏沉而有力，服此方一剂时，疼痛减轻，能安眠，服数剂后而痊愈。

第四节 泌尿系统疾病

一、小便 闭

治老年人尿闭方（前列腺肥大）

白城市 张子凤

处方：银花五钱 乳香二钱 没药二钱 红花一钱半 木通二钱

甲珠二錢 萹蓄三錢 瞿麥五錢 石葦三錢 天葵子二錢
人參一錢半 甘草三錢 水煎服。

漢逐七一錢半 血琥珀一錢半 海金砂二錢 研面均包

用法：水煎服三次，每次沖面藥一包，隨藥汁服下。孕婦忌服。

驗例：張某年七十歲得此病後，即開始服用中藥治療無效，後經醫院治療，注青霉素及導尿亦未治愈，又經某一醫院診斷為前列腺肥大，決定手術，但手術時出血太多，未達到手術目的，結果採用耻骨上切開，插入橡皮管通尿。來我處診斷患者脈正常，體格稍弱，飲食正常，經用此方三劑後，即感覺有尿意，但疼痛重於治療前，將橡皮管扎緊，時許尿能貯留，經半日許，則感有尿意，痛疼更甚，以後即漸排尿，第一次排出有半茶盃，內有象白通草片樣四五片，以後每天都能排尿，尿量逐漸增多，體格漸漸恢復。

治小便閉結，小腹胀滿方

處方：萹蓄三錢 荳麥三錢 車前二錢 木通三錢 生地二錢
生石羔二錢 滑石四錢 澤夕三錢 肉桂一錢 赤茯苓三錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治小便不通方

靈振民

處方：大蒜一頭 山梔七枚 鹽花少許

用法：共搗亂，攤棉紙上貼肚臍處，良久即通，如不通，即移涂陰囊上立通。

又方：車前草五錢 蛋砂二錢 灯心一把 水煎服三次。

順倒散

五 惠 氏

主治：尿閉（屬熱性者）、身熱口渴，舌苔黃，脈沉數。

處方：川軍二兩 明粉一兩

用法：每服二錢至三錢，開白水服下。孕婦忌服。

驗例：服本方后即瀉，緩解尿閉所致一切痛苦，繼之身涼脈靜而愈。

二、遺 尿 症

治遺尿方

懷慶縣 馬 德 貞

處方：益智仁三錢 桑螵蛸三錢 白微三錢 草薢三錢

用法：共為細末，勻四次服。

治小便頻數遺尿效方

懷慶縣 王 永 久

處方：烏藥七錢 益智五錢 山藥四錢

用法：共為細末，每服二錢，淡鹽水送下。

治遺尿方

處方：小茴香二錢 益智二錢 桑螵五錢 烏藥二錢 新豬吹胞一個

用法：將藥裝在豬吹胞內焙干，共為細面，每服一錢，日服三次。

禁忌：油膩。

治遺尿方

刘墨軒

处方：黃芪二錢 益智三錢 升麻一錢半 兔絲子三錢 鷄腸子
(焙干)

用法：共為細末，每服三錢。

注：兼用針刺療法。針刺：大敦、關元、中極。

鎖陽散

懷德縣 陳鵬雲

主治：男女遺尿症。

处方：鎖陽二兩 車前二兩

用法：共為細末，每服二錢至三錢，開白水送下，早晚空心服之。

治小便頻數遺尿方

吳衍昆

处方：益智一兩 酒芍一錢 澤瀉三錢 肉桂一錢 萸肉一錢
甘草一錢

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

治遺尿方

白城市 周龍順

处方：桑螵五錢 故紙四錢 益智仁三錢 兔絲子三錢 五味
子二錢 鷄腸子一具 鷄肫（內金）一個，焙焦

用法：共為細面，每服二錢，白水送服。

治小便頻數方

沈漢臣

处方：澤瀉二錢 萱草二錢 石葦葉二錢 篇蓄二錢 巨麥二錢
藤米二錢 沒藥一錢 檀香一錢半 竹叶二錢 乳香一錢
不痛去乳香沒藥

用法：水煎服三次。

治小便頻數及夜尿症方

長春中醫學院 黃 維 授

處方：甘草二斤

用法：水煎，經常服用。

治產後小便不禁方

梅 旬 長

處方：故紙三錢 竹叶二十片 灯心七根 當歸三錢 酒芍二錢
熟地二錢 炙芪三錢 核桃七個

用法：水煎服三次。

治婦女小腹寒、小便不禁方

梅 旬 長

處方：復盆子五錢 故紙五錢 桂皮五錢 附子五錢 菖蒲五錢
烏藥五錢

用法：水煎服三次。

禁忌：孕婦忌服。

治婦女遺尿不知者

梅 旬 長

處方：白微一兩 白芍一兩

用法：研細末，酒調服，每次二錢。

三、淋 濁 症

豬髓川軍湯

東丰县 鄭 銀 廣

主治：五淋癰閉。

處方：豬骨髓油三兩 川軍三錢

用法：水煎服三次，第一次只服药，第二次服药后吃猪髓油一半，第三次服药后将猪髓油吃完。

治热淋方

怀德县 黄 德 精

处方：川军二钱、泽夕一钱

用法：共为细面，开白水服下。

治淋症方

东丰县 赵 景 山

处方：桑螵蛸三钱(炒) 海金砂三钱 川军三钱

加减法：血淋加巨麦三钱 寒淋加茴香三钱 火淋加黄芩、车前、莲须各三钱。

用法：共为细面，分成三包，每次服一包，空腹服下。

治石淋方

徐 繼 學

处方：海洋石二钱五分 甘草粉二钱五分

用法：共为细面，每服五分，空腹时开白水服下，一日三次。

验例：患者张传昌患此病三年，经医院门诊及住院二年治疗未愈，用此方配成面药，服三十多次痊愈，以后又治疗数名，均收效。

治血淋尿血其痛如刺方

长 春 市。

处方：焦查五钱 黄柏三钱 蒲黄四钱 木通三钱 滑石四钱
生地四钱 当归三钱 赤苓三钱 竹叶一钱半 灯心一钱半
豆麦三钱 草薢三钱 菴蓉三钱 甘草稍五钱 琥珀二钱
鹿胶一两 车前子二钱

用法：共为细面，每服二钱至三钱，黄酒冲服。

禁忌：辛辣油腻、血肠等品。孕妇忌服。

驗例：陈明礼男52岁，患尿血病半年多，尿色如酱油一样，小便耐头痛项墙，哀痛不止。經用此方治疗二十余日痊愈。

注：若小便不大痛时一星期即可痊愈，如严重时可以用汤剂，分量酌情加減服之。

清淋散

九台县 塔 玉 庚

主治：热淋血淋及梅毒性淋

处方：清夏面三錢，血珀面三錢 滑石面三錢 甘草稍面三錢
川軍面三錢

用法：上五味共合一处，用瓶装之严密封口，每在飯前三十分鐘服三錢，黄酒为引，开白水服下。

禁忌：辛辣油腻等物。孕妇忌服。

驗例：此方經本人临床实验有百分之九十的效果，病輕者服三、五次即癒，重者服七、八次即癒。

治血淋方

前郭旗 高 恩 清

处方：牛膝一两 乳香七錢 甘草三錢

用法：水煎服三次。

注：有梦遗滑精，血崩不止，气虛下陷因而腿膝肿痛者忌用。孕妇忌服。在临床上根据体质强弱，須慎重使用。

治膏淋症方

延吉县 沈 龙 治

处方：生山药一两 生芡实一两 生牡蛎六錢 生龙骨六錢 生地六錢 党参五錢 生白芍五錢

用法：水煎服，一日一付，每付煎两次，早晚服。

治石淋，小便痛不可忍方

龙井 张 维 彰

处方：海金砂五錢 萆薢二錢 益智二錢 乳香一錢半 沒
藥一錢半 血琥珀一錢 角霜二錢

用法：共为細面，每服二錢，早晚两次。

禁忌：辣物。

治毒淋，热淋方

崔 鳴 山

处方：大黃三錢 斑蝥三个去头翅研面，鷄蛋一个。

用法：将鷄蛋打一孔，去黄留清，把药面装入鷄蛋内拌匀，
用紙将蛋包好，用慢性火烧干，連皮剝面，黃酒冲
服。在服药后，多飲茶水，微汗即愈。

注：因斑蝥毒性猛烈，用时須慎重，虛弱之人禁用。孕妇忌服。

治淋症方

怀德县 齐 振 邦

处方：人中黃三錢 人中白三錢 大黃一两

用法：共为細面，猪骨髓油为小丸二錢一付，白水服下。

治淋毒方

海龙县 王 炳 臣

处方：川軍三錢 酒軍三錢 山甲珠三錢

用法：共为細面，均五次服，每次一包，白水送下。

四、小便尿血

治小便尿血方

九台县 關 景 昌

处方：当归二錢 血余炭二錢 朱砂一錢

用法：共为細面，引用石榴花根煎湯，將葯面均两次服之。

治小便尿血方

鎮賚县 周 德 良

处方：牛膝二两 乳香二錢

用法：水煎服。孕妇忌服。

治尿血方

長春中医学院 陈 玉 崧

处方：牛膝一两 血琥珀一錢

用法：將琥珀研为細面，用牛膝煎湯冲服。

禁忌：孕妇忌服。

止血散

怀德县 董 誠 明

主治：膀胱有热，小便尿血等症。

处方：漏蘆一两 桑蛸二錢 盐黃柏一錢

用法：共为細面，每服二錢，黃酒为引送下。

禁忌：辛辣之物。

治小便尿血方

海龙县 楊 凤 榮

处方：生地二錢 車前二錢 寄奴二錢

用法：水煎服三次。孕妇忌服。

治血淋、溺血、大便下血方

农安县 范 陸 榮

处方：生山藥一两 生龙骨六錢 生牡蠣六錢 海螵蛸四錢 茜

草三錢 生白芍四錢 白头翁三錢 黃阿膠三錢

用法：水煎服三次。

加減法：溺血者，加龙胆草。

大便下血者，去阿膠加元肉。

治血淋、溺血方

李 清 華

处方：黑天天秧子不拘多少

用法：熬水飲之有效。

五、水 肿

治水肿方

扶余县 吳 璠

处方：榴皮三錢 大戟二錢五分 芫花二錢五分 甘遂二錢五分
葶藶五錢 豆根五錢 杏仁五錢 牙皂五錢 炙脂五錢
陈皮二錢五分 麦芽二錢五分 神曲四錢 三稜二錢 枳
壳二錢五分 木香二錢五分 青皮二錢五分 朱砂二錢五分

用法：共为細面，醋糊为小丸，菉豆藟面湯为引送下。

注：此方未介紹用量，在应用时，可以酌量用之。孕妇忌服。

治水肿方

前郭尔罗斯蒙古族自治县 高 恩 清

处方：槟榔五錢 二丑各二錢五分

用法：共为細面，分为三付。紅糖水送下。

治水肿方

高 恩 清

处方：甘遂一錢五分（面煨） 白丑一錢五分 黑丑一錢五分 川
貝一錢五分 榔片一錢五分 萊菔三錢（炒）

用法：共为細末，每服三錢，白糖水送下。孕妇忌服。

治水肿效方

农安县 宋 金 鳳

处方：白商陆二錢

用法：煎水、用水煮面条、食面条。

治水肿方

樟 甸 县

处方：高良菊花一两 冻青子二钱 冻葫蘆二两 二丑二钱 冻
黄瓜三两 灯心二钱 竹叶二钱 商陆二钱 木通二钱
西瓜皮一两

用法：用黄酒煎成汁，每服一两。

禁忌：盐酱。孕妇忌服。

治水肿方

樟 甸 县

处方：通草三钱 冰片二分 硫苦一分 觸烟三个（不带尾巴）

用法：共为細末，紅糖水送下。

治水肿方

樟 甸 县

处方：雄黄二钱五分 玉金二钱五分 乳香一钱五分 沒药一钱五分
陈皮一钱五分 皂角一钱五分 木香一钱 朱砂二钱五分
豆霜二钱五分 黄瓜皮一两 西瓜皮一两

用法：共研細末，为小丸，黄豆大。病輕每服十二丸，病重每
服十四丸。孕妇忌服。

倒水散

孙 繼 賢

主治：水肿腹水。

处方：广木香三钱 商陆三钱 芫花二钱五分（醋炒） 甘
遂二钱五分（面煨） 巴豆霜一钱 蛤蜊珠子二分

用法：共为細末，成人每次用八分或一钱，白开水送服，不
愈时，隔日再服一次。

禁忌及注意事项：忌食生冷油腻之物，身体虛弱及妊娠妇忌

服。

治水肿方

舒兰县 张 夏 山

处方：三七五分 防风二钱 果仁二钱 砂仁二钱 大毛三钱
泽兰一钱 麻黄二钱 川附二钱 葶藶三钱 猪苓三钱
防己四钱 川羌三钱

用法：水煎服三次。

治急性肾炎方

榆树县 齐 香 范

处方：山药四钱 云苓三钱 泽泻二钱 莢肉二钱 丹皮二钱
生地三钱 桂枝二钱 白归三钱 川芎二钱 白朮三钱
杜仲二钱 陈皮二钱 党参三钱 甘草二钱

用法：水煎服三次。

治水肿方

王 敦 礼

处方：大戟一钱 芫花一钱 煨甘遂一钱 盔沉一钱 桔红三钱
腹皮八钱 西瓜皮一两 二丑一钱 葶藶二钱 赤苓二钱
通草二钱

用法：水煎服。

注：此方药性猛烈，根据体质强弱情况，酌情用之。孕妇忌服。

治水肿方

王 健 东

处方：黑丑一两 白丑一两 斑毛两个（去头足） 青蛙一个（括净）

用法：共煎服之。

禁忌：孕妇忌服，非体实气壮人，用时宜慎。

治腹水方

朱 興

处方：大戟一錢半 芫花一錢半 甘遂一錢半 大棗十五枚

用法：水煎服。

禁忌：孕婦忌服。

注：氣虛體弱者宜慎用之。

治水肿，腹脹尿少，食欲不振方

尹 耀 东

处方：陈皮三錢 苓皮五錢 姜皮一錢 大皂三錢 焦朮三錢
防己三錢 貢桂五分 滑石三錢 广砂二錢 不留三錢
木通二錢 車前子五錢 老黃瓜皮三錢 紅小豆皮三錢

用法：把車前用紗布袋裝上，入諸藥內熬。水煎服之。

注：孕婦不宜用之。

治水肿方

胡 云 升

处方：山柰二錢 絲瓜五錢 翠衣(西瓜皮)五錢 木瓜三錢 如陰
水加姜皮一錢五分

用法：水煎服之。

治水肿方

李 汉 章

处方：砂仁二兩 紫薏二兩 葶藶二兩 神曲二兩 麦芽二兩
栝榔二十個 核桃二十個 茶葉一兩 大棗半斤

用法：除核桃，栝榔須用火煨外，其他各藥均炒黃（大棗去核炒）。共為細末，每服四錢至五錢，一日二次服，以沙茶水為引送下。

肿胀双消散

苗春林

主治：大腹水肿，胀满，气喘。

处方：甘遂三钱（面煨） 槟榔三个（烧存性） 二丑三钱（炒）
寒水石三钱（煨） 木香三钱

用法：共为细末，每服三钱，开白水温服。

验例：此方治水肿，无论双、单腹胀服之均效。曾治愈十余例。孕妇忌服。

懷慶縣 軒文岐

治风湿性全身浮肿方

处方：姜皮三钱 陈皮三钱 神曲三钱 荆芥二钱

用法：水煎服三次。

治全身浮肿方

处方：薦蓄一把（土称猪芽草） 鷄子一个

用法：将薦蓄放在砂鍋內煮开，把鷄子打入鍋內煮熟，将鷄子蘸白糖食之。

治水肿方

九台县 崔子恒

处方：小王八二个（元魚）

用法：瓦上焙酥，轧成细面，黄酒冲服，微取汗，排出小便即消。

禁忌：盐酱。

治水肿效方

敦化县 苗凤梧

处方：鸽子粪五分 猪吹胞一个 白酒七两五钱

用法：将粪酒装在猪吹胞內扎住口，用带将猪吹胞綁在臍部

上，至酒被吸干后即效。如不愈者，再用一次。

禁忌：盐酱，豆类食物。

治水肿方

謝 援 声

处方：葫蘆子七个 窝瓜子七个 馬蓮子七个 板櫚七个 核桃仁七个

用法：共焙黃色研成細面，用黃酒一次冲服，連服三次后，隔三日再服。

禁忌：粘硬等物。

六、消渴病（糖尿病）

治消渴病方

东丰县 楊 維 山

处方：生地八錢 萸肉五錢 茯苓四錢 泽泻三錢 山藥八錢 丹皮二錢

用法：水三碗，煎剩碗半，日服两次。

驗例：治愈三例，如无热者，可加黃芪五錢，但須服十八剂至二十剂。

治消渴病方

倪 廷 庚

处方：石斛五錢 黃芪四錢 甘草三錢 萸肉三錢 五味一錢五分 熟地三錢 五倍子二錢 寸冬二錢 藟蒲二錢 黃柏二錢 知母二錢

用法：水煎服三次。

治消渴病方

延吉县 沈 龙 治

处方：生山药一两 黄芪五钱 知母六钱 炙甘草二钱 葛根一钱五分 五味三钱 花粉三钱

用法：水煎服，一日两次，早晚服之。

第五节 神经系统疾病

一、中风不語（脑溢血）

治中风不語方

敦化县 楊 树 义

处方：防风一两 貫筋一两 凤眼草一两 夏枯草一两 年見五钱 地枫五钱 海馬五钱 白酒一斤

用法：酒煎方法：把药和酒一齐投入药壶内，壶口用好毛头纸蒙盖好，用文武火煎之，煎至壶内热气蒸发将毛头纸润湿为度。一次服之，发汗，须避风。

验例：此方系我县故去赵老夫之祖传效方，治愈多人，患者徐明在蛟河患中风不語，十余日經治未愈，經用本方一剂全愈。

治中风不語方

鎮賚县 馬 德 良

处方：白矾一钱

用法：用凉水灌下即能說話。

治腦溢血方

敦化县 苑 旭 东

处方：黃連三钱 黃柏三钱 黃芩三钱 山梔三钱

用法：水煎服三次。

治腦溢血方

敦化县 苑旭东

处方：黃連三錢 黃柏三錢 黃芩三錢 大黃三錢 附子四錢

用法：水煎服。

治腦溢血方

楊文蔚

处方：黃芪五兩 赤芍二錢 地龍四錢 歸尾三錢 桃仁一錢五分
紅花一錢五分

用法：水煎服。孕婦忌服。

加減法：初起加羌活、防風，日久便秘者去川羌活加黃柏。

驗例：曾治三例均獲痊愈。如突然而發，肢體不遂，牙關緊閉，喉有痰聲，須立即放血，用烏梅擦牙，續服本湯。凡本病發生後，24小時內不死者，用此方均效。

治腦溢血、半身不遂、言語中樞無障礙者

董治中

处方：天麻一兩 木瓜五錢 山枝三錢 黃連三錢 牛黃五分面研
(旧秤) 黃酒一斤

用法：用黃酒煎黃連等四味煎至八分碗，送服牛黃，頓服出汗，汗后即愈。

驗例：治愈三例半身不遂，言語無障礙者，配合針灸療法更佳。

防風通聖湯加減方

敦化县 苑旭东

主治：腦溢血。

处方：大黃三錢 川芎二錢 芒硝三錢 荊芥三錢 麻黃三錢
甘草一錢 桔梗二錢 山梔二錢 當歸二錢 滑石三錢

薄荷一錢 黃芩三錢 白朮三錢

用法：水煎服。孕婦忌服。

二、半身不遂、口眼歪斜

治半身不遂方

四平市葯材公司 劉 玉

处方：麻黃四兩 炙馬前四兩 桂枝三兩 杜仲三兩 牛膝三兩
地楓三兩 年見三兩 甘草三兩 防風三兩 虎骨三兩
沒藥三兩 川羌活三兩 大活三兩

用法：共為細面蜜丸二錢重，每服一丸，白水服下。孕婦忌服。

治男子痿症方

王 賢 義

处方：桑寄生四錢 生杜仲一兩 生白朮一兩 生牡蠣四錢
西藏紅花一錢

用法：水煎服。孕婦忌服。

驗例：治一森林工人，初起感覺兩腿微痛，漸重，在五、六
日後，不能走道，癱在炕上，經余診后用此方連服五劑
而愈。

起痿四物湯

長嶺縣 王 化 周

主治：痿症。

处方：當歸四錢 酒芍四錢 川芎三錢 生地四錢 人參三錢
山藥四錢 黃芩三錢 黃柏三錢 故紙三錢 牛膝三錢
枸杞四錢 川斷三錢 羚羊一錢 骨皮三錢 桃仁三錢
紅花三錢 木瓜二錢 黃芪一兩 絲餅二錢 虎骨一錢

用法：共為細面，每服三錢，白水送下。陰虛脈弱之人最

效。孕婦忌服。

治痺症及癰症

安安縣 李 沛 森

处方：年兒一两 地楓一两 黃藤四兩

用法：共為細面，每日三次，每服三錢，白水沖下。

治顏面神經麻痺方

九台縣 王 敬 礼

处方：白附子七錢 防風三錢 全蝎五錢 天麻四錢 南星四錢
生甘草二錢。

用法：共為細面，成人每服二錢，黃酒送下。（孕婦禁用）

外用方 天麻子一个 棉花籽二錢

共為面，陳醋調之（或黃酒亦可）。噙左糊右、噙右糊左，一日兩次。

治顏面神經麻痺方

徐 謹

处方：馬前子八个 紅公鷄熱血一个

用法：馬前子用毛去皮穢合鷄血混合一处，敷患處十分鐘，
在敷以前，先將患側口腔內腮部紫血管，用針刺破，
急速敷藥。

治口眼喎斜方

周 曜 一

处方：防丰二錢 白芷二錢 川烏二錢 紅花二錢 沒藥二錢
乳香一錢五分 細辛二錢五分 川羌二錢

用法：共為細面，用黃酒調合糊之，共均兩次，一天換一次，
左边斜糊右边，右边斜糊左边。

三、神經衰弱

加味溫胆湯

邵宗仁

主治：神經衰弱失眠及神經痛

處方：石決四錢 棗仁五錢 茯神二錢 竹茹二錢 生石羔三錢
枳實一錢五分 清夏一錢 黃連一錢 菖蒲二錢 菊花四錢
寸冬二錢 當歸二錢 白芍二錢 荊子三錢 薄荷二錢
甘草一錢

用法：水煎服，早晚各一次服之。孕婦忌服。

驗例：孫國臣患此症，神經衰弱失眠，已五、六年，經其他方法治療無效，服用此方後，每晚能睡六、七個小時，繼以用此方配成丸藥，蜜丸二錢重，每日早晚各服一丸。白天也能睡覺，逐漸恢復正常。

治怔忡驚悸不寐方

延吉縣 沈龍治

處方：生山藥五錢 炒山藥五錢 人參三錢 寸冬三錢 茯神三錢
當歸三錢 丹參二錢 菖蒲一錢 五味一錢 甘草一錢

用法：水煎服三次。

治脾氣虛極下陷方

延吉縣 沈龍治

處方：生黃芪四錢 白朮四錢 川斷三錢 萆薢三錢 寄生三錢
炙草二錢 萸肉三錢 龍骨四錢 牡蠣四錢

用法：水煎服，一日兩次早晚服之。

治腎陰太虛、相火妄動、陽強不倒方

延吉縣 鄭 范 鍾

處方：元參三兩 萸肉一兩 骨皮一兩 沙參一兩 丹皮一兩

用法：水煎服，一日三次。孕婦忌服。

加味歸脾湯

梨樹縣 歐 元 江

主治：神經衰弱，心跳失眠，怔忡健忘。

處方：黨參六錢 白朮三錢 茯神八錢 遠志五錢 棗仁八錢

木香一錢五分 黃芪八錢 當歸五錢 生杜仲五錢 龍

骨四錢 牡蠣一錢 菊花二錢 甘草三錢

用法：水煎服三次。服五付——七付可痊愈。

治神經衰弱方

梅河口 張 永 富

處方：枸杞果一斤 芡實五兩

用法：共為細面，每服三錢，飯前白水沖服。

三才封髓丹

長春市 劉 品 芳

主治：神經衰弱。

處方：天冬五錢 熟地六錢 黨參五錢 黃柏五錢 砂仁四錢

甘草三錢

用法：共為細面，蜜丸二錢重，早晚各服一丸，白水送下。

治神經衰弱，心跳失眠及癲狂症

長嶺縣 王 殿 卿

處方：生石膏六錢 黃連二錢 朱砂二錢 竹茹二錢 棗仁二錢

琥珀二錢

用法：共為細面，每服一錢，白水送服。

治神經衰弱、榮養不良方

吳 棣 芝

处方：人參四錢 鹿茸一錢 枸杞一錢

用法：共為粗末，煮汁服之。

治神經衰弱、健忘失眠方

賈 存 財

处方：淫羊藿一斤 白酒三斤

用法：用酒將藥浸七天後，每服三錢，一日早晚兩次之，服兩周停一周再服。

治心跳方

靖宇縣 白 玉 璋

处方：鹿臍血一茶盞

用法：將鹿臍血隨鮮時服下。

驗例：本人患心跳病，經過十幾年之久，服用各方無效，經用此方治愈，現已三十多年未犯。

治心跳方

靖宇縣 白 玉 璋

处方：狍子心血三錢 琥珀六錢 朱砂六錢

用法：共為細面，將狍子血晒干研面，與二味合勻，每服三錢，每日晚間臨睡前服下。

治心臟虛煩、失眠、遺精、腰痠、貧血等症方

崔 麟 翔

处方：黃芪三錢 人參三錢 茯神三錢 當歸三錢 柏仁二錢
五味二錢 枣仁二錢(炒) 清夏一錢五分 油桂一錢 甘
草二錢 鹿膠二錢 黃芩三錢 寸冬三錢 車前三錢

用法：共為細面，每服一錢，開白水送服。

注：虛者宜之，有熱者忌用。孕婦忌服。

治盗汗方

公主岭 刘玉桃

处方：浮小麦一两

用法：水煎服，一日一次服之。

治神经衰弱方

鹿港 仙

处方：首乌 元肉 石斛 各等分

用法：用黄酒煮服。

四、高 血 压

治高血压方

公主岭 柏占田

处方：生杜仲二两 广犀角五分 白酒一斤

用法：用酒将药浸泡五天，每服一酒盅，日服两次。

治高血压方

海龙县 周献图

处方：生杜仲一两 黄芩五钱 玉金三钱 瓜蒌三钱 川膝三钱
生龙齿八钱 枯草三钱 孕妇忌服。

治高血压方

农安县 张玉成

处方：牡丹皮为面

用法：每服二钱，白水冲服。孕妇忌服。

治高血压方

宣林市 常春林

处方：早服清宁丸 午服枸菊丸 晚服舒肝丸

用法：酌情用量，白水服下。

治高血压方（鎮肝熄風湯）

桃安縣 解 超 英

处方：川牛膝二錢 生龍骨二錢 生牡蠣二錢 生赭石二錢 生
龜板二錢 白芍(生)二錢 元參二錢 天冬二錢 茵陳二錢
川棟二錢 麦芽二錢 甘草二錢

用法：水煎服三次。

注：本方劑量，可按症狀情況加減施用。孕婦忌服。

五、癲狂病症

治癲狂病方

懷德縣 陳 鵬 云

处方：朱砂三錢 琥珀三錢 牛黃二錢 射香二錢

用法：共為細面，每服一錢，引用鮮地龍熬水沖服，乾的亦可。

治癲狂病方

長春中醫學院 高 士 賢

处方：甘遂三錢 朱砂三錢 菖蒲三錢 狐狸心一個，無狐狸心
時，用豬心亦可，焙干共研細面。

用法：將藥面放在豬心里，用毛頭紙包好，放在火上燒熟，
把藥取出，分為兩次黃酒服下。狐狸心或豬心也分為
兩次服之。孕婦忌服。

治精神病方

樟甸縣 王 學 書

处方：真牛黃 真虎牙 狼糞 枯礬各等分

用法：共為細面，重者服三分，輕者服一分。

驗例：張云良同志患此病兩月余，經用其他藥無效，服此方一

付即愈。

治癲狂方

长春市 尙明齋

处方：猪苦胆一个 白矾三錢

用法：将矾装在胆内，用慢火烤干枯为度，去皮研面，用鉄落四两熬水，同伏龙肝二錢冲水服下。服后要安睡，不要惊动。孕妇忌服。

禁忌：有心脏病者及孕妇忌服。

治精神病方

梨树县 周玉璽

处方：大黄一两

用法：水煎服。孕妇忌服。

注：此方有苦寒泻下作用，无便秘症状，可以慎用。

治羊癲风方

通榆县 王化东

处方：土地龙去淨土二錢

用法：焙乾为面，开白水服下一次用之。孕妇忌服。

磁朱散

怀德县 顧治平

主治：羊癲风

处方：磁石一錢五分 朱砂一錢五分

用法：共为細面，每服一錢，黄酒冲服，輕者一付，重者二、三付可愈。

治羊癲风方

公主岭市 侯英华

处方：神砂一錢五分 川軍四錢 煨石膏四錢 白矾四錢 朱砂二錢 雄黃二錢

用法：共为細面，每服一錢，白水服下。孕婦忌服。

治羊癲風方

— 董 庚 功 —

处方：大赤參五錢 炙黃芪一兩 川附子三錢 紫薏仁三錢 油
朴三錢 紅花三錢 炙桃仁三錢 黃筋三錢 沉香三錢
當歸四錢 川芎三錢 年見五錢 地楓五錢 七爪桔五錢

用法：水煎服，黃酒為引。孕婦忌服。

治羊癲風方

前郭旗 高 恩 清

处方：明礬五錢 松羅茶五錢

用法：共为細面，蜜小丸如綠豆大，每一歲服一丸，成年人
服五十丸，茶酒送下。

六、头 痛

寒濕條辨方

長春中醫學院 任 繼 學

主治：年久偏正頭痛。

处方：茶葉三錢 燈心五分 銀花三錢 元參二錢 荊子三錢
防風一錢 天麻一錢 川芎一錢 辛夷去毛二錢

用法：水煎服。

加減法：寒性頭痛加附子一錢 痰飲頭痛加清夏二錢

驗例：治療七十余例均收良效，其中最嚴重患者季王氏偏頭
痛十余年，頭痛劇烈眼花惡心，經用注射嗎啡無效，
後服此方三劑痊癒，有三年之久未犯。

治偏头痛方

张 泽 昆

处方：防风三钱 荆芥二钱 白芷二钱 细辛七分 天麻二钱
全虫七分 姜虫七分 南星二钱 川乌一钱四分 川芎二钱

用法：水煎服三次。

验例：此方对远年近月的偏头痛均有效。孕妇忌服。

治头痛方

于 煥 庭

处方：川芎一两 沙参一两 蔓荆子二钱 细辛五分

用法：水两碗煎加黄酒半碗，煎到半碗调服。

注：根据此方川芎一两用时可按患者体质强弱酌情使用，一般用量一钱至二钱如有气升痰喘虚火上炎者不宜用之。

治神经性头痛方

尚 久 群

处方：苍耳子捣一两至一两五钱

用法：水煎服。

验例：治一张××小学教员看书就头痛，近将一年经常服用镇痛药，未能解除痛苦，经服此药数剂而痊愈。

禁忌：猪肉。

注：根据患者身体强弱，可酌情使用，虚人慎服，用多量能散气耗血。

七、风湿性关节炎

治腰腿痛方

王 明 山

处方：虎骨一钱五分 活猪骨三钱 透骨草三钱 炮姜二钱 干姜二钱 川牛膝三钱 粉面子一两 红糖一两

用法：共为細面，每次服一錢至一錢五分，黄酒送下，空腹服之出汗。

驗例：治一患者宋××因受风湿，前膝骨疼，腰痛，得病六年多，用此方两剂痊愈，又治一女同志用此方三剂痊愈。孕妇忌服。

治风湿性腰腿痛方

长春市 許 騰 飞

处方：西紅花三錢 茴香三錢 透骨草三錢 虎骨四錢 杜仲四錢
故紙四錢 兔絲并四錢 淫羊藿一錢 黃蘗一斤

用法：共为細面，炼蜜为丸二錢重，早晚各服一丸，白水服下。

禁忌：孕妇禁服。

驗例：孙素琴患风湿性腰腿痛，久治不愈，中西疗法无效，后得此方配一付药，服完痊愈。以后我在临床上試用，治愈数例。

治腰腿疼痛方

曲 悅 有

处方：炙馬前四兩 麻黃四兩 川羌三錢 大活三錢 川膝三錢
木瓜三錢 乳香三錢 沒药三錢 土虫三錢 申姜三錢
年見三錢 地枫三錢 地龙三錢 桃仁三錢 紅花三錢
川芎三錢 当归三錢 秦艽三錢 甘草三錢

用法：共为細面，每服一錢，开白水和黄酒送服。孕妇忌服。

驗例：屢試屢驗，治疗几例，均得痊愈。

注：因馬前子一药，麻毒性猛烈，可根据病症具体情况，酌情减量。

治产后周身麻木腰腿疼痛及腹痛方

梅河口 張 輔 忱

处方：川芎二錢 丹皮二錢 木瓜二錢 丹参二錢 秦艽四錢

独活二錢	当归三錢	香附二錢	牛膝二錢	陈皮二錢
甘草二錢	赤芍二錢	茯苓二錢	生芪四錢	防丰二錢
生地二錢	桃仁二錢	紅花二錢	杜仲三錢	

用法：水煎服三次。孕婦忌服。

八、牙 痛

治风火牙痛方

农安县 高 凤 楼

处方：雄黄 巴豆 杏仁各等分。

用法：共研細面，用布袋装好，咬在痛牙之处，注意不要把涎嚥下。

治牙痛方

吉林鄭大 周 兰 泽

处方：黃連三錢 黃芩三錢 生地三錢 阿膠二錢 鷄蛋黃二个

用法：將四味煎好，濾出藥汁把鷄蛋黃投入攪勻，露一宿，次日早晨服之，其效良好。

驗例：本人患牙痛，試用有效，但体虛之人，服后有腹痛感，即泻一、二次便愈。

九、抽 麻 筋

治抽筋方

东辽县 关 相 忱

处方：海金砂 海螺粉各等分。

用法：共为細面，每日三次，每服一錢，白水送下。

治妇女手足痿痺方

李 年 年

处方：龙骨一两 海螺一两 生牡蠣一两 鹿角霜一两

用法：共为細面，冰泛小丸，每服三錢。

治抽筋方

孫 因 溥

处方：海螺十两 赭石三錢 木耳一两 天麻一两五錢 鈎藤三錢
西归三錢

用法：先将海螺以木炭煨透，取下表层部份，同赭石研細，
再将木耳、天麻、鈎藤、西归用清水洗淨入鍋煮汁，拌
入前药面中，乾燥后，面糊制錠。

每日三次，热元酒送下取汗，每服一錢至二錢。

孕妇忌服。

治抽麻筋方

九台县 王 忠 儒

处方：蛤粉研細面。

用法：共为細面，元酒送下。

治妇女抽筋方

怀德县 范 玉 明

处方：紅里海螺一个煨研面。綫麻五錢 烧灰 朱砂三錢

用法：共为細面，每日早晚各服二錢，黄酒为引。

禁忌：生冷之物。

治妇女抽筋方

怀德县 陈 鵬 芸

处方：当归一錢五分 扁豆四錢 海螺二两 木耳四两 綫麻四两
烧灰

用法：共为細面，炼蜜为丸四錢重，每日早晚各服一丸，元
酒送下出汗自愈。

禁忌：麝香。

治抽筋方

柳甸县

处方：乳香一錢 木瓜二錢 杜仲二錢 防风三錢 当归二錢
木耳四錢

用法：水煎服，无酒引出汗。

治抽筋方

农安县 王連科

处方：大海螺一个（一两八錢） 乳香三錢 沒药三錢 桂枝三錢
天麻三錢 吉利三錢 鈎藤三錢

用法：共为細末，每服三錢，无酒引，儿童可按年龄增减用之。

治虚人汗出中风、风邪内入、全身筋紧、身疼 难以轉側方

内蒙 孟增宇

处方：川羌二錢 鈎藤二錢 天麻二錢 桂枝尖二錢 防风二錢
全虫七个 赤芍一錢五分 生芪四兩 海馬一錢

用法：水煎服。

治妇人抽筋方

續表县 王書文

处方：茅朮四兩 木耳四兩

用法：共为末，蜜丸三分重，每日一服，无酒送下。

治妇人抽麻筋方

长春中医学院 刘金峰

处方：海螺煎 鷄蛋外壳煎至老黃色 各等分

用法：二药混合一处，每次服三錢，黄酒服下（无黄酒白酒亦可）。此方經本人使用治愈两例。

第二章 外 科

第一节 外科疾病

一、瘡瘍疽

灵 妙 散

白城市 樓、瑞 林

主治：一切初潰破之惡瘡，無論輕重，均可用之。

处方：煅石膏一兩（禁用煤火煅制）白降丹一錢五分

用法：共研細面，貯于瓶內，再上藥時，瘡面禁用“過猛酸鉀”溶液洗滌，可隨瘡口大小上藥，瘡口大者上面，瘡口小者，用煮爛粳米粥合藥搗粘，做成條狀，塞入瘡口內，外貼拔毒羔即妥。

驗例：貼膏藥三晝夜，再將羔藥揭去，瘡面一切爛肉盡化膿水，并長出新的肉芽組織。如不到三晝夜，就揭去，瘡面爛肉，未到化膿只變成黑青色，再用爛藥亦得半月時間去淨腐爛的肉，無論什么样的惡瘡潰爛，只上一次，就變為好治之瘡，上藥后立見消腫。此方有“化瘀活血”，“去腐生肌”之功，不可輕易忽視。

治瘡癰方

白城市 樓、瑞 林

处方：抱茸角膠三錢 當歸三錢 赤芍三錢 皂刺一錢 銀花三錢

連翹四錢 甘草三錢 益母草（蒸熟）三錢 人參二錢
全退一錢 黃芪三錢 甲珠四錢

用法：共為細面，煉蜜為丸二錢重，日服一次白水送下。

禁忌：辛辣，魚腥發物。

狗茸膠制法：狗茸角，由立春至惊蛰就長成，只要不退毛就可，在熬時，先用柴火燎去毛，并且刮淨，趁熱劈碎，放置鍋內添水熬至二三日、去淨骨滓，再用慢火熬粘，倒在磁盆內，候涼用刀割成小塊，晒干應用或單吃茸亦可。

驗例：無論多重的陰瘍險惡之症，服過十餘丸即可收效。

治无名肿毒方

新站 荆 淑 兰

处方：黃柏三兩 白芷二兩四錢 當歸二兩四錢 乳香三兩
生地二兩四錢 蓖麻子一兩二錢 全虫九十個 全退一兩八錢
蛇退六條 赤芍三兩 紅花三兩 馬前子切片四十二個
蜈蚣六十六條 男子發如雞蛋大一團 麻油八斤 浸透熬爛
去滓，鉛粉四斤。

用法：共為細面，將麻油與藥混合熬成膏，量腫毒面積大小攤貼之。無論已潰未潰，俱可貼用，有消散拔毒之功。

治无名肿毒及风湿性腰腿疼痛方

海龍縣 趙 殿 發

处方：虎骨三錢 熊油二斤 大黃七錢 木鱉九錢 巴豆三錢
油桂六錢 血竭一錢 儿茶二錢 荊芥二錢 防丰二錢
當歸六錢 輕粉三錢 山甲二錢 乳香四錢 沒藥三錢
官粉二錢 骨草二錢 人言二錢 皂刺三錢 白芷六錢
黃芩四錢 赤芍四錢 生地四錢 阿魏四錢 血余三錢
射香一錢 馬前二兩 香油二斤 黃丹適量

用法：熬成膏药，外贴患处。

验例：此方经余用四十余年，治愈患者很多。

禁忌：一切发物。

治一切恶疮痛疽方（无论肿毒，溃瘍均效）

处方：灵脂五钱 白芷二钱 血竭一钱五分

用法：共为细面，用猪油调成羔，敷患处。

治疮疡溃烂，久不收口、不长肌肉，及棒伤溃烂方

谢振声

处方：生石膏五钱（用甘草水飞过者良） 红升丹五分 梅片五分

射香五厘

用法：共为细面，调上患处。

验例：郑文华同志，患瘰癧，屡治无效，终日流水，经用此方数旬痊愈。

又治蔡恒发，因受棒伤，伤处溃烂严重，用此药上之即愈。

治一切无名肿毒（红肿热痛之症）

处方：鲜地龙适量

用法：将地龙捣烂，加入白糖调敷患处，在冬季时用干的亦可。

治无名疮毒、红肿有脓不出头方

扶余县 车 承 兴

处方：公鹅屎适量

用法：将粪用瓦焙干，黄酒冲服见汗。

禁忌：辛辣之物。

治无名肿毒洗药方

处方：胆矾二两 白矾二两 芒硝四两

用法：共合一起，研为细面，每次用量，三至五钱，开水冲洗患部，此方屡试有效。

· 加味仙方活命散

长岭县卫生所 董庆富

主治：痈肿未溃方。

处方：黄芪一两 甲珠三钱 银花五钱 皂刺三钱 当归三钱
赤芍三钱 乳香三钱 没药三钱 浙贝三钱 白芷三钱
防丰三钱 花粉三钱 陈皮三钱 甘草三钱 桔梗三钱

用法：黄酒为引，水煎服。孕妇忌服。

董氏药膏

长春市 董 华

主治：疔毒，痈疽，一切化脓症（脚气，乳痈，癰肿，骨结核）。

处方：生石膏一两 珍珠三分 轻粉三钱 章丹一两
红粉片二钱五分 梅片一两 射香二分 白凡士林油八两

用法：先将轻粉研细无声为度，再将其它各药研细，合在一起，加入凡士林油，制成软膏敷用。

验例：治一汽车公司女同志，患天顶疽、颈后周围肿如拳大，已溃化脓，疼痛有七个月之久，头晕面色苍白等状，用此方治五十余日全愈。

范氏拔毒膏

榆树县 齐 青 范

主治：痈疽，疔瘡，乳痈，瘰癧等症。

处方：麻油二斤 黄連五钱 紋軍二钱 青柳枝五钱（去皮）白花蛇二钱

用法：将麻油用文武火熬至滴水成珠不散时，再把前药投入油内，炸枯去滓，下章丹一斤，待起黑泡时，马上离火，不住手搅之，至稠粘时，再加入下列药品。

梅片二钱 滑石粉二钱 射香三分 轻粉五分 红粉片一钱
血竭五钱 乳香三钱 没药五钱 樟脑一钱，共为细面
加入膏内搅之，至搅不动为度，放在水内浸一夜，拔出火气便妥。

用法：用时将膏摊在布上，量患处大小酌量用之。

验例：此方经验多年有效。

地龙汤

东江县 王 锡 荣

主治：毒痛恶瘡。

处方：活地龙一两 红糖一两（白糖亦可）

用法：将二味共合一处研如泥状，用药布滤过汁涂患处，滓子研末内服。有消肿祛热之功。

治痂肿初起方

铜 甯 县

处方：五倍子为细面。

用法：根据痂子大小，将药面用陈醋调敷患处，至三四小时后，痂肿即消，逐渐恢复正常。

治痂肿效方（外敷）

铜甯县 陈 海 章

处方：芙蓉叶 黄柏 白芨 各等分

用法：共为细面，用陈醋调敷患处。

治无名肿毒效方

铜 甯 县

处方：榆树皮面 黄柏 乳香 没药 各等分

用法：共为細面，用鷄蛋清和开白水各半，調成稀糊敷患处。

治腰痛、砍头、发背、膝疮等、一切阳性疮症，潰烂久不收口者方

陈亚东

处方：蜜陀僧五錢 銀珠五錢 輕粉五錢 銅綠五錢 章丹二兩
陈石灰一两五錢

用法：共为細面，用香油調成稀粥状，將药夹在两层油紙之內，四边折起，防药流出，貼于患处，上用紗布盖好，繃带固定，在三四日局部消毒一次，除去脓汁。此药如干时另用香油調之，可連用二三日換一次。

驗例：此方在临床应用有效，治愈数例。

治腰痛、发背、偏口、对口、胎毒等症

农安县 吕秀春

处方：生鳖甲一个 珍珠四粒（綠豆粒大） 官粉五錢 輕粉三錢
枯矾五錢 合子布一块 剪窝五个（做便服上衣剪下来的领窝），
血余（一个人的头发）射香一两

用法：用泥做成爐子，將鳖甲放在爐內，用七斤炭火烧之，再用陈醋四斤，徐徐往鳖甲上涂之，把珍珠装在鳖甲內，以醋涂了为度。再将全蛤蜊两个，用火烧醋淬。官粉瓦上焙黃，領窝、头发焙干，合上药共为細面。射香、輕粉另研細后，与药混合均匀，調上患处。

二、疔 疮

治疗奇方

高恩清

处方：菊花四两

用法：黄酒三碗，煎服出汗。

注：脾胃虛寒、大便滑泄者不宜用，如脾胃健盛，大便經常者，可按體質強弱酌情應用。

泄毒飲

高 恩 濟

主治：疔毒。

处方：黑豆五十粒 古月十五粒 生姜三片 葱头三棵 紅糖一两

用法：水煎服，加入紅糖冲服出汗。此方必須和下方“薰疔藥方”合用。

薰疔方：斑毛一个 紅枣一个去核 将斑毛入枣肉內包好燒之，
古月七粒 蓖麻子一粒 銀珠適量

用法：将各藥共合一处搗爛，用布包好納入鼻孔內，再服泄毒飲。

治疗外敷藥方

高 恩 濟

处方：巴豆三錢 人言三錢 銀珠三錢 輕粉三錢 乳香三錢
沒藥三錢 潮腦三錢 蟾酥三錢

用法：共为細面，香油調敷患处。

禁忌：小米飯七日。

注：使用此方，可酌情減量配製。但对此藥須注意保管。

治各种疔毒方

磐石县 于 芳 圃

处方：1. 外敷藥：乳香 沒藥 地榆 雄黃 公丁香
各等分

用法：共为細面，用白酒、依克度或乳汁調藥，用依克度調配为佳。

2. 內服：飞龙夺命丹二十一丸、或梅花点舌

丹二十一丸。

用法：服梅花点舌丹，每次服一丸，陈酒送下，臥睡取汗。
服飞龙夺命丹，每次服三丸、七丸或九丸，用热黄酒送服取汗。但在临床上，可以酌情加减用量。孕妇忌服。

3. 內服五味消毒飲：銀花八錢 菊花四錢 公英四錢
地丁五錢 天葵子四錢

用法：水煎服，病在下，食前服；病在上，食后服。

禁忌：腥冷发物。

4. 截疗法：初治时，須用銀針截其疔根，不然无效。視患者背后有小紅痣，(不論左右)痣中有立毫毛，以針刺之，不疼者是疔根，不論刺多深，以知疼为止，用火罐拔之。先用敷药，次用丸药，不愈者再服湯药。

治疗毒方

蛟河县 刘任氏

处方：巴豆一粒

用法：用粳米粥少許，合在一处捣烂，貼患处。

治疗毒方

于远航

处方：巴豆七粒 乳香一錢

用法：同葱白捣烂如泥，敷患处。

八宝护心丹

怀德县 陈鹏云

主治：五脏所发一切疔毒。

处方：琥珀二錢 朱砂二錢 白射二錢 南星四錢 防風三錢
熊胆三錢 紅花二錢 黃連三錢

用法：共为細面，每服三錢，开白水服下，出汗即愈。孕妇忌服。

治疗毒方

前郭尔罗斯蒙古族自治县 赵 述 兴

处方：陈醋一碗 面碱一握

用法：将面碱投入醋内，必定翻花出沫，然后用棉球蘸醋擦患处。

治惡性疔毒，初起发冷方

前郭尔罗斯蒙古族自治县 刘 純 义

处方：黄蜡 香油各适量

用法：将黄蜡入香油内，火上化开，在局部周围趁热涂之有效。

治疗毒起緩方

长春市 董 华

处方：古月为面 杏核一个

用法：将杏核劈开，去仁用硬壳半个，把古月面装入壳内，叩在疔之局部，用凉水調白面至稠粘性，涂于杏壳周围，待二十四小时取去，紅綫即无。

驗例：韓奎同志，年三十五岁，患鎖口疔，口眼歪邪，牙关紧閉，头晕心煩恶心，用此方三次而愈。

巴豆銀珠散

怀德县 陈 鵬 云

主治：疔毒惡瘡。

处方：銀珠五分 巴豆二个（燒去皮）

用法：共为細面，蜂蜜做成一丸，塞入鼻孔内，男左女右，出透汗自愈。

治疗毒洗药方

梨树县 宋志仁

处方：麻黄一两 紫花地丁一两 蒋蕊草一两

用法：水熬趁热洗之。

治疗毒恶疮方

梨树县 宋志仁

处方：银花五钱 地丁一两 甘草三钱 明矾三钱

用法：黄酒为引，水煎服，连续数剂有效。

治疗毒方

梨树县 王佳令

处方：白芨二钱 银花三钱 半夏二钱 贝母三钱 山甲三钱

皂刺三钱 知母三钱 花粉三钱 桔梗三钱

用法：水煎服。

治疗毒方

刘永财

处方：银花八钱 地丁五钱 菊花八钱 连翘三钱 公英五钱

甘草五钱

用法：水煎服，食前服之。

治疗毒敷方

怀德县 崔作云

处方：雄黄二两 轻粉五钱 梅片五分 蟾酥五分

用法：共为细面，水调涂于患处有效。

治疗毒敷药方

镇安县 王香文

处方：血余（般存性）二钱 飞罗面二钱 朱砂一钱 百草霜三钱

用法：共为细面，合葱白七个一处捣烂，敷于患处，其效良好。

三、鼠瘡癰瘰（淋巴腺結核）

治淋巴腺結核方

梨樹縣 陳芳亭

處方：甲 蛤粉二兩 海蝶四錢 海藻四錢 昆布四錢 茯苓五錢
柴胡四錢 夏枯草六錢 銀花四錢 川芎四錢 乳香四錢
沒藥四錢 龍胆四錢 當歸四錢 白芍四錢 青皮四錢
生地四錢 丹皮三錢 珍珠四十八粒

用法：共為細面，糯米面糊為小丸，每服三錢開白水服下。
（小兒用酌減）。孕婦忌服。

乙 香附四錢 當歸三錢 白芍三錢 柴胡三錢 茯苓三錢
骨皮三錢 薄荷一錢半 丹皮二錢 川芎一錢五分 枯草四錢
甘草一錢半

用法：水煎服，煎三次兌一處，再均三次服之，現吃現熱。

禁忌：辛辣之品及各酒類。孕婦忌服。

治鼠瘡方

白城市 復瑞林

內服藥方：漏蘆一兩 銀花五錢 連翹五錢 川連七錢 川貝去
心七錢 黃芩三錢 黃柏二錢 白芍三錢 當歸三錢 生
地八錢 木通三錢 公英三錢 花粉五錢 柴胡三錢 梔
子八錢 元參八錢 薄荷三錢

用法：將藥共合一處，不許炒，炕干軋為細面。

用法：每服二錢，一日兩次，或一次均可。

禁忌：腥辣之物，狗肉、牛肉。

驗例：如重症服四十劑后可貼千錘改造溶化膏，效果更加。

外敷藥：溶化膏配制法：

蓖麻子油二兩 乳香五錢 沒藥五錢 巴豆仁二十個

(夏天用十个) 杏仁二錢半 木鱉子仁二十二个 (用如綠豆色仁) 銅銹五分 (把銅器抹醋放在濕地生銹后取之) 胆矾四分 广松香一斤 核桃仁五个 桃仁五个

用法: 沒药、乳香、炕干为面, 桃杏仁木鱉仁巴豆仁共研如泥, 松香搗碎共合一处, 合蓖麻子油一同放入鍋內, 用慢火熔化, 沒有松香疙瘩为度, 将膏药取出, 倒入凉水盆內, 水不宜少, 浸一宿解除膏药之燥烈之性, 随症听用。

用法: 在用前将患处消毒好采用适当的块, 或蘸水或用唾液, 捻成如紙样薄片, 摊于布上, 貼患处, 貼至痊愈为止。如遇鼠瘡潰破或潰烂者, 使用本方, 去巴豆加沒药乳香 各五錢 輕粉八錢, 配制法同上, 貼于患处。

四、漏 瘡 (骨結核)

治漏瘡方 (骨結核)

梨樹縣 周 鳳 山

处方: 炙龟板四兩 炙龜甲四兩 山甲珠二兩 虎骨二兩

用法: 共为細面, 蜜为大丸, 一日三次, 每服一丸, 白水送下。

驗例: 梨樹縣衛生院副院長患此病, 經四平透視确诊骨結核 (右手小多角骨結核), 当时症状是書写困难、不能运动 (乒乓球不能打)。經用此方即漸好轉, 写字如常又能参加运动。

此方經研究試用, 去虎骨也有同样疗效。

治漏瘡方 (骨結核)

吉林市 邓 維 漢

处方: 銀花面二兩 人參健脾丸面二兩

用法：将二味合成蜜为大丸，每次服一丸，早晚服下。

驗例：对局部皮肤，有漏孔流脓水的骨結核以此方治之，收到良效。

治骨結核、腺結核方

张先凱

处方：馬前子片二两（用香油炸，用紙压，滲出油） 山甲珠二两（砂炒） 僵虫四两（炒存性）

用法：共为細面，用大黃米粥为小丸如小豆大，成人从每服十一丸起，服至五日或七日增加二丸，加至服二十三丸为止，永不再加，未成年人可以酌情減量，一日早晚两次服之。孕妇忌服。

加減法：生在腰部，引用杜仲。大腿引用牛膝。脛足部引用牛膝木瓜，上肢引用桂枝。

驗例：此方是我师傅传给秘方，我老师曾治愈很多病例。我长子患腰椎結核，二年有余，在头一年病势尚輕，感觉腰痛，經医院診斷为风湿性腰疼，到二年用中西药无效，腰椎向后凸起，骨結核症状出現，經服此方治疗八个月的时间，完全治愈。

治骨結核方

敦化县一楊树义

处方：白矾五錢 礞砂三錢 火硝三錢 白砒三錢 朱砂一錢 雄黃一錢 礞砂一錢

用法：先将头三味药为面每味对半分，先放入鍋底为第一层，再将后四味药一半盖之为第二层，再把前三味药一半放在上面为第三层，最后再把后四味药一半放在最上面为第四层，鍋底升火，見冒青烟时立即住火。取出共为細面。用时加乳香沒药各五分（面），白面做成条

狀，放入瘡內。

驗例：曾治萬同志，患漏瘡已九年之久，潰爛出九個漏孔，流膿血水，經省醫院照象骨頭已變黑色，經用此方治愈。

治一切惡性漏瘡化膿流水方

教化縣 梁 立 發

處方：天靈蓋一錢（炒黃） 烏梅燒灰一錢五分 輕粉一錢

用法：共為細面，香油調上患處。

又方：輕粉一錢 紅粉一錢 冰片一錢 大棗十枚（去核）

用法：把上三味藥包在棗內，燒灰純性為面，用香油調上患處。

驗例：丛樹發同志，手腕生漏瘡，骨頭已變成黑色，爛成四個眼流血水，七年多未治好，經用此方治愈。
治褚富良，在腿上已患十三年漏瘡，特別嚴重時，往外流骨渣子，用此方治愈。

五、膝 瘡

治兩腿膝下生膝瘡方

九台縣 李 印 堂

處方：紅粉一錢 冰片三分 煅石膏一錢五分 寒水石一錢

用法：共為細面，用香油調勻，塗抹患處。

治膝瘡多年不愈方

東豐縣 王 磯 田

處方：兒茶三錢 銅綠三錢 松香三錢 官粉三錢 枯礬三錢
章丹三錢 珍珠二粒

用法：共為細面，用生豬板油適量，搗勻成膏狀，攤紙貼患處，七、八天即愈。

治膿瘡方

鄭·殿 奎

处方：蜜陀僧一錢 猪板油一两

用法：共合一处，搗成膏敷患处。

驗例：本方經我在临床上使用确实有效。

治膿瘡久不愈者

东丰县 李世荣

处方：人中白适量 桐油适量

用法：共合一处研面，調敷患处有效。

治膿瘡方

东丰县

处方：黄蜡 真香油 各等分

用法：将二药用鉄杓熬好、摊在窝紙上，貼患处一星期后，再貼黄烟叶，过一星期后，用原方貼之。

治膿瘡方

吉林市 馮 有

处方：大萝卜烧了成粘性时，敷在膿瘡处，一天換三次。

驗例：自己患过膿瘡，久治不愈，曾用此方治愈。

六、瘰 瘡

治痔核痔瘡方

洮安县防疫站 楊 玉山

处方：輕粉一錢 龙骨一錢 儿茶一錢 冰片一錢

用法：共研为細面，混合均匀，用瓶貯藏，防泄药味。每日上两次，最好在晚上睡覺前上之，在上药前用新毛巾一条，开水待溫洗滌患处，用毛巾擦干、上药，如里痔将肛門扩开，把药上在患处，并須臥床休息五—十五

分鐘，即可見效。

驗例：經治療數例，均收良好效果。

注：此方藥味組成簡便，到處都能配製，可以大量推廣試用。

痔瘡散

長春中醫學院 周 云 樓

主治：痔瘡痔核（外痔有特效）。

處方：珍珠一錢 川連一錢 冰片五分 龍骨七分 輕粉二錢
沒藥五錢 兒茶一錢 射香五分

用法：共為極細面，破時干上，沒破時，用凡士林油調勻上患處。

治痔核方

長春中醫學院 劉 金 峰

處方：生半夏七分—八分（約六—七個） 白酒三兩

用法：將生半夏搗碎，浸酒內泡至三晝夜，五天喝完，每日早晚喝一次（此藥毒性猛烈可按日期喝完，不要任意多喝）。孕婦忌服。

驗例：經服此方，痔核消縮痛止，曾治數例均收良效，沒有副作用。

治痔瘡特效方

長春中醫學院 程 方 生

處方：芒硝五兩

用法：以開水沖化裝小罈內，趁熱坐在罈口上熏之。

驗例：此方使用多次有效，最重者，經手術未愈，用此方兩次即愈。如便燥者，可服搜風丸，使其緩下。

治痔核脫出效方

懷德縣 楊 樹 范

處方：蒼耳子一斤

用法：用火炒黃，研成細面，白糖為引，每日服用三次，每次自酌適量即妥，內服七天即可轉愈。

外洗藥：骨皮一兩 黑朮一兩 用開水浸泡，趁熱熏之，待溫時洗患處。

治外痔出血方

張子風

處方：局方七厘散

用法：凡是外痔在犯病時出血期，疼痛難忍，并有重墜感的疼痛，將藥面用手紙托住，向患處上之，有止痛止血作用，以後如果保持大便正常，不能再犯。

七、燙火傷

治燙火傷方

鎮賚縣

處方：阿膠適量

用法：將阿膠放在酒內，把白酒點燒，使阿膠溶化為度，上患處。

治燙火傷方

海龍縣 駱云章

處方：炒乳香 三錢 炒沒藥 三錢 丁香 三錢 官粉 三錢
珍珠二、三粒

用法：共為細面，香油調上患處。

專治燙火傷流膿水方

賀和

處方：兔子皮（蝦成灰）

用法：研面，用香油調上。根據傷面大小，酌量用之。

治燙火傷方

德惠縣 宋 養 閣

處方：白硃面、白面漿子各等分

用法：共合一處，用水調勻，塗傷處。

注：此方經濟，配制簡便，一二度燙傷塗抹有效，有消炎止痛的作用，可以推廣試用。

治燙火傷方

前郭爾羅斯蒙古族自治縣 宋 永 平

處方：大黃面一兩 豬毛燒成灰二錢 梅片五分

用法：共為細面，與梅片研勻，香油調抹患處。使用頗有驗效。

治燙火傷方

東豐縣 趙 景 山

處方：大黃 白芷 石羔各等分

用法：共為細面，香油調上患處。

禁忌：熱物。

治燙火傷方

長春中醫學院 宋 逸 卿

處方：月石三錢 寒水石五錢 地榆炭三錢 梅片五分

用法：共為細面，合梅片研勻；初時用香油調上，已潰破則干面撒之。

治燙火傷方

東豐縣 吳 和

處方：小米炒黑為面

用法：將面用香油調敷傷處。

驗例：治一例，劉玉良粉匠，在工作時掉在粉鍋內，全腿燙傷起泡并有脫皮地方，經用此方，上之立止疼痛，七

天痊愈。

又方

怀德县 齐 殿 三

处方：白矾二钱 猪胆汁一个

用法：将白矾研成面，与猪胆汁调成膏状，敷于患处即愈。

八、冻 瘡

治冻疮破溃流水痒痛者

长春中医学院 范 渭 生

处方：轻粉 铅粉 樟脑 故纸 各等分

用法：共为细面，用凡士林油混合，制成膏，涂抹患处。

治冻疮方

处方：鲜山查肉（不要有腐烂的）

用法：用火烤熟，捣烂敷于冻疮处。

注：可以试用。

治冻疮方

长春中医学院 刘 金 峰

处方：红辣椒 不拘数量

用法：用开水浸泡，加白酒一半，待温时，须频洗伤处，有活血消炎止痛的作用。

九、疝 气

治疝气偏坠痛方

怀德县 张 士 瑞

处方：血竭三钱 蜈蚣三条 全虫三钱 甲珠三钱

用法：共为细面，每服三钱，黄酒送服。

治小腸疝氣方

懷德縣 吳 占 庭

處方：木香一錢 茴香二錢 官桂二錢 川楝三錢 血竭一錢五分
甲珠三錢

用法：共為細面，大人每服二錢，小兒酌量。

治小腸疝氣方

海龍縣 蘇 信 久

處方：當歸二錢 蒼朮二錢 澤瀉二錢 川楝三錢 牛膝二錢
甲珠二錢 茴香二錢 木香五分 油桂二錢 延胡二錢
全蟲二錢 甘草二錢

用法：水煎服三次、空心服之。

治疝氣痛方

舒蘭縣 張 巨 山

處方：豬鬃（燒灰）

用法：每服一錢，槐角煎水沖服。

治疝氣方

農安縣 王 墨 林

處方：青皮三錢 吳茱三錢 茴香三錢 枝核二錢 附子二錢

用法：水煎服。

十、癰 丸 炎

木香金鈴丸

長春中醫學院 李 澤 民

主治：癰丸腫大作痛，一側或兩側堅硬發涼及小兒疝氣。

處方：木香 川楝 人參 附子 乳香 沒藥 茴香 延胡
全蝎各等分

用法：共为細面，酒糊为小丸，每服二錢黃酒送下。如湯剂，以黃酒加水各半煎服。

驗例：此方經我在临床上应用二十来年，效果很好，在用量上，可按患者体质强弱，酌情增减；一般服头一剂后，即有好感，繼服肿痛逐漸消失，如小儿在月內好哭的，易发此症，审查无有热性者，可用小量少少服之，或作散剂亦可。

治舉丸炎（結核性者亦效）

鄧 柏 林

处方：金棕子花一把

用法：水熬，每日服二、三次有效。

驗例：此方从民間采来的治辽效果好，無論属于寒性或热性者，均可用之。但目前对此方的藥理作用，尚未明了。

治急性舉丸炎方

趙 國 叔

处方：沒药二錢 全虫二錢 紅参二錢 茴香二錢 川棟二錢
延胡二錢 附子二錢 木香二錢 乳香二錢

用法：黃酒为引，水煎服。

治阴囊腫方

張 祥 民

处方：青皮五錢 枝枝五錢 益智五錢 烏药五錢 茴香五錢

用法：共为細面，每服二錢，黃酒送服。

驗例：治五例，腎囊腫大透明似水，沉重不疼。又治一小儿九岁，阴囊忽肿，二、三日不能行动，无疼痛，用此方一周后而愈。又治年七十岁老翁，阴囊腫两月余，服它药无效，而用此方治愈。

治阴囊肿大，疼痛不止，特别对寒湿受风者有效

处方：枝核二錢 桔核二錢五分 桃仁二錢 香附二錢 木香一錢五分
茴香一錢五分 棟子三錢 紅花一錢五分 泽泻三錢 吳茱二錢
山查核二錢 防丰三錢 大活二錢 甘草一錢五分

用法：水煎服。

治辜丸炎方

挑安县 郎 河 林

处方：地丁三錢

用法：为細面，每服一錢，白酒服下。

治辜丸炎方

邵 崇 仁

处方：茴香一两 防丰三錢 蛇床子三錢 吳茱一錢

用法：水煮数开，至剩一大碗为度，装入大蘿卜罐內，趁热薰之，辜丸出汗为止。

驗例：此方是祖传驗方，經治疗数例，均收良效。

治副辜丸炎方

处方：蒼朮三錢 桃仁三錢 冬瓜子三錢 甘草三錢 白芍二錢
丹皮三錢 薏米六錢 大黃二錢

用法：水煎服，服后将药滓用布包之敷辜丸肿处。

治惡性、淋毒性、辜丸炎方

通化县 刘 松 山

处方：鮮姜（搗汁）

用法：将姜汁滤过，放于尿道口处，姜汁被吸入尿道內，沒有疼痛即有热感，辜丸部出汗，疼痛肿胀逐漸消失。

治舉丸偏墜腫痛，或左或右牽引小腹痛方

鎮賚縣 劉 傳 秀

处方：白朮四錢 茯苓四錢 猪苓三錢 澤瀉三錢 木通一錢 木香一錢
油桂一錢 川棟子二錢 枝核二錢 桔核二錢 茴香一錢五分
用法：水煎服，第一次水三碗煎至兩碗，第二次水兩碗煎至一碗，將兩次量合在一起，均兩次一日早晚服之。

加減法：血滯者加紅花錢半 桃仁二錢。

氣滯者加檳榔二錢。

寒盛者加附子一錢。

熱盛者加黃柏二錢 知母二錢。

腫痛甚者用千金翼方洗：雄黃一兩 白矾二兩 甘草七錢
水五碗，煎至兩碗，先薰后洗。

第二节 皮膚系統疾病

一、疥 癬 瘡

治疥瘡方

東丰县 張 玉 良

处方：大楓子肉三錢 核桃仁三錢 紅棗肉三錢 硫黃三錢
潮腦二錢 紅矾一錢 水銀二錢

用法：共搗一處如羔，火烤擦之。

驗例：臨床使用有效。

治疥瘡方

延吉縣 鄭 友 容

处方：硫黃面 白芷面 輕粉 胡桃肉 木鱉子 大楓子 各等分
猪脂油適量

用法：共搗一處成膏，如症重者可酌加巴豆一個，裝在紗布

袋內，随时擦之，在冬季时，須用火烤擦之，試用有效。

治疥疮方

长岭县 秦 凤 杰

处方：花椒三錢 巴豆三錢

用法：將二味藥用瓦焙成黃色，研為細面香油調勻，將藥裝在紗布袋內，擦患處。

注：陰部及乳房禁擦。

治疥疮方

洮安縣 董 增 宗

处方：硫黃 雄黃 白芷 狼毒各等分 猪板油生的適量

用法：將藥共為細面，和猪油共搗一處成羔，裝紗布袋內擦患處，在冬季時用火烤擦，經驗有效。

治牛皮癬方

双阳县 王 清 华

处方：雌黃 輕粉 猪香脂油各等分

用法：共一處搗敷癬處。

治週身发痒起白屑，重則化脓方

雲 鏡 秀

处方：輕浮萍一兩 蒼耳子一兩五錢 蒼朮一兩五錢 苦參一兩五錢

黃芩五錢 香附二兩五錢

用法：共為細面，酒糊為丸二錢重，白開水服下，每次服一丸，上半身多者食前服，下半身多者食後服。

治牛皮癬方

洮安縣 解 起 英

处方：加皮五錢 腹皮五錢 鮮皮五錢 桑皮五錢 骨皮五錢

大活五錢 川椒五錢 雄黃三錢 生艾葉一兩 防風一兩

甘草一两 地肤子一两 苦参五钱 蛇床子一两 川羌五钱
老黄瓜皮五两 外用猪香脂油四两 和药一处用开水浸
泡洗身患处

内服：消风散

川羌二钱 防风二钱 荆芥二钱 川芎三钱 党参二钱
茯苓二钱 陈皮二钱 姜虫二钱 藿香二钱 甘草二钱
银花三钱 连翘三钱 蜈蚣二条去足尾，焙黄色研面均三包。

用法：水煎服三次，每次服蜈蚣面一包。孕妇忌服。

验例：本方世传，经本人临床使用治愈数例，用之有效。

二、黄 水 瘡

治黄水疮方

鎮賚县 刘 凤 林

处方：黄柏一两 苦参五钱 枯矾三钱 雄黄五钱 龙骨五钱
海螺硝五钱 煅石膏三钱 梅片一钱

用法：共为细面，香油调上。

治黄水疮方

鎮 賚 县

处方：枯矾五钱 轻粉一钱 黄柏面五钱 雄丹（炒）三钱 官
粉三钱

用法：共合一处研匀，香油调上或凡士林油亦可，轻者二、
三次，重者四、五次可愈。

治黄水疮方

樟 甸 县

处方：青黛三钱 蛤粉二钱 黄柏一钱 黄连三钱 硼酸四钱

用法：共为细面，用凡士林油制成膏剂，涂抹患处。

治黃水瘡方

永吉縣 張 鳳 璽

處方：大皂炭一兩 蛤粉一兩 青黛五錢 松香五錢 梅片一錢
輕粉五分

用法：共為細面，濕性干上，干性香油調上。

治黃水瘡，耳底，下疳方

輝南縣 白 良 楠

處方：古月五錢 梅片五分 朱砂三分 消炎粉四錢 薄荷冰二分

用法：將古月研成細面，各藥一處，用薄荷冰研勻，裝入瓶內，上之以備應用。

禁忌：辛辣發物。

治頭面生瘡，流黃水，癢難忍方

張 殿 閣

處方：輕粉三錢 紅粉三錢 海螵蛸三錢 甘石一錢五分
銀硃三錢 官粉二錢 乳香二錢 沒藥二錢 山梔一錢五分
大黃一錢五分 梅片五分

用法：共為細面，香油調上，用之有效。

三、癩疹(蕁麻疹)

治蕁麻疹，週身蕁痒方

梨樹縣 周 玉 璽

處方：黃芪一兩 當歸一兩 川芎四錢 赤芍四錢 生地五錢
桃仁四錢 紅花四錢 丹皮五錢 全退三錢 連翹四錢
鮮皮四錢 白芷四錢 蒼朮四錢 苦參四錢

用法：水煎服。

注：此方藥量，可按體質強弱酌情用量。孕婦忌服。

治蕁麻疹方

張 榮 久

處方：黃芪五錢 甲珠二錢 防丰一錢五分 地肤子三錢 生地五錢
桃仁二錢 紅花二錢 粉甘草二錢 枳壳二錢 赤芍二錢
柴胡二錢五分 川芎二錢 桔梗二錢五分 牛膝三錢

用法：水煎服。孕婦忌服。

- 此方治法，是按氣虛血熱，受風所致，服藥後蕁麻疹多出於皮膚表面，這是甲珠之力，以後消失不再復發，如有濕性重者，可加蒼朮五錢。

加減消風散

藥樹县 辛 海 漢

主治：蕁麻疹。

處方：荊芥二錢 防風二錢 木通二錢 苦參二錢 知母一錢五分
全退三錢 當歸二錢 甘草二錢 銀花四錢 連翹二錢
公英二錢 地丁二錢 牛蒡子二錢

用法：水煎服。孕婦忌服。

加減法：如里熱所致，屬于胃腸性者，加涼膈散。

鬧心者加桃仁，紅花各一錢五分

因吃肉所致，兼腹痛者加大黃三錢 山查三錢

治蕁麻疹洗方

東丰县 楊 維 田

處方：蟾酥一錢 白矾三錢 雄黃三錢 白酒四兩

用法：共為細面，用酒燉開為度，擦患處。

四、腎囊風（陰囊濕疹）

治腎囊濕疹方

乾安縣 蘇 梅 林

處方：銅綠五分 硫黃五分 梅片三分 官粉三分 枯礬五分

用法：共為細面，用豬脂油調成羔狀，擦患處，一日兩次在
上藥前用麻黃煎水洗之，再上藥膏。

治腎囊風方

懷德縣 齊 源 三

處方：花椒皮一兩 透骨草三錢 艾葉三錢 防風三錢 甘草一錢五分

用法：水煎洗之。

治腎囊濕疹方

吉林鐵路醫院 劉 廷 煥

處方：胖大海六枚

用法：將大海焙干研細面，用黃酒沖服一半，擦患處一半，
在服完藥時，蓋被出汗即愈。

治腎囊風方

樟甸縣

處方：苦參三錢 狼毒三錢 蛇床子三錢 艾葉五錢 花椒三錢

防風三錢 透骨草三錢 鮮皮五錢

用法：水煎洗之出汗。

治腎囊濕痒方

長白縣 桑 志 學

處方：大青鹽三錢 皂角三錢 苦參三錢 川椒三錢 蒼朮三錢

用法：水煎先薰后洗，數次即愈。

治腎囊濕痒方

安安县 王 向 学

处方：新姜五两 茴香三两

用法：水熬先煎后洗，盖被出汗，洗二、三次即愈。

治腎囊風方

樟甸县

处方：山核桃一个 冰片少許 雄黄面五分

用法：将山核桃一个放在火內烧存性研面，和冰片雄黄面拌匀，香油調上患处。

治腎囊風方

敦化县 楊 树 义

处方：砂仁一錢 白芷一錢 硫黄一錢 蚊蛤一錢

用法：共为細面，用手掌沾药擦之。

五、腋 臭 症

治腋臭方

处方：白矾面四分 梅片一分

用法：将腋窝用溫水洗淨，用药擦患部，每日两次。

治腋臭方

处方：包米粉子炒黄黑色

用法：临臥前，涂擦腋窝部。（先用青盐水洗之，后擦药面）

治腋臭紅腫方

蛟河县 孟 昭 星

处方：白楊树叶（鮮的）

用法：用开水浸泡以透为度，候凉时貼腋部，在冬季时，用

楊树皮亦可。

治腋臭方

处方：硫黄三分 枯矾五分 大活二錢 地龙肚內土二錢

用法：共为細面，擦腋部。比蜜陀生散力强。

六、蛇盘瘡（带状疱疹）

降龙丹

双阳县 任 維 寶

主治：蛇盘瘡。

处方：生石膏一两 雄黄三錢

用法：共面水調上之，三、五次即愈。

治蛇盘疮方

海龙县 王 炳 臣

处方：黄柏五錢 大黄五錢 地龙五錢 炒柏叶五錢 赤豆（紅小豆）三錢 輕粉三錢

用法：共面香油調上有效。

治蛇盘疮方

李 星 權

处方：雄黄一两 姜黄一两

用法：共为細面，香油調上。

治蛇盘疮方

敦化县 陈 国 翰

处方：外用，金黃散 加雄黄用陈醋調敷。內服万灵丹，出汗即愈。

七、脚 气

治脚气肿痛方

张 昆 明

处方：苏叶二钱 吴茱一钱 桔梗二钱 生姜三片 桔红二钱
板榔片二钱 加桃仁二钱 红花二钱

用法：水煎，凉服。孕妇忌服。

治干湿性脚气方

延吉市 贾 存 财

处方：蒼朮面一两 鷄蛋清适量

用法：用鷄蛋清調好，涂患处有效。

治脚气肿痛方

桃安县 解 超 英

处方：仙人掌去刺

用法：搗汁，抹于患处，肿消痛止。

治烂脚丫方

内蒙呼和浩特市 宫 杜 岩

处方：黄精四两

用法：把黄精用水泡两日夜后，滤过去滓，用时先用热水泡脚解痒，然后以药水涂患处，睡前时用之。

第三章 婦 產 科

第一节 調 經

一、經 血 不 調

指迷丹

通化市 王 鍾 麟

主治：月經不調，心胃脹滿，腰腹疼痛。

处方：錦紋軍一斤 瓦楞子五兩 醋淬七次 肉桂五兩

用法：共為細末，陳醋打丸如綠豆大，朱砂為衣，每服四錢，
車前子四錢炒，水兩碗煎湯一碗，送丸藥。

定經湯

梨樹縣 張 錫 林

主治：月經無定期。

处方：兔絲子四錢 酒芍三錢 當歸三錢 五味一錢 山藥五錢
茯苓三錢 柴胡根五分 炒芥穗二錢 艾炭五分

用法：水煎，食前服。

禁忌：生冷辣物。

溫經止痛湯

磐石縣

主治：經痛小腹有寒，經血不調，小腹作痛，白帶下，心煩
腰酸，無熱痛者。

处方：川芎一錢五分 歸身五錢 甘草二錢 生芍一錢 明黨三錢

黃膠三錢 桂枝五錢 丹皮三錢 姜下三錢 寸冬三錢
黑姜三錢 吳萸三錢 生艾叶三錢

用法：水煎服。

調經止痛湯

磐石縣

主治：月經不調，經前腹痛，黑色量少腰腿疼，乳房脹疼。

处方：歸尾三錢 赤芍二錢 乳香二錢 沒藥二錢 靈脂一錢五分
生卜黃一錢五分 香附三錢 元胡三錢

用法：水煎服。

治經血不來腹痛方

延吉縣 沈龍治

处方：當歸一錢五分 川芎一錢五分 生地黄一錢五分 桃仁一錢五分
紅花一錢五分 元胡索一錢五分 蓬朮一錢五分 青皮一錢五分

用法：水煎服，一日二次。

治經前腹痛方

延吉縣 沈龍治

处方：熟地黃二錢 當歸二錢 川芎二錢 赤芍藥二錢 元胡
索一錢五分 苦楝皮一錢五分 香附子一錢五分 桃仁一錢
紅花一錢 黃連一錢

用法：水煎服，日三次（三日間）。

治經期將行，少腹脹痛方

樺甸縣

处方：當歸四錢 川芎三錢 赤芍三錢 蒼朮三錢 苡米四錢
木香二錢 烏藥三錢 靈脂二錢 元胡二錢 蒲黃三錢
香附三錢

用法：水煎，食前三十分鐘服下。

禁忌：生冷。

治經后腹痛方

構甸縣

处方：当归四錢 川芎三錢 酒芍四錢 炙草三錢 党參四錢
桂心二錢 台烏三錢 貢膠二錢 寸冬三錢 丹皮三錢
半夏三錢

用法：水煎食前30分服用。

禁忌：生冷之物。

治妇女經血不調，血寒受冷，腰腹疼痛，久不受孕方

長白縣 丁明閣

处方：香附三錢 元胡二錢 灵脂二錢 沒藥二錢 当归三錢
川芎二錢 肉桂三錢 西花一錢五分 桃仁二錢 炮姜八分
酒芍三錢 炙草二錢 广砂二錢

用法：共为細面，炼蜜为小丸，

每日早晚吃二錢，开白水送下。

清热通經丸

农安县 張殿卿

主治：治妇女經血不动，或經行腹痛，血色黑紫有块。

处方：酒軍四錢 怀夕二錢 山查二錢 黃芩二錢 泽兰二錢
桃仁二錢 紅花二錢 玉金二錢 香附三錢 元胡二錢
甘草一錢五分 文术二錢 三稜二錢 灵脂二錢 沒藥二錢
土虫二錢 斑蝥一錢去翅。

用法：共为細末，蜜丸一錢重，每服一丸。

二、年老經断复来 (子宮癌)

治子宮肿瘤硬痛方

东丰县 孙嘉賓

处方：香附三錢 元胡三錢 茴香二錢 姜黃二錢 文朮一錢五分

三棱一錢五分 枳壳二錢 双花五錢 連召三錢 玉金二錢
紅花二錢 甘草二錢

用法：水煎服。

治倒开花方

王 本 謙

处方：阿胶珠一两 全当归一两 西紅花八錢 冬瓜子五錢

用法：水煎服。

注：应按体质情况，酌情用量。

治老年妇人經血漏崩方

敦化县 馬 贊 一

处方：蜜黃芪六錢 人參一錢五分 云苓三錢 酒芍三錢 炙
仁四錢 远志三錢 側柏叶四錢 地榆四錢 丹參三錢
棕炭三錢 煅牡蠣三錢 龙骨三錢 山藥三錢 金櫻四錢
元肉引，另研海螵三錢 京墨二錢分三包随湯药服之。

加減法：头疼加炒芥穗，白芷。腰疼加川断，杜仲。老年人
气虛，人參，黃芪倍用。发烧加龟板，鳖甲。腹疼
加沉香，元胡。

用法：水煎早晚空心服之。

禁忌：生冷辣物。

治子宮炎及附件炎方

前郭旗 溫 俊 清

处方：金銀花四錢 連召四錢 生鹿角五錢 沒药三錢 乳香三錢
赤木二錢 紅花三錢 桃仁二錢 坤草五錢 公英四錢
黃芩三錢 甘草三錢

用法：水煎服。

三、崩漏帶下

治經血不止方

四平市 石 万 喜

处方：川玉金一两五錢 生地炭二兩 酒芍五錢 大麥冬五錢
藕节炭一两 京墨三兩

用法：共为細末，每服三錢，元酒送下。

治血崩方

于 远 航

处方：棕炭三錢 灵脂三錢 汗三七三錢 千里崩(驢蹄子)三錢

用法：共为細末，醋糊为丸，每服三錢，元酒送下。

治血崩方

安图县 吳 文 通

处方：人參一两 黄耆一两 白朮一两 三七根五錢

用法：共为細面，每服二錢，一日三次。

治血崩效方

农安县 楊 雅 軒

处方：西归三錢 香附三錢 香墨二兩 伏龙肝一两 血余炭一两

用法：共为細末，蜜丸三錢，每次一丸，綠豆角皮熬水冲服。

治血崩方

公主岭 李 子 复

处方：当归四錢 白芍三錢 茯神四錢 川断四錢 杜仲四錢

党参五錢 黄芩五錢 柴胡八分 升麻五分 生地四錢

广皮三錢 木瓜三錢 于朮三錢

用法：水煎服。

治血崩方

磐石县 于 仿 浦

处方：汉三七三錢 老山参三錢 大生地不拘多少。

用法：将三七、人参研細面，装生地內，外用綫纏住，以火烧成炭研末，元酒冲服。

治血崩方

长春市 赵 庆 民

处方：海螵蛸一两 百草霜五錢

用法：共为細面，每服二錢，姜水送下。

治血崩方

农安县 李 尚 泽

处方：陈棕树炭一两 百草双一两

用法：共为細面，每服一錢，陈醋送下。

治崩漏方

长岭县 楊 占 山

处方：柏叶炭一两 醋制 棕櫚炭一两 醋制

用法：水煎服。

治血崩方

周 唯 一

处方：当归四錢	川芎三錢	白芍四錢	生地四錢	貫朮四錢
远志四錢	柏炭三錢	元芩三錢	地榆三錢	貫胶一錢
艾炭三錢	元茂三錢	小蘗三錢		

用法：血余一团为引，水煎服。

治血崩方(子宮出血)

李 国 瑞

处方：人參三錢 地榆炭一两醋炙三次 蓮子心三錢

用法：童便引，水煎服。

治血崩方

長春中醫學院 姚學善

處方：生芪一兩 當歸一兩 生地二錢 艾炭三錢 芥炭三錢
甘草二錢

用法：水煎服，日服二次，連服四付即止。

治血崩方

李長山

處方：蓮房炭一兩 烏梅肉炭三錢 芫薊子三錢

用法：共為細面，每服三錢，日服三次。

加汗三七一錢更效。

治血崩方

張澤民

處方：銀耳（即木耳）二兩 漢三七一兩

用法：共為細末，每服一錢，日二次早晚用。

治血崩方

郭濟川

處方：蒼朮四錢 白朮三錢 防風二錢 茯苓三錢 白芍二錢
泄瀉加益智、半夏、生姜、大棗。

用法：水煎服。

治血崩方

李卿貴

處方：全歸一兩 川芎五錢 朱砂一錢五分 漢三七一錢五分

用法：將歸芎煎好，朱砂三七研末，隨藥三次服用。

治血漏方

長春中醫學院 姜桂枝

處方：蓮房炭五錢 米壳二錢

用法：水煎服。

治月經日久淋漓不斷方

榆樹縣 王 鳳 山

處方：側柏叶三錢 生白芍三錢 貢膠珠三錢

用法：水煎服，三付即愈。

治婦女腰腹痛、流血不止、頭暈方

長白縣 丁 明 閣

處方：當歸三錢 川芎二錢 酒芍三錢 蓮房炭三錢 黑蒲黃二錢
三七一錢（研細另包沖服） 生芪五錢 生草二錢 焦山

梔一錢五分

用法：引用燈心水煎服。

芍藥飲

通化市 陳 修 源

主治：止血崩。

處方：白芍一兩 胆草一兩 棕炭一兩 元肉五錢 人參三錢
甘草一兩

用法：水煎服，忌辣物。

治經漏及產期血迷神昏方

農安縣 王 文 會

處方：蓮房六錢 棕炭三錢 香附炭三錢 芥穗炭三錢

用法：共為細面，每服三錢，元酒送下。

治子宮炎流血方

四平市 劉 玉

處方：龜板二錢 鱉甲二錢

用法：共為面，元酒送下。

補經止血湯

德惠縣 王 庚 林

主治：虛証血崩，大失血者。

处方：煨龙骨五錢 煨牡蠣五錢 阿膠三錢 茜草三錢 海蛸三錢
 遠志三錢 茯神三錢 棗仁四錢 生芪五錢 白朮五錢
 生地四錢 酒芍四錢 棕炭五錢 黑梔四錢

用法：水煎服。

固經湯

輝南县 張 印 澤

主治：崩漏下血不止。

处方：炙龜板一兩 酒芍四錢 炒椿皮七錢五分 炒元柏七錢五分
 炒元芩七錢五分（除龜板用醋炙外，其餘均用酒制）。

用法：水煎服。

忌服：辛辣。

治婦女大失血方（血脫氣陷）

扶余縣 劉 振 聲

处方：人參一兩 大棗一兩

用法：水煎服。

治子宮出血方（虛性者）

輝南县 高 光 瑞

处方：生芪五錢 白朮四錢 萸肉五錢 煨龍骨八錢 煨牡蠣八錢
 茜草三錢 棕炭四錢 杭芍三錢 海蛸五錢

用法：水煎服，重者四、五劑，輕者三、四劑即癒。

治日久經漏方

農安縣 呂 仁 生

处方：當歸三錢 川芎三錢 酒芍二錢 熟地三錢 粉丹五錢
 云苓三錢 陳皮三錢 香附三錢 吳萸一錢 元胡三錢
 桃仁三錢 生草二錢

用法：水煎服，熱甚加黃芩三錢

禁忌：勿用銅鐵器熬。

三七散

主治：血崩日久不止。

处方：三七三錢 豆砂一錢五分

用法：共為細面，均三次童便引。

海宝回潮散

東丰县 張景良

主治：血崩危急者，兼治吐衄一切血症。

处方：煨龍骨一兩 煨牡蠣一兩

用法：共為細面，每服五錢。

療效：脈象虛弱自汗出，神智不清者有效。

治血崩日久不止方

洮安縣 解超英

处方：荆芥炭二錢 山查炭二錢 蒲黃炭二錢 生地炭二錢
地榆炭三錢 西歸片二錢 雞冠花三錢 益母草三錢
炙香附一錢五分 桃仁粉一錢五分 炙元芪三錢 炙甘草二錢

用法：水煎服。

治經血淋漓不斷，其色紫，腹脹痛方

源景新

处方：蓮房七錢 雞冠花三錢 凌霄花二錢 三七七分 元胡一錢五分
生白芍三錢五分 青皮一錢五分 甘草一錢五分

用法：水三碗，煎八分服。

止血散

東丰县 徐作周

主治：吐衄崩漏。

处方：蓮房炭一兩 烏梅炭六錢 漢三七三錢

用法：共為細面，陳醋為丸，每次一錢，白水送服。

治血暈、顏面蒼白、發燒口渴、脈洪大有力者

長春中醫學院 任繼學

處方：生芪一兩 西歸一兩 生地炭八錢 大黃二錢 丹皮二錢
貫仲炭一兩 黑芥穗三錢 炒芝麻二兩

用法：水煎服。

驗例：張振鐸愛人，產後四天，失血過多，顏面蒼白，氣短，心跳，煩躁不安，心內發熱，口渴，脈洪數有力，服此藥而愈。

治經血大下不止，眩暈虛脫方

曹國瑛

處方：貫仲炭三錢 漢三七炭三錢 朱砂一錢

用法：共為細面，均三次服用。

化帶丸

—梅河口 張永富

主治：婦女白帶。

處方：黃芪一兩五錢 焦朮三兩 防風五錢

用法：共為細面，蜜丸三十丸。每服一丸，白開水送下。

治赤白帶下方

白城市 邢廣忠

處方：白朮一錢 白斂一錢

用法：共為細末，一次服；白帶用白糖引，赤帶用紅糖引。

治婦人白帶，少腹作滿疼痛，食欲不振，有時惡心方

吉林師大 周蘭澤

處方：烏賊骨八錢 姜虫五錢 煅龍骨四錢 鹽黃柏三錢 清
夏三錢 桂心五分 乾姜二錢 滑石三錢 石華三錢 伏
龍肝三錢 赭石三錢 牛角尖炭三錢

用法：水煎服。

驗例：徐××女，35岁，患此症腰酸，腿疼，白带甚多，腹部膨胀脉搏沉而有力，服药七剂痊愈。

四、經 閉

治癆症膨胀方

农安县 董 志 清

处方：胡桃二十个，用黄泥包好烧干去皮 大枣二十个去核 当归五钱 茯神二钱 甘草三钱 白公鸡一个去下水。

用法：用布口袋将药装好，装鸡肚内，用沙锅煮熟。吃肉，骨头焙干研碎、用元酒冲服。

治少女干血癆方

敦化县 王 賢 义

处方：当归八钱 西花八钱 炮姜六钱 乾姜四钱 甘草六钱 白馬粪二钱（烧灰）

用法：共为细末，蜜丸均十八丸，每晚服一丸，按时白水冲服，吃十八天即愈。

治妇女干血癆方

桦甸县

处方：坤草二两 古同钱七个 红花三钱 公鸡血一个（三年鸡） 丹皮三钱 赤木三钱 家核桃七钱五分 川芎三钱 三棱三钱 文朮三钱 鳖甲三钱

用法：元酒为引，水煎服之。

治干血癆方

长春 韓遇昌 赵光汉

主治：干血癆骨瘦如柴，身上生黑鳞，病势危篤。

处方：西藏花六钱 生姜四钱 红糖四两 大枣四两

用法：用洋铁桶盛半桶多水，熬开了，下西藏花，熬至三十

分鐘，撈去紅花，搗姜汁，大棗去核，用紅花水熬，熬至大棗有糊香味。頻頻飲之，汗出為止。

禁忌：服藥后不可仰臥睡覺，睡則危險。服藥后應避風，半月內不許服他藥。

治干血癆方

處方：木耳二兩焙成黑黃色 紅糖一兩五錢 胡桃仁十個去皮炒黑黃色

用法：木耳、核桃仁為細面，以紅糖水溶液和之，七日吃光。

治干血癆方

懷德縣 顧治平

處方：錦紋軍四兩 斑蝥一百個 血竭一兩 朱砂五錢

用法：共為細面，蜜丸三錢重。每服一丸黃酒為引，或白開水送下。

禁忌：硬生冷。

高氏女金丹

長春中醫學院 劉金峰

主治：婦女血寒氣滯之經閉及干血癆等症。

處方：當歸三兩 川芎一兩 赤芍八錢 木香八分 羌胡一兩五錢
丹皮二兩 青皮二兩 廣皮一兩 紅花一兩 枳殼一兩 香附三兩 文朮二兩 三棱一兩 桃仁一兩五錢

用法：共為細面，蜜丸二錢重，每次一丸，早晚服之。

驗例：葛××女，年三十歲，經閉十個月余，體格消瘦，食欲減退，腹有塊作痛，經服此藥而愈。

治干血癆方

雙陽縣 潘維新

處方：川軍一兩 蕎麥面一兩

用法：將川軍研細面，用蕎麥糊為丸，如黃豆大，元酒送下。

每服七粒，重者不过三付。

注：此方药性寒凉每次不可过量服之。

治妇人白带下方

延吉市 金 三 柯

处方：当归五钱 川芎二钱 熟地二钱 白芍二钱 防风一钱
官桂一钱 阿胶珠一钱 白朮一钱 吴萸一钱 红花五分
甘草五分

用法：水煎日二次，食前服。

治妇女赤白带下方

德惠县 王 庆 林

处方：白果七个 硫黄末五分

用法：白果用铁片炒，硫黄末撒上烟尽为度。研细末，水冲服。

治赤白带下方

刘 墨 軒

处方：漏芦二钱 地丁四钱 公英五钱 连召五钱 银花三钱
当归三钱 白芷二钱 管仲二钱 知母二钱

用法：水煎服。

治白带方

临江县 李 宝 芬

处方：茯苓炒二钱 白芷炒二钱 海蛸二钱

用法：共为细末，元酒冲服，每服三钱。

五、不 孕 症

治妇女久不受孕方

处方：当归三钱 钩藤三钱 薄荷二钱 透骨草三钱 山虎三钱

紅花四錢 蜂房三錢

用法：元酒、水各一半煎服。在月經行時服此藥，經停藥止。

注：曾生育過者有效

治婦人久不生育方

龐 逸 仙

處方：當歸一兩 艾絨三錢 石英三錢

用法：共為細面，頓服三錢。

加減少腹散

乾安縣 趙 逸 卿

主治：經血不調，久不受孕者。

處方：香附五錢 羌胡三錢 吳萸三錢 靈脂三錢 蒲黃三錢
附子三錢 貢桂三錢 炮姜三錢 貢朮三錢 炙草三錢
當歸三錢 川芎三錢 赤芍三錢 沒藥三錢 南茴四錢
赤木三錢

用法：共為細面，醋面糊小丸，每服三錢。

八寶種子丹

延吉市 磊 桂 芳

主治：婦女久不受孕。

處方：細辛一錢五分 廣木香二錢 川烏二錢 炙薏仁一錢 枳殼
一錢 甘草一錢 川軍五錢 海男子五錢

用法：共為細末，蜜丸分八丸，經期過後，男女各吃四丸，
每晚用紫朴煎湯送下一丸，四日吃完。

注：海男子（海參大而有刺者名海男子）有“補腎經，益精髓”“降火
滋腎、通腸潤燥”之功。

治不受孕方

張 顏 秋

處方：赤木三錢 枳實三錢 坤草三錢 樹棕三錢 榔片三錢

官桂三錢 紅花三錢

用法：自己頭頂心發七根，黑豆七個，紅糖元酒為引，水煎服。

種子丹

主治：不受孕。

卡倫 王雨 潤

處方：野紋軍一錢八分 上沉香一錢八分 廣木香一錢八分 川烏一錢八分 枳殼一錢八分 上薏仁一錢八分 甘草一錢八分

用法：共為細面，蜜為丸，共均八丸，男女各服四丸。引用厚朴煎湯送服。男女每月各服一丸

治月經正常不孕者

樺甸縣

處方：川斷二錢 沙參二錢 杜仲二錢 歸身二錢 坤草二錢 川芎一錢 砂仁一錢五分 香附二錢 桔紅一錢 紅花一錢二分

用法：水煎服，每逢月經來時服，每月吃一付。

禁忌：經斷勿服，生冷、腥、辣物忌服。

第二節 胎 產

一、胎前諸症

治妊娠腹脹方

樺甸縣

處方：青木香一錢 白芍五錢 香附三錢 蘇梗一錢

用法：共為細末，酒調服。

子懸解郁湯

安縣 姜 宴 堂

主治：子懸。

处方：人参二錢 焦朮三錢 薄荷一錢五分 茯苓三錢 酒芍一兩
酒归一兩 枳壳一錢 广砂三錢 焦梔三錢

用法：水煎服。

治墜胎下血不止方

神 甸 县

处方：当归一两焙 大葱白一把

用法：酒煎温服。

治先兆流产方

敦化县 孙 修 章

处方：当归二錢 白芍二錢 川芎二錢 熟地三錢 柏叶炭三錢
杜仲炭三錢 兔絲子四錢 貢朮三錢 貢朮三錢 地榆
炭三錢 川断三錢 寄生三錢

用法：水煎服。

治子肿方

敦 知 白

处方：生姜皮一錢 炒谷芽四錢 肉桂四分 云苓二錢 怀山药四錢

用法：水煎服。

治妊娠胎气下墜方（妊娠下垂症）

延吉市 金 得 鉉

处方：升麻八錢 西归六錢 川芎四錢 甘草二錢

用法：水煎服。

清热安胎飲

高 恩 清

主治：胎前百病，保母子安全。

处方：西归四錢 杭芍五錢 京母三錢 甘草二錢

用法：水煎服。受孕三——七个月应服。

治孕婦郁熱日久，咳嗽日夜不止方

長白縣 吳 長 德

處方：當歸三錢 川芎二錢 杜仲三錢 黃芩三錢 貢白朮三錢
麥冬三錢 兔絲子三錢 川貝二錢 桑皮三錢 艾炭二錢
生芪三錢 陳皮二錢 生草二錢 炒芥穗二錢

用法：水四碗煎取八分碗溫服。

禁忌：三日忌食生冷物及魚。

治孕婦腹痛方

長白縣 吳 長 德

處方：當歸三錢 川芎一錢 杜仲三錢 黃芩三錢 貢白朮三錢
兔絲子三錢 艾炭二錢 炒芥穗二錢 萊菔子三錢 白
蔻二錢 枳殼二錢 生黃芪三錢 藿香二錢 腹皮二錢
桔紅三錢 生草一錢

用法：水煎服。

治胎前大便秘結方

高 玉 峰

處方：當歸三錢 川芎二錢 元參三錢 生地三錢 寸冬三錢
甘草二錢

用法：水煎服。

二、无乳、乳房痛疽

治乳汁不行方

四平市 李 庆 云

處方：核桃十個去皮取仁搗亂 穿山甲一錢

用法：共合一处，搗成細末，黃酒送服。

治产后无乳方

石王氏

处方：紅花四錢 白糖四錢 白酒一斤不見銅鉄

用法：用酒將藥熬好，每服一盅，*产后二十天可用。

治无乳方

紀王氏

处方：豆腐漿子一碗 葦油少許 白糖少許

用法：放一起喝，連喝七日。

治无乳方

通榆縣 王 玉

处方：冬虫草一錢 鷄子七个 七厘散二分

用法：水煎一次服下。

治乳癌肿硬

东丰县 孙 嘉 宸

处方：双花三錢 白芷二錢 連召三錢 漏蘆二錢 沒藥三錢
玉金二錢 香附三錢 枳壳二錢 当归五錢 大貝三錢
文朮一錢五分 青皮二錢

用法：元酒为引水煎服。每日二次食后服。

乳癌散

罗 第 章

主治：乳癌

处方：夏枯草一两 萆仁一两五錢 茜草根一两五錢 生草一两五錢
陈皮一两五錢 两头尖一两五錢 川貝一两五錢 連召一两五錢
桔叶一两五錢 白芷一两五錢 菊花一两五錢 乳香一两五錢
沒藥一两五錢 紫地丁一两五錢 双花二两

用法：共为細面，蜜为丸三錢重，每服一丸，早晚空心服。

治乳癌方

通化县 陈修源

处方：地龙二钱 蜂房二钱 蜈蚣二钱 全虫二钱 甲珠二钱
边桂二钱 乳香二钱 没药二钱 甘草二钱

用法：水煎服，无酒引，取汗。

禁忌：辛辣。

治乳癌方

农安县 李尚泽

处方：生鳖壳数十枚

用法：放砂锅内烧焦为面，每日吃二钱，黄酒送下，须天天服不间断。

双花木鳖汤

农安县 盖永安、华云贵

主治：乳腺硬性结核（乳癌）。

处方：双花一两 甲珠三钱 姜蚕三钱 木别三个 大枫子三个

用法：木鳖子，大枫子均须整个用，用烧酒一斤，均二次用炭火煎之顿服。

治乳癌方（膏药方）

王静山

处方：好密陀僧四两 好香油四两

用法：将药放在砂锅内，炭火熬之，用桑枝搅（无桑枝，筷子亦可），熬至滴水成珠为度。

将膏药暖后贴患处。若核已破，则将瘡口露出，药贴周围，便于向外流水。

治乳结核方

怀德县 黄桂芳

处方：角霜五钱

用法：为細面，白水送下。

治吹乳方

大安县 梁 思 信

处方：白芷三錢五分

用法：为細面，黄酒冲服后出汗。如不好，可再服一付。

治乳腺炎方

双阳县 高 静 軒

处方：鹿角霜二兩

用法：水煎服，取汗。

治乳腺結核，或因外压肿胀疼痛方

长春中医学院 程 万 生

处方：生香附

用法：为极細面，每服二錢，元酒送服，取汗，再服不必出汗。

治乳癌方

处方：胖大海

用法：为細面，每服三錢，一日三次，开水送下，外用香油調涂之。

治乳痛初起方（已潰者无效）

农安县 官 海 廷

处方：坤草二錢

用法：为极細末，用醋調敷，干則換之，二、三次即消。

治乳疹生疮

赵 金 林

处方：鹿角五兩 紅枣四斤 山核桃三十个 牛牙二十个

用法：共为末，每服五錢，元酒送下。

黑神散

长春市 刘品方

主治：乳瘡。

处方：黑牛牙三錢 明矾二錢 茶叶三錢 古月七粒 白糖三錢

用法：共为細末，鷄子清調勻，黃酒冲服，发汗即愈。

三、产后下血过多

治产后出血过多，腰、骨盆痛方（貧血性）

桦甸县

处方：熟地五錢 云苓三錢 山藥三錢 山萸二錢 丹皮二錢
泽夕二錢五分 肉桂二錢 川附子二錢 川断二錢 杜仲二錢

用法：水煎服。

忌服：生冷物品。

治小产下血淋漓不断方

德惠县 张道芳

处方：当归三錢 川芎二錢 杭芍三錢 熟地四錢 艾叶三錢
防风二錢 貢胶三錢 柏仁二錢 地榆三錢 川断二錢
炙草三錢

用法：水煎服，每日二至三次。

治产后失血过多，虚脱，气少，面色蒼白，神昏不
醒症

长岭县 中心医院

处方：赤参二两 元肉一两 大枣十个

用法：水煎服，日二次。

治产后大出血方

农安县 曹玉衡

处方：赤参五錢 黃芪(生)一两 炙芪一两 生地炭五錢 熟地炭五錢

芥穗炭三錢 黑姜炭二錢 黑蒲黃三錢 艾炭三錢 當歸一兩
炙棗仁五錢 棕炭三錢 百草霜三錢

用法：水煎服。

治产前产后失血方

农安县 邵 凤 林

处方：黃芪三錢 焦朮二錢 廣皮三錢 升麻一錢 柴胡二錢
人參三錢 西歸三錢 艾炭三錢 棕炭三錢 黑蒲三錢
芥炭三錢 貢膠三錢 龍骨二錢 牡蠣二錢炙

用法：水煎服。

四、产 后 血 暈

治产后血迷方

刘 志 文

处方：山羊血約兩酒杯

用法：引用黃酒冲服。

治习惯性产后昏暈方

梨樹县 王 保 貴

处方：汉三七七錢

用法：研細面，黃酒或白水送下。

注：此方汉三七用量过重，一般用量五分至一錢五分，但气虛无痰者禁用。

治产后血昏或吐瀉方

梅 甸 县

处方：芥穗末三錢

用法：童便調服。

治产后血暈，人事不省方

双阳县 孙 秀 峰

处方：鹿角一支

用法：将鹿角烧存性为細末，每服二錢。

五、产后腹痛

治产后腹痛方

王 东 林

处方：当归七錢 川芎一錢四分 生芍二錢一分 灵脂二錢一分
蒲黄一錢 川棟一錢四分 荔枝二錢一分 豬苓二錢一分
茯苓二錢一分 肉桂七分 木通七分 元胡一錢

用法：共为細面，蜜小丸，每服三錢，开白水下(虛者忌用)。

治产后小腹疼痛方

德惠县 张 道 芳

处方：香附米一錢五分 五灵脂二錢 小茴香三錢

用法：元酒冲服，每日二次。

注：气滞有瘀者宜之。

治产后腹痛方

农安县 张 鸿 祥

处方：琥珀一錢 朱砂一錢 炙馬前五分 糖灵脂二兩 蒲黄(炒)二兩

用法：共为細面，每服二錢。

六、产 后 风

治产后不語方

樟 甸 县

处方：人參三錢 石菖蒲三錢 石連肉二錢

用法：水煎溫服。

治产后风方

樟 甸 县

处方：酒当归八錢 川芎三錢 赤芍二錢 紅花二錢 桃仁三錢
麻黃三錢 甘草五分 泽兰三錢 姜炭五分 芥穗三錢
用法：老酒童便为引，煎服，出汗即好。

黃芪桃仁湯

农安县 楊 遇 春

主治：产后抽瘋二目天吊，口角流涎，項背反張，昏不省人事。

处方：生黃芪八兩 桃仁三錢 紅花三錢

用法：水煎服。

治产后中风方

梨樹縣 王 保 仁

处方：芥穗三錢。

用法：去梗炒焦，以黃酒六兩煎服，如不能飲酒者，以酒水各半，煎至十分鐘溫服。

治产后风方

榆樹縣 王 鳳 山

处方：苧麻根炭三錢 茶葉三錢 葛根三錢 血余炭三錢 白糖二兩
核桃三個搗 烏木筷子一支搗

用法：水煎服，服時出汗。

七、产后杂病

治产后小腹胀大，其硬如石效方

东丰县 盧 貴 德

处方：石葦三錢 苳麥三錢 木通三錢 車前三錢 糯蓄三錢
川軍三錢 滑石一兩 梔子三錢 元柏三錢 川芎三錢
甘草三錢

用法：水煎服。

驗例：本县城关区，刘文治儿媳于1948年产后患病，其腹肿大服药两剂愈。金×珍，产后腹大如三盆，其硬如石，四剂而愈。

治产后四肢浮肿效方

德惠县 张道芳

处方：血竭一钱五分 红花五分

用法：水煎服，元酒送下。

治产后头疼不止效方

张道芳

处方：芳香、菊花各等分

用法：元酒煎服，每日两次。

治产后肿症方

王德发

处方：云茯苓三钱 榔片二钱 猪苓三钱 泽夕二钱 广砂三钱
广木香八分 陈皮三钱 木瓜三钱 腹皮三钱 双皮二钱
西当归三钱 枳壳二钱 防己三钱 生草一钱

用法：水煎服。

驗例：朱××35岁，产后面部、身部全肿，四肢微肿，服药两剂痊愈。

禁忌：身体虚弱者慎用。

治产后怔忡惊悸心跳不宁方

楊德臣

处方：当归三钱 川芎三钱 茯神三钱 枣仁二钱 白朮三钱
远志三钱 柏仁三钱 人參二钱 黄芪三钱 麦冬二钱
花粉一钱

用法：水煎服。

**治产后七、八日感冒、头痛、全身疼、发冷、恶寒、
内热口渴方**

东丰县 张 旭 东

处方：当归八钱 川芎二钱 桃仁二钱 姜炭八分 川羌二钱
防风二钱 芥炭二钱 桂心一钱 大活二钱 炙草一钱
寄生二钱

用法：外用茱白七根，元酒、童便各半碗，水煎饭后服，一日二次。

二妙散

辽源县 赵 庆 民

主治：产后腰腹疼，气短，周身无力，食欲不振。

处方：糖灵脂二钱 粉甘草二钱

用法：共为细面，每服一钱，日服三次，元酒或童便冲服。

验例：1959年东丰县，兴安社，王××年35岁，患此病经用此方而愈。

三仁润肠汤

双阳县 孙 秀 峰

主治：产后大便难。

处方：当归二钱 寸云一两五钱 柏仁二钱 桃仁二钱 麻仁二钱

用法：水煎服。

八、妇 科 杂 病

治妇女虚羸咳嗽腹有积块方

农 安 县

处方：台参四钱 焦朮三钱 玄参三钱 文朮一钱五分 三稜一钱五分
生芪四钱 京母二钱 内金三钱 生水蛭二钱

用法：水煎服。

治子宮炎及附件炎方

前郭尔罗斯蒙古族自治县 温俊清

处方：銀花四錢 連翹四錢 鹿角五錢 沒藥二錢 乳香三錢
赤木二錢 紅花三錢 桃仁二錢 坤草五錢 公英四錢
元芩三錢 甘草三錢

驗例：对子宮及輸卵管、卵巢發炎肿胀疼痛，或者在外部也可能触到肿块者，經服此药后，能消肿痛而愈。約治愈20余名，但有肿瘤及癌肿者无效。

治血瘀气滯，心腹胀痛，二便不通方

农安县 李連荣

处方：水蛭五錢石灰炒 川軍二兩 黑丑二兩

用法：共为細末，每服三錢，元酒为引。

禁忌：孕妇忌服。

注：此方药性泻下力猛，体虛气弱者酌情应用。

逐瘀斬鬼丹

敦化县 馬貴一

主治：妇女太肚子病（怪胎）。

处方：西归尾四錢 赤芍三錢 川芎三錢 元胡三錢 紅花二錢
桃仁三錢 香附三錢 焦榔四錢 大毛二錢 二丑六錢
雷丸三錢 赤木三錢 广木香一錢五分 三稜三錢 文
朮三錢 沒藥三錢

用法：水煎服，早晚空心服。

禁忌：生冷。

驗例：經余治患此病妇人，年多在40岁以上，也有50岁以上者，在数年之中，經過治愈者七例，有下肉蛋者，下粉白球者居多，西医所謂連珠形的葡萄胎。

治阴挺方

白城市 謝 國 祥

处方：生牡蠣三錢 生龙骨三錢 甘松三錢 柏子仁三錢 生地一兩

用法：用鉄銹熬水，煎服。

治阴挺方

前郭旗 高 恩 清

处方：党参一錢 炙芪八錢 干朮四錢 炙草三錢 陈皮三錢
升麻三錢 柴胡三錢 归身四錢 蓮肉五錢 扁豆五錢

用法：姜枣引，水煎服。

治子宮下垂方

农安县 李 汉 章

处方：枳壳一兩 陈皮一兩 醋五兩

用法：共粗末；用醋炒薰患处。

治阴茄方

长岭县 刘 恩 远

处方：蜜炙嫩黄芪一兩 蜜炙升麻三錢 貢朮三錢 陈皮二錢
柴胡三錢 赤参三錢 归身三錢 炙草一錢

用法：水煎服，一日一次。

治阴茄方

桦甸县

处方：党参五錢 生芪一兩 貢朮五錢 升麻二錢 陈皮三錢
柴胡二錢 萸肉一兩 兔絲五錢 当归三錢

用法：水煎服。

治阴茄方

德惠县 王 庆 林

处方：元芪五錢 白朮五錢 陈皮三錢 升麻一錢五分 柴胡四錢
人參四錢 当归四錢 阿膠三錢 五味三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

治妇女阴脱下坠（俗名气葫蘆），茄症，小便时痛悶方

处方：生黄芪五錢 明党参三錢 茅蒼朮三錢 广陈皮三錢 升麻二錢 全当归三錢 生芍药五錢 五味子二錢 桔核三錢 寸冬四錢 柴胡三錢 生甘草二錢 杞果三錢 桑椹三錢 鹿胶二錢

用法：姜三片，大枣三枚入药同煎，早晚空心服之。

驗例：朱王氏，56岁，患此症六、七个月，服此方五剂全愈。

双阳县东长岭子乡侯家屯，白永峰内人43岁，患此症二年有余，其症型与小茄包相同，初则不疼，就是感觉发悶，以后較痛，小便不通快，服此方十五、六剂而愈。

治阴道滴虫症方

长春中医学院 刘金峰

处方：百部三錢 苦参三錢 蛇床三錢 黃連一錢 明矾三錢 远志一錢 生艾一錢

用法：用开水泡浸，趁热气先薰，待至温凉时洗阴道，一日早晚两次。

驗例：曾治佟××，經鏡檢确诊阴道滴虫症，用此方治之，收到良效。又治一般带症增多者，用之症状減輕，亦有效果。

治阴戶癢痒、燒疼方

隋相臣

处方：地骨皮三錢 蛇床子三錢 川椒三錢 当归五錢 赤小豆搗五錢

用法：水煎洗之。

治阴部内作痒方

张 泽 民

处方：蛇床子二两

用法：加水三碗，煎三、四沸，将药与水放在小口的罐内，令患者骑在罐上薰之，温时洗之。

银杏散

馬 志 超

主治：女人阴户作痒，内外生瘡。

处方：水銀 輕粉 杏仁 雄黃各等分

用法：共为細面，枣肉为丸，在外者干搽，在内者納入阴戶中一丸。一日一換。孕妇禁用。

治阴戶刺痒方

东丰县 张 子 新

处方：麻黃一两 川連一两 床子五錢 艾叶一两 烏枚十个
防风一两 大戟五錢

用法：水煎薰洗。

治阴戶生虫刺痒效方

东丰县 张 子 新

处方：猪肝或羊肝

用法：切开，以开水冲，打成卷，入阴戶内，有虫則叮到肝上，次日取出另換之。

治阴戶生虫刺痒方

东丰县 张 子 新

处方：酒軍五錢 当归一两 元荅五錢 炙芪一两 赤芍三錢
大朮四錢 元參五錢 丹皮五錢 山萸三錢 床子五錢
节菖蒲五錢 吳萸三錢

用法：引用葱白五寸，水煎服。

禁忌：生冷发物。

第四章 兒 科

一、急慢惊风类

治小儿抽风方

董志清

处方：豆双一分 朱砂三分 寒水石三分

用法：共为細面，乳汁送下，每服一分。

治抽风方

处方：白姜虫一个 淨全蝎一个 川連一分

用法：共为細面，白水送下，小儿每服十分之一。

治小儿急惊四肢抽搐，角弓反張方

通化市 王延峰

处方：大片砂一錢 大蜈蚣一条焙 清全蝎一个焙去肚

用法：共为細末，酒水送下，一周岁作五次用，二、三岁作三次用。

注：可根据小儿年齡酌情用量。

治小儿惊风方

前郭旗 高恩清

处方：蝎尾49个 去毒鉤用薄荷炒黃色。天虫49个 薄荷炒黃色。梅片一厘 台射四厘

用法：共为細面，每服三~五分。雄鷄肝煎水送下。

治小儿惊癇抽搐方

磐石县

处方：全蝎 地龙 甘草各等分

用法：共为細面，按儿大小强弱，酌情服之。

治小儿急惊慢惊方

通化县 陈修源

处方：全虫三錢 姜虫三錢 全退一錢 竺黄二錢 朱砂二錢
銀珠二錢火煅 豆豉五分

用法：共为細面，白水送下，每服二分。

注：銀珠辛温有毒，其性燥烈，过服能使人齱烂筋挛以当慎重用之。

治初生小儿抽风方

鎮賚县 修兴久

处方：姜虫五分 白芷三分 当归五分 甘草五分

用法：共为細面，用蜂蜜拌勻，外敷肚臍上。

二、小兒夜啼

治小儿肚腸风方（七圣散）

扶余县 刘济三

处方：川連一錢半 防风二錢 全虫三錢去尾 姜虫二錢 焦
朮三錢 条芩二錢 川貝二錢 甘草二錢

用法：共为細面，初生儿每次服三一四分，姜湯送服。

治小儿夜哭方

海龙县 张延龄

处方：蟬蛻七个 薄荷三分

用法：水煎服。

治小儿夜啼方

昌图县 孙桂芝

处方：五權子研面

用法：用水和在一起，填于臍窝中。

三、小兒咳嗽

治小兒咳嗽方

东辽县 徐 国 范

处方：姜蚕二錢 全虫二錢 全退二錢 冰片五分 朱砂一錢
貝母二錢 赤金十张

用法：共为細面，每服三分。

治小兒肺热、面紅、气喘方

鎮賚县 敖 显 廷

处方：朱砂五錢 沙参五錢 煅寒水石五錢 石羔三錢

用法：共为細末，一至三岁小兒每服二至三分，三至六岁每服四至五分，白糖水送下，每日二至三次。

治小兒火嗽疫黃方

權 甸 县

处方：炙双皮二錢 地骨皮一錢五 甘草一錢 川貝一錢五 寸
冬二錢 知母二錢 桔梗一錢 元芩一錢 薄荷一錢五分

用法：水煎服。

治小兒喘嗽方

德惠县 楊 逢 春

处方：川連 生地 木通 竹叶 甘草各等分

用法：水煎服，分三次用。

四、吐 瀉

治小兒嘔吐方

怀德县 郑 殿 丰

处方：寒水石 石膏 片砂 冰糖 各等分

用法：共为細末，每服三分，冷水送下。

治急性胃腸炎方

梨樹縣 周 玉 璽

处方：紅參一錢 吳萸二錢 生姜二錢 大棗三个

用法：水煎服。

治小兒暑濕作瀉方

鎮 賚 縣

处方：炒黃連三錢 廣木香二錢 炒吳萸二錢 酒芍三錢 炒肉
蔻三錢 烏梅三錢

用法：共为細面小兒一至二岁每服五分，三至四岁每服七分，五至十岁，每服一錢，白糖为引。

治小兒吐乳方

* 农安县 陈 国 良

处方：生甘草二兩 炙甘草二兩 砂仁七十粒 白蔻七十粒

用法：共为細面，按兒大小服藥，白水送下。

治小兒嘔吐方

荆 州 柱

处方：朱砂一錢 白蔻一錢 黃連一錢

用法：共为細面，一岁服一分，乳汁送下。

五、消化不良

鎮惊益脾散

吉林省卫生厅 关 保 才

主治：嬰兒一切消化不良，腹痛，夜間不眠，經常便瀉不止
(綠色便)。

处方：朱砂三錢 大赤金五張 老琥珀一錢 川芎二錢

用法：共为細末，每服五分。

山楂內消散

白城市医院 謝 国 群

主治：小儿諸虛百損、食积乳积。

处方：山楂二錢 神曲一錢 广皮五錢 麦芽五錢 枳实五錢
萊服五錢 砂仁三錢 內金三錢

用法：共为細面，每服三一五分。

治小儿食积，食火，腹胀，夜热，消化不良方

樺甸县

处方：麦芽一錢 查肉一錢五分 黑梔一錢 酒苓一錢 蒼朮一錢
甘草五分 姜下五分 寸冬一錢半 川朴一錢 連召一錢
車前一錢 云苓一錢五分

用法：水煎服，一盅均两次，間隔半小时。周岁及三岁小儿
用均可。

治小儿一切食积不消方

农安县 张 蔭 南

处方：水紅子一两 山楂一两 榔片五錢 內金五錢 核桃
仁一两

用法：共为細末，蜜丸一錢重，三一四岁小儿每服一丸，每日
三次，开白水送下。

治小儿食积痞积痞气

樺甸县

处方：水紅子 內金 神曲 麦芽 焦榔 各等分

用法：为末，每服一錢，白水送下。

治小儿惊哭惊叫，吐泻不止，肚子疼痛方

长岭县 郑 凤 鸣

处方：乳香一錢 沒药一錢 朱砂五分 血竭一錢

用法：共为細末，每服二、三分。

治小儿疳积方

长春中医学院 李 树 堂

处方：使君子仁二两 鷄內金二两 焦貢朮二两 大枣三两 胡桃肉三两 白糖五两 面粉八两

用法：将上列藥品为面，再将枣肉及胡桃肉搗为泥，与白面、白糖合在一起，加重曹少許蒸成羔服用。根据小儿年龄大小体质情况酌量食之。

六、胎毒及疳症

治小儿胎毒施水方

樺 甸 县

处方：黃連一錢 麻黃一錢 黃柏一錢 冰片二分

用法：共为細面，香油調上。

治小儿胎毒方

九台县 矯 鴻 珍

处方：肥猪肉片

用法：貼于患处。

治小儿疳症方

磐石县 靳 义 公

处方：龙骨三錢 象皮二錢 川連三錢 硃砂一錢 冰片五分

用法：共为極細面，每服二分。

治小儿疳疾效方

长春中医学院 程 万 生

处方：駱駝絨炭三錢 葛条炭三錢 眞銀珠三錢 河蛤粉四錢
枯矾二錢 硃砂三錢 冰片一錢 牛黃二分（严重着用）

用法：共为細面，三、五岁小孩每服五分，破烂者，可以外上或吹鼻。

治小儿疳症方

长春中医学院 张 輯 五

处方：珍珠一錢 煅石決明一兩 朱砂五錢 兒茶三錢 冰片五分

用法：共為細面，每服二分，日二次，早晚服，開水送下，如患腸炎瀉的嚴重者，須先治腹瀉後，再用此藥。

治牙疳、串皮疳效方

長春中醫學院 范 濤 生

处方：川椒三錢 枯礬三錢 細辛三錢 川連三錢 月石三錢
青黛三錢 兒茶三錢 冰片一錢五分 射香二分 東珍珠一錢

用法：共為細面，干上或調油上均可。如有內疳症狀，服之亦可。一一五歲小兒，每服一一二分。

驗例：治牙疳或小兒高熱病轉變，或麻疹所引起疳症，經過使用有效。

治走馬牙疳方

前郭爾羅斯蒙古族自治縣 姜 玉 山

处方：明雄三錢 梅片三錢 蘆薈五錢 胡連五錢 紋軍五錢
青黛三錢 台射一厘

用法：共為極細面，上于局部。

治疳症效方

農安縣 史 明 經

处方：珍珠一分 台射一厘 冰片三分 血力四分 沒藥三分
明雄四分 月石四分 輕粉三分 松香冬令四分 夏令三分
症狀嚴重者可加蟬酥二厘

用法：共為細面，成人每服一錢，小兒酌減。外用香油調敷。

治小儿疳症方

海 龙 县 张永富

处方：煅龙骨一錢 煅蛤粉一錢 煅珍珠五分、冰片五分

用法：共为細面，用热浆豆付敷其上。亦可內服。一至三月者每服一、二分，一至二岁者每服三、五分。

第五章 五官科

一、耳 病

治耳聋方

怀德县 馬 兴 武

处方：甘遂 甘草

用法：将甘遂塞在耳窝内，口内含甘草，将唾液吐出不要咽下。

治耳聋方

舒兰县 楊 宝 山

处方：陆路通四两

用法：煎水当茶水飲，每次服半碗有效。

治耳暴聋方

鎮 賚 县

处方：巴豆一个 斑毛三个 射香五厘 菖蒲七节 葱心三根

用法：共捣一处为丸如菰豆大，用紗布裹好塞耳内，男左女右，塞二小时即妥。

二、鼻 病

治鼻堵塞不通流鼻涕方

张 泽 民

处方：胆草三錢 山梔二錢 黄芩二錢 知母二錢 黃連一錢
生地三錢 柴胡一錢 辛荑二錢 蒼耳二錢 苦本二錢

泽夕二錢 白芷二錢

用法：水煎服。

驗例：經在臨床使用治癒很多，有一人患此病十余年治療未效，經服此方十五劑后，而痊癒。

加味蒼耳辛荑散

吉林市 常 春 林

主治：鼻淵，過敏性鼻竇炎、臭鼻症、鼻甲介肥大。

處方：蒼耳子五錢（流涕多者用）白芷一錢（頭痛可加至三錢）辛荑二兩 薄荷一錢（感冒熱時加至三錢）陸
陸通三錢 鵝不食草三錢 花粉一錢 甘草五分

用法：葱白茶湯為引，水煎服，將藥放在砂鍋內，上口用布封好以免蒸發藥味，煎好時先薰後服，剩下藥滓辛荑花可塞鼻內。

治鼻衄血方（高血壓性）

張 榮 久

處方：鮮荷葉七錢 降香一錢五分 藕節三錢五分 茅根三錢五分
大黃二錢 蘇木二錢五分 桃仁二錢五分 茜草根二錢

用法：水煎服，童便三盅為引。

驗例：根據治療經驗此方有效，血止後不再復犯，服此藥一、二劑可痊癒。

治鼻內流血方

吉林市 張 慶 云

處方：童子頭髮三錢 龍骨三錢 烏梅三錢

用法：共一處焙干為細面，吸入鼻孔內。

三、咽 喉 病

治扁桃腺炎及小儿气管炎性哮喘方

邹 向 安

处方：銀花三錢 桔梗三錢 元參三錢 寸冬三錢 豆根三錢
黃芩四錢 射干三錢 大海三錢 甘草二錢（旧制）

用法：水煎服，如小儿用量可酌情減之。

驗例：在临床上治过很多病例，用青霉素注射无效或有效不显著者，服此药皆效。

治單双乳蛾，咽喉肿痛，呼吸困难，飲水即噎方

樟甸县 王 学 青

处方：乳香珠二錢 明沒药二錢 广木香一錢五分 血竭花二錢
漳丹二錢 蟬酥五分 好香片茶叶三錢

用法：共为細面，将药面用苦酒（陈醋）調炒，趁溫热敷于肚臍上，微出汗。

驗例：临床試用屢效。

治扁桃腺炎，咽喉肿痛，飲水不下，呼吸困难方

吉林縣大 周 兰 泽

处方：元參一两 銀花一两 牛蒡子三錢 生地三錢 寸冬三錢
天冬三錢 生石膏三錢 糖瓜蜚三錢 甘草三錢

用法：水煎服。

治急性喉头炎方

磐 石 县

处方：冰片二錢 枯矾五錢 黃柏炭四錢 灯心炭六錢

用法：共为細面，吹于咽喉处即愈。

治音哑方

公主岭市 李兆丰

处方：节菖蒲三钱 全退三钱

用法：水煎服，一日服两次。

桔梗射干汤

撫松县 李春华

主治：喉头炎、扁桃腺炎。

处方：桔梗二钱 射干一钱半 豆根一钱半 银花二钱 连翘二钱
梔子一钱五分 寸冬二钱 黄芩二钱 元参二钱 大海一个
甘草一钱

用法：以水300毫升煎至50毫升一次服，煎两次服之。该药量是三至五岁小儿用量，其他年龄可酌情加减用之。

验例：在本年一月时治愈两名麻疹后合并喉头炎患者。

四、口 腔 病

治小儿鹅口疮方

靖宇县 潘青贵

处方：硼砂一钱 维乙粉一钱

用法：混合研细，涂搽患处，即可治愈。

加减泻心汤

于远航

主治：牙龈出血。

处方：大黄一钱半 黄连二钱 黄芩三钱 生地五钱 甘草一钱
茅根三钱

用法：水煎服三次。

治口疮齿龈溃瘍方

开通县 刘景林

处方：白人参三钱 黄柏一钱

用法：共为細面，搽患处。

治齿龈炎出血有臭味方

长春中医学院 刘金峰

处方：人中白 金灯皮（紅姑娘皮晒干忌炒）各等分

用法：二味共为細面，搽患处。

治驗：临床試用有效。

治舌面无皮方

延吉市 刘延龄

处方：人中白五分 儿茶三分 青黛三分 內金二分 珍珠三分
冰片五分

用法：研为細面，分成六包，每服一包，飯后用，日三次。

在服时要留一点药撒在舌面上，任其自然融化。

治小儿口舌生疮糜烂痒痛方

农安县 赵修清

处方：白矾面装入猪胆內，待风干后，将白矾倒出加冰片五分
牛黄二厘

用法：共为細末，上患处有效。

治鹅口疮及舌糜烂方

长春中医学院 曲志申

处方：黄連五錢 月石三錢 石膏三錢 儿茶二錢 冰片五分

用法：共为細面，撒于患处，一日二、三次，經驗有效。

禁忌：忌食猪肉三、四日。

五、眼 病

治眼珠疼痛方（夜痛甚者）

孙秀峰

处方：枯草一两 香附五錢 甘草一錢

用法：共为細面，每次服一錢五分

驗例：經治疗两例此症痊愈。

治宵光眼方

譚景祺

处方：石决明五錢 生草决明五錢 生地五錢 熟地五錢 枸杞果一两 五味子一錢五分 山萸肉三錢 生白芍三錢 菊花二錢 石斛五錢 (旧制量)

用法：水三碗煎八分碗服。

禁忌：辛辣之物。

驗例：經临床治疗有效 (百日內者)。

治眼球突出，头痛眼球痛，日夜不能眠者

周凤山

处方：馬勃四錢 全龙衣一条 皂子七个

用法：用两个小瓦盆将药放盆內，上下扣好，以黄泥固封勿使漏气，放在木柴火上將药焙純性取出为面，匀两次吃，白水送下，服一、二剂可除根。

驗例：在临床上凡遇此病服本方均收良效，治愈十几个病例，达到痊愈。

治迎风流淚方

农安县 王速魁

处方：当归一錢 白芍一錢 熟地一錢 茯苓一錢 萸肉一錢 泽夕七分 丹皮一錢 知母一錢 盐柏一錢 双叶三錢 骨皮三錢 甘草一錢 酒軍一錢五分 山药七分 菊花三錢

用法：水煎服。

治暴发火眼，目赤肿痛方

鎮賚县

处方：大黄面

用法：凉水調合，敷在两眉中間，不断用凉水潤之，而肿消痛止即癒。

又方 黃連五錢 薄荷二錢五分

用法：共为面，鷄蛋清調勻攤在布上貼眼部。

治烂眼边方

敦化县 馬 貫

处方：爐甘石（煅透）一两 黃連二錢 龙骨（煅灰）一錢 冰片五分

用法：将前味药共为細面，再加冰片研勻。

眼边湿性者干上，干性者用香油調上。

治烂眼边方

穰 甸 县

处方：硼酸三錢 黃連四錢 爐甘石三錢 冰片一錢

用法：共为細面，凡士林油調合成膏涂患处。

化坚二陈散

延吉市 賈 学 仁

主治：梅核病（眼疮）

处方：陈皮四錢 半夏四錢 茯苓一錢 黃連二錢五分
白姜蚕八分 生甘草一錢

用法：共为細面，大人服一錢，一日三次，小儿一分至五分，一日四次服。

驗例：經近几年来广泛使用有效，在一九五八年春一軍人两眼患此病，用本方治疗六、七天全癒，并未复犯。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 吉林省中医验方秘方汇编 (第三辑)

作者 = 吉林省卫生厅编

页数 = 1 8 8

S S 号 = 1 0 4 6 1 4 1 0

出版日期 = 1 9 6 1 年 0 2 月 第 1 版

目录

五、	癲狂癇症
六、	头痛
七、	风湿性关节炎
八、	牙痛
九、	抽麻筋
第二章	外科
第一节	外科疾病
一、	疮疡痈疽
二、	疔疮
三、	鼠疮瘰癧（淋巴腺结核）
四、	漏疮（骨结核）
五、	臃疮
六、	痔疮
七、	烫火伤
八、	冻疮
九、	疝气
十、	辜丸炎
第二节	皮肤系统疾病
一、	疥癬疮
二、	黄水疮
三、	癩疹（荨麻疹）
四、	肾囊风（阴囊湿疹）
五、	腋臭症
六、	蛇盘疮（带状疱疹）
七、	脚气
第三章	妇产科
第一节	调经
一、	经血不调
九、	腹痛
十、	痢疾
十一、	腹泻
十二、	便血
十三、	肠痈（阑尾炎）
十四、	脱肛
十五、	绞肠痧
第三节	呼吸系统疾病
一、	感冒性咳嗽
二、	痰饮咳嗽
三、	内伤咳嗽
四、	咳血
五、	肺结核
六、	肺痈（肺脓疡）

	七、胸胁疼
第四节	泌尿系统疾病
	一、小便闭
	二、遗尿症
	三、淋浊症
	四、小便尿血
	五、水肿
	六、消渴病（糖尿病）
第五节	神经系统疾病
	一、中风不语（脑溢血）
	二、半身不遂、口眼歪斜
	三、神经衰弱
	四、高血压
目次	
第一章	内科
第一节	传染病及地方病
	一、麻疹
	二、脑膜炎
	三、百日咳
	四、白喉
	五、狂犬病
	六、破伤风
	七、肝炎
	八、霍乱
	九、克山病
	十、大骨节病
	十一、甲状腺肿
第二节	消化系统疾病
	一、胃脘作痛
	二、吞酸
	三、反胃、噎膈、呃逆
	四、胃溃疡（胃痛）
	五、吐血
	六、黄疸病
	七、单腹胀、膨胀
	八、积聚
	二、年老经断复来（子宫癌）
	三、崩漏带下
	四、经闭
	五、不孕症
第二节	胎产
	一、胎前诸症
	二、无乳、乳房痈疽

- 三、产后下血过多
- 四、产后血晕
- 五、产后腹痛
- 六、产后风
- 七、产后杂病
- 八、妇科杂病

第四章 儿科

- 一、急慢惊风类
- 二、小儿夜啼
- 三、小儿咳嗽
- 四、吐泻
- 五、消化不良
- 六、胎毒及疳症

第五章 五官科

- 一、耳病
- 二、鼻病
- 三、咽喉病
- 四、口腔病
- 五、眼病