

前 言

本會于一九五六年編選的「中醫秘方驗方匯編第一集」出版后，受到廣大讀者的歡迎，并接到許多來信要求出版第三集，因此，繼續編選了此書。

此書主要是供醫務人員臨床上研究參考，在選用藥方時，必須根據病症的實際情況，運用中醫「辨証論治」的法則，才能發揮方劑的功效。對其中有毒性的藥物，試用時務須謹慎；非醫務人員必須與中醫師研究后再行試用。希望將試用結果隨時告知本會，以便再汇集各方面的經驗，作進一步的研究。

江蘇省中醫中藥學術研究委員會籌備委員會資料室

一九五八年一月

目 录

內 科 門

咳嗽、哮喘类

神效化痰丸方	一
冷哮丸方	一
肺炎方	一
痰血方	一
伤风方	一
馬脾风散方	一
气喘方	一
干咳嗽方	一
伤风方	一
杏金丹	一
失音丸方	一
加味生脉散方	三
劳嗽方	三
肺癆类	
肺結核方	三
肺病方	三

肺結核方	三
肺結核方	四
白参散方	四
蛤蚧散方	四
加減越鞠丸方	四
龙骨龟板丸方	四
木耳散方	四
肺癰方	五
肺癰方	五
肺癰方	五
金不换方	五
肺膿瘍方	五
风痹、头痛类	
风湿病方	五
足牽筋方	六
四肢麻痺方	六
芎芷散方	六
头痛方	六
头风痛方	六
头痛方	六

頭痛方	七
頭痛方	七
口眼歪斜方	七
腰痛方	七
關節炎單方	七
關節炎方	七
偏頭痛方	八
偏頭痛方	八
頭目暈眩方	八

瘧疾類

瘧疾方	八
瘧疾方	八
治瘧散方	八
瘧疾方	九
瘧疾方	九
瘧疾砒豆丸方	九
瘧疾塞鼻方	九
瘧疾方	九
瘧疾方	九
瘧疾方	一〇
瘧疾方	一〇
瘧疾方	一〇
截瘧散方	一〇

腸胃病類

瘧疾方	一〇
截瘧散方	一〇
瘧疾方	一一
瘧疾單方	一一
瘧疾方	一一
香附丸方	一一
胃痛方	一一
腹痛方	一二
腹痛方	一二
胃痛方	一二
消化性潰瘍驗方(一)	一二
消化性潰瘍驗方(二)	一二
胃病方	一二
胃病方	一二
胃潰瘍方	一三
消化性潰瘍方	一三
神棟丹方	一三
胃痛方	一四
胃痛方	一四
胃痛方	一四
胃痛方	一四
胃痛方	一四
胃痛方	一四

胃痛方.....一四

胃痛方.....一四

胃病方.....一四

胃病方.....一五

胃病方.....一五

噎膈方.....一五

胃疼方.....一五

胃痛方.....一五

胃痛方.....一六

黄疸类

黄疽方.....一六

黄疽方.....一六

黄疽方.....一六

黄疽方.....一六

黄疽方.....一七

黄疽方.....一七

积聚臌脹类

腹水方.....一七

腹水方.....一七

腹水方.....一七

双甲散方.....一八

急性浮腫方.....一八

十大功劳散方.....一八

十面埋伏丸方.....一八

臌脹方.....一八

水腫病方.....一九

水腫方.....一九

腎臟性水腫方.....一九

肝臟腫方.....一九

水腫外治方.....一九

水腫單方.....二〇

痢疾类

痢疾方.....二〇

痢疾方.....二〇

蒜薤丸方.....二〇

痢疾方.....二〇

痢疾方.....二〇

痢疾方.....二〇

痢疾方.....二〇

痢疾方.....二〇

痢疾方.....二〇

痢疾方.....二〇

休息痢方.....二〇

泄瀉方……………一一一
血痢方……………一一一
血痢方……………一一一
痢疾方……………一一一
水瀉方……………一一一
痢疾方……………一一一
痢疾方……………一一一

失血类

蕩草丸方	吐血方	吐血或咯血方	吐血方	吐血方	吐血方	吐血方	吐血方	咳血方	便血方	便血方	便血方	腸風下血方	腸風下血方
一三三	一三三	一三三	一三三	一三三	一三三	一三三	一三三	一四四	一四四	一四四	一四四	一四四	一四五

虫病类

癰疽方	二五
蛔蟲方	二五
蛔蟲方	二五
蛔蟲方	二五
蛔蟲方	二五
蛔蟲方	二五
蛔蟲方	二五
蛔蟲方	二五
驅蟲方	二六
驅蟲方	二六
殺蟲方	二六
六味絲蟲丸方	二六
四味鉤蟲丸方	二六
鉤蟲皂鐵丸方	二七
鉤蟲單方	二七
蟯蟲方	二七
蟲積方	二七
棟根煎方	二七
牛郎丸方	二七
癰 癰 癰	
癰狂病方	二八
癰狂症方	二八
舞蹈症方	二八
癰丸方	二八

癰
瘤
類

羊癇風方	二八
羊癇風方	二九

破伤风、狂犬病类

破伤风方	二九
破伤风方	二九
破伤风方(一)	二九
破伤风方(二)	二九
破伤风方	二九
破伤风方	三〇
狂犬病方	三〇
狂犬病方	三〇
狂犬病方	三一
瘋狗咬傷方	三一
狂犬病方	三一

泌尿病类

二便不利方……………三二一
白濁方……………三二一
淋疾方……………三二一
小便頻數方……………三二一
小便癰閉方……………三二一
尿閉外治方……………三二一

小便癰閉方……………三二
二聖散方……………三二
小便不通方……………三三
小溲不通方……………三三
小便不通方……………三三
小溲淋痛方……………三三
血尿方……………三三
尿血方……………三三
淋濁方……………三三
小便淋痛方……………三四
尿道炎方……………三四
尿閉方……………三四
尿閉方……………三四
血淋方……………三四
血淋方……………三四
乳糜尿方……………三四

杂病类

腦膜炎方……………三五
陽萎方……………三五
闌尾炎方……………三五
遺精方……………三五
虛汗方……………三六
盜汗外用方……………三六

氣癰方	三六
補血丸方	三六
貧血方	三六
傷心丸方	三六
糖尿病方	三七
吐瀉方	三七
水蛭入肛門方	三七
大頭瘟方	三七
失眠方	三七
失眠方	三八
乳房結核方	三八
棉子油中毒方	三八
睪丸炎方	三八
睪丸腫大方	三八
陽疳方	三八
闌尾炎方	三八
肝陽類	
高血壓方	三九
土苓草藤飲方	三九

外科門

瘡瘍類

褲腿風方	四〇
膿瘡方	四〇
膿瘡方	四〇
膿瘡方	四〇
膿瘡方	四〇
外科簡易方	四一
肥兒單方	四一
外用方	四一
洪寶丹方	四一
金箍散方	四一
清露散方	四二
翻花瘡方	四二
烏梅散方	四二
宿癰方	四二
八黃散方	四二
腿部潰瘍方	四二
附骨疽方	四二
附骨疽方	四三
背疽方	四三
癰腫方	四三
串癰方	四三
乳腺炎方	四三
蜂窩織炎方	四四
鬐頭肉方	四四

收斂散方	四四
膿瘡方	四四
三仙丹方	四四
生肌散方	四四
陰囊腫潰方	四五
流注方	四五

疔瘡類

疔瘡走黃方	四五
敷疔方	四五
疔瘡方	四五
拔疔方	四五
蛇頭疔方	四六
疔瘡方	四六
山藥膏方	四六
解毒丹方	四六
唇疔方	四六
疔毒方	四六
疔瘡外治方	四七

皮膚病類

頑癬方	四七
黃水瘡方	四七
綉球瘋方	四七

蒼葦茄根膏方	四七
皮膚皸裂方	四八
遇仙丹方	四八
禿發方	四八
鬚鬚頭方	四八
癬病外用方	四八
鬚鬚頭方	四八
禿瘡方	四八
禿瘡方	四八
治癬方	四九
爛腳方	四九
脚濕氣方	四九
枯龍散方	四九
長年爛腳方	四九
疥瘡方	五〇
痒疹方	五〇
皮膚濕疹方	五〇
皮膚驗方	五〇
外科清涼膏方	五〇
神化散方	五〇
濕毒方	五一
蝨蟻濕毒方	五一
赤游丹毒方	五一
羊胡瘡方	五一

燙火灼傷方.....五八

蛇虫咬傷類

毒蛇咬傷方.....五八

毒蛇咬傷方.....五九

蜈蚣咬傷方.....五九

蜈蚣咬傷方.....五九

蛇咬方.....五九

跌打損傷類

活血止痛湯方.....五九

止血方.....五九

傷科方.....六〇

骨折方.....六〇

傷藥方.....六〇

接骨方.....六〇

接骨方.....六〇

刀傷方.....六〇

刀傷方.....六一

刀傷方.....六一

跌打損傷方.....六一

腰扭傷方.....六一

傷藥方.....六一

刺傷腫痛方.....六一

五官病門

眼病類

目疾方.....六二

目疾方.....六二

目疾方.....六二

夜盲方.....六二

決明散方.....六二

眼科效方.....六三

翳癰方.....六三

赤眼方.....六三

眼癰方.....六三

夜盲症驗方.....六三

消障救眼方.....六三

煤油治眼炎方.....六四

耳病類

中耳炎方.....六四

耳內癰肉方.....六四

慢性中耳炎方.....六四

中耳炎方.....六四

中耳炎方.....六四

中耳炎方.....六五

中耳炎方	六五
耳聾方	六五
耳聾鼠胆膏方	六五

鼻病类

鼻淵方	六五
鼻淵方	六五
腦漏方	六六
腦漏方	六六
鼻衄方	六六
鼻疳方	六六

咽喉病类

白喉方	六六
白喉方	六六
白喉方	六七
白喉吹藥方	六七
喉科方	六七
平險如夷散方	六七
咽喉痛方	六七
喉痹方	六八
四七噤化丸方	六八
柳華散方	六八
引龙归海散方	六八

加味凤鳴散方	六八
膏吹藥方	六八
珍珠散方	六九
金不換方	六九
雄黃解毒丸方	六九
硃角散方	六九
紅雪散方	六九
黃雪散方	六九
海洋至宝方	六九
乳蛾方	七〇
白喉外治方	七〇
紅吹藥方	七〇
口疳方	七〇
口瘡方	七〇
冰片散方	七〇
人中白方	七一
云珠散方	七一
开关立效散方	七一

齿病类

牙痛方	七一
牙痛方	七一
风火牙痛方	七一
牙疼方	七一

风火牙痛方	七二
巴椒丸方	七二
齩齿疼痛方	七二
齿齩方	七二
齿齩方	七三
牙疳方	七三
砒棗散方	七三
走馬疳方	七三
治火牙單方	七三
生肌散方	七三
沃雪散方	七四
牙痛方	七四

婦科門

調經類

痛經方	七五
痛經方	七五
經閉方	七五
干血癆方	七五

崩帶類

白帶方	七五
白帶方	七六

白帶方	七六
白帶方	七六
白帶方	七六
白帶方	七六
白帶方	七六
白帶方	七六
白帶方	七六
帶下方	七七
白帶方	七七
血崩方	七七
血崩方	七七
血崩方	七七
血崩方	七八
血崩方	七八
崩漏方	七八
崩漏方	七八
子宮出血方	七八

产后疾病類

产后多汗方	七八
产后风方	七八
产后破伤风方	七九
产門不開方	七九
初产阴戶腫痛方	七九

儿枕痛方.....七九

妇女杂病类

产后缺乳方.....七九

乳汁不足方.....八〇

催乳方.....八〇

吹乳方.....八〇

女科胎前饮方.....八〇

乳癰方.....八〇

乳癰方.....八〇

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

乳癰方.....八一

儿科門

惊风类

小儿惊风方.....八三

小儿惊风方.....八三

敷惊散方.....八三

太极丸方.....八三

小儿惊厥方.....八三

百日咳类

百日咳方.....八四

百日咳方.....八四

百日咳方.....八四

百日咳方.....八四

梨膏半貝散方.....八五

百日咳方.....八五

百日咳方.....八五

百日咳方.....八五

疳积类

肥儿粉方.....八五

小儿便秘方.....八六

丹阳子藥方.....八六

泄瀉、嘔吐类

小儿泄瀉方.....八六

小儿水瀉方.....八六

小儿腹瀉方.....八七

小兒吐瀉方·····八七
小兒嘔吐方·····八七

小兒雜病類

小兒赤游丹方·····八七
小兒吐乳方·····八七
小兒夜啼方·····八七
小便不通方·····八八
小兒脫肛方·····八八
小兒口瘡方·····八八
小兒羊須瘡方·····八八
二粉散方·····八八
小兒癩瘡方·····八八
千臍散方·····八九
引兒食乳方·····八九
臍突出方·····八九
小兒疳瘦微熱方·····八九
遺尿方·····八九
小兒遺尿方·····八九
遺尿方·····八九
桃花散方·····九〇
小兒喘息方·····九〇
誤吞鉄釘方·····九〇
臍風方·····九〇

口腔炎方·····九〇
鵝口瘡方·····九〇
鵝口瘡方·····九一
土苓一味煎方·····九一

內科門

咳嗽、哮喘類

神效化痰丸方

顧振遠

主治

肺風痰喘，氣急鼻煽，痰壅咽喉，喉中痰聲如鋸，呼吸喘急，臥寐不安，服此藥順氣化痰。

處方

天麻一錢

防風三分

胆星一錢

青礞石五分

竹黃五分

腰黃五分

巴霜四錢

元寸香三分

淨天虫五分

白芥子六分

甘草末三分

沉香一錢

制法

右藥研細末，煉蜜為丸，如綠豆大。

用法

幼童每服一丸，大人每服二丸，開水送下。

〔注〕

此方藥味太雜，似不及雄黃解毒丸。但用量不大，不妨試用。

冷哮丸方

計志霖

主治 多年痰飲，遇寒即發哮喘，氣急不能平臥。

處方 江西白豆豉一兩 白礞一錢

制法 上藥研末，用粳米飯研爛入末為丸，如萊菔子大。

子大。

用法 每服三、四粒，冷茶沖服，童子服后可除根。

〔注〕 以之治冷喘極驗，兼治瘡疾，此藥毒性很大，

應由有經驗的醫師指示用之。

肺炎方

黃橋中醫聯合診所

主治 肺炎、氣急鼻煽、發熱咳嗽、吐銹色痰。

處方

生石羔一兩

西麻黃八分

桑白皮三錢

干地龍三錢

杏仁三錢

知貝母各三錢

生甘草一錢

制法

水煎服。

用法

每日一劑，頭二煎、分二次服。

〔注〕

服用上方時，須與當地中醫聯系，根據體質、病勢輕重，劑量可以加減。

痰血方

吳建鴻

主治

傷風喀痰帶血。

处方 生藕

制法 搗汁和蜜

用法 連服有效

伤风方

吳建鴻

主治 伤风咳嗽。

处方 核桃

制法 帶壳搗碎，加冰糖。

用法 煎服數次，有良效。

馬脾風散方

徐一柱

主治 寒邪入肺，寒郁為熱，痰喘氣上，肺脹胸膈。

处方 甘遂一錢五分 輕粉五分 硃砂二錢五分

制法 上藥共研細末。

用法 每取一、二分，以開水少許，上滴香油一點，

挑藥在油上，待沉下却去，開水服下。

〔注〕 此方藥力較峻，須由中醫師斟酌使用。

氣喘方

張景虹

主治 氣喘。

处方 北瓜七斤（去皮熬汁過濾） 飴糖五斤半 姜汁半斤

制法 姜去皮，煎湯，入飴糖熬膏，入瓜汁。

用法 每天早晚二調羹，連服四十九天。

干咳嗽方

包元 董介先

主治 干性氣管炎。

处方 花生（搗碎）

制法 煎湯

用法 一兩一次，療效極好。

伤风方

胡逸松

主治 傷風咳嗽、聲啞。

处方 玉蝴蝶一錢 胖大海一錢 冰糖五錢

制法 煎湯

用法 連服二、三次有良效。

杏金丹

張宏仁

主治 諸般咳嗽。

处方 百部二兩 甜杏仁四兩

制法 研末煉蜜為丸。

用法 一日三次，每次二錢至三錢，開水下。

失音丸方

張宏仁

主治 咳嗽失音。

处方 紫苑二兩 杏仁一兩 桃仁一兩

制法 煉蜜為丸，如梧桐子大。

用法 一日三次，每次五粒至十粒。開水下。

加味生脈散方

張宏仁

主治 勞嗽失音。

处方 人參一錢五分 麥冬二錢 五味子一錢五分

貝母二錢五分 葛蒲八分 地黃三錢

用法 煎服，煎時加白蜜，或蜜丸服。

勞嗽方

張宏仁

主治 勞嗽、干咳無熱。

处方 百部四兩 川貝二兩 茅朮二兩 滁菊一兩

桑葉一兩

制法 研末為丸。

用法 一日三次，每次二錢，開水下。

肺癆類

肺結核方

主治 咳嗽吐痰、身體消瘦、面色顴紅、午后潮熱、

夜出盜汗、呼吸不暢、四肢倦怠、食欲不振，服藥無效。

处方 牛骨髓半斤 飛羅面半斤 黑芝麻四兩（研碎）

制法 先將中骨折斷，放鍋內煮取髓質，加面與芝

麻共放鍋內，蒸六小時取出。

用法 每日晚服一次，服時加冰糖一兩，與藥等量

加水沖服。忌刺激性食物。

肺病方

吳江川

主治 肺萎、肺癰、咳嗽痰多或咳不成聲。

处方 生薏米仁四兩 糯米四兩 去皮白芨粉一錢五分

冰糖

制法 薏米先加水煮爛，再入糯米，最後加入冰糖、

白芨粉。

用法 臨睡吃一碗，天明再吃一碗。

肺結核方

戴幼亭

主治 盜汗、咳嗽、潮熱、失眠。

处方 百部根一斤 薄荷一斤 怀山藥一斤（半搗碎）

大鰻魚十條（去腸肚，留肝和油）

制法 將百步根放在鍋內，加水，上設籠。鋪以薄荷、鰻魚放在薄荷上，再蓋以怀山藥，用武

火蒸約三小時（七支香時間），至魚脫骨為度。留鱔魚、怀山藥，余均弃去。然後將去骨鱔魚及怀山藥用文火慢慢烘干，研末混合，裝入瓶內备用。

用法 每服一至三湯匙，一日三次，食后服。約服五、六劑，臨床症狀均可減退。

肺結核方

張宏仁

主治 肺癆吐血。

处方 白芨四兩 蛤蚧一對 三七二兩

制法 共研末，棗肉為丸。

用法 一日三次，每次服一錢二分至一錢五分。

白參散方

張宏仁

主治 癆嗽吐血。

处方 海參一斤（切片焙干） 白芨（切片）半斤

龜板（炙酥）四兩

制法 共研細末。

用法 一日三次，每次五錢，開水下。

蛤蚧散方

張宏仁

主治 肺癆、失音、咳血。

处方 川蛤蚧十對（酒浸炙酥） 川貝母一兩

桑白皮（蜜炙）一兩 白茯苓一兩 黨參一兩

黑木耳二兩（焙） 紫苑二錢 款冬花一兩

制法 右藥研末。

用法 每服三錢，一日三次，蜜水或開水調服。

加減越鞠丸方

張宏仁

主治 肺癆久咳。

处方 百部四兩 遠志二兩 當歸四兩 川芎四兩

白芨四兩

制法 研末，水泛為丸。

用法 一日三次，每次二錢，開水下。

龙骨龜板丸方

張宏仁

主治 久咳、勞瘵、遺精、盜汗。

处方 龙骨一兩 龜板二兩 遠志二兩 石菖蒲一兩

百部四兩 款冬花二兩 白芨二兩 前胡二兩

制法 研末，水泛為丸。

用法 一日三次，每次二錢，開水送下，一劑至二劑。

木耳散方

張宏仁

主治 癆嗽休弱。

处方 木耳四兩(焙) 龟板五錢(炙) 鱉甲一兩(炙)

百部二兩五錢

制法 共研細末。

用法 一日三次，每次二錢至二錢五分，開水送下。

肺癰方

包元

主治 肺癰

处方 鮮小薊汁(不拘多少)

制法 搗汁

用法 澆服

〔注〕 可加金銀花二兩，煎湯和服，取效當更佳。

肺癰方

董介先

主治 肺癰，症狀緩解，痰腥亦漸減少。

处方 合歡木皮(手掌大一塊)

制法 煎劑。

用法 內服。

〔注〕 此本千金黃昏湯，為肺癰初愈善后方。

肺癰方

顧錫才

主治 肺癰。

处方 鮮蘆根

制法 採集洗淨，煎湯。

用法 代茶飲之。

〔注〕 藥力很薄弱，重症不可恃，只可充輔助療法。

金不換方

孫繩武

主治 肺癰。

处方 梨汁 陳芥菜

用法 燉熱服之

〔注〕 如再加金絲荷葉打汁，陳酒沖服更好。

肺膿瘍方

孫杏一

主治 胸膈脹滿，上氣喘急，咳則大痛，痰中帶血，

目突面浮，元虛危症。

处方 吉林參二錢 白芨一兩 魚腥草汁一大盅

制法 煎劑。

用法 日服一劑，服時，入魚腥草汁一大盅。

〔注〕 連服一星期，不可間斷，症狀有所改善。

風痺、頭痛類

風濕病方

鹿奉先

主治 膝關節常年麻木疼痛，在秋冬二季更為嚴重。

處方

川烏三錢

川羌活二錢

全當歸五錢

左秦艽二錢

白酒三斤

草烏二錢

川牛膝三錢

防風三錢

粉甘草二錢

桂枝三錢

川木瓜二錢

川續斷二錢

茅蒼朮二錢

制法

將藥放入酒內浸一星期。

用法

每日三次，每次一兩，不會飲酒者可減少。

足牽筋方

佚名

主治

腓腸筋痙攣

處方

木瓜三錢 牛膝二錢

制法

水煎

用法

內服

四肢麻痺方

沈飛鵬

主治

新久四肢麻痺

處方

桑枝二斤

制法

煎熬去渣，加冰糖一斤收膏。

用法

每早服半調羹，開水送下。

芎芷散方

孫繩武

主治 偏正頭風及腦漏。

處方

川芎 白芷 細辛 藁本各等分

制法

共研末。

用法

吹入鼻中，男左女右。

頭痛方

陸樹人

主治

頭痛（充血性）。

處方

羚羊尖四分 石決明四錢 鉤藤三錢

潼蒺藜三錢

白蒺藜三錢

冬桑葉二錢

淡芩二錢

制法

水煎。

用法

內服。

頭風痛方

陳振華

主治

頭風痛。

處方

白芷三錢 川芎一錢半

制法

水煎。

用法

內服。

頭痛方

姚錫高

主治

鼻塞頭痛。

處方

冰片一分 全蝎一只 大黃五分

制法 共研末

用法 头痛时右痛塞左鼻，左痛塞右鼻，满头痛兩

鼻皆塞（塞时將藥末用絹包扎如黃豆大）。

頭痛方

董介先

主治 头痛。

处方 蔓荊子二錢

制法 水煎。

用法 內服，以愈為度。

頭痛方

陆树人

主治 头痛病久不愈，有貧血症狀者。

处方 柴胡三錢 杭白芍四錢 归身四錢

青龙齿一兩 茯神三錢 明天麻二錢

制法 水煎

用法 內服

口眼歪斜方

湯沛

主治 口眼歪斜。

处方 防风三錢 羌活、独活各二錢 白芷三錢

木瓜四錢 勾藤二錢 甘草二錢

桑枝七寸 鮮蒼耳子二兩 川芎二錢

制法 水煎。

用法 吃二份，留一份洗患处，如无鮮蒼耳子，即

以皂針代之。此症腮部必发现紫血，宜用針

刺破，如外部发现硬筋，亦宜刺破。

腰痛方

王新华

主治 风寒、湿痹、腰痛。

处方 川烏头三个

制法 將上藥生搗為末。

用法 用时少加鹽水，調攤于紙帛上，貼痛处，須

臾即止。

关节炎單方

佚名

主治 属于膝关节、肘关节部分的关节炎

处方 生蚕豆四十粒

制法 用开水泡透搗爛，加白糖二兩和勻。

用法 敷腫痛处，隔一宿換一次。三次有效。

关节炎方

沛县鹿楼联合診所

主治 四肢关节紅腫，疼痛难忍，由风寒而引起者。

处方 全蠍十二个 香油二兩

制法 用銅勺將全蠍放入香油內煎炸，以不炸黃為

度。

用法 一次干服，以热酒一盅为引，可以发汗。

偏头痛方

沈純济

主治 偏头痛。

处方 硫黄一錢 川椒皮三分

制法 共研細末。

用法 塞痛边之鼻孔，出清涕可愈。

偏头痛方

施亞輝

主治 陣发性偏头痛。

处方 鬧阳花 細辛 樟腦

急性子(即凤仙花子)各一錢

制法 共研細末，置于密塞瓶中备用。

用法 將藥末三分包于棉花中，左边头痛塞右鼻，

右边头痛塞左鼻。

〔注〕 据献方人称：塞三分鐘后，头痛可立止。

头目暈眩方

周启明

主治 头目暈眩。

处方 胡桃肉四兩 黑芝麻二兩

制法 上藥入冰糖，同搗爛，以甜为度，貯入盖碗

备用。

用法 每晨服一、二匙。

瘡疾类

瘡疾方

鄒复兴

主治 瘡疾。

处方 淨草果仁一兩

制法 去壳、用淨仁，微炒后，研成細末，分作八

包。

用法 在发作前或发作后，以米湯調服，亦可加白

糖送下。病重者，每次服二包。

瘡疾方

孙福隆

主治 瘡疾。

处方 阿魏一小块

制法 研碎。

用法 于瘡作前二小时，敷置于第三节胸椎骨上，

外用藥膏貼住。

治瘡散方

湯承祖

主治 各種瘡疾。

處方 草果仁五錢 洋樟五錢 雄黃二錢五分

制法 共研細末，愈細愈好。

用法 于瘡發之日清晨，用藥棉裹藥塞入鼻內，男左女右，孕婦勿用。

瘡疾方

秦郁哉

主治 瘡疾。

處方 甜茶三錢 鈎藤三錢

制法 露一宿，水煎。

用法 內服。

瘡疾方

清江市四聯診所

主治 瘡疾。

處方 黃常山二錢五分 檳榔三錢

制法 水煎。

用法 于瘡發前二小時許，溫服之。

瘡疾砒豆丸方

孟乐天

主治 慢性頑強瘡疾。

處方 白砒一錢（煨研成粉） 萊豆粉一兩

制法 共研勻，為丸一百粒。

用法 每服二、三粒，服後宜多吃開水，三、四次

即愈。

瘡疾塞鼻方

李蔭之 孫文伯

主治 瘡疾。

處方 草果二分

制法 將草果研成細末，用棉花裹好。

用法 塞入鼻孔。

瘡疾方

陳彩雲

主治 瘡疾。

處方 煨草果二錢 常山二錢 生薑一錢 紅棗四枚

制法 水煎。

用法 內服。

〔注〕此方宜先一日晚服頭煎，至發作前二小時許服二煎，方有效。

瘡疾方

孟乐天

主治 瘡疾。

處方 常山三錢 草果二錢 浙貝母一錢五分

知母一錢半

制法 水煎。

用法 五更时热服即愈。

瘡疾方

孟乐天

主治 瘡疾。

处方 甜茶三錢 冰糖三錢

制法 煮水一杯。

用法 服后取吐即愈。

瘡疾方

陈希齡

主治 瘡疾。

处方 木賊草二兩

制法 剉細，浸于二〇〇西西酒精內。

用法 成人每次五西西，小兒二西西。

〔注〕 根据張景岳木賊煎。

瘡疾方

无錫市衛生局

主治 瘡疾。

处方 巴豆 雄黃各等分

制法 研末(量如兩粒米大)，置膠藥中。

用法 貼在耳后乳突部，男左女右，時間在黎明前，

貼一晝夜即效；對間日瘡更為有效。

截瘡散方

孙任国

主治 各种瘡疾。

处方 車前子 樟腦各等分

制法 將車前子炒焦，研細篩過，得深赭色粉末，

再与等分的樟腦細末混合起来即成。

用法 发病前兩小时，用藥棉包合成的藥末如蚕豆

大小，塞入鼻內，男左女右，利用呼吸，將

藥味吸入。病輕者一次即止，重者兩三次亦

可止。如再佐以針刺大椎、合谷、曲池等穴

其效更速。

瘡疾方

宋先业

主治 間日瘡。

处方 甘遂末二分 甘草末三分

制法 研細末。

用法 发作前一小时，用鮮姜片將臍部擦一、二分

鐘(皮肤发紅即可)，將藥末撒在臍內外，貼

上膏藥(盖紗布貼橡皮膏亦可)。

〔注〕 发作前一、二小时应用，隔三小时后取下。

截瘡散方

王文济

主治 間日瘡、三日瘡、惡性瘡。

处方 雄精六分 甜茶一錢五分 硃砂三分

烏梅一錢五分 夜明砂二錢

制法 上藥各為細末，混和貯存备用。

用法 每服一至二錢，日服三次，連服三日。

瘡疾方

佚名

主治 間日瘡、三日瘡和一日瘡。

處方 白大川 細辛 白芷各等分

制法 研末水拌。

用法 一日瘡用白果大一块貼第七頸椎，間日瘡貼第二胸椎，三日瘡貼第三胸椎，連貼三次。

瘡疾單方

王新华

主治 間日瘡或惡性瘡。

處方 常山二錢 烏梅肉四枚

制法 上藥研末，拌和。

用法 分二次吞，早上服一次，臨發前一小時服一次，開水送下。

瘡疾方

李輔才

主治 按時寒熱，熱後汗解。

處方 煅石膏一兩 白朮一錢

制法 共研細末。

用法 在瘡疾未發作前四、五小時服。成人每服

○五公分，七八歲小孩每服○二五公分，服時少加白糖，用溫開水沖服。服後加飲熱水就會作嘔。

〔注〕 孕婦及年老以及三、四歲兒童忌服。此方對每日瘡，間日瘡，三日瘡，均有效。

腸胃病類

香附丸方

火見良

主治 腕部氣脹，胸中臌滿。

處方 姜黃六錢 香附（炒）五兩

制法 研細末。

用法 每服三錢，空心淡鹽湯下。

胃痛方

佚名

主治 胃痛。

處方 瓦楞子（炒，研末適量） 白糖少許

制法 以白糖拌瓦楞子末。

用法 內服。

〔注〕 錄自朱振聲「丹方精華」

腹痛方

陈希龄

主治 腸部寒急痛。

处方 水山藥花(蒲公英花)二百朵

制法 浸于陳酒內，七天后濾去渣，加糖少許，燉熱飲之。

用法 內服。

〔注〕 本方來自民間，流傳甚廣，據稱療效相當好。

腹痛方

封子厚

主治 慢性腹痛。

处方 肉桂

制法 研末备用。

用法 以上藥五分，開水吞服。

胃痛方

徐煥

主治 胃脘疼痛，飯後嘔吐，胃酸過多。

处方 神曲二錢 白芍二錢 法半夏二錢 木香二錢
川芎八分 甘草一錢

制法 水煎。

用法 日服兩次，飯前服，連服七天。

消化性潰瘍驗方(一)

王新华

主治 胃脘部疼痛劇烈，泛吐酸水。

处方 烏賊骨二錢 象貝母五分 乳香 沒藥各二分半

制法 共研細末

用法 一日分三次吞服，每次一錢，開水送下。

消化性潰瘍驗方(二)

王新华

主治 胃脘疼痛，并有冷感，喜熱飲。

处方 烏賊骨二錢 象貝母五分 附子五分

制法 共研細末，和勻。

用法 一日三次吞服，每次一錢，開水送下。

胃病方

佚名

主治 消化不良，胃部有時作痛，噯酸，食後有時作嘔，受涼則特別嚴重。

处方 广木香三錢 广陈皮二錢 茯苓三錢

粉甘草一錢 西砂仁二錢 法半夏二錢

吳萸(炒)二錢 煨姜三片

用法 煎服。

胃病方

胡守中

主治 胃脘作痛，嘔吐酸水，不能飲食，陣发性痙攣，痛甚則暈厥。

处方

西当归四錢

广木香二錢

老广皮三錢

台烏藥三錢

川連一錢

抗白芍六錢

制香附三錢

法半夏三錢

粉甘草一錢

淨川芎三錢

淡吳萸一錢

元胡索三錢

生薑三片

制法

水煎。

用法

內服。

胃潰瘍方(胃脘痛)

佚名

主治

胃氣上逆，心下痞滿，嘔吐酸水及穢逆，疼痛多於飯後。

处方

代赭石二錢

潞黨參三錢

生甘草三錢

大棗三枚

旋復花三錢

法半夏三錢

生薑三片

制法

水煎。

用法

內服。

〔注〕

凡腥冷，不消化及刺激性食物均禁忌。代赭石為鎮吐收斂止血藥。甘草為矯味藥及中和劑。旋復花為健胃祛痰藥。大棗為矯味及緩

和強化劑，亦有健脾作用。黨參為強壯健胃藥，并能幫助腸胃消化，促進乳糜之吸收。半夏有鎮嘔祛痰作用，開胃健脾。生薑系辛

消化性潰瘍方

常怀开

主治

消化不良，食入反嘔无味，大便下紫黑血成塊，顏面口唇蒼白。

处方

上阿膠二錢

炒白朮四錢

地榆炭四錢

淡附片一錢

熟地三錢

制法

用黃土煎水濾過，再入藥。

用法

內服，再和香砂六君子湯交替服用。

〔注〕

阿膠為止血藥，對潰瘍面有保護作用，治胃潰瘍出血。白朮為利尿健胃藥，為收斂止血藥，附子有強心作用。熟地為強心補血藥，止

吐血止咯血。黃土湯加減，主要用治腸出血，對消化性潰瘍出血可能有效，以待試用。

神棟丹方

張宏仁

主治

胃痛、噁心、氣逆、心嘈等症。

处方

神柚 川棟子等分

制法

研末

用法

一日三次，每次一錢，飯前服，連服七天。

胃痛方

刘篤祖

主治 胃痛。

处方 丹参一兩 檀香一錢 砂仁一錢

制法 水煎。

用法 內服。

胃痛方

刘篤祖

主治 血滯、胃痛。

处方 元胡 草果 沒藥 五灵脂各二錢

制法 共研細末。

用法 每服二錢，開水冲服。

胃痛方

邵鶴云

主治 胃痛。

处方 南棗一斤 鮮佛手兩只 紅花四兩

制法 浸入高粱酒內，貯一年以上（以陳为佳）。

用法 能飲者，每服二、三杯；不能飲者，一杯即可。

胃痛方

佚名

主治 胃脘痛

处方 紅花五分 大棗十枚

制法 水二碗，煎至棗熟，去紅花。

用法 吃湯和棗，連服二十日。

胃痛方

佚名

主治 胃脘疼痛。

处方 乳頭草（蒲公英）

制法 放瓦上炙，枯焦存性，研末。

用法 每服一錢，好酒調和吞下，至少連服五天。

胃痛方

徐达邦

主治 胃痛。

处方 荔枝核（燒微焦）一兩二錢 广木香七錢

制法 研細末。

用法 一日三次，每次二錢。

胃痛方

周宗黃

主治 胃神經痛，中医称胃氣痛，时好时发。

处方 黃連三錢 附子二錢 白芍三錢 木香二錢

制法 共研細末。

用法 每服一錢，開水送下，一日三次。

胃病方

刘金山

主治 嘔吐酸水、腹部脹痛。

處方 高良姜三錢 紫豆蔻七个 黑白丑五錢

制法 共研細末。

用法 每次服三錢，白開水送下。

胃病方

吳汇川

主治 胃寒轉熱，苔黃或發黑有刺。

處方 綠豆四兩

制法 煎湯。

用法 內服。

胃病方

施志昌

主治 胃部寒積痛，食呆不化。

處方 黃酒四斤

制法 煮沸，置罈中，再以石灰塊投于沸酒中，即覺有熱氣上騰。病者俯伏，將胃脘安于罈口上。

用法 用此熏蒸法二、三次，有效。

胃病方

駱玉良

主治 吞酸胃病。

處方 生牡蠣

制法 研末。

用法 每次服一錢。

噎膈方

佚名

主治 每日晨，口干燥，咽物稍覺不利，后迁延增劇，即稀粥亦下咽困難，大便燥結。

處方 豬肚一具

制法 洗淨，納入多年便壺中，外以糠火焙烘，至二十四小時取出搗泥。

用法 每日早晚服一次，每次服銅元大，另加蜂蜜一兩。

胃疼方

卓培浩

主治 下午疼痛劇烈，晚上嘔吐，不能臥，不思飲食。

處方 麻黃一兩 旱澄茄一兩 遠志一兩 陈皮一兩

馬錢子三錢

制法 將上藥用瓶五个分裝，每瓶用酒四兩浸一星期，备用。

用法 上藥浸好后，服時配二西西，飯前服，日服二次。

胃痛方

王福达

主治 有胃痛病史，遇寒即發，綿綿疼痛，有脈細
舌白等症狀。

處方 胡椒一錢 元酒二兩 紅棗七個

用法 先將紅棗煎湯，后將胡椒研末和酒用紅棗湯
沖服。胃潰瘍患者禁服。

〔注〕 此為民間單方。輕者一服，重者服二次即愈。

胃痛方

張宏仁

主治 老胃痛。

處方 苦參子仁十五粒

制法 包于桂圓肉內。

用法 飯后服，一日三次，連服十日。

黃疸類

黃腫方

王仁裕

主治 黃腫。

處方 針砂三兩(煨) 黑棗半斤(去核)

制法 搗爛為丸，如梧桐子大。

用法 每服三錢，每日早晚各一次。

〔注〕 本方亦适用于鉤虫病。

黃疸方

劉滋如

主治 頭暈，四肢痠楚，足腫，脈細而無力，食欲
不振，全身發黃。

處方 炒蒼朮六錢 原朴六錢 大生地六錢

茯苓六錢 白朮六錢 炒澤瀉六錢

皂莢一兩 紅棗肉二兩

制法 先將紅棗用水浸透，去皮核，然后將上藥研
細，和棗肉調制為丸，每丸重二錢。

用法 每日服一至二次，每服一丸，開水送下。

〔注〕 口傳驗方，經試驗有效。

黃疸方

于墨龍

主治 阻梗性黃疸。

處方 綿茵陳一兩 廣玉金二錢 生川軍三錢

赤苓三錢 生梔子三錢 豬苓四錢

生鷄金三錢 澤瀉二錢五分 川黃柏一錢

制法 上藥加水六百毫升，煎至三百毫升。

用法 分三次服，連續服至皮膚肌膜黃色退淨為止，

如大便不通者，可加元明粉三錢。

黃疸方

李清讓

主治 全身及面目俱黃，身出黃汗，小便色黃染地，或身有微腫。

處方 茵陳四兩 大棗四兩

制法 水煎。

用法 分早晚二次服，臨服時，酌加冰糖，除飲棗湯外，并食已煮熟的紅棗。全身黃色晦暗者，禁用此方。

〔注〕經數年臨床試用，屢用屢效。

黃疸方

張桂珍

主治 眼球少有發黃，全身呈黃白色，但食量正常，周身發癢、懶動。

處方 上沉香四分 广木香二錢 皂莢一兩 木羅面

蜂蜜(酌加) 紅棗七個(去核皮)

制法 先將上三味研細，然後將其余藥品混合拌勻，制成丸用，百草霜為衣。

用法 分作三天服用。

黃疸方

施振飛

主治 黃疸。

處方 新鮮猪苦胆一个

用法 剪开，嚼服胆汁，每隔一、二天服用一次。

〔注〕服用法，但可拌賦形藥內或干燥用之。如嫌味苦，可加入一些調味品。

积聚臃脹类

腹水方

張桂珍

主治 全身水腫，按之不起，呼吸困難，不能平臥。

處方 蜈蚣七個

制法 在新瓦上焙黃為末。

用法 用黃酒沖服，忌鹽及猪肉各一百天。

腹水方

封子厚

主治 腹水(俗名河白脹)。

處方 活鯽魚一尾 麝香一分

制法 將活鯽魚去骨，搗爛，拌入麝香。

用法 上藥制成后，敷臍上扎好，一晝夜二、三次。

腹水方

閻冠華

主治 腹部脹滿，小便短少。

處方 甘遂三錢 麥冬三錢(焙) 广木香三錢

硃砂三錢 肉桂三錢

制法 共研細末。

用法 第一次服一錢，試用后可加至二錢，每隔日服一次。忌鹽百日。

双甲散方

火見良

主治 右肋痞块，肝脾腫大。

处方 蟹甲六錢 穿山甲一錢

制法 水煎。

用法 每日一剂，一次飲服。

急性浮腫方

李繼祖

主治 風水、全身浮腫。

处方 皮硝五錢 糯米粉四兩

制法 將皮硝投入糯米粉中炒黃。

用法 根据浮腫程度，成人可服一錢五分至三錢，几童量酌減。

十大功劳散方

孙燕謀

主治 虫积、食积、腹痛、热积、腹脹、痞滿等症。

处方 大黄八兩

黑丑一兩半(半生半炒)

白丑一兩半(半生半炒)

檳榔一兩

三棱一兩(炒)

蓬莪朮一兩(炒)

木耳炭一兩(將木耳入青竹筒內煨过取出应用)

紅糍一兩 牙皂一兩 榆面一兩 木通一兩

制法 右藥共研細末。

用法 每服三錢，空心姜湯送下，候下大便四、五次，即以溫米粥湯補之，必愈。

十面埋伏丸方

孙燕謀

主治 疳膨食积、虫积、积聚、寒积、肚脹、痞滿等症。

处方 巴豆霜二兩

榆面三錢

檳榔一兩

君子肉一兩

雷丸一兩

鶴虱一兩半

三棱一兩半(炒)

蓬朮一兩半(炒)

黃芩二兩

炒青皮二兩

制法 右藥共研細末，面糊为丸。

用法 每服三分至六分为止，清晨空心热湯送下，下便三、四次后，补以粥湯。

臃脹方

赵开亞

主治 腹脹如鼓，青筋暴露，面顏枯萎，脉弦急。

处方 陈胡芦一大片 黃酒一杯

制法 在瓦上焙黃，待冷后，研細末。

用法 將葫蘆末加黃酒放在碗內，开水冲服，每日

服一次。戒惱怒，忌食刺激物。

水腫病方

新海連市衛生科整理

主治 全身浮腫。

處方 田螺十個 生半夏三錢 麝香一分 葱 鹽適量

制法 將田螺、半夏、葱、鹽共搗爛，加麝香和勻。

用法 敷于臍下（丹田穴）一寸二分，連敷二、三次，一日一次。

〔注〕 本方原名麝螺散，可試用。

水腫方

鹿奉先

主治 頭面四肢及軀干浮腫，小便短少，腰痛，食

欲不振。

處方 蟾蜍一只 巴豆（連皮油）七個 砂仁七個

制法 將巴豆、砂仁塞入蟾蜍腹內，用膠泥將蟾蜍包好，在急火中燒至泥紅為度，然後去泥將蟾蜍研細末备用。

用法 一日二次，每次服三至四分，開水沖服。禁忌（一）孕婦禁服；（二）忌鹽及豬肉；（三）避免勞動，應絕對臥床休息。

腎臟性水腫方

新海連市海州區第一聯合診所

主治 先患腰痛，繼而小便短少，周身浮腫，口渴

形寒，食欲不振。

處方 西瓜

用法 根據病人需要，隨意服之。（可熬成西瓜膏

貯用。）

肝臟腫方

陳鳴璆

主治 寒熱，右肋下腫脹壓痛，曾有痢疾病史者。

處方 樟檳香各三錢 白芥子四錢 柴胡一錢

青木香三錢 蘇梗子各三錢 全瓜蒌四錢

薤白頭三錢 青皮三錢 川朴一錢

制法 水煎

用法 每日一劑，兩三天后，症狀即可慢慢減輕。

水腫外治方

邵漢民

主治 水腫，腿脚腰腹俱腫，面目亦腫。

處方 牽牛藤葉三大握

制法 置鍋中煎濃湯。

用法 趁熱盛于桶中，患者坐其上，周圍密裹，不使熱氣外洩。另用毛巾蘸水，頻頻摩洗腫處，水涼則停止，安臥床上。每天兩次或三次，一星期后，腫消神旺，行動如常。

水腫單方

胡湘泉

主治 水腫。

處方 老絲瓜絡三條(去子剪碎) 巴豆四十九粒(去壳)

制法 將巴豆和絲瓜絡同炒，俟巴豆深黃色，去巴

豆，入米三合，與絲瓜絡同炒至米黃為度，取米研粉為丸，如梧桐子大。

用法 每服三十粒，苡仁湯送下，曾試用有效。

痢疾類

痢疾方

顧克義

主治 紅白久痢、脫肛、作渴、飲食減少。

處方 黃連三錢 烏梅三個 升麻一錢 黨參六錢

制法 水煎。

用法 內服。

痢疾方

主治 痢疾。

處方 紅白扁豆花各十朵

紅白糖各一兩

生熟山查各一兩

制法 水煎。
用法 內服。

蒜茸丸方

孫繩武

主治 痢疾、水瀉。

處方 草麻仁三錢 獨囊蒜三錢 黃丹一錢

制法 共研末，打為丸，如芡實大。

用法 以一九納臍中，外用膏藥貼之。

痢疾方

康會蘊

主治 腹痛，大便下紅白粘液，里急后重。

處方 南山查一兩(研末) 蜂蜜一兩

制法 將上藥和勻，制成丸藥，每丸重一錢。

用法 小兒每次服一九，成人每次服三九，無論小

兒成人，每日均服三次。赤痢用白糖水送下，

白痢用紅糖水送下，如為赤白痢用紅白糖水

送下。

痢疾方

顧克義

主治 紅、白久痢，脫肛作渴，飲食減少。

處方 黃連三錢 烏梅三個 升麻一錢 黨參六錢

制法 水煎。

用法 內服

〔注〕 療效達百分之九十，系臨床驗方。此方治久痢，有熱性症狀者可以試用。如在痢疾初起，無論其為菌性痢疾或原虫痢疾，均禁用此方。

痢疾方

徐錫齡

主治 細菌性痢疾（初期）。

處方 黃瓜藤一兩（鮮的加倍）

制法 水煎。

用法 內服。

痢疾方

王養柏

主治 久痢不止。

處方 赤石脂末。

用法 每服一錢，米湯送下。

痢疾方

徐達邦

主治 赤白痢疾。

處方 檳榔五錢 冰糖一兩

制法 煎煮去渣。

用法 內服。

痢疾方

余瑞卿

主治 赤白痢疾。

處方 槐花一把 水芹菜一把

制法 煎湯。

用法 冷服。

痢疾方

應慕賢

主治 阿米巴痢。

處方 阿魏一味

制法 盛于膠囊內。

用法 每回用一、二枚。

痢疾方

高志明

主治 痢疾。

處方 白头翁三錢

山查炭三錢

銀花炭三錢

貫眾炭三錢

大黃一錢

制法 水煎。

用法 一日一劑，頭二煎分二次服。

休息痢方

新海連市衛生科整理

主治 痢下紅白，或瀉或止，時輕時重。

處方 臭椿樹根皮一錢五分至三錢 粳米三錢至六錢

制法 水煎。

用法 每日早晚各服一次，可連服三天。
〔注〕 下痢日久始可用。

泄瀉方

龔 鐸

主治 泄瀉。

處方 雞蛋一、二個

制法 將雞蛋外用艾叶包好，放入灶內灰火中約半

小時，艾叶得火，雞蛋亦熟。

用法 去壳服之。

血痢方

邵鶴云

主治 血痢。

處方 茜草根三錢 阿膠三錢 地榆三錢 炙甘草一錢

黃連一錢 黃柏一錢五分

赤石脂三錢

制法 水煎。

用法 內服（一般三劑取效）。

血痢方

伍克光

主治 赤痢。

處方 烏梅 胡黃連 灶下土各等分

制法 研細末，每服三錢。

用法 菜湯調服。

〔注〕 此為五代時陳應之驗方。

痢疾方

王養柏

主治 赤白痢。

處方 豆豉不拘多少（研細末） 大蒜適量

制法 搗爛如泥為丸，如梧桐子大。

用法 每服三十——五十丸，米湯送下。

水瀉方

吳汇川

主治 水瀉。

處方 炒山查一兩 生姜三片 紅糖半兩

制法 水煎。

用法 內服，可連用數次。

痢疾方

賴祖嘉

主治 紅、白痢。

處方 臘火腿四兩 冬瓜半斤

制法 將此二物切碎，加少量水，以文火煎煮兩小

時左右。

用法 一次或兩次服下，服一、二劑即愈。

痢疾方

徐七池

主治 一般性赤白痢

处方 鮮萊菔英一把 紅砂糖適量

制法 將鮮萊菔英搗汁，約一小碗，隔水蒸，微溫

置入砂糖。

用法 空心服，約服兩三次。即可治愈。

失血類

茜草丸方

張宏仁

主治 咳嗽吐血。

处方 茜草二兩 百部五錢

制法 研末，水泛為丸。

用法 一日三次，每次一錢半至二錢，開水送下。

吐血方

鈕福康

主治 咳嗽吐血。

处方 活龜數只

制法 炙成炭，研細末。

用法 陳酒送服，每日約一、二錢，分服，頓服均可。

吐血或咯血方

魏中濟

主治 肺、胃大出血，或咯或吐，出血成碗，病起

突然。

处方 川貝母四錢（研末） 藕汁 童便各半茶杯

用法 將藕汁和童便燉溫，沖服貝母。

〔注〕 據稱此為家傳秘方。用此方治愈大量吐血咯

血者很多，如病久出血者，用之亦效。

吐血方

劉明齋

主治 吐血。

处方 鮮梨一個（去核） 鮮藕一斤（去節）

鮮荷葉一張（干者亦可） 鮮茅根一兩

柿餅一斤（去蒂） 大紅棗十個（去核）

制法 水煎。

用法 代茶，飲數日，不問三年五載，或年久不愈

的，用之均效。

吐血方

戴玉海

主治 各種吐血。

处方 藕節三錢 蒲黃二錢 血余炭二錢

制法 水煎。

用法 內服。

吐血方

李良才

主治 吐血。

处方 茜草二兩 白芨五錢

制法 以上二味，和熟豬肉半斤，加水共煨，取濃湯。

用法 每天服一、二次，每次一匙。

吐血方

祝飛熊

主治 吐血

处方 桂元核

制法 煨灰，研末。

用法 內服可治吐血，外用可以止皮膚出血。

咳血方

宋光文

主治 面部潮紅，脈搏洪大而數，舌苔中黑而外黃。

处方 鮮荷葉一張 白芍三錢 生地三錢 芦貝母一錢

制法 以上四味，共搗為丸如綠豆大。

用法 共分三次服，一日服完。

便血方

趙云深

主治 便遠血、近血、腸風下血。

处方 槐花五錢 烏梅三枚 防風二錢 黃芩二錢

柿餅二枚 荊芥二錢 黃連六分 側柏葉五錢

制法 上藥共炒成炭，研極細末，置地面上一晝夜，

出去火毒，裝瓶密塞。

用法 每天兩次，早晚每服二錢（成人量），米飲湯送下。

〔注〕 忌食魚肉、辛辣、香燥屬物，孕婦禁服。

便血方

陳希齡

主治 便血（吐血亦可用）

处方 番茄

用法 生吃

便血方

武心广

主治 面黃瘦，下腹部作痛，大便帶血。

处方 臭椿樹根的皮一斤 紅沙糖四兩

制法 濃煎，去臭椿樹根皮，加入紅沙糖熬成膏。

用法 早晨空腹一茶匙，開水下。

腸風下血方

張鼎亞

主治 腸風下血。

处方 茄子數个

制法 用經霜茄子，連蒂燒，存性研末，空心酒下。

用法 每服二錢。

腸風下血方

繆心龙

主治 大便前后出血，别无他症。

处方 棉花子三十至四十粒

制法 將棉花子敲去壳，取肉，入鍋內炒黃，不可過焦。

用法 用水煎一次服下，隔日服一次。

虫病类

蛔虫方

清江九联診所

主治 蛔虫。

处方 木香一錢 檳榔二錢 苦楝根一兩

制法 水煎。

用法 內服。

蛔虫方

駱筱峰

主治 蛔虫。

处方 使君子仁十粒

制法 炒熟。

用法 日服二次，開水送下。

蛔虫方

賈振寰

主治 蛔虫。

处方 使君子三錢 石榴根皮三錢

制法 水煎。

用法 內服。

蛔虫方

陈彩云

主治 蛔虫。

处方 使君子三錢 白雷丸一錢半 烏梅肉八分

開口花椒十粒

制法 水煎。

用法 內服。

蛔虫方

清江四联診所

主治 蛔虫。

处方 檳榔五錢 使君子五錢

制法 水煎。

用法 每日清晨空腹先吃糖開水一杯，停十分鐘服藥。

蛔虫方

張益清

主治 蛔虫

处方 黑丑一錢半

檳榔二錢

使君子仁三錢

蕪荑一錢

錫灰一錢

雷丸二錢

川楝子皮二錢

鶴虱二錢

制法 水煎

用法 內服，幼童酌減。

蛔虫方

何少春

主治 蛔虫

处方 使君子肉 榧子肉各等分

制法 共研細末

用法 服時少加白糖，每服五錢，開水送下，小兒減半。

蛔虫方

何少春

主治 蛔虫。

处方 葱白汁一酒杯 菜子油几滴

用法 溫開水送下

驅虫方

楊彥林

主治 蛔虫（鉤虫、蟯虫，亦可試治）。

处方 刘寄奴子

制法 研細末。

用法 一至三岁小兒，每服一——三分，每天二、三次。

杀虫方

于墨龙

主治 鉤虫、鞭虫。

处方 煨綠矾四錢

檳榔八錢

甘草四錢

臭蕪荑六錢

陈皮八錢

雷丸四錢

厚朴八錢

榧子一兩

制法 上藥研成細末，用蜜混和备用。

用法 每次服八分，日服三次。

六味絲虫丸方

秦正生

主治 絲虫病。

处方 蒼朮二分 黃蘗二分 牛夕一分 薏苡仁二分

茯苓二分 蜂蜜適量

制法 先將五味研成細末，次用煉蜜為丸，如梧桐子大。

用法 每服三錢，日二次，早晚飯前開水送下，連服十日，停三日，再服十日即可痊愈。如為晚期以愈為度。

四味鉤虫丸方

秦正生

主治 鈎虫

处方 榧子肉一兩 茅蒼朮一兩 煨紅皂硃六錢

檳榔三錢

制法 共研細末，水泛為丸，如梧桐子大。

用法 每服二錢，日二次，開水送服，以愈為度。

鈎虫皂鉄丸方

孟乐天

主治 鈎虫。

处方 皂硃一兩 鉄屑一兩 紅棗肉二兩

制法 先將皂硃、鉄屑同放瓦罐內，在炭火上煨三

小時作紅色，烟尽取出，另將紅棗肉煮爛，

共搗為丸如梧桐子大。

用法 每服一至三錢，開水送服，早晚各一次，以

愈為度。

鈎虫單方

清江四聯診所

主治 鈎虫。

处方 炒熟榧子肉。

用法 作日常零食，頻食之，服至五十至一百粒，

多效。

蟯虫方

臧金台

主治 蟯虫。

处方 生白果。

制法 搗糊。

用法 敷肛門上。

虫积方

孫世敏

主治 虫积腹痛。

处方 台烏藥三錢 千百合四錢

制法 水煎。

用法 每日服一劑，連服十日。

棟根煎方

張宏仁

主治 蛔厥心痛及其他心、胃、腹痛。

处方 棟根皮三錢 烏藥二錢 陈皮一錢 茴香五分

制法 水煎。

用法 每日服一劑，共服兩劑至三劑。

牛郎丸方

張宏仁

主治 虫积及胃痛，反胃、胸痞、癥瘕、便閉。

处方 黑丑一兩 白丑一兩 檳榔一兩五錢

制法 研末糊丸。

用法 五更服三錢至五錢（應視體質強弱而定），冷

开水下，十日一服，病愈为止。

癲癇类

癲狂病方

楊樓村

主治 神經錯亂，言語失常，有时奔走喊叫。

处方 川玉金一兩(晒干) 明矾八錢 粳米二兩

制法 共研細末，溫水和丸，如黃豆大。

用法 每服十五丸，每晨服一次，開水送下，連續服用。

癲狂症方

新海連市衛生科整理

主治 突然发作，神志錯亂，笑罵不休，語无倫次，甚或跳跃奔走。

生桐油一兩 鷄蛋二个

制法 將蛋打开去壳，以桐油煎炒。

用法 劝病人一次吃下，如未彻底治愈，可隔一天再服一至二次。

服后有嘔吐、腹瀉等反应，排泄物均为白色粘液，約二、三小时即止，病人但覺疲倦嗜眠。

〔注〕

舞蹈症方

楊从恂

主治 舞蹈症

处方 广玉金四兩 生明矾四兩

制法 为末，水泛为丸。

用法 每服三錢，開水送下。

癲丸方

瞿心石

主治 癲癇

处方 大黃三錢

元明粉三錢

青礞石一兩

陈胆星一兩半

陈皮一兩半

半夏一兩半

枳实二錢

沉香三錢

制法 研末制丸，以辰砂三錢为衣。

用法 日服三錢。

羊癲风方

主治 卒然抽搐，暈倒，口中流液，角弓反張，兩眼直視，声如羊叫。一日一发，或間日一发。

处方 羊心一个 月石一錢至二錢

制法 將月石末裝在羊心內，放鍋中煮熟。

用法 連湯服食，每天吃一个，不能間断，連吃十余个即愈。

羊癰風方

胡守忠

主治 突然暈倒，不省人事，間歇發作。

處方 梟鳥一只

制法 將梟鳥殺死，去內臟用開水燙去毛，洗淨，

加水煮熟。

用法 分三次服下（連湯帶肉）

破傷風、狂犬病類

編者按：本類內斑蝥系劇毒藥品，

用時要與中醫師研究後使用為妥。

破傷風方

鹿奉先

主治 牙關緊閉，角弓反張。

處方 白花蛇一條 麝香六錢 獨頭蒜七個 葱鬚七個

制法 先把白花蛇搗碎，後入麝香等凡味藥，共搗

為膏，用紗布包。

用法 手握出汗即愈。

破傷風方

佚民

主治 破傷風

處方 (一)活蚯蚓一條 麝香一分 (二)全蠍末一錢
制法 將第一方共打爛成餅，敷臍下一寸二分。
用法 第二方分二次內服。

破傷風方(一)

蔡鑑

主治 破傷風

處方 荊芥 江鯀(南貨店有售俗名魚肚鯀) 黃蠟
艾葉各一兩

制法

先將江鯀剪成條子，用文火微炒至色黃為度，
後與上藥一起放入瓦罐內，加入好陳酒一斤
至一斤半、豆腐皮扎口。隔水溫蒸一支香時
間。

用法 一次服完。每日服一劑，至全愈為止。

破傷風方(二)

主治 破傷風初起，病邪在表，用上方加用本方。

處方 蜈蚣二錢 江鯀三錢 南星二錢五分

防風一錢五分

制法 各為細末，水泛為丸。

用法 每日二次，每次二錢，陳酒送下。

破傷風方

寶永達

主治 手足振顫，頭頸強硬，角弓反張，聞聲則驚，心煩不安。

处方 血竭花三錢 粉儿茶三分 制乳香三分(去油)

斑發五个(去头、尾、米炒) 制沒藥三分(去油)

上前尖三分 硃宝砂三分

制法 共研末。

用法 黃酒一次送服。

〔注〕 此方系民間傳方，經本人使用，已經治愈二人。

破伤风方

劉繼奎

主治 发热、畏寒、口噤歪斜、項背強直、角弓反張。

处方 蜈蚣一条 全蠍七个 粉草四兩 天麻三錢

白芷三錢 当归三錢 川芎三錢 荆芥三錢

防风三錢

制法 前藥九味，用新汲水三碗煎至半碗。

用法 服后，盖被使出汗，隔三小时服二煎。

狂犬病方

吳繼民

主治 口吐涎沫，牙关紧閉，神志不安。

处方 乳香二錢 雄黄八分 硃砂五分

斑發七个(去翅、足，大米炒黃)

制法 共研为末。

用法 分兩次冲服，每次用黃酒半兩，服完即愈。

狂犬病方

趙平恕

主治 角弓反張，頸強直，牙关紧閉，抽搐畏水。

处方 当参三錢 独活三錢 桔梗三錢 茯苓三錢

前胡三錢 柴胡三錢 川芎三錢 枳壳三錢

地榆一兩 羌活三錢 粉甘草五錢 紫竹根八錢

生薑三片(引)

制法 水煎。

用法 內服。

狂犬病方

殷錫琪

主治 在被狂犬咬伤后，未发病前，服本方可預防病发。

处方 (一) 斑發五錢 輕粉二錢半 木鱉子一兩

(二) 沉香片一錢 生虎骨一錢 飞滑石二錢

生大黃一錢 金匱腎氣丸二錢

制法 用面粉半斤，釀成老酵，將第一方藥物帶整

放于其中，再放在柴火上熏燒約一小時許，

以无烟为度，用鉗取出放于磁罐內，約四十

八小时取出研末，再加第二方共研細末，貯

瓶备用。

用法 每隔七天服一次，每次一錢至一錢半，用黃

酒調吞，黃酒送下。輕者服三次，重者服六次至十次，再加服全匱腎氣丸，每晨五至六粒。

〔注〕 据献方者称：三十年来約經四百个病例使用，都有預防功效。

狂犬病方

叶心銘

主治 作疑似及預防用，发作时亦可用。

处方 地榆二兩

制法 水煎。

用法 內服。

〔注〕 本方来自民間，应連用三天。

瘋狗咬傷方

顧書玉

主治 瘋狗咬伤。

处方 麝香五厘

斑猫二分(糯米粉炒，以米黃为度)

乳香二分

沒藥二分

老石滑石二錢

制法 上藥共研細末。

用法 在半夜时一次服。小兒及身体虛弱者，依其

年齡酌減。服藥后，待小便解下十余次，給以黃連五分，童木通五錢，生草梢一錢，煎服。

〔注〕 煎剂应預先煎好，待冷后服之，可解其毒。

服藥后、如嘔吐，可用冷开水止之；孕婦忌服。

狂犬病方

胡淑身

主治 狂犬咬伤。

处方 斑猫七个(去翅足) 上銀珠一錢

制法 用鷄蛋一个，在一头打一小口，將蛋白倒去

五分之一；裝入上藥，外用桑皮紙包加麻扎好，埋豆稽文火燒熟。

用法 早晨用白开水送吞。

泌尿病类

二便不利方

黃香如

主治 二便閉塞。

处方 連翹七莖

淡豆豉五錢

生姜三大块

食鹽三錢

制法 上四味搗爛，作一餅錠。

用法 將餅烘热，掩盖臍上，以布扎之。

〔注〕 此法可通小便。

白濁方

主治 五淋白濁。

处方 鷄蛋一个 黃連粉五分

制法 在鷄蛋尖端打一小孔，瀝去蛋白，納入黃連粉末五分，用竹杆攪和後，再用紙封口燉熟。

用法 用陳酒過服，約服三、五个即愈。

淋疾方

董介先

主治 五淋白濁。

处方 地肤子 紅花 木通 蚕砂各二錢

制法 水煎。

用法 內服，以愈為度。

小便頻數方

徐錫齡

主治 小便頻數

处方 党参三錢 炙黃芪三錢 当归三錢 淮牛膝三錢

制法 水煎

用法 內服

小便癰閉方

陳叔文

主治 小腹胀大，上逆大腹，小便不下，气逆不降。

处方 大黃四錢 紅花一錢 猪苓四錢 泽瀉四錢

生甘草一錢 长头发一扎(皂水洗净)

制法 水煎。

用法 內服。

尿閉外治方

曹明哲

主治 小便癰閉。

处方 陈麦柴二、三斤

制法 水煎沸，盛便桶內。

用法 病人坐桶上。

〔注〕 治結石无效。

小便癰閉方

許龙云 国强

主治 小便癰閉，或陡然不通。

处方 活螻蛄(俗名土狗)一只 麝香五厘

制法 先將活螻蛄搗爛，加入麝香。

用法 將此藥放在臍部，然後用膏藥貼之。

二聖散方

孫繩武

主治 尿閉。

处方 甘遂少許 活鯽魚少許

制法 共搗研如泥。
用法 敷臍部。

小便不通方

宋仲开

主治 小便不通。

处方 木通二錢

飞滑石四錢

車前子四錢

生草梢一錢

梔子三錢

灯芯八寸

升麻二錢

制法 水煎。

用法 內服。

〔注〕 根据症狀，升麻可多增一錢、服二、三剂。

小便不通方

嘉定县卫生科

主治 小便不通。

处方 車前草一棵

独囊大蒜一枚

田螺二枚

制法 加鹽少許，共同搗爛。

用法 烘熱貼臍上，布条縛束。

小便不通方

計志霖

主治 小便不通。

处方 蜈蚣一条 麝香五厘

制法 打爛

用法 貼在臍上

小便淋痛方

嘉定县卫生科

主治 病后小便时，尿道刺痛，甚則見血。

处方 金鈴子二錢 木通五分

制法 水煎

用法 一次飲服，每日一剂。

血尿方

包元 董介先

主治 小便出血。

处方 胡麻二錢

制法 研末，水二碗，浸一夜。

用法 翌立日煎沸溫服。

血尿方

黃秀峰

主治 尿中帶血絲。

处方 豆豉一兩

制法 水煎。

用法 內服。

淋濁方

高尙志

主治 淋濁。

处方 鮮土牛膝（即臭花娘子）

制法 煎湯。

用法 內服。

小便淋痛方

周春三

主治 小便淋痛不爽。

处方 將軍（蟋蟀）二——三只

制法 煎湯。

用法 連服三日。

尿道炎方

劉以棟

主治 小便短赤頻數，一日數十次，便時疼不可忍，

牽引小腹，舌苔薄黃，脈緊，發熱，煩渴。

处方 川草薢二兩

制法 鹽水泡炒，研成細末。

用法 一日三服，分六次服完，白開水沖服。

尿閉方

陳志賢

主治 小便不通。

处方 葱白頭一斤

制法 將葱白頭入鍋炒熱，作餅一個。

用法 乘熱貼臍下，小便即通。

尿閉方

蘇維三

主治 小便不通。

处方 桂枝一錢 黃柏二錢

制法 研細末。

用法 開水送下。

〔注〕 據獻方人稱，系家傳良方。

血淋方

蔡敬倫

主治 小便短赤，帶血，尿時疼痛難忍。

处方 川軍末一兩 鷄蛋七個

制法 將鷄蛋一頭打一小洞，蛋清倒出，把川軍末

放入，文火燒之，待鷄蛋熟為止。

用法 一日三次，每次服一個，開水下。

〔注〕 忌食刺激性食物。

血淋方

陳廷章

主治 血淋。

处方 白鷄冠花

制法 燒灰存性。

用法 米湯調服三錢。

乳糜尿方

談泉奇

主治

尿似牛乳或豆漿色，有时又呈紫紅或灰色，沉淀如血絲狀，尿时毫无痛感。小便常規檢查：蛋白質与紅血球增多。

处方

糯稻根

制法

每次用藥五至七錢，洗淨煎水。

用法

內服（头二煎），五、六次可愈。

〔注〕

据献方人称，曾患此病时近一載，中藥服百余剂无效，西藥服海群生亦不見效。此病大多为絲虫病引起了后果，淋巴綫管为成虫阻塞所致。此方曾治愈多人，惟对年深日久者，效果不显。糯稻根原为治盜汗之藥，即使不滴乳糜尿病症，服入亦无副作用。

杂病类

腦膜炎方

葛万如

主治

早期腦脊髓膜炎。

处方

皂莢（不拘多少）

制法

置瓦片上，上面再盖一块瓦，煨焦后，取出

研碎，过篩备用。

用法

用噴鼓（自来风）將此藥末噴入患者鼻腔，即

不断流出清涕，清涕停止后，即愈。

阳萎方

黃秀华

主治

阳萎不举（神經性阳萎）。

处方

淫羊藿三錢 复盆子三錢 炒杜仲五錢

枸杞子三錢 破故紙三錢 姜豉四錢（蜜水拌）

制法

水煎。

用法

內服。

關尾炎方

余公俠

主治

關尾炎，中医名为腸癰，右腹盲腸部疼痛，

发热嘔吐等。

处方

生大黃 芒硝 桃仁 丹皮 冬瓜子

当归尾 赤芍 薏苡仁 陈酒

制法

水煎。

用法

每日一剂，煎兩次，分二次服。

〔注〕

本方未注剂量，如需服用，請与当地中医联系，視病情輕重而配以剂量。

遺精方

赵云深

主治

遺精、盜汗、白淫等症。

处方

黃柏五錢 牡蠣八錢 龟板八錢 芡实五錢

金櫻子五錢 甘草二錢

制法 研為細末，和糊為丸，如桐子大。

用法 每晚臨睡前一小時服三錢，用淡鹽水送下。

〔注〕 禁忌辛辣、煎炒等類食品，切戒房欲。

虛汗方

徐一桂

主治 大病將愈未愈時，冷汗淋漓者。

處方 黃耆皮一錢五分 地骨皮三錢 浮小麦三錢

糯稻根一束

制法 水煎

用法 內服

盜汗外用方

夏海珊

主治 自汗、盜汗。

處方 龙骨二錢 牡蠣二錢

制法 共研細末

用法 用紗布包，扑身上。

氣瘰方

李春霖

主治 氣瘰（甲狀腺腫）。

處方 海藻 昆布各二兩 陳酒一斤

制法 將海藻切碎，放入陳酒內，浸一星期。

用法 每服二〇西西，一日三次。

補血丸方

嶧山防治站
正儀中醫治療組

主治 因寄生蟲病引起的貧血

處方 潞黨參四兩 廣陳皮二兩 全當歸一兩

蒼朮三兩 甘草一兩 川原朴二兩

淡附片二兩 針砂四兩

制法 香附二兩（醋燉、透水，飛細末）

制法 以上十一味研末，用黑棗一斤煮爛，去皮核，

搗和為丸，如梧桐子大。

用法 成人每日三錢，分二次服，飯後開水送下，

兒童減半。

貧血方

王鈞啟

主治 面黃消瘦，四肢無力、痠楚，飲食減少，勞

動則頭暈心悸。

處方 生公鷄血一兩 大麥粉二兩 皂莢一兩

紅糖二兩

制法 先將大麥粉、皂莢、紅糖、三味共研，然後

和鷄血，為丸如綠豆大。

用法 每晚一次，服二至三錢，開水或糖開水送服。

傷心丸方

張宏仁

主治 犹思伤神，面目憔悴，失眠健忘，头目暈眩，

喜怒失常。

处方

远志肉二兩

石菖蒲二兩

龟板二兩

生釘代赭石一兩

茅虎三兩

灵磁石(煨)八錢

制法

共研細末，水泛为丸。

用法

一日三次，每次一錢至一錢五分，开水送下。

糖尿病方

黄桥中医联合診所

主治

口渴引飲，小便多，帶有甜味。

处方

淮山藥一兩

大生地一兩

鷄內金三錢

生黃芪五錢

淨山萸肉五錢

生猪胰子三錢

制法

水煎。

用法

每日一剂，头二煎分二次服。

吐瀉方

林世圻

主治

小兒吐瀉或妊娠嘔吐。

处方

灶心土二兩

制法

水煎。

用法

取清汁內服。

水蛭入肛門方

主治

夏日在不洁的河水中游泳，而水蛭鑽入肛門

內。

处方

蜂蜜一兩

制法

开水冲。

用法

一次飲服。

〔注〕

經試驗，水蛭和蜂蜜放在一起，約經一刻鐘左右即死去。

按：內服是否有效，尙待研究。

大头瘟方

陈金生

主治

頸項发直，角弓反张，繼以昏睡，重者数日

即死。

处方

皂矾一兩

制法

焙焦研末。

用法

由鼻孔慢慢吸入，再用公猫尿蘸棉花塞耳內，

当日即愈。

〔注〕

此方系外治法，可以試用。

失眠方

周宗黃

主治

神經衰弱失眠症。

处方

合欢皮

夜交藤

酸棗仁

珍珠神

花生叶各三錢

制法

水煎。

用法 临睡前半小时服。

失眠方

施乃明

主治 失眠及多夢不安。

处方 落花生叶三兩

制法 水煎。

用法 分三回服。

乳房結核方

王健行

主治 男子乳房結核，并无紅腫疼痛。

处方 蓮房炭 煨牡蠣各等分

制法 研末

用法 每用二錢，黃酒燉溫送下，每日二次，連服一周。

棉子油中毒

顧錫才

主治 棉油中毒，无汗怕熱、羞明，妇女有經水不行者。

处方 生石膏六錢

制法 煎剂

用法 內服

睪丸炎方

王肇潤

主治 睪丸腫大疼痛，小便短黃發燒。

处方 篇蓄叶一斤

制法 煎一碗，加白糖四兩，露一夜。

用法 早晨空腹服。

睪丸腫大方

何尽孫

主治 睪丸腫大。

处方 黑牛胆一个 黑料豆适量

制法 在冬至日將牛胆上边剪一小口，把黑料豆裝入，以滿为度，挂在簷下，至九九八十一天后，取豆四、五十粒，瓦上焙干为末，用黃酒一兩，送下連服二、三日即消。

腸疝方

佚名

主治 腸疝（小腸气）。

处方 好醋二斤 鉄錘一个

制法 將鉄錘在炭火內燒紅，投入醋罐內，罐口蒙以青布，使患处靠近罐口。

用法 以上法熏蒸阴囊和患处，可收消腫止痛之效，脫腸亦可上升。

闌尾炎方

林衍五

主治 慢性闌尾炎。

处方 紅藤一兩 敗醬草五錢 黃芩三錢

制法 水煎。

用法 加陳酒十至二十西西，沖服。

〔注〕 紅藤，藥店沒有出售，須自采。

肝 阳 类

高血压方

張 恕

主治 高血压症，头重脚輕。

处方 生赭石二兩 杭麦冬三錢 生白芍五錢

怀牛膝四錢 旋复花三錢 石决明四錢

法半夏四錢

制法 用鉄銹水煎。

用法 每日一剂，头二煎分二次服。

土苓草薺飲方

李古松

主治 梅毒

处方 鮮土苓一兩(分二次磨冲) 生黄芪三錢

青防风一錢半 山党参三錢 汉防己一錢半

粉草薺三錢 生甘草一錢 黑大豆一兩(杵)

制法 水煎。

用法 內服，以愈为度。

〔注〕 禁忌：五金、茶醋。

外科門

瘡瘍類

褲腿風方

郭言德

主治 膝以下久潰不愈的瘡瘍、潰瘍、發紫暗色，

濃水淋漓。

處方 密陀僧三錢(研細) 百草霜五錢 白蠟五錢

梅片五分

制法 用麻油五兩，和密陀僧文火煎熬，至滴水成

珠后，再下百草霜、白蜡、梅片，一分鐘即成。

用法 然后倒在碗內，待冷后按瘡面的大小敷涂一

薄层，油紙包，一、二日一換。

臙瘡方

丁明森

主治 臙瘡、下腿潰瘍。

處方 紫花地丁適量 桐油一兩

制法 搗糊。

用法 敷患處。

臙瘡方

王承彥

主治 臙瘡。

處方 銅綠 樟腦 猪板油。

制法 共搗成膏，攤布上。

用法 貼患處。

〔注〕 本方銅綠、樟腦未列用量，可酌用百分之十。

臙瘡方

朱崇馨

主治 臙瘡久不愈。

處方 紅棗十個 葱根十個

制法 共搗爛為餅。

用法 貼瘡上。

臙瘡方

張桂珍

主治 下腿潰瘍。

處方 銅綠二錢(研細) 鉛粉二錢(研細) 黃丹二錢(研細)

黃蜡四錢 血余一團(研細) 桑樹根一兩

制法 用猪脂四兩，將桑樹根入內炸黑，把渣除去，再入上藥收成膏。

用法 敷于患处。

外科簡易方

陈楚材

主治 久病不能轉側，腰背臀部发生破皮潰爛之瘡，

如碗大，膿水淋漓。

处方 川黃連四分 太乙粉六分 冰片少許

制法 共研細末。

用法 搽于患处。

肥皂單方

胡逸松

主治 外科瘡瘍面与周圍，長一种討厌的浮膜与硬

边，膿头鉗不出。

处方 肥皂少許

用法 切成薄片，盖于瘡上，貼以敷料。次日患部

奇痒难忍，揭开一看，膿头便順利的流出。

〔注〕 勒柏辛斯卡娅氏学說云：「碱性（重曹）能中

和肌肉疲倦的乳酸，加强組織的新陈代谢。」

故效。

外用方

陈国梁

主治 对口疔瘡、癰疽搭背、一切瘡瘍、大毒不能

出膿收功。

处方 蚰蜒 寒水石各等分

制法 將蚰蜒搗爛，寒水石研末，合入一起，日晒

夜露使干，再研为極細末，用瓶收存备用。

用法 从提膿起一直到收功为止，都是用这一种藥，

用普通膏藥貼之。

洪宝丹方

江靜波

主治 消散一切阳性腫瘍。

处方 南花粉一斤 黃柏四兩 白芷三兩

赤芍四兩 生大黃八兩 黃芩八兩

生甘草四兩 姜黃八兩 天南星二兩

種蚕八兩 陳皮四兩

制法 共研細末。

用法 用蜜調敷（靜按：用凡士林調敷亦可）。

〔注〕 此为大港沙派外科金不换方。

金箍散方

江靜波

主治 收束阳性腫瘍之根脚（适宜于部位較大者）。

处方 生大黃八錢 姜黃四錢 黃芩二錢 赤芍一錢

花粉一兩 白芷二錢 陳皮二錢 甘松二錢

制法 共研細末。

用法 用蜜（或凡士林）調敷。

〔注〕 此为大港沙派外科金不换方。

清露散方

江靜波

主治 消散一切阳性腫瘍。

处方 冬桑叶四兩 芙蓉叶四兩 梅片五分

制法 共研細末。

用法 用蜜調敷。(靜按：用凡士林調敷亦可)

〔注〕 此为大港沙派外科金不换方。

翻花瘡方

李春林

主治 翻花瘡。

处方 綫香(即香店卖的香)

用法 燃点熏灼患部。

〔注〕 按〔医宗金鑑〕对頑瘡、用桑柴熏法，可參考。

烏梅散方

沙亦恕

主治 仅長肉芽，不易生皮。

处方 烏梅四兩 冰片少許

制法 共為細末。

用法 干搽。

宿瘡方

蕭公碩

主治 足脛潰腐，痒瘡。

处方 輕粉一錢 牡蠣五錢 煅石膏五錢 黃柏二錢

制法 右藥各研細末，貯用。

用法 用熟菜油將上藥調稠，敷于患處，日二次。

八黃散方

包昌瑞

主治 宿瘡久不收口。

处方 西黃五厘 西珀末二分 浮水甘石一錢五分

制法 上藥研細末。

用法 以少許藥末干撒患處，上蓋膏藥，早晚各一

次。

腿部潰瘍方

李協凡

主治 潰瘍及兼皮炎(俗名爛水瘡)。

处方 干蚯蚓 百草霜 熟石膏各等分

制法 共研細末。

用法 敷于患部。

附骨疽方

劉猷洛

主治 急性或慢性的附骨疽(多生在大腿內側或外

側)。

处方 谷糠十斤

制法 粗細皆可，用淨水二十斤，泡浸二十四小時，

再用布袋過濾去滓澄清，將清水入鍋熬至成膏為度。

用法 攤在布上，敷貼患处。

附骨疽方

趙德修

主治 每在腓脛骨的前面，一塊如銅錢大，邊緣整齊，周圍呈青紫色。

处方 辛裏花七個（細末） 猪脂二兩

制法 搗和一起成膏。

用法 用表心紙七、八層，涂于紙上，貼患处，七日后去之。

背疽方

丁辰

主治 發背疽。

处方 土龙粉（蚯蚓糞，韭菜田內的為佳）

水龙粉（旧船船底縫中的油灰）

制法 晒干研末，除去雜質，研細，各五錢，加梅片二分和勻。

用法 互研極細，同時以桐油調成厚糊，平攤紙上蓋貼，日換一次，輕症三、四次，重症五、六次可愈。

〔注〕 如愈合不快時，可加入鰲血。

癰腫方

汪主恩

主治 癰腫初起。

处方 白芥子末一兩 鷄蛋白一個

制法 將二者調成稀糊（芥子必須研得很細，除去雜質，如果太陳無辣味，效力就差）。

用法 敷在患处，用布扎住。

串癰方

紀云光 華強

主治 串癰類似骨疽，患于腿部，不紅不腫，上下流通，疼痛不已，腿形成干癰，難以行走。

处方 松香三兩（研細末） 燒酒一匙

用法 用酒調松香，敷于患处，約一分厚，然后用雙皮紙裹之，再用紗布圍好，過了兩天去紗布、雙皮紙和松香，約一周自脫。

乳腺炎方

羅昌華

主治 乳腺炎初起，尚未化膿者。

处方 新鮮夏枯草二至三兩

制法 于石臼中搗爛，布包絞取汁（如汁不易絞出，搗時可略加水分）。

用法 晚上睡前將搗取的夏枯草汁在鍋中隔水燉

溫，加酒一杯（如能飲酒，可多加一些，以致大醉為度）溫服，服後即臥。同時并將夏枯草的渣滓敷患處扎緊，一日一次，兩日可愈。

蜂窩織炎方

李孔德

主治 蜂窩織炎（如手發背類）。

處方 蜂房一個 梅片二錢 破雨傘紙一大塊

制法 將梅片裝到蜂房里，用傘紙包裹，用桑柴燒透成炭，共為細末。

用法 每天上二、三回，外以凡士林膏貼蓋，全愈為止。

鬍頭肉方

無錫市衛生局

主治 鬍肉外突。

處方 黃豆芽（去芽取瓣）

制法 打爛。

用法 塗在鬍肉上，每日更換三、四次，數日後鬍肉自行脫落。

收斂散方

包昌瑞

主治 指頭肌肉外翻。

處方 熟地炭 烏梅炭各等分

制法 研細末，混和备用。

用法 用藥少許撒患處，日三、四次。

〔注〕 亦有止血作用。

臙瘡方

新沂縣王肇潤

主治 下腿潰瘍。

處方 龙井茶葉

制法 泡濃，洗患處，洗后用爛的茶葉貼患處，數次即愈。

三仙丹方

許堯階

主治 初期臙瘡，功能提膿拔毒。

處方 紅昇一錢 生半夏五分 冰片三分

制法 研細末。

用法 黑油膏藥貼用。每日換一次。

生肌散方

許堯階

主治 瘡面日久不斂，瘡面膿液減少時，即可用此生肌收口。

處方 密陀僧一兩（飛） 飛滑石五錢 輕粉三分

冰片三分

制法 研極細末。

用法 膏藥貼用，功能生肌收口，數日即愈。

〔注〕 獻方者原注云：祖傳中医外科已三世，上方使用已有一百多年的历史，其效卓著。

陰囊腫潰方

成駿

主治 性病后陰囊腫潰。

处方 百草霜（老鍋底心刮取） 蚯蚓各等分 冰片少量

制法 打爛調和。

用法 塗擦患部，數次即愈。

流注方

聶耀堂

主治 濕痰流注（寒性膿瘍）。

处方 紅棗七個 芫花二錢（醋炒）

制法 紅棗去核，同醋炒芫花。

用法 煎服。

〔注〕 服后即瀉下數次，如覺瀉太劇，飲米湯可止。

疔瘡類

疔瘡走黃方

王仁裕

主治 疔瘡走黃

处方 水芭蕉根八兩

制法 洗淨切片，放在石臼內搗爛，用消毒紗布絞汁。

用法 冷飲之，俟痙厥略停，再續服二、三次。

敷疔方

孫繩武

主治 疔瘡初起。

处方 生山藥 白糖

制法 打爛如糊。

用法 外敷。

疔瘡方

趙雨亭

主治 疔瘡。

处方 遠志一兩

制法 蒸過，打爛酒調。

用法 外用。

〔注〕 視瘡之大小，可酌加藥量。

拔疔方

孫繩武

主治 疔瘡。

处方 蜣螂一只（活研） 白砒少許

制法 面糊為丸。

用法 用刀挑破疔瘡，將一粒放在瘡頂，以膏藥貼上，惡血一夜即拔出。

蛇头疔方

孫敦典

主治 蛇头疔。

处方 雄黃一錢 蟾酥二分

制法 共研為末，用鷄子一個打一洞，將藥放入。

用法 將患指插入鷄子。

疔瘡方

周岩道

主治 一切疔瘡初起。

处方 鬼螺絲四錢 丁香二錢 冰片一錢

制法 鬼螺絲、丁香，分別取置瓦上，文火炙之，

以无烟為度，共研細末，再入冰片，磁瓶密閉備用。

用法 使用時取少許，置小膏藥上，貼患處。

〔注〕 鬼螺絲，一名石海螵，在阴湿牆脚下可以尋到。

山藥膏方

嘉定縣衛生科

主治 疔毒初起或手指頭面瘡癰紅腫。

处方 山藥一兩 白砂糖一兩

制法 同杵爛。
用法 敷患處，一日換數次。

解毒丹方

劉鶴山

主治 一切疔瘡。

处方 广相黃(大黃)一兩 腰黃二兩 巴霜五錢

制法 共研細末，水泛為丸二百五十粒，每服二九至三九。

用法 野菊叶泡茶送下。

唇疔方

劉鶴山

主治 反唇疔。

处方 五谷虫一錢 蟾酥三錢 紅信三分

制法 共研細末。

用法 每用一、二厘，以水調和貼于瘡頂上，用膏藥蓋之，以免散失藥性。

疔毒方

呂四聯合診所

主治 疔毒(即炭疽)

处方 蜣螂虫一只

制法 置石灰罈內，將水分吸干，研末。

用法 敷于疔毒上，外用膏藥蓋住。

疔瘡外治方

張省之

主治 疔瘡不論發生在面部或手足部，不論初起或化膿階段。

處方

生山梔三錢

生大黃三錢

生皂角三錢

白川六粒

生薑(去皮)三錢

葱白四錢

元醋五錢

銀硃一錢半

制法

先將山梔、大黃、皂角、生薑搗碎，再將葱白、白川、元醋，加入共搗如泥，做成圓形的球樣，如核桃大，以銀硃為衣。

用法

令患者吃熱粥或喝開水後，側臥，位呈蝦形，將此藥球放手心中，兩手合攏(莫把藥球弄碎)置于褲裆下，合眼睡眠一至二小時後周身出汗，其痛漸止，全身症狀逐漸消失，局部腫脹亦漸消除。第二天如未痊愈，可再將此藥球加醋搗如泥，作成球形(不加銀硃)，仍以上法治之。初起者即消，已成者促其及早化膿及出膿而愈(局部可配合外科處理)。

皮膚病類

頑癬方

曹登州

主治 頑癬及禿瘡。

處方 斑蝥三個 生半夏五個

制法 共為細末。

用法 用此藥粉干搽，外貼膏藥，數小時患處起水泡，用銀針刺破。

黃水瘡方

朱學周

主治 黃水瘡。

處方 蚕豆衣(即蚕豆壳，不是莢)

制法 炙灰研細末。

用法 麻油調敷患處。

〔注〕 即蚕豆壳，不是莢。

綉球瘋方

鈕福康

主治 綉球瘋(陰囊濕痒)

處方 苦參片 蛇床子 皂矾各七錢

制法 煎湯。

用法 乘熱薰洗。

蒼耳茄根膏方

陳鵬鶴

主治 頑癬及一般頑強皮膚病。

處方 鮮蒼耳草五十斤 茄子根十斤

制法 一起搗爛取汁，熬成膏。
用法 塗敷患處。

皮膚皸裂方

陳步峰

主治 皮膚皸裂（兼治凍瘡）。

處方 苦楝子（不拘多少）

制法 煎湯。

用法 洗患處，又可用楝子肉搗爛搽患處。

遇仙丹方

江靜波

主治 治一切濕熱、爛皮、毒水淋漓者。

處方 蝦蟇粉六錢 熟石膏四兩 青黛二錢 梅片三分

制法 共研細末。

用法 淨麻油調敷。

〔注〕 此為大港沙派外科金不換方

禿髮方

劉順堂

主治 鬚鬚頭、禿髮。

處方 駝油

制法 將駝油放到鍋里，象熬豬油一樣，讓它冷固。

用法 用布沾油抹患處，不待干再繼續塗抹，約半

月可愈。

〔注〕 用此油治療前，要有三個月未經其他治療，才能有效。

鬚鬚頭方

劉應璠

主治 鬚鬚頭（頭部白癬）。

處方 大蜂房一具 硫黃五錢 烟膏一兩

制法 上藥共研細末，菜油二兩熬熱調勻。

用法 塗敷患處。

癬病外用方

朱松聲

主治 癬病。

處方 灯草

用法 以灯草少許，摩擦患處，使表皮充血，如是

三、四次，即可告愈。

鬚鬚頭方

趙伯

主治 鬚鬚頭

處方 輕粉一錢 密陀僧三錢 青黛一錢 白蜡二錢

蜈蚣三條 黃丹二錢

制法 共研細末，用烟油調。

用法 搽數次即愈。

禿瘡方

沈純濟

主治 白禿瘡

處方 雄黃二兩

蜜中紅土基四兩

百草露一兩

輕粉五錢

胆凡六兩

榆白皮四錢

制法 共研末。

用法 剃頭后，用豬脂油調搽，再剃再抹，三次可

愈。

禿瘡方

沈純濟

主治 紅禿瘡、落發。

處方 牛角 羊角各等分

制法 研末。

用法 豬油調涂。

治癬方

李挹江

主治 牛皮癬。

處方 土槿皮不拘多少

制法 將土槿皮在酒內浸兩天，約十兩酒浸四兩土

槿皮。

用法 先將患處用肥皂水洗淨，再將藥酒燉熱搽患

處，三、四次即可痊愈。

〔注〕 又可用土槿皮磨醋敷之亦效。

爛脚方

顧星隆

主治 老爛脚（俗稱爛皮症）。

處方 柏油十兩 石硫黃二兩 陈石灰五兩

制法 先將柏油煎熱至一刻鐘，后將其他各藥研細

和入柏油內，煎成軟膏，攤成膏藥。

用法 先將患部用開水洗淨，然后將膏藥視其潰瘍

部大小，適量貼敷于患部，一天兩次。

脚濕氣方

穆心龙

主治 香港脚之濕重潰爛者。

處方 煨石膏四錢 枯矾二錢 輕粉一錢 东丹一錢

制法 共研細末。

用法 用菜油或凡士林調涂，每日一次。

〔注〕 据献方人称：曾患脚濕氣，用此方治愈。

枯龙散方

周元福

主治 脚濕氣，脚趾間发痒发臭等。

處方 枯矾三錢 水龙骨三錢 冰片二分 密陀僧一錢

薄荷五分 芦甘石一錢

制法 共研細末，瓶貯备用。

用法 先用陈大蒜梗煎水熏洗患處，再用枯龙散撒

上，每日一次。

長年爛脚方

陶駿觀

主治 長年老爛脚。

处方 芦甘石三錢 銅綠二錢 广丹二錢 梅片五分

樟腦三錢

制法 共為細末，用鮮猪油和藥共同打爛，攤成膏

藥，共攤七張。

用法 以膏藥貼患部，每天換一次，七天可愈。

疥瘡方

王文濟

主治 干性疥瘡。

处方 硫黃不拘多少

制法 生猪油包硫黃，于紅燭上燃燒，下置一碗，

硫黃液、燭油等滴入碗中貯用。

用法 以棉花吸藥塗擦患處。

〔注〕 当心硫黃易着火，謹防火災。

痒疹方

楊甫文

主治 麻疹后，遍身发疹且痒。

处方 萬苳

制法 切皮，放入鍋內加水煮。

用法 用萬苳水洗澡后，靜臥，數次有效。

皮肤湿疹方

李繼祖

主治 墜熱重而痒甚者。

处方 蛇床子四錢 五倍子四錢 黃柏三錢 蒼朮三錢

明矾少許

制法 煎湯。

用法 洗澡用。

皮肤驗方

張治華

主治 皮肤湿疹。

处方 蛇床子三錢 黃柏二錢 蒼朮五錢 荆芥二錢

防风二錢五分

制法 煎湯。

用法 乘熱塗洗患處，一日兩次。

〔注〕 对皮癬是否有效，可試用。

外科清涼膏方

賈振寰

主治 打扑伤、丹毒、湿疹、膿疱瘡、急性皮肤炎、

漆瘡等。

处方 当归五錢 紫草一兩 大黃一兩 麻油適量

黃蠟適量

制法 各藥分研和勻，用麻油調。

用法 敷患處。

神化散方

張振賢

主治 一切濕疹。

處方 煨石膏一兩 煨甘石一兩

制法 研成細粉，用麻油調成漿糊狀。

用法 外敷。

濕毒方

殷祖康

主治 皮炎、濕毒。

處方 五花龍骨 左牡蠣 銀花炭 兒茶 地榆炭

甘草各等分

制法 上藥研極細末，菜油調敷，每日一次。炎性

重者，銀花炭、地榆炭加重；黃水多者，龍骨、牡蠣加重；腐敗較深者，龍骨、兒茶加重（隨症用量）。

〔注〕 可視瘡的範圍大小而自己配用，如龍骨用一

兩，其餘各藥皆為一兩。

螞蟥濕毒方

錢双呆

主治 近期或远期螞蟥濕毒。

處方 豆腐渣（不拘多少）

制法 用真麻油拌調，以均勻為度。

用法 塗患處，不留空隙，以紗布包紮，日換一次。

〔注〕 近期三、五次，远期倍之。

赤游丹毒方

計志霖

主治 赤游丹毒。

處方 黃芩一錢 黃連五錢 黃柏三錢 人中白三錢

上青黛八分 大黃三錢

制法 上藥研細末。

用法 用水芭蕉根打汁調藥敷患處。

羊胡瘡方

朱惟濟

主治 羊胡瘡（唇下濕疹）。

處方 炒黃柏五錢 元棗肉五錢

制法 菜油調。

用法 塗患處。

綉球瘋方

朱克昌

主治 綉球瘋（陰囊濕疹）。

處方 鮮紫蘇叶

制法 搗碎取汁。

用法 塗患部。

綉球瘋方

顧星槎

主治 陰囊外圍發痒、出水。

处方 五倍子 硃砂各五錢
制法 研細。
用法 用菜油調敷，一日一次。

爛皮癬方

李春林

主治 爛皮癬（顏面腿部均可發生）。
处方 新鮮小薊草
制法 搗汁。
用法 擦患部。

蟻瘻方

刘文廷

主治 蟻瘻生足上。
处方 山甲 輕粉 雄黃各等分 猪板油適量
制法 共搗成膏。
用法 搽患處。

〔注〕 此症为脚底生瘡，上有細孔，日久不愈。

蟻瘻方

刘文廷

主治 蟻瘻生在上身，數年不愈。
处方 刘寄奴五斤
制法 熬水去渣，再煎成膏。
用法 搽患處。

消灭疤痕方

录自丹方精华

主治 消灭瘡疤。
处方 橄欖核
制法 磨汁。
用法 涂瘡疤久而无痕。

生发方

孙繩武

主治 病后脫发、发稀。
处方 生首烏五錢 黃柏三錢 生半夏四錢
制法 共研末。
用法 香油調搽。

三仙丹方

李古松

主治 梅毒（外用）。
处方 輕粉三錢（另研不見量） 黃柏末一錢半
煅石膏一錢半 冰片少許
制法 共研为細末。
用法 撒布患處，貼以万应膏（中藥店有售），如遇干性者，可用猪胆汁調搽之。

鵝掌瘋方

主治 鵝掌瘋及頑癬。

處方 芝麻花

制法 摘鮮芝麻花，不問多少，將花放在手掌患處，

盡量搓之，搓至花盡為度。

用法 每天搓二次，搓至十日，即可痊愈。

鵝掌瘋方

佚名

主治 兩手千枯破裂，搔痒甚劇。

處方 小米谷糠酒

制法 將谷糠置于鍋中炒，再加酒拌炒。

用法 趁熱取藥搓兩手，冷時加酒再炒再搓。

鵝掌瘋方

胡逸松

主治 鵝掌瘋。

處方 白蜜五兩 魚肝油五兩 硫黃三兩 滑石二兩

爐甘石二兩

制法 共調研如膏。

用法 天天用以擦手，一料之后，可見痊愈。

鵝掌瘋方

李繼祖

主治 鵝掌瘋或稱濕氣，春夏手心汗多，或開皸裂。

處方 土括婁根五錢 皂角五錢 細辛一錢

制法 為末，用醋調勻。

用法 在夏天大暑內，用紗布，將藥密密涂上，綁

扎兩手心，一个星期不下水。

鵝掌瘋方

趙伯

主治 鵝掌風、四肢瘋。

處方 鮮白鳳仙花根一兩 斑毛虫四分 白癬皮二錢

苦參三錢 檳榔三錢 土荆皮三錢 潮腦一錢半

制法 將藥研細末，用鮮鳳仙花根搗爛拌入。

用法 用香醋四兩，猪尿泡一个（兩手兩個，醋半

斤）。上藥配兩料，將醋藥各放入一尿泡內，手放入浸二十四小時即可。

鵝掌瘋方

鞠凤祥

主治 鵝掌瘋

處方 鵝掌一个 当归 荆芥 防风 白芷 甘草

各等分

制法 共入香油煎枯，用蜡調成膏狀。

用法 搽患處

〔注〕 香油和蜡的分量，視藥量多少而定。

鵝掌瘋方

鞠凤祥

主治 鷄掌風。

处方 百部三錢 土槿皮三錢 白鮮皮三錢 吳仙三錢

皂角三錢

制法 酸醋二兩，連上藥放壺內，加水貳斤煎者。
用法 先熏后洗。

冻瘡方

徐錫齡

主治 冻瘡潰爛。

处方 金毛(即金毛狗脊之毛)

制法 研末。

用法 外搽(視潰爛面積大小而定用量)。

冻瘡方

陈振華

主治 冻瘡(已潰)。

处方 馬勃

制法 取細末。

用法 搽患部。

冻瘡方

張隱樵

主治 冻瘡。

处方 紅花二錢 麻黃七分 蛇床子一錢

制法 煎湯。

用法 熏洗

冻瘡方

陆志清

主治 冻瘡已潰。

处方 橄欖(煨灰) 凡士林適量

制法 調勻。

用法 涂患處。

冻瘡方

邵文祥

主治 冻瘡未潰。

处方 桑螵蛸

制法 將桑螵蛸橫斷，有液汁析出。

用法 涂患處，一日兩次。

冻瘡方

張志高

主治 冻瘡。

处方 鯊魚血

制法 拌在紅糖內。

用法 敷患處，一日一次。

凍瘡、麻風、雅司病類

凍瘡方

王成彥

主治 瘰癧（淋巴結核），俗名老鼠瘡。

處方 貓頭骨一具（鮮頭連腦尤佳） 麝香一分

冰片五分 輕粉五分 枯礬八分

制法 貓頭放瓦上焙焦或放土器煨成炭，同前藥共

研細末。

用法 成人每服六、七分，小兒每服三、四分，每

日二次，開水送下。

瘰癧方

干墨龍

主治 瘰癧（淋巴腺腫）。

處方 夏枯草一兩 蓋母草一兩 元參四錢

紅花三錢 當歸五錢 銀花五錢

昆布五錢 蒲公英五錢 地骨皮四錢

海藻五錢 牡蠣五錢 黃芪四錢

制法 以上各藥研細末，蜜丸，每丸二錢。

用法 早晚各服一丸，開水送下。

〔注〕 氣虛者，倍黃芪；已破者，增木通三錢，連

翹三錢，全蠍一錢五分，百部五錢。

鼠核方

宝应卫生科

主治 鼠核（頸腋部淋巴結核）。

處方 白芷 土大貝（土貝母）各等分

制法 共研細末

用法 成人早晚各服一錢，小兒酌減。

麻風方

李繼祖

主治 麻風病。

處方 海金沙二兩 米葱二兩

制法 煎湯。

用法 熏洗周身。

大麻風方

孫文伯

主治 麻風病。

處方 蝦蟆十個 米三升

制法 同煮成飯，晒干喂雞，喂完后，在暑天煮

食之。不放油鹽，加酒少許，溫服取汗，宜

避風。

〔注〕 曾有一婦人，患麻風症，有人告以用蛇肉同

米煮飯飼雞，俟雞吃久脫毛時食之。治愈后，

還生了兩個孩子。

麻風方

卜子义

主治 麻風病。

處方 荆芥四兩

羌防風二兩

白蒺藜四兩

大胡麻六兩	全当归四兩	怀紅花二兩
香白芷二兩五錢	小胡麻九兩	蒼朮四兩
怀牛膝二兩五錢	南苦參十一兩	白花蛇一條
大楓子十三兩(去壳)	蜈蚣七條	全蠍五錢

制法 上藥各為細末，兌合后，約重三斤，分為十二包，逐日晒之。

用法 每包分作十日服之，紹興酒送下，共服一百二十天。

雅司病方

孟乐天

主治 雅司病。

处方 菖蒲根一兩

制法 水煎。

用法 內服，每日三次，連服一星期。

〔注〕 此菖蒲，是端午節時人家和艾同插在門簷口上的菖蒲。

雅司病方

孟乐天

主治 雅司病。

处方 紅棗二、三斤(去皮核) 杉木炭適量(研細末)

制法 共搗為丸，如梧桐子大。

用法 每服二、三錢，日三次，以愈為度。

雅司病方

孟乐天

主治 雅司病。

处方 金銀花二錢 薏苡仁二錢 宣木瓜二錢
皂角子七分 白鮮皮一錢 土茯苓一兩
防風一錢 木通一錢

制法 水煎。

用法 內服，每日一劑，以愈為度。

雅司病方

何尽生

主治 雅司病(似翻花瘡)。

处方 鮮生地八錢(搗汁) 金銀花八分 苦參三錢
怀牛夕二錢 白鮮皮三錢 淡竹叶一錢
灯草一分 淨連翹一錢 淡黃芩一錢
京赤芍一錢 熟大黃一錢 粉甘草八分

用法 右十二味，先煎十一味。湯成，沖生地汁服之。

痔瘡類

痔瘡方

蕭公碩

主治 痔瘡出血流脂。

处方 紅砒(包)一錢 枯礬一錢 煨烏梅三分 辰砂三分
制法 上藥研細末，备用。
用法 以少許藥末敷患處，每日三次。
〔注〕 敷數回即有效。

痔瘡方

周耀先

主治 肛門疼痛，有時便血。
处方 槐米三分 白糖少許
制法 將槐米炒成末。
用法 糖水沖服。

〔注〕 如肛門腫甚，可兼用外敷法，用蝸牛十個，放碗內，加冰片五分，自化成水，用鵝翎塗之。

脫肛方

朱學周

主治 脫肛。
处方 鐵綉三斤 活磁石二兩
用法 鐵綉煎湯熏肛門，磁石煎湯內服。

脫肛方

朱學周

主治 脫肛
处方 枸桔三枚(打) 綫香約三丈(折斷)
制法 煎汁

用法 熏洗患處

乙字湯方

于墨龍

主治 各種痔病及肛裂。
处方 大黃一錢五分 柴胡一錢五分 升麻五分
黃芩一錢 甘草六分 當歸三錢
制法 煎湯。
用法 每日一劑分三次服。

漏管方

李春林

主治 結核性漏管
处方 壁虎尾
制法 晒干應用。
用法 插入管內，須連用七、八次至二十次(外蓋膏藥)。

燙傷類

火燙方

孫繩武

主治 火燙。
处方 大黃 川連 地榆各等分

制法 酌加冰片，共為細末。
用法 菜油調敷

水、火燙傷方

田西池

主治 水火燙傷

處方 蚯蚓 淨白糖適量

制法 以蚯蚓和白糖搗如泥

用法 糖于傷處，所用之多少，視傷處之大小而定。每日一換，三日可愈。愈后无疤痕。

〔注〕 蚯蚓以韭菜地內的為佳。

灼傷方

薛漢山

主治 紅腫水泡

處方 茶叶半兩

制法 將茶叶入砂壺內，加水半碗，煮爛即成。

用法 將煮爛茶叶搗如泥，攤布上敷患處。

水火燙傷方

張書堂

主治 水火燙傷。

處方 伏龙肝

制法 水飞研極細，备用。

用法 根据傷處大小用藥。以人乳調勻，涂患處，

日換兩次。

燙傷方

胡逸松

主治 水火燙傷。

處方 地榆炭一兩 蚌壳炭二只 凡士林二兩

制法 上藥研末，調凡士林。

用法 涂敷患處。

湯火炮傷方

董介先

主治 湯火炮傷。

處方 桂圓壳（煨存性為末）

制法 和以柏油。

用法 涂傷處，即止痛，愈后不留斑痕。

蛇虫咬伤类

毒蛇咬傷方

新海連市衛生科

主治 毒蛇咬傷。

處方 草蒼朮三錢 香白芷三錢 檳榔三錢 雄黃一兩

制法 共研細末。

用法 用開水沖化，去渣冷服；用藥渣敷咬傷處。

〔注〕編者按；雄黃有毒，用時須慎重，藥渣切不可服。

毒蛇咬傷方

趙伯

主治 土灰蛇咬，或其他毒蛇咬。

处方 生川烏一錢 生草烏一錢

血竭五分 生南星一錢

冰片三分 青黛五分

全蝎五分 生半夏一錢
巴豆肉三分

制法 上約共研細末，用醋調勻。

用法 敷患處，一次即愈。

蜈蚣咬方

錢双呆

主治 蜈蚣咬傷。

处方 旧紅燭煤頭

制法 將燃過之煤頭研細。

用法 塗傷處。

〔注〕可立即止痛消腫。

蜈蚣咬方

喬以倫

主治 蜈蚣刺螫。

处方 百草霜適量

制法 研末。

用法 塗傷處。

蛇咬方

邵季鴻

主治 蛇咬。

处方 臭虫 耳屎各等分

制法 焙焦研末，瓶收待用。

用法 敷患處。

〔注〕原注云：不論什麼蛇咬，敷上即效。

跌打損傷類

活血止痛湯方

朱允宗

主治 跌打損傷。

处方 當歸三錢 赤芍三錢 杜紅花二錢 延胡索三錢

杜仲三錢 續斷三錢 炒川芎一錢半 丹參三錢

白芷二錢 甘草一錢

制法 陳酒和水各一碗半，煎成一淺杯。

用法 內服。

止血方

錢彭壽

主治 局部止血。

处方 苧麻叶
制法 秋天采下晒干，研成极细末。
用法 敷出血处

傷科方

祝飞熊

主治 一切輕伤
处方 陈皮三錢 蟬衣三錢
制法 水煎
用法 內服

骨折方

李蔭之

主治 骨折
处方 土鱉 白糖各等分
制法 先將土鱉搗爛，繼入白糖。
用法 用米湯冲服

〔注〕 本方系指用鮮的活土鱉而言，如到中藥店买干的研末冲服亦可，用量一錢五分。

傷藥方

孙繩武

主治 跌打損伤
处方 紅花一錢 当归二錢 細辛一錢 肉桂一錢
甘松二錢 山奈 炙乳沒各一錢 制川烏八分

自然銅(煨)三分
制法 共研細末。
用法 开水送下，每次三分至一錢。

接骨方

主治 跌打損伤，骨折疼痛。

处方 (一)山梔仁 自然銅(醋煨九次) 当归 血竭

各五錢 牛膝三錢(醋炒) 石斛 紅花各三錢

(二)山梔 桃仁 乳香 沒藥各等分

制法 上藥二方，分开研为細末。

用法 第一方用酒冲服，每次用三錢，一日二次。
第二方用醋調敷患处。

接骨方

王 肇

主治 跌打損伤，骨折疼痛。

处方 制乳香一錢五分 煆蛻末一錢 广三膝一錢

明沒藥一錢五分 自然銅二錢 广犀黄一分

血竭花一錢五分 小瓜子四分 土元虫(鴉汁)五个

制法 加黃酒一杯，水煎。

用法 一次飲完

刀傷方

丁 辰

主治 刀伤。

处方 陈石灰(越陈越好)二兩 血竭二錢 龙骨二錢

海蝶蛸三錢

制法 共研細末。

用法 用时或干掺，或用麻油調敷。

刀傷方

蔣佩紳

主治 刀伤。

处方 大葱叶

制法 剖开。

用法 裹伤口。

刀傷方

蔣佩紳

主治 刀伤。

处方 桂圆核

制法 研末。

用法 敷患处。

跌打損傷方

孙繩武

主治 急救跌打損伤。

处方 梧桐叶三張

制法 泡湯。

用法 飲下即可。

〔注〕 另用絲瓜子七粒研末，陈酒送下尤佳。

腰扭傷方

陈怀仁

主治 腰扭伤。

处方 明雄黃 真血竭 沒藥 樟腦各等分

制法 研末。

用法 放膏藥上，貼于患处，外用帶子束紧。

傷藥方

孙繩武

主治 跌打損伤。

处方 生白附子八兩 羌活五錢 天麻五錢 防风五錢

細辛五錢 白芷五錢

制法 共研細末。

用法 每服四分，陈酒送下。

刺傷腫痛方

汪主恩

主治 異物入肉，鉄、竹、木与刺或魚骨、兽骨，

刺入肉内，掀腫不得出。

处方 土狗(又叫螻蛄)數只

制法 槌爛。

用法 敷于患处，用布扎好，不使落下。

〔注〕 本草綱目載，此物可取箭鏃；可疗咽中骨梗，均可能有疗效。

五官病門

眼病类

目疾方

沈純濟

主治 凡眼珠有云翳，眼角有赤綫者，宜服加減撥云散，如疼甚，眼胞腫，流泪生眵，加酒炒黃連。

处方

防风 蟬退 青箱子 黃芩 菊花 車前子

荆芥 归尾 木賊草 赤芍 生地 生薑(引)

制法

水煎。

用法 劑量应按病情与当地中医研究。

目疾方

沈純濟

主治 凡眼生白星成块，輕者为云，重者为眵，宜服加減撥云散。

处方

防风 荆芥 蟬退 車前子 木賊草

甘草 黃芩 柴胡 赤芍 石決明

青箱子 生薑(引)

制法 水煎。

用法 劑量应按病情与当地中医研究。

目疾方

沈純濟

主治 凡眼不腫不紅，不疼，眼胞下墜，視物不明者，气虛也，宜服加減補中益氣湯。

处方

黃芪 炙草 归身 川芎 升麻 柴胡

陳皮 茯苓 生地 枸杞

制法 水煎。

用法 劑量应根据病情与当地中医研究。

夜盲方

臧金台

主治 夜盲。

处方

羊肝

制法 煮熟。

用法 蘸百草霜吃。

决明散方

孫繩武

主治 治鷄盲眼。

处方

茅朮片(鹽水拌晒干) 决明子(炒蝦)各等分

制法 上藥研末。

用法 每服三錢，以谷精草、大麥冬煎湯，空心調服。

眼科效方

趙伯

主治 迎風流淚。

處方 冬桑叶三分 荆防風各二兩 左秦艽二兩

蟬衣一兩 黑芝麻三分

制法 先將黑芝麻稍炒另研，篩細，再將諸藥研細拌入。

用法 以白蜜煉熟，將藥拌入為丸，如梧桐子大。每日早晚服三錢，服完即愈。

芫荽方

董介先

主治 目翳、鼻瘰肉。

處方 芫荽適量

制法 搗碎塞鼻，目翳自消；鼻內瘰肉，塞之自落。

赤眼方

尹中義

主治 眼紅赤腫，目生贅肉。

處方 決明子 木賊草 夏枯草 軟柴胡 青箱子

龍胆草 菊花 干地黃 赤芍

制法 水煎。

用法 內服約三、五劑可愈。

〔注〕 原方未注用量，可照一般用量應用之。

眼癰方

孫繩武

主治 眼癰。

處方 晚蚕砂（酒洗晒干）

制法 共研末，加硃末少許，用雞蛋油調。

用法 外搽。

夜盲症驗方

陳光祖

主治 夜盲症（俗名雞蒙眼）。

處方 蛤壳（煨）六錢 黃蜡三錢 豬肝六兩

制法 先將黃蜡溶開，納入蛤壳拌和；把豬肝切一條縫，納入上藥，用綫扎住，放在鍋內煮熟。

用法 先以患者兩目乘熱熏之，然後服下。

〔注〕 據獻方人稱：一劑即愈，很少有服兩劑者。

豬肝亦可用羊肝代替。

消障救眼方

蔣步青

主治 目中贅肉，紅筋白膜，云翳等症，并治厥陰

風火上沖。

處方 石蟹 羚羊角 防己 白蒺藜 木賊草

連翹 草決明 羌蔚子 龙胆草 甘菊

制法 作散剂或煎剂。

用法 用量服法可与当地中医师联系，在其指导下斟酌使用。

煤油治眼炎方

顧瑞芳

主治 赤眼炎。

处方 煤油

用法 用一根銀針蘸一些煤油，翻开眼皮，抹几下，就有少量煤油进入眼睛，眼珠转动几下。

〔注〕

用此法治眼睛感到阴凉，旋即感到一些麻人，即可睡下休息，次晨眼周围都是眼屎，用温水洗去，感觉非常舒适，而眼炎也就消去，退腫而愈。

耳病类

中耳炎方

張培光

主治 耳孔内流膿水，周圍紅腫痛。

处方 石榴花蕊 枯矾各五分

制法 共研細末。

用法 以棉花卷去膿液，以紙筒吹入上藥，每天三

次，數日可愈。

耳內瘰癧肉方

賀季衡傳 賀相林獻

主治 耳內瘰癧肉。

处方 硃砂 月石 硃砂 枯凡 梅片各等分

制法 共研細末。

用法 先以針刺破瘰癧肉，用茶水調点患处，屢效。

慢性中耳炎方

林蔚光

主治 慢性中耳炎。

处方 咸蛋油

制法 即醃咸鴨蛋的鹽滴，越陈越好。

用法 滴于耳內，不疼不痛，六、七次有效。

中耳炎方

李輔才

主治 耳內流膿或黃水。

处方 木鱉子一个

制法 去皮用仁，加真香油研糜之。

用法 滴耳中，每次一滴，一日一次。

中耳炎方

顧克义

主治 中耳炎初起。

处方 蝸牛七个 冰片少許

制法 蝸牛去壳，放在茶杯內，加冰片化水。

用法 滴入耳內。

中耳炎方

佚名

主治 中耳炎。

处方 大黃魚腦骨五錢 花龙骨三錢 熟石膏四錢

冰片適量

制法 以上各藥均研細末。

用法 先用藥棉卷清膿液，再用双养水或硼酸水洗

清，而后用棉花卷塞于耳內，一天數次。

中耳炎方

佚名

主治 中耳炎。

处方 蛇退六分 露蜂房四分 淨蟬衣一錢 枯矾一錢

大泥块五片

制法 共研極細末。

用法 吹入耳內，一日三、四次，必愈。

耳聾方

儲敬超

主治 因肝火上升忽然发生耳聾者。

处方 石菖蒲六錢 路路通四錢

制法 水煎

用法 冲白糖服。輕者一次，重者二次即愈。

耳聾鼠胆膏方

白汝桂

主治 因热病或怒气而起的耳聾病

处方 鼠胆一只

制法 剖开，趁热取胆，再用人中白三分微焙，梅

片三厘同研。

用法 如干，可稍加麻油滴入。

鼻病类

鼻淵方

赵开亞

主治 腦痛連及額部，鼻流濁涕，腥臭難聞。

处方 經霜絲瓜藤

制法 在瓦上焙至黃脆，研細末。

用法 每次用二、三錢，黃酒送下。

鼻淵方

翁希定

主治 鼻淵（副鼻竇）。

处方 砂仁五粒 黑牽牛二粒
制法 酌加甜瓜蒂少許，共研極細末。
用法 隨時搐鼻。

腦漏方

胡逸松

主治 腦漏（慢性鼻竇炎）。

处方 葛根一錢半 麻黃一錢半 桂枝一錢半

芍藥二錢 甘草八分 生姜三片

大棗四枚 桔梗 石膏 辛夷花

制法 水煎，右方系加味葛根湯。

用法 內服（屢用屢效）。

腦漏方

孫繩武

主治 鼻淵、腦漏。

处方 華撥

制法 研末飯丸。

用法 塞鼻內。

鼻衄方

許翠如

主治 鼻中出血，若塞就隨口吐出，每次能衄血碗

余，面黃唇蒼白。

处方 生藕汁

制法 用生藕二斤，搗爛取汁，加入白糖四兩。
用法 每次服一碗（涼飲，藕汁與白糖要搗勻）。
〔注〕 禁食刺激性食物。

鼻疳方

沈純濟

主治 鼻疳，赤痒疼痛。

处方 川黃連一錢 川軍一錢

制法 加麝香少許，研末。

用法 吹入鼻內，即愈。

咽喉病類

白喉方

主治 白喉。

处方 鷄屎白 人中白 甘草各五分 銀花一錢

梅片二分 或加 麝香五厘 枯礬五分

明雄黃二分

制法 共研細末。

用法 一日數次吹喉。

白喉方

鎮江市中醫師協會白喉研究小組

主治 白喉症狀較輕者。

處方 桑叶二錢 赤芍一錢半 潤元參三錢

炒梔仁二錢 丹皮二錢 象貝母三錢

連翹三錢 水炙枇杷叶二錢(包)

制法 水煎。

用法 每日一劑，頭二煎分二次服。

白喉方

鎮江市中醫師協會白喉研究小組

主治 白喉症狀較重者。

處方 銀花三錢 赤芍二錢 大生地三錢

連翹三錢 丹皮二錢 象貝母三錢

炒山梔二錢 潤元參四錢 活水芦根(去節)八錢

制法 先煎蘆根，取水再入上藥同煎(煎二次)。

用法 二次飲服，每日一劑。

白喉吹藥方

鎮江市中醫師協會白喉研究小組

主治 白喉。

處方 西瓜霜二錢 明雄黃四分 犀牛角二分

辰砂四分 青果炭四分 冰片二分

制法 研細末，以無聲為度。

用法 吹入咽喉中。

喉科方

丁辰

主治 一般喉症。

處方 野薔薇花(連根皮)八錢

用法 煎湯內服，或熬厚汁搽塗。

〔注〕 此方加鮮地骨皮四錢，木賊草三錢，亦可治

牙齦腫痛。

平險如夷散方

顧振遠

主治 一切喉症。

處方 赤小豆四錢 芙蓉叶三錢 文蛤四錢

四季葱三根 大力子三錢 燕子窩泥五錢

大黃四錢

制法 共研細末，將四季葱打汁，以陳茶水、白酒

各半共調和，炒微熱。

用法 敷頸項。

咽喉痛方

劉應璿

主治 風火咽喉痛(扁桃腺炎)。

處方 新鮮馬蘭根四兩

制法 搗汁。

用法 分三次連續服。

喉痹方

沈純濟

主治 喉痹。

處方 烏魚胆

制法 臘月取之。

用法 輕者少許點即愈，重者水調灌之。

四七噤化丸方

顧振遠

主治 喉內有如梅核氣，有痰咽不下吐不出。

處方 香附二兩 紫蘇二兩 厚朴三兩 茯苓四兩

半夏(姜制)五兩 陳皮二兩 炙甘草一兩

制法 共為末，煉蜜為丸，如芡實大。

用法 每服一丸，用大棗二枚，生姜五片，煎湯送下。

柳華散方

王文濟

主治 一切口舌喉部潰瘍。

處方 黃柏一兩 青黛二錢 冰片二分

制法 上藥各為細末，混和备用。

用法 日吹患處二、三次。

引龙归海散方

顧振遠

主治 白喉急症(寒証)。

處方 制附片三錢 吳萸三錢

制法 共研細末，白酒調作二餅。

用法 貼兩足心涌泉穴，若天氣寒，用火微烘，庶無根之火浮越于上，得此引之而自降，亦同類相求之法也。

加味風鳴散方

嘉定縣衛生科

主治 咽喉紅腫疼痛及口瘡。

處方 嫩薄荷一錢 炙兒茶八分 飛青黛五分

元明粉一錢七分 川連四分 人中白八分

硼砂一錢七分 冰片五分

制法 各研極細末，和勻，瓷瓶收藏备用。

青吹藥方

王同文

主治 咽喉紅腫。

處方 薄荷叶一兩 生甘草二錢 灯草灰一錢五分

頂青黛二錢 西月石三錢 西牛黃三分

京大梅一分

制法 以上諸藥共研細末。

用法 每日吹七、八管。

珍珠散方

陳訪賢

主治 咽喉口舌腐爛。

處方 廉珠五分(水飛) 月石二兩(煨) 西瓜霜八錢

制甘石二分 冰片二分

制法 共研極細末，用磁瓶收貯。

用法 日吹四、五次。

金不換方

陳訪賢

主治 乳蛾腫爛及咽喉紅腫。

處方 蠶蚕二錢 羚羊角五分(水磨晒干)

月石一兩五錢(生研) 西瓜霜二兩

射干一錢 廉珠一錢(水飛)

青黛五分 冰片三分

制法 上藥共研細至無聲為度，用磁瓶收貯。

用法 以鹽水漱口，吹上藥立效。

雄黃解毒丸方

顧振遠

主治 緊喉風。

處方 雄黃一兩 巴豆十四粒(去皮油) 郁金一錢

制法 共研末，醋糊為丸，如黍粒大。

用法 每日五分，津液送下。

〔注〕 此丸有斬關奪鎖功能。

硃角散方

孫繩武

主治 急喉風。

處方 白硃 皂角 天虫 冰片 月石各等分

制法 共研細末。

用法 吹喉。

紅雪散方

顧振遠

主治 喉癰及虛火咽痛。

處方 硃砂(水飛)三分 石膏粉五錢 硼砂五錢

冰片三分

制法 共研細末

用法 吹喉。

黃雪散方

顧振遠

主治 喉痹。

處方 元明粉五錢 硼砂五錢 腰黃五錢 冰片三分

制法 共研細末。

用法 吹喉。

海洋至寶方

孫繩武

主治 喉癰。

处方 蝸牛三分(煨) 川椒三分(炒)

制法 共研細末。

用法 吹喉。

乳蛾方

孫繩武

主治 雙單乳蛾。

处方 皂角

制法 研細末。

用法 輕者服一錢，重者一錢五分。

白喉外治方

王光升

主治 發熱惡寒，咽部滿布灰白色的假膜。

处方 獨頭蒜一枚 明雄黃少許

制法 先將大蒜搗成泥，再入雄黃調勻如豆狀大，

年齡大的可增加藥量。

用法 將已調好的藥置于合谷穴，蓋以膏藥。

〔注〕 此系家傳秘方，屢試屢驗。八小時后貼藥處

即起水泡，一切症狀均減，如不起水泡，則病有危險。

紅吹藥方

王同文

主治 喉風。

处方 西月石一錢 京大梅三分 炙礞石十條

硃砂三錢 枯礞三錢 腰黃三錢

牙硝一錢

制法 研末備用。

用法 吹入咽喉。

口疳方

李協凡

主治 口疳。

处方 蟬蛻皮(晒干)

制法 煨灰存性，研末，和冰片少許。

用法 吹敷。

口瘡方

新海連市衛生科

主治 口腔粘膜及舌面發生潰瘍。

处方 白茅花一握 梅片少許

制法 將白茅花燒灰研末，調以冰片。

用法 一日數次，涂口腔內，一、二日即消失。

冰片散方

顧振遠

主治 治一切口疳。

处方 上青黛三錢 腰黃二錢 烏金紙(煨)十六張

人中白(漂去咸味用炭火煨細研水飛)三錢

黃連二錢

黃柏二錢

甘草一錢

枯矾一錢

元明粉二錢

硼砂二錢

鹿角霜一兩

加冰片一錢

制法 研細末。

用法 吹患处。

人中白方

蕭公碩

主治 口瘡。

处方 人中白一錢五分(煨)

青黛一錢五分

川連五分

珍珠二分

黃柏五分

蟬衣四分

梅片三分

制法 右藥共為細末，密貯备用。

用法 上藥敷患处，日三次。

雲珠散方

陳訪賢

主治 咽喉口舌紅腫等症。

处方 烏犀角二分(水磨晒干)

廉珠三分(水飛)

月石一兩(生研)

辰砂二分

西瓜霜八錢

冰片二分

制法 共研極細末，以磁瓶收貯备用。

用法 以鹽水漱口，吹之立效。

开关立效散方

顧振远

主治 一切白喉，牙关緊閉，湯水難入。

处方 真雄精一錢 細辛一分 真牛黃一錢 牙皂二分

杜字香四分 薄荷六分(去梗) 大梅片五分

制法 除片、麝、牛黃外，共研極細末，過絹篩，

合片、麝、牛黃，再研精細，磁瓶收貯，蜡

封固瓶口，勿使洩氣。

用法 臨時以二、三厘吹兩腮內，或以少許吹鼻孔。

齒病類

牙痛方

馮定邦

主治 一切牙痛。

处方 辣椒(干紅細長完整者)一只

制法 將辣椒對折，用鑷子挾住，于火上烤至半焦

(勿損壞辣椒)，漲氣，而后在手背上試好

合宜溫度。

用法 令患者咬在患牙上，三至五分鐘移去，即可

止痛。

〔注〕 如效果不顯，重複一次無不效。

牙痛方

李孝儒

主治 牙齒疼痛。

处方 地骨皮 高良姜各等分

制法 共研細末。

用法 吸入鼻孔少許，左痛吸左，右痛吸右，口中含涼水。

風火牙痛方

新海連市衛生科

主治 牙齒疼痛，牙齦浮腫，色紅發熱，甚或腮外亦腫。

处方 鮮嫩小絲瓜一條(二兩) 梅片一分

制法 用絲瓜燒存性研末，加入梅片和勻。

用法 以指纏新布，用冷茶浸透，蘸藥末，擦牙齦及腫痛處。

牙疼方

陳懷仁

主治 牙痛。

处方 升麻三分 白芷四分 北細辛四分

制法 煎湯。

用法 內服。

風火牙痛方

孫立家

主治 紅腫痛，不能進食，甚至兩腮亦紅腫。

处方 月石二錢 冰片五錢

制法 共研末。

用法 先用針將局部刺六、七處出血，把血吐出。用該藥厚塗，含三十至五十分鐘吐出，連含三次即愈。

巴椒丸方

賈長芝

主治 牙破蛀成黑窟窿。

处方 巴豆一分(去壳研) 川椒一分(研末)

制法 二味和勻，米湯為丸，如米粒大。

用法 將藥丸納入牙窟窿內，閉嘴五分鐘，再將口水吐出，忌吞口水。

齲齒疼痛方

于祖望

主治 齲齒劇痛。

处方 石碱(即洗衣用的)

制法 取米粒大小一顆。

用法 塞入齲孔內，疼即止。

齒衄方

張世仁

主治 牙花出血、口臭、病后爛牙花或失治，轉成牙疳。

处方 人言 元紅棗

制法 以元紅棗去核裝入人言(即砒石)一、二錢，再

用法 敷患處，如口內流涎，須吐出不可咽下。

齒衄方

徐佩

主治 齒縫出血不止，口臭。

处方 活水芦根適量

制法 至河边挖取新鮮者煎湯或泡茶。

用法 內服可立止血。

牙疳方

張国棟

主治 走馬牙疳(水瘡)

处方 地鼈虫十只(煨存性) 冰片一分

制法 共研細末。

用法 擦牙齦潰爛部。

砒棗散方

顧振遠

主治 走馬牙疳黑腐，氣味臭甚者。

处方 人中白三錢 紅信石二錢五分 黑棗七枚

制法 將棗去核，以紅信石均分入于棗內，放瓦上

用炭火炙至棗枯烟尽為度，共研細末。

用法 吹敷患處。

〔注〕 此方又名人中白散。

走馬疳方

孫繩武

主治 走馬牙疳。

处方 蝸牛(炙存性) 梅片適量

制法 研末。

用法 吹患處。

〔注〕 先用白薔薇花根皮打汁洗口內患處，然後吹藥。

治火牙單方

王植三

主治 風火牙痛。

处方 火硝二分 樟腦二分 硼砂二分 青鹽二分

制法 研細末。

用法 擦患處。

生肌散方

顧振遠

主治 牙疳、牙宣、牙齦。

处方 凡茶五錢(焙脆研細) 龙骨五錢(煨研水飛)

腰黃一錢

制法 共研細末。

用法 吹入患處。

〔注〕 如加珍珠粉收效更佳。

沃雪散方

陳訪賢

主治 小兒走馬牙疳及牙肉久爛不愈。

處方 廉珠二分(水飛) 人中白一錢(煨研)

月石一錢(炒研) 犀角二分(水磨晒干)

甘中黃一錢(焙燥研) 西瓜霜一錢 冰片少許

制法 共研末，以磁瓶收貯，勿令洩氣。

用法 用淡鹽水漱口，搽之立效。

牙痛方

邵季鴻

主治 牙疼。

處方 做種茄子或經霜絲瓜

制法 燒灰。

用法 搽患處立效。

婦科門

調經類

痛經方

吳江川

主治 婦女痛經或腹部常痛。

處方 食鹽一斤(礱細) 生薑四兩(切碎)

葱頭四十九个(洗淨)

制法 在鐵鍋內炒熱，包以毛巾。

用法 外用熨痛處。

痛經方

千祖望

主治 一切痛經。

處方 川烏 草烏 香附各等分

制法 上藥俟干燥后，研成極細末。

用法 嗅入鼻孔。或用單層紗布，裹包此藥，塞入鼻

孔，每次塞十五——二十分鐘，每天塞五——

十次，左右不一定，如能交替塞嗅，更好。

經閉方

吳竹溪

主治 經閉。

處方 山楂四兩(研末) 砂糖適量

用法 白開水送下，每服三錢。

干血癆方

朱學周

主治 室女經閉，干血癆。

處方 黑木耳三斤 冰糖三斤

制法 每日各用半兩，煎湯。

用法 內服。

崩帶類

白帶方

熊周南

主治 白帶。

處方 干姜七錢 白芍二兩

制法 共研細末。

用法 米湯送下。

〔注〕 據獻方者稱：服一次即效。

白帶方

姚公棠

主治 婦女白帶

處方 炒車前一兩 大黃一兩 猪脊髓四兩

制法 將上藥研細，同猪脊髓制拌搗丸如梧桐子大。

用法 每日早晚各三錢，白開水送下。

白帶方

嘉定县卫生科

主治 婦女白帶。

處方 葵花枯梗內白心

制法 瓦上焙焦，研末。

用法 每服一錢，一日二至三次，開水白糖沖服。

白帶方

宋雨軒

主治 婦女白帶（非淋菌性）。

處方 澤蘭叶三錢 黃芩三錢 白朮五枚（去朮）

制法 水煎。

用法 一次飲服。

白帶方

朱鈿高

主治 婦女白帶病。

處方 殭蚕一兩

制法 瓦上焙，研細為細末。
用法 六次分服（二日），陳酒送下。

白帶方

陳張明

主治 白帶。

處方 綠豆芽連頭根三斤

制法 洗淨，加水二大碗，煎透去渣，加生姜汁四

兩，黃糖三兩，先武火后文火收膏。

用法 每晨開水沖服，約半月服一料，宜連服二料。

白帶方

陳張明

主治 白帶日久，體力衰弱。

處方 懷山藥一兩 川草薢八錢 建蓮子三錢

制法 清水煎。

用法 食前溫服。

白帶方

陳廷章

主治 白帶。

處方 馬齒莧

制法 搗汁一盅，鷄蛋清調燉。

用法 溫服。

白帶方

陳廷章

主治 赤白帶。

处方 貫仲一个

制法 刷尽毛，切块，好醋蘸浸，慢火上炙熟，研

末。

用法 每服二錢，米湯調下。

帶下方

唐际虞

主治 帶下。

处方 西潞党参三錢 炒蒼朮一錢五分 炒白朮二錢

黑升麻八分 淮山藥三錢 陈皮一錢五分

白云苓四錢 炒車前三錢 炙甘草六分

軟柴胡五分 炒白芍二錢 鷄冠花子三錢

制法 煎剂。

用法 內服。

白帶方

湯建奇 卫造时

主治 白帶。

处方 墓头回

制法 水煎。

用法 內服。

〔注〕 本品見本草綱目，可詢售草藥人或草藥店。

量未注明，仅云約一角錢。

血崩方

雷隱东

主治 血崩。

处方 生龟板四兩 紅糖三錢 童便一盅

制法 煎剂。

用法 內服。

血崩方(子宮出血)

張桂珍

主治 經来淋漓，数月后忽然血大下，顏色发紫，

有的成块，腹痛，顏面蒼白，四肢无力，腰

痠痛，脉搏沉細。

处方 牛角膠一块(須用牛自己擰掉的)

制法 用水一大碗，煎至半碗。

用法 一次服下，如尚未完全痊愈时，再煎二汁服

下即愈。

〔注〕 忌刺激性和生冷食物。

血崩方

高志明

主治 妇人子宮出血。

处方 蓮房炭三个 阿膠三錢

制法 將蓮房炭煮水冲化阿膠。

用法 一次飲服。

血崩方

張臆如

主治 婦人血崩不止，脈弱氣虛。

處方 當歸身四錢 生黃芪二兩

制法 水煎。

用法 一次飲服。

血崩方

王誠漣

主治 血崩。

處方 蓮房三個 藕節七個 艾叶炭一团 小蓟一把

側柏炭三錢 血余炭三錢 茅根一把(洗淨)

制法 水煎。

用法 內服。

崩漏方

張兆平

主治 崩漏不止。

處方 鯉魚鱗 人头发

制法 煨灰。

用法 每次服四錢其血即止。

崩漏方

王声浩

主治 崩漏

處方 地榆三錢。

制法 好米醋同煎。

用法 內服。

子宮出血方

高仁昌

主治 子宮出血。

處方 牛角腮五錢(鮮者更佳可加重至一兩)

制法 煎湯。

用法 內服。

〔注〕牛角腮即牛角尖中之堅骨，猶魚之有鰓，故名。惟此物不易尋取。

产后疾病类

产后多汗方

江子和

主治 产后体虛多汗。

處方 梧桐子一把(去壳)

制法 炒黃。

用法 內服。

产后风方

張桂珍

主治 产后痙病、頸部強直，牙关緊閉。

处方 蟹壳七个

制法 在瓦上焙黃研末，放入碗內，加井水半碗，

再放在鍋內蒸，一小時取出。

用法 已蒸好的藥物，臨服時加紅糖二至三兩，用開水沖為兩碗服下。如牙关緊閉，可先刺頰車以開之。

产后破伤风方

余公俠

主治 产妇产道創傷面感染破伤风細菌，數日后發生全身症狀：項背強，牙关緊閉，抽搐等。

处方 醋炒荆芥三錢 鈎藤四錢 當歸三錢

赤芍一錢五分 川芎一錢五分 全蠍兩對

炮姜一錢 炙甘草一錢 茯苓三錢

如汗多者加黃芪三錢

制法 右藥煎湯，加重便或陳酒兩杯和服。

用法 上藥每日服一劑，頭二煎分二次服。

产門不開方

陶興詩

主治 产門日久不開。

处方 鯽魚一條(約一斤重) 醋一兩

制法 將魚煮熟搗爛，和醋。

用法 敷于产門。

〔注〕 民間流傳方，臨床試用有效。

初产阴戶腫痛方

录自朱振声「丹方精华」

主治 初产阴戶腫痛，坐臥不寧。

处方 紅梗莧菜不拘多少

制法 煎湯。

用法 熏洗。

儿枕痛方

夏海珊

主治 产后腹部疼痛(名儿枕痛，大約在产后一、

二日內)。

处方 熟灰一碗

制法 以醋噴上，用布包好。

用法 熨痛處。

妇女杂病类

产后缺乳方

移山

主治 产后缺乳，或乳量很少，不能滿足小兒需要。

处方 通草三錢 蒲公英三錢 黃芪五錢 穿山甲四錢

鮮黃魚一條(半斤左右)

制法 先將藥品加水煎，去渣，再用藥汁煮黃魚，

以熟為止。

用法 連魚帶藥湯一次吃下。

〔注〕 服藥后一星期內不能吃韭菜。如无黃魚，鯽魚也可用。

乳汁不足方

沈飞鵬

主治 产后乳少。

处方 王不留行一錢五分 絲通草一錢 穿山甲二錢

制法 水煎。

用法 內服二、三次。

催乳方

沈飞鵬

主治 产后乳少。

处方 赤小豆(即野赤豆)酌量

制法 水煎。

用法 內服數次。

〔注〕 藥店出售的半紅半黑的不宜用。

吹乳方

沈純濟

主治 乳腺炎。

处方 鮮蒲公英

制法 搗爛。

用法 涂局部。

女科胎前飲方

陶駿馥

主治 孕婦食物必吐。

处方 小生地(指大) 川續斷各二兩

制法 煮水代茶。

用法 頓服。

乳癰方

許茂祥

主治 妇人乳部紅腫熱痛。

处方 蒲公英二兩

制法 水煎。

用法 加黃酒半杯和服，藥渣敷乳部。

乳癰方

新海連市衛生科

主治 乳腺阻塞，初起惡寒發熱，局部紅腫，硬痛。

处方 胡桃四兩 白干酒四兩

制法 將胡桃打開去壳，取仁搗碎，同酒放入壺內

蓋緊，用火煮之。

用法 吃酒及胡桃肉，以碎為度，將余下的酒及胡

桃肉敷于患处。

〔注〕重症二剂即愈。

乳癰方

王仁裕

主治 乳癰。

处方 水山藥根(蒲公英根)約一斤多

制法 洗淨放石臼內搗絞汁。

用法 服鮮汁。

乳癰方

葛庆生

主治 乳癰。

处方 山茨菇一錢 大麦芽三錢

制法 共研細末。

用法 用茶調敷患处。

乳癰方

王仁裕

主治 乳癰、乳核。

处方 蟹壳三、四百只

制法 洗淨晒干，每壳切二片，放鍋內同石砂炒，

炒到蟹壳发黃而脆，取出置地上冷透，研細末，水泛为丸，如綠豆大。

用法 每服三錢，早晚各一服，吃酒者陈酒下，不

吃酒者开水送下。

〔注〕初起者吃到十多兩，必有效驗。

乳腺炎方

罗昌华

主治 乳房癰癤。

处方 新鮮夏枯草二、三兩

制法 搗爛布包絞取汁，再搗第二次取汁(絞不出可略加水)，約得自然汁一茶杯。

制法 晚間加溫服之(加些酒)即睡，擦敷患处。

乳腺炎方

朱良春

主治 乳腺炎未化膿者。

处方 硃砂八分 广木香八分 元寸四分 东丹八分

制法 共研極細粉約〇·一公分，包藥棉中。

用法 塞鼻內，患左塞右，患右塞左，二十四小时后，即可消散，南通中医院使用多例甚效。

奶癰方

周岩道

主治 奶癰(乳腺炎)。

处方 通草三錢 木通三錢 生甘草三錢 当归二錢

銀花三錢 紅花三錢 蒲公英六錢

制法 煎剂。

用法 內服。一至三帖有效。

奶癰方

浦东声

主治 乳房結块紅腫。

处方 鷄蛋一枚 蓖麻子仁二粒 雄黃一小匙

(約半个銅元所能挑起者)

制法 將鷄蛋打一小洞，放入蓖麻子仁二粒，雄黃

一小匙，封閉煮熟。

用法 一次食之，取效亦可再服一枚。

奶头脫皮方

岳中和

主治 奶头脫皮或皸裂。

处方 南瓜

制法 瓦上炙灰研細，加入冰片少許，用葶藶打汁

調敷。

用法 調敷患處。

黃膏藥方

孫繩武

主治 濕毒、結毒、下疳、阴戶生瘡。

处方 黃柏三兩 大黃一兩 甘草五錢

麻油四兩 輕粉三錢 乳沒藥各五錢

黃白占各五錢 儿茶五錢

制法 熬去渣，下黃占、白占、儿茶、輕粉、乳沒

藥，共入膏內攤貼，甘草湯洗之。

枳實方

薛夢周

主治 小便頻數，子宮下墜，脫肛。

处方 枳實四兩

制法 以水五千西西煎。

用法 每服五十西西，一日三次，每有一劑即愈者。

〔注〕 枳實能收縮平滑肌，小便頻數，系膀胱括約

肌弛緩失攝，叶橘泉氏實用經效方中推荐此方，用于臨床療效彰著。

雀斑方

董介先

主治 妇人雀斑。

处方 冬瓜子仁 桃花各等分

制法 用蜂蜜煉和。

用法 涂敷面上。

儿 科 門

惊 风 类

小儿惊风方

王德坤

主治 小儿惊风。

处方 鸣蟬一只

制法 在中伏前一天捉，阴干为末，加元寸五厘，
用法 硃砂五厘，为末，五月五日配最好，装入瓷

瓶內。

用法 小儿每服五分，开水冲服。

小儿惊风方

熊周南

主治 小儿惊风。

处方 砂仁五分 南星五分 麝香一分

制法 水煎。

用法 內服。

敷惊敷方

計志霖

主治 急惊风。

处方 麝香一分五厘 大梅片三分 殭蚕九只

全蠍九只 硃砂三分

制法 共研細末，白蜜为餅。

用法 敷臍上。

太极丸方

計志霖

主治 小儿似惊非惊，手足掣搐，身热甚高。

处方 天竺黄五錢 胆星五錢 大黃三錢（酒浸）

白殭蚕三錢 麝香二分 梅片二分

制法 上藥除片、麝外，研細末，再加片、麝研勻，

硃砂为衣，白蜜为丸，如黄豆大。

用法 每次二粒，每日服三次。

〔注〕 有高热者須随症施治。

小儿惊厥方

江汉家

主治 小儿猝然发热惊厥，或嘔吐洩瀉，目眶下陷，

声音嘶哑，或咳嗽气喘，鼻翼扇动，口唇发

紺（青色）。

处方 生山梔二錢 生南星二錢 生半夏二錢

花椒二錢

附块二錢

樟冰二錢

蓖麻子二錢

杏仁二錢

葱头三枝

制法

上藥研末，搗爛和入干面、燒酒作餅。

用法

綁臍眼及手足心，若在春冬天寒，應將藥餅

烘熱貼之，若體溫高，將燒酒去掉，用鷄子

清二枚作餅。時間以一晝夜為度，綁后一小

時見效。嗅得小兒口鼻中有藥香味，則顏面

轉紅潤，氣喘平，汗出熱退，嘔瀉止。輕者

一料，重者二料。

百日咳類

百日咳方

周启明

主治 小兒百日咳、(頓咳)。

處方

天竺子四錢

玉蝴蝶一錢五分

勾藤四錢

广陈皮一錢

款冬花二錢

冰糖二錢

制法

將藥及糖置碗中，和水，飯上蒸透。

用法

代茶飲。

〔注〕

數劑后，症狀可漸減。

百日咳方

謝双峰

主治 百日咳。

處方

炙百合四錢

炙冬花五錢

制法

水煎。

用法

內服，每日一次，三、四次即愈。

百日咳方

徐七池

主治 小兒百日咳。

處方

川貝母一兩五錢(五次量)

米湯一小碗(一次量)

冰糖二兩(五次量)

制法

川貝母研極細末，以米湯沖調，隔水蒸，并

置入冰糖，溶化后服。

用法

每日清晨及臨睡前各服一次。

〔注〕

一料未愈，可再配一料，即可痊愈。此為五

歲以上小兒用量，五歲以下可減半服用。

百日咳方

袁祥

主治 百日咳(頓咳)。

處方

射干二錢

紫苑二錢

冬花半錢

麻黃八分

細辛六分

五味子六分

半夏三錢

石羔七錢

生薑三片

紅棗五枚

制法

煎劑。如汗多則麻黃帶節，无汗氣急者加桂

枝，惡寒脈細者加附子去石羔，有汗者麻黃

桂枝不可并用。
用法 內服。

〔注〕 此方宜与医师斟酌用之。

梨膏半貝散方

張仲華

主治 百日咳。

处方 宋半夏四錢 川貝母二錢

制法 上藥共研細末。取大梨一枚，在結蒂處，用刀划一小洞，取出梨核，將前藥末納入梨內，再納入碎冰糖（需裝滿）再用原梨蓋蓋好，放鍋內隔湯蒸熟。

用法 先服梨內藥糖，再服梨肉，用開水送下，或趁熱服之。

〔注〕 忌辛辣食物。——三歲小兒每服三分之一，三——五歲小兒每服二分之一，每隔四小時一次。

百日咳方

蘇盈齊

主治 百日咳（頓咳）。

处方 杏仁粉四兩 白蜜一斤

制法 先把杏仁去皮共研細，用草紙包十層，壓于石頭底下，約二天換紙一次，共壓一星期，

以无油為度。再將白蜜在鍋內熬煉，蜡去淨，与杏仁調和成膏。

用法 五歲兒童每次服一湯匙，開水冲服，日服二次。

小兒咳嗽方

新海連市衛生科

主治 小兒陣陣作咳，甚則嘔吐，纏綿不已。

处方 梨一個 麻黃二分 冰糖適量

制法 將梨挖一洞，把麻黃插入梨肉內蓋好，置砂鍋內煮透。

用法 取汁飲，每日一劑。服用一星期可愈。

疳積類

肥兒粉方

徐惠之

主治 小兒疳積病，面黃肌瘦，脘腹膨脹，納食不化，大便時泄、時堅，或貪食无厭；或竟不思食；或情緒暴躁；或手足心煩熱；或睡則盜汗。

处方 皂凡三斤 小麦粉三斤 使君子肉半斤
土炒白朮六兩 滑石六兩 炒淮山藥六兩

制法

先將皂凡及小麦粉用適量酸醋和濃米湯等分調和，作成餅狀，放在瓦上，下用文火燂燒，約十二小時，待其自成粉狀，以成赭色為度。然後再將其余各藥研極細末，再與上藥等分，共同和勻，待用。

用法

(一)調和在牛乳、豆漿、蛋湯及粥飯等食物內同吃。

(二)和入面粉內，加入白糖或食鹽，再用豆油及冷水拌和，做成餅狀，烤熟後服食。

〔注〕

服藥時，忌飲茶葉及服食蕎麥。

小兒便秘方

張兆平

主治

小兒大便秘結。

處方

青菜

制法

打汁約二調羹。

用法

服後三、四小時，大便即下。

丹陽子藥方

顏亦魯

主治

小兒疳疾、面黃形瘦，腹中有痞塊，不思飲食。

處方

木鱉子一斤(用面粉包炙)

黑丑一斤四兩

使君子二斤四兩 檳榔一斤

制法

上藥分別炒熟，合成一料，研為細末，每包三錢。

用法

一至三歲小兒，每包分作四次服；四至五歲小兒，每包分作三次服；七至十歲小兒，每包分作兩次服。用雞蛋白一枚調和，隔水蒸熟食之，蒸時用皮紙糊碗口，免藥性外洩，忌食鹽，服十五天。

〔注〕

此方為丹陽東門鍋底老丁宅祖傳，因用鷄子燂服，故名為「子藥」，遠近馳名，有近百年的歷史。

木鱉子有毒，宜如法炮制，慎用。

泄瀉、嘔吐類

小兒泄瀉方

張兆平

主治

小兒腹泄不止。

處方

高粱壳子一撮

制法

煎湯。

用法

內服。

小兒水瀉方

湯慕唐

主治 小兒水瀉。

處方 硫黃 白胡椒等分

制法 研末，放在布膏藥上。

用法 貼于臍部。

小兒腹瀉方

張元仁

主治 小兒水瀉。

處方 大蒜鬚

制法 烘干研末。

用法 用膏藥貼臍上。

小兒吐瀉方

陸永江

主治 小兒吐瀉肢冷。

處方 鹹附子一枚

制法 切成四塊，各用油紙包，一面刺小孔，將有

孔的一面，各貼于手足心，用布包扎，三、

四小時后四肢和暖，一日一夜除去或調換。

小兒嘔吐方

徐松峰

主治 小兒嘔吐，乳食不化，四肢逆冷，面唇青白。

處方 炮干姜一錢五分 炙甘草一錢五分 陳皮一錢

鏡面砂五分

制法 共研細末。

用法 每服一錢，用灶心土煎水送下。

小兒雜病類

小兒赤游丹方

錢晚香

主治 小兒赤游。

處方 川柏五錢 川連三錢 青黛三錢 甘草四錢

大黃五錢 黃芩五錢 木瓜五錢

制法 上藥各研細末混和，密貯備用。

用法 用上藥若干，麻油或蓖麻油調涂患處。

小兒吐乳方

熊周南

主治 感冒后，小兒吐乳。

處方 防風二錢 生薑一片 砂仁五分 藿香一錢

制法 水煎。

用法 溫服。

小兒夜啼方

吳汇川

主治 小兒夜啼。

處方 灯心草

制法 燒成灰

用法 將灰搽在奶頭，徐徐哺兒（在睡前行之）。

小便不通方

顧延林

主治 初生嬰兒或十歲兒童小便不通，腹脹或小便淋漓作痛，或自覺尿道中有物堵塞。

處方 大蒜一大把

制法 熬水倒入盆中，令患者坐熱湯中，冷則更換之，至解下小便為度。

小兒脫肛方

陳希齡

主治 小兒脫肛。

處方 蝸牛十餘只

制法 新瓦上焙枯研末。

用法 以豬油調敷。

小兒口瘡方

沈純濟

主治 小兒口瘡，不能吮乳。

處方 密陀僧適量

制法 研末，醋調。

用法 塗足心，愈即洗去。

小兒羊須瘡方

新海連市衛生科

主治 小兒兩口角癰爛，發紅疼痛。

處方 紅棗灰 黃柏末各等分

制法 共研末。

用法 用香油調敷患處。

二粉散方

顧元龍

主治 初生兒二阴之旁，皮膚紅腫，症重者紅暈向腹背上竄，蔓延至耳、目、口、鼻之旁。俗名獼猴疳。

名獼猴疳。

處方 生萊豆粉一兩 銀硃一兩 輕粉一錢五分

冰片一分

制法 先以輕粉研極細末，然後將萊豆粉和銀硃合併一處，加入冰片合研和勻。如无陳金汁，可用生甘草一錢，白灯芯五分煎湯，調和。

用法 敷患處，日一、二次，經一、二天紅暈退去，即愈。

〔注〕重症可兼服犀角地黃湯

小兒癩瘡方

沈純濟

主治 小兒滿頭癩瘡，手、足、身上皆有。

處方 五倍子一錢 輕粉一錢 蛇床子三錢

雄黃二錢 枯礬三錢 黃連一錢

制法 共研末。

用法 先以荊芥湯洗，拭干，香油調抹。

干臍散方

孫侃

主治 臍汁不干。

處方 車前子 適量

制法 炒焦研細末。

用法 敷之即干。

引兒食乳方

孫侃

主治 生后不食乳。

處方 川連三分

制法 煎湯。

用法 灌飲后自愈。

臍突出方

孫侃

主治 小兒臍突出。

處方 茯苓一錢 車前子一錢 甘草二分 陳皮二分

通草三分

制法 加適量水煎。

用法 內服。

小兒疳瘦微熱方

汪主恩

主治 小兒骨蒸（結核性發熱）、盜汗、腹痛。

處方 胡黃連五分 五靈脂一錢 黃芩五分

烏梅一個 使君子仁三粒 柴胡五分

制法 水煎。

用法 每日一劑。

遺尿方

施友梅

主治 遺尿。

處方 桑螵蛸五錢 益智仁五錢

制法 研末。

用法 一次用米湯送下。

〔注〕遺尿症多為孩童之病，以上藥粉一兩宜考慮分多次服。

小兒遺尿方

董介先

主治 小兒遺尿。

處方 破故紙（炒）

制法 研末。

用法 每夜開水過服五分，甚效。

遺尿方

焦鴻峰

主治 遺尿。

处方 粉甘草末八錢 五倍子一錢(去虫糞研末)

制法 和勻，分成九包。

用法 早晚各服一包，開水下。

〔注〕 一劑到兩劑，兩星期至四星期見效。并可治慢性淋症，一劑見效。

桃花散方

刘希栋

主治 小兒喘息。

处方 石膏三錢 硃砂一錢

制法 共研細末。

用法 每服四分。

小兒喘息方

朱克昌

主治 小兒喘息，屬于多食鹹而誘起者。

处方 海螵蛸(細末)二錢 白糖適量

制法 和入粥湯內。

用法 內服，連續應用，自旬日至一、二月。

誤吞鉄釘方

主治 小兒誤吞鉄釘入腸胃。

处方 活磁石二錢 朴硝二錢。

制法 上藥研末。

用法 用熟豬油加蜜適量調藥末，吞之，隔夜藥裏鉄釘排出。

臍風方

高郵中医座談会

主治 初生兒臍風。

处方 吳茱萸 生半夏各等分

制法 研末。

用法 和鷄蛋清敷兩足心一晝夜。

口腔炎方

高志明

主治 小兒口腔粘膜炎。

处方 柿霜三分 硼砂一分 黃連二分(炒)

制法 共研細末。

用法 用少許敷口中，每日四次。

鵝口瘡方(俗名糊口白)

徐州專區中医进修班第三隊第五組

主治 鵝口瘡多見于一兩歲小兒，乳食不下，若蔓延喉部，能使喉部閉塞，甚為危急。

处方 月石三分 銅綠三分 火硝三分 冰片四分

制法 共研末，用筆一支蘸生桐油再蘸藥面，塗抹患處。

用法 一日三次。

〔注〕 此方治本病有特效。一日抹三次自愈。

鵝口瘡方

魏中濟

主治 鵝口瘡。

处方 海蝶蛸一錢 滑石粉一錢 冰片五分

制法 研末。

用法 吹之。

土苓一味煎方

李古松

主治 專治小兒先、后天梅毒，成人亦可用。

处方 鮮土苓一兩（小兒酌減）

制法 水煎。

用法 內服，一日三次，或頻頻服之，且須久服，始能生效。

〔注〕 忌五金、茶、醋、及鹽類食物。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中医秘方验方汇编 第二集

作者 = 江苏省中医中药学术研究 委员会筹备委员会资料室编

页数 = 9 1

S S 号 = 1 0 4 4 4 4 2 4

出版日期 = 1 9 5 8 年 0 4 月第 1 版

前言
目录
内科门

- 咳嗽、哮喘类
- 神效化痰丸方
 - 冷哮丸方
 - 肺炎方
 - 痰血方
 - 伤风方
 - 马脾风散方
 - 气喘方
 - 干咳嗽方
 - 伤风方
 - 杏金丹
 - 失音丸方
 - 加味生脉散方
 - 劳嗽方

- 肺癆类
- 肺结核方
 - 肺病方
 - 肺结核方
 - 肺结核方
 - 白参散方
 - 蛤蚧散方
 - 加减越鞠丸方
 - 龙骨龟板丸方
 - 木耳散方
 - 肺痈方
 - 肺痈方
 - 肺痈方
 - 金不换方
 - 肺脓瘍方

- 风痺、头痛类
- 风湿病方
 - 足牵筋方
 - 四肢麻痺方
 - 芎芷散方
 - 头痛方
 - 头风痛方
 - 头痛方
 - 头痛方
 - 头痛方
 - 口眼歪斜方
 - 腰痛方
 - 关节炎单方
 - 关节炎方

症疾类

偏头痛方
偏头痛方
头目晕眩方

症疾方
症疾方
治症散方
症疾方
症疾方
症疾砒豆丸方
症疾塞鼻方
症疾方
症疾方
症疾方
症疾方
症疾方
截症散方
症疾方
截症散方
症疾方
症疾单方
症疾方

肠胃病类

香附丸方
胃痛方
腹痛方
腹痛方
胃痛方
消化性溃疡验方（一）
消化性溃疡验方（二）
胃病方
胃病方
胃溃疡方
消化性溃疡方
神楝丹方
胃痛方
胃痛方
胃痛方
胃痛方
胃痛方
胃痛方
胃病方
胃病方
胃病方
胃病方

噎膈方
胃疼方
胃痛方
胃痛方

黄疸类

黄肿方
黄疸方
黄疸方
黄疸方
黄疸方
黄疸方

积聚膨胀类

腹水方
腹水方
腹水方
双甲散方
急性浮肿方
十大功劳散方
十面埋伏丸方
膨胀方
水肿病方
水肿方
肾脏性水肿方
肝脓肿方
水肿外治方
水肿单方

痢疾类

痢疾方
痢疾方
蒜薹丸方
痢疾方
痢疾方
痢疾方
痢疾方
痢疾方
痢疾方
痢疾方
痢疾方
休息痢方
泄泻方
血痢方
血痢方
痢疾方
水泻方
痢疾方
痢疾方

失血类

茜草丸方
吐血方
吐血或咯血方
吐血方
吐血方
吐血方
吐血方
吐血方
咳血方
便血方
便血方
便血方
肠风下血方
肠风下血方

虫病类

蛔虫方
蛔虫方
蛔虫方
蛔虫方
蛔虫方
蛔虫方
蛔虫方
蛔虫方
蛔虫方
驱虫方
杀虫方
六味丝虫丸方
四味钩虫丸方
钩虫皂铁丸方
钩虫单方
蛲虫方
虫积方
楝根煎方
牛郎丸方

癫痫类

癫狂病方
癫狂症方
舞蹈症方
痫丸方
羊痫风方
羊痫风方

破伤风、

狂犬病类
破伤风方
破伤风方
破伤风方 (一)
破伤风方 (二)
破伤风方

破伤风方
狂犬病方
狂犬病方
狂犬病方
狂犬病方
疯狗咬伤方
狂犬病方

泌尿病类

二便不利方
白浊方
淋疾方
小便频数方
小便癃闭方
尿闭外治方
小便癃闭方
二圣散方
小便不通方
小溲不通方
小便不通方
小溲不通方
血尿方
尿血方
淋浊方
小便淋痛方
尿道炎方
尿闭方
尿闭方
血淋方
血淋方
乳糜尿方

杂病类

脑膜炎方
阳萎方
阑尾炎方
遗精方
虚汗方
盗汗外用方
气瘕方
补血丸方
贫血方
伤心丸方
糖尿病方
吐泻方
水蛭入肛门方
大头瘟方
失眠方

		失眠方
		乳房结核方
		棉子油中毒方
		睪丸炎方
		睪丸肿大方
		肠仙方
		阑尾炎方
	肝阳类	
		高血压方
		土苓萆薢饮方
外科门		
	疮疡类	
		裤腿风方
		臃疮方
		臃疮方
		臃疮方
		臃疮方
		外科简易方
		肥皂单方
		外用方
		洪宝丹方
		金箍散方
		清露散方
		翻花疮方
		乌梅散方
		宿疮方
		八黄散方
		腿部溃疡方
		附骨疽方
		附骨疽方
		背疽方
		痈肿方
		串癰方
		乳腺炎方
		蜂窝织炎方
		腮头肉方
		收腮散方
		臃疮方
		三仙丹方
		生肌散方
		阴囊肿溃方
		流注方
	疔疮类	
		疔疮走黄方
		敷疔方
		疔疮方

拔疔方
蛇头疔方
疔疮方
山药膏方
解毒丹方
唇疔方
疔毒方
疔疮外治方

皮肤病类

顽癣方
黄水疮方
绣球疯方
苍茸茄根膏方
皮肤皴裂方
遇仙丹方
秃发方
鬍鬚头方
癣病外用方
鬍鬚头方
秃疮方
秃疮方
治癣方
烂脚方
脚湿气方
枯龙散方
长年烂脚方
疥疮方
痒疹方
皮肤湿疹方
皮肤验方
外科清凉膏方
神化散方
湿毒方
蚂蚁湿毒方
赤游丹毒方
羊胡疮方
绣球疯方
绣球疯方
烂皮癣方
蚁瘰方
蚁瘰方
消炎疤痕方
生发方
三仙丹方
鹅掌疯方
鹅掌疯方

鹅掌疯方
鹅掌疯方
鹅掌疯方
鹅掌疯方
鹅掌疯方
冻疮方
冻疮方
冻疮方
冻疮方
冻疮方
冻疮方

瘰癧、麻风、雅司病类

瘰癧方
瘰癧方
鼠核方
麻风方
大麻风方
麻风方
雅司病方
雅司病方
雅司病方
雅司病方

痔疮类

痔疮方
痔疮方
脱肛方
脱肛方
乙字汤方
漏管方

烫伤类

火烫伤
水、火烫伤方
灼伤方
水火烫伤方
烫伤方
烫火炮伤方

蛇虫咬伤类

毒蛇咬伤方
毒蛇咬伤方
蜈蚣咬方
蜈蚣咬方
蛇咬方

跌打损伤类

活血止痛汤方
止血方
伤科方

	骨折方
	伤药方
	接骨方
	接骨方
	刀伤方
	刀伤方
	刀伤方
	跌打损伤方
	腰扭伤方
	伤药方
	刺伤肿痛方
五官病门	
眼病类	
	目疾方
	目疾方
	目疾方
	夜盲方
	决明散方
	眼科效方
	茺荑方
	赤眼方
	眼癖方
	夜盲症验方
	消障救眼方
	煤油治眼炎方
耳病类	
	中耳炎方
	耳内瘰肉方
	慢性中耳炎方
	中耳炎方
	中耳炎方
	中耳炎方
	中耳炎方
	耳聋方
	耳聋鼠胆膏方
鼻病类	
	鼻渊方
	鼻渊方
	脑漏方
	脑漏方
	鼻衄方
	鼻疳方
咽喉病类	
	白喉方
	白喉方
	白喉方

白喉吹药方
喉科方
平险如夷散方
咽喉痛方
喉痹方
四七噤化丸方
柳华散方
引龙归海散方
加味凤鸣散方
青吹药方
珍珠散方
金不换方
雄黄解毒丸方
矾角散方
红雪散方
黄雪散方
海洋至宝方
乳蛾方
白喉外治方
红吹药方
口疳方
口疮方
冰片散方
人中白方
云珠散方
开关立效散方

齿病类

牙痛方
牙痛方
风火牙痛方
牙疼方
风火牙痛方
巴椒丸方
龋齿疼痛方
齿衄方
齿衄方
牙疳方
砒枣散方
走马疳方
治火牙单方
生肌散方
沃雪散方
牙痛方

妇科门

调经类

痛经方

痛经方
经闭方
干血癆方

崩帶类

白帶方
白帶方
白帶方
白帶方
白帶方
白帶方
白帶方
白帶方
白帶方
帶下方
白帶方
血崩方
血崩方
血崩方
血崩方
血崩方
崩漏方
崩漏方
子宮出血方

产后疾病类

产后多汗方
产后风方
产后破伤方
产门不闭方
初产阴户肿痛方
儿枕痛方

妇女杂病类

产后缺乳方
乳汁不足方
催乳方
吹乳方
女科胎前饮方
乳痈方
乳痈方
乳痈方
乳痈方
乳癌方
乳腺炎方
乳脓炎方
奶疔方
奶疔方
奶大脱皮方

儿科门		黄膏药方
		枳实方
		雀斑方
	惊风类	
		小儿惊风方
		小儿惊风方
		敷惊散方
		太极丸方
		小儿惊厥方
	百日咳类	
	百日咳方	
	百日咳方	
	百日咳方	
	百日咳方	
	梨膏半贝散方	
	百日咳方	
	小儿咳嗽方	
疳积类		
	肥儿粉方	
	小儿便秘方	
	丹阳子药方	
泄泻、呕吐类		
	小儿泄泻方	
	小儿水泻方	
	小儿腹泻方	
	小儿吐泻方	
	小儿呕吐方	
小儿杂病类		
	小儿赤游丹方	
	小儿吐乳方	
	小儿夜啼方	
	小便不通方	
	小儿脱肛方	
	小儿口疮方	
	小儿羊须疮方	
	二粉散方	
	小儿癰疮方	
	干脐散方	
	引儿食乳方	
	脐突出方	
	小儿疳瘦微热方	
	遗尿方	
	小儿遗尿方	
	遗尿方	
	桃花散方	

小儿喘息方
误吞铁打方
脐风方
口腔炎方
鹅口疮方
鹅口疮方
土苓一味煎方