

第 49.

廣東省各縣市

中醫驗方交流彙編

第一集

廣東省中醫藥研究委員會編印

廣東省各縣市驗方交流集
第一集

廣東省中醫藥研究委員會編
公私合營蔚興印刷廠印

編號：研方 56—1 印數：1,500

開本：32 字數：


一九五六年七月出版

0.50

內 容 說 明

搜集和整理中醫秘方驗方，吸收其中一切合理的有效用的部份，並加以整理提高，更好爲保健事業服務，這是我會的工作任務之一，本編所彙集的驗方是廣東省衛生廳廣州市衛生局和本省各縣市衛協會幾年來從中醫各界及人民群眾獻方者所收集起來的第一集，現在把它編印成集，再送到各個衛生醫療機構作進一步實驗研究。同時擴大了交流效果，以証明祖國醫學遺產是豐富多采，和對保健的潛在力量是鉅大的。希望各衛生醫療機構單位與各地中西醫工作同志們進行實驗研究，隨時將實驗結果送到我會以便聯系，共同搞好整理驗方的工作。

本編內容共收集1000多個驗方，分爲內科、婦科、兒科、五官科、外科、災害外科等各類每科再以症狀分目，目內各個處方，首標方名，次獻方人，次藥品份量，次用法，次適應範圍，檢索時可按分類頁數檢查，對於一些未刊出的驗方，留待第二集編入出版。



目 錄

第一篇 內科症類

一、吐瀉（急慢性胃腸炎、霍亂）·····	內 1—7
二、心腹痛（胃神經痛、消化性潰瘍、闌尾炎、 腸寄生蟲腹痛、小腸疝氣痛）·····	內 7—13
（參攷第二十項疝痛範圍）	
三、膈食反胃·····	內 13—14
四、痢 疾·····	內 14—21
五、大便秘結·····	內 22
六、小便澀閉·····	內 22—24
七、淋濁（五淋白濁）·····	內 24—28
八、黃 疸·····	內 28—30
九、吐血（胃出血、鼻血、大便下血、 血友病 ）·····	內 31—35
十、肺癆（咳血）·····	內 35—37
十一、咳 嗽·····	內 37—40
十二、哮 喘·····	內 40—44
十三、肺 癰·····	內 45
十四、瘧 疾·····	內 46—53
十五、脚 氣·····	內 53—54
十六、癱 瘓·····	內 54—56

十七、水腫（附血吸虫晚期效方）	內 56—76
十八、關節痛	內 76
十九、頭痛	內 76
二十、疝痛（睪丸炎癰瘻積聚）	內 76—79

（參攷第二項心腹痛範圍內小腸疝痛）

廿一、癲狂	內 79—80
廿二、撞紅、夾色傷寒、蘇勞	內 80—83
廿三、虛弱（貧血、萎黃、眩暈、失眠、怔忡、遺精、 縮陽）	內 84—87
廿四、傷寒（腸熱）	內 87—88
廿五、鼠疫	內 88

第二篇 婦科症類

一、經痛	婦 1—2
二、帶下	婦 2—3
三、難孕	婦 3—5
四、經閉	婦 5—7
五、血崩	婦 7—11
六、胎前	婦 11—12
七、產褥	婦 12
八、鬼胎	婦 13
九、陰挺（子宮脫出）	婦 13—15
十、乳瘡（包括離奶）	婦 15—16

第三篇 小兒科症類

一、口腔病·····	兒 1—3
二、吐乳·····	兒 3
三、泄瀉·····	兒 3—4
四、疳積（包括蛔虫）·····	兒 5—9
五、夜啼·····	兒 9
六、驚風·····	兒 9—14
七、咳嗽（包括百日咳、奶哮）·····	兒 14—20
八、麻疹·····	兒 20—22
九、皮膚胎毒·····	兒 22—23

第四篇 五官科症類

一、眼科·····	五 1—5
二、耳科·····	五 5—7
三、鼻科·····	五 8—9
四、喉科（包括舌病）·····	五 9—17
（附）牙科·····	五 17—21

第五篇 外科症類

一、瘡瘍（包括皮膚爛肉）·····	五 1—6
二、疔腫·····	五 7—9
三、瘰癧·····	五 9—10

四、痔 瘡	五 11—14
五、疥 癬	五 14—15
六、濕 疹	五 15

第六篇 災害外科症類

一、犬咬傷（附狂犬咬傷）	災 1—3
二、蛇蟻咬傷（包括蜈蚣咬傷）	災 3—17
三、燙火傷	災 17—18
四、跌打刀傷（附破風傷）	災 18—27
五、砲彈射傷	災 20—28
六、急救（包括骨梗、服毒）	災 28

廣東省各縣市中醫驗方交流彙編

第一編 內科症類

一、吐瀉（急慢性胃腸炎、霍亂）

治腹瀉方

平遠縣 袁濟生

【處方】 老柚壳三錢，細茶葉二錢，生羌二小片。

【服法】 上藥二味共爲細末，用生羌煲開水送服。

【適應症】 腹痛瀉，瀉下如水。

【戒食】 生冷之品、及魚類猪油三幾天。

急性腸炎方

封開 符汝英

【處方】 玉兒草蕈一兩（又名滿天星綢牛特角膿膏，該藥分大葉細葉兩種，現取其細葉者）金剛葉二十張，槌爛，棉花核一兩槌破（槌時用布包好，不可被核飛去）同煲水服，另用鐵薯芋去皮，切成細條，用鑊炒成炭存性（有黃色的不要）用上藥水沖焗出味，頻頻服，遇渴即飲，便可馬上止疴嘔，如手足仍抽搖用金剛葉一斤半，大寬筋藤一斤半，生鹽四兩煎水洗四肢和全身，便可止痙攣，此方本人曾治效數次。

【適應症】 腹部劇烈疼痛，（腸痙攣）腹瀉，臭味難聞，瀉出黃色水四五次併發嘔吐不止及手足痙攣，食百物不下，汗淋如雨，口噤不言，病發時如治不得法，十至十五小時使

會死亡。

又 方

開建 吳孔梗

【處 方】 鷄桐木一兩，蕃薯藤乾二兩，煲水飲即止吐瀉，渣擦手足，就不會抽筋。

【適應症】 忽然泄瀉肚痛抽筋等。

疴嘔腹痛方

封開 八耀榮

【處 方】 赤苓、甘草、蒼朮、酒芩、蘇葉、陳皮、法夏、神曲、牙皂、木香、細辛、藿香、麥芽、枳壳、各三錢，香附、山渣、薄荷、腹皮、砂仁、川朴（羌汁炒）扁豆莢根蓮葉各六錢。

【用 法】 共爲末，每服六分，陳皮湯送下，抽筋加川木瓜湯送下

【適應症】 疴嘔腹痛抽筋、傷暑傷寒各症，不論有汗無汗。此方小兒每服六分尚可，成人每服須一錢，瀉久而有缺水現象勿服。

治絞腸痧方

豐順衛協

【處 方】 拉蓼葉一兩，和黃糖煲水服。

治大腸熱瀉方

豐良衛協

【處 方】 木耳五錢，用水浸漲，露一晚，和白糖晨服。

絞腸痧方

廣州 趙思競

【處 方】 生羌磨汁於杯內澄片時，傾去羌汁，將杯底羌粉少許點入兩眼大角內，流出熱淚，很快見效。

絞腸痧劇烈吐瀉腹痛方

廣州 梁翰芬

【處 方】 雄黃晶三份，白礬七份，共爲細末，梘水粽搗爛爲小

丸成人每服一錢，小兒減半，一日可服二次，開水送服。

疴嘔肚痛抽筋霍亂方

廣州 黃節香

【處方】 厚朴一兩 霍香一兩 煨木香五錢 泡蒼朮一兩 老檀香一兩 丁香五錢 烏梅肉一兩 川木瓜五錢 法半夏一兩 淡附子五錢研末成人每服一錢，小兒五分（均司碼秤）用陰陽水送服，止後每2——3小時服一次，一日三次。

霍亂驗方

豐順 陳乃生

【處方】 焦白朮兩，干羌五錢，熟附五錢，炙甘草三錢。

【用法】 水兩碗煎六分溫服，隔兩小時再服一劑，若吐瀉仍有、加煨肉寇三錢、肉桂錢，用灶心土或赤石脂二味煎水去渣，將水煲藥，如抽筋加木瓜五錢，桂心二錢，如大汗大渴用高麗參二錢（半炒）或黨參五錢，麥芽三錢，五味子錢半另煎水當茶飲，若服藥即吐，仍須頻服，竟有日夜連服四、五劑，四肢才轉溫，吐瀉漸止者，症有輕重，故效有遲速，萬勿因一、二劑少效便易他方。

【附註】 一九四三年梅縣霍亂流行，死者不計其數，後以此方治療，活者甚多。惟必要確診是寒霍亂方合。在霍亂初期，四肢未至厥冷，心力未呈衰竭者，宜先服上方，患者已呈厥逆，脈伏，即投此方以爲救危，二方相輔而行，效果很好。

治霍亂效方

雲浮 陳榮光

【處方】 薏仁五錢，川木瓜三錢，白芷三錢，蠶砂三錢，吳萸六分，樟木子二錢，蒼朮一錢，扁豆五錢，水煎去滓加鹽少許溫服。

治霍亂驗方

雲浮 黃勉臣

【處方】 甘松一兩，桂枝一兩，羌活一兩，藿香一兩，知母一兩五錢，樟木子錢半，連翹錢半，甘草五錢。

【用法】 共爲細末，大人每服三錢，小兒減半服之。

又方

雲浮 黃勉臣

【處方】 樟木子五錢，或用樟木皮五錢，煎水內服，小兒酌量減用。

治霍亂方

雲浮 劉永康

【處方】 簪前滴水石，約一至二斤，放鍋中炒至極紅，淬入清水二、三碗，煮沸，加生油或茶油七至八滴再煎，傾置盆中，用粗紙拖去水面上油膩，候溫，令病人恣飲之，自癒。

【附註】 本方經治癒多人，屢試效果很好。

治霍亂吐瀉腹痛屢驗方

雲浮 衛榮彬

【處方】 蒜頭四兩，食鹽二兩，將蒜頭搗爛和鹽放入鍋中炒至老黃色，加水煎沸服至不瀉爲止，如係寒加吳萸八分同煎服。

治乾霍亂又名絞腸痧方

陳炳榮

【處方】 竹筒蜂，搗爛，加鹽少許，沖滾水服之。

吐瀉散

豐順 徐朝

【處方】 眞射香二分，蟾酥二分，明枯礬四錢，明雄精三錢，藿香四錢，吳萸三錢，川連一錢，桂枝三錢，大黃錢半，

青蒿二錢，春砂仁二錢，甘草二錢，金石斛二錢。

【製 法】 共研細末，用瓷瓶貯藏，勿令洩氣，另用檀香少許煲水數滾後約二茶杯再和冷開水二茶杯共沖服藥散。

【用 法】 成人每服五分，若吐瀉未止，可再服五分，兒童按年齡大小酌減予服。

【附 註】 一九四三年夏，我縣霍亂流行，周治清醫師用此治癒者十多人，服藥後須服大量鹽水。

吐瀉方（脾虛） 封開 伍學傳

【處 方】 附子一錢，白朮錢半（土炒）防黨一錢，炙草一錢，干羌五分，春砂仁一錢，白芍一錢（炒）故芷一錢（鹽水炒）玉桂一分（研末另包沖服）

【用 法】 另用灶心土八錢，以水二碗煎取一碗，澄清去渣煎上各藥成半碗溫服（三至五歲全方，一至三歲半服）

霍亂抽筋驗方 廣州 吳森波

【處 方】 火秧勒樹一兩去皮，煲水一次服。

霍亂症散方 廣州 屈炳衡

【處 方】 霍香八兩，蒼朮八兩，甘草六兩，芥穗四兩，香干四兩，丁香三兩，神糲四兩，厚朴四兩，赤芍六兩，蘇葉六兩，黃連三兩，桂枝四兩，白芷六兩，樟木子八兩，石脂八兩，枳壳四兩，腹皮八兩，木香三兩，防風四兩，雲苓一斤，香附三兩，桔梗六兩，陳皮四兩。

【用 法】 共研細末，每服五分，小兒減半，重症加倍，開水沖

服。

- 【適應症】 霍亂吐瀉抽筋，或不吐瀉而肚痛抽筋的攪腸痧症。忌食米氣寒冷膩滯等物。

時疫霍亂散

廣州 馮希陶

- 【處方】 大梅片八分，薄荷冰一錢，枯凡三錢，正辰砂一兩，廣木香一兩，細辛五錢，白芷三錢，甘草三兩。

- 【用法】 共研細末，每服一錢，急症每四十分鐘一次，緩症一小時一次，一日三次。

- 【適應症】 霍亂吐瀉，四肢厥冷，脈伏不起，昏迷，轉筋。

萬應散方

廣州 劉詠如

- 【處方】 細辛三錢半先研盡，牙皂三錢半先研盡，硃砂二錢半，蟾酥一錢，陳皮二錢，雄黃晶二錢半，防風二錢，白芷二錢，桔梗二錢，甘草二錢，法夏二錢，貫衆二錢，藿香二錢，木香二錢，丁香二錢，薄荷二錢，白凡二錢，製南星二錢。

- 【用法】 共研細末，忌用火炒，封固候用。

- 【適應症】 疴嘔腹痛抽筋，風火牙痛，中風中痰，心胃氣痛，傷寒傷暑身熱，山嵐瘴氣，水土不服，大人小兒急症，中風中痰，胃氣腹痛，小兒每次用1—2分，大人每次一錢，兼用此散點眼內。

六神嘔疴散

廣州 蔡文榮

- 【處方】 樟木子、廣木香、赤石脂、白芍、甘草、粟殼等分。

- 【用法】 共研細末，每服二分，重症二服至三服，兒童遞減。

- 【適應症】 疴嘔腹痛抽筋，小兒胃腸病吐瀉。

霍亂驗方

廣州 鍾玉池

【處方】 樟木子三錢，丁香二錢，炮天雄四錢，不撥二錢，川干姜二錢，白芷二錢，玉桂一錢，鴉片烟屎（三沙尿）二錢，風沙藤根四錢，山芝蔴根四錢。

【用法】 共研細末，五歲以上，每服1—2分，成人服4分，開水送服，五歲以下小兒忌服。

【適應症】 寒症霍亂，瀉如清水，六脉沉微，四肢冰冷。

霍亂疴嘔散

廣州 程蓬

【處方】 廣木香二兩，石菖蒲二兩，泡蒼朮二兩，吳萸八錢，辰砂四錢，坡蔻八錢，厚朴二兩，沉香八錢，丁香40粒，鴉片烟灰四錢。

【用法】 共研細末，以三分庄小樽裝，蜡封口候用。成人每服一樽，重症加倍，五歲以上兒童半樽，五歲以下忌服。

【適應症】 虛寒、或寒濕之霍亂疴嘔腹痛抽筋均效。

二、心腹痛（包括胃神經痛、消化性潰瘍痛、闌尾炎痛、虫痛、小腸疝氣痛）

心氣痛方

封開 蘇燦財

【處方】 川朴錢半，炙脂錢半，香附一錢，佛片錢半，鬱金一錢，飯朮錢半，枳壳一錢，故芷錢半，陳皮一錢，甘草五分，川芎錢半，當歸一錢，生羌二片。

【用法】 水煎服。

【適應症】 男婦心氣痛。

心氣痛方

雲浮 趙裕才

【處方】 茵陳三錢，南豆花三錢，佩蘭三錢，花粉二錢，桃仁二

錢，干葛花三錢，桑枝三錢，薤白二錢，生枝仁錢半，甘草一錢。

加減法：孕婦去桃仁，體質寒者去枝仁，加延胡二錢或加佛手二錢。

【適應症】 由消化不良而誘發的胃腸痛症，時發時止者。

治胃痛屢效方

雲浮 趙裕才

【處方】 荔核（煨）五錢，乳香三錢，玄胡索三錢，研末。

【用法】 每三服錢，日兩服，白開水送下。

治男婦心胃氣痛方

雲浮 葉良

【處方】 川朴（羌汁炒）二錢，甘草五分，五靈脂一錢，佛手一錢，飯朮一錢，當歸身一錢，破故紙一錢，川芎一錢，枳殼一錢，川鬱金一錢，香附一錢，廣陳皮一錢，生羌二片。

【用法】 水煎內服（此方經多人服食有效）

治心氣痛單方

雲浮 黃瑞林

【處方】 寒痛用山薑頭一兩，熱痛用白銀樹二層皮二兩，均用清水煎服，

治心絞痛方

雲浮 趙裕才

【處方】 血餘炭八分，晚蠶砂一兩，研末，另玄胡三錢，煎水沖入上二味藥末，攪勻澄清服之，立止。

治氣脹頂心不能食方

黃瑞熙

【處方】 用生雄雞雛一隻，在雞背上用瓦器剖開，急去內臟，加川麝一分，敷臍上，或痛處，良久，自安。

立止腹痛方

封開江口 蘇卓活

【處方】老羌

【用法】把羌搥爛敷在肚臍上，其痛立止。

肚痛不止

封開 張少眉

【處方】生葱頭八兩

【用法】將葱搥爛炒熱敷肚臍處即愈。

肚痛萬應散

廣州 鄧智卿

【處方】黃連一兩，黃芩一兩，黃柏一兩，紫蘇葉一兩，香附一兩，藿香四錢，乳香四錢，降香四錢，檀香四錢，沉香四錢，蒼朮四錢，沙朮四錢，甘松四錢，~~陳皮四錢~~，~~木香四錢~~，~~枳實四錢~~，延胡四錢。

【用法】研細末，另用大黃二兩，浸煎濃汁養麵爲丸，每重五分，辰砂爲衣，每服二丸（小兒減半）開水送服。

【適應症】四時感冒，疴嘔，腹痛。

逢痛必止散

廣州 王一強

【處方】赤石脂兩，鬱金二錢，赤芍二錢，靈脂二錢，甘草十兩，乳香二錢，木香一錢，金花草二錢，煨馬錢二錢，鴉片烟二錢，田七二錢。

【用法】研末和勻，成人每次服三分，兒童一分（五歲內小兒禁用）開水送服。

【適應症】各種痛症輕重新久均効，止痛後覺口乾喉燥的飲淡鹽水。

本方含有劇毒成分如煨馬錢、鴉片烟、金花草，須十分謹慎注意使用，以免容易招致中毒。

止痛丹

廣州 馮天慈

【處方】 甘草三十份，坡蒾五份，大茴五分，薄荷油四份，丁香油三份，樟油五份。

【用法】 研末煉成小丸，看症輕重增減。

治慢性腸神經痛方

潮安 周益枝

【處方】 乳香一錢五分，沒藥一錢五分，茯苓五錢，白芍五錢，小茴七分，川棟二錢。

【用法】 水煎服

【適應症】 衰弱期慢性腸神經痛。

治一切腹痛效方

豐順 劉兆芹

【處方】 芍藥甘草湯——杭白芍一兩，炙甘草五錢。

【用法】 用清水一碗半，煎六分溫服，兒童減半。

此方除療胃腸一切痛甚效之外，對二腳攣急酸痛不能行亦甚效，（其症狀晚上腫痛，而晨止者）凡因跌打損傷或睡眠姿勢不正，因而腰背有筋牽強者

治胃痛方

雲浮 黃瑞林

【處方】 啄木鳥一隻，燒灰存性，用酒送服。

胃痛方

廣州 劉詠如

【處方】 薤白頭三錢（去衣）炒焦瓜蒌仁三錢，延胡索二錢，法夏二錢，茯苓三錢，香附二錢，煨瓦弄子三錢，生羌二片，桂枝錢。

【用法】 清水煎服。

【適應症】 久患胃痛，胸痞泛澁，脉弦。

治胃積疼痛方

雲浮 歐宴桃

【處方】 青皮二錢，靈脂二錢，川棟子二錢，穿山甲珠二錢，小茴二錢，玄胡索錢半，沒藥錢半，良薑錢半，檳榔二錢，木香錢，沉香一錢，春砂分，煎服。

沉香化滯定痛丸

雲浮 李茂釗

【處方】 沉香錢半，大黃三錢，莪朮二錢，沒藥二錢，乳香二錢，煨瓦楞子五錢，玄胡索（酒炒）三錢，爲末糊丸服，每次三錢。

胃和十二指腸潰瘍方

廣州 謝 創

【處方】 五靈脂八兩，香附子八兩（去淨毛水浸一日）黑丑一兩，白丑一兩。

【製法】 共爲末微火炒至半熟，醋和爲丸，如蘿蔔子大。

【服法】 每日早晚各服一次，每次一錢，羌湯送下。

慢性胃潰瘍

封開 鄧瓊林

【處方】 南豆花三錢，雲苓三錢，金釵斛二錢，干葛花三錢，苡仁五錢，薤白二錢，春砂花錢半，檳榔花錢半，白芍二錢，甘草一錢。

南豆、干葛、春砂、佛手等花，係療胃腸病發作疼痛比較青皮木香等有效，而且較少副作用，至於此種花類之性味，大概與各藥本身之作用相近似，但氣味芳香，鎮痛調整之功能較爲優越，如能臨床診斷確屬腸胃病疼痛

者，可以對合症狀選方用之，（或適當加減）常收良效。

【症狀】胃部疼痛，牽引脅痛，每發時即覺潮熱，噯腐，大便常夾黑色血液，脈緩濇，舌苔白滑不渴。

治胃痛民間驗方 雲浮 趙裕才

【處方】桐油特強，約四、五兩，煎水內服。立效如神。

闌尾炎方

【處方】西黃五錢、元明粉五錢、丹皮五錢、桃仁三錢、冬瓜仁五錢、木通三錢、海藻三錢。

【用法】水煎溫服，日二次，如瀉過多，宜減西黃明粉。

【適應症】闌尾炎疼痛。

治闌尾炎方 封開 張伯炘

【處方】丹皮三錢、苡米五錢、桃仁三錢、菖蒲三錢、香附二錢、甘草一錢。

【用法】水煎服

【適應症】盲腸部疼痛劇烈，右足抽縮，不能伸直。

菖蒲一葯，廣州對腸癰常使用小菖蒲又名外菖蒲

治盲腸炎方

江村區高塘小組西醫 劉介臣

【處方】蛇利草、煲茶飲。

【服法】生用或晒乾同樣可用，份量多少無妨

胃痛和虫患 封開 何仲平

【處方】烏梅丸一防黨三錢，歸身二錢，干羌錢半，川連二錢，

細辛錢半，川椒錢半，桂枝錢半，黃柏二錢，附子二錢
烏梅四錢

此方原治厥陰吐蛔的，現借胃腸作痛虫患，往往收到
良好效果，若服其他治標的止痛藥無效者，可試服此
方。

心氣痛方

廣州 趙思競

- 【處方】老黃皮樹根或梅花樹正根三錢黑枝7—8個水煎好酒冲服
又方白毛鷄胆一只不見水，正蜜糖一杯燉滾臨發作前空
心服
又方網油膏二錢綠豆一分錢煲數滾食後嘔虫而癒。

三、膈食反胃

治膈食反胃方

鬱南 陳萬生

- 【處方】雪梨一個去核入丁香五十粒在雪梨內，外用紙包煨熟食
之。
【適應症】食入即吐

又方

鬱南 聶尊賢

- 【處方】牛反草煎水服（即牛夜間反出的草，用手採取）
【適應症】朝食晚吐，晚食朝吐

治膈食驗方

雲浮 黃瑞熙

- 【處方】青皮三錢，薑乾三錢，吳萸五分，鵝喉二條，川生花二
錢，牡丹皮三錢，細辛五分月石五錢。
【用法】爲末，分四天服三次。

膈氣散

廣州 趙思競

- 【處方】大黃二兩酒製九次上沉香末六錢礪砂二錢桃 去皮尖去

油六錢烏藥一兩

【用法】 研末每服三分，五更舌上舐津下。

四、痢疾

痢疾屢驗方

陳濟周

【處方】 生穀芽、炒穀芽、生車前子、熟車前子、生甘草炙甘草

【用法】 各等分、肚痛朽瀉加炒白芍、生白芍、生山桂肉、炒熟山查肉（本方由玉子巷禮耕齋關澄弼秘傳而來）

久痢驗方

廣州 梁端儕

【處方】 鴉胆子去壳取完整粒肉。

【用法】 成人每次服20—50粒，可用吸素分載，空腹開水送服，痢疾經過一星期以上多效。

治閉口痢方

番禺

【處方】 去壳鴉胆子肉霜一兩

【製用法】 將鴉胆子肉取去油，（名肉霜）用白飯二兩和藥搓成小丸綠豆大，大人服八粒，小兒服一二粒，同時用（當歸炭三錢，荊芥炭一錢）煲水作茶飲，又將京柿一個，瘦肉二兩，木棉花四朵，作餽食。

痢症丹

廣州 姚錦石

【處方】 生大黃二兩，羌活一兩，製川烏一兩，北杏仁25粒，蒼朮一兩半，米甘水浸一夜麻油炒。

【用法】 共研極細末，每服三分至一錢，一日三次，小兒酌減，開水送服。

赤痢驗方

【處方】 用貓鼠耳草，分劑成人每次服一兩，蘿蔔皮一兩燉水沖

蜜糖，重症服三次即癒。又方用蘇銀花一兩研末冲蜜糖作二次服

紅白痢症方

廣州 趙思競

【處方】 紅花三錢，鴉片一分，黃蜡五錢，硃砂一錢，鴉胆肉五錢去油。

【用法】 研細末，爲小丸如綠豆大，每服八粒，一日三次。

痢症方

廣州 趙思競

【處方】 鐵香爐十二文錦地羅十五文白石（木）耳十五文京柿三個木棉花四文白芽根二文

【服法】 清水煎服

治痢疾方

順德大良 董少宸

【處方】 大黃一兩

【用法】 用好酒二大盞，煎至一盞半，去渣分二次服。

【適應症】 瀉痢日久不愈，膿血稠粘，裡急後重，日夜無度。

又方

董少宸

【處方】 赤芍四錢，白芍四錢，歸尾三錢，黃芩三錢，大黃二錢，木香二錢，尖檳三錢，甘草一錢

【服法】 清水煎服

【適應症】 紅白痢疾，腹痛，裡急後重。

又方

董少宸

【處方】 白芍六錢，黃芩四錢，甘草一錢五分

【服法】 水煎服

【適應症】 痢止後，服此以撤盡其毒。

又 方

順德容奇 李庭芬

- 【處 方】 水飛木薯粉
【用 法】 成人每次量兩匙，用冷水調勻如糊狀，加入白糖少許，用滾水沖入，口服
【適應症】 痢疾裡急後重，黃白粘液帶血，日下數十次，連服此藥四次，可以見效。

又 方

- 【處 方】 生狗貼耳三兩，生細藥鳳毛草二兩
【用 法】 將上藥煎取一碗半濃汁，加老蕃薯餅末半個，沖蜂糖服，小兒減半。
【適應症】 紅白痢疾

又 方

失名

- 【處 方】 大黃四錢，只壳三錢，檳榔二錢，為歸二錢，川朴二錢，赤芍三錢，萊服子三錢，木香四分
【用 法】 水煎服
【適應症】 久痢不愈，新痢而無發熱惡寒症狀此亦可。

痢疾方

手抄本

- 【處 方】 西黨三錢，西栗壳二錢，木香五分，故紙二錢，五味20粒縮砂一錢，山楂二錢，煨羌為引
【服 法】 水煎服
【適應症】 久痢不愈

痢疾方

封開 梁云山

- 【處 方】 留種蘿蔔頭一個煲水，後將蘿蔔水煲鷄蛋二只食湯服用，如果長期痢紅白痢者，將蘿蔔水煲鷄肉連湯服食。

又 方

封開 梁伯強

【處 方】 春砂花二兩，煲水冲蜜糖飲，若有紅白，加檳榔炭八錢同煎。

又 方

封開 龍崑山

【處 方】 槐花、麥芽、榴皮、蒼朮、銀花、茯苓、鬱金、靈脂、沉香，以上各味錢半炒過，若虛痢加炙芪炙黨炒白朮便效，（煎服）
此方屬寒濕痢有效。

又 方

封開 莫翰洲

【處 方】 銀花三錢，黃芩二錢，白芍二錢，山楂二錢，枳壳二錢，檳榔二錢，歸身三錢，甘草一錢，地榆二錢，紅花二錢，如祇是白痢無血者，去地榆加大黃錢半，木香八分同煎服。

【適 應】 紅白痢均可適合，初起濕熱積滯者多效。

又 方

封開 黎民生

【處 方】 玉桂五分，川連二錢，煎服連飲五天

【適 應】 久痢可用，經驗。

寒痢症方

封開 蘇富軒

【處 方】 熟附四錢，炮羌錢半，茯苓四錢，白朮四錢（土炒）赤石脂三錢，吳萸七分，炙草一錢，煎服。

【適 應】 痢疾不止，脈沉小，舌淡白微黃，但潤而不燥，渴飲熱湯，腹中隱痛有效

又 方

封開 蘇富軒

【處 方】 熟附子四錢，干羌錢半，飯黨參三錢，白朮四錢（土炒）

茯苓四錢，赤石脂三錢，水煎服

【適應】 紅白痢日久，脈微欲絕，舌淡白不渴。

痢疾方

豐順 譚江衛協

【處方】 鮮鳳尾草一束，萊菔子一兩，（畧炒）柿餅一塊。

【用法】 將萊菔子柿餅煎水後，將鳳尾草搗斗再加蜂糖服之。

又方

豐順 許振剛

【處方】 川大黃四錢，枳殼三錢，白芍五錢，川朴錢半，麥芽四錢，南木香一錢，（後下）檳榔錢半，若下血多者加槐花四錢，（炒黑）此方適用於初起的痢疾。

治赤白痢疾經驗方

雲浮 區功蓋

【處方】 毛射五錢，山楂子三錢，金銀花一兩，煎水服

治紅白痢疾方

雲浮 何漢華

【處方】 用黑葉荔枝核晒乾爲細末，另用燈心球一丸，陳皮一塊煲粥，將荔枝核末和入粥內另加上白糖拌勻食之，雖噤口痢亦效。

治小兒痢疾有效方

雲浮 趙裕才

【處方】 雲母石（眞者）三錢，爲極細末和粥哺兒食之即止。

治痢疾方

雲浮 歐國英

【處方】 槐花三錢，銀花三錢，木棉花三錢，川連一錢，鷄蛋花二錢，天香爐二錢，白頭翁三錢，大黃二錢

【用法】 水煎服。

治紅白痢疾方

雲浮 樊榮華

【處方】 生苡米一兩，黑芝蔴一兩，搗爛煎服有效。

治紅白痢症驗方 雲浮 六合診所

【處方】 栗殼三錢，麥冬三錢，竹葉三錢，紅棗七只，黑棗七只，燈芯一子，水煎去滓加黃糖白糖各七錢，服之有效。

治紅白痢症方 雲浮 保民診所

【處方】 枯礬二錢，甘草二錢，沉香二錢，洋烟屎二錢，赤石脂二錢

【用法】 共爲細末大人每服七分，小兒每服三分，白開水送下。

治痢症良方 雲浮 彭明軒

【處方】 萹蒲四錢，萊菔子三錢，北紫草五錢，銀花三錢，槐花三錢水煎服。

又方

【處方】 用元根火秧心漂淨煲水煎之。

紅白痢疾方 失名

【處方】 川不太、木棉花、赤茯苓、錦地蘿、金香爐，每四錢煎水服。

治痛痢特效方 雲浮 趙裕才

【處方】 川連五錢，槐米一兩，（二味同炒至老黃色，去槐米不用）另乳香錢半，沒藥錢半研爲細末，先將川連煎水作濃汁調入藥末，作一次服之，立能止痛止痢。

治紅白痢疾方 廖觀慶

【處方】 黑骨槳煲水飲。

又 方

葉少海

【處 方】 鳳尾草煲水冲蜜糖服之。

治下痢方

葉滿枝

【處 方】 刀頭玉、木棉花、鷄谷草、水煎內服。

治痢疾經驗良方

雲浮 區焯年

【處 方】 金香爐一兩，土銀花六錢，棉茵陳六錢，加京柿二只去蒂切片水煎服。

治白痢方

雲浮 曾吉燮

【處 方】 祈艾、木香、川薤白、錦地蘿、水煎內服。

治獨腳痢方

雲浮 梁毅修

【處 方】 黑鐵樹葉一兩，煲豬瘦肉少許服之，痔症下血亦效。

治噤口痢疾方

雲浮 朱星葵

【處 方】 山查五錢，銀花五錢，研末用羌皮煲滾水冲蜜溫服。

治痢疾初起方

雲浮 六合診所

【處 方】 赤痢用紅梗勒莧菜四兩，白痢用白梗勒莧紋四兩，如紅白痢每樣各三兩，搗爛汁絞冲滾水和蜜糖內服。

治痢效方

雲浮 陳榮光

【處 方】 薏五仁錢，扁豆五錢，葛根五錢，鴉胆子另吞七粒，陳皮一錢，赤芍四錢，山查七錢，麥芽五錢，水煎去滓溫服。

治紅白痢方

雲浮 嚴錦卿

【處方】 雀仔利草用三至四兩搗爛沖蜜糖服之。

治痢疾方

雲浮 黃盛林

【處方】 勒茨菇煲豬瘦肉食之，內服量每次一兩。

又方

【處方】 酸石榴搗絞汁取二升，每服五合，治五色痢疾有效。

治久痢不止方

【處方】 薺花不拘多少，陰干研末每服二錢，白開水送服。

治阿尾巴性痢疾方

雲浮 趙裕才

【處方】 白頭翁湯加歸身五錢，白芍四錢，香椿樹根皮五錢，水煎，內服，吞服鴉胆子十至十五粒，如丫鴉胆子後腹痛轉劇可煎服白芍四錢，甘草二錢即止。

治細菌性赤痢方

雲浮 趙裕才

【處方】 黃芩四錢，川連二錢，檳榔三錢，枳壳三錢，川朴三錢，當歸身五錢，白芍四錢，廣木香（後下）二錢，甘草二錢，生錦軍三錢，水煎

【加減法】 努責減少去錦軍加茜根三錢，熱減少減黃芩川連各一錢，腹痛減少減木香一錢，裡急後重減少減檳榔，枳壳川朴各一錢，膿血減少減歸身，白芍各二錢，此名退減芍藥湯法，如以上症狀任何一種加重，則依藥量照增，此名進加芍藥湯法，但總結一般治療經過，都屬逐漸減輕急性病狀，余以本方為主，痊癒率在90%以上而運用加減之法，服三劑而痊癒者指不勝屈，特介紹以促同業注視。

五、大便秘結

治大便不通方

封開 溫燦星

【處方】 生油四兩飲下即通。

慣性便秘

【處方】 草決明十兩

【用法】 每次用二兩水煎服，五次可愈

【適應症】 習慣性便秘，不屬於寒熱結範疇者。

治大便閉結

【處方】 巴戟一兩 白朮一兩 熟地一兩 萸肉一兩 附子三錢

【用法】 水煎服

【適應症】 便秘腸鳴作痛、胃噯冷氣、畏寒喜熱者。

六、小便窿閉

治尿閉方

鬱南 譚鑑初

【處方】 田螺肉（新鮮的）生鹽

【用法】 共搗爛敷小腹部移時即通，如有風寒，加吳萸末同敷。

治小便不通

高要 劉振旺

【處方】 田螺廿隻去壳、蒜頭二個

【用法】 共搗爛貼肚臍中三個三鐘有效、

【適應症】 尿泌不通

小便不通方

封開 廖文庭

- 【處方】 生葱連根一握，生鹽一撮，田螺七隻，三味共搥爛敷肚臍即通，（如夏季無葱時，用四季葱亦效）。

治小便不通方

雲浮 劉晉文

- 【處方】 假黃粟蘖煲水，加鹽服之，即通。

治閉小便驗方

雲浮 高恒均

- 【處方】 莎鷄四十九隻搥爛，沖白滾水飲。

治小便不通方

雲浮 區仲銘

- 【處方】 大田螺和大梅片搥爛敷肚臍。

又方

雲浮 趙裕才

- 【處方】 金櫻子強四兩，川滑石一兩，煎水內服，立通。

治小便刺痛及出血方

雲浮 黃士才

- 【處方】 木通三錢，生枝三錢，車前子三錢，大黃二錢，扁蓄二錢，瞿麥三錢，桃仁二錢，赤芍二錢，滑石三錢，甘草錢半，水煎，內服。

治男婦小便不通方

豐順潭江衛協

- 【處方】 抗青草四兩，煲和烏糖服即通。

又方

豐順潭江衛協

- 【處方】 白頸蚯蚓（最好在芭蕉樹下的）約六條，將泥去淨搥溶去渣，其汁和蜂蜜及開水服，（無蜜糖用鹽多粒，或米汁水亦可，）同樣製法，且可治小兒百日咳。

氣虛小便不出方

廣州 趙思競

【處方】 熟地四錢，萸肉二錢，淮山二錢，茯苓三錢，麗參三錢
(另燉) 麥芽三錢，牛膝二錢，車前二錢，玉桂四分(另局)

七、淋濁(包括砂淋·血淋·白淋·白淋·虛淋)

治砂淋方

揭陽六區曾紀識

【處方】 用韭菜煲醋沖六一散服之沙出。

又方

【處方】 用貓毛草，車前草，半呷(邊)蓮草煲水沖鹽少許服。

治砂淋方

【處方】 先煲冬瓜連湯帶渣食之，後用牛七、乳香、血餘、用酒水各半煎湯，加入血餘炭沖服，不效再作服。

治砂淋方

【處方】 白苧麻頭二兩，金砂五錢，水煎服有效。

治砂石淋效方

豐順 譚江衛協

【處方】 金錢草(即錢鑿口)煲水服之立效，重者數服。
本人曾親目見過真正之金錢草，不是錢鑿口，據文獻記載，對治砂石淋症確屬神效云，但錢鑿口是否同樣有效，有待今後之實驗，方能確定之。

治砂淋方

徐世雄

【處方】 蟋蟀二隻，男人用雄，女人用雌，用新瓦焙存性、六一散二錢，另用霧水草三錢，煎水沖服之。

又方

雲浮 蘇善卿

【處方】 扁蓄，瞿麥，葵子，海金砂，各三錢，煎水內服。

砂淋方

廣州 勞靖夷

【處方】 卑蠱（又名肥豬，形如小土別灰白色乾用研末）老荳角
蘊四兩。

【服法】 先將荳角蘊用水五碗煎至大半碗，沖入卑蠱末服之。

【適應症】 砂淋病，（即今膀胱石）

治沙淋方

鬱南 黃汝霖

【處方】 佛雙花

【用法】 煎水服

【適應症】 砂淋疼痛

治膀胱結石方

潮安縣 陳計生

【處方】 淡豆豉五錢， 牛膝三錢， 射香五厘

【用法】 清水煎服

【適應症】 膀胱疼痛，放散至直腸和生殖器，排尿障礙，尿線中斷，或見血尿。

治淋病

廣州 李鴻成

【處方】 劉寄奴一兩 川棟子四錢 木通五錢 澤瀉四錢 海金
砂六錢 瞿麥四錢

【用法】 水煎服

【適應症】 砂淋、白濁、小便刺痛。

又方

廣州 曾少安

【處方】 牛七三錢 乳香三錢

【用法】 水煎服

【適應症】 淋病小便刺痛

又 方

廣州 謝錫霖

【處 方】 馬蹄四兩，金錢草二兩。

【服 法】 水煎服

【適應症】 一般淋病

治血淋特效方

雲浮 趙裕才

【處 方】 牛七一兩，乳香三錢，水煎內服，最嚴重者，血水點滴而出，慘痛呼號，服至三劑，無不痊愈。

本方出驗方新編，經屢試屢驗，曾治愈多人，故特為介紹注意。

治血淋方

鬱南 習彩麟

【處 方】 琥珀三錢，正尖 三錢，六一散一兩。

【用 法】 用甘草牛七煎水冲服

治淋血方

鬱南 聶春榮

【處 方】 蓮鬚，川連，地榆，阿膠，只壳，赤茯，各三錢，黃芩，生地，木通各四錢，黑枝六錢，燈心二束。

【用 法】 同煎服

溺血驗方

陳鉅昌

【處 方】 粟米心，鬚，莢，三樣（即玉蜀黍）生用或晒干，每次用數兩以清水數碗煎取一碗頓服，約數十次即愈

治男子血尿方

雲浮 溫 星

【處 方】 水瓜壳煎服，加萊菔子同煎更效。

男子血淋不止方

廣州 趙思競

【處方】 陳枳壳一錢，海金沙一錢，滑石一錢，黃連錢半，瞿麥一錢，冬青子一錢，生甘草八分，王不留行一錢，燈心花一只。

【用法】 淨水煎服

小便出血痛不可忍方

廣州 趙思競

【處方】 淨豆豉一撮，煎湯服之奇效。

小便下血方

廣州 趙思競

【處方】 旱蓮草，車前草，取汁，每日空心一杯溫服。

治血淋症

廣州 黃濟時

【處方】 潞黨參三錢，白朮二錢，炙甘草一錢五分，雲茯苓四錢，滑石三錢，蒲黃三錢，琥珀二錢，車前子三錢，海金沙三錢，乾荷蒂二錢。

【用法】 清水二碗半煎至一碗，空腹溫服，日一劑，服至三，四劑，自愈。

【症狀】 形瘦體倦，小便不利，便時見血塊及白汁，大便日五六次。

治白濁方

雲浮 練華國

【處方】 獨行千里，六月雪，九里明，水煎內服。

治花柳白濁方

雲浮 黃林

【處方】 生白果一兩，川太片一兩，川百足（去頭足）四條，土瓜根蘖一兩，水煎內服，連服四至五次即愈。

治神經衰弱小便混濁方

潮安縣 陳宗虞

- 【處方】 茯苓一兩，淮山一兩，金英五錢，茨實一兩，蓮子一兩，棗肉五錢，薏仁六錢，人字草一兩。
- 【製服法】 上藥用水溫燉熟晒乾，研爲細末，米糊爲丸如梧桐子大，每早晚飯前各服三錢，滾水送下。
- 【適應症】 輕度神經衰弱並發現小便混濁者。

八、黃 疸

治黃疸方

廣州 區英傑

- 【處方】 雞骨草二兩至四兩 瘦豬肉一塊
- 【用法】 將肉和葯共煎湯服。
- 【適應症】 全身及角膜均發黃

又 方

廣州 葉 英

- 【處方】 黃皮核一兩，鷄骨草五兩，豬肉三兩
- 【用法】 將葯和肉共煎湯服，連服二十次，每次要煎三小時。
- 【適應症】 小便眼白黃，身體疲倦，飲食不思。

治黃疸方

帙名

- 【處方】 生薏米四錢，綿茵陳五錢，川軍太四錢，瞿麥三錢，扁蓄三錢，車前三錢，木通三錢，滑石六錢，枝子三錢，胆草四錢，甘草錢半
- 【服法】 用水煎服，連服四次。
- 【適應症】 皮膚面目均黃，屬於熱性的。

治陽黃疸特效方

雲浮 趙裕才

- 【處方】 用滿天星草四兩，搗爛，放沙盆中，另煮茵陳蒿二兩去滓，沖沙盆裏，澄清，再去滿天星滓，使病人盡量內服，不三服而愈。

治黃疸經驗方

雲浮 朱星葵

- 【處方】 川草太錢半，川木瓜錢半，秦艽二錢，茵陳錢半，黃柏錢半，山枝二錢，石斛二錢，猪苓錢半，聞澤瀉錢半，木通錢半，龍胆草二錢，酒苓錢半。
- 【附註】 患本病者，身體、四肢、面、目、二便皆黃，宜服本方，並用銅器煲水浴身即愈。
- 【編者按】 本方祇治陽黃，如屬陰黃勿服。

治黃疸方

高要縣 廖平世

- 【處方】 對面針強六兩、毛雞一隻。
- 【製服法】 男子患此症用母雞一隻，女子患此症用公雞一隻，加些油鹽用水八碗連藥，煲至一碗連雞同食，
- 【適應症】 全身皮膚皆黃、面部和眼睛亦黃、不論男女患此症，服三劑痊癒。

黃疸外治方

婦幼隊 雷慶餘

- 【處方】 硃砂二錢，苦丁香八錢，母麻雀糞八錢，共研成粉。
- 【用法】 取竹筒一枝，將藥粉放入竹筒內，吹入病人鼻孔中，須用力吹進內部，吹後叫病人伏着面坐或臥，使鼻孔內黃水流出，任由他流至乾淨為度，不可用手阻止。
- 【注意】 吹藥前，須將鼻涕排淨，免阻礙藥粉入內，吹藥後如口中感覺有苦味，不可嚥下，須即吐出。三天即可全愈。

黃病方

廣州 趙思競

【處方】 馬鞭草適量煎湯常飲自愈。

黃腫丸

廣州 趙思競

【處方】 渣肉七錢，香付三錢，生黨七錢，青皮二錢，麥冬二錢，麗參一錢，茯神三錢，白朮五錢，杜仲四錢，炮羌一錢

【用法】 研末蜜丸，硃砂爲衣，每服七分。

黃食妙方

廣州 趙思競

【處方】 龍鱗草煲猪精肉食

慢性黃病（阻塞性黃疸）方

南城 肅 熙

【處方】 黨參二兩，白朮二兩，雲苓三兩，生甘草八分錢，針砂二錢，皂礬焙存性錢半，鷄內金二兩。

【用法】 研細末，蜜丸，如梧子大，每服五分至一錢，日三服，後。

吐血（包括鼻衄、大便下血、血友病）

胃出血方

封開 徐行莊

【處方】 蒲黃三錢，生地三錢，川連三錢，生枝三錢，甘草錢半，黃芩三錢，花粉二錢，側柏三錢，犀角錢半（先煲）水煎冷服。

【適應】 大熱吐血。

又方

封開 鍾毓芬

【處方】 生蓮藕半斤，扁柏葉二兩，搗爛沖滾水冷飲，三次便愈。

【適應】 心中發熱吐血。

治新吐血經驗方

雲浮 趙裕才

【處方】 生側柏葉，生萊菔頭生，蓮藕連節，共納臼中搗爛，絞取清汁，調服三七末錢半，立止。

治血熱妄行方

雲浮 陳維龍

【處方】 生萊菔，搗汁盡量服之。

止新吐血驗方

雲浮 曾仲鍊

【處方】 旱蓮草鮮者四兩搗爛，沖童便飲之，加生柏子共搗爛共服尤效，服下即止。

新吐血方

雲浮 曾仲鍊

【處方】 藕節煲旱蓮草服之。即愈。

治吐血方

雲浮 黎彥樞

【處方】 生鉄炒紅，熟塩一錢，微炒，煎服，即止。

治吐血良方

雲浮 鄧慶耀

【處方】 鹹藕節一兩半，柏子仁三錢，菟麥草一兩，煎服。

治嘔血方

雲浮 保民診所

【處方】 生地五錢，藕節四錢，山枝三錢，天葵三錢，百部四錢，茜根四錢，大麥冬三錢煎服。

治吐血經驗方

雲浮 伍 佳

【處方】 胎血餘（煨存性）合柏子仁三錢研末，沖入滾水一兩，再加童子便約一至二兩，服之。

治吐血不止方

雲浮 樊榮華

【處方】 灶心坭一兩，百草霜五錢，爲末，煎服。

又 方

雲浮 樊榮華

【處方】 仙鶴草一兩，白茅根花三錢，煨炭煎服。

治吐血方

鬱南 陳德軒

【處方】 茜根五錢，藕節一兩

【服法】 水煎加蜜調服。

【適應症】 一般吐血

治吐血良方

番禺

【處方】 生茅根五錢，紅棗十枚，生地五錢，仙鶴草三錢，蓮子五錢，丹皮五錢，鹿含草三錢，杏仁三錢，扁柏五錢，茜根草四錢，牛膝三錢，薤菜一兩煎服。

【適應症】 上中下三焦心肺、脾胃、腎肝、血散而吐。

又 方

番禺

- 【處方】 黑枝子四錢，歸身三錢，桃仁三錢，黑磁石兩，炮羌一錢，生花三錢，生地黄五錢，志通三錢，白及三錢，仙法夏三錢，花粉三錢，田七二錢。
- 【服法】 用水煎成加生蓮湯汁和葯服。
- 【適應症】 治忽然從口吐出之血，乃咯血、衄血散行。

治吐血方

- 【處方】 仙鶴草一兩，白茅花煨炭三錢
- 【服法】 水煎服

治吐血鼻血方

鬱南 黎達權

- 【處方】 黑墨草，百草霜，側柏葉。
- 【用法】 用水煎好，加童便沖服。

治鼻血、吐血、大便血、同時發現方

鬱南 莫兆平

- 【處方】 生地炭三錢，生茅根一兩，丹皮二錢，白芍四錢，阿膠二錢，側柏葉三錢，大黃炭三錢，茜根二錢半。
- 【服法】 同煎湯加田七末六分，再加入童便沖服。

治鼻流血方

番禺

- 【處方】 山枝子、大甘草、煨炭研細末加梅片吹入鼻血即止。
- 【適應症】 兼治皮膚外傷出血、或刀破傷出血。

鼻出血方

封開縣 李考年

- 【處方】 生地五錢，天冬三錢，麥冬四錢，茜根四錢，白及四錢，黑枝子四錢，黑側柏四錢。
- 【服法】 水煎服

【適應症】 血熱妄行、鼻血不止。

又 方

封開縣 三區馮飛鳶

【處 方】 茅根五錢，生地一兩，加桑白四錢，黑枝二錢更效。

【服 法】 水煎服

【適應症】 一般血熱鼻出血。

又 方

封開縣

【處 方】 生地一兩，麥冬一兩

【服 法】 水煎服

【適應症】 鼻流血不止

又 方

封開縣 張少眉

【處 方】 西根四錢，黑枝子一錢，茅根四錢，藕節二錢

【服 法】 水煎服

【適應症】 鼻血不止

又 方

河源 楊鳳鳴

【處 方】 雞屎藤二兩 猪肉

【用 法】 二項共煎湯服

【適應症】 鼻出血、牙血、嘔血。

治鼻血屢驗方

廣州 麥潔泉

【處 方】 早造禾頭六錢，大紅棗去核三枚

【用 法】 清水四碗煎至一碗，如患者無外感發熱兼病，可加瘦猪肉些少同煲，服二、三劑自可全愈。

【適 應】 流鼻血不論新久及多少俱皆適用。

治遍身毛管出血 雲浮 潘良杰

【處方】 松毛煲水候冷，用布或巾浸透水舖皮膚出血處。

治逢孔出血的 血經驗良方 雲浮 譚培彬

【處方】 五靈脂五錢，炒克靈脂五錢，側柏葉三錢，用滾水煲滾，加蜜糖五錢煎服效。

肺癆（包括咳血）

治肺癆 番禺五區關南溪

【處方】 鮮胎盆一個。
【製服法】 取婦人產後之新鮮胎盆，用水洗淨，再用生鹽擦過，然後再洗去鹽味，切成粗條，加米煲粥食。
【適應症】 治療五臟損傷，補而不燥，並無不良副作用，多食亦有益無害，功能調補血氣，係治療肺癆有效藥之一（製乾藥名紫河車）。

又方 番禺五區 關南溪

【處方】 人參七分，阿膠三錢炙炒，牛蒡子三錢，南杏三錢，糯米二錢半，馬兜鈴二錢，甘草七分。
【服法】 水煎服
【適應症】 治肺癆功能補肺，服此方同時煲鮮胎盆三次食可痊癒。

又方 (同上)

【方用】 白及先用清水洗淨，隔水在飯面蒸過，再晒乾，研為細末，每次用白及粉二錢，和蜂蜜五錢，開水沖服，每晚睡前服食一次，至半月後可隔晚服一次，此藥對破金型

肺癆，（即聲帶已破發音嘶嘎），尤爲有效。

又 方

番禺五區關南溪

【方 用】 虎乳靈芝三錢，加入上開補肺阿膠散，煎服。

【適應症】 對肺癆咯血症甚有療效，或用虎乳靈芝和冬蟲草，燉黑肉竹絲雞食亦佳。

肺癆咯血驗方

廣州 趙思競

【處 方】 鷄屎藤五錢，蜜棗一大粒，石仙桃兩，鳳凰雞（有毛）五錢，扁柏五錢，藕節五錢。

【用 法】 一日一劑煎服。

治先痰後血方

【處 方】 天冬三錢，枝子二錢，龜甲二錢，陳皮錢半，生地四錢，紫苑三錢，黃芩三錢，桑白三錢，茯苓三錢，白芍三錢，阿膠炒二錢，甘草錢半，烏梅二錢。

【服 法】 水煎服。

【適應症】 屬於肺熱而吐血者。

治先血後痰方

【處 方】 生地二錢，熟地三錢，天冬麥冬各二錢，陳皮錢半，知母錢半，黃柏（蜜炒）二錢，白芍（酒炒）二錢，歸身（酒洗）三錢，生羌三錢，大棗二枚。

【服 法】 同煎服。

【適應症】 屬於陰虛而吐血者。

治咳血

順德十區 陳義生

【處 方】 阿膠三錢，白及三錢，京柿五個（切片）。

【服 法】 清水二盅，煎至大半碗，再加食鹽少許溶化，倒出放溫服。

【適應症】 男婦兒咳血。

治肺出血

潮安 陳宗虞

【處方】 正硃砂三錢，正川貝三錢，煨中白三錢。

【服法】 上藥共研細末，入柿餅內加水一杯燉服，三小時服一次。

【適應症】 肺結核出血，及外傷性肺血管破裂出血。

又方

【處方】 竹茹絲一兩，鉄包金五錢，穿破石五錢，石猪肝三錢，云田七三錢。

【服法】 上藥用水煎候涼服，連服二三劑，每日一劑，有卓效。

【附記】 內鉄包金，穿破石猪肝，係生草藥，廣州生草藥舖有賣，如別地無此藥，則可不用，即用竹茹三兩，田七三錢，鹽二分，水煎涼服亦效。

治咳血良方

【處方】 海底椰三錢，磁石八錢，葶薺三錢，鹿含草三錢，咸秋石錢，百部二錢，茜根四錢，生地四錢，山枝四錢，熟地四錢，桃仁二錢，川貝三錢，牛黃一分沖服，加生珠柏，生蓮藕汁和葯服。

【適應症】 治咳痰和血日久，肺經出血。

咳 嗽

枝氣管炎方

封開 梁雲山

【處方】 白前二錢，杏仁三錢（去皮）麻黃二錢（去節）桔梗二錢，百部二錢，紫苑三錢，地骨皮三錢，桑皮四錢，兜鈴三錢，陳皮錢半，知母三錢，蕁仁三錢（去油）甘草

錢半。

【用法】 水二碗煎至一碗，分二次溫服，一劑嗽咳減少，氣平得臥，再服下方。

【禁忌】 腥膩燥熱等物。

又 方

封開 梁雲山

【處方】 冬花三錢，桑白四錢，石羔三錢，百部二錢，桔梗二錢，陳皮錢半，杏仁三錢，（去皮）地骨皮三錢，兜鈴三錢，麻黃二錢，（去節）薑三仁錢，甘草錢半，柱角一錢（先煲）。

【用法】 先將黑柱角用水三碗先煎，後將各藥煎至一碗，分二次溫服，此症咳嗽再減少，氣喘平和，潮熱稍退，口不渴，食慾稍進，再將此方連服二劑，服後方。

又 方

封開 梁雲山

【處方】 麻黃二錢（去節）桑白四錢，地骨皮三錢，黑柱角一錢（先煲）牛子三錢，花粉三錢，石羔四錢，知母三錢，杏仁三錢（去皮）冬花三錢，百部二錢，桔梗二錢，陳皮錢半，甘草錢半。

【用法】 先將黑柱角用水三碗先煎，後將各藥煎至一碗，分二次溫服，此症咳嗽已大部份減少，不潮熱，食慾增進，再將此藥連服四劑便愈。

咳嗽痰實症方

封開 盧其欽

【處方】 貝母三錢，橘紅三錢，赤苓二錢，知母三錢，天冬三錢，玉竹三錢，薑壳二錢半，開冬三錢。

【用法】 水煎服，若咳痰見血加黑枝炭三錢半，絲瓜絡炭二個，血餘炭五分。

【編者按】 傷風咳嗽表邪未解忌用。

訶子散

開封 張普生

- 【處方】 訶子三錢，青黛四錢，川連三錢，海石四錢，黑枝四錢，葶仁四錢，黃芩四錢，川貝三錢，甘草二錢。
- 【用法】 若吐血，可單用生蓮葉煲水飲，連飲數次便愈。
- 【編者按】 非有實熱，勿用芩連。

治痰火咳嗽經驗良方

趙裕才

- 【處方】 青黛四錢，（水飛極細復研）川貝末三錢，蛤粉三錢，煉蜜丸如指頭大，臨臥含化三至四丸，其效如神。

治諸般咳嗽久不止方

- 【處方】 款冬花四錢，川貝母二錢，知母四錢，枇杷葉（去毛蜜棗）八錢。
- 【用法】 上藥先用水浸一小時，微煮數沸，加冰糖二兩，和勻，頻頻小服之，數日即止，屢用屢效。

治肺病吐血或肺癰肺癆等

- 【處方】 紅蔥頭煲猪瘦肉食，未愈再進，屢效。

治支氣管炎

- 【處方】 陳皮一錢，法夏四錢，白礬三分，川貝二錢，薄荷二分。
- 【適應症】 咳嗽痰多
- 【用法】 將上各藥研末，每服一至二錢，開水送下。

治慢性支氣管炎 潮安縣 陳去弱

- 【處方】 新鮮蘿蔔汁八兩，飴糖一兩
【服法】 上藥共燉化，候溫，每日二次分溫服
【適應症】 持續久咳，早晚及夜間增劇，咯痰粘稠。

止咳散 高要 趙芳伯

- 【處方】 頂舊陳皮一錢，半夏四錢，白凡三分五厘，川貝二錢，薄荷二分。
【製法】 將上列這藥共為細末，每服一錢至二錢。
【適應症】 咳嗽痰多，此散不寒不燥能立奏奇效。

治年久咳嗽不止方 葉良

- 【處方】 北杏二錢，人參二錢，阿膠一錢，桑白皮三錢，知母錢半，烏梅八只，罌粟壳二錢，甘草錢半，大棗四只。

肺炎及肺支氣管炎 廣州 歐學英

- 【處方】 土桑白皮一兩，土地骨一兩，粉甘草一錢。
【用法】 早午服一劑。
【說明】 如屬支氣管炎，照上藥加地龍干三錢，浙貝三錢，薄荷一錢煎服。

哮喘

治哮喘方 石牌華僑醫務所 張進金

- 【處方】 白菓甘粒，麻黃二分，款冬三錢，蘇子三錢，杏仁二錢，法夏一錢五分，桔梗一錢五分，甘草八分。
【用法】 用水三碗煎成一碗溫服，服二至三劑即停止，隨服下方即可痊愈。

又 方

【處 方】 熟地三錢，杞子二錢，黃芪四錢，黨參六錢，大棗十枚，羊肉一斤。

【服 法】 將葯和羊肉共同用水熬，熬至肉爛爲度，飲湯并吃羊肉，每星期服二次，連吃一個月。

治哮喘方

封開縣四區 何仲平

【處 方】 紫苑三錢，北杏三錢，明黨三錢，川貝二錢，荊芥錢半，麻黃三錢，冬花三錢，百部三錢，甘草一錢，法夏四錢，銀杏十枚（煨熟），梔 五分，生姜三片。

【服 法】 水煎服

【適應症】 氣喘不得臥

【附 記】 麻黃宜去節，先煎去沫。

治哮喘方

【處 方】 白菓廿一枚（炒香去壳）麻黃三錢，法夏三錢，款冬花三錢，桑白三錢，蘇子三錢，北杏三錢，黃芩三錢，甘草一錢生姜三片。

【服 法】 清水煎服。

治哮喘方

王鑑堂

【處 方】 淡豆豉五兩，製海石五錢，熟白朮五錢，枯礬一兩半，加工粉一兩八錢七分，正硃砂六錢。

【製 法】 共研細末水和爲丸，硃砂爲，如菜豆大，裝磚勿洩氣，勿使受潮濕。

【適應症】 男婦老少，新老諸般哮喘。

【服 法】 每次大人四五粒，小兒二三粒，用清茶或開水送下。能在發作前半小時服最佳。

【禁 忌】 孕婦勿服，戒公雞鯉魚，圓眼荔枝生痰滯氣等物。

治哮喘方

順德大良 董少宸

【處方】 龍涎香一錢，麗參三錢，牛黃一錢，射香二分，殭蠶三錢，鬧洋花一錢，鍾乳石一錢，防黨四錢，細辛一錢五分，鹿茸二錢，歸身三錢，茯神一兩，牛膝五錢，熟地一兩，款冬四錢。

【製法】 共研細末，米糊爲丸，每粒五分。

【適應症】 體虛無熱的哮喘。

【服法】 每服一丸，開水送下，連服數天。

治哮喘方(吸入法)

順德大良 董立三

【處方】 法夏五錢，川貝五錢，鬧洋花四兩（以二兩切絲），薄荷葉二錢切成絲，毛射香（生草藥）五錢，老生羌一斤。

【錢法】 將法夏川貝二味研爲末，用老羌取汁和勻，燉兩句鐘，再用鬧洋花二兩，毛射香五錢 水，與各藥和勻，晒極干，然後以生切熟烟混合，捲作紙烟或用旱烟筒吸入，哮喘立止。

【適應症】 新舊哮喘。

治哮喘實驗丸方

廣州 朱國英

【處方】 龍涎香四分，正砂仁三分，竹黃精六分，橘紅皮四分，製南星七分，舊陳皮二分，上川朴五分，炒蘇子三分，正牛黃六分，七製信石三分，正珍珠錢，煨蒙石五分，胆凡七分，正秋石五分。

【製法】 “信石”用水豆腐製七次，將上藥研末，用淡豆豉二錢半煎水搗爛，加麵粉二錢一分和藥粉爲小丸。

【用法】 成年人每次七厘，晨早清茶送下，小兒減半，輕症漸減至全愈。

皂莢散

廣州 胡倍功

- 【處方】 皂莢二兩。
【用法】 研爲細末，每次一錢，每日一次，滾水送服。
【適應】 哮喘。

治哮喘方

高要莫章 黎鑑源

- 【處方】 金雞納霜一分，陳皮一分，春砂仁（去壳）二錢，蘇子二錢，龍涎香三分，毛桔紅四分，川朴四分，正秋石五分，煨蒙石五分，竹黃六分，正牛黃六分，胆星七分，珍珠末一錢，胆凡七分，製信石三分。
【用法】 共爲細末，另用淡豆豉三錢搗爛，水一盅，和麵粉二錢，打和爲丸，每丸重二厘，服够一足劑量，即可全愈。
【服法】 頭一個月，每天服七丸，第二三月，每天早晚各服七丸，第四個月，每天仍服七丸，用六安茶或清遠茶送下，白開水亦可。
處方內信石一味，毒性極大，一定要依法泡製後可用。
製信石方法：把信石用布包好，取豆腐及甘草搗爛，同放在大瓦煲內，加滿清水，連煮兩晝夜，取出信石，陰干研末，合藥使用。

治哮喘特效方

封開 何仲平

- 【處方】 紫苑三錢，北杏三錢，明黨三錢，川貝二錢，荊芥錢半，麻黃三錢，冬花三錢，百部三錢，甘草一錢，法夏四錢，銀杏十枚，皂仁五分，生羌三片，水服。

治哮喘方

蘇善卿

- 【處方】 貓腸全副，用男童便浸四十九天，撈起晒干，煨過，又青骨鳥（煨）一雙，加法半夏三錢，北杏仁三錢，玄胡

三錢。

【用法】 共爲細末，每服二錢，開白粥食之。

哮喘又方

潮安縣 陳德發

【處方】 川貝母一兩，海漂消一兩，田蛙一大只。

【製服法】 將田蛙去腹腔內腸什清水洗淨待用，將川貝，海漂消裝入田蛙腹中，用線縫合，用臘紙包裹，外塗田泥，厚六分，以手整爲長方形，瓦上煨至田泥白色爲度，去泥，將田蛙連藥研爲細末，每天服三次，飯後各服二錢。

【適應症】 如上述哮喘症狀，須於發作後長期服用。

治哮喘病藥膏方

潮安縣 謝平山

【處方】 防黨八錢，茯苓八錢，白朮六錢，炙甘草三錢，陳皮四錢，半夏五錢，蘇子三錢，薏苡一兩，胡桃六錢，甜杏仁五錢，桂枝一錢五分，白菓二十粒，款冬花五錢，麻黃二錢，沉香二錢五分，杏仁五錢，五味一錢五分。

【製服法】 上藥研爲細末，用雪蜜十二兩，飴糖六兩，豬油一兩混和藥末熬成膏，再加入羌汁一兩五錢和勻卽成，每天服三次，每次服大棗一枚，開水送下。

【禁忌】 戒食生冷及刺激性食物。

【護理】 睡眠時頸背部要保持溫暖。

【適應症】 哮喘病，（支氣管喘息）（并治慢性氣管炎）一般多在夜間發作，吸呼困難，喘鳴或咳嗽，顏面蒼白，胸部有壓逼感，不能平臥，（至慢性氣管炎）緩和的只有經常咳嗽，臨床沒有顯著症狀，重型的咳嗽劇烈，常在上呼吸道感染，在冬季多會發作，無發熱及血象變化，聽診呼吸音強銳，呈水泡音或笛音。

肺 癰

治肺膿瘍

順德大良 董立三

【處方】 銀花二錢，浙貝四錢，生苡仁五錢，白及一錢半，亭力子三錢，桔梗三錢，陳皮八分，甘草節二錢。

【服法】 用水煎一次頓服。

【適應症】 肺膿瘍，咳嗽吐濃痰，發熱，胸痛。

又方

封開 梁斗南

【處方】 葶藶三錢，苡米五錢，桃仁二錢，瓜瓣八分，甘草一錢，桔梗錢半。

【用法】 水煎服，二劑可愈，後用苡米煲粥食全愈。

【適應症】 肺膿瘍口臭，痰似膿，脈滑大。

又方

開建 梁尙俊

【處方】 牛子二錢，連喬二錢，元參三錢，川貝二錢，銀花二錢，條芩二錢，花粉二錢，知母二錢，桑皮三錢，萎仁三錢，前胡二錢，苡米三錢，桔梗二錢。

【用法】 水煎一次服。

【適應症】 肺癰肺痿初期，咳血痰黑色，氣喘，肌肉消瘦。

【禁忌】 孕婦勿用。

又方

廣州 趙思競

【處方】 久年蒜頭醋隨量吸服。

瘧 疾

良性瘧（間日瘧或三日瘧）

封開 梁澤民

- 【處方】 柴胡二錢，黃芩二錢，法夏二錢，知母三錢，川朴一錢，檳榔二錢，青皮一錢，桃仁三錢，川紅花錢半。
- 【加減法】 頭痛甚加藁本，蘇葉各三錢，骨節疼痛加威靈仙三錢，蒼朮二錢，口渴去法夏加花粉三錢，口乾唇舌均紅，去檳榔，川朴，法夏，加赤芍二錢，茅根一兩，柴胡減至一錢，青皮八分，有厚苔加川連一錢，查炭二錢，大渴汗出，熱時胸滿難堪，去檳榔，川朴，青皮法夏，加石羔茅根，竹葉連翹。夜熱不甚，時間無定，一日二三度發加桂枝赤芍。上述症狀而夜熱甚的加當歸，痰多加川貝，無汗而骨節疼痛氣喘或咳嗽的加麻黃北杏，三數日大便不通，苔黃厚的，加大黃枳實。
- 【適應症】 寒熱兩型並具，有汗或無汗，發作有時，每日間日或三日發作一次者。
- 【說明】 梁乃津中醫師云：理血，調整熱型，健胃，殺滅瘧原虫，為中法治瘧的四大用藥原則。……一般良性瘧，可以本方為主，根據加減法去取，甚有效，但殺滅瘧原虫的力量，本方實嫌不足，能於用藥的同日，給予西藥對於良性瘧的任何一種治程，則效果十分穩當，如無西藥，可用常山四、五錢，但常山有催吐作用，須用酒洗，再加入紅棗三四枚去核，收效也很好，如祇用常山一味，很難有效。
- 【禁忌】 孕婦忌用桃仁，紅花。

又 方

同 前

【處 方】 石羔一兩，知母五錢，柴胡（寒多者多用，寒微者少用，無寒者不用）竹葉四錢，茅根一錢，黃三錢，花粉四錢，連翹四錢，桃仁三錢，川紅花二錢，威靈仙錢半，牛膝四錢。

【加減法】 夜發而唇紅齒燥者，去柴胡加生地元參赤芍，苔厚膩者加川貝竹茹，胸滿吐甚加玉樞丹，小便不利滑石木通。

【適應症】 寒微熱甚，或但熱不寒，口渴汗出或不汗出，胸滿煩燥，骨節疼煩時嘔者。

【說 明】 梁乃津中醫師云：本方所治較第一方爲重，更應並用西藥，如無西藥，應入常山紅棗，有西瓜時，口渴多吃西瓜，無西瓜以茅根馬蹄（連皮）西瓜皮煎水代茶，本型病症，單用西藥三四天方效，單用中藥要五天，中西合用一两天可效，本型再發機會較上方爲少。

又 方

同 前

【處 方】 升麻一錢，柴胡二錢，首烏四錢，當歸三錢，黃芩四錢，炒黨參三錢，別甲五錢，白朮二錢，陳皮二錢，黑棗四枚，生羌二錢。

【加減法】 嘔加半夏云苓，骨節疼煩加桂枝靈仙，頭痛甚加日芷藁本，大便不通加崧蓉，麻仁，川朴。

【適應症】 虛人貧血患瘧者。

【說 明】 梁乃津中醫師云：營養不良和體虛胃弱者，一旦患瘧貧血立見，此時祇用抗瘧藥多不見效，有時祇見抗瘧藥的副作用，很易變成慢性瘧，作者於此類症狀，用本方已收到效數十次，有些病者服藥後三四小時，一切症狀立即好轉，作者近來常用百樂君，繼續與本方再服一星期左右，再發率大減，本型病症不能用奎寧。

又 方

- 【處 方】 柴胡三錢，桂枝二錢，干羌一錢，花粉三錢，黃芩二錢，牡蠣六錢，炒黨參三錢，酒炒常山五錢別甲五錢，生羌二錢，大棗四枚。
- 【加減法】 不渴而嘔，去花粉加半夏，吳萸，云苓，身體瘦弱，時出盜汗，去花粉加黃芪，當歸，浮小麥，夜甚的加當歸，本型可用阿的平爲主藥的一個治程。
- 【適應症】 寒多熱少，頭眩汗出，胸 苦悶，心悸不安而口渴者。

又 方

- 【處 方】 桂枝二錢，赤芍二錢，柴胡錢半，當歸三錢，青蒿二錢，別甲四錢，青皮錢半，川紅花錢半（酒洗）。
- 【加減法】 渴加花粉茅根，枝桂減半，紅花不用酒炒，嘔加生羌半夏，本型可用白樂君爲主藥的一個治程。
- 【適應症】 夜瘧微寒微熱，或但熱不寒但寒不熱者。

又 方

- 【處 方】 干羌錢半，附片三錢，厚朴二錢，蒼朮二錢，常山三錢，（酒炒）當歸三錢，草果二枚，白蔻仁錢半，紅棗四枚（去核）。
- 【加減法】 嘔甚加川椒吳萸半夏，汗多加龍骨牡蠣，本方並用西藥時最好先服本方一日，第二日起然後服阿的平或百樂君，不可用奎寧。
- 【適應症】 寒熱甚微，或寒甚熱微，唇舌淡白，脈微細而弱，古說所謂“虛寒特甚者”。

惡性瘧

- 【處 方】 連翹五錢，茅根一兩，石羔一兩，知母四錢，桃仁四錢（打）川紅花二錢，赤芍四錢，山甲五錢，地龍四錢，

元參六錢，射香一分，玉樞丹三錢，全虫二錢，兼用奎寧注射。

【加減法】 微寒者加柴胡少許，舌無苔者加生地石斛，骨節疼痛者加少量歸尾，大便不通加大黃。

【適應症】 熱型不清，高熱昏迷頭痛如劈，口渴干嘔，胸滿痞脹，脈弦數大，舌質畧紅，舌面如堆粉末者。

【說明】 梁乃津中醫師云：作者於抗戰期間，西藥絕時，粵北惡瘧流行極烈，曾以本方治療過很多患者，多數有效，但如有奎寧，則應用奎寧為佳，注射奎寧兼用本方，收效很快，營養不良者，淮山于肉枝子山地元參知母石斛煎水代茶，口渴者，有西瓜時最好多吃西瓜，治瘧用理血劑，作者多年來經驗很有效，寒性用當歸，熱性用桃紅，……這類瘧疾，如用白虎柴胡之類，不但無效，而且病更加重。本型又可兼用玉樞丹……又中藥對於瘧疾的常用方，如金匱的鱉甲煎丸，張景岳的何人飲，局方常山飲，和倪涵初治瘧第一二諸方，都有一定的作用。請讀者們自己參考。

瘧疾方

封開 莫兆豐

【處方】 鱉甲三錢，山甲珠一錢，木賊二錢，桂枝尖錢半，鹿角霜三錢，防黨二錢半，首烏三錢，生羌三片，歸身二錢（土炒）紅棗二只。

【用法】 水煎服，連服二、三劑。

【說明】 該方久瘧適用，初起熱瘧不宜。

瘧疾昏厥救急法

該方是封開縣二區梁澤民從蕭俊逸治傷寒（腸熱病）另吞六神丸，紫雪丹的方法借治瘧昏厥經試驗有效。

【處方】 雷允上六神丸十粒，橘花仙館紫雪丹一瓶，（小兒酌減），

【用法】 先將六神丸搗爛然後和勻紫雪丹，用煖白滾水沖灌，

(不可用滾住的水冲下) 灌完紫雪丹之後，須繼續進白滾水二三次。

【說明】 若服完紫雪丹六神丸二小時仍未甦醒者，可繼進雷少逸的宣竅導痰法——竺黃二錢，遠志一錢，石菖五分，杏仁三錢，葶仁三錢，僵蠶三錢，皂角炭五分，水煎服，若腦症狀顯著者，可加犀角，川連，胆艸，紅花，丹皮赤芍等，神經性症狀顯著者，加羚羊勾藤，全蝎，菊花，天麻等。

【禁忌】 孕婦忌用。

瘧疾加減柴胡青蒿飲方

豐順 許振剛

【處方】 北柴胡三錢，浙青蒿二錢，條黃芩二錢，肥知母三錢，常山根二錢半（酒炒）川秦艽二錢，大烏梅二枚。

【服法】 水二碗煎至六分，空腹服，（成人量）小兒減半，老人酌減孕婦忌。

【加減法】 若嘔不止者加羌半夏三錢，寒長而熱微者去知母，加桂枝七分至一錢，若熱多微寒或無寒兼多汗而頭痛者，加生石膏八錢，（碎）至若高熱不退，頭劇痛，漸進昏迷者，生石膏加至兩半至二兩，打碎先煎，原方加桃仁三錢，川紅花二錢，胆草一錢，用水三大碗煎存一碗，頻頻灌服，至人事清醒，熱較退時，將原方減輕分量，繼續再服九劑，若慢性瘧（久瘧）或三日瘧，脾臟腫大，寒熱均不顯著者，去知母黃芩川芎，加鱉甲（酒醋炙）八錢、黨參五錢，首烏四錢，水三碗煎七分，連服七至十劑，脾腫一定消細，瘧也全癒。

【適應症】 良性瘧、間日瘧、三日瘧、惡性瘧、慢性瘧。

【附註】 患者原不嘔者，服此方不嘔，藥性和平，無副作用，如孕婦患惡瘧，可不用桃仁，紅花，加羚羊三分，（另燉）

治瘡疾經驗良方

雲浮 區功蓋

- 【處方】 柴胡錢半，枳壳五分，白芷五分，防風八分，粉甘草五分，雲查肉五分，廣陳皮八分，青皮八分，法半夏一錢，前胡八分，生羌三片。
- 【用法】 水煎，提早一點半鐘服之。
- 【附註】 本方分量雖少，而收效甚大，經驗多人，不可輕視

治發冷病方

雲浮 樊榮華

- 【處方】 常山一兩，生羌五錢，水煎服之即愈，小童酌減用之

治瘡疾方

雲浮 歐國英

- 【處方】 柴胡二錢，黃芩二錢，厚朴七分，甘草七分，草果五分，常山錢半，青皮五分，青蒿一錢，生羌一片，水煎服。

治瘡疾方

雲浮 林業初

- 【處方】 川杜仲一兩，煎服即愈，如單寒無熱者，用鱉甲飲加杜仲地榆煎水服之。

治瘡疾方

雲浮 趙裕才

- 【處方】 常山二錢，尖檳三錢，烏梅二只，柴胡三錢
- 【加減法】 如熱少寒多加草果仁錢半，寒少熱多加知母三錢，口渴加花粉四錢，嘔吐加法夏三錢，生羌一錢。
- 【用法】 水煎服，服時宜在瘡發前兩小時飲葯，法當一劑，瘡止如仍未解時加針大椎合谷二穴必效。

治單寒牝瘡方

雲浮 黃進旆

- 【處方】 川足（去頭足）一條，研末，用膏葯一隻以川足末作葯心放膏葯內貼項後處。

瘧疾驗方

廣州 李陳濟

- 【處方】 常山三錢川芎二錢，白朮二錢，草菓七分紅棗七只，甘草七分。
- 【用法】 水三碗煎至一碗，沖酒服。另外用白芥子末五分，白胡椒粉五分和酒攪，在發冷前一時將葯貼腕上脉門緊縛之，男左女右，約三十分鐘，覺痛，即解去，屬重症日再貼一次。

瘧疾方

廣州 陳培淦

- 【處方】 蜘蛛壳（即蜘蛛脫出之壳）
- 【用法】 將壳搓碎，以黑棗或元肉裹之，於瘧發前三小時服食，並頻啜熱粥其瘧即止。
- 【適應症】 間日瘧，或日日瘧。

治長寒瘧疾

廣州 黃春田

- 【處方】 大葉雙眼龍葉五分（研末）尖檳六分（研末）
- 【用法】 葯末和酒沖服。
- 【適應症】 長寒瘧疾。
- 【說明】 據獻方者謂：“此方係傳自禺北老中醫謝植溪先生，患者服食，確有效果，並說服食後，全身滾熱，起一種反抗作用。能制止寒戰云。

治疫瘧效方

- 【處方】 川厚朮一錢，製夏一錢五分，良玉錢半，草菓（煨）八分酒炒黃芩錢半，甘草五分，藿香一錢，加生羌三片爲引
- 【用法】 清水煎服
- 【適應症】 此方係雷少逸時病論之宣透膜原法，又師吳又可達原飲之法，方中去知母之苦寒及白芍之酸斂，仍用朴、檳、草菓、達其膜原，驅其盤踞之邪，黃芩清燥熱之餘，

草爲和中之用，擬加藿香暢氣調脾，生羌破陰化濕、濕穢乘入膜原而作瘧者，此法必奏效。

又 方

同 上

【處 方】 川厚朴錢半，良玉錢半，草菓一錢，黃芩四錢，甘草錢半，藿香二錢，製半夏錢半，去心麥冬三錢，天花粉三錢。

【用 法】 用清水煎服

【適應症】 脈右勝於左、瘧發間日，寒少熱多，自汗、欲吐、腹痛身體疼、舌胎黃膩口渴、小便黃、係感濕熱患疫瘧所致擬宜透膜原法加味。

又方當歸六黃湯

同 上

【處 方】 當歸頭五錢，黃芪三錢，生地三錢，熟地三錢，黃連一錢，黃芩錢半，黃柏錢半，臭草錢半，浮小麥五錢，泡光參五分。

【服 法】 清水煎服

【適應症】 脈右浮數而虛、左細小、係邪熱未清而陰血陽氣空虛。

脚 氣

治療脚氣驗方

順德 李庭芬

【處 方】 眉豆四兩，生羌五錢，通草二錢，紅棗八個，蒜頭二個青皮兩個。

【製 法】 用清水同煎，煎至眉豆開花、連水帶渣服食

【適應症】 治一般性脚氣、廣泛地取得治療效果。

又方治濕脚氣

潮安縣 王邦安

【處方】 射香一分，沉香二錢，木香一錢五分，蒼朮一錢，薏苡三錢，羌蠶二錢，羌半夏一錢五分，桂枝一錢五分，紅花一錢，甘草一錢，川木瓜一錢五分。

【服法】 上藥共研爲細末，每天服三次，每飯時用散二錢與飯調勻，另用糯米、綠豆、蒜頭共煮熟作飯或粳米花生仁煮食

【適應症】 治下肢水腫、屬於維他命 B 乙種缺乏引起者

脚氣症驗方

廣州 趙思鏡

【處方】 水魚一只約斤餘，勿放血，原身放入水鍋內燒至將滾，俟其死，剝去青黑衣膜，復用滾水煮透，然後割開去腸臟，勿接觸冷水，斬開五件，放瓦罐內加綠豆八錢土苡仁一兩半和後列藥汁隔水燉四小時，用咸檸檬汁點食，並趁熱飲汁。

山菩提鮮用二兩（勿錯用老鼠担冬瓜）

鮮崩大碗七錢，金釵斛錢半，川木瓜錢半，陳皮錢半，淮牛七一錢，水三碗煎取碗半作燉魚用。

癱 痺

治中風類偏枯症方

高要縣 莫家濟

【處方】 靈龜兩只，土茯苓十兩，虎骨十兩，桑枝十兩，先將龜放在瓦盅內用火炙，刮去衣不用，破開肚全隻連上開三味藥放於大罌內熬兩日夜去渣取汁，將汁貯起後另用羌活四錢，獨活四錢川牛膝六錢，桂枝四錢，防風六錢，天麻四錢，水煎至一碗去渣共上四味藥汁燉熟分二次服

【適應症】 偏枯或左或右不用等症。

治顏面神經麻痺方 潮安縣 陳樹剛

【處方】 (內服) 天麻六錢，雙勾藤六錢，金蟬肚廿隻，全蝎去頭足八個，羌蠶六錢，硃砂三錢。

【用法】 上藥共研爲極細末，每天飯後各服一錢五分，滾水沖服。

【適應症】 本病主徵通常是一側性面部癱瘓、患側面肌弛緩、無表情、額部不出皺紋、眼臉開大、(兔眼) 鼻唇溝消失、口角下降、麻痺顯著時口裂被牽至健側、咀嚼談話、唾吐、漱口都障礙，味覺缺損、反射運動不存在。

(外用) 草麻子去壳七十粒、射香五厘、共搗爛成羔，作一次攤於玻璃紙上，粘貼健側，(即麻痺喎斜在左貼在右方，患在右者貼在左方。

又方

潮安縣 李仰衡

【處方】 巴豆去壳三十六粒，草麻子三十六粒，射香三厘。

【外用法】 將巴豆和草麻子加高粱酒搗爛後摻入射香。

如口眼歪在左將藥羔貼於右手寸口脉上歪在右側貼在左手寸口脉上，貼藥時間以二十四小時爲度，至面部有灼熱感則去藥、如熱太高、應提前一小時去藥。

桂枝茯苓丸

廣州 梁朝宗

【處方】 桂枝尖一兩二錢，桃仁泥八錢，赤芍八錢，丹皮八錢，云苓二兩四錢。

【用法】 共研極細末，米糊爲小丸，每服三錢，飯前用滾水沖服。

【適應症】 麻痺、一身之中，凡有一次覺得麻痺狀、或骨節疼痛。

驅風逐濕湯

廣州 崔顯時

【處方】 獨活一錢半，牛膝五錢，桑寄生五錢，當歸三錢，生地五錢，火麻仁(打)六錢，續斷三錢，木瓜四錢。

【用法】 水三碗煎至八分，日一劑，溫服。

【適應症】 一切風濕痹，手足攣痛，麻痺不仁，腰痛背強，筋瘦骨弱，而無實邪者。

水腫（包括蠱脹，並附血吸虫晚期效方）

水腫氣腫方

封開 八耀榮

【處方】 生軍四錢，青皮四錢，牽牛三錢，亭力四錢，甘遂三錢，大戟三錢，芫花三錢，商陸三錢，枳壳三錢，連翹三錢，木香五錢，蛤粉三錢，陳皮五錢，桑白三錢，椒目三錢，玉桂五分，用七醋三兩同炒酒乾研細末，麪粉爲丸綠豆大，每服廿丸，每日空心服一次，至二次陳皮湯送下，先服陳皮湯消上部，桑白湯消中部，服芫皮湯消下部兼要攻補行氣，宜煎服——白朮茯苓澤瀉北芪木香蘇葉牽牛（醋炒）亭力等藥。

水腫或腹水症方

封開 符汝英

【處方】 鯉魚一條（大人八兩一條，小兒用四兩一條左右）用鹽煨熟盡服，將魚在腹部割開一寸許闊，取出腸臟，抹乾腹內血液，用生鹽二斤，炒至黑色，將鹽敷密鯉魚，蓋回鑊蓋，候一小時即熟，一次盡食，連服三四天，依這方法可消。

本方適宜於營養不良性水腫，腎炎水腫忌鹽，注意勿用爲要。

又方

封開 蘇次平

【處方】 萊菔子三錢，淮山三錢，神曲五錢，枳壳二錢，車前子二錢，玉桂一分，土炒白朮，白茯苓，生苡仁各一兩，甘草三分，水煎分三次溫服。

【適應症】 水濕腫脹日久，胃口不開者。

治實症腹水方

潮安縣 陳映山

【處方】 商陸三錢，甘遂四錢，大戟三錢，黑丑四錢，白丑四錢
法夏四錢

【用法】 上藥研爲細末，每日服二次，每次一錢五分，滾水沖服

【適應症】 各種原因引起腹水、腹部膨脹有壓重感、臍窩消失、腹壁靜脈怒張、打診濁音、因橫膈膜被推向上、常有心悸亢進、呼吸困難、一般小不利、本方治於實症而脈有力者、體弱而脈微細者不適用之。

水腫方

廣州 陳振煦

【處方】 黃皮果葉數斤，燒灰

【用法】 將灰浸水內攪勻，用布濾過，將水煮飯食二三次，利水消腫甚速

【附註】 忌食糯米、麵、鹽五星期。

治急性腎炎

廣州 譚石生

【處方】 麻黃，北杏，苡仁，生甘草，赤小豆，陳葫蘆瓜壳，桑

【用法】 皮水煎服，數劑可愈。

【適應症】 急性腎炎、眼面浮腫、發高熱、尿少、血尿。

治慢性腎炎

廣州 譚石生

【處方】 白朮八錢，附子八錢，茯苓一兩半，白芍六錢，干羌三錢，麻黃一錢半，紅棗三枚。

【服法】 水煎服。

【適應症】 下肢浮腫、面目亦腫、心悸、小便短少、舌白潤，脈遲弱心有什音。

【附註】 上方是一主方，但仍當隨症狀的變化而加減靈活運用。

慢性腎炎方

臨高 陳其中

【處方】 老熟地五錢，丹皮二錢，車前一錢，萸肉三錢，澤瀉二錢，萊服子二錢，淮山三錢，磁石二錢，黑牽牛錢半，三錢，牛七二錢，燈草爲引。

【服法】 水煎服連十劑。

【適應症】 慢性腎炎

治水腫

廣州 陳振煦

【處方】 大戟甘遂，羌花，青蛙。

【用法】 將三味葯研末，給青蛙食，把青蛙晒乾，頭肢腹分別煨乾頭腫用頭，手腫用上肢，足腫用下肢，腹腫用腹部末，開水或燒酒調服，每次三錢至五錢。

【附記】 戒食鹽

治腎病水腫

羅定縣

【處方】 防黨三兩，白朮三兩，茯苓五兩，炙草五錢，陳皮一兩，法夏一兩，蒼朮二兩，北芪三兩，熟付一兩，土玉桂一兩，羌皮一兩，川椒一兩，吳萸五錢，白蔻仁五錢，川厚朴五錢，腹皮五錢，丁香五錢，炒薏米三兩，防己二兩，香加皮一兩，防風五錢。

【製法】 以上共二十二味，合爲細末。

【服法】 成年人每服三錢，每日服二次，早晚用米湯送服，十歲左右減半，更小的酌減用，又輕症可減服。

【適應症】 治一般水腫病、虛弱、倦怠、胃消化不良或胞、小便短少次數多、脈博沉遲，細、弱、無力者均可服用，有興奮強心、健胃消食、利水消腫。

小兒虛寒水腫方

豐順 周治清

【處方】 甘遂五分，羌花一錢，赤茯苓錢半，白朮七分，油桂三分

油朴八分，澤瀉七分，只亮七分，小荷三分，茵陳一錢。

【用法】 水一碗煎三分服。

【附註】 以上是六歲小兒藥量，成人增加分量，或用麵糞糊丸之則瀉，煎劑不瀉。

治肺水腫方（心臟性水腫同時有效）

【處方】 玉桂心四分，茯苓五錢，熟地五錢，柏子仁三錢，北芪四錢，熟棗仁五錢，山萸肉四錢，遠志一錢五分，白朮三錢。川加皮六錢，熟附子三錢。

【服法】 清水煎服。

【適應症】 心臟衰弱、全身水腫、心跳、氣喘。

五種鼓脹症方

廣州 趙思競

甘遂醋炒二錢大戟二錢元胡二錢木香二錢羌花二錢醋炒亭力二錢醋炒川貝錢半田七錢半共研末輕症每次五分，中症七分、重症多至一錢，一日早午晚各服一次，開水送服。

鼓脹收功方

廣州 趙思競

【處方】 小兒角五錢，干羌五錢，白朮五錢。

【用法】 將藥煲茶飲之，凡遇此症將上藥末服之，以好尿為證，然後用三味煎，自然收功，服藥之時忌用鹽醬，魚腥，凡人體虛弱，倘以前食藥過多，須用清化玉桂煲水沖藥粉食以佐元氣。

鼓脹十九方

廣州 趙思競

（一） 第一日回渣，小便必長，忌葷一日。

【處方】 白朮一錢半（土炒）茯苓二錢半（去皮）赤茯苓半（去

皮) 陳皮錢半, 半夏(羌汁炒) 木通(酒炒晒乾) 蘇葉各一錢, 生羌一大片, 大帶肉三枚。

(二) 第二日早, 回渣, 以後不思葷。

【處方】 白朮錢半(土炒) 茯苓錢半, 赤茯苓半, 陳皮錢半 青皮錢(醋炒) 春砂錢(去皮, 打) 生羌三片。

(三) 第二日午, 回渣。

【處方】 白朮(土炒) 半夏(羌汁炒) 春砂(去衣醋炒) 草果(去皮) 木通各一錢, 黃芩八分(酒炒) 豬苓一錢半, (去皮忌鐵) 蘇葉八分, (炒碎) 磨沉香三分, (沖)

(四) 晚, 回渣。

【處方】 豬苓一錢半(去皮, 忌鐵) 磨沉香四分(沖) 川朴(羌汁炒) 烏藥, 春砂(去衣) 白朮, 各八分, 澤瀉, 尖檳白茯苓, 白朮(土炒) 半夏, (羌汁炒) 香附, (醋炒) 黃芪麥冬(去心) 翟麥各錢。

(五) 第三日早, 回渣。

【處方】 白朮錢(土炒), 木香錢半(切片), 草果(去皮), 半夏蒼朮, 各一錢(米泔炒) 白芷, 春砂(去皮打), 厚朴(羌汁炒), 陳皮各八分, 黃芪錢(蜜炙), 丁香三分(切片), 蘇葉一分(炒碎), 磨沉香五分(沖)。

(六) 第四日回渣, 與第三日早服方用午, 回渣。

【處方】 白朮土炒錢半, 白茯苓, 香附(醋炒) 各一錢二分, 澤瀉厚朴, 羌汁炒, 木通、歸身、(酒炒) 木瓜錢, 春砂(炒碎) 黃芩(酒炒), 青皮(醋炒), 陳皮, 各八分。

(七) 晚五更, 回渣。

【處方】 白朮土炒, 香附(醋炒) 陳皮各錢, 木通、半夏羌汁炒, 腹皮, (酒洗晒干) 白茯苓去皮只壳、木瓜、麥冬、(去心) 蒼朮(泔水泡) 檳榔, 各錢, 磨沉香五分(沖), 白芷尾八

分，（碎）藿香梗八分。

（八） 第五晚四更回渣。

【處方】 白朮二錢，（去皮）白朮錢半，（土炒）陳皮錢，川朴一分（羌汁炒）木通、香附、（醋炒）砂仁、（去衣研）羌夏（羌汁炒）木瓜、蘇葉、（炒碎）枳壳八分，（羌汁炒）

（九） 第六日早回渣。

【處方】 半夏錢半，（羌汁炒）瞿麥錢，木瓜錢，炙芪八分，木香八分，（片蜜炙）蒼朮錢，（米甘浸炒），砂仁錢半，（去衣）蘇子二分，（炒碎）

（十） 午、回渣。

【處方】 白朮（土炒）豬苓，（去皮、忌鐵）白朮各錢半，陳皮、木香、澤瀉各一錢。

（十一） 第七日，午、回渣，與六日午胆方同，晚、回渣。

【處方】 白朮木二錢半，（土炒）半夏錢半，（羌汁炒）白朮錢半，（去皮）扁蓄八分，木香八分（片）木瓜、陳皮、木香、瞿麥、枳壳、蘇子（炒碎）檳榔各一錢。

（十二） 第八日晚、回渣。

【處方】 豬苓，（忌鐵）白朮，各錢半（土炒）瞿麥、葶藶（炒打）木通、陳皮、澤瀉，各一錢。（片）

（十三） 第九日早、回渣。

【處方】 白朮，（土炒）錢半，白朮錢半，陳皮錢，蘇子（炒打）錢，木香（片）八分。

（十四） 午、回渣。

【處方】 白朮，香附，（醋炒）木通，各錢半，石榴皮、檳榔蘇子，（炒研）壳春砂，萊菔子，（炒研）陳皮錢、磨沉香八分（沖）

(十五) 晚、回渣。

【處方】 白朮（土炒）豬苓，（去皮忌鐵）茯苓，澤瀉各錢半，陳皮錢，瞿麥錢，燈草十條，（每長六寸）

(十六) 第十日，早、回渣。

【處方】 香附（醋炒）木香，（切片）川朴，（羌汁）陳皮、蘇子，（炒研）春砂各一錢（去皮碎）白朮（土炒）木通、白茯苓各錢半，半夏二錢，（羌汁炒）白芷八分。

(十七) 午、回渣。

【處方】 白芷、桑白、只壳、香附（醋炒）羌夏（羌汁炒）蘇子（炒研）青皮、檳榔、陳皮各一錢，木瓜、木通、白朮（土炒）麥芽各錢半砂仁八分（去壳研）木香（切片）八分磨沉香八分（沖）。

(十八) 緊皮丸

【處方】 人參、生地、赤茯苓、神曲（醋炒）木通車前麥芽（炒）澤瀉白茯苓（去皮忌鐵）青皮（醋炒）半夏（茯苓汁炒）各一兩蒼朮二兩（羌汁炒）陳皮二兩故紙二兩（鹽水炒）白歸身二兩（酒洗）莖朮八錢（醋炒）正川朴一兩（羌汁炒）

【用法】 麵糊爲小丸早晚每吞三十粒，白滾水送下倘貧不得人參者，可去人參仍爲丸用五錢，研調開下代參膏。

代參膏

【處方】 玉竹二斤防風二兩，炙芪一斤，杞子十二兩（酒蒸）杞葉六兩（蜜炙）天冬八兩龍眼肉十二兩，地黃十二兩，（濕紙包煨熟，切片酒浸一夜）熬膏煉蜜十二兩，收貯開緊皮丸，並治九種胃痛但恐藥力猛略停數日方可食，孕婦忌。

(十九) 開鹽方

【處方】 白朮八分，射香五厘爲末入鯽魚二條（去腸臟）生鹽一兩

兩紙包固煨熟新瓦焙干研末搗一宿，每早晚用水服一錢

治血吸虫藥方（即治蟲脹黃疸）

海康 尹盛初

- 【處方】 水仙子五錢，百步五錢，蕪荑五錢，使君肉兩，春砂四錢，百草霜五錢，皂凡兩半，蒼朮五錢，文旦五錢，商陸五錢，茵陳兩半，水蛭十條，山竹仔皮四只皮壳，山道年五錢，川朴根七錢，只實兩，白芍七錢，茯苓兩安桂心三錢，蘆薈四錢，東洋參兩，羌黃五錢，腹皮三錢
- 【製法】 共爲細末，用片糖十兩，煎成膠和藥粉爲丸各梧子大，每早晚服三次，每次服二錢，服完此劑可愈七八成，再服用香砂六君子湯八九劑可愈。
- 【適應症】 治單腹鼓症

又方

- 【處方】 甘遂三錢，澤瀉三錢，大戟五錢，珍珠末二錢，射香三錢。
- 【製法】 共研爲細末，入米粉爲丸，每天早晨服一錢三分，用以下各藥按次每日取一味煎湯送丸服。
- （1）商陸末詳（2）木通四錢（3）麥冬三錢（4）田螺十只（5）側魚一條（6）燈心一錢，（7）枝子五只，服藥後飯量要畧爲減少一些，服藥後約10—15分鐘，腹部開始微痛，隨有嘔瀉，如見痢血也不要害怕，如見膿血並來，即應停藥，這是危症，在藥療效達（95%）晚期的症可癒，通常二至三週可以治愈。
- 【注意】 （1）治療期間及愈後一百天內，絕對戒鹽。
（2）生鷄、鯉魚、黃牛肉、永遠戒食。

又方

潘惠芳

- 【處方】 細辛四錢，麻黃三錢，白朮四錢，當歸三錢，白芍三

錢，此芪四錢，大棗十二枚。

【服法】 水煎服

【適應症】 治氣鼓

又方治各種蠱脹

李錫賜

【處方】 大黃二錢，青皮二錢，黑芷二錢，亭力二錢，桑白二錢，椒目二錢，陳皮二錢，連翹二錢，大戟二錢，甘遂二錢，羌花二錢，萊服子二錢，商陸二錢，玉桂二錢，枳殼二錢，木香二錢，蛤粉二錢。

【製服法】 已上各藥同醋頭二盅同炒爲極細末，每次服量（未詳）第一服用羌葱湯，五更時空心服，定然得瀉午時自止，即消面之腫，第二服用滾水湯五更時空心服，能消中步腫處，第三服用陳皮湯服能消腳下腫處輕者三服，重者五次，此五蠱方獨步，千金不可洩漏，明白照湯。

又方治氣蠱藥方

二區會 李錫賜

【處方】 烏藥錢半，桔梗錢，只壳二錢，檳榔八分，郁李仁二錢，乙金六分，香附二錢，醋炒三棱八分，瓜蒌霜二錢，川朴八分，青皮二錢，土狗七只，焙干去頭足，木香後下五分，沉香末五分冲。

【服法】 淨水煎

【適應症】 治氣蠱戒鹽一百日，倘誤食了鹽，用塘蝦搗爛煮湯食之即解，遲則復發難治，凡食物宜用米醋點白糖糖，切戒無鱗魚田螺狗肉等物，切記。

又方

二區會 李錫

【處方】 薤葛七錢，（如無以干葛代之）服二劑不好不治

【服法】 水煎服

【適應症】 酒蠱藥方，酒蠱又名蜘蛛蠱，畧與相類，此病酒積。所至腹中常悶。

又 方

李錫賜

- 【處 方】 生地三錢，紅花三錢，生軍三錢桃仁錢半去油，烏藥錢半，破布藥二錢，桔梗錢，枳壳錢，青皮錢，甘草錢半，川樸二錢，郁李仁二錢，土狗七只，焙干去頭足，沉香末五分，木香末五分。
- 【用 法】 水煎和冲二香末空肚服
- 【適應症】 治血蠱，此症婦人更多，皆因天癸不調，或產後停滯所致。

又 方

李錫賜

- 【處 方】 海漂蛸二錢，浸淡研末，茯苓末錢，大腹皮二錢，陳皮二錢，郁李仁二錢，甘草二錢，薄荷葉八分，土狗七只焙干去頭足。
- 【用 法】 淨水煎服
- 【適應症】 治水蠱手足俱浮腫，如係板蠱不治，按其腹狀如板，俱無軟處，此爲不治之症。

又 方

李錫賜

- 【處 方】 烏梅三個，熟軍二錢，生地二錢，三棱二錢醋炒，只壳錢，莪朮二錢醋炒，青皮錢，乙金六分，香附錢，烏藥錢半，川樸八分，薄荷八分，郁李仁二錢，瓜蒌霜二錢，土狗七只焙干去頭足，沉香末五分，木香末五分。
- 【用 法】 淨水煎和二香末服
- 【適應症】 治積蠱，以腹中常疼痛。

又方試看各症狀法

方法先用生鹽四兩炒熱，用布包放落患者臍下，看其曬色，若何色素，分辨甚麼症。

如係水蠱，鹽化水，如係血蠱鹽變紫紅色。

如係食蠱，鹽變紅色，如係氣蠱鹽變紫黑色，如氣虛中滿鹽仍本色。

又 方

李錫賜

- 【處 方】 大蒜頭五個，大田螺四個，車前子二錢。
【製 法】 共爲末埋餅貼臍下，扎緊一小時小便自利，如喘促難臥，取土狗七只去頭足焙干，用萊服子錢煎湯送下。

又 方

李錫賜

- 【處 方】 大戟二錢，芫花錢半，甘遂錢半，黑丑二錢，連翹二錢，川椒錢，巴豆錢，白朮二錢，萊服子二錢，青皮二錢，腹皮二錢，亭歷錢半，川黃錢半，砂仁錢半，益智子錢半，木香錢半，朱苓二錢，澤瀉錢，木通錢半。
【用 法】 已上共爲細末，用米醋煮麵糊爲丸如綠豆大，每服五錢，用陳皮葱酒煎湯送下，如服後肚內作痛，定痛散解之，方開列於下。
【適應症】 治五般蠱總方

定痛散方

- 【處 方】 元胡三錢，香附三錢木香錢，甘草錢，乳香錢半，沒藥錢半，巴豆三錢，共爲細末，用陳皮湯送下

又 方

李錫賜

- 【處 方】 海金砂錢半，灶心坭三錢半，黃岑錢半，莪朮錢半，茅朮三錢，百草霜錢半，苦地胆二錢半，澤瀉錢半，川烏二錢半，春砂仁三錢，江子肉錢，正川連二錢半，大黃錢半，朴硝錢半，三棱錢半。
【製 法】 共爲細末，用黑棗肉搥爛爲丸如綠豆大，每次服一錢，滾水吞下。
【適應症】 治雙腹蠱三腫三消法，如係水蠱加茵陳錢，如係食蠱加白

朮三錢，如係血蠱加山茺子錢射香錢，血竭錢半，銅綠錢半，硫磺錢半，半夏錢半，氣蠱加沉香二錢，四肢俱腫加石羔五錢，根據各蠱症加藥引煎水送丸服。

看症發藥一身不腫，獨一處腫是單鼓也，脚腫肚脹眼黃週身浮腫是雙蠱也，肚內有消有脹，是氣之脹也，皮黃眼黃週身浮腫，是黃腫水脹也，四邊帶痞肚有痛，是血脹也。

倘臍肚有紅筋十字過臍不可醫也，又肚臍突高腫流水爲不治之症，又面青白肚大青筋臍下開了，又手掌無紋不治，又陽事不舉不治，又陰消後腫不治。

〔附〕中華人民共和國衛生部血吸虫病 防治手冊中醫藥治療方法

中醫中藥對血吸蟲病的治療，雖然尚未發現最理想的方法，但我們相信祖國醫學文化遺產中，必定存在着很豐富的經驗，如浙江的腹水草、金黃丸，安徽的半邊蓮，江蘇的葫蘆虫筍和澤漆湯等，對晚期血吸虫病腹水的治療，都取得了良好的效果。所以，發揮廣大中醫力量，密切聯系羣衆，是發掘祖國醫藥對血吸虫病作鬥爭的重要措施。但研究中醫治療血吸虫病的方法，是應該有計劃有步驟的選擇病例，按病狀輕重等，分型別類，適宜地選方用藥，通過臨床觀察，研究分析，吸取經驗。有一定療效者（如腹水消失、症狀減輕、肝脾縮小等），即應及時推廣，不能片面地根據糞便中仍有虫卵而認爲無效。

在治療過程中，中西醫互相結合是當前的迫切要求，如對腹水消除、肝脾腫大縮小、解除併發黃胆症等，以及在不適於錒劑治療情況下均可以採用中醫中藥的治療，在採用中醫方法主治時，亦可應用西藥輔助治療（服中藥期間，護理工作應遵照中醫的意見），才能發揮更好的治療效果。

有計劃的集體治療，應詳細記錄病案，進行研究，觀察效果。一般的門診治療，亦需詳細記錄病案，並進行隨訪。中醫治療血吸虫病

各種類型的病例，臨床上採用不同的方藥，應詳細統計，以便集中研究，總結經驗，進行推廣。

茲根據江蘇、浙江、安徽三省，目前中醫中藥對血吸虫病的治療經驗，訂出初步治療方案，供各地治療中參考執行。

一、晚期血吸虫病有腹水症出現者可選用的藥法：

(一) 腹水草：經初步鑑定是多穗草，屬玄參科，多年生草，莖梢蔓生，端着地生根，即產生新株；莖梢有細毛，暗紅色，葉互生，花呈穗狀；腋生果，卵形，有二房室，每室有數粒種子，畧呈球狀；萼片針形，在浙江常山、諸暨、金華、杭州等縣均有生長。

1. 用法：將腹水草放於小瓦罐中，加水一碗（十兩左右），煎煮二小時，使藥汁乾達三分之一，即可倒出服用；每劑可服二煎，但第二劑加水半碗即可，煎法與第一次相同。

2. 藥量及療程：藥量及療程之長短，應按病人體質情況而決定，小兒酌減。根據常山方面經驗，每日用藥草5克至45克，分1—3次服完，空腹及飽時均可服，連服1—10天，休藥1—9天，服藥總量60—442.5克不等，平均量166克（一斤=500克，一兩=31.2克。166克=5.3兩）。

3. 療效：經浙江省衛生廳治療52例血吸虫病患者後，對晚期血吸虫病已有一定的療效。

4. 注意事項：一律採用低鹽飲食，每日食鹽不宜超過3克。

5. 反應：本藥毒性小，有如下反應。在第一及第二療程中，發生惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉的反應較多。嘔吐延續時間最長六小時，腹瀉最長6—7小時。第三及第四療程，發生腸鳴、倦怠、口乾的現象較多。

(二) 細米草：係野生植物，又名半邊蓮，屬桔梗科，李時珍本草綱目有記載。

1. 劑量及用法：將鮮半邊蓮去雜、洗淨、烘乾，服用前加水煮煎兩小時，過濾後製成10—15%煎劑，酌加糖漿，成人每日劑量為6—42克，分四次口服。

2.療程：由於此藥無毒性，服後亦無不良反應，可長期服用，根據安慶防治所治病經驗，每日六克劑量逐步提高到每日36克，連服二個月，而且治程由過去的60天縮短到40天左右。

3.療效：經安慶血吸虫病防治所試驗，對治療血吸虫病有顯著效果。

4.注意事項：忌食鹽。

(三) 葫蘆、虫筍：葫蘆係束腰形小葫蘆，一名京葫蘆，以江蘇、山東省產量較多，目前缺貨，應迅速推廣種植。

虫筍係受虫咬傷而萎縮的筍，以浙江紹興、平水地區產量較多。

1.劑量及用法：葫蘆、虫筍各六錢，加水500—600毫升，文火煎成150毫升，原藥照上法再煎二次，早、中、晚溫服。

2.療程：由於該藥品無毒性，亦無反應，可以長期服用，以消除腹水爲止。

3.療效：經江蘇省無錫防治所初步使用，對晚期血吸虫病腹水有良好效果。

4.注意事項：忌食鹽。

(四) 新方十寶丸：

1.藥品組成及配製：醋製芫花一兩、甘遂（甘草水浸）一兩、大戟二兩、扁蓄二兩、冬葵子二兩、防已二兩，上藥共研末，以紅棗二十只，去皮核搗爛爲丸如綠豆大。

2.劑量及用法：成人量每次服三——五錢，10—16歲減半服，空腹米湯送吞。

3.療程：45天，每隔一天服丸一次。以15天爲一個階段觀察效果。

4.療效：杭州市中醫門診部及嘉興縣衛生院，施用於晚期血吸虫病，在消除腹水上，獲得初步效果。

5.注意事項：忌食鹽。

(五) 金黃丸：

1.藥品組成及配製：黃鬱金一兩、腰黃一兩、巴豆（去油淨）35粒，上藥共研細末，水泛爲丸如綠豆大。

2.劑量及用法：成人量每日六分，分上下午二次空腹服，服時另用瞿麥一兩、甘草一錢、烏梅三錢加水250毫升，煎成80毫升；第二煎加水150毫升，煎至80毫升送服。

3.療程：40天。每服3天停藥1天；共服藥30天，停藥觀察10天。

4.療效：杭州市中醫門診部治療晚期血吸虫病腹水症，有初步效果。

5.注意事項：忌食鹽。

(六) 澤漆湯：

1.藥品組成及配製：澤漆莖葉（一名貓兒眼睛草、本草綱目有記載）五錢（杭州、蘇州草藥行均有出售、）紅棗四枚、赤豆二兩，將上列藥品用水500毫升，煎成250毫升。

2.用法：每日上、下午兩次服，10—16歲服量減半。

3.療程：36天。服藥10天，停藥2天；計服藥30天，停藥觀察三天。

4.療效：根據江蘇中醫院初步經驗，對晚期血吸虫病及一般腹水治療有顯著效果，並不引起吐瀉等反應。

5.注意事項：應吃低鹽食物。

二、晚期血吸虫病肝臟鬱血、腹如鼓、出現靜脈曲張，面目黧黑，唇舌有紫色者，可結合上面逐水方，參酌下列各方，加減選用：

(一)大黃蠱虫丸(金匱方)：大黃(酒蒸)二兩五錢、黃芩(炒)二兩、桃仁(炒去皮尖)四兩、杏仁(炒去皮尖)四兩、蠱虫(炒)一兩五錢、蟬蛻一兩五錢，蠱蟲(即地鼈虫，炒)一兩，水蛭(猪油熬)一兩五錢、甘草二兩、赤芍藥(炒)四兩、乾地黃十兩、乾漆一兩、上藥十二味研細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，酒飲服一錢五分，日三服。

(二)新方桂枝茯苓：桂枝三兩、桃仁三兩、茯苓三兩、赤芍三兩、羌螂虫三兩、水蛭一兩五錢、蠱虫二兩，上藥細研，煉蜜爲丸如

梧桐子大，每服一錢，日三服。

(三) 金鈴子散(劉河間方)：金鈴子三錢、醋製延胡三錢，上藥共研細末，每服二錢，日二服。

三、血吸虫病高度貧血，腹有痞塊，消瘦衰弱者， 可選用的藥方：

(一) 禽血(鵝、雞、鴨等生血)：

1.劑量及作用：取上列禽類生血一酒杯(多亦不妨)，加少量黃酒(約十與一之比)，加溫飲用，一日一、二次(多亦不妨)。

2.療程及療效：如供應可能時，可以常服，約二、三十天即顯著見效，營養改善，痞塊縮小，勞動力恢復。經蘇州角直農村診所初步試驗30餘例，其中12例係晚期血吸虫病，症狀消退後，糞便陰性的有四例。

3.應吃低鹽食物。

4.附註：此方係發現於木瀆民間一例晚期血吸病人，得此方治愈。按普濟良方早有記載：鵝血治痞塊，能消滅於無形云云。

(二) 黑大豆(千金方)：將黑大豆炒香、但不太熟，磨成粉，隨意服用，多少不拘。

(三) 赤豆紅棗粥(民間營養食物)：以赤豆、紅棗、粳米適量煮粥，隨意服用。

(四) 新方枳朮湯：枳實錢半、白朮三錢、生芪朮二錢、山查肉四錢，每日一劑，水煎服。

(五) 黃芪四物湯：黃芩三錢、當歸三錢、川芎一錢、大生地四錢、白芍半錢，每日一劑，水煎，二服。

四、急性血吸虫病，有粟粒結核型發熱、咳嗽、吐血等症者可選用的藥方：

(一) 生髓血：

1.劑量及用法：取新鮮髓血約30—50毫升，加黃酒3—5毫升，溫

開水沖服，一日一次。

2. 療程及療效：連服三、四天，如供應無問題，可以服7—10天。初步經驗，服三、四天後有效。

(二) 加減青蒿鼈甲湯：鼈甲五錢、青蒿二錢、黑糟豆四錢、地骨皮三錢、茜草根三錢、桑皮錢半、百部二錢、甘草五分、紅棗三枚，上藥加水，可煎二次，分上下午二次服。

五、痢疾型血吸虫病患者可選用的藥方：

(一) 畢澄茄散：無熱、腹痛、痢白者適用：

1. 藥品組成：畢澄茄一兩五錢、廣木香五錢。

2. 劑量及用法：將上藥共研細末。和勻，每日上、中、下午用開水各吞一次，每次服一錢（每天量三錢）。

3. 療程三——五天。

(二) 白頭翁湯：發熱、腹痛、痢赤者適用。

白頭翁五錢、川連錢半、黃柏二錢、秦皮三錢、水煎二次，分上下午二次服。

六、血吸虫病有急性高熱神昏者可選用的藥方：

(一) 犀角地黃湯。(二) 白虎湯。(三) 神犀丹。(四) 安宮牛黃丸、至寶丹等。

七 出現黃疸症狀者可選用茵陳蒿湯等

八、瘧疾型者可選用柴胡湯加減。

上海綜匯醫院用柴胡龍牡湯加減法初步有效。附方：鮮沙參一兩、軟柴胡一錢五分、左牡蠣二兩、花龍骨四錢川桂枝一錢、淡黃芩二錢、生川軍一錢五分、粉丹皮二錢、綿茵陳六錢、大青葉二錢。上藥一日量，煎二次，溫服。

上列各方，可根據中醫臨床經驗作為參考，隨症施用。

九、附錄：巴豆製劑（對腹水脹、虫脹有效）

本藥供研究參考。

（一）存心堂集驗方大走馬丸：巴豆60枚（去皮、心，皮炒令黃，勿枯焦，另研如脂）、生狼毒一兩（炙香、另研細末）、杏仁60枚（去皮尖、另研如脂），上三味，合搗一千杵。蜜和丸備用。

（二）存心堂集驗方巴豆五物丸：巴豆二兩（去皮、心，炒勿黑，另研如脂）、杏仁一兩（去皮尖、另研如脂）、續隨子一兩（去壳，取色白者，別研如泥）、商陸一兩、桔梗二兩。上藥各須精新，先搗桔梗、商陸爲末，將巴豆、杏仁、續隨子合勻，又搗二千杵，蜜和丸如菉豆大，每服二丸，白湯下，重者可服三丸、四丸。

〔附〕健康報433期烏臼根皮治療晚期 血吸虫病有效

包凌云

1954年，安徽寧國縣平興鄉40多歲船民李滿堂，因患血吸虫病發生重度腹水，腹部凸起，肚子脹得不能彎腰，不能勞動。他不得不賣掉一只容量7噸的大木船，到河瀝溪私人診所醫治（當時因血吸虫病防治機構只用酒石酸銻鉀治療血吸虫病，因而不肯收治晚期腹水病人）。他住在那里打針吃藥，放了幾次水，錢用盡了，腹水仍在發生，他只得失望地回家。鄉鄰給他請了一位老人，替他診治，取了幾包黃色的丸藥服用。幾天之後，腹水完全消除，飯量增加了。治好了病以後，李滿堂被疾病折磨得憔悴的面容，也逐漸紅潤起來。從前年至現在，一直健壯撐船勞動。

今年1月，寧國縣血吸虫病防治站副站長陳雨文同志知道了這件事，便訪問了病人，並到霞西區橋頭鋪訪問了這位老人葉春宏醫生。爲了讓更多的晚期血吸虫病病人恢復健康，葉春宏老先生獻出了七代祖傳治療鼓症的秘方——烏臼根皮丸；將自己能記得的近幾年治療過的十幾個病人告訴了寧國縣血吸虫病防治站。

防治站對葉春宏先生治療過的十幾個病人進行了訪問，初步證明烏臼根皮丸對晚期血吸虫病腹水病人有良好的療效。許多病人在未治療以前，都是重度腹水，經過葉先生用烏臼根皮丸治療以後，腹水大部消除，身體恢復健康，已經能從事正常勞動。其中有一重度腹水病人向經川，他在1954年冬天服過這種藥，防治站在訪問時給他作了三次糞便沉澱孵化檢查，都是陰性。這個事實，引起了該縣黨政領導的重視。

寧國縣現有晚期血吸虫病病人約6,000人。爲了解除這些人的疾苦，縣委決定由寧國縣血吸虫病防治站組織中醫進行臨床實驗。

1月16日，寧國縣血吸虫病防治站在寧墩區治療組第一批試用中藥烏臼根皮，收治了22名晚期血吸虫病病人，經過25天的療程，除其中1人因過春節回家，未繼續治療外，21例都結束了療程，出院時已消除腹水，恢復了健康。今年2月底該站隨訪了19個病人，其中有13例經過3次糞便檢查爲陰性。病人張清海，治療前腹圍105公分，脾臟15公分，喪失勞動力已經3年。治療後，不但腹水消除，腹圍縮小至80公分，脾臟縮小至10公分，而且，出院時直腸鏡檢和最近隨訪作沉澱孵化檢查都是陰性。現在，張清海已是農業生產合作社的生產能手，每天生產能評12—14工分。一般整勞動力每天可得8—12工分，12—14工分是生產能力很强的。

這個驚人的療效，大大地鼓舞了防治人員對用中藥治療晚期血吸虫病的信心。寧國縣血吸虫病防治站于今年2月23日在縣里以葉春宏老先生爲主正式成立了中醫治療組，收治重度、中度、輕度等不同程度腹水和一般血吸病患者150人。2月25日開始檢查，3月初服藥。僅半個月光景，經過臨床效果觀察，已經獲得很好的療效。78個腹水病人，體重平均減少3.429公斤（消除腹水，體重減輕）；病人普遍在服藥1—3次後，消除或減少了腹水；肝臟腫大的病人48個，在治療中縮小的有23人，佔47.9%；一般縮小1—7公分。脾臟腫大的病人63例，從開始治療到目前爲止，已有54例脾臟縮小，縮小程度1—7公分；黃疸指數高于11的16人，除一例比前增高外，大部分都減低到恢復正常或接近正常。150例中，服藥7錢到1兩1錢的33個病例，經

過3次糞便檢查，已有18例糞便檢查陰性。

寧國縣中醫治療組在這次收治的150個病人中，有這樣一個驚險的病例：寧國縣五區銀峯鄉，有個62歲的老農民揭興才，解放前就患血吸虫病，解放初已有腹水。去年年底，腹部已發生靜脈曲張，臍眼突出，腫脹得睡覺翻身需要人捧着肚子。今年2月，已臥床不起，便血，高燒，手脚發冷，鄰人看老人家無望了，叫他兒子揭福祥買棺材準備後事。老人呻吟着向兒子說：“聽說縣里政府派來許多好醫生，專治大肚子病。你抬我去試一試罷。治不好，死了也不怨。”3月4日揭福祥求人將老人抬到了寧國縣血吸虫病防治站中醫治療組。病人年老體弱，病又重，抬了一百多里路，受了些顛簸，吸呼已經微弱。揭福祥絕望地看着醫生，話也說不出來。

防治組的醫生們，雖然治過許多重度腹水病人，對治這樣已奄奄一息的危急病人，誰都沒有經驗。當時，醫生們都面露難色。“想想辦法，我們一定要把他從死亡的邊緣上挽救過來。”副站長陳雨文同志鼓勵着大家。

經過醫生們兩天的努力和細心治療，病人已脫離了險境。4、5天以後，腹圍已從97公分縮小到80公分，並且也能下床走動了。3月17日，當記者去訪問他時，老人正在院子里散步。醫生把記者向他介紹後，老人便滔滔不絕地述述起他病危經過的情景。他怕自己講得不詳細，把送他來防治組“現在還在這裡照顧他的兒子揭福祥叫來，替他做補充。”

“要不是毛主席，我這幾根老骨頭已經下了地了。”老人說着，感動地掉下了眼淚。

現在，寧國縣血吸虫病防治站中醫治療組的醫生們，對治療晚期血吸虫病人的信心更高了。爲了減少在治療過程中的嘔吐反應，他們研究改進了丸藥制作方法，將烏白根皮研末和入棗泥，使病人服後不發生嘔吐。經試用後，效果很好。病人服藥後，有些因瀉下（藥物使腹瀉以排除腹水）發生少腹痛，他們使用針灸在天樞穴上用雀啄術3—5分鐘，疼痛便消失；有些病人腹水消除後，脾塊有些疼痛，他們用針灸在章門穴扎入3至5分，雀啄1—2分鐘，疼痛也就消除，效

果很好。爲了提高烏臼根皮丸的療效，和縮短療程、減少反應，中醫治療組的醫生們正在準備進一步研究如何根據中醫“辯證論治”的法則，採用綜合性的治療方法，按照病人不同的情況，將烏臼根皮配制成不同的水丸、粉劑和複方，以更好、更快地使病人恢復健康，消滅血吸虫病。

關節痛

關節炎掀痛

順德 董少宸

【處方】 木通二兩乾切

【服法】 水二碗煎取一碗服，取熱服，服後有微汗爲度，痛畧止但痛位游走者加羌活防風，痛甚有汗加熟附子，無汗加麻黃，痛甚不能移動者加防杞，各藥以不超過三錢爲度。

頭痛（包括腦炎頭痛）

治腦脊髓膜炎方

番禺

【處方】 龍胆草三錢，犀角三分，黃連錢半，菊花三錢，生地五錢，當歸三錢，羚羊三分，加服安宮牛黃丸半個，沖服。

疝痛（包括睪丸炎及癰瘰積聚痛）

小腸疝氣痛方

雲浮 葉良

【處方】 荔枝核煨灰一兩，黃皮核五錢，柑核三錢，小茴香一錢，青皮一錢，吳萸八分，廣木香錢半，桂心三分，煎之服效。

小腸氣痛方

封開 童劍初

- 【處方】 豬苓三錢，荔枝三錢，柑核三錢，黃皮核二錢，（炒）枳殼二錢，（炒）青皮二錢，烏藥三錢，川茴二錢，木通二錢半，香附二錢，酒水各半煎服，後加酒一盅沖服。

寒疝神方

封開 羅焰南

- 【處方】 荔枝核一兩，（燒微焦）洋硫磺錢半，陳皮一錢。
【用法】 研末每服三錢，酒送下，二三服除根。
【適應】 睪丸痛甚，致於氣上沖心，手足厥冷。

疝氣（一）方

馬穩庵錄自臨宋各科綜合治療學

- 【處方】 川草薢三錢，歸尾三錢，橘核錢半，橘葉錢半，川棟子三錢，南查炭三錢，赤芍錢半，絲瓜絡錢半，澤瀉三錢，苡仁三錢，山枝錢半（炒焦），木通一錢，花粉三錢，赤豬苓各三錢，水煎服。
【適應】 睪丸漸次腫大，疼痛，潮紅，灼熱，小便赤痛。

疝氣（二）方

錄時逸人中國內科痛學

- 【處方】 桂枝錢半，白朮錢半，赤苓三錢，豬苓二錢，澤瀉二錢，小茴香五分，木香一錢，台烏二錢，吳萸五分，川練錢半。
【用法】 水煎服，寒甚者加附子干羌，內熱重去桂枝、吳萸、小茴，加山枝、黃芩，血滯加紅花桃仁，氣虛加北沙參，便瀉加苡仁車前。
【適應】 睪丸偏墜，腫痛脹大。

治睪丸痛方

黃繼榮

- 【處方】 北杏五錢，南杏五錢和鴨蛋打爛同煎服，如祇屬一個睪

丸腫痛，用鴨蛋一枚，兩個學丸皆腫痛則用鴨蛋二枚，連煎服二三次。必效。

治小腸氣驗方

番禺

- 【處方】 鬱金五錢，麥冬十粒。
【服法】 水二碗半煎成八分，一次服。
【適應症】 能止痛、止痛後再服一二劑能斷尾。

又方

- 【處方】 生麻雀一只連毛。
【製用法】 生放入瓦罐內，外用泥封，用火焙成炭，研成細末，分二次晨早開白粥服食自愈。
【適應症】 同上

治小腸疝氣方

麥炳榮

- 【處方】 螳螂三只煨存性、六一散一兩，白糖五錢沖滾水服之。

斷根疝氣方

蘇賢生

- 【處方】 生松葉（俗名松毛）半斤，生扁柏半斤，鷄蛋兩隻。
【製法】 先將松葉，柏葉洗淨以清水五碗煎至一碗，鷄蛋熟後去壳同藥煎。
【用法】 一次連同鷄蛋服食。
【適應】 壯年疝氣，濕熱下墜於膀胱。

治肝脾腫大經驗方

封開 趙裕才

- 【處方】 水邊紅辣蓼，半老穗者，全株，連頭帶子及葉拔起，洗淨曬乾，不拘多少，大蒜頭去衣膜，約與蓼等量，同納石臼中，打爛如泥，捏如餅狀，曬乾研末，每斤入蚶子壳煨灰研粉四兩，再用老蒜頭搗膏爲丸，如桐子大，每服百丸，空心白開水送下，日三服。外另用新鮮辣蓼同

蒜頭打爛，加皮硝一兩許，阿魏三錢，再搗捏成餅樣，量腫塊大小貼之，外用帶紮好，乾則換藥，約二三服即消。

積聚癥

封開 羅焰南

- 【處方】 加味六君子湯——人參二錢（炒），白朮錢半，陳皮錢半，法夏錢半，歸身錢半，茯苓錢半，莪朮二錢半，三稜八錢，木香錢半，鹽中四錢（醋灸）灸草一錢。
- 【用法】 水煎服，以蜜煉丸更妥。
- 【適應症】 虛弱人飲食留滯，聚積癥瘕血龜等。
- 【附註】 孕婦慎用。

癲 狂

醫治瘋顛方

孔憲武

- 【處方】 無論遠年初起，用豬肚一個，內放起碼金葉十張（普通漆匠貼金用的金葉，每張價值一二角而已），豬肚的口用線縫好，煮熟，水不要多，約兩大碗餘，連肚連湯，設法使患瘋顛的人盡行吃下，便可霍然而愈了。

治癲癇病丸劑方

潮安縣 陳去弱

- 【處方】 蟬衣五錢，硃砂二錢，明礬四錢，勾藤一兩，乙金五錢，製全蝎五錢，製蜈蚣三條，羌蠶一兩，天麻五錢，川芎五錢，防風五錢，白芍一兩，甘草五錢。
- 【製服法】 上藥共研為細末，麵糊為丸，如綠豆大，每次服一至二錢，每早晚服一次，如有發熱者，用生地、元參、麥冬，各三錢煎水送服。
- 【適應症】 猝然昏倒癱瘓，不省人事，口流白沫，顏面蒼白或發

赤，瞳孔散大，遺尿，具有顛癇徵狀者。

神經失性亂言方 廣州 李耀芝

- 【處方】 紫丹參三錢，雲茯神三錢，川鬱金三錢，石菖蒲二錢，生龍齒一兩，煨牡蠣五錢，熟棗仁五錢，柏子仁三錢，個牛黃四分，猴子棗二分，射香一分。
- 【製法】 用田盅一個，先將牛黃猴子棗搗幼末，放在盅底，次將藥放盅內，加入開水兩碗，蓋住盅，隔水燉兩點鐘取出，用紗布過濾。
- 【用法】 另用茶杯放入射香，將藥汁沖服，空肚服之。
- 【適應症】 失性，失眠，痰多，驚悸畏，妄想，幻覺夢多，精神恍惚等症。

撞紅、夾色傷寒、蘇勞

治撞紅經驗良方 雲浮 毛澤賢

- 【處方】 生地五錢，粉甘草錢半，黃芩四錢，生花三錢，蘇木四錢，連翹三錢，川滑石五錢，澤蘭三錢，木通四錢，水煎，連服二三劑即愈。

治撞紅經驗方 雲浮 潘鑑銘

- 【處方】 連翹三錢，滑石四錢，扁柏二錢，破石二錢，赤芍三錢，丹皮二錢，粉甘草錢半，生地五錢，紅花二錢，歸尾二錢，木通二錢，水煎服。

又方 雲浮 潘鑑銘

- 【處方】 生地五錢，滑石三錢，紅花二錢，朱芩四錢，澤蘭二錢，木通二錢，桃仁三錢，玄參四錢，連翹三錢，水煎服。

治撞紅及夾色方

雲浮 梁毅修

【處方】 老鼠屎樹強五錢，羅鼓勒強五錢，扁柏葉三錢，桑葉三錢，瓷瓦器粉四錢，榕樹鬚五錢，蔗一兩，水煎服。

治夾色傷寒方

雲浮 李明周

【處方】 生箭芪三錢，大歸身二錢，川芎錢半，玄胡索二錢，泡山甲二錢，橘紅三錢，陳佛手二錢，桃仁二錢，雲茯苓三錢，酒炒川木瓜二錢，酒炒牛七二錢，黑附片一錢，正羚羊錢半，（如無羚羊可用白桂片代之）水煎服。

祖傳治傷寒夾色經驗良方

雲浮 董愛朝

【處方】 東風桔強一兩五錢，生歸尾二錢，生地黄三錢，西秦艽三錢，雪梨乾四錢，川牛七三錢，六神樞三錢，淡竹葉二錢，蘇葉一錢，紅花八分，柴胡三錢，粉葛四錢，瞿麥三錢，苦瓜子三錢，赤芍三錢，淮通三錢，蔗尾白一條，古勞茶三錢，水煎內服。

【症狀】 頭重、舉則暈眩，腰痛，四肢麻痺，心翳等。

治傷寒夾色方

雲浮 邱萬方

【處方】 黑墨草半斤，淨水煎滾水沖服，效。

治夾色症灸法

雲浮 劉晉文

【處方】 用陳艾絨，加些少射香，在尾脊骨處灸五壯，手足指尖男左女右，灸五壯。

治夾色傷寒驗方

雲浮 鄧慶耀

【處方】 麻黃二錢，細辛二錢五分，羌活一錢，柴胡一錢，柴胡錢半，榕樹四鬚錢，羽箭錢半，雙寒頭五錢，崗松花

五錢，馬鞭草五錢，鴨腳木皮五錢，水煎服，如在夏季酷熱時，麻黃最多用至二錢半，不可過多，恐發汗不止。

治傷寒夾色方

雲浮 黎鏡泉

【處方】 白茅根一兩，生扁柏五錢，老勒強一兩，尖咀木芋頭一兩（切細絲用），榕樹吊鬚一兩，用米一兩同藥落鍋，炒至米變黃色，加入清水三碗煎數沸，以水一碗，給病者飲之，餘水並渣再沖水煮數沸，乘熱與病人洗身，立效。

治夾色傷寒方

彭明軒

【處方】 炮山甲錢半，歸身一錢，北芪七分，佛手一錢，玄胡一錢，橘紅七分，川木瓜錢半，桃仁一錢，牛七錢半，川芎五分，川芎一錢，茯苓半錢，羚羊角一錢，水煎服。

二日後，若脈沉而緊，或似虛浮者，用下方。

【處方】 羚羊角錢半，歸身一錢，川芎二錢，北柴胡二錢，佛手錢半，烏梅一只，酒洗西紅花五分，黃柏錢半，化橘紅錢半，牛七鹽水炒二錢，川芎一錢，知母鹽水炒二錢，水煎服。

【附註】 先用白礬五分令病人含之，如覺甜而不澀者，爲真夾色也，用生鷄仔和射香，梅片，敷肚臍，後用十三太保方。

本方與李明周上方藥同，但份量各異耳。

又方

【處方】 如太熱，用山枝一兩，淡豆豉三錢，煎服。

又 方

雲浮 彭明軒

【處 方】 四肢厥逆者，用當歸四逆湯——歸身三錢，桂枝二錢，白芍二錢，炙草錢半，木通錢半，細辛一錢，紅棗五只，水煎服，如寒盛者加吳萸二錢，生羌三錢，同煎服。

治夾色傷寒方

雲浮 伍雲佳

【處 方】 老鼠屎（生藥名）一兩，粉葛一兩半，蘇葉八錢，蘿蔔干二兩，燈籠草（又名搏仔草）二兩，生柏葉一兩，冬桑葉二兩，加冬竹蔗一斤，夏秋加黃糖二兩同煎。
伍雲佳醫生原詞：夾色傷寒原有論，印有鴛鴦兩條紋，男左，女右，有紅絲紋，重者難醫，皆暗沒，輕者未必喪失紋，但係青年須謹慎，免受此病喪他身。老粉、蘇籠、蘿白、柏，請祈加蔗要一觔，以上取齊各藥，用水五觔，煎至一觔，溫服，倘失治，死後週身黑，便是此症的失救，但患此症，手足麻木，手脚趾甲有黑色，兼身熱頭暈，便是對症，宜及早治療。

治蘇癆經驗方

雲浮 張勝初

【處 方】 木棉花蘗，兩便針，圓眼樹皮，鐵牛入石，酸味仔蘗，榕樹鬚，蘆花勒蘗，蘆根，楊桃樹寄生，以上九味各一兩，煎四小時 煎成湯，約二碗，夫婦同食，連服八次，屢試屢驗，（症狀）咳而無血，面目日漸枯黃，本病不出百日而死。

治蘇癆症良方

雲浮 衛永祺

【處 方】 酸五稔葉一斤，五月艾葉一斤，洗淨，共搗極爛，加燒酒四兩，再搗，絞出其汁，用生鷄仔一隻，約重半斤為度，殺取生鷄血沖汁內，和勻服之，立愈。

虛弱（包括貧血萎黃眩暈失眠怔忡遺精縮陽）

治貧血有效方

雲雲 趙裕才

【處方】鴨血（可在酒館定，鷄血無效）蒸熟，和入好酒，（最好是首烏酒）約二、三茶匙食之，不四五日，面色必轉紅潤。

【附註】此方傳自梅縣林海醫生屢試皆驗。

黃病方

封開 朱清湖

【處方】陳皮一兩，青凡五錢，川朴一兩，砂仁五錢。

【用法】共研細末，後用黑棗八兩，蒸熟去皮核杵爛加入前藥末爲小丸，每日服二錢。

【適應症】皮膚萎黃，全身倦怠，食慾減退，失神心悸，婦女月經不調。

怔忡病方

趙裕才

【處方】不落水豬心一隻，剖開，連豬心血，加入口米砂三錢，重湯燉約三、四小時，食之，食至兩三枚，可止。

失眠症（即亢陽症）效方

【處方】百合六錢，紫蘇錢，香付二錢，北味錢，淮山四錢，萸肉三錢，文且二錢，丹皮二錢，生地四錢，白茯四錢。

【用法】水煎服五劑，下午七句鐘服，宜靜養爲安。

【說明】此方不合老人，宜服歸脾湯亦可奏效，按失眠的方，治慢性腦沖血亦有效。

防眩湯

【處方】散黨五錢，半夏三錢，白朮五錢，當歸五錢，熟地兩，

白芍五錢，川芎四錢，黃肉四錢，天麻錢，陳皮五分。

【用法】 清水煎服。

【說明】 頭目暈眩雖屬小症，然而大病每由此而起，甚至暈眩眼目一時昏花，卒至猝倒而不可救者，宜及早治之，方名防眩湯者，此專治氣血之虛，不治頭目之暈眩，蓋氣足則陰陽和，陰陽和自不致頭眩，多服數劑，受益無窮。

遺精方

封開 集體創作

【處方】 雲茯苓、石蓮肉各三兩，山藥六兩，肇茨實三兩，共爲末。

【用法】 另用生金櫻子三斤熬膏和上藥末爲丸，每服三錢，淡鹽湯送下。

【適應症】 房事過多，性機能衰弱遺精。

虛性遺精方

封開 蘇世初

【處方】 龍骨、麻黃根、肉蓉、牡蠣、益智、破故紙，各二錢，蓮翬三錢，沙苑三錢，棉花仁三錢金櫻三錢，巴戟三錢，升麻一錢。

治遺精特效方

雲浮 趙裕才

【處方】 金櫻子半熟者，約十斤，剖去核及毛，重湯燉水，煎膏，肇茨實五兩，白雲蓮一兩，湘蓮肉二兩，共爲細末，加入生櫻子膏，和勻，日作口糖食之，不特止遺精神效，並能增進食慾，強壯筋骨。

治小便不禁方

雲浮 趙裕才

【處方】 野生白花薔薇根，煎濃汁，連服數次，果效。

治神經衰弱加味羊腎丸

潮安縣 李 衡

【處方】 高麗參一兩，淫羊藿一兩，仙茅一兩，沙苑一兩，陽起

石五錢，薏苡一兩，山茱萸六錢，巴戟六錢，鎖陽六錢，兔絲六錢，枸杞一兩。

【製用法】 各藥共爲細末，另用羊畢丸一對，水內燙硬，不要太熟，剝去外皮，晒干研末，與上藥末混和，煉蜜爲丸，如碗豆大，每早晚飯前各服三錢，滾水或服鹽湯送下，輕症一料則應效，重症多服。

【適應症】 陽萎、舉而不堅、早洩、屬於性神經衰弱疾患。

補腎方

廣州 鄧榮滋

【處方】 骨碎補一兩，巴戟四錢，杞子三錢，淮山兩，鎖陽五錢。

【用法】 煲豬腰（注意不要將腰肉洗）全腰煲食約二天食一次。

【適應症】 性神經衰弱，遺尿症。

此方出於清宮秘方，是先將骨碎補，鎖陽兩藥兩味相等在新瓦內煨乾取末，後將豬腰切開兩邊，將藥末放入，用絲線紮之在新瓦上煨乾存性，爲末，和蜜糖及棗肉爲丸，如梧桐子大，每次服二錢，早晚各一次，若覺熱氣口苦，則用鹽水送服，我在臨床上覺得丸製造上手續麻煩，且不能久藏易於變質，故改用飲食方法治療，既可以佐膳，且又可口，而功用比製丸功效爲快爲好，在治療上甚有功效，故錄出之以供有素疾者，可一試之。

治縮陽症方

蘇善卿

【處方】 白胡椒沖燒酒內服，若無白胡椒，用蛤蜊骨代之，如不效，或情勢危急者，以艾絨急急救之，在病人尾龍骨處，灸時加一銅錢，在錢眼處灸之，以免灸點太濶。

治縮陽良方

李明周

【處方】 白胡椒四兩打爛，沖酒服之，立效。

【附註】 據編者按上兩方相同，因縮陽症，乃因虛寒過度，乃經謂寒主收引之義，余曾親治縮陽症二人，當發作時，急

用戥秤盒夾之，隨用燒酒開火葯內服，皆效。

治縮陽方

黃德泉

- 【處方】 玉桂四分，杞子六錢，白胡椒三錢，破故紙（鹽酒炒）六錢，肉從蓉六錢，用水煎服，經驗多人。

治縮陽症方

鬱南 徐永田 林 躍 李君衡 潘振麟

- 【處方】 硫磺錢半（用天生石磺）
【用法】 冲滾水或酒服，另一方用胡椒粉冲滾水或酒服。

又 方

鬱南 莫兆平

- 【處方】 北芪五錢，石柱參錢，黑附子三錢，炮羌一兩，胆星三錢。
【用法】 共煎湯冲服桂心二分。

治睪丸縮上方

鬱南 黎彥樞

- 【處方】 木患子四只，塘虱魚一條，或加糯米煲粥食之，神效。

治小腸疝氣睪丸疼痛方

雲浮 黃進旒

- 【處方】 絲瓜核三錢，搗爛，冲開水服之。

傷寒（腸熱）

治腸熱

本市秉政街秉仁巷 周志偉

- 【處方】 痕芋頭四司兩（即木芋頭）
【用法】 將木芋頭切片用鑊炒至微黃，用清水約四司斤煲約八小時餘，煎成約二碗分數次服，約服三天可痊癒。
【適應症】 男女一般性腸熱療效。

又 方

番禺 鄧伯強

- 【處 方】 川滑石五錢，波薐一錢，川朴錢五分，北杏三錢，淡竹葉四錢，甘草二錢，法夏三錢，通草三錢，粳米一兩。
- 【用 法】 清水煎服。
- 【適應症】 舌胎潤灰色（中醫名爲濕溫症）。

治腸熱症驗方

陳治平

- 【處 方】 犀角五分（另煎沖服）正西藏紅花五分（另以葯水燉服）正土個牛黃三分（末粉沖服），生地五錢，土苡仁六錢，生蘆根兩，生蓮葉三張（取邊去心）小環釵四錢，梨乾四錢，雲苓四錢，正金汁二安沖服，連翹四錢，白薇四錢。
- 【用 法】 水四碗煎至大半碗，同葯末沖服，如口渴加生石膏兩，小便赤短加車前四錢，枝氣管及肺炎加桔梗四錢。
- 【症 狀】 唇焦、舌黑、口渴、譫語、腹部見紅暗斑點。

鼠 疫

治鼠疫症

前本市中醫 黎庇留

- 【處 方】 射干四錢，黃岑三錢，甘草二錢，連翹三錢，升麻二錢，雲苓半錢，川朴錢半，枳殼二錢，川連三錢，生地四錢，紅花三錢，銀花四錢，煎服。
- 【適應症】 係一種陰陽之毒，少陰受邪所致，脉浮洪，惡寒發熱嘔吐。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]
书名= 广东省各县市验方交流汇编 第一集 第一编 内科症类
作者= 广东省中医药研究委员会编
页数= 88
S S 号= 10444015
出版日期= 1956年07月